

玉樓微義卷之四十四

癰疹門

論癰疹證治

潔古云癰疹之病其為證各異癰發焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之癰小紅靨行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯癰證若自吐瀉者慎勿亂治而多吉謂邪氣上下皆出也癰疹並出小兒難禁是以別生他證也首尾不可下大抵安裏之藥多發表之藥少秘則微疎之令邪氣不壅併而能作香次使兒易禁也身溫煖者順身涼者逆

按此是例陽證發癰宜與小兒門癰論兼看證治論傷寒發癰有陰陽不同

畧例曰陽證發癍有四有傷寒發癍有時氣發癍有熱病發癍
有溫毒發癍班班如錦文或發之面部或發之胸背或發之四
末色紅赤者胃熱也紫黑為胃爛也一則下早一則下之晚乃
外感熱病而發癍也當服玄參升麻白虎等藥

謹按四氣發癍溫毒為至重暑證亦發癍固有輕重之殊見
面部者傳手經也難知云戊助少陰心火入于手太陰肺也
背多者足太陽胸屬足陽明四末屬脾與心也

陰證發癍亦出背胸又出手足亦稀少而微紅若作熱證按之
涼刺大悞矣此無根失守之火聚於胸中上獨重肺傳於皮膚
而為班點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦文也調中溫胃加以
茵香為藥以大建中之類其火白下癍自退可謂治本而不治

標也

謹按癍證固有陰陽輕重之現證矣陽證太率用桂裏清熱
化癍涼血陰證止用調中溫胃其癍自消病體自安非若瘡
成膿庖也雖輕重俱從火化大抵急則治標緩則治本

論中寒發癍

畧例云元顏小將軍病寒熱間作有癍三五點鼻中微血出兩
手脉沉瀋胸膈四肢按之殊無大熱此內傷寒也問之因暑卧
殿角傷風又渴飲冰酪水此外感者輕內傷者重從內病俱為
陰也故先癍衄後顯內陰寒熱間作脾亦有之非往來少陽之
寒熱也與調中湯數服而愈

論傷寒治誤發癍

神無擇云傷寒發癍者蓋不當下而下之熱則乘虛入胃當下而失下則胃熱不得泄二者皆能發癍其狀如錦繡赤者易治黑者難治蓋熱毒入胃深也

按此謂癍主於胃因下早下晚之失而生至如陽證誤用寒劑而發癍或溫毒便發癍者皆宜從脈求其本也仲景云寸脈浮滑者可用瓜蒂散吐之是熱毒蘊於胸膈也又非在胃及虛火之比大抵黑者熱極亢則害承乃制也

論癍疹

陳無擇云世醫論癍疹無不謂是皮膚間風然既分冷熱冷熱即寒暑之證又有因浴出湊風冷而得之者豈非溫也則知四氣備矣經分諸瘡言熱則痛虛寒則痒又陽明主肌肉屬胃與大腸亦有冷熱分痛痒不可不審世人呼白者為婆膜赤者為血風名義混雜當以理曉察內外隨證治之

謹按癍疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癍疹也發則多痒或不仁者是兼風兼濕之殊色紅者兼火化也

癰疹

升散之劑

元戎葛根橘皮湯治斑在肌 冬溫始發肌中斑爛欬而心悶
但嘔清汁

葛根

橘皮

杏仁

知母

黃芩

麻黃

甘草

右等分水煎服

按此是陽明太陽藥也

陽毒升麻湯癰在面傷寒一二日或吐下後變成陽毒脛背痛
煩悶不安面赤狂言見鬼下痢脉浮大咽痛

升麻

五錢

犀角

射干

黃芩

人參

甘草 各二錢半

右咬咀水煎取飲半盞刻許再進溫覆手足得汗出解

玄參升麻湯癰在身治汗下吐後毒不散表虛裏益其發於外甚
則煩躁譫妄

玄參

升麻

甘草

等分

右咬咀水煎服

按已上之陽明藥也

陽毒梔子湯治傷寒壯熱百節疼痛而發癰

升麻

梔子仁

黃芩

芍藥

石膏

知母

杏仁

柴胡

甘草

右粗末每五錢入姜五片豉百粒煎服

按此是陽明少陽藥也

消毒犀角飲子治癩及癰疹

牛蒡子 荊芥 防風 各三錢 甘草 一錢

右吹咀水煎

按此手太陰藥也

解毒防風湯治癩及癰疹痒痛

防風 一兩 地骨皮 黃芪 芍藥

荊芥 枳殼 牛蒡子 各半兩

右為粗末每四五錢水煎服

按此手是太陰藥也已上諸方本於陽證者宜選用之

升麻葛根湯 方見

陰毒升麻鱉甲湯治陰癩

升麻 三兩 當歸 甘草 各三兩 蜀椒 一兩

鱉甲 炙 雄黃 半兩研

右為末每服五錢水煎服

按此

三因加味羌活散治感四時所傳肌膚發為癰疹增寒壯熱

羌活 前胡 各兩 人參 桔梗

甘草 枳殼 川芎 天麻

茯苓 各半兩 蟬蛻 薄荷 各三錢

右吹咀搗為末每服二大錢姜三片煎服

按此是太陽手太陰少陰藥也

調中湯治內傷外感而發陰症

蒼朮 一錢半

陳皮 一錢

砂仁

藿香

芍藥 炒

甘草 炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼 各錢

川芎 半錢

麻黃

桂枝

各半錢

右以咀姜三片水煎服

按此是太陽太陰手陽明太陰藥也已上諸方本於陰證者宜選用之

和解之劑

化癍湯治傷寒汗吐下後癍發脉虛

白虎湯加人參守真類粹再加白朮

右以咀時時煎服之

下劑

當歸丸治傷寒癍見無大熱脉虛秘悶

當歸 半兩

甘草 分

黃連

大黃 各二錢半

右先將當歸熬膏子入藥末三味為丸漸加至利為度

涼血之劑

黑膏治濕毒發癍

生地黃 半斤

好豉 升

右二味以猪膏二斤合煎之至濃汁用雄黃麝香如大豆大內中攪和每服用彈子大湯化服未效再服之

大青四物湯

大青 四兩

阿膠

甘草 各兩

豉 八合

右以咀每服五錢水煎服之

卷之四十四

玉機微義卷之四十五

黃疸門

發黃附

諸經敘黃疸脈證

內經曰弱黃亦安卧者黃疸

要畧曰寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦

煩脾色必黃於熱以行 尺脈浮為傷腎跌陽脈緊為傷脾風

寒相搏食穀即眩穀食不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰

被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸 額上黑微汗出手足

中熱溽暮即發膀胱急小便不利名曰女勞疸 腹如水狀心

中憊懷而熱不能食時欲吐名曰酒疸多不治

脈經曰脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃凡黃候其寸口脈

近掌無脉口鼻冷並不可治

論五疸

陳無擇云古方敘五種黃者其實一病立名異耳如黃汗者以胃為脾表屬陽明蓄熱喜自汗汗出因入水中熱必鬱故汗黃也其後身體腫發熱不渴狀如風水汗出染衣色正黃如柏汁

黃疸者由暴熱用冷水洗浴熱留胃中所致其候身面眼悉黃如金色小便如煮藥汁

穀疸者夫由肌發熱大食傷胃氣衝鬱所致其候食則腹滿眩暈穀氣不消 云云見前

酒疸由大醉當風入水所致唯酒緣發音取多熱毒流于清氣道

中則眼黃鼻離

女勞疸由人熱交接竟入水水流濕于脾因腎氣虛甚以所勝剋入致胃氣上行故有額黑身黃之證其間兼渴與腹脹者並難治發於陰必嘔發於陽則振寒面微熱雖本於胃氣鬱發土色上行然發於脾則為內疸發於腎則為黑疸若所論因外則風寒暑濕內則喜怒憂驚酒食房勞三因悉備世醫獨嚴於傷寒論中不亦盪矣

按已上五疸與前要畧所具不同宜兼考之陳氏治例未能以盡其變推其病體究治大抵已上五疸形證已具無所隱兼證者黃汗黃疸穀疸誠以元氣脾胃之氣為主而治之形氣穀氣稍實者則可得而復矣酒疸則元氣胃氣殊已傷甚

形氣孤危穀氣阻藥雜進能有斷厚味而守藥得復生者則
幾希矣女勞疸則陰陽之氣虛竭其者為難治陳云世醫獨
嚴於傷寒而不及此此則亦非傷寒家法所可髣髴施也

論傷寒陽證發黃

保命集云凡發黃有六有畜血發黃邪熱傳於太陽之本小便
先淋而黃其人暴狂內有血也為太陽發黃本病也濕熱發黃
太陰併陽明之本為小便不利風濕熱發黃併少陽也寒濕發
黃太陰併少陽也結胸發黃下之早附太陽也痞氣發黃附太
陰也凡六者各隨脈證標本而治之大抵發黃從太陽陽明而
論脾胃皆土也故見黃色當從其脾病色黃土氣化濕非濕毒
何能發黃也

論陰證發黃

韓祗和云病人三五日服下藥太過虛其脾胃亡其津液渴飲
水漿脾土為陰濕加之與邪熱相會發黃此陰黃也當以溫藥
治之如兩手脈沉細遲肢體逆冷皮膚有粟起或嘔吐舌上有
胎遍身發黃煩躁欲於泥水中卧小便赤少皆陰候也故陰黃
多以熱湯溫之或湯漬布搭其胸腹或以湯盛歌中坐於臍下
熨之其病愈者曾治趙顯宗病傷寒至六七日因服下藥太過
致發黃其脈沉細遲無力皮膚涼發躁欲於泥中卧喘嘔小便
赤澁先投茵陳橘皮湯喘嘔止次服小茵陳湯半劑脈微出不
欲於泥中卧次日又服茵陳附子湯半劑四肢發熱小便二三
升當日中大汗而愈似此治愈者不一一錄凡傷寒病黃每遇

太陽或太陰司天歲若下之太過往往變成陰黃蓋辰戌太陽寒水司天水來犯土丑未太陰濕土司天土氣不足即脾胃虛弱亦水來侵犯多變此證也

按已上論傷寒陰陽二證發黃殆無餘蘊大抵本形氣虛實受證不同用藥有汗下溫之禁非若雜病之比也我丹溪先生謂發黃如奮麴相似濕熱有微甚及兼熱兼寒瘀血所因不同故治例不可不分

論內傷發黃

略例云內感傷寒勞後形體飲食失節中州變寒之病生黃非傷寒壞之而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陳也按此言內傷不足故宜補益惟其有餘新病必須消導之久

病從微垣施治可也

論發黃治例

難知云色如熏黃乃濕病也一身盡痛 色如橘子黃乃黃病也一身不痛 乾黃燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲者 梔子蘗皮湯 濕黃脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲者 大茵陳湯 若大便自利而黃者茵陳梔子黃連三物湯往來寒熱一身盡黃者小柴加梔三湯

按一身盡痛而黃者濕勝在表也不痛者病在裏也乾燥者熱勝也故後證皆有表裏之分殊東垣云傷寒當汗不汗即生黃邪在表者宜急汗之在裏之裏宜滲利之在半表裏宜和解之在裏者宜急下之若已上諸證及畧例云男黃小便

自利當與虛勞小建中湯若黃色不變欲自利腹滿而喘不可除熱除熱必噦小半夏湯皆不必拘於茵陳也

黃疸明

升散之劑

金匱桂枝加黃芪湯治黃汗身腫汗出出已輒輕輕久必身暈胸中痛腰以下無汗腰臆弛痛如有物在皮中刺者不能食煩躁小便利

桂枝

芍藥

各三錢

甘草二錢

黃芪

五錢

右水煎入姜棗服後仍飲熱粥助藥力

麻苦連翹赤小豆湯治身熱不去瘀熱在裏發黃小便微利

麻黃

連翹

各兩

赤小豆

右咬咀作一服水煎

局方茵陳五苓散治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴

本方五分加茵陳十分

韓氏茵陳茯苓湯治發黃脉沉細數四肢冷小便濇煩躁而渴

茯苓 桂枝 猪苓 各兩 滑石 一兩半

茵陳 一兩

右為末每服半兩水煎服如脉未出加當歸

按已上方並太陽例藥也

攻下之劑

金匱梔子大黃湯治酒疸心中懊懷或熱痛

梔子 十四枚 大黃 一兩 枳實 五枚 豉 一升

右水煎至二升分温三服

大黃消石湯治黃疸腹滿小便不利而赤自汗此表和裏實

大黃 黃柏 消石 各四兩 梔子 十五枚

右水煎服如前法

消石礬石散治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒膀胱急小腹

滿足下熱因作黑疸其腹滿如水狀大便必黑時澹此女勞

之病非水也

硝石 礬石 各燒等分

右二味為散以大麥粥汁和服二錢日三重衣覆取汗隨大

小便去小便黃大便黑是其候也

半夏湯治酒疸身黃無熱言了了腹滿欲嘔心煩足熱或癢癢

心中懊懷其脉沉弦或緊細

半夏 茯苓 白朮 各三兩 前胡

枳殼 炒

甘草

大戟 炒各兩 黃芩

茵陳

當歸 各兩

右以咀每服四錢水煎入姜三片空心服

茵陳蒿湯治身熱鼻乾汗出陽上奔小便赤而不利濕熱發黃

茵陳蒿 六兩

梔子 十四箇

大黃 二兩

右二味每服一兩半水煎服

難知茵陳大黃湯治傷寒大熱發黃面目悉黃小便赤

茵陳蒿

梔子

柴胡

柏皮

黃芩

升麻

大黃 炒各兩

龍膽草 半兩

右為粗末每服五錢水煎服

抵當湯治太陽傷寒頭痛身熱法當汗解反利小便熱瘀在內

則身重脈沉少腹硬小便自利其人如狂者下焦有血也宜

此湯主之

水蛭

蟅虫 各五箇

大黃 兩

桃仁 十二箇

右剉作一服水煎食前服

按已上並陽明經藥也抵當湯厥陰藥輕者桃仁承氣湯主

之

和解之劑

小柴胡加梔子湯

按此手太陰足少陽藥也

治熱和中之劑

梔子柏皮湯治身熱不去大便利而煩熱身黃者

梔子

柏皮

黃連

各等分

右咬咀每服一兩水煎服

實鑑夜夢溼湯治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷身體面目黃
小便不利不得安卧不思食

白茯苓五分澤瀉三分茵陳六分猪苓二錢

生黃芩黃連梔子防己

白朮蒼朮陳皮青皮

枳實各二分

右咬咀作一服水煎空心服酒疸兼作九子服之

按此並太陽例藥

溫中之劑

金匱小半夏湯治黃疸小便色不異欲利腹滿而喘

半夏湯泡七次

右咬咀每服三五錢水煎入姜十片

韓氏茵陳橘皮湯治身黃脉沉細數熱而手足寒喘嘔煩躁不

渴者

茵陳橘皮生薑各兩白朮一分

半夏茯苓各半兩

右為末水四升煮取二升放溫分作四服

按此並足陽明太陰藥也

小茵陳湯治發黃脉沉細遲四肢及遍身冷

附子一箇片甘草炙兩茵陳二兩

右為粗末用水二升煮一升溫作三服

茵陳四逆湯治發黃脉沉細遲肢體逆冷腰已上自汗

甘草炙兩 乾姜炮兩半 附子一箇作片 茵陳二兩

右為粗末分作四貼水煎服

茵陳附子湯治服四逆湯身冷汗不止者

附子一箇作片 乾姜炮二兩半 茵陳一兩半

右為粗末水煎分作三服

按已上並少陰經藥也

茵陳茱萸湯治服茵陳附子湯證未退及脉伏者

吳茱萸兩 當歸二分 附子一箇作片 木通二兩

乾姜炮 茵陳各兩半

右為粗末分作二服水煎

按此是少陰厥陰藥也

吐下之劑

三因苦參散治濕熱內甚便赤澀大便時秘食飲不妨服諸藥

不除因為久黃

苦參 黃連 瓜蒂 黃栢

大黃 各一分 葶藶 半兩

右為末每服一大錢飲調下當吐利隨時消息加減與之

按此出太陽陽明例藥

調理之劑

當歸白朮湯治酒疸發黃結飲癖在心胸間堅滿骨肉沉重逆

害飲食小便赤黃此因內虛飲食生冷脾胃痰結所致其脉弦濡

白朮

茯苓

各三兩

當歸

黃芩

茵陳

前胡

枳實

甘草

杏仁

炒各兩 半夏 一兩半

右咳咀每服四五錢入姜煎

小建中湯

養榮湯治五疳肺弱心忪口淡耳鳴微寒發熱氣急小便白濁當作虛勞治之

六並見虛損門

消食之劑

三因紅丸子治穀疸發黃

方見霍亂門用生姜甘草湯下

寶鑑藥錄治食勞目黃身黃者

皂礬

不以多心沙鍋內水浸燒通紅赤用米醋內煎之

右為末棗肉丸桐子大每服二三十九食後用生姜湯下

取黃水法

瓜蒂散

瓜蒂

二錢

母丁香

一錢

黍米

四九箇 赤小豆 三錢

石為碎細末每夜於鼻內噴之取下黃水內服涼劑

三因如神散治酒毒不散發黃久浸清流清氣道中宜此內鼻中取黃水

苦瓠子 去皮苦葫蘆子 去皮三七箇

黃黍米 三三粒 安息香 二皂子大

右為末以一字搗入鼻中滴出黃水一升忌勿吹吹或過多
即以黍穰燒灰麝香末各少許吹鼻內立止

卷之四十五

王機徵義卷之四十六

霍亂門

內經敘霍亂所因

經曰歲土不及風乃大行 云云 氏病飧泄霍亂體重腹痛筋骨

繇併

按此言土運不及木乃太過木乘土而為病宜詳玩本文

論霍亂脈證

內經曰脈伏者霍亂

傷寒論曰病嘔吐而利名曰霍亂或發熱頭痛身疼惡寒吐利
或自吐下又利止復更發熱也皆是霍亂證傷寒其脈微澁者
本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下

利者不可治也

保命集云傷寒霍亂轉筋身熱脉長陽明本病也脾胃受濕熱中焦氣滯或因冷飲或傷冷水或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏上下相離榮衛不能相維故轉筋掣痛經絡亂行暴熱吐瀉中焦胃氣所主也

謹按傷寒傳變為霍亂者殊少惟夏秋之間暄熱人腠理疎感風濕暄之氣而生此證多有陰陽虛實不同脉來浮洪者可治微而遲氣少不語者為難治

論霍亂分三因

陳無擇曰霍亂者心腹空痛嘔吐下利增寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利並作甚則轉筋入腹則斃霍亂證無越於斯蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞膈上下奔逸治之唯宜溫煖更詳別三因以調之外因諸風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗胃濕則重著傷暑則熱煩內因九氣所致鬱聚痰涎飲痞膈不通遂致滿悶隨其勝復必作吐利或諸飽食膾炙恣飧乳酪冰膈寒漿旨酒胃既膜脹脾臟停疑必內鬱發遂成吐利當從不內外因也

按此具霍亂三因稍備但立方未能以盡其變學者自宜確格

論霍亂轉筋

陳氏曰轉筋者以陽明養宗筋屬胃與大腸今暴吐下津液頓亡外感四氣內積七情飭食甜膩攻閉諸脉枯削於筋宗筋失

養必致變縮甚則卵縮舌卷為難治

按此言霍亂者多轉筋大抵冷熱不調陰陽相搏故轉筋攣痛甚者遍體轉筋此實陰陽之氣反戾風寒乘之筋失氣血所榮而為攣縮急痛也

論乾霍亂

陳氏曰乾霍亂者忽然心腹脹滿絞刺疼痛盡毒煩冤欲吐不吐欲利不利狀若神靈所附頃刻之間便致悶絕亦涉三因或臟虛或腸胃素厚故吐利不行

按此謂人腸胃素厚形氣實者故感四氣則吐利不行而乾揮霍撩亂也大抵熱勝痰鬱則悶亂濕勝飲鬱則吐下形氣虛者禍不旋踵嚴氏謂胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾揮霍之阻變成吐利然飲食致者亦有有餘不足如飲食自倍外感濕暍而乾霍亂者宜吐之或下之過傷者宜清導之痰者劫之寒者溫之熱者清之要在適事為故也

論霍亂煩渴

陳氏曰煩渴者以陰陽反戾清濁相干水與穀併小便秘澀既乏津液腎必枯燥引水自救煩渴必矣

按吐利必渴况腎水竭者平與水者唯宜溫煖熱甚者天水葷以甘緩火也

霍亂治例

保命集云霍亂陽明證宜和中平胃建中葷或四君子湯脉浮自汗四君子加桂主之脉浮無汗四君子加麻黃吐利轉筋

筋下痛脈弦者木剋土也故痛甚平胃加木瓜五錢或建中加
紫胡木瓜 吐利轉筋腹中痛體重脈沉而細者四君子加白
芍良姜 吐利四肢拘急脈沉而遲此少陰霍亂四君子加姜
附厚朴 吐利四肢厥冷脈微緩屬厥陰建中加歸附 吐利
頭痛而身熱熱多欲飲水者五苓寒多不用水者理中丸三之
元戎云太陰證霍亂者理中加橘紅名治中湯 若吐下必腹
作痛手足逆冷理中去白朮加熟附名四順湯 若吐利後轉
筋者理中加火煨石膏一兩

和中之劑

四君子湯

平胃散

建中湯並治證見前

方見虛損門

治寒之劑

機要漿水散治暴泄如水周身汗出盡冷脈弱不能語言甚者
加吐

半夏 二錢

附子

乾生姜

炙甘草

桂

各半錢

良姜

三分半

右為末作一服漿水煎服之

姜附湯治霍亂轉筋手足厥冷多吐嘔逆

乾姜 一兩 附子 一箇生用

通脈四逆湯治霍亂多寒身冷脉絕

吳茱萸 兩炒 附子 炮兩 桂心 通草

細辛 白芍 甘草 各各半兩 當歸 二錢

右咬咀每服四錢水酒各半加生姜煎

理中湯治過食生冷遂成霍亂吐下脹滿食不消心腹痛

方見寒門加橘皮名橘皮治中湯

嚴氏曰若臍上築動者腎氣動也去木加桂吐多者去木加

生薑半夏利多者仍用木心悸者加茯苓腹痛者加乾姜腹

滿者去木加附子厚朴

治瀉之劑

二因茯苓澤瀉湯治霍亂吐利後煩渴飲水

五苓減豬苓加甘草

按此太陽例藥也

治暑之劑

局方五苓散治霍亂頭痛吐下煩渴

方見瀉門

嚴氏水浸丹治伏暑傷冷冷熱不調口乾煩渴

黃丹 一兩一分炒 巴豆 二五箇去皮心

右同研勻用黃蠟作汁為丸如梧子大每服五丸以水浸少

右為末作一服漿水煎服之

姜附湯治霍亂轉筋手足厥冷多吐嘔逆

乾姜 一兩 附子 一箇生用

通脈四逆湯治霍亂多寒身冷脉絕

吳茱萸 兩炒 附子 炮兩 桂心 通草

細辛 白芍 甘草 炙各半兩 當歸 二錢

右咬咀每服四錢水酒各半加生姜煎

理中湯治過食生冷遂成霍亂吐下脹滿食不消心腹痛

方見寒門加橘皮名橘皮治中湯

嚴氏曰若臍上築動者腎氣動也去木加桂吐多者去木加
生薑半夏利多者仍用木心悸者加茯苓腹痛者加乾姜腹

滿者去木加附子厚朴

治瀉之劑

三因茯苓澤瀉湯治霍亂吐利後煩渴飲水

五苓減豬苓加甘草

按此太陽例藥也

治暑之劑

局方五苓散治霍亂頭痛吐下煩渴

方見濕門

嚴氏水浸丹治伏暑傷冷發熱不調口乾煩渴

黃丹 一兩分炒 巴豆 二十五箇去皮心

右同研勻用黃蠟作汁為丸如梧子大每服五丸以水浸少

須別以新汲水吞下

按此劫劑也

加味香薷飲治伏暑吐利不止煩悶多渴

本方加攪御 黃連

右咬咀每服五錢水酒各半煎服

冷香飲子治伏暑吐利煩躁

草果仁 二兩 附子 橘紅 各兩 甘草 半兩

右咬咀每服一兩入姜煎水旋冷服

按已上並太陽例藥也百寒熱陰陽不同要在脈證相符而

行也

溫經之劑

三三木瓜湯治霍亂吐下舉體轉筋入腹則悶絕

乾木瓜 一兩 吳茱萸 半兩 茴香 炙甘草 各三錢

右咬咀每服四大錢入姜三片蘇葉十片煎

按此陽明例藥也大抵轉筋亦有所兼之證不同用者自宜

推格

墜痰溫補之劑

三因胃氣丸治憂思過度脾肺氣閉聚結痰飲留滯腸胃氣鬱

於陰凝之於陽陰陽反戾吐利交作四肢厥冷頭目暈眩或

復發熱

硫黃 不以多少入猪臟內縛定頭米泔酒重便冬瓦煖乾半取出洗其穢晒乾

秤一兩

半夏洗去滑人參

白茯苓各二錢石膏

右為末生薑汁浸炊餅為丸每五十九至二百丸空心食前米湯下

理氣溫中之劑

三因七氣湯治七氣發鬱致臟氣刑剋陰陽反戾變成吐利交作寒熱眩暈痞滿咽塞

半夏五錢厚朴

桂心各三錢茯苓

白芍

橘皮各二錢人參一錢

右咬咀每服四五錢入姜棗煎

訶子散治心脾冷痛霍亂吐利如神

訶子

甘草炙

厚朴製

乾姜

草果

陳皮

良姜

茯苓

神麴

麴各等分

右為末每服二錢入鹽些小水煎服

按已上並是陽明經藥也

消食之劑

三因紅丸子治脾胃虛冷飲食失節宿食留飲聚癖腸胃或因食不調衝胃寒濕忽作霍亂吐利並作心腹絞痛

蓬朮

三稜各二兩同用米醋煮伏時

胡椒一兩

青皮

三兩炒阿魏一分

右為末化阿魏入陳米粉為丸如梧子大朱砂為衣每服百丸至二百丸不拘時生薑甘草湯下

雜方

嚴氏洗法治霍亂轉筋

藜一把去兩頭水三升煮一升放溫重洗

清法治霍亂轉筋入腹

鹽多用煎湯於槽中暖漬之

三國注治乾霍亂盡毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣極鹹益

湯三升熱飲一升刺口令吐宿食便盡不吐更服吐訖復飲

三吐乃止此法大勝諸治俗人以為田舍淺近鄙而不用守

死而已凡有此證即先用之元戎云吐定用理中湯

灸法治霍亂已死腹中有暖氣者 鹽內臍中灸二七壯

卷之四十六

玉機微義卷之四十七

厥証

內經論厥證所因

論曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥人質壯以

秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上

也氣因於中由陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在

故手足為之寒厥也陰氣衰於下則為熱厥由醉飽入房內亡

精氣中虛熱入腎氣日衰陽盛陰虛故手足為之熱也陰氣盛

於上則下虛下虛則腹脹滿腹滿則下氣重而邪氣逆逆則陽

氣亂陽氣亂則令人暴不知人或至半日遠一日乃知人也名

曰尸厥

按本論敘六經厥狀與六經厥逆甚詳宜玩本文大抵六經之厥陽證至為昫仆為顛疾為妄見陰證至為腹脹大小便不利或嘔或心痛之類皆素多痰氣因虛所乘之為病也惟有輕重之殊爾如成無已註傷寒論云厥者手足冷也四逆者四肢不溫也邪在三陽則手足必熱傳到三陰則手足厥冷厥者逆也而有陰陽之殊熱極而成厥逆者陽極似陰也寒極而成厥逆者獨陰無陽也

論卒厥脉法

脉經曰脉至如喘名曰氣厥氣厥者不知與人言

金匱方論曰寸脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟唇口青身冷即死如身和汗自出為入腑即愈此為卒

厥

按腑者為傳道出內之所其氣通故入腑即愈也

論諸厥證寒熱不司

陳無擇曰經論粗分六經殊不出寒熱二證所因欲求備治當歷明之寒厥則因多慾而奪其精故致陽衰陰盛熱厥則因醉飽入房精虛則熱入故致陰虛陽盛考其厥因多以不勝乘其所勝氣不得行遂致厥逆如腎移寒於脾則水乘於土水既不行乃成寒厥如心移熱於腎則火乘于水水火既不行乃成熱厥六經皆然可次第論也尸厥亦然正由臟氣相刑或與外邪相忤則氣遏不行閉於經絡諸脉匿伏昏不知人唯當隨其臟氣而通之寒則熱熱則寒閉則通經中以數醉為熱厥之因學者

不可拘此蓋傷寒溫病皆有熱厥仲景所謂熱深厥深經意以酒能發百脉熱故舉此以為例耳寒厥者初得之四肢冷脉沉微而不數多惡寒引衣自覆下利清穀外證多惺惺熱厥者初得之必發熱頭疼脉雖沉伏按之必數其人或畏熱喜冷揚手掉足煩躁不眠大小便秘赤外證多昏冒傷寒亦然

謹按寒熱發厥固宜隨其陰陽勝負為治如其厥逆者不外乎傷寒寒熱二證求陰陽厥逆之淺深餘寒熱厥證是沉寒積熱發致至若陰陽竭閉尸厥卒厥又非已上寒熱厥證之比也陳論雖稍闕其贖何治例殊未少具爾

論寒熱厥證宜吐下

子和曰云云

謹按厥證寒熱亦有陰陽虛實不同如形氣相實者宜從于和之法吐下之虛甚者惟宜隨其所因而調理之可也陳氏論臟氣相刑或與外邪相干氣遏不行閉經絡脉伏昏不知人至為尸厥今世俗多作風治鮮不致斃如傳引華陀治號太子尸厥為陽脉下墜陰脉上爭會氣閉而不通上有絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色已發脉亂故形靜如死狀此與經言陰陽之氣盛衰為厥之旨甚微後人安能得證治之彷彿乎而以陰陽證治之可驗者較之若傷寒手足厥逆昏不知人邪正已極溫下之間稍或遲緩禍不旋踵或汗不解暴衄不知人而厥或雜病得吐衄血而厥不知人者一二日或二日必間間則為愈矣蓋陰氣尚實必身不熱熱則

不厥厥則為血溫身熱主死矣其氣厥而形實者七情所致
痰飲內鬱而厥必半日或一二時必間形虛而氣逆甚者多
致不救此又可見氣血為厥陰陽暴逆之甚也故不可斷作
風治

厥門

通關發之劑

蘇合香丸治卒暴厥不知人未辯風痰氣厥宜與此膏化濃湯
灌之醒後却議脉證用藥

吐劑

瓜蒂散

方見痰飲門口噤者或先用搐鼻藥

升發之劑

三因追魂湯治卒厥暴死及主客竹鬼擊飛尸氣絕不覺口噤

麻黃湯 方見寒門

右吹咀水煎灌之不下者分病人髮左右捉搦按肩引之令

服取効千金方加桂

按此治感中邪氣之劑也

治寒之劑

四逆湯治寒厥未熱裏寒下利清穀食入則吐脉沉伏手足冷

方見寒門

按此治寒熱之劑並出寒暑例然內因氣血之劑詳見各門
宜對證選用茲不詳錄

治熱之劑

白虎湯治熱厥腹滿身重難以轉側面垢語澀渴手足厥冷

自汗脉沉滑

方見暑門

卷之四十七

玉機微義卷之四十八

痺證門

內經敘痺

經曰風寒濕三氣雜至合而為痺其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺以冬遇此為骨痺以春遇此為筋痺以夏遇此為脉痺以至陰遇此為肌痺以秋遇此為皮痺

按本論備五臟等痺甚詳宜玩本文

脉法

脉經曰脉澀而緊痺病

論痺證所因不同

陳無擇云雖三氣合痺其用不同三氣襲人經絡入於筋脉皮

肉肌骨久而不已則入五臟煩滿喘而嘔者是痺客於肺煩心上氣壅乾恐噫欬脹滿者是痺客於心多飲數小便小腹痛如懷妊夜卧則驚者是痺客于肝善脹尻以代腫脊以代頭者是痺客於腎四肢懈墮發欬嘔沫上為大寒者是痺客於脾又有腸痺胞痺及六腑各有俞風寒濕所中治之隨其腑俞以施針灸之法仍服逐三氣發散等藥則病自愈大抵痺之為病寒多則痛風多則行濕多則著在骨則重而不舉在脉則血凝不流在筋則屈而不伸在肉則不仁在脾則寒逢寒則急逢熱則緩又有血痺以類相從外有支飲作痺

謹按痺之為證有筋攣不伸肌肉不仁者與風證絕相似故世多類於風痿痺證通治此千古之弊也徐先生已於卷首分出痿證一門大抵固當分其所因風則陽受之痺感風寒濕之氣則陰受之為病多重痛沉着患者難易得去如錢仲陽為宋之一代明醫自患周痺止能移於手足為之偏廢不能盡去可見其為難治也况今世俗多類於風證通治宜乎不能得其病情也

論痺因虛所致

嚴氏曰痺證因體虛腠理空疎受之而成逢寒則急逢熱則緩隨所受邪氣而生證也診其脉大而瀦為痺脉來急亦為痺脉瀦而緊者亦為痺又有風血痺陰邪入於血經故也

謹按三氣為痺者正因形虛血虛爾但有在肌皮血脉淺深之異故入臟者死雖陳氏具經論頗詳而其方未能以

盡其變學者自宜充擴

痺證門

溫經勝濕之劑

三因附子湯治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著四肢
緩縱

附子生 白芍 桂心 甘草

白茯苓 人參 各一分 白朮 一兩

右㕮咀每服四錢水煎服

按此太陽例藥溫中解表之劑

疎風養血之劑

三因黃芪五物湯治人骨弱肌重因疲勞汗出卧不時動搖加
以微風遂作血痺脉當陰陽俱微尺中少緊身體如風痺狀

黃芪

芍藥

桂心 等分

右以咀每服四五錢入姜棗煎

嚴氏蠲痺湯治身體煩疼項背拘急或痛或重舉動艱難手足

冷痺腰腿沉重筋脉無力

當歸

芍藥

黃芪

片子薑黃

羌活

各兩半

甘草

炙半兩

右以咀每服四五錢入姜棗煎

黃芪酒治風濕痺身體頑麻皮膚癢痒筋脉攣急言語蹇澁手

足不遂時覺不仁

黃芪

防風

桂

天麻

草薢

石斛

虎骨炙

白芍

當歸

雲母粉

白朮

茵芋葉

木香

仙靈脾

甘草

川續斷

右剉如麻豆大以生絹袋盛好酒一斗浸之春五夏三秋七

冬十日每服一盞溫服之不拘時

防風湯治血痺皮膚不仁

防風

二兩

川獨活

川當歸

赤茯苓

秦艽

赤芍

黃芩

各兩

桂心

杏仁

甘草

炙各半兩

右以咀每四五錢入姜煎

獨活寄生湯治肝腎虛弱感風濕致痺兩脛緩縱痺弱不仁

方見脚氣門

謹按已上方多太陽例藥也六抵痺證有兼風兼濕寒熱獨
勝腑臟所受不同用者自宜擴充然此證因虛而感既著體
不去須製對證藥日夜飲之雖留連不愈能守病禁不令入
臟庶可扶持也如錢仲陽取茯苓其大逾斗者以法噉之閱
月乃盡由此雖偏廢而氣骨堅悍如無疾者壽八十二而終
惜乎其方無傳

治痰飲之劑

茯苓湯治支飲手足麻痺多唾眩冒

半夏

赤茯苓

橘紅各兩

枳實

桔梗

甘草

各半兩

右吹咀每服四五錢入姜七片水煎

按此言支飲能為痺證即飲能為脚氣證是也大抵因虛而
傳注邪客日久榮衛壅滯多致濕熱經緩不能自收持如逢
熱則縱也已上方未能盡其例用者自宜通變也

卷之四十八

玉機微義卷之四十九

婦人門

論經閉不行

內經陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為息音者死不治東垣曰婦人脾胃久虛或形羸氣血俱衰而致經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脉津液所化津液既絕為熱所燥肌肉消瘦時見渴蹠血海枯竭病名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此證或經通行而有子子木安為胎病者有矣或心包脉洪數躁作時見大便秘澁小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血海乾枯宜調血脉除包絡中火邪而經自行矣內經所

謂小腸移熱於大腸為瘧瘕為沉月澁不利則月事沉滯而不
利故云為瘧瘕為沉也或因勞心心火上行月事不來安心補
血瀉火經自行矣故內經云月事不來者胞脉閉也胞脉者屬
心而絡於胞中令氣上迫肺心氣不得下故月事不來也曾治
驗裴澤之夫人病寒熱而月事不至者數年矣已加喘嗽醫者
率以蛤蚧桂附等投之曰不然夫人病陰為陽所搏溫劑太過
故無益而反害投以涼血和血之藥則經行矣已而果然
要略曰婦人之病因虛積冷結氣為證經水斷絕至有歷年血
寒積結胞門寒傷經絡疑堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損
分在中盤結繞臍寒沁或兩脇疼痛與臟相連或結熱中痛在
關元脉數無瘡經候不勻冷陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根

氣街 云云

謹按良方言婦人月水不通由勞傷血氣致令體虛受風寒
邪氣客於胞內損衝任之脉并手太陽少陰二經致胞絡內
血絕不通如已上病機皆畧之不議且血病經閉又豈止手
太陽少陰二經耶然亦有不因寒熱或痰飲積聚疝瘕所致
如七情所動其為氣病血從一也况陰道常虛不足者實多
宜翫血證門血屬陰難成易虧論及後丹溪先生等說
論經水不調或紫或黑

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅黑火色也血為氣
之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯
則滯氣清則清氣濁則濁上應於月其行有常名之曰經為氣

之配因氣而行成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷乘之而行溫熱之劑禍不旋踵矣良由病源論月水之病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑者北方水之色也紫者黑之漸也非冷而何予曰經云亢則害承乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也況婦人性執而鄙嗜欲加倍臟腑斂陽之火無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之吾恐千百而一二也

按此論經病甚詳大抵不得率指為風冷所乘者此由良方所言世俗往往因之悞人故戒慎之也然冷證外邪初感入

經必痛或不痛者久則鬱而凝

矣且寒則凝既行而紫黑

故非寒也

論經漏不止

內經陰陽別論云陰虛陽搏謂之崩東垣曰婦人脾胃虛損致命門脉沉細而數疾或沉弦而洪大有有力寸關脉亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脉必弦細寒作於中中有赤帶者其脉洪數疾熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼脾胃證出見或四肢困熱心煩不得眠卧心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫勢入事疎少或先富後貧心氣不之其火大熾旺於血脉之中又致

脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病者
不行於診故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適
來適斷暴下不止治當先說恐死之言勸諭令拒死而心不動
以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰
瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕則陽氣內動發則
心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳為脉痿此
之謂也

良方論曰婦人崩中由臟腑傷損衝任血氣俱虛故也衝任為
經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平
而氣血調適若勞動過多致臟腑俱傷而衝任之氣虛不能約
制其經血故忽然暴下或由陰陽相搏為熱所乘攻傷衝任血
得熱則流散甚者至於昏悶其脉數疾小為順大甚者逆

按此備言經脉致病之因本於臟腑傷損合前東垣所論極
言因熱因虛或悲哀七情等所致病機殆無餘蘊矣

脉法

脉經曰尺脉滑血氣實婦人經脉不利 少陰脉弱而微數則
少血少陰脉滑而數者陰中則生瘡 寸口脉浮而弱浮則為
虛弱則無血 脉來至狀如琴弦若少腹痛主月水不利孔竅
生瘡 肝弦沉主月水不利腰腹痛 尺脉來而斷絕者月水
不利 寸關調如故而尺脉絕不至者月水不利當患小腹引
腰痛氣滯上攻胸臆也 經不通繞臍心痛其脉沉緊此由
寒氣客於血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故血相搏

故痛 漏血下赤白脉進者脉小虛滑者生急疾者大緊實數者死 暴崩下血寸口脉微遲尺脉微弦微遲為寒在上焦但吐爾今尺脉微弦如此即小腹引腰痛者必下血也 寸口弦而大弦則為減大則為充減則為寒充則為虛寒虛相搏脉則為革婦人則半產漏下 尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下赤 漏下赤白日久下血數斗脉急疾者死遲者生 尺寸脉虛者漏血漏血脉浮不可治也

論赤白帶下

機要云赤者熱入小腸白者熱入大腸其本實熱寃結于脉不散故為赤白帶下也寃屈也結也屈滯而病熱不散先以十棗湯下之後服苦練丸大玄胡散調下之熱去濕除病自除也

按此止是論有餘之證也論見下

良方論云帶下起於風氣寃熱之所傷或產後早起不避風邪風邪之氣入於胞門或中經脉流轉臟腑而發下血名為帶下若傷足厥陰肝之經其色青如泥傷手少陰心之經其色赤如紅津傷手太陰肺之經其色白如涕傷足太陰脾之經則其色黃如爛瓜傷足少陰腎之經則色黑如衄血此其因也

按此言風氣寒熱之所傷諸臟致證似言外邪大抵此證多有本於陰虛陽竭榮氣不升經脉凝泣衛氣下陷精氣累滯於下焦奇經之分蘊積而成其病或醉飽房勞服食燥劑所致也白物如涕之狀故言帶者亦病形也經云帶脉為病而得名而白者屬氣赤屬血東垣舉脉訣云崩中日久為白帶

漏下多時骨木枯言崩中者始病血崩久則血少復亡其陽
故白滑之物下流不止此可見未得全拘於帶脉矣詳病亦
有濕痰流注於下焦或腎肝陰滯之濕勝或因驚恐而木乘
土位濁液下流或思慕為筋痿內經所謂二陽之證發心脾
是也或餘經濕熱屈滯於少腹小腹之下而病本殊則皆為
氣血虛損榮衛之精氣累滯而成其病標一也前人立論殆
盡病機則治法無定若戴人以帶下得兩手脉俱滑大而有力
乃上用宣去痰飲下以導水丸泄濕熱繼以淡劑滲之此
為瀉實也如其諸脉微細或沉緊而澁按之空虛或洪大而
澁按之無力正為元氣不足陰虛筋痿虛極中寒等證東垣
有補陽調經固真等例乃兼責虛也丹溪先生治因濕痰下

注用海石南星椿根皮之類較之前人下之而復吐以提其
氣或發中熱補補中兼利燥中兼升發潤中益氣溫而兼收
澁之例不同蓋病機有輕重淺深之異爾

論師尼寡婦異乎妻妾之治

醫鑑曰宋褚澄療師尼寡婦別製方蓋有為也此二種寡居獨
陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧
久則為勞史託倉公傳載濟北王侍人韓女病腰痛寒熱眾
醫多以為寒熱倉公曰病得之欲男子不可得也何以知診得
其脉肝脉弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血為
主男子精盛以思至女人血盛以懷胎也如厥陰脉弦出寸口
又上魚際則陰盛可知故知褚氏之言有謂矣

論胎產諸證

胎氣要云治胎產之病從欬陰經論之無犯胃氣及上二焦
之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之
證則大便則脈數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥
藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣如發渴而白
虎氣弱則黃芪血刺痛而用當歸腹中痛而加之芍藥大抵產
病天行後增損柴胡雜證後增損四物宜詳察脈證而用之
謹按已上云胎產禁例大抵主於元氣本病為要至於病體
所因不同學者又必當處於權變也且胎前之證良方悉具
但每證治例殊少如胎漏胎痛子煩子腫等證出方皆是治
本病之例設所因不同或有所兼之證如胎漏下血亦有氣
虛血熱腹痛亦有濕熱者或形志苦樂不一七情所動氣動
血病胎氣即損雖治例未能以盡其變然欲學者臨證自推
克而行之爾今於諸證夫能一一悉具聊以證治數例附于
後云

胎自墮論

丹溪曰陽施陰化胎孕乃成血氣虛之不足榮養其胎則墮譬
如枝枯則果落藤痿則花墜又有勞恐傷情內火便動亦能墮
胎譬如風撼其木人折其枝也火能消物造化自然病源乃謂
風冷傷於子臟而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有孕至
三箇月左右必墮診其脈左手大而無力重則瀉知其血者也
以其壯年只補中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯下

黃芩末一錢與數十貼得保全而生因而思之墮於內熱而虛者於理為多曰熱曰虛蓋孕至三月上屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎妙藥耶

難產論

丹溪曰世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴奉養之家若貧賤者鮮有之古方止有瘦胎飲一論而其方為湖陽公主作也恐非至到之言蓋用之者其難自若予族妹苦於難產遇胎則觸而去之予甚憫焉視其形肥而勤於女工知其氣虛久坐氣不運而愈弱兒在胞胎因母氣虛不能自運耳當補其母之氣則兒健易產令其有孕至五六月來告遂於大全良方紫蘇飲加補氣藥與之數十貼因得男甚快因此方隨母之性稟與茯苓加減服者無不應用臨蓐時腹不覺痛產母亦無恙因名方曰達生散云

論局方胎產用藥之誤

丹溪曰或問婦人一門無非經候胎產用藥溫熱於理頗通吾子其妄言乎予曰婦人以血為主血屬陰易於虧欠非善於調攝者不能保全也餘方是否若神仙聚寶丹則有不能忘言者其方治血海虛寒虛熱盜汗理宜補養琥珀之燥麝香之散可以用乎面色痿黃肢體浮腫理宜導濕乳香沒藥自可治血可以用乎胎前產後虛實不同逐敗養新攻補雜病積塊堅癥赤白崩漏宜於彼者必妨於此而欲以一方通治乎世人以其品貴名雅又喜其常服可以安神去邪令人有子殊不知積溫成

熟香竄散氣服者無不被禍自非五臟能言醫者終不知覺及至變生他證悖理肉汁發陰經之火易成內傷之病先哲具有訓戒胡以羊雞濃汁作糜而入之服當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖是滋補悉犯桂附乾姜僭熱之劑臟腑無寒何處消受若夫兒之初生母腹頓寬便啖雞子且喫火鹽不思雞子難化火鹽發熱展轉為病醫者不識委指他病率爾用藥寧不誤人予每見產婦之無疾者必教以却去黑神散與夫雞子火鹽諸般肉食且與白粥將理間以此小石首煮魚令甘淡食之至半月以後與少肉雖雞子亦須豁開煮之大能養胃却痰彼當富貴之家驕恣之婦率有白帶頭風氣痛膈滿痰逆口乾經事不調髮脫體熱皆是陽勝陰虛之病天生血氣本自和平日勝日虛又焉知此等謬妄有以啓之耶

論婦人服熱劑求子之誤

丹溪曰無子之因多起於父氣之不足豈可獨歸罪於母血之虛寒况母之血病奚止虛與寒而已哉然古方治婦人無子惟秦桂丸一方其性熱其辭確今之欲得子者率皆服之無疑夫求子於陰血何至輕用熱劑耶或曰春氣溫和則物生冬氣寒凜則物消不假熱劑何由于臟得暖而成胎予曰詩言婦人和平則藥有子和則血氣不爭平則陰陽不乖今得此丸經血必轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟進久則口苦舌乾陰陽不平血氣不和焉能成胎縱使有成子亦多病以其能損真陰也鄭憲史子生七箇月得淋

云云日淋閣明

謹按婦人無子多因經氣不調或陰虛血少積聚痰氣嗜慾等
致種種不同矣已虛與寒而已然經寒者亦有之但不可例
為常法爾是以先生論此戒後人不得病機之的者斯藥勿
妄行也况無子之因亦豈止於婦室者如東垣云李和叔問
中年以來得一子至一歲之後身生紅絲瘤不救後三四子
至一二歲皆病瘤而死何緣至此疾翌日思之謂曰汝乃腎
中伏火精氣中多有紅絲以氣相傳生子故有此疾俗名胎
瘤是也汝試視之果如其言遂以滋腎丸數服以瀉腎中火
邪補真陰不足忌酒辛熱之物其妻與六味地黃丸以養陰
血受胎五月之後以黃芩白朮二味作散啖五七服後生子
至一歲前證不復作今已年壯噫合觀先生已上所論則

旨深矣

婦人門

調經之劑

局方四物湯治衝任虛損月水不調臍腹疝痛

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃 各等分

右咬咀每半兩水煎服

按此手足太陰厥陰藥也

逍遙散治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

甘草

炙半兩

當歸

茯苓

白芍

白朮

柴胡

各兩

右咬咀每半兩入姜薄荷葉煎服

按此足三陽三陰藥也散血中濕熱之劑

膠艾湯治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷

阿膠

川芎

甘草

炙各三兩

當歸

艾葉

炙各三兩

熟地黃

白芍

各四兩

右咬咀每半兩水煎

按此溫經補血之藥也厥陰例

良方溫經湯治婦人血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

義朮

各半兩

甘草

牛膝

各一兩

右咬咀每五錢水煎服

薑黃散治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

當歸

牡丹皮

延胡各兩

芍藥

三兩

川芎

紅花

桂心

莪朮

各兩

川薑黃

四兩

右為末每一錢水煎服酒同煎

按此二方通經之劑破血之藥非止於溫經也臟冷氣血滯

者可用姑存之

加減四物湯

經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱脈微數本方去

地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分

經候過多本方去熟地黃加生地黃

經行身熱脈數頭昏本方加柴胡黃芩各半兩

經行微少或脹或疼四肢疼痛加延胡沒藥白芷與本方等

淡醋湯調下末子

經候不調心腹疼痛只用芎歸二味名君臣散

鹿茸丸治衝任虛損又為風寒所乘尺脈微小甚者可交關元

穴

鹿茸

赤石脂

禹餘糧

各兩續斷

三兩

栢葉

附子

熟地黃

當歸

酒浸

艾葉

右為末酒糊丸梧子大每五十九丸空心溫酒下

按此是少陰厥陰藥也今人多用之故收入治血虛濕勝帶

下其捷

元戎加味四物湯

氣充經脈故月事頻併臍下多痛本方加芍藥

經欲行臍腹絞痛本方加玄胡攢榔苦練木香

經水過多本方加黃芩白朮

經水澁少本方加葵花紅花

經水適來適斷或有往來寒熱宜先服小柴胡去寒熱後以

四物湯和之

丹溪加味四物湯

經候過而作痰血氣俱虛也宜本方對四君子湯服之

經候將來作痛者血實也本方加桃仁黃連香附

經水不及期血熱也本方加黃連

過期血少也本方加參朮帶淡在半夏陳皮

過期紫黑有塊者血熱也必作痛本方加香附黃連

過期而淡色者痰多也當歸二味合二陳湯服

紫色成塊者熱也本方加黃連柴胡

肥人不及日數而多痰者多血虛有熱本方加香附南星半

夏黃連白朮

瘦人血枯經閉者本方加桃仁紅花或越鞠丸 方見血門

簡易當歸散治經候不勻或三四月不行或一月再至或婦人

天癸過期經脈不調

當歸

川芎

白芍

黃芩

白朮

各半兩

山茱萸肉

一兩半

右為末每二錢空心温酒調下日三次

按此是厥陰少陰藥也

香薷生地黄丸治婦人血實厥陰脉弦而長病惡風體倦乍寒乍熱面赤心忪或時自汗如傷寒狀宜服抑陰藥

生地黄

柴胡

秦艽

黃芩

各二兩

芍藥 一兩

右末蜜丸梧子大每三十丸烏梅湯吞下日三次

按此手足少陰太陰足少陽藥也

謹按已上諸方皆調理法也然血分成水氣腸胃等證詳見各門茲不備錄大抵經病實者破之結者散之虛者補之要在適事為故也

理氣之劑

澹寮者附九治經候不調血氣刺痛腹脇脹頭暈惡心崩漏帶下並宜服之

香附子

擦其皮不參麥醋浸一日用瓦銚煮令醋盡

右醋糊為丸梧子大日乾每五十九丸淡醋湯下

方香附一斤艾葉四兩當歸二兩製同名艾附丸

嚴氏抑氣散治婦人氣盛於血變生諸證頭暈膈滿

香附 四兩

茯神

甘草 各二兩

陳皮

二兩

右為末每二錢食前沸湯調下

按此方主於氣者附九則氣中之血藥也然氣鬱其者宜於氣證隨選用不必拘此

東垣益胃升陽湯治婦人經候不調或血脫後脈弱食少水泄

日三二行

黃芪 二錢 人參 甘草炙 當歸身

陳皮 各錢 白朮 三錢 升麻 柴胡 各半錢

炒麩 一錢半 黃芩 半錢秋去之

右吹咀每半兩水煎腹痛加芍藥

補中益氣湯治婦人室女經候不調脈微食少體倦或熱

方見雜論

按此二方氣血之藥血脫益氣之大法也

紺珠正氣天香湯治婦人一切氣氣上凌心胃攻築脇肋刺

痛月水不調

台烏藥 二錢 香附子 八錢 陳皮 蘇葉 各錢

乾姜 半錢

右吹咀每七八錢水煎服

謹按婦人經病多有因於七情六鬱致者故集已上例以備其義大抵氣行不失其常則經血亦行也

通經之劑

良方通經丸治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血瘕

川椒 炒 蓬朮 乾漆 炒 當歸 一錢半

青皮 乾姜 大黃 桃仁 炒

川烏 桂心 各一錢

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥成劑白中杵之充如

梧子大陰乾每三五十九醋湯下

嚴氏方無川烏有紅花

加味四物湯嚴氏名一合湯治婦室經事不行腹中結塊疼痛腰

木方加桂蓬朮等分

右咬咀每四錢水煎服

紅花當歸散治婦人血臟虛竭或積瘀血經候不行時作腹痛腰膝重疼小腹堅硬及室女經不通

紅花

當歸尾

紫葳

牛膝

甘草

蘇木

劉寄奴

桂心

赤芍

劉寄奴

右為細末空心熱酒調三錢一名凌霄花散

桂枝桃仁湯治經不通繞臍寒疝痛其脉沉緊此由寒客於血室血凝不行

桂枝

芍藥

生地黄

各兩 桃仁 五箇

甘草

右為粗末每服五錢水煎入姜棗

地黃通經丸治經不行結積成塊臍下如覆杯

熟地黄

蜜虫

水蛭

糯米炒

桃仁

各五箇

右為細末煉蜜丸如梧子大空心温酒下五丸未知加至七

丸

嚴氏琥珀散治婦人室女月事凝滯腹脇脹痛及血逆攻心眩

暈不省

劉寄奴

牡丹皮

熟地黄

玄胡索

烏藥

赤芍

莪朮

三稜

當歸

桂 各兩

右用煎五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮至爛為度焙乾入後五味同為細末每服二錢用溫酒調服空心食前

戴人玉燭散治經候不通腹脹或痛

四物湯對調胃承氣湯

右咬咀

按已上諸方並出厥陰例藥也然有本於氣虛氣鬱血虛痰

積等因不同宜於前調經理氣諸方內選用

治崩漏之劑

生地黄散治經漏下血脉虛洪經水紫黑

方見血證門

簡易黃芩湯治崩中下血陽乘陰經水沸溢

黃芩 不以多少

右為末每一二錢燒秤鎚淬酒調下

按此二方治熱之劑也

一法用此味治天癸當住每月却行或過多不止出瑞竹堂方名卷心丸

伏龍肝散治氣血勞傷衝任經虛血非時崩下臍腹冷痛脉遲

弱食少或赤白帶下

伏龍肝

赤石脂

麥門冬

各兩

甘草

各半兩

川芎

當歸

乾姜

七錢半

桂

半兩

艾葉

熟地黄

二兩

右件為粗末每四錢入棗煎

按此治寒例藥補血固虛之劑也

備金散治婦室血崩不止

香附子

當歸尾

一兩錢

五靈脂

一兩炒

右為末每五錢淡醋湯調空心食前服一方只用香附一味

澹紫茯苓補心湯治婦人亡血過多或氣逆心悶

四物湯

一分半參蘇飲三分

右吹咀入姜煎

按已上方理氣補榮之劑也

良方縮砂散治血崩

新縮砂不以多少瓦上炒香為細末米飲調下三錢

五靈脂散治血山崩不止

靈脂十兩水煎去滓澄清再煎成膏入神麩二兩和丸如

梧子大每三二十九温酒下

荆芥散治崩中不止

用此一味於麻油燈上燒焦為末每三錢童便調下

瑞竹堂方蒲黃散治崩中不能止

破故紙

蒲黃

千古石灰

各等分炒過

右為末每二三錢淡酒或淡醋湯調下

按已上諸方皆劫劑也

東垣升麻除濕湯治婦人女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食失節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其脉緩而弦急按之洪大皆脾土受邪也

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪

各一錢半

防風

甘草

升麻

藁本

各一錢

蔓荊子

七分

獨活

當歸

各半錢

右咬咀作一服水煎食前服

涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故

走而崩也

生地黃

各錢黃連

羌活

柴胡

防風

各分黃柏

知母

升麻

藁本

細辛

川芎

各二分 甘草一錢

荊芥穗

蔓荊子

黃芩

各一分 當歸半錢

紅花

少許

右咬咀作一服水煎

按已上二方升劑也經漏不止氣血下陷非此不能治

當歸芍藥湯治婦人經脉漏下不止其色鮮紅或先因勞役脾

胃虛損氣短氣逆自汗不止身熱食懶大便或泄體倦無力

黃芪

一錢半 白朮

蒼朮

當歸身

白芍 各錢 熟地黄 錢 甘草 炙 生地黄 各三分

陳皮 錢 柴胡 二分

石叟咀 作一服水煎

按此補劑也

治帶下之劑

千金方治帶下脉數者

枸杞根 兩 生地黄 五兩

右二味酒煮一升至三合作一服

按此治熱例藥也

元戎六合湯治婦人赤白帶下脉沉微腹痛或陰中痛

四物湯 四兩 桂 附子 炒五錢

右叟咀每五錢水煎食前服

按此治寒之劑也

宣明道水丸治濕熱鬱於下焦之分赤白帶下不止躁熱煩渴

方見濕河

按此治濕熱之藥下劑也

嚴氏當歸煎丸治赤白帶下腹內疼痛不飲食羸瘦

當歸 赤芍 炒 牡蠣 煨 熟地黄

阿膠 炒 白芍 炒 續斷 酒浸各兩 地榆 五錢

右為末醋糊丸梧子大每五十九空心米飲下

按此治血虛之劑潤燥藥也

良方白芷散治赤白帶下

白芷 一兩 海螵蛸 二箇 燒胎髮 一匳 煨

右為細末空心溫酒調下二錢

伏龍肝散治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁多困乏力

棕櫚 不以多少先灰火熱急以益蓋塵 伏龍肝 於鍋竈底下取炒令烟盡

屋梁上塵 懸空者如無竈頭虛空中者炒令烟盡

右三味等分碾和令停入龍腦麝香各少許每服二錢溫酒

調下淡醋湯亦可患十年者半月可安

按已上方皆切劑也

益母草散治赤白惡露下不止

益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調二錢日三服

東垣固真丸治白帶久不止臍腹冷痛陰中亦然

白石脂 一錢 煨赤 乾姜 炮薑 黃柏 酒蒸

白芍 各錢 白龍骨 二錢 訶訶 一錢 當歸身 二錢

右除石脂龍骨另研外同為細末水煮糊丸如桐子大每十

丸食前煎水下

按此寒熱之劑又止澁藥也

桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂 一錢 附子 三錢 黃柏 知母

甘草 炙 升麻 各半錢 黃芪 一錢 半 人參 七分

右吹咀作一服水煎食前服

按此補陽氣極虛用黃柏等為引用又升降陰陽藥也

補經固真湯治白帶下流不止始病崩中日久血少復亡其陽

故白滑之物不止也

紫胡

甘草

郁李仁研

黃芩各錢

乾姜

二錢

橘皮

半錢

人參

二錢

白葵花

去蕊一兩

右吹咀水煎空心服

按此補氣例藥也

衛生湯治帶下不止脈微弱腹痛

白芍

炒

當歸

各兩

黃芪

三兩

甘草

一兩

右吹咀或末每五錢水煎空心服下苦練丸三十粒

按此補血之劑也

苦練丸治赤白帶下

苦棟

炒酒浸

面香

炒

當歸

各等分

酒糊丸桐子大每五十九空心酒下

此謂邪入小腸故用此燥丙藥也

當歸丸治癩疝白帶下注脚氣腰已下如在水雪中以火

焙乾厚衣蓋其上猶寒冷不任寒之極者而白如枯魚之象

肌肉瘦削小便不止與白帶常流不禁病甚者

當歸

一兩

茴香

半兩

良姜

附子

炮各七錢

已上四味吹咀以好酒一升半煮至乾再焙乾

炒黃蘗

全蝎

各錢

丁香

苦棟

甘草

各半錢

紫胡

二錢

升麻

木香

各一錢

玄胡索

四錢

右與前同為細末酒煮糊為丸如梧子大每五七十九空心

淡醋湯下忌酒濕麪油膩物

按此升陽勝濕之劑氣血藥也

升陽燥濕湯治白帶下陰戶痛控心急痛身黃皮緩身重如山

陰中如水

防風

良姜

乾姜

郁李仁

甘草各錢

柴胡

一錢三分橘皮

黃芩各半錢

白葵花七葉

右吹咀分作二服水煎空心服

按此升散之劑也

坐藥勝陰丹

二葉子

川烏頭

大椒各半錢

柴胡

羌活各分

全蝎

三箇

蒜

七分

甘松二分

破故紙八分與蒜同煮

升麻

枳殼各二分

麝香心計

右為細末煉蜜丸如彈子大綿裹留系在外納丸藥於陰戶

內

按此劫藥也

灸法

氣海一穴在臍下一寸五分主月事不調帶下崩中因產惡露

不止繞臍疔痛灸五壯

帶脉二穴在季脇下一寸八分陷者宛宛中灸七壯主婦人月

水不調及閉不通赤白帶下氣轉運替引痛不可忍

血海二穴在膝膕上內膝白肉際 寸中治女子漏下惡血月
事不調逆氣腹脹灸三壯

陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之
治婦人漏血不止腹脹滿不得息小便黃如蠱膝如錐不得
屈伸小腹引痛灸三壯

關元一穴在臍下四寸主婦人帶下瘕聚因產惡露不止斷產
下經冷可灸百壯

安胎之劑

金匱方當歸散妊娠宜常服之

當歸

黃芩

白芍

川芎

各兩

白朮

半兩

右五味為末酒飲調服方寸七日二次

按此方養血清熱之劑也瘦人血少有執胎動不安數曾半
產者難產者皆宜服之以清其源而無後患也

千金茯苓半夏湯治妊娠惡阻心悶吐逆頭眩四肢怠惰煩疾
痰逆嘔吐惡寒自汗黃瘦

半夏

七次薑

生薑

五兩

茯苓

熟地黃

各三兩

橘紅

細辛

人參

芍藥

紫蘇

川芎

各兩

苦梗

甘草

各半兩

右以咀每四錢水煎空心服

局方參橘散治妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

橘皮

茯苓

各兩

麥門冬

白朮

厚朴製

甘草炙各半兩

石叟咀每四錢入姜竹茹煎一方加入參名竹茹湯良方名
人參橘皮湯

良方膠艾湯治妊娠或因頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶
心或去血腹痛

膠一斤炙

艾葉數莖

指迷方加秦艽

右二味以水五升煮取二升分三服

阿膠散嚴多作阿膠湯不問妊娠月數深淺或頓仆或因毒藥胎
動不安腰痛腹滿搶心短氣

熟地黃

艾葉

白芍

川芎

黃芪

阿膠

當歸

甘草各二兩

右叟咀每四錢入姜棗煎金匱方無黃芪

佛手散治妊娠傷胎下血

當歸

三錢

川芎

二錢

右叟咀水煎食前服

安胎散治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血

胃虛嘔逆並宜服之

縮砂

不以多少炒過

右為末每二錢用酒調服艾益湯亦可

簡易方知母飲治妊娠心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

赤茯苓

黃芩

黃芪

各三兩

知母

麥門冬

甘草

各二兩

右咬咀每四錢入棗白皮熟時再入竹瀝與小服
竹葉湯治妊娠心驚膽怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓 四兩 防風 麥門冬 黃芩 各三兩

右咬咀每四錢入竹葉五片水煎外臺方有竹瀝二合無葉
一方有黃芩知母

按萃方枳殼湯治胎漏下血或因事下血

枳殼炒 黃芩 各半兩 白朮 一兩

右為末每一錢白湯調下宣明方無枳殼

二黃散治胎漏下血

生地黃 熟地黃

右為末煎白朮枳殼湯調下二錢或錢半

當歸羊肉湯治產後發熱自汗肢體疼痛名曰羸勞

當歸 人參 各五錢 黃芪 一兩 生薑 半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入煎藥煎四盞去

粗作六服

良方茯苓散治產後心虛怔忡不定言語錯亂

人參 甘草 山藥 當歸 各錢

生薑 遠志 茯苓 桂心

麥門冬 冬桑錢 大棗

右咬咀水煎

機要增損柴胡湯治產後經水適斷感於異證手足搐搦咬牙

昏冒

柴胡 八錢 黃芩 四錢半 人參 二錢 甘草 炒四錢

石膏 四錢 知母 三錢 黃芪 五錢 半夏 三錢

右為粗末每半兩入姜蜜煎

血風湯治產諸風痠痺無力

秦艽 羌活 防風 白芷

川芎 芍藥 白朮 當歸

地黃 茯苓 半夏 黃芪 等分

右為末一半為丸煉蜜桐子大一半為散溫酒送下五七十

丸

愈風散治產後中風口噤牙關緊急手足痲癢如角弓狀

荆芥穗 畧炒為末

空心食前服日三次腫消止藥

按此二方治證例相類故併錄之

嚴氏紫蘇飲治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮 川芎 白芍 陳皮

蘇葉 當歸 各兩 人參 甘草 各半兩

右以咀每四錢入姜葱煎

安茶散治妊娠小便澁少遂成淋澁名曰子淋

麥門冬 通草 滑石 各三錢 當歸

燈心 甘草 各半兩 人參 細辛 各兩

右為細末每二錢煎麥門冬湯調下

珍三角散治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語澁痰涎不

利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角 錢 川獨活 酸棗仁炒 五加皮 各半錢

薏苡仁 防風 當歸 川芎

茯神 杏仁 各四分 木香 甘草 各三分

石叟咀每五錢入姜煎

八味丸治妊娠小便不通名曰轉胞亦治子淋

方見補虛門

丹溪參朮飲治妊娠轉胎

四物湯加人參 白朮 半夏 製

陳皮 甘草

右咬咀入生姜煎空心服

按丹溪曰轉胞之病胎婦之稟受弱者憂悶多者性急躁者食味之者庸或有之古方皆用滑利藥鮮有應効因思胞不自轉為胎所壓裹在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起居於基胞系自疏水道自利然胎之墜下必有其由近吳宅寵人忘此兩脉似瀆重則弦左稍和子曰此得之憂患瀆為血少氣多則胎氣弱而不能舉弦為有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下乃以已上藥與服隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與之次早亦然至八貼安此法恐偶中耳後又治數人亦効未知果何如耶仲景云婦人本肌肥盛頭舉自滿今反羸瘦頭舉中空胞系了戾亦多致此病但利小便則愈宜服腎氣丸以中有茯苓

故也地黃為君功在補胞若頭舉等語其義未詳恐有能知之者

按已上安胎諸法皆氣血本病之藥故非辛熱苦寒之劑蓋產前當清熱養血也然有外感風寒內傷生冷以辛熱散之溫之大積大聚以藥衰其大半而止經曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞故無殞也斯法亦不為本病之謂也故妊娠諸證例藥詳見大全良方茲不備錄

東胎丸 第八箇月服之

黃芩

炒夏二兩春秋七錢半冬半兩

白朮

二兩

茯苓

七錢半

陳皮

三兩炙

右為末粥為丸桐子大每三四十九空心白湯下

達生散

又名東胎散

大腹皮

三錢

人參

各半錢

白朮

白芍

各錢

甘草

炙

紫蘇葉

半錢

當歸尾

一錢 或加枳殼縮砂

右咬咀作一服入青葱五葉黃楊腦七箇煎服於八九箇月服十數貼甚得力或夏加黃芩春加芍冬依正方或有別證以意消息

又方於第九箇月服

黃芩

怯弱減半

白朮

一兩

滑石

枳殼

各七錢半

右為末粥丸如桐子大每服二十九空心熱湯下

按世俗婦室妊娠鮮有服束胎藥者蓋局方良方諸法未能
以盡其妙用者多輒動娠故率不敢行然丹溪先生因製已
上諸方以備世俗取擇實好生君子之一端也

滑胎易產藥

枳殼散治妊娠胎肥壅隘難產臨月服之

粉草 一兩炙 商州枳殼 二兩炒

右為細末百沸湯點二錢空心日三服

一方枳殼 六兩 甘草 一兩

一方有糯米半升淘控乾同炒為末

溫隱居加當歸木香各等分

又法張氏方治妊娠胎肥動止艱辛臨月服之縮胎易產治氣

寬膈

枳殼 五兩 甘草 一兩半 香附子 二兩炒

右為細末姜湯點服

神寢丸滑胎易產入月服之

通明乳香 半兩 枳殼 一兩

右為末煉蜜丸梧子大空心酒下二十九

陸氏名寤生丸乳香只一分

保氣散安胎易產或居處失宜偶然頓仆胎動胎痛漏胎下血

兼服佛手散

香附子 四兩 山藥 二兩 縮砂 兩 木香 四錢

粉草 一兩 益智仁 紫蘇 各兩

右為細末白湯點二錢八月服之

益元散八月服之滑胎易產

方見前

產間藥

施氏催生如意散臨產腰疼方可服之

人參

乳香 各錢末

辰砂 半錢

右三味一處研臨產急用雞清一箇調藥末再用生姜汁調

冷服如橫生倒產即時端順而生

催生佛手散

方見前

嚴氏無憂散治胎肥氣逆或人瘦血少胎弱臨產難產者便產

須知名保生無憂散

當歸

川芎

白芍 各兩

枳殼 炒五錢

乳香 三錢

木香 一錢半

血餘灰 一錢

甘草

右為末每二錢水煎服

簡易集効黑散子催生兼治橫生逆產

百草霜

白芷末

等分

右和勻每二錢童便并好醋調稀更以沸湯調下

局方催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並宜治之

十二月鬼腦髓

去皮膜研如泥

乳香

另研細如泥

母丁香

二錢半

麝香

另研五分半

右三味拌勻以无腦和丸如雞頭大陰乾油紙裹每一丸温

水下即產兒手中搗出

良方催生乳香膏

名如神開骨膏 又名乳珠丹

一法酒乳為末猪心血為丸五月五日午時合

右如桐子大朱砂為衣每一粒面東酒吞下未下再服如胎乾者先與四物湯

秘方益母丸專治橫生逆產難產并安胎順氣神效

益母草五月採陰乾石臼搗為末煉蜜丸如彈子大母一丸或二丸臨產以童便和溫酒送下氣不順木香參湯送下或作小丸吞服亦可

獨聖散

黃葵子炒七十粒

研爛酒服濟君急

若也臨危產難時

免得全家俱哭泣

小品療橫生倒產子足先出方

用粗針刺兒子足入二分許兒得痛驚轉即縮自當回順而生

一法益塗兒之底又可急搔爪之并以鹽摩產婦腹上即產

機要半夏湯治胎衣不下或子死腹中或子衝上而昏悶或血

暴下及胎乾不能產者

半夏 一兩半 桂 七錢半

桃仁 三錢少

大黃 半兩

右為細末先服四物湯三兩次服此生姜同煎

良方治死胎不下其證產母舌青黑及胎上冷者子已死或指甲青舌青脹悶甚者口中作屎臭先以平胃散一貼作兩服每服

酒水各一盞同煎至一盞却投朴硝半兩研細再煎數沸溫服胎化血水而下

鹿角散治因熱病胎死腹中

鹿角屑 二兩

右水煎入葱白五莖豉半合丹溪云燒過治產後血暈

當歸湯治子死不下

川當歸 三兩 川芎 二兩

右為末水酒各半調下四錢未下再服

一方只用川芎末酒煎服

香桂散下死胎

麝香 麤 桂心 三錢為末

右和勻只得一服溫酒調下

一方朴硝末二錢溫童便調下

必效方牛膝湯治胎衣不出腹臍堅脹急痛即殺人服此胞即爛下死胎

牛膝 鹽苳麥 各四兩 當歸 三兩 通草 六兩

滑石 八兩 故子 五兩

右切細以水九升煮取三升分三服

宣明礪砂散治胎死腹中不下

礪砂 研細 當歸 各兩

右二味研極細只分作二服溫酒調下如重專行五里不下再服

局方至寶丹

見本方

花藥石散治胎死腹中及胎衣不下

花藥石 一斤 上色硫黃 四兩

右二味相拌勻煉製見良方

黑龍丹治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂死者但

灌得下無不立活

當歸

五靈脂

川芎

良薑

熟地黃

各一兩對以少合盛赤石脂泥封紙筋鹽泥固濟炭火十斤煨令通赤去火候冷取開看成黑糟色取細研却入後藥

百草霜 五兩 硫黃

乳香 各錢半 花藥石

琥珀 各錢

右五味並細研與前藥再研如法修製和勻以米醋煮麩糊丸如彈子大每服一丸炭火燒令通赤投於生姜自然汁與童便入酒漉出控乾研細只此酒下

一方取死胎用烏雞一隻去毛細切水煎三三升湯通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

產後雜方

局方芎歸湯治產後去血過多暈煩不省

當歸

芎藭 等分

右以咀每半兩水煎服腹疼加桂名桂香散一名琥珀散治

腹中痛急自汗頭眩少氣加羊肉名羊肉湯

黑神散治產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心及腹痛不止

黑豆炒半升 熟地黄 當歸 肉桂

乾姜 甘草 白芍 蒲黃各四兩

土地黃局方良方俱無此味便產須知有之

右為末每二錢酒童便各半調服一名烏金散

按此手少陰足厥陰太陰陽明表裏血藥也豈方大意見前丹
溪之論矣今人以為治產後百病率用之故收入然用者自

宜通變

人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛則內熱心煩
短氣自汗頭痛

熟地黃 人參 當歸 桂

麥門冬各兩 白芍二兩炒

右以咀每五錢入竹葉生姜煎

當歸黃芪湯治產後失血多腰疼身熱自汗

當歸三兩 黃芪二兩 白芍一兩半炒

右以咀每五錢入姜煎

失笑散治產後心腹絞痛欲死及兒枕痛

蒲黃炒 五靈脂各等分

右為末醋調二錢熬成膏湯化服之

一法治小兒枕痛各單服

經驗方三聖散治兒枕痛

當歸

桂

玄胡索

右等分為細末每服二錢熱酒或童便調下

嚴氏清魂散治產後血暈昏不知人更宜取漆器於床前燒薰之頻置醋炭更服此藥

澤蘭葉

人參 各兩

荆芥穗

四兩

甘草

炙八錢

川芎 二兩

右為末每二錢熱湯酒各半盞調下

抵聖湯治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍

半夏

澤蘭葉

陳皮

人參

各錢

甘草

炙一錢

右以咀作一服入生姜煎

按良方論云婦人有子之後血畜以養胎矣豈可復能散動耶所以然者有娠而月信每至是亦未必因血盛也若謂榮經有風則經血喜動以其風勝則可此例可見胎漏之因非止一端也治者宜擴充焉

地黃當歸湯治胎痛

當歸

一兩

熟地黃

二兩

右為末每半兩水煎良方等分為末蜜丸名內補丸許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋此等藥甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調停有

益胎嗣此前人未嘗論及也愚詳陰陽調停不若不服為愈
全生方白木散治妊娠面目虛浮肢體腫如水氣名曰子腫

白木 二兩 生姜皮 大腹皮 陳皮

白茯苓 各半兩

右為末每二錢米飲調下指迷方有桑白皮無木

李氏天仙藤散治妊娠自二月成胎之後兩足自脚面漸腫腿
膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美狀似水氣至於脚指
間有黃水出者名曰子氣

天仙藤 洗畧炒 香附子 炒 陳皮 甘草

烏藥 等分

右為末每服三錢水煎入姜三片木瓜三片紫蘇三葉同煎

右每三錢 豆淋酒調下童便亦可一方加當歸

謹按產後多有血病神強癆瘵而似中風者宜用此藥通血
脉而清神或加當歸者為然非外因例藥也是以姑錄此一
法義見後丹溪論

獨行散治產後血暈昏迷

五靈脂 炒

右為末水酒童便調下一二錢

當歸散治產後氣血俱虛無大補恐增客熱宜服此去惡露

當歸 白芍 川芎 黃芩 各二兩

白木 二兩

右為細末溫童便調下一二錢

黃芪湯治產後汗不止因陰虛而得

黃芪 二錢 白朮

防風

熟地黄

牡蠣 煨

白茯苓

麥門冬

甘草 炙各半錢

右咬咀每半兩入棗煎

加減四物湯治產後陰虛發熱或日閉明了暮則發熱增寒

當歸

川芎

生地黄

柴胡

右等分每四五錢水煎

瑞竹堂方治產後血塊腹痛

京芎 炒

當歸 炒

熟地黄

白芍

炒各半兩

蒲黃 炒二分

右同為細末每服一錢空心温酒調下

丹溪參朮膏治產後胞損成淋瀝證

人參 二錢

白朮 二錢

桃仁

陳皮

各錢

黃芪 一錢

茯苓 一錢

甘草

炙半錢

右咬咀水煎猪羊胞後入藥作一服

丹溪曰嘗見尿胞因收生不謹以致破損而得淋瀝證有徐

氏婦於壯年得此因思肌肉破傷在外者且可補完胞雖在

腹恐亦可治診其脉虛甚因悟曰難產之人多是氣虛難產

之後血氣未虛因用峻補以參朮膏煎以猪羊胞極飢時與

之每劑用一兩至一月而安恐是氣血驟長其胞可完若稍

遲緩恐難成功

嚴氏起痛散治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍身疼痛

當歸

桂

白木

牛膝

甘草

各錢

黃芪

獨活

生姜

各半兩

薤白

二錢半

右咬咀母半兩水煎

按此手足之陰藥出太陽例治表之劑也然惡露不盡絞痛不止宜良方歸湯散治裏之劑以大黄桃仁等藥下之血畜經絡成血塊宜沒藥丸以虫虫水蛭等藥逐之皆變法也茲不詳錄故已上諸方皆調理之劑餘有異說詳見八全良方

謹按產後血滯於經多成癰腫或有致不救者蓋氣血虛損逆之甚也大抵此兼陰虛火動凡辛溫之劑宜慎之矧產後用藥有三禁我丹溪先生謂產後如無惡阻當大補氣血雖有雜證以末治之如中風切不可作風治與續命湯必先補氣血然後治痰當以左右手之脉分其氣血多少而治如發熱惡寒皆是氣血虛手脉不足用補血藥多於補氣藥右手脉不足用補氣藥多於補血藥惡寒發熱腹痛者當去惡血以求通變之意也

卷之四十九

玉機微義卷之五十

小兒門

論色脉法

脉經曰小兒四五歲脉呼吸八至細數者吉 小兒脉呼吸八至者平九至者傷十至者困 診小兒脉法多雀鬪要以三部脉為主若緊為風痼沉者乳不消弦急者客忤氣 小兒是其日數應變蒸之時身熱而脉亂汗不出不欲食食輒吐覘者脉亂無苦也小兒脉沉而數者骨間有熱欲以腹按冷清也 小兒大便赤青澀滲泄脉小手足寒難已脉小手足温易已 小兒病因汗出如珠着身不流者死 小兒病其頭毛皆上逆者必死耳間青脉起者瘕痛 小兒病而額限其口唇乾目皮反

口中氣出冷手足四垂其目如縛掌中冷皆死不治

脉訣啓蒙曰凡診小兒脉當大指按三部一息六七至為平和八九至為發熱五至為內寒弦脉為風癩沉緩為傷食促急為虛驚弦急為氣不和沉細為冷浮為風大小不調為鬼祟浮大數為風熱伏結為物聚單細為疳勞風腸痛多嘔而脉洪為有虫浮而遲潮熱者胃寒也

按此本錢氏脉法也頗詳

虎口脉歌曰紫風紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃即困脾

按全嬰等書云小兒三歲已前虎口第二指上寅卯關有脉紋見者可驗病狀男左女右視之脉紋從寅關起不至卯關

者病易治若連於卯關者有病難治如寅連卯卯過辰關者十難救一若脉紋小或短者病易治也宜察視之

錢氏曰面上證左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾頰為腎赤者熱也隨證治之 目內證赤者心熱瀉赤散主之淡紅者

心虛熱生犀散主之青者肝熱瀉青丸主之淺淡者補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎虛地黃丸主之紫古曰青是腹

痛社古藥潔古曰肝病面白 肺病面赤 脾病面青 腎病面黃 心病面黑若肝病驚搖而又加面白痰涎喘急之類此

皆難治餘皆倣此推之叔和云春得秋解定知死亦此意也 按錢氏云者本病也紫古則兼勝已制化言之故後五臟形

證不容不辯也

論五臟形證虛實所主

錢氏曰肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶 虛則咬牙多
欠氣熱則外生氣溫則内生 肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青
丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之 肝有風目連劄不搖得
心熱則搖治肝瀉青丸治心導赤散 風甚身反張直不搖心
不受熱也當補腎治肝 肝有熱目直視不搖得心熱則搖治
與有風同 凡病或新或久皆引肝風風動而止於頭目日屬
肝風入於目上下左右如風吹不輕不重覓不能任故目連劄
也若熱入目牽其筋脉兩皆俱緊不能轉視故目直也若得心
熱則搖以其子也俱有實熱風火相搏故也
繁古曰肝主謀勇熱則尋衣捻物目連劄直視不能轉視或極

則身反強直折皆風熱也目者肝之竅屬木木性急故如是
錢氏曰心主驚實則叫哭發熱飲水而搖 虛則困卧悸動不
安 心病多叫哭手足動搖驚悸 心氣熱則心胃亦熱欲言
不能而有就涼之意故合面卧 心熱視其睡口中氣溫或合
面睡及上竄搖頭咬牙皆心熱也導赤散主之 心實則氣上
下澁合卧則氣不得通故喜仰卧則氣得上下通也瀉心湯主
之

錢氏曰脾主困病則困睡洩瀉不思食 實則困睡身熱飲水
虛則吐瀉生風

肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者 虛則哽氣長
出氣 肺熱手搖眉目鼻面 肺盛復有風冷胸滿短氣氣急

喘嗽上氣當先散肺後散風冷肺只傷寒則不胸滿 肺虛熱
唇深紅色治之散虛熱 肺臟怯唇口色當補若閃亂氣虛喘
促噎氣者難治肺虛損故也 脾肺病久則虛而唇白脾者肺
之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇白白而澤者吉
如枯骨者死

潔古曰肺主氣燥熱則壯熱飲水喘悶鼻乾燥手捫眉面瀉白
散 胸滿短氣氣急喘嗽上氣皆是肺氣有餘復感風邪之所
傷謂之微邪先瀉而復發散之

錢氏曰腎主虛無實也惟瘡疹腎實則黑陷 腎虛見本虛怯
由胎氣不成則神不足目中白睛多其顛即解 自開也面色皓
白此皆難養縱長不過八八之數若恣色慾多不及四旬而亡

或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲
墜下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明宜補之

潔古曰下竄者腎氣不足兩足熱不喜衣履是然此者臍以下
皆腎之所主緣心氣下行於臍部也此乃腎不足而心有餘宜
地黃丸

論五臟相勝虛實之邪

錢氏曰五臟相勝輕重肝臟病見秋木旺肝強勝肺也宜補肺
瀉肝輕者肝病退重者唇白而死

肺病見春金旺肺勝肝當瀉肝輕者肺病退重者目淡青必發
驚更有赤者當播為肝怯當目淡青色也

心病見冬火旺心強勝腎當補腎治心輕者病退重者下竄不

語腎怯虛也

腎病見夏水勝火腎勝心也當治腎輕者病退重者悸動當攝

也

肝病見四旁皆做此治之順者易治逆者難治脾怯當面目赤

黃五臟相反隨證治之

又曰如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故

也若目直大呻哭項急煩悶者難治蓋肺病久則虛冷肝強實

而反勝肺也視病之新久虛實虛則補母實則瀉子

潔古曰肝勝肺則肝病身熱發搐又見肺虛喘而氣短病見於

申酉戌時是肝身強也內經曰受所制而不能制謂之真強法

當補脾肺而後瀉肝導赤散瀉黃散

肺勝肝則肺病喘嗽氣盛見於寅卯辰時木之位又以見肝怯

少力正為鬼賊所尅法當補肝瀉肺若肺病嗽久虛羸無實不

得瀉肺只宜用地黃丸補之不可服瀉白散何謂也經云虛則

補實則瀉之

按此謂五臟相勝病機不離五行生尅制化之理者 小兒

初在襁褓未有七情六慾只是形體脆弱血氣未定腑臟精

神未完所以有臟氣虛實勝乘之病但世俗不審此理往往

遇是率指為外感內傷而用藥致枉死者多矣悲夫矧錢論

脫畧幸而潔古補之今特參附誠所謂無窮之惠也

潔古曰五臟子母虛實鬼賊微正若不達旨意不易得而入焉

在前者為實邪

子能令母實拒鬼賊不敢傷於母其子又引母所尅者妻相
助故曰實邪也

在後者為虛邪

母引子之鬼賊至由此母能使子虛也內經曰子能令母實
母能令子虛此之謂也

妻來乘夫為微邪

夫來乘妻為賊邪

法當瀉鬼補本臟

本臟自病為正邪

法當虛則補之實則瀉之內經曰滋苗者必固其根伐下者
必枯其上逆其根則伐其本伐其本則敗其真矣

按此以五行生尅之道論也義見難經五十難及後五臟治
要論宜參考之

心之熱自病或大熱瀉心湯主之

實則煩熱黃連瀉心湯主之

虛則驚悸生犀散主之

肺乘心微邪

喘而壯熱瀉白散

肝乘心虛邪

風熱煎大羌湯下大青丸

脾乘心實邪

洩瀉身熱瀉黃散

腎乘心賊邪

恐怖惡寒安神丸

按乘者猶乘車之乘也大抵五臟之病相乘伏匿隱顯莫測已上但言本病乘勝之道故以五臟治要附于左宜參攷焉凡心臟得病必先調其肝腎兩臟腎者心之鬼肝氣通則心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求于肝清其源也五臟受病必傳其所勝水能勝火則腎之受邪必傳於心故先治其腎逐其邪也故其退腎也益肝氣兩方或診其脉肝腎兩臟但和而心自生疾然後察其心家虛實治之

肺主燥自病則喘嗽燥則潤之

腎則喘而氣盛瀉白散

虛則喘而少氣先益黃散而後阿膠散

心乘肺賊邪

熱而喘嗽先地黃丸中瀉赤散後阿膠散

肝乘肺微邪

惡風眩暈昏憤嗽羌活散

腎乘肺實邪

增寒嗽清利百部丸

脾乘肺虛邪

體重吐痰泄瀉嗽人參白朮散

凡肺之得疾必先觀心之虛實若心火炎盛鑠金即當先抑心氣後喫肺藥若心氣和即更看脾脉若脾氣虛冷即不能

相生而肺家生氣不足則風邪易感故患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實則亦痞隔中焦而大腸與肺表裏不能相通夫中焦熱隔則肺大腸不通其毒熱之氣必上蒸於肺而生疾故患肺熱者多脾實得之心氣盛瀉之脾氣虛者益之脾氣實者通之然後隨其肺之寒熱以治之故有抑心氣益脾氣通脾氣三藥若診其脉氣心脾兩臟俱和而肺自生疾則但察肺家虛實而治之

肝主風自病則風搖拘急肝苦急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之

實則風搖力大瀉青丸
虛則風搖力少地黃丸

心乘肝實邪

壯熱而搖利驚之涼驚丸主之

肺乘肝賊邪

氣盛則前長呵欠微搖法當瀉肺先補本臟補肝地黃丸主之瀉肺瀉白散主之

脾乘肝微邪

多睡體重搖先當思之搖瀉青丸主之搖止再見後證則別立法治之

腎乘肝虛邪

地黃丸主之

凡肝得病必先察其肺腎兩臟根其病之所起然後復其肝

家本臟之虛實方可治療然腎者肝之母金者木之賊今肝之得病若非腎水之不能相生必是肺金之鬼來相攻擊不得不詳審而求之故其來在肺先治其肺攻其鬼也其來在腎先補其腎滋其根也然後審其肝家本臟之虛實而寒溫之

脾主濕自病則泄瀉多腫體重昏倦脾胃苦濕急食苦以燥之

實則泄瀉赤黃眩不露睛瀉黃散

虛則泄瀉白已睡露睛白朮散

肝乘脾賊邪

風瀉而嘔痰苔生夏湯主之

心乘脾虛邪

壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘草湯主之

肺乘脾音邪

能食不大便而嘔嗽煎檳榔大黃湯下葶藶丸

腎乘脾微邪

惡寒泄理中丸之類

凡脾之得病必先察其肝心兩臟之虛實根其源之所起然後救療蓋肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼勝心氣虧則脾家生氣不足盛者抑之則退虧者益之則不之故有抑肝氣益心氣兩藥診其脉肝心兩臟俱和則是脾自生疾察其虛實而治

腎主寒自病則足脛寒而逆人之五臟惟腎無實小兒瘡疹變

黑暗則是腎實水尅退心火是以水能制火也

心乘腎微邪

內熱不惡寒桂枝丸

肺乘腎虛邪

喘嗽皮澀寒百部丸

肝乘腎實邪

拘急氣搐身寒理中丸

脾乘腎賊邪

體重泄瀉身寒理中丸

本臟虛弱是自己正令不行乃鬼賊之所尅害當補本臟之正氣假令肺氣喘嗽時於初春見之法當補腎見於夏秋肺

見於秋瀉肺見於冬補心瀉本臟乃名寒嗽大抵五臟各至

本位即氣盛不可更補到初尅位不可更瀉

五行之間惟腎之一臟母盛而子反受邪而物之性有不可

一槩論者肺腎是也何則肺屬金射於皮毛所主者氣腎屬

水主於骨髓所藏者精氣之輕浮能上而不能下精之沉重

能下而不能上此物性之然今肺之盛蓋熱之作也氣得熱

而上蒸則肺不能下生於腎而腎受邪矣急食涼藥解之使

臟氣溫和自能下生於腎此腎之病必先求之於肺若肺臟

安和而腎忽然受病者不過脾之濕相刑於腎而生疾所以

有解肺熱去脾邪兩藥若脾肺兩臟俱和而腎自生疾亦察

其本臟而治之

論外感風寒

錢氏曰傷風食睡口中氣熱呵欠頓悶當發散與大青膏解不散有下證當下大黃丸大飲水不止善食者可微下餘不可下也 傷風手足冷脾臟怯也當先和脾後發散和解傷風自利脾虛怯也 傷風腹脹脾虛也補脾必不喘後發散仍補脾去脹瀉氣丸 傷風無臟無心則驚悸無肺則悶亂喘息噎氣長出氣嗽無腎則畏明各隨補母臟虛見故也 肝外感風呵欠頓悶口中氣熱當發散若能食飲水不止當微下之餘不可下 謹按傷風亦有六經不同詳見傷風門

潔古曰小兒外傷於風秋冬用溫熱藥春夏用涼寒藥若大熱飲水能食不大便用大黃丸作散子服之如身表無大熱而小便不利是蒸有濕熱

便則其熱自退如清心 脫仍用勝濕藥白朮茯苓之類利小便

便則其熱自退如清心 調慎不可妄下恐外熱遂於內而變結胸危證多矣

又曰傷寒依四時陰陽 降順剛柔而施治氣升則順發之氣

收則下之有汗發熱惡風脉浮緩者風傷衛桂枝湯無汗發熱

惡寒不當風而自增寒脉浮緊者寒傷榮麻黃湯有汗發熱惡

風脉浮緊無汗惡寒脉浮緩謂之榮衛俱傷青龍湯桂枝麻黃

各半湯無汗發熱不惡風寒脉沉洪者可下之更詳認其厥與

不厥量寒熱淺深而治之有汗四肢厥脉沉微者名陰厥四逆

湯無汗四肢厥脉沉滑者名陽厥大承氣湯加膩粉如四肢不

厥身熱內外皆陽不動涼藥三五服下之

論諸熱證病本不同

全嬰方論曰夫潮熱者發歇有時或血氣盛實臟腑生熱或傷
寒時疫觸受邪氣陰陽相勝也 驚熱顛叫恍惚夜熱夕發旦
止 餘熱者寒邪未盡或傳經之遺熱也 食熱者吐背先熱
疳熱者骨蒸盜汗 壯熱一向不止錢氏云不已甚則發驚
癇也 煩熱心躁不安喘急甚則發癇也 積熱頰赤口瘡下
盛則腰腿癱腫表裏實則身熱便澀虛則汗下後仍熱也 風
熱汗出身熱呵欠面赤 虛熱困倦少力其有久嗽久瀉多痢之血
癆以致諸疾之後成者皆虛熱也 客熱來去不定為陽邪干於
心也心受邪則熱形於額故先起頭面身熱多驚由真氣虛而
邪氣勝也 癖熱涎嗽飲水由乳食不消伏結於中致成癖塊
也或痰嗽而驚或嘔逆不定日中啞煎夜則啼叫午熱乍涼如
潮熱也 寒熱者如瘧狀陰陽相勝也先寒而後熱陽不足先
熱而後寒陰不足寒多而熱少陰勝陽也熱多而寒少陽勝陰
也寒熱相半陰陽交攻也 血熱者每日巳午間發熱遇夜則
涼 疹熱耳鼻尖冷

錢氏曰胎熱者生下有血氣時叫哭身熱如淡茶色目赤大便
赤黃糞稠急食乳浴法主之

按已上辯諸證可謂詳悉但血熱證東垣謂夜則發熱晝則
明了此血熱也蓋晝陽夜陰也食熱者手心熱暖氣吐乳嘔
吐者多宜隨證推格燕玩本文

論變蒸身熱

全嬰方論曰夫變蒸者以長氣血也變者上氣蒸者體熱變蒸
有輕重輕者體熱虛驚耳冷微汗唇中白泡狀如珠子重者寒
熱脉亂腹疼啼叫不能乳食輒吐現其輕者三日重者五日古
法以黑散子紫丸子主之其有不熱不驚或無證候暗變者多
矣蓋受胎氣壯實故也

按本論註云嘗攷錢氏與寶鑑論變蒸互說差殊錢氏云一
變腎二變膀胱三變心四變小腸五變肝六變膽七變肺八
變大腸九變脾十變胃故稱水數一先變也寶鑑云初變肝
二變肺三變心四變脾五變腎二書所論皆五行顛倒相生
者却逢相剋相剋者又逢相生大抵陰陽造化相生者順相
剋者逆變蒸者是長養血氣滋榮五臟相生之法此理昭然

在生者有母子之道相剋者有夫婦之義相生所以相繼相
剋所以相治原夫胎者得水火既濟陰陽造化五行相治而
成形故始於腎氣之初生也小兒變蒸者當陰陽升降後五
臟相繼而成人故始於肝之初變也雖二說互有所長大抵
小兒所稟胎氣壯怯不同况所變之證不一古方用已上二
藥非本病通變法也故不錄

論傷寒瘡疹同異

錢氏曰傷寒男體重面黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠煩
悶項急也瘡疹則腮赤躁多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷寒當發
散之治疹行溫平有大熱者解毒餘見前說

潔古曰凡傷風則皮澁拘急鼻塞癢疹則睡中發驚悸呵欠嚏

噴是為易識矣

論急慢驚風

錢氏曰急驚因聞大聲或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚丸主之此證本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤刺則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其痰熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒熱痰客于心胃因聞聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不聞聲及驚亦自發搐 慢驚因病後或吐瀉胃虛損遍身冷口鼻氣出赤冷手足時瘳瘳昏睡露睛 一血陽也瓜蒂湯主之 凡急慢驚陰陽異證切宜辯而治之急驚合涼瀉慢驚合溫補如不分別則誤甚矣

問孝忠曰急慢驚風古人無之惟曰陰陽瀉陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可悞也急驚猶有熱熱即生風又或因驚而發則目為連翳涎潮搐搦身體口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急驚證也當其搐熱漸減食與鎮心退熱藥候定以藥即下其痰熱心神安寧即愈慢驚得大病之餘吐瀉之後或誤取轉泄致脾胃虛損風邪乘之似搐而不甚搐似睡而不似睡四肢與口中氣皆冷睡露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此則危證脾胃虛損故也

聖古曰急驚陽證也俱腑受病爾小兒客痰熱於心膈是少陽相火旺經云熱則生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得火氣

而發搐火本不動得風而動當用利驚丸導赤散瀉青丸地黃
丸三之搐止服安神丸慢驚陰證也俱臟受病爾蓋小兒吐瀉
病久脾胃虛損若不早治則成慢驚名曰瘰癧以搐而不甚搐
也因脾胃虛損故大便不聚當去脾胃間風先以宣風散導之後
用史君子丸益黃散則其利自止既已失治則脾肺俱虛致被
肝木所乘是為慢驚也當用溫補羌活膏

全嬰方云驚證因風則目青面紅發搐因驚其病在心忽然叫
聲發搐因食則其證嘔吐氣即發搐皆陽瀉也肺胃經虛則生
粘痰痰者肺胃所出也痰則凝滯在於咽喉如牽鋸之聲時復
瘰癧或因吐瀉所致脾虛則肺亦虛涎痰流溢其證亦然皆陰
瀉也 身熱脈浮精神恍惚或吐或瀉不思乳食發搐即是半

陽合病 身涼脈沉精神倦怠不生不瀉又能乳食發搐
者亦是半陰半陽合病正如傷寒半是表半是裏也亦有急驚
瀉瀉而不愈或與吐下藥太過變為慢驚慢驚溫補而不愈變
為急驚互相更變者多矣

按已上諸家所論殆盡證治之要矣但錢云慢驚用枯薑湯
恐傳寫誤耳大抵驚主風木甲木屬陽腑病故急易治乙木
屬陰臟病故慢難治如大人驚恐即後洩蓋甲木剋戊土也
况小兒五臟之氣未實神氣未完而自病乎證非病後及吐
瀉脾胃虛損得者中有夾火夾熱夾痰夾食病因不同至風
邪內陷入腑入臟亦與外中風相似故治此者當本錢氏虛
實補瀉法則不致犯禁之悞藥有太過不及之失

論發搐有風有熱有痰有食補瀉不同

驚癇發搐錢氏曰男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也 潔古曰男為木左視木位右視金位相擊則有聲男反右視女反左視亦皆有聲

早辰發搐錢氏曰因潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動搖口内生熱涎項頸急此肝旺當補腎治肝也

潔古曰潮熱於寅卯辰木之位是肝旺也當補水以制心火瀉肝木以止其搐

日午發搐錢氏曰因潮熱巳午未時發搐心神驚悸自上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搖此心旺也當補肝治心 潔古曰巳午未火之位而發潮搐者心熱也填赤散及涼驚

丸

日晚發搐錢氏曰因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝 潔古曰肺之位而肝強法當補脾恐被木之賊所尅害先瀉心肝以剋其勢瀉心填赤散瀉肝瀉青丸而後補脾益黃散 夜間發搐錢氏曰亥子丑時不甚搐而卧不穩身體溫壯日睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不省補脾治心填赤涼驚主之

潔古曰皆因大病之後脾胃虛損多有此疾法當補脾涼心傷風後發搐錢氏曰傷風後得之口中氣出熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏主之小兒本怯者多此病也

潔古云因傷風而得已上證者同大人傷風寒之類當用汗
無汗陰陽二證用大青膏仲景小續命之類開發則愈

傷食後發搐錢氏曰因食得之身體溫多唾多睡或吐不思食
而發搐當先定搐搐退白餅子下之後與安神丸

潔古曰傷食發搐謂不因他病忽然而搐此因飲食過度致
損脾胃故見多睡或吐不思飲食脾胃既虛引肝風則發搐
當先定其搐加羌活防風煎下瀉青丸後用白餅子下其食
漸漸用調中丸異攻散養其氣

百日內搐錢氏曰真者不過三兩次必死假者發頻不為重真
者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐
也欲知假者口中氣出熱也治之可發散大青膏及用塗顛

浴體法

錢氏曰惟癰疹能作搐風火相爭故也治當瀉心所補母

雜病目赤兼青者欲發搐 咬牙甚者發搐

全頭方曰凡身體壯熱耳輪鼻尖及手足稍俱冷忽發搐者此
非驚是豆搐也 夫驚搐有陰陽兩證陰者拇指在內陽者
拇指在外陽拳者順陰拳逆也

凡目鮮目眦目白日青目斜目闔目轉目瞪聲佳聲噴聲顛
聲輕啞口弄舌捲舌露筋噓氣噎氣噎氣撮唇噎乳噎食忽
然定睛吐涎吐沫拗頸仰身搖頭擦面蓋頭畏明手攣手顫
脚攣不伸忽撩忽亂恍惚精神失張失志眠睡不寧睡中喜
笑困憂齒齟心煩躁熱啼哭咬人面臉弄色或紅或青伸舒

用力微微作聲有已上證候驚搐先證也預防之驅風膏琥珀散更擇對證藥

問孝忠曰似搐而不甚搐此名瘈瘲

按此所論諸臟旺實或傷風因食所致發搐旺者當瀉實補虛傷風者當發散食宜下之此則與因驚發搐所異也大抵驚病發搐多自外感自內因者如吐瀉後脾虛所致或熱極生風之類是也餘證發搐已上亦備所因不同但世俗罕能分於臨證用藥不無實實虛虛之失反為害耶

論咳嗽

錢氏曰嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者其病必實非久病也其證面赤痰盛身熱法當以葶藶丸下之若久者不

可下也十一十二日嗽者乃傷風咳也風從背脊第三椎肺俞

穴入也以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水涎熱咽喉不利者宜

蕪甘桔湯治之若五七日之間其證身熱痰盛唾粘者以兩錢

丸下之有肺盛者咳而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即

熱以瀉白散瀉之若傷風咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦葶

藶丸主之後用化痰藥有肺虛者咳而喘氣時時長出氣喉中

有聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先葶藶後以補銀丸微

下之涎退即補肺補肺如上法有嗽而吐涎少或青綠水者以百

祥丸下之有嗽而吐痰涎乳食者以白餅子下之有嗽而咳膿

血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者肺亡津液阿膠散補之咳

而痰實不其喘而面赤時飲水者可補銀丸下之治嗽大法盛

即下之久即補之更量虛實以意增損

按此論小兒效證既有外感內因之殊在實之異治法外此宜與效門諸方約之

論吐瀉有傷乳食有風有熱有寒有虛

錢氏曰吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也有初生三日內或至十日吐瀉壯熱不思食大便乳不消或白色是停食當下之後和胃下用白餅子或食乳不消身溫涼不思乳大便青白色此上實下虛也更有無見證吐瀉因傷風得之身溫乍涼乍熱睡多氣壅大便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽更有五臟兼見證當前入臟君臣藥先大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下也此乃脾肺受寒不能入食也傷風吐

瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃此為胃虛熱瀉吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發散藥止渴多服白朮散發散大青膏傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白色因亂不消噯氣長出氣睡露睛此傷風任冉輕怯因成吐瀉當補脾後發散此二證多病於春冬也吐瀉於五月二十五日以後身壯熱此熱也小兒臟腑十分中九分熱也或因傷熱乳食吐乳不消寫深黃色玉露散主之六月十五日以後吐瀉身溫似熱臟腑六分熱四分冷也吐嘔乳食不消瀉白黃色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃散食後多服玉露散七月七日以後吐瀉身溫涼三分熱七分冷也不能食乳多似睡悶亂噯氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便下渴食前多服益黃散食後

少服玉露散 八月十五日以後吐瀉身冷無陽也不能食乳
乾噦瀉青褐水當補脾益黃散主之不可下也虛瀉脾胃不和
不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀
氣也有冷者時時下利唇口青白有熱者溫狀身熱肌肉微黃
此冷熱虛羸也冷者木香丸主之夏月不可服如有證則少服
之熱者胡黃連丸主之冬月不可服如有證則少服之

素古曰夏月心火用事治吐瀉不可用溫燥藥秋用溫藥秋深
用暖藥更有五臟兼見證如有風瀉防風羌活 有熱瀉黃芩
大黃 有寒瀉附子 有濕瀉白朮茯苓 有肺瀉芍藥桂
之喘荆芥人參如其加檳榔木香大便不通則加大黃更詳看
病新舊新則止之久則腸風之患宜推陳致新法當宣風散導

過以用入臟君臣藥調之共置黃散

凡大瀉引飲者其病不以新久皆宜服白朮散痢病亦同身熱
吐瀉欬嗽是風木入于脾母虛其子亦弱法當更前檳榔豆豉溫
下大青膏後服共置黃散 身熱吐瀉大渴大便必少是熱入膀胱
脫亡失津液此為大逆是陰陽相乘也五苓散主之 身涼吐
瀉不渴則知為寒瀉當補之煎附子桂枝湯下大青膏 陰陽
相乘肝入于胃故發熱而嘔當服白朮散後煎檳榔木香湯下
大青膏

蘭孝忠曰凡小兒吐瀉當溫補之予每用理中丸以溫其中以
五苓散導其逆連與數服兼用異攻散等溫藥調理之往往便
愈若已虛損當速生其胃氣宜與其四味理中丸并研金液丹

末煎生薑米飲調灌之惟多服乃効候胃氣已生手足漸暖陰
退陽回然猶瘦瘵即減金液丹二分增青州白丸子二分蒸
用異攻散羌活膏溫白丸鈎藤飲子之類調理至安依此治之
仍頻與粥雖至危者往往死中得生十救八九金液丹治小兒
吐瀉虛極最妙沈存中良方論金液丹云親見小兒吐利刺氣
已絕服之復活者數人真不妄也須多服方驗

按此證錢論傷乳食所致分冷熱傷風雜兼見證明寒熱因
而治可謂究其緒矣醫主溫中兼用金液丹之類蓋是治寒
證濕證及升提下陷之法至潔古更分時令備兼見證而用
藥治法殆無餘蘊但吐瀉止作一證然有吐而不瀉瀉而不
吐則當別議若吐而不瀉傷冷者宜溫胃瀉而不吐傷冷而

脉微者宜灸之亦不可不分蓋病本之不一也

論疳證虛實

錢氏曰疳者皆脾胃病亡津液之所作也 云云疳在內目腫腹

脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也 疳在外鼻不赤爛

自擗鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生瘡治鼻瘡爛蘭香散諸瘡

白粉散治之五臟疳筋疳骨疳 形證詳見本論

潔古曰疳者小兒病癥或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒易

為虛實致之胃虛而亡失津液內發虛熱外消肌肉一臟虛則

諸臟皆弱其病目胞腫腹脹利色無常漸加瘦瘵久不痊可是

腸胃有風積法當用宣風散導之後各依本臟補其母

大抵小兒疳病肌羸血氣不足同大人癆瘵之疾

按疳證唯錢氏論中最詳 宜玩本文

論腹痛所因

錢氏曰積痛口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積宜消積尤甚者當白餅子下之後和胃 蟲痛面眊白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安虫散主之小兒本怯者多此病積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛當口淡而沫自出

按小兒腹痛亦有傷冷食乳物及濕熱欲作痢而痛或發痧疼痛者皆宜詳悉

論小兒癍積

錢氏曰腹中有癍不食但飲乳是也當漸用白餅子下之小兒病癍由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱相類不早治必成疳以其有癍則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲水過多即蕩滌脾胃亡失津液脾胃不能傳化水穀其脉沉細益不食脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣

論癍瘡輕重

錢氏曰凡瘡疹一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢剝也青乾紫陷睡昏汗出不止煩躁熱渴腹脹喘大小便不通者困也凡瘡疹當乳母慎口味凡飢及風寒歸腎變黑難治也有大熱當利小便有小熱宜解毒若黑紫乾陷者百祥丸下之不黑者慎勿下者時月輕重

大抵瘡疹屬陽出則春夏為順秋冬逆冬月腎旺又盛寒病多
歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑陷秋癩冬疹亦不順也黑者無
問何時十難救一其候寒戰噤牙或身黃腫紫宜急以百祥丸
下之復惡寒不已身冷出汗耳聾反熱者死腎氣大旺也下後
身熱飲水可治脾旺勝腎寒去而溫熱也 先發膿胞後發疹
子者順後發癩子者逆 先發水泡後發疹子者逆 先發膿
疱後發水泡多者順少者逆 先水泡後癩子多者逆少者順
先疹子後癩子者順 凡瘡疹只出一般者善

潔古曰一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹
升麻湯若癩已發密重微喘飲水者有熱證則去風藥微下之
若出不快清便自調知其不在表不在裏當微發散用升麻葛根

湯若青乾黑陷身不大熱大小便澀則是熱在內煎大黃湯下
宣風散若身表大熱表證未罷不可下若癩疹已出見小熱小
便不利當利之已發後有餘毒未散復有身熱瘡腫之類當用
茶粉下解毒凡瘡疹已出後有聲音者乃形病氣不病也瘡疹
未出先聲音不出者乃形不病而氣病也若瘡疹出而聲音不
出者是形氣俱病也當清其肺氣當用八風湯并涼膈散去硝
黃亦可

論痘瘡用熱藥之誤

丹溪曰讀前人之書當知其立言之意苟不知其意求適於用
不可得也痘瘡之論錢氏為詳歷舉源流明經絡分表裏虛實
開其治法證以論辨深得著書垂教之體使後人如求方圓於

規矩較平直於准繩引而伸之觸類而長之可謂無窮之應用也今人不知致病之因不求立方之意倉卒一試設有不應并其書而棄之近因局方之學行素問之道不明類皆喜溫而惡涼喜補而惡解利忽得陳氏方論遂以為錢氏不及也雖然陳氏亦可謂善求病情者大率歸重於太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬脾主手足肺金惡寒而易於外感脾土惡濕而無物不受觀其用丁香官桂所以治肺之寒用附木半夏所以治脾之濕也使脾與肺果有寒與濕而兼有虛也中病則已何傷之有今徒見其出遲者身熱者泄利者驚悸老氣急者渴思飲者例與木香散異攻散者間有偶中之効不思一偏之禍若錢氏方固未嘗廢細辛丁香白朮參芪輩率有監制輔佐

之藥但有寒涼者多而補助一法略爾端緒疾人不可說愛錢氏之慮深矣亦將俟達者推克而用之夫渴者用溫藥痒塌者用補藥自陳氏發之迥出前輩然其多用燥熱或未適中恐其立方之際必有挾寒而痘者余嘗會諸家之粹而用之聊陳一二從子六七歲時出痘身熱微渴自利或欲用木香散加丁香十粒煎予觀其出遲固因其自利而氣弱察其所下皆臭滯因熱蒸而恐未必寒急止之已投一貼矣與黃連解毒湯加白朮近十貼以解之利止痘出其後肌常微熱手足生癰又與涼劑補一月安一人年七十歲發熱而昏倦其脉大而似數與參芪歸朮陳皮大料濃湯飲之二十貼痘出又二十貼膿胞成身無全膚或欲用陳氏本方與之予曰但虛無寒也又與前方至六

十貼而安至正甲申春邑間痘瘡不越一家率與陳氏方童幼死者百餘雖曰天數吾恐人事亦或未之盡也

謹按錢氏論痘瘡形色輕重困劇而用藥已具其端緒矣三潔古又辨所熯之證及候音聲察形氣為病而處治治法可謂詳悉但世俗不深求其意反有疑似丹溪先生所以言之謀謀也大抵世俗喜溫而惡涼將錢氏之法不去推充至多疑似如云不可妄下蓋妄之一字戒慎之意當有可下之理也若瘡疹初發有因裏實而出不快渴而脈數便秘煩躁不下可乎有將熯之際裏實而渴便秘身熱不下可乎或云首尾俱不可下或指為上吐下瀉不可下皆非也但自病體虛實不等時令中治法之異要當適中病情爾故錢氏著時月

此句關係甚妙如冬月盛寒使難例用涼劑且小兒痘瘡本五臟之毒所發非止屬諸痛痒瘡皆出心火之比故陳氏方一出亦多獲効今人用錢氏方亦有致悞者蓋不善用其法之過非製法者之過也宜求乎立方本旨矧歲氣時臨災言淺深不同小兒體有虛實之異用藥不可輕舉詳索古以微下法中佐以風劑是熯升發之意亦慎之也何熱劑與香竄之藥豈可例用乎然有毒入關竅肌骨間邪氣下陷用此而獲生者或有之恐千百而一二也

論癩疹證治

王海藏云夫癩之為病皆由于在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒皆太陰濕土雍滯君相二火之所作也因小兒真氣既

盛正氣又旺邪無所容或因天寒傷表或傷裏痲由是而生焉
治當外者外治內者內治中外皆和其痲自出至於惡寒者發
之表大熱者奪之渴者清之秘者通利之驚者安之泄者分之
不可執一大抵傷寒同治隨經用藥最為高論假如五日以裏
諸病與痲疹不能別辨者不可疑似必須發之但各從其所傷
應見治之皆不妨痲出若強發之其變不可勝數矣前八言首
尾俱不可下者何也曰首不可下者為痲未顯於表下則邪氣
不得伸越此脉證有表而無裏故禁首不可下也尾不可下者
為痲毒已顯於外內無根蒂大便不實無一切裏證下之則痲
氣逆陷故禁尾不可下也又言溫暖不令通風痲若已出身熱
天暄何必蓋覆不使之通風乎後人執此二句不知天令人事

通變致悞者多大抵以脉為主浮中沉之診平舉按之候察其
虛實定其中外則可以萬全矣

論未顯痲證所用之藥

外傷升麻湯 內傷枳實丸 大便溲者枳朮丸

傷冷者溫之神應丸 惡寒者發之防風蒼朮湯

表大熱者奪之此表者通言三陽也夫陽盛則氣必上行言奪
者治之不令上行也 大便秘結者下之桃仁承氣四順飲柴
胡飲選用察其在氣在血 渴者清之大渴者白虎湯小渴者
涼膈散 小便不通者利之道赤散八正散之類當求上下三
焦何經而用藥驚者分輕重安之 泄者察寒熱分之
已顯痲證所用之藥

出不快化毒湯 出不多犀角地黄湯 地骨皮鼠粘子湯

咽不利桔梗甘草粘子湯 煩者桔梗甘草粘子湯

肺不利紫草甘草枳殼湯

太陽出不快荆芥甘草防風湯

陽明出不快升麻加紫草湯

少陽出不快連翹防風湯

四肢出不快防風芍藥甘草湯

小兒門

治風之劑

小續命湯 一名寬筋湯 治小兒吐瀉之後因虛生風癱瘓神昏涎

盛不利

麻黃去節兩 防風一分 芍藥 附子

人參 川芎 白朮 防己各兩

黃芩一分 桂枝 甘草各半兩

右為粗末每三歲一錢水煎入姜棗有汗者去麻黃

錢氏大青膏治小兒熱盛生風欲為驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之

天麻末錢 白附子錢半 蝎稍半錢 朱砂一字

麝一字

烏蛇肉

酒浸焙

青黛一錢

天竺黃一字

右同為末生蜜和成膏每服半皂子大月中兒粳米大

天麻防風丸

見後

按已上三方風自內因者宜此汗之可見裏之表證與外因不同矧有驚風痰熱食熱等類諸風者臨證並宜選擇

驅風膏

瀉青丸加辰砂蝎尾

按此表裏藥也

浴體法

天麻末 一錢 蝎尾

朱砂 各半錢

烏蛇肉

酒浸為末

白礬石 各三錢 麝 一字

青黛 三錢

右同研勻每三錢水煎入桃枝一握并葉五七枝溫洗之勿

浴背

塗額法

麝 一字

蝎尾 半錢

薄荷葉 半錢

蜈蚣末

牛黃末

青黛末 各半

右研勻熟棗肉劑為膏新綿上塗勻貼額上四方可出一指許火上炙手頻熨百日裏外兒用此法

謹按世俗週歲上下小兒諸風搐證用浴體搗洗法得汗立効殊勝火灸蓋艾有悞加於風熱陽癇也慎之

局方敗毒散治小兒傷風身熱鼻塞

方見熱門

拔萃防風蒼朮湯治小兒邪熱在表惡風風寒所傷

防風 二兩

蒼朮

石膏 各二兩

甘草 炙半兩

川芎

黃芩 各二錢半

右為粗末每二錢入薑薄荷葉煎

升麻黃芩湯治小兒中風身熱頭項強自汗表不和也

升麻

葛根

黃芩

芍藥 各五錢半

甘草 二錢半

右咬咀母二錢水煎

按此二方陽明經藥也

大羌活湯治風熱

方見卷明

錢氏塌氣丸治脾風腹脹

胡椒 一兩

蝎尾

半兩

右糊丸粟米大每五七丸至一二十九

按此宣風補脾藥也

羌活膏

見後驚風劑

全嬰方加減惺惺散治小兒傷風風熱及傷寒鼻塞發熱驚悸
頭痛咳嗽時行風熱

蒼朮

川芎

細辛

羌活

防風

白芷

天花粉

甘草

赤芍

桔梗

麻黃

荆芥

當歸

薄荷

右等分水煎一錢入姜

按此太陽例藥也

已上諸方宜隨諸經輕重選用

殭蚕散治小兒中風不語失音關骨不通精神昏憤

殭蚕 半兩 羌活 一兩 麝 半錢

右為末三歲半錢姜汁少許調和湯浸服又以菖蒲末於舌

根上頻用之

桂香散治小兒急中風失音不語

桂心 一兩 石菖蒲 一分

右為末三歲一錢水煎服若大病後不語者用猪膽汁調下

未語再服

按此二方出太陽例可見中風傷風例不同故錄之

治寒之劑

仲景桂枝湯治感冒風寒身熱惡寒自汗

麻黃湯治胃風寒身熱鼻塞寒慄無汗

桂枝麻黃各半湯

小青龍湯治感風寒脉緩發熱腹痛或利

理中湯治感寒腹痛

方並見寒門

謹按世俗治傷寒多不本仲景初法矧小兒乎惟近代鄭友

端集全嬰方於傷寒多採其例言桂枝湯自西北二方居人

四時行之無不驗江淮間惟冬及春可行之自春末及夏以前桂枝證加黃芩一分謂之陽旦湯夏至以後有桂枝可加知母石膏各半兩或加升麻一分若病人素虛寒者正用古方不在加減也可謂得其旨趣故茲寒例與夫變證法並見本論今不詳錄但以變法一二附于左

葛根升麻湯

方見升麻湯

右咬咀水煎

按此方陽明藥也世俗用治小兒傷風及發癍瘡疑似之間者皆用之故收入然亦須審諦而行之可也故王海藏云活人言傷寒頭痛如破者連鬚葱白湯次又不已者葛根升麻

湯惡太陽流入陽明用斷其路故以此湯主之地黃湯內如無犀角以升麻代之是知陽明藥非太陽藥也人或初病太陽證便與此湯是遺太陽不惟遺經反引太陽邪氣入陽明不能解也其變可勝言哉故不可不慎之况小兒乎

麻黃黃芩湯治小兒傷寒頭痛身壯熱無汗鼻塞目澁小便清者知不在裏可汗之

麻黃

三錢

赤芍

黃芩

各錢半

甘草

桂枝

各錢

右為粗末水煎

按此太陽例藥也

惺惺散治傷寒時氣風熱痰壅欬氣不和

桔梗

細辛

人參

甘草炙

白茯苓

白朮

瓜蒌根 各兩

右為末每二錢水煎入薄荷五葉一方加防風川芎各一分
按此少陰例藥也

東垣麻黃升麻湯治小兒寒鬱而喘喉鳴臍中鳴腹滿鼻流清涕脉沉急而數

麻黃

草豆蔻 各五分 益智仁 一分 厚朴

吳茱萸 各分

甘草 一分

當歸尾

升麻

麩末

蘇木 各半分

紫胡

黃芩 各一分

紅花

少許

蝎 二箇

右以咀作二服水煎稍熱服

按此太陽例藥也然有所兼之證故用是變又法隨證加減之也

治熱之劑

錢氏瀉青丸治肝熱搐搦脉洪實

當歸

龍膽

山梔

川芎

大黃

羌活

防風

右等分蜜丸雞頭大每服一九

按此瀉乙木之陰火藥也治風熱表裏之劑

瀉心湯治心經實熱

按此瀉丁火藥也

瀉黃散治脾熱目黃口不能吮乳

按已上治已土濕熱之藥風勝濕甘寒瀉火也與已上並治實熱之劑

瀉白散治肺熱目黃口不能吮乳喘嗽

按此瀉肺邪之有餘補辛金之不足也

導赤散治內熱小便赤黃心躁睡語

按此治丙火藥也

安神丸治邪熱驚悸面黃頰赤

按此治心肺胃熱氣分藥也清鎮之劑

已上方並見執門

地黃丸治疳熱腎虛瀉血失音身瘦目翳生疥解顛不合長大不行可服取効

方並見執門

按此治癸水不足藥也

地骨皮散治小兒肌熱

白虎湯治小兒發熱而渴

方並見執門

生犀散治小兒肌熱

生犀

地骨皮

赤芍

枳胡

葛根

甘草

右咬咀水煎

按此少陽陽明藥也

鱉甲飲治小兒骨熱潮熱盜汗

驚甲炙

地骨皮

秦艽

柴胡

枳殼炒

知母

當歸

等分

右咬咀三歲一錢水煎加桃柳枝各三寸烏梅一箇

按此少陽厥陰藥也氣血之劑

鎮心丸治內熱生驚痰盛

甜硝 一兩

人參 一兩

甘草 炙

寒水石 燒一兩

山藥

茯苓 各兩

朱砂 一兩

膠麝

各錢

右為末蜜丸雞頭要紅入臙脂量兒大小與服

按此手太陰少陰足陽明太陽藥也

化毒丹治心胃內熱驚悸

生熟地黃 各五兩

天門冬

麥門冬

去心焙各三兩

玄參 二兩

甘草 炙

甜硝 各兩

青黛

一兩半

右為末入硝煉蜜丸如雞頭大每半丸或一丸水下

按此手足太陰少陰藥也

甘露飲子治心胃熱咽痛口舌生瘡上攻牙齦腫

方見執門

大黃丸

方見傷風門

絳雪丹治小兒諸熱陽盛發狂躁不安目赤煩渴

芒硝 一兩

朱砂 一兩

右為末浸桑餅為丸雞頭大二歲兒一丸沙糖水化下無時

按已上三方陽明例藥也

易老羌活黃芩蒼朮甘草湯治口壯熱體重而瀉

羌活 黃芩 蒼朮 甘草

右等分以咀水煎服

按此太陽陽明藥也

陳氏人參清膈散治小兒潮熱煩熱自汗骨蒸

人參 柴胡 當歸 芍藥

知母 桑白皮 白朮 黃芪

紫苑 地骨皮 茯苓 甘草

桔梗 各兩 黃芩 半兩 石膏 滑石 各兩半

右為粗末每三錢水煎入姜

按此手足太陰足少陽厥陰陽明藥也虛熱煩熱氣血皆可

用

謹按已上諸方姑隨輕重例因舉其藥至於食熱痰熱驚熱

等候宜于後方內選用

治濕熱攻下之劑

錢氏牛黃奪命散治小兒肺脹喘滿胸高氣急兩脇扇動陷下

鼻張悶亂嗽渴聲啞痰涎潮塞俗謂之馬脾風者

黑白牽牛 各兩半 半炒 大黃 檳榔 各兩

右為末三歲兒每服二錢冷溫水調下涎多加膩粉少許無

時

通膈丸

大黃 牽牛 木通 等分

右為細末水丸粟米大每三二十九量大小虛實與服
按已上二方陽明例藥也

治驚之劑 宜與風癇門兼者

錢氏涼驚丸

草龍膽

防風

青黛

各三錢

鈎藤

二錢

牛黃

麝 各字

黃連

五分

龍腦

一字

右糊丸粟米大每三五九金銀湯下

按此治風熱之劑也

局方天麻防風丸治小兒驚風身熱喘麗多睡驚悸手足搐搦

精神昏憤

天麻

防風

人參 各兩

蝎尾

半兩炒

甘草

朱砂

雄黃

各半

牛黃

麝 各錢

僵蚕

炒半兩

右為末煉蜜丸櫻桃大朱砂為衣每一丸薄荷湯化下

按此治風癇通關竅藥也

三因方治陽癇驚風熱證面赤身熱發搐直視牙緊

朱砂 一錢

膩粉

麝 半錢

蘆會

白附子

甘草 各二錢

胡黃連 二錢

蝎梢

七箇

僵蚕 七箇炒

金箔 七片

赤脚蜈蚣

一條炙

右為末二歲已上服半錢金箔薄荷湯下

按此治風熱痰之劑透關通經絡藥也

全嬰方睡紅散治小兒急慢驚風手足搐搦目眩神昏

生黃

鵬砂

腦子

真珠

水銀砂子各半錢

青黛

蝎尾炒

京墨燒

南星

半夏同字覆夏蛇含石碎各錢

金銀箔各片麝香一字

烏蛇尾并項下等並酒浸宿取出去皮骨

右為末三歲一字薄荷湯下

按此治風熱痰藥通關透肌骨之劑也非風邪下陷者不可

輕用

東垣朱砂安神丸

方見熟明

按此寧心清神涼血之劑也

謝氏奪命丹治急驚不省人事眼定不動牙關不開唇白并黑

者

南星

半夏各四錢為末並以生薑汁和作餅子晒乾

真珠新白者巴豆去油朱砂四錢

金箔

銀箔各十片輕粉

麝各半錢

右九味各為末和勻飛羅麪打糊為丸如黍米大每一歲兒

一九燈心湯下

比金丸治小兒風熱丹毒急慢啞驚

前奪命丹中減去金銀箔加真鬱金末三錢丸如上法

利驚丸

前比金丸中去鬱金加腦子半錢曰頸蚯蚓一條用刀截

斷首尾兩頭齊跳者用之去土秤二錢丸服如上法

按此三方導痰藥也白餅子加減法

按已上諸方治陽癰之藥不問急慢但係陽證諸熱者宜隨

表裏輕重擇用之

錢氏溫驚丸

天南星 為末入鴈月牛膽中百日陰乾為末四兩

朱砂 一錢 天竺黃 二兩 坯子臘脂 片腦 各一錢

右用牛膽汁和丸雞頭大每一丸小者半丸沙糖漿水化下

葱活膏治頭目虛肝氣熱盛生風或吐瀉後成慢驚者

羌活 川芎 人參 白附子

赤茯苓 各二兩 天麻 二兩 僵蚕 炒 乾蝎 炒

白花蛇 酒浸焙各五分 川附子 炮 防風

麻黃 各三錢 肉豆蔻 母丁香 藿香葉

沉香 木香 各三錢 輕粉 一字 真珠末

牛黃 各錢半 龍腦 半字 麝香 一錢 雄黃

辰砂 各一分已上味各另研

右為細末熟蜜劑旋丸大豆大每服一二丸食前薄荷湯或

麥門冬湯下

二因方治陰癰慢驚

黑附子 剉去南星 半夏 各錢 白附子 一錢半

右研細井花水浸七日每日換水浸控乾入朱砂二錢麝香一

錢拌勻每服一字薄荷湯下量大小與服或丸如粟米大每

二十九薄荷湯下此白丸子方也因分兩不同故兩存之

經驗方保生錠子治急慢驚風

蛇含石

四兩火煨醋淬十數次研為極細末

南星

二兩先炮細切再炒

白附子

去皮兩錢三錢另研極細

麝香

一錢

右為細末用糯米粉煮作餅搗和煎藥令勻作錠子臨用薄荷湯濃磨汁服一二口

全嬰方麝香餅治小兒急慢驚風進退不定在再經日乍靜乍

動嘔吐痰涎潮搖甚者宜此

麝香

去毒

蜈蚣

二條酒浸酥炙

南星

炮

白花蛇

酒浸下至骨度焙已上各半兩

乳香

鐵粉

朱砂

牛黃

各錢

右為末酒煮糊丸如雞頭大粘作餅子二歲兒一餅用薄荷

湯下

按此厥陰例藥也非風在關竅肯繁者不可用義見中風門通關透骨例

全蝎散治小兒急慢驚風潮作不定心肺中風

蛇頭

一箇酒浸

蜈蚣

一條酥炙

錢

草烏

一箇去皮炙

麻黃

去毒一錢

朱砂

一錢

腦麝

各字

右為末一歲一字薄荷湯下

奪命散治小兒急慢驚風諸藥無効者一服見效

白附子

黑附子

南星

天麻

防風

半夏

炮

麻黃

去節

蝎

新薄荷葉裝姜汁蘸炙三兩各一錢

右入麝香半錢為末三歲半錢薄荷姜汁更入酒此小熱湯
共調下

按此二方太陽例藥也

鈎藤飲子治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

鈎藤 三分 蟬殼 防風 人參

赤黃 去節 殭蚕 炒 天麻 蝎尾 炒各半兩

甘草 炙 川芎 各分 麝 一錢另研

石同為細末每服二錢水煎量多少與之寒多者加附子半
錢

按此升陽越脾氣藥也

寧心膏治小兒精神不之恍惚不寧恐畏多哭驚魘

人參 白朮 茯苓 茯神

山藥 羌活 甘草 炙各錢 朱砂 二錢

腦麝 各一字

右為末煉蜜丸如雞頭大二歲一九薄荷湯化下

按此養氣疎風清神之藥也

寶鑑天麻散治小兒急慢驚風其効如神

半夏 七錢 天麻 二錢半 甘草 炙 白茯苓

白朮 各錢

右水一盞入磁器內煮水乾將生姜三錢同煮候乾為末每
服一錢半姜棗湯調下

按此溫脾養胃之劑非止於疎風勝痰藥也大抵小兒血氣

未充體虛者多或因病後致者宜與此調理而不為峻劑下
陷轉成壞證者此三方則庶幾矣

謹按已二諸方治陰癇不問急慢驚但係陰證宜隨表裏輕
重選用則半陰半陽慢脾之法例在其中矣

經驗方驚風開關散牙關緊急者用之啗鼻并擦牙

蜈蚣 一條炙 直僵蚕 炒 南星 各錢 麝香 一字

猪牙皂角 一皂者燒存性

右各為末研極細少許搗鼻如欲擦牙者用生姜汁蘸藥擦
牙上

全嬰方探生散治小兒急慢驚風諸藥無效者吹鼻定之死生

沒藥 雄黃 各錢 乳香 半錢 麝香 一字

石為末少許吹鼻如眼淚鼻涕俱出者可治

按此二方捷速藥也

吐風散治小兒急中風口噤不開不省人事

全蝎 一箇炒 瓜蒂 十箇炒 赤小豆 三錢

右為末一歲一字温米飲調下未吐再服

碧雲散治小兒急風卒中涎潮氣粗不省人事

石碌 四錢 輕粉 一錢

右為末每一字薄荷湯下酒少許同調下良久先吐後利

一方以銅青為末醋糊丸如雞頭大每一丸薄荷湯磨下須

更吐涎似膠以手拽出神効

天霜散治小兒急中卒風并急驚口噤搦搐涎盛昏塞不語

辰砂

粉霜

輕粉

南星炮各半兩

蝎尾

白附子

藿香葉各一錢

右為末一歲半字薄荷湯調下茶亦得末吐再服

按已上三方宜劑也宜選用然此方吐中兼汗下也

錢氏利驚丸治小兒急驚風涎盛發熱潮搐

青黛

輕粉

各一錢

牽牛

二兩

天竺黃

二錢

右為末白糊丸如小豆大二十九薄荷湯下

按此下濕熱痰之劑也

金匱驅風膏治小兒肝風筋脉拘急面紅目青眼上驚搐及胎

風

辰砂

蝎尾

當歸

龍膽草

川芎

山梔

大黃

羌活

防風

甘草

各一錢

右為末入麝香一字煉沙糖丸如雞頭大二歲一丸薄荷竹

葉蜜湯化下

按此下風熱之劑也

珍珠丸治小兒急慢驚風發搐涎潮壯熱及痰嗽壅塞

白附子

滑石

巴豆

十五箇

輕粉

南星各錢

右為末糊丸如小豆大二歲一二丸葱白湯下

按此下食痰道滯之劑也白餅子加減法

通關散治小兒驚風已退聲啞不能言

右以南星大者炮為末三歲一錢猪膽汁調下嚙入喉中便能言

灸驚風法 附臍風撮口法

寶鑑云小兒急驚風灸前頂一穴在百會前一寸若不愈須灸兩眉頭及人中一穴各三壯如小麥大

小兒慢驚風灸尺澤穴各七壯在肘中橫紋上動脈中炷如小麥大

初生小兒臍風撮口諸藥不効者取然谷穴在內踝前踝骨下陷中可灸三壯針入三分不宜見血立効

小兒癩癩瘰癧脊強互相引灸長強穴二十壯在脊軀端跌地取之乃得

小兒癩癩驚風目眩灸神庭一穴七壯在鼻直上入髮際五分

小兒風癩者先屈手指如數物乃發也灸鼻柱入髮際宛宛中灸三壯如小麥大

小兒驚癩先啼怖啼叫乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青脉炷如小麥大

治痰涎之劑

青州白丸子

南星 三兩 半夏 七兩 白附子 二兩 川烏 半兩 各生用

右為末絹袋盛并水搗盡為度別換水浸三五日晒乾糯米粉丸

按此治寒痰風痰藥也

抱龍丸治風痰壅盛驚搐昏睡

雄黃 辰砂 天竺黃各四錢麝香一錢

牛膽南星八錢入臘月牛膽中陰乾百日內用如無害者水浸三日焙用

右為末煮甘草糊丸如皂子大三歲一九量大小與服薄荷

湯下

按此治風痰熱痰藥也

宣風散

檳榔 二箇 陳皮 甘草各半兩 牽牛 四兩半生薑

右為末每一錢量大小與服湯調下

按此下濕痰之劑也

扁銀丸治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹氣喘

巴豆 半兩去油 好墨 八錢燒醋淬 水銀 半兩

黑鉛 一錢半與水銀結砂子 麝香 半錢別研

右將巴豆末并墨再研和勻入砂子等陳米粥和丸如菉豆

大捻作餅子一歲一九薄荷湯下

按此下食痰癖積藥也

謹按小兒多痰熱宜用抱龍丸與化毒丹等兼服故慈例不

多錄

治內傷及癖積之劑

錢氏白餅子治腹中有癖但飲乳軟而吐痰涎

方見痰飲門

按此下痰積食積藥也義見痰飲門

消積丸

丁香 九箇 砂仁 一箇 巴豆 二箇 香油 烏梅肉 二箇

右為末麩糊丸黍米大二歲已上三五丸已下三二丸溫水下

消積丸消乳癖及下交妳又治痰熱膈實取積

礪砂末 巴豆 去滓 輕粉 各錢 水銀砂子 兩毫子六

黃明膠末 五錢

右同研勻入麩糊丸如麻子大倒流水下一歲兒一丸食後

按此二方有寒熱輕重之分宜選用後法同

寶鑑三稜煎丸治小兒飲食過多痞悶疼痛宿食不化久而成

癖

廣木 黑角者 荆三稜 下濕紙裹煨為末各兩

大黃 去皮八兩

右將大黃為末石器內以好醋浸令透慢火熬成膏和二藥為丸麻子大或绿豆大每一二十丸食後溫水下

酸甲猪肚丸治癖發熱

鱉甲 九肋者七錢醋煮黃色 青蒿 黃連 各七錢

青皮 枳實炒 木香 各五兩 柴胡 二兩

右細末猪肚一箇去脂貯藥蒸熟同和梧子大每一三十丸食後人參湯下

廣木化癖丸治乳食不消心腹飽脹壯熱喘麓嘔吐痰逆食積

乳癖

代赭石醋牛當歸炒

朱砂研

枳殼炒

廣木炮

荆三稜炮各半

木香一兩

麝香

巴豆去油各二分

右末研勻糊丸如麻子大每一歲兒二丸米飲下

灸癖積法

寶鑑云治小兒癖氣久不瘥中脘一穴章門二穴在大橫外直

臍季脇喘側卧屈上足舉臂取之各灸七壯臍後脊中灸二

七壯

治小兒脰下滿瀉利體重四肢不收瘥癖積聚腹痛不嗜食寒

熱取脾俞二穴在第一顛下兩旁相去各一寸五分可灸七

壯又治腹脹黃疸可灸三壯

治瀉痢之劑

錢氏白朮散

藿香葉

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參各錢

乾薑二錢

右為末每一錢至二錢水煎服

異功散

四君子湯加陳皮一方只用參朮甘草三味名溫中湯

按此二方補脾湯加減法也

益黃散

陳皮一兩

青皮

呵子肉

甘草炙

丁香 二錢

石為細末每二錢水煎服

沒石子丸

木香

黃連

各二分

沒石子一箇

巨靈仁二箇

二箇

訶子肉

二箇

右為末飯丸麻子大米飲下十五丸量大小與之

按此二方兼止瀉藥也

五苓散治瀉而澀

方見瀉

羌活膏治小兒瀉瀉發搐

方見前

溫白丸治小兒脾氣虛困洩瀉瘦弱冷疳洞利或驚

天麻

半兩

殭蚕炒

白附子

乾蝎

南星

浸各錢

右為末浸寒食麩為丸如棗豆大每五七丸至三三十丸姜湯下仍於寒食麩內養七日取出

更生散治小兒吐瀉

大南星

八九錢已上者

右用地坑子一箇深三寸燒赤入好酒半盞下南星却用炭火三兩條蓋候南星微裂取出剉再炒放冷為細末每半錢或一字濃煎生姜防風湯調下
按此二方升肺脾之氣藥也

金液丹治吐利日久脾胃虛損之症厥逆神昏睡多露睛口鼻
氣冷欲成慢驚或身冷脉微自汗小便不禁

船上硫黃十兩去砂不為末沙合于盛八分滿水和赤石
脂封縫塩泥固濟晒乾再入水罐內泥固濟火煨過候冷
右於乳鉢內研為細末水浸蒸餅丸桐子大或如菉豆大每
五十丸至百丸米飲下

按此厥陰例藥也

玉露散治傷熱吐瀉黃色

寒水石

石膏 聖白者各半兩

生甘草 分

右同為細末每服半錢或一錢温湯調下
按此陽明例藥也

豆蔻香連丸治洩瀉腹痛腸鳴

黃連

三分炒

肉豆蔻

木香 各二分

右為細末粟米飯丸米粒大每服十九至三十九日夜各
四五服米飲下

二聖丸治小兒臟腑或瀉或好久不愈

黃連

黃柏

去皮各兩

右為末入猪膽內煮熟丸如菉豆大每二二十九米飲下

按此解毒湯變法也與前方不同宜選用

羌活黃芩蒼朮甘草湯治壯熱體重而瀉

方見前

茯苓半夏湯治風瀉而嘔

方見痰飲明

東垣升陽益胃湯

方見補虛門

湯氏助胃膏治小兒氣虛乳食不進腹痛洩瀉腸鳴

陳皮

山藥

各四兩

甘草

砂仁

白茯苓

藿香

桂

各三兩

肉果

人參

木香

丁香

白豆蔻

各兩

右為末煨薑丸和成膏每服雞頭大量大小與之

按此出太陽例冬月時令中藥

局方水浸丹治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐利煩渴

巴豆大者三五箇去皮研細去油盡

黃丹

一兩炒

右研勻用黃蠟銕汁為丸如梧子大每一丸以水浸少頃別

以新水吞之量大小與服

按此是陽明藥也

小香連丸治熱痢腹痛

木香

訶子各分

黃連

半兩

右為末飯和丸黍豆大米飲下十九至三十九頻服之

胃風湯

方見洩瀉明

全嬰方訶散治小兒純下血痢腹痛

訶子

半兩燒去核

梔子仁

一錢半

右為末三歲錢米湯調下食前

按此治熱之劑也

桃花丸治小兒赤白痢腹痛

赤石脂 川乾姜 炮等分

右為末糊丸如小豆大二歲二十九丸米湯下

按此治寒之劑也

澁腸丸治小兒下痢赤白後重頻併

龍骨 海螵蛸 訶子 炮去核等分

右為末糊丸如小豆大二十九丸米湯下

按此止澁之劑也

東垣厚腸丸治小兒乳食不能消化或生腹脹瘦弱痢瀉無常
色

橘皮 三分 大麥麩 半錢 半夏 三分 枳實 半錢

蒼朮 三分 青皮 二分 人參 三分 厚朴 二分

麩末 半錢

右為細末煮糊為丸如麻子大每二十丸溫水下食前

按此足陽明太陰藥也

按已上諸方皆備其例宜兼者瀉痢二門而分治之

治咳嗽之劑

麻黃湯治傷風咳嗽喘急無汗

方見寒明

按此治風寒之劑也

敗毒散治時氣咳嗽

方見

按此治風溫之劑也

紫苑散治小兒咳嗽上氣喉中水雞之聲

射干

紫苑

款冬花 各二錢 麻黃 四錢

細辛 二錢

半夏 一錢

五味子 六錢

右吹咀三歲兒一錢水煎入姜棗少許

百部飲治小兒喘嗽日夜不得睡目鮮如突出之狀

百部

生薑 各八錢

細辛

甘草 各三錢

貝母

白木

五味子 各錢 桂心 一錢

麻黃 二錢

右吹咀三歲兒一錢水煎

按此二方太陽例藥宜分輕重選用

紫蘇子散治小兒欬逆上氣因乳哺過度內挾風冷傷肺氣或

啼未定與乳乳與氣相逆不得下

蘇子

訶子

羅白子

杏仁 炒

木香

人參 各錢

青皮

甘草 各二錢

右為末每一錢以水煎入姜量大小與服

按此下氣道止咳藥也

葶藶丸治乳食積胸肺咳嗽面赤痰喘

甜葶藶

隔紙 黑牽牛 炒

漢防己

杏仁 炒 各一錢

右為末入杏仁泥取黍陳棗肉和再搗為丸如麻子大每五

丸至七丸生薑湯下

按此下濕之劑也

全真方雄朱丸治小兒咳嗽有痰潮熱

雄黃一分 巴豆七粒 半夏半兩

右為末糊丸小豆大一歲二丸姜湯下

按此瀉風痰濕痰乳癖藥也

潤肺散治小兒延嗽不已氣急煩渴

麻黃二錢 甘草一錢 人參 知母各二錢

陳皮一分 桔梗 阿膠 百部各半錢

右為末三歲一錢水煎

按此手太陰足太陽藥也

人參丸治小兒延嗽有痰乳癖惡心

人參 半夏 白朮 川姜

南星炮

右等分為末姜糊丸小豆大三十九丸姜湯下

按此手足太陰藥也

參香膏治小兒久新咳嗽氣急惡心有痰咯血

人參 阿膠 杏仁炒 款冬花

五味子 甘草 訶子 貝母

右等分為末煉蜜丸雞頭大三歲兒一丸白湯下

補肺散治小兒久患欬嗽氣急有痰

阿膠 糯米各兩 馬兜零 甘草各半兩

杏仁七十粒 大力子一分

右以咀三歲兒一錢水煎服

按此二方手太陰之的藥也

瀉肺散治小兒肺氣熱盛而欬

方見熱門瀉白散

治嘔吐之劑

二苓半夏湯

方見前瀉劑

迴生散治小兒吐瀉

方見前

異攻散

方見前瀉劑

藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔噦

麥門冬

半夏

甘草炙

石膏

各生兩

藿香一分

石為末每半錢至一錢水煎入姜

全嬰方消食丸治小兒生冷傷脾腹痛惡心

即局方亦七香丸

拔萃定吐紫金核

半夏不製

人參

白朮

木香

丁香

藿香

各三錢半

右為末稀糊為丸如李核大後用沉香硃砂各一錢研勻為衣陰乾每一丸棗湯磨下

謝氏燒針丸專主吐逆

府丹不拘多少

右件研極細去皮小棗肉和劑為雞頭大每用針簽於燈上燒灰為末乳汁下一丸

按此亦劫劑也已上方唯藿香散出陽明例藥餘溫劑宜隨輕重選擇出理中例

治疳之劑

錢氏木香丸治小兒疳瘦腹大

木香

青黛

檳榔

三稜 各一分

麝香白 錢半

續隨子 一兩

蝦蟇

三箇燒存性

右為末蜜丸棗豆大每三五丸至一二十九薄荷湯下

按此手足太陰藥也

六味地黃丸治小兒疳瘦不行解顛骨熱

方見補虛門

全嬰方盧薈丸治小兒疳氣腹急骨熱

盧薈

木香

檳榔

各分

黃連

一兩

蕪荑

青皮

陳皮

各半兩

巴豆

三七枚同口吹炒黃去

蝦蟇

酒浸炙黃去骨一兩

右為末猪膽丸小豆大二歲三十九米湯下

按此手少陰手足太陰藥也

蒸雞丸治小兒疳勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱腹急面黃食不生肌

肉

黃連

二兩

柴胡

一兩

蕪荑

鶴虱

各半兩

秦艽

知母

紫苓

史君子

去殼炒各兩

右為末黃雄雞一隻重一斤籠之專以天麻子飼之五日後去毛及腸肚淨入前末子以線縫之取小醜子先以黑豆鋪醜底三寸安雞四旁及上黑豆蓋之早蒸至晚取肉研和硬入酒糊丸如小豆大二歲二十九加減與之米飲下忌豬肉按此手少陰大陰足少陽藥也

肥兒丸截疳殺虫治腹脹消食

史君子肉

蘿白子

各兩小紅棗

肉兩糖菓子末

飛羅麩

各兩

右取好黃土和作一爐墩子內底下蘿白片鋪一層次將史

君子肉鋪在當中次又鋪羅白一層上安棗肉蓋於上以泥封固其外以炭火煨至內三物熟爛了取出以飛羅菓子末和勻充如麻子大量兒大小與服米飲下按此足陽明大陰藥也

五疳消食丸消疳殺虫退熱磨積進食

史君子

肉少麥蘖

炒陳皮

麥麩

蕪荑

草龍膽

炒黃連

炒糖菓子等分

右為細末陳米飯為丸如黍米大每十九米飲下

按此手少陰大陰藥也然疳證自有虛實積執等致不同已上諸方未能以盡其變學者自宜推格治之

治瘡疹之劑

升麻湯治小兒瘡疹未出發熱

升麻

葛根

芍藥

甘草

右咬咀水煎

按此之太陽陽明藥也

錢氏四聖散治瘡疹出不快

紫草

木通

甘草炙

枳殼炒

右等分為粗末每一錢水煎服陳氏加黃芪

按此之陽明手太陰藥也

調肝散治瘡疹大盛宜服此令瘡不入眼

生犀

一錢半

龍膽草

一錢

半兩

大黃

二錢

桑白皮

半兩

鈎藤子

各錢

石膏

半兩

麻黃

瓜蒌

甘草

右為粗末每一錢水煎服食後

按此手太陰足陽明太陽藥也內外實者非此不可

化毒湯治豆瘡已出出不快

紫草茸

升麻

甘草

各等分

右咬咀入粳米五十粒水煎

按此之陽明藥也

鼠粘子湯治豆瘡欲出未能得透皮膚熱眼赤心煩咽嗑不利

鼠粘子

炒四錢

荊芥穗

二錢

甘草

一錢

防風

半錢

右為細末沸湯點服去吐風名消毒散

按此太陽少陽藥首論溫平者此也

活血散治豆瘡出不快

白芍藥 炒一錢

右為末酒調服腹痛溫熱水調下

按此正的大陰藥也海藏云張和之治四肢出不快加防風

大効

犀角地黃湯治瘡疹出太盛便血或鼻衄

犀角 一兩

生地黃 二兩 赤芍 三分

牡丹皮 一兩

右以咀三歲兒一二錢水煎服

按此足太陰少陰手太陰藥也

葛根麥門冬散治小兒熱毒斑瘡出多心神煩悶

葛根

麥門冬 各三錢 人參 二錢

石膏 半兩

升麻

甘草

茯苓 各三錢

赤芍 一錢

石以咀每三錢水煎服

按此足陽明手太陰藥也

連翹散治瘡痘發熱

連翹

防風

梔子

甘草

右為末水煎

按此治熱在外而不欲少陽藥也

如聖飲子治瘡疹毒攻咽噤腫痛

桔梗

甘草

鼠粘子 炒黃

麥門冬

半兩

右為末竹葉同煎二三錢

按此手太陰少陰藥也

解毒防風湯

防風

地骨皮

黃芪

芍藥

荊芥

枳殼

鼠粘子

各半兩

右為粗末每服四五錢水煎

按此手足太陰藥也

真牙湯治癰瘡黑陷者

人牙二枚燒存性入麝香少許

右為末用紫草升麻湯調下

御藥院方無價散治癰瘡不出黑陷欲死者

人猫猪犬糞臘月內燒為灰

右為末每一字蜜湯調服量大小與之

按此二方劫劑也

當歸丸治瘡疹能食而大便秘

當歸

半兩

甘草

一錢

黃連

大黃

各二錢半

右將歸熬膏子入下三味末為丸漸加服至利為度

按此足陽明厥陰藥也

粟變百祥丸

紅牙大戟

去骨一兩

青州棗

去核三十箇

右用水一碗同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和

作劑後少至多服至利為度

按此足少陰藥也

陳氏異攻散治小兒痘瘡欲斃之際頭溫足指冷或腹脹瀉渴

氣復或身不壯熱悶亂不寧卧則噁氣煩渴咬牙

木香 三錢半 官桂 二錢 當歸 三錢半 人參 二錢半

茯苓 二錢 陳皮 厚朴 二錢半 白朮 二錢

半夏 一錢半 丁香 肉豆蔻 二錢半 附子 一錢半

右為粗末每二三錢水煎入姜棗

按此是太陽少陰厥陰手足太陰藥也

謹按已上瘡疾諸方有散散補脾涼血瀉火清神攻下溫中

補劫之法不同學者自宜取擇

局方涼膈散治瘡痘已出發熱作渴脉實悶亂便實者

方見火門

謹按瘡瘍已發有定法溫涼不同形氣虛盛之異已上三方

宜對脉證選用有起死迴生之効也是陽明藥

地骨皮鼠粘子湯 本方加地骨皮

桔梗甘草鼠粘子湯

桔梗甘草梔子湯

防風芍藥甘草湯 並三味治證見前

升麻加紫草湯

升麻湯加紫草

荆芥甘草防風湯

三味治證見前

紫草甘草枳殼湯

四聖散減木通

連翹防風湯

前連翹散減梔子

並治證見前論

玉機微義卷之五十終

玉機微義序

醫書自內經而下歷數千載善斯道而作者非一人
其間有言診者有論證者有集方者莫不皆裨於世
用然奧妙之旨奚所發揮雖世異病殊以方取驗若
出一人之手迥不知世運之遠作者之衆然人同此
心心同此理漢張仲景本經旨傷寒之法言診論證
以例處方後之學者得有所據晉唐以來其道益廣

用其法者不一或止言雜病診證或求奇示怪秘而不傳好事者慕其風而繼作或止據於方雖有一源一意之可觀又非百代可行之活法也始純從學於江左馮先生庭翰間嘗請其義授以會稽徐先生所著書一帙觀其法求其意蓋出於內經非前所謂也且古今作者非一人其法各得一意而後人執之該治不知通變之法與經旨多相違戾不無得失是以

先生究探古今作者源意撫金劉守真元李明之朱彥脩諸氏論集本乎經旨而折衷其要發明中風痿痰泄瘡諸門診證方例非一源一意而有通變乎百證千方者斯為古今可行之活法也歟豈止集方而已先生諱彥純字用誠蚤歲嘗客吳中以春秋教授鄉之俊彥今沒十有二年始遇其從弟用中獲詢先生學行知深於醫者也又嘗見其本草發揮竊意前

書必有全帙惜今不可見矣嗚呼歲月云邁九原不
作幸而遺墨昭然生意如在以先生所著取效熟火
暑燥濕寒等門診證方例妄意續于諸門之末雖心
同理而不免獲狂僭之過因撫諸內經至數至名之
旨乃自其書曰玉機微義未知其果是否後之明哲
有所正焉於是乎書告

洪武丙子三月朔日吳陵劉純序

玉機微義序

余向讀國語醫和有言曰上醫醫國其
次醫人唐柳子非之余竊是之余謂人
受天地之中以生元氣流行各正性命
理之常也不幸天地之氣乖而人之氣
亦戾由是疾厲作民夭閔而國本動搖
惟醫師之良者探造化之機究陰陽之

理投藥起疾以正人之氣人之氣既正則天地之氣亦正由是民生遂天命全而國本固矣是非醫國而何今觀吳陵劉宗厚氏所著玉機微義余益自信余之是和言者果是而柳子非之者果非也宗厚之學本諸濂洛儒先旁究岐黃盧扁之術故其發于論議者始於推氣

運之原以參五行相生相勝之妙要之於性命之稟賦貫之於物理之變通而會之于人事動靜不惻之微馳騁經史出入古今引譬明驗誠非庸常之流所可及也其學則私淑丹溪宋彥脩其法則有得夫漢長沙及近代劉河間李東垣之秘旨顧其為書雖以兩門分類彙而

非歌訣集方億度乎艾砭參苓者之可
同日語也嗚呼醫術之奧有如此者俾
之經國治民特舉而措之耳孰謂和言
之非乎宗厚世為吳陵望族以詩禮相
傳其先世在勝國時居省憲掌樞要以
名宦顯著者殆未易一二數宗厚窮而
在下不能躬耕自食其力故托迹于醫
以自養自晦也雖然以宗厚之材之術
抑豈久於栖栖者耶行將膺異等之薦
展上醫手以裨

聖主仁民之治此余之所望於宗厚也宗
厚其以此自期乎其以此自勵乎余與
宗厚之嚴翁橘泉先生有世契今觀宗
厚所著書殆不容於默默也故僭序其

實于卷首俾覽其書者知宗厚之學有
本而勿謂世醫而易之也

洪武丙子九月初吉吳興莫士安序

