



花溪老人虞

搏天氏輯

錢塘徐開先振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳葵則子奇訂

中風真中類中論

中風者體氣先虛必有風邪真中然後見有暴仆暴
暗口眼歪斜手足不舉言語蹇澁甚者人事不省等
証若無風邪必無此等証候又云無真中類中之分
斯言也尤見理未真之過也按中風者氣體先虛而

卷一 真中 類中

元集

後風邪中之者理也所謂邪之所湊其氣必虛是也
予嘗見有人心火暴盛痰涎壅塞無毫髮風邪雜於
其中而前証悉見隨用清熱養血化痰順氣之劑而
愈者即東垣所謂本氣自病河間所謂將息失宜心
火暴盛丹溪所謂濕熱相生此三者類乎中風而實
非中風也一用風藥禍不旋踵安得不指出此証使
後學知之此類中之說所由起也但此証當另列一
條而不雜於中風之條如昔人謂四証似傷寒而不

列於傷寒之列則明白而易知矣若老人謂無類中皆真中恐使後人臨証不明反增人病辨之奚容已乎其言標本緩急之論輕重攻補之宜則至善而不可沒大有功於後學也

中風証一

天地間惟風無所不入人受之者輕則爲感重則爲傷又重則爲中凡中風之証卒然暈倒昏不知人或痰涎壅盛咽喉作聲或口眼歪邪手足癱瘓或半身

卷一 中風

二

元集

不遂舌強不語風邪既盛氣必上壅痰隨氣上停留壅塞昏亂卒倒皆痰爲之也五臟雖皆有風而犯肝經爲多蓋肝主筋屬木風易入之肝受風則筋緩不榮所以有歪邪不遂癱瘓舌強等症治之之法初得之卽當開痰理氣經云善治風者順氣理風氣順則痰消除理其風及其久也卽當養血活血若不先順氣遠用烏附又不活血徒用防風羌活天麻輩吾未見其能治也中風有真中類中真中有中腑中臟中

經之不同中腑者多着四肢故面如土色有表証脈浮而惡風寒四肢拘急不仁現六經形証或中身之前或中身之後或中身之側皆中腑也中臟者多滯九竅故唇緩失音鼻塞耳聾目瞽大小便澀皆中臟也治法中腑者加減小續命湯發其表調以通聖辛涼之劑中臟者三化湯通其滯調以十全大補四物之劑腑臟兼見者藥必兼用先表而後通之也其或外無六經之形証內無便溺之阻隔但肢不能舉口

卷一 中風

三

元

不能言此邪中於經也又當從乎中治宜大秦花湯補血養筋或二陳湯加清熨養血藥中腑者易治宜汗亦不可過汗損其衛氣中臟者難治宜下亦不可過下損其榮氣中經者有汗下之戒只宜養血通氣類中亦有不同河間主尖東垣主氣丹溪主熱與痰僵仆卒倒此氣虛也治宜六君子湯加竹瀝姜汁痰涎壅盛偏枯口禁筋急拘攣筋反縱脈數此火也治法在表宜防風通聖散在上涼膈散口眼歪斜半身

不遂。涎多不語。此痰証也。治宜二陳導痰等湯。大抵
真中者少。類中者多。外感內傷。當辨輕重。重於外感
者。先驅風邪。而後補中氣。治以散風藥爲君。而以補
損藥爲臣。使重於內傷者。先補中氣。而後驅風邪。治
以滋補藥爲君。而以散邪藥爲臣。使其心火暴盛。痰
涎壅塞。無毫髮風邪。而囁斜不遂等証。悉具者。治宜
清熱化痰。養血順氣。一用風藥。禍不旋踵。半身不遂
大率多痰。中左屬瘀血。血虛宜四物湯。加桃仁紅花。
竹瀝姜汁。中右屬痰與氣虛。宜二陳合四君子。加竹
瀝姜汁。氣血兩虛而挾痰者。八物湯加南星半夏枳
實。竹瀝姜汁。初中卒倒不省人事。急搯人中。提頭頂
髮。口噤不能進藥。急以生半夏爲末。吹入鼻中。或以
皂角細辛爲末。吹入鼻中。有嚏者。生無嚏者。肺絕死。
痰涎壅盛。口眼喎斜。舌強不語。皆當用吐法。一吐不
愈。再吐。輕者用瓜蒂末一錢。重者用稀涎散。加藜蘆
五分。入麝少許。以鷺翎探吐。惟年老虛弱者。不可吐。

氣虛卒倒者不可吐凡中經雖有痰涎猶能進湯水者先進藪合香丸通竅隨進順氣散凡小便不利者不可利小便熱退自利諸中或已甦或未甦忽狀吐

中風不治症

口開心絕手撒脾絕遺尿腎絕眼合肝絕吐沫直視

鼻如鼾睡肺絕肉脫筋痛髮直搖頭上竄面赤如粧

汗綴如珠皆不治症若謂症中止見一症者猶或可治脉遲浮者吉

卷一 中風

五 元集

急疾者齒寸脉有尺脉無者當吐不吐者死尺脉盛

寸脉無者當下不下者死脉經曰脉微而數中風

使狀寸口沉大而滑沉則為實滑則為氣氣實相搏

入於臟則死入於腑則愈此為卒厥不知人唇青身

冷為入臟死身溫和汗自出為入腑而復自愈脉

陽浮而滑陰濡而弱或浮而滑或沉而滑或微而數

或微而虛寸口或浮而緩或緩而遲皆為中風之症

大法浮遲者吉急疾者凶又曰脉浮而遲者易治大

數而急者不治

中風方

小續命湯 治中腑外有六經之形症 中風自汗

者不可重發汗此藥不可輕用

麻黃

人參

黃芩

白芍

附子

防已

桂枝

川芎

各七分

防風

一錢

杏仁

甘艸 各五分

六經加減法

太陽中風者無汗惡寒加麻黃防風

卷一 中風

杏仁一倍名麻黃續命湯

太陽中風有汗惡風加

桂枝芍藥杏仁名桂枝續命湯

陽明中風無汗身

熱不惡寒加甘艸石膏知母一倍名白虎續命湯

陽明中風有汗身熱不惡風加桂枝黃芩葛根一倍

名葛根續命湯 太陰中風無汗身涼加附子乾姜

甘艸一倍名附子續命湯 少陰中風有汗不熱加

替枝附子甘艸一倍名桂枝續命湯 少陰厥陰或

厥節攣痲或麻木不仁宜羌活連翹續命主之

三化湯 治邪氣內實二便阻隔

厚朴 大黃 枳實 羌活 各等分 微利 為度

防風通聖散 治中風風熱壅盛表裏三焦皆實及

諸風等症

防風 川芎 川歸 白芍 炒 大黃 蒸

芒硝 連翹 薄荷 麻黃 各四分 石膏

桔梗 黃芩 各八分 白朮 二分 荆芥穗 三分 梔子 二分

滑石 二錢 四分 甘艸 一錢 姜三片煎溫服

卷一中風

七

元集

十全大補湯

人參 黃芪 甘艸 白茯苓 熟地

川歸 白朮 白芍 各等分 川芎 各等分 肉桂 二分

薑三片棗三枚煎服

大秦朮湯 治中經外無六經形症內無便溺阻隔

血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語

宜養血而筋自榮

秦朮 甘艸 炙 白朮 炒 白芍 炒 川芎 洗

川歸洗各

一錢 羌活

防風

黃芩炒各

五分 白芷

生地

熟地各五

分 石膏

生一

白茯苓

一錢

獨活

一錢

春夏加知母八分天陰加生
薑心下痞滿加枳實一錢。

二陳湯 理一身之氣 療一身之痰 欲下行加引下

藥防已 黃栢 木通 欲上行加引上藥 柴胡 升麻 防

風

陳皮

茯苓

各一錢

甘艸

五分

半夏

二分

薑三片煎溫服

六君子湯

益氣補脾和中

卷一中風

八

元集

人參

白朮

各一錢

陳皮

半夏

茯苓

甘艸

加薑三片煎服

涼膈散

治胸膈與六經熱

連翹 一錢

梔子

薄荷

黃芩

大黃

芒硝

各五分

甘艸

一錢

熱退即止

東垣加減涼膈法 減芒硝 大黃 加桔梗 淡竹 葉各

五分 同為舟楫之劑 浮而上之 治胸膈與六經熱 以

其手足少陽之氣 俱下胸膈中 三焦之氣 同相火遊

行於身之表。胸中六經乃至高之分。此藥浮載亦至高之劑。故能於無形之中。隨高而走去。胸膈中及六經熱也。重症用前方。輕用後方。

導痰湯 開痰導氣

半夏 二錢 陳皮 甘草 南星 茯苓

枳壳 各一錢 加薑且三片如久嗽肺燥熱者去半兩及加五味九菴杏仁泥五分

四物湯 補血要藥

當歸 二錢 川芎 白芍 生地 各一錢五分 水煎溫服

卷一 中風 九 元集

四君子湯 補氣要藥

人參 一錢五分 白朮 茯苓 二錢 甘草 八分 水煎溫服

八物湯 以上二方相合為用

稀涎散 治中風暴仆痰涎壅盛口眼喎斜隔塞不通等症

好白明礬 兩半生 猪牙皂角 四條去黑 皮炙黃色

台為細末每服一二錢溫水調下以此為度少通續進他藥

瓜蒂散 一名獨聖散 治中風膈實痰盛諸癩痰飲

壅溢等症。

甜瓜蒂 一匙炒黃色瓜熟脫落者為佳

右為細末每服五分或一錢量人虛實用之以酸蒸汁調下以吐為度吐罷宜降火利氣安神定志藥

通頂散 治中風中氣昏憤不省人事口噤不能開

急用吹鼻即甦

藜蘆 生甘艸 川芎 人參 各一錢 細辛 一錢

石膏 五錢 右為細末以一字吹入鼻中就提起頭髮有嚏者肺氣未絕可治

卷一 中風 十 元集

改容膏 治中風口眼喎斜

草麻子 一兩 真水片 五分

其搗為膏寒月加乾薑附子各一錢如喎在左以此膏敷其右在右以此膏敷其左今日敷之明日即改正或以蠅螂水片搗敷或以鮮血同水片敷之皆良

蘓合香丸 治初中風喉中痰塞水飲難通此丸

以開竅但可敷一時之急不宜多服

沉香 青木香 烏犀角 香附子 丁香

硃砂 訶黎勒 白檀香 麝香 華撥

龍腦

白朮

安息香

薤合油

各二兩

薰陸香

二兩

共為細末
薤合油調為丸

藿香正氣散

治四時不正之氣
憎寒壯熱

大腹皮

茯苓

白朮

紫蘆

各一錢
陳皮

桔梗

白芷

厚朴

半夏曲

各八分

藿香 一錢

甘草

五分

薑三片棗二枚煎服

烏藥順氣散

治中風中氣
遍身麻痺
語言蹇澀
口

眼喎斜喉中氣急有痰

卷一中風

十一

元集

麻黃

陳皮

烏藥

各一錢

枳殼

炒一錢

甘草

多

白芷

桔梗

各一兩

川芎

洗五分

白僵蚕

炒五分

乾薑

炒黑五分

薑三片棗二枚煎服

八味順氣散

治中風正氣
虛痰涎壅盛

白朮

茯苓

青皮

陳皮

白芷

烏藥

人參

各一錢

甘草

五分

薑三片水煎服

治類中清熱順氣湯

當歸

黃連

黃芩

知母

赤茯苓

陳皮各七分 枳壳五分 半夏各一分 貝母各一分 香附

烏藥各七分 甘艸四分 白附子八分 胆星七分

薑三片煎服如痰涎壅盛加僵蚕全蝎各一錢

又驗方

陳皮 半夏姜汁炒 茯苓 甘艸 胆星

僵蚕 片苓 羌活 白芷 防風

荀子 黑枳實薑三片煎服痰涎壅盛及大便不通者用薑湯入皂角少許同煎下礞石滾痰丸氣虛脉數者加參朮各五分

卷一 中風 十一 元集

又驗方 治風痰壅繫古本不能言語者

僵蚕三錢 胆星五錢 薑三片水煎服

烏梅擦牙關方 治病人中風初起筋急口噤不開

便以鉄物開之恐傷其齒用梅肉擦其牙關使其

酸軟則易開矣此酸先入筋之故也

牽正散 中風口眼喎斜無他証者

白訶子 白僵蚕 全蝎三味生用為末每服酒調下二錢

星香湯 治中風體肥痰盛口不渴者

膽星 入錢 木香 一錢 生用 二味以水煎服

省風湯 治中風口眼喎斜痰涎壅盛者

防風 一錢 半夏 姜製 全蝎 二錢 胆星 甘艸 灸

生白附 生川烏 木香 不見火 各五分 以水煎服

瀉青丸 治中風發熱不能安眠者

龍胆艸 川芎 梔子 炒 當歸 酒洗 大黃 酒蒸

羌活 防風 各等 以水為丸

蠲痺湯 治中風表虛手足頑痺者

卷一 中風 三 元集

黃芪 灸 防風 羌活 赤芍 薑黃 炒

當歸 洗各二錢五分 甘艸 灸五錢 以水煎服

愈風丸 治諸風

防風 麻黃 薄荷 僵蚕 大黃

芒硝 黃連 黃柏 山梔 連翹

當歸 白芍 熟地 川芎 各五錢 羌活

獨活 細辛 白芷 天麻 首烏

桔梗 菊花 白木 各 荆芥 二錢 滑石 五分

甘艸 各二兩
右未蜜丸 彈子大 金箔
為衣 荆芥湯下一丸

藥酒方 治肢節疼痛 養血 祛風 去濕

當歸 酒洗
生地 酒洗 各二兩
川芎 一兩
羌活 六錢

厚黃栢 一兩 酒
虎骨 一兩 五錢 好酒
拌炒 炙透 研如米粒

蒼朮 一兩 五錢 泔水 浸二日 再
用竹刀 割去黑皮 切片 炒
川草薢 二兩 泔
打碎

龜板 一兩 五錢
錢酒 炙

右藥製就 共盛入絹袋 用好頭生酒 十觔 煮二
時 取起 入好米 燒二觔 過二七 再飲

活絡丹 中風手足不仁 日久不愈者 經絡中有濕

卷一中風 十四 元集

痰死血 此方主之

胆星 川烏 炮去皮 各二兩
地龍 去土 焙乾

去油 沒藥 各二兩 二錢

胆星之辛烈 所以燥濕 痰二烏之辛熱 所以散寒
濕地龍即蚯蚓 濕土所生 用之者 何易曰 方以類
聚 欲其引星鳥 直達濕痰所聚之處 所謂同類相
求 亦內經佐以所宜之意 風邪注於肢節 久久則
血脉凝聚 不行 故用乳香 沒藥 以消瘀血

蒜菴丸 病人骨節疼痛緩弱無力。此方主之。

蒜菴艸于五月初五七月七九月九採取不拘多少。搗其葉及枝頭洗去土。晒乾鋪入甌中。用蜜酒層層勻洒蒸之。復晒如此九次。不必太燥。但取蒸爲度。杵爲末。蜜丸。梧子大。空心溫酒或米飲下。五十九。

骨節疼痛壅疾也。壅則喜通。此物味辛苦而氣寒。九蒸九晒則苦寒之濁味皆去。而氣輕清矣。本艸云。輕可以去實。蓋輕清則無竅不入。故能透骨。驅風強健筋骨。若未蒸晒。卽蒸不至於九。則濁味猶存。陰體尙在。則不能透骨入裏。祛風而却病。此陰陽清濁之義也。

中氣証二

許學士云。暴怒傷陰。暴喜傷陽。憂愁不已。氣多厥逆。往往得此疾。便覺涎潮昏塞。牙關緊閉。脉伏身冷。此名中氣。若中風。則身溫爲異耳。不可作中風治。宜先

進蘓合香丸。續用烏藥順氣散。或八味順氣散。

胃風証 三

丹溪曰胃風為病。初飲食訖。乘風涼而致其症。飲食不下。形瘦腹大。惡風。頭多汗。膈塞不通。脉右關弦而緩。帶浮。胃風湯主之。

中氣方

類中清熱順氣湯 見前中風方內

附方

卷一

中氣 胃風

六

元集

五香麻黃湯

凡傷寒熱病後。忽發浮腫。或着頭面。或着唇口頸項。或着胸背。或着四肢。或偏着兩足。不赤不痛者。此方主之。

麝香

五分

薰陸香

錢一

雞舌香

錢一

青木香

沉水香

麻黃

防風

獨活

白薇

枳實

炒

萎蕤

秦艽

甘艸

各二錢

腫而痛者為實邪。不痛為虛邪。腫而赤者為結熱。

不赤為留氣。故知上件諸腫。乃餘邪未去。榮衛之

行不相順接。逆於肉理而爲之耳。用五香以順氣。開竅。麻黃防風獨活秦艽萎蕤白薇皆辛散也。一以解其餘邪。一以流其着氣。乃甘艸之補。所以致新枳實之悍。所以推陳耳。

胃風方

胃風湯

人參

白朮

茯苓

當歸

川芎

芍藥

桂心

各等分

入粟米一小撮煎服如腹痛加木香五分

卷一

中氣

胃風

十七

元集

瘟疫証

四

蝦蟆瘟

大頭瘟

內經曰冬不藏精者春必病瘟。傷寒論云瘟病起于春應溫而反清。夏應熱而反寒。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。丹溪曰衆人病一般者此天行瘟疫也。瘟取溫熱之義。疫用勞役之義。多感於房勞辛苦之人。蓋危重病也。大恣表裏傳經與傷寒相似。但傷寒寒自外入。瘟疫毒自內出。此爲異耳。凡看瘟疫先看病者。兩目露血絲。舌次看口唇紅燥。舌胎黃白紫黑以

驗。裏熱淺。深除舌胎。遍白爲熱。稍輕其餘。睛赤唇紅。胎黃斷紋。俱是重症。若紫黑燥裂。則又熱之極也。又以病家之人。手按其胸膈脇肋間。問其有無痛處。分別表裏經絡。次看小腹。覺有硬滿處。卽問其小便利否。若小便利。則是津液留結。宜用小柴胡去參。合四苓散。若小便利。則是蓄血之症。宜下瘀血。用桃仁承氣湯去枳實。不犯上焦。此法看傷寒亦然。初得病一二日。有表症。自冬至至春分前。元味羌活湯。

卷一 瘟疫

十八

元集

敗毒散。去人參。自春分至夏至。天氣已變溫熱。宜升麻葛根湯。柴胡解肌湯。小柴胡湯。去參。初得二三日。見太陽証。便溏泄者。宜小柴胡。去參。對四苓散。或香連丸。稍久大便秘而渴。玄明粉乃要藥也。白虎湯亦可用。不渴者。禁用白虎。又凡瘟疫一起。卽發渴。是熱入陽明。宜五瘟丸。白虎湯。三黃石膏湯。加減用之。渴病藥味通用者。天花粉。片苓。葛根。益元散之類。衄血胃火。宜白虎湯。心火。宜犀角地黃湯。切忌發汗解表。

發狂譎語大便滑而渴宜加味白虎湯不作渴大便
秘結五七日不解宜大小承氣湯調胃承氣等湯下
之。瘟病有氣虛血虛而深者觀形色察脉理表裏熱
症已除者宜參芪歸朮溫補自汗太甚者亦宜補丹
溪曰宜補宜散宜降故知此三法者皆不可廢也凡
瘟病初看未端的且先以敗毒散加減治之看歸在
何經再隨經施治此要法也

脉陽濡弱陰弦緊更遇溫氣變爲瘟疫

卷一 瘟疫

十九

元集

瘟病二三日體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾八
日死。瘟病四五日頭痛腹滿而吐脉來細而強十二
日死。瘟病八九日頭身不疼目不赤色不變而反利
脉來牒牒按之不鼓手時大心下堅十七日死。瘟病
汗不出出不至足者死厥逆汗自出脉堅強急者生
虛軟者死。瘟病下利腹中痛甚者死

蝦蟇瘟

丹溪曰此病屬風熱防風通聖散加減用之或用小

柴胡加防風羌活荆芥薄荷桔梗煎服外以側柏葉搗汁調火煉蚯蚓糞敷之

大頭瘟

丹溪曰大頭病乃溫熱在高巔之處用羌活酒芩酒蒸大黃隨病加減切不可用降氣藥東垣曰陽明邪熱太甚實少陽相火而為之也濕熱為腫木盛為病此邪見於頭多在兩耳前後先出治法大不宜藥速速則過其病所謂上熱不除中寒復生宜徐徐緩藥當視其腫在何部分隨經治之陽明為邪者首大腫少陽為邪者出於耳前後

瘟疫方

九味羌活湯 治觸冒四時不正之氣憎寒壯熱頭

痛身疼口渴

羌活 太陽 白芷 陽明 黃芩 少陽 蒼朮 太陰 細辛 少陰

川芎 厥陰 生地 治少陰心熱 去血中之熱 甘艸 和諸藥去氣中之熱

防風 治一身疼痛

五苓散 治煩躁小便不利而渴

澤瀉一錢五分 白朮一錢 赤茯苓 猪苓各錢 肉桂五分

熱甚者去桂加黃芩 薑一片棗二枚煎服

香連丸 治瘟疫溏瀉方見痢疾

白虎湯 治憎寒壯熱口渴一身盡痛陽明經病

石膏二兩 知母六錢 甘草二錢 粳米五升

煎米熟去渣溫服 溫濕者加蒼朮

五瘟丹

卷一 瘟疫 五 元集

黃連 黃柏 黃芩 梔子 大黃

香附子 紫蘼 甘草梢 甲巳之年甘艸君 丙辛黃柏乙庚蒼

丁壬梔子連戊癸一年一君 四為臣香附紫蘼 為佐大黃為九味破為衣水吞下初病可煎服

三黃石膏湯 治瘟疫表裏俱盛五心煩熱兩目如

火鼻乾面赤大渴舌燥

石膏一錢 黃芩一錢 黃柏一錢 梔子五個 麻黃一錢

淡豆豉半合 黃連二錢 水煎服

犀角地黃湯 治衄血及吐紅

犀角

赤芍

丹皮

生地

各等分煎食後服

大承氣湯

治陽邪入裏上中下三焦皆病痞滿燥

實堅皆全胃實譫語五六日不大便者可服併治

少陰舌乾口燥日晡發熱脉息沉實者

大黃

七錢五分

芒硝

半合

枳實

厚朴

各兩

右水先煎根朴數沸次入大黃芒硝煎一沸溫服以利為度

小承氣湯

治六七日不大便腹脹滿悶病在陽明

無表症汗後不惡寒狂言潮熱而喘

卷一 瘟疫

三十三

元集

大黃

七錢

厚朴

枳實

各三錢五分

照前先煎根朴次入大黃一沸卽服以利為度邪在上焦則作滿邪在中焦則作脹胃實則作

潮熱腸乘于心則狂熱下胃口則喘除芒硝者欲其無干下焦也

調胃承氣湯

治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘

結譫語嘔渴日晡潮熱脉實者

大黃

六錢五分

芒硝

半合

枳實

二錢

右水煎服以利為度去根朴者欲其無犯上焦也

桃仁承氣湯

治外証已解小腹急大便黑而小便

利其人如狂此有蓄血者

桃仁

去皮尖二十個

桂枝

二錢

大黃

酒浸六分

芒硝

半分

甘艸

二錢

右水煎服血去為度

萎蕤湯

治冬溫憎寒壯熱身痛頭疼口渴面腫

萎蕤

二錢五分

麻黃

白薇

青木香

羌活

杏仁

川芎

甘艸

各五分

石膏

一錢五分

甘菊花

一錢五分

清水煎服

大青龍湯加黃芩

凡傷寒

寒疫頸痛身熱無汗惡風

卷一 瘟疫

五

元集

煩躁者此方主之

本方加黃芩七錢春分以後

至秋分節前。天有暴寒。抑遏陽氣。不得泄越。至有

上件諸証。皆為時行寒疫。表有風寒。故見太陽証。

頭痛身熱。無汗惡風。裏有溫熱。故見煩躁。麻黃桂

枝。甘艸。杏仁。生薑。大棗。辛甘物也。辛以解風寒。甘

以調榮衛。石膏。黃芩。寒苦物也。寒以清溫熱。苦以

治煩躁

漏蘆湯

疫癘積熱。時生疔瘡。結毒俗稱流注。面腫

咽塞者此方主之

漏蘆

升麻

大黃

藍葉

黃芩

玄參

芒硝各等分

甚者加倍芒硝

經曰榮氣不從逆於肉理乃生毒癰又曰熱甚則腫故疫癘之餘熱解未盡逆留於分肉之間則作上症辛能解散苦能勝熱漏蘆升麻藍葉辛且苦故足以解結熱鹹軟堅苦瀉實黃苦硝鹹故足以軟瀉參苦潤芩苦枯潤去血熱枯去氣熱與蘆麻

卷一 瘟疫

三五

元集

同用則走散無所不至矣

二黃湯

治天行大頭瘟疫

黃芩

黃連俱酒炒

生甘艸各一兩

清水煎服

消毒飲

治全前

黃芩

黃連炒各五分

柴胡五分

桔梗三分

人參三錢

陳皮

甘艸

玄參各一錢

連翹

板藍根

馬勃

鼠粘

疆蚕

升麻各七分

便秘加大黃

右為細末半用湯調時時呷之半用蜜丸化俱可

東垣曰身半以上天之氣也邪熱容於心肺之間
上攻頭面而爲腫初覺憎寒壯熱體重次傳頭面
腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥此炎上
作火之象也芩連苦寒瀉心肺之火連翹玄參板
藍鼠粘馬勃壘蚕皆清喉利膈之物緩以甘艸之
國老載以桔梗之舟楫則諸藥浮而不沉升麻升
氣於右柴胡升氣於左清陽升於高巔則濁邪不
能復居其位狀邪之所奏其氣必虛故用人參以
補虛陳皮用以利壅滯之氣加大黃則從其實而
瀉之此灶底抽薪之法也

癩疹証 五

癩疹外症悉由中出潔古云瘡發焮腫於外者屬少
陽三焦相火也謂之癩小紅靨行皮膚之中或不出
者或出而隨沒又隨出者屬少陰君火也謂之疹蓋
癩重而疹輕也凡顯癩症而自吐瀉者慎勿亂治而
多吉謂邪氣上下皆出也小兒癩疹並出身溫者吉

身冷者逆。癍疹首尾俱不可下。秘則微疎之。大抵此証有陰有陽。陽症發癍有四症。有傷寒。有時氣。有熱病。有溫毒。班班如錦紋。點大如色赤。此外感熱証也。陰症發癍。色雖微紅。而出則稀少。若作熱症治之。死。生反掌。宜調中溫胃。稍兼解散。陰陽二証。雖當辨明。又有內傷証。亦出癍疹。但微見微紅。此胃氣極虛。一身之火。遊行於外。當補益氣血。則中有主。而氣不外游。榮有養而血不散。此証尤當慎之。或謂古云癍。

色紅赤者胃熱也。五死五生。紫黑者胃爛也。九死一生。又云下之早則熱乘虛入胃。下之遲則胃熱不得泄。此以癍疹悉屬之胃矣。而潔古以癍屬少陽。疹屬少陰。不幾於背馳與。予曰胃者總司也。五臟六腑之氣皆由胃發。故胃熱失下。熱氣薰蒸。衝入少陽。則助相火而成癍。衝入少陰。則助君火而成疹。苟胃熱被下。則胃火一息。二經之火亦息。癍疹二症亦隨去矣。何昔馳之有。或又云癍疹首尾忌下。今欲下之何也。

予曰治病當隨時變通不可執一。若熱未入腑大便得通此忌下之時。宜用升麻葛根化癩白虎等劑。消其邪熱如陽明結實七八日不大便此正火氣盛發上衝二經。癩出猛烈輕則紅赤重則紫黑此時不下。循得全命乎。三一承氣莫之疑矣。古云藥不拘方合宜而用善夫。

癩疹者隱隱在皮膚之中多屬於脾發則多痒或不仁者是兼風兼濕色紅者兼火化也。脉陽浮而數陰實而大火盛在表故陽脉浮數下焦實熱故陰脉實。大脉多沉伏或細而散或絕無滑伯仁曰脉者血之波瀾發癩者血散於肌膚是以脉伏。

癩疹方

陽毒發癩

升麻葛根湯

治傷寒陽明實熱發癩疹已出未

出皆可服

方見瘟疫門

玄參升麻湯

治發癩咽喉疼痛煩躁瀉諸

立參 升麻 甘州

白虎化癍湯 治胃熱發癍

知母二錢 甘州二錢 粳米五勺 石膏一兩 虛加人參二錢

陽毒梔子湯 治傷寒壯熱百節煩痛身發癍爛

升麻 梔子仁 黃芩 白芍各一錢 柴胡二錢

石膏二錢 知母一錢 杏仁七分 甘州五分

薑三片香豉一百粒煎服

陰毒發癍

卷一 癍疹

三九

元集

調中湯 治內傷外感所發陰癍

蒼朮一錢五分 陳皮一錢 砂仁 藿香 桔梗

甘州 白芍 半夏 羌活 白芷

枳壳各七分 川芎五分 麻黃三分 桂枝三分 片水煎溫服

大建中湯 治中氣不足無根失守之火出於肌表而成癍者

人參 黃芪炙 白芍炒 當歸 桂心

甘州炙 半夏 黑附子 薑三片煎服

升麻驚甲湯 治陰瘡

升麻 三錢 當歸 一錢 甘艸 二分 蜀椒 二十粒 驚甲 錢

雄黃 另研 四分 水煎去渣調雄黃末服

內傷發瘡

補中滋榮湯

人參 砂仁 陳皮 川芎 柴胡

白朮 茯苓 當歸 神曲 升麻

補中益氣湯

卷一 癰疹 三十一 元集

方見內傷門

葛根橘皮湯 治冬月肌中癰爛咳而心悶者

葛根 橘皮 杏仁 知母 麻黃

黃芩 甘艸

消毒犀角飲 治皮膚癰疹無裏証者

牛旁子 大 荆芥 二錢 防風 三錢 甘艸 錢

方無犀角而名犀角飲者其功用同乎犀角也

三一承氣湯

大黃 芒硝 厚朴 枳實 甘艸各五分 薑三片煎服

紅瘰驗方

葛根 陳皮 片苓 知母 石膏

紫胡 甘艸

紫瘰驗方

犀角 白芩 半夏子 甘艸 荆芥

片苓 柴胡 石膏 防風 枳壳

癰疹

卷一 癰疹 三 元集

丹溪加減通聖散 本方除防風芒硝

川芎 川歸 麻黃 連翹 黃芩

石膏 桔梗各一錢 滑石三錢 荆芥二錢 白朮二錢

甘肅 身痛加蒼朮羌活有痰加半夏或貝母

消風散 治風熱丹疹

荆芥穗 甘艸炙 陳皮 厚朴薑炒 藿香

蝉退 白殭蚕炒 人參 茯苓 防風

川芎 羌活

治一切癰疹。斑毒。火丹。煩躁。搔癢。

藜蘆錢五 大黃錢二 一味為末。生薄荷汁。同蜜調塗。

內傷証六

內傷者傷諸內者也。凡飲食勞倦。七情六慾之傷。是也。外傷者傷諸外者也。凡霜雪雨露風寒暑濕之傷。是也。但內外之証治雖不一。而見証多同。使診脉者恍惚難辨。惟東垣內外傷辨載之詳悉。予撮其大旨。擇其緊要者言之。均之寒熱也。外傷則寒熱齊作。而

卷一 內傷

三五

元集

無間。內傷則寒熱間作而不齊。均之惡寒也。外傷則厚衣烈火而不除。內傷則一得溫暖而卽解。均之頭痛也。外傷則連痛而不休。內傷則乍痛而乍止。外傷則鼻塞而不通。內傷則口變而無味。外傷則手背熱。內傷則手心熱。外傷則言語壯健。先輕而後重。內傷則言語恹弱。先重而後輕。外傷則人迎脉大於氣口。一

倍。二倍。三倍。內傷則氣口脉大於人迎。一倍。二倍。三倍。又按陰陽應象論云。天之邪氣。感則害人五臟。

是八益之邪傷形而不傷氣有餘之症也當泄而不當補又云水穀之寒熱感則害人六腑是七損之病傷氣而不傷形不足之症也當補而不當泄故凡汗之下之吐之尅之皆泄也凡溫之和之調之養之皆補也辨別明白庶免臨証有感

飲食所傷

經曰飲食自倍腸胃乃傷故凡受傷者皆原中氣不足宜以補益爲要但治法有先後不可倒施故物傷

卷一 飲食傷

三五

元集

之際積食未行遽用補益則滋其壅塞增其痛苦勢反增劇必先用消食化痰行氣之藥保和丸枳實導滯丸待食行或吐或瀉或暗消宿食盡行然後用六和湯以蕩其未盡之邪調中益氣以回其散失之氣健脾丸以復其本體之常斯調治有序而獲寧矣大抵此症輕重有三等輕者因痰畏食停滯頗多不痛不嘔只胸膈不快中宮不清久則有塊或致嘈雜腸鳴重者食填太陰壓住肝氣致肝氣不得上升肝者

將軍之官其性猛烈故中脘大痛胃氣上升肝氣助烈載食而吐則痛隨吐減或飲食過膈遂痛在中焦延及下焦則成瀉矣經云痛隨利減因而獲寧其至重者食積甚多濁氣載食下不得瀉胃氣虛衰上不_得吐陰陽乖隔榮衛不通瀕_危矣王水所謂濕霍亂者生乾霍亂者死以無吐瀉故也

勞倦內傷

經曰有所遠行神氣衰少穀氣不盛上脘不行下脘

卷一 勞倦傷

三十四

元集

不通而胃氣熱熱氣薰蒸胸中故胸中熱又曰勞者溫之損者補之是知勞倦者因勞而致倦也經謂之解_休故人有勞心者思慮無窮有勞力者筋骨_憊軟致元氣下流心志慵懶四肢怠惰嗜_卧恹行飲食少味急以補中益氣湯加杜仲枸杞以溫補之不比傷飲食者先消之而後補之也

七情六慾所傷

七情者喜怒哀樂愛惡欲也六慾者耳目口鼻心意

也若是者皆神思間病治法氣滯者行滯痰積者開
痰有鬱者舒鬱再看虛在何經加收本經之藥非若
飲食勞倦之証猶有可消可溫可調可補者比也或
婦人得之鬱而不舒多成勞病男人得之蓄而不解
多成隔症雖然七情之中得禍至速者惟怒爲甚六
慾之中得患最大者惟色爲先經曰大怒則令人暴
絕使血菀於上又云怒則氣通常見人大怒之後血
大妄吐得此患者當以氣升血亦升氣降血亦降爲

卷一 七情六慾傷

三五

元集

主卽用降氣制肝湯庶氣得平而愈難經云損其腎
者補其精素問曰精不足者補之以味凡人色慾無
節者內損真陰如木之損其根水之涸其源陰精既
盡相火自動曰腎本屬水虛則熱矣心本屬火虛
則寒矣腎脈自肝膈入肺中循喉嚨繫舌本腎火一
動肝火乘之入肺成肺嗽入喉成喉痺而潮熱夢遺
盜汗百病皆起矣病勢未劇猶可圖全或製十味回
生丸

飲一內傷方

保和丸 治飲食所傷。胸腹飽悶不安。或腹中有食。

積痞塊。交服日漸消散。脾胃虛弱者。以補藥下之。

四君子湯皆可用。

山查肉 五兩 神曲 半夏 各三兩 茯苓 陳皮 去白

荀子 麥芽 各一兩

別用生神曲五兩為末入薑汁一小盞水調打糊為丸每服三五十丸滾湯清米湯俱可下。

大安丸 健脾 消食最効。

卷一 飲食 三十五 元集

即保和丸加白朮二兩

小保和丸 助脾胃消腹脹。化飲食。

白朮 五錢 山查 神曲 各二錢 陳皮 一錢 五分

白芍 一錢 右為細末蒸餅打糊 為丸滾湯下五十九丸

枳朮丸 治痞滿消食強胃。

白朮 二兩 枳實 一兩

右為末泡清荷葉少頃去葉用湯打老米糊為丸白湯下五六十

本方加橘紅一兩 枳實 枳朮丸 治元氣虛弱飲食不消心下痞滿 本方加炒神曲一兩

十味回生丸

杜仲 山萸肉 生地 山藥 知母

丹皮 扶神 枸杞 黃柏 澤瀉

二十四味保和丸 健脾安胃和中消積止痛

白朮 米泔水浸 甘草 五錢 使君子肉 一兩 神曲

莪朮 醋浸 白茯苓 去皮 山藥 薑汁 麥芽粉 炒 葡萄子 炒

三稜 醋浸 厚朴 薑汁 香附子 去毛童 山查 各一兩

蒼朮 米泔水浸一宿 廣陳皮 去白 藿香梗 七錢

卷一 七情六慾

元集

大肉果 四個約 砂仁 微炒 人參 木香 各五錢

益智仁 淨六錢 白蔻仁 三錢 葶薺 五錢 檳榔 三個

煉蜜為丸 梧子大 隨意薑湯白 湯服五六十丸 小兒量大小服

葛花解醒湯 治酒食內傷

葛花 砂仁 白豆蔻 木香 陳皮

人參 茯苓 各五 神曲 炒 白朮 炒 青皮

澤瀉 各三 草生薑煎服

附方

大健脾丸

人參 茯苓 陳皮各二兩 白朮三兩 枳實

半夏曲 山查 青皮各一兩 白豆蔻五錢 木香五錢

川連 穀芽粉各一兩 荷葉煎湯打五錢 老米糊為丸

消食去積丸

白朮二兩 山查 史君子 雞肫皮 麥芽

神曲各一兩 山藥八錢 砂仁三錢 老米糊為丸

夏氏肥兒丸 補脾消疳退熱殺蟲止腹痛長肌肉

卷一 七情六慾

卑 元集

調血氣

人參 白朮 茯苓 麥芽各一兩五 川連

蕪荑仁 胡黃連 神曲 陳皮 沉香

史君子 柴胡各一兩 蘆薈七錢 甘艸四錢 木香三錢

豬胆汁和米湯丸黍大

又方 健脾消食久服生肌無傷食之患

白朮炒 山查蒸各一兩 茯苓炒 白扁豆一兩 麥芽炒

薏苡清水洗 蓮肉炒 山藥蒸拌炒各一兩五錢 陳皮錢

右爲末川晚米炒熟磨粉調服
早晨下諒人大小多寡用之

錢氏白朮散

脾虛肌熱瀉泄者此方主之

人參

白朮

甘艸

木香

茯苓

藿香

乾葛

脾虛者補之以甘故用人參白朮茯苓甘艸肌
熱者療之以清故解以乾葛脾困者醒之以香
故佐以藿香

