


QK
297
.P7
vol.2
pt.4

QK297

.P7

vol.2

pt.4



P R O D R O M U S
F L O R A E B A T A V A E.

TYPIS DE BREUK & SMITS.

PRODROMUS

FLORAE BATAVAE.

VOLUMEN II. PARS IV.

(*Fungi.*)

SUMTIBUS SOCIETATIS

APUD

JAC. HAZENBERG, CORNELII FIL.

1866.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

ALBANY
MUSEUM
UNIVERSITY
LIBRARIES

QK 297
P 7
Vol. 2
PL. 4

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

V O O R B E R I C H T.

Het besluit om de bewerking der lagere Fungi van het Herbarium der *Vereeniging voor de Flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen* op te dragen aan een buitenlandsch correspondeerend lid, werd genomen op de jaarvergadering van 1860, toen het gebleken was, dat geen van de gewone leden der Vereeniging zich met die taak wilde of durfde belasten. De keuze van het Bestuur viel op den Heer G. D. Westendorp, officier van gezondheid bij het Belgische leger te Dendermonde, een man, die, door vele geschriften, als grondig mycoloog zich een welverdienden naam verworven had. Ge- noemde Heer had de groote welwillendheid, aan onze roepstem gehoor te geven, en zond ons zijn manuscript in Juli 1863 over.


Door omstandigheden, die het nutteloos zou wezen hier na te gaan, werd het ter perse leggen van het manuscript des Heeren Westendorp tot in Augustus 1865 vertraagd. De ondergetekende, in dat jaar tot Voorzitter onzer Vereeniging gekozen, spande terstond alle pogingen in om het verzuim te herstellen, en verheugt er zich in dat hij thans, hoezeer dan ook een vol jaar later, het laatste stuk van den Prodromus zijnen medeleden kan aanbieden.

De Heer Westendorp heeft de goedheid gehad, de laatste proef van alle vellen na te zien.

De ondergetekende acht zich geroepen, aan voornoemd correspondeerend lid onzer Vereeniging onzen hartelijken dank over te brengen voor de hulpvaardigheid, ons bewezen.

Amsterdam Aug. 1866.

C. A. J. A. OUDEMANS.



La détermination des champignons inférieurs (*Gasteromycetes*, *Pyrenomyces*, *Hymenomycetes* et *Coniomycetes*) de l'herbier de l'Union, nous a présenté de grandes difficultés, en ce que beaucoup de *Specimen* qui s'y trouvaient, étaient surannés, ayant été colligué depuis un grand nombre d'années; que d'autres avaient été détruits par les insectes ou par l'humidité; que quelques uns en assez grand nombre avaient été récoltés lorsque la plante commençait seulement à se développer ou bien lorsqu'elle était déjà dans un état de développement trop avancé; conditions qui ne permettent pas de déterminer avec certitude. Enfin que pour la masse, certaines indications qui facilitent les recherches, telles que le nom de la plante qui sert de support, l'endroit et l'époque de l'année où elle a été trouvée, le nom de la personne qui l'a découverte, etc., etc., manquaient ou étaient fautives. Néanmoins et malgré toutes les difficultés que nous avons eu à surmonter, nous avons été assez heureux de pouvoir déterminer, avec plus ou moins de certitude, environ *sept cent espèces*!

Nous aurions pu nous dispenser de citer plusieurs tribus, tels que les *Phylleriacei*, les *Destructorii*, voire même les *Cytisporei*, parceque leur autonomie a été contestée par plusieurs auteurs. Mais ayant été chargé seulement de faire le relevé de ce qui se trouvait dans l'herbier de l'Union, nous avons cru bien faire en mentionnant dans ce Prodrôme, tout ce qui s'y trouvait, en laissant aux futurs auteurs de la flore

Néerlandaise le soin d'éliminer ce que la science aura reconnu comme ne devant plus être considéré comme tribu, genre ou espèce distinctes.

Cette partie de la mycologie ayant été entièrement négligé par les auteurs qui se sont occupés de l'énumération des plantes de la flore indigène, nous n'avons pu consulter aucun ouvrage Néerlandais, sauf deux opuscules de Dozy et Molkenboer, ainsi que quelques notes manuscrites de Mr. Franquinet, concernant les plantes Cryptogames des environs de Maastricht. Quand aux autres ouvrages que nous avons du consulter pour la détermination des espèces et qui se trouvent cités dans cette dernière partie du prodrome, nous en donnerons ici la liste, avec les abréviations employés entre parenthèses :

- | | |
|----------------------------|---|
| Bonorden. | Handbuch der algemeinen Mycologie. (Bon.
Handb.) |
| Chevallier. | Flore des environs de Paris. (Chev. fl. Par.) |
| Corda. | Icones fungorum. (Cord. Ic. fung.) |
| Desmazières. | Plantes Cryptogames de France, 1 ^{re} édit.
Fascicules 1 à 44. (Desmaz. Pl. Crypt.
Fr. 1 ^{re} Ed.) |
| » | Plantes Cryptogames de France. Nouvelle
édition. Fasc. 1 à 16. (Desmaz. Pl. Cr.
Fr. nouv. Ed.) |
| » | Notices 1 à 24 sur les Cryptogames nou-
velles ou inédites de la flore Française, ex-
tractes des mémoires de la Société Royale
des Sciences de Lille, et des Annales des
Sciences naturelles (Partie Botanique des
1 ^e , 2 ^e et 3 ^e séries.) (Desmaz. Not. Crypt.
Nouv. de Fr.) |
| Dozy et Molkenboer. | Novae fungorum species in Belg.
Septent. nuper detectae. (Dz. et Mb. Nov.
fung.) |
| » | Bijdragen tot de flora Cryptogamica van Ne- |

- Duby.
 " "
 Fée.
 Fries.
 " "
 " "
 " "
 Léveillé.
 " "
 " "
 " "
 Kickx.
 " "
 Libert.
- derland in het Tijdschrift voor natuurl. Gesch. en Physiologie XI^e deel. (Dz. et Mb. Bijdr.)
Botanicum gallicum. (Duby Bot. gal.)
Mémoire sur la tribu des Hystérinées. Extr. du T. XVI des Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. (Duby. Mém. Hyst.)
Mémoire sur le groupe des Phyllériées et notamment sur le genre Erineum. (Fée Phyll.)
Elenchus fungorum. (Fr. Elench.)
Epicrisis fungorum. (Fr. Épier.)
Summa vegetabilium Scandinaviae (Fr. Summ. Veg.)
Systema mycologicum (Fr. Syst.)
Champignons du musée de Paris. Extraits des Annales des sciences naturelles, 2^e Série T. V. pag. 111 et 249. (Lév. Champ.)
Fragments mycologiques. Extr. des Ann. des sc. nat. 2^e Série. (Lév. fragm. myc.)
Organisation et disposition méthodique des espèces du genre Erysiphe. Extr. des Annales des Sciences naturelles, 3^e Série T. XV. p: 109. (Lév. Erys.)
Disposition méthodique des Urédinées. Extr. des Annales des Sciences naturelles, 2^e Sér. T. II. p. 1).
Flore cryptogamique des environs de Louvain. (Kx. fl. Cr. Louv.)
Recherches sur la flore cryptogamique des Flandres. 5 Centuries. Extrait des mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Belgique. (Kx. Rech.)
Plantae cryptogamicae arduennae. (Lb. Pl. Crypt.)

Montagne.	Sylloge gen. specierumque cryptogamorum. (Mont. Syll.)
Persoon.	Synopsis fungorum. (Pers. Syn.)
Rabenhorst.	Deutschland's Kryptogamen-Flora (Rabenh.)
"	Herbarium vivum mycologicum. (Rabenh. Herb. myc.)
"	Fungi Europaei. (Rabenh. fung. Eur.)
Wallroth.	Compendium florae germanicae. (Wallr. Comp.)
Westendorp.	Herbier cryptogamique Belge. (West. Herb. crypt.)
"	Notices 1 à 8 sur les Cryptogames nou- velles ou inédites de la flore Belge. Extr. des Bulletins de l'Académie Royale des Sciences de Belgique, et des Bulletins de la Société Royale de Botanique de Bel- gique. (West. Not. crypt. inéd. fl. B.)

Ayant rencontré, en examinant les collections, des espèces et des localités qui n'avaient pas été mentionnées dans les trois premières parties du second volume du Prodrome, nous les avons réunies en tête de cette dernière partie sous le titre d'*Addenda*.

WESTENDORP,
*Médecin de l'armée Belge, Vice Président de la
Société Royale de Botanique de Belgique.*

Termonde, le 12 Juillet 1863.

ADDENDA

ad Vol. II Part. 1, 2 en 3^{de}.

Lichenes.

- 1750¹.** **Biatora rosella** (Pers.) Fr. Op schors van oude boomstammen. (Rabenh. p. 94. — Basidia rosella De Not.; Körb. Syst. Lich. Germ. p. 185)
In Herb.: Holland, v. d. Ende (v. s.)
- 1811¹.** **Verrucaria nitida** b. *nitidella* Flörk. Op oude Berkenstammen. (Flörk. Deutschl. Lich. n°. 10; West. Herb. Cr. Belge n°. 117)
In Herb.: Duinkant te Walcheren, v. d. B. (v. v. et s.)
- 1812¹.** **Verrucaria cinerea** Kx. Op schors van oude Wilgen, alsook op schuttingen. (Kx. Rech. sur la Fl. Cr. des Fland. 2 Cent. p. 24; West. Herb. Cr. Belge n°. 22)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)
- 1812².** **Verrucaria gemmata** Ach. Op schors van oude Beuken en Esschen. (Rabenh. p. 12; West. Herb. Cr. Belge, n°. 23)
In Herb.: Holland.

Algæ.

- 2061¹.** **Nestoc tuberculosum** Kütz. Op overstroomde koemest in polders.

Subinundatum; phycamate olivaceo-atro, tuberculato, compacto, duro; trichomatibus flexuosis, laxe implicatis, aequalibus, dilute aerugineis; articulis granulosis, oblongis, angulatis, dimidiatis; spermatis ellipticis, rarissimis; peridermide luteo-fuscescente. (Kütz. Sp. Alg. p. 298; Kütz. Tab. phyc. II. T. 5. f. V.)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes) v. d. B. (v. s.)

- 2125¹.** **PALMOGLOEA** Kütz.

Stratum gelatinosum difforme indeterminatum, ex cellulis sparsis polygonimicis in substantia gelinea nidulantis compositum. (Kütz. Sp. Alg. p. 228)

- P. protuberans** Kütz. Op vochtige aarde, mossen en boomtronken in bosschen. (Kütz. Sp. Alg. p. 228; Coccochloris protuberans Spreng.; Rabenh. p. 60)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 2142¹.** **Protococcus Orsinii** Kütz. Op oude koemest op vochtige plaatsen.

Strato crustaceo e rubro-aurantiaco, aurantiaco-cinnamomeo et olivaceo-lutescente variegato; cellulis simplicibus globosis, variis, membranula crassiuscula achromatica laevissima, nucleo solido aurantio subhomogeneo, centro granuloso.

Diam. $1/400$ — $1/70''$. (Kütz. Sp. Alg. p. 202.)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

Fungi.

- 2630¹.** **Cantharellus bryophilus** Fr. Op *Hypnum Sto-*

kesii. Vere. (Fr. Syst. I. p. 325; Rabenh. p. 445)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 2636¹.** **Marasmius spodoleucus** Berk. et Broome.
Op doode afgevallen takjes in de bosschen. Aut. Vere.
Conchiformis, resupinatus, margine liberato, supra
cinereus, subfurfuraceus; stipite prorsus nullo; hymenio
albo, lamellis paucis; interstitiis laevibus. Berk.
et Br. (Rabenh. Fung. Eur. n°. 205)
In Herb.: Naaldwijk, v. d. Tr. (v. s.)

- 2749¹.** **Cyphella ampla** Lev. Op afgevallen takken en
houtsplinters. Aut. Vere.
Receptaculum sessile membranaceum cupulatum al-
bum tomentosum, intus venosum cervinum, margine
tenui integro. (Lev. fragm. myc. in ann. Sc. nat. 3
Sér. T. IX. pag. 126; Cyphella Coemansii Rabenh.
Fung. Eur. n°. 209)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 2766.** **Clavaria inaequalis** a. *helvola* Fr. (Epier. p.
577) In bosschen tusschen het gras.
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)
b. aurantiaca Fr. II. Op dezelfde plaatsen.
In Herb.: Zuid-Beveland (Goes) v. d. B. (v. v. et s.)

- 2775¹.** **Exidia glandulosa** a. *papillata* Fr. Op rottend
hout. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 225)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 2775².** **E. recisa** Fr. Op doode afgevallen Eiken- en Wilgen-
takken. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 223; Rabenh. p. 313)
In Herb.: Groningen, de Haan; Leiden, Meppel,
Dz. et Mb.; Harendermolen, Strat. (v. v. et s.)

- 2778¹.** **Tremella albida** Fr. Op rottend hout, bijzonder
van Eiken en Beuken. Vere. (Fr. Syst. II. p. 215;
Rabenh. p. 311)
In Herb.: 't Haagsche bosch, Wttw.; Zuid-Beve-
land, v. d. B. (v. v. et s.)

b. effusa Alb. et Schw. Op rottende Populierschors.
(Trem. gemmata Lev. in Herb. Unio?)
In Herb. Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

2778². Tr. aurantia Schwein. Aan oude palen. Hieme.
(Fr. Syst. II. p. 213)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

2778³. Tr. lutescens Fr. Op rottend hout. Hieme. (Fr.
Syst. II. p. 213; Rabenh. p. 311)
In Herb.: Goes, v. d. B. (v. s.)

2778. Tr. mesenterica Retz. Adde:

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Harderwijk, Jungh.;
Leiden, Wt tw.

2782. Dacryomyces tortus Fr. Adde:

In Herb.: Utrecht, Wt tw.; Leiden, Dz. et Mb.;
Maastricht, Franq.

2783. Dacr. stillatus Nees. Adde:

In Herb.: Harderwijk, Jungh.; Leiden, de Haan,
Wt tw.; Maastricht, Franq.

2783¹. **EPIDOCHIUM** Fr.

Stroma e ceraceo-corneum, superficie impolita; sporis continuis subpyriformibus, sporophoris suffultis.
(Fr. Summ. Veg. Sc. p. 471.)

Ep. Martensii West. Op doode afgevallen Linde-takken.

Réceptacles épars, immersés, aplatis, bleu-noirâtres, arrondis, ne dépassant jamais un mill. de diamètre. Basidies filiformes, rameuses, dichotomes, hyalines, à sporides terminales uniques. Sporides ovale-allongées, transparentes, d'un beau bleu, mesurant 3/100es de mill. de longueur sur 1/100 de mill. de largeur (West. 4e not. Crypt. nouv. de la fl. B. p. 13. n°. 56 T. I. f. 6.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

2784. *Cylindrocolla Urticæ* Bon. Adde.

In Herb.: Groningen, de Haan; Leiden, Wttw.; Amsterdam, v. d. S. Lac.

2786. *Podisoma Gymnosporangium* Bon. Adde:

In Herb.: Leiden, in 's Rijks Plantentuin, Wttw.; Aalsmeer, v. d. S. Lac.; Amsterdam, v. d. S. Lac.

2819¹. *Peziza fascicularis* Alb. et Schw. Op doode Elzen- en Populiertakken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 75; Rabenh. p. 367)

In Herb.: Haarlein, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v.)

2822¹. *Pez. brunneo-atra* Desmaz. Op de aarde op vochtige plaatsen; ook op verrot hout. Vere.

Sessilis, solitaria, majuscula, subplana, integra, carnosa, fragilis, glabra, brunneo-atra; ascis maximis, cylindricis; sporidiis ovoideis, subhyalinis. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 826)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

2828¹. *Pez. umbrosa* Fr. Op de aarde tusschen mossen.

Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 85; Rabenh. Fung. Eur. n°. 217.)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

2831¹. *Peziza ciliaris* Fr. Op doode afgevallen Eikenbladen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 89; Rabenh. p. 363)

In Herb. Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

2832¹. *Pez. diversicolor* Fr. Op ouden verdroogden koe-drek. Aut. (Fr. Syst. II. p. 88; Rabenh. p. 363)

In Herb. Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

2840¹. *Pez. sanguinea* Pers. Op rottend hout. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 110; Rabenh. p. 356)

In Herb.: Utrecht, Dz. et Mb. (v. s.)

2845¹. *Pez. inflexa* Bolt. Op doode stengels van groote kruidgewassen. Verc. (Bolt. Halif. III. p. 106. Tab.

106. f. 2; Fr. Syst. II. p. 120; Rabenh. p. 353)
In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

2845². Pez. striata Nees. Op doode stengels van Brandnetels. Vere. (Fr. Syst. II. p. 122; Rabenh. p. 352; Rabenh. Fung. Eur. n°. 221)

In Herb.: Warmond, de Haan in Herb. De Vr. (v. s.)

2845³. Pez. albida Rob. Op doode afgevallen bladstelen van Esschen. Vere. Aestate.

Sparsa aut laxe gregaria, stipitata, fragilis. Cupula minuta, eburnea, acetabuliformis, dein plana, margine integerrimo; stipite crassiusculo, basi rufo; ascis clavatis; sporidiis hyalinis, oblongis, obtusis, subcylindricis; sporulis 2—3. (Rob. in Desmaz. 19e not. Cr. de Fr. p. 28; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 2004)

In Herb.: 't Bosch te Zalk, R. Bond. (v. v. et s.)

2850¹. Pez. Rubi var. *herbicola* Rabenh. Op doode stengels van groote kruidgewassen. Vere. (Rabenh. Fung. Eur. n°. 218)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.)

Obs. Peziza Rubi ei herbarum proxima, sed differt a priori colore laete- et fulvo-sulphureo nec non jam loco natali, a posteriori stipite breviore verruciformi.

2851¹. Peziza lacustris Fr. Op doode halmen van *Scirpus lacustris*. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 143; Rabenh. p. 347)

In Herb.: Amsterdam, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

2852². Pez. neglecta Lib. Op doode stengels van Brandnetels. Vere.

Erumpenti-superspecialis, cupulis primum concavis demum planiusculis, marginatis; margine fusco; disco aurantio-rubro; ascis clavaeformibus paraphysibus immixtis; sporidiis ovatis. (Lib. Pl. Cr. Ard. n°. 29. Pez. fusariooides Berk.; Desmaz. Pl. Cr. fr. n° 1063)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

Obs. Inter *Cylindrocollam Urticæ* frequenter occurit cum quo facile confundi potest; sed notis allatis valde differt.

- 2852³. Pez. Hederae** Lib. Op stervende en doode bladen van *Hedera Helix*. Per annum.

Dense sparsa, innato-erumpens, orbicularis, pallido-nigricans, laciniis quatuor epidermidis cincta, disco submolli viridi-olivaceo; ascis clavatis; sporidiis ovoideis hyalinis. (Lib. Pl. Cr. Ard. n°. 229; Pez. insidiosa Desmaz.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 2852⁴. Pez. sphæroides** v. *Lychnidis* Desmaz. Op doode stengels van *Lychnis dioica* en *sylvestris*. Vere. (Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 174. Sine descr.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

- 2852⁵. Pez. graminis** Desmaz. Op doode bladen en halmen van verschillende Grassoorten. Vere.

Sparsa, erumpens, sessilis, ceraceo-mollis, minima, glabra, concava, umbrina; disco griseo-pallente; margine villosiusculo albo; ascis clavatis, minutis; sporidiis oblongis, linearibus. (Desmaz. 8^e not. Crypt. de Fr. p. 5, Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 1066)

In Herb. Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 2852⁶. Peziza arenivaga** Desmaz. Op rottende bladen van *Psamma arenaria*. Hieme. Vere.

Foliicola, erumpens, minuta, sparsa, ceraceo-mollis, glabra, sessilis, junior globosa, adulta plana, extus fulva, margine elevato tumidiusculo, fulvo, sicco nigro. Disco aquoso, subalbido, sicco brunneo. Ascis clavatis, subcylindricis, inter paraphyses simplices erectis; sporulis octonis, oblongo-ovoideis, hyalinis, utrimque obtusis. (Desmaz. 20^e not. Cr. inéd. de Fr. pag. 19)

In Herb.: Hollandsche duinen, v. d. B. (v. s.)

- 2852⁷. Pez. arduennensis** Mont. Op doode wilde Rozen-takken. Hieme. Vere.

Sparsa, crassiuscula. Cupula sessilis, planiuscula, marginata, flavo-cerina; disco pulverulento, margine demum evanescente; ascis clavaeformibus; sporidiis oblongatis biseptatis. (Mont. Syll. gen. spec. Crypt. p. 186. Patellaria Rubi Lib. Pl. Cr. Ard. n°. 231)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.

d. *Patellea*. (Sessilis, ceraceo-lenta, marginata.)

2852⁸. **Pez. salicaria** Pers. Op rottend hout in holle Wilgentronken. Hieme. Vere. (Pers. Myc. Eur. I p. 308; Pez. flexella b. salicaria Fr. Syst. II. p. 152)

In Herb.: Willemspolder, Dz. et Mb.; Amsterdam, v. d. S. Lac.

2854¹.

STICTIS Pers.

St. radiata Pers. Op een ouden stervenden Lindestam. Aut. Aest. (Fr. Syst. II. p. 194; Rabenh. p. 333) Variat:

a. *major* (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 1532)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

2854².

NAEVIA Fr.

Discus innatus, applanatus, maculaeformis, immarginatus, epidermide secedente tectus; sporae simplices, ascis clavatis recepta. (Fr. Summ. Veg. p. 373)

N. valvata Mont. Op doode bladen van *Psamma arenaria*. Aut. Hieme.

Innata, elliptico-oblonga, tecta, demum epidermide circumscissa elapsa nuda; hymenio (disco) submarginato nigro; ascis filiformibus sporas globosas uniseriatas foventibus. (Mont. Syll. gen. spec. Crypt. p. 198;

Stictis valvata Mont. Ann. des Sc. nat. 2 Sér. T. VI.
p. 337)

In Herb.: Hollandsche duinen, v. d. B. (v. v. et s.)

2855¹.

TYMPANIS Tode.

T. conspersa Fr. Op afgestorven takken van
Sorbus Aucuparia, *Pirus Malus*, etc. Per annum.
(Fr. Syst. II. p. 175; Rabenh. p. 336)

In Herb.: Amsterdam, Oudem. (v. v. et s.)

2855².

CATINULA.

C. turgida Desmaz. Op afgestorven schors van
Corylus Avellana. Aest. Aut. (Excipula turgida Fr.
Syst. II. p. 189; Rabenh. p. 152)

In Herb.: Hulst, West. (v. v. et s.)

Ord. Gasteromycetes.

* **Angiogasteres.**

Trib. Phalloideae.

PHALLUS Mich.

- 2856. Ph. impudicus** L. In bosschen op vochtige en moerassige plaatsen. Jul. Aug. (Fr. Syst. II. p. 283; Rabenh. p. 307)

In Herb.: Noordwijk aan zee, Dz. et Mb. Bovendien: Bosch van Wolfhezen, Un. 1847; Velp, Un. 1849; Nijmegen, Abel.; Rotterdam, Oudem. (v. v. et ic.)

- 2857. Ph. caninus** Huds. In bosschen aan en bij vermolmde tronken (van *Corylus*) Aut. (Fr. Syst. II. p. 285; Rabenh. p. 307)

In Herb.: Abtspoel bij Leiden, Dz. et Mb. Bovendien: Zeist, Oudem. (v. v.)

Trib. Clathracei.

CLATHRUS Mich.

- 2858. C. cancellatus** L. Op vochtige plaatsen, aan moerasen en waterkanten. (Fr. Syst. II. p. 288; Rabenh. p. 306)

Leiden (eenmaal aan den waterkant in den Hortus academicus, Dz. et Mb.) (v. v.)

Trib. Nidulariacet.**CYATHUS Hall.**

- 2859. C. striatus** Willd. In bosschen en op beschaduwde plaatsen, tuschen en aan afgevallen bladen, takken, enz. Aut. (Rabenh. p. 306; Nidularia Fr. Syst. II. p. 298; Dz. et Mb. in Bijdr. XI p. 392)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Renkom, Buse. Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v. et s.)

- 2860. C. Olla** Pers. Aan takken, spaanders, ruigten, enz., op vochtige plaatsen. Oct. Nov. (Rabenh. p. 305; Cyath. vernicosus Dec.; Nidularia campanulata Fr. Syst. II. p. 298; Dz. et Mb. l. l. p. 392)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Amsterdam, v. d. S. Lac; Bosch te Zalk, R. Bond.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. s. et ic.)

- 2861. C. Crucibulum** Hoffm. Op rottende Dennenplanken en palen. Aut. (Rabenh. p. 305; Nidularia Fr. Syst. II. p. 299; Dz. et Mb. l. l. p. 392)

In Herb.: Leiden en Haarlem, Dz. et Mb.; Groningen, Strat.; Amsterdam, v. d. S. Lac; Wassenaar, v. d. B. (v. v.)

Trib. Carpobolei.**SPHAEROBOLUS** Tode.

- 2862. S. stellatus** Tode. Aan hontzaagsel, spaanders, enz., op vochtige plaatsen. Aut. (Rabenh. pag. 303; Fr. Syst. II. pag. 309)

In Herb.: Leiden, in den Hortus academicus, Dz. et Mb.; Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v.)

THELEBOLUS Tode.

- 2863. T. stercoreus** Tode. Op ouden koemest. Aug. Sept. (Fr. Syst. II. p. 307; Rabenh. p. 304)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s. et ic.)

** **Trichomyctes.****A. Trichogasteres.****Trib. Geastrides.****GEASTER** Mich.

- 2864. G. hygrometricus** Pers. Op zandige heuvelen in Dennenbosschen. Aut. (Rabenh. p. 301; Fr. Syst. III. p. 19.)
In Herb.: Wageningen, Buse. (v. v. en s.)

- 2865. G. rufescens** Fr. In bosschen in zandige streken. Aut. (Fr. Syst. III. p. 18; Rabenh. p. 302)
In Herb.: in 't Haagsche bosch, Bisschop; Haarlem, Dz. et Mb. (v. v.)

- 2866. G. mammosus** Fr. Op gelijke plaatsen als de vorige. Aut. (Fr. Syst. III. p. 17; Rabenh. p. 302; Fl. Bat. tab. 750, 1).
In Herb.: Haarlem, Dz. et Mb. Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v. et ic.)

- 2867. G. fimbriatus** Fr. Op bedekte plaatsen op schralen zandgrond. Aut. (Fr. Syst. III. p. 16; Rabenh. p. 302)
In Herb.: Haarlem en 's Hage, Dz. et Mb. (v. v.)

Trib. Lycoperdacei.**BOVISTA** (Dill.) Fr.

- 2868. B. nigrescens** Pers. Op grazigen zandgrond. Aug. Sept. (Fr. Syst. III. p. 23; Rabenh. p. 301)

In Herb.: Haarlem, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v. et s.)

- 2869. B. plumbea** Pers. Op gelijke plaatsen als de vorige, in de duinen. Maj. Jun. Sept. (Fr. Syst. III. p. 24; Rabenh. p. 300)

In Herb.: Haarlem en Leiden, Dz. et Mb.; Wieringen, v. d. S. Lac.; Walcheren, v. d. B.; Beuningen en Weurt, Abel. Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v. et s.)

LYCOPERDON (Tourn.) Fr.

- 2870. L. piriforme** Rupp. In bosschen, enz., op zandgrond (soms aan vermolmde tronken) groote zoden vormend. Vere. Aut. (Fr. Syst. III. p. 38; Rabenh. p. 298)

In Herb.: Leiden en Wassenaar, Dz. et Mb.; Kampen, R. Bond.; Zwake, v. d. B. (v. v. et s.)

- 2871. L. gemmatum** Batsch. In bosschen en op beschaduwde plaatsen in zandige streken. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 36; Rabenh. p. 298) Variat.

a. *excipuliforme* Scop. In Herb.: Leiden, Oudem.; Wassenaar, Dz. et Mb. Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v.)

b. *perlatum* Pers. In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuidwijk bij Leiden, v. d. S. Lac. Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v. et s.)

c. *echinatum* Pers. In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Renkom, Busse. (v. v.)

d. *hirtum* Mart. In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)

e. *furfuraceum* Fr. In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. Bovendien: Nijmegen (Weurt), Abel. (v. v. et s.)

f. *papillatum* Schaeff. In Herb.: Westland, v. d. Tr. (v. s.)

- 2872. L. saccatum** Fl. Dan. Op beschaduwde plaatsen, in bosschen, enz., in zandige vochtige streken. Aut. (Fr. Syst. III. p. 35; Rabenh. p. 299)

In Herb.: Voorschoten bij Leiden, Dz. et Mb. Bovendien: Weurt bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)

- 2873. L. Bovista** Linn. In weilanden en op grazige gronden. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 29; Rabenh. p. 299)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Amsterdam, v. d. S. Lac.

- 2874. L. coelatum** Bull. In weilanden en op grazige plaatsen en zandgronden. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 32; Rabenh. p. 300)
In Herb.: Voorschoten bij Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Meerwijk bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)

- 2875. L. pusillum** Batsch. Op grazige plaatsen aan dijken en wegen, in bosschen en weilanden. *Sept. Oct.* (Fr. Syst. III. p. 33; Rabenh. p. 300)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.
Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v. s. et ic.)

- 2876. L. molle** Pers. Op de aarde in Dennenbosschen. Aut.
Subparvum, saepe solitarium, peridio turbinato piriformi rufescente, superne papillis caducis furfuraceis minutis acutisque confertissimis obruto, caule glabriusculo. Pers. in Chev. fl. Par. I. pag. 353. Tab. 10 fig. 2.
In Herb.: Renkom, Buse. (v. v. et s.).

- 2877. L. hiemale** Bull. Op grazige plaatsen. Aut.
Paulo minus, peridio subsphaericō regulari glabriusculo ex albido fuscescente, verrucis in junioribus minutis confertis demum sparsioribus subfurfuraceis caducis, caule subobeso plicato. Bull. Champ. Tab. 72 et Tab. 475. E. (Chev. fl. Par. pag. 355)

In Herb.: Renkom, Buse. (v. v. et s.)

- 2878. L. turbinatum a. lividum** Pers. Op grazige plaatsen in de duinen. Aut. Vere.
Turbinatum basi crassa productum brunneum nit-

duin, verrucis exiguis persistentibus (Pers. in Journ. Bot. 1809. Tom. II. Tab. 1 fig. 3.4.5; West. Herb. Crypt. Belg. n° 1264)

In Herb.: Katwijk, Wttw. (v. s.)

TULOSTOMA Pers.

- 2879. T. mammosum** (Mich) Fr. Op mosachtige plaatsen in de duinen. Aut. (Fr. Syst. III. pag. 42; Rabenh. p. 297; Fl. Bat. Tab. 750. 2)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; 's Hage, Oudem.; Katwijk, Wttw.; Overveen, Wassenaar, Dz. et Mb. Bovendien: Naaldwijk, v. d. Tr. (v. v. et s.)

Trib. Sclerodermacei.

SCLERODERMA Pers.

- 2880. S. vulgare** Fr. In bosschen, op bouw- en weilanden, enz. (soms aan oude boomtronken). Aut. (Fr. Syst. III. p. 46; Rabenh. p. 295)

In Herb.: Leiden, het Haagsche bosch, Dz. et Mb. Bovendien: Westland, v. d. Tr.; Nijmegen (Wychen), Abel. (v. v. s. et ic.)

- 2881. S. verrucosum** Pers. Op schralen zanderigen boschgrond. Aut. (Fr. Syst. III. p. 49; Rabenh. p. 297; S. pedunculatum Dz. et Mb. in Bijdr. V. Tijdschr. Nat. Hist. XI. p. 398)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Hilversum, M. D.; Bij de Bilt en Zeist, het Haagsche bosch, v. d. S. Lac. (v. v. et s.) Variat:

- β. spadiceum* Schaeff. Minus, reniforme, saepe sessile. (Fr. l. l.)

In Herb.: Stadwijk bij Leiden, Dz. et Mb.; in het bosch te Muiden, v. d. S. Lac. (v. s. et ic.)

Trib. Cenococcet.**CENOCOCCUM Fr.**

- 2882. C. geophilum** Fr. Op beschaduwde hei- en zandgronden. Per annum. (Fr. Syst. III. p. 66; Rabenh. p. 289)

In Herb.: Voorschoten bij Leiden, Dz et Mb.; Lisse, Oudem. (v. v.) Variat.

β . *Byssisedum* Fr. l. l. Leiden, met de soort, Dz. et Mb.

B. Trichodermaceæ.**Trib. Trichodermei.****HYPHELIA Fr.**

- 2883. H. terrestris** Fr. Op vochtige aarde in duistere bosschen. Vere. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 213; Rabenh. p. 287)

In Herb.: Leiden, Dz et Mb. (v. v. et ic.)

- 2884. H. nigrescens** Fr. Op rottende Esschentronken. Aut. et Vere. (Fr. Syst. III. p. 212; Rabenh. p. 287)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)

- 2885. H. rosea** Fr. Op rottend Populierhout. Vere. (Fr. Syst. III. p. 211; Rabenh. p. 288)

In Herb.: Maastricht, Franq.

PILACRE Fr.

- 2886. P. Petersii** Berk. et Curt. Op rottende schorsen. Hieme.

Stipite breviore candido, capitulo magno, floccis subrectis, sporis minutis sphaericis, vix pallide fuscescens-tibus. (Rabenh. Fung. Eur. n° 268)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

TRICHODERMA Pers.

- 2887. T. dubium** Alb. et Schw. Aan rottende Berkenstammen. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. pag. 216; Rabenh. p. 287)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.); Harderwijk, Jung h. in Herb. Dev.

- 2888. T. viride** Pers. Aan oude boomtronken en op vochtig liggend hout. Aut. (Fr. Syst. III. pag. 215; Rabenh. p. 286)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 2889. T. aeruginosum** Chev. Op rottende boomschors. Aut. Vere.

Expansum, sporularum acervis aeruginosum. (Chev. Fl. Par. I. p. 54. Tab. 5. fig. 4. d.)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

Trib. Aegeritei.**Aegerita Pers.**

- 2890. A. candida** Pers. Aan rottende boomstammen. Aut. (Fr. Syst. III. p. 219; Rabenh. p. 285)

In Herb.: Maastricht, Franq.

C. Myxogasteres.**Trib. Physarei.****LEOCARPUS Link.**

- 2891. L. vernicosus** Link. Op stervende grashalmen, doode bladen en takken, in Dennenbosschen. Vete et autumno. (Rabenh. pag. 284; Diderma vernicosum Pers.; Fr. Syst. III. p. 102)

In Herb.: Leiden (Zuidwijk), Bourse W.; Un. 1850. (v. v. et s.)

DIDERMA Pers.

- 2892. D. testaceum** Pers. Op *Hypnum confertum* in holle Wilgen. Aut. (Fr. Syst. III. p. 107; Rabenh. p. 282; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 706)
In Herb.: Amsterdam, Oudem.
- 2893. D. difforme** Summerf. Op doode bladen en stengels van groene planten. Aut. (Fr. Syst. III. p. 106; Rabenh. p. 283)
In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)
- 2894. D. spumariooides** Fr. Aan grashalmen, bladen, takjes, enz., in bosschen. (Fr. Syst. III. p. 104; Rabenh. p. 283)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)

DIDYMIUM (Schrad.) Fr.

- 2895. D. cinereum** (Batsch) Fr. Aan vermolde hout in holle Wilgentronken. Aut. (Fr. Syst. III. p. 126; Rabenh. p. 279)
In Herb.: Zwake, Goes, v. d. B.; Leiden, Dz. et Mb., Oudem. — Bovendien: Westland, v.d.Tr. (v. v.)
- 2896. D. farinaceum** Pers. Aan rottend hout, bladen, mossen, enz. Aut. (Fr. Syst. III. p. 119; Rabenh. p. 280)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., Wttw. (v. v.)
- 2897. D. nigripes** Link. Aan vermolmd hout, bladen, enz. — Aut. (Fr. Syst. III. p. 119; Rabenh. p. 281)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)
- 2898. D. herbarum** Fr. Op rottende stelen en bladen van groene planten. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 120; Rabenh. p. 281)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v.)

- 2899. D. praecox** Dubary. Op rottende bladen van Appel- en andere fruitboomen. Aut. (Rabenh. Fung. Eur. IV. no. 367)
In Herb.: Leiden, Wttw. (v. s.)

PHYSARUM Pers.

- 2900. Ph. sinuosum** (Weinm.) Fr. Op levende bladen levermossen. Aest. (Fr. Syst. III. p. 145; Rabenh. p. 273)
In Herb.: Beekbergerwoud, v. d. S. Lac. (v. s.)
- 2901. Ph. bryophilum** Fr. Aan *Hypnum purum* en andere blad- en levermossen. Aut. (Fr. Syst. III. p. 135; Rabenh. p. 275)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)
- 2902. Ph. nutans** Pers. Aan vermolmd hout. Aut. (Fr. Syst. III. p. 128; Rabenh. p. 277)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)
- 2903. Ph. albipes** Link. Op vermolmd hout, bladen en rottende planten. Aut. (Fr. Syst. III. p. 130; Ph. nutans s. albipes Rabenh. p. 278)
In Herb.: Kampen, R. Bond. (v. s.) Variat:
β. sessile Dubary. In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)

CRATERIUM Trentep.

- 2904. C. pedunculatum** Trentep. In bosschen op rottende takken en bladen van Eiken en Beuken. Aut. (Fr. Syst. III. p. 150; Rabenh. p. 271)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Haarlem, Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v.)
- 2905. C. minutum** Fr. Aan mossen, korstmossen, bla-

den, takjes, enz. Aut. (Fr. Syst. III. p. 151; Rabenh. p. 271)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.) Variat:

$\beta.$ *aureum* (Fr. Syst. III. p. 152). Op *Hypnum praelongum*. In Herb.: Leiden, Wttw. (v. v.)

2906. C. leucostictum Chev. Aan oude boomstammen op mossen (*Leskeas sericea*). Sept. (Fr. Syst. III. pag. 152)

Peridio pyriformi erecto candicante, operculo convexo concolore, stipite brevi laevi, sporidiis atris.

Priori perquam affine. Stipes peridio triplo brevior fulvescens; peridium junius plumbeo-lividum dein candicans; margo saepe laceratus. Fr. l. l.

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

Trib. Stemonitidei.

DIACHEA Fr.

2907. D. elegans Fr. In bosschen en op beschaduwde plaatsen aan dorre stengels en bladen. Aut. (Fr. Syst. III. p. 156; Rabenh. p. 270)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. s. et ic.)

STEMONITES Gled.

2908. t. fusca Roth. Aan oude tronken en vermolmde stammen. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 157; Rabenh. p. 268)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. Bovendien: Westland (Naaldwijk), v. d. Tr. (v. v. et s.) Variat:

$\beta.$ *tubulina* Fr. l. l. Op de bladen van een *Pandanus*. In Herb.: Utrecht in den Hort. Acad., Dz. et Mb.

- 2909.** **St. obtusata** Fr. Op rottend hout van Esschen.
Aut. (Fr. Syst. III. p. 160; Rabenh. p. 269)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.
- 2910.** **St. typhoides** Dec. In holle Wilgen en aan vermolmd hout. Aut. (Fr. Syst. III. p. 158; Rabenh. p. 269)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v.)
- 2911.** **St. ovata** Pers. Op vermolmd hout. Aut. (Fr. Syst. III. p. 160; Rabenh. p. 269)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.

DICTYDIUM Schrad.

- 2912.** **D. umbilicatum** Schrad. In holle Wilgentronken. Sept. Oct. (Fr. Syst. III. p. 165; Rabenh. p. 267)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Leiden, Wttw. (v. v. et s.)
- 2913.** **D. ambiguum** Schrad. Op rottende Dennentronken.
Aut. (Fr. Syst. III. p. 165; Rabenh. p. 267)
Leiden, Wttw. (v. ic.)
- 2914.** **D. splendens** Schrad. Op rottende stammen van Dennen en Beuken. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 166; Rabenh. p. 267)
Leiden, Wttw. (v. ic.)
- 2915.** **D. microcarpum** Schrad. Op rottend Dennen-hout. Aut. (Fr. Syst. III. p. 166; Rabenh. p. 268)
Leiden, Wttw. (v. ic.)

Trib. Trichiacei.

TUBULINA Pers.

- 2916.** **T. cylindrica** Dec. Op rottend hout en de schors-

van verschillende boomen. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 195; Rabenh. p. 264)

In Herb.: Leiden, Wtzw.; Zuid-Beveland (Goes) v. d. B.

- 2917. *T. fragiformis* Dec.** Op rottend hout, in holle Wigen, aan bladen, takjes, mossen, enz. — Aut. (Rabenh. p. 264; Licea fragiformis Fr. Syst. III. p. 196)
In Herb.: Nieuwersluis, v. d. S. Lac. (v. s.); Zuid-Beveland, v. d. B.

- 2918. *T. pulvinata* Lév.** Op de schors van boomen. Aut.
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

PERICHAENA Fr.

- 2919. *P. strobilina* Fr.** Onder de schubben van rottende Pijnkegels. Aut. (Fr. Syst. III. pag. 190; Rabenh. p. 262)
In Herb.: Haarlem, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 2920. *P. populina* Fr.** Onder en op de rottende schors van Populieren. Aut. (Fr. Syst. III. p. 191; Rabenh. p. 262)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland (Goes) v. d. B.; Katwijk, Wtzw.

TRICHIA Hall.

- 2921. *T. varia* Pers.** Op run van broeibakken, aan vermolmd hout, enz. — Per totum annum. (Fr. Syst. III. p. 188; Rabenh. p. 259)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Rotterdam, Oudem. (v. v.)
- 2922. *T. chrysosperma* Dec.** Aan vermolmd hout in rottende bladhoopen. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 187; Rabenh. p. 259)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., Wttw.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. — Bovendien: Westland (Naaldwijk) v. d. Tr. (v. v. et s.).

- 2923.** *T. turbinata* With. Aan vermolmd Wilgenhout. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 187; Rabenh. p. 260; Fl. Bat. Tab. 809. 2)
Naaldwijk, v. d. Tr. (n. v.)

- 2924.** *T. Neesiana* Cord. Aan vermolmd Wilgenhout. Aut. (Cord. Ic. Fung I. p. 23. Tab. VI. fig. 288; Rabenh. pag. 260)
In Herb.: Leiden, Wttw. (v. s.)

- 2925.** *T. scabra* Dubarry. Op vermolmd hout. Aut.
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; 't Haagsche Bosch, G. B.

- 2926.** *T. rubiformis* Pers. In holle Wilgentronken. Oct. (Fr. Syst. III. p. 183; Rabenh. p. 261).
Zuid-Beveland, v. d. B. (v. ic.)

ARCYRIA (Hill) Pers.

- * **2927.** *A. nutans* Dec. Aan vermolmd Wilgenhout. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 180; Rabenh. p. 257)
In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.); Leiden, Dz. et Mb.

- 2928.** *A. incarnata* Pers. Aan vermolmde boomtronken. Aug. (Fr. Syst. III. p. 178; Rabenh. p. 258)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 2929.** *A. punicea* Pers. Op rottend hout. Juli—Aug. (Fr. Syst. III. pag. 177; Rabenh. p. 258)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; 't Sas van Gend, Walrav. (v. s.)

Trib. Aethalini.**LYCOGALA Mich.**

- 2930. *L. epidendrum* Buxb.** Aan vermolmde boomtronken, in holle Wilgen, aan oude palen, enz. — Vere. Aut. (Fr. Syst. III. pag. 80; Rabenh. p. 256; Fl. Bat. Tab. 805. 2)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Nichtevecht, Utrecht, v. d. S. Lac.; Renkom, Buse; Zuid-Beveland, v. d. B. — Bovendien: Westland (Naaldwijk), v. d. Tr. (v. v. et s.)

- 2931. *L. parletinum* Fr.** Aan vochtig rottend hout en papier (aan oude vochtige bepleisterde muren). Aut. (Fr. Syst. III. pag. 83; Rabenh. pag. 257)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)

RETICULARIA Bull.

- 2932. *R. muscorum* (A. et S) Fr.** Op mossen, bladen, enz., op vochtige, beschaduwde plaatsen. Aut. (Fr. Syst. III. p. 91; Rabenh. pag. 255)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v.)

- 2933. *R. umbrina* Fr.** Aan oude Dennenpalen, -tronken, enz. (Fr. Syst. III. p. 87; Rabenh. p. 255). Aest. Aut.

Westland (Naaldwijk), v. d. Tr. (v. s. et ic.)

AETHALIUM Link.

- 2934. *A. septicum* Fr.** Op de run in broeibakken en oranjeriën. Vere et Aut. (Fr. Syst. III. p. 93; Rabenh. p. 253)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. — Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v.)

SPUMARIA Pers.

- 2935. S. alba** Dec. Op weilanden, aan wegen, enz., grashalmen en plantenstengels overtrekkend. Jul.—Sept. (Fr. Syst. III. p. 95; Rabenh. p. 253)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. — Bovendien: Westland, v. d. Tr. (v. v. et s.)

*** **Sclerotiacae.**

Trib. Sclerotiacet.

ACROSPERMUM Tode.

- 2936. A. compressum** Tode. Op doode stengels (vooral op die van *Urtica* en *Carduus*). Aut. (Fr. Syst. II. p. 245; Rabenh. p. 244)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 2937. A. graminum** Lib. Op doode bladen van Grassen (*Poa* en *Elymus*). Aut. (Rabenh. p. 244; Lib. Pl. cr. Arduenn. no 33.)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

SCLEROTIUM Tode.

- 2938. S. Clavus** Fr. Aan de aren van verschillende Gramineën. Aest. (Fr. Syst. II. p. 269; Rabenh. p. 238). Variat.

- α. *Secales* Rabenh. l. l. In Herb.: Geertruydenberg, Verkouteren; Apeldoorn, v. d. S. Lac.; Nijmegen, Abel. (v. s.)
- β. *Triticci* Wallr. In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.); Maastricht, Franq.
- γ. *Lolii* Wallr. In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Amsterdam, Oudem. (v. v. et s.)

- δ. *Agropyri* West. (In Herb.) Op *Agropyrum repens*.
 In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)
 ε. *Arundinis* West. (In Herb.) Op *Arundo Phragmites*.
 In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.
 η. *Glyceriae* West. (In Herb.) Op *Glyceria aquatica* en
 fluitans.
 In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Leesten, Abel. (v. s.)
2939. S. Pustula Dec. Op doode Eikenbladen. Aut. (Fr. Syst. II. pag. 260; Rabenh. p. 239)
 In Herb.: Haarlem, Oudem. (v. s.). Variat:
 β. *epicaula* West. Op doode Aardappelstengels.
 In Herb.: Westland (Naaldwijk), v. d. Tr.
2940. S. albidum Rob. Op doode Wijngaardranken.
 Vere et Aut.
 Erumpens, minutum, rotundatum, dein oblongum,
 confluens, convexum, albidum, sublaeve, siccum de-
 pressum, intus concolor. (Rob. in Desmaz. Pl. Crypt.
 de Fr. Nouv. Edit. n° 567)
 In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)
2941. S. durum Pers. Op doode stengels van groene
 planten. Aut. (Fr. Syst. II. p. 259; Rabenh. p. 239)
 Variat:
 a. Op *Solanum tuberosum*. In Herb.: Leiden, Dz. et
 Mb.; Maastricht, Franq.
 b. Op *Anethum Foeniculum*. In Herb.: Goes, v. d. B.;
 Groningen, Strat.
 c. Op *Heracleum Sphondylium*. In Herb.: Leiden, Oudem.; Utrecht, v. d. S. Lac.
 d. Op *Convolvulus Sepium*. In Herb.: Amsterdam, v. d. S.
 Lac.; Ubbergen bij Nijmegen, Abel.
 e. Op *Polygonum aviculare*. In Herb.: Zuid-Beveland,
 v. d. B.; Amsterdam, v. d. S. Lac.
 f. Op *Aster Tripolium*. In Herb.: Amsterdam v. d. S.
 Lac. (v. v. et s.)

- 2942. S. leiodermum** Rob. Op doodde stengels van *Polygonum Persicaria*, dikwijls in g zelschap van *S. durum*. Vere.

Adnatum, laxe gregarium, minutum, rotundatum ovatumque, confluens, nigrum, laeve, nitidulum, intus album. (Rob. in Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. Nouv. Ed. no 568)

In Herb.: Leiden, in den Hortus academ., J u n g h.

- 2943. S. Liliacearum** West. Op de zaadhuisjes en stengels der Liliaceen. Vere.

Sparsum, adnatum, parvum, ovale, pallide fuscum, laeve, demum nigrum, rugosum, intus album (S. *Tulipae* Lib. Pl. Crypt. Arduenn. no 36). Variat:

β. Scillae West. In Herb. Cr. Belge. Op *Scilla nutans* en *Allium vineale*.

In Herb.: Dongen (Noord Braband). (v. s.)

γ. Tulipae West. Op wilde en gekweekte Tulpen. Maastricht, Franq. (n. v.)

- 2944. S. compactum** Dec. Op den bloembodem, de vruchten en de zaden van de Cucurbitaceen en de Helianthideen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 258; Rabenh. p. 239). Variat:

β. Helianthi Rabenh. l. l. In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 2945. S. pirinum** (Nees) Fr. Op rottende vruchten (kweeën, appelen, enz.) Vere. (Fr. Syst. II. p. 258; Rabenh. p. 240)

In Herb.: Utrecht, W t t w. (v. s.)

- 2946. S. varium** Pers. Op aardappelen, gele wortelen en rapen, in kuilen en kelders. Vere. (Fr. Syst. II. p. 257; Rabenh. p. 240)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 2947. S. muscorum** Pers. Aan de wortels van ver-

schillende mossoorten, op vochtige en beschaduwde plaatsen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 252; Rabenh. p. 241)

- 2948.** **S. fibrillosum** Lib.? Op de run in broeibakken en oranjeriën. Aut. Vere.

Tectum, magnum, difforme, durum, primo laeve album, demum corrugatum umbrinum, intus stuppeo-fibrosum, fibrillis ramosis repentibus candidis instructum. (Lib. Pl. Crypt. Ard. n° 139)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.

- 2949.** **S. Semen** Tode. Op en in doode stengels van *Solanum tuberosum* en *Arctium Lappa*, op rottende Populierbladen en afgevallen zaadhuisjes van *Fraxinus*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 249; Rabenh. p. 243)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Haarlemmerhout, De Haan; Amsterdam, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq; Westland, v. d. Tr. (v. v. et s.)

- 2950.** **S. Pezizaeforme** Schum. Op doode Populierbladen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 248; Rabenh. p. 243)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 2951.** **S. scutellatum** Alb. et Schw. Op rottende bladen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 248; Rabenh. p. 243)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 2952.** **S. complanatum** Tode. Op rottende Populierbladen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 248; Rabenh. p. 243)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.; Utrecht, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 2953.** **S. crustuliforme** Rob. Tusschen de vezels der bladstelen van verschillende boomen. Vere.

Tectum, minutum, ovatum vel ellipticum, applanatum, siccum, rugulosum, primo pallidum, demum brunneo-castaneum; intus album. (Rob. in Desmaz.

15e notice sur les pl. crypt. de Fr. in Ann. des Sc. Nat. 3e Série. T. IX. p. 346; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 2046). Variat:

β. *Iridis* West. 8e Not. Cr. inéd. Belg. n° 23. Tusschen de vezels van rottende Irisbladen. In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

2954. *S. medullosum* Rob. Op doode Olmtakken. Vere.

Erumpens, subtectum, minutum, ovatum vel ellipiticum, primo convexum pallide-griseum, basi tenui byssinae insidens, demum depresso nigrescens, intus medullosum sordide albido-ochroleucum. (Rob. in Desmaz. 22e Notice sur les pl. crypt. de Fr. in Ann. des Sc. Nat. 3e Série. T. XX. n° 33. — Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. Nouv. Série. n° 160)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

2955. *S. variegatum* Wallr.? In de stengels van groote groene planten. Vere.

Pseudo-stromate ovato-subgloboso adnato, dein elongato ruguloso ex albo-nigroque variegato, intus corneo-albo. (Wallr. Comp. Fl. Germ. IV. p. 139).

In Herb.: Holland, Kros (v. s.)

2956. *S. Sinapispermum* West. Op vochtige run in broeibakken. Aut. Vere.

Péridium sphérique, d'un demi à un millimètre de diamètre; à l'état frais jaunâtre, plus ou moins orangé, lisse et adhérent par un point; à l'état sec libre, d'un rouge brun et légèrement chagriné à la surface. Chair blanche et cornée. West. 8e Not. Crypt. inéd. de la Fl. Belg. n° 24, pag. 8.

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

MELAMPSORA Cast.

Spores? ou Sporanges? cylindriques, parallèles, souvent de consistance cornée, arrondies aux deux extré-

mités ou accompagnés à la base par une ou deux utricules arrondies. (Castagne Cat. Pl. de Mars. p. 206)

- 2957. M. Euphorbiae** Cast. Op treurende bladen van sommige soorten van *Euphorbia*. Aut. (Sclerotium herbarum β. Euphorbiae Kze., Fr. Syst. II. p. 263)

In Herb.: Leiden, Overveen, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Ewijk, Abel. — Bovendien: Maastricht, Franq. (sub nom. *Rhytisma Euphorbiae*).

- 2958. M. Populneum** Cast. Op doode Populierbladen. Aut. (Selerotium Populneum Pers., Fr. Syst. II. p. 262; Perisporium Rabenh. p. 228)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., Oudem.; Utrecht, Wttw. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 2959. M. Salicinum** Desmaz. Op treurende Wilgenbladen. Aut. (Sclerotium Salicinum Dec., Fr. Syst. II. p. 262; Perisporium Rabenh. p. 228)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

Trib. **Perisporei.**

PODOSPHAERA Lev. (Erysiphe Fr.)

Mycelium effusum arachnoideum plerumque evanidum. Conceptacula sphaerica sporangio unico, subgloboso, octosporo fareta; sporae ovatae. Appendiculae parcae (3—8), dichotomae, fuscae, apice turgidae, hyalinae. (Lév. Org. et Disp. méth. du G. Erysiphe in Ann. des Sc. Nat. 3e Sér. Tom. XV. p. 109)

- 2960. P. clandestina** A. Crataegi Lev. l. l. Op de levende bladen van *Crataegus Oxyacantha*. Aest. (Erysiphe Oxyacanthae Dec., Rabenh. p. 237; Fr. Syst. III. p. 238).

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

SPHAEROTHECA Lev. (Erysibe Rebent.)

Mycelium arachnoideum floccosum effusum plerumque persistens. Conceptacula globosa, sporangio unico vesiculoso octosporo fareta; sporae ovatae. Appendiculae numerosae floccosae cum mycelio intertextae. (Lev. l. l.)

- 2961.** **S. pannosa** Lev. Op de takken, bladen en bloemkelken der Rozen. Aest. (Erysibe pannosa Link., Fr. Syst. III. p. 236; Rabenh. p. 230)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Weurt bij Nijmegen, Abel.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Rotterdam, Oudem.

- 2962.** **S. Castagnel** Lev. Op levende bladen van verschillende groene planten. Aest. Variat:

a. *Compositarum* Lev. Op de bladen van *Senecio vulgaris*. (Erysibe communis d. Compositarum Rabenh. p. 233; Fr. Syst. III. p. 247). In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

b. *Veronicarum* Lev. l. l. Op de bladen van *Veronica longifolia*. (Erysibe fuliginea Link.; Rabenh. p. 230; Fr. Syst. III. p. 238)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

c. *Plantaginis* Lev. l. l. Op *Plantago lanceolata* (Erysibe lamprocarpa c. plantaginis Link (partim); Rabenh. p. 232)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

d. *Humuli* Lev. l. l. Op de bladen der Hop (Erysibe macularis a Humuli Rabenh. p. 231; Fr. Syst. III. p. 237)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; 's Gravenhage, Oudem.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Zwijndrecht, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

PHYLLOACTINIA LEV. (Erysibe Auct.)

Mycelium amphigenum; conceptacula hemisphaerica demum depresso, receptaculo membranaceo-granuloso persistenti vel evanido insidentia, sporangiis 8 et ultra in pedicellum protractis 2- vel 4-sporis farcta; sporae ovatae. Appendiculae 8—16 rectae, rigidae, aciculatae, demum retroflexae. (Lev. l. l.)

- 2963. P. guttata** Lev. Op de levende bladen van verschillende kruiden en boomen. Aest. (Erysibe spec. Rabenh.). Variat:

a. *Aceris* West. Op *Acer campestris*. (Erysiphe marrisalii. West. Herb. Cr. Belg. n° 551; West. 2e Not. s. qq. Crypt. nouv. fl. Belge in Bull. de l'Acad. Roy. des Sc. de Belg. N°. 120. Pl. 1. Fig 4. n. o. p. q.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v.)

b. *Fraxini* Lev. Op *Fraxinus excelsior*. (Erysibe lenticularis a. Fraxini. Rabenh; Fr. Syst. III. p. 246; Rabenh. pag. 234)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

c. *Betulae* Lev. Op de bladen van *Betula alba*. (Erysibe guttata b. Betulae Rabenh. p. 234; Fr. Syst. III. p. 245)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

d. *Fagi* Lev. Op de bladen van Beukenboomen. (Erysibe lenticularis b. Fagi Rabenh. p. 234; Fr. Syst. III. p. 246).

In Herb.: Renkom Buse. — Bovendien: Maastricht, Franq.

e. *Coryli* Lev. Op de bladen des Hazelaars. (Erysibe guttata a. Coryli, Link, Rabenh. p. 234; Fr. Syst. III. p. 245)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zutphen, Wttw.; Maastricht, Franq. (v. v.)

UNCINULA Lev. (Erysibe spec. Rabenh.)

Mycelium epi- vel hypophyllum, floccosum, submembranaceum, evanidum vel persistens. Conceptacula globosa sporangiis 8—16 subpyriformibus, 2—4 sporis oyatis repleta. Appendiculae rigidae, simplices, bifidae vel raro dichotomae apice uncinatae, radiato-patentes, demum sursum flexae. (Lev. l. l.)

- 2964.** **U. adunca** Lev. Op levende bladen van verschillende kruiden en bomen. (Erysibe adunca Rabenh.) Variat:

- a. *Artemisiae* Lev. Op *Artemisia vulgaris*. Aest. (Erysibe depressa b. *Artemisiae* Link.; Rabenh. p. 232; Fr. Syst. III. p. 240)

Maastricht, Franq. (v. v.)

- b. *Salicis* Lev. Op de bladen van verschillende Wilgen. (Erysibe adunca a. *Amentacearum* bb. *Salicum* Rabenh. p. 236; Fr. Syst. III. p. 245)

Maastricht Franq. (v. v.)

- c. *Populi* Lev. Op de bladen van verschillende Populieren. (Er. adunca a. *Amentacearum*. aa. *Populorum* Rabenh. p. 236.)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v.)

- 2965.** **U. Wallrothii** Lev. Op de bladen van verschillende Prunimen, vooral van *Pr. spinosa*. Aest. (Erysibe adunca c. *Rosacearum* Wallr.; Rabenh. p. 236; Fr. Syst. III. 245)

Maastricht, Franq.

- 2966.** **U. bicornis** Lev. Op de bladen van *Phylleria* en verschillende soorten van *Acer*. Aest. Aut. Variat:

- a. *Aceris* Lev. Op de bladen van *Acer campestris*, *Pseudoplatanus*, enz. (Erysibe bicornis (*Acerum*) Rabenh. p. 235; Fr. Syst. III. p. 244)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Rotterdam, Oudem.;

Kampen, Bond.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.—

Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v.)

CALOCLADIA Lev. (Erysibe spec. Auct.)

Mycelium arachnoideum, subcontextum, evanidum vel persistens. Conceptacula sporangiis 4—8 ovatis rostratis 4—8 sporis repleta. Appendiculae rectae dichotomae, ramulis apice turgidis vel filiformibus. (Lev. l. l.)

- 2967. C. Ehrenbergii** Lev. Op de bladen van *Lonicera tatarica*. Aest.

Mycelio epiphylo subcontexto orbiculari persistente. Conceptaculis gregaricis globosis minutis. Sporangis 4 ovato-rostratis 8 sporis. Appendicalis circiter 20 conceptaculum aequantibus. (Lev. l. l.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.

- 2968. C. penicillata** Lev. Op de bladen van verschillende boomen. Aest. et Aut. (Erysibe spec. Rabenh.) Variat:

- a. *Viburni* Lev. Op de bladen van *Viburnum Opulus* (Erysibe penicillata β . Caprifoliacearum Rabenh. p. 236; Fr. Syst. III. p. 242).

In Herb.: Wassenaar, Dz. et Mb.; Amsterdam, Oudem. (v. s.)

- 2969. C. Dubyi** Lev. Op de bladen van *Lonicera Xylosteum*, *Caprifolium*, enz. (Er. penicillata β . Caprifoliacearum pro parte. Rabenh. p. 236).

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

- 2970. C. holosericea** Lev. Op de bladen van *Astragalus glycyphyllos*. Aest. (Erysibe holosericea Astragali, Rabenh. p. 231; Fr. Syst. III. p. 240)

In Herb.: Ubbergen en Weurt bij Nijmegen, Abel. (v. s.)

- 2971. C. Berberidis** Lev. Op de levende bladen van *Berberis vulgaris*. Aest. Aut. (Erysibe penicillata c. Berberidis Link; Rabenh. p. 236; Fr. Syst. III. p. 244)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Rotterdam, Oudem; Hees bij Nijmegen, Abel.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.—Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 2972. C. Grossulariae** Lev. Op de bladen van *Ribes Grossularia*. Aest. Aut. (Erysibe penicillata d. Grossulariae Link.; Rabenh. p. 236)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.—Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.)

ERYSIPHE Hedw.

Mycelium arachnoideum saepe contextum, fugax vel persistens. Conceptacula globosa aut hemisphaerica, sporangiis 8—24 polysporis repleta. Appendiculae floccosae nunc simplices nunc vage ramosae cum mycelio intertextae, interdum liberatae (Lev. emend. l. l.)

- 2973. E. lamprocarpa** Lev. Op de bladen van verschillende kruiden. Aest. Variat:

- a. *Cichoracearum* Lev. Op de bladen van *Scorzonera hispanica* en *Hieracium sabaudum*. (Erysibe horridula b. *Cichoracearum* Wallr.; Rabenh. p. 235; Fr. Syst. III p. 241)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Weurt bij Nijmegen, Abel.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- b. *Labiatarum* Lev. Op de bladen van *Lamium purpureum* en *album*, *Stachys palustris*, *Ballota nigra*, enz. (Erysibe lamprocarpa a. *Labiatarum* Rabenh. p. 232)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Leiden, Dz. et Mb.; Kampen, Bond.; Rotterdam, Oudem.

- c. *Plantaginis* Lev. Op de bladen van *Plantago major* en *maritima* (Erysibe lamprocarpa c. *Plantaginis* Link.; Rabenh. p. 232; Fr. Syst. III. p. 239)

In Herb.: Leiden, Oudem.; Dordrecht, Amsterdam, v. d. S. Lac.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 2974. E. graminis** Dec. Op de bladen van *Apera Spica venti*, *Agrostis alba*, enz., in de koornvelden. Aest. (*Erysibe communis a. Graminearum* Link.; Rabenh. p. 232)

In Herb.: Rijnsburg, Leiden, Oudem.; Amsterdam, v. d. S. Lac.

- 2975. E. Martii** Lev. Op de levende bladen van verschillende kruiden. Aest. Aut. Variat:

- a. *Cruciferarum* Lev. Op *Alyssum calycinum* (*Erysibe communis p. Cruciferarum* Rabenh. p. 233; Fr. Syst. III. p. 242)

In Herb.: Weurt bij Nijmegen, Abel. (v. v.)

- b. *Leguminosarum* Lev. Op de bladen van *Pisum sativum*, *Melilotus alba*, als ook van *Lupinus*, *Vicia*, *Trifolium*, enz. (*Erysibe communis m. Leguminosarum* Link; Rabenh. p. 233; Fr. Syst. III. p. 240)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Oudem.; Heerjansdam, v. d. S. Lac.; Rotterdam, Oudem.; Nijmegen, Abel.; Kampen, Bond.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Maastricht, Franq. (v. v.)

- c. *Ulmariae* Lev. Op de bladen en bladstelen van *Spiraea Ulmaria*. Aest. Aut. (*Erysibe horridula c. Spiraeacearum* Rabenh.? p. 235)

In Herb.: Zuid-Beveland, Zwake, v. d. B. (v. s.)

- d. *Umbelliferarum* Lev. Op de bladen van *Anthriscus sylvestris*, *Heracleum Spondylium* en andere *Umbelliferae*. (*Erysibe communis l. Umbelliferarum* Link; Rabenh. p. 233; Fr. Syst. III p. 242)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Maastricht, Franq.; Rotterdam, Oudem. (v. v. et s.)

- e. *Urticearum* Lev. Op de bladen der Netels, en bijzonder op die van *Urtica dioica* en *urens*. Aest. Aut.

(*Erysibe communis* b. *Urticarum* Rabenh. p. 233)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.

- 2976. E. Montagnei** Lev. Op de bladen van kruiden, zoo als *Lappa*, *Cirsium*, enz. Aest. Aut. Variat:
a. Bardanae Lev. Op de bladen van *Lappa major* en *tomentosa*. (*Erysibe depressa* a. *Bardanae* Link; Rabenh. p. 232; Fr. Syst. III. 242)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Dordrecht, Amsterdam, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 2977. E. tortilis** Fr. Op de bladen van *Cornus alba* en *sanguinea*. (*Erysibe tortilis* *Corni* Link; Rabenh. p. 231; Fr. Syst. III p. 243)

In Herb.: Rotterdam, in de nieuwe plantaadje, Oudem.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 2978. E. horridula** Lev. Op de bladen van *Symphytum officinale*, *Echium vulgare*, *Myosotis intermedia*, enz. Aest. Aut. (*Erysibe horridula* a. *Asperifoliarum* Rabenh. p. 235; Fr. Syst. III. p. 239)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Oudem.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Ewijk, Abel. (v. s.)

- 2979. E. communis** Fr. Op de bladen van verschillende kruiden. Aest. Aut. Variat:

- a. Ranunculacearum* Duby. Op de stengels, bladstelen en de bladen van *Aquilegia vulgaris*, *Ranunculus acris*, *Philonotis*, enz. (*Erysibe communis* r. *Ranunculacearum* Link; Rabenh. p. 233; Fr. Syst. III. p. 240)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Maastricht, Franq.; Beuningen bij Nijmegen, Abel.

- b. Polygonearum* Lev. Op de bladen van *Polygonum*

aviculare (*Erysibe communis* *r.* *Polygonacearum* Link;
Rabenh. p. 233; Fr. Syst. p. 240)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.; St. Anne bij Nijmegen, Abel. (v. v.)

c. *Solanacearum* West. Op de bladen van *Verbascum Thapsus*. Aest. (*Erysibe communis* *k.* *Solanacearum* Rabenh. p. 233; Fr. Syst. III. p. 242)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

d. *Rubiacearum* West. Op de bladen van *Galium Aparine*. Aest. (*Erysibe communis* *d.* *Rubiacearum* Rabenh. p. 233)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Oudem.

PERISPORIUM Fries.

2980. P. vulgare Cord. Op de bladen van *Phragmites communis*. Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 250; Rabenh. p. 228; *Perisporium arundinis* Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 329)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.

2981. P. Brassicae Lib. Op rottende stronken van roode en groene kool. Vere. (Lib. Pl. Crypt. Ard. n°. 280; *Sclerotium, Coccocystis, Brassicae* Pers.; Rabenh. p. 239; Fr. Syst. III. p. 259)

In Herb.: Leiden, Wtzw. — Bovendien: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Maastricht, Franq.

CONIOSPORIUM Link.

2982. C. circinans Fr. Op de bladscheeden van *Phragmites communis*. Aut. (Fr. Syst. III. p. 257; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 330; *Sphaeria circinans* Rabenh. p. 174)

In Herb.: Leiden, Wtzw.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

MICROSTICTA Desmaz. (*Perisporii* spec. Fr.)

Perithecium? minutum scutiforme carbonaceum cel-lulosum superficiale-adnatum, intus nucleo? carnosocelluloso albo ubique fructificante. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. Nouv. Edit. n°. 674)

- 2983. M. vagans** Desmaz. Op de stengels en bladen van verschillende kruiden en heesters (*Perisporium Speireum* Fr. Syst. III. p. 230) Aut. Vere. Variat:

a. *Buxi* West. Op de bladen van den Palmboom. (West. 7^e not. Crypt. Belg. n°, 17 d. in Bull. acad. roy. Sc. de Belg. 2^e Série T. XI)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v.)

Trib. Apiosporei.**CHAETOMIUM** Kze et Schm.

- 2984. C. elatum** Kze et Schm. Op rottende grashalmen, riet en bladen. Per totum annum. (Fr. Syst. III. p. 254; Rabenh. p. 227)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Wilhelminapolder, Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

ILLOSPORIUM Mart.

- 2985. I. carneum** Fr. Op het thallus van *Peltigera*-soorten. Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 259; Rabenh. pag. 225).

- 2986. I. coccineum** Fr. Op het thallus van korstmossen. Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 259; Rabenh. p. 226)
Maastricht, Franq. (n. v.)

Ord. Pyrenomycetes.

* **Sphaeriacei.**

Trib. Sphaerini.

CORDYCEPS Fr.

- 2987. C. Ophioglossoides** Fr. In vochtige bosschen, gewoonlijk parasitisch op *Elaphomyces muricatus*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 324; Rabenh. p. 224)

In Herb.: Renkom, Buse.

- 2988. C. militaris** Fr. Op doode insectenlarven in bosschen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. pag. 323; Rabenh. pag. 224)

Westland (Naaldwijk), v. d. Tr. (v. icon.)

PORONIA Fries.

- 2989. P. punctata** Fr. Op paarden- en ezelsmest in zandige streken. Aut. (Sphaeria Fr. Syst. II. p. 330; Rabenh. p. 223)

In Herb.: Harderwijk, Jung h.; Sloten, v. d. S. Lac. — Bovendien: Westland (Naaldwijk), v. d. Tr. (v. s. et ic.)

XYLARIA Schrank.

- 2990. X. cornuta** Schrank. Op rottende Elzentronken.

Aut. Vere. (*Hypoxyton vulgare* Rabenh. p. 222; *Sphaeria Hypoxylon* Fr. Syst. II. p. 327; Dz. et Mb. in *Bijdr.* I. pag. 19).

In Herb.: Kampen, Bond.; Leiden, Oudem.; Wtzw.; Ubbergen, Abel.; Sterrebosch (Groningen), Strat.; Swijndrecht, v. d. S. Lac. — Bovendien: Westland (Naaldwijk), v. d. Tr.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.).

2991. X. Cupressiformis Kx. Op rottende boomtronken. Aut. Vere. (*Sphaeria Hypoxylon* β. *Cupressiformis* Fr. Syst. II. pag. 328; Dz. et Mb. *Bijdr.*)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Haarlemmerhout, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.) Variat:

a. *pedata* West. in Herb. Op rottende boomtronken. (Fr. l. l.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Dordrecht, v. d. S. Lac.

2992. X. polymorpha Grev. Aan afgehouwen rottende boomtronken. Hieme. (*Sphaeria Pers.*; Fr. Syst. II. p. 328; *Hypoxyton* Rabenh. pag. 222)

In Herb.: Dordrecht, v. d. S. Lac.; Sterrebosch bij Groningen, Strat. — Bovendien: Westland (Naaldwijk), v. d. Tr.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

2903. X. digitata Rabenh. Op doode Elzentronken. Aut. Vere. (*Sphaeria* Fr. Syst. II. 326; *Hypoxyton* Rabenh. Deutschl. Krypt. Flora I. p. 223; Rabenh. Herb. viv. myc. 2e Ed. n°. 46)

In Herb.: Leiden, Wtzw. (v. s.)

2994. X. carpophila West. Op de napjes der Beuken. Hieme. Vere. (West. Herb. Crypt. Belg. n°. 114; *Sphaeria* Fr. Syst. II. p. 328; *Hypoxyton* Rabenh. pag. 223)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

2995. X. coronata West. Op rottende tronken en wortels van boomen. Aut. Vere. (Sph. Guepini Moug. ? in herb. Franq.)

Tige allongée, mince, stipitiforme, tortueuse, inégale enbosselée, longue de 35 à 40 mill., s'évasant vers le haut en une tête conique de 4 mill. de longueur, surmontée de 3, 4 ou 5 appendices digitiformes d'environ 2 mill. de longueur. Perithèces rares, petits, immergés, placés vers le haut de la tête et devenant saillants. Ostioles papilliformes. Thèques cylindriques, octospores, unisériées, longues de $\frac{1}{10}$ mill. et entourées de quelques paraphyses rares, hyalines et simples. Sporidies brunes, ovales, translucides, mesurant $\frac{3}{200}$ mill. dans le grand diamètre sur $\frac{1}{100}$ mill. dans le petit. (West. 8^e not. Crypt. inéd. Belg. pag. 5. n° 2. fig. 1 a, b, c, d.)

In Herb.: Maastricht. Franq. (v. s.)

SPHAERIA Hall.

A. Compositae.

Sect. 1. **Periphæricæ.** Compositæ. Perithecia subdivergentia, in ambitu stromatis collocata, ostiolo aequali, collo destituta.

* Stroma sessile, convexum, subhemisphaericum, immarginatum, peritheciis periphericis. (Pulvinatae Fries)

2996. Sph. concentrica Bolt. Op doode boomtronken. Aut. (Fr. Syst. II. p. 331; Rabenh. p. 222)

In Herb.: 't Haagsche Bosch, Bisch. (v. s.)

2997. Sph. Fragiformis Pers. Op de schors van doode Beuken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 332; Rabenh. p. 222)

In Herb.: Renkom, Buse; in den Aardenhout, Molk. (v. s.)

2998. Sph. fusca Pers. Op doode takken van Elzen en Beuken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 232; Rabenh. p. 221; Dz. et Mb. in Bijdr. fl. v. Ned. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Stekh.; Dz. et Mb.; v. d. S. Lac.; Voorhout en Katwijk, Wttw.; Amsterdam, Utrecht, v. d. S. Lac.; Kampen, R. Bond.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Maastricht, Franq.

2999. Sph. argillacea Fr. Op doode takken van Ha-zelaars en Elzen. Aut. (Fr. Syst. II. p. 333; Rabenh. p. 221; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Maastricht, Franq. (v. s.)

3000. Sph. cohaerens Pers. Op doode boomtronken, bijzonder van Wilgen. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 333; Rabenh. p. 221; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Oudem. (v. s.)

3001. Sph. granulosa Pers. Op de schors van doode tronken van *Crataegus Oxyacantha?* Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 335; Rabenh. p. 221)

In Herb.: Leiden, Wttw.; Bommel, Jung. (v. s.)

3002. Sph. multiformis Fr. Op doode Berken- en Elzenstammen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 334; Rabenh. p. 221) Variat:

a. junior Fr. l. l. In Herb.: Leiden, Wttw. (v. v. et s.)

β. adulta Fr. l. l. In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. v. et s.)

* * Stroma late effusum, indeterminatum, immarginatum, planum, perithecia cingens l. e. peritheciis connascentibus ortum. Perithecia collo destituta, in superficie immersa l. prominentia. (Connatae Fr.)

3003. Sph. serpens Pers. In holle Wilgenstammen. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 341; Rabenh. p. 249)

In Herb.: Bommel, Jung. ; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3004. Sph. confluens Tode. In vermolmde Wilgenstammen. Vere. Aut. (Fr. Syst. II, p. 342; Rabenh. p. 218)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Ankeveen (N. Holl.), v. d. S. Lac. (v. s.)

Sect. 2. **Hypophericace.** Compositae. Perithecia verticalia, immersa, stromate tecta, in collum attenuata.

*** Determinatae, a matrice discretae. Perithecia immersa, ampla. (Glebosae Fr. l. l.)

3005. S. deusta Hoffm. Op doode Wilgentronken. Hieme. (Fr. Syst. pag. 345; Rabenh. p. 218)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Haarlem, Brugm.; Doornwerth, Buse; 't Soerensche Bosch, v. d. S. Lac. (v. s.)

3006. S. Nummularia Dec. Op doode takken van Eiken, Beuken en andere boomen. Per totum annum. (Fr. Syst. II. p. 348; Rabenh. p. 217)

Maastricht, Franq. (n. v.)

**** Determinatae, cum matrice connatae, basi linea nigra circumscriptae. Perithecia demersa, stipata. (Lignosae Fr.)

3007. S. bullata Ehrh. Op doode takken van Wilgen, Elzen en Hazelaars. Vere. (Fr. Syst. II. p. 349; Rabenh. p. 216)

In Herb.: Bommel, Jungh.; Groningen, Strat.; De Heikop, De Haan; Kampen, R. Bond.; Ubbermen, Abel. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3008. S. undulata Pers. Op afgevallen doode takken van *Crataegus* en *Corylus*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 350; Rabenh. p. 216).

In Herb.: Leiden, Wttw.; Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3009. *S. Stigma*** Hoffm. Op doode takken van Esschen, Beuken en wilde Pruimen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 350; Rabenh. p. 216; Dz. et Mb. Bijdr. I. pag. 19)
In Herb.: Utrecht, Haarlem, Wttw.; Leiden, Dz. et Mb. — Bovendien: Maastricht, Franq.
- 3010. *S. decorticata*** Dec. Op oude Beuken en Eiken. Per totum annum. (*S. Stigma* γ decorticata Fr. Syst. II. p. 350; Rabenh. p. 216)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Wttw.; Bommel, Jungh.; Maastricht, Franq. (v. s.)
- 3011. *S. disciformis*** Hoffm. Op doode takken van Beuken en wilde Kastanjes. Vere. (Fr. Syst. II. p. 353; Rabenh. p. 216).
In Herb.: Leiden, Wttw. — Bovendien: Maastricht, Franq.
- 2012. *S. verruciformis*** Ehrh. Op takken van *Carpinus betulus*, van Beuken en van Hazelaars. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 355; Rabenh. p. 215)
In Herb.: Utrecht, Wttw. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v.)
- 3013. *S. flavo-virens*** Pers. Op afgevallen doode takken: Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 357; Rabenh. p. 215)
In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac.
5 * Determinatae, connatae, nulla linea circumscriptae. Perithecia sparsa. (Versatiles Fr.)
- 3014. *S. scabrosa*** Dec. Op doode Eikentronken en takken. Vere. (Fr. Syst. II. p. 360; Rabenh. p. 215).
In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)
- 3015. *S. quercina*** Pers. Op doode Eikentakken. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. 362; Rabenh. p. 214; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)
In Herb.: 't Haagsche Bosch, Wttw.; Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.)

- 3016. *S. lanciformis*** Fr. Op doode Berkentakken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 362; Rabenh. p. 214)
- 3017. *S. ferruginea*** Pers. Op doode takken van Hazelaars. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 363; Rabenh. p. 211)
In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)
- 3018. *S. ceratosperma*** Tod. Op doode Eikentakken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 364; Rabenh. p. 211)
In Herb.: Harderwijk, Jung h. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)
- 3019. *S. Strumella*** Fr. Op doode takken van Aalbeziën. Vere. (Fr. Syst. II. p. 365; Rabenh. p. 214)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)
- 6 * *Effusae, indeterminatae, connatae, haud circumscriptae.* (Concrescentes Fr.)
- 3020. *S. speculosa*** Pers. Op doode takken van *Viburnum Opulus*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 369; Rabenh. p. 213)
In Herb.: Utrecht, Wttw.
- 3021. *S. lata*** Pers. Op doode Esschenschors en hout. Vere. (Fr. Syst. II. p. 369; Rabenh. p. 213; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, Wttw.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland (Goes); v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.)
- 3022. *S. velutina*** Wallr. Op doode afgevallen takken en hout. Vere. (Rabenh. p. 213)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Leiden, Dz. et Mb.
- 3023. *S. salicella*** Fr. Op doode Wilgentakken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 377)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

Sect. 3. Amphiphericae. Compositae. Perithecia con-

vergentia, circinantia, stromate spurio undique pustulo-cineta, in collum attenuata.

7* Perithecia in conceptaculo integro, ab epidermide discreto, collecta. (Circumscripae Fr.)

- 3024. *S. gastrina* Fr.** Op doode tronken van Olmen en Haagbeuken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 379; Rabenh. p. 210)

In Herb.: Harderwijk, Jung h.

- 3025. *S. Prunastri* Pers.** Op doode Pruimtakken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 380; Rabenh. p. 212)

In Herb.: Utrecht, Wttw.

- 3026. *S. stellulata* Fr.** Op doode Olmtakken. Aut. (Fr. Syst. pag. 380)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.

- 3027. *S. Limminghii* West.** Op doode Olmtakken. Vere.

Perithèces petits, sphériques, noirs, groupés au nombre de 6 à 15, nichés entre les fibres corticales et surmontés chacun d'un col cylindrique plus ou moins long. Les ostioles de chaque groupe se réunissent en convergeant pour soulever et percer transversalement l'épiderme, sous forme d'un disque arrondi, proéminent, mamelonné, noir et luisant. Thèques en massue presque cylindrique ou fusiforme, sans paraphyses, longues de 12 a 15/100 de mill. Sporidies uni- ou bisériées, fusiformes, hyalines, de 3/100^{es} de mill. de longueur sur 1/100^e de mill. de largeur, et n'offrant à l'intérieur aucune trace de cloison, mais seulement quelques granules peu distincts. (West. 6^e not. Crypt. Nouv. de la fl. Belge n°. 26, in Bull. de l'Acad. Roy. des Sc. de Belgique, 2^e Série Tom. VII.) Obs. Verschilt grootelijks in de vruchtdeelen van de voorgaande.

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.; Leiden, Ankersm.; Groningen, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3028. *S. enteroleuea* Fr.** Op doode afgevallen Eiken-

takken. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 381; Rabenh. p. 210)

In Herb.: Harderwijk, Jungh.; De Vriese; Leiden, Dz. et Mb.; 't Haagsche Bosch, v. d. S. Lac.— Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3029. *S. Anomia*** Fr. Op doode takken van *Robinia pseudo-Acacia*. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 381; Rabenh., p. 210)

In Herb.: Harderwijk, Jungh. (v. s.)

- 3030. *[S. detrusa]*** Fr. Op doode takken van den Berberis. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 382; Rabenh. pag. 211)

In Herb.: Leiden, Wttw. (v. s.)

- 3031. *S. Carpini*** Pers. Op doode takken van *Carpinus Betulus*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 384; Rabenh. p. 210)

In Herb.: 's Hertogenbosch, West.

8 * Perithecia in conceptaculo dimidiato et superne epidermide adnata inclusa, disco erumpente. (Incusae Fr.)

- 3032. *S. nivea*** Hoffm. Op jonge doode Populier- en Wilgentakken. Per totum annum. (Fr. Syst. II. p. 386; Rabenh. p. 209)

In Herb.: Amsterdam, Oudem. ex. herb. Brugm. (v. s.)

- 3033. *S. leucostoma*** Fr. Op doode Pruiptakken. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 387; Rabenh. p. 209)

Variat:

- a. *polypora* Fr. l. l. In Herb.: Bommel, Jungh. (v. s.)

- 3034. *S. controversa*** Desmaz. Op doode takjes van *Cornus sanguinea*, *Acer Negundo*, *Fraxinus*. Hieme. Aut.

Circumscripta, stromate corticali nigro. Peritheciis immersis, ostiolis erumpentibus prominulis. Ascis sub-

clavatis; sporidiis biscriatis, hyalinis, ovato-oblongis;
sporulis 4, globosis. (Desmaz. 9e Not. pl. crypt. de
Fr. n° 18 in Ann. des Sc. Nat. Févr. 1842). Variat:
a. *corni* West. Herb. Crypt. Belge, n° 910.

In Herb.: Leiden, v. d. B. (v. v.)

* 9. Perithecia absque conceptaculo proprio in pus-
tula corticali ostiolaque in discum collecta (Obval-
latae Fr.)

3035. *S. coronata* Hoffm. Op schors van Beukentakken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. pag. 395; Rabenh. p. 204)

In Herb.: Utrecht, Wttw.

3036. *S. decorticans*, Fr. Op afgestorven schors van *Fagus sylvatica* en *Sorbus aucuparia*. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 396; Rabenh. p. 207)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3037. *S. turgida* Pers. Op doode Beukentakken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 400; Rabenh. p. 206)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

3038. *S. salicina* Pers. Op doode Wilgentakken. Aut. (Fr. Syst. II. p. 401; Rabenh. p. 206)

In Herb.: Rotterdam, Oudem.; Leiden, Wttw.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

3039. *S. stilbostoma* Fr. Op doode takken van verschil-
lende boomen. Aut. (Fr. Syst. II. p. 403; Rabenh.
p. 205). Varia:

a. *umbilicata* Fr. l.l. Op doode takken van *Acer pseu-
do-platanus*.

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

* 10. Perithecia in orbem disposita, libera absque conceptaculo et disco (Circinatæ Fr.)

- 3040.** **S. pulchella** Pers. Op afgestorven Pruimenschors. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. pag. 406; Rabenh. p. 204)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3041.** **S. conjuncta** Nees. Op doode stengels van Braambeziën. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 408; Rabenh. p. 204)

In Herb.: 't Haagsche Bosch, Dz. et Mb. (v. s.)

- 3042.** **S. quaternata** Pers.? Op oude Berken- en Beukenschors. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 409; Rabenh. p. 203)

In Herb.: Walcheren (duinkant), v. d. B. (v. s.)

Sect. 4. **Epiphericæ.** Subcompositæ. Perithecia horizontalia, supra stroma (spurium saepius) nuda collocata, sed primo a matrice tecta, collo nullo.

* 11. Perithecia caespitosa, superficialia, supra stroma subinnatum erumpens collocata (Caespitosæ Fr.)

- 3043.** **S. cinnabrina** Tode. Op schors van doode boomstammen. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 412; Rabenh. p. 202; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., de Haan, Wttw.; Kampen, R. Bond.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Groningen, Stekh., Strat.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3044.** **S. coccinea** Pers. Op doode Pruimen- en Elzenstammen. Hieme (Fr. Syst. II. p. 412; Rabenh. p. 202; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20.)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Amsterdam, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et v.). Variat:

a. *sanguinella* Fr. l. l. In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.
(v. s.)

3045. **S. ribis** Tode. Op doode Aalbezietakken. Aut. Vere.
(Fr. Syst. II. p. 413; Rabenh. p. 202; Dz. et Mb.
Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Maastricht, Franq.;
Zuid-Beveland, v. d. B.

3046. **S. laburni** Pers. Op doode takken van *Cytisus la-*
burnum. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 413; Rabenh.
p. 202; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 17)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

3047. **S. acervalis** Moug. Op doode Esschen- en Wilgen-
takken. Aut. (Fr. Elench. II. p. 83; Rabenh. p. 202)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. — Bovendien:
Maastricht, Franq. (v. s.)

3048. **S. cyanogena** Desmaz. Op rottende Koolstronken.
Aest. Aut.

Peritheciis minutissimis, numerosis, conglomeratis, raro
solitariis, globosis, rugosis, atris, opacis; ostiolo papillæ-
formi; nucleo albido; ascis clavatis; sporidiis hyalinis, ob-
longis, subsusiformibus, curvulis, vix obtusis, 3 septatis.
(Desmaz. 15^e Not. crypt. de Fr. n°. 18 in Ann.
Sc. nat. 3^e Série. Tom. IX p. 352; Desmaz. Pl. crypt.
de Fr. n°. 2060)

In Herb.: Leiden, Wttw. (v. s.)

3049. **S. berberidis** Pers. Op doode takken van *Berbe-*
rnis vulgaris. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 415; Ra-
benh. p. 201; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 8)

In Herb.: Leiden, de Haan, Dz. et Mb., Wttw.;
Utrecht, Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3050. **S. varia** Pers. Op afgestorven Pruimenschors (Fr.
Syst. II. p. 416; Rabenh. p. 201)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3051. **S. cupularis** Pers. Op drooge Pruimen- en Vliertakken, en die van andere boomen. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 416)

In Herb.: Leiden, Wttw.; Zuid-Beveland (Goes), v.d.B.

3052. **S. pulicaris** Fr.? Op afgestorven Vliertakken. Aut. (Fr. Syst. II. p. 417; Rabenh. p. 200; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.

3053. **S. aggregata** Lasch. Op doode stengels van *Euphrasia odontites*.

Peritheciis erumpentibus subrotundis nigris nitidis, seriatim aggregatis; nucleo albo; ascis subclavatis octosporis; sporis cylindraceis monoblastis aut uniseptatis (Lasch in Rabenh. Herb. viv. myc. Ed. II. n°. 541)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

* 12. Perithecia primo immerso-innata, demum emersa, confluentia (Confluentes Fr.)

3054. **S. elongata** Fr. Op doode takken van *Robinia pseudo-acacia*. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 422; Rabenh. p. 199)

In Herb.: Leiden, Wttw. (v. v. et s.)

3055. **S. mucosa** Pers. Op rottende vruchten van *Cucurbita pepo*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 425; Rabenh. p. 198; Dr. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden. Dr. et Mb.

3056. **S. dothidea** Moug. Op doode Esschentronken en takken. Aest. Aut. (Fr. Syst. II. p. 423; Rabenh. p. 200). Variat:

a. *Rosae* Fr. Elench. II. p. 86. Op levende Rozentakken.
In Herb.: Hulst, West. (v. v.)

3057. **S. spartii** Nees. Op doode tronken en takken van

Sarothamnus vulgaris (Fr. Syst. II. p. 424; Rabenh. p. 199)

In Herb.: Axel, West.

* 13. Perithecia in series parallelas disposita (Seriatae Fr.)

3058. *S. rimosa* Alb. et Schw. Op drooge halmen van *Phragmites communis*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 427; Rabenh. p. 190; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Voorshoten, de Haan; Utrecht, Wttw. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3059. *S. filicina* Fr. Aan de bladstelen van Varens. Vere. (Fr. Syst. II. p. 427; Rabenh. p. 190)
In Herb.: Utrecht, Jungh.; Maastricht, Franq. (v. s.)

3060. *S. juncei* Fr. Op drooge halmen van *Juncus glaucus*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 428; Rabenh. p. 191)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Utrecht, Wttw. (v. v.)

3061. *S. lirella* Moug. Op doode stengels van *Spiraea ulmaria*. Aut. (Fr. Elench. II. p. 105; Rabenh. p. 192; Dr. et Mb. Bijdr. II. p. 17)
In Herb.: Blauwkapel, v. d. S. Lac.

3062. *S. arundinacea* Sow. Op drooge halmen van *Phragmites communis*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 429; Rabenh. p. 193; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)
Subtecta, linearis, stromate vix distincto. Peritheciis minutis, globosis, uniserialibus, subastomis, nigro farctis. Ascis nullis; sporidiis elongatis, subfusiformibus; sporulis 4-6, semiopacis (Desmaz. emend. 12e Not. crypt. de Fr. in Ann. des Sc. nat. Janv. 1846. p. 49)
In Herb.: Leiden, Stekh., Wttw.

3063. *S. godini* Desmaz. Als de voorgaande. Vere.
Subtecta, oblonga, minuta, griseo-nigra, stromate

vix distincto. Peritheciis minutissimis, stipatis, compressiusculis, 2-3 serialibus, subastomis *albo* farctis. Ascis clavatis; sporidiis oblongis, 3 septatis. (Desmaz. Loc. cit.)

In Herb.: Leiden, Stekh., Wttw.; Amsterdam, v. d. S. Lac.

3064. *S. nebulosa* Pers. Op doode stengels van groene gewassen en bijzonder van Aardappelen. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 430; Rabenh. p. 191; *S. nebularis* Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 8)

In Herb.: Leiden, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.)

3065. *S. polygramma* Fr. Op doode stengels van *Angelica sylvestris*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 432; Rabenh. p. 192)

In Herb.: Leiden, Wttw. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.)

* 14. *Perithecia aggregata*, foliis innata (Confertae Fr.)

3066. *S. graminis* Pers. Op doode bladen van verschilende grassoorten. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 434; Rabenh. p. 189; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. — Bovendien: Maastricht, Franq.

3067. *S. trifolii* Pers. Op de bladen van *Trifolium repens*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 435; Rabenh. p. 188)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., Oudem.; Zwake, v. d. B.; Beuningen bij Nijmegen, Abel.

3068. *S. allicina* Fr.? Op stervende bladen van *Allium Porrum*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 437; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.

3069. *S. bifrons* Schmidt et Kze. Op verdroogde Ei-

kenbladen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 438; Rabenh. p. 189)

In Herb.: Leiden, in den Hortus Academicus, Dz. et Mb., Wttw.

- 3070. *S. ceuthocarpa*** Fr. Op verdroogde bladen van *Populus tremula*. Aut. Vere. (Fr. Syst. p. 439; Rabenh. p. 189)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Wassenaar, Wttw. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

B. Simplices.

Sect. V. **Superficiales.** Simplices. Perithecia bicorticata supra stroma effusum villosum l. matricem plane superficialia, libera, primo velata.

* 15. Perithecia per se glabra, insidentia subiculo tomentoso (Byssisedae Fr.)

- 3071. *S. aurantia*** Pers. Op rottende kurkachtige Polypori. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 440; Rabenh. p. 198)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3072. *S. aquila*** Fr. Op doode en rottende boomtakken. Hieme et Vere (Fr. Syst. II. p. 442; Rabenh. p. 197)
In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac.; Maastricht, Franq. (v. s.)

- 3073. *S. byssiseda*** Tode. Op rottende Wilgentakken. Vere (Fr. Syst. II. p. 442; Rabenh. p. 197)
Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3074. *S. tristis*** Tode. Op rottend hout van *Acer pseudoplatanus*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 444; Rabenh. p. 197)
In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. s.)

- * 16. Perithecia villo persistente tecta (Villosae Fr.)
- 3075. *S. ovina*** Pers. Op rottend Wilgenhout in holle stammen. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 446; Rabenh. p. 196)
In Herb.: Willemspolder, Dz. et Mb. (v. s.)
- 3076. *S. hirsuta*** Pers. Op rottend hout. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 449; Rabenh. p. 194)
In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)
- * 17. Subiculum nullum. Perithecia glabra, basi rotundata, sublibera, ostiolo persistente (Denudatae Fr.)
- 3077. *S. peziza*** Tode. Op rottend hout. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 452; Rabenh. p. 190)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.) Variat:
a. *villifera* Fr. l.l. (Sph. *peziza* ♂. *miniata* Rabenh. l.l.)
Maastricht, Franq. (n. v.)
- 3078. *S. sanguinea*** Sibth. Op verdroogd Elzenhout. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 453; Rabenh. p. 174)
In Herb.: Rotterdam, Oudem. (v. s.)
- 3079. *S. episphaeria*** Tode. Op de puisten van *Sphaeria quercina*, *stigma* en anderen. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 454; Rabenh. p. 190)
In Herb.: de bosschen van Ameliswaard bij Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v.)
- 3080. *S. mammaeformis*** Pers. Op weggeworpen rottend hout. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 455; Rabenh. p. 176)
In Herb.: Zwake, v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.)
- 3081. *S. stercorearia*** Sow. Op paardenmest. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 455; Rabenh. p. 174; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)
In Herb.: Harderwijk, Jungh.; Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

3082. S. obduceens a. minor Fr. Op doode takken van *Fraxinus excelsior*. Aut. Vere. (Fr. Syst. p. 456; Rabenh. p. 176)

In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. s.)

3083. S. bombarda Batsch. Op rottende boomstammen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 456; Rabenh. p. 177) Maastricht, Franq. (n. v.)

3084. S. spermoides Fr. Op rottende Eiken- en Wilgenstammen. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 457; Rabenh. p. 176)

In Herb.: Utrecht, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Amsterdam, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3085. S. moriformis Tode. In rottende holle Wilgentronken, alsook op rottende stammen van *Prunus mahaleb*. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 458; Rabenh. p. 176; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 17)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Leiden, Wttw.; Kampen, R. Bond. (v. v. et s.)

3086. S. erubescens Rob. Op doode bladen van *Ilex aquifolium*. Aut.

- Sparsa vel subgregaria, superficialis, basi villosa alba radiata. Peritheciis minutis, globosis, mollibus, glabris, testaceis dein radio-rubris collabescendo concavis. Ostiolo papillaeformi. Ascis clavatis; sporidiis oblongis subacutis, subcurvulis, hyalinis, 3 septatis (Rob. in Desmaz. 13e Not. crypt. de Fr. pag. 72)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

3087. S. pulvis pyrius Pers. Op vochtig rottend hout. Vere. (Fr. Syst. II. p. 458; Rabenh. p. 176; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Rijnsburgerweg, de Haan; Leiden en Utrecht, Wttw., v. d. S. Lac.; Muyden, Uylenpas, Soerensche bosch, v. d. S. Lac.;

Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3088. *S. pulveracea*** Ehrh. Op dood en rottend hout.
Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 459; Rabenh. p. 174)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

* 18. *Perithecia glabra, basi applanata subinnata pertusa* (Pertusae Fr.)

- 3089. *S. mastoidea*** Fr. Op doode Wilgen- en Esschen-takjes. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 463; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; de Bild, v. d. S. Lac.; Haarlem (v. s.)

- 3090. *S. pertusa*** Pers. Op rottend hout. Vere. (Fr. Syst. II. p. 464; Rabenh. p. 178; Dz. et Mb., Bijdr. I. p. 20)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

Sect. VI. **Subimmersae.** Simplices. *Perithecia immersa, saepe erumpentia, ostiolo insigni dilatato l. in collum elongato.*

* 19. *Ostiolum latissimum, compressum, rima longitudinali dehisces* (Platystomae Fr.)

- 3091. *S. excipuliformis*** Fr. Op oude Eikenschors. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 469; Rabenh. p. 184)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, Wttw.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3092. *S. macrostoma*** Tode. Op afgevallen takken, dood hout en oude schors van boomen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 469; Rabenh. p. 184)
In Herb.: op den Rijnsburgerweg, de Haan (v. s.)

* 20. Ostiolum elongatum, cylindricum, liberum,
perithecio longius (*Ceratostomae* Fr.)

3093. *S. rostrata* Fr. Op doode en rottende Beuken- en Berkentakken. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 473; Rabenh. p. 186)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

3094. *S. rostellata* Fr. Op doode stengels van verschillende *Rubus*-soorten. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 476; Rabenh. p. 186)

Maastricht, Franq. (v. v.)

* 21. Ostiolum in collum matrici immersum elongatum (*Obtectae* Fr.)

3095. *S. eutypa* Fr. Op het hout van doode boomtronken. Per annum (Fr. Syst. II. p. 478; Rabenh. p. 183; Dz. et Mb., Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

3096. *S. operculata* A. et S. Op rottend Dennen- en Elzenhout. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 479; Dz. et Mb., Bijdr. I. p. 20)

Leiden, Dz. et Mb. (n. v.)

3097. *S. corticis* Fr. Op doode Populierschors. Aut. et Vere. (Fr. Syst. II. p. 481; Rabenh. p. 182)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3098. *S. ditopa* Fr. Op doode Elzentakken. Aut. et Hieme. (Fr. Syst. II. p. 481; Rabenh. p. 182)

In Herb.: Warmond, de Haan (v. s.)

3099. *S. tiliae* Fr. Op doode en afgevallen Lindentakken. Vere. (Fr. Syst. II. p. 485; Rabenh. p. 181)

In Herb.: Leiden, Ankers.; Haarlem (v. s.)

3100. *S. pruinosa* Fr. Op de schors van doode Eschentakken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 486; Rabenh. p. 182)

In Herb.: Leiden, Jungh. — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3101. S. xylostei** Pers. Op doode takken van *Lonicera xylosteum*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 487; Rabenh. p. 181)

In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. s.)

Sect. VII. **Subinnatae.** Simplices. Perithecia epidermidi matrix subinnata velo nullo, gelatina diu farcta.

* 22. Perithecia mox erumpentia, liberata, ostiolo simplici (Obturatae Fr.)

- 3102. S. sapinea** Fr? Op schors en takken van Dennen en Pijnboomen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 491)

In Herb.: Harderwijk, Jungh.

- 3103. S. syringae** Fr. Op doode takken van *Syringa vulgaris*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 492; Rabenh. p. 179; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 8)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

- 3104. S. lonicerae** Sow. Op de doode stammen van *Lonicera periclymenum*. Vere. (Fr. Syst. II. 492; Rabenh. p. 179)

In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. s.)

- 3105. S. strobilina** Holl. et Schm. Op de schubben van rottende Pijnkegels. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 495; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

Leiden, Dz. et Mb. (n. v.)

- 3106. S. epicymatia** Wallr. Op de scutella van *Pattellaria subfusca* en *parietina*. Vere. Aest. (Rabenh. p. 180; Sph. Lichenicola Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 17)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

* 23. Perithecia primo innata, cum matrice concreta, demum supra denudata, ostiolo simplici (Subtectae Fr.)

3107. S. epidermidis Fr. Op de takken van *Berberis vulgaris*. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 499). Variat:

a. microscopica Desmaz. Op de zaadhuisjes van den Esch. Vere. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. no. 975)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

3108. S. taxi Sow. Op de bladen van *Taxus baccata*. Vere. Aut. (Fr. Syst. II. p. 500; Rabenh. p. 171)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

3109. S. macularis Fr. Op stervende bladen van *Acer* en *Populus*, Aut. (Fr. Syst. II. p. 502; Rabenh. p. 187)

In Herb.: Groningen, Strat. (v. s.)

3110. S. ilicis Fr. Op doode bladen van *Ilex aquifolium*. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 501; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.

* 24. Perithecia primo tecta, demum epidermide annua discreta secedente nuda (Caulicolae Fr.)

3111. S. pellita Fr. Op doode stengels van *Papaver* en andere kruiden. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 505)

In Herb.: Warmond, de Haan (v. s.)

3112. S. rubella Pers. Op doode stengels van kruiden. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 504; Rabenh. p. 179; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Haarlem. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3113. S. haematites Desmaz. Op doode stengels van *Clematis vitalba*. Vere.

Conservim sparsa, minuta, macula sanguinea insidens. Peritheciis orbiculatis, primum pallescentibus, dein nigris, humectatis convexis, siccis pezizoideo-collapsis, epidermide translucenti semper tectis. Ostiolo punctiformi. Ascis cylindrico-clavatis; sporidiis non observatis (Desmaz. 19^e Not. pl. crypt. de Fr. n° 24 in Ann. des Sc. nat. 2^e Série Tom. XVI.)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.

- 3114. *S. acuta*** Hoffm. Op doode stengels van Brandnetels (*Urtica urens* et *dioica*). Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 507; Rabenh. p. 175; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 8)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, v. d. S. Lac.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Leiden, Wttw.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Warmond, de Haan; Maastricht, Franq.

- 3115. *S. modesta*** Desmaz. Op doode stengels van groote kruiden; Aut. Vere.

Sparsa. Peritheciis globoso-depréssis, minutis, epidermide primo tectis, dein nudis, nigris, laevibus, nitidis. Ostiolo papillato obtuso. Nucleo albo. Ascis amplis, subcylindricis; sporidiis fusiformibus, obtusiusculis, curvulis 4—6 septatis; sporulis minutissimis, globosis hyalinis. (Desmaz. 14^e Not. crypt. nouv. de Fr. n° 61 in Ann. des Sc. nat. 2^e Sér. Tom. VIII. pag. 173. — *Sph. complanata* Lib. (non Tode)!)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

- 3116. *S. coniformis*** Fr. Op de doode stengels van groote kruiden, vooral van Brandnetels en *Umbelliferae*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 508. — *Sph. herbarum c. conica* Rabenh. p. 175)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., Wttw.; Utrecht, Amsterdam, v. d. S. Lac.

Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s. et s.)

- 3117. *S. dolilolum*** Pers. Op doode stengels van *Umbel-*

liferae en vooral van *Angelica sylvestris*. Vere. (Fr. Syst. II. p. 509; Rabenh. p. 173; Dz. et Mb., Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., Wttw.; Blauwkapel, v. d. S. Lac.

Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3118. S. pisí Sow. Op doode stengels van *Pisum sativum*.

Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 509; Rabenh. p. 173)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3119. S. caulinum Fr. Op uitgerukte stengels van

Umbelliferae. Vere. (Fr. Syst. II. p. 509)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3120. S. culmifraga Fr. Op doode Grashalmen. Hieme.

Vere. (Fr. Syst. II. p. 510; Rabenh. p. 180). Variat:

b. linearis Fr. l. l. Op doode koornhalmen.

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

3121. S. scirpicola Dec. Fr. Op doode bladen van

Scirpussoorten. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 510). Variat:

b. typharum Desmaz. Op doode bladen van *Typha latifolia*. Vere. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. no 1778)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

3122. S. herbarum Fr. Op doode stengels van groote

kruiden. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 511; Rabenh. p. 174; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21). Variat:

a. Op Aster tripolium. In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

b. Op Solanum tuberosum. In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Leiden, Wttw.

c. Op Allium porrum. In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

d. Op Convolvulus tricolor. In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

e. Op Koolstronken. * In Herb.: Amsterdam. v. d. S. Lac. (v. s.)

- f. Op *Rumex*. In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.
(v. s.)
- g. Op *Centaurea* en *Carduus*. In Herb.: Leiden,
Wttw. (v. s.)
- h. Op *Eryngium maritimum*. In Herb.: Katwijk,
Wttw. (v. v. et s.)

3123. *S. bardanae* Wallr. Op doode stengels van *Lappa tomentosa*. Hieme. (Wallr. Comp. fl. Germ. IV. pag. 806; Rabenh. p. 179)

In Herb.; Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.)

3124. *S. carduorum* Wallr. Op doode stengels van *Carduussoorten*. Hieme.

Pyreniis gregariis hypophloeodeo-latitantibus, basi arete insculptis depresso-globosis, e vertice convexiusculo mox deplanato collum breve, apicem versus in-crassatum obconicum truncatum pertusum, summam epidermidem penetrans informantibus. (Wallr. Comp. fl. Germ. IV. p. 805, excl. Syn. Sow. Fr.)

In Herb.: Rijnsburg, de Haan. (v. v. et s.)

3125. *S. armeriae* Corda. Aan afgestorven stelen van *Statice globularifolia*. Vere. (Corda Ic. fung. IV. p. 41. Tab. VIII. fig. 119; Rabenh. p. 175).

In Herb.: Leiden, in den Hortus Academicus, Wttw. (v. s.)

3126. *S. perforans* Rob. Op doode bladen van *Psamma arenaria*. Vere.

Epiphylla, sparsa. Peritheciis immersis, minutis, nigris ellipsoideis; ostiolis perforantibus, superficialibus, convexis, dein collabescendo subconcavis, poro dilatato apertis. Sporidiis ellipticis, hyalinis, bilocularibus. (Desmaz. Nouvelle notice crypt. inéd. de Fr. mars 1843. p. 41 n°. 30; Rob. in Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 1288)

In Herb.: Overal in de Hollandsche duinen.

3127. S. Berkeleyi Desmaz. Op doode stengels van *Umbelliferae* en vooral van *Heracleum spondylium*. Hieme et Vere. (Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 1769, sine descr.; Sph. Angelicae Berk. in Mag. of Zool. and Bot. vol. I. p. 48. Tab. 3. f. 7)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3128. Sph. nigrella Fr. Op doode stengels van kruidgewassen. Vere. Aest. (Fr. Syst. II. p. 512; Rabenh. Herb. viv. myc. n°. 1936; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 8)

In Herb.: Warmond, van Hall. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.)

3129. Sph. nigrans Rob. Op doode halmen van *Dactylis glomerata*. Vere.

Minuta, sparsa, epidermide nigricante tecta. Peritheciis globosis vel subellipticis, depressis, albo farctis, basi villis brunneis vestitis. Ostiolo erumpente papillaeformi. Ascis clavatis; sporidiis fusiformibus curvulis, subhyalinis, 5 septatis (Desmaz. 13^e Not. pl. crypt. de Fr. 2^e Série T. VI. p. 79. — Rob. in Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 1774)

In Herb.: Boxmeer, v. d. B. (v. s.)

3130. Sph. lugubris Rob. Op doode en rottende bladen van *Psamma arenaria*. Hieme. Vere. Aestate.

Maculis epiphyllis, piecis, minutis, ovalibus, sparsis. Peritheciis subsolitariis, immersis, nigris, globosis, demum depressis. Ostiolo brevi erumpente subconico. Ascis magnis cylindricis. Sporidiis 8, uniserialibus, ellipsoideis, subacuminatis, brunneis, semiopacis (Desmaz. 14^e Not. pl. crypt. de Fr. n°. 60. in Ann. des Sc. nat. 2^e Sér. Tom. VIII, p. 174; Rob. in Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 1792)

In Herb.: Overal in de Hollandsche duinen. (v. v. et s.)

Aanm. Deze soort zal eigenlijk wel in de hieronder volgende afdeeling der *Foliicolae* te huis behooren.

* 25. Perithecia cum matrice concreta, tecta, nulla macula exarida cineta (*Foliicolae Fr.*)

- 3131. *Sph. tubaeformis*** Tode. Op doode en afgevallen Elzenbladen. Vere. (*Fr. Syst. II.* p. 516; Rabenh. p. 172; Dz. et Mb. *Bijdr. I.* p. 21)

In Herb.: Warmond, de Haan; Leiden, Voor-
schoten, Dz. et Mb., Wttw., Ankers.; de Bildt,
v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3132. *Sph. gnomon*** Tode. Op afgevallen bladen van *Corylus avellana*. Hieme. Vere. (*Fr. Syst. II.* p. 517; Rabenh. p. 172)

Maastricht, Franq.

- 3133. *Sph. saligna*** Ehrh. Op doode bladen van *Salix capraea*. Hieme. Vere. (*Sphaeria capraea* Dec.; *Fr. Syst. II.* p. 517; Rabenh. p. 172; *Phoma saligna* Fr. *Syst. II.* pag. 546; Rabenh. p. 143)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

- 3134. *Sph. setacea*** Pers. Op doode en afgevallen bla-
den van verscheiden boomen. Hieme et Vere. (*Fr. Syst. II.* p. 518; Rabenh. p. 173). Variat:
a. petiolicola West. Op de rotende bladstelen van *Acer pseudo-platanus*.

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3135. *Sph. aquilina*** Fr.? Op de bladen van *Pteris aquilina*. Hieme. (*Fr. Syst. II.* p. 522; Rabenh. p. 169)
In Herb.: Utrecht, Jungh. (v. s.)

- 3136. *Sph. polypodii*** Rabenh. Op de bladen van *Polypodium vulgare*. Aest. (*Sph. aquilina* Fr. in Dz. et Mb. *Bijdr. III.* p. 8)

Peritheciis sparsis, depresso-globosis, opacis, sub-
umbonatis; ascis cylindraceo-clavatis octonis oblon-
gis $1/420''$ crassis 3—4 plo longioribus hyalinis proto-

plasmate turbatis dense faretis. (Rabenh. Herb. viv. myc. 2^e Edit. n^o. 533)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3137. Sph. carpinea** Fr. Op doode bladen van *Carpinus betulus*. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 523; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 8)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3138. Sph. myriadea** Dec. Op doode en afgevallen Eikenbladen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 524; Rabenh. p. 188)

In Herb.: Zwake, v. d. B. (v. s.)

- 3139. Sph. brunneola** Fr. Op kwijnende of afgestorven bladen van *Convallaria majalis*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 526; Rabenh. p. 580)

Maastricht, Franq.

- 3140. Sph. maculaeformis** Pers. Op doode Eiken- en Kastanjebladen. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 524; Rabenh. p. 168; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, Dz. et Mb.; Kampen, R. Bond.; Maastricht, Franq. (v. s.)

- 3141. Sph. aucupariae** Lasch. Op levende bladen van *Sorbus aucuparia*. Aest. (Rabenh. pag. 170; Sph. conglomerata (Sorbi) Wallr. Comp. Fl. Germ. IV. p. 814)

In Herb.: Domburg, v. d. B.; Maastricht, Franq.

- 3142. Sph. punctiformis** Tode. Op doode Eikenbladen. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 525; Rabenh. p. 168; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zwake, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3143. Sph. eryngii** Fr. Op doode bladen en bladstelen van *Eryngium maritimum*. Vere. (Fr. in litt. Duby Bot. Gall. II. p. 710; Rabenh. p. 171)
Variat:

a. *petiolicola* West. In Herb.: Katwijk, de Haan, Wt tw.

3144. Sph. cruciferarum Fr. Op de stengels, stelen en zaadhuisjes van *Erysimum officinale*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 525)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

3145. Sph. ostruthii Fr. Op de stervende bladen van *Angelica sylvestris*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 526; De-pazea Ostruthii Rabenh. p. 139)

In Herb.: Zwijndrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3146. Sph. atomus Desmaz. Op doode Beukenbladen. Aut.

Epiphylla; maculis rufis, minutis, suborbiculatis; peritheciis minutissimis, numerosis, brunneis, innato-prominulis, collabescendo umbilicatis (Desmaz. 8^e Not. crypt. nouv. de France n°. 19, in Ann. des Sc. nat. Mars 1841; Desmaz. Pl. cr. de Fr. n°. 1293)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3147. Sph. melanoplaca Desmaz. Op treurende bladen van *Geum urbanum*. Aut.

Amphigena. Peritheciis minutissimis, numerosis innato-prominulis, nigris, subnitidis, poro simplici pertusis, in macula magna fuliginea gregariis. Nucleo albido. Ascis brevibus cylindricis, crassis, absque paraphysibus; sporidiis glaucis vix distinctis (Desmaz. 20^e Not. crypt. nouv. de Fr. n°. 10, in Ann. des Sc. nat. 2^e Sér. Tom. XVIII. — Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 2097)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3148. Sph. gangrena Fr. Op treurende bladen van verschillende Grassoorten. Aut.

Tecta inaequalis aterrima receptaculis astomis pro-

minulis demum depresso-tuberculosa (Fr. in Duby Bot. Gall. II. p. 695).

Pour compléter cette description, nous dirons que les perithèces sont hypophylles, d'abord convexes, ensuite affaisés et concaves, munis d'un ostiole ponctiforme. Les thèques sont claviformes grosses, remplies de sporidies oblongues, obtuses, 3 à 4 fois plus longues que larges, contenant trois à quatre sporules globuleuses et hyalines (Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 1267)

In Herb.: Boxmeer, v. d. B. (v. s.)

Trib. Dothidini.

POLYSTIGMA Pers. in Moug.

3149. P. fulvum Pers. Op de levende bladen van *Prunus spinosa*. Aut. (Rabenh. I. p. 166; Dothidea fulva Fr. Syst. II. p. 554; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22)

In Herb.: In 't Haagsche Bosch, Dz. et Mb. (v. v. et s.). Variat:

a. **aurantiacum** West. Op Perenbladen. Aest. (*Polyst. aurantiacum* West. Herb. crypt. Belge n°. 825)

In Herb.: Rotterdam, Oudem.; Kampen, R. Bond.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

3150. P. rubrum Dec. Op levende bladen van *Prunus spinosa*. Aut. (Rabenh. I. p. 166; Dothidea rubra Fr. Syst. II. p. 553; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22)

In Herb.: Amsterdam, Dz. et Mb. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3151. P. typhinum Dec. Op de halmen van *Agrostis* en andere Grassoorten. Aut. (Rabenh. I. p. 167; Do-

thidea typhina Fr. Syst. II. p. 553; Dz. et Mb.
Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.; Haarlemmerhout, M. Doornik; Zuid-Beveland, v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

DOTHIDEA Fries.

3152. *D. ribesia* Fr. Op doode Aalbeziertronken en -takken. Aut. et Vere. (Fr. Syst. II. p. 550; Rabenh. p. 164)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3153. *D. sambuci* Fr. Op doode Vliertakken. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 151; Rabenh. p. 164)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (Sub nomine *Sph. pulicaris*). Maastricht, Franq. (v. s.)

3154. *D. puccinoides* Fr. Op doode takken van *Buxus sempervirens*. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 551; Rabenh. p. 164)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

3155. *D. sphaeroides* Fr.? Op de schors van doode Eschetaakken. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 552; Rabenh. p. 165)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

3156. *D. vernicosa* Fr. Op doode stengels van *Anthriscus sylvestris*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 559; Rabenh. p. 165)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3157. *D. umbilicata* Fr. Op afgevallen bladen van *Crataegus oxyacantha*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. Orb. veg. I. p. 363; Rabenh. p. 165)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3158. *D. alnea* Fr.** Op stervende Elzenbladen. Aut. (Fr. Syst. II. p. 564; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 17; Sphaeria alnea Link; Rabenh. p. 170)
In Herb.: Oosterhoutsch bosch te Ubbergen, Abel.; Leiden, Dz. et Mb. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)
- 3159. *D. potentillae* Fr.** Op levende bladen van *Potentilla anserina*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 563; Rabenh. p. 165; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 8)
Maastricht, Franq. (n. v.)
- 3160. *D. brassicae* Desmaz.** Op treurende Koolbladen. Aut.
Amphigena; maculis orbiculatis, tandem confluentibus, pallide viridibus vel griseis subzonatis, centro rufescentibus subexaridis; peritheciis minutissimis, numerosis, prominulis, nigris, aggregatis, subconcentricis; ascis fixis, subclavatis; sporidiis oblongis; sporulis 2—4, globosis, hyalinis (Desmaz. 9^e Not. crypt. nouv. de Fr. in Ann. des Sc. nat. Févr. 1842. — Desmaz. Pl. crypt. de Fr. Nouv. Edit. n°. 95)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, Wttw.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)
- 3161. *D. chaetomium* Kze.** Op treurende bladen van verschillende *Rubus*-soorten. Aut. (Fr. Syst. II. p. 565; Status vetustis = Phacidium rubi Fr. Syst. II. p. 578; Rabenh. p. 158)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)
- 3162. *D. decolorans* Fr.** Op doode takken van *Morus alba*. Hieme et Vere. (Fr. Elench. II. p. 122; Desmaz. Pl. crypt. de Fr. Nouv. Ed. n°. 90)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)
- 3163. *D. fimbriata* Kickx.** Op levende bladen van *Carpinus betulus*. Aut. (Kickx Fl. crypt. Louv. p.

112. *Sphaeria fimbriata* Pers.; Fr. Syst. II. p. 436; Rabenh. p. 189)

In Herb.: Rotterdam, Oudem. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

3164. D. fraxini Fr. Op de bladen van *Fraxinus excelsior*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 561; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.

3165. D. geographica Fr. Op doode en afgevallen Appelbladen. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 560; *Sphaeria geographica* Wallr.; Rabenh. p. 188)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3166. D. graminis Chev. Op de bladen van *Deschampsia caespitosa* en andere Grassoorten. Aut. Hieme.

Subrotunda prominula nigra rugulosa striata, stromate atro, nucleis minutis albo-farctis seriatisque. (Chev. Fl. Par. I p. 457. Non *Sphaeria graminis* Pers.)

In Herb.: Leiden, Ankersm., Dz. et Mb.; Maastricht, Franq.; Zuid-Beveland, v. d. B.

3167. D. depazoides Desmaz. Op levende bladen van *Buxus sempervirens*. Per annum.

Epiphylla. Maculis eburneis, nigro-cinctis. Pustulis atris, orbiculatis, convexiusculis, sparsis, dein confluentes angulato-difformis. Nucleis 3-20, confertis, minutissimis, albis, ascis clavatis brevibus. Sporidiis oblongis, hyalinis. Sporulis 4, globosis. (Desmaz. Crypt. inéd. de la Fl. de Fr. n°. 20 in Mém. Soc. Roy. des Sc. de Lille 1839. 1^{re} partie pag. 85)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

3168. D. iridis Desmaz. Op de stengels en bladen van *Iris pseudo-acorus*. Aut.

Maculis rufis vel brunneo-castaneis. Peritheciis

minutissimis, sparsis, nigris, nitidis, innato-prominulis, convexis, intus albidis, poro pertusis, deum depres-
sis. Ascis majusculis subcylindricis; sporidiis oblong-
gis, utrinque obtusis, hyalinis 2, 3 septatis (Des-
maz. 14^e Not. crypt. inéd. de Fr. n°. 65, in Ann.
des Sc. nat. 2^e Sér. T. VIII. p. 176)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3169. D. robertiani** Fr. Op levende bladen van *Geranium Robertianum*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 564; Sphaeria robertiani Rabenh. p. 169; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22)

In Herb.: Amsterdam, Oudem. — Bovendien:
Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3170. D. ulmi** Fr. Op levende en treurende Olmbladen.
Aut. (Fr. Syst. II. p. 555; Polystigma ulmi Link.; Rabenh. p. 167; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Ubbergen bij Nijmegen, Abel.; Kampen, R. Bond. — Bovendien:
Maastricht, Franq.

** Phaciacei.

Trib. Stegillacei.

EUSTEGIA Fr.

- 3171. E. ilicis** Chev. Op doode bladen van *Ilex aquifolium*. Hieme. Vere. (Chev. Fl. Par. I. p. 443; Fr. Elench. II. p. 112; Stegilla ilicis Rabenh. p. 163; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.

Trib. Hysteracei.**RHYTISMA.**

- 3172. R. urticae** Fr. Aan doode stengels van *Urtica dioica*. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 570; Rabenh. p. 161)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

- 3173. R. punctatum** Fr. Op levende bladen van *Acer pseudo-platanus*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 569; Rabenh. p. 161; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Wttw.; Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3174. R. acerinum** Fr. Op dezelfde bladen als de voorgaande. Aut. (Fr. Syst. II. p. 569; Rabenh. p. 161; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Rotterdam, Oudem.; Ubbergen bij Nijmegen, Abel.; Zwolle, R. Bond.; Zuid-Beveland, v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3175. R. salicinum** Fr. Op levende bladen van *Salix capraea*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 568 excl. var. β ; Rabenh. p. 162; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 18)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Valkenswaard, de Haan; Zuid-Beveland, v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3176. R. umbonatum** Desmaz. Op levende bladen van *Salix monandra*. Aut. (Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 1736; Rabenh. p. 162; Rh. salicinum β -minus Fr. Syst. II. p. 568; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 18)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3177. R. bistortae** Lib. Op stervende bladen van *Polygonum bistorta*. Aut. (Lib. Crypt. Ard. n°. 68;

Ectostroma Fr. Syst. II. p. 602; Polystigma Link;
Rabenh. p. 167)

Maastricht: Franq. (n. v.)

- 3178. R. rubiae** Mont. Op de bladen van *Rubia tinctorum*. Aut.

Innatum, hypophyllum, gregarium confluensque, punctiforme, convexum, cupulari-depressum, fusco-atrum, opacum, intus fuscum, frustulatim secedens: ascis e fundo erectis clavatis sporas 8 oblongas altero fine attenuatas quadrinucleolatas foventibus (Mont. Syl. gen. spec. Crypt. p. 194)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

PHACIDIUM Fr.

- 3179. P. coronatum** Fr. Op rottende Eikenbladen in vochtige bosschen. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 577; Rabenh. p. 158)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3180. P. dentatum** Schm. Op doode Eikenbladen. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 577; Rabenh. p. 158)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3181. P. pini** Fr. Op doode en afgevallen takken van Pijnen en Dennen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 573; Rabenh. p. 159)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3182. P. ilicis** Lib. Op doode en afgevallen bladen van *Ilex aquifolium*. Hieme et Vere. (Phacidium multivalve (ex parte) Moug. et Nestl.; Fr. Syst. II. p. 576; Ph. aquifolii Rabenh. p. 159; Ph. multivalve Schm.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3183. P. patella** Pers. Op doode stengels van groote

kruidgewassen. Aut. Vere. (Fr. Elench. II. p. 134; Rabenh. p. 160; Sphaeria patella Fr. Syst. II. p. 511). Variat:

- a. campestre* Fr. l. l. Op de stengels van *Daucus carota*.

In Herb.: Leiden, Wttw.; Rijnsburg, de Haan; Maastricht, Franq.; Utrecht, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- b. alpestre* Fr. l. l. Op de stengels van *Angelica sylvestris*.

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3184. P. lauro-cerasi** Desmaz. Op doode bladen van *Prunus lauro-cerasus*. Hieme et Vere. (Fr. Elench. II. p. 136; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 19)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3185. P. ranunculi** Fr. Op stervende bladen van *Ranunculus acris* en *repens*. Aut. (Lib. Pl. cr. Ard. n°. 69; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 16; Dothidea ranunculi Fr. Syst. II. p. 562; Excipula ranunculi Rabenh. p. 153)

In Herb.: Naaldwijk, v. d. Tr.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3186. P. litigiosum** Desmaz. Op treurende bladen van *Ranunculus acris*. Aest. et Aut.

Maculis amphigenis, irregularibus, luteolis. Peritheciis hypophyllis, gregariis, minutis, rufo-brunneis. Disco fulvo-luteo, plano vel convexiusculo, margine sinuoso. Ascis clavatis sporidiis oblongis subpyriformibus. (Desmaz. 14e Not. crypt. nouv. de Fr. n°. 74 in Ann. des Sc. nat. 2^e Série, T. VIII, p. 181; Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 1639)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3187. P. abietis** Rabenh. Op de doode schors en takken van *Pinus abies*. Aut. (Rabenh. p. 161)

In Herb.: Leiden, Wttw. ex herb. Jungb. (v. s.)

HYSTERIUM (Tode) Fr.**A. Denudata Fr. (Hysterium Dec.)**

- 3188. H. pulicare** Pers. Op rottend hout en schors van oude Populieren en Eiken. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 579; Rabenh. p. 153; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 7)

In Herb.: Harderwijk, Jungh., Wtzw.; 's Gravenhage, Stekh.; Leiden, Wtzw. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3189. H. grammodes** de Not. Op rottend hout en oude Eikenplanken en -palen. Hieme et Vere.

Nigro-piceum nitidum, sparsum, sporis latoribus. (de Not. Dispos. in Giorn. bot. Ital. T. II. a° 2° p. 21. — Hyst. Rousselii β. Grammodes Duby Mém. sur la tribu des Hystérinées p. 28 n°. 13)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3190. H. lineare** Fr. Op rottend hout in holle Wilgen. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 583; Rabenh. p. 154.)

In Herb.: Willemsdorp, Goes, v. d. B. (v. s.)

B. Erumpentia.

- 3191. H. fraxini** Pers. Op schors en takken van Eschen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 585; Rabenh. p. 155; Dz. et Mb., Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Stekh., Dz. et Mb., Oudem., Wtzw. ex herb. Ankers.; Utrecht, v. d. S. Lac.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3192. H. rocheanum** Duby. Op een onbekenden bast.

Receptaculis erumpentibus superficiali-adnatis crustaceo-aggregatis sed non confluentibus ovato-globosis ovoideisve atro-nitidis, labiis tumidis convexis estriatis rimam angustam deum paulisper dilatatam relinqu-

tibus, thecis clavatis sessilibus sporas diametro subdupo longiores ellipticas tenuissime lineolatas diaphanas maturitate pallide luteolas nucleus 4 merenchymaticis factas soventibus, paraphysibus filiformibus apice ramosis et interdum coadunatis brevioribus. (Duby Mém. sur la trib. des Hyst. pag. 31. n°. 23. Tab. I. fig. 11)

Leiden, in den Hortus academicus, de la Roche in Herb. Dec. (n. v.)

3193. **H. rugosum** Fr. Op levende boomschors. Per annum. (Fr. Elench. II. p. 141). Variat:

a. faginea Fr. l. l. p. 143. Op Beukenschors. (Opegrapha conglomerata Pers.; Rabenh. p. 155)

b. quercinum Fr. l. l. Op de schors van jonge Eiken. (Opegrapha macularis Ach.)

In Herb.: Twello, R. Bond., Top (v. v. et s.)

3194. **H. conigenum** Moug. et Nestl. Op rottende kegelschubben van *Pinus sylvestris*. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 586; Rabenh. p. 155)

In Herb.: Leiden, Stekh., Wtzw. Bovendien: Maastricht, Franq. (v. s.)

C. Subtecta Fr.

3195. **H. rubi** Pers. Op afgestorven ranken van *Rubus*-soorten. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 587; Rabenh. p. 155)

In Herb.: Utrecht, Wtzw. ex herb. Jungh.; Maastricht, Franq. (v. v.)

3196. **H. pinastri** Schrad. Op afgevallen en rottende Pijn- en Dennenaalden. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 587; Rabenh. p. 156; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Harderwijk, Jungh.; Leiden, Stekh.; Dz. et Mb. (v. v. et s.). Variat:

a. *major* West. Op de naalden van *Pinus maritima*. (West. 6^e Not. crypt. inéd. de la Belg. n°. 68 in Bull. Acad. Roy. des Sc. de Belg. 2^e Sér. T. VII)

In Herb.: Bij Zutphen, West. ex herb. G. Aubert (v. v.)

b. *minor* West. l. l. Op de naalden van *Pinus Zembra*.

In Herb.: Bij Zutphen, West. ex herb. G. Aubert (v. v.)

c. *juniperinum* Fr. Op de naalden van *Juniperus sabina* en *communis* (Fr. Syst. II. p. 588; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; bij de Bildt, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3197. H. lauri Fr. Op doode en stervende bladen van *Laurus nobilis*. Per annum (Rabenh. I. p. 156. Hypoderma lauri Duby. Mém. de la trib. des Hyst. p. 43)

In Herb.: Leiden in den Hortus academicus, Wttw. (v. s.)

D. Xyloma Fr.

3198. H. scirpinum Fr. Oprottende halmen van *Scirpus lacustris*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 590; Rabenh. p. 157)

In Herb.: Leiden, Wttw. ex herb. Jungh. (v. v. et s.)

3199. H. arundinaceum Schrad. Op doode halmen van *Phragmites communis*. Hieme et Vere. (Fr. Syst. II. p. 590; Rabenh. p. 157)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., v. d. B.; Utrecht, v. d. S. Lac., Wttw. ex herb. Jungh.; Zuid-Beverland, v. d. B. (v. v. et s.)

3200. H. culmigenum Fr. Op doode halmen van verschillende Grassoorten. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 591; Rabenh. p. 157). Variat:

- a. *gramineum* Fr. l. l. Op de halmen van Koorn, enz.
In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)
- b. *abbreviatum* Desmaz. Op doode bladen van *Psamma arundinacea* (Desmaz. 14e Not. in Ann. des Sc. nat. 2e Série T. VIII. p. 179; Desmaz. Pl. crypt. de Fr. Nouv. Ed. n°. 171)

In Herb.: Hollandsche Duinen, Oudem. (v. v. et s.)

3201. H. foliicolum Fr. Op de doode bladen van *Cra-taeagus oxyacantha*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 592; Rabenh. p. 157)

In Herb.: Nymegen, Abel. (v. v. et s.)

3202. H. hederae Mart. Op de doode bladen van *Hedera helix*. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 593; Rabenh. p. 156)

In Herb.: Leiden, Stekh. (v. v. et s.)

3203. H. punctiforme Fr. Op stervende Eikenbladen.
Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 593; Rabenh. p. 157; Hyster. virgultorum v. quercinum West. Herb. crypt. Belge n°. 1119)

In Herb.: Haarlem, v. d. B. (v. s.)

AYLOGRAPHUM Lib.

Perithecium elongatum, dimidiatum, innatum simplex ramosumve, rima longitudinali dehiscens, nucleo discifero pellucido albido linearis persistente; asci minutis fixi paraphysibus immixti; sporidiis simplicibus. (Lib. Pl. crypt. Ard. n°. 272)

3204. A. vagans Desmaz. Op de bladen van *Ilex aquifolium*, *Hedera helix*, etc. Hieme.

Peritheciis innato-superscialibus, amphigenis, sparsis

ovato-oblongis, simplicibus vel confluente furcatis, atris; labiis suberistatis. Ascis ellipsoideis; sporidiis oblongis, obtusiusculis; sporulis 4, globosis, opacis. (Desmaz. Not. sur Cr. inéd. de la Fr. in Mém. de la Soc. Roy. des Sc. de Lille, Mars 1843. n°. 39; A. Hederae Lib. I. l. n°. 272).

In Herb.: Busloo bij Zutphen, West. ex herb. G. Aubert. (v. v. et s.)

COLPOMA Wallr.

Receptaculum simplex coriaceo-spongiosum flexuosum ellipticum aut lineare basi applanata adnatum primo clausum dein rima longitudinali excurrente bilabiato-dehiscens, tandem labiis divergentibus omnino aper-tum, senio collabescens canaliculatum. Nucleus gelatiniformis albescens. Thecae elongato-clavatae e sporis 8 filiformibus pallide hyalino-lutescentibus formatis quae apice disjunguntur, inflectuntur, et basifixae spe-ciem paraphysium filiformium induunt. (Wallr. char. reform. e cl. Duby. mém. sur la tribu des Hyst. p. 50)

- 3205. C. quercinum** Wallr. Op doode takken en takjes van Eiken. Aut. Vere. (Cenangium quercinum Fr. Syst. II. p. 189; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 16; Hysterium quer-cinum Pers.; Rabenh. p. 155; excl. Syn. Fr. El.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; bij den Uilenpas, M. J.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

EXCIPULA Fr.

- 3206. E. heraclei** Rabenh. Op treurende bladen van *Heracleum spondylium*. Aut. (Rabenh. p. 152; Dothidea heraclei Fr. Syst. II. p. 556).

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3207. E. rubi** Fr. Op afgestorven ranken van verschil-

lende *Rubus*-soorten. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. pag. 190; Rabenh. p. 152).

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

* * * **Sphaerонemei.**

Trib. Cytisorei.

HENDERSONIA Berk.

Peritheциум corneum, superficiale innatum, vel immersum, vertice poro perforatum vel irregulariter aperatum, vel ostiolatum; ostiolo punetiformi, plus minusve cylindrico. Ascii nulli; basidia filiformia vel stipitiformia plus minusve elongata aut brevissima. Sporidiis terminalibus, polymorphis, dein liberis; sporulis plus minusve numerosis, globosis, cylindricis vel discoideis, achromaticis aut coloratis. (Berk. emend. Desmaz. 17^e Not. crypt. nouv. de Fr. in Ann: des Sc. nat. 2^e Série Tom. XI, Mai et Juin 1849, p. 15)

3208. H. phragmitidis Desmaz. Op de rottende bladscheeden van *Arundo phragmites*. Hieme et Vere.

Peritheciis innatis, minutissimis, numerosis, sparsis, globosis, nigris, epidermide tectis. Ostiolis erumpentibus papillatis halone brunnea cinctis, demum deciduis. Sporidiis ovoideo-oblongis, sporulis 4, compressis, fuscis. (Desmaz. 22 Not. crypt. nouv. de Fr. in Ann. des Sc. nat. 2^e Sér. Tom. XX, n° 19).

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

3209. H. mespili West. Op stervende bladen van *Mespilus germanica*. Aut.

Taches épiphyllés, éparses ou confluentes, arrondies ou irrégulières, brunes, blanchissant au centre avec l'âge. Périthèces rares, très, petits, noirs, éparpillés

irrégulièrement sur toute la tache. Sporidies hyalines, ovale-pyriformes, à trois cloisons et mesurant $\frac{3}{200}$ e de mill. de longueur sur $\frac{1}{150}$ e de mill. de largeur. (West. 5^e Not. crypt. inéd. de la fl. Belg. in Bull. de l'Acad. Roy. des Sc. de Belg. 2^e Série T. II, pag. 16, n° 14; West. Herb. Cr. B. n° 1225)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3210. H. Fiedleri** West. Op afgestorven takken en takjes van *Cornus sanguinea* en *alba*. Aut. Vere.

Sporis ellipticis, oblongis, triseptatis; septis laete castaneis. (Klotzsch in Rabenh. Herb. viv. myc. 1^a ed. n° 882; 2^a ed. n° 71)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3211. H. sarmentorum** West. Op doode ranken van *Vitis vinifera*. Hieme.

Périthèces immersés, aplatis, d'un brun foncé, cachés sous l'épiderme du sarment qui se déchire en plusieurs lambeaux, pour faire voir un ostiole poriforme. Basidies simples, continues, transparentes; restant attachés aux sporidies pendant leur irruption. Sporidies brunâtres, pyriformes, à trois cloisons. (West. 2^e Not. crypt. inéd. de la Belg. in Bull. de l'Acad. Roy. des Sc. de Belgique, T. VIII, p. 14, n° 60 fig. 2).

In Herb.: Leiden, Stekh. (v. v. et s.)

- 3212. H. subseriata** Desmaz. Op doode halmen van grassoorten en bijzonder van *Enodium caeruleum*. Vere.

Erumpens, peritheciis nigris, subseriatis, minutissimis globosis vel oblongis. Nucleo albido, dein griseo. Sporidiis fusiformibus, 3—6 septatis, sporulis 4—7 globosis, hyalinis. (Desmaz. 13^e Not. crypt. inéd. de Fr. pag. 69. n° 13; Pl. crypt. de Fr. n° 1893).

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

PESTALOTIA Denot.

Sporidia pedicellata pluriseptata, articulo supremo in setas divergentes soluto, infero mutico, vel uni-bi-setoso, stromate gelatinoso juncta, ex epidermide erumpentia, demum effusa. (Denot. Micromyc. Ital. Dec. II. pag. 80).

- 3213. P. Guepini** Desmaz. Op stervende en doode bladen van *Camellia Japonica*, in de oranjeriën. Hieme Vere.

Amphigena, atra, sparsa, approximata; sporidiis fusiformibus pedicellatis, utrinque hyalinis, 3—4 septatis; articulo supremo appendicibus filiformibus coronato; filis 3, 4 tenuissimis, simplicibus, hyalinis, elongatis, divergentibus. (Desmaz. Not. sur crypt. inéd. de la Fr. in Mém. de la Soc. Roy. des Sc. de Lille; Desmaz. Ann. des Sc. nat. Tom. XIII. année 1840 p. 183).

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3214. P. rosae** West. Op doode Rozentakjes. Hieme. Péritheces épicauls, très-petits, bruns, épars et immersés, ostiole soulevant et déchirant irrégulièrement l'épiderme. Sporidies fusiformes à 3 cloisons transversales, formant 4 loges, dont la supérieure, surmontée de 2 ou 3 cils divergents, est hyaline et les 3 autres pâle brunâtres. La sporidie mesure de $\frac{1}{50}$ à $\frac{1}{40}$ de mill. de longueur sur $\frac{1}{100}$ de mill. de largeur; les cils égalent la sporidie en longueur. (West. 6^e Not. cr. inéd. fl. B. in Bull. de l'Acad. Roy. des sc. de Brux. 2 Sér. T. VII. n°. 70)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

DIPLODIA Fr.

Peritheциум corneum, superficiale innatum vel immersum, vertice poro perforatum vel irregulariter

apertum, vel ostiolatum; ostiolo punctiformi, plus minusve cylindrico. Asci nulli; basidia filiformia vel stipitiformia, plus minusve elongata aut brevissima. Sporidiis terminalibus, ovoideis vel ellipsoideis, dein liberis; sporulis binis coloratis vel hyalinis, compresso-truncatis, hemi-ellipsoideis. (Fr. Emend. Desmaz. 17^e Not. Cr. inéd. de la Fr. in Ann. des Sc. nat. 2^e Série, T. XI. Mai et Juin 1849. n°. 14)

- 3215. D. inquinans** West. Op doode Elzentronken en takken. Vere. (*Sphaeria inquinans* Tode; Fr. Syst. II. p. 486; Rabenh. pag. 181)

In Herb.: Leiden, Wttw. (v. v. et s.)

- 3216. D. visci** Kx. Op doode takken, bladstelen en bladen van *Viscum album*. Vere. (Kx. Rech. Cr. des Fl. 1^e Cent. p. 21; *Sphaeria atro-virens a visci* Alb. et Schw.; Fr. Syst. II. p. 501 excl. var. β ; *Sph. visci* Dec.; Rabenh. I. p. 171)

In Herb.: Bommel, Wttw. ex herb. Jungh. (v. v. et s.)

- 3217. D. crataegi** West. Op doode takken en takjes van *Crataegus oxyacantha*. Aut. Vere.

Périthèces noirs, globuleux, immergés, formant souvent des lignes parallèles et longitudinales, restant recouverts par l'épiderme déchiré en longueur. Ostiole papilliforme. Sporidies ovales, brunes, à une cloison. (West. 5^e Not. in Bull. de l'Acad. Roy. des Sc. de Br. 2^e Sér. T. II. pag. 17; West. Herb. Cr. Belge, n°. 1128)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3218. D. corni** West. Op doode takken van *Cornus sanguinea*. Aut. Vere.

Périthèces épars, noirs, immergés, restant recouverts par l'épiderme décoloré, qui donne seulement

passage à l'ostiole papilliforme. Sporidies brunes, ovales, biloculaires. (West. loc. cit. p. 16)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3219. D. pinea** West. Op doode schors van *Pinus sylvestris*. Hieme.

Atra, erampens; peritheciis ovoideis in seriem sinuosam dispositis, raro gregariis; ostiolo conico demum deciduo; sporidiis magnis, ovato ellipticis, brunneis, semiopacis, quandoque didymis aut uniseptatis. (Sphaeria pinea Desmaz. 9^e Not. Cr. inéd. de Fr. in Ann. des Sc. nat. Févr. 1842. p. 14; Desmaz. Pl. crypt. de Fr. n°. 1277)

In Herb.: Warmond, van Hall. (v. s.)

- 3220. D. acerina** Lev. Op doode takken van *Acer platanoides* en *Platanus orientalis*. Vere.

Conceptaculis globosis innatis nigris in seriebus linearibus ordinatis epidermide fissa tectis, ostiolis obsoletis. (Lev. Champ. du Mus. de Paris in Ann. des Sc. nat. 2^e Sér. T. V. p. 290)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3221. D. rosarum** Fr. Op stervende takken van *Rosa cinnamomea*. Hieme. Vere.

Périthèces épicaules, épars, noirs, sphériques, à ostioles papilliformes, déchirant l'épiderme noir ci par transparence, pour le passage de la matière sporidifère. Sporidies ovales, biloculaires, étranglées à l'endroit de la cloison, et mesurant $\frac{1}{40}$ ^e de mill. de longueur sur $\frac{1}{100}$ ^e de mill. de largeur. (West. 6^e Not. Cr. inéd. de la Fl. Belge in Bull. de l'Acad. Roy. des Sc. de Belg. 2^e Sér. T. VII. p. 21. n°. 75; West. H. cr. Belge n°. 1227; Sphaeria spurca Wallr. ? Rabenh. p. 199)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

- 3222. D. scabrosa** West. Op doode stammen. Hieme, Vere.

Pustules grosses, irrégulières, confluentes, atteignant jusqu'à 4 à 5 centim. de longueur sur une largeur de 4 à 5 millim., noires, saillantes et entourées par les débris relevés de l'épiderme. Périthèces globuleux, réunis par groupes dans les pustules. Sporidies ovales, brunes, biloculaires, mesurant $7/200^{\text{e}}$ de mill. de longueur sur $3/200^{\text{e}}$ de mill. de largeur. (West. 7^e Not. in Bull. de l'Aead. Roy. des Sc. de Brux. 2^e Sér. T. XI. p. 6. n°. 2; West. H. cr. Belge n°. 1372; Sphaeria scabrosae afghanica Rabenh. Herb. viv. myc. Ed. nov. n°. 537?)

In Herb.: Harderwijk, Jungh. (v. v. et s.)

- 3223. D. ligustrinum** West. Op doode takjes van *Ligustrum vulgare*. Hieme. Vere.

Périthèces très petits, globuleux, noirs, placés souvent par séries linéaires, recouverts par l'épiderme qui se déchire irrégulièrement pour montrer a nu un ostiole noir et papilliforme. Sporidies ovales, brunes, biloculaires. (West. 8^e Not. cr. inéd. fl. B. pag. 7.)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3224. D. mori** West. Op doode takken van *Morus alba*. Aut. Vere.

Périthèces très-petits, isolés, nombreux, noirs, recouverts par l'épiderme, qui se déchire irrégulièrement pour mettre a nu un ostiole papilliforme. Sporidies ovales, brunes, biloculaires. (West. loc. cit. pag. 6.)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3225. D. conigena** Desmaz. Op de schubben van afgevallen kegels van *Pinus maritima*. Hieme. Vere.

Peritheciis immersis dein erumpentibus, subrotundatis gregariis subconfluentibus, atris, astomis. Nucleo nigro; sporidiis oblongis, utrinque obtusis, fusca, unilocularibus. (Desmaz. 13^e Not. in Ann. des Sc. nat. p. 69. n°. 12; Phoma pinastri Lev.; Macro-

plodia conigena West. Herb. cr. Belge n°. 1230)
In Herb.: Harderwijk, Jung. (v. v. et s.)

- 3226. D. salicis** West. Op doode takken van *Salix alba* en andere. Aut. Vere.

Périthèces membraneux, sphériques, d'environ $\frac{2}{3}$ de mill. de diamètre, s'affaissant par la sécheresse, noirs, épars, recouverts par l'épiderme noir ci par transparence. Ostiole papilliforme. Sporidies hyalines, fusiformes, de $\frac{3}{200}$ de mill. de longueur sur $\frac{1}{300}$ de mill. de largeur, à une cloison au milieu. (Diplodina salicis West. 5e Not. pag. 19. n°. 28, fig. 6; West. Herb. crypt. B. n°. 1229)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac; Rijnsburger weg, de Haan, in Herb. de Vries e. (v. v. et s.)

DISCOSIA Lib.

Perithecium innatum scutiforme ostiolo perforatum obtegens ascidia fusiformia utrinque in productionem filiformem protensa, sporidiis globosis. (Lib. Pl. crypt. Ard. n°. 345)

- 3227. D. artocreas** Lib. Op doode Beukenbladen. Hieme. Vere. (Lib. l. l. n°. 345; Sphaeria artocreas Tode; Fr. Syst. II. p. 523; Rabenh. p. 170)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac, — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

Sphaeropsis Lev.

Perithecium sphaericum, immersum, subinnatum, astomum, demum (epidermide secedente) circumscisum l. irregulariter rumpens. Sporae simplices absque ascis. (Lev. in Demid. Voy.)

- 3228. Sph. depressa** Lev. Op doode takjes van *Syringa vulgaris*. Hieme. Vere.

Conceptaculis gregariis innatis hemisphaericis nigris demum collapsis epidermide rupta tectis, ostiolis papillatis pertusis, sporis cylindrico-ovatis obtusis. (Lev. Champ. du Mus. de Par. in Ann. des Sc. nat. 2^e Sér. T. V. p. 295)

In Herb.: Harderwijk, Jungh. (v. s.)

- 3229. Sph. fimicola** West. Op verdroogde kocmest. Aut. Vere.

Péritthèces très-petits, ponctiformes, sphériques, noirs, luisants, d'abord immersés, puis devenant superficiels. Ostiole papilliforme. Sporidies grandes, hyalines, ovales, uniloculaires, de 2 à $\frac{3}{100}$ de mill. de longueur sur $\frac{1}{75}$ de mill. de largeur. (West. 5^e Not. crypt. inéd. de Belg. pag. 20. n°. 31. fig. 9)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

SPHAERONEMA Fr.

- 3230. Sph. cylindricum** Fr. Op rottend hout, bijzonder van Wilgen en Eiken. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 538; Rabenh. p. 149)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3231. Sph. conicum** Fr. Op doode stengels van groote kruidgewassen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 538; Rabenh. p. 149; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22)

Leiden, Dz. et Mb. (n. v.)

- 3232. Sph. truncatum** Fr. Op rottend hout van Mast- en Pijnboomen. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 539; Rabenh. p. 149; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

- 3233. Sph. anemones** Lib. Op de bladen, stelen en bloemen van *Anemone nemorosa*. Vere. (Lib. Pl. crypt. Ard. n°. 167; Sphaeria anemones Fr. Syst. II. p. 563; Rabenh. p. 189)

Maastricht. Franq. (n. v.)

- 3234. **Sph. rhinanthi** (Euphrasiae) Lib. Op verdroogde zaadhuisjes van *Euphrasia odontites*. Aut. Hieme.

Peritheciis sparsis, rotundis plano depresso, poro simplici pertusis, nigris, globulo sporophoro minuto albo. (Lib. Pl. crypt. Ard. no. 263)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

SPORONEMA Desmaz.

Peritheciun innatum, epidermide tectum dein erumpens, sessile, subimmersum ab initio clausum demum dehiscens a centro versus ambitum in lacinias plures. Nucleus discoidens tremellosa-gelatinosus, basidiophorus; basidia filiformia, simplicia vel dichotoma, 1-polyspora. Sporae hyalinae, rectae, ovoideae vel cylindricae. (Desmaz. 19^e Not. crypt. inéd. de Fr. p. 24)

3235. **Sp. ramealis** Desmaz. Op doode takken van *Sambucus nigra*. Hieme et Vere.

Numerosa, dense sparsa, minutissima, rotundata vel oblonga in lacinias (3-4) inaequales dehiscens. Disco albido vel rufo, convexo. Sporidiis hyalinis, rectis, oblongo-cylindricis, obtusis; sporulis 2-3, globosis quandoque subopacis. (Desmaz. I. I. p. 25)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

3236. **Sp. strobilina** Desmaz. Op de schubben van rottende kegels van *Pinus abies*. Hieme.

Peritheciis minutis subglobosis, tenuissimis, atris, gregariis quandoque confluentibus in lacinias plures inaequales irregulariter dehiscentibus. Disco convexo, gelatinoso, griseo, subopalino. Sporophoris simplicibus, monosporis; sporis numerosis, hyalinis, fusiformibus. (Desmaz. 20^e Not. Crypt. inéd. de Fr. p. 14. no. 16)

In Herb.: Harderwijk, Wttw. ex herb. Jung h. (v. s.)

PILIDIUM Kze.

Peritheциум innatum, hemisphaericum, rimis pluribus a centro ruptum, sporidiis fusiformibus reservatum.
(Kze. Myc. Hefte II. p. 92)

- 3237. P. carbonaceum** Kze. Op doode Wilgentakken.
Vere. (Kze. Myc. Hefte II. p. 92. Phacidium carbonaceum Fr. Syst. II. p. 574; Rabenh. p. 160)
In Herb.: Leiden, Wttw. (v. s.)

CEU THOPORA Fr.

- 3238. C. phacidioides** Grev. Op stervende en doode bladen van *Ilex aquifolium*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 576; Rabenh. p. 144)
In Herb.: Leiden in den Hortus academicus, Wttw.
- 3239. C. umberata** Wallr. Op de bladen van *Cochlearia anglica*. Aut. (Rabenh. p. 144; Wallr. Comp. Fl. Germ. IV. p. 746)
In Herb.: Aan het IJ te Amsterdam, v. d. S. Lac.

CHEILARIA Lib.

Perithecia difformia, rotundata, rima dehiscentia; asci gelatina juncti subcirculari rejecti; sporidia globosa.
(Lib. Pl. crypt. Ard. Cent. 1. pag. 8)

- 3240. Ch. agrostidis** Lib. Op de bladen van *Agrostis vulgaris* en andere grassoorten. Aut.
Maculis fusco-albescensibus aut nullis. Peridiis immersis, utrinque prominulis, ovatis elongatisve atris, rima longitudinali dehiscentibus; cirrhis albis; ascis fusiformibus; sporidiis 2 pellucidis. (Lib. Pl. crypt. Ard. n° 63)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

MELASMA Lev.

Conceptacula membranacea apice dehiscentia tumidula demum depressa rugosa receptaculo tenui effuso maculaeformi innata. Sporae minutae sublineares continuae obtusae pellucidae in globulum gelatinosum erumpentes. (Lev. Champ. du Mus. de Par. in Ann. des Sc. nat. 2^e Série T. V. p. 276)

- 3241. M. acerina** Lev. Op levende en treurende bladen van *Acer pseudoplatanus*. Aut.

Receptaculis epiphyllis sparsis vel confluentibus maculas nigras suborbiculares pustulosas zona discolore cinctas efficientibus. (Lev. l. l.)

In Herb.: Haamstede, v. d. B. (v. v. et s.)

Obs. Ne pas confondre avec le Rhytisma punctatum, dont il a plusieurs traits de ressemblance.

PHOMA Fr.

- 3242. Ph. pustula** Fr. Op doode Eikenbladen. Vere. (Fr. Syst. II. p. 547; Rabenh. p. 143; Sphaeria pustula Pers.)

In Herb.: Leiden, Stekh. (v. s.)

- 3243. Ph. longissima** West. Op doode stengels van verschillende soorten van *Chenopodium*. Hieme. Vere. (West. 3^e Not. sur les Cr. inéd. de la fl. Belg. p. 13 n° 45; Sphaeria longissima Pers.; Fr. Syst. II. p. 430; Rabenh. p. 191)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3244. Ph. albicans** Desmaz. Op de bloemstelen van *Hypochoeris glabra*. Aut.

Peritheciis minutis, numerosis, inordinatis, intus sordidis, epidermide tectis, humidis globosis prouinentibus; ostiolis nudis, minutis, papillatis; sporidiis oblong-

gis, sublinearibus. (Desmaz. 17^e Not. Crypt. inéd. Fr. pag. 12, n° 20; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n° 1865)

In Herb.: Berg en daal bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)

- 3245. Ph. atriplicinum** West. Op doode stengels van *Atriplex hortensis*. Aut. Hieme.

Péritthèces membraneux, ovale-allongés, noirs, récouverts par l'épiderme noirce. Ostiole papilliforme. Sporidies ovales, hyalines, de $1/100^{\text{e}}$ de mill. de longueur sur $1/200^{\text{e}}$ mill. de largeur et contenant deux sporules globuleuses aux extrémités. (West. 5^e Not. Crypt. inéd. de la Belg. p. 20, n° 35; West. Herb. Cr. B. n° 1233)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3246. Ph. complanata** Desmaz. Op doode stengels van *Umbelliferae* en bijzonder van *Heracleum* en *Angelica*. Aut. Vere. (Desmaz. 19^e Not. Cr. nouv. de Fr. p. 4; Sphaeria herbarum var. *complanatum* Pers.; var. *major* Rabenh. p. 175; Sph. *complanata* Tode; Fr. Syst. II. p. 508; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Rijnsburg, de Haan; Leiden, Utrecht, Wttw.; Blauwkapel, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3247. Ph. coronillae** West. Op doode takjes van *Coronilla emerus* en *varia*. Aut. Hieme. (West. Herb. Cr. B. n° 966; Spaeria *coronillae* Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n° 1279; Desmaz. Not. in Ann. des Sc. nat. 2 Sér. Tom. XIII. p. 188)

Sparsa, approximata, subgregaria; peritheciis immersis, tectis, minutissimis, subglobosis, albido farctis; ostiolo simplici pertusis. Sporidiis liberis, oblongis, $1/100$ millemetro longis; sporulis 2, globosis. (Desmaz. l. l.)

In Herb.: Zutphen, Wttw. (v. v. et s.)

- 3248. Ph. equiseti** Lev. Op doode stengels van *Equisetum palustre*. Aut.

Conceptaculis innatis sparsis, globosis minutis intus nigris epidermide obtectis, ostiolis obsoletis, sporis ovatis pellucidis simplicibus. (Lev. Champ. du Mus. de Par. in Ann. des Sc. nat. 2^e Sér. Tom. V. p. 282; West. Herb. Cr. B. n° 632)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3249. Ph. herbarum** West. Op doode stengels van *Urtica dioica* en *Cirsium lanceolatum*. Vere.

Périthèces membraneux, translucides, très-petits, ovales ou arrondis, bruns, d'abord recouverts par l'épiderme, qui se détruit et laisse le perithèce à nu. Ostiole poriforme bien apparent. Nucleus blanc, sortant par l'humidité sous forme de cirrhe et se résolvant en un très grand nombre de sporides ovalaires, transparentes, très-petites, contenant 1 ou 2 sporules aux extrémités. (West. 3^e Not. Crypt. nouv. Fl. B. pag. 15 n° 51; West. Herb. Cr. B. n° 965)

In Herb.: Leiden, Wt tw.; Utrecht, v. d. S. Lac.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Katwijk, Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3250. Ph. striaeformis** Dur. et Mont. Op doode takken van *Kerria Japonica*. Aut. Vere. (Mont. Syll. gen. spec.rypt. p. 270; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. nouv. Ed. n° 59; Sphaeria striaeformis Fr.? Syst. II. p. 428; Rabenh. p. 191)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3251. Ph. lineolatum** Desmaz. Op de schubben van rottende kegels van *Pinus larix* en *pinaster*. Ilieme et Vere.

Subtectum, erumpens, nigrum. Peritheciis membranaceis tenuissimis, seriatis, subconnatis, globosis, stromate albido immersis, intus albis, poro pertusis. Cirrhis tenerumis tortis, albis. Sporidiis hyalinis, ovoideo-oblongis. (Desmaz. 19^e Not. Cr. inéd. de la fl. Fr.

p. 3; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. nouv. Ed. n° 58)
In Herb.: Deventer, Wttw.

- 3252. Ph. podagrariae** West. Op de levende en treurende bladen van *Aegopodium podagraria*. Aut. (Dothidea podagrariae Fr. Syst. II. p. 556; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22; Sphaeria podagrariae Roth.; Rabenh. p. 188; Phoma West. Herb. Cr. B. n° 722)

In Herb.: Sassenheim, Oudem.; Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3253. Ph. ruborum** West. Op doode ranken van verschillende *Rubus*-soorten. Hieme. Vere.

Périthèces épars, immergés, arrondies ou ovales, assez grands, atteignant jusqu'à 2 mill. dans leur grand diamètre, saillants, bruns et luisants. Ostiole nul. Sporidies hyalines, cylindriques, à extrémités arrondies, droites ou légèrement courbées, mesurant $\frac{3}{400}$ de mill. de longueur sur $\frac{1}{400}$ de mill. de largeur. (West. 6^e Not. Cr. inéd. fl. Belg. p. 22. n° 79; West. Herb. Cr. Belg. n° 1234)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3254. Ph. samarorum** Desmaz. Op de zaadhuisjes van Esschen. Hieme. Vere.

Tubercules noirs, orbiculaires et convexes, s'ouvrant chacun par un orifice arrondi, ensuite un peu allongé et à bords blanchâtres. Les sporules sont oblongues et n'ont pas plus de $\frac{1}{150}$ de mill. de longueur. (Desmaz. Observ. crypt. in Mém. de la Soc. Roy. des Sc. de Lille, année 1827—28. p. 452; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n° 349; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 17)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

- 3255. Ph. siliquastrum** Desmaz. Op de zaadhuisjes van *Brassica*. Aut. Hieme.

Maculis oblongis, olivaceo-brunneis; peritheciis numerosis, minutissimis, approximatissimis, fusco-nigris,

poro apertis; sporidiis perecilibus, oblongis; sporulis 2 globosis, opacis. (Desmaz. 17^e Not. Cr. nouv. de Fr. p. 8 n° 12; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n° 1874)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v.)

PHYLLOSTICTA Pers. Ch. Comest.

Perithecia exilissima, innata, poro aperta, maculas decoloratas in foliis procreantia. Nucleus gelatinosus; ascis nullis; sporidiis ovoideis, vel oblongis rectis, minutissimis, subcirculari rejectis. (Desmaz. 14^e Not. crypt. nouv. de Fr. p. 28)

- 3256. Ph. atriplicis** West. Op treurende bladen van *Atriplex angustifolia* en *patula*. Aut. (Sphaeria (Depazea) vagans d'atriplicicola Fr. Syst. II. p. 532; Rabenh. p. 139; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3257. Ph. berberidis** West. Op levende bladen van *Berberis vulgaris*. Aut.

Taches très petites (1 à 3 mill.), anguleuses, blanches, entourées d'une ligne rougeâtre, éparses ou confluentes. Périthèces noirs, ponctiformes, au nombre de 2 à 3 sur chaque tache. Ostiole poriforme; sporides ovales, hyalines, de $1/100^{\text{e}}$ de mill. de longueur sur $1/200^{\text{e}}$ de mill. de largeur, contenant deux sporules globuleuses. (West. 5^e Not. Crypt. inéd. de la fl. Belg. p. 24. n° 54; West. Herb. Crypt. Belge n° 1375)

In Herb.: Kampen, Bond. (v. v. et s.)

- 3258. Ph. brassicae** West. Op stervende Koolbladen. Aut. (West. 2^e Not. crypt. inéd. de la fl. Belg. p. 20. n° 92; Septoria brassicae West. Herb. Crypt. Belg. n° 294; Depazea brassicaccola Duby; Rabenh. p. 138)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3259. Ph. camelliae** West. Op treurende bladen van *Camellia japonica* in de oranjeriën. Hieme. (West. 2^e Not. Crypt. inéd. de la Belg. p. 21. n°. 96)

Taches arrondies, assez grandes (2 à 3 centim.), se développant indifféremment sur les bords ou le centre de la feuille, brunâtres, devenant blanchâtres avec l'âge, entourées d'une bordure étroite, épaisse, brun pourprée. Perithèces immergés, noirs, noircissant quelquefois l'épiderme par transparence, épars sur toute la tache. Cirrhe blanchâtre. Sporidies ovales, très petites transparentes, contenant aux extrémités 2 sporules globuleuses. (West. l. l.)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3260. Ph. coryli** West. Op de treurende bladen van *Corylus Avellana*. Aut. (West. 3^e Not. Cr. inéd. fl. B. pag. 18 n°. 76; West. Herb. Cr. B. n°. 731.)

Taches hypophylles, arrondies, brunes, assez grandes, de 5 à 15 mill. de diamètre. Perithèces épars sur toute la tache, brun-noirâtres, petits, percés d'un pore simple. Cirrhe blanchâtre. Sporidies ovales, contenant 2 sporules hyalines placés aux extrémités.

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3261. Ph. cruenta** Kx. Op treurende bladen van *Convallaria multiflora* en *polygonatum*. Aut. (Kx. Rech. Crypt. des Fland. 4^e Cent. p. 22; Sphaeria (Depazea) cruenta Fr. Syst. II. p. 531; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21; Depazea cruenta Kze; Rabenh. p. 138)

In Herb.: 's Hage, Dz. et Mb.; Wassenaar, Jung h.; Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3262. Ph. destructiva** Desmaz. Op stervende bladen van verschillende *Malva*-soorten. Aut. (Ph. destructiva β . malvacearum Desmaz. 14^e Not. Crypt. de Fr. p. 29; Sphaeria (Depazea) vagans d. malvaecola Fr. Syst. II. p. 532; Rabenh. p. 139).

In Herb.: . . . Lantz. Ben. — Bovendien:
Maastricht Franq.

- 3263. Ph. fragariaecola** Rob. Op stervende en treurende bladen van *Fragaria vesca*. Aut. (Rob. in Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. nouv. Ed. n°. 686; Depazea fragariaecola Wallr.; Rabenh. p. 138; Sphaeria vagans γ. fragariaecola Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.) — Bovendien:
Maastricht, Franq.

- 3264. Ph. mercurialis** Desmaz. Op treurende bladen van *Mercurialis annua*. Aut.

Maculis albis, exaridis, minutis, indeterminatis, interdum confluentibus. Peritheciis amphigenis, innatis, pallide succineis, dein fusco-nigricantibus, poro apertis. Sporidiis hyalinis, rectis, oblongis, utrinque obtusis, 1-septatis, vel 3, 4 guttulis repletis. Desmaz. 17^e Not. Cr. de Fr. p. 25 n°. 35; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 1857)

In Herb.: Hees bij Nymegen, Abel (v. v. et s.)

- 3265. Ph. rhodondendri** West. Op treurende bladen van *Rhododendron arboreum* in de oranjeriën. Hieme.

Taches rousses ou brun rougeâtres, assez grandes (3 a 5 centim.), indéterminées, attaquant ordinairement les bords ou le sommet de la feuille. Périthèces immersés, saillants, noirs à ostiole poriforme assez grand. Cirrhe incarnat. Sporidiies cylindrique-ovales, contenant 3 ou 4 sporules, globuleuses. (West. 2^e Not. Crypt. inéd. de la Belg. pag. 22 n°. 100)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., Oudem. (v. s.)

- 3266. Ph. rumicis** Pers. Op treurende bladen van *Rumex acetosa* etc. Aut. (Pers. Ch. comest. p. 147. Sphaeria vagans v. rumicicola Fr. Syst. II. p. 532; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3267. Ph. sambuci** Desmaz. Op treurende bladen van *Sambucus nigra*. Aut.

Epiphylla. Maculis candidis, solitariis vel confluentibus in series dispositis. Peritheciis curvato-prominulis, minutissimis, paucis fusco-nigris, poro apertis. Nucleus albidus; sporidiis perexiguis, ovoideo-oblongis, bimaculatis. (Desmaz. 14^e Not. Crypt. de Fr. pag. 34, n°. 51)

In Herb.: Broek in Waterland, Kraamw.; Kampen, R. Bond. (v. v. et s.)

- 3268. Ph. ulmi** West. Op treurende en stervende bladen van *Ulmus campestris*. Aest. Aut.

Taches amphigènes, arrondies, éparses ou confluentes, d'un blanc-grisâtre sale, sans bordure ni aréole et souvent stériles. Perithèces rares, excessivement petits, éparpillés sans ordre sur toute la tache. Ostiole poriforme. Sporidies ovales, hyalines, de $1/100^{\text{e}}$ de mill. de longueur sur $1/200^{\text{e}}$ de mill. de largeur. (West. 5^e Not. Crypt. inéd. de la Belg. p. 27. n°. 69; West. Herb. Crypt. B. n°. 1143)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3269. Ph. violae** Desmaz. Op treurende bladen van *Viola odorata*. Aut.

Amphigena. Maculis albidis, rotundatis, sparsis vel confluentibus. Peritheciis innatis, numerosis, microscopicis, fuscis. Cirrhis albis. Sporidiis minutissimis, rectis, subcylindricis. (Desmaz. 14^e Not. Crypt. de Fr. p. 29. n°. 41)

In Herb.: In den kruidtuin van Nymegen. Abel.

CYTISPORA (Ehrenb.) Fr.

- 3270. C. chrysosperma** Fr. Op doode takken van *Populus tremula*. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 542; Rabenh. p. 146)
Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3271. C. corni** West. Op doode takken van *Cornus sanguinea*. Aut.-Vere.

Périthèces noirs, membraneux, comprimés, très petits, réunis par groupes de 3 ou 4, recouverts par l'épiderme soulevé et bruni; les ostioles de chaque groupe se réunissent pour percer l'épiderme au centre de la partie tachée, sous forme de disque ponctiforme, noir et luisant. Cirrhe d'un blanc jaunâtre, formé par l'aggrégation de sporidies excessivement petites, cylindriques, droites ou légèrement courbées, de $\frac{1}{200}$ de mill. de longueur sur $\frac{1}{800}$ de mill. de largeur. (West. 5^e Not. Crypt. inéd. de la Belg. pag. 28. n° 76; West. Herb. Cr. Belg. n° 1129)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3272. C. fugax** Fr. Op doode Wilgentakken. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 544; Rabenh. p. 146)

In Herb.: Warmond, Rhijnsburg, de Haan, in Herb. de Vries; Leiden, Ankersm.; Utrecht, Wittw.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Goes, v. d. B.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3273. C. incarnata** Fr. Op doode takken van *Robinia inermis* en *pseudo-acacia*. (Fr. Syst. II. p. 542; Rabenh. p. 148).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3274. C. leucosperma** Fr. Op doode Populiertakken. Per annum. (Fr. Syst. II. p. 543; Rabenh. p. 147; Dz. et Mb., Bijdr. t. I. p. 22)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac.; Amsterdam, Oudem.; v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3275. C. macilenta** Desmaz. Op doode takken van *Cornus sanguinea*. Aut.-Vere.

Pustulis minutis, punctiformibus, brunneis vel nigris, numerosis, inordinatis, irregulariter rotundatis, ovatis vel reniformibus, convexis, epidermide tectis dein erupta applicatis; cellulis 5-7 tenuibus, circinatis; nucleo pulposo; cirrho crasso, abbreviato, albidio-lutescente. Sporidiis oblongis, rectis, obtusiusculis, hyalinis; sporalis 2-4, globosis, subopacis. (Desmaz. 17^e Not. Crypt. de Fr. p. 26. n^o. 37; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n^o. 1898)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

MICROPERA Lév.

Conceptacula innata membranacea ovato-elongata vertice dehiscentia. Sporae lineares continuae curvatae cum gelatina immixtae in massam erumpentes. (Lév. Champ. du mus. de Par. in Ann. des Sc. nat. 2^e Série Tom. V. p. 283)

- 3276. M. drupacearum** Lév. Op doode schors van Krieken en Pruimen. Per annum. (Lév. l. l.)

Conceptaculis pustulatis innatis subcylindricis basi coadunatis farinaceis transversim erumpentibus. ostiolis albis, sporis apice curvatis. (Lév. l. l.; Cenangium Cerasi var. junior Fr. Syst. myc. II p. 180).

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

Obs. Cette espèce serait d'après Mr. Tulasne, l'état spermogonique du *Cenangium Cerasi* Fr.

SEPTORIA Fr. (*Ascochyta* Lib.).

- 3277. S. aegopodii** Desmaz. Op treurende bladen van

Aegopodium podagraria Aut. (Desmaz. Pl. Crypt de Fr. n° 616; *Sphaeria aegopodii* Pers.; Dz. et Mb. Bijdr. I p. 21; Fr. Syst. II. p. 526; Rabenh. p. 580).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, Wttw.; Rotterdam, Oudem.; Naaldwijk, v. d. Tr.; Zwake, v. d. B. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3278. *S. aesculicola* West. Op stervende bladen van *Aesculus hippocastanum*. Aut. (West. 2^e Not. Crypt. inéd. Belg. p. 17. n° 80; *Sphaeria* (Depazea) *aesculicola* Fr. Syst. II. p. 530; Rabenh. p. 137; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3279. *S. alliorum* West. Op de bladen van *Allium porrum*. Aest. Aut.

Taches irrégulières, éparses ou confluentes, non limitées, verdâtres, devenant d'un blanc de lait au centre, dépassant rarement un centim. de diamètre. Perithèces nombreux, sémi-immergeés, éparpillés sans ordre sur toute la tache, d'un roux-brunâtre, à ostiole poriforme. Sporidies flexueuses; cylindriques, obtuses aux extrémités, contenant de 4 à 6 sporules globuleuses. (West. 2 Not. Crypt. inéd. de la Belg. pag. 19 n° 86.)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

3280. *S. ari* Desmaz. Op treurende bladen van *Arum maculatum*. Aest. Aut.

Maculis amphigenis, parvis, albido-exaridis vel viridulis suborbiculatis, fusco-cinctis. Peritheciis epiphyllicis, paucis, minutis, brunneis, innato-prominulis, poro apertis dein collabescendo concavis. Sporidiis rectis, linearibus; sporulis globosis numerosis. (Desmaz. 14^e Not. Crypt. de la Fr. pag. 18, n° 19).

In Herb.: Utrecht, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3281. *S. betae* West. Op treurende bladen van *Beta vulgaris*. Aest. Aut. (*Sphaeria* (Depazea) *vagans* h.).

betaecola Dec.; Fr. Syst. II. p. 532; Rabenh. p. 139; West. 2^e Not. Crypt. inéd. Belg. p. 16, n° 77). Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3282. S. cheiranthi** Rob. Op treurende bladen van *Cheiranthus cheiri*. Aest.

Maculis amphigenis, helvolis, rotundatis vel irregularibus. Peritheciis epiphyllis, paucis, nigris, innato-prominulis, poro pertusis, dein collabescendo concavis. Cirrhis eburneo-subcarneis. Sporidiis tenuissimis, curvulis, sporulis 6—8. (Desmaz. 14^e Not. p. 20, n° 25).

In Herb.: Deventer ? (v. s.)

- 3283. S. chelidonii** Desmaz. Op treurende bladen van *Chelidonium majus*. Aest. Aut. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 1176; Sphaeria lichenoides var. Chelidonicola Dec.; Ascochyta Lib.; Rabenh. p. 146).

Maastricht Franq. (n. v.)

- 3284. S. chenopodii** West. Op treurende bladen van *Chenopodium viride* en anderen. Aest. Aut.

Taches arrondies, éparses ou confluentes, atteignant rarement 6 millim. de diamètre, d'un blanc verdâtre, devenant avec l'âge d'un jaune sale, entourées de zones jaunes ou brunâtres. Perithèces innombrables, noirs, sémi-immergés, très petits, éparpillés sur toute la tache et lui donnant une teinte plombée. Ostiole poriforme. Cirre blanchâtre. Sporidies droites ou flexueuses, cylindriques ou fusiformes obtuses aux extrémités et contenant de 6 à 10 sporules globuleuses. (West. 2^e Not. Crypt. inéd. de la Belg. p. 19, n° 88; West. Herb. Cr. B. n° 643).

In Herb.: Tjepma . . . ? (v. v. et s.)

- 3285. S. convolvuli** Desmaz. Op treurende bladen van *Convolvulus arvensis* en *sepium*. Aest. Aut. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 1172; Sphaeria (Depazea) Gentianaccola & Convolvulicola Dec.; Fr. Syst.

II. p. 531; *Depazea Coneolvulicola* Rabenh. p. 138).

In Herb.: Bij Nijmegen, Abel. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3286. *S. cornicola* Desmaz. Op bladen van *Cornus sanguinea*. Aest. Aut. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 342; *Sphaeria* (*Depazea*) *cornicola* Dec.; Fr. Syst. II. p. 530; *Depazea cornicola* Rabenh. p. 137).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3287. *S. dianthi* Desmaz. Op treurende bladen van *Dianthus barbatus*. Aest. Aut. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 344; Desmaz. 17e Not. Crypt. de Fr. p. 20 n° 27; *Sphaeria* (*Depazea*) *Dianthi* Fr. Syst. II. p. 531; *Depazea dianthi* Rabenh. p. 137; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21)

In Herb.: Scheveningen, Dz. et Mb.; Bommel, Jungb. in Herb. Wttw. (v. v. et s.). Variat:

a. *Saponariae* Desmaz. l.l. Op bladen van *Saponaria officinalis*.

In Herb.: Katwijk, Wttw. ex herb. Ankersm. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

3288. *S. ficariae* Desmaz. Op treurende bladen van *Ranunculus ficaria*. Aest. Aut.

Amphigena; maculis parvis, orbiculatis, fuscis, demum cinereis exaridis, in ambitu fuscis, irregularibus vel confluentibus; peritheciis innatis, minutissimis, nigris, subnitidis, convexis, demum planiusculis; cirrhis albis; sporidiis linearibus tenerrimis, rectis vel subcurvatis. (Desmaz. 8e Not. Crypt. nouv. de Fr. p. 7; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 1087).

In Herb.: Rotterdam: Oudem. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

3289. *S. fragariae* Desmaz. Op kwijnende bladen van *Fragaria vesca*. Aest. Aut.

Epiphylla, maculis suborbiculatis, fuscis, in ambitu brunneo-rubris. Peritheciis minutissimis, innato-prominalis, fusco-fuligineis, ore orbiculari late apertis. Cirrhis albidis; sporidiis cylindricis, obtusis, curvatis vel rectis; sporulis 4, oblongis hyalinis. (Desmaz. Not. sur 16 esp. du genre *Septoria*, in Mém. Soc. Roy. des Sc. de Lille, 1842, n° 15, p. 11; Depazea fragariaecola Wallr.; Rabenh. p. 138).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

- 3290. S. Gei** Rob. Op treurende bladen van *Geum urbanum*. Aest. Aut. (Rob. in Desmaz. Nouv. Not. Crypt. inéd. de Fr. in Mém. Soc. Roy. des Sc. de Lille Mars 1843. p. 25. n° 12; Sphaeria (Depazea) vagans b. Geicola Fr. Syst. II. p. 532; Rabenh. p. 139).

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3291. S. hederae** Desmaz. Op de bladen van *Hedera helix*. Aut. Vere. (Desmaz. Nouv. Not. Crypt. inéd. de Fr. in Mém. Soc. Roy. Sc. de Lille. Mars 1843, n° 9 pag. 24; Sphaeria (Depazea) hederaecola Fr. Syst. II. p. 528; Rabenh. p. 136; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 21).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Maastricht, Franq. (v. s.)

- 3292. S. heterochroa** Desmaz. Op treurende bladen van *Malva-*, *Lamium-*, *Antirrhinum-* en *Plantago-* soorten. Aest. Aut.

Maculis amphigenis, sparsis, minutis, suborbiculatis, griseo-brunneis dein albis evanidis, saepe brunneo cinctis. Peritheciis parvis, epiphyllis, rarius hypophyllis, exilibus, fulvis, brunneis demum nigris, poro apertis, siccis concavis. Sporidiis linearibus tenuissimis, rectis vel curvulis. (Desmaz. 14^e Not. Crypt. nouv. de Fr. p. 21. n° 27). Variat:

a. *Plantaginis* Desmaz. Op de bladen van *Plantago major*. Aut. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 2172; Desmaz. 21^e Not. Crypt. de Fr. p. 2. n° 3).
In Herb.: Kampen, R. Bond. (v. s.)

3293. S. hydrocotyles Desmaz. Op treurende bladen van *Hydrocotyle vulgaris*. Aest. Aut.

Epiphylla; maculis irregularibus, rufis vel fuligincis, dein exaridis; peritheciis minutissimis innatis, ore orbiculari apertis; cirrhis albidis; sporidiis linearibus, curvalis; sporulis 8—10 globosis, opacis. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 1175; Desmaz. 9^e Not. Crypt. inéd. de Fr. pag. 19).

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3294. S. incondita Rob. Op treurende bladen van *Acer-*, *Quercus* en *Castanea*-soorten. Aut.

Maculis amphigenis, irregularibus, rufis aut brunneoterreis, non limitatis, dein confluentibus. Peritheciis hypophyllis, minutissimis, numerosis, rufo-olivaceis, dein intense-brunneis, innato-prominulis, poro apertis, dein pauciseulis. Cirrhis albidis aut dilute carneis; sporidiis elongatis, tenuissimis, rectis vel curvatis, saepe obtusis, sporulis 4, cylindricis. (Desmaz. 21^e Not. Sept. nouv. de la Fr. p. 11. n° 20.) Variat:

a. *Quercicola* Desmaz. ll. et Pl. Crypt. de Fr. n° 2192. Op Eikenbladen.

In Herb.: Leiden, v. d. B. (v. v. et s.)

3295. S. leguminum Desmaz. Op de peulkleppen van Boonen en Erwten. Aut.

Peritheciis innato-prominulis, fulvo-brunneis, minutissimis numerosis, dense sparsis, vel concentricis, quandoque maculaeformibus poro apertis. Cirrhis carneis; sporidiis oblongis, obtusis; sporulis 2-4 peregriguis, globosis, hyalinis. (Desmaz. Nouv. Not.

Crypt. inéd. de Fr. in Mém. Soc. Roy. des Sc. de Lille, Mars 1843. p. 28. n°. 15) Variat:

- a. *Pisorum* Desmaz. ll. Op de peulkleppen van Erwten (*Pisum sativum*) Aut. (Ascochyta Pisi Lib.; Rabenh. p. 146)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3296. S. nebulosa** Desmaz. Op de stengels van *Foeniculum vulgare* Aut.

Erumpens. Maculis griseis, effusis vel elongatis. Peritheciis minutissimis, nigris, numerosissimis, dense sparsis, vel in series longissimas parallelas aggregatis; ostiolo simplici pertusis. Cirrhis tenellis albis; sporidiis linearibus, rectis vel curvulis; sporulis 10-15, pereciliibus, opacis. (Desmaz. Nouv. Not. Crypt. inéd. de Fr. in Mém. Soc. Roy. des Sc. de Lille, Mars 1843. p. 24. n°. 10; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 1331)

In Herb.: Warmond, de Haan in Herb. de Vr. (v. v. et s.)

- 3297. S. oenotherae** West. Op de bladen van *Oenothera biennis*. Aest. Aut. (West. Herb. Cr. B. n°. 1152; West. 5^e Not. Crypt. nouv. de la Belg. p. 32. n°. 96; Depazea Oenotherae Lasch. in Rabenh. p. 138?)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3298. S. orchidearum** West. Op de bladen van *Orchis maculata* en *latifolia*. Aest.

Taches d'un pâle brunâtre, arrondies, non limitées par des lignes plus foncées, de 5 à 10 millim. de diamètre, offrant au centre un grand nombre de périthèces très petits, d'abord d'un jaune d'ambre, devenant ensuite d'un brun foncé. Ostiole simple, poriforme. Cirrhe blanchâtre. Sporidies linéaires, atténueées aux extrémités droites ou légèrement flexueuses, contenant de 6 à 8 sporules globuleuses et transparentes, très difficiles à apercevoir. (West. 2^e Not,

Crypt. nouv. de la Belg. p. 16. n° 74; West. Herb.
Cr. B. n°. 638)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3299. S. oxyacanthae Kze et Schm. Op de bladen
van *Crataegus oxyacantha*. Aut. (Kze. Myc. Hefte
II. p. 109; Dz. et Mb., Bijdr. I. p. 30; *Phlaeospora*
oxyacanthae Wallr. Comp. Fl. Germ. IV. p. 177;
Fr. Elench. Fung. II. p. 119)

In Herb.: Maastricht, Franq.; Zuid-Beveland, v. d. B.
(v. v. et s.)

3300. S. populi Desmaz. Op treurende bladen van *Po-*
pulus fastigiata. Aut. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr.
n°. 1731; Sphaeria (Depazea) frondicola ♂ maculis mi-
noribus Fr. Syst. II. p. 529; Dz. et Mb. Bijdr. I.
p. 21)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Maastricht, Franq.
(v. s.)

3301. S. pseudoplatani Rob. Op levende bladen van
Acer pseudo-platanus. Aut.

Maculis amphigenis, minutissimis, sparsis, suborbicu-
latis, rufis, in ambitu luteolis. Peritheciis epiphyllis,
paucis, conglomeratis, brunneis, convexis, dein
collabescendo concavis. Cirrhis albidis. Sporidiis line-
aribus, tenuissimis, curvulis. Sporulis 4? (Rob. in
Desmaz. 14^e Not. Crypt. de Fr. p. 20 n° 26; Des-
maz. Pl. Crypt. de Fr. n° 1722).

In Herb.: Kampen, R. Bond. (v. v. et s.)

3302. S. pyri West. Op levende bladen van *Pyrus com-*
munis. Aest. Aut.

Taches épiphylles, petites, éparses, arrondies ou an-
guleuses, brun-bistrées, circonscrites par une ligne plus
foncée, formée par les nervures de la feuille. Au centre de
chaque tache on remarque une autre plus petite, blanche
ou jaune brunâtre, sur laquelle on voit les périthèces

au nombre de 3 à 10, très petits, épars, noirâtres, et perforés d'une ouverture simple, assez grande; cirrhe blanc verdâtre. Sporidies allongées, linéaires, amincies aux extrémités, plus ou moins flexueuses et contenant de 8 à 12 sporules globuleuses, transparentes. (West. Herb. Cr. Belge n° 136; Depazea pyricola Desmaz.)

In Herb.: Goes, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3303. S. quercina** Desmaz. Op stervende Eikenbladen. (Desmaz. 14e Not. Crypt. de Fr. pag. 25, n° 35; Depazea quercicola Wallr.; Rabenh. I. p. 137).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3304. S. rosae** Desmaz. Op treurende Rozenbladen. Aest. Aut.

Taches d'abord purpurines, puis brunes, arrondies, plus ou moins grandes, quelquefois entourées d'une aréole jaunâtre ou pourprée. Périthèces innés, bruns, épars, s'ouvrant au sommet par un pore arrondi. Cirrhe blanc. Sporidies linéaires, plus ou moins courbées contenant 8 à 12 sporules, globuleuses, opaques. (West. 1e Not. Crypt. inéd. de la fl. Belge, p. 16, n° 41; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 535; Ascochyta roseum Lib.; Rabenh. p. 145).

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3305. S. rubi** West. Op kwijnende *Rubus*bladen. Aut. (West. Herb. Cr. Belge n° 938; Sphaeria rubi Duby. Bot. Gall. II. p. 712?; Depazea rubi West. et v. Haes. Cat. Crypt. n° 80).

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3306. S. salicariae** West. Op treurende bladen van *Lythrum salicaria*. Aut. (Ascochyta salicariae Franq. in litt.)

Ascis fusiformibus, tenuissimis, pellucidis. (Franq. l. l.)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3307. S. scabiosaecola Desmaz. Op levende bladen van *Scabiosa succisa*. Aest. Aut. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n° 722; Sphaeria (Depazea) vagans f. scabiosaecola Dec.; Fr. Syst. II. p. 532; Rabenh. p. 139; Dz. et M. Bijdr. II. p. 17).

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

3308. S. stachydis Rob. Op bladen van *Stachys sylvatica*. Aest. Aut.

Maculis amphigenis, subolivaceis, dein pallide brunneis sub-exaridis, irregularibus, venulis cinctis, sparsis vel confluentibus. Peritheciis epiphyllis, minutissimis, brunneo-nigris, poro apertis. Sporidiis linearibus, tenuissimis, curvulis vel flexuosis; sporulis vix distinctis. (Desmaz. 14^e Not. Crypt. de Fr. p. 19. n° 22).

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3309. S. tiliae West. Op levende bladen van *Tilia europaea*. Aut.

Taches amphigènes, très petites (1 à 2 millim.), arrondies, éparses, d'un brun foncé presque noir, palissant un peu au centre, où se trouvent éparpillés quelques périthèces rares, fort petits et noirs. Sporidies cylindriques, droites, souvent un peu plus grosses d'un côté, de 1 à $\frac{2}{100}$ es de millim. de longueur, sur $\frac{1}{400}$ de millim. de largeur et offrant de 3 à 5 cloisons. (West. 5^e Not. Crypt. de Belg. pag. 34 n° 108; West. Herb. Cr. Belg. n° 956).

Maastricht, Franq. (n. v.)

Obs. Cette plante, à l'état stérile ou de vétusté est *Ectostroma Tiliae* des auteurs.

3310. S. tomentillae Rob. Op kwijnende bladen van *Potentilla*-soorten. Aest. Aut.

Maculis amphigenis, minutis, ovalibus vel irregularris, albidis exaridis, saepe roseo cinctis. Peritheciis epiphyllis, minutissimis, paucis, fuscis, poro apertis,

sporidiis tenuissimis, flexuosis. (Desmaz. 14^e Not. Crypt. de Fr. p. 22 n° 29). Variat:

- a. *Potentillae* West. Op de bladen van *Potentilla reptans*. Aut. (West. 3^e Not. Crypt. inéd. de la Fl. B. p. 17. n° 67)

In Herb.: Tjepma. (v. s.)

- 3311. *S. tussilaginis*** West. Op kwijnende bladen van *Tussilago farfara*. Aut.

Taches nombreuses, éparses ou confluentes, arrondies, irrégulières ou anguleuses, dépassant rarement 4 millim. de diamètre, d'abord brunes, puis devenant blanchâtres ou grisâtres, limitées par un bord épaissi et entourées d'une aréole pourprée. Périthèces très petits, immersés, éparpillés sur toute la tache, noirâtres, à ostiole poriforme. Sporidies petites, flexueuses, cylindriques, tronquées aux extrémités, contenant de 8 à 12 sporules globuleuses et transparantes. (West. 2^e Not. Crypt. inéd. de la Fl. B. p. 18. n° 83)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3312. *S. ulmi*** Fr. Op stervende bladen van *Ulmus campestris*. Aut.-Vere. (Fr. Nov. Fl. Succ. V. p. 78; Rabenh. p. 43; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30).

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Kampen, R. Bond.—Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

PHLYCTENA Desmaz.

Peritheциум spurium, convexum, ab epidermide nigrafacta formatum, poro pertusum. Nucleus gelatinosus. Asci nulli. Basidia brevissima. Sporidiis curvatis elongatis vel fusiformibus dein ejectis. (Desmaz. 14^e Not. Crypt. de Fr. p. 16)

- 3313. *Ph. vagabunda*** Desmaz. Op doode stengels van kruidgewassen. Vere. Aest.

Maculis nullis vel minutissimis, brunneis, saepe fibrillosis. Pseudoperitheciis numerosis, sparsis, exilisimis. Sporidiis hyalinis, curvatis, elongatis, linearibus, utrinque subobtusis. Sporulis 7-9, vix distinctis. (Desmaz. Il. p. 16. n°. 16; Ascochyta caulinum. Lib. Pl. Crypt. Ard. n°. 248)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

VERMICULARIA Fr.

Perithecium superficiali-adnatum, pilis setosis erectis vestitum, astomum, demum basi secedens. Sporidia fusiformia septata. (Fr. Summa Veg. Scand. p. 419)

* Caulicola e.

- 3314. V. chenopodii** West. Op doode stengels van *Chenopodium album*. Hieme-Vere.

Périthèces d'un noir brunâtre, saillants, arrondis, très petits, épars, innés, couverts de poils rares, courts, très fragiles, brunâtres. Ostiole irrégulier. Sporidies hyalines, fusiformes, légèrement courbées en croissant, de $1/100^{\text{e}}$ de mill. de longueur sur $1/400^{\text{e}}$ de mill. de largeur et offrant souvent une cloison au milieu. (West. 5e Not. Crypt. inéd. de la Fl. B. p. 23. n°. 48; West. Herb. Cr. Belge n°. 1233)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3315. V. dematium** Fr. Op doode stengels van groote kruidgewassen. Vere. (Fr. Summ. Veg. Scand. p. 420; Sphaeria dematium Pers.; Rabenh. I. p. 195; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Wttw.; Utrecht; v. d. S. Lac.— Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3316. V. eryngii** Desmaz. Op doode stengels van *Eryng-*

gium campestre. Hieme. Vere. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 542; Exosporium eryngii Pers.; Helminthosporium eryngii Fr. Syst. III. p. 361).

In Herb.: Noordwijk, Dz. et Mb.; Harderwijk, Jungh. in Herb. de Vr.; Kampen, R. Bond.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3317. V. herbarum West. Op doode stengels van kleine kruidgewassen. Vere.

Périthèces innés, épars, très petits, arrondis ou ovalaires, surmontés d'un faisceau de poils bruns (plus pâles et transparents vers le sommet), raides et acérés, et s'ouvrant au sommet par une déchirure inégale. Sporidies allongées, atténées et courbées aux extrémités, ayant $1/50^{\text{e}}$ à $1/60^{\text{e}}$ de mill. de longueur, contenant de 3 à 5 sporules globuleuses et transparentes. (West. 2^e Not. Cr. inéd. de la B. p. 29. n°. 146)

Variat:

a. *Dianthi* West. l. l. Op doode stengels van *Dianthus superbus*. In de hoven.

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

b. *Sedi* West. Op doode stengels van *Sedum telephium*.

Vere. (West. 4^e Not. Cr. inéd. Belg. p. 12. n°. 49)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

3318. V. liliacearum West. Op doode bloemstengels van *Ornithogalum*, *Scilla* en *Allium*-soorten. Hieme. Vere.

Périthèces très petits, noirs, luisants, arrondis ou ovalaires, convexes, épars, surmontés d'un faisceau de poils assez fins, d'un noir brunâtre, variant pour sa longueur entre 3 et $9/100^{\text{e}}$ de mill. et caducs dans un âge avancé. Ostiole poriforme ou irrégulier. Sporidies hyalines, cylindriques, atténées aux extrémités, plus ou moins courbées en forme de croissant, longues de $1/50^{\text{e}}$ de mill. sur $1/200^{\text{e}}$ de mill. de largeur et of-

frant souvent une cloison au milieu. (West. 5e Not. Cr. inéd. de la Fl. B. p. 23. n°. 47)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3319. V. maculans** Desmaz. Op doode Aardappelstruiken. Hieme. Vere. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 339; Fr. Summ. Veg. Scand. p. 420; Exosporium maculans Link.)

In Herb.: Naaldwijk, v. d. Tr. (v. v. et s.)

- 3320. V. minutum** Desmaz. Op doode stengels van kruidgewassen. Hieme. Vere. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 231; Sphaeria dematum b. minor Fr. Syst. II. p. 505;? Sph. minuta Rabenh. I. p. 196)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, Splitg.
in Herb. de Vr. (v. v. et s.) Variat:

- a. *Hederae* West. in Herb. Op stervende bladen van *Hedera helix*. (Exosporium minutum V Hederae Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 1848)

In Herb.: Leiden, v. d. B. (v. v. et s.)

* * Epiphyllae.

- 3321. V. trichella** Fr. Op doode bladen van *Hedera helix*. Hieme. Vere. (Fr. Summ. Veg. Scand. p. 420; Sphaeria trichella Fr. Syst. II. p. 515; Rabenh. p. 195)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Utrecht,
v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3322. V. hispidula** West. Op bladen, halmen en aren van afgesneden grasgewassen. Aut. Hieme. (Exosporium hispidulum Link.; Rabenh. p. 33)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3323. V. depazoides** West. in Herb. Op treurende bladen van de Vlier. Aut. (Exosporium depazoides Desmaz. 17e Not. Cr. de Fr. p. 38. n°. 56)

Amphigenum, numerosum, maculae albae insidens.
Stromate punctiformi. Setis brevibus, fusco-nigris,
subdivergentibus. Sporidiis rarissimis, clavatis, septa-
tis, semihyalinis. (Desmaz. l. l.)

In Herb.: Kampen, R. Bond. (v. s.)

Trib. Sporophorac.

PROSTHEMIUM Kunze.

- 3324. Pr. betulinum** Kunze. Op de schors van af-
gestorven takken van *Betula alba*. Hieme. Vere. (Fr.
Syst. III. p. 484; Rabenh. p. 142)

In Herb.: Leiden, Wttw. (v. v. et s.)

SCHIZOTHYRIUM Desmaz.

Perithecium sessile, simplex, subcorneum, rotunda-
tum vel ovatum, applanatum vel convexiusculum, mi-
natum, punctiforme, rima longitudinali dehiscens;
nucleo gelatinoso, albido. Ascii fixi, erecti. Sporidiis
ovoideis simplicibus vel compositis. (Desmaz. 17^e Not.
Cr. de la Fr. p. 34)

- 3325. S. ptarmicae** Desmaz. Op levende stengels en
bladen van *Achillea ptarmica* in de lusthoven. Aest.
Aut. (Desmaz. l. l. p. 35. n^o. 50; Labrella ptarmicæ
Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n^o. 189; Dz. et Mb. Bijdr.
l. p. 22; Fr. Elench. fung. II. p. 149)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

ACTINOTHYRIUM Kze.

- 3326. A. graminis** Kze. Op doode grashalmen. Aut.
Vere. (Fr. Syst. II. p. 597; Rabenh. p. 142)

In Herb.: Rotterdam, v. d. B. (v. v. et s.)

MICROTHYRIUM Desmaz.

Perithecium simplex, superficiale, membranaceum, adpressum, scutiforme, centro perforatum, obtegens ascos fixos subclavatos. (Desmaz. 8^e Not. Crypt. de Fr. p. 9. Pl. XIV. fig. 1)

- 3327. M. microscopicum** Desmaz. Op doode en afgevallen bladen van *Ilex aquifolium*. Aut.

Epiphyllum. Maculis magnis, irregularibus, fusco-cinerascentibus; peritheciis sparsis, minutissimis, tenuissimis, nigris, subnitidis, papillatis; ascis clavatis; sporidiis septatis, oblongis, subfusiformibus. (Desmaz. I. l. p. 10; Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 1092)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

Obs. Cette espèce est souvent mêlé sur les mêmes feuilles avec le *Phacidium multivalve* et l'*Eustegia ilicis*.

LEPTOSTROMA Fries.

- 3328. L. scirpi** Rabenh. Op doode halmen van *Scirpus lacustris*. Hieme. Vere. (Rabenh. I. p. 140; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 17)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3329. L. juncinum** Fr. Op doode halmen van *Juncus conglomeratus*. Hieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 598; Rabenh. p. 140; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 17)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

- 3330. L. filicinum** Fr. Op doode loofstelen van *Pteris aquilina*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 599; Rabenh. p. 141; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 18)

In Herb.: Haarlem, Dz. et Mb.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3331. L. litigiosum** Desmaz. Op doode loofstelen van *Pteris aquilina*. Aut. Hieme.

Perithecium subrotundum, minutissimum, punctiforme, sparsum vel conglomeratum, brunneo-nigrum, demum totum secedens. (Desmaz. Mém. de la Soc. Roy. des Sc. de Lille, Mars 1843. pag. 21. n°. 5; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 1327)

In Haarlem, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3332. L. vulgare** Fr. Op doode stengels van verschillende kruidgewassen. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 599; Rabenh. p. 141)

In Herb.: bij Zutphen, West. ex herb. G. Aub. (v. v. et s.) Variat:

- a. *Verbena* Rabenh. (West. Herb. Cr. Belg. n°. 1246).
Op doode stengels van Verbena offic.

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3333. L. scirpinum** Fr. Op doode halmen van *Scirpus lacustris*. Aut. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 598; Rabenh. p. 140)

In Herb.: Hulst, West. (v. v. et s.)

Obs. Ne pas confondre avec le *L. scirpi* qui croit sur les mêmes plantes.

- 3334. L. ocellatum** Pers. Op doode bladen van *Betula alba*. Hieme. (Pers. in Herb.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.) An *Leptothyrium betulae* Lib.?

LEPTOTHYRIUM Kunze.

- 3335. L. juglandis** Lib. Op treurende en stervende bladen van *Juglans regia*. Aut. (Lib. Pl. Crypt. Ard. n°. 164; Sphaeria (Depazea) juglandicola Fr. Elench. fung. II. p. 110; Depazea juglandina Rabenh. p. 137)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3336. L. populi** Lib. Op stervende bladen van *Populus nigra* en *fastigiata*. Aut.

Epiphyllum. Maculis primo orbiculatis, subradiatis, demum irregularibus confluentibus fuscis; peritheciis planiusculis, pallidis, basi circumscisis; pulpa alba; ascellis subclavatis; sporidiis 3-4 pellucidis. (Lib. Pl. Cr. Ard. n°. 257)

In Herb.: Busloo bij Zutphen, West. ex herb. G. Aub. (v. v. et s.)

- 3337. L. ribis** Lib. Op treurende bladen van rode Aalbeziën. Aut.

Epiphyllum. Maculis orbiculatis, minutis, confluentibus, fuscis; peritheciis planiusculis ruso-gilvis, basi circumscisis; pulpa alba; ascellis ovatis, curvatis; sporidiis 3 pellucidis. (Lib. Pl. Crypt. Ard. n°. 258)

In Herb.: Kampen, R. Bond.; Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

Trib. Asporae.

ASTEROMA Dec.

- 3338. A. atratum** Chev. Op de bladen van *Scabiosa*. Aut.

Epiphyllum anguloso-subrotundum aternum confluens late effusum, peritheciis minimis confertis. (Chev. Fl. Par. I. p. 449)

Maastricht, Franq. (n. v.)

- 3339. A. betulae** Rob. Op rottende bladen van *Betula alba*. Hieme. Vere.

Amphigena, maculaeformis. Fibrillis innatis, brunneis, ramosis e centro radiantibus; ramis numerosis, apice divergentibus. Peritheciis erumpentibus, sparsis, minutissimis, nigris. (Rob. in Desmaz. Mém. Soc.

Roy. des Sc. de Lille. Mars 1843 p. 35. n° 22; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n° 1346.

In Herb.: Hulst, West. (v. v. et s.)

3340. A. delicatulum Desmaz. Op de zaadhuisjes van *Lunularia rediviva*. Aut.

Maculis minutis, orbiculatis, quandoque confluentibus, humidis subolvaceis, siccis griseo-nigris. Fibrillis innatis tenerrimis flexuosis, e centro radiantibus. Ramis paucis, elongatis subdichotomis, articulatis; articulis diametro aequalibus. Peritheciis minutissimis, sparsis, globosis. (Desmaz. 19^e Not. Crypt. de Fr. p. 8; Desmaz. Pl. Cr. de fr. 1993.)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

3341. A. graminis West. Op rottende halmen van verschillende grassoorten. Aut. Vere.

Rosettes très petites, arrondies ou allongées, d'abord éparses puis confluentes, d'un gris olivâtre, formées par des fibrilles superficielles, divergentes, rameuses, très déliées et fort nombreuses. Périthèces excessivement petits, noirs, luisants, éparpillés sans ordre sur toute la rosette. Sporidies inconnues. (West. 5^e Not. Crypt. inéd. de la fl. B. p. 27, n° 73.) Variat:

- a. *Ammophilae* West. l. l. Op de halmen en bladen van *Ammophila arenaria*. (West. Herb. Cr. Belge n° 1051.)

In Herb.: de Hollandsche duinen, Oudem. (v. v. et s.)

3342. A. populi Rob. Op rottende Populierbladen. Hieme.

Epiphylla. Maculis nullis vel albidis, minutis, suborbiculatis, numerosis, saepe confluentibus, fibrillis tenuissimis, brevibus, densis, ramosis fusco-nigris e centro radiantibus. Peritheciis ignotis. (Desmaz. 14 Not. Crypt. de Fr. p. 35, n° 54.)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.)

3343. A. rosae Lib. Op kwijnende Rozenbladen. Aut. (Lib. Ann. Soc. L. Par. V. p. 405; Erysiphe radiosum Fr. Syst. III. p. 247; Sporotrichum maculare Link.; Ast. radiosum Fr. El. II. p. 151; Rabenh. p. 139.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Goes, v. d. B.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3344. A. ulmi Chev. Op stervende Olmbladen. Aut. Hieme.

Epiphyllum. Subrotundum fibrillis, centro tandem opaco, divaricatis. Peritheciis parum conspicuis innatis. (Chev. fl. Par. I. p. 448; Dothidea ulmi Grev.?)

In Herb.: Zalk, R. Bond. (v. s.)

ECTOSTROMA Fr.

3345. E. liriodendri Fr. Op treurende bladen van *Liriodendron tulipiferum*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 602; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 23; Leptostroma liriodendri Link.; Rabenh. p. 141.)

In Herb.: Leiden, in den Hortus Academicus, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3346. E. sedi Fr. Op stervende stengels en bladen van *Sedum telephium*. Aut. (Fr. Syst. II. p. 602; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22; Leptostroma sedi Link; Rabenh. p. 142.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Oudem. (v. v. et s.)

STREBLEMA Chev.

Fragile expansum submembranaceum totum nigrum intra ligni putridi fibras retroflexas efficiens. (Chev. fl. Par. I. p. 508).

3347. S. entogenum Chev. Tusschen de vezels van rottend hout, in holle Wilgenstammen, enz. Per annum.

Sinibus nigris crassiusculis late vaseque serpentibus interdum ligno resecto duplicatis, passim ramosis anostoniosantibus. (Chev. II. p. 508.)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

Ord. *Hyp homycetes.*

* **Mucorini.**

Trib. *Pilobolei* Corda.

PILOBOLUS Tode.

3348. P. cristallinus Tode. Op koemest, bij vochtig weder. Per annum. (Fr. Syst. III. 312; Rabenh. p. 135.)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. — Bovendien; Naaldwijk, v. d. Tr. (v. v. et Icon.)

Trib. *Mucoroideae.*

EUROTIUM Link.

3349. E. herbariorum Link. Op slecht gedroogde planten in Herbaria: Per annum. (Fr. Syst. III. p. 332; Rabenh. p. 133; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28.)

In Herb.: Leiden, Oudem. (v. v. et s.) Variat:

a. epixylon Kze et Schm. Op vochtig hout in de kelders. (Rabenh. p. 133; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 19)

In Herb.: Leiden, Oudem.; Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

MUCOR Mich.

- 3350. M. mucedo** Linn. Op bedorven spijzen, brood etc.
Per annum. (Fr. Syst. III. p. 320; Rabenh. p. 130;
Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland,
v. d. B. (v. s.)

- 3351. M. caninus** Pers. Op hondsdrek op vochtige plaat-
sen, in kelders, enz. Per annum. (Rabenh. p. 130.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3352. M. macrocarpus** Corda. Op den hoed en den
vruchtdrager van *Mycena galopus*. Aut. (Corda Ic.
fung. II. p. 21. T. XII. f. 84; Rabenh. p. 131;
Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 19)

In Herb.: 's Hage, G. B.

ASCOPHORA Tode.

- 3353. A. chalybaea** Dz. et Mb. Op de lauellen van
Agaricus rimosus. Aug. (Dz. et Mb. Tijdsch. v. Nat.
Gesch. en Physiol. XII. p. 283. T. VI. f. 4—10;
Bijdr. II. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et Ic.)

- 3354. A. fructicola** Corda. Op rottende pruimen, aal-
bessen en andere vruchten, na regenachtig weder. Aest.
(Corda Ic. fung. II. p. 20. T. XI. f. 82; Rabenh.
p. 130; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 19)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland,
v. d. B. (v. s.)

Trib. Isariae.**EPICHYSIUM** Tod.

- 3355. E. argenteum** Tode. Op rottenden koemest. Vere.
Aest. (Fr. Syst. III. p. 293; Rabenh. p. 125;
Tode Fung. Meck. II. p. 1. T. VIII. f. 60.)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

Trib. Stillbini.**STILBUM** Tode.

3356. S. erythrocephalum Ditm. Op drek van konijnen, hazen, enz., bij vochtig weder. Aut. (Fr. Syst. III. p. 303; Rabenh. p. 122.)

In Herb.: Rotterdam, Oudem. (v. v. et s.)

3357. S. rigidum Pers. Op rottend hout. Per annum. (Fr. Syst. III. p. 303; Rabenh. p. 122; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 10)

Naaldwijk. v. d. Tr. (n. v.)

PERICONIA Pers.

3358. P. atra Corda. Op verdroogde stengels van *Paeonia officinalis*. Aut. (Corda Ic. fung. I. p. 19. T. V. f. 258; Rabenh. p. 118.)

In Herb.: Leiden (Studentenpad), Dz. et Mb. (v. v. et s.)

Trib. Racodiel.**BRACHYCLADIUM** Corda.

3359. B. penicillatum Corda. Op doode stengels van *Papaver somniferum*. Aut. (Cord. Ic. fung. II. p. 14. T. X. fig. 63; Rabenh. p. 117)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

CEPHALOTRICHUM Link.

3360. C. stemonitis Nees. Op rottend hout, alsook op rottende halmen van *Phragmites communis*. Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 280; Periconia stemonitis Pers.; Rabenh. p. 118; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 27)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

TRIPOSPORIUM Corda.

- 3361. T. elegans** Corda. Op rottende Berkentakken en -spanen. Aut. Vere. (Corda Ic. fung. I. p. 16. T. IV. fig. 220; Rabenh. p. 116)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

POLYTHIRINCIMUM Kze.

- 3362. P. trifolii** Kze. Op treurende bladen van verschillende Klaversoorten. Aut. (Fr. Syst. III. p. 338; Rabenh. p. 115; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb., Oudem.; Zuid-Beveland, Zwake, v. d. B.; Zwijndrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq.

CLADOSPORIUM Link.

- 3363. Cl. herbarum** Link. Op afgestorven stengels van kruidgewassen. Aut. Ilieme. (Fr. Syst. III. p. 370; Rabenh. p. 113; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Kampen, R. Bond. (v. s.)

- 3364. Cl. fuscum** Nees. Op levende bladen van *Artemisia vulgaris*. Aut. (Fr. Syst. III. p. 370; Rabenh. p. 113)

In Herb.: Maastricht, Franq.

- 3365. Cl. fumago** Link. Op levende bladen van verschillende boomen en heesters. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 370; Rabenh. p. 113; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28; Fumago vagans Pers.)

In Herb.:

- Op *Acer*, Leiden, Dz. et Mb.
- Op *Tilia*, Leiden, Oudem.

- c. Op *Quercus*, Leiden, Dz. et Mb.
- d. Op *Viburnum tinus*, Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.
- e. Op *Pyrus malus*, Goes, v. d. B.
- f. Op *Ribes nigrum*, Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3366. Cl. epiphyllum Link. Op afgestorven Populier-bladen. Aut. (Fr. Syst. III. p. 370; Rabenh. p. 113; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Kampen, R. Bond.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq. (n. v.)

3367. Cl. dendriticum Wallr. Op levende bladen van Appelen en Peren. Aut. (Rabenh. p. 113) Variat:

- a. *Pyri* Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 2137.

In Herb.: Maastricht, Franq. (n. v.)

3368. Cl. graminum Link. Op kwijnende bladen en halmen van verschillende Grassen. Aut. (Rabenh. p. 113)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3369. Cl. fasciculare Fr. Op stervende stengels van kruidgewassen, alsook op de vruchten van Esschen. Aut. Hieme. (Fr. Syst. III. p. 370; Rabenh. p. 113; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Kampen, R. Bond.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

3370. Cl. fasciculatum Corda. Op rottende halmen van *Scirpus lacustris*. Aut. (Corda Ic. fung. I. p. 15. T. IV. fig. 216; Rabenh. p. 115)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. s.)

3371. Cl. typharum Desmaz. Op afgestorven bladen van *Typha angustifolia*. Aut. (Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 304. Sine deser.)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Læc. (v. v. et s.)

CAPNODIUM Mont.

Peridium carnosum, varium, clavatum, lageniforme aut ceranoideum, apice irregulariter rumpens, e strato duplice formatum, exteriori scilicet colorato celluloso, cellulis inaequaliter penta-hexagonis, in ostio parallelogrammis linearibusque, interiori mucilagineo hyalino fere anhisto. Nucleus gelatinosus bibulus. Ascii late obovoideo-clavaeformes, mox diffluentes, sporas subsenas, oblongas, transversim septatas, tandem septis longitudinalibus accendentibus cellulosas, fuscescentes, includentes. Thallus nigrescens superficialis, libere evolutus, e floccis brevibus contortis aut moniliformibus, ramosis articulatis fusca dense intricatis compositus. (Mont. Ann. des Sc. Nat. 3^e Sér. T. XI. p. 233; Mont. Syll. Gen. Spec. Crypt. p. 256.)

- 3372. C. sphaeroideum** Lacr. Op schors van Wilgentakken. Hieme. Vere. (Lacr. in Desmaz. Pl. Cr. de Fr. 2^e Sér. n° 769. Sine deser.; Rabenh. Fung. Eur. n° 352.)

In Herb.: Studentenpad bij Leiden, de Haan in Herb. de Vr. (v. s.)

PASSALORA Mont. et Fr.

Fibrae tenellae, flexuosa, subramosa. Sporidia longe stipitata, stipite articulo discreto, ceterum simplicia et primitus concatenata. (Mont. Ann. des Sc. nat. 2^e Série T. VI. p. 30. T. 12 f. 4.)

- 3373. P. bacilligera** Mont. et Fr. Op levende Elzenbladen. Aut.

Hypophylla; fibris tenellis subramosis flexuosis, apice incrassato obtusis, olivaceis septatis intricatis, maculas minutis fuliginosas efformantibus; sporidiis simplicibus longe stipitatis; stipite articulo discreto, primitus con-

catenatis. (Mont. l.l. pag. 31. T. XII. fig. 5; Mont. Syll. Gen. Spec. Crypt. p. 305)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

HELMINTHOSPORIUM Link.

3374. H. velutinum Link. Op doode takken van verschillende boomen en heestergewassen. Per annum. (Fr. Syst. III. p. 359; Rabenh. p. 108; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 10)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3375. H. tenuissimum Nees. Op rottende bladen van een *Pancratium*. Hieme. (Rabenh. p. 109; Macrosporium tenuissimum Fr. Syst. III. p. 374.)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3376. H. arundinaceum Corda. Op stervende bladen van *Phragmites communis*. Aut. (Corda Ic. fung. III. p. 10. T. II. f. 25; Rabenh. p. 109.)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3377. H. folliculatum Corda. Op rottend hout, bijzonder van *Corylus avellana*, op vochtige plaatsen. Hieme. (Corda Ic. I. fung. p. 12. T. III. f. 180; Rabenh. p. 110.) Variat:

a. *brevipilum* Corda l.l. II. pag. 13. T. X. f. 60; Rabenh. l.l.

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

3378. H. gracile Rabenh. Op stervende bladen van Iris, Gladiolus, enz. (Rabenh. p. 110.)

In Herb.: Rotterdam, Oudem. (v. v. et s.)

3379. H. macrocarpum Grev. Op afgestorven Elzentakken. Aut. Hieme. (Cord. Ic. fung. I. p. 12. T. II. f. 177; Rabenh. p. 110; Fr. Syst. III. pag. 356; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 10)

In Herb.: Haren bij Groningen, de Haan; Leiden; Dz. et Mb.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3380. *M. appendiculatum*** Corda. Op doode en afgevallen Esschentakken. Aut. Vere. (Corda Ic. fung. I. p. 12. T. III. f. 178; Rabenh. p. 111.)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; 't Haagsche Bosch en Blauwkappel, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3381. *M. scolicoides*** Corda. Op rottende koolstronken. Vere. (Corda Ic. fung. I. p. 12. T. III. f. 179; Rabenh. p. 111.)

In Herb.: Leiden, Wttw. (v. s.)

- 3382. *M. betulinum*** Corda. Op rottende schors van *Betula alba*. Aut. Vere. (Corda Ic. fung. I. p. 12. T. III. f. 184; Rabenh. p. 111.)

In Herb.: Harderwijk, Jungh. in Herb. de Vr. (v. s.)

- 3383. *M. longipilum*** Corda. Op afgestorven Berkenschors. Per annum. (Corda Ic. fung. T. I. p. 14. III. f. 197; Rabenh. p. 112)

In Herb.: Harderwijk, Jungh. (v. s.)

- 3384. *M. fasciculare*** Corda. Op rottend hout op vochtige plaatsen. Nieme. (Corda Ic. fung. I. p. 12. T. II. fig. 198; Rabenh. p. 112)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

MYXOTRICHUM Kze.

- 3385. *M. chartarum*** Kze. et Schm. Op rottend grauw papier op vochtige plaatsen. Per annum. (Fr. Syst. III. p. 349 pro parte; Rabenh. p. 105; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28; Oidium chartarum Link.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

ARTHIRINIUM (Kunze) Link.

- 3386. A. caricicola** Kunze et Schm. Op stervende bladen van *Carex riparia* en andere *Carex*-soorten. Aut. (Fr. Syst. III. p. 377; Rabenh. p. 104)
In Herb.: Muiden, v. d. S. Lac.; Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

CAMPTOUM Link.

- 3387. C. curvatum** Lk. Op bladen van grote *Carex*-soorten. Hieme-Vere. (Fr. Syst. III. p. 377; Rabenh. p. 103)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

** **Mucedinei.****Trib. Mucedinei genuini.****VERTICILLIUM** Nees.

- 3388. V. tenerum** Nees. Op rottend hout op vochtige plaatsen. Per annum. (Fr. Syst. III. p. 403; Rabenh. p. 100; Botrytis tenera Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29).
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

- 3389. V. ochro-rubrum** Desmaz. Op rottend hout. Per annum.

Hyphasmate obsoleto; floccis sporidiferis aggregatis ochro-rubris; ramis patentibus, ternis, superioribus oppositis, brevibus; sporidiis minutissimis, globosis, concoloribus. (Desmaz. Ann. des Sc. Nat. 1834. T. II. p. 71. T. II. f. 5, 5^a.)

Holland. Splitg. (v. i.c.)

ACROSTALAGMUS Corda.

- 3390. A. cinnabarinus** Corda. Op rottende stengels, bedorven aardappelen, rottend hout, enz., op vochtige

plaatsen. Hieme. (*Corda* Ic. fung. II. p. 15. T. X. f. 66; *Rabenh.* p. 99; *Dz.* et *Mb.* *Bijdr.* III. p. 11).

In Herb.: Leiden, *Dz.* et *Mb.* (v. v. et s.)

BOTRYTIS (Mich.) Link.

3391. *B. cinerea* Pers. Op oude puisten van *Sclerotium durum*; alsook op slecht gedroogde kruidgewassen op vochtige plaatsen. Aest.-Vere. (Fr. Syst. III. p. 396; *Rabenh.* p. 96; *Dz.* et *Mb.* *Bijdr.* I. p. 29)

In Herb.: Leiden, *Dz.* et *Mb.* (v. s.). Bovendien: Goes, v. d. B.

3392. *B. vulgaris* Fr. Op rottende appelen, alsook op rottende vruchten van *Cucurbita pepo*. Hieme-Vere. (Fr. Syst. III. p. 398; *Rabenh.* p. 97; *Polyactis vulgaris* Link; *Dz.* et *Mb.* *Bijdr.* III. p. 11).

In Herb.: Leiden, *Dz.* et *Mb.* (v. v. et s.)

3393. *B. cana* Kze et Schm. Op rottende bladen, stengels en vruchten. Per annum. (Fr. Syst. III. p. 397; *Rabenh.* p. 97; *Polyactis cana* *Dz.* et *Mb.* *Bijdr.* III. p. 11).

Maastricht, Franq. (n. v.)

3394. *B. parasitica* Pers. Op levende stengels en bladen van *Odontites vulgaris*, *Schoberia maritima* en vooral van *Capsella bursa-pastoris*; parasitisch op de puisten van *Cystopteris candidus*. Aut. (Fr. Syst. III. p. 403; *Rabenh.* p. 98; *Dz.* et *Mb.* *Bijdr.* I. p. 29)

In Herb.: Hulst, West.; (v. v. et s.); Kattendijke, Zuid-Beveland, v. d. B. Bovendien: Maastricht, Franq.

3395. *B. farinosa* Fr. Op treurende bladen van *Rubia tinctorum*. Aut. (Fr. Syst. III. p. 404; *Dz.* et *Mb.* *Bijdr.* I. p. 29)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3396. B. violacea** Lév. Op bloemen van *Anthemis cotula*. Aut.

Pedicellis erectis continuis dichotome ramosis, sporis ovatis glabris violaceis. (Lév. Ch. du Mus. de Par. in Ann. des Sc. nat. 2^e Série T. V. p. 298; West. Herb. Cr. B. n°. 1199; *Botrytis tenera* Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 22. p. p.)

In Herb.: Zwake (Zuid-Beveland) v. d. B. (v. s.)

NEMATOGONIUM Desmaz.

Flocci erecti aut decumbentes, simplices vel subramosii, septati et articulati; articulis remotis inflatis. Sporidia vase inspersa, nuda (absque appendiculo), simplicia (non septata), thallo non adglutinata. (Desmaz. Ann. des Sc. nat. 1834. II. 2. p. 69)

- 3397. N. simplex** Desmaz. Op de lamellen van een *Agaricus*. Aut. (Bonord. Handb. der Mycol. p. 117. T. IX. f. 192)

Leiden, Dz. et Mb. (v. icon.)

DACTYLIUM Nees.

- 3398. D. dendroides** Fr. Op een *Agaricus trivialis*. Aest. (Fr. Syst. III. p. 414; Rabenh. p. 96; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 20).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

ASPERGILLUS Mich.

- 3399. A. dubius** Corda. Op korsten van oude kaas op vochtige plaatsen. Per annum. (Corda Ic. fung. II. p. 18. T. II. f. 77; Rabenh. p. 94; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 20).

In Herb.: Leiden, Dz. en Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3400. A. glaucus** Link. Op slecht gedroogde kruidgewassen. Per annum. (Fr. Syst. III. p. 385; Rabenh. p. 93; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

- 3401. A. candidus** Link. Op doode stengels van groote kruidgewassen. Aut. Hieme. (Fr. Syst. III. p. 385; Rabenh. p. 94; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 10)
Maastricht, Franq. (n. v.)

COREMIUM Link.

- 3402. C. vulgare** Corda. Op rottende appelen. Per annum. (Corda Prachtfl. T. XXV; Rabenh. p. 93; Coremium glaucum et candidum Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 10).
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

STYSANUS Corda.

- 3403. St. monilioides** Corda. In rottende holle Wilgentronken. Vere. Aut. (Rabenh. p. 92; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 11; Isaria monilioïdes Fr. Syst. III. p. 276).
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

PENICILLIUM Link.

- 3404. P. glaucum** Link. Op bedorven spijzen, alsook op slecht gedroogde planten. Vere. Autumno. (Rabenh. p. 91. Penicillium crustaceum Fr. Syst. III. p. 407; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

- 3405. P. candidum** Link. Op een rottenden *Agaricus velutipes*. Per annum. (Fr. Syst. III. p. 409; Rabenh. p. 91; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 10).
In Herb.: Leiden, Wttw. (v. s.)

- 3406. P. bicolor** Fr. Op rottende vruchten, zoo als appelen, peren, enz. — Aut. (Fr. Syst. III. p. 408)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

PERONOSPORA Corda.

- 3407. P. densa** Rabenh. Op treurende bladen van *Rhinanthus crista-galli* en *Odontites vulgaris*.

Caespitibus densissime lanatis, effusis, albidis; stipe ramoso hyalino intricato; ramis dichotomis, ramulis abbreviatis, furcatis; sporis sphaericis, seu ovoideis, seu quadratis, utrinque rotundatis, hyalinis, glabris. (Rabenh. Herb. viv. myc. Edit. 1^a n°. 1572; Desmaz. 24^e Not. Cr. de Fr. p. 4, n°. 7)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

- 3408. P. effusa** Desmaz. Op kwijnende bladen van *Amarantus blitum*, *Chenopodium album*, *Atriplex latifolia*, enz. Aut.

Thallo effuso, griseo purpureo pallido. Floccis hyalinis densissime intricatis, ramoso dichotomis apice furcatis acutissimis. Sporulis magnis, oviformibus, griseo fulvis. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. Nouv. Edit. n°. 258; Botrytis effusa Grev.; Desmaz. Ann. des Sc. nat. Sér. II. T. VIII. p. 4. T. 1 f. 1; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29 p. p.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; v. d. Tr.; Blauwkapel, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3409. P. ganglioniformis** Berk. Op kwijnende bladen van *Sonchus oleraceus*, *Lactuca sativa*, enz. Aest. Aut.

Caespitibus tenuissimis, effusis, albis. Floccis fertilibus parce dichotomis, apice 3—5 fidis stellatis. Sporulis majusculis, subovoideis, albis. (Botrytis stellata Desmaz. 13 Not. Cr. de Fr. p. 65. n°. 4; Peronospora ganglioniformis A. Braun in Rabenh. Herb. viv. myc. Edit. nov. n°. 168; Botrytis farinosa Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

ACROTHAMNIUM Nees.

- 3410. A. violaceum** Nees. Op boomwortels tusschen *Hypnum praelongum*. Per. annum. (Rabenh. p. 88)
Maastricht, Frang. (n. v.)

OIDIUM Link.

- 3411. O. aureum** Link. Op rottend hout. Aut. Vere.
(Fr. Syst. III. p. 429; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 20;
Torula aurea Corda; Rabenh. p. 37)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Leiden, Dz.
et Mb.; Harderwijk, Jungh. (v. s.)

- 3412. O. fusisporoides** Fr. Op bladen van verschillende kruidgewassen. Aut. (Fr. Syst. III. p. 431;
Rabenh. p. 88). Variat:

- a. *Lapsanae* Desmaz. Op bladen van *Lapsana communis*. (Desmaz. Pl. Cr. de Fr. no. 2134)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland,
v. d. B. (v. v. et s.)

- 3413. O. monilioides** Link. Op bladen van verschillende grassoorten, en bijzonder van *Triticum repens*.
Aut. (Fr. Syst. III. p. 431; Rabenh. p. 88; Dz. et
Mb. Bijdr. I. p. 29)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland
(Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

- 3414. O. erysiphoides** Fr. Op bladen van verschillende kruidgewassen. Aut. (Fr. Syst. III. p. 432). Variat:

- a. *Cucurbitacearum* Rabenh. Op bladen van *Cucumis sativa* (Rabenh. Fung. Eur. exsicc. no. 87)

In Herb.: Steeg bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)

- 3415. O. fructigenum** Kze. Op rottende vruchten, vooral op pruimen en kersen. Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 430; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 20; *Torula fructigena* Pers.; Rabenh. p. 37)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland,
v. d. B. (v. v. et s.). — Bovendien: Maastricht, Franq.

HORMODENDRUM Bonord.

Baumförmig verästelte Hyphen tragen an den Enden
der Zweige lange Ketten runder oder ovaler Sporen.
(Bonord. Handb. der Mycol. p. 76)

- 3416. H. farinaceum** Rabenh. Op bladen van *Symphytum officinale*. Aut.

Sporis ovatis simplicibus haud septatis, ramis prima-
riis rudimentariis, secundariis articulatis, articulis oblon-
gis bipunctatis. (Rabenh. Fung. Eur. exsicc. n°. 173)

In Herb.: Kampen, R. Bond. (v. v. et s.)

TORULA Pers.

- 3417. T. graminicola** Corda. Op levende halmen van
Holcus lanatus. Aut. (Corda in Sturm. Myc. Heste
III. T. 42; Rabenh. p. 35)

Diepenveen, Cop in Herb. Dav. (n. v.)

- 3418. T. pinophila** Chev. Op takken en bladen van *Pi-*
nus picea. Aest. Aut. (Fr. Syst. III. p. 231; Rabenh.
p. 35)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3419. T. chartarum** Corda. Op graauw papier van voch-
tige plaatsen. Aut. Vere. (Corda Ic. fung. IV. p. 24.
T. VI. f. 78; Rabenh. p. 35)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3420. T. herbarum** Link. Op rottende stengels van kruid-
gewassen. Hieme. Vere. (Fr. Syst. III. p. 501; Rabenh.
p. 35)

In Herb.: Leiden, Wtew.; Amsterdam, v. d. S. Lac.
(v. v. et s.)

- 3421. T. rhizophila** Corda. Op de opgegraven wortels van verschillende grassoorten. Hieme-Vere. (Cord. Ic. fung. I. p. 8. T. II. f. 127; Rabenh. p. 36). Variat: *a. arundinacea* West. Op rottende wortels van *Phragmites communis*. Vere. (West. 7^e Not. Cr. nouv. fl. B. n°. 73; Herb. Cr. Belg. n°. 1197)
In Herb.: Leiderdorp, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

BISPORA Corda.

- 3422. B. monilioides** Corda. Op oude afgehakte boomstammen, palen en houten schuttingen. Hieme-Vere. (Rabenh. p. 39; *Torula antennata* Pers., Fr. Syst. Myc. III. p. 501; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 31)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)
Bovendien: Maastricht, Franq.

Trib. Sporotrichel.

TRICHOTHECIUM Link.

- 3423. T. roseum** Link. Op de schors van afgestorven boomtronken, takken, enz., op vochtige plaatsen. Hieme. Vere. (Rabenh. p. 86; Fr. Syst. III. p. 427; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29)
In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

FUSISPORIUM Link.

- 3424. F. aurantiacum** Link. Op rottende IJpenschors, alsook op rottende vruchten van *Cucurbita pepo*. Hieme-Vere. (Fr. Syst. III. p. 445; Rabenh. p. 83)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.
3425. F. rhizophilum West. Op rottende aardappelen en *Dahlia*-knollen, alsook op beetwortels in kuilen en kelders. Hieme-Vere.

Acervis tuberculiformibus, convexis, incarnatis, tremellinis, demum effusis, floccis candidis, ramosis, tenerrimis, evanescentibus; sporidiis copiosis, fusiformibus, rectis vel curvatis, hyalinis, 3—5 septatis. (Desmaz. Mém. Soc. Roy. des Sc. de Lille. Vol. 1827—28. p. 453.). Variat:

- a. *Dahliae* West. Op de rottende knollen van *Dahlia*. (West. 2^e Not. Cr. inéd. fl. B. p. 36. n°. 194)
In Herb. Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

BYSSOCLADIUM Link.

- 3426. B. fenestrale** Link. Op vensterglazen in vochtige vertrekken, zoo als kelders, stallingen, enz. Aut. Vere. (Rabenh. p. 82)
In Herb.: Hulst, West. (v. v. et s.)

SPOROTRICHUM Link.

- 3427. S. candidum** Link. Aan eene schutting en op eene verrotte blaas in een kelder. Hieme. (Rabenh. p. 78; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 11)
In Herb.: Leiderdorp, de Haan. (v. s.)

- 3428. S. laetum** Link. Op doode takken in vochtige kelders. Hieme. (Fr. Syst. III. p. 423; Rabenh. pag. 80)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3429. S. flavicans** Fr. Op doode takken en hout van Pijnboomen. Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 119; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Harderwijk, Jungh.

- 3430. S. aureum** Link. (non Pers.) Op rottend hout en schors van Elzen. Hieme. (Rabenh. p. 80; Sporotrichum aurantiacum Fr. Syst. III. p. 423)

Maastricht, Franq. (n. v.)

3431. S. fusco-album Link. Op rottend hout. Hieme. (Rabenh. Deutschl. fl. I. p. 81; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 11)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. s.)

3432. S. olivaceum Fr. Op rottend hout en rottenden bast. Hieme. (Rabenh. p. 82)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

3433. S. cinereo-virens Fr. Op rottende stengels van *Umbelliferae*. Hieme. (Fr. Syst. III. p. 416; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

3434. S. bryophilum Pers. Op bemoste Wilgentronken. Aut.

Laxum crassiusculum, floccis intricatis, sporulis conglomeratis globosis demum fuscescensibus. (Pers. Myc. Eur. I. p. 78; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 11)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

GEOTRICHUM Link.

3435. G. candidum Link. Op vochtige turfaarde in de bosschen. Per annum. (Rabenh. p. 77)

Maastricht, Franq. (n. v.)

Trib. Sepedonei.

CHLORIDIUM Link.

3436. Ch. festucae Corda. Op bladen van grassen in vochtige bosschen. Aut. (Corda. Ic. fung. III. p. 7. Tab. 1. f. 19; Rabenh. p. 75)

Amsterdam, Oudem. (v. i.)

SEPEDONIUM Link.

3437. S. mycophilum Link. Op stervende en rottende

Fungi, en bijzonder op *Boletus*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 71; Sepedonium chrysospermum Fr. Syst. III. pag. 438; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 29)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.). Bovendien: Maastricht, Franq.

SPORENDONEMA Desmaz.

- 3438. Sp. casei** Desmaz. Op korsten van oude kaas. Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 435; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 11; Sepedonium caseosum, Link; Rabenh. p. 71)

In Herb.: Utrecht, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

PSILONIA Fr.

- 3439. P. gilva** Fr. Op doode Brandnetelstengels. Hiemie Vere. (Fr. Syst. III. p. 451, Rabenh. p. 73; Conoplea gilva Pers.)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

COLLARIUM Link.

- 3440. C. nigrospermum** Link. Op rottende of verdroogde lijm. Aut. Vere. (Rabenh. p. 70; Fr. Syst. III. p. 441; Sporotrichum collae Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 11)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

***** Byssacei.**

Trib. Phyllophagacei.

TAPIRINA Fr.

- 3441. T. populina** Fr. Op levende Populierbladen. Aest.

Aut. (Fr. Syst. III. p. 520; Rabenh. p. 64; Erineum aureum Pers.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 39)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; te Beeklust in de Ooi en te Heumen, Abel.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq.

ERINEUM Pers.

3442. E. roseum Schultz. Op levende bladen van *Betula alba*. Aut. (Rabenh. p. 65; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38)

In Herb.: Beek, Abel.; Amsterdam, M. Doorn. (v. v. et s.)

3443. E. betulinum Pers. Op levende bladen van *Betula alba*. Aut. (Rabenh. p. 65; Fr. Obs. I. p. 221)

In Herb.: Bloemendaal, Oudem.; Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3444. E. platanoldeum Fr. Op bladen van *Acer platanoides*. Aut. (Fr. Obs. I. p. 224; Rabenh. p. 65; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq.

3445. E. populinum Pers. Op levende Populierbladen. Aut. (Fr. Obs. I. p. 223; Rabenh. p. 65; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq.

3446. E. alneum Pers. Op levende bladen van *Alnus glutinosa*. Aut. (Fr. Obs. I. p. 223; Rabenh. pag. 65; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Haarlem, Splitg.; Kampen, R. Bond; Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq.

3447. E. fagineum Pers. Op Beukenbladen. Aut. (Pers. Obs. II. p. 102; Rabenh. p. 66; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38)

In Herb.: Haarlem, Splitg. (v. v. et s.) Variat:

a pallidum Link. (Fée. Mém. sur les Phyll. p. 55)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

b. purpureum Dec. (Fée. l. l. p. 54; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3448. E. padi Duv. et Roehl. Op bladen van *Prunus padus*. Aut. (Rabenh. l. p. 66; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 39.)

In Herb.: 't Haagsche Bosch, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3449. E. oxyacanthae Pers. Op bladen van *Crataegus oxyacantha*. Aut. (Rabenh. p. 66; Er. elandestinum, Grev.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 39).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq.

3450. E. purpurascens Gaertn. et Roehl. Op bladen van *Acer campestre* en *platanoides*. Aut. (Rabenh. p. 66; E. acerinum Schum.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Beek bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq.

PHYLLERIUM Fries.

3451. Ph. tiliaceum Pers. Op levende Lindebladen. Aut. (Pers. Syst. p. 700; Cord. Ic. fung. V. p. 48. T. 1. f. 1; Erineum tiliaceum Pers.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38).

In Herb : Haarlem, Splitg.; Leiden, Dz. et Mb.; Utrecht, v. d. S. Lac.; Ubbergen, Abel.
Bovendien, Maastricht, Franq.

- 3452. Ph. juglandis** Schleich. in Dec. Op levende bladen van *Juglans regia*. Aut. (Rabenh. p. 67; Er. juglandinum Fries; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38).

In Herb.. Leiden, Dz. et Mb.; Haarlem, Splitg.; Weurt bij Nijmegen, Abel.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Kampen, R. Bond.; Groningen, Strat. (v. v. et s.)
Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3453. Ph. axillare** Fée. Op bladen van *Alnus glutinosa*. Aut. (Fée Mém. sur les Phyll. p. 33)
In Herb.: Rotterdam, Oudem. (v. s.)

- 3454. Ph. pyrinum** Fr. Op bladen van *Pyrus malus*. Aut. (Rabenh. p. 67; Erineum pyrinum Pers. Syn. p. 700; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)
Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3455. Ph. rubi** Fr. Op bladen van verschillende *Rubus*-soorten. Aut. (Fée Mém. sur les Phyll. p. 43; Erineum rubi Pers.; West. Herb. Cr. B. n°. 590; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 22).

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3456. Ph. bifrons** Lepell. Op levende Lindebladen. Aut. (Fée Mém. sur les Phyll. p. 41)
In Herb.: Leiden, Oudem. (v. s.)

- 3457. Ph. pseudoplatani** Kze. Op bladen van *Acer pseudoplatanus*. Aut. (Rabenh. p. 67; Er. pseudoplatani Kze; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Kampen, R. Bond.; Ubbergen, Abel. (v. v. et s.)

- 3458. Ph. vitis** Fr. Op bladen van *Vitis vinifera*. Aut. (Rabenh. p. 67; Erineum vitis Dec.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 38).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.; Haarlem, Splitg.; Dordrecht, Utrecht, v. d. S. Lac.; Nijmegen, Abel.; Amsterdam, M. Doorn.; Kampen, R. Bond. (v. v. et s.)

Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3459. Ph. alnigenum** Rabenh. Op bladen van *Alnus glutinosa*. Aut. (Rabenh. p. 67; Erineum alnigenum Kze)

Maastricht, Franq.

Trib. **Destructorei.**

RHIZOMORPHA Roth.

- 3460. R. subcorticalis** Pers. Tusschen het hout en den bast van stervende boomtronken, alsook op run in broeibakken. Per annum. (Rabenh. p. 63; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Rijnsburg, R. Bond.; Amsterdam, v. d. S. Lac.; Paterwolde, Zwijndrecht, v. d. S. Lac.; Werkendam, v. d. S. Lac.

Bovendien: Zuid-Beveland, v. d. B.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.) Variat:

- a. *latissima* Kx. Rech. fl. crypt. Fland. 5 Cent p. 24)
In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac.

- b. *tendo* Pers. Tusschen het hout en de schors van Pijnboomen. (Pers. Myc. Eur.; Rh. subcorticalis flaccida Chev. fl. Par. I. p. 507)

In Herb.: Harderwijk, Jungh. (v. s.)

- 3461. Rh. divergens** Grev. Tusschen het hout en de schors van Dennen- en Mastboomen. Per annum. (Rabenh. p. 64; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28)

In Herb.: Harderwijk, Jungh. (v. s.)

- 3462. Rh. parallela** Rob. in Desmaz. Op en in doode Vliertakken. Aut. Hieme. (Rh. sambuci Chev.)

Nigra laevigata, caulinibus filiformibus longissimis aequalibus parallelis nec intricatis nec ramosis. (Chev. fl. Par. I. p. 508)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3463. Rh. setiformis Roth. Op *Sphagnum* en andere mossen in vochtige bosschen. Per annum. (Roth. Cat. I. p. 235; West. Herb. Crypt. B. n°. 548. Cerattonema hippotrichodes Pers.)

In Herb.: Breda, v. d. S. Lac.; Nieuw Loosdrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3464. Rh. intestinalis Pers. Tusschen de vezels van rottend Olmenhout. Hieme. (Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

BYSSUS (Linn. Vaill.) Humb.

3465. B. floccosa Schreb. Op muren en balken in vochtige kelders. Per annum. (Rabenh. p. 62; Hypha bombicina Pers.; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 20)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland (Goes) v. d. B. (v. s.)

OZONIUM (Pers.) Link.

3466. O. auricomum Link. Op rottend hout op zeer vochtige plaatsen. Per annum. (Rabenh. p. 60; Oz. fulvum Pers.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 28)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3467. O. parietinum Link. Op muren in vochtige kelders. Hieme. (Rabenh. p. 61)

In Herb.: Ouwendijk bij 's Gravesande.

3468. O. castaneum Wallr. Op rottend Eikenhout. Hieme. (Rabenh. p. 61)

In Herb. Nijmegen, Abel.; Zuid-Beveland, v. d. B.
(v. s.)

HIMANTIA (Pers.) Chev.

Flocci decumbentes fasciculati intertexti, apice radiantes; sporulae passim globosae. (Chev. fl. Par. I. pag. 80)

- 3469. H. candida** Pers. Op afgevallen rottende bladen. Hieme. (Pers. Syn. p. 703; Ozonium candidum Mart.; Rabenh. p. 61)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Zwake, v. d. B. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.; Naaldwijk, v. d. Tr.

- 3470. H. radians** Pers. Op afgevallen bladen in de boschen. Hieme.

Alba, folia agglutinans, filis in fasciculum confertis apice divergentibus. (Pers. Syn. p. 703)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

- 3471. H. rufipes** Chev. Op rottende vaten in vochtige kelders en oranjeriën. Hieme. Vere.

Filis divergentibus implexis albidis, ad basin contextissimis compactis, subtomentoso-spongiosis rufescenscentibus. (Chev. fl. Par. I. p. 81)

In Herb.: Leiden, in den Hortus Academicus. Wttw. (v. v. et s.)

Trib. Meteorici.

XYLOSTROMA Pers.

- 3472. X. giganteum** Tode. Op rottend hout. Aut. Vere. (Tode. Fung. Meckl. sel. I. p. 36. T. VI. f. 51; X. Corium Rabenh. p. 60)

In Herb.: Leiden, in 's Rijks plantentuin. de Haan.
(v. v. et s.)

ATHELIA Pers.

Filamenta intertexta radiantia medio in pelliculam tenuem laevem depresso-applanatam fibrillis sporulis intermixtis obductam condensata, radio libera. (Duby, Bot. Gall. II. p. 932.)

3473. A. epiphylla Pers. Op rottende mossen en bladen op den grond in de bosschen. Aut. Vere. (Pers. Champ. Com. p. 67; Thelephora epiphylla Fr. Elench. I p. 226).

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes) v. d. B.

Ord. Coniomycetes.

* **Tubercularii.**

Trib. Tubercularini.

EPICOCCUM Link.

- 3474. E. purpurascens** Ehrb. Op doode halmen en bladen van *Zea mais*. Aut. Hieme. (Corda Ic. fung. I. p. 5. T. 1. fig. 90; E. versicolor b. purpurascens Rabenh. p. 58)

In Herb.: Leiden, in 's Rijks plantentuin. Jungh.
in Herb. de Vr. (v. s.)

PERIOLA Fries.

- 3475. P. tomentosa** Fr. Op rottende aardappelen in vochtige kelders. Hieme. (Fr. Syst. II. p. 521; Rabenh. p. 56)

In Herb.: Dongen in Noord-Brabant (v. v. et s.)

CHAETOSTROMA Corda.

- 3476. Ch. buxi** Corda. Op doode bladen van *Buxus sempervirens*. Vere. Aut. (Corda Ic. fung. II. p. 30. T. XIII. f. 107; Fusisporium Buxi Fr. Syst. III. p. 447; Fusidium Buxi Schm.; Rabenh. p. 42)

In Herb.: Bommel, Jungh. in Herb. Wttw.

TUBERCULARIA Tode.

3477. *T. vulgaris* Tode. Op doode takken en basten van boomen. Vere. Aut. (Fr. Syst. III. p. 464; Rabenh. p. 53; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30)

In Herb.: Heikop, de Haan; Leiden, Oudem., Wttw.; Willemstorp, Zuid-Beveland, v. d. B.; Groningen, de Haan. (v. v. et s.)

3478. *T. herbarum* Fr. Op rottende koolstronken. Hieme. (Fr. Syst. III. p. 465; Rabenh. p. 54)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

3479. *T. aesculi* Opiz. Op afgestorven takken van wilde Kastanjes (*Aesculus hippocastanum*). Vere. Aut. (Corda Ic. fung. I. p. 4. T. I. f. 77; *T. vulgaris* o. *Aesculi* Rabenh. p. 54)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Weikenburg bij Utrecht, Wttw. (v. v. et s.)

3480. *T. confluens* Pers. Op afgehouwen tronken van *Acer*, *Crataegus*, enz. Hieme. (Corda I. l. fig. 74; Rabenh. p. 54; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Kampen, R. Bond.; Eekta (Groningen) Strat.; Sas van Gendt, Walr.; Valkenburg bij Leiden, Wttw.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3481. *T. mutabilis* Nees. Op doode takken van *Kerria japonica*, in de lusthoven. Aut. Vere. (Corda I. l. fig. 73; Rabenh. p. 55; West. Herb. Crypt. Belg. n°. 1191)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3482. *T. floccosa* Link. Op doode schors van *Alnus*, *Betula*, enz. Hieme. (Rabenh. p. 55; Dz. et Mb. Bijdr. III, p. 11; *T. floccipes* Corda.)

In Herb.: Aan de Delftsche vaart, de Haan. (v. s.)

3483. T. granulata Pers. Op afgestorven takken van *Cornus mascula*, *Pyrus malus*, enz. Hieme. Vere. (Corda l. l. f. 75; Rabenh. p. 55)

In Herb.: Leiden, Wttw. (v. s.)

3484. T. nigricans Bull. Op afgestorven takken van pijn- en mastboomen. Hieme. Vere. (Rabenh. p. 55)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3485. T. expallens Fr. ap. Desmaz. Aan eene schutting. Hieme. (Fr. ap. Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n° 171; West. Herb. Crypt. B. n° 396)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. s.)

3486. T. polycephalum Lév. Op uitgegraven boomwortels. Hieme. Vere. (Lév. ap. Dz. et Mb. in Herb. Un. n° 243)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

FUSARIUM Link.

3487. F. pallens Nees. Op afgestorven takken van *Robinia Pseudacacia*. Hieme. (Rabenh. p. 50; Volutella pallens Fr. Syst. III. p. 468)

Maastricht, Franq.

3488. F. roseum Link. Op rottende stengels van *Malva sylvestris*, alsook op rottende koolstronken. Hieme. (Rabenh. p. 50; Corda Ic. fung. I. p. 3. T. I. f. 55)

In Herb.: Harderwijk, Jungh.; Maastricht, Franq. v. v. et s.)

3489. F. heterosporium Nees. In de zaden van sterrende grasperallen, zooals van *Lolium perenne*, *Glyceria fluitans*, enz. Aut. (Fr. Syst. III. p. 372; Rabenh. p. 51; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3490. F. lateritium** Nees. Op afgestorven takken van *Morus alba*. Hieme. Vere. (Fr. Syst. III. p. 470; Rabenh. p. 51)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3491. F. sulphureum** Schleidl. Op rottende aardappelen in vochtige kelders. Hieme. (Fr. Syst. III. p. 471; Dz. et Mb. Bijdr. II. p. 20; Fusidium sulphureum Link; Rabenh. p. 42)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. s.)

- 3492. F. pezizoides** Desmaz. Op stervende en doode bladen van *Hedera helix*, dikwijls gemengd met *Peziza hederae* Lib. Aut. Vere.

Erumpens, amphigenum, subimmersum, minutum, numerosum, sparsum, rotundatum, pallide rufidulum, siccum concavum, humidum convexum disciforme, gelatinosum, opalimum, subhyalinum. Sporophoris monosporulis, simplicibus, pedicelliformibus; sporulis ovoidis, hyalinis. (Desmaz. 20^e Not. Crypt. de Fr. p. 19. n°. 21; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. Exs. n°. 2176)

In Herb.: Leiden, Zuid-Beveland, v. d. B.; Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3493. F. equisetorum** Desmaz. Op stervende stengels van *Equisetum limosum*. Aut.

Minutulum, punctiforme, erumpens, sparsum, rotundum, convexum, carnosotremellosum, rufo-ochraceum. Basidiis filiformibus, continuis; sporulis acrogenis, minutissimis ovoidis, hyalinis. (Desmaz. 17^e Not. Crypt. Nouv. de Fr. p. 37. n°. 55; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 1846)

In Herb.: Dongen in Noord-Braband. (v. v. et s.)

GLOEOSPORIUM Desmaz. et Mont.

Peritheциum nullum. Sporae ex ovoido-pyriformes aut subcylindricae, subcontinuae, hyalinae, pedicello (sporophoro) e parenchymate folii exerto suffultae, mox

liberae et sub epidermide collectae, tandem, hac rupta,
ope mucilaginis subcirrose rejectae, cirris achromaticis.
(Mont. Syll. Gen. Spec. Crypt. p. 195)

3494. Gl. acerinum West. Op kwijnende bladen van
Acer campestre. Aut.

Taches hypophylles, pâle-jaunâtres, grandes, irrégulières, attaquant de préférence les bords de la feuille. Réceptacles rouge-brunâtres, ponctiformes, nombreux, éparsillés sur le pourtour de la tache, d'abord recouverts par l'épiderme, puis nus par la destruction de celle-ci. Sporidies ovale-allongées ou presque cylindriques, hyalines, mesurant $\frac{1}{50}$ e à $\frac{1}{100}$ e de mill. de longueur sur $\frac{1}{400}$ e de mill. de largeur. (West. 4^e Not. Cr. Nouv. fl. Belge. p. 7. n°. 17; West. H.C.B. n°. 979)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3495. Gl. alneum West. Op treurende bladen van *Alnus glutinosa*. Aut.

Taches hypophylles, rousses, arrondies, à bords anguleux et irréguliers, de 5 à 7 mill. de diamètre, éparses ou rarement confluentes. Le centre des taches, qui devient d'une teinte brun-grisâtre, est couvert d'un grand nombre de petits points bruns, bulleux, émettant, après la rupture de l'épiderme, des sporidies hyalines, ovales, de $\frac{1}{200}$ e de mill. de longueur sur $\frac{1}{400}$ e de mill. de largeur. (West. I. I. p. 7. n°. 18; West. Herb. C. B. n°. 977)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3496. Gl. quercinum West. Op kwijnende Eikenbladen. Aut.

Taches hypophylles, brun-verdâtres, éparses ou confluentes, couvertes d'un grand nombre de réceptacles ponctiformes, bulleux, rouges ou rouge-brunâtres, éparsillés de préférence sur le pourtour de la tache. Après

la déstruction de l'épiderme, on voit de très petits globules orangés, translucides comme de la cire, formés par un mucilage contenant des sporidies ovale-allongées, hyalines, de 4 à $5/100^{\text{es}}$ de mill. de longueur sur $1/200^{\text{e}}$ de mill. de largeur. (West. l. l. p. 8. n°. 21; West. Herb. Cr. B. n°. 981)

In Herb.: Leiden, v. d. B. (v. v. et s.)

3497. Gl. betulæ West. Op kwijnende bladen van *Betula alba*. Aut.

Taches hypophylles, roussettes, arrondies, irrégulières, de grandeur variable, couvertes d'un grand nombre d'autres petites taches bulleuses d'un roux plus clair, formées par l'épiderme soulevé. A la maturité celle-ci se rompt irrégulièrement pour laisser à nu la masse sporidifère, également rousse, formée d'une grande quantité de sporidies hyalines, ovoïdes, de 2 à $3/100^{\text{es}}$ de mill. de longueur sur $1/400^{\text{e}}$ de mill. de largeur. (West. l. l. p. 7. n°. 20; West. Herb. Cr. B. n°. 978)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

3498. Gl. salicis West. Op treurende Wilgenbladen. Aut.

Taches épiphyllles, brunes ou brun-rougeâtres, petites, éparses ou confluentes, arrondies ou irrégulières. Réceptacles plus pâles, ponctiformes, nombreux, bulleux, émettant, après la rupture de l'épiderme, des sporidies hyalines, ovales, mesurant à peine $1/200^{\text{e}}$ de mill. dans le grand diamètre. (West. 7^e Not. Cr. inéd. fl. B. p. 12. n°. 44; West. Herb. Cr. Belg. n°. 1269)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

HYMENULA Fries.

3499. H. vulgaris Fr. Op doode stengels van Brandnetels. Hlieme. Vere. (Fr. Syst. II. p. 234; Rabenh. p. 50)

In Herb.: Maastricht, Franq.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. s.)

- 3500. H. rubella** Fr. Aan de binnenzijde der bladscheiden van *Typha latifolia*. Hieme. Vere. (Fr. Elench. II. p. 38; Rabenh. p. 50)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

- 3501. H. arundinis** Fr. Op afgevallen halmen van *Phragmites vulgaris*. Aut. Vere. (Fr. Syst. II. p. 234; Fr. Elench. II. p. 37; Rabenh. p. 50)

Maastricht, Franq.

Trib. Stilbosporei.

STILBOSPORA Pers.

- 3502. S. macrosperma** Pers. Op afgestorven basten en takken van verschillende boomen. Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 485; Rabenh. p. 47)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

ASTEROSPORIUM Kze.

Sporidia coacervata, stellata, septata, stromati heterogeneo floccoso-granuloso incumbentia. (Kze. Bot. Zeit. 1819. T. 1. p. 225)

- 3503. A. hoffmanni** Kze. Op doode takken van Berken en Beuken. Aut. Vere. (Kze. l. l.; Stilbospora asterosperma Pers.; Rabenh. p. 47; Fr. Syst. III. p. 484)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

STEGONOSPORIUM Corda.

Perithecium immersum, membranaceo-floccosum, tenuissimum, dein supra irregulariter apertum. Stroma columellaeforme vel nullum. Pulpa sporarum atra, dein erumpens. Basidia filiformia, paraphysibus mixta.

Sporæ aerogenae; episporio continuo uniloculari; nucleo transverse septato vel celluloso. (Corda Ic. fung. III. p. 22)

- 3504. St. pyriforme** Corda. Op afgestorven takken en schors van *Acer campestre*. Aut. Vere.

Gregarium. Peritheciis immersis, semper tectis, coriacieis atris; basidiis filiformibus albis; sporis obovatis vel pyriformibus; episporio duplii, pallido; nucleo celluloso-fusco; cellulis plerumque transverse stratosis. (Corda. I. l. III. p. 23. T. IV. f. 61; West. Herb.: Cr. Belge no. 577)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

MELANCONIUM Link.

- 3505. M. sphaerospermum** Link. Op doode en afgewallen halmen van *Phragmites communis*. Hieme. Vere. (Fr. Syst. III. p. 489; Rabenh. p. 44; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht Franq.; Naaldwijk, v. d. Tr.

- 3506. M. disseminatum** Link. Op rottend hout. Hieme. (Fr. Syst. III. p. 489; Rabenh. p. 44; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30)

Leiden, Dz. et Mb.

- 3507. M. ovatum** Link. Op schors van omgehakte bomen. Hieme. Vere. (Rabenh. p. 44; Stilbospora ovata Pers.; Fr. Syst. III. p. 485; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30)

In Herb.: Langs de Delftsche vaart, de Haan in Herb. De Vr. — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3508. M. betulinum** Schm. en Kze. Op Berkenschors. Hieme. (Rabenh. p. 45)

In Herb.: Maastricht, Franq.

BLENNORIA Fr.

- 3509. B. buxi** Fr. Op doode bladen van *Buxus sempervirens*. Aut. (Fr. Syst. III. p. 472; Rabenh. p. 43)
In Herb.: Bommel, Wttw. ex herb. Jungh (v. v. et s.).

FUSIDIUM Link.

- 3510. F. candidum** Link. Op afgestorven Beukenschors, Hieme. Vere. (Rabenh. p. 42)
In Herb.: Dongen in Noord-Brabant. (v. s.)

- 3511. F. hysteriaeforme** West. Op overrijpe meloenen en pompoenen. Aut. Vere.

Pustules irrégulières, allongées, éparses ou confluentes, blanchâtres, luisantes, bulleuses ou boursouflées; l'épiderme du fruit qui les recouvre se fend longitudinalement, s'écarte et montre des rainures remplies d'une poussière farineuse, très blanche, formée de sporules nombreuses, hyalines, ovales, ovale-allongées ou presque cylindriques, parfois offrant une cloison au milieu et mesurant $\frac{1}{200}$ e à $\frac{1}{50}$ e de mill. de longueur sur $\frac{1}{300}$ e à $\frac{1}{200}$ e de mill. de largeur. (West. 4^e Not. Cr. inéd. fl. B. p. 14. n^o. 70; West. H.C.B. n^o. 1290)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.)

- 3512. F. parasiticum** West. Op het stroma van *Xylaria cornuta*, dat hij doet treuren en verdroogen. Hieme.

Couche d'abord gélatineuse, puis se concrétant en une poudre farineuse, très blanche, formée par des sporules excessivement petites, nombreuses, cylindriques, fusiformes, transparentes, n'ayant qu'environ $\frac{1}{50}$ e de mill. de longueur sur une largeur moyenne de $\frac{1}{200}$ e de mill. (West. 3^e Not. Crypt. inéd. fl. B. p. 35. n^o. 189; West. H.C.B. n^o. 593)

In Herb.: Groningen, Strat. (v. v. et s.)

NAEMASPORA Fr.

- 3513. N. crocea** Pers. Op rottende schors van boomen.
Aut. Vere. (Fr. Syst. III. p. 479; Rabenh. p. 41;
Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30); Myxosporium croceum
Corda.

Maastricht, Franq.

- 3514. N. microspora** Desmaz. Op doode Populiertronken. Hieme. (Fr. Syst. III. p. 479)
In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Maas-
tricht, Franq. (v. v. et s.)

LIBERTELLA Desmaz.

Receptaculum nullum. Sporidia fusiformia, recta aut magis minusve curva massa gelatinosa juncta, sub epidermide plantarum mortuarum effusa, in cirros prodientia. (Desmaz. Monogr. du G. Naem. in Mém. Soc. Roy. des Sc. de Lille 1829—30. p. 191)

- 3515. L. betulina** Desmaz. Op schors van afgestorven tronken van *Betula alba*. Hieme.
Sporidiis aurantiaco-rubris, fusiformibus, subrectis, circiter $1/70$ mill. longis. (Desmaz. l. l. p. 192. Tab. VI. f. 4)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

- 3516. L. faginea** Desmaz. Op afgestorven Beukentronken en takken. Hieme. Vere.
Sporidiis aurantiacis, fusiformibus curvissimis tenuissimis, circiter $1/60^{\circ}$ mill. longis. (Desmaz. l. l. p. 192. Tab. 6. fig. 5; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n° 707)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3517. L. alba** Lib. Op afgestorven Elzentakken. Hieme. Vere.

Accrvi rotundi; pulpa alba in cirros crassos

concolores erumpente; ascellis fusiformibus curvatis;
sporidiis globosis pellucidis. Lib. Pl. Cr. Arduenn.
nº. 364)

In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. v. et s.)

MYXOSPORIUM Link.

- 3518. M. fagineum** Corda. Op rottende Beukenbladen.
Hieme. (Rabenh. p. 41; Illosporium fagineum Lib.
Pl. Cr. Ard. nº. 185)
Maastricht, Franq.

**** Uredinei.**

Trib. Phragmidiacei.

EXOSPORIUM Link.

- 3519. E. tiliae** Link. Op doode Lindetakken. Hieme.
Vere. (Rabenh. p. 33; Helminthosporium tiliae Fr.
Syst. III. p. 360)
In Herb.: Leiden, Oudem. (v. s.)

- 3520. E. hypodermium** Link. Op doode stengels van
groote kruidgewassen. Hieme. Vere. (Rabenh. p. 33)
Maastricht, Franq.

- 3521. E. hispidula** Link. Op bladen, halmen en aren
van verschillende grassoorten. Aut. Hieme. (Rabenh.
p. 33; Conoplea hispidula Link. non Pers.)
Maastricht, Franq.

PHRAGMIDIUM Link.

- 3522. Phr. incrassatum** Link. Op levende bladen van
verschillende *Rubus*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 32;
Aregma Phragmidium Fr.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 31;
Puccinia mucronata Pers.). Variat:

a. *Rosarum* Wallr. Op bladen van eenige Rozen.

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. — Bovendien:
Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

b. *Ruborum* Wallr. *Puccinia rubi Schum.*

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. — Bovendien:
• Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

3523. Phr. obtusum Schm. et Kze. Op bladen en
bladstelen van eenige *Potentilla*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 32)

In Herb.: Dongen in Noord-Brabant. (v. v. et s.)

3524. Phr. apiculatum Rabenh. Op bladen van *Poterium*- en *Sanguisorba*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 32)
Maastricht; Franq.

3525. Ph. asperum Wallr. Op bladen van *Rubus fruticosus*. Aut. (Rabenh. p. 32)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3526. Ph. bullatum West. Op stervende wilde Rozen-
takken in bosschen. Aut.

Taches épicaules, gris-jaunâtres, de 1 à 4 ou 5
cent. de longueur, limitées par une aréole pourprée,
couvertes de boursouflures ou de petites ampoules
inégales, produites par le soulèvement de l'épiderme.
A la maturité, celle-ci se déchire irrégulièrement et
laisse à nu, en larges coussinets noirs, des sporidies
brun-rougeâtres, cylindriques, à 5, 6 ou 7 cloisons
et terminées par une petite pointe. Pédicelle hyalin,
siliforme, épaisse vers le bas. (West. 4^e Not. Cr.
inéd. fl. B. p. 11, n°. 44; West. Herb. Crypt. B.
n°. 1069)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

CORYNEUM Nees.

3527. C. umbonatum Nees. Op doode Olmtakken. Ilieme.

Vere. (Fr. Syst. III. p. 474; Rabenh. p. 31; Dz. et Mb. Bijdr. III. p. 12).

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Oudem. (v. s.)

- 3528. C. pulvinatum** Kze et Schm. Op doode Linde-takken. Hieme. Vere. (Fr. Syst. III. p. 474; Rabenh. p. 31)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Oudem.; Wtew.; Utrecht, Amsterdam, v. d. S. Lac. — Bovendien: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

SPORIDESMIUM Link.

- 3529. Sp. bulbophilum** West. Op bollen van Tulpen. Aut. Hieme. (West. 8^e Not. Crypt. inéd. fl. Belge pag. 11. n°. 35)

Taches étalées, noires, indéterminées. Spores solitaires ou agrégés, diaphanes, brunâtres, oblongs ou pyriformes, à trois cloisons et mesurant $3/100$ es de mill. de longueur sur $1/100$ e de mill. de largeur. Pédicelles très courts ou nuls.

In Herb.: Utrecht, Haarlem, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3530. Sp. myrianum** Desmaz. Op afgestorven bladen van *Psamma arenaria*. Aut. Hieme.

Cauli- vel foliicolum. Acervulis erumpentibus, minutissimis, innumerosis, approximatis, punctiformibus. Stromate tenui, convexiusculo, nigro; sporidiis congestis, fuscis semiopacis, polymorphis, ellipsoideis, obovatis vel pyriformibus, sessilibus aut brevissime pedicellatis, tri- vel tetradymis cellulosis. (Desmaz. 20^e Not. Cr. de Fr. p. 3. n°. 4; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. Nouv. Série n°. 2)

In Herb.: Hollandsche duinen.

SELENOSPORIUM Corda.

- 3531. S. pyrochroum** Desmaz. Op doode Vliertakken. Hieme. Vere.

Erumpens, sparsum, minutum, rotundatum, oblongum vel polymorphum (non caespitosum) ochroleucum, siccum flammeum. Stromate pallido vesiculoso. Sporidiis fusiformibus, acutis, curvatis, hyalinis, 3 septatis. Septulis aegre conspicuis. (Desmaz. 18^e Not. Cr. de Fr. p. 5; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n^o. 1847)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. s.)

- 3532. S. sarcochroum** Desmaz. Op doode takjes van *Cytisus laburnum*. Hieme. Vere.

Erumpens, sparsum, minutum, tuberculariaeforme, ochroleucum, siccum carneum. Stromate convexo pallido; sporidiis majusculis, fusiformibus, acutis, plerumque curvatis, hyalinis, 5 raro 3 septatis; septis distinctissimis. (Desmaz. 18^e Not. Cr. de Fr. p. 6)

In Herb.: Leiden in 's Rijks Plantentuin, Wt tw. (v. v. et s.)

- 3533. S. asperifoliorum** West. Op kwijnende bladen van *Symphytum officinale*. Aut.

Taches très petites, 2 mill. au plus, arrondies, blanchâtres ou brunâtres. Strome très mince, blanc, étalé sur le centre de la tache. Sporidiis hyalines, dressées, filiformes, à extrémités effilées; droites ou courbes, courtement pédicellées, les plus grandes mesurant $\frac{1}{25}$ ^e de mill. de longueur sur $\frac{1}{600}$ ^e de mill. de largeur. (West. 7^e Not. Cr. inéd. fl. B. p. 13. n^o. 47. T. 1. fig. 2)

In Herb.: Kampen, R. Bond. (v. v. et s.)

PHRAGMOTRICHUM.

- 3534. Phr. bullaria** Corda. Op doode stengels van *Angelica sylvestris*. Aut. (Rabenh. p. 40; Didymosporium bullatum Fr. Syst. III. p. 487)

In Herb.: Kampen, R. Bond. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

DIDYMOZPORIUM Nees.

- 3535. D. salicinum** Corda. Op doode Wilgentakken.
Hieme. Vere. (Cord. Ic. fung. I. p. 5. T. II. f. 108;
Rabenh. p. 27)

In Herb.: Leiderdorp, (v. v. et s.)

- 3536. D. aceris** Desmaz. Op levende bladen van *Acer campestre*. Aest. Aut. (Desmaz. Pl. Crypt. de Fr. n°. 777; Cheilaria aceris Lib. Pl. Crypt. Ard. n°. 255)

Maculis orbiculatis griseo-fuscis; periteciis? minutis, rotundato-oblongis, nigris, rima dehiscentibus; pulpa fusca, ascis oblongis; sporidiis 2 pellucidis. (Lib. l. l.)

In Herb.: Maastricht, Franq. (v. v. et s.)

TRIPHAGMIUM Link.

- 3537. Tr. ulmariae** Link. Op levende bladen van *Spiraea ulmaria*. Aut. (Rabenh. p. 28)

In Herb.; Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.).

PUCCINIA Pers.

- 3538. P. graminis** Pers. Op bladen en halmen van verschillende grassoorten. Aut. (Rabenh. p. 21; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 31). Variat:

a. *epicaula* West. Op doode grashalmen.

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

b. *epiphylla* West. Op bladen van *Phragmites communis*.

In Herb.: Kampen, R. Bond.; Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3539. P. arundinacea** Hedw. fil. Op bladen en halmen van *Phragmites communis*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 22; P. Striola Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 31?)

a. *epiphylla* Wallr. Comp. fl. Germ. IV. 225. Op de bladen.

In Herb.: Ubbergen, Abel. (v. v. et s.)

b. *epicaula* Wallr. l. l. Op de halmen.

In Herb.: Ubbergen, Abel. (v. v. et s.) — Boven-dien: Maastricht, Franq.

3540. P. caricis Dec. Op bladen van *Carex laevigata* en andere *Carex*-soorten. Aest. Aut. (Rabenh. p. 22. Pucc. striola Link)

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

3541. P. scirpi Link. Op halmen van *Scirpus lacustris*. Aut. (Rabenh. p. 22)

Maastricht, Franq.

3542. P. alliorum Corda. Op de stengels van *Allium vineale*. Aut.

Caespitulis gregariis epidermide semper tectis, bullatis, fuscis; sporis oblongis, rarius ovoideis, fuscis, supra rotundatis vel obtusis, cellulis subaequalibus; episporio tenui amoene fusco; nucleo pallido; stipite filiformi, cavo, longo. (Corda Ic. fung. IV. p. 12. T. III. f. 31)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3543. P. polygonorum Schlecht. Op stengels en bladen van verschillende *Polygonum*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 22; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 31). Variat:

a. *Bistortae* Rabenh. l. l. Op bladen van *Polygonum bistorta*.

b. *Amphibii* Rabenh. l. l. Op *Polygonum amphibium*.

c. *Convolvuli* Rabenh. l. l. Op *Polygonum convolvulus*.

Maastricht, Franq.; Twello, Cop in herb. Dav.

3544. P. glechomatis Dec. Op bladen van *Glechoma hederacea*. Aut. (Rabenh. p. 23; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)

In Herb.: Zwijndrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

- 3545.** **P. menthae** Pers. Op bladen van *Mentha-* en *Chinopodium*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 23; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
Maastricht, Franq.
- 3546.** **P. compositarum** Schltdl. Op bladen van *Sonchus oleraceus*. Aut. (Rabenh. p. 24; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
Maastricht, Franq.
- 3547.** **P. discoidearum** Link. Op bladen van *Tanacetum vulgare* Aut. (Rabenh. p. 24; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
Maastricht, Franq.
- 3548.** **P. conglomerata** Schm. et Kze. Op bladen van *Centaurea scabiosa*. Aut. (Rabenh. p. 24)
Maastricht, Franq.
- 3549.** **P. vaillantiae** Pers. Op bladen van *Vaillantia cruciata*. Aut. (Rabenh. p. 25)
Maastricht, Franq.
- 3550.** **P. galiorum** Link. Op bladen en stengels van *Galium*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 21; Dz. et Mb. Bijdr. II, p. 21)
Maastricht, Franq.
- 3551.** **P. umbelliferarum** Dec. Op bladen van *Apium graveolens* en andere *Umbelliferae*. Aut. (Rabenh. p. 25; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
Maastricht, Franq.
- 3552.** **P. aegopodii** Link. Op bladen en bladstelen van *Aegopodium podagraria*. Aut. (Rabenh. p. 25; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.) —
Bovendien: Maastricht, Franq.
- 3553.** **P. pimpinellae** Link. Op bladen van *Pimpinella saxifraga*. Aut. (Rabenh. p. 25)
Maastricht, Franq.

- 3554. P. adoxae** Dec. Op bladen en bladstelen van *Adoxa moschatellina*. Aest. (Rabenh. p. 25; P. *saxifragarum* Dz. et Mb. Bijdr. III, p. 12)
Maastricht, Franq.
- 3555. P. saxifragarum** Schleidl. Op bladen van *Saxifraga*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 25)
Maastricht, Franq.
- 3556. P. prunorum** Link. Op Pruimenbladen. Aut. (Rabenh. p. 26; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
Maastricht, Franq.
- 3557. P. anemones** Pers. Op bladen van *Anemone nemorosa*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 26; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
In Herb.: Ubbergen bij Nijmegen, Abel (v. v. et s.)
- 3558. P. stellariae** Rabenh. Op bladen van *Stellaria media* en *trinervia*. Aut. (Rabenh. Herb. viv. myc. edit. 2^a n° 86; Pucc. *lychnidearum* Rabenh. Deutschl. fl. I, p. 26; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
In Herb.: Zwijndrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.) —
Bovendien: Maastricht, Franq.
- 3559. P. dianthi** Dec. Op bladen van *Dianthus barbatus*. Aut. (Pucc. *lychnidearum* pr. part. Rabenh. l. l. p. 26; Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 32)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)
- 3560. P. fabae** Link. Op stengels van *Vicia faba*. Aut. (Rabenh. p. 27)
Maastricht, Franq.
- 3561. P. cirsii** Lasch. Op bladen van *Cirsium arvense*. Aut. (Lasch. in Rabenh. Fung. Eur. n° 89)
In Herb.: Fort Sterrenschans bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)
- 3562. P. sonchi** Rob. Op drooge stengels van *Sonchus arvensis* en *oleraceus*. Aut.

Maculis fusco-rubescensibus vel nullis; acervulis hyporarius epiphyllis vel caulinis, epidermide tectis, numerosis, rotundatis vel oblongis, nigris, subnitidis, rugulosis, approximatis vel circulariter positis, saepe confluentibus et crustaceo effusis; sporidiis fuscis, oblongis, medio contractis, pedicello subaequali. (Rob. in Desmaz. 17^e not. Cr. de fr. p. 2. n^o 3; Desmaz. Pl. Cr. de fr. n^o 1831)

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes) v. d. B. (v. v. et s.)

NB. Praeter species hic memoratas indigenae enumerantur in Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 31 et 32: *P. Calthae* Lk., *P. Gentianae* Lk., *P. Aethusae* Lk., *P. Violarum* Lk., *P. Circaeae* P.; *P. Liliacearum* Dc., *P. Allii* Desm.

Trib. Uredinei genuini.

PERIDERMIUM Link.

- 3563. *P. pinii*** Wallr. Op doode bladen van verschillende Pijnboomen. Aest. Aut. (Rabenh. p. 21; Dz. et Mb. Bijdr. II, p. 21).

In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

ROESTELIA Rabenh.

- 3564. *R. cancellata*** (Linn.) Rabenh. Op bladen van Appelen en Peeren. Aut. (Rabenh. p. 20; Caeoma roestelites Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 37).

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3565. *R. lacerata*** Mer. Op bladen van *Crataegus monogyna*. Aut. (Aecidium cornutum a oxyacanthae Rabenh. p. 20; Caeoma cylindrites Dz. et Mb. I, p. 37)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq. Variat:

- a. *Mespili* Kx. Op bladen van *Mespilus germanica*. Aut.
(Aecid. cornutum e. *mespili* Rabenh. l.l.)
In Herb.: ? — Bovendien: Maastricht, Franq.

CRONARTIUM (Kunze) Fries.

- 3566. Cr. asclepiadeum** Fr. Op bladen van *Cynanchum vincetoxicum*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 20)
- a. *Paeoniae* Fr. Op bladen van *Paeonia officinalis*. Aut. (Sphaeria flaccida Alb. et Schw.; Fr. Syst. II. p. 516; Rabenh. p. 172)
In Herb.: Naaldwijk, v. d. Tr.; Rotterdam, Oudem. (v. v. et s.)

AECIDIUM Pers.

- 3567. Aec. adoxae** Grav. Op bladen en bladstelen van *Adoxa moschatellina*. Aest.
Caulinum bifronsque, maculis nullis, pseudoperidiis sparsis laxis pallide luteis urceolato-cupulatis, margine erecto aut subpatulo lacinulato deciduo, sporidiis globosis pallide luteis. (Grav. in Duby Bot. Gall. II. p. 908; Caeoma Adoxae Dz. et Mb. Bijdr. III, p. 12).
Maastricht, Franq.

- 3568. Aec. tussilaginis** Wallr. Op bladen van *Tussilago farfara*. Aest. Aut. (Aec. compositarum b. *Tussilaginis* Pers., Rabenh. p. 15; Caeoma Compositarum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36, p. p.).
Maastricht, Franq.

- 3569. Aec. cichoracearum** Dec. Op bladen van *Scorzoneroides* en *Tragopogon*-soorten. Aest. Aut. (Rabenh. p. 16; Caeoma *Tragopogonatum* Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36, p. p.).
Maastricht, Franq.

- 3570. Aec. asperifolii** Pers. Op bladen van *Cynoglos-*

sum officinale. Aut. (Rabenh. p. 16; Caeoma Borruginatum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36).

Maastricht, Franq.

- 3571. Aec. urticae** Schum. Op bladen van Brandnetels.

Aut. (Rabenh. p. 16; Caeoma Urticatum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 37).

Maastricht, Franq.

- 3572. Aec. grossulariae** Dec. Op bladen van *Ribes*-soorten.

Aut. (Rabenh. p. 16; Caeoma Grossulariatum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 37).

Maastricht, Franq.

- 3573. Aec. violae** Schum. Op bladen en bladstelen van *Viola*-soorten.

Aut. (Rabenh. p. 17; Caeoma Violatum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 37).

Maastricht, Franq.

- 3574. Aec. glaucis** Dz. et Mb. Op bladen van *Glaux maritima*.

Aest. (Dz. et Mb. Nov. fung. spec. in Tijdschr. v. nat. gesch. T. XII. p. 16 T. V. f. 1, 2, 3 et Bijdr. II, p. 21).

Zuid-Beveland, v. d. B.

- 3575. Aec. leucospermum** Dec. Op bladen van *Anemone nemorosa*.

Aest. (Rabenh. p. 18; Caeoma leucospermatum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36).

In Herb.: Ubbergen bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.) —

Bovendien: Maastricht: Franq.

- 3576. Aec. ranunculacearum** Dec. Op bladen en

bladstelen van verschillende *Ranunculaceen*. Aest.
Aut. (Rabenh. p. 18; Caeoma Ranunculaceatum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36). Variat:

- a. *Ranunculi* Pers. Op bladen van *Ranunculus*-soorten. (Rabenh. l. l.)

Maastricht, Franq.

- b. *Ficariae* Pers. Op bladen van *Ficaria ranunculoides*. (Rabenh. l. l.)

Maastricht, Franq.

c. *Aquilegiae* Pers. Op bladen van *Aquilegia vulgaris*. (Rabenh. p. 19)

Maastricht, Franq.

d. *Clematidis* Dec. Op bladen van *Clematis vitalba*.

Maastricht, Franq.

3577. Aec. periclymenti Dec. Op bladen van *Lonicera periclymenum*. Aut. (Rabenh. p. 19)

Maastricht, Franq.

3578. Aec. falcariae Dec. Op bladen van *Sium falcaria*. Aut. (Rabenh. p. 19)

Maastricht, Franq.

3579. Aec. leguminosarum Rabenh. Op bladen van verschillende *Leguminosae*. Aut. (Rabenh. p. 19)
Variat:

a. *Trifolii* Rabenh. l. l. Op Klaverbladen.

Maastricht, Franq.

3580. Aec. rhamni Pers. Op bladen, bladstelen en jonge takjes van *Rhamnus frangula*. Aut. (Aec. elongatum
a. Rhamni Rabenh. p. 19; Caeoma crassatum et Rhamnatum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 37).

Maastricht, Franq.

3581. Aec. berberidis Pers. Op bladen van *Berberis vulgaris*. Aut. (Aec. elongatum d. berberidis Rabenh. p. 20; Caeoma Berberidatum Dz. et M. Bijdr. I, p. 37).

Maastricht, Franq.

3582. Aec. phaseolorum Wallr. Op bladen van *Phaseolus vulgaris*. Aut. (Rabenh. p. 20)

In Herb.: Beuningen, Abel. (v. v. et s.)

3583. Aec. convallariae Schum. Op bladen van verschillende soorten van *Convallaria*. Aut. (Rabenh. p. 15; Caeoma Convallariatum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36).

In Herb.: Groningen, Strat.; Ubbergen bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)

- 3584. Aec. myrtilli** Franq. Op de onderzijde der bladen van *Vaccinium myrtillus*: Aut.

Sporen gelb; Sporidien klein in Kreisen lange verschlossen, endlich ausbrechend; Saum kaum zurückgeschlagen. (Franq. MSS.)

Maastricht, Franq.

- 3585. Aec. pyri** Franq. Op Peerenbladen Aut.

Sporen orange; Sporidien klein, etwas eingesenkt, in unregelmässigen Flecken disponirt auf der Oberfläche des Blattes, gleichfarbig, spät zerrissen mit zurückgeschlagenem Saume. (Franq. MSS.; non *Roestelia cancellata* nec *Aec. cornutum*)

Maastricht, Franq.

- 3586. Aec. senecionis** Desmaz. Op bladen van *Senecio aquaticus* en *Jacobaea*. Aut.

Maculis flavescensibus. Peridiis hypogenis, subcentricis aut confertis. Ore dentato, primum contracto, demum patulo et reflexo. Sporulis aurantiacis. (Desmaz. Pl. Cr. de fr. n° 677; Desmaz. Mém. Soc. Roy. des Sc. de Lille 1834. p. 14)

In Herb.:? . . (v. v. et s.)

Speciebus enumeratis accedunt: *Caeoma Alliatum* Lk., *C. rubellatum* Lk., *C. Melampyrum* Kze., *C. Buniatum* Lk., *C. quadrifidum* Lk., *C. Epilobiatum* Lk., *C. Euphorbiatum* Lk., *C. Salicorniatum* Lk., *C. Ari* Dz. et Mb., *C. Heraclei* Dz. et Mb. (in Dz. et Mb. Bijdr. I, II, III).

CONIOTHECIUM Corda.

- 3587. C. amentacearum** Corda. Op afgestorven takjes van Wilgen in de duinen. Aut. Hieme. (Corda Ic fung. I. p. 2. T. 1. fig. 26; Rabenh. p. 15)

In Herb.: Leiden, Wt tw.; Amsterdam, v. d. S.
Lac. (v. v. et s.)

- 3588. C. conglutinatum** Corda. Op ontschorste doode takken. (Corda Ic. fung. I. p. 2. T. 1. fig. 20; Rabenh. p. 14)

In Herb.: Leiderdorp. (v. s.)

- 3589. C. effusum** Corda. Op vochtig rottend hout. Hieme. Vere. (Corda Ic. fung. I. p. 2. Tab. 1. f. 21; Rabenh. p. 14)

In Herb.: Leiden, Oudem. (v. s.)

- 3590. C. phyllophilum** Desmaz. Op verdroogde Eikenbladen. Hieme.

Hypophyllum, atrum, minutum, tenue maculaeforme. Sporulis conglutinatis, minutissimis, globosis, fuscis, semihyalinis. (Desmaz. 11^e Not. Cr. de fr. p. 358; Desmaz. Pl. Cr. de fr. n° 1427)

In Herb.: Amsterdam, Oudem. (v. s.)

- 3591. C. betulinum** Corda. Op doode takken en takjes van *Betula alba*. Aut. (Corda Ic fung. I. p. 2. T. 1.f. 25)

In Herb.: Achttienhoven, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

CONISPORIUM Link.

- 3592. C. buxi** West. Op doode afgevallen takken van *Buxus sempervirens*. Vere.

Effusum, fusco-nigrum. Sporis ovoideis vel pyriformibus, pedicellatis, rufo-fuscis, impellucidis, longis $\frac{1}{100}$ ad $\frac{4}{100}$ mill. — Pedicello brevissimo, hyalino. (West. 8^e not. Crypt. inéd. fl. B. pag. 11. n° 36 fig. 7, o, p.)

In Herb.: Utrecht, Wt tw. (v. v. et s.)

UREDO Pers.

* Urédinées sans Cystides.

Réceptacle caché sous l'épiderme; spores s'échappant

sous forme de poussière. (Lév. Dispos. méth. des Uréd. in Ann. des Sc. nat. 3 Sér. T. VIII)

1^o Réceptacle composé d'un tissu à mailles irrégulières, à peine distinctes, formant un petit coussinet, de la surface duquel naissent les spores; spores simples, globuleuses, pédicellées, entrainant avec elles leurs pédielles ou s'en détachant. (**Uromyces** Lév. l. l.)

A. Spores jaunes ou orangées.

3593. U. rubigo-vera Dec. Op bladen en halmen van granen en andere grassoorten. Aest. (Rabenh. p. 13; Caeoma Rubigo Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33).

In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. v. et s.)

3594. U. rhinanthacearum Dec. Op bladen van *Rhinanthus*, *Melampyrum*, enz. Aest. (Rabenh. p. 10; Caeoma Rhinanthacearum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33). Variat:

a. *Euphrasiae* Rabenh. l. l. Op bladen van *Euphrasia odontites*.

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

b. *Melampyri* Rabenh. Op bladen van *Melampyrum arvense*.

In Herb. Utrecht, Wttw. (v. s.)

3595. U. alchemillae Pers. Op bladen van *Alchemilla vulgaris*. Aest. (Rabenh. p. 10) —

Maastricht, Franq.

B. Spores rousses, brunes ou noires.

3596. U. leguminosarum Desmaz. Op bladen van verschillende soorten van *Leguminosae*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 7; Caeoma Trifolii, C. appendiculatum et C. Leguminosarum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35 et II. p. 21).

- a. *Viciarum* Rabenh. l. l. Op *Vicia sepium*.
Maastricht, Franq.
- b. *Trifoliorum* Rabenh. l. l. Op Klaverbladen. (*U. apiculosa* v. *Trifolii* Berk.)
In Herb.: Zuid-Beveland, v. d. B.; Leiden, Dz. et Mb.
(v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.
- c. *Fabarum* Rabenh. l. l. Op bladen van *Vicia faba*.
(*Uredo Viciae fabae* Dec.)
In Herb.: Leiden, Wttw. (v. v. et s.)
- d. *Phaseolorum* Rabenh. l. l. Op bladen van *Phaseolus vulgaris*, in moeslanden. (*U. Phaseolorum* Dec.)
In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac.; Kampen, R. Bond. (v. v. et s.)

3597. *U. leguminum* Desmaz. Op de peulen van *Phaseolus* en *Vicia faba*. Aut.

Acervis rotundis, solitariis, maximis, epidermide
rupta cinctis. Sporulis ovoideis, pedicellatis, fuscis.
(Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 934; Desmaz. Mém.
Soc. Roy. des Sc. de Lille 1839 1^e partie p. 78. n°. 5)
In Herb.: Steeg bij Nijmegen, Abel. (v. v. et s.)

3598. *U. apiculata* Strauss. Op bladen van *Cytisus laburnum*. Aut. (Rabenh. p. 4; Ur. *Cytisi laburni* Dec.; Caeoma *apiculatum* Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35).

Leiden, Dz. et Mb.

3599. *U. polygonorum* Dec. Op bladen van *Polygonum aviculare*. Aut. (Rabenh. p. 6; Caeoma *Polygonorum* Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33).

In Herb.: Zuid-Beveland (Goes), v. d. B. (v. v. et s.) —
Bovendien: Maastricht, Franq.

3600. *U. epilobii* Dec. Op bladen van *Epilobium*-soorten.
Aest. Aut. (Rabenh. p. 8; Caeoma *Epilobii* Dz. et Mb. Bijdr. II, p. 21).

Maastricht, Franq.

- 3601. U. valerianae** Dec. Op bladen van *Valeriana officinalis*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 9; Caeoma Valerianæ Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35).

In Herb.: Leiderdorp. (v. s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3602. U. ambigua** Dec. Op bladen van *Allium scorodoprasum*. Aest. (Rabenh. p. 6)

Maastricht, Franq.

- 3603. U. gentianae** Dec. Op bladen van *Gentiana pneumonanthe*. Aest. (Rabenh. p. 5)

In Herb.: Vinkeveen, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

2^o. Réceptacles composés de très petites cellules irrégulières, formant une sorte de plateau couvert de vésicules cylindriques, terminées par plusieurs spores disposées en chapelet; spores sphériques ou cubiques. (*Cystopus* Lév. l. l.)

- 3604. U. candida** Pers. Op bladen, stengels en zaadhuisjes van verschillende kruidgewassen. Aest. Aut. (Rabenh. p. 13; Caeoma candidum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35). Variat:

- a. *Cruciferarum* Rabenh. Op *Capsella bursa pastoris* en *Erysimum tenuifolium*.

In Herb.: Amsterdam, Oudem. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

- b. *Compositarum* Rabenh. l. l. Op bladen van *Scorzonerá hispanica*. Aest. Aut.

In Herb.: Zutphen. Wttw. (v. v. et s.)

- 3605. U. portulacae** Dekin. Op bladen van *Portulaca oleracea*. Aest. (Dekin. fl. Brux.; U. candida c. Portulacearum Rabenh. p. 13; Caeoma candidum β. grossum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35).

In Herb.: Zutphen, Wttw. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

3°. Réceptacle composé de très petites cellules irrégulières, formant une sorte de plateau dont la surface est couverte de plusieurs assises de cellules inégales, renfermant chacune une spore; spores simples, toujours dépourvues d'appendices. (*Uredo Pers.*; Lév. l. l.)

A. Spores jaunes ou orangées.

3606. U. symphyti Dec. Op de bladen van *Symphytum officinale*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 11; Caeoma Symphyti Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35).

In Herb.: Culenborg, Leiden, Wttw. ex herb. Arkenh. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

3607. U. pustulata Pers. Op bladen van *Cerastium* en *Stellaria*-soorten. Aest. (U. *Caryophyllacearum* Rabenh. p. 11; Caeoma *Caryophyllacearum* Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34). Variat:

a. *Caryophyllacearum* Pers. Op *Cerastium vulgatum*.

In Herb.: Leiden, Wttw. ex herb. Arkenh. (v. s.)

b. *Epilobiorum* Pers. Op bladen van *Epilobium spicatum*.

In Herb.: Voordorp bij Leiderdorp. (v. v. et s.)

3608. U. potentillarum Dec. Op bladen van *Potentilla* en *Agrimonia*-soorten: Aest. Aut. (Rabenh. p. 9; Caeoma Potentillarum et polymorpha Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34).

Maastricht, Franq.

3609. U. padi Kze et Schm. Op bladen van *Prunus padus*. Aut. (Rabenh. p. 12)

Maastricht, Franq.

3610. U. sonchi Pers. Op bladen van *Sonchus*-soorten. Aest. Aut. (U. *fulva* a. *Sonchorum* Rabenh. p. 12; Caeoma Compransor Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34).

In Herb.: Leiden, Wttw. ex herb. Arkenh. (v. s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3611.** **U. cacaliac** Dec. Op bladen van *Cacalia alpina*.
Aest. Aut. (Rabenh. p. 12; Caeoma Comprausor Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34, p. p.).
Maastricht, Franq.
- 3612.** **U. linearis** Pers. Op bladen en halmen van granen en andere grassoorten. Aest. Aut. (Rabenh. p. 13; Caeoma lineare Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33).
In Herb.: Leiden, Wttw. ex herb. Arkenh. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.
- 3613.** **U. senecionis** Schum. Op bladen van *Senecio jacobaea*. Aut. (Rabenh. p. 12; Caeoma Senecionis Dz. et Mb. I, p. 34).
In Herb.: Leiden, Wttw. ex herb. Arkenh. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.
- 3614.** **U. sempervivi** Alb. et Schw. Op bladen van *Sempervivum tectorum*. Aut. (Rabenh. p. 9; Caeoma Sempervivi Dz. et Mb. Bijdr. II, p. 21).
Maastricht, Franq.
- 3615.** **U. fallens** Desma. Op Klaverbladen. Aest.
Maculis obliteratis. Acervulis hypo- rarius epiphyllis, numerosis, sparsis, subrotundis, rufis, epidermide erupta cinctis. Sporulis subovatis, pedicello albo, brevi instructis, episporio tenuissime verrucoso. (Desmaz. 11^e Not. Cr. Nouv. de la fr. p. 357 n° 1; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n° 1325)
In Herb.: Leiden, langs het Marendijkje, Oudem. (v. v. et s.)
- 3616.** **U. betae** Pers. Op bladen van *Beta vulgaris*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 6; Caeoma Betarum Dz. et Mb. I, p. 33).
Maastricht, Franq.
- 3617.** **U. paeoniarum** Desmaz. Op bladen van *Paeonia officinalis*, dikwijls gemengd met *Cronartium asclepiadeum a. paeoniae*. Aut.

Maculis amphigenis, irregularibus, brunneo-violaceis; Acervulis hypophyllinis, numerosis, orbicularibus ovalibusve dein confluentibus, pallide aurantiacis epidermide bullata tectis. Sporulis ovoideis vel pyriformibus. Episporio dupli subhyalino, tenuissime verrucoso, nucleo brunneo granuloso. (Desmaz. 14^e Not. Cr. inéd. de la Fr. p. 11. n°. 4; Desmaz. Pl. Cr. de Fr. n°. 1664)

In Herb.: Rotterdam in den Hortus Botanicus, Oudem. (v. v. et s.)

B. Spores fauves, brunes ou noires.

3618. U. suaveolens Pers. Op bladen van *Serratula arvensis*. Aut. (Rabenh. p. 6; Caeoma suaveolens Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34).

In Herb.: Utrecht, Wttw. — Bovendien: Maastricht, Franq.

3619. U. scirpi West. Op stengels van *Scirpus lacustris*. Aut.

Groupes d'un brun canelle, allongées, elliptiques ou linéaires, épars, recouverts par l'épiderme, qui se rompt longitudinalement suivant les fibres du support. Sporides brunes, globuleuses, pyriformes ou ovoides. (West. 7^e Not. Cr. de la fl. B. p. 12. n°. 38; West. Herb. Cr. B. n°. 1266)

In Herb.: Amsterdam, v. d. S. Lac. (v. v. et s.)

3620. U. rumicium Dec. Op bladen van *Rumex acetosa*. Aest. (Rabenh. p. 6; Caeoma Rumaticum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33).

Maastricht, Franq.

3621. U. muricella Wallr. Op bladen van verschillende soorten van *Umbelliferae*. Aut. (Rabenh. p. 6; Caeoma Umbellatarum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34). Variat:

a. *Cynapii* Dec.; Rabenh. l.l. Op bladen van *Aethusa cynapium*.

Maastricht, Franq.

b. *Conii* Strauss. Op bladen van *Conium maculatum*.
Maastricht, Franq.

3622. U. labiatarum Dec. Op bladen van verschillende soorten van *Labiatae*. Aut. (Rabenh. p. 10). Variat:

a. *Menthae* Pers. Op *Mentha*-soorten.
Maastricht, Franq.

b. *Clinopodii* Rabenh. Op bladen van *Clinopodium vulgare*.
Maastricht, Franq.

3623. U. flosculosorum Alb; et Schw. Op bladen van *Apargia autumnalis*. Aut. (Rabenh. p. 6; Uredo apargiae Schleich.)

In Herb.: Utrecht, Dz. et Mb. — Bovendien: Maastricht, Franq.

3624. U. bullatum West. Op stengels en somtijds op bladen van *Dianthus prolifer*. Aut.

Tâches épicaules, grisâtres, de 1 a 2 cent. de longueur, couvertes de boursoufflures inégales, produites par le soulèvement de l'épiderme; à la maturité celle ci se déchire longitudinalement et laisse à nu des coussinets orangés. Ces coussinets sont formés par des sporidies globuleuses, arrondies ou pyriformes, quelquefois pédi-cellées et mesurant environ $\frac{1}{40}$ de mill. de diamètre. (West. 8^e Not. Crypt. inéd. fl. B. pag. 9. n°. 27)

In Herb.: Weurt bij Nijmegen, Gev. Deyn.? (v. v. et s.)

3625. U. epilobii Dec. Op bladen van *Epilobium hirsutum*. Aut. (Rabenh. p. 8)

In Herb.: Leiden, Wttw. ex herb. Arkenh. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

4°. Réceptacle composé de filaments ramifiés; ramifications supportant à leur extrémité un sporange formé de cellules polygonales, imitant un réseau vésiculeux autour d'une spore centrale; spores globuleuses ou ovales. (**Polycystis** Lév.; **Urocystis** Rabenh.)

- 3626. U. anemones** Pers. Op bladen en bladstelen van *Anemone nemorosa* Aest. Aut. (Rabenh. p. 4)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

- 3627. U. colchici** Link. Op bladen van *Colchicum autumnale*. Aut. (Rabenh. p. 4. Sporisporium colchici Lib.)

In Herb.: Kampen, R. Bond. (v. v. et s.)

- 3628. U. pompholygodes** Schleidl. Op bladen van *Helleborus viridis* en *Ranunculus bulbosus*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 4; *Ustilago pompholygodes* Dz. et Mb. Bijdr. II, p. 22).

Zuid-Beveland (Goes), v. d. B.; Maastricht, Franq.

- 3629. U. ficariae** Alb. et Schw. Op bladen van *Ficaria ranunculoides*. Aest. (Rabenh. p. 5; Caeoma Ficariae Dz. et Mb. Bijdr. II, p. 21)

Maastricht, Franq.

5. Réceptacle composé de filaments rameux; ramifications terminées par une spore; spores simples. (**Tilletia** Tul.; Lév. l. l.)

- 3630. U. caries** Dec. In Tarwekorrels. Aest. (*Uredo sitophila* Ditm.; Rabenh. p. 3; Caeoma sitophilum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33)

In Herb.: Zutphen, Wt. — Bovendien: Leiden, Dz. et Mb.

6. Réceptacle composé de filaments rameux; ramifications renflées au sommet, et supportant 8-20 spores. Spores sphériques. (**Microbotryum** Lév. l. l.)

3631. U. violacea Pers. Op de helmknoppen van *Malachium aquaticum* en *Lychnis vespertina*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 3; Uredo antherarum Dec.; Ustilago antherarum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 38)

Voorschoten, Dz. et Mb.; Zuid-Beveland, v. d. B.

3632. U. receptaculorum Dec. In den vruchtbodem van *Scorzonera-* en *Tragopogon*-soorten. Aest. (Rabenh. p. 4; Ustilago receptaculorum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 37) Leiden, Dz. et Mb.

7. Réceptacle composé de cellules très petites, irrégulières, donnant naissance à plusieurs couches de cellules monosporiques (sporanges); spores globuleuses. (**Ustilago** Bauh.; Lév. l. l.)

3633. U. segetum Pers. In de bloemstengels van Haver, Gerst en Tarwe. Aest. (Rabenh. p. 4; Ustilago segetum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 38). Variat:

a. *Avenae* Pers. Op Haver en *Arrhenatherum avenaceum*.

In Herb.: Utrecht, Wttw. — Bovendien: Leiden, Dz. et Mb.; v. Hall. in Herb. De Vr. (v. v. et s.)

b. *Hordei* Pers. Op Gerst.

In Herb.: Utrecht, Wttw. — Bovendien: Zuid-Beveland, v. d. B. (v. v. et s.)

c. *Triticci* Pers. Op Tarwe.

In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. s.) — Bovendien: Leiden, Dz. et Mb.; Maastricht, Franq.

3634. U. urceolorum Dec. Op kafjes en vruchtblaasjes van *Carex acuta* en *arenaria*. Aest. (U. caricis Pers.; Rabenh. p. 3; Caeoma caricis Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33)

Bij Haarlem, Dz. et Mb.

3635. U. olivacea Dec. In den vruchtbodem van *Carex arenaria*. Aest. (Rabenh. p. 3)

Noordwijkerhout, Mb.

3636. U. utriculosa Duby. In zaden van *Polygonum Braunii* en *hydropiper*. Aut. (Rabenh. p. 3; Caeoma utriculosum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33)

Utrecht. v. d. S. Lac.; Maastricht, Franq.

3637. U. longissima Sow. Op bladen van *Glyceria aquatica*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 4; Caeoma longissimum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 33)

In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. s.) — Bovendien: Leiden, Dz. et Mb.; de Haan; Zuid-Beveland, v. d. B.

3638. U. hypodytes Rabenh. Op halmen van *Elymus arenarius*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 4; *Ustilago hypodytes* Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 37)

Katwijk, Zandvoort en Scheveningen, Dz. et Mb.
Variat:

a. *Triticici* Desmaz. Op halmen van *Triticum repens*.

In Herb.: Kampen, R. Bond. — Bovendien: Zuid-Beveland, v. d. B.

3639. U. salveii Berk. et Broom. Op bladen van *Dactylis glomerata*. Aest. Aut.

Acervulis elongatis, linearibus, parallelis, saturate brunneis; sporulis subovoideis, verruculosis, semiopacis, $\frac{1}{100}$ am inter et $\frac{15}{1000}$ as mill. diametro variantibus. (*Ustilago salveii* Berk. et Broom.; Desmaz. 22. Not. Crypt. inéd. de la Fr. p. 1. n° 1)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.

8. Réceptacle composé de très petites cellules irrégulières, formant une sorte de petit plateau, dont la surface est couverte de vésicules allongées, superposées (sporanges), renfermant 3 ou 4 spores disposées en série linéaire; spores simples. (**Coleosporium** Lév. l. l.)

3640. U. campanularum Pers. Op bladen van verschillende *Campanula*-soorten. Aest. Aut. (Rabenh.

p. 10; Caeoma campanularum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34)
Maastricht, Franq.

- 3641. U. tussilaginis** Pers. Op bladen van *Tussilago farfara* en *Petasites officinalis*. Aest. Aut. (*U. fulva c. Tussilaginum* Wallr.; Rabenh. p. 12; Caeoma Compransor Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34, p. p.)
In Herb.: Zutphen, Wttw. (v. v. et s.)

- 3642. U. aureum** West. Op bladen van *Sonchus arvensis* en *oleraceus*. Aest. Aut. (*Coleosporium aureum* Bonord.; *U. fulva a. sonchorum* Rabenh. p. part. p. 12; Caeoma Compransor Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34, p. p.)

In Herb.: Spoel bij Culenborg, Oudem. (v. s.)

** Urédinées pourvues de Cystides.

Mycélium ou réceptacle caché sous l'épiderme; spores s'échappant sous forme de poussière. (Lév. l. l.)

9. Réceptacle composé de très petites cellules formant une sorte de coussinet arrondi, entouré ou parsemé de cystides en forme de massue ou de matras, et recouvert de sporanges pédicellés monosporès; spores simples conservant quelquefois leurs pédicelles. (**Lecythea** Lév. l. l.)

- 3643. U. ruborum** Dec. Op bladen van *Rubus caesius* en andere *Rubus*-soorten. Aut. (Rabenh. p. 11; Caeoma Ruborum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35)

In Herb.: Zutphen, Wttw. ex herb. Arkenh. (v. v. et s.)

- 3644. U. rosae** Pers. Op Rozenbladen. Aest. Aut. (Rabenh. p. 11; Caeoma Rosacearum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 34)

In Herb.: Leiden, Utrecht, Wttw. (v. v. et s.)—
Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3645. U. populina** Jacq. Op levende Populierbladen.
 Aest. Aut. (Rabenh. p. 9. Ur. longicapsula Dec.;
 Caeoma cylindricum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35, p. p.)
 In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. v. et s.) — Boven-
 dien: Maastricht, Franq.
- 3646. U. betulina** Wahlenb. Op bladen van *Betula alba*. Aut. (Ur. populina b. Betulac Rabenh. p. 9;
 Caeoma cylindricum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35, p. p.)
 In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. v. et s.) — Boven-
 dien: Maastricht, Franq.
- 3647. U. epitea** Kunze. Op bladen van *Salix triandra*
 en *viminalis*. Aut. (Rabenh. p. 8; Caeoma epitemum
 Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36)
 Maastricht, Franq.
- 3648. U. poterii** Spreng. Op bladen van *Poterium sanguisorba*. Aest. Aut. (Rabenh. p. 8)
 In Herb.: Leiderdorp, Dz. et Mb. (v. v. et s.)
- 3649. U. euphorbiae** Pers. Op bladen van *Euphorbia peplus*. Aest. (Rabenh. p. 8; Caeoma euphorbiacearum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35)
 Maastricht, Franq.; Deventer, Cop in herb. Dav.
- 3650. U. gyrosoa** Rabenh. Op bladen van *Rubus corylifolius*. Aut; (Rabenh. p. 9; Caemo gyrosum Dz.
 et Mb. Bijdr. I, p. 35)
 In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. v. et s.)
10. Réceptacle composé de très petites cellules irrégulières, formant des coussinets charnus, dont la surface est recouverte de cystides pédicellées renflées au sommet, et de cellules cylindriques qui supportent plusieurs spores disposées en chapelet; spores simples isolées, ou encore soudées bout à bout. (**Podosporium** Lév. l. l.)
- 3651. U. capraearum** Dec. Op bladen van *Salix caprea*

en *aurita*. Aut. (Rabenh. p. 8; Caeoma Caprearum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36)

In Herb.: Utrecht, v. d. S. Lac. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

- 3652. U. aecidioides** Dec. Op bladen van *Populus alba*. Aut. (Rabenh. p. 9; Caeoma aegirinum Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 36)

In Herb.: Utrecht, Wttw. (v. v. et s.)

- 3653. U. lini** Dec. Op stengels en bladen van *Linum catharticum*. Aest. (Rabenh. p. 8; Caeoma Lini Dz. et Mb. Bijdr. I, p. 35)

In Herb.: Zutphen, Wttw. (v. v. et s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

N. B. Speciebus enumeratis accedunt: *Caeoma (Uredo) Alliorum* Lk., *C. Orchidum* Lk., *C. Artemisiae* Lk., *C. epigallicum* Schlecht., *C. Calthae* Lk., *C. sparsum* Lk., *C. minutum* Schlecht., *C. porphyrogoneta* Lk., *C. mixtum* Lk., *C. Hypericorum* Lk., *C. Pseudocyperi* Lk., *C. Pyrolae* Lk. (in Dz. et Mb. Bijdr. I, II, III).

PROTOMYCES Unger.

- 3654. P. endogenus** Ung. Op stengels van *Galium mollugo*. Aest. Aut. (Protomyces galii Rabenh. p. 2)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb. (v. v. et s.)

UREDINARIA Chev.

- 3655. U. vagans** Chev. Op schors van jonge Elzen. Per annum. (Chev. fl. Par. I. p. 412; Nosophlaea alnea Fr.; Dz. et Mb. Bijdr. I. p. 30)

In Herb.: Leiden, Dz. et Mb.; Wttw. (v. s.) — Bovendien: Maastricht, Franq.

INDEX

AD FUNGORUM ENUMERATIONIS PARTEM PRIOREM.

A.	Pag.	Pag.	
Agaricini	303	Cylindrocolla	393
Agaricus	303	Cyphella	307
Amanita	303		D.
Armillaria	308	Dacrymyces	392
Ascobolus	396	Daedalea	380
Auricularia	391	Discomycetes	394
B.		E.	
Bolbitius	350	Entoloma	331
Boletus	367	Exidia	391
Bulgaria	395		
C.		F.	
Calocera	392	Fistulina	382
Cantharellus	362		
Cenangium	405	G.	
Clavaria	387	Galera	337
Clavariei	387	Geoglossum	395
Clitocybe	313	Gomphidius	354
Collybia	317		
Coprinus	346	H.	
Corticium	385	Hebeloma	334
Cortinarius	350	Helvella	394
Coryne	392		
Crepidotus	338		

	Pag.		Pag.
Helvellacei	394	Patellaria	405
Hydnæi	382	Paxillus	353
Hydnnum	382	Peziza	396
Hygrophorus	354	Pezizei	395
Hymenomycetes	303	Pholiota	332
Hypholoma	341	Pleurotus	327
L.		Pluteus	330
Irpeæ	383	Podisoma	393
L.		Polyporei	367
Lactarius	357	Polyporus	370
Lentinus	365	Psalliota	338
Lenzites	366	Psathyra	363
Leotia	395	Psathyrella	345
Lepiota	305	Psilocybe	360
M.		R.	
Marasmius	362	Radulum	383
Merulius	381	Russula	360
Mitrula	395	S.	
Morchella	394	Stereum	384
Mycena	320	Stropharia	360
N.		T.	
Naucoria	336	Thelephora	383
Nolanea	331	Thelephorei	383
O.		Trametes	380
Omphalia	328	Tremella	391
P.		Tremellini	391
Panacolus	344	Tricholoma	308
Panus	365	Typhula	390
V.		V.	
		Volvaria	380

INDEX

AD FUNGORUM ENUMERATIONIS PARTEM POSTERIOREM.


A.	Pag.	.	Pag.
<i>Acrospermum</i>	25	<i>Blennoria</i>	155
<i>Acrostalagmus</i>	129	<i>Botrytis</i>	130
<i>Acrothamnium</i>	134	<i>Bovista</i>	12
<i>Actinothyrium</i>	115	<i>Brachycladum</i>	123
<i>Aecidium</i>	166	<i>Byssacei</i>	139
<i>Aegerita</i>	17	<i>Byssocladum</i>	137
<i>Aegeritei</i>	17	<i>Byssus</i> :	144
<i>Aethalini</i>	24		C.
<i>Aethalium</i>	24		
<i>Ailographum</i>	80	<i>Calocladia</i>	34
<i>Angiogasteres</i>	10	<i>Camptoum</i>	129
<i>Apiosporei</i>	39	<i>Cantharellus</i>	2
<i>Arcyria</i>	23	<i>Capnodium</i>	126
<i>Arthrinium</i>	129	<i>Carpobolei</i>	11
<i>Ascochyta</i>	101	<i>Catinula</i>	9
<i>Ascophora</i>	122	<i>Cenococcei</i>	16
<i>Aspergillus</i>	131	<i>Cenococcum</i>	16
<i>Asporae</i>	118	<i>Cephalotrichum</i>	123
<i>Asteroma</i>	118	<i>Ceuthospora</i>	91
<i>Asterosporium</i>	153	<i>Chaetomium</i>	39
<i>Athelia</i>	146	<i>Chaetostroma</i>	147
		<i>Cheilaria</i>	91
		<i>Chloridium</i>	138
		<i>Cladosporium</i>	124
<i>Biatora</i>	1	<i>Clathracei</i>	10
<i>Bispora</i>	136	<i>Clathrum</i>	10

Pag.		Pag.	
Clavaria	3	Epichysium	122
Coleosporium	180	Epicoccum	147
Collarium	139	Epidochium	4
Colpoma	81	Erineum	140
Coniomycetes	147	Erysiphe	35
Coniosporium	38	Exidia	3
Coniothecium	169	Exosporium	157
Conisporium	170	Eurotium	121
Cordyceps	40	Eustegia	73
Coremium	132		
Coryneum	158	F.	
Craterium	19	Fusarium	149
Cronartium	166	Fusidium	155
Cyathus	11	Fusisporium	136
Cylindrocolla	5		
Cyphella	3	G.	
Cystopus	173	Gasteromycetes	10
Cytispora	100	Geaster	12
Cytisporei	82	Geastrides	12
	D.	Geotrichum	138
Dacryomyces	4	Gloeosporium	150
Dactylium	131		
Destructorei	143	H.	
Diachea	20	Helminthosporium	127
Dictyidium	21	Hendersonia	82
Diderma	18	Himantia	145
Didymium	18	Hormodendrum	135
Didymosporium	161	Hymenula	152
Diplodia	84	Hyphelia	16
Discosia	84	Hyphomycetes	121
Dothidea	70	Hysteriacei	74
Dothidini	69	Hysterium	77
	E.		
Ectostroma	120		

I.	Pag.	Pag.	
Illosporium	39	Naevia	8
Isariae	122	Nematogonium	131
L.		Nidulariacei	11
Lecythea	181	Nostoc	2
Leocarpus	17	O.	
Leptostroma	116	Oidium	134
Leptothyrium	117	Ozonium	144
Libertella	156	P.	
Lycogala	24	Palmogloea	2
Lycoperdacei	12	Passalora	126
Lycoperdon	13	Penicillium	132
M.		Perichaena	22
Marasmius	3	Periconia	123
Melampsora	29	Peridermium	165
Melanconium	154	Periola	147
Melasmia	92	Perisporei	30
Meteorici	145	Perisporium	38
Microbotryum	178	Peronospora	133
Micropera	101	Pestalotia	84
Microsticta	39	Peziza	5
Microthyrium	116	Phaciadiacei	73
Mucedinei	129	Phacidium	75
Mucor	122	Phalloideae	10
Mucorini	121	Phallus	10
Mucoroideae	121	Phlyctena	111
Myxogasteres	17	Phoma	92
Myxosporium	157	Phragmidiacei	157
Myxotrichum	128	Phragmidium	157
N.		Phragmotrichum	160
Naemaspora	156	Phyllactinia	32
		Phyllicheriae	139
		Phyllerium	141
		Phyllosticta	96

	Pag.		Pag.
<i>Physarei</i>	17	<i>Sepedonci</i>	138
<i>Physarum</i>	19	<i>Sepedonium</i>	138
<i>Pilacre</i>	16	<i>Septoria</i>	101
<i>Pilidium</i>	91	<i>Sphaeria</i>	42
<i>Piloboli</i>	121	<i>Sphaeriacei</i>	40
<i>Pilobolus</i>	121	<i>Sphaerini</i>	40
<i>Podisoma</i>	5	<i>Sphaerobolus</i>	11
<i>Podosphaera</i>	30	<i>Sphaeronema</i>	89
<i>Podosporium</i>	182	<i>Sphaeronemei</i>	82
<i>Polycystis</i>	178	<i>Sphaeropsis</i>	88
<i>Polystigma</i>	69	<i>Sphaerotheca</i>	31
<i>Polythrincium</i>	124	<i>Sporendonema</i>	139
<i>Poronia</i>	40	<i>Sporidesmium</i>	159
<i>Prosthemium</i>	115	<i>Sporonema</i>	90
<i>Protococcus</i>	2	<i>Sporophorae</i>	115
<i>Protomyces</i>	183	<i>Sporotrichei</i>	136
<i>Psilonia</i>	139	<i>Sporotrichum</i>	137
<i>Puccinia</i>	161	<i>Spumaria</i>	25
<i>Pyrenomycetes</i>	40	<i>Stegillacei</i>	73
R.		<i>Stegonosporium</i>	153
		<i>Stemoritidei</i>	20
		<i>Stemonites</i>	20
<i>Racodiei</i>	123	<i>Stictis</i>	8
<i>Reticularia</i>	24	<i>Stilbini</i>	123
<i>Rhizomorpha</i>	143	<i>Stilbospora</i>	153
<i>Rhytidoma</i>	74	<i>Stilbosporei</i>	153
<i>Roestelia</i>	165	<i>Stilbum</i>	123
S.		<i>Streblema</i>	120
		<i>Stysanus</i>	132
<i>Schizothyrium</i>	115	T.	
<i>Scleroderma</i>	15		
<i>Sclerodermacci</i>	15	<i>Taphrina</i>	139
<i>Sclerotiacae</i>	25	<i>Thelebolus</i>	12
<i>Sclerotiaceti</i>	25	<i>Tilletia</i>	178
<i>Sclerotium</i>	25	<i>Torula</i>	135
<i>Selenosporium</i>	159	<i>Trémella</i>	3

Pag.		Pag.	
Trichia	22	Uredinaria	183
Trichiacci	21	Uredinei	157
Trichoderma	17	Uredo	170, 174
Trichodermacei	16	Urocystis	178
Trichodermei	16	Uromyces	171
Trichogasteres	12	Ustilago	179
Trichomycetes	12		
Trichothecium	136	V.	
Triphragmium	161		
Triposporium	124		
Tubicularia	148	Vermicularia	112
Tubicularii.	147	Verrucaria	1
Tubicularini	147	Verticillium	129
Tubulina	21		
Tulostoma	15	X.	
Tympanis	9		
U.			
Uncinula.	33	Xylaria	40
		Xyloma	79
		Xylostroma	145





3 5185 00105 2412

