





外科正宗卷二

海甯許 輯辛本訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焞寅昉校

瘡瘍看法第十五

初起頂高根活。色赤發熱。掀腫疼痛。日漸高腫者順。已  
成掀痛。皮薄光亮。飲食如常。二便調和。身溫者順。已潰  
膿稠。色鮮不臭。腐肉自脫。掀腫易消。身輕者順。潰後新  
肉易生。瘡口易斂。飲食漸進者順。初起頂平根散。色暗

微腫。不熱。不疼。身體倦怠者。逆。已成腫。堅。色紫。不作膿。  
不腐潰。惟口乾。多煩躁者。逆。已潰皮爛。肉堅不腐。腫仍  
不消。痛仍不減。心煩者。逆。潰後膿水清稀。腐肉雖脫。新  
肉不生。色敗臭穢者。死。

楣案此係總論看法。各卷分論大略相同。徐氏謂  
不必重出。良然。

### 腫瘍治法第十六

初起知痛或不痛。起發或不發。毋論陰陽表裏。日數遠  
近。但未見膿者。俱宜灸之。

徐曰寒毒  
方宜灸

既灸不知痛癢。明

灸之。掀腫發熱。疼痛有時。脈來浮數。無便秘者。宜藥托之。身體拘急。脈緊惡寒。飲熱就暖者。邪在表也。宜汗之。腫硬痛深。口乾便秘。身熱脈實者。邪在裏也。宜下之。掀痛勢甚。煩躁餓冷。舌乾口燥者。火在上也。宜清之。腫痛堅硬。背如負石。惡心乾嘔。邪毒在內。解毒拔之。腫痛日深。內膿不出。瘀肉塗塞。瘡口者。急宜開割之。軟慢不作膿。及不腐潰者。陽氣虛也。壯脾胃。助陽氣。身涼自汗。手足並冷。六脈虛細。便泄陽脫也。急溫之。

楣案原本此後接以癰疽治驗各條。余觀之。皆發

背也。敘于諸方之前為失次。故另補發背總論。而移于第四卷腦疽之後。

腫瘍主治方第十七

神授衛生湯

衛生湯用阜歸銀  
芷甲羌防翹草節

粉乳紅沈石決明  
大黃便秘得之行

治癰疽發背。腦疽對口。丹瘤瘰癧。惡毒疔瘡。溼痰流

注。及一切諸毒。未成者即消。已成者即潰。能宣熱散

風。行瘀活血。解毒消腫。疎通臟腑。且藥性平和。功效

甚速。誠外科首用方也。

徐曰外科治法不外  
宣熱散風十六字

羌活

八分

防風

白芷

穿山甲

土炒  
研

沈香

紅花

連翹

石決明

煨各六分

金銀花

皂角刺

歸尾

甘草節

花粉

各一錢

乳香

五分

大黃

酒拌炒二錢脈虛便利者不用

水二碗煎八分。病在上部先服藥。隨後飲酒一杯。病

在下部先飲酒一杯。隨後服藥以行藥勢。

徐曰。此外科之主方。加減不外乎此。羌活搜風發

表勝溼。防風解表去風勝溼。白芷發表散風熱。活

血排膿。連翹散結消腫排膿。瘡家聖藥。甘草節生

肌止痛。惟花粉大寒不可用。破後口渴乃可用。其

外科  
方之分兩亦宜斟酌得中。除大黃外共一兩零五分。

又曰。外科與內科大不相同。內科之病千頭萬緒。一病必有一病之主方。外科不過托毒清火。及生肌長肉等數法耳。卽有加減亦惟隨症選擇幾味。無多法也。集中所載不下數百方。細審之不外數十方。學者果能將藥性細細參考。隨症施治。無投不利也。

相案外症陽毒卽不服藥亦能自腫自潰以至收



功。然有藥以治之。則可內消。陰毒非服藥不可。集中首列衛生湯。蓋卽仙方活命飲。而藥味小有出入。本是古法。然余觀他書治陰陽二毒之方。儘有佳者。目擊試驗。今附錄于左。

四妙湯

卽神效托裏散

生黃耆

五錢

大當歸

一兩

金銀花

一兩

甘草節

二錢

右藥水煎。晝夜服盡。自可移深居淺。轉重作輕。如已成氣血素虧。不能穿潰者。加白芷。阜針。山甲。各二錢。一伏時自潰。如已潰後。卽宜刪去阜針。山甲。如初起。

掀痛口渴。加天花粉。此方出外科說約。顧世澄瘍醫  
大全中采之。謂此乃瘍科首用捷法。數十年來。凡治  
一切癰疽。皆賴此方。增減活法。臨時酌用。遇大症。金  
銀花每加至六兩。四兩。生黃耆加至兩許。當歸加至  
二兩。甘草節加至三錢。但見瘡色不起。膿水清稀。卽  
加肉桂。轉陰爲陽。化毒成膿。如乳癰乳吹。卽加蒲公英  
英一兩。立消。百發百中。萬穩萬當。如偏身有溼熱  
瘡癰者勿用

摺案。金銀花須重用。方得力。他書載一園丁發背  
甚危。取金銀藤五六兩。搗爛。入熱酒一鍾。絞取汁。

溫服渣。罨患處。四五服而平。後用此藥治瘡。因以  
養身成家。遂棄園業。蓋金銀花治瘡。未成卽散。已  
成卽潰。藤與花功用相同也。

又案全生集謂大癰潰後。醫多用炙耆炙草。或用  
半炙半生。殊不知耆草皆炙。適以補毒而不能托  
毒。倘毒氣未盡。反得補助。致攻內腑。則如之何。此  
說甚當。蓋不獨未潰以前不可用炙耆炙草矣。

又案昔有人傳一方。遇赤貧者生大毒。以阜角刺  
四兩。生甘草二錢。酒水各半煎服。初起一二劑卽

消。余試驗數人。然有力者。不如用四妙湯為妥。  
陽和湯

熟地黃

一兩

白芥子

二錢 炒研

鹿角膠

三錢

肉桂

一錢

薑炭

五分

麻黃

五分

加生甘草

一錢 乳岩加土貝母五錢

右藥用水加酒一杯同煎。

痲案全生集治陰疽。專恃犀黃丸及此方。大指謂諸疽白陷。乃氣血虛寒凝滯所致。陽和一轉。則凝結之毒。自能化解。血虛不能化毒者。尤宜溫補。排膿。膿雖已潰。毒氣未盡。通其腠理之功。仍不可緩。

蓋補而不溫。則血凝氣滯。孰作釀膿之具。猶之造酒不暖。何以成漿。造飯無火。何以得熟。溫補而不開腠。裏則寒凝之毒。何從覓路行消。且毒盛者反受其助。猶車粟以助盜糧矣。余謂徐氏痛詆溫補。蓋爲十全大補等方。略不顧及外症。及專用參附者言也。此方用熟地。薑桂鹿角以爲溫補之品。用麻黃以開腠理。用白芥子以消皮裏膜外之痰。具有法度。全生集又謂熟地得麻黃。則不膩膈。麻黃得熟地。則不發表。神用在斯。其言良是。余見獲效。

者頗多。昔一親戚患腦疽。色如隔宿豬肝。蔓延無  
畔。岸醫投以涼藥。神思昏憤。余令服此方。一劑而  
神清毒活。漸次出膿而愈。知全生集之不余欺也。  
然半陰半陽之症。卽不可用。

### 醒消丸

乳香

一兩  
去油

沒藥

一兩  
去油

麝香

一錢  
五分

雄精

五錢

右乳沒雄三味各研秤準。再合和麝香共研。用爛煮  
黃米飯一兩。入末搗和爲丸。如菜菔子大。如飯嫌乾。  
量加開水可也。晒乾。忌烘。每服三錢。熱陳酒送下。醉

蓋取汗。酒醒癰消痛息。此方專治紅癰。

犀黃丸

真犀黃 三分

乳香 一兩 去油

沒藥 一兩 去油

麝香 一錢 五分

石藥先將乳沒各研秤準。再合和犀麝共研。用黃米

飯一兩。如前法為丸。飯嫌乾。酌加開水。晒乾。忌烘。凡

乳岩瘰癧痰核橫痃流注肺癰小腸癰等毒。每服三

錢。熱陳酒送下。患生上部。臨卧服。下部。空心服。此方

紅癰亦可用

相案外症丸藥。以此方為最妙。治白疽與陽和湯

相輔而行。陽和湯有時須斟酌用之。而此方無投  
不利。所見獲效者甚多。余仲兒珊林喜食厚味。而  
不嗜茶。數十年來。腦背等處屢欲生大疽。皆乘其  
初起。服此丸得消。戊午年夏間生疔尤危險。其疔  
甚奇。兩兩相對而生。腦門左右兩額角兩顴兩太  
陽穴兩耳門共十箇。惟兩眉之間一箇。初以爲暑  
癩。不甚在意。俄覺身發寒熱。飲食不進。神思恍惚。  
知爲大毒。急服此丸。并另服煎藥。用生黃耆至四  
兩。生甘草至五錢。漸覺神清熱退。毒亦高腫潰膿。



甫旬日而九毒已收功。惟餘二毒出膿稍遲。又半月全愈。潰膿後停服犀黃丸。仍服生黃耆及調理脾胃托毒之品。胃口日開。但厭食葷腥。又一月卽如常矣。因係疔毒。首尾用洞天膏及頭二三瓶糝藥。

又案犀乃牛之別種。方用犀黃。實牛黃耳。牛黃以產于陝西者爲最勝。世稱西黃。西犀同音。遂訛爲犀黃。不知藥有犀角無犀黃也。陝產牛黃質輕而細。如千層蚌殼。重疊可揭。用津唾磨指甲上。黃透

指甲洗之不退者真其產于廣中者名廣黃質重而粗無千層蚌殼紋磨指甲黃色亦不甚透醫家取其價賤用代西黃然其力甚薄合此丸斷不可用駱駝亦有黃大而灰黯肆中以充廣黃乃是偽品更有以雞子黃晒乾混充則貨藥者之造孽矣用者審之。

### 三黃丸

熟大黃

三錢

乳香

一兩  
去油

沒藥

一兩  
去油

雄精

五錢

麝香

一錢  
五分

犀黃

三分

石將熟大黃酒浸透。隔湯蒸軟搗爛。再將餘五味研極細和入。再搗干杵爲丸。如梧子大。每服五錢。此丸專治懸癰紅腫熱毒疼痛大癰楊梅結毒火毒等症。連服十次。雖甚險者全愈。

### 五通丸

廣木香

五靈脂

麻黃

乳香

去油

沒藥

去油

右藥等分。各研極細末。再秤準研勻。用黃米飯搗爛。入末再搗爲丸。如梧子大。另以芎歸赤芍連翹生甘草等藥煎湯送丸。每服五錢。凡大癰生於要緊穴道。

將。在。發。威。之。際。服。此。甚。效。如。與。三。黃。丸。間。服。更。妙。

小金丹

白膠香

五靈脂

草烏

地龍

木鼈

各一兩  
五錢

乳香

去油

沒藥

去油

歸身

各七錢  
五分

墨炭

一錢  
二分

麝香

三錢

右白膠香以下八味各研極細末秤準和勻再入麝

香墨炭同研用糯米粉一兩二錢為厚糊和入諸末

搗干杵為丸如芡實大此一料約為二百五十九丸晒

乾忌烘瓷瓶密藏勿令泄氣臨用取一丸布包放平

石上。隔布敲細。取好酒調藥令勻。蓋好浸一二時許。

再用銀物研過。熱陳酒送服。醉蓋取汗。梟案此須斟酌如每日服

一丸至服消乃止斷無每日取汗之理如流注初起。及一應痰核癰癤。

乳岩橫疔初起。服消乃止。如流注等症。成功將潰及

潰久者。當以十丸作五日早晚服。服則可杜流走。不

至再增。但方內有五靈脂。與人參相反。不可與有參

之藥同日服。

控涎丹 金生集易名子龍丸

製甘遂 紅芽大戟 白芥子 炒

腫瘍

右藥等分。各研秤準。再合研煉蜜爲丸。每服三分。淡薑湯送下。日服三次。凡實痰流注。癰癤橫痃。初起皆宜服此丹以消之。製甘遂之法。每斤用甘草四兩。煎湯浸三日。湯黑換河水淘洗。再用清水日淘。日浸。每日換水數次。三日後去心。再淘浸四五日。取一撮入白瓷盆內。隔一宿。盆中水無異色。乃漚乾。以麪裹如團。糠火煨至麪團四面皆黃。內藥熟透。取出晒乾。入鍋炒透磨粉。其苦寒之性。經製則不苦而甜。不寒而溫矣。如藥肆已經製過。但須清水浸一二日。並無黑

色便可用。製大戟之法。去附枝。水煮透。去骨取皮。切晒磨粉。甘遂與甘草相反。不可與有甘草之藥同日服。

內消沃雪湯

內消沃雪草歸皮  
阜甲射干銀貝芍

乳沒青翹歸芷耆  
木香花粉大黃宜

治發背併五臟內癰。尻臀諸腫。大小腸癰。肛門臟毒。初起但未出膿。堅硬疼痛不可忍者。

青皮

陳皮

乳香

沒藥

連翹

黃耆

當歸

甘草節

白芷

射干

天花粉

穿山甲

貝母

白芍

金銀花

卓角刺

各八分

木香

四分

大黃

二錢

水酒各一碗煎至八分量病上下食前後服之

徐曰此方以治氣分之症為宜但藥味太雜宜揀擇熟讀藥性方能知也

內疎黃連湯

內疎黃連湯木香大黃桔草連翹共

梔歸苓芍薄荷榔邪毒消除身自強

治癰疽腫硬發熱作嘔大便秘澀煩躁飲冷噦呃心煩舌乾口苦六脈沈實有力此邪毒在臟也急宜服此以內除之使邪氣不得傳變經絡

木香

黃連

山梔

當歸

黃芩



白芍

薄荷

檳榔

桔梗

連翹

各

錢

甘草

五分

大黃

二錢

水二茶鍾煎八分。食前服。臨服加蜜二匙亦可。

徐曰。此為寒下之劑。

保安萬靈丹

萬靈丹用朮防風川草二烏甘竭芥

羌活麻黃歸解芎雄黃何首北辛同

治癰疽疔毒對口發頤風溼風溫溼痰流注附骨陰疽鶴膝風症左癱右瘓口眼喎斜半身不遂氣血凝滯徧身走痛步履艱辛偏墜疝氣破傷風牙關緊閉截解風寒無不應效。

茅水八兩

全蝎

石斛

當歸

甘草炙

明天麻

川芎

羌活

荆芥

防風

麻黃

北細辛

川烏

湯泡去皮

草烏

湯泡去皮尖

何首烏

各一兩

明雄黃

六錢

右爲細末。煉蜜丸。每藥以一兩作四丸。一兩作六丸。

一兩作九丸。三等做下。以備年歲老壯病勢緩急取

用。預用硃砂六錢。研細爲衣。瓷罐收貯。治癰疽初起

二三日之間。或已成至十朝前後。尙未出膿。狀若傷

寒。頭疼煩渴。拘急惡寒。肢體疼痛。惡心嘔吐。四肢沈

重恍惚悶亂。坐卧不甯。皮膚壯熱者。又治傷寒四時感冒傳變疫症。但惡寒身熱。表症未盡者。俱宜服之。用連鬚大蔥白九枝。煎湯一茶鍾。將藥一丸乘熱化開。通口服盡。被蓋出汗爲效。如服後汗遲。再用葱白湯催之。後必汗如淋洗。漸漸退下。覆蓋衣物。其汗自收。自斂。患者自然爽快。其病如失。未成者隨卽消去。已成者隨卽高腫潰膿。如諸疾無表症相兼。不必發散者。只用熱酒化服。此方原載於諸風癰瘰門。予每用之。發散瘡毒。其功甚捷。故移錄於此。詳觀此方治

腫瘍甚效者何也。凡榮衛不調。氣血凝滯。乃生癰腫。此方性專發散。又能順氣搜風。通行經絡。所謂結者開之。況瘡毒乃日積月累。結聚所發。苟非甘溫辛熱發泄。以汗疎通。安能得效。所謂發散不遠熱。正合此方之意也。服後避風。當食稀粥。忌冷物房事。孕婦勿服。

徐曰。此方剛燥。膏粱之人不宜用。藥亦太雜。

又曰。此方治寒溼之毒爲宜。餘者當斟酌。

楣案。以此方治風溫及傷寒四時感冒傳變疫症。

實開外科妄治內症之弊

雙解復生散

雙解荆防芎芍者歸翹滑石銀羌活

麻黃甘草薄荷山梔參朮黃硝共得宜

治癰疽發背諸般腫毒初起憎寒發熱四肢拘急內熱口乾大小便秘宜此藥發表攻裏

荆芥

防風

川芎

白芍

黃耆

麻黃

甘草

五分

薄荷

山梔

當歸

連翹

滑石

金銀花

羌活

人參

白朮

各八分

大黃

芒硝

各二錢

水二碗表症甚者加薑三片葱頭二莖裏症甚者臨

服加生蜜三匙。為發表攻裏雙解藥也。

徐曰。此方以散風為主。藥味亦雜。毒甚而體強者

可用。

內消散

內消散內用銀花  
半夏乳香併阜甲

知貝天花白芩加  
此方神效病全瘥

治癰疽發背對口疔瘡乳花百種無名腫毒一切疔瘡。此藥能令內消。化毒為黑水。從小便而出。勢大者雖未全愈。亦可轉重就輕。移深居淺。

金銀花

知母

貝母

天花粉

穿山甲

白芩

半夏

阜角

乳香各錢

水酒各一碗煎八分隨病上下食前後服之留藥渣

搗爛加秋芙蓉葉細末一兩白蜜五匙同渣調敷瘡

上一宿自消重者再用一服忌口效

徐曰此方能散熱痰與前諸方近不必錄

清熱消風散

清熱消風散芍耆柴苓翹與紅花阜

銀花歸粉草陳皮蒼朮防芎和解宜

治癰疽諸毒已成未成之間外不惡寒內無便秘紅

赤高腫有頭掀痛宜服此藥和解之

防風

川芎

當歸

黃芩

白芍

花粉

金銀花

甘草

五分

連翹

紅花

柴胡

蒼朮

陳皮

黃耆

角刺

各一

錢一

水二茶鍾。煎八分。食遠服。婦人加香附童便炒。已上  
 七方。癰疽七日已前。瘡勢未成。形體壯實。表裏之症  
 相合者。宜服。病退即已。如過七日以後。形勢已成。便  
 宜用後托裏等藥。催毒在外。以速其膿。禁前表下之  
 藥。損傷元氣。致生他變。

徐曰此即前諸方之意。無他異義。



內固清心散

內固清心散茯苓人參菉豆元明粉

砂雄豆蔻乳香增冰片生甘病自輕

治癰疽發背對口疔瘡熱甚掀痛煩躁飲冷服此可預防毒氣內攻不致變症。

茯苓

辰砂

人參

甘草

雄黃

元明粉

白豆蔻

乳香

冰片

一錢

真豆粉

二兩

右為細末。每服一錢五分。蜜湯調下。不拘時候。

徐曰。此護心之方也。然護心另有效方。此方可不備。

護心散

護心散用上好硃砂  
每服二錢頻送下

豆粉乳香甘草加  
惡心嘔吐頗然瘥

治瘡毒內攻口乾煩躁惡心嘔吐

真豆粉

一兩

乳香

淨末  
三錢

硃砂

二錢

甘草

末一錢

右共研極細每服二錢白滾湯調服早晚二次

徐曰此不必

琥珀蠟礬丸

琥珀蠟礬丸琥珀  
雄黃蜂蜜丸成就

明礬黃蠟與硃砂  
護心護膜效堪誇

治癰疽發背已成未膿之際恐毒氣不能外出必致

內攻預服此丸護膜護心亦且散血解毒

白礬

一兩  
二錢

黃蠟

一兩

雄黃

一錢  
二分

琥珀

一錢另  
研極細

硃砂 一錢二分

蜂蜜 二錢

右將白礬等四味先碾研極細。另將蜜蠟銅杓內溶化。離火片時。候蠟四邊稍凝時。方入上藥攪勻。共成一塊。以一人將藥火上微烘。眾手急丸。小棗豆大。用硃砂為衣。瓷罐收貯。每服二三十丸。白湯食後送下。病甚者早晚日進二次最效。

徐曰。此護心緩治之方。不可少。

托裏消毒散

托裏消毒散人參角針白芷銀花等

芍芍耆歸朮茯苓桔梗甘草效如神

治癰疽已成。不得內消者。宜服此藥以托之。未成者

外科正宗卷二  
可消。已成者卽潰。腐肉易去。新肉易生。此時不可用  
內消泄氣寒涼等藥。致傷脾胃爲要。

人參

川芎

白芍

黃耆

當歸

白朮

金銀花

茯苓

各一錢

白芷

甘草

皂角針

桔梗

各五分

水二茶鍾。煎八分。食遠服。脾弱者去白芷。倍人參。

徐曰。法重出。無別義。

排膿內托散

排膿內托散芎歸  
止草桔梗併桂膠

參朮苓陳芍附耆  
隨方加減在人爲

治癰疽腦項諸發已潰流膿時宜服此藥

當歸

白朮

人參

各二錢

川芎

白芍

黃耆

陳皮

茯苓

各一錢

香附

甘草

五分

白芷

項之上加三分

桔梗

胸之上加五分

牛膝

下部加五分

肉桂

入分

薑三片。水二茶鍾煎入分。食遠服。

徐曰。此補托之總方。

又曰。此乃溫托之法。寒症而無毒者宜。

媚案參朮桂三味徐圈。桔梗註胸之上三字。牛膝

註下部加五分字亦圈。

外科正宗卷二  
又案既言補托總方。又言寒症而無毒者宜蓋陽  
毒熱毒無補法恐人誤會也。

乳香黃耆散

乳香黃耆散乳沒  
芎歸白芍與陳皮

栗殼參耆甘草撮  
加上熟地疼即脫

治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍未成者速散已  
成者速潰。敗腐膿毒不假刀砭其惡肉自然脫下兼  
治打撲傷損筋骨疼痛。

乳香

沒藥 各五分

黃耆

鷓鴣栗殼

去肋膜  
蜜炒

人參

甘草

川芎

歸身

白芍

陳皮

熟地黃

各一錢

水二茶鍾煎八分量病上下食前後服之

徐曰乳香沒藥粟殼皆止痛之藥也熟地黃不人煎藥其誤起於薛立齋應換熟大黃

神功內托散

神功內托散芎耆附子木香甘草炙

歸朮陳皮白芎宜參苓山甲起垂危

治癰疽腦項諸毒至十四日後當腐潰流膿時不作腐潰更兼瘡不高腫脈細身涼者

當歸

二錢

白朮

黃耆

人參

各一錢五分

白芍

茯苓

陳皮

附子

各一錢

木香

甘草

炙各五分

川芎

一錢

山甲

炒八分

煨薑三片大棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服。

徐曰此方治寒溼之毒。

透膿散

透膿散內用黃耆加上角針頭自破

山甲芎歸總得宜能令膿毒透紅肌

治癰疽諸毒內膿已成不穿破者服之即破。

黃耆

四錢

山甲

炒末一錢

川芎

三錢

當歸

二錢

阜角針

一錢五分

水二茶鍾煎一半隨病前後服臨時入酒一杯亦好。

徐曰此方專主透膿以爲諸方加味則可專用大

偏。



竹葉黃耆湯

竹葉黃耆湯草芩石膏半夏兼冬地

芩歸白芍共入參淡竹生津瀉渴心

治癰疽發背諸般疔腫表裏熱甚口乾大渴者

黃耆

甘草

黃芩

川芎

當歸

白芍

人參

半夏

石膏

麥冬

各入

分

淡竹葉

十片

生地黄

一錢

水二茶鍾薑三片燈心二十根煎八分食遠溫服

徐曰此治熱毒之方然終宜入風藥幾味

又曰知母蘆根茅根元參連翹皆可選用

回陽三建湯

回陽三建府參耆陳朴木紅甘紫草

歸朮芎苓杞獨萸陰疽危症此堪扶

治陰疽發背初起。不疼不腫不熱不紅。硬若牛皮。堅如頑石。十日外脈細身涼。肢體倦怠。皮如鼈甲。色似土硃。多生粟頂。孔孔流血。根腳平散。軟陷無膿。又皮不作腐。手熱足涼者。俱急服之。

附子

人參

黃耆

當歸

川芎

茯苓

枸杞

陳皮

萸肉

木香

甘草

紫草

厚朴

蒼朮

紅花

獨活

各五分

煨薑三片。阜角樹根上白皮二錢。水二碗。煎八分入。

酒一杯隨病上下食前後服之用綿帛蓋瘡令暖并  
不得大開瘡孔走泄元氣爲要愚按凡背疽屬陰者  
皆由臟腑先壞而內毒不得發越於外也舊有用雞  
冠剪血滴於疽上者有醋煮雄艾敷用者豬腦熱藥  
敷圍者神燈火氣灼照者此數法皆陰疽所宜予雖  
常用未見實效蓋陰疽不起者如樹木之根壞強培  
枝葉終無發生之理先要疎其土通其脈助其本回  
其陽此四者缺一不可予常據理用藥得生者十中  
三四用蒼朮厚朴茯苓陳皮疎其土川芎當歸紫草

紅花通其脈。人參黃耆枸杞山萸助其本。附子木香  
甘草獨活回其陽。但根本內有一脈未絕之氣。服之  
俱可得生。如手足溫暖。瘡便發熱。漸作掀腫。復生疼  
痛。色暗得活。堅硬得腐。胃氣得回。此卽藥之效驗。必  
在三服中應之爲吉。外兼照法接助回陽。此通治陰  
疽之大法也。

徐曰。此治陰毒。然藥味太雜。不可學。

黍米寸金丹

黍米寸金丹乳香  
輕沒蜈蚣狗鯉膽

蠟麝酥雄狗寶霜  
黑石礮砂男乳良

二名返魂丹。三名再生丸。四名追命丹。五名延壽丹。

六名來甦圓七名知命丸八名得道丸此方昔出異人所傳常有暴中急症忽然卒倒者撬開牙關研灌三丸其人即活又能治發背腦疽偏身壅腫附骨癰疽等症初起憎寒壯熱四肢倦怠沈重者無分表裏老幼輕重並宜服之

麝香 五分 乳香 沒藥 雄黃 狗寶

輕粉 烏金石 各一錢 蟾酥 二錢 粉霜 水銀煉日色者

黃蠟 各三錢 硃砂 二錢 鯉魚膽 陰乾三箇 狗膽 乾用一箇

白丁香 四十粒 金頭蜈蚣 七條金色 頭胎男乳

外科正宗卷二 癰疽

合一

右共爲細末。除黃蠟乳汁二味熬成膏。同藥和丸。如  
藁豈大。大人三丸。小兒用一九。病重者五丸。冷病用  
葱湯熱病用新汲水送下。衣被密蓋。勿令透風。汗出  
爲度。諸病如失。後食白粥調理。

徐曰。此乃護心托毒之藥。險毒之症可用。不可輕  
用。疔毒最宜。

董發背奇方

發背諸方此獨嘉  
并添沒藥將紙裏

麝香雄竭與硃砂  
燃照薰瘡逐漸加

治發背初起七日前後未成者自消。已成者自潰。不

起發者卽發不腐潰者卽腐誠爲良法

雄黃

硃砂

血竭

沒藥

各二錢

麝香

四分

右五味研爲細末。每用三分。綿紙裹藥爲搽。長約尺許。以真麻油潤透。灼火離瘡半寸許。自外而內。周圍徐徐照之。火頭向上。藥氣入內。瘡毒隨火解散。自不內侵臟腑。初用三條。漸加至四五條。候瘡勢漸消。漸減。薰後隨用敷藥。如已潰大膿發泄時。不必用此照敷。只宜用膏藥蓋貼。

徐曰。此卽神燈照法。治寒毒不起發最妙。

敷藥方

薰後敷方有四般。車前豨莶五龍乾。銀花小粉爲糊貼。膿毒消清身自安。

車前草

連根

豨莶草

五龍草

金銀花

各等分

右四味鮮草藥。一處搗爛。加三年陳小粉。卽常用漿衣者。初起仍加飛鹽末二三分。共打爲稠糊。徧敷瘡上。中留一頂。以膏蓋貼。避風。自然拔出膿毒。若冬月草無鮮者。預採蓄下。陰乾爲末。用陳米醋調敷。亦如前法。並效。但五龍草不能隨地皆有。或致缺少。難合。



子常薰後頂以膏蓋周圍腫上以如意金黃散代敷亦效。

如意金黃散

如意金黃散大黃 薑黃黃柏芷陳蒼 南星厚朴甘花粉 敷上腫消體便康

治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷溼痰流毒大頭時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾溼脚氣婦女乳癰小兒丹毒凡外科一切諸般頑惡腫毒隨手用之無不應效誠為瘡家良便方也。

天花粉

上白四兩黃柏

色重者大黃

薑黃

白芷

各五

分

紫厚朴

陳皮

甘草

蒼朮

外科正宗卷一  
天南星

各八錢

以上各藥。切成薄片。曬極乾燥。各研極細淨末。每樣稱準合和再研。瓷器收貯。勿令泄氣。凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者。及夏月火令時。俱用茶湯同蜜調敷。

徐曰蜜調祇能清熱不能收口

如微熱微腫。及大瘡已成欲作膿者。

俱用葱湯同蜜調敷。如漫腫無頭。皮色不變。溼痰流毒。附骨癰疽。鶴膝風等症。俱用葱酒煎調。如風熱惡毒。皮膚亢熱。紅色光亮。形狀游走不定者。俱用蜜水調敷。如天泡火丹。赤遊丹。黃水漆瘡。惡血攻注等症。

俱用大藍根葉搗汁調敷。加蜜亦可。湯潑火燒皮膚破爛。麻油調敷。具此諸引。要在臨用之際。順合天時。洞窺病勢。察其寒熱溫涼。用之為妥。

徐曰。此即通行圍藥。

四虎散

四虎散內用南星再添狼毒并豬腦

草烏半夏效通靈搗貼癰疽腫即甯

治癰疽腫硬。厚如牛領之皮。不作膿腐者。

南星

草烏

半夏

狼毒

各等分

石為細末。用豬腦同搗。徧敷瘡上。留正頂出氣。

徐曰。此治寒痰之敷藥。

真君妙貼散

真君妙貼散神通諸般異症皆堪效

常取收功掌握中

治癰疽諸毒及異形異類頑硬大惡歹瘡走散不作膿者宜用此藥不痛者即痛痛甚者即止

明淨硫黃

八兩為末

蕎麪

白麪

各四兩

共一處用清水微拌乾溼得宜木廂內躡成麪片單

紙包裹風中陰乾收用臨時再研極細用新汲水調

敷如皮破血流溼爛疼苦等症麻油調搽天泡火丹

肺風酒刺染布青汁調搽並效

回陽玉龍膏

回陽玉龍膏肉桂草烏赤芍與南星

白芷軍薑同一位熱酒調敷功更倍

治背疽陰病。不腫高。不掀痛。不發熱。不作膿。及寒溼流注。冷痛痺風。諸溼脚氣。手足頑麻。筋骨疼痛。及一切皮色不變。漫腫無頭。鶴膝風等。但無皮紅肌熱者。一概用之。俱有功效。

草烏

三兩 炒

軍薑

三兩 煨

赤芍

炒

白芷

南星

煨各一兩

肉桂

五錢

右製畢。其爲細末。熱酒調敷。此藥有軍薑肉桂熱血生血。旣生旣熱。恐轉致壅而爲害。故有草烏南星。可以破惡氣。祛風毒。活死肌。除骨痛。消結塊。回陽氣。又

有赤芍白芷足以散滯血住痛苦加以酒行藥性攻  
通氣血雖十分冷症未有不愈者誠為寒灰之焰枯  
木之春大抵病冷則肌肉陰爛不知痛癢其有痛者  
又多附骨之痛設若不除則寒根透髓尋常之藥固  
莫能及矣

沖和膏

沖和膏內紫荆皮白芷配成五行妙

獨活菖蒲赤芍宜諸般外症總堪醫

治癰疽發背陰陽不和冷熱不明者

紫荆皮

五兩炒

獨活

三兩炒

赤芍

二兩炒

白芷

一兩

石菖蒲

一兩五錢

右爲細末。葱湯熱酒俱可調敷。紫荊皮乃木之精能破氣逐血消腫。獨活土之精動蕩凝滯血脈散骨中冷痛。去麻痺溼。石菖蒲水之精善破堅硬生血止痛。破風消腫。白芷金之精能去風生肌定痛。赤芍火之精能生血活血散瘀除痛。蓋血生則肌肉不死。血動則經絡流通。故肌活不致爛痛。經通不致壅腫。此爲散風行氣活血消腫祛冷軟堅之良藥也。其中五行相配用者再無不效。又流毒骨疽冷症尤效。

徐曰。此風痰之圍藥。

又曰。此方古本皆有之。皆極推重。外科不可少也。

鐵桶膏

鐵桶膏中有麝香明礬芫花倍并銅綠

膽礬輕粉鬱金鑲調醋搗瘡法最良

沿發背將潰已潰時根脚走散不收束者用此搗之

銅綠

五錢

明礬

四錢

膽礬

三錢

五倍子

微炒一兩

白芨

五錢

輕粉

鬱金

各二錢

麝香

三分

右為極細末。用陳米醋一碗。杓內慢火熬至一小杯。

候起金色黃泡為度。待溫。用藥末一錢攪入膏內。每

用頓溫。用新筆塗膏瘡根上。以綿紙蓋之。瘡根自生

縐紋。漸收漸緊。再不開大。



徐曰此收束之要藥凡散漫之毒皆可用。

煮拔筒方

煮拔筒方羌紫蘇  
鬚葱白芷兼獨活

生甘蘄艾石菖蒲  
筒拔瘡膿看有無

治發背已成將潰時膿毒不得外發必致內攻乃生  
煩躁重如負石非此法拔提毒氣難出也。

羌活

獨活

紫蘇

蘄艾

鮮菖蒲

甘草

白芷

各五錢

連鬚葱

三兩

預用口徑一寸二三分新鮮嫩竹一段長七寸一頭  
留節用刀剗去外青留內白一半約厚一分許靠節  
鑽一小孔以杉木條塞緊將前藥放入筒內筒口用

葱塞之。將筒橫放鍋內。以物壓。勿得浮起。用清水十  
大碗。滷筒。煮數滾。約內藥濃熟爲度。候用。再用披針  
於瘡頂上。一寸內。品字放開三孔。將藥筒連湯用大  
瓷鉢盛貯。至病者榻前。將筒藥倒出。急用筒口乘熱  
對瘡合上。以手捺緊。其筒自然吸住。約待片時。藥筒  
已溫。拔去塞孔木條。其筒自脫。將器倒出筒中物色。  
看是何樣。如有膿血相黏。鮮明紅黃之色。一二杯許。  
乃是活瘡。治必終愈。如拔出物色純是敗血。氣穢紫  
黑。稀水而無膿意。相黏者。此氣血內敗。肌肉不活。必

是死瘡。強治亦無功矣。此法家傳。屢經有驗。如陽瘡。易潰。易膿之症。不必用此。以傷氣血。惟陰瘡。十五日。前後堅硬。不潰。不膿者。用之。此法有回天之效。醫家不可缺也。

徐曰。此方亦有用處。

又曰。此吸毒之法。袋膿瘡亦可用。

豬蹠湯

豬蹠湯內羌甘草  
加上露蜂房更妙

赤芍黃芩白芷歸  
諸瘡一洗換新肌

治癰疽諸毒已潰流膿時。用此湯洗。消毒氣去惡肉。回死肌。潤瘡口。又能散風消腫。腐盡則已。

羌活

甘草

赤芍

黃芩

白芷

當歸

蜂房

各等分

右爲粗末。看疽瘡大小。用藥多少。先將獾豬前蹄一隻。用白水六碗。煮蹄軟爲度。將汁濾清。吹去汁上油花。用藥一兩投於汁中。再用微火煎十數沸。密絹濾去藥渣。候湯半熱。將軟絹蘸湯淋於瘡上。輕手浥去疼膿腐肉。諸惡物隨湯而下。洗訖。以絹帛浥乾。照前總論次第。如式用藥。

徐曰。洗方不可少。

楣案蜂房一味徐圈獷豬卽今之闔豬

又洗藥方

洗藥方中歸獨活癰疽腐盡頻淋洗

生甘白芷與葱頭長肉生肌頓失愁

當歸

獨活

白芷

甘草

各二錢

葱頭

五箇

用水三碗煎至藥爛濾清以絹帛蘸湯浥淨瘡上隨搽貼紅黑二膏蓋之洗時切忌風寒為要治背瘡輕易者以此代豬蹄湯用亦效

徐曰前方好

加味太乙膏

太乙膏中槐柳枝大黃木鼈芷輕粉

元丹魏芎血餘宜乳沒當歸地桂奇

小... 厘瘍

年

治發背癰疽。及一切惡瘡。跌撲傷損。溼痰流毒。風溼  
風溫。徧身筋骨走注作痛。內傷風鬱。心腹胸背。或刺  
作疼。腿腳酸軟。腰膝無力。湯潑火燒。刀傷棒毒。五損  
內癰。七傷外症。俱貼患處。又男子遺精。婦人白帶。俱  
貼臍下。臟毒腸癰。亦可丸服。諸般瘡癤。血氣癩痒。諸  
藥不止痛痒者。並效。

肉桂

白芷

當歸

元參

赤芍

生地

大黃

土木鱉

真阿魏

錢二

輕粉

錢四

槐枝

柳枝

各一  
百段

血餘

兩

乳香

淨末  
五錢

沒藥

淨末  
三錢

右十味併槐柳枝用真麻油足秤五斤將藥浸入油內春五夏三秋七冬十候日數已畢入潔淨大鍋內慢火熬至藥枯浮起爲度住火片時用布袋濾淨藥渣將油秤準足數將鍋刷淨復用細舊絹將油濾入鍋內要清淨爲美將血餘投下慢火熬至血餘浮起以柳槐挑看似膏溶化之象方算熬熟淨油一斤將飛過黃丹六兩五錢徐徐投入火加大些夏秋亢熱每油一斤加丹五錢不住手攪候鍋內先發青烟

後至白烟。疊疊旋起。氣味香馥者。其膏已成。即便住火。將膏滴入水內。須軟硬得中。如老。加熟油。若嫩。加炒丹。每各少許。漸漸加火。務要冬夏老嫩得宜。爲佳。候烟盡。撥下鍋來。方下阿魏。切成薄片。散於膏面上。化盡。次下乳。沒輕粉攪勻。傾入水內。以柳棍攪成一塊。再換冷水浸片時。乘溫。每膏半斤。扯拔百轉成塊。又換冷水投浸。用時。每取小塊。銅杵內煇化。隨便攤貼。至妙。

徐曰。此通治之要方。



又曰此通行之方。然更有佳者。

楣案諸書膏藥方甚多。惟全生集分貼陰毒陽毒。二膏甚佳。而陽和膏尤不可缺。蓋陰毒多寒。凝非不得溫暖之膏。不能轉陰為陽也。今並附錄於後。

### 洞天鮮草膏

專貼陽毒。夏天熱癩尤妙。

壯年頭髮

斤 牛蒡子

甘菊 蒼耳

以上俱用新鮮根葉

各一

金銀藤

馬鞭草

仙人對坐草

以上亦用新鮮

者各

一斤 白芷

甘草

五靈脂

當歸

各半斤

先用菜油三斤。將頭髮入鍋熬枯。去渣聽用。再以菜油十斤。同牛蒡等各鮮草熬枯。漚出。再入白芷等藥。熬枯出渣。用絹濾淨。并入髮油內。共秤準斤兩。每油一斤。用當日炒透桃丹七兩。徐徐投入。隨熬隨攪。熬至滴水成珠。以兩指取膏爲丸。而丸不黏指爲度。掇下鍋來。候稍溫。傾入水中。扯拔數十次。卽可攤貼。

### 陽和解凝膏

專貼陰毒。凡腦疽。背疽。乳疽。瘰癧。及一切爛潰陰疽。俱以此貼。如紅癰。勿貼。

新鮮牛蒡子根葉梗

斤三

活白鳳仙梗

兩四

川附

桂枝

大黃

當歸

肉桂

官桂

草烏

川烏

地龍

僵蠶

赤芍

白芷

白朮

白芨

各二兩

川芎

兩四

續斷

防風

荆芥

五靈脂

木香

香櫞

陳皮

各一兩

乳香

研細末

沒藥

各二兩

麝香

研細一兩

用菜油十斤。先將牛蒡白鳳仙熬枯去渣。次日除乳香沒藥蘇合油麝香外。餘藥俱陸續入鍋煎枯。去渣。

夕禾正卷二  
三  
濾淨。秤準斤兩。每油一斤。加炒透桃丹七兩。熬至滴水成珠。不黏指爲度。撥下鍋來。將乳香沒藥蘇合油麝香入膏攪和。半月後攤貼。此膏兼可治瘧疾。貼在背脊第三節骨上。

相案全生集言膏藥不可以草麻子煎入。倘貼孕婦下身瘡癩。卽小產。產後尚不悟膏藥之故而再貼。則致命。附記于此。

生肌玉紅膏

生肌玉紅膏更奇  
血竭白蠟同紫草

芷草歸身輕粉施  
麻油熬好貼生肌

此膏專治癰疽發背。諸般潰爛棒毒等瘡。用在已潰

流膿詩。先用甘草湯。甚者用豬蹄藥湯。淋洗患上。軟  
絹浥淨。用抵腳挑膏。於掌中捺化。徧搽新腐肉上。外  
以太一膏蓋之。大瘡早晚洗換二次。兼服大補脾胃  
暖藥。腐肉易脫。新肉即生。瘡口自斂。此乃外科收斂  
藥中之神藥也。

白芷

錢五

甘草

錢二

歸身

錢二

血竭

輕粉

各四

錢

白蠟

錢二

紫草

錢二

麻油

斤一

先用當歸甘草紫草白芷四味入油內浸三日。大杓  
內慢火熬煎微枯色。細絹慮清。將油復入杓內煎滾。

下整血竭化盡。次下白蠟。微火化之。用茶鍾四枚。預  
頓水中。將膏分傾四茶鍾內。候片門方下。研極細輕  
粉。每鍾一錢。攪勻。候至一伏時。取起。不得加減。致取  
不效。

徐曰：此膏卽藥油也。乃去腐生肌之總方。其調入  
末隨症加減。

化腐紫霞膏

化腐紫霞膏甚奇  
金砒血竭同樟腦

草仁巴豆與螺螄  
銅鐵敷之也化糜

治發背已成。瘀肉不腐。及不作膿者。又諸瘡內有膿  
而外不穿潰者。俱用此膏。不腐爛者自腐。不穿潰者

自破其功甚於烏金膏及碧霞錠子

輕粉

草麻仁

研各三錢

血竭

二錢

巴豆

研白仁五錢

樟腦

一錢

金頂砒

五分

螺螄肉

用肉晒乾為末二錢

右各為末。共碾一處。瓷罐收貯。臨用時。旋用麻油調搽頑硬肉上。以綿紙蓋之。或膏貼亦可。至頑者不過二次。即軟腐為膿。點諸瘡頂亦破。

徐曰。此藥易合而可久藏。點藥之最便者。去頑肉不可少。

楣案巴豆金頂砒螺螄肉三味徐圈。

腫瘍

又案點藥及去頑肉以白降丹為最妙。呼膿拔毒。去腐生肌。及初起內消。亦有靈妙。糝藥。此書惟有玉紅膏。及末卷白昇藥。殊為未備。今采取各方。附錄於後。

### 白降丹

水銀 一兩  
四錢

淨火硝 一兩四錢  
夏天加三錢

白礬 一兩  
另研

硃砂 五錢  
三分另研

雄精 二錢  
三分另研

硼砂 四錢  
另研

早礬 一兩  
七錢

白砒 二錢  
另研

食鹽 三錢

右藥研至不見水銀星為度。盛于陽城罐內。用煇炭



微火鎔化。火急則水銀上升走鑪。熬至罐內無白煙起。以竹枝撥之。無藥屑撥起。用木杵槌實。則藥吸于罐底。謂之結胎。胎成。將空罐合上。用綿紙條潤以墨水。置于縫間。鹽泥封固。烤乾。如有裂縫。添鹽泥密固之。再用宜興鉢頭盛水。上放大黃沙盆。中開一孔。將有藥之罐在上。空罐在下。入沙盆孔中。水平罐底。然後盆內鋪以淨灰。輕輕按平。不可動搖。恐傷封口。卽要走鑪。鋪畢。取燒紅栗炭攢圍藥罐。用扇微扇。煉一炷香。謂之文火。再略重扇。煉一炷香。謂之武火。炭隨

少隨添。勿令間斷。而見罐底。再煉一炷。卽退火。俟盆

灰冷定。去灰及封口土。開看下罐內所有白霜。卽謂

之丹。瓷瓶收貯聽用。

楣案兩罐鹽泥封固。須用鐵條四根夾住。鐵絲纏縛。方不脫。

一治腫瘍膿成不穿。用津唾調少許。點毒頂。以膏蓋

之。卽穿。或用麪糊以竹片拌和爲條。切作脂麻大。

放膏中對腫頭貼之。不用指拌者。新降甚烈。恐沾

指疼痛起泡也。

一治潰瘍毒根堅硬如石。用以消化。

一用作點藥。如病者怕疼。可用生半夏對攪。再加冰

片少許。能令肉麻不痛。名夏冰對配丹。或用蟾酥少許攪入。亦可不疼。

一肌薄骨露無肉之處。及經脈交會之所。神氣之所

注。氣血之所聚。潰後元氣有傷。不能收斂。須藉溫補。潛斂收功者。此丹不可概施。恐拔傷元氣。

一初降性烈。尋常之症。只用後開九一丹爲妥。如腐肉厚韌。不化不脫。或三七。或對攪。或一九。斟酌用之。年久烈性已退。方可專用。然四圍好肉。亦須用生肌之藥護之。

九一丹

生石膏

九分

白降丹

一分

右共研極細聽用。年久降丹烈性已退。入二七三攪和均可。

一治腫瘍結核。將丹薄薄勻糝膏上。數箇即消。不可太多。多則有傷皮膚。

一治潰瘍。糝膏上貼之。提膿拔毒。毒盡生肌。比昇丹功效數倍。惟賺骨正面及踝骨。與凡肌薄無肉之處。不能化膿。但有稠水者。忌用此丹。緣提拔甚猛。

誤用反疼。甚則流血。宜用後開頭二三瓶糝藥爲妥。

此丹用綿紙撚作藥線。潤以麪糊。將丹拌上。插入膿管。能退管收功。

頭瓶糝

丁香 錢一

血竭 錢三

白芷 錢三

兒茶 錢五

草烏 錢五

山柰 錢五

甘松 錢五

萆撥 兩一

乳香 錢一

沒藥 錢一

去油

右各研極細末。再秤準。共研極勻。瓷瓶收貯。勿令泄。

氣腫瘍初起。糝膏上貼之。未成者消。已成者潰。

二瓶糝

延胡索

錢五

牙皂

錢一

麝香

分三

丁香

錢一

右藥製法同上。糝潰瘍膏藥中能呼膿拔毒止痛。凡肌薄無肉之地。必用此藥。切不可用九一丹。

三瓶糝

硃砂

一錢研極細水飛淨

爐甘石

一錢以黃連五分煎汁煨淬研極細水飛淨

川連

錢一

生龍骨

錢五

冰片

分一

右藥製法同上。糝膏貼之。能生肌長肉。或即薄糝新

肌上緣有深潭處恐藥不能到也凡糝藥總以極細  
爲主粗則嵌入嫩肉亦能作疼不可不知。

### 珍珠散

珍珠

一錢人乳浸三日夏天須每日換  
乳珠質最堅尤宜研極細如飛麪 血竭 五分

兒茶

五分 石膏 一錢

爐甘石

一錢製法與上  
三瓶糝藥同

赤石脂

一錢

陳年絲吐頭

五分

冰片

一分

右藥製法同上諸毒膿腐已盡用此糝上即能生肌

長肉平口收功神效無比但珍珠價貴恐醫者不能

備只用上三瓶糝藥亦遠勝於昇丹也

陰毒內消散

麝香 二錢

輕粉 三錢

丁香 一錢

牙皂 二錢

樟冰 四錢

腰黃 三錢

良薑 二錢

肉桂 一錢

川烏 一錢

甲片 三錢

白胡椒 一錢

乳香 二錢

沒藥 二錢

阿魏 三錢

瓦 三錢

右藥製法同上陰毒初起。糝膏上貼之即消。已成即

潰。惟疔毒癰瘡等毒及孕婦忌貼。以下二方蔣君光

桐鄉曹氏云秘之  
已數世施送極驗

陽毒內消散

麝香 二錢

冰片 二錢

白芨 四錢

薑黃 四錢

南星 四錢



甲片錢四

樟冰錢四

輕粉錢三

膽礬錢三

銅綠錢四

漂青黛錢二

右藥製法同上。陽毒初起。糝膏上貼之。二方皆功專

于消。已破者勿糝。

以上三十二方。凡腫瘍初起及已成時選用。新附十入方

潰瘍治法第十八

膿熱不潰。瘡不掀熱。食少便澇者。脾虛也。補托溫中。膿

清或多。瘡口散大。不生肌者。裏虛欲變症。峻補之。此三字徐

勒批曰也。須清毒。腐肉雖脫。新肉生遲。如棗色者。肉冷肌寒。宜

外科 卷二  
大溫氣血。潰後食少。心煩不睡。發熱作渴者。脾弱陰虛。宜補中益氣。身涼脈細。倦怠懶言。食不知味者。脾弱也。醒脾助胃。風寒襲於瘡口。皮白綻而不收斂者。外照而內溫補。潰後面黃肌瘦。膿水清稀。瘡色淡白者。當香燥助脾。脈大無力。細瀆微沈。自汗身涼者。氣血俱虛。峻補之。出血或膿多。五心煩熱。躁甚不眠者。亡陽也。急補之。瘡口已合。經犯房勞。或值急暴。復崩潰者。仍助氣血。

潰瘍主治方第十九

十全大補湯

十全大補參耆芍  
歸朮茯苓甘草炙

肉桂川芎熟地黃  
棗薑加之號全方

治潰瘍發熱。或惡寒。或作痛。或膿多。或清。或自汗盜汗。及徧身流注。癰癤。便毒。諸瘡。久不作膿。或膿成不潰。潰而不斂。若氣血不足之人。結腫未成。膿者。宜加陳皮。香附。半夏。連翹。服之。自消。

人參

黃耆

白芍

肉桂

川芎

熟地

當歸

白朮

茯苓

各一錢

甘草

炙五

分

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎入分。食前服。

徐曰。此方必毒火盡除而後可全用。

八珍湯

八珍湯擅理陰陽參苓白朮兼甘草

芎芍當歸熟地黃何愁虛弱不康強

治潰瘍諸症。調和榮衛。順理陰陽。滋養氣血。進飲食。和表裏。退虛熱。為氣血俱虛之大藥。

川芎

白芍

當歸

熟地

人參

白朮

茯苓

各一錢

甘草

炙五分

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

補中益氣湯

補中益氣用陳皮甘草柴胡薑棗引

當歸升麻參朮耆元虛不足得和宜

治瘡瘍元氣不足。四肢倦怠。口乾發熱。飲食無味。或

飲食失節。或勞倦身熱。脈洪大而無力。或頭痛而惡

寒或聲高而喘身熱而煩

黃耆

一錢五分

甘草

炙

人參

當歸

白朮

各一

錢

升麻

柴胡

陳皮

各三分

水二茶鍾薑三片棗二枚煎一鍾空心熱服

徐曰此治陽陷之方然升柴亦當酌用

楣案補中益氣湯並無麥冬五味二品而此書刻

本或有或無當是後人所加徐於前卷屢言此二

品不可用而此但言升柴當酌用是徐本亦無此

一二品故刪去

人參養榮湯

人參養榮參朮歸  
甘草地黃併五味

陳皮白芍桂心者  
茯苓遠志棗薑宜

治潰瘍發熱惡寒。或四肢倦怠。肌肉消瘦。面色萎黃。吸吸短氣。飲食無味。不能收斂。或氣血原不足。不能收斂。若大瘡愈後多服之。不變他症。

白芍

一錢五分

人參

陳皮

黃耆

桂心

當歸

白朮

甘草

各一錢

熟地黃

五味子

茯苓

各八分

遠志

五分

薑三片。棗二枚。水二茶鍾煎八分。食遠服。

徐曰。此方陰陽兩虛而不收口者最宜。

人參黃耆湯

人參黃耆湯更奇  
黃耆歸身五味子

麥冬二朮草陳皮  
升麻神麴棗薑隨

治潰瘍虛熱不睡少食或穢氣所觸作痛者

黃耆

人參

白朮

麥冬

歸身

蒼朮

甘草

陳皮

升麻

神麴

各五

分

黃蘗

酒拌炒  
三分

五味子

炒五  
分

水二茶鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

徐曰藥味亦雜

內補黃耆湯

內補黃耆湯桂芍  
川芎遠志人參等

歸苓熟地草門冬  
棗薑加上有奇功

治癰疽發背諸瘡已破後虛弱無力體倦懶言精神

短少飲食無味。自汗口乾。脈濇不睡。

黃耆

人參

茯苓

川芎

歸身

白芍

熟地

肉桂

麥冬

遠志

各一

錢

甘草

五分

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎一鍾。食遠服。

徐曰。此等方與十全大補等方大同小異。不必復

記。

托裏清中湯

托裏清中湯。茯苓。棗。薑。半夏。陳皮。草。

尤冬。五味。梗。人參。專治瘡瘍咳嗽清。

治癰疽脾胃虛弱咳嗽痰氣不清飲食少思者。



人參

白朮

桔梗

陳皮

半夏

茯苓

各一錢

麥冬

五味子

甘草

各五分

水二茶鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

徐曰不必存

托裏和中湯

托裏和中湯半夏陳皮甘草木香宜

白朮參苓功不亞煨薑效值千金價

治癰疽中氣虛弱飲食少思腫不消潰不斂者

半夏

白朮

人參

茯苓

陳皮

煨薑

各一錢

木香

甘草

各五分

水二茶鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

徐曰。此暖胃之方。可治痢瀉。

托裏建中湯

托裏建中附子強  
還兼半夏同甘草

參苓白朮與炮薑  
補氣回陽此最良

治癰疽元氣素虛。或因寒涼傷脾損胃。飲食少思。凡  
滄無味。或作嘔泄瀉等症。急服以建中氣。

人參

白朮

茯苓

各二錢

半夏

炮薑

各一錢

錢

甘草

五分

熟附子

八分

水二茶鍾。煨薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

徐曰。亦重前。

托裏溫中湯

托裏溫中益智良  
參苓陳朮羌附夏

木香白朮與乾薑  
甘草丁香功倍強

治癰疽陽弱陰寒。脈虛身冷。或瘡為寒變。反致不疼。或膿水清稀。心下痞滿。腸鳴腹痛。大便微溏。食則氣短。嘔逆不得安卧。時發昏憤者。

白朮

茯苓

木香

丁香

各五分

半夏

陳皮

羌活

益智仁

乾薑

炮

人參

白朮仁

甘草

各錢

附子

二錢

水二茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。不拘時服。方與舊不同。予製此嘗治癰疽陰症。及雜症陽氣脫陷。與寒氣逼陽於外。發熱煩躁。口乾作渴。投之津液頓生。煩

熱頓退。其應如響。

徐曰亦前方義。而藥加重。

聖愈湯

聖愈湯憑熟地者  
人參一品同煎服

川芎生地與當歸  
膿甚心煩此可醫

治潰瘍膿水出多。氣血虛極。脈細空而無力。以致心煩不安。眠睡不甯。或五心煩躁等症。

熟地

生地

川芎

人參

各五錢

歸身

黃耆

鹽水炒  
各一錢

作一劑。水二茶鍾。煎八分。食遠服。

徐曰。此方無意義。

楣案古方聖愈湯卽四物加參者。此去白芍而兼用生熟地。宜徐氏以爲無意義。

保元大成湯

保元大成廣木香者陳附草砂仁芍

參苓歸朮最爲良五味山萸同棗薑

治潰瘍元氣素虛精神怯弱或膿水出多神無所主以致睡卧皆倦六脈虛細足冷身涼便澹或秘胸膈或寬或不寬舌雖潤而少津口雖食而無味瘡弦不緊肉色微紅總由不足大補堪施。

人參

白朮

黃耆

蜜水拌炒各二錢

茯苓

白芍

陳皮

歸身

甘草

炙

附子

山萸肉

五味子

各一錢

木香

砂仁

各五分

水二茶鍾。煨薑三片去皮。大棗三枚煎入分。食遠服。服至精神回。手足煖。脾胃醒。肉色紅為度。以上數症。乃元氣虛脫已欲變壞之病。非此不回也。

徐曰亦重前。

獨參湯

人參一味獨稱強氣血兩亡併自汗

濟困扶危立大綱脈虛寒熱用皆良

治潰瘍膿水出多。氣血虛極。或惡寒。或發熱。或自汗。冷汗。或手足指甲青冷。或身涼脈細。

人參

二兩切片

作一劑水二碗棗十枚煎一碗徐徐服之若煎至稠厚卽爲膏矣作三次用好溫酒化服亦可

徐曰此暫用急救之方干不得一者

香砂六君子湯

古有香砂六君湯砂仁半夏陳皮等

參苓白朮與藿香甘草同煎加棗薑

治潰瘍脾胃虛弱惡心嘔吐或飲食不思等症

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏

各一

錢

甘草

藿香

砂仁

各五分

薑三片棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服

徐曰此方穩切凡脾胃之方皆本此此乃祖方也

清震湯

清震湯中益智仁棗薑附子同香附

參苓柿蒂澤甘陳半夏加增效似神

治潰瘍脾胃虛弱或悞傷生冷或氣惱勞役或入房夢遺致火邪乘入中脘乃生呃逆。

益智仁 陳皮

半夏

茯苓

人參

甘草

香附

各一錢

柿蒂

二十箇

澤瀉

三分

熟附子

手足冷者用一錢

薑三片棗二枚。燈心二十根水二茶鍾煎八分不拘時服如身熱口乾便燥火呃者加黃連五分。

徐曰亦重前



醒脾益胃湯

醒脾湯用朴山查  
澤瀉陳皮山藥夏

二朮二苓參麥芽  
木香蘇子並堪加

治潰瘍脾胃虛弱過傷飲食生冷以致胸膈不寬四肢面目浮腫及小水不利等症

人參

陳皮

茯苓

半夏

山藥

白朮

各二錢

蒼朮

厚朴

澤瀉

麥芽

木香

山查

蘇子

豬苓

各五分

老黃米

炒黃  
一錢

水二茶鍾薑三片燈心二十根煎八分食前服

徐曰此燥脾而兼利水之方

托裏定痛散

托裏定痛散當歸  
粟殼桂皮併熟地

乳沒川芎白芍隨  
瘡瘍疼痛此堪醫

治癰疽潰後血虛疼痛不可忍者服之甚效

歸身

熟地黄

乳香

沒藥

川芎

白芍

肉桂

各一錢

粟殼

泡去筋膜  
蜜炒二錢

水二茶鍾煎八分。隨病上下食前後服之。

徐曰。此方能止痛。

楣案熟地黄徐改生地黃。

歸脾湯

歸脾湯用朮參耆  
酸棗木香龍眼肉

歸草茯苓遠志隨  
煎加薑棗益心脾

白朮

茯神

黃耆

棗仁

龍眼肉

各一錢

木香

人參

甘草

各五分

當歸

一錢

遠志

五分

薑一片。棗二枚。水煎食遠服。

榻案此方失載。治何症。讀內科書自知。

神應異功散

異功散中丁木香陳皮半夏當歸朴

參苓桂附可回陽肉蔻還加朮棗薑

治潰瘍陰盛陽虛發熱作渴手足並冷脈虛無力大便自利至飲沸湯而不知其熱者。

木香

官桂

當歸

人參

茯苓

陳皮

白朮

各一錢

半夏

丁香

肉豆蔻

潰瘍

七

附子

厚朴 各五分

水二茶鍾。薑五片。棗三枚。煎八分。不拘時服。此方癰疽陰症及雜症。陽氣脫陷。與寒氣逼陽於外。發熱煩躁。口乾作渴。投以薑桂附子之類。津液頓生。煩熱頓退。其應如響。

徐曰。此亦溫脾之藥。亦重出。

參朮膏

參朮膏中參朮地補脾補氣兼補血

分煎合用酌其中急症虛危可漸充

治癰疽發背等症。大膿後氣血大虛。急宜用此。

上好人參半斤

切片用水五大碗。砂鍋內慢火熬。至三碗。將渣再煎。汁一碗。共用密。

平常無病久病。但脾虛食少嘔泄者。並妙。

人參

山藥

茯苓

芡實

蓮肉

各六

兩

糯米

三升

粳米

七升

白糖霜

二斤半

白蜜

一斤

右將人參等五味各為細末。又將糯粳米亦為粉。與

上藥末和勻。將白糖和蜜湯中頓化。隨將粉藥乘熱

和勻。攤鋪籠內。切成條糕蒸熟。火上烘乾。瓷器密貯。

每日清早。用白湯泡用數條。或乾用亦可。但覺飢時。

隨用數條甚便。服至百日。輕身耐老壯。助元陽培養

脾胃妙難盡述。

膏各二匙化服。如氣血脾胃相等無偏勝者。三膏每  
各二匙。熱酒化服。此膏用於清晨併臨睡時。各進一  
次。自然精神強健。氣血頓生。新肉易生。瘡口易合。任  
瘡危險。勢大膿多。可保終無變症。夏天炎熱。恐膏易  
變。分作二次熬用亦好。愈後能服。鬚髮變黑。返老還  
童。以上諸方。功難及此。

徐曰。此方純用蠻補氣血。毫無意義。

八仙糕

八仙糕設卻爲何  
山藥參苓蓮芡實

養胃健脾止瀉多  
白糖米粉蜜調和

治癰疽脾胃虛弱精神短少飲食無味食不作飢及

平常無病久病。但脾虛食少嘔泄者。並妙。

人參

山藥

茯苓

芡實

蓮肉各六

兩

糯米

三升

粳米

七升

白糖霜

二斤半

白蜜

一斤

右將人參等五味。各為細末。又將糯粳米亦為粉。與上藥末和勻。將白糖和蜜湯中頓化。隨將粉藥乘熱和勻。攤鋪籠內。切成條糕。蒸熟。火上烘乾。瓷器密貯。每日清早。用白湯泡用數條。或乾用亦可。但覺飢時。隨用數條甚便。服至百日。輕身耐老。壯助元陽。培養脾胃。妙難盡述。

徐曰。此服食之方。不足治病。

胃愛丸

胃愛丸中參朮苓建蓮甘草蜜丸就

紫蘇山藥豆蔻陳胃弱脾虛效似神

治潰瘍脾胃虛弱飲食諸味不喜用過開胃進食之

藥不效者。此脾崩之象。宜服之。食進為吉。

雲片白朮一兩

鮮白者米泔浸去澀水切片曬乾同麥芽拌炒

懷慶山藥一兩

肥大上白者切片用男乳拌溼候潤透曬微焙

上白茯苓一兩

切一分厚用砂仁二錢共茯苓合碗內飯上蒸熟只用茯苓

清河人參一兩

製畢曬乾共為細末

陳皮

用陳老米先炒黃色方入同炒微燥勿焦六錢



小紫蘇

蜜拌透晒乾微蒸片時連梗葉切片五錢

白豆蔻

三錢

蓮肉

去皮心敲碎五錢

甘草

炙三錢

右共為細末用老米二合微焙碾粉泡荷葉湯打糊。

丸梧子大每服八十九清米湯不拘時服。

徐曰此和平養胃之方。

二神丸

二神丸用破故紙薑棗煎水候水乾

肉果去油兩相使棗丸吞服寒瀉止

治癰疽脾胃虛弱飲食不消大便溏泄。

破故紙

四兩微炒香

肉果

肥大者二兩麩裹煨切片盪去油

用大棗四十九枚老生薑四兩切片水浸棗薑煮至

水乾爲度。取棗肉同二藥淨末爲丸。如梧子大。每服七十九。清米湯空心送下。並治尋常腎虛脾泄俱效。

徐曰。此治寒滑瀉痢之症。

加減八味丸

八味丸中五味宜茯苓澤瀉山萸肉

地黃山藥桂丹皮止渴生津兼治脾

治癰疽已發未發。口乾作渴。舌乾黃硬者。

茯苓

山藥

丹皮

各四兩

澤瀉

蒸三兩

山萸肉

五兩

熟地黃

搗膏酒煮八兩

肉桂

六錢

五味子

炒三兩

右共爲末。煉蜜丸。如梧子大。每服二錢。空心服。鹽湯

送下尋常酒服亦可。此又滲溼潤燥藥也。

以上二十五方治癰疽已潰。至於收斂正病雜病變症壞症。俱在其中選用。毋得錯亂。大抵潰後氣血根本無有不虧傷者。補怯扶羸。理勞續損。皆不出於前方。此外無法也。

相案未有紅鉛造化丹。徐批不入藥。用筆勾去。余故不錄。爲著書者消一罪孽。實存二十四方。

徐曰。以上所錄潰瘍諸方。皆內科溫補之法。乃大症潰後。精血大虧。自宜溫補。但瘡口未全愈。必有

兼外科之症。或膿清不厚。或寒熱未止。或火毒未清。或胃口未和。或新肉未生。或毒痰內積。種種兼症。若一味峻補。與外科不相照顧。則餘毒未清。反能增病。必須審度其虛。是病氣未除。抑全屬虛寒。然後擇取對症之藥。幾味成方。如不問外症之有無。而一概以全方治。則其中必有不對症之藥。反能有害。是不但不知內科。并外科之理亦不知也。

薛立齋之用內科方。盡如此不值一笑也。

梔案腫瘍方中。如意金黃散。尋常用一次。不過數

分而原書所開各藥至四十斤之多。卽其門如市之瘍醫亦須一二年方能用完。不知末藥最怕泄氣。卽資罐密藏。閣久香氣必大減。用便不靈。醫者當以應付之繁簡爲合藥之多少。甯少無多。勿使閣久而成朽藥。余將此方分兩減至一斤。恐人疑其與原書不符。故附記卷末。至真君妙貼散二十斤亦嫌其多。今亦酌減。

又案凡合丸散。須各藥各研。稱準淨末。合和再研。最爲要著。緣末藥總須賸渣。藥有粗細。卽渣有多

外科正宗卷二  
少有一兩僅得淨末四五錢者。亦有得七八錢至  
九錢外者。共研去渣。則與原方銖兩配合不符。倘  
內有要藥。去渣一半。誤事多矣。