

對症方選

三篇



持57

806

共四本

大阪府病院長
從六位高橋正純著

對症方選

明治九年
十月刻成


日新亭藏

三三三

欠

MISSING

明倫彙編 家範典 卷一百一十五



下血

六十二丁

腹痛

六十三丁

白痢

六十六丁

紅痢

六十七丁

腹痛

六十八丁

便秘

七十丁

腸管壅塞

七十五丁

及吐糞病

七十八丁

腸蟲

七十八丁

蛔蟲

八十丁

條蟲

八十二丁

蛻蟲

八十三丁

直腸症

八十三丁

痔疾

八十六丁

直腸潰瘍

八十六丁

脫肛

八十七丁

直腸瘰癧

八十八丁

直腸癌腫

八十九丁

肛門症

九十丁

肛門搔癢

九十丁

肛門破裂

九十丁

腹膜焮衝

九十一丁

結核性腹膜焮衝 疝癆

九十三丁

腹水腫 即脹滿

九十四丁

肝臟充血

九十九丁

肝臟焮衝

百丁

脂肪肝

百二丁

肝臟胞蟲

百三丁

急性肝萎縮 又發黃熱

百三丁

慢性肝臟萎縮

百四丁

膽石

百五丁

黃疽

百六丁

脾病

百八丁

脾焮衝

百九丁

泌尿器病

腎焮衝

百十丁

急性貌麗篤病

百十一丁

慢性貌麗篤病

百十二丁

小兒貌麗篤病

百十四丁

溺崩

百十五丁

溺血

百十六丁

溺石

百十七丁

膀胱焮衝 加答流

百十八丁

膀胱瘰癧

百二十二丁

膀胱麻痺	百二十三丁
溺閉	百二十三丁
遺溺及淋瀝	百二十四丁
小兒尿淋	百二十六丁
尿道狹窄	百二十七丁
遺精及陰痿	百二十八丁
陰囊水腫	百三十丁

對症方選卷之三目錄

對症方選卷之三

從六位 高橋正純 著

消化器病

舌病

○方_選 舌燉衝

答麻林度 滿那_{各半} 芒硝_一

右以水十二分煮濾過取液八分加覆盆子

舍利別一分每二時服二食匕

○格羅兒加里_飲 主治舌癆及扁桃腺炎

格羅兒加里_{九十} 忽弗滿鉢痛液_三

竜胆浸_四

右調勻取一食匕冷水一酒盞和服日三次

○沃度鐵合劑_每 主治舌披裂_{方出慢}

○昇秉飲_每 主治同前_{方出于} 標毒

○ 硼砂含劑 丹 主治舌披裂、舌下潰瘍

硼砂 六十八至
百二十氏 甘油 一
接骨木花水 或玫瑰水
八等

右調勻外用

○ 方 舌硬結

鹽酸金 四氏 玫瑰軟膏 一

右調和塗擦

○ 方 痛性舌潰瘍

阿芙蓉丁幾 一 蜂蜜 二

右調和塗擦于患部

○ 方 主治舌癌

昇承 六 老利兒水 一
野菊花越幾

金盞花越幾 各一 阿芙蓉丁幾 一

右調勻以毛筆貼于患部

口內潰瘍

○ 格羅兒加里飲 丹 主治口內潰瘍 方出于
敗血病

○ 刺答尼合劑 丹 主治頰內黏膜弛緩、懸壅脹

大齶肉弛鬆等 方出于
敗血病

○ 方 主治口內加答流

硝酸銀 二氏五氏 蒸餾水 一

右溶和以毛筆塗布于口內

○ 含電阿芙蓉液 丹 口內潰瘍

右以毛筆貼患部

○ 方 口內及咽內潰瘍及板狀滲出物

阿芙蓉越幾 半至 阿芙蓉丁幾 二至
一 四

蒸餾水 一

右調勻為含嗽劑

○ 方 主治口內及咽喉黏膜炎及潰瘍

鹽酸 二錢 桑椹舍利別 二錢

右調勻、以毛筆貼于患部

○方 主 治 流 涎、口 內 及 咽 喉 潰 瘍

格羅倪酸加里 一錢至水十二錢

右為含嗽劑

○收 瀼 洗 劑 主 治 口 內 癰 腫

枸橼酸 百二十錢 水 八錢

右調勻、為含嗽劑

○方 主 治 口 內 及 咽 頭 加 答 流

昇汞 一錢至二錢 蒸餾水 一錢

右溶和為含嗽劑

○方 主 治 口 唇 內 皮 癢

硫酸 洎夫藍末 各適宜

右為泥貼于患部

○方 主 治 同 前

咯 啞 酸 曹 達 液 六 錢 水 八 錢

右調勻、為含嗽劑

○明 礬 水 主 治 口 內 及 咽 內 加 答 流

明礬 半錢 水 半廿或一廿

右溶和含嗽、一日二次

○枯 礬 會 劑 主 治 口 咽 潰 瘡

枯礬 八十八 沒藥丁幾 一錢 水 八錢

右調勻、為含嗽劑

○又 方 主 治 聲 啞、咽 痛 等、兼 懸 壅 弛 縱 者

枯礬 六十八 胡椒丁幾 三錢

桑椹舍利別 一錢 玫瑰水 八錢

右調勻、為含嗽劑

口內壞疽及水瘡

○方 壞疽性驚口瘡

幾那越幾 半 護謨末 一 菩提樹花水 三

甘海塩精 半 橙皮舍利別 半

右調勻、每二時、服二食匕

○方 主治同前

鹽酸加里 八 蒸餾水 三 單舍利別 半

右調勻、每服一匕、日三次

○方 主治同前

幾那越幾 三 蓬砂 半 沙列布根煎 三

右調勻、每一時、服一二茶匕

○方 口內壞疽

格羅兒加里 半 幾那越幾 一

蒸餾水 五 橙皮舍利別 一

右調勻、每一時、服一匕

○方 主治水瘡

鹽酸加里 十 白糖 一

右為散、製劑六個、每四時、服一劑

○方 主治同前

幾那越幾 二 桂皮水 一

橙皮舍利別 一

右調勻、每二時、服一茶匕、或一琶布匕

○方 主治同前

硫酸規尼 二 白糖 八

右為散、製劑八個、每二時、服一劑

○方 壞疽性驚口瘡

皓礬 半 玫瑰水 三 桑椹舍利別 一

右調勻、以毛筆、貼于患部

○方 主治水瘡

鹽酸 十滴 玫瑰蜜 半

右調勻、以毛筆、貼之

○方選 主治同前

醋酸 一錢半 玫瑰蜜 一錢

右調勻以毛筆貼于患部

○方燈 主治壞疽性齶口瘡

稀硫酸 三十滴至四十滴 桑椹舍利別 一錢

右調勻以毛筆貼患部

○方燈 主治同前

明礬 一錢至一錢半 玫瑰水 一錢至二錢

右調勻以毛筆貼患部

○方燈 主治同前

硝酸銀 一刃 蒸餾水 半錢

右溶和貯黑色硝子鏤貼患部

○硝酸汞液 半錢 主治水瘡

右以毛筆貼患部日二次

○鹽酸加爾基 一錢 主治同前

右燒灼後撒布患部

○方選 主治同前

鹽酸加爾基 十六八錢 護謨漿 一錢

橙皮舍利別 或桑椹舍利別 半錢

右調勻以毛筆或蘸撒於貼于患部

○方燈

鹽酸曹達 一刃至一錢 大麥煎 三錢 蜂蜜 一錢

右調勻振盪為含嗽劑

○方選 主治水瘡

格羅兒曹達 半錢 蒸餾水 三錢

阿仙藥丁幾 沒藥丁幾 各二錢

右調勻以毛筆貼于口內

○方選 主治同前

硫酸銅 一錢 常水 二錢 幾那皮末 二錢

右調和貼潰瘍全面日二次至三次

○方 〔種〕 主治惡臭甚者

結列阿曹篤 一匁 芳香煎汁 一匕

右調勻為蒸湯劑

○方 〔無〕 主治壞疽性口內炎

格羅兒亞鉛 十八 水 八匁

右調勻為含嗽劑

汞毒流涎

○方 〔珍〕

沃度加里 一匙 水 四匁 橙皮舍利別 半

右調勻每日服三四匕

○方 〔珍〕

沃度加里 一匙 甘草末 甘草膏 各適宜

右為六十九丸衣桂末每服五丸一日二三次

○方 〔歷〕 〔天〕

格羅兒加里 二匙 護謨殼 六匙

右調勻每服一卵匕一日盡之或每服一匙

布匕日三次

○方 〔獨〕

鹽酸加里 一匙至 蒸餾水 四匁或 六匁

蜀葵舍利別 或單舍利別 或 桂舍利別 一匁

右調勻每二時服一茶匕

○方 〔獨〕 主治汞毒口內炎

鹽酸加里 二匁 沃度加里 二匙 水 六匁

右調勻每一時服一茶匕

○方 〔獨〕

硫酸加里 一匙 竜胆越幾 三匙

右二氏為一丸衣石松末每三時服二丸

○方 〔獨〕

磷酸 或硝酸 二匙 沙列布煎 或泉水 六了

覆盆子舍利別 一了

右調勻每二時服一食匕

○方 實 汞毒流涎及汞毒顛震

阿芙蓉 二了 三了 至六了 白糖 一匙

右為散分六服每日三服至四服

○方 空 主治汞毒惡液質

龍腦 六了 硫黃 各半匙

右為散分六包每二時服一包

○冷肉汁 空 主治汞毒流涎 方出千 尙儻病

○方 主治汞毒流涎 桑椹舍利別 二

醋酸 半了 桂皮水 四了

右調勻為口中藥

○方 可 主治同前 玫瑰蜜 一了

稀鹽酸 或稀硫酸 半 匙至一匙

撒爾非浸 或泉水 四了

右調勻為含嗽劑

○方 實 主治口內惡臭甚者

格羅兒加里 二 匙至 八 了 蜀葵根煎 八 了 玫瑰蜜 一

右調勻為含嗽劑

○方 實 主治同前

格羅兒加里 一 匙至 十二 了 泉水

桑椹舍利別 半 了

右調勻為含嗽劑

○方 主治汞毒流涎

次亞鹽酸石灰 半 了 泉水 二了

銳烈燒酒 二 了 蕃薇油 四滴

右調勻取一茶匕和水一盞為含嗽劑

○方 實 主治同前

石炭酸 或結列阿曹篤 一 了 水 十六了

右調勻為含嗽劑

○方 越 主治同前

明礬 或皓礬一錢 水 十六分

右溶和為含嗽劑

○方 天 主治同前

檫皮 六錢以泉水十八分 明礬 半錢

銳烈燒酒 一分半

右調勻為含嗽劑

○方 燈

單寧酸 半錢至一錢 蒸餾水 一升

右調勻每四分時或每半時含嗽

○方 歷 主治口內粘膜腫脹者

阿芙蓉丁幾 一錢至半錢 泉水 一升

右調勻每一時嗽口內及咽喉

○方 歷 主治同前

甘油 半分 單寧 半錢 泉水 一升

右調勻為含嗽劑

○方 歷 主治流涎尤甚者

沃實丁幾 一錢 泉水 十升

桂皮水 一分半 桂皮舍利別 半升

右調勻為含嗽劑

○方 汞毒流涎兼潰瘍者

蓬砂 一錢 沒藥丁幾

玫瑰蜜 各二錢 亞刺比亞漿 一升

右調勻以毛筆貼于患部

○方 窩 主治同前

硝酸 一分 玫瑰蜜 桑堪舍利別 各半升

右調勻為揀劑以毛筆貼之

○方 主治同前

硝酸銀 一分半 蒸餾水 一升

右溶和點潰瘍

○方 主治同前

鈴糖 五人至十人

覆盆子舍利別 一弓

右調勻以毛筆貼之

○方 主治同前

硫酸銅 三人

蒸餾水 一弓

沒藥丁幾 一弓

玫瑰蜜 三弓

右調勻以毛筆貼之

○方 主治口內汞毒潰瘍

龍腦 一弓

甘扁桃油 一弓

右調勻以毛筆貼之

○方 列 主治齒齦弛縱及汞毒流涎

刺答尼越幾 半弓

玫瑰水 一弓半

阿芙蓉丁幾 十滴至十五滴

右調勻以撒筆貼于齒齦

○方 水銀擦法問發口內汞毒症者

沒食子丁幾 半弓

舍電阿芙蓉液 二弓

右調勻塗于齒齦

○方 主治同前

呀囉呀 一弓

亞刺比亞漿 一弓

右調勻塗擦齒齦

齒齦症

○方 主治齒齦炎

蜀葵根 一弓 水煎取液十二弓

蜀葵舍利別 或醋發 二弓

右調勻微溫含嗽

○方 主治同前

接骨木花

蜀葵根 各三

甘草 二弓

右水煎取液十二弓為含嗽劑

○方 主治同前

亞麻仁末 大麥粉 各三錢

○方 右加常水適量煮為芻布

○方 主治同前

接骨木花 錦葵葉 白罌粟殼 各一握

右以乳汁煮為溫芻布

○方 主治同前

鷄子黃 一個 阿列機油 二錢 冰糖 一錢

右調勻塗布片貼于齒齦

○方 主治咽喉炎、齒齦出血、流涎

鈇糖 十八 水 十六 舍利別 或護謨漿 或醋 各一錢

右調勻為含嗽劑

○方 主治敗血性齒齦症

撒爾非 一錢 浸出液 六錢 明礬 半錢 至一錢

山薺菜精 一錢 玫瑰蜜 半錢 至一錢

右調勻為含嗽劑

○方 主治敗血性齒齦出血

山薺菜精 一錢 沒藥丁幾 二錢

阿仙藥丁幾 刺答尼丁幾 各一錢

右調勻塗擦于齒齦

○方 主治齒齦軟腫

刺答尼越幾 半錢 沒藥丁幾

山薺菜精 玫瑰蜜 各半錢

右調勻

○方 主治齒齦出血

刺答尼丁幾 一錢 至二錢 水 十二錢

右調勻為含嗽劑

○方 主治齒齦炎

鹽酸加爾基 一錢 泉水 一升

忽氏鎮痛液 二十滴

右調勻、微温含嗽

○方 主治齒齦潰瘍

鹽酸加爾基 十五分至 亞刺比亞漿 一司

橙皮舍利別 半司

右調勻振盪、以毛筆貼之

○方 主治齒齦弛縱

拔爾撒守露 阿仙藥丁幾 各一司

沒藥丁幾 二司 山萸菜精 一司

右調勻、用法同前

○方 主治惡性齒齦炎

撒爾非浸了 十二 稀硫酸 二 玫瑰蜜 一

右調勻、為含嗽劑

○方 齒齦腫脹、兼出血者

鹽酸 一司 玫瑰蜜 二司

右調勻、以毛筆貼于齒齦

○方 主治同前

硝酸 三十 玫瑰蜜 半司 大麥煎 六司

右調勻、為含嗽劑

○方 主治齒齦弛緩、及潰瘍

明礬末 二司 木炭末 三司 醋蜜 六司

右揀和、以手指塗布于齦肉

齒痛

○石炭酸 主治齦齒痛

右取一二滴、蘸綿絮、挿齒窩

○方 主治齒痛

阿芙蓉 荳蔻越幾 菲阿斯越幾 各十

丁香油 五滴 別爾篤刺根 適宜

右一丸為一丸、取一丸挿于齦齒

○方 主治同前

非阿斯越幾 阿芙蓉 各六分

右為六丸或十二丸 每夜取一丸 置痛處

○方 主治同前

白蠟 二分 甘扁挑油 一分 阿芙蓉末 六分

右調勻 取小豆大 為球 插于齧齒

○方 主治齧齒疼痛

結列阿曹篤 燒酒 各半匙

右調勻 蘸綿絮 插于齧齒

○方 主治同前

結列阿曹篤 二分 蒸餅心 適量

右研和 一分量 為一丸 內齧齒

○方 主治齧齒疼痛

結列阿曹篤 四分 阿芙蓉 二分

甘草膏 五分 或亞刺比亞末

右為十丸 取一丸 插于齧齒

○方 主治齧齒痛

丁香油 一分 阿芙蓉丁幾 越的兒 各半匙

右調勻 取一二滴 蘸綿絮 插齒孔

○方 主治同前

龍腦 一分 銳烈燒酒 二匙

舍電阿芙蓉液 半匙 丁香油 一分

右調勻 取二三滴 蘸綿絮 內于齒窩

○獨敵刺涅兒氏齒痛液

加耶普的油 或薄荷 舍電阿芙蓉液

忽弗滿鎮痛液 各一分

右調勻 蘸綿絮 內于齒窩 兼塗擦于患側之頰

○方 主治齧齒痛

醋酸越的兒 舍電阿芙蓉液

沒藥丁幾 各半匙 薄荷油 三滴

右調勻、蘸綿絮、內于齦齒

○方 主治齦齒

阿仙藥 血竭 沒藥 各二十四分

葭苈越幾 阿芙蓉 各十五分

右調勻、一丸為一丸、取一丸內于齦窩

○方 主治齦痛

阿芙蓉 龍腦 各一分

丁香油 胡椒丁幾 各二滴

右為四丸、取一丸置齒上

○方 主治倭麻質性齦痛

芫菁丁幾 別兒篤刺謨根丁幾

龍腦丁幾 各一分

右調勻、塗擦于頰、及齦齦

○方 主治倭麻質性、及神經性齦痛

哥羅尼爾丁幾 二身取昆蟲六、十個、投燒酒一斗、浸漬八日、取液

右塗擦于齦齦

○方 主治齦痛、因于齦齦者

鹽酸 半匙 蒸餾水 一斗

右蘸綿絮、內于齦窩

○方 主治齦齦

明礬 一匙 甘硝石精 半斗

右調勻、蘸綿絮、內于齦窩

○方 主治同前

硝酸銀 一分 蒸餾水 一匙

右溶和、蘸綿絮、內于齦窩

○方 主治齦齦痛

乳香 半斗 血竭 二匙 銳烈燒酒 一斗

右溶和、充填于齦窩

○方 主治同前

白蠟 一斗 乳香末 一匙 銳烈燒酒 適宜

右煉和為硬膏之稠填塞齒窩

○達兒攝篤氏鑲屬和劑

蒼鉛 一錢 鉛 五錢 錫 三錢

右熔和為球填塞齒窩

○方 主治齩齒及口氣惡臭

鹽酸加爾基 五錢至二十錢 螞蛄石 半錢

丁香油 二滴

右研和為磨齒散

鴛口瘡

○方 鑑

蓬砂 一匙至二匙

胡蘿蔔舍利別 一錢

右調勻以毛筆貼患部

○方 鑑

蓬砂 一錢 玫瑰蜜 半 含電阿芙蓉液 六滴

右調勻貼患部

○蓬砂合劑 主治鴛口瘡及咽瘍 方出于敗血病

○又方 主治鴛口瘡

蓬砂 百二十丸 甘油 一錢

右調勻以毛筆塗于口內

○方 鑑 主治同前

蓬砂 一錢 紫革舍利別 或醋蜜或覆盆子舍利別 一錢

右調勻以毛筆塗布于口內

○方 鑑

石炭水 一錢 亞刺比亞漿 一匙

右調勻為塗藥

○方 鑑

硝酸銀 二錢四錢至八錢 或皓礬十錢 蒸餾水 一錢

右溶和貯黑色蠟貼患部

○亞硫酸曹達含劑 治 主治鴛口瘡

亞硫酸曹達 六十分 蒸餾水 一分

右調勻以毛筆塗于口咽粘膜日數次

○方 越 主治小兒鴛口瘡

稀塩酸 一分至二分 蜂蜜 一分

右攪和以毛筆塗布口中

○方 主治鴛口瘡青腿牙疳流涎

刺答尼越幾 一分 撒爾非水 四分

桑椹舍利別 一分

右調勻為含嗽劑

唾腺焮衝 可參考瘡性焮衝條

○方 罌

蠟軟膏 半分 阿片越幾 半分

右揀和取豌豆大塗擦于患部

○方 罌

沃度加里 半分 水銀軟膏 半分

右揀和攤軟布貼于腫脹部

○方 罌

結列阿曹篤 一分 家猪脂 六分

右為軟膏塗擦于患部

○訶屈列兒氏安沒尼琴布

蒸餅心 五分 亞麻仁末 一分 碯砂 一分

右注沸湯適宜為琴布

○方 罌 經久硬固而難消散者

赤沃頰 一分至一分 單軟膏 半分

右調和塗擦于患部

扁桃腺炎

○方 治扁桃腺炎

吐根 一匙 浸出液 一匙 蜀葵根 舍利別 半匙

右調勻 每十分服一匙 布上 至得吐

○方 治同前 或實弗的里

鹽酸加里 半匙 一匙 至二匙 亞刺比亞漿 一匙

蒸餾水 六分

右調勻 每服一食匕 日三次 至六次

○鹽酸加里飲 治扁桃腺炎 舌炎

哈喇酸剥答斯 九分 十分 越的兒精 三匙

龍胆浸 四分

右調勻 取一食匕 水一盞和服 日三次

○方 治扁桃腺炎 兼粘液湧出者

炭酸加里 半匙 泉水 八分 卑舍利別 一匙

右調勻 為飲劑 每一時服一食匕

○方 治侵蝕性咽喉

幾那皮 四分 水煎 取液 四分 收斂越的兒 半匙

右調勻 每二時服一食匕

○幾那安沒尼劑 浸潤性丹毒狀炎 方出于 癰疽

○規尼合劑 患者虛衰者 方出于 紫斑病

○鹽酸會嗽劑 扁桃腺炎 及咽喉瘡

稀鹽酸 三匙 蜂蜜 一匙 玫瑰浸 八分

右調勻 為會嗽劑

○阿片莨菪會劑 急性扁桃腺炎

阿芙蓉丁幾 二分 莨菪丁幾 三分 龍腦水 八分

右調勻 會嗽 日數次

○方 治扁桃腺炎

莨菪越幾 或阿片越幾 四分 一至一分 水 一分

右調勻 用器械 吸引其蒸氣

○方 主治同前

野菊花油 一升
含電阿芙蓉液 一升

右調勻塗擦于頸部

○方律拔

硝酸銀晶 一升
蒸餾水 半升或一升

右溶和以毛筆塗擦于患部

○方密

錦葵葉 三升
撒爾非葉 一升

右為浸劑含嗽

○方窩

主治慢性扁桃腺炎

撒爾非半升浸出液一升 硝砂半 玫瑰蜜 一

右調勻為含嗽劑

咽喉衝

○方雙

硝石 半升 醋蜜 六升 榧楂核漿 一升

右調勻每服一卵匕日四次嬰兒服量

○方

加答流性咽喉衝

民埕列里精 醋蜜 各三 接骨木花水 三

右調勻每二時服一匙布匕嬰兒服量

○方

主治同前

屋施蔑兒 一升 桑椹舍利劑 二升

右調勻時々服一卵匕小兒服量

○方

咽喉衝初起

屋施蔑兒 一升 大麥煎 八升

右調勻為含嗽劑

○方越

主治咽喉加答流

硝砂 一升 水 十二升或十六升

右調勻為含嗽劑

○方越

主治同前

硝石 半斤 水 十六斤 醋蜜 二斤

右調勻為含嗽劑

○方 主治同前

硝石 十八 白糖 一斤

右為散以鷲管吹入咽內

○方 主治咽喉加答流微毒性潰瘍

塩酸 一匙 水 十二斤 醋蜜 一斤 或玫瑰蜜

右調勻為含嗽劑

○方 主治咽喉潰瘍

硝酸 一匙 水 十二斤

右調勻為洗劑或含嗽劑

○方 主治咽喉炎

明礬 半匙至一匙 水 一 覆盆子舍利別 一

右調勻為含嗽劑

○方 主治同前

格羅兒加里 或格羅兒曹達 水 一廿

右調勻為含嗽劑

○方 主治侵蝕性咽喉衝

塩酸加爾基 半斤至一斤 泉水 八斤

右調勻含嗽日數次

○方 主治咽喉炎

草寧 一匙半至二匙 水 一廿 橙皮舍利別 一

右調勻為含嗽劑

○結列阿曹篤含劑 主治咽內慢性炎

結列阿曹篤 二十滴 複方刺賢堽兒丁幾

沒藥丁幾 各四匙 枸橼舍利別 十二匙

水 八斤

右調勻為含嗽劑

○又方 主治同前

結列阿曹篤 二十滴 達刺侃篤漿 三斤

水八号

右調勻為含嗽劑

○蓬砂含劑_丹 主治咽喉慢性炎

蓬砂 三钱 海葱舍利别 一钱 水 八号

右調勻為含嗽劑

○方_鑑 主治急性咽喉炎

蓬砂 一钱 玫瑰蜜 半号

末爾秩私鎮痛液 十滴水 一钱

右調勻為含嗽劑

○皓礬刺答尼含劑_丹 主治懸壅及咽內弛緩

皓礬 二十人 桑槁舍利别 四钱

甘油 一号 刺答尼浸 八号

右調勻為含嗽劑

○方_鑑 主治咽加答流

沃實護 六号 沃度加里 十二号 水 六号

右調勻塗布于患部

○方_鑑 主治義膜性咽孔炎

格羅謨酸 一钱 蒸餾水 二钱

右溶和以毛筆燒灼咽內

○方 醃膿性咽嗽衝

硫酸銅 半刀至 一刃 蜂蜜 一号

右調和貼于患部

胃管病 即噎膈

○方_鑑 主治胃管嗽衝及痞腫

醋酸莫非 二钱 老利兒水 半号

右溶和每一時服六滴

○安沒尼合劑_丹 瘰癧性胃管狹窄 方出于 膿毒症

○方 主治瘰癧性胃管狹窄因併私的里者

阿魏

纈草越幾 各一匙

右加纈草根末適宜、二匙為一丸、衣石松子末、每服五丸、一日四次

○阿魏竜胆飲 每 主治同前 方出併私的里

○纈草酸規尼丸 丹 主治同前 方出併私的里

○磷酸亜鉛丸 丹 主治同前 方出于頭痛

○方 主治同前

非阿斯越幾 一刃 老利兒水 六匙

右調勻、每服十滴、至十二滴、日四次

○莫非曹達散 越 主治痙攣性胃管狹窄、粘液上湧者 方出于氣管支炎

○方 主治胃管狹窄、因併私的里者

吐根末 三匙至六匙 白糖 一匙半

右為散、分十二服、每一時或二時、一服

○方 寬 主治同前

河狸香 葎若葉末 纈草根末 各一

大黃末 癒瘡木脂 硝酸蒼鉛 各二

加密列末 三匙 過泥子油糖 八匙

右為散、製劑八個、每二時、服一劑

○方 選 主治胃管狹窄、及攝護腺硬結

硃砂 甘草膏 各一 蒲公英越幾 適宜

右為球、製劑十二個、每四時、服一劑

○方 主治同前

接骨木花昆設爾弗

蜀葵舍利別 各二匙

右調勻、每二時、服一食匕

○方 選 主治胃管加答流

硝酸銀 五匙至十匙 蒸餾水 一匙

右溶和、以長管唧筒、注入胃管

○方 選 主治同前、發潰瘍者

硝酸銀 一八

家猪脂 一錢

右為軟膏

○方 主治胃管潰瘍

單寧酸 三錢至二十錢 或沃度加里二錢至十錢 或沃實
丁幾一密 水一錢
至十五密

右裝器械為吸引法

○方 主治痙攣性胃管狹窄

莨菪硬膏 半錢 草零陵香硬膏 一錢

右煉和外用

○方 主治同前

失鳩答硬膏 水銀硬膏 各半錢

右煉和外用

○方 主治同前

硃砂揮發膏 一錢 舍電阿芙蓉液 一錢

右調勻為塗擦劑

○方 主治同前

菲阿斯油 一錢 舍電阿芙蓉液 一錢

右調和為塗擦劑

○方 主治胃管膀胱狀狹窄初期

沃度加里 半錢 水銀軟膏 半錢

右調和塗擦于患部

消化不良 胃弱

○方 主治胃弱

水楊梅根末 橙皮末 各一錢 大黃末 半錢

麻屈涅失亞 十錢 白糖 半錢

右為散每服一匙布已日二三

○方 主治同前

葛斯加栗刺越幾 一錢 橙花水 四錢

右調和每服一匙布已

○方 消化不良因刺酸者

麻屈涅夫十 蝟姑石半 白糖半

右為散每服一匙布已

○方 主治胃腑知覺不敏捷者

複方 檳榔丁半 橙皮丁一

右調和每服一匙布已

○方 主治兼酸液過釀者

炭酸剥答斯一 枸橼汁一

薄荷水四 橙皮舍利別半

右調和每服一匙布已

○方 主治胃弱

括夫亞越幾一 默栗薩水四

右調和每服一匙布已至一食已

○方 主治同前

亞爾鮮葉一 橙皮 苜蓿根各細到者

右注熱湯浸出取液四加失格列乙加大

黃舍利別二匙每服一匙布已

○方 主治同前

橙皮三 肉豆蔻一 過泥子油糖三

右為散每服一刀尖日三次

○方 主治同前

肉豆蔻 泥苜蓿根各半 大黃末

炭酸麻屈涅夫各一 過泥子油糖三

右為散每三時服一刀尖

○複方肉豆蔻散 胃弱兼虛脫者

肉豆蔻 益智各一 橙皮二

枸橼油二滴 白糖半

右為散每服一茶匙蒲萄酒一盞和服

○方 主治消化不良兼酸液及便秘者

蘆薈

石鹼 各一兩

右研和為十丸、日服二丸、至六丸

○方獨 主治同前

大黃末 麻僞涅失亞 白糖 各一兩

右為散、分六服、朝夕各一服

○硝鹽酸合劑 每 主治胃弱、食機缺乏者

稀硝鹽酸 二匙 稀青酸 二十五密

蒲公英榨汁 六匙 複方竜胆丁幾 一匙

梅那浸 八匙

右調勻、每服六分劑、一日二三次

○硝酸梅那蒲公英飲 每 主治胃弱 癰疽 方出于

○大黃麻僞涅失亞劑 每 主治同前 方出于 刺衝熱

○方獨 主治消化不良

乳酸 一 鹽酸 五 百布失涅 半 水 適

右調勻、食前用

○百布失涅蘆薈丸 每 主治同前或經閉

百布失涅 三十八 蘆薈越幾 四八至

甘油 適量

右為八丸、衣銀箔、每日午餐後服一丸

○健胃飲 每 主治胃弱、不食

竜胆越幾 半匙至 重碳酸曹達 一匙

水 六匙或 橙皮舍利別 一匙

右調勻、每服一食匕、日六次

○方獨 主治消化不良、兼便秘者

格綸僕 半匙 生姜 半匙 梅那葉 二匙

右浸出、取液十二匙、每服二食匕、日三次

○牛膽丸 每 主治消食不良、兼惡心、便秘者

炭酸安沒尼 十四匙 煎熬牛膽 三十六匙

右為十二丸、衣銀箔、每食後三時、服一丸

○方獨 主治消化不良、吞酸

炭酸安沒尼 五錢 橙皮丁幾 一錢

龍胆浸 一錢 水 二錢

右調勻、朝夕各服一劑

○吐根大黃酸化銀丸 主治胃弱 方出于神經痛

○鐵安沒尼劑 主治同前 方出于萎黃病

○鐵枸橼酸加里劑 主治同前 方出于萎黃病

○鐵私的列發尼劑 主治同前 方出于昆垤兒

○鐵百布失涅丸 主治同前 方出于貧血

○規尼吐根丸 主治同前 方出于頭痛

○規尼大黃丸 主治同前 方出于頭痛

胃液衝 胃加答流

急性胃加答流

○方 急性胃加答流、初起惡心、嘔噦者

吐根 二錢浸出 海葱蜜 半錢

右調和、每十分與一匙、至得吐

○方 急性胃加答流、發惡臭、變氣者

吐酒石 一錢 吐根 一錢

右為散、頓服、或分二服、每半時一服

○方 主治同前

吐根末 十五 沸騰散 一錢

右調和、頓服

○方 急性及慢性症

煨製麻僞涅失亞 半錢 炭酸曹達 十五

蒸餾水 二錢

右調和、臨用振蕩、每一時與一匕

○方 急性胃加答流、全腹緊滿、雷鳴者

大黃末 半錢 麻僞涅失亞 一錢 白糖 半錢

右為散、分三服、每二時一服

○方 愈 主治同前

孕驗酒石 一 泉水 四 大黃舍利別 一

右調勻、每一時、服一食匕

○方 愈 主治同前、頑固便秘者

甘汞 六分 藥刺巴末 半匙

右為散、頓服

○莫非曹達散 愈 胃部劇痛者 方出于氣 管支喉衝

○方 愈 主治同前

番水 驚越幾 一 白糖 二刀

右調和、分四包、每半時、服一包

○方 愈 主治惡心嘔噦者

重碳酸曹達 半匙 酒石酸 三匙

枸橼油糖 一匙

右為散、每三四時、取一茶匕、糖水和服

○方 愈 主治中暑食滯

炭酸麻 偏濕失 二匙 枸橼汁 一匙

炭酸刺篤亞斯 二 水 十一 号

右調勻、為飲劑

○方 愈 小兒急性胃炎

甘汞 一 剉站石 一 刀 白糖 半匙

右為散、分六服、每二時、一服

○方 愈 小兒急性胃加答流

硝酸銀晶 一 蒸餾水 三 号

單舍利別 半 号

右調勻、每二時、與一小匕

○方 愈 主治同前

水製大黃丁幾 二 匙 刺篤亞斯水 十二 滴

茴香水 三 号 單舍利別 半 号

右調勻、每三時、與一茶匕

○方 愈 主治同前

結列阿曹篤 一滴 水 四号

右調勻、每二時、與一茶匕

○方 越 主治小兒胃炎、兼發泄瀉者

把弗兒散 六号 白糖 一匙 茴香油 二滴

右為散、分六服、每二時、一服

○方 越 小兒胃炎、兼便秘者、

麻偃涅失亞 十二 大黃末 六号

茴香油 一滴 白糖 半匙

右為散、分六服、每二時、一服

○方 登 胃痛甚者

非阿斯葉 粗末 二号 錦葵葉 粗末 三号

右調和、加水及乳汁、為懸布

○牛肉乳酥灌腸方 丹 主治胃炎、胃瘍、胃癌、頑

固嘔吐等、飲食嚥下困難者

牛肉浸 四号至 八号 乳酥 一号

武蘭實 半号或葡萄酒 一号半

右調勻、為灌腸劑、一晝夜二三次、施之

○又方 丹 主治同前

肉羹汁 四号至 六号 乳酥 一 武蘭實酒 二茶

阿片流動越幾 十密至 十五密 枸橼酸鎂規尼 八

右調勻、為灌腸劑

○肝油幾那灌腸方 丹 主治同前

牛乳 四号 波兒篤酒 一号 肝油 半号

幾那丁幾 二匙 阿片流動越幾 二十

右調勻、每十二時、取一劑、注于直腸

○規尼肉羹汁灌腸方 丹 主治同前

武蘭實 二食匕 硫酸規尼 五号

甘油 一茶匕 乳酥 二食匕

肉羹汁 四号或 八号 阿片流動越幾 十五

右調勻、每六時、或八時、注入直腸

慢性胃加答流 留飲癖飲癖囊 翻胃等屬之

○方 丹 慢性胃加答流、兼微質發生者、

亞硫酸曹達 半匙至一匙 拈失亞浸 一匙半

右調勻、每服一劑、一日三次

○方 越 慢性胃加答流、疼痛甚者、

硝酸蒼鈴 一匙 阿芙蓉 麻屈涅失亞 一匙

吐根 各六分

右為散、分二十服、一日三服

○方 越 主治同前

硝酸蒼鈴 一匙 大黃

格倫僕末 各十八

右為散、分六服、朝夕各一服

○蒼鈴散 丹 主治慢性胃加答流

硝酸蒼鈴 十五分 重碳酸曹達 十二分

複方達刺侃篤散 六十分

右為散、分三服、武蘭實水一盞和服、日三次

○哥百爾氏曹達蒼鈴錠 胃痛吐酸水者、

硝酸蒼鈴 七百二十分 炭酸麻屈涅失 二分

炭酸加爾基 三分 重碳酸曹達 十八百分

白糖 十四分 亞刺比亞末 二百二十分

護謨漿 一分 玫瑰水 適宜

右捏和為三百六十錠、每服一錠、至六錠

○健胃散 越 主治慢性胃加答流

番木鱧越幾 六分 蘆薈 六分至十二分

麻屈涅失亞 一匙 炭酸曹達 一分

右為散、每服一卵匕、一日三次、冷水和服

○方 越 主治經久胃病、屢吐酸醱液者、

精製石炭酸 一分 甘油 四分

右調勻、每服四滴、至八滴、日數次

○方 越 慢性胃加答流、發疼痛、或敗臭酸氣者

石炭酸 一刃至半匙 亞利比亞末 二匙

淨水 八勺 單舍利別 一勺

右調勻、每一時服一匕

○方 **越** 慢性胃加答流

石炭酸 一匙 蜀葵根末 甘草越幾 各適宜

右為六十九丸、朝夕服一丸、漸加至十五丸

○方 **越** 主治同前、頻發噯氣者

結列阿曹多 十二滴 甘草膏 適宜

右為二十四丸、每服一丸、至二丸、日三次

○結列阿曹篤飲 **越** 惡心嘔吐、風氣夥多者、

結列阿曹多 半匙至一匙 水 十二勺

甘硝石精 二匙 橙皮舍利別 半勺

右調勻、每服一食匕、日六次

○石灰水 二勺 酸敗液上湯者

右每服一匕、乳汁或乳清一小碗和服

○的列並飲 **丹** 主治慢性胃加答流及胆石

越的兒精 二匙 的列並油 一匙半

護謨漿 三勺 桂皮水 六勺

右調勻、每服六分之一、日三次

○方 **馬** 主治慢性胃加答流

的列並油 半一匙 鷄子黃 一個 桂水 四勺

單舍利別 六匙 醋酸越的兒 二匙

右調勻、為乳劑、每服二食匕、日三次

○方 **馬** 主治同前

的列並底那 一刃 甘草末 適宜

右為球、製劑六個、每服一劑、日三次

○方 **緊** 消食機衰弱者

葛斯加栗刺 粗末者二匙浸出液四勺

複方幾那丁幾 二匙 薄荷舍利別 半勺

右調和、每一時半、與一匕

○健胃飲戒 主治食機缺乏者方出消 化不良

○方福 主治同前

括失亞一至半勺 浸出取液八勺 麻屈涅失一刃或酒 石塩半勺

橙皮舍利別半勺或橙皮丁幾

右調勻、每二時、服一食匕

○方越 主治同前

括失亞末半勺 炭酸麻屈涅失一匙

右為散、分六服、每食後、一服

○方露 慢性胃加答流

沃度加里三勺至 蒸餾水二勺

右調勻、一日服

○方露 主治同前

硝砂十二 橙皮舍利別半勺 水五勺

右調勻、每服一食匕、一日三次

○方露 主治同前

硝砂 麻屈涅失亞各一 枸櫞皮油糖一

右為散、每服一刃尖、日三次

○方選 主治同前

炭酸曹達二 括失亞 麻屈涅失亞各半

右為散、每服一刃尖、日三次

○酸化銀丸丹 主治同前方出于 肺勞

○硝酸銀丸丹 主治同前

硝酸銀一 菲阿斯越幾三

右為二丸、午時空心頓服、或二回分服

○方越 主治同前

硝酸銀五 失鳩答越幾一

番椒末或胡椒末

右為三十丸、每服二丸、一日三次

○方露 慢性胃加答流、頑固者

消酸銀晶一 至 蒸餾水二

右溶化、每二時與一食匕

○方 蠶 慢性胃加答流、有疼痛者

老利兒水 一匙 番木鱉丁幾 十滴

右調勻、每一時服五滴、至十滴

○方 蛤 慢性胃加答流

苦酒 橙皮丁幾 各半

右調勻、每服一匙布匕

○方 蛤 主治同前

菖蒲根 二匙浸出 大黃丁幾 二匙

橙皮油糖 半匙

右調和、每服一匕、日三次

○方 越 慢性胃加答流、兼貧血者

炭酸鍊 二 硫酸規尼 十二 乳糖 一匙

右為散、分十二服、一日三服

○方 越 主治同前

硫酸鐵 半匙

番木鱉越幾 五匙

蘆薈 十匙

甘草膏 適宜

右為三十九丸、每服二丸、一日三次

○方 越 主治同前

炭酸鍊 半匙

葛斯加栗越幾 一匙

蜀葵根末 適宜

右為三十九丸、每服三丸、一日三次

○安波尼鐵水 每 主治同前 方出腸 弟扶斯

○方 寬 慢性胃加答流、吐出多量粘液者

碲銅礬 四分八 一 蒸餾水 五匙

橙皮舍利別 一匙

右調勻、每二時服一食匕

○方 越 主治慢性胃加答流、兼微質發生者

石炭酸 一刃至 水 十二匙

右攪和、以胃唧筒注射于胃中、後抽出之

嘔吐

○方 嘔吐因胃中污物及膽汁鬱積者

吐酒石 一丸 加密列水 二勺

吐根末 一刃 海葱醋蜜 二匙

右調勻振盪每四分時服一匕

○方 妊婦惡心及嘔吐

炭酸苦土 二匙 酒石酸 半匙 枸橛油糖 一匙

右為散取一卵匕投冷水乘沸騰頃服一日

三次至四次

○方 瀉 主治嘔吐因胃加答流者

重炭酸曹達 酒石酸 白糖 各一匙

右為散分十二服包蠟紙每一時取一包投

冷水一盞乘沸騰嚥下

○里歌利飲 瀉 主治惡心嘔吐

炭酸曹達 或炭酸加里 水 一勺

右溶和投枸橛汁一匕乘沸騰嚥下

○方 瀉 污物排泄後嘔吐不止者

炭酸剥答斯 一匙 蒸餾水 四勺

枸橛酸 加蒸餾水 一勺者

右調勻令飽和每服一匙布匕

○方 瀉 主治同前

炭酸曹達 一匙 覆盆子水 四勺

栗鼈子舍利別 半勺

右調和每服一食匕

○炭酸水 瀉 主治嘔吐

右供飲料

○方 瀉 主治同前

葇若越幾斯 二丸 白糖 一匙

右為散分六包每服一包日二三次

○方〔膏〕 主治同前

老利兒水 二匙 莫爾非 一丸

右溶和每服十滴至三十滴日二三次

○方〔粉〕 主治同前頑固症

收歛越的兒 一匙 覆盆子舍利別 一匙

右調和每服一匙布匕水一硝盞和服

○方〔膏〕 主治同前

結列阿曹篤 十滴 亞刺比亞漿 半匙

黑櫻實水 四匙

右調和每服一匙布匕或一食匕

○結列阿曹篤丸 〔丹〕 主治頑固神經性嘔吐

結列阿曹篤 二十密至 香竈散 八十八

護謨漿 適宜

右為二十九每服一丸至二丸日三次

○石灰水 〔越〕 一 小兒酸液嘔吐及下利

右每服一小茶匕 即一及乃 至半匙

○方〔何〕 妊婦痙攣性嘔吐

格綸僕末 四日 阿芙蓉 四丸

薄荷油 十滴 水楊梅越幾 適宜

右為三十九每服二丸日三次

○方〔粉〕 主治神經性嘔吐

格綸僕末 二刃 薄荷油糖 一匙

右為散分三服每食前四分時各一服

○昆斯繆篤散 〔丹〕 惡心嘔吐及嘈雜胃痛

炭酸蒼鉛 麻屈涅夫亞 各十八

右研和為散曹達水半盞和服一日三次

○蒼鉛散 〔丹〕 主治同前 方出于慢性 胃嫩衝

○方〔歷〕 主治神經性嘔吐

硝酸銀 莫若越幾 各七 蒸餾水 一匙

右溶和貯黑硝子鏗每服十五滴至二十滴

日三次糖水服

○沃青謨丁幾一匙 頑固嘔吐

右每服五滴至十五滴糖水一盞和服

○苦味安沒尼水一匙 主治惡心嘔吐胃痛

硝砂香竈精三匙 老利兒水一匙

重碳酸曹達一匙 格給僕丁幾六匙

過泥子水八分

右調勻每服六分之一日二三次

○雙鸞菊結列阿曹篤飲一匙 主治頑固嘔吐

雙鸞菊丁幾四十 結列阿曹篤飲八分

右調勻每服六分之一日三次

○方一 妊婦嘔吐

舍電阿芙蓉液 醋酸越的兒各一

蒸餾水五分 橙花舍利別一

右調勻每二時服一匕

○方何 妊婦惡心及嘔吐

肉豆蔻三至 白糖一

右為散製劑六個每服一劑日三四次

○方 妊婦嘔吐飲食藥劑悉吐逆者

番木鱉丁幾四滴 老利兒水二

右調勻每服十滴漸加至二十滴日二次

○方 吐婦嘔吐

葶藶越幾半 家豬脂三

右調和塗擦于胃部

○方里 併私的里性嘔吐胃瘧及疝痛

非阿斯油 加密列油各一 硝砂精

阿芙蓉液各二 枸橼油一 薄荷油半

右調和取一食匕塗擦于腹部

○方哈 主治頑固嘔吐

忽氏拔爾撒謨非答一 或刺賢理兒精

右塗擦胃部

○龍腦阿片擦劑 每經久惡心嘔吐胃痛

復方龍腦軟膏 阿芙蓉丁幾

葇若丁幾 各四錢

右調勻塗擦于心下

胃脘痛 胃瘕

○方 胃瘕發作

老利兒水 一匙

醋酸莫爾非 半錢

右調勻每服十滴至三十滴

○方 主治同前

青酸 一錢

地榆丁幾 三錢

右納黑纒每服五滴至十滴一日二次

○方 主治同前

硝酸蒼鉛 四錢至十二錢 莫爾非 半錢 白糖 一匙

右為散分六包每服一包日三次

○方 主治胃痛兼酸液及便秘者

大黃末 硝酸蒼鉛 各一匙

右為散分六服每日一服至二服

○方 主治胃瘕

硝酸蒼鉛 三錢 護謨散 香窠散 各八錢

右為散製劑十個每服一劑日三次

○方 主治胃脘痛

硝酸蒼鉛 六錢至十八錢 葇若越幾 半錢或葇若末六錢

白糖 一匙或薄荷油糖

右為散分六服一日二服至四服

○蒼鉛莫非散 主治胃瘕

硝酸蒼鉛 重碳酸曹達 各半匙

莫爾非 白糖 一匙

右為散分八包每服一包一日三四次

○方寫 主治同前

硝酸銀晶 六分

阿芙蓉 六分

失鳩答越幾

甘草膏 各一分

右為六十九丸朝夕服二丸漸加其量

○方寫 胃瘕兼便秘者

蒲公英越幾

蘆根越幾 各半分

硝砂 十八

淨水 三升

右調勻每服一茶匕日三次

○方寫 主治胃脘痛

番木鱉丁幾

葛私多樓丁幾 各三十分

舍電阿芙蓉液 一分

右調勻每半時取十滴冷水和服

○方寫 主治同前

番木鱉越幾 二分

白糖 一分

右為散分六包每服一包日三次

○方寫

炭酸安波尼水

野菊花舍利別 各六分

野菊花水 六分

右調勻每一時服一匕

○安波尼沸騰散 主治胃刺衝症兼衰弱者

方出膿毒症

○又方 主治胃刺衝症兼酸液過多者

硝砂香鼠精 四分

重炭酸加里 二分

呀羅坊精 六分

菲阿斯丁幾 三分

葛斯加栗浸 八分

右調勻每四時取六分之一加枸櫞汁一食

匕乘沸騰用之

○方寫 主治胃瘕

苦扁桃 甘扁桃 各二分

菲阿斯丁 半分

右搗和加水適宜為乳劑五分、加後味

重碳酸曹達 一匁 苗香油糖 半匁

右調勻、每服一食匕、日四次

○方 [鈴] 主治同前

葛私多儂丁幾 一匁 香寶酒 三匁

右調勻、每一時、服二十滴

○阿魏水 即歌以私的里水 三匁 [鈴]

右每半時、或一時、服一茶匕

○方 [越] 主治胃腑神經痛、善便秘者

大黃越幾 蒲公英越幾

亞爾鮮越幾 各半 大黃末 半匁

右為六十九、每日服三九、至八九

○方 [梳] 主治同前、輕易者

睡菜葉 半匁 旃那葉 二匁

右調勻、取一食匕、注沸湯二碗泡出、供用

○方 [越] 主治胃脫痛

結縈 三匁至六匁 番木鱉丁幾 十二滴 水 六匁

右調勻、每服一匕、日三次

○方 [鈴] 主治同前

纈草浸 以半匁、浸出者、四匁 葛私多儂丁幾 一匁

野菊花舍利 別 一匁

右調勻、每一二時、服一匕

○醋酸越的兒 二匁

右每服十滴、至三十滴

○方 [扶] 主治同前

鹽酸亞鈴 一匁 硫化越的兒 二匁

右溶和每服六滴、日三四次、糖水和服

○方 [馬] 主治胃瘕、酸液嘈雜

炭酸曹達 半匁 大黃末 十二匁

阿芙蓉 三匁 遏泥子油糖 一匁

右為散分六服每日三服

○曹達莫非劑 丹 主治胃痛 方出心裁

○方 烏 主治胃瘧酸液嘈雜

麻屈涅失亞 三 桂皮水 薄荷水 各一

硝砂精 二十滴 香竈酸丁幾 一

右調勻每三時服一食匕

○安沒尼加里劑 丹 主治胃痛

重炭酸加里 二 硝砂香竈精 三

雙鸞菊丁幾 三十 忽布浸 八

右調勻每服六分之一日三次

○方 烏 主治胃瘧

重炭酸加里 半 桂皮水 薄荷水 各二

橙皮水 半 舍電阿芙蓉液 半

右調勻每三時服一食匕

○刺埵末歇兒氏沃實和劑 結 主治胃痛腸痛

沃實丁幾 三十滴 蒸餾水 八

達刺侃篤護謨 一

右調勻每一時服一食匕

○沃度坊丸 丹 主治胃痛

沃度坊 二 至 六 大鳩答越幾 四

右為二丸臨卧用

○哥羅坊 越 主治胃瘧

右每十分取四滴至十滴糖水和服

○方 越 頑固胃瘧

硫酸亞篤魯非涅 半 蒸餾水 半

右溶和每服四滴 即百二十 日三次

○青酸鎂規尼丸 丹 主治胃腸神經痛

青酸鎂規尼 一 番木鱉越幾 一

甘草膏 一

右研和為十丸每日服五丸至十丸

○方〔卷〕胃脘發作

莫爾非 十八 府利軟膏 二匙

右調勻取豆大塗擦于胃部

○方〔卷〕主治同前

菲阿斯油 一匙 醋酸莫爾非 十八

右調勻為塗擦劑

○莫若阿片塗劑 于痛風 主治同前

胃中潰瘍

○方〔卷〕

消酸蒼鈴 六分至 十二分 莫爾非 一分至 五分

白糖 一匙

右為散分六包每服一包日二三次

○蒼鈴莫非散 胃瘍兼酸液者 方出于 胃脘

○方〔卷〕主治胃瘍兼嘔噦者

結列阿曹篤 或沃實丁 二滴

右糖水二三勺和服

○方〔卷〕胃中潰瘍發疼痛者

番木鱉越幾斯 二匙 白糖 一匙

右為散分六包每服一包日二三次

○方〔卷〕胃中潰瘍發吐血者

明礬 一匙 蒸餾水 四匙 栗鱉子舍利別 半匙

右調和每服一匕

○方〔卷〕主治同前

收斂鐵液 三十滴至 五十滴 桂皮水 一匙

右調和每服一匙布匕

○方〔卷〕主治同前

鉛糖 三匙至 六匙 阿芙蓉 一匙 白糖 一匙

右為散分六包每服一包日三次至六次

○方 鑿 主治同前

硫酸鎂 十人 阿芙蓉 半人 桂皮水 二匙

右調和每二時與十滴至二十滴

○方 鑿 胃中潰瘍

○硝酸銀晶 二人 桂皮水 四勺

右調和貯硝子瓶每服一食匕日二次

消酸銀丸 五 主治胃瘍 方出慢性 胃效街

○方 鑿 主治同前

皓礬 四人 蒸餾水 半勺

右溶和每服十滴至二十滴

○方 鑿

牛乳 四分 石灰水 一分

右調勻

○方 鑿 胃瘍、胃痛、慢性胃炎、食後有疼痛者

百普夫涅 三匙 鹽酸莫爾非 一人

硝酸蒼鉛 一匙半

右為散分十二服每食時一服

○鐵龍胆丸 五 主治胃瘍有疼痛或嘔噦者

硫酸鐵 竜胆越幾 各三十八

右為十二丸每服一丸一日三次

○鐵安沒尼劑 五 主治同前 方出于 萎黃病

○枸橼酸鐵安沒尼劑 五 主治同前 方出于 貧血

○枸橼酸鐵規尼劑 五 主治同前 方出于 貧血

胃瘍 可參考 瘰癧 糸

○扶氏香酸莖液 五 扶 方出于 瘰癧

○方 主治胃瘍及胃瘰

昆斯繆篤 二八至 莖若越幾 六分八一至

大黃末 三八至 白糖 半勺

右為散製劑十二個、每服一劑、日三次

○方 主治胃瘧及經久嘔吐

葶藶越幾二 刺藜亞斯水一 薄荷水五

大黃丁幾 大黃舍利別各一

右調勻、每二時、服一食匕

○方澄 主治胃瘧

硝酸銀一、以蒸餾水三、溶解 亞刺比亞漿一

右調勻、每服一食匕、日三四次

○方氏 主治胃瘧

酒石葉一 尖爐答越幾半

番木鱉越幾十六 蒲公英越幾三

薄荷水六 蒲公英舍利別一

右調勻、每二時、服一食匕

○方氏 主治同前

葶藶葉末三 白糖一

右為散、製劑八個、每日、服一劑

○方 胃中硬瘧

阿芙蓉一 甘汞一 石鹼半

右三丸為一丸、朝夕各服三丸

○墨屈林丸 胃瘧、發頑固嘔吐者

菲阿斯越幾 顯草越幾 亞鉛華各一

右三丸為一丸、每三時、服一丸、至二丸

○浩天里篤膏

吐酒石一 玫瑰軟膏或 宋猪脂二

右調和、取胡桃于大、塗擦于心窩

吐血

○方越 主治胃血、及胃瘧

阿芙蓉 鉛糖各半 白糖十八

右為散每一時或每二時服一劑

○食塩越 主治吐血咯血

右取一茶匕至一食匕冷水和服日一二次

○方爾 主治吐血

鉛糖四 尖樞答越幾五 白糖二

右為散分十二服每二時一服

○麥奴越幾水寫 主治嘔血方出于咯血

○方罕 主治內部實性出血殊胃血腸血

麥奴越幾一瓦蘭 蒿苳水百二十瓦蘭

實亞格日舍利別三十六瓦蘭

右調勻每一二時服一食匕

○明礬乳清寫 主治慢性吐血

明礬一匙至二匙 牛乳一匕或二匕

右上火令煎沸濾過取清供用

○方 瘧性吐血

非阿斯越幾一 老利兒水半

右調勻每服十四滴日四次

○方 主治吐血

收欵亞的兒半匙至一匙 沙列布煎六

覆盆子舍利別一

右調勻每二服服一食匕

○方額

答麻林度二 幾那越幾二

枸橞油糖六 醋酸越的兒一

右為紙劑每二時服一茶匕

○方爾 弛弱性吐血

的列並油二十五滴 桂皮水一

橙皮舍利別一

右調勻頓服

○的列並油飲丹 主治虛性吐血

護謨漿 四勺

重碳酸曹達 十八

的列並油 十滴

過泥子油 一滴

燕餹水 一勺半

右調勻、每服一劑、日三次

○的列並油飲 〔五〕 主治吐血 〔紫〕 方出于

○安沒尼鐵水 〔五〕 主治同前 〔方〕 扶斯

○塩酸鐵劑 〔五〕 主治胃血 〔出〕 血病

○沒食吐根散 〔五〕 主治吐血 〔第〕 扶斯

○沒食酸水 〔五〕 主治同前 〔紫〕 班病

○酸性幾那合劑 〔五〕 吐血 〔衰〕 弱者 〔紫〕 方出于

○規尼鐵劑 〔五〕 主治同前 〔紫〕 班病

○硝塩酸合劑 〔五〕 主治吐血 〔紫〕 班病

○鐵塩酸劑 〔五〕 主治同前 〔頭〕 痛

○硫酸芒硝水 〔五〕 吐血 〔兼〕 便秘者 〔紫〕 方出于

○麥奴越幾皮下注射法 〔五〕 主治吐血 〔紫〕 方出于

小腸焮衝 腸加答流

○方 〔五〕 主治腸焮衝

花歇爾私散 〔六〕 八至 白糖 一匙

右為散、分六包、每二時、服一包

○方 〔五〕 主治腹痛下利、而舌乾燥者

阿芙蓉末 〔一〕 吐根末 〔二〕 白糖 八

右為散、分二服、朝夕、各一服

○方 〔五〕 主治同前

沙列布煎 〔六〕 舍電阿片液 〔十〕 滴至

實亞格日舍利別 〔四〕 匙

右調勻、每一時、服一食上

○方 〔五〕 主治同前

甘扁桃油 〔半〕 勺 護謨漿 一 勺

護謨漿 四号

重炭酸曹達 十八

的列並油 十滴

遇泥子油 一滴

蒸餾水 一号半

右調勻、每服一劑、日三次

○的列並油飲 〔用〕 主治吐血 方出于紫班病

○安波尼鐵水 〔用〕 主治同前 方出于紫班病

○塩酸鐵劑 〔用〕 主治胃血 方出于紫班病

○沒食吐根散 〔用〕 主治吐血 方出于紫班病

○沒食酸水 〔用〕 主治同前 方出于紫班病

○酸性幾那合劑 〔用〕 吐血兼衰弱者 方出于紫班病

○規尼鐵劑 〔用〕 主治同前 方出于紫班病

○硝塩酸合劑 〔用〕 主治吐血 方出于紫班病

○鐵塩酸劑 〔用〕 主治同前 方出于紫班病

○硫酸芒硝水 〔用〕 吐血兼便秘者 方出于紫班病

○麥奴越幾皮下注射法 〔用〕 主治吐血 方出于紫班病

小腸燉衝 腸加答沅

○方 〔用〕 主治腸燉衝

挖歌爾私散 六八至十八人 白糖 一匙

右為散、分六包、每二時、服一包

○方 〔用〕 主治腹痛下利、而舌乾燥者

阿芙蓉末 一匙 吐根末 二匙 白糖 八

右為散、分二服、朝夕、各一服

○方 〔用〕 主治同前

沙列布煎 六号 舍電阿片液 十滴至四十滴

實亞格日舍利別 四号

右調勻、每一時、服一食匕

○方 〔用〕 主治同前

甘扁桃油 半号 護謨漿 一号

按爾撒字露糖煉 六匙 泉水 三号

右調勻、每二時、服一食匕

○方 越 腹痛、下利

阿芙蓉 一丸 白糖 或護謨末 二刀

右為散、分四服、或六服、每二時、一服

○方 倭麻質性腸炎、炎勢減退者

竜腦 二丸至 阿芙蓉 一丸 白糖 二刀

右為散、分四包、每服一包、日三次、至四次

○方 越 汚物排泄後、下利不止者

硫酸銨 阿芙蓉 各半丸

右為丸、每服一劑、日三次

○方 越 主治同前

阿仙藥 二匙 蜀葵根煎 六号

右調勻、每一二時、服一食匕

○方 越 主治同前

硝酸銀 四分丸 白蠟 適宜

右為丸、頓服

○方 越 主治小兒腸加答流

消酸銀晶 一丸 蒸餾水 一三或 三三

右溶化、每二時、與一小匕

○方 越 主治同前

甘汞 一丸 蜆站石 十丸 白糖 一匙

右為散、分八包、每二時、與一包

○冷肉汁 丹 主治腸炎 方出于 伺僕病

○方 越 主治腸潰衝、有劇痛者

蔓陀羅葉 烟草 各半 亞麻仁 一

右調和、供罨法

○方 越 主治同前

摸爾非涅 十丸 越沒里膏 三匙

右研和、為擦劑

聖方... 卷之三十一

○方 罇 主治同前

亞麻仁膏 二匙 阿芙蓉 一刃

右為軟膏

○方 罇 主治同前

椰子油 半勺 菲次斯越幾 二八至 四八

右研和分四個為坐藥

○方 主治同前

亞麻仁 半勺水煎 亞麻仁油 一勺

右調勻為灌腸劑

○方 越 腸加答流下利或直腸疼痛者

阿芙蓉 二八 家猪脂 一匙

右研和為軟膏納肛內

○方 越 主治同前

舍電阿芙蓉液 十二 水 二勺或 四勺

右混和為灌腸劑

○方 罇 主治同前

哥羅方 一刃 橄欖油 一勺

米粥汁 適量

右調勻為鎮痙灌腸劑

○方 越 主治腸加答流下利

硝酸銀 二八至 六八 蒸餾水 六勺

右調勻為灌腸劑

○方 罇 主治同前

單寧酸 半匙 赤葡萄酒 六勺

右調勻為灌腸劑

盲腸焮衝

○方 越 主治盲腸焮衝初起

亞麻仁油 二勺 或蓖麻子油

外科方選 卷之三十一 四十四 柳新

右每二時服一食匕

○方 主治同前

蓖麻子油 一弓

櫻實水 四弓

亞刺比亞漿 適宜為乳劑為度 半弓

右調勻每二時服一食匕

○方 瀉衝劑稍減者

瀉利塩 半弓

泉水 半弓

亞麻仁油 一弓

阿芙蓉丁幾 九滴

罌粟舍利別 半弓

右調勻每半時服一食匕

○方 主治盲腸嫩衝

甘汞 三八至 四瓜

白糖 十瓜

右為散製劑四個每二三時服一劑

○方 慢性腸嫩衝

蘆根越幾

蒲公英越幾 各一 匙半

純精酒石 半弓

泉水 四弓

右調勻每二時服一食匕

○方 盲腸炎兼腹膜嫩衝者

阿芙蓉 四分瓜 至半瓜

白糖 十瓜

右為散每二時服一劑

○規尼合劑 主治同前 方出于 紫班病

○方

沃度安沒尼 三瓜至 十五瓜 幾那浸 一弓至 二弓

右調勻食前服一日二三次兼用尤軟膏

沃度安沒尼 六瓜 家猪脂 一弓

右調和塗擦于腫脹部

○方 硬尿鬱積而下利稀薄者

蓖麻子油 半弓 梅那浸 四弓 瀉利塩 半弓

右調勻為灌腸劑

○方 主治同前

蓖麻子油 一弓至 一弓半

卵黃 二個

野菊花水 六弓

右調勻為灌腸劑

○水銀軟膏 一錢

右塗擦于患部

○方

沃度加里 一錢 純沃實謨 三錢 甘油 二錢

右調勻為塗擦劑

痢疾

○油乳劑 主治赤痢及腹中痙攣

橄欖油 半錢 護謨漿 二錢

水 八錢 舍利別 一錢

右調勻為乳劑或劑中加老利兒水一匙或

鷄子黃一二個每一時服一食匕

○扁桃乳劑 主治痢疾

甘扁桃 搗碎者 一錢 亞刺比亞末 二錢

水 八錢 白糖 半錢

右調勻為乳劑每一時服一食匕

○蓖麻子油 裏急後重而糞便不利者

右取半錢至一錢頓服日一次

○方 主治同前

蓖麻子油 一錢 苦扁桃油 一滴或薄荷水 一錢

右調勻二四分服

○蓖麻油乳劑 主治同前

蓖麻子油 一錢 亞刺比亞末 二錢

白糖 半錢 薄荷水 四錢

右研和為乳劑每一時服一食匕

○蓖麻子油劑 主治痢疾燥屎留滯者

護謨漿 二錢 桂水 三錢

蓖麻子油 十二錢 大黃丁幾

橙皮舍利別 各六 阿芙蓉液 三十滴

右調勻、每三時、服八分之一

○方 括 主治赤痢

甘扁桃乳 三 硝石 半 刃 至

阿芙蓉丁幾 半 匙

右調勻、每二時、服一食匕

○方 括 前方無効者、宜之

甘汞 一 人 阿芙蓉 四 分 白糖 十 人

右為散、每二時、服一劑

○銀灰抱弗兒散 括 主治緩性赤痢

銀灰散 抱弗兒散 各五 人

右為散、每八時、或十二時、服一劑

○方 括 腹中絞痛、兼血利、大便不斂積者、

抱弗兒散 五 人 至 白糖 十 人

右為散、夜間頓服

○方 括

阿芙蓉 二 人 至 白糖 一 匙

右為散、分六服、每二時、一服

○方 括

沙列布煎 六 人 阿芙蓉丁幾 二十滴 至 四十滴

實亞格日舍利別 半 人

右調勻、每一時、服一匕

○方 括 主治痢疾劇症

吐根 一 匙、浸出 舍電阿芙蓉液 一 匙

護謨癩 三 匙 挂皮舍利別 半 人

右調勻、每二時、服一食匕

○方 括 粘液、及膿狀下利、經久者

阿仙藥 二 匙 水 六 人 亞刺比亞 半 人

右調勻、每二時、服一食匕

○阿仙藥合劑 括 主治同前

阿仙藥丁幾 三匙 呀羅叻精 六匙

流動別禮越幾 十二匙 麻知胡浸 六分

右調勻、每服二食匕、一日三次、至四次

○規尼吐根丸 五 主治赤痢

硫酸規尼 八分 吐根末 二十四分

托弗兒散 三十分 甘油 適宜

右為十六丸、每三四時服二丸

○方 腸刺衝機減退、而下利尚存者

阿芙蓉 二分 單寧 十二分

肉豆蔻糖 一匙

右為散分六服、每二時或三時一服

○方 主治同前

阿芙蓉 八分 明礬 十分 護謨末 半匙

右為散製劑八個、每三四時服一劑

○方 疼痛甚者

護謨漿 六分 水製阿芙蓉 二分

右調勻、每二時服一匕

○方 兼下血者

鹽酸鐵液 二十四分 蒸餾水 五分

阿芙蓉丁幾 六滴 實亞格日舍利別 半分

右調勻、每一時服一匕

○方 主治痢疾

甘油 一匙半 橙皮水 常水各三分

右調勻、每一時服一食匕

○方 主治痢疾

甘油 一分 橙花水 泉水各五分

右調勻、每一時服二匕

○方 刺衝減退、而下利不止者

吉納護謨 六分 肉豆蔻糖 一匙

右為散分六服、每二三時一服

○吉納坎百設劑 丹 慢性赤痢 方出腸弟扶斯

○方 越 主治下痢、赤痢、下血、咯血
吉納 二匙 桂皮末 一匙

右浸出、取液八分、加阿芙蓉液二十滴、每二時服一食匕

○方 越 主治赤痢
結列阿曹篤 半匙至一匙 水 十二分

甘硝石精 一匙 橙皮舍利別 半分
右調勻、每服一食匕、日六次

○方 寬 慢性大腸加答流、兼裏急後重者
篤爾面室刺 半分、水煎取液一匙 阿芙蓉丁幾 半匙

右調勻、為四個之灌腸劑
○方 越 主治同前
吐根 二匙、浸出取液六分 阿芙蓉液 六滴、乃至十滴

右混和為灌腸劑

○方 燈 明礬 半匙 沙列布煎 四分

令電阿芙蓉液 二十滴
右調勻、為二個之灌腸劑

○方 解 主治頑固痢疾
硝酸銀晶 十分 蒸餾水 二分

右調勻、為二個之灌腸劑

○方 糖 硝酸銀 四分、至六分 阿芙蓉丁幾 十滴、至一分
蒸餾水 六分

右溶和、為二個之灌腸劑

○方 烏 山慈姑煎 四分 阿芙蓉丁幾 二十滴、或阿芙蓉一分

右調勻、為二個之灌腸劑

單寧酸 半兩至一兩
泉水 三兩

舍電阿芙蓉液 十五滴

右調勻為二個之灌腸劑

○方 〔略〕

鹽酸鍊液 一錢至二錢 蒸餾水 四兩
舍電阿芙蓉液 二十滴

右調勻為二個之灌腸劑

○方 〔選〕

甘油 一兩 大麥煎 或亞麻仁煎 六兩

右調勻為灌腸劑

○方 〔節〕

沃實丁幾 二錢 沃度加里 一兩

蒸餾水 四兩

右調勻為灌腸劑每三四時及復

○方 〔鑑〕 裏急後重太甚者

過爾托軟膏 半兩 阿芙蓉越幾 半錢

右調和內于肛內

○方 〔鑑〕 主治同前

椰子油 家猪脂 各一兩

醋酸莫爾非 半兩

右調勻分二個為坐藥

下利

○方 〔略〕 主治加答沅性下利

托歇爾私散 六兩至十八兩 白糖 一兩

右為散分六包每服一包日二次至四次

○方 〔略〕 主治同前

沙列布末 十兩 煎取 阿芙蓉丁幾 十滴至液六兩

麗春花舍利別 二錢

右調勻、每半時、與一匕

○阿片甘汞丸 〔丹〕 主治同前

甘汞 二錢 阿芙蓉末 四分一

玫瑰昆設爾弗 適宜

右為一九、每四時、服一劑

○方 〔方〕 主治慢性下利

阿芙蓉越幾 二錢 甘汞 四錢

吐根末 四錢 甘草越幾 半錢

右調勻、為一九、朝夕服一九

○方 〔方〕 主治慢性下利、赤痢

舍電阿芙蓉液 吉納丁幾 各一錢

橙皮舍利別 六錢 桂皮水 五錢

右調勻、每服一食匕、日四次

○方 〔方〕 主治慢性泄瀉

阿芙蓉 一錢 甘扁桃 三錢

明礬 一錢 白糖 三錢

右加水搗和、取液五錢、每三時、服二食匕

○方 〔方〕 主治泄瀉

阿芙蓉 三錢 幾那越幾 一錢 卵黃 一個

桂皮水 四錢 白糖 半錢

右調勻、每三時、服一食匕

○芳香硫酸阿片劑 〔丹〕 主治虛性下利

芳香硫酸 二錢 複方龍腦丁幾 一錢

桂皮水 八錢

右調勻、每食前一時、服六分劑、日三次

○忽布石灰水 〔丹〕 主治泄瀉、因第一道剩酸者

忽布丁幾 六錢 複方益智丁幾 四錢

吐根酒 二錢 阿芙蓉液 二十五滴

石粉和劑 六錢

右調勻、每三時、或每四時、服一食匕

○阿仙藥合劑每主治弛緩性下利

阿仙藥丁幾 三錢 香麻石粉散 九十八

薄荷油 六滴 阿芙蓉液 三十滴

石粉和劑

右調勻、每泄瀉後、服六分之一

○方越主治同前

阿仙藥 二錢 亞刺比亞護謨 一錢

桂枝水 二錢 舍電阿芙蓉液 一錢

單舍利別 一錢 淨水 八錢

右調勻、每一時、服一食匕

○方登主治同前

格綸僕越幾斯 半錢 挖歌爾私散 十八

白糖 一錢

右為散分十包、每服一包、日二次、至四次

○方鈴主治下利

格綸僕 三錢、水煎取液六錢 阿芙蓉丁幾 二十滴至四十滴

右調勻

○方越主治同前

格綸僕 半錢、水煎取液七錢 舍電阿芙蓉液 一錢

亞刺比亞護謨 一錢 單舍利別 一錢

右調勻、每一時、服一食匕

○方越主治同前

葛斯加栗刺末 半錢 抱弗兒散 十六錢

白糖 半錢

右為散分六包、每一時、與一包

○方越主治同前

吉納護謨 一錢 阿芙蓉 一錢 白糖 一錢

右為散分十二包、每一時、與一包

○方越主治同前

失瑪爾拔 六錢、水煎取液六錢 阿芙蓉丁幾 十二滴

橙皮舍利別 一匁

右調勻、每二時、服一食匕

○方 越 主治慢性腸加答流性水樣下利

番木鱈丁幾 一匁 舍電阿芙蓉液 一匁

水 三匁

右調勻、每二時、與一食匕

○方 鈴 主治同前

葛刺健苔 二匁、水煎 阿芙蓉越幾 二匁

甘扁桃舍利別 半匁

右調勻

○方 鈴 主治同前

單寧酸 六匁、至 阿芙蓉越幾 二匁

白糖 半匁

右為散、分六包、每二時、與一包

○方 搥 下利、因腸結核者

鈴糖 二匁 阿芙蓉 一匁 護謨末 或白糖 一匁

右為散、分六包、每服一包、日三次

○方 主治下利赤痢

鈴糖 四匁 阿芙蓉 二匁

蒸餾水 二匁 白糖 三匁

右調勻、每服二食匕、日二次

○方 鈴 主治遷延下利

明礬 九匁、至 阿芙蓉 二匁 白糖 半匁

右為散、分六包、每服一包、日二三次

○硫酸銅阿片丸 每 主治頑固下利 方出腸 弟扶斯

○硝酸銀阿片丸 每 主治同前

硝酸銀 半匁 阿片越幾 二匁

右為一丸、朝夕、各服一丸

○方 搥 主治同前

硝酸銀 一匁 蒸餾水 四匁

實亞古日舍利別 四錢

右調勻、每服一食匕、日三次

○方 主治慢性腸加答流下利

硝酸銀晶 五錢 單寧 一錢

阿芙蓉越幾 五錢 甘草膏 適宜

右煉和為三十九丸、每日服二三丸

○方 主治同前

硝酸銀晶 四錢 醋酸摸爾非 五錢

過爾挖根末 二刀 甘草末 適宜

右為四十九丸、每服一粒、或二粒、日二次

○方 慢性下利

鹽酸鍊 十錢 蒸餾水 二錢

右調勻、每二時服一茶匕

○結列阿曹篤飲 性胃煥衝

○方 主治同前

結列阿曹篤 三滴至 沙列布烈 三錢至

硝砂加過泥子精 十五錢

右調和、每服一匙布匕、日三次

○方 主治同前

結列阿曹篤 半錢 水 十二錢

甘硝石精 一錢 橙皮舍利別 半錢

右調勻、每服一食匕、日六次

○木炭煉劑 下利因排泄物之泡脹者

木炭末 一錢 糖蜜 一錢

右調勻、每服一茶匕、日三四次

○刺答尼合劑 主治泄瀉

大黃丁幾 三錢 刺答尼浸 八錢

右調勻、每六時或八時服六分之一

○方 主治同前

刺答尼越幾 一錢 挖弗兒散 一錢

苗香水 五子 護謨漿 三子

右調勻、每二時服一食匕

○麻知胡刺答尼飲 每 衰弱下利 方出腸

○吉納坎百設木劑 每 主治同前 方出腸

○米幹櫻實劑 每 主治下利 方出腸

○方 每 主治溶崩下利

幾那皮 葛斯加栗刺 各半

右水煎取液八子、每服一食匕

○方 每 主治虛性下利

葛斯加栗刺 一 格綸僕

亞爾尼加根 各一 橙皮舍利別 半

右先取前三味水煎取液四子、加後味、每三時服一匕

○方 每 溶崩下利、諸方無效者

的列並油 二 卵黃 一個

舍電阿芙蓉液 十滴 牛乳 四

右調勻、

○方 每 主治小兒慢性下利

油乳劑 二 吐根舍利別 二

右調勻、每二時服一匙布匕

○方 每 主治小兒水瀉

拖弗兒散 一 白糖 二

右為散、每二時服一小茶匕

○方 每 主治小兒泄瀉

沙列布根 三 過泥子 一 桂皮 十

右為散、每服取一刀尖、攪和溫乳、或肉羹汁、與之日二次

○大黃丁幾 每 主治泄瀉便秘交來者

右每服三滴、至八滴、一日三四次

○方 每 主治溶崩下利

篤爾面室刺 一斗，煮取 液一斗 明礬 一钱

阿芙蓉丁幾 半钱

右調和為灌腸劑

○方 馮 主治同前

硝酸銀 二钱 爲十 蒸餾水 八斗

右溶和為灌腸劑

○方 馮 主治下利

亞刺比亞漿 四斗 阿芙蓉丁幾 六滴 至 十二滴

硝酸銀晶 二钱

右調和為二四之灌腸劑

○麻醉灌腸劑 主治泄瀉及腸內窘迫

醋酸莫非水 二十密 吐根酒 三十密

阿仙藥丁幾 四十密 澱粉漿 二斗

右調勻先以微溫水洗肛內後注入此方

○方 馮 小兒頑固下利

阿芙蓉液 二滴 漿粉水 二斗

右調勻為灌腸劑

哺乳兒下利

○方 馮

甘汞 四 藥刺已末 二 白糖 半

右為散分八包每二時取一包冷水送下

○方 馮

吐根 二钱 浸出 單舍利別 半斗

右調勻每一時與一毡布七或方中加阿芙蓉

丁幾二滴

○方 馮

沙列布煎 三斗 葛斯加栗刺越幾 三斗

右調勻用法如前

○方 馮

沙列布煎 三斗 水製大黃丁幾 十滴

右調勻用法如前

○方 罌

甘汞 一八至二八

珊瑚石 或白糖 半匙

右為散分六包每三時與一包

○方 罌

沙列布煎 三勺

明礬 二八至五八

右調和每一時與一匙布也

○方 罌

沙列布煎 三勺

阿芙蓉丁幾 一滴或阿芙蓉越幾

八分大之一

右調勻用法同前

○方 罌

格綸僕 十八煎取液二勺

桂皮舍利別 半勺

右調和每一時與一匙布也

離乳兒下利

○方 罌 離乳兒泄瀉

亞刺比亞護謨漿 菩提樹花水 各半勺

過爾挖舍利別 三匙

右調和每一時與二茶匕

○方 罌 主治同前

沙列布煎 三勺

炭酸刺答斯 六八

右調和每一時與一匙布也

○方 罌

葛斯加栗刺 一匙至二匙浸出取液二勺乃至三勺

番木鱉越幾 一八至二八 過爾挖舍利別 一勺

右調勻每一時與一匙布也

○方 罌

吐根末 二八至三八

喇站石 半匙

白糖 二匙

右為散分十二包每三時與一包

○方 罇

蝟蛄石 齒香油糖

過爾托根末 各一 舍電阿芙蓉液 一滴

右為散分四包 每一時與一包

○石灰水 律後一北 右取半分加乳汁一北為飲料

○方 罇

實亞格日舍利別 半 麝香丁幾 二滴至四滴

蒸餾水 一

右調勻每三時服一琶布也

○方 罇

格綸僕末 十八至十二 沙列布煎 二

舍電阿芙蓉液 二滴 加密列舍利別 半

○方 罇

右調勻每一時服一琶布也

沙列布煎 三 大黃丁幾 二

桂皮水 一 白糖 一

右調勻每二時服一茶匕

○重炭酸曹達 至十二 右製劑四個取一劑和乳汁半杯

○燐酸曹達 律後一 右每朝和肉羹汁少許供用

○方 罇

硝酸毘私膠篤 六八至十二 白糖 一

右為散分六包二十四時間用盡

○機椰舍利別 後律 右每服一琶布也

○方 罇

硝酸銀晶 六分 蒸餾水 一

過爾托舍利別 十

右調和每服一茶匕二十四時間用盡

○忽弗滿拔爾撒非答一弓

右為塗擦劑

○方 燈

明礬 半匙至一匙

蒸餾水 五弓

右調勻供灌腸劑

○方 湯

肉豆蔻油

玫瑰軟膏 各二匙

忽氏拔爾撒非答 半匙至一匙

阿芙蓉丁幾 一弓

右調和為軟膏擦于腹部

○方 燈

硝酸銀晶 四分之二至半之

蒸餾水 五弓

右調和供灌腸劑

○方 燈

老利兒油

肉豆蔻油 各二匙

加密列油 半匙

右為軟膏擦于腹部

○方 燈

護謨溶水 二弓

水製幾那越幾 十五至半

右調和供灌腸劑

○方 燈

硝酸銀晶 四分之二

亞刺比亞漿 半弓

舍電阿芙蓉液 二滴

右調和供灌腸劑

○方 燈

護謨溶水 三弓

鹽酸鍊液 六滴至十滴

右調和供灌腸劑

虎狼痢 亞細亞霍亂

○方竄

托弗兒散 八分至十六分 白糖 一匙

右為散分六服每一二時一服

○方竄

阿芙蓉 二分至四分 白糖 四分

右為散分八服每一二時一服

○方竄

主治疼痛或嘔吐甚者 莫爾非 六分至一分 白糖 十分

右研和頓服

○方歷 主治同前

阿芙蓉越幾 十分 蒿苳越幾 半匙

阿仙藥末 一匙

右為三十九丸每服一丸至二丸日三次

○方歷 主治同前

雙鸞菊丁幾 六匙 阿芙蓉丁幾 三匙

蘆薈丁幾 二匙

右調勻小兒取十滴至十五滴婦人取二十

滴男子取二十五滴至三十滴葡萄酒或骨

喜一匕和服

○方歷 主治同前

老利兒水 二匙 舍電阿芙蓉液 三十滴

右調勻每半時服十滴至十五滴

○方歷

單寧酸 半匙 酒製桂皮水

亞刺比亞漿 各三分

右調勻每四時服一匕

○方歷

甘汞 六分 白糖 一匙

右為散分六服每一時一服

○方歷

龍腦 六八至十二分 白糖 一匙

右為散分六服每四分時一服

○方 卷

纈草根 二匙浸出液四勺 阿芙蓉丁幾 二十滴至三十滴

實亞格日舍利別 二匙

右調勻每一時服一食匕

○方 卷

硝砂精 一匙至二匙 野菊花水 或亞麻仁煎六勺

右調勻每半時服一匕

○鹽酸里沒奈垓 丹 虎狼痢第三期 方出于第扶斯

○越的兒阿片劑 藥 主治類虎狼痢 方出于斯

○斯的運氏鹽製劑 主治惡性虎狼痢

咯羅兒曹胃母 二十分 塩酸剝篤亞斯 七分

炭酸曹達 三十八分 水 十二匙

右調勻每半時服一劑

○方 卷 主治同前

哥羅叻 六分 銳烈燒酒 三匙 蒸餾水 二分

右調勻三四分服

○哥羅叻蓖麻油合劑 丹 主治虎狼痢性下利

哥羅叻 六滴至十二滴 複方龍腦精 二匙

蓖麻子油 三匙 護謨漿 三勺

右調勻頓服

○方 卷

龍腦 十八分 醋酸越的兒 二匙

阿芙蓉丁幾 半匙

右調勻每四分時或半時服十滴至十二滴

○方 主治及應既來而瀉白色液者

硝酸銀晶 二分 蒸餾水 四分

右溶和每二時服一食匕

○方 卷 主治同前

麝香 八分

香木鼈越幾

一分或阿
芙蓉二分

白糖 一分

右為散分四服每三時一服

○方〔畫〕 主治生力急沈衰者

麝香 八分

龍腦 四分

白糖 一分

右為散分二時每一二時一服

○魯西亞液 主治虎狼痢

纈草丁幾 二分

吐根酒 一分

舍電阿芙蓉液 一分 薄荷油 五滴

右調勻每一二時服二十滴至二十五滴

○方〔越〕 主治同前

番椒末 半勺

芥子末 一分

右加水為泥貼肚腹或下肢

○方〔掃〕 主治轉筋甚者

呀羅叻或龍腦精 二分

右塗擦于腓腸

○方〔登〕

白芥子油 二匙

亞爾箇兒 一分

右混和為擦劑

○方〔登〕

龍腦 十分

鷄子黃 一個

水製阿芙蓉 一分至
三分 水 六分

右混和為灌腸劑

下血

○方〔匣〕 主治虛性腸出血

刺答尼越幾 二分

明礬 半匙

桂 一分

右研和二分為一丸每三時服五丸至十丸

○方〔新〕 主治腸出血

鹽酸鍊液 半匙至二匙 蒸餾水 四至十六

右調勻、每半時服一食匕

○方 馬 主治虛性下血

硫酸鐵 一刃 阿芙蓉 一八至二八

亞刺比亞末 一刃

右為散、分十包、每服一包、一日三次

○明礬硫酸飲 丹 主治虛性出血、鉛毒疔

明礬 百八 覆盆子舍利別 六匙

酸味玫瑰浸 八勺

右調勻、每六時服二食匕

○方 罕 主治虛性出血

明礬 六八 阿芙蓉越幾 一八

阿仙藥 二十四八

右為散、製劑六個、二十四時間、用

○麥奴越幾水 馬 主治下血 方出于咯血

○麥奴越幾水 匣 主治同前 方出于吐血

○波食吐根散 匣 主治同前 方出于腸第扶斯

○方 選 主治腸出血

鉛糖 一刃 水 四勺 舍電阿片液 二十滴

右調勻、灌腸

疝痛

○方 我 大人小兒、疝腹痛

甘扁桃油 半 亞刺比亞末 一 茴香水 二

滿那慈劑 半 扁桃舍利別 一

右調勻、為乳劑、每二時服一食匕

○方 選 疝腹痛、在于胃下者

阿芙蓉 一八至二八 格綸僕末 四

右為散、分四包、葡萄酒半盞、和服

○方_聖 疝腹痛、兼風氣痞滯者

河狸香丁幾 忽弗滿鎮痛液 各一

右調勻每服十滴、至二十滴、日三四次

○方_聖 主治同前

甘硝石精 一匙 橙皮丁幾 二匙

右調勻、取十五滴、至三十滴、野菊花泡劑、和服、日二三次

○方_聖 主治同前

府利油 半匙 忽弗滿鎮痛液 一匙

右調勻、每二時、取十二滴、白糖和服

○方_聖 主治同前

過泥子油 半匙 甘硝石精 二匙

硝砂加過泥子精 一匙

右調勻每服十滴、至十五滴、日三四次

○方_聖 主治同前

加密列油 或薄荷油 十五滴 甘硝石精 三匙

右調勻、每二時、取十滴、至二十滴、白糖和服

○方_聖 主治同前

的列並油 五滴、至十滴

右糖水一匕和服、日數次

○莫非曹遠散_聖 主治同前 方出于氣管支液

○莫非注射方_聖 主治同前 方出于神經痛

○方_聖 主治神經性疝痛

莫爾非 一匙 老利兒水 一匙

續草丁幾 二匙 醋酸越的兒 十二滴

右調勻、每半時、服六滴、至八滴

○方_聖 主治併私的里性疝痛

續草丁幾 二匙 河狸香丁幾 半匙

右調勻、每半時、服十滴、至十五滴

○方_聖 主治疝痛、因風氣痞滯者

香竈丁幾 一弓 加密列油 一滴

阿芙蓉丁幾 半匙

右調勻、每半時服十滴、至二十滴

○方 歷 主治疝痛

硝酸蒼鈴 半 桂末 一 白糖 一

右為散、每食前服半茶匕

○越的兒阿片劑 通 主治疝痛、急性無炎下利

忽弗滿鎮痛液 一匙 銳烈燒酒 二匙

白糖 三匙 舍電阿芙蓉液 三十滴

薄荷水 四弓

右調勻、時々服一食匕

○哥羅叻阿片劑 再 劇性疝痛、及諸瘧瘵病

哥羅叻 五密至 流動阿片越幾 十五密至

十密 罌粟舍利利 一匙

達刺侃篤漿 一弓

右調勻、夜中頓服

○方 再 主治風氣疝

炭酸麻偈涅失 八十 阿芙蓉液 三十

越的兒精 三匙 薄荷水 六弓

右調勻、臨時服四分之一

○安沒尼合劑 再 主治疝痛劇甚者

硝砂香竈精 三十 炭酸麻偈涅失 二十

哥羅叻精 一匙 薄荷水 十二匙

右調勻、頓服

○方 再 主治腸瘕、肝石疝、瘕性尿閉、瘕頓腸墜

葭苈越幾 三人 葭苈末 四人

甘草越幾 一弓

右研和、為六丸

○方 越 疝痛兼便秘者

蘆薈 大黃 各一 巴豆油 二滴至

右為三十丸、每二時服一丸

○方 痿麻質性、或痛風性疝痛

硫黃華

炭酸麻偈涅夫亞 各二

阿芙蓉

吐根末 各三

右為散、分十二包、每服一包、日四次

○方 瘰癧性疝痛、胆石、瘡頸腸隆

炭岩越幾 一匙

家猪脂 一匙

右調勻、外用

○方 主治同前

亞篤魯比涅 四、亞爾箇兒 一二滴、溶解

家猪脂 四匙

右調勻、為軟膏

○方 主治肝病、腎疝、腸疝、及子宮疝

青酸加里 一匙

哥羅防 一匙

甘扁挑油 二匙

右調勻、塗擦于痛處

○方 主治同前

哥羅防 一匙

卵黃 一個

蒸餾水 四匙

右調勻、為灌腸劑

鉛毒及銅毒疝

○方 主治鉛毒疝、及關節痛

阿芙蓉

三八至六八、或 醋酸莫非 二

白糖 一匙

右為散、分六包、每一時服一包

○方 主治同前

番木鱉越幾 一匙 白糖 四匙

右為散、分八包、每服一包、日三次

○方 主治同前

純私的列幾尼 半匙

白糖 五匙

右為散、分十包、每日服二包

○苦水

六分、方出 于便秘

主治鉛毒疝

右一日三四回分服

○硫酸瀉利塩水〔每〕 主治鉛及銅毒症方出于

○病院白飲〔每〕 主治鉛毒症方出于

○方〔每〕 主治鉛毒症、兼頑固便秘者

巴豆油二滴至六滴 甘扁挑油一 水四

垂刺比亞末一 白糖二

右調勻、每一時服一茶匕

○方〔無〕 主治鉛毒症

沃度加里十五 水三 單舍利別三

右調勻、一日用

○沃度加里合劑〔每〕 主治同前方出于

○方〔每〕 主治同前

沃實護三 單舍利別三 淨水二

右調勻、時々服一茶匕

○方〔無〕 主治同前

抱水酸化鉄 磷酸加爾基各半

右為散分六包、每服一包、日三次

○方〔每〕 主治鉛毒症、鼓脹、蟻蟲

龍腦一 的列並油二 阿列襪油一

卵黃一個 大麥煎十

右調勻、為灌腸劑

○硫黃浴〔每〕 主治鉛毒症方出于

小兒疝痛

○方〔每〕

茴香水二 大黃丁幾一

麻僞涅失亞十五 橙皮舍利別二

右調勻、每服一茶匕

○方〔每〕 小兒疝痛、因酸敗液者

茴香浸 茴香水各二 麻僞涅失亞十五

舍電阿芙蓉液二滴 單舍利別半

右調勻、每二時服一茶匕

○方 證

甘汞 四分八一至三分八 白糖 十八

右為散、製劑六個、每二三時、服一劑

○方 證 小兒疝痛

甘汞 半八至一八 硼砂石 半匙

茴香油 滴一二

右為散、分六服、每一時、與一服

○方 證

梅那浸劑 一匙 麻偈涅失亞 十八

野菊花舍利別 三匙

右調勻、每服一匙布已

○方 證

硫酸規尼 二八 稀硫酸 四滴

蒸餾水 二匙 單舍利別 二匙

右調勻、每二時、服一匙布已

○方 證

纈草根 十八、浸出 礮砂加過泥子精 二十

單舍利別 二匙

右調勻、每服一匙布已

○方 證

阿魏 二八至四八 野菊花浸 一 護謨末 五

右調勻、為灌腸劑

○方 證

鎮痙軟膏 半匙 礮砂加過泥子精 一匙

右調勻、塗擦于腹部、日二次

鼓脹 風氣痞滯

○方 證 主治鼓脹

複方梅那浸 四匙 薄荷水 一匙

忽氏鎮痛液 十滴 橙皮舍利別 半勺

右調勻、每半時服一食匕

○方權 主治同前

大黃末 重碳酸曹達 各五

加密列油糖 或橙皮油糖 半勺

右為散、頓服

○方寫 主治風氣疝

蓖麻子油 一勺半 香竈丁幾 一匙半

茴香油糖 三匙 桂皮水 三勺

右調勻、三四分服

○箇布蘭度氏小兒驅風和劑電

炭酸曹達 八勺 過泥子油 一滴

橙皮舍利別 一匙 茴香水 一勺

右調勻、每服一茶匕

○越的兒合劑每 主治風氣苦惱

越的兒精

哥羅仿精 各三匙

肉豆蔻精 二匙

複方益智丁幾 六匙

葛縷子油 十二滴

達刺侃篤漿 三勺

薄荷水 八勺

右調勻、每服二三食匕、日數次

○竜胆越的兒大黃劑每 疝痛、及風氣痞滯

大黃丁幾 一勺 複方竜胆丁幾 二勺

硝砂香竈精 忽氏鎮痛液 各四匙

牙埋加椒水 四勺

右調勻、每服二食匕、日數次

○牛膽丸每 主治風氣痞滯、兼便秘者

格魯董菲阿斯丸 精製牛膽

忽布越幾 各二十五

右為十二丸、衣銀箔、每日午後服一丸

○又方每 主治同前

加耶普的油 四密 乳糖 二匙

右研和加複方蘆薈煎一匙半早朝服

○方寫 主治鼓脹

過泥子 二匙浸出 取液六分 過泥子舍利別 半分

右調勻每一時服一食匕

○方寫 主治風氣痞滯胃瘕

過泥子油 十五滴 桂皮丁幾

舍電阿片液 各一 茴香油糖 三匙

薄荷水 三分

右調勻每服一二食匕日三次

○方寫 主治風氣痞滯

薄荷水 四分 煨製麻樞涅夫 一匙

阿魏丁幾 各一 橙皮丁幾 各一

薄荷油 各四滴 茴香油 各四滴

右調勻每服一食匕

○方寫 主治風氣症、痙攣

阿魏 一匙半 炭酸安沒尼 一匙

匪刺比護謨 一匙 過泥子水 或野菊花水

橙皮舍利別 半分 醋酸越的兒 一匙

右調勻每二時服一食匕

○酸性幾那合劑 每 風氣症 方出于關節病

○硝塩酸合劑 每 主治同前 方出于尿

○結列阿曹篤丸 每 主治同前 方出于嘔吐

○木炭煉劑 每 主治同前 方出于下利

○菟麻油芸香灌腸劑 每 主治風氣痛

芸香油 六滴 菟麻子油 一匙

阿魏丁幾 二匙 燕麥煎 七分

右調勻為灌腸劑

○方寫 主治鼓脹、風氣症

的列並油 三 龍腦 一 阿列襪油 二

卵黃 一個 大麥水 十勺

右調勻為二三回之灌腸

○方 腹脹劇甚者

龍腦精 或菲阿斯油 或加密列油

右塗擦于全腹

便秘

○方 主治便秘

旃那浸 覆盆子舍利別

右調勻三回分服

○旃那滋劑 主治同前

旃那葉末 酒石英 各一勺

過泥子末 或茴香末 梅肉 一勺半

單舍利別 適宜

右調勻為滋劑每服一匕

○方 主治同前

大黃 藥刺巴 大黃舍利別 適宜

右為十二丸衣桂末每二時服二丸

○方 主治同前

大黃 孕糞酒石 各一匙半

蘆薈 蒲公英越幾 適宜

右為六十九丸每服五丸日三次

○小兒下劑 小兒便秘

大黃末 炭酸麻偈涅失 六十八

茴香水 一勺半

○方 主治同前

蓖麻子油 炭酸麻偈涅失 一匙

薑舍利別 二勺

右調勻、每二時服、二食匕

○牛膽劑 丹 主治燥屎鬱滯于直腸者

炭酸麻脛涅失 三十 藥刺巴丁幾 二

稱那丁幾 一 煎熬牛膽 三十

龍腦水 四

右調勻、先服其半、三時後服其餘

○瀉利塩硫酸鐵劑 丹 主治便秘、兼衰弱者

瀉利塩 二 硫酸鎂 四

稀硫酸 十五滴 牙埋加椒水 二

括失亞越幾 二十

右調勻、早朝頓服

○苦水 總 主治慣習便秘

瀉利塩 半 水 四

右溶和、早朝空心頓服、或三四分服

○硫酸芒硝水 丹 常癖便秘、兼風氣痞脹者

芒硝 半 稀硫酸 一 複方竜胆浸 六

右調勻、朝餐後、或午餐後、服三食匕

○方 區 下劑

芒硝 一 水 六 重炭酸曹達 一

枸橀汁 一 白糖 六

右調勻、每二時服、二食匕

○芒硝蒲公英劑 丹 主治便秘、因膽汁分泌過

止者 方出于

○緩下劑 區

硫黃華 一 酒石英 過泥子油糖 各半

右為散、每三時服、一茶匕

○複方蘆薈丸 主治便秘

蘆薈 二 沒藥 一

洎夫藍 半 舍利別 適宜

右研和、為丸

○複方蘆薈煎 主治同前

甘草膏半 蘆薈 沒藥

洎夫藍 炭酸加里 各一匙

右水煎三時、濾過、取液十二分、每服一食匕

○方 蘆 主治便秘

蘆薈 大黃越幾

藥刺巴脂各半 格魯董篤越幾半

右為三十九丸、每夜臨卧、服二丸

○方 馬 主治同前

格魯董篤越幾一匙 甘汞一刃

生薑末十五 杜松子油十滴

右研和、為二十九丸、每服二丸、至四丸

○方 憲 主治頑固便秘

格魯董篤一匙浸出 茴香油糖半

取液六分 右調勻

○複方蘆甘沒扭散憲 主治頑固便秘、及水腫

蘆甘沒扭四分 藥刺巴末三分 生薑一分

右為散、每服十八日、二三次

○方 馬 下劑

巴豆油六滴 甘扁挑油一匙 亞刺比護謨二

白糖半 常水三分

右為乳劑、每一時、服一二食匕

○方 憲 主治頑固便秘、或急要通暢者

巴豆油四滴 蒸餅心適宜

右調勻、為四丸、日服一二丸

○皓礬番木鱉丸憲 主治常癖便秘

皓礬二十四 番木鱉越幾二

野菊花越幾三十

右為十二丸、每服一丸、日三次

○番木鱉丸丹 主治常習便秘、因腸管衰弱、及

粘液分泌不足者

番木鱉越幾 三錢 吐根末 六錢

複方大黃丸 或蘆薈阿魏丸 四十錢

右為十二丸、隔夜臨臥、服二丸

○又方 主治結腸運滯急慢者

番木鱉越幾 二錢 蘆薈越幾 六錢

大黃越幾 二十錢

右為六丸、每日午餐後、服一丸

○又方 主治常習便秘

菲阿斯越幾 四十錢 番木鱉越幾 三錢

複方格魯莖丸 或蒟刺巴脂 二十錢

右為十二丸、每夜服一丸

○單純灌腸劑 主治單純便秘及蟻姦

食塩 一錢 大麥煎 十二錢

右調勻、為灌腸劑

○又方 主治便秘、因燥屎鬱滯者

橄欖油 六錢至八錢

右微溫、注入于直腸、十二時間、令停留

○又方 主治同前

橄欖油 一錢 瀉利塩 半錢 大麥煎 十二錢

右調勻、為灌腸劑

○又方 主治同前

石鹼 一錢 溫湯 十二錢

右調勻、微溫灌腸

○蓖麻油的列並灌腸劑 主治頑固便秘

方出于尿毒症

○巴豆油灌腸劑 主治同前

巴豆油 六滴 蓖麻子油 一錢

的列並油 二錢 大麥煎 六錢

右調勻、為灌腸劑

○食鹽灌腸方 越

食鹽 扁桃油

石鹼 或舍利別 水 或十二分

右調勻

○油性灌腸方 越 直腸過敏者宜之

蓖麻子油 或橄欖油 或亞麻仁油

護謨末 一匙 水 四勺或六勺

右調勻

○鹽性灌腸方 越

芒硝 或瀉利塩 水 十二分

右調勻

○峻性灌腸方 越

梅那末 半勺至一勺 浸出液 十二分 芒硝 或瀉利塩 一分

右調勻

○又方 越

葯刺巴末 護謨末 各二分 水 十二分

右攪和

○又方 越

蘆薈 半匙 或蘆甘 水 十二分

右調勻

○方 靈 主治便秘 因于直腸弛緩者

番木鱉越幾 一分 單軟膏 一分

右混和 插入肛內

腸管壅塞 痔瘻腸墜 及吐糞病

○方 越 腸管未全閉塞者

蓖麻子油 一分 巴豆油 一二滴

右頓服 或二回分服

○甘汞下劑 越 主治同前 方出于腦 欬衝

○方靈 主治炎性脘頤腸墜及吐糞病

甘汞 四錢 五錢 至六錢 白糖 半斤

右為散製劑四個每二時服一劑

○方靈 主治同前

葇苔葉 一錢 甘汞 二錢 白糖 半斤

右為散製劑四個每二時服一劑

○方靈 主治痙攣性脘頤症

吐根末 二錢 白糖 四斤

右為散分八服每半時一服

○方靈 主治脘頤腸墜兼痙攣及風氣者

舍電阿芙蓉液 二十滴 忽弗滿鎮痛液 一錢

薄荷水 四錢

右調勻每五分或六分服一食匕

○方氏 主治吐糞病

阿芙蓉 二錢 巴豆油 二滴 纈草油糖 十錢

右為散製劑三個

○方靈 主治同前

梅那下泄浸 三錢 野菊花舍利別 半斤

右調勻每服一食匕

○方靈 主治脘頤腸墜諸方無效者

煙草葉 三錢 大黃 二錢

右注熱湯適宜浸漬瀝過取液八錢加橙皮

舍利別一錢每一時服一大食匕

○方靈 主治慢性閉塞症因硬屎鬱滯者

亞麻仁油 二錢 護謨末 適宜

加密列水 五錢 硫酸苦土 一錢

枸橼汁 六錢 阿片越幾 二錢

覆盆子舍利別 一錢

右調勻每四分時服一食匕至奏效

○方靈 主治同前

亞麻仁油 半斤至一斤

鷄子黃 適宜

加密列水 或泉水 八分

硫酸曹達 或瀉利塩 一分

大黃舍利別 一分或滿那舍利別 一分半

右調勻、為乳劑、每一時、服二食匕

○方 治陰狐疝

蓖麻子油 一 鷄子黃 二 泉水 十一

瀉利塩 半斤 滿那舍利別 一分

右調勻、為乳劑、每一時、服二食匕

○方 治同前

番木鱈丁 幾 五滴至十滴 蒸餾水 二斤

右調勻、每四十分時、服一茶匕

○方 治腸管閉塞、百方無効者

生水銀 一、二、三、至八分

右頓服

○阿片 莨菪丸 腸壅塞、疼痛甚者、方出于癌腫

○牛肉浸 治腸壅塞虛憊者

牛肉 細到者 水 一巴即二十分

右納壺置火邊、溫浸二三時、而上火煮沸十分

五分、去泡沫、供用

○冷肉汁 治同前 方出于僕病

○牛肉濃煎 治同前 方出于肺病

○鷄卵乳酥牛肉浸 治同前 方出于肺勞

○牛肉浸乳酥灌腸方 治腸壅塞、嘔吐劇

甚者 方出急性胃狀衝

○方 治同前

莨菪葉 一、二、三、至一、二、半 熱湯 適宜

右浸出、取液八分、加亞麻仁油一二食匕、為灌腸劑

灌腸劑

○方 治慢性箭頭腸墜

煙草葉 一、二、三、至一、二、三、沸湯 浸出、取液七分 亞麻仁油 一分

右調勻為灌腸劑

○方〔堯〕 主治瘡頸腸墜

煙草葉 二錢

葭苈葉 半斤

右沸湯浸出取液七升加亞麻仁油一升為灌腸劑或加食塩一匕于劑中

○方〔留〕 主治虛性瘡頸腸墜

吐酒石 四八至六八

蒸餾水 四升

右溶和為灌腸劑

○方〔鑿〕 主治瘡頸腸墜

密陀醋 四升

蜀葵根煎 四升

舍電阿芙蓉液 十二滴

右調勻為灌腸劑

○葇麻油芸香灌腸劑〔丹〕 主治腸墜塞

方出 疝痛 方出尿毒症

○蓖麻油的列並灌腸劑〔丹〕 主治同前

方出 便秘

○巴豆油灌腸劑〔丹〕 主治同前

○葇若阿片塗劑〔丹〕 瘡頸腸墜劇痛者 方出 痛風

○方〔急〕 方治同前

葇若越幾 一錢

菲阿斯油 半升

的列並油 二錢

右調勻為擦劑

○方〔業〕 主治痙攣性瘡頸症

葇若越幾 一升

家猪脂 一升或菲阿斯油 三升

右調和擦入于腹部

○方〔搜〕 主治同前

硝砂加龍腦揮發膏

菲阿斯油 各一

舍電阿芙蓉液 二錢

○方 主治瘡頸腸墜要通暢者

右調勻振蕩每半時取二茶匕塗擦于腹部

巴豆油 十滴至三十滴

白罌粟油 三十滴

右調勻塗擦于臍邊

○方 主治瘡頭腸壁

水 十勺

阿片越幾 半勺

鈴糖 半匙

龍腦精 二十滴

右調勻為浴藥

○方 何 腸壁及小兒臍內腸壁

越的兒 二匙

燒酒 二勺

老利兒油 半勺

右調勻外用

腸蟲

蛔蟲

○珊篤尼驅蟲劑 五

珊篤尼 二勺至六勺

乳糖 十五勺

右為散早朝乳酥一食匕和服六時後服複方蘆薈煎一勺或分四服每二時一服

○驅蟲蝕劑 結

珊篤尼 十勺

葯刺巴末 二匙

單舍利別 三勺

右調勻每三時服二茶匕

○方 鑑

珊篤尼 六勺

淑格刺度 一匙

護護漿 適宜

右研和為十二錠一二歲兒每服三錠日二次二歲至四歲者每服四錠日二次

○方 越 糖

珊篤尼

甘秉 各四勺

大黃末 半匙

白糖 一匙

右為散分八服一日三四服

○驅蟲丸 寫

攝綿施那 二匙

葯刺巴 一匙

亞爾鮮越幾 半匙

水 適宜

右研和二勺為一丸衣茴香末朝夕服六丸

○方 鑑

攝綿施那 續草根 各一兩

甘秉 二兩 白糖 二兩

○方 右為散分四包每服一包日二次

攝綿施那 三錢 藥刺巴末 半錢

淑格刺度末 六錢 護謨漿 適宜

右為四十球每服四球小兒一球日三次

○私篤兒屈氏驅蟲劑

攝綿施那 二錢 藥刺巴末 半錢

續草末 一錢 海葱醋蜜 適宜

右為散劑每三時服一茶匕

○梅綿施那 一錢

右浸出取液十錢數次分服

○方 罌

○甘頰 六錢 藥刺巴末 乳糖 各一

右為散分十二服日四回一服

○方 罌

蓖麻子油 三錢 的列並精 一錢半

右調勻每朝二回服二三食匕

○方 罌

藥刺巴根末 二錢 續草根末 半錢

右為散分八服每朝空心一服十二歲乃至

十五歲之服量

○方 罌

太那散點謨 一錢 家猪脂 半錢

右調勻塗擦于腹部

○方 罌

○柘榴根皮 新鮮者 一錢

右注水十二錢浸漬十二時煮取液六錢加

橙皮舍利別半錢早朝空心三回分服三時

後每三時服蓖麻子油一食匕至得下
○方罈

柘榴根皮一斗半 綿馬根半斗

右注沸湯二斗浸漬二十四時煮減半加橙
皮舍利別半斗每半時服一食匕

○柘榴根驅蟲劑 罈

柘榴根皮百八十 薩拔實刺末 六斗

芳香散 六十八

右為散分六服每二時一服後用鹽性下劑

○方罈

柘榴根皮越幾半斗 綿馬越幾二斗

右分三十個二三時間以煎茶一碗服之

○方罈

綿馬根末 三斗至 蜂蜜 或舍利別 適宜

右為散劑分二服朝夕空心各一服三四日

持長或前夜絕食翌朝空心隔一時服盡二
時後取左方頓服

甘黍 藤黃 藕甘沒扭 各十二

右研和

○綿馬驅蟲劑 罈

綿馬流動越幾 二十滴或 水 四斗

薑舍利別 二斗 達刺侃篤漿 二斗

右早朝空心頓服四時後用蓖麻子油

○方罈

綿馬越幾 綿馬根末 各一斗

右為二十丸夜間臥前隔二時服十丸

○方罈 小兒方

綿馬越幾 半斗 玫瑰蜜 半斗

右為散劑隔半時二回分服

○方罈

甘草 二兩 藥刺巴末 二兩 綿馬越幾 二兩
白糖 三兩 達刺侃篤漿 適宜

○方 寫 右為三十九錠、朝夕各服五錠、至八錠

綿馬越幾 一兩 綿馬末 半兩

甘草 二兩 野菊花越幾 適宜

右為三十六丸、早朝空心、三回服、四丸、薄暮、用蓖麻子油

○方 寫

流動綿馬越幾 一兩 攝綿施那末 適宜

右為三十丸、早朝空心、服十五丸、午後再服十五丸、後用蓖麻子油

○格烏曹 一兩至一兩半

右水浸、取液八分、加蜂蜜一分、早朝空心、三四分服、二時後與下劑

○格烏曹驅蟲劑 寫

格烏曹末 二百四十 蜂蜜 適宜

右為祇劑、早朝服其半、六時後服其餘

○方 寫 四歲乃至六歲者 格烏曹末 一兩半至二兩半 泉水 一分半

單舍利別 半兩

右調勻、隔一時、二回分服

○驅蟲劑 寫

錫末 二兩 亞爾鮮越幾

為刺巴末 各一兩 橙皮舍利別 適宜

右為十球、每一時服一個

○方 寫 的列並油 一兩 煖製麻偏涅失 二兩

綿馬越幾 半兩 蜂蜜 一分半

右調勻、每一時服一食匕、後服下劑

○方 罌

纈草根十八 藥刺巴 梅那葉各五

右為散製劑三個每朝服一劑

○葛墨刺驅蟲劑 罌

葛墨刺六十八至百八十八 橙皮舍利別二

達刺侃篤漿一 水三

右調勻早朝頓服六時後服下劑

○的列並驅蟲劑 罌

菟麻子油四 的列並油三 水四

達刺侃篤漿一 薑舍利別一

右早朝空心頓服

燒蟲

○方 越 主治腸內風氣痞滯或燒蟲

的列並油一 亞刺比亞末二 水六

右調勻為灌腸劑

○方 越 主治燒蟲或風氣痞滯

阿魏一 水六

右調和灌腸

○方 罌 主治燒蟲及單純便秘

食鹽一 大麥煎十二

右調勻為灌腸劑

○鐵蘆薈灌腸劑 罌 主治燒蟲

鹽酸鍊丁幾一 拈失亞越幾五

蘆薈越幾二 拈失亞浸八

右調勻為灌腸劑

○方 罌 主治同前

亞爾鮮 芙蓉 薩毘那各半

右水煎取液十一加菟麻油一為灌腸劑

○單純灌腸劑 罌 主治同前方出于便秘

直腸症

痔疾

○方 痔疾諸症

酒石英 半勺

蒲公英越幾 三錢

甘草膏 一錢

泉水 四勺

右調勻、每二時服一食匕

○方 治痔疾育痔等

瀉利塩 一勺

迷栗薩水 四勺

大黃丁幾 一勺

右調勻、每服二食匕一日二次

○方 治痔疾結核、出血閉止者

硫黃華

酒石英

白糖 各四錢

橙皮油 四滴

右為散、每服一茶匕、日四次

○複方硫黃散 治痔疾諸症

硫黃華 二錢

酒石英 半勺

炭酸麻 伍分

白糖 二錢

茴香油 六滴

右為散、每服一卵匕、日二三次

○方 治痔疾家下劑

梅那砥劑 四勺

硫黃華

酒石英 各一勺

橙皮舍利別 適宜

右為砥劑、每服一食匕、日三次

○下泄煉劑 治痔疾及肝機怠慢

梅那煉劑

蒲公英越幾

酒石英 各一勺

右調勻、每朝食前一時服一茶匕

○方 治炎性痔疾有疼痛者

甘頰 二十分

阿芙蓉末 五分

吐根皮末 十分

白糖 一錢

右為散、分八服、每一時一服

○複方甘草散 〔卷〕

梅那葉 甘草 茴香

硫黃華 白糖 各等分

右為散每服一茶匕日一二次

○方

硫黃華 二匙 孕礬酒石 半斤

枸橼油糖 白糖 各三匙

右為散每服一茶匕一日二三次

○方 〔摺〕 主治痔疾兼便秘者

蘆薈 大黃越幾

大黃末 各半匙 格魯董篤越幾 六八至十二八

右為六十九丸每日服三四丸

○百布失涅蘆薈丸 〔摺〕 主治痔疾 方出于甲弱

○番木鱉丸 〔摺〕 主治同前 方出于便秘

○單純灌腸劑 〔摺〕 主治同前 方出于便秘

○麻醉灌腸劑 〔再〕 主治直腸炎 方出于下利

○方 主治痛性及炎性結核痔

亞麻仁油 或白罌粟油 或菲阿斯油 或阿列機油 或椰子油 一寫

右為塗擦劑

○方 主治同前

亞麻仁油 半寫 舍電阿芙蓉液 半寫

右為塗擦劑

○方 主治炎性痔疾疼痛劇甚者

亞麻仁末 茴香末 各一寫

罌粟花 野菊花 各一握

右加牛乳適宜煮為羶布

○方 主治同前

阿芙蓉越幾 半寫 莫勞越幾 半寫

水銀軟膏 半寫

右調和外用

○方 籀 主治同前

硫酸莫非 十五分 炭酸鈔末 半分

蔓陀羅軟膏 一分 橄欖油 適宜

右為軟膏外用

○方 阿 主治炎症痔疾

鉛糖 一分 亞刺比亞漿 玫瑰軟膏 各半分

右調和、外用

○方 主治炎症痔疾及痔疾潰瘍

蓬砂 半分 家猪脂 半分

右為軟膏外用

○方 主治弛緩性痔疾結核

沒食子末 一分 家猪脂 半分

右調和為軟膏

○方 氏 主治痛性及出血痔

明礬末 半分 牛酪 新鮮無塩者 一分

右為軟膏外用

○方 越 主治痔漏及肛門瘍

單寧 一分 家猪脂 或甘油 一分

右調勻為軟膏

○方 越 疼痛劇甚者

單寧 十分 阿芙蓉 五分 脂 半分

右研和貼于肛門

○方 越 痔疾有出血者

塩酸鈔液 一分 或塩酸鉄 水 四分

右調勻注入于直腸

○方 越 主治痔疾

密陀醋 半分 家猪脂 一分

右調勻外用

○方 爲 主治劇性痔血

檳皮 一分 以泉水 二分 明礬 三分

阿芙蓉酒 一匙半

右調勻為射注劑

○方寫主治同前

家猪脂 半斤

龍腦 半匙

沒食子末 四刀

阿芙蓉丁幾 一匙

右調和為軟膏

○收清洗劑再主治痔瘡方出于

○病院赤洗劑再主治同前方出于

直腸潰瘍

○方選主治直腸潰瘍

硝酸銀 一匙至二匙

蒸餾水 一匙

右溶和注射于直腸日一二次

○方選主治同前

皓礬 十五分

水 一匙

右溶和灌腸

○皓礬軟膏丹主治同前

皓礬 百二十分

單軟膏 一匙

右研和外用

○方寫主治直腸潰瘍有劇痛者

哥羅方 一匙半

亞鉛華 二匙

橄欖油 一匙

白蠟 半匙

右煉和為軟膏貼于患部

○方選主治同前

黃岩越幾 四分至六分

單軟膏 二匙

右調和塗擦于肛圍

脫肛

○方詞主治小兒脫肛

番木鱉越幾 一匙至二匙

右調勻每四時服六滴至十滴

○方選小兒脫肛兼裏急下利者

葛斯加栗皮 一匙至二匙 番木鱉越幾 一八至二八

亞刺比亞漿 蜀葵舍利別 各一

右先取前一味沸湯浸出取液三了、加後三味振盪每四時服一匙布已

○方 鑿 主治脫肛

番木鱉越幾 半 蒸餾水 三

單舍利別 半

右調勻每一時服一匙布已

○亞鉛番木鱉丸 丹 主治直腸弛緩 方出德毒鬱憂

○方 越 主治脫肛

檳皮 或水楊皮或七葉樹皮一 泉水 十二了或十六了

右煮而減半、瀝過取液為洗劑、或射注劑

○方 珊 主治同前

赤石脂 柘榴花 各半

右為散、摻布于患部

○方 鑿 主治同前

單寧酸 半 蒸餾水 一

右外用

○方 珊 主治弛緩性脫肛、兼出血者

柘榴花煎 四 幾那煎 二

硫酸亞鉛 半 阿芙蓉丁幾 一

右調勻、投于浴湯

○方 主治直腸脫垂、及出血痔

沒食子 一 泉水 一

右煮取液一匙、分二個、為灌腸劑

○方 主治同前

明礬 半 沒食子煎 六

阿芙蓉丁幾 二十滴至三十滴

右調勻、為灌腸劑

○方 鑿 主治脫肛

硝酸私的列幾尼十二分

右撒布脫肛大約施之三四回乃有效

直腸痙攣

○方置主治痙攣性直腸狹窄

澱粉

菲阿斯越錢 各一錢

右加粘漿適宜為聖藥插于直腸

○方 主治同前及頑固秘結

白石鹼 一錢

越刺的留謨 二錢

右揀和為聖藥

○方卷主治肛門括約筋痙攣性狹窄

黃岩葉 一刃

纈草 一錢

右以熱湯六分浸出為灌腸劑

○沃度加里膏每主治括約筋刺衝症

黃岩擦劑

或双窩菊擦劑二錢

沃度加里膏 一錢

右混和為塗擦劑

○方可主治直腸及尿道痙攣性窄閉

菲阿斯葉 一刃

阿芙蓉 二錢

澱粉 半錢

右調和注熱湯二酒盞濾過為灌腸劑

○方置主治直腸痙攣、急疼痛者及腸蟲

甘汞 一錢二分

亞刺比亞末 半錢

纈草水 一錢半

右調勻為灌腸劑

直腸癌腫

○阿片菲阿斯丸每主治直腸癌腫方出于

○莫非飲每主治同前方出于

○莫非哥羅方大麻合劑每主治同前方出于

○雙鸞菊阿片丸每主治同前方出于

○阿片聖藥每直腸刺衝症或疼痛或癌腫

阿芙蓉末 一錢至二錢 石鹼 十錢

右調勻為聖藥

○又方〔再〕主治直腸癌

阿片越幾一八至三八 莫若越幾半八

椰子酪二十八

右調勻為聖藥

○麻醉灌腸方〔再〕主治同前

流動阿片越幾二十密至一匙 莫若丁幾十五密至三十密

澱粉漿二勺

右調勻為注入劑

○沃度吩聖藥〔再〕主治直腸癌及自他疼痛

沃度吩三八至八八 椰子酪二十八

右研和為聖藥

○方〔修〕主治直腸癌腫

失鴉答葉二匙

右水煎取液十二勺、注射于直腸、日三次

肛門症

肛門搔癢

○下泄煉劑〔再〕主治肛門搔癢及痔疾

硫黃煉劑二勺 蒲公英越幾一勺

右調勻、每日朝飯前服一茶匕

○參兒丸〔再〕主治肛門搔癢

參兒一勺 香竈散半勺

右五丸為一丸、每服二丸、至三丸、一日三次

○大黃水銀菲阿斯丸〔再〕主治同前方出于頭痛

○砒石劑〔再〕主治同前方出于尿毒症

○沃度鐵合劑〔再〕主治同前方出于風濕

○單純灌腸劑〔再〕主治同前方出于便秘

○硼砂甘油洗劑〔再〕主治同前方出于陰痒

○鎮靖洗劑〔再〕主治同前

煙草 百二十分 熱湯 一已

右浸出一時、濾過、供用

○青酸洗劑 〔母〕 主治同前

民埜列里精 一分 稀青酸 一分半

魯別里亞浸 八分 以六十分浸出者

右調勻、塗擦于患部、日二三次

○方 〔馬〕 主治同前

阿芙蓉 半匙 家猪脂 六匙 阿列機油 三

右為軟膏、外用

肛門披裂

○方 〔憲〕 主治肛門披裂、粘膜腫脹、疼痛甚者

刺答尼越幾 一分 刺答尼丁幾 或並爾箇

淨水 六分

右調勻、注于直腸

○方 〔愛〕 主治同前及肛門瘻

醋酸鉛 黃岩越幾 各半 家猪脂 一分

右為軟膏、塗撒系、挿于肛門

○方 〔守〕 主治肛門披裂

阿芙蓉 皓礬 各六分 家猪脂 二分

右為軟膏、外用

○方 〔不〕 主治肛門披裂

亞鉛花軟膏 半分 硝酸銀 半刀、至

右為軟膏

腹膜炎

○方 急性腹膜炎

甘扁挑 搗碎者 黑櫻實水 六分

舍電阿芙蓉液 二十滴 白糖 六分

右調勻、為乳劑、每一時服一匕

○方 治同前

醋酸莫爾非 八分六一至 白糖 半勺

右為散製劑六個每二時服一劑

○方 治同前

老利兒水 二匙 醋酸莫爾非 半八一至二八

右調勻每二三時服十滴至二十滴

○方 治同前

萬苜水 一勺 亞刺比亞漿

橙花舍利別 各半 阿芙蓉丁幾 二十滴

右調勻每二時服一茶匕小兒服量

○方 治同前

阿芙蓉 半八至 白糖 半勺

右為散製劑八個每二三時服一劑

○阿芙蓉丁幾 一匙

右先服十五滴至二十滴後每一時服五滴

○方 治急性性腹膜炎及腸炎

甘汞 六八至 阿芙蓉 一八半 白糖 一匙

右為散分六服每一二時一服

○雙鸞菊阿片丸 治腹膜炎

雙鸞菊越幾 阿片越幾 各八八

非阿斯越幾 十六八

右為八九每四時或八時服一丸

○方 治腹膜炎

綠藜盧丁幾 五密至 水 一勺

右為一服每三時服一劑

○方 炎候減退滲出液瀦留者

甘汞 實麥答利末 各二 白糖 一匙

右為散分六包每二時服一包

○方 治同前

實麥答利葉 十五浸出 沃度加里 十五 取液六勺

右調勻、每一時、服一食匕

○沃鐵肝油劑 〔冊〕 慢性腹膜激衝 方出于肺勞

○依蘭香親尼膠 〔冊〕 主治同前 方出于肺勞

○次亞磷酸曹達飲 〔冊〕 主治同前 方出于肺勞

○方 〔冊〕 主治急性腹膜激衝

荳蔻葉 或煙草、半錢、一錢、至二錢

右注沸湯浸出、取液八分、為二個之灌腸劑

○方 〔冊〕 主治同前

水銀軟膏 一牙 荳蔻越幾 一錢

右調和、攤大布片、貼于全腹

○荳蔻塗劑 〔冊〕 方出于胆石 主治同前

○黃岩河片塗劑 〔冊〕 方出于痛風 主治同前

○方 〔冊〕 生滲出液于腹腔內、若

羌菁膏 或沃實丁藥

右塗布于腹部

○解凝軟膏 〔選〕 主治同前 方出于腺病

結核性腹膜激衝 即疝勞

○方 〔選〕

幾那越幾 一刃 蒲公英越幾 一錢

酒石葉液 半錢 茴香水

大黃舍利別 各一牙

右調勻、每服一茶匕、日四次

○方 腹中有堅核者

失樞答越幾 半刃、至十五分 桂皮水 一牙

橙皮舍利別 半牙

右調勻、每服一茶匕、日二次、至三次

○方 〔選〕 主治結核全成者

甘汞 十二分 金硫黃 十分 大黃末 十六分、至三十二分

喇站石 十六 白糖 四刀

右為散分八包每服一包日三次

○方 主治瘡癩

硫銅礬 一刀 橙花水 四刀 白糖 半刀

右調勻每服六滴至十九滴日二次

○方 主治同前

鍊粉 一八 桂皮末 二八

麻福涅失亞 五八 白糖 半刀

右為散朝夕各服半劑

○方 主治疼痛及不眠者

醋酸莫爾非 十分八一至 蒸餾水 三刀

右溶和每服一匙布也

○方 主治患兒嘔吐及下利者

番木鱉越幾 四分八 舍電阿芙蓉液 三滴

續草水 二刀

右調勻每一時服一匙布也

○方 主治同前

硝酸銀 四分八 舍電阿芙蓉液 二滴至

單舍利別 二刀

右調勻每一時服一匙布也

○方 主治瘡癩

肝油 三匙 鷄子黃 一個

薄荷舍利別 橙皮舍利別 各一

右調勻每服一茶匕日三次

○方 主治同前

肝油 二匙至 護謨末 適量

齒香水 一匙 橙皮舍利別 半刀

右調勻每二時服一茶匕

○沃度鐵合劑 再 主治瘡癩

沃度加里 三八至 枸橼酸鍊安汶尼 二刀