

大德重校聖濟總錄卷第一百六十七



小兒門

小兒受氣初生將護等法

小兒口噤 小兒撮口

小兒鵝口 小兒重脞

小兒臍風 小兒臍瘡

小兒解顱 小兒顱陷

小兒變蒸



小兒統論

論曰小兒初生氣體稚弱膚革不能自充手足不能自衛保護鞠育蓋有所待自受氣至於胚胎由血脉至於形體以至筋骨毛髮府藏百神漸有所就而後有生蓋未生之初稟受本於父母既生之後斷臍洗浴擇乳襁褓皆有常法謹守其法無所違誤猶或胎氣稟受有強弱骨骼所具有成虧而壽數之修短係焉是以昔人於字乳之法至纖至悉初生之時先去惡血去血之後次與丹蜜惡血在裏則吐利以除之氣有所虧則灸炳以助之或呵臍或衛顙然後飲乳用哺無令傷風無令驚

恐庶幾其有成也苟失其養疾疢因之故解顛重勝連  
斷撮口重舌癩瀰口噤軀啼之類得諸胎中驚啼客忤  
中惡魘病之類得諸感襲乳哺不節則有癰結哺露丁  
奚傷飽之患肥甘過度則有諸疳之疾以至風寒暑濕  
致寇於外五藏六府感傷於內無不成病者今集慈幼  
之法自初生至於成童凡證候可調者悉著于篇云

### 小兒初受氣法

凡小兒受氣在娠一月胚二月胎三月血脉生四月形  
體成五月動六月筋骨立七月毛髮生八月藏府具九  
月穀氣入胃十月百神備而生生後六十日目瞳子成

能類笑識人百日任脉生能反覆百八十日尻骨成能  
獨坐二百一十日掌骨成能匍匐三百日髓骨成能獨  
倚三百六十日爲一期膝骨成乃能行此是定法若有  
不依期者必不壽也

### 小兒初生法

小兒始生肌膚未成不可煖衣煖卽令筋骨緩弱不可  
不見風日不見風日卽令肌膚脆軟衣被宜故絮勿用  
新綿天氣和暖令乳母與之俱臥日中數見風日則血  
凝氣剛肌肉鞭密堪耐寒暑若常在幃帳重衣溫煖譬  
如陰地草木輒脆易傷又當薄衣薄衣之法當從秋習

之勿於春夏卒然減去恐中風寒冬月常令衣適可禦寒則佳愛而熨之適所以害之也又當消息無令汗出卽致虛損晝夜寤寐皆宜慎之其飲食乳哺不能無痰癖常當節適若微不進仍當將護凡不能進乳哺則宜下之不致寒熱也又小兒始生生氣尚盛無有虛勞微惡卽須下之所損不足言其益多矣若不時下則疾成難治冬月下之最難將護然有疾者亦不可不下夏月下後腹中常小脹滿當節哺乳護之兒之乳哺宜令多少有常兒稍大食哺自能稍增若減少者是腹中已有小不調便當微與藥勿復哺之但乳之而已甚者十餘

日輕者五六日自當如常若都不食哺而但飲乳者此是有癖不可不下卽致寒熱或吐而發癩或致下痢若先治其輕則病速愈矣小兒有少病癩者母懷娠時役動骨血卽令氣強若侍御多血氣微胎養弱卽兒軟脆易傷故多病癩兒須多著頂衣取燥菊花爲枕枕之母乳兒時摸兒風池若壯熱卽須熨使微汗微汗不差便灸兩風池及背第三頰第五頰第七頰第九頰兩邊各二穴與風池凡爲十穴一歲兒七壯兒大者以意增之可至三十壯唯風池特宜多七歲以上多至百壯小兒常切慎護風池風池在頸項筋兩邊有病乃治之

尋常不可妄施鍼灸亦不可輕於吐下緣鍼灸傷經絡吐下動府藏故也但當以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之又以臍中膏塗之令兒處涼時以新水飲之新生無疾慎不可逆鍼灸逆鍼灸即忍痛動脈因而成癩河洛間土地多寒兒喜病瘧其俗生兒三日多逆灸以防之又灸其頰以防噤又決舌下以去血江東吳蜀地溫無此疾古方雖傳有逆鍼灸之法今人不詳南北之殊便案方用之爲害最多惟田舍小兒任其自然皆無此患又云春夏不可下以小兒府藏軟弱易虛易實下之則下焦必虛上焦生熱熱即增痰自非當下之

病不可下也

論小兒初生將護法

小兒新生出胎便以綿裹指拭口中及舌上青去其惡血此謂之玉銜若不急拭啼聲一發即入腹成血病矣若兒生下不作聲者當取冷水灌之須臾當啼又以葱白細細鞭之即啼兒之初生速當舉之舉之差晚則令寒中腹內雷鳴仍先浴之後速斷臍不得用刀惟令人隔單衣咬斷兼將煖氣呵七徧然後結之所留臍帶令長至兒足若短即令兒腹中不調常令下痢若先斷臍然後浴者則臍中水而發腹痛其臍斷訖臍連帶中多

有蟲宜急去之不爾入腹生疾又尿清者冷也與中水  
同此當令兒腹痛大啼呼面青黑是中水之過當灸之  
至八九十壯若輕者但臍腫出汁時時啼呼擗當歸末  
傅之或炙綿絮熨之有至百日乃愈者又法兒初生宜  
以父故衣裹之若生女宜以母故衣裹之勿與新帛切  
須依法令兒長壽

小兒取吐胸中惡血法

小兒洗浴斷臍襁抱畢宜取甘草如中指一節許打碎  
以水二合煮取一合綿沾與兒吮之約得一蜺殼許入  
腹卽止兒當吐去胸中惡汁如得吐餘藥更不須與若

不得吐可消息與之若更與而又不吐者但稍稍與之  
令盡一合止如得吐令兒智慧無病一合盡都不吐者  
是兒胸中無惡血耳勿復與之乃與朱蜜以鎮心神定  
魂魄也

初生兒服朱蜜法

小兒初生三日中須與朱蜜只不宜多多則令兒胃冷  
腹脹喜病陰瀰氣急變噤則瘞而死也惟以真飛鍊丹  
砂如大豆許赤蜜一蜺殼和之綿沾與兒吮之得三沾  
止一日吮盡連三日與之則三豆也勿令過此與朱蜜  
訖可與牛黃如朱蜜多少牛黃益肝膽除邪熱定精神

止驚悸辟惡氣去百病

### 小兒始哺法

小兒新生三日後應開腸胃助穀神可研米作粥飲如乳酪厚薄以大豆許與噉之類燕三豆許止日三滿七日方與哺凡兒生十日始哺如棗核又十日倍之五十日如彈丸百日如棗令兒無疾哺之太早而多者頭面身體生瘡愈而後發令兒尪弱難長

### 揀乳母法

乳母以血氣爲乳汁五情善惡悉血氣所生凡擇乳母欲其喜怒不妄情性和善而已他亦不可求備但形色

不惡相貌稍通無胡臭瘦瘠蒼癯疥癬白禿癩瘍潰

切屑耳聾臄鼻頭眩等疾便可飲兒

### 乳小兒法

凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐若太飽者以空乳含之則消夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令兒寒痢凡欲乳兒先令乳母捏去乳汁按散熱氣勿令乳汁奔出奔出卽令兒噎若噎便出其乳候氣歇定良久復飲之又每侵早捏去宿乳乳母共兒臥當令兒頭與乳齊乃飲之若頭低乳高則噤飲不快又小兒初生一月內常與豬乳飲爲佳

乳母忌慎法

小兒飲乳則乳母當知禁忌不爾令兒百病由之而生  
大忌之法春夏不得衝熱與兒乳令發熱疳并嘔逆秋  
冬不得以冷乳與兒令腹脹羸瘦乳母嗔怒次不得哺  
兒令患狂邪乳母醉不得哺兒令患驚癇天癆急風等  
乳母有孕不堪哺兒令患胎黃及脊疳乳母有疾不得  
哺兒令患癩癩風病乳母吐後不得哺兒令嘔逆羸瘦  
乳母傷飽不得哺兒令多熱喘急乳母忌食諸豆及醬  
熱麪生冷之類若兒患疳卽不得食羊肉及魚凡乳母  
不得以綿衣蓋兒頭面及不得以口鼻吹着兒顙衣服

忌着新綿百日内不得以油膩手襁抱及不得令火炙  
襁保令兒染熱病若冬中大寒以火炙乾衣被且置地  
上少時熱接令冷緩得所然後用之如乳母行房氣息  
未定便哺兒亦致多病未滿月內所驅使人亦不得令  
有所犯到兒前恐惡氣觸兒

小兒相法

兒生枕骨不成者能言而死膝骨不成者能踞而死掌  
骨不成者匍匐而死踵骨不成者能行而死臙骨不成  
者能立而死又初生頭四破者不成啼聲散者不成汗  
不流小便凝如脂者不成此其大畧也



浴兒法

凡新生兒浴法豬膽一枚投湯中令兒終身不患瘡疥湯中勿添生水浴訖斷臍

新生兒三日浴法

桃根

李根

梅根各貳兩

右三味以水八升煮二十沸去滓浴之去不祥令兒終身無瘡瘍一方煎成去滓後入麝香末少許

治新生小兒驚辟惡浴金骨湯方

金壹

虎頭骨壹枚

右二味以水一斗煮取七升適冷煖浴兒佳凡浴兒

辟除惡氣令兒不驚不患瘡疥

虎頭湯方

虎頭骨伍兩

苦參肆兩

白芷貳兩

右三味以水一斗煮二十沸入豬膽汁少許適寒溫

浴兒

治兒少小身熱李葉湯方

李葉不少

右一味以水煮熟去滓適寒溫浴兒

又方

白芷根苗煎湯浴兒良

又方

苦參煎湯浴兒良

治新生兒卒寒熱不佳不能服藥用大物莽草湯浴之方

莽草

丹參

蛇牀子

桂各參

菖蒲半

雷丸壹

右六味剉碎以水五升煮三五沸適寒溫浴兒避日

向陰處

治小兒卒客忤吐下乳哺面青黃色變弦急浴之方

錢七十文以水三升煮令有味適寒溫浴兒

凡尋常浴兒法

右以湯添水着少鹽浴兒後以粉傅之若無事勿數

浴恐遇風冷令兒發驚成癩

小兒口噤

論曰夫小兒初生便得口噤不能飲乳者此由在胎時其母府藏有熱熏蒸胞胎熱氣入兒心脾致初生後口也

治小兒口噤瓜蒂散方

瓜蒂散

全蠍壹枚

赤小豆貳柒

右三味搗羅爲散每服粥飲調下半錢匕服後以吐  
爲効量兒大小加減服之

治初生兒口噤不開舌不能飲乳方

蜘蛛壹枚去足及口  
炙令焦細研

豬乳半

右二味將豬乳和蜘蛛末分爲三服徐徐灌之

治小兒初生口噤不開方

右取赤足蜈蚣半枚去足炙令焦研爲末以豬乳二

合和分三四服與之差一方用人乳汁

治小兒口噤其病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能乳

哺水銀方

右以水銀如黍米大與兒服覺病不問早晚水銀下

咽便愈以意量之不過小麻子許爲度百日兒不可

過如小麻子許

治小兒口噤體熱方

右取竹瀝一合令溫分三服差

又方

右取雀屎一枚爲末看乳頭上與兒飲差

又方

右取鹿角粉大豆末各少許相和塗乳頭上與兒飲

差

又方

右取驢乳二盞豬乳一盞相和煎得一盞半時取少許與兒服差

又方

右取牛口齒草絞汁塗口上差

又方

右取白牛尿塗口中差

又方

右取東行牛口沫塗口及額卽止

又方

右取雞屎白如豆大三枚以水下差

小兒撮口

論曰小兒初生未滿七日面赤喘促啼聲不出乳哺艱難名爲撮口蓋因胎中受風挾熱始生之時氣血未定洗浴當風襁抱失宜遂成斯疾最爲急切宜速治之

治小兒初生胎熱撮口麝香散方

麝香 研

丹砂 研分

蛇蛻皮 壹尺 炙令赤爲末

右三味細研如粉每用半字匕津唾調塗兒脣上日

五七次

治小兒初生撮口不收乳方

蜈蚣壹條赤足者

右一味去足炙微黃研爲細末以乳汁一合調半錢匕分三四服溫灌之

治初生小兒撮口不收乳飲烏蛇散方

烏蛇酒浸去皮骨炙令黃熟半兩

麝香壹分銜去筋膜

右二味將烏蛇搗羅爲末同麝香再研勻每服半錢煎荆芥湯調灌之

治小兒撮口及發噤方

晚蠶蛾貳枚炙令黃

右一味研爲末蜜和塗兒口唇內

治小兒初生撮口釣藤湯方

釣藤

升麻

黃芩去黑心各半兩

蛻蝦貳枚去翅足微炒

右四味麤擗篩每服一錢匕水一小盞入蘆根半分煎取五分去滓放溫徐徐服量兒大小加減

治小兒因剪臍傷風致唇青口撮保生散方

蜈蚣壹條赤足者炙令乾烏頭尖陸枚生用麝香研壹字

右三味除麝香外搗爲末同研極細每服半字匕煎金銀薄荷湯調下

治小兒撮口方

赤足蜈蚣壹條 棘剛子伍枚

右二味燒成灰飯和爲丸如麻子大每服三九至五九乳汁下

治小兒臍風撮口丹砂丸方

丹砂研

麝香研

牛黃研各壹分

半夏湯洗棗徧切焙

丁香

白附子

鐵粉研

天麻

天南星各半兩

右九味搗研爲末用粳米飯丸如麻子大每服五九荆芥湯下空心午後各一服量兒大小以意加減

治小兒胎風熱撮口發噤牛黃竹瀝散方

牛黃研壹分

淡竹瀝半合

右二味每服牛黃一字匕用淡竹瀝調下一二歲兒服之三四歲兒每服半錢日三服量兒大小以意加減

小兒鵝口

論曰小兒初生口中有白屑如米粟狀鼻外亦有乃至舌上生瘡謂之鵝口此由胎中稟受穀氣偏多既生之後心脾氣熱上熏於口致成斯疾蓋心主舌脾之絡脉散舌下故也

治小兒初生連舌下有膜如石榴子中膈連其舌下微

微令兒語不發不轉方

右以爪摘斷令微有血出無害若血不止可燒髮灰作末傳之止

治小兒鵝口方

右取栗房以井華水濃煮汁以綿纏筋頭沾拭之如無栗房以栗木皮代

治小兒鵝口方

右取柘木根淨洗細剉五升無根只以弓材亦佳水一升煮取五合去滓更煎二合頻頻拭齒口即差

治小兒鵝口不能飲乳牛黃散方

牛黃壹分  
烏末

右一味用竹漚調勻漚在兒口中

治小兒鵝口不能乳方

右取白鵝糞以水絞取汁漚在口中

又方

右取黍米以水研取汁塗拭之

治小兒鵝口并噤白礬散方

白礬燒

丹砂研分

右二味和研極細傅兒舌上日三次以亂髮揩舌上

垢令淨即差

治小兒鵝口方

右以指纏亂髮以溫水掠之三日忽絕甚効

治小兒鵝口方

右以馬牙消細研爲粉每用一豆大塗舌下日三次

小兒重勝

論曰小兒初生上腭有物脹起若懸癰或如蘆籜盛水之狀者名曰重勝此乃脾胃挾熱血氣不能收斂令口中舌下或在腭頰如吹小脰速宜以綿纒長鍼微露鋒芒刺腫處決去惡汁則其病可消若再生亦宜再刺不爾則脹滿口中妨害乳食呼吸不可緩也

治小兒重勝重斷腫痛口中涎出牛黃散方

牛黃

龍腦

丹砂各壹

太陰玄精石

壹兩 鉛霜半兩

右五味各細研爲散再和研勻每服半錢匕先於重舌上以鉞鍼鉞破出血用鹽湯洗拭口然後摻藥於

口中神効

又方

驢乳

豬乳各壹

右二味相和煎至二合時時與兒服之

又方



玄明粉

太陰玄精石各壹

鉛霜

分半

右三味同研令細少傳之

又方

右以蛇蛻皮燒灰研令細以少許傳之効

又方

右取露蜂房燒灰細研以水和塗口中立愈

又方

右取始煤以水調塗之

小兒臍風

論曰新生小兒既斷臍之後臍瘡未愈不可外犯風邪及浴水入瘡濕冷褊抱皆致臍風其候臍腫多啼甚則風行百脉口噤不乳身體反強乃致不救

治小兒初生至七日臍風發腫欲落者錦灰散方

錦帛

燒灰微存性壹錢

雄鼠糞

微炒柒枚

大棗

去核參分

麝香

研少許

右四味搗研爲散看臍欲落不落卽用藥封之切忌外風入

治小兒初生斷臍了便傳此散免一臘內臍風天漿散方

天漿子

枚

亂髮性平 灰存

蜈蚣鼠寸 燒灰

羚羊角

燒灰

麝香豆大

右五味研令勻細纔割臍了便用少許傅之

治小兒臍風白龍散方

天漿子

有蟲者

白殭蠶直者炒

右二味搗羅為散入膩粉少許以薄荷自然汁調灌

之取下毒物神効量兒大小分作二服亦得

治小兒臍風腫神灰散方

雄鼠糞

米枚兩頭

乾薑隴大

甌帶

壹圓

緋綿

胡粉炒如

白石脂

各半兩

右六味存性燒為灰相和細研加少許麝香為散音

臍欲落不落即封臍便差如未患傅之終不患也燒

藥時不得令有別灰入

治小兒臍風久不差腫出汁者牡蠣散方

牡蠣

壹枚

蝦蟆

壹枚

右二味並燒為灰細研如粉每以少許傅臍中甚驗

治小兒着臍風汁出當歸散方

當歸

切焙

甘草

炙剉

鉛丹

研半

右三味除鉛丹外搗為散入鉛丹合研令勻以傅臍

中差

治小兒臍風汁出不止黃藥散方

黃藥去麤皮 壹兩半

釜底黑煤研分

亂髮灰研分 壹

右三味先搗黃藥為末入二味合研令勻傳臍中差

又方

當歸切

右一味搗羅為末時傳之

治襁褓中小兒臍風撮口法

右視小兒上下斷當口中心處若有白色如豆大此病發之候也急以指爪正當中指之自外達內指令

匝微血出亦不妨又於白處兩盡頭亦依此指令內外斷應手當愈

小兒臍瘡

論曰小兒初生當先洗浴然後斷其臍斷臍後便當以熟艾封裹之或灸數壯勿令犯濕若先斷臍後洗浴揩拭不乾或為邪氣所傷或為水入臍中皆致臍瘡也瘡過百日者雖差或風邪入裏則變為癩矣

治小兒臍不乾白礬散方

礬石燒

龍骨各壹分

右二味細研傳臍中取差為度

治小兒臍風汁出甘草散方

甘草銹 螻蛄炙魚各壹分

右二味搗羅為散摻傅臍中差

治小兒臍亦腫汁出不止白石脂散方

白石脂兩壹

右一味研為散熬令溫撲臍中日三

治小兒滿月臍不乾方

蝦蟇伍枚

右一味燒灰撲臍日三

治小兒臍中水濕腫赤汁出時時啼呼當歸粉方

當歸末 胡粉各半兩

右二味相和研勻傅臍中仍炙絮熨之以啼呼止為候

治小兒臍濕熨方

右取鹽豉搗作餅子如錢大於新瓦上熬令熟更互熨之亦可以黃蘗末傅之一方用鹽二兩豉二合同搗作餅熨之

治小兒臍瘡久不差方

乾蝦蟇大者壹枚燒灰 白礬壹分燒灰

右二味研細每用少許傅之以差為度

治小兒臍瘡汁出不乾黃藥散方

黃藥去麤皮壹兩半爲末金下墨研分

亂髮灰研壹分

右三味同研勻細少少傅之

治小兒臍中汁出國老散方

甘草炙判壹分

當歸焙

鉛丹研各半分

右三味搗羅二味爲散入鉛丹同研勻細撲臍中

三

治小兒臍濕逾月不止三灰散方

乾蝦蟇燒

白礬燒

皂莢子燒各壹分

右三味細研少傅臍中

治小兒臍久不乾赤腫膿出及清水當歸散方

當歸焙

右一味爲末極細少少着臍中頻用之頃有小兒常

病臍漏五十餘日用此一傅卽乾後因尿入瘡復病

又一傅愈

小兒解顛

論曰腎主身之骨髓腦爲髓海腎氣和平則骨髓充足  
骨髓充足則顛顛圓成若腎氣不足則骨髓不充年雖

長大頭縫尚開故名解顛亦名顛解

治小兒解顛願大身有痼熱頭面汗出腹脹欬嗽上氣

肩息足蹇脛交三歲不行鍾乳丸方

鍾乳粉

防風又

生乾地黄焙

牛黃研

甘草炙

漆花各壹分

右六味搗羅為末以犬腦髓為丸如麻子大每服二

丸至三九米飲下早晨午時日晚各一服更量大小

以意加減一方以豚腦丸

治小兒解顛細辛散方

細辛去苗

桂去麤皮

乾薑炮各壹分

右三味搗羅為散以乳汁和塗顛上

治小兒腦長喜搖頭解顛牛黃丸方

牛黃

漆花

甘草炙

白朮

防風去

鍾乳粉

生乾地黄焙各壹分

右七味搗羅為末用犬腦髓為丸如麻子大每服二

丸至三九溫水下早晨日午晚後各一服更量兒大

小以意加減

治小兒解顛顛門開解封顛散方

柏子人參

細辛去苗

防風去

白及各壹兩

草烏頭炮半

右五味搗羅為細散乳汁調塗顛開處

治小兒解顛不合蟹足散方

生蟹足骨焙乾 白欬各半兩

右二味搗羅為散乳汁和塗顛上以差為度

治小兒鼻多涕是腦門為風冷所乘甘菊花湯方

甘菊花壹兩 甘草炙壹分 防風去叉半兩

山茱萸柒兩

右四味蟲搗篩每一錢匕水一盞煎至六分去滓分

溫三服早晨日午晚後各一量兒大小以意加減

治小兒鼻多涕是腦門為風冷所客細辛膏方

細辛去苗葉半兩

右一味用油一合同煎令黑色去滓下蠟少許煎化

停疑每日三度薄塗顛上

治小兒顛開不合合顛散方

防風註 白及 柏子人各壹兩

右三味搗羅為散用乳汁調少許塗顛上以合為度

治小兒腦長髮大顛開不合臂脛小不能勝頭半夏散方

半夏湯洗去滑柒兩焙 芎藭 桂去麤皮壹兩

草烏頭拾枚炮裂去皮臍 細辛去苗葉貳兩

右五味細剉以酒四升漬一宿煮令微熱漉出綿裹

溫熨顛上朝暮二三十徧良

治小兒腦長顛不合雞血塗方

右取丹雄雞一隻將就小兒顛上割其冠使血滴顛訖以赤芍藥末粉血上

治小兒解顛腦縫開不合防風丸方

防風

去

鍾乳粉

牛黃

研

白朮

各半兩

熟乾地黄

焙

甘草

各參分

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二九溫水化下隨歲數加減服

治小兒解顛腦縫不合塗傳膏方

蛇蛻

燒

豬頰骨髓

各少許

右二味調和爲膏塗顛上日再易

小兒顛陷

論曰人之沖氣內圍於胃上通顛頂小兒胃氣沖和則腦髓充成顛頂漸合若胃熱熏蒸府藏則渴而引飲因致泄利令府藏血氣虛弱不能上充髓腦所以顛陷也治小兒藏府壅熱氣血不榮致顛陷者生乾地黄散方

生乾地黄

兩

烏雞骨

壹兩酥炙黃

右二味搗細羅爲散粥飲調下半錢匕不拘時候

治小兒胃虛血氣不充顛陷當歸湯方



當歸切

白朮

人參

黃耆劉各

訶梨勒煨去核甘草炙分

右六味麤搗篩每一錢匕水七分煎至三分去滓分溫二服不拘時候

治小兒氣血虛弱顛陷不平乾地黃丸方

熟乾地黃焙

芍藥

當歸切

白朮各半

桂去麤皮 豈分

右五味搗羅爲細末鍊蜜和丸如黍米大每服七丸粥飲下乳食前量兒大小加減

治小兒顛陷方

狗頭骨

右一味炙令黃搗羅爲末雞子清調塗之又方

天靈蓋

右一味炙令黃搗羅爲末生油調塗之

治小兒顛陷方

豬牙車骨髓

右一味煎如膏塗顛上

小兒變蒸

論曰小兒初生稟受陰陽之氣水爲陰火爲陽水火相

逮而後陰陽變革由胚胎而有血脉由血脉而成形體  
以至府藏具精神全無非陰陽水火之氣故三十二日  
一變六十四日再變且蒸變卽七氣蒸卽體熱三百二  
十日而十變五蒸是爲小蒸畢又六十四日而一蒸凡  
四蒸揔五百七十六日而變蒸足氣血就每當變蒸則  
情態異常輕者體熱微汗似有驚候耳體皆冷重者壯  
熱牀亂或汗或否大率與溫壯相似特耳與競不熱爲  
異爾此乃血氣增長無用調治唯忌傍人或致驚動任  
之五日以上至十日自定或熱甚連數日者服黑散發  
汗熱不止者服紫雙丸小差便止勿復服之亦有或早

或晚不拘口數者亦有臨變蒸時爲寒邪所加者寒熱  
交爭腹痛天矯必啼呼不止但驗其耳與體審得其證  
者或熨痛處後兼以治寒邪之藥

治小兒變蒸中挾時行溫病或非變蒸時而得時行者  
黑散方

麻黃

去根節沸湯  
掠過半兩

大黃

剉炒  
壹分

杏仁

湯浸去皮尖雙  
人麩炒黃半兩

右三味先搗三味爲末別研杏仁如脂和散又搗令  
調勻內密器中一月兒服小豆大一粒以乳汁和服  
抱令得汗汗出溫粉粉之勿使見風百日兒服如棗

核計

治小兒變蒸發熱不解紫雙丸方

代赭搗研如粉

赤石脂搗研如粉各壹兩

巴豆參拾枚去心皮出油盡

杏仁伍拾枚去皮尖雙人麩炒黃

右四味先以巴豆杏仁等別搗如膏和代赭二味末搗二千杵相得入少蜜搗之仍須密器中收三十日兒服如麻子一丸與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱若未全除明旦更與一九百日兒服如小豆一丸量兒大小加減小兒夏月多熱令發疹二三十日一服甚佳代赭須真者若無以左

顧牡蠣代之

治小兒初生血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐嘔者若已能進哺飲食不消壯熱及變蒸不解中寒人魁氣并諸驚癩悉藥龍膽湯方

龍膽

鈎藤

茈胡去苗

赤茯苓去黑皮

桔梗炒

黃芩去黑心

芍藥

大黃剉炒各壹兩

甘草剉

蛻蝦去翅足炙

當歸切

人參各壹兩

右一十二味蠶搗篩一二歲兒每服一錢匕以水五分煎至三分去滓溫服三四歲兒每服一錢半匕水

一小盞煎至五分去滓連夜三四服量兒大小加減服之

治小兒變蒸經時不止挾熱心煩啼叫不歇骨熱面黃此胡湯方

此胡去

甘草炙

人參

玄參各壹兩

龍膽兩

麥門冬去心焙壹兩半

右六味麤搗篩每服一錢匕水八分盞煎至四分去滓溫服不拘時更量兒大小加減

治小兒變蒸熱氣乘心煩躁啼叫不已及骨蒸煩熱前胡湯方

前胡去蘆頭

龍膽

甘草炙

人參

麥門冬去心焙各壹兩

右五味麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後量大小加減溫服

大德重校聖濟總錄卷第一百六十七

大德重校聖濟總錄卷第一百六十八

小兒門

小兒溫壯

小兒壯熱

小兒潮熱

小兒風熱

小兒熱渴

小兒溫壯

論曰足陽明胃之經主於肌肉若小兒胃有伏熱或挾宿寒皆令胃中不和其氣蒸鬱發于肌肉故令兒體熱多睡名曰溫壯其證大便黃而惡穢者有伏熱也利下乃愈若便白而醋穢者有宿滯也當微利損穀乃愈古法去伏熱則用龍膽湯去宿滯則用紫雙丸當倣其法而治之

治嬰兒出腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐  
嘔者若已能進哺食實不消壯熱及變蒸不解客忤魃  
氣并諸驚癇悉治十歲已下小兒皆服龍膽湯方第一

此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此為例若知是客件及有魘氣者可加人參當歸各如龍膽多少一百日兒加三銖二百日兒加六銖一歲兒加半兩餘藥准此

龍膽

釣藤皮

此胡去蘆頭

黃芩去黑心

桔梗炒

芍藥

赤茯苓去黑皮

甘草炙各兩

蜣螂炒貳枚

大黃剉炒兩

右一十味咬咀如麻豆大以水一升煮取五合為劑兒生一日至七日分一合為三服兒生八日至十五

日分一合半為三服兒生十六日至二十日分二合為三服兒生二十日至三十日分三合為三服兒生三十日至四十日盡以五合為三服皆得下即止治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱不歇及腹中有痰癍哺乳不進乳則吐吮食癩先寒後熱者紫雙丸方

代赭磚研加粉

赤石脂磚研如著各壹兩

巴豆參拾枚去心皮出油盡

杏仁伍拾枚去皮尖雙入炒

右四味將巴豆杏仁別研為膏入二味末相和更搗令相得若鞭入少蜜同搗之密器中收三十日兒服

一丸如麻子大與少乳汁合下食頃後再與小乳當  
小下熱氣若餘勢未消明旦更與一九百日兒服如  
小豆一丸以此準量增減丸數大小

治小兒溫壯往來腹內有熱此胡湯方

此胡去蘆頭

黃芩去黑心

人參

甘草炙

赤茯苓去黑皮

麥門冬去心焙各半兩

右六味麤搗篩每用一錢匕以水一盞入竹葉數片  
煎取五分去滓放溫量兒大小分減服之

治小兒溫壯熱不差若舌寬不含乳胸中有疾口中瘡  
兼驚黃芩湯方

黃芩去黑心壹兩壹分

釣藤細切壹分

蛇蛻炙壹寸

甘草炙到半兩

芒消壹分

大黃蒸參偏焙乾用壹兩

牛黃如大豆許參粒別研

右七味麤搗篩三四歲兒每服半錢匕以水半盞煎  
至三分去滓食後溫服日三量兒大小以意增減

治小兒壯熱實百病芍藥湯方

芍藥

甘草炙到各半兩

大黃蒸焙乾到壹兩

右三味麤搗篩五六歲兒每服一錢匕以水半盞煎  
至三分去滓溫服食後日三服隨兒大小以意加減

治小兒溫壯不解升麻湯方



升麻

芫胡去薑

麥門冬去心

黃芩去黑心

甘草炙到各半兩

黃耆剉

人參各壹分

右七味麤搗篩每用一錢匕以水八分煎取五分去滓量兒大小分減服

治小兒挾實溫壯惕惕微驚當歸湯方

當歸切焙半兩

芫胡去薑頭參分

黃芩去黑心半兩

細辛去抽葉參分

大黃剉炒壹兩

升麻兩

五味子兩

紫苑壹兩

牛黃研壹分

杏仁貳拾枚湯浸退去皮尖雙入炒別研

右一十味麤搗篩二三歲兒每一錢匕以水七分煎至五分去滓分溫日三服隨兒大小以意加減

治小兒有熱服藥大下後溫壯不解胸中結熱五味子湯方

五味子

黃芩去黑心

芫胡去薑頭

芒消

麥門冬去心焙各半兩黃連去須壹分

甘草炙到壹分

當歸切焙參分

大黃飯上蒸溫暴乾壹兩

石膏參分搗碎再細研入

右一十味麤搗篩五六歲兒每服一錢匕以水七分煎至四分去滓食後溫服無痰三服若有痰即吐之

量兒大小以意加減

治小兒腹中伏熱溫壯往來此胡湯方

此胡去蘆頭

黃芩去黑心

人參半兩

甘草炙半兩

赤茯苓去黑皮

麥門冬去心焙

右六味麤搗篩每服一錢匕水七分入小麥五七十粒竹葉十片煎至四分去滓溫服量兒大小加減服之

治小兒挾熱痰盛溫壯夜臥不穩天南星丸方

天南星炮爲末

半夏湯洗去滑膩粉

滑石研各壹錢

巴豆貳拾肆枚去心膜以水浸壹宿研細不出油

右五味先研巴豆令熟次下衆藥末以糯米粥和丸如菘豆大每服三九更量兒大小加減瀉痢米飲下取食葱湯下驚悸薄荷荆芥湯下

治小兒熱疾後腹中不調飲食不節腹滿溫壯及中客忤兼乳冷消滯丸方

雀屎白

牛黃研各壹分

芎藭

芍藥

乾薑炮

甘草炙各半兩

麝香研

小麥麩

大黃剉炒

當歸切焙

人參各壹分

右一十一味搗羅爲末鍊蜜丸如麻子大溫熱水下

三九欲令下者服五九

治小兒風邪溫壯發熱歷驚止頭痛化涎生犀牛黃丸

方

犀角屑壹分

牛黃壹錢

龍腦

麝香各半

天南星牛膽內  
懼者未藿香葉爲末各  
貳兩

甘草末

雄黃末各半

右八味合研如粉鍊蜜和丸如雞頭大每服一九不計時候煎薄荷湯化下

小兒壯熱

論曰小兒壯熱者由陰陽不和氣盛血實邪熱之氣客

於腸胃蘊蓄日久重發肌肉故令身體壯熱其脉三部俱實者是也亦有乳食不化及食物不消蒸鬱於外合兒壯熱口乾煩渴其脉見寸口浮而大按之反澁者是也

治小兒百日已來結實壯熱兼驚祛熱湯方

大黃剉

朴消

甘草炙

龍齒各壹分

枳殼去瓤麩  
炒壹兩

右五味麤搗篩每服半錢匕以水半盞煎至三分去滓放溫時與一分服日可三服乳母服之亦妙  
治小兒壯熱脹滿不飲乳龍膽飲方

龍膽去根

犀角鎊屑各半兩

升麻

天麻炒

甘草炙

鼈甲去裙爛醋浸炙黃色各參

分

檳榔煨剉壹枚

右七味麤搗篩每服一錢匕以水半盞煎至三分去

滓分温三服

治小兒生四五十日服藥下後身體壯熱如火傷寒兼

腹滿頭面丹腫此皆有伏熱龍膽湯方

龍膽去根

冬葵子

菘菹

大青

此胡去苗各壹分

赤茯苓去黑皮

甘草炙各半兩

其水三升

右七味麤搗篩每一錢匕以水半盞煎至三分去滓分爲三服如人行十里已來一服隨兒大小加減

治小兒期歲至三歲時時壯熱升麻湯方

升麻

此胡去苗

枳殼去穢炒

黃芩去墨心

芍藥

梔子人

知母焙

杏人去皮尖雙人炒別研各參分

大黃剉炒壹兩壹分

石膏剉兩半

右一十味以八味麤搗篩入杏人石膏拌勻每服一

錢匕以水一中盞入青竹葉同煎至三分去滓食後

相繼三服量兒大小加減

治小兒壯熱不除犀角湯方

犀角鎊半兩

升麻壹分

大黃剉炒壹分

石膏搗研參分

右四味以三味麤搗篩入石膏拌勻每服半錢匕以水半盞煎至三分去滓放溫相繼三服隨兒大小以意加減

治小兒服藥吐利後身壯熱精神昏慢或微利而內有結熱大青湯方

大青兩半

大黃剉炒壹分

甘草炙半兩

麻黃去根節半兩

右四味麤搗篩二三歲兒每服半錢匕以水半盞煎至三分去滓食後相繼三服仍隨兒大小以意增減治小兒壯熱實滯不去及寒熱往來微驚大黃飲方

大黃剉炒壹兩

黃芩去黑心

栝樓根

甘草炙各參分

牡蠣熬

龍骨

凝水石研

白石脂各半兩

滑石研

消石研

人參

桂去麤皮各貳兩

右一十二味以九味麤搗篩入研藥和勻五六歲兒每服一錢匕以水一中盞煎至五分去滓溫服食後相繼三服隨兒大小加減

治小兒壯熱不安釣藤飲方

鈎藤

升麻

甘草

人參

各半兩

右四味麤搗篩每一錢匕以水一盞煎至五分去滓  
分溫二服空心午後各一服隨兒大小以意加減  
治小兒八九歲痰實壯熱山梔子湯方

山梔子

黃芩

去黑心

前胡

甘草

生用

右四味等分麤搗篩每服一錢匕水一中盞煎至五  
分去滓溫服日三量兒大小加減不計時候

治小兒羸內及百日以來壯熱虎睛牛黃丸方

虎睛

壹對

牛黃

研

麝香

研

丹砂

研

雄黃

研各壹分

右五味再同研爲末鍊蜜和丸如小豆大以乳汁化  
一丸與服

治小兒百日已來結實壯熱兼驚龍齒湯方

龍齒

半兩

大黃

剉炒半兩

山梔子

壹分

枳殼

去瓢炒壹分

朴消

參分

甘草

炙壹分

右六味麤搗篩每服一錢匕水七分煎至五分去滓  
溫服量兒大小加減

治小兒壯熱面赤脣口焦乾大小便不通四肢掣動驚啼或時發渴人參湯方

人參

參分 此胡壹分

大黃剉分

升麻

兩分 芍藥分壹

山梔子入兩

甘草

炙半 鈞藤兩

右八味麤搗篩每服一錢匕水七分煎取四分去滓

溫服

治小兒壯熱不解及驚熱風熱龍腦散方

龍腦

研半 馬牙消

壹分入合子內固濟火煨通赤先搗一地坑子甘草

水波冷濕紙襯藥入坑子內產壹宿取研

丹砂研壹

乾蠟微炒研

右四味合研勻細每服半錢匕或一字煎人參茯苓

湯調下驚熱冷水下熱甚者冷水研生地龍汁調下

治小兒肌體壯熱夜多驚啼及發吐逆日久不解或瀉

或祕變成慢驚或作疳疾定搐搦除疳氣墜痰涎鎮心

神如聖青金丸方

龍腦

研壹 麝香

研 膩粉各壹

香墨

研 盧會

研各壹 白麩

青黛

研 金薄

各拾 銀薄片

使君子

時按以麩裏煨令麩香熟去麩杵取末

右一十味再同研令勻滴井華水爲丸如雞頭實大  
患慢驚用冷薄荷水化下三歲已上服一九已下則  
半丸服訖便睡覺逐利動立愈後隔三五日更與一  
服如些小驚著或急驚及覺身體熱但服之取下青  
涎爲效量兒大小加減服

治小兒風熱壅滯壯熱煩渴時嘔麥門冬湯方

麥門冬去心焙 栝樓根 知母焙

人參 藜蘆去蘆頭 龍膽半

粟米合

右七味麤搗篩每用三錢匕水一盞半煎至八分去

滓分溫三服

小兒潮熱

論曰小兒潮熱者身體發熱作止有時故謂之潮熱由  
保養失宜風冷邪氣客於分肉之間每遇衛氣至則真  
邪相搏故令發熱欲知在何經絡當觀間甚之時屬何  
府藏各循其經以調之

治小兒潮熱盜汗心忪及骨蒸勞熱地骨皮飲方

地骨皮 白茯苓去黑皮 覆麥穗

赤芍藥 生乾地黄焙 山梔子入

甘草炙各 大黃炒 苳胡去苗



木通

剉各壹兩半

人參

木香

各半兩

青橘皮

湯浸去白焙壹分

右一十二味麤搗篩每服一錢匕水七分入竹筴少

許同煎至四分去滓溫服不拘時候量大小加減

治小兒潮熱青蒿湯方

青蒿

焙

知母

焙

甘草

各貳兩

半夏

湯洗柒遍薑汁製壹分

常山

剉貳兩

鼈甲

醋炙黃去裙襖

桂

去麤皮

枳殼

去麤炒

秦艸

去苗土各肆兩

右九味麤搗篩每服半錢匕水半盞入生薑一片烏

梅肉少許同煎三五沸去滓溫服

治小兒潮熱飲食不為肌肉黃瘁夜臥不安時有虛汗

此胡地骨皮湯方

此胡

去苗

地骨皮

桔梗

炒各壹兩

甘草

炙半兩

右四味麤搗篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去

滓食後臨臥溫服量大小加減

治小兒風虛潮熱齒齕言酸棗人飲方

酸棗人

壹兩

蛇蛻皮

炙參條

人參

羌活

土蘆頭各半兩

甘草

炙壹分

右五味麤搗篩每二錢匕水一盞入薄荷三葉同煎  
七分去滓分溫三服量大小加減

治小兒潮熱白鮮皮湯方

白鮮皮

人參

白芷

防風去

黃芩去黑心

知母焙

沙參

犀角鑄各半兩

甘草炙壹分

右九味麤搗篩每一錢匕水八分入薄荷三片煎取  
五分去滓分溫二服

治小兒潮熱百一羌活餅方

羌活去塵頭

芎藭

白僵蠶炒

雞蘇各壹兩

乾蠍全者拾肆枚炒

右五味麤羅爲末鍊蜜和丸如雞頭大捏作餅子每  
服一餅荆芥湯化下

治小兒潮熱此胡飲方

芫胡去苗

人參

知母焙

羚羊角燒

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙

赤茯苓去黑皮

半夏湯洗柒編去滑焙

木通剉

芍藥等分

右一十味麤搗篩每服一錢匕水一盞人生薑一片  
同煎至五分去滓溫服日二

治小兒潮熱連翹湯方

連翹

山梔子人

甘草炙

防風炙

蟬殼去土焙

右五味等分麤搗篩每服一錢匕水半盞煎三五沸去滓量大小加減溫服

治小兒潮熱不解長肌進飲食人參此胡湯方

人參

此胡去苗

白茯苓去黑皮

芎藭各壹兩

知母焙

升麻

菓本去苗

甘草炙

天門冬去心焙各半兩

獨活去苗

柏子人研各壹分

右一十一味麤搗篩每服一錢匕水半盞入生薑二片青蒿一穗同煎至三分去滓食後溫服五歲以上十五以下入醋炙鼈甲半兩每服二錢水一盞煎六分服

治小兒潮熱肌瘦盜汗黃雞煎丸方

黃連去須

鶴蝩

燕薹人各半兩

秦艸去苗

此胡去苗

知母焙

使君子去皮各壹兩

右七味搗羅爲末以黃雌雞一隻重一斤許者籠之食以大麻子候五日去毛令淨於尾下開竅去腸肚

洗淨乾入前藥末於腹內以線縫之取小甌先以黑  
 豆鋪甌底厚三寸安雞在甌內四旁以黑豆圍裹上  
 以黑豆半寸蓋之自已時炊至申時住火俟溫取雞  
 去腹中藥及筋骨頭翅以淨肉研和得所更少入酒  
 麩糊丸如小棗豆大每服十九量兒大小加減空心  
 臨臥麥門冬熟水下疝瘦骨熱十五歲以上溫酒下  
 治小兒潮熱煩渴引飲脇腹滿脹羸瘦多汗龍甲丸方

龍甲

醋炙去  
裙襴

黃耆

剉

芫胡

去苗各  
壹兩

枳殼

去瓤  
麩炒

白朮

人參

各半  
兩

木香

壹  
分

右七味搗羅爲細末水浸炊餅心和丸如麻子大二  
 歲兒十九溫粥米飲下日二更量兒大小加減服

小兒風熱

論曰小兒體性純陽熱氣自盛或因觸犯風邪與熱氣  
 相搏外客皮毛內壅心肺其狀惡風壯熱胸膈煩悶目  
 澁多渴是也

治小兒風熱心膈煩悶身體壯熱饑睡多渴羚羊角湯  
 方

羚羊角

鎊

麥門冬

去心  
焙

甘草

炙剉各  
參分

白茯苓

去黑  
皮

白鮮皮

升麻

人參

黃耆各半兩

右八味麤搗篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎沸分為二服溫呷量兒大小加減

減

治小兒風熱多驚丹砂丸方

丹砂

研水飛過

芫胡去苗

鐵粉研

麥門冬

去心焙

白茯苓

去黑皮各半兩天竺黃研

人參

黃耆剉

黃芩去黑心

甘草

炙剉各壹分

牛黃研

麝香研各壹錢

右一十二味搗研為末鍊蜜和丸如菉豆大每服五

九煎竹葉湯化下量兒大小加減

治小兒風熱心神驚悸夜臥不安真珠丸方

真珠末

羌活去蘆頭

防風去

鈞藤

龍膽

天竺黃研

升麻

牛黃研各壹分

茯神去木

人參

羚羊角鈔

犀角鈔兩壹兩

鉛霜研

龍腦研

麝香研各壹錢

右一十五味搗研為細末鍊蜜和丸如菉豆大每服五丸荆芥薄荷湯研下日三常服化一切驚涎量兒

大小加減

治小兒風熱寸金湯方

鬱金

大黃各壹兩

皂莢

貳兩水壹碗  
採汁去萍浸

煎貳味煮頓  
片切暴乾

馬牙消

當歸

切焙

山梔子人兩各半人參

甘草

剉

赤芍藥各壹分

雄黃少許  
好者

右一十味麤搗篩每服半錢匕至一錢匕水七分薄

荷三葉同煎至四分去滓放冷服之日一服

治小兒風熱驚疳潮熱釣藤湯方

釣藤壹兩

使君子皮

乾蠍

炒

人參

子芩

川大黃

剉碎  
微炒

犀角屑

已上各壹分  
蚱蟬參收

甘草

半兩  
微赤剉

川升麻兩

石膏兩

除蒸

右十一味搗篩為麤末每服一錢匕以水一小盞煎至五分去滓入竹瀝半合牛黃末一字看兒大小分

減服之

治小兒風熱心胸煩悶牛黃散方

牛黃壹分

鬱金半兩

人參壹錢

取末

右三味都細研令勻每服半錢匕荆芥湯調下日進

三四服量兒大小以意加減

治小兒風熱驚悸大小便赤澀釣藤散方

剉碎  
微炒

釣藤

天竺黃細研

地骨皮已上各

川大黃

參分剉碎微炒 茯神

犀角屑

龍膽去蘆頭

川芒消

甘草

赤茯苓已上各半兩

右十味搗羅爲末每服一錢匕水一盞煎至半盞去

滓量兒虛實加減與服

治小兒風熱多驚人參湯方

人參

白茯苓去黑皮 甘草炙

各一小盞煎

大黃剉

芍藥

釣藤

當歸焙各半兩

各一小盞煎

右七味麤搗篩每服一錢匕水八分入竹葉五片煎

至五分去滓溫服

治小兒一切熱連翹飲方

連翹

防風去

甘草炙

山梔子人各壹兩

右四味麤搗篩每用二錢匕水一盞煎至七分去滓

分溫二服

治小兒一切風熱白木生犀散方

白朮

桔梗微炒

甘草炙

馬牙消研各半兩

麝香研壹

生犀角鎊半

右六味搗羅四味為散與二味研者和勻每服半錢  
匕蜜熱水調下薄荷熱水亦得量兒大小加減

治小兒風熱涼心煮散方

連翹

防風去

甘草炙

山梔子人

雞蘇

惡實炒各半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎三五沸量

兒大小加減

治小兒風熱驚風天竺黃散方

天竺黃

蟬蛻

白僵蠶炒

山梔子人

甘草炙

鬱金

右六味等分搗羅為散每服一錢匕熱水調下三歲

兒可半錢未辟兒一字

治小兒風熱涎盛發喘嗽化涎餅子方

鐵粉研

人參

白朮各壹分

蓬砂

馬牙消

粉霜

牛黃

麝香各壹錢研

丹砂貳錢研

右九味搗研為細末鍊蜜和丸如皂子大捻作餅子

別以丹砂為衣二歲兒服半餅子薄荷湯化下

治小兒挾風蘊熱真珠散方

太陰玄精石兩壹分  
石膏分

龍腦半錢



右三味搗研極細每服半錢匕新汲水調下

治小兒風熱天竺牙消散方

天竺黃

馬牙消各半兩

丹砂

生龍腦

各半分 栝樓根

滑石各壹分

右六味搗研為細散每服半錢匕新汲水調下

治小兒風壅痰實經絡邪熱頭疼麻黃湯方

麻黃

去根節煮 防風又去

芎藭各壹分

羌活去頭

葛根剉

甘草剉各壹兩

荆芥穗兩

右七味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓

溫服

治小兒風熱止煩渴除風疹治驚悸防風湯方

防風去

黃耆剉

甘草剉

人參

連翹各半兩

山梔子人分

右六味麤搗篩每服一錢匕水八分煎至六分去滓

溫服

治小兒風熱越桃飲方

越桃去皮壹兩

甘草剉貳兩

藿香葉

石膏飛過各半兩

右四味用蜜二匙塗在桃子內先炒甘草赤色次下

越桃藿香葉炒微黑爲度搗羅爲末入石膏研勻每服一錢匕新汲水調下

治小兒風熱人參桔梗散方

人參

白茯苓去黑皮

桔梗炒

甘草炙

右四味等分搗羅爲散每服半錢匕熟水調下

治小兒風熱壅毒關膈滯塞涼心壓驚抱龍丸方

右以臘月黃牛膽一枚天南星好者炮去皮臍搗爲細末填滿膽中緊繫通風處陰乾去膽皮取藥每一兩入金銀薄小者各十片丹砂一錢半龍腦麝香各

一字同研極細鍊蜜和丸如雞頭實大每服一九竹葉水化下歲數小者半丸

治小兒風熱潮作不思飲食肌體消瘦此胡木香湯方

此胡去苗拾兩

木香壹兩

半夏湯洗柒兩去滑

人參各貳兩

黃芩去黑心

甘草炙各參兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑二片大棗一枚擘破煎至六分去滓溫服不拘時

治小兒風熱潮作肌體煩倦不思飲食安鎮心神茯神丸方

茯神去木

麥門冬去心擘犀角劈

梔子人

白鮮皮

升麻

玄參

車前子各壹分

鐵粉研

丹砂研各半兩

右一十味搗羅八味為末與鐵粉丹砂同研令勻鍊

蜜丸如菉豆大每服五丸溫熱水下不拘時更量兒

大小加減

治小兒風熱身體溫壯利膈化涎安神鎮心牛黃丸方

牛黃研

龍腦研

麝香研

甘草剉

雄黃研

天竺黃研

丹砂研

人參

遠志去心

乾蟄去土炒

山芋

白僵蠶各壹錢

天南星漿水煮壹日透軟切焙

天麻各壹分

右一十四味搗研為末鍊蜜和丸如雞頭大每服一  
九分四服金銀薄荷湯化下不拘時候量兒大小加

減服

治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱等桔梗煮散方

桔梗剉

細辛去苗葉

人參

白朮

桔樓根

甘草炙

白茯苓去黑皮

芍藥各等分

右八味搗羅為散每用二錢匕水一盞生薑一片薄

荷三葉同煎至六分三歲以下作四服五歲以上作  
二服凡小兒發熱不問傷寒風熱便與數服無不愈  
者

治小兒風熱胸膈煩悶目澁多渴鬱金散方

鬱金半兩

蟬蛻肆拾枚

龍膽

白附子炮各半兩

大黃炒

乾蠍炒

甘草炙各壹分

右七味搗羅爲散每服一字至半錢匕量兒大小空  
心薄荷湯調下

小兒熱渴

論曰小兒血氣本自盛實府藏之間易爲生熱熱氣熏  
蒸則津液乾枯故令兒渴而引飲

治小兒熱渴或虛熱吐下除熱止渴栝樓飲方

栝樓根分

黃芩去黑心壹分

知母煨

小麥

粟米各半兩

右五味除粟米小麥外餘三味並搗羅爲麤末每二  
錢匕水一小盞入小麥粟米各一撮同煎至六分去

滓分作三服一日喫盡更量兒大小以意加減

治小兒夏天服藥大下後胃中虛熱渴唯飲水麥門冬  
飲方

麥門冬去心

龍膽各壹兩

甘草炙

黃芩去黑心

葛根剉壹兩半

右五味麤搗篩每服一錢匕用水七分煎至四分去

滓溫服量兒大小以意臨時加減

治小兒壯熱兼嘔渴不止蘆根飲方

蘆根剉

麥門冬去心

人參各半兩

知母焙壹兩

粟米壹合

右五味麤搗篩每二錢匕水一盞入生薑少許擘破

同煎至五分去滓分溫三服更量兒大小以意加減

治小兒多渴黃連飲方

黃連去須半兩

冬瓜瓢壹分

右二味細剉以水一盞半同煎至八分去滓分溫三

服量兒大小臨時加減

治小兒熱渴不止蓮實湯方

蓮實

參拾枚炒黃推研浮萍壹分

右二味同用水一盞生薑少許煎五分去滓分溫二

服量兒大小臨時加減

治小兒上焦虛熱飲水不止枇杷葉湯方

枇杷葉去毛

葛根剉

胡黃連

甘草炙

玄參

麥門冬去心焙等分

右六味蠱擣篩每一錢匕水一盞入生薑一片煎至六分後入蜜少許再煎至五分去滓放溫分二服食後

治小兒上焦風熱熱渴引飲不止天麻人參煎方

天麻

人參

白茯苓去黑皮

天竺黃研壹

甘草生用壹錢

鈴白霜研壹錢

龍腦研半錢

丹砂研壹錢

右八味先將四味爲細末再入研了四味和勻鍊蜜煎爲膏每服一大豆許用金銀薄荷湯化下

治小兒熱氣熏蒸疳藏煩躁津液乾枯渴欲引飲方

右取桑枝一握細剉以水一盞半煎至八分去滓分作三服如熱水與飲

治小兒熱渴不止方

黃連去須炒

蘆根各壹分

右二味細剉以水一盞半煎取五分去滓旋與飲