

目錄

小金丹方

還魂湯

又方

外臺走馬湯

雄黃粉

治瘰方

辟瘟殺鬼丸

八毒赤丸以上疫癘鬼瘧

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

麻黃醇酒湯

黃疸方

赤苓散

寒水石散

女勞疸

牛疽煎

救急三十二種黃方

療黃疸方

近效瓜蒂散

麻黃連翹赤小豆湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯以上諸疸

半夏秫米湯

半夏麻黃丸

桂枝救逆湯

黃連阿膠湯

酸棗仁湯

溫膽湯

治多忘

枕中方

鎮心省散益智方

治虛煩不可攻方

以上情志臥夢

補腎治五蠱方

從蓉丸

麝香佛手睡

磁石猪腎羹

通耳法以上耳

七寶散

去腎方

蘭臺軌範

卷七

補肝丸

磁硃丸

石斛光夜丸

羚羊角散

蟬花散

洗眼藥以上目

通草散

飄鼻方

消鼻痔方

凌霄花散

蒼耳散

治鼻淵方

又方

又方

鼻中瘕肉以上鼻

口甘方

口苦方

療口瘡

推頰車法

口氣鼻穢方

口中臭方

口香去臭方

治緊唇方

又方

塗唇方

刺舌方

療舌腫方

又方

治重舌

治舌脹方

治舌腫脹

治失音

治馬喉痺

琥珀犀角膏

喉腫刺法

口傍惡瘡方

敷面齏方

又方

止牙痛方

治牙痛仙方

治牙疼方

如神散

細辛散以上口齒

吳江徐靈胎洞溪著

疫癘鬼症

素問

遺篇刺法論黃帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不施救療如何可得不相移易者岐伯曰不相染者止氣存內邪不可干避其毒氣天牝從來天牝內經注云鼻也空虛能受天地之氣故曰天牝欲其來往出入復得其性氣出於腦即不邪干氣出於腦即先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而出左行於東化作林本次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作焰明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次想黃氣自脾而出存於中央化作土五氣護身已畢以想頭上如北斗之煌煌然後可入於疫室又一法於春分之日日未出而吐之又一法於雨水日後三浴以藥泄汗

病源

一歲之內節氣不和寒暑乖候或有暴風疾雨霧露不散則民多疾疫無長少卒皆相似如有鬼厲故云疫癘中惡 精神衰弱為鬼神之氣卒中卒然心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脈緊大而浮者死緊細而浮者生 又中惡吐血數升脈沉數細者死浮脈大段如此亦不可泥卒然吐血多者多係中惡莫作吐血治如疾者生 陰陽逆也其狀如死猶微有息而不恆脈尚動而形無知也脈沉大而滑身溫而汗此為入腑氣復自愈若唇青身冷此為入臟即死

鬼擊 謂鬼厲之氣擊著於人也得之無漸如人以刀矛持刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或吐血或鼻中出血或下血一名為鬼排重者死

卒斃 魂魄外遊為他邪所執欲還未得忌火照之照則神魂遂不復入乃死若在燈光前斃者是本由明出

不忌火

三口諸蟲 其蟲與人俱生而此蟲忌血能與鬼靈相通常接引外邪為人患害其發作之狀或沉沉默默不知所苦而無處不惡或腹痛脹急或礫塊踊起或舉引腰脊或精神雜錯變狀多端其病大同小異但以一方治之者故名諸尸也

尸注 是五尸內之尸注而挾外鬼邪之氣流注身體令人無處不惡每節氣改變輒至大惡積月累年漸就頓滯以至於死死後復易旁人乃至滅門以其尸病注易旁人故謂尸注

喪尸 人有年命衰弱至於喪死之處心意有所畏惡其身內尸蟲性既忌惡便更接引外邪共為疹病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但逢喪處其病則發故謂之喪尸

尸氣 人有觸值死尸或臨尸其尸氣入腹內與尸蟲相接成病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但聞尸氣則發故謂之尸氣

諸注 謂邪氣居住人身內故名為注又注易旁人也乃有三十六種九十九種而方皆不顯其名所載有風鬼轉生死邪氣寒熱冷毒惡忤遺走溫喪哭殃食水骨血溫痺勞微泄石產土飲以上諸注皆正氣虛而邪氣傳綿也與諸尸病相近

又此九種注

- 一曰風注
- 二曰寒注
- 三曰氣注
- 四曰生注
- 五曰涼注
- 六曰酒注
- 七曰食注

- 八曰水注
- 九曰尸注

疫癘方

小金丹方

辰砂二兩

水磨雄黃一兩 叶子雌黃一兩 紫金

半兩 雄黃以金箔同藥研之可為細末

同入合中外固了地一尺築地實不用

爐不須藥制用火二十斤煨之也七日終常令火不絕候冷七日取次日日出合子合子即磁取出順日研之順日研之請左藥也

還魂湯金釐

救卒死客忤死

麻黃三兩去節杏仁去皮尖

甘草一兩炙千金

右三味水八升煮取三升去渣分令咽之通治諸感忤千金

金方云此方主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕復覺或已無脈口禁拘不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右足踏肩引之藥下復增取一升須臾立甦

又方

韭根一把 烏梅二七個

吳茱萸半升

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三漉櫛浮者生沉者死

煮取三升去渣分飲之

外臺走馬湯金匱

附方

治中惡心痛腹脹大便不通并通治飛尸鬼擊

巴豆二枚去

杏仁二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合掄取自然汁飲之當下老小量之

雄黃粉千金

治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄黃一味爲粉以酒服一刀圭日三服化

爲水

治瘧方外臺

瘧疫轉相染著至滅門延及外人無收視者

赤小豆

鬼箭羽

鬼臼

雄黃研

丹砂各二兩

右五味搗末蜜丸如小豆大服一丸可

與病人同脉

辟瘧殺鬼丸外臺

虎頭骨五兩

礞砂一兩

鬼臼一兩

雄黃一兩

皂莢一兩

雌黃一兩

蕤蕤二兩

右七味搗篩

以蠟蜜和彈丸大絳囊盛繫臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血物

八毒赤丸寶鑑 治鬼疔病

雄黃 礬石 附子油 麝香 丹皮 巴豆各一兩 蜈蚣一條

為末蜜丸小豆大每服五七丸冷水送下無時石或

紫金錠 蘇合丸二方俱見通治

諸痘附黃汗

素問

平人氣象論濁黃赤安臥者黃疸已食如饑者胃疸目黃者曰黃疸

素問

跌陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為滿脈緊而數則有熱兼有寒故用藥亦當寒熱兼顧古方可考也尺脈浮為傷腎跌陽緊為傷

脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸額

上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中懊憹而熱不能食時欲

吐名曰酒疸 夫病酒黃疸必小便利其候心中熱足下熱是其證也 酒疸心中熱欲吐者吐之愈 酒

疸下之久久為黑疸目青面黑心中如噉蒜薑狀大便正黑皮膚爪之不仁脈浮弱雖黑微黃故知之 黃家

從濕得之一身盡發熱面黃壯熱熱在裏當下之 黃疸之病當以十八日為期治之十日以上瘥反劇為難

治疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部其人必嘔陽部其人振寒而發熱也 黃汗之病雨

脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮臥盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲

錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞶瞶即胸中痛又從腰以下必汗出下無汗腰體

弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼痛煩燥小便不利此為黃汗

病源

黃疸 黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後壯熱口裏有血當下之法如純肝狀其人少腹內急若其人眼睛澀疼鼻骨疼兩膊及項強腰背急即是患黃多大便澀但令得小便秘卽不慮死不用大便多多卽心腹脹不存此由寒濕在表則熱蓄於脾胃脹理不開瘀熱與宿穀相搏煩鬱不消則大小便不通故身體面目皆變黃也 利小便爲治黃總訣

急黃 脾黃有熱穀氣鬱蒸因爲熱毒所加故猝然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也

勞黃 脾臟中風風與痰熱相搏故令身體發黃額上黑微汗出手足中熱薄暮發膀胱急四肢煩小便目利

名爲勞黃

腦黃 熱邪在骨髓腦爲髓海故熱氣從骨髓流入于腦則身體發黃頭痛眉疼

陰黃 陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名爲陰黃

癰黃 氣水飲停滯結聚成癰因熱氣相搏則鬱蒸不散故脇下滿痛而身發黃名爲癰黃

噤黃 心脾有痰熱心主於舌脾之絡脈出於舌下若身面發黃舌下大脈起青黑色舌噤不能語名爲噤黃

五色黃 凡人著五種黃其人冥漠不知東西者看其左手脈名手肝脈兩筋中其脈如有如無又看近手屈

肘前臂上當有三岐脈中央者名爲手肝脈兩廂者名岐脈看時若肝脈全無兩廂壞其人九死一生若中央

脈近掌三指道有如不絕其人必不死

酒疸 虛勞之人飲酒多進穀少則胃內生熱因大醉當風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發

赤斑

穀疸 穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失饑大食胃氣衝熏所致

女勞疸 其狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便 由大勞大熱而交接卽入水所致也

黑疸 黑疸之狀小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也諸疸久久多變爲黑疸

黃汗之爲病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染衣正黃如柏汁其脈自沉此由脾胃有熱汗出而入水中浴若水入汗孔中得成黃汗也

諸疽方

茵陳蒿湯 金匱 穀疸之爲病寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃爲穀疸此湯主之

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 大黃二兩 右三味以水一斗先煮茵陳減六升納二味煮取三升去渣分溫

三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

消石礬石散 同上 黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作

黑疸其腹脹如水狀大便秘黑時溲此女勞之病非水也腹滿者難治此方主之

消石 礬石燒等分 右二味爲散以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便

正黑是候也

梔子大黃湯 同上 酒黃疸心中懊憹或熱痛此方主之

梔子十四枚 大黃一兩 枳實五枚 豉一升 右四味以水六升煮取二升分溫三服

桂枝加黃耆湯 同上 諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之此方主之 亦主治黃汗

桂枝 芍藥 甘草各二兩 生薑三兩 大棗十二枚 黃耆二兩 右六味以水八升煮取三

升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗不汗更服

猪膏髮煎 同上 諸黃主之

猪膏半斤 亂髮 如雞子大三枚 右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

茵陳五苓散 同上 黃疸主之

茵陳蒿末一錢 五苓散五分 右二味和先食飲方寸匕日三服 此利小便之法

大黃消石湯 金匱 黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之

大黃 黃疸變臨滿者最 黃柏 硝石各四兩 梔子十五枚 右四味以水六升煮取二升去渣納硝更煮取一升

頓服 多此方乃下法也

麻黃醇酒湯 千金 治黃疸

麻黃三兩 以美清酒五升煮取二升半頓服盡冬月用酒春月用水

黃疸方 千金 治身目皆黃皮肉翹腫出

茵陳一把 梔子 二十枚 石膏一斤 以水五升煮二升取二升半去渣以猛火燒石膏令赤投湯中沸定

服一升覆取汗周身以粉粉之不汗更服 燒石膏之 義甚精妙

赤苓散 千金 主黑疸身皮大便皆黑

赤小豆 三十枚 茯苓六銖切 雄黃一銖 瓜丁四銖 女薑六銖 甘草二銖炙 以水三升煮豆茯苓取八

合搗四味爲散和半錢服之須臾當吐吐則愈亦主一切黃

寒水石散 千金 主肉疽飲少小便多白如泔色此病得之從酒

寒水石 白石脂 括蕪各五分 知母 兔絲子 桂心各三分 搗篩爲散麥粥服五分匕

日三服五日知十日差 此方不常用 聊備一格

女勞疸 千金 治黃疸之爲病日晡所發熱惡寒少腹急體黃額黑大便黑濇洩足下熱此爲女勞也腹滿者

難療

滑石研 石膏 研各五兩 爲散麥粥汁服方寸匕日三小便極利差

牛疸煎 千金 酒疸身黃麴蘗出此主之

牛疸一枚 大黃八兩 芫花一升 薑花半斤 右三味以酒一升切三味漬之一宿煮減半去渣納

牛膽微火煎令可丸如豆大服一服日移六七尺不知更服一丸腸上吐膈下痢或不吐痢而愈
救急三十種黃方外靈 用雞子一顆并殼燒灰研碎一合又溫之總和頓服身體眼暗極黃者不過三顆鼻

中蟲出神效

療黃疸方外靈 取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥苗穢麥苗亦得

近效瓜蒂散外靈 療黃疸

瓜蒂二七枚 赤小豆七枚 生秣米二七枚 丁香二七枚 右四味搗篩重者取如大豆二枚各著一枚鼻孔中

痛縮鼻須臾鼻中漉清黃水或從口中出升餘則愈病輕者小豆大則可不愈間日復顯用效或使人以竹

筒極力吹鼻中無不死者 噴鼻出黃水唐以前即有此法或用東腰葫蘆內白膜研細加麝少許吹鼻亦能出水

麻黃連軀赤小豆湯 傷寒 治傷寒瘧熱在裏身必發黃此主之

麻黃二兩 連軀二兩 赤小豆一升 杏仁四十粒 甘草二兩 生梓白皮一升 生薑二兩

大棗十二枚 右以潦一斗先煮麻黃去沫納諸藥煮取三升分溫三服 此方治傷寒餘邪未盡之黃與諸證微別

黃耆芍藥桂枝苦酒湯 金匱 黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如檗汁脈自沉

以汗出入水中浴水從汗孔入得之此湯主之

黃耆五兩 芍藥三兩 桂枝三兩 右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服

至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也 一方以美生釀代苦酒此病在表不在裏 金匱等書治疸病之方最多然用

黃水瀉不能入非決破其盛或提其黃水出淨必不除根此等病當求厥試驗驗和平輕淡之藥方治之專恃古方竟有全然不應者

小建中湯 見通 瓜蒂湯 方見

情志臥夢

靈素

靈大惑論五臟六腑之精氣皆上注於目而爲之精精之稟爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡
其稟氣之精爲白眼肌肉之精爲約束裏擷筋骨血氣之精而與脈并爲系上屬於腦後出於項中故邪中於
項因違其氣之虛其入深則隨眼系以入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪同其精其
精所中不相比也則精散精散則視岐視岐見兩物目者五臟六腑之精也榮衛魂魄之所常榮神氣之所生
也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽也故陰陽合傳而精明也目者心使也
心者神之舍也故精神亂而不轉卒然見非常處精神魂魄散不相得故曰惑也 素舉痛論帝曰予知百病

生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收靈則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結 陰

陽氣象大論東方生風在聲爲呼在變動爲握在志爲怒怒傷肝悲勝怒 所勝即五行 生尅之理 南方生熱在聲爲笑在變

動爲憂在志爲喜喜傷心恐勝喜中央生濕在聲爲歌在變動爲噦在志爲思思傷脾怒勝思西方生燥在聲

爲哭在變動爲咳在志爲憂憂傷肺喜勝憂北方生寒在聲爲呻在變動爲慄在志爲恐恐傷腎思勝恐 調

經論神有餘則笑不休神不足則悲血有餘則怒不足則恐 血并於陰氣并於陽故爲驚狂血并於陽氣并

於陰乃爲瘵中血并於上氣并於下心煩惋善怒血并於下氣并於上亂而善忘 以上 情志

不臥多臥 靈邪客篇黃帝問於伯高曰夫邪氣之客入也或令人目不瞑不臥出者何氣使然伯高曰五穀

入於胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脈而行呼吸焉榮氣者泌其津液

注之於脈化以爲血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而先行於四末分肉皮

膚之間而不休者也晝日行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於五臟六腑則衛

氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻陷不得入於陰陰虛故目不瞑黃帝曰善

治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其臥立至

大惑論黃帝曰人之多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉 善食人多善 臥往往如此 黃帝曰卒然

多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦閉而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多臥焉

不夜眠不晝眠 靈樞衛生會篇黃帝曰老人之不夜眠者何氣使然少壯之人不晝眠者何氣使然岐伯答

曰壯者之氣血盛其肌肉滑氣道通榮衛之行不失其常故晝精而夜眠老者之氣血衰其肌肉枯氣道滯五

臟之氣相搏其榮氣衰少而衛氣內伐故晝不精夜不眠 寒熱病篇陽氣盛則瞋目陰氣盛則瞑目

不得臥 素逆調論不得臥而息有音者是陽明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃

脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也下經曰胃不和則臥不安此之謂也夫起

居如故而息有音者此肺之絡脈逆也絡脈不得隨經上下故留經而不行絡脈之病人也微故起居如故而

息有音也夫不得臥臥則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主臥與喘也以上臥按風入

於陰經亦多臥

靈淫邪發夢篇陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢大火燔灼陰俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢

墮甚饑則夢取甚飽則夢予肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢恐懼哭泣飛揚心氣盛則夢喜笑恐畏脾氣盛則夢

歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬 素脈要精微論活蟲多則夢聚聚長蟲多則夢相擊毀傷以上

情志臥夢方

半夏秫米湯 靈樞 以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升治半

夏五合徐炊令竭為一升半去其滓飲汁一小杯日三稍增以知為度故其病新發者覆杯則臥汗出則已

矣久者三飲而已也 漢時一斗僅今二升余親見古銅量一枚較準如此

半夏麻黃丸 金匱 心下悸者此主之

半夏 麻黃等分 右二味末之煉蜜丸小豆大飲服三丸日三 此治飲在

桂枝救逆湯 同上 火邪者主之

梓枝三原 甘草二兩 生薑三兩 牡蠣五兩熬 龍骨四兩去 蜀椒三兩去 大棗十二枚 右七味末之

以水一斗二升先煮蜀漆減二升納語藥煮取三升去渣溫服
黃連阿膠湯傷寒論 治少陰病心中煩不得臥

黃連四兩 黃芩二兩 芍藥二兩 阿膠二兩 雞子黃二枚 右五味以水六升先煮三物取二升去渣納阿膠烱盡少冷納雞子黃攪和溫服七合此治腎氣沖心之不得臥故清心火以納腎氣

酸聚仁湯金匱 治虛勞虛煩不得眠
酸聚仁二升 甘草一兩 知母 茯苓 川芎各二兩 右五味以水八升先煮聚仁取六升納

諸藥煮取三升分溫三服同一心煩不眠而用諸別何醫者之多不審也 此方外應有加乾薑者亦可採取
溫膽湯千金 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服

半夏 竹茹 枳實各二兩 橘皮三兩 生薑四兩 甘草一兩 右六味咬咀以水八升煮取二升分三服又一不眠之症 方中一味生薑已足散膽中之寒庸醫則必以乾薑溫膽須知膽為清虛之腑無用熱補之理也

治多忘千金
菖蒲二分 茯苓 人參各五分 遠志七分 右五味治下餽酒服方寸匕日二夜一

五日後知神良
枕中方千金 治好忘
龜甲炙 龍骨 遠志去心 菖蒲等分 右四味治下餽酒服方寸匕日三常服令人大聰

鎮心省睡益智方千金翼
遠志五十兩 益智子 菖蒲各八兩 右三味為末以淳糯米酒服方寸匕一百日有效祕不令人知

療虛煩不可攻方外臺 青竹茹二升以水四升煮取三升去渣分溫五服

梔子豉湯

見傷寒

補心丸

天王補心丹

以上三方俱見經治

五穀病

耳目鼻口齒

靈樞

靈脈度篇五臟不和則七竅不靈

耳

靈素

靈厥氣篇精脫者耳聾

液脫者耳數鳴

素繆刺論邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大指次

指爪甲上去端如韭葉許各一瘡立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時間者不可刺也

此乃邪氣入絡卒然斷得

之症故

耳聾刺手陽明不已刺其通脈出耳前者

病源

耳聾瞤耳 津液爲風熱所乘結鞅成丸塞耳

耳方

補腎治五聾方

千金

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾如此久聾耳中作聲

葶麻仁五分

杏仁去皮尖

桃仁去皮尖

蠟八分

菖蒲

磁石各一兩

巴豆仁

一分去皮心熬石鹽三分

附子泡

通草各半兩

薰陸香一分 松脂二兩半

右十二味先搗諸草石等令細別搗諸仁如脂加松

脂及蠟合搗數千杵可丸乃止取如棗核大綿裏塞耳一日四五度出之轉捻不過三四度日一易之

菴蓉丸

濟生

治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉

山萸肉

石龍芮

一名胡

石菖蒲

兔絲子

羌活

鹿茸

石斛

磁石

附子各一兩

全蠍

七兩去毒

麝香

半兩旋入

右爲末煉蜜丸梧子大丸每服百丸空心酒下或鹽

湯下

醫香佛手散 奇效 治五般耳出水者

屏香少許 人牙 煨過存性出火毒以 人牙換石首魚齒亦瓦

一字服之即出

磁石猪腎羹 姜老 治老人久患耳聾腎臟強骨氣

磁石 一斤碎水調 去赤汁候乾

藥空腹食之作粥及入酒並得

通耳法 調生

磁石 用堅者如 豆大一塊 穿山甲 煨存性為 末一字

一個巴豆一粒研細綿裹塞耳痛取出

目

靈素

靈論疾診尺篇診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走者少陽病

素解精微論夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燔目故見風則泣下也

目方

七寶散 千金 主目瞽經年不愈方

琥珀

珠珀

去瞽方 千金

貝子 十枚 煨灰

右為細末每用少許吹耳內即乾及治小兒痘瘡出現壓者酒調

猪腎一對去脂 辰細切

右以水五升煮磁石取二升去磁石投腎調和以葱破薑椒作

右用新綿紙裹了塞耳口中銜少許鐵覺耳內如風雨即愈一方用斑毛

按此症如有火者服清火藥腎虛者服補腎藥隨症治無定方也

決明子

紫貝

貝子 十枚 煨灰

卷七 五藏 目 鼻

者加珍珠如貝子等分研如粉

補肝丸 千金 主明目

地膚子 藍子 葵藜子 車前子 瓜子 兔絲子 茺蔚子 各二兩 黃連 一兩中

青葙子 一合 大黃 二兩 決明子 細辛 螢火蟲 各五合 桂心 五分 右十四味搗篩煉蜜和丸

飲服如子大下十五丸可加至二十九丸慎生冷油蒜等物眼暗神方也

磁珠丸 倪微德原 機啓徵集 治神水寬大漸散昏如霧露中行漸視空中有黑花視物成二體及內障神水淡綠色淡白色

及治耳鳴及聾 磁石 二兩 辰砂 一兩 神龜 三兩生 右三味更以一兩水和作餅煮浮入前藥煉蜜丸每服十九丸加至

三十丸空心米湯下

石解夜光丸 治神水寬大漸散昏如霧露空中有黑花視物成二神水淡綠淡白色者

天門冬 二兩 兔絲子 七錢 人參 茯苓 各二兩 甘菊 山藥 枸杞 石斛

杏仁 各七錢 草決明 八錢 麥冬 熟地 生地 各一兩 肉蓯蓉 青葙子 羚羊角 各

葵藜 川芎 甘草 炙 黃連 防風 枳殼 烏犀 鎊各五兩 牛膝 七鎊半

右二十四味爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十五丸溫酒鹽湯送下 眼料藥不外此諸味

羚羊角散 局方 治風熱毒上衝眼目暴發赤腫或生瘡疼痛隱澀羞明

羚羊角 鎊 車前子 甘草 黃芩 川升麻 各二兩 決明子 二十四枚 龍胆草 去蘆 山梔仁 各五兩

右爲細末每服一錢食後溫熟水調下日進三服小兒可服五分

蟬花散 局方 治肝經蘊熱風毒上攻眼目翳膜遮睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵淚內外障眼

草决明炒 甘菊花 川芎不見火 蟬退洗去土 山梔子 穀精草 防風不見火 黃芩去土

蔓荊子 木賊草 羌活不見火 荊芥 蜜蒙花 白蒺藜炒去刺 甘草各等分 右為末每服

二錢用茶清調服或用荊芥湯入茶少許調服亦得食後及臨臥時服此去翳通治方

洗眼藥養老書

膽礬一兩煨令白 滑石一兩 秦皮半兩 膩粉二錢 右四味每用一字湯泡候溫閉目洗兩管頭以冷為

度膽礬入目極痛煨用頗宜 按五竅之病惟目病最多所以另有專科此集略述內治數方以備揀取 至於全體治法則當廣求眼科諸書而細討之風火時眼煎方即於九散中擇對症之藥酌用可也

鼻

靈素

靈憂患無言簡人之鼻洞涕出不收者頰頰不開分氣失也 素五臟別篇五氣入鼻藏于心肺心肺有病而

鼻為之不利也

辛頰鼻淵 素氣厥論膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為齕齕眼目膿血汗也故得之氣厥也

鼻方

通草散千金 治鼻中息肉

通草半兩 礬石一兩燒 眞珠一錢 右三味下篩然絲如棗核取藥如小豆著綿頭納鼻中三日此

能去一切息肉

鼻方千金 治鼻中息肉不得息

礬石燒 藜蘆各半兩 瓜蒂二七枚 附子半兩泡 右四味各搗下篩合和以竹管取藥如小豆大納孔

中吹之以懸絮塞鼻中日再以愈為度吹不

消鼻痔方

苦丁香 甘遂各二錢 青黛 草烏尖 枯礬各二分 右爲細末麻油搜令硬不可爛旋丸如

鼻孔大小用藥納鼻內令至痔肉上每日一次

凌雪花散 選方 治酒齶鼻

凌雪花 山梔等分 右爲末每服二錢食後茶湯調下

蒼耳散 治鼻流涕不止名曰鼻淵

辛夷仁半兩 蒼耳子炒二錢半 香白芷一兩 薄荷五分 右爲末每服二錢用葱茶湯食後調服

治鼻淵方 本事 山梔子 不拘多少 燒存性 末之搗入鼻中立愈

又方 藿香爲末用豬膽汁或牛膽汁丸每服一錢 按鼻病惟鼻淵最重當博求效方不得徒恃外治法也

又方 絲瓜連根處藤炙爲末酒服 此治鼻中 有蟲者

鼻中瘰肉

礞砂 雄黃 巴豆炭 製信 提硝 珠 冰片 礞砂

苦丁香 以上俱可選用耳痔及諸瘰肉皆同

口齒

靈素

口苦 靈邪氣臟腑病形論膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之噦中訶訶然數睡

齒痛 靈雞病篇齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明

重舌 靈終始篇重舌刺舌柱以披針也

瘡 靈變毒無言篇人卒然無音者寒氣客於厭則厭不能發發不能下至其開闔不致故無音 肝脈驚暴

有所驚駭脈不至若瘡不治自己 驚駭而瘡者與有 瘡之瘡皆不必治

口糜 素氣厥論膀胱移熱于小腸高腸不便上爲口糜
齒寒 素繆刺論邪客於足陽明之經令人齩齩上齒寒

病源

齩齩者 睡眠而齒相磨切也此由血氣虛風邪客於牙車筋脈之間故因睡眠氣息喘而邪動引其筋脈故
上下齒相磨切有聲謂之齩齩

滯頤 脾冷不能收攝涎唾潰於頤也

口齒方

口甘方 素問 有病口甘者此五氣之溢也名曰脾痺夫五味入口藏於胃脾爲之行其精氣津液生脾故令

口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥者也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉爲

消渴治之以蘭除陳氣也 蘭草性味甘能利水道脾不祥除胸中痰癖其氣清香能生津止渴潤肌肉故可除陳積蓄熱之氣

口苦方 素問 有病口苦者病名膽痺夫肝者中之將也取決于膽咽爲之使此人者數謀慮不決故膽虛氣

上溢而口爲之苦治之以膽募俞 數謀慮不決肝膽俱勞則必虛虛則氣不固故膽氣上溢而口苦膽募在肋本經之日月也膽俞在背足太陽之穴也經又云口苦取陽陵泉亦膽經之穴在委中之外廉

療口瘡 千金 治口瘡久不差入胸中並生瘡三年以上不瘳者

濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根夏用莖葉 冬青葉湯亦可漱

推頰車法 同上 治失欠頰車蹉開張不合 一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣惟當疾出其指恐誤

嗜傷人指也 外塗南星末

口氣鼻穢方 同上 常以月旦日未出時從東壁取步七步回頭向垣立含水噴壁七遍口即美香 此名禁法

口中臭方 同上 細辛豆蔻含之甚良

口香去臭方 同上 井花水三升漱口吐廁中良

治緊唇方同上 取蛇皮拭淨燒爲灰敷之 又方灸虎口男左女右

塗唇方同上 治唇黑腫痛癢不可忍 燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和敷之亦治濇唇

刺舌法同上 治舌卒腫滿口溢如吹猪胞氣息不得通須臾不治殺人 刺舌兩邊大脈血出勿使刺著舌

下中央脈血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篋令赤熨瘡數過以絕血也

療舌腫方同上 治舌腫起如猪胞 釜下墨末以醉厚傳舌上下脫去更傳須臾即消若先决出血汁寬傳

彌佳凡此患人皆不識或錯治益困殺人甚急但看其舌下自有噤蟲形狀或如螻蛄或如蠶子細看之有

頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自消

療舌腫方同上 治舌上黑有數方大如筋出血如湧泉此心藏病

戒鹽 黃苓 黃柏 大黃各五兩 人參 桂心 甘草各二兩 右七味蜜丸

梧子大以飲服十丸日三亦燒鐵篋烙之

療重舌同上 并治舌上生瘡涎出 以蒲黃末傅之不過三度差

療舌脹方同上 用雄雞冠血蓋盛浸舌咽下即縮

療舌腫脹方本事 治心脾壅熱生木舌腫脹

元參 升麻 大黃 犀角 甘草各等分 右爲細末每服三錢水一盞煎至五分

溫服不拘時

饜失音養老書

皂角一挺刮去黑皮并子 蘿藦一個切作片 右以水二碗同煎至半碗服之不過三服便語吃却蘿藦更妙此方乃去喉間之痰涎也

療馬喉痺千金 治喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺

馬鞭草根一握一名杜牛膝 勿中風截去兩頭搗取汁服之

琥珀犀角膏 治咽喉

真琥珀研

犀角屠生用各一錢

人參

棗仁

茯苓

辰砂研各二錢

片腦研一錢

右為末研勻

蜜為膏以磁器收貯候其疾作每服一彈子大以麥冬濃煎湯化下一日連進五服

此治陰火上炎之喉痛

喉腫刺法

千金翼

治咽喉不得息若毒氣硬咽毒攻咽喉 刺手小指爪文中出血即愈逐左右刺出血神效

立愈一法刺兩手少商穴出血其穴在大指內廉去爪甲如韭葉

口旁惡瘡方千金翼

亂髮灰

故絮灰

黃連末

乾薑末等分

右四味合和為散以粉塗上不過三遍

數間壓方千金

治野醫烏壓令面潔白

馬珂二兩

白附子

鷹屎白

珊瑚各一兩

右四味研成粉和勻用人乳調每夜取敷面明且濕

漿水洗之

又方千金 李子仁為末和雞子白敷一宿即落 一方用白附子末酒和敷之即落

止牙痛方

蟾酥七分

硃砂

雄黃各三分

甘草一分

右研極細以飛麪為丸如菜子大絲綿裏包塞在痛

處

治牙痛仙方 以羊前蹄膝合盤骨以酥塗炙黃為末入細辛末一錢雄黃末五分共三味研極細末擦患處

立愈

治牙疼方千金翼

蒼耳子五升

右一味以水一斗煮取五升熱含之疼則吐吐復含不過三劑愈無子莖葉皆得用之

如神散局方 治風牙疔牙攻疔疼痛牙斷動搖連頰浮腫

露蜂房微炙 川椒 去目及閉口 微炒出汗 右爲末每用一錢水一盞入鹽少許同煎八分乘熱漱之冷卽吐一服立

效 二味炙灰爲末搽亦效

細辛散局方 治風中牙疼牙斷宣爛牙齒搖動腮頰浮腫

紅椒 縮砂去殼 鶴鹼 牙皂 華撥各半兩 荊芥 細辛各一兩 白芷

川烏各二兩 右爲細末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得咽少時用溫水漱口頰頰擦之立有神效

治風寒牙疼之症

按牙疼有數種寒熱風火蟲蝨治各不同非對症則不愈故有效有不效至於喉痺症則變殊此屬外科病變無窮茲偶錄一二方未及萬一若欲專治此症非廣求博識不可

雜病

靈素

靈口問篇黃帝曰人之欠者何氣使然岐伯答曰衛氣晝日行於陽夜半則行於陰陰者主夜夜者臥陽者主上陰者主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡而陽氣盛則寤矣 黃帝曰人之噦者 乾嘔爲噦或云即噦氣 何氣使然岐伯曰穀入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新穀氣俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出於胃故爲噦 黃帝曰人之噦者何氣使然岐伯曰

此陰氣盛而陽氣虛陰氣疾而陽氣徐陰氣盛而陽氣絕故爲噦 黃帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故爲振寒慄 黃帝曰人之噦者 噦呢逆也 何氣使然岐伯曰寒氣客於胃厥逆從上下散復出於胃故爲噦 黃帝曰人之噦者何氣使然岐伯曰陽氣和利滿於心出於鼻故爲噦 黃帝曰

人之禫者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脈虛諸脈虛則筋脈懈惰筋脈懈惰則行陰用力氣不能復故爲禫 黃帝曰人之哀而泣涕出者何氣使然岐伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故泣涕出

焉液者所以灌精滯空數者也故上液之道開則泣泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣

黃帝曰人之太息者何氣使然岐伯曰憂思則心係急心係急則氣道約約則不利故太息以伸出之 黃帝

曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於胃胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下

黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脈之所聚也故胃中空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭者故

耳鳴 黃帝曰人之自齧舌者何氣使然此厥逆走上脈氣至也少陰氣至則齧舌少陽氣至則齧頰陽明

氣至則齧唇矣凡此十二邪者皆奇邪之走空竅者也故邪之所在皆爲不足 經氣爲邪所據則正氣不能復歸故爲不足當引本經之正氣以逐邪出外所謂正

氣者即本經之氣故能禦邪此指針法言之庸醫不知竟 用補藥于邪氣所留之經則是補住其邪矣害惡言哉 故上氣不足腦爲之不滿耳爲之苦鳴頭爲之苦傾目爲之眩中

氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則乃爲痿厥心惋 五味篇酸走筋多食之令人癩鹹走血多食

之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悶心 師傳篇岐伯曰入

國問俗入家問諱上堂問禮臨病人問所便 此句爲萬世辨症之鑰訣 黃帝曰便病人奈何岐伯曰夫中熱消痺則便寒寒中

之屬則便熱胃中熱則消穀令人懸心善饑臍以上皮熱腸中熱則出黃如藥臍以下皮寒 按寒字當作熱字 胃中寒則

腹脹腸中寒則腸鳴飧泄 凡脹滿宜溫藥瘕泄亦同 胃中寒腸中熱則脹而且泄胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹 黃帝曰

胃欲寒飲腸欲熱飲 百病始生篇陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃

之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣 邪客篇黃帝問於岐伯曰

人有八虛各何以候岐伯答曰以候五臟黃帝曰候之奈何岐伯曰肺心有邪其氣留於兩肘肝有邪其氣留

於兩腋脾有邪其氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膕凡此八虛者皆機關之室真氣之所過血絡之所遊邪

氣惡血固不得住留住則傷筋絡骨節機關不得屈伸故拘攣也 大惑篇黃帝曰人之善饑而不嗜食者

何氣使然岐伯曰精氣并於脾熱氣留於胃胃熱則消穀消故善饑胃氣逆上則胃脘寒故不嗜食 宣明

五氣論五味所入酸入肝辛入肺苦入心鹹入腎甘入脾是謂五入五氣所病心爲噫肺爲欬肝爲語脾爲吞

腎爲欠爲嘔胃爲氣逆爲噦爲恐大腸小腸爲泄下焦溢爲水膀胱不利爲癰不納爲遺溺膽爲怒是爲五病
五精所并精氣并於心則喜并於肺則悲并於肝則憂并於脾則畏并於腎則恐是爲五并虛而相并者也五
臟所惡心惡熱肺惡寒肝惡風脾惡濕腎惡燥是爲五惡五臟化液心爲汗肺爲涕肝爲淚脾爲涎腎爲唾是
爲五液五味所禁辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹若走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食
甘酸走筋筋病無多食酸是爲五禁無令多食五病所發陰病發於骨陽病發於肉陰病發於冬
陰病發於夏是爲五發五邪所亂邪入於陽則狂邪入於陰則痺搏陽則爲癰疾搏陰則爲瘡陽入之陰則靜
陰出之陽則怒是爲五亂五邪所見春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋得夏脈冬得長夏脈名曰陰出之陽
病善怒不治是謂五邪皆同命死不治五臟所藏心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏志是爲五臟所藏五臟
所主心主脈肺主皮肝主筋脾主肉腎主骨是謂五主五勞所傷久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久
行傷筋是謂五勞所傷五脈應象肝脈弦心脈鉤脾脈代肺脈毛腎脈石是謂五臟之脈 至真要大論大要
曰君一臣二奇之調也君二臣四偶之制也君二臣二奇之制也君三臣六偶之制也故曰近者奇之遠者偶
之汗者不以奇下者不以偶補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄適其至所此之謂
也是故平氣之道近而奇偶制小其服也遠而奇偶至大其服也大則數少小則數多多則九之少則二之奇
之不去則偶之是謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也 岐伯曰辛甘發散爲陽酸
苦涌泄爲陰鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽六者或收或散或緩或急或燥或潤或奠或堅以所利而行之調
其氣使其平也 岐伯曰有毒無毒所治無主適大小爲制也帝曰請言其制岐伯曰君一臣二制之小也君
一臣三佐五制之中也君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之堅者削之客者除
之勞者溫之結者散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之逸者行之驚者平之上之下之摩
之浴之薄之劫之開之發之適事爲故 帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因熱用寒因寒用通因通用必

伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已 岐伯曰主病之謂君
佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也 岐伯曰諸寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求
其屬也帝曰善服寒而反熱服熱而反寒此其故何也岐伯曰治其王氣是以反也 五味入胃各歸所喜故
酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而久天之由也 陰陽應象
大論因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之形不足者溫之以氣精不足者補之以味其高者因而越
之其下者引而竭之中滿者瀉之於內其有邪者瀉形以爲汗 五常政大論岐伯曰大毒治病十去其六常
毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行
復如法必先歲氣無伐天和 至真要大論帝曰願聞病機何如岐伯曰諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬
於腎諸氣膹鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱瞢瘡皆屬於火諸痛痺瘡皆屬於心諸厥固泄皆屬於下
諸痿喘嘔皆屬於上諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸逆項強皆屬於濕諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬
於熱諸燥狂越皆屬於火諸暴強直皆屬於風諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火
諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱諸病水液澄澈清冷皆屬於寒諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱 生氣通天論
陽因而上衛外者也因於寒欲如轉樞起居如驚神氣乃浮因於暑汗煩則喘渴靜則多言體若燔炭汗出而
散因於濕首如裹濕熱不擾大筋纏短小筋弛長纏短爲拘弛長爲痿因於氣爲腫四維相代陽氣乃竭陽氣
者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽潰潰乎若壞都汨汨乎不可止陽氣者
大怒則形氣絕而血莩於上使人薄厥有傷於筋縱其若不容汗出偏沮使人偏枯汗出見濕乃生漉癘高梁
之變足生大丁受持虛勞汗當風寒溼爲皴鬱乃溼陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大
僂陷脈爲癭留連肉腠俞氣化薄傳爲善畏及爲驚駭榮氣不從逆於肉理乃生癰腫魄汗未盡形弱而氣慳
穴俞以閉發爲風癩故風者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此因時之序也 春傷

於風邪氣留連乃爲洞泄夏傷於暑秋爲涼瘧秋傷於濕上逆而咳發爲痿厥冬傷於寒春必溫病四時之氣更傷五臟 通平虛實論黃帝問曰何爲虛實岐伯對曰邪氣盛則實精氣奪則虛 刺志論氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑穀入多而氣少者得之有所脫血濕居下也穀入少而氣多者邪在胃及與肺也玉機真臟論黃帝曰余聞虛實以決死生願聞其情岐伯曰五實死五虛死帝曰願聞五實五虛岐伯曰脈盛皮熱腹脹前後不通悶瞀此謂五實脈細皮寒氣少泄痢前後飲食不入此謂五虛帝曰其時有生者何也岐伯曰漿粥入胃泄注止則虛者活身汗得後痢則實者活此其候也 臟氣法時論肝苦急急食甘以緩之肝欲散急急食辛以散之用辛補之酸瀉之心苦緩急急食酸以收之心欲奠急急食鹹以奠之用鹹補之甘瀉之脾苦濕急急食苦以燥之脾欲緩急急食甘以緩之用苦瀉之甘補之肺苦氣上逆急急食苦以泄之肺欲收急急食酸以收之用酸補之辛瀉之腎苦燥急急食辛以潤之開腠理致津液通氣也腎欲堅急急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之夫邪之客於身也以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至於所生而持自得其位而起必先定五臟之脈乃言間甚之時死生之期也 毒藥攻邪五穀爲養五果爲助五畜爲益五菜爲充氣味合而服之以補精益氣

以上皆辨病治病之機訣能
精通其理方能識症擇方

解脩 素玉機真臟論冬脈太過則令人解脩脊脈痛而少氣不欲言 刺癰論足少陽之癰令人身體解脩寒不甚熱不甚惡見人見人心憊憊然熱多汗出甚

食脩 素氣厥論大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食脩胃移熱於膽亦曰食脩

膈洞 靈根結籍太陰爲開開折則食糜無所輸隔洞故開折者氣不足而生病 邪氣臟腑病形篇腎脈微緩爲洞洞者食不化下噎還出

重強 素玉機真臟論脾脈不及則令人九竅不通名曰重強

齟齬 靈論疾診尺篇診齟齬痛按其陽之來有過者熱在左左熱在右右熱在上上熱在上下熱 繆刺論

齒顛刺手陽明不已刺其脈入齒中者立已

手陽明之脈貫頰入於齒中故當刺齒陽穴不已則刺其痛脈之入齒中者按甲乙經注手陽明脈齒二間三間合谷陽谿偏歷溫溜七穴主齒痛

金匱

跌跋 其人但能前不能却刺腦人二寸此太陽經傷也

所載雜病其方俱散見於各證條內茲不復贅按病施治無遺法矣

蘭亭輒範卷十號

Faint, illegible text within the main body of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Small mark or character on the right edge of the page.

Small mark or character on the right edge of the page.

蘭臺軌範卷八

目錄

桂枝茯苓圓

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

芩子茯苓散

當歸貝母苦參丸

當歸散

白朮散

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

溫經湯

土瓜根散

旋覆花湯

大黃甘遂湯

礬石丸

紅藍花酒

蛇床子散

狼牙湯

三物黃芩湯

當歸建中湯

佛手散

回生丹

開骨散

奪命散

下死胎方

交加散

護胎方

海蛤散

小柴胡加地黃湯

烏雞煎圓

豬蹄湯

紫石英丸

催生丹

小調經散

二味參蘇飲

紫蘇飲

紫散

秦桂丸

求嗣方

黃龍湯以上婦人

瀉青丸

導赤散

生犀散

瀉黃散

五味異功散

益黃散

瀉白散

阿膠散

地黃丸

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

六君子湯

補中益氣湯

香砂助胃膏

肥兒丸

九味蘆薈丸

木香丸

胡黃連丸

如聖丸

蘭香散

白粉散

蟾蜍丸

蘇莢散

仙方活命飲

五苓散

小柴胡湯

黃連香薷飲

漏銀丸

大青膏

歸脾湯

蟬退鉤藤散

團參湯

神效當歸膏

治痘出眼中方

治牙疳方

安蟲散

消積丸

白虎湯

加味逍遙散

金匱加減腎氣丸

利驚丸

百祥丸

越鞠丸

羚羊角丸

參附湯

保命散

治癩方

治吐乳方

白玉散

保和丸

地黃清肺飲

龍膽瀉肝湯

五色丸

小續命湯

半李膏

安神丸

止汗散

人參養榮湯

治疔積方

治骨蒸方

治蠶螂子方

柳華散

四神丸

參蘇飲

茵陳湯

斷癩丹

鉤藤鉤飲

雄黃散

火花膏

常歸六黃湯

浴體法

治赤痢方

治遺尿方

摺

吳江徐靈胎洵滋著

婦人

案問

六元正紀大論黃帝問曰婦人身重毒之何如岐伯曰有故無殞亦無損也帝曰願聞其故岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死 腹中論帝曰何以知懷子之且生也岐伯曰身有病而無邪脈也 奇病論黃帝問曰人有重身九月而瘡此何為也岐伯曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復 平人氣象論婦人手少陰脈動甚者妊子也

難經

妊之為病其內苦結女子為癰聚 左者為腎右者為命門命門者諸精神之所舍原氣之所繫也男子以藏精女子以繫胞

金匱

問曰新產婦人有三病一者病瘧二者病鬱胃三者大便難何謂也曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘧亡血復汗寒多故多鬱胃亡津液胃燥故大便難產婦鬱胃其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必胃胃家欲解必大汗出以血虛下厥狐陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之 雖當汗出不宜太過 師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有瘀血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利 產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯主

之熱在裏結在膀胱也 婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室治之無
犯胃氣及上二焦必自愈 婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼和胸脅滿如結胸狀譫
語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之 期門二穴在乳頭直下四寸第
二肋端此等刺法最易學也 婦人之病因虛積冷結爲氣
爲諸水斷絕至有歷年血寒積結胸門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結繞臍塞
痼或兩脇疼痛與臟相連或結熱中痛在關元脈數無瘡肌若魚鱗時著男子非止女身在下未多經候不勻
令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣街氣街急痛膝脛疼痛奄忽眩胃狀如厥癰或有憂慘悲傷多嘔此皆
帶下非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行其針藥治危得安其雖同病
脈各異源子當辨記勿謂不然 問曰婦人年五十所病下痢數十日不止暮即發熱小腹裏急腹滿手掌煩
熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當
以溫經湯主之 婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之 方無考校本云
宜是膠艾湯 婦人懷娠六七月脈弦發熱其胎愈
脹腹痛惡寒者少腹如扇 形容惡
寒之盛 所以然者子臟開故也當附子湯溫之 方無考 婦人傷胎身腹滿不得小便
從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮關元小便微利則愈

病源

妊娠數墮胎候

血氣虛損子臟爲風冷所居則血氣不足故不能養胎所以致胎數墮候妊娠而恒腰痛者

喜墮胎也

按墮胎皆由於血熱

兩胎一死一生候

陽施陰化精盛有餘者則成兩胎其兩胎而一死者候其胎上冷是

胎已死也

妊娠過年不產

由挾寒冷宿血在胞而有胎則冷血相搏令胎不長產不以時若其胎在胞日月雖多其胎

醫小轉動勞羸是挾於病必過時乃產

胞轉，躋下急痛小便不通是也其病皆不同胞轉及胞落並致死

帶下三十六疾 諸方說三十六疾者是十二癰九痛七害五傷三固是也十二癰者是所下之物一如膏二如青血三如紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如葵根蕪八如凝血九如青血血似水十如米汁十一如月浣十二經度不應期也九痛者一陰中傷痛二陰中淋痛三小便即痛四寒冷痛五月水來腹痛六氣滿並痛七汁出陰中如蟲嚙痛八脅下皮痛九腰痛七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房六害如七害睡五傷者一窮孔痛二中寒熱痛三小腹急牢痛四臟不仁五子門不正引腎痛三固者一月水閉塞不通其餘二固文缺不載

與鬼交 臟腑虛神守弱鬼氣得病之也其狀不欲見人獨言笑悲泣眠來伏或如鳥喙

惡阻 心中澁悶頭眩四肢煩痿懈惰不欲執作惡聞食氣欲嘔食鹹酸果食多睡少起乃至三四月以上大劇者不能自勝舉也此由婦人元本虛羸血氣不足腎氣又弱兼當風食冷太過心下有痰氣挾之而有妊也子滿 此由脾胃虛弱有停水而挾以妊娠也水漬於胞則令胎壞惟將產之月而脚微腫則其產易蓋胞藏水血多也初妊娠者則反壞胎

胎漏 此由衝任脈虛不能約制太陽少陰之經血也亦名胞阻漏血盡則人斃也

鬼胎 正虛則妖魅精入臟如懷娠

胎疽 其母臟氣熱熏蒸於胎

血分 是經先斷而後成水病以其月水壅塞不通經血分而爲水故曰血分

胞絡傷損 子臟虛冷氣下衝則陰挺出謂之下脫亦有因產用力偃氣而陰脫者

陰臭 由子臟有寒寒搏於津液蘊積氣衝於陰故變臭也 此亦由內熱所致

子臟開 由子臟虛宿虛因冷氣乘之血氣得冷不得相榮故令開也

婦人方

桂枝茯苓丸^{金匱} 治婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者爲癥瘕害妊爰六月動者

前三月經水利時胎也下血者後斷三月不也所以血不止者其癥不去故也當下其癥此主之

桂枝 丹皮 茯苓 桃仁去皮尖熬芍藥各等分 右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食

前服一丸不知加至三丸

當歸芍藥散^上 治婦人懷娠腹中疝痛

當歸三兩 芍藥一斤 茯苓四兩 白朮四兩 澤瀉半斤 芎藭三兩 枌爲散取方寸匕酒和日

三服

乾薑人參半夏丸^上 治妊娠嘔吐不止

乾薑 人參各一兩 半夏二兩 右三味末之生薑汁糊丸如梧子大飲服十丸日三

葵子茯苓散^上 治妊娠有水氣身重小便不利瀝漸惡寒起卽頭眩

葵子一斤 茯苓三兩 右二味枌爲散飲服方寸匕日三服小便利則愈

當歸貝母苦參丸^上 右妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母 苦參各等分 右三味末之蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸

當歸散^上 婦人妊娠宜常服

當歸 黃芩 芍藥 芎藭各一斤 白朮半斤 右五味枌爲散酒服方寸匕日再服妊

娠常服卽易產胎無苦疾產後百病悉主之

白朮散^上 妊娠養胎

白朮 芎藭 蜀椒三分去汗牡蠣 右四味枌爲散酒服一錢匕日三服夜一服但苦痛加芍

藥心下毒痛倍加芍藥心煩吐痛不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以酸漿水服之若嘔

以醋漿水服復不解者小麥汁服之以後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置原水無分即

枳實芍藥散金匱 治產後腹痛煩滿不得臥

枳實燒令黑勿太過 芍藥等分 右二味杵為散服方寸匕日三服并主癰腫以麥粥下之假令腹痛不愈此為

腹中有瘀血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

下瘀血湯同

大黃三兩 桃仁二十枚 蟅蟲二十枚 宋之蜜和為四丸以酒一升煎一丸取八合頓服之新血下如豚

肝以丸作加又一法按新字當作廢字

竹葉湯同 治產後中風發熱面赤喘而頭痛

竹葉一把 葛根三兩 防風 桂枝 桔梗 人參 甘草各二錢 附子一枚泡

大棗十五枚 生薑五兩 右七味水一斗煮取二升半分溫三服溫覆取汗出 頸羸強用大附子一枚

破之如豆入前藥揚去沫 嘔者加半夏半升洗

竹皮大丸同 治婦乳中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹 石膏各二分 桂枝一分 甘草七分 白薇一分 右五味末之蜜肉丸如彈子大飲服一

丸日三夜一 有熱倍白薇 煩喘者加柏實一分

白頭翁加甘草阿膠湯同 治產後下痢虛極

白頭翁 甘草 阿膠各二兩 秦皮三兩 黃連二兩 柏皮三兩 右六味水七升煮二升

半納膠令消分溫三服

半夏厚朴湯同 治婦人中如有痰醫

半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩 生薑五兩 乾薑二兩 右五味水七升煮取四升分溫四服日

三夜一

甘麥大棗湯同 治婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸此主之

甘草三兩 小麥一升 大棗十個 右三味水六升煮取三升分溫三服亦補脾氣

溫經湯同 主婦人曾經半產瘀血在少腹不去其證唇口乾燥

吳萸茶三兩 當歸 芎藭 芍藥 人參 桂枝 阿膠 丹皮各二兩

一 生薑三兩 甘草二兩 半夏一升 麥冬一升去心 水一斗煮取三升分溫三服 亦主婦人少腹寒

久不受胎兼治崩中去血或月水來過多及至期不來調經方

土瓜根散同 治帶下經水不利少腹滿痛經一月再見

土瓜根 芍藥 桂枝 鹿蠹各三兩 右三味杵為散酒服方寸匕日三服 此治瘀血伏留 在衝脈之方

旋覆花湯同 寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏

下此湯主之

旋覆花三兩 葱十四莖 新絳少許 水三升煮取一升頓服

大黃甘草湯同 治婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此為水與血俱結在血室也此主之

大黃四兩 甘草 阿膠各二兩 右三味以水三升煮取一升頓服其血當下

礬石丸同 治經水閉不利臟堅癖不墜中有乾血下白物

礬石三分燒 杏仁一分 右二味末之煉蜜丸棗核大納臍中劇者再納之

紅藍花酒同 治婦人六十二種風腹中血氣刺痛

紅藍花一兩 酒一大升 減煎半頓服一半未止再服

花末子散同 治婦人陰寒盛陰中坐藥

蛇床子一味末之以白粉少許和合如相得如聚大棉裹納之自然溫

狼牙湯同上 治婦人陰中生瘡蝕爛者

痕牙三劑 水四升 煮取半升以綿纏筋如繭絞湯瀝陰中日四遍

三物黃芩湯千金 治婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩一兩 苦參二兩 地黃四兩 右三味水六升煮取二升溫服一升多吐下蟲

當歸建中湯千金 治產後羸虛不足腹中刺痛不止吸吸少氣或苦少腹中急摩痛引腰背不能食飲產後一

月日得四五劑為善令人強壯宜

當歸四兩 桂枝三兩 芍藥六兩 生薑三兩 甘草二兩 大棗十二個 右六味水一斗煮取三升

分攤三服一日令盡 若大虛者加飴糖六兩湯成納之火上煖令飴消 若去血過多崩傷內衄不止加

地黃六兩阿膠二兩

佛手散本事方又 名淨歸湯 調經

芎藭二兩 當歸三兩 右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫服

回生丹 此催生之聖藥

錦紋大黃一斤蘇木三兩打碎用河水五 大黑豆三升水浸取殼用絹袋盛煮同豆煮 紅花三兩炒黃色入好酒三 醋九斤陳

大黃末入淨鍋下米醋三斤文火熬之以長木筋不住手攪之成膏再加醋三斤熬之又加醋三斤次第加

畢然後下黑豆汁三碗再熬次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取瓦盆盛之大黃鍋把亦鑊下入後藥

同磨 人參 當歸酒洗 芎藭 香附酒炒 延胡索酒炒 蒼朮米泔 蒲黃隔紙 茯苓

桃仁各一兩去 牛膝五錢 甘草炙 地榆酒洗 川羌活 橘紅 白芍各三錢 木瓜

青皮各三錢 乳香 沒藥 益母草三兩 木香四錢 白朮三錢米 烏藥二兩五 良薑四錢

馬鞭草 五錢

秋葵子 三錢

熟地 一兩酒浸九次 蒸曬如法製就

山稜 五錢醋浸 透紙裏煨

五靈脂 五錢醋煮化 焙乾細研

山黃肉 五錢酒 浸蒸搗

上三十味并前黑豆殼共曬為末入石臼內大黃膏拌勻再下熟蜜一斤共搗千杵為丸重二錢七八分陰乾不可火烘燂蠟為殼護之用時去蠟

開骨散 臨產婦交骨不開

當歸五錢

龜板三錢醋炙研芎藭二錢

婦人髮一團

水煎服

奪命散 產後

沒藥

血竭等分

右研為細末纔產下用童便細酒半杯煎一二沸調下二錢絡久再服其惡血

下行便不衝上免生百疾

下死胎方

本事方

桂木三錢

麝香當門子一粒

同研溫酒服須臾如手推下比之用水銀等藥此不致損元氣也

交加散

同上

治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多少結聚為瘕產後中風

生地黃

五兩研取汁

生薑

五兩研取汁

右交互用汁浸一夕各炒黃漬盡汁為度末之尋常腹痛酒調下三錢尤不

可缺

護胎方 同上 治妊娠時氣身熱令子不落

伏龍肝為末水調塗臍下二寸乾則易差即止 又取井中泥心下乾則易

海蛤散

同上

治婦人傷寒血結胸膈不可撫近

海蛤

滑石

甘獻各一兩 芒硝半兩

右為末每服二錢雞子清調下

小柴胡加地黃湯

同上

治婦人室女傷寒發熱或發寒熱經水適來或適斷晝則明了夜則譫語如見鬼狀亦

治產後惡露方來忽爾斷絕

榮胡一兩一分人參

黃芩

甘草

生地黃各半兩

右為末每用五錢水二盞生薑五片薑

二枚煎至八分去渣服此即雞入血室

烏雞煎圓局 治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之

烏雄雞一隻 人參

白朮

石床

丹皮

黃耆

烏藥

草果

延胡索

地黃熟乾者洗焙木香

琥珀

肉豆蔻各半兩陳皮

紅花

川烏泡

海桐皮

芍藥白者

附子泡去皮臍肉桂去粗皮

蓬莪朮各三兩蒼朮米泔浸切焙一兩半

右細剉用烏雄雞一

隻湯搗去毛及腸肚將上藥安放雞腹中用新瓦好酒一斗同煮令乾去雞骨以油單紙盛焙乾為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸

豬蹄湯局

治乳婦氣少血衰脈澀不行絕無乳汁

豬蹄一隻

木通五兩

右將豬蹄淨洗依食法事治次用水一斗同木通浸煮得四五升取汁飲如乳

不下再服為妙

紫石英丸局

治婦人久冷無子及數經墮胎經水不調崩漏帶下三十六病積聚癥瘕少腹急重小便白濁

烏賊魚骨燒灰甘草炙

柏子仁微炒別研山楨各一兩半辛夷仁

肉桂去粗皮

卷栢

石斛

乾熟地黃

芎藭

牡蒙

禹餘糧醋淨七次研各二兩人參

續斷後

細辛

桑寄生

牛膝

厚朴薑汁炙

食茱萸

當歸炒

川烏泡去皮臍乾薑泡

丹皮各一分

天門冬去心

紫石英細研飛各三兩

右為細末煉蜜丸如桐大每服三十丸溫酒或米飲下空心食前日二服

備生丹局

治產婦產育艱難或逆或橫並宜服之

母丁香末一錢

麝香別研一錢

兔腦髓臘月者去皮搗如泥乳香別研極細一分

右拌勻以兔腦和圓如雞豆大陰乾用油紙蜜封

貼溫水服一丸即時產下隨男左女右手中握丸藥出是驗

小調經散局 治產後敗血循經流入四肢腐爛如水服此血行腫消則愈

沒藥 琥珀 桂心 白芍 當歸各一錢 細辛 麝香各五分 爲末薑汁酒各少許

調服 此方治血分病最良

二味參蘇飲 治產後瘀血入肺欬喘急

人參一兩 紫蘇二兩疑是蘇木 作一劑水煎服若既愈常用六君子湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用此藥

加附子五錢亦有得生者

紫蘇飲服氏 治子懸腹痛或臨產驚恐氣結連日不安或大小便不利

當歸 甘草 大腹皮黑豆浸水泡 人參 芎藭 橘皮各七分 白芍炒五分 紫蘇一錢

薑蔥引水煎服

紫散元和紀用經 止血崩

香附子炒黑存性 爲末熱酒調方寸匕再服立定生末安胎

秦桂丸雜抄方 治婦人無子

秦艽 桂心 杜仲 防風 厚朴各三錢 附子生用 茯苓各一兩半白微 乾薑

沙參 牛膝 半夏各五錢 人參一兩 細辛一兩右十四味爲末煉蜜丸如棗豆大每服

三十丸空心米飲任下未效再加數丸已覺有孕便不可服

求嗣方同上 壬子日合藥別日不用名助陽丹

細辛 牛膝二兩 茯苓一兩 沒藥四錢 吳茱萸 白斂 白朮 秦艽

孔香 防風 當歸去蘆各三錢 肉桂 厚朴 石菖蒲 附子各二錢 人參一錢以

胞寒無子者陰虛血少者非宜

黃龍湯 治人 妊娠寒熱頭疼嘔噦不欲飲食脅下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如癰并經水澇

斷病後勞復餘熱不解

柴胡一兩 黃芩 人參 甘草各分半 右四味每服五錢水一盞半煎一盞去渣溫服

桂枝湯 金匱 婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有

醫治逆者卻一月加吐下者則絕之見傷寒

小柴胡湯 上 婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入於血室其血必結故使如瘧狀 見傷寒

大承氣湯 上 產後七八日無太陽症少腹堅痛惡露不盡不大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩

躁者不食食即譫語至夜即愈熱在裏結在膀胱也 見寒

小青龍湯 上 婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫此主之 見痰飲 涎沫止乃治痞瀉心湯主之

見血門

芍藥艾膠湯 上 治陷經漏下黑不解 見遺治

豬鬃膏煎 上 胃氣下泄陰吹而正暄此穀氣之實也 見痘門

腎氣丸 上 治婦人飲食如故煩熱不得臥而反倚息者此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈 即崔氏八味丸 見通治

見通治

當歸生薑羊肉湯 上 治產後腹中疝痛并治腹中寒疝虛勞不足 見通治

按婦人一切外感內傷等證與男子同無庸另立法惟經帶胎產癰瘕等疾病變多端必從調經種子等法採本索源而後

可施用今因金匱要略有治婦人方論一卷故亦略載婦人常用之方數十首至其全體仍當取唐宋以來專門之書詳考之

小兒 此 若方論俱從錢氏直訣選出其外有小兒常藥之證而方未備者更考他書補入治小兒之法 大端略具其所遺之方藥一概全錄不必更將他卷查閱以觀藥幼科者專治此書誦習可也

脈弦急 和 脈沉緩傷食脈促結虛脈浮為風脈沉細為寒脈亂不治 全幼心鑑云小兒一歲以前看虎口食指

寅卯辰三關以驗其病 寅卯辰即風氣命三關也 脈紋從寅關起不至卯關者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過辰

者十不救一其脈紋見有五色如因驚必青瀉痢必紫當以類而推之一歲後則可用一指轉側辨其三部

脈弦急浮沉四五歲後脈七八至而細數者為平九至者傷十至者困六至五至者為虛為寒弦緊為風癩

弦急為客忤

面部症

左腮為肝右腮為肺頰上為心鼻為脾頰為腎若色赤者熱也宜隨症治之

目部症

目內色赤者心實熱淡紅者心虛熱青者肝實熱淡青者肝虛熱黃者脾實熱微黃者脾虛熱白而混者肺實熱目無睛光者腎虛也

五臟虛實寒熱

心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則臥而悸動不安 視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也

心氣實則喜仰臥

肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛則咬牙多欠 肝熱則手尋衣領及亂捻物壯熱飲水喘悶目赤發

揚 肝有風則目連筋得心熱則發搐或筋脈牽繫而直視風甚則身反張強直不搐心不受熱也當補腎治

肝

脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風面白腹痛口中氣冷不思飲食或吐清水 呵欠多睡者脾氣虛

而欲發驚也

肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虛則哽氣長出氣 肺熱則手招眉目鼻面 肺盛復感風寒

則胸滿氣急喘嗽上氣 肺臟怯則唇白悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛甚也

腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷若胎稟虛怯神氣不足目無睛光面白顛解此皆難育雖育不壽或更加色欲變症百出愈難治療或目長明下窺者蓋骨重而身縮也咬牙者腎水虛而不能制心火也

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全自生之後即長骨脈五臟六腑之神智也變者易也自內而長自下而上又身熱故己生之日後三十二日一變變每畢卽性情有異於前何者長生腑臟智意故也何爲三十二日骨長添精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十自生下骨一日十段而上之日百段三十二日計三百二十段爲一遍亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入髓中作三十二齒而齒牙有不及三十二數者由變不足其常也或二十八日卽至長二十八齒以下做此但不過三十二之數也凡一周遍乃發虛熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而未壯也

急驚風症治

小兒急驚因聞大聲或驚而發搐搐正如故此熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱二便黃赤甚則發搐蓋熱甚生風陽盛而陰虛也宜利羶丸除其痰熱不可用巴豆之藥

慢驚風症治

小兒慢驚因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃而肢體逆冷口鼻氣微手足瘳癢昏瞶露睛此脾虛生風無陽之症也小兒初生壯熱吐衄身體強直手足抽掣目反直視是胎驚風症也

發搐症治


驚癇發搐男則目左視無聲右視有聲女則右視無聲左視有聲相勝故也欲驗逆順男則握拳屈指又入食指中爲順於外爲逆女則又入食指爲逆於外順仍參吮乳不能類以治其母後做此若傷風發搐口中氣熱呵欠頓悶手足動搖若傷食發搐身溫多睡或吐不思食一百日內發搐眞者不過

一三次必死假者類發不死真者內生驚癩假者外傷風冷血氣未能勝任故發瘡


癩癩症治

凡治五癩皆隨臟治之每臟各有一獸之形並用五色丸治之發而重者死病甚者亦死若反折上竄其聲如犬症屬肝也若目暈吐舌其聲如羊症屬心也若目直腹痛其聲如牛症屬脾也若驚跳反折手縱其聲如雞症屬肺也若肢如尸口吐涎沫其聲如猪症屬腎也

附 面 部 三 部 診 候 圖



小兒半歲之間有病以名中食二指曲按額前眉上髮際之下若三指俱熱感受風邪鼻塞氣粗三指俱冷感受風寒臟冷吐瀉若食中二指熱上熱下冷名中二指熱夾驚之候食指熱胸膈氣滿乳食不消
附虎口三關脈症圖



水鏡訣云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部位各分逆順難明若憑寸口之浮沉必至橫亡於孩子須明虎口辨別三關消詳用藥必無差悞未至三歲看虎口三關若脈見風關尚易治交氣關則難治交命關為死症又當辨其色如獸驚三關必青水驚三關必赤人驚三關必黑若紫色主瀉痢黃色是雷驚三關脈通度乃極驚之症必死有紋或青或紅如綫直者是母食傷脾左右一樣者是驚積齊發紋有三條白主肺傷風痰或胸胎聲青主傷寒及嗽紅主泄瀉有黑相兼主下痢紅多白痢黑多赤痢有紫相兼虎口脈亂乃氣不和也蓋脈紋見有五色由其病甚色能加變至於純黑者不可得而治矣

五臟瘡疹證治

小兒在胎食五臟血穢伏於命門若遇天行時熱或乳食所傷或驚恐所觸則其毒當出初起之候面燥腮赤

目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱欬嗽噴手足稍冷驚悸多睡宜究其何臟所發察其何因所起令乳母亦須
節飲食慎風寒 五臟各有一症肝臟水包青色而小肺臟膿包色白而大心臟斑色赤而小脾臟疹小次斑
故色赤黃淺也先發膿包後發疹子者順先疹子後斑者順反此爲逆惟腎無候但見飢冷耳冷是也若寒水
來侮故黑陷而耳飢反熱爲逆也急用百詳丸半李膏各三服不愈者死 如發潮熱三日以上出不甚多而
熱不止者未盡也潮熱隨出如早食潮熱不已爲水包之類也一發便出盡者重瘡夾疹者半輕半重也出稀
者輕裏外微紅者輕外黑裏赤者微重外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢最劇也青乾紫陷昏睡
汗出煩躁熱渴腹脹啼喘二便不通者困也有大熱利小便解熱毒若紫黑乾陷或寒戰咬牙或身黃腫紫者
急以百詳丸下之復惡寒不已身冷出汗耳飢反熱者死症也此腎氣大旺脾虛不能制故耳下後身熱氣溫
飲水者可治以脾土勝腎寒去而溫熱也不黑者不可下下則內虛歸腎大抵瘡疹屬陽在春夏爲順冬秋爲
逆冬月腎旺盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿包夏黑陷秋斑子冬疹子者十活四五黑者十難救一 身熱
煩渴腹滿而喘便澀面赤悶亂大吐此當利小便不瘥者宣風散下之若能食而痢頭焦起或未焦而喘實亦
可下之著五七日痢不集是內熱也宣風散導之生犀汁解之 斑疹作搐爲脾虛而肝則乘心火妄動風熱
相搏也當瀉心肝補脾土 瘡黑而忽便膿血并痂皮者乃脾氣實腎邪退而病安也及瀉而乳食不化者脾
虛不能制腎故爲難治 此卽近世痘瘡之症其病與斑疹同列並無起脹成漿收靨等說大抵宋時之瘡形
治法不過如此近日愈變愈重與斑疹絕不相類治亦迥別因知天下之病隨時隨地變化無窮所以內經
有五運六氣異法方宜等論爲醫者苟不能知天運之轉移及五方之體性終有偏執之處不可以稱上工
也 痘瘡無人可免自種痘之法起而小兒方有避險之路此天意好生有神人出焉造良法以救人也然
入往往以種痘仍有死者疑而不敢種不知乃苗之不善非法之不善也况卽有死者不過百中之一較之
天行惡痘十死八九者其安危相去何如也至於治痘之書自宋至今不下數十種莫不和平切近孰意邇

年以來崇奉怪書不論小兒之彌弱痘症之虛實概以大黃數兩石膏數斤爲一劑使兒眞火消盡元氣大傷絕其脈成漿之路因向其父母云此症或不能起脹或不能成漿而死至期果死其父母以爲神目不知此實醫者致之死地也或幸不死則信爲大黃石膏之功而此二味遂爲不祧之藥矣又方中多用蜂房蠍子螬蟻蛆蚌汁等惡物成升成盃灌入兒腹以增其毒而爛其胃宛轉就死尤可痛心夫近日時醫治精壯男婦之病見用清火之藥一二錢羣以爲此寒涼之品斷不可服必當用附桂參朮獨於數月之小兒反用大寒大毒之藥成兩成斤俾死者接踵而不悔何耶醫者不足責爲父母而目觀其子之服此毒藥以致慘死毫無疑怨則何心也

丹瘤

丹瘤之症因熱毒客於腠理搏於血氣發於皮膚當以白玉散塗之

傷風兼變症治二

傷風兼肝則發搐頓悶兼心則驚不安兼肺則喘嗽哽氣兼脾則困睡兼腎則目畏明各隨補其傷

諸經發熱症治三

潮熱者時而發熱過時即退來日依時而發此欲發驚也 壯熱者常熱不已甚則發驚癩也 風熱者身熱而口中氣熱乃風邪外感也 溫熱者肢體微熱也 發熱而不欲飲水者胃氣虛熱也發熱而飲水作渴喜冷飲食者胃氣實熱也

吐瀉症治

若吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下之 吐瀉昏倦睡不露睛者胃實熱也吐痰涎及綠水者胃虛冷也 初生下吐因穢惡下咽故也凡初生急須拭淨口中否則啼聲一發穢物咽下致生諸病

拭去穢物
出痘必稀

五臟內外疳症主治

凡小兒疔在內目腫腹脹瀉痢青白體瘦羸弱疔在外鼻下赤爛頸揉鼻耳或肢體生瘡鼻瘡用蘭香散諸瘡用白粉散 肝疔一名筋疔白膜遮睛或瀉血面癭 心疔面黃頰赤身體壯熱 脾疔一名肥疔體黃瘦削皮膚乾澀而有瘡疥腹大嗜土 腎疔一名骨疔肢體瘦削遍生瘡疥喜臥濕地 肺疔一名氣疔喘嗽氣促口鼻生瘡 若患潮熱當先補肝後瀉心若妄以硝黃諸藥病之若患癰當消磨若誤以巴豆礬砂下之及傷寒誤下皆能成疔其初病者爲熱疔久病者爲冷疔冷熱相兼者津液短少者皆因大病脾胃虧損內亡津液所致當固脾胃爲主早爲施治則不變敗症也

腹痛腫脹諸症

小兒腹痛體瘦面色眊白目無睛光口中氣冷不思飲食或嘔利撮口此脾土虛而寒水所侮也若口中氣溫面色黃白目無睛光或多睡惡食或大便酸臭此積病也若腹脹而悶亂喘滿者實也若不悶亂喘滿者脾虛也誤下之以致目包腮面四肢浮腫肚腹愈脹因下而喘脾氣益虛也脾虛不能勝腎水隨肺氣行於四肢如水狀若侵浮於肺卽大喘也 若腎熱傳於膀胱熱甚逆於脾肺脾胃虛而不能制腎水流走四肢而身面皆腫若土勝則刑於肺故令喘也 苦口吐涎沫或吐清水面眊白心腹痛有時者蟲痛也與痢相似但目不斜手不攙也安蟲散主之 若腹中有澀不食但飲乳是也蓋小兒病此良由乳食不消伏於腹中乍冷乍熱飲水過多卽瀉滲腸胃亡失津液脾胃虛弱不能得化水穀以致四肢羸瘦腹肚漸大而成疔矣

五臟雜症主治

喜汗者厚衣臥而額汗出也盜汗者肌肉虛而睡中汗出也 胃虛汗者上至項下至臍也六陽虛汗者上至頭下至項難治 夜啼者小兒筋骨血脉未成而多哭脾臟冷而痛也當與溫中藥或花火膏主之 若虛怯爲冷所乘則唇青 驚啼者邪氣乘心也當以安神丸主之 若浴後拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛也若額撮口是氣不和也 弄舌熱者脾臟微熱令舌絡牽緊時時舒熱或飲水者脾胃虛而津液少也

兼面黃肌瘦五心煩熱者疳積也大病未已而弄舌者凶 解顛者生下顛門不合也長必多愁少笑目白精
多面色皸白或體消瘦皆腎虛也胎肥者生下豐厚目睛紛紅大便乾難時出涎水 胎熱者生下有血色時
叫哭身熱淡黃目睛多赤大便秘色黃急欲食乳並用浴體法主之 胎怯者生下面白肌肉瘦弱大便白水身
無血色嘔氣多喘亦用浴體法 急欲乳不能食者此風邪由臍而蘊熱心脾致舌厚唇燥不能吮乳也 龜
胸龜背者由兒生下風客於脊入於骨髓致成龜背若肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸並用龜尿點其骨節自
愈 取尿法用青蓮葉安龜在上用鏡照之其尿自出 失音吐瀉或大便後雖有聲而不能言又能咽物者非失音此腎怯不能上接於陽也
凡口噤不止則失音語遲 若大病後身目皆黃者黃病也 身病背強大小便澀一身盡黃小便黃赤此黃
疸也瀉者難治 若百日或半年不因病而身黃胃熱胎疸也 若淡黃兼白者胃怯也 長大不行行則脚
軟 齒久不生則不固 髮久不生則不黑皆胎弱

小兒方

瀉青丸 治肝經實熱急驚搐搦

羌活

壬乙同歸一治故用羌活

大黃 瀉諸實熱

芎藭 入手足厥陰辛以緩肝

山梔仁 瀉心火實則瀉其子

龍膽草 炒益肝膽氣止驚

當歸 入足厥陰以

防風 各等分

右爲

末煉蜜丸芡實大每服半丸竹葉湯入砂糖化下

導赤散 治小腸實熱小便秘赤

生地黃

心與小腸之藥

木通 利小腸之熱放錢氏用以與赤

甘草 生瀉心火各等分

右爲末每服一錢入淡竹葉

經

水煎

生犀散 治心經虛熱

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛各一兩

甘草五錢

犀角

二錢鎊主風熱驚癇鎮肝除心熱丹溪云犀角痘後用以散餘毒無毒而血虛者非宜

水煎

右爲末每服一二錢水煎

瀉黃散 治脾胃實熱

藿香葉入手足太陰經甘草各七錢石膏五錢瀉山梔仁一兩治胃中鬱氣防風三兩右用蜜酒微炒爲末每服一二錢

水煎

五味異功散 治脾胃虛弱吐瀉不食

人參 茯苓 白朮 甘草炒 陳皮各等分 右爲末每服三錢薑棗水煎

益黃散 治脾土虛寒嘔吐泄瀉

陳皮 下食入太陰之倉丁香各二錢去脾胃中寒訶子肉五錢能開胃消食止痢甘草炙三錢 右爲末每服一二錢水煎

瀉白散 治肺經實熱咳嗽痰喘

桑根白皮炒瀉肺氣之有餘有餘者邪有餘也地骨皮各一兩甘草炙五錢 右爲末每服一二錢入粳米百粒水煎

阿膠散 治肺虛欬嗽口乾作渴

明阿膠一兩熬炒乾補氣不足甘草炙一錢馬兜鈴五錢主肺熱咳嗽清肺補肺糯米一兩杏仁七粒去皮尖下喘用治氣也鼠粘子二錢五分 右爲末每服一二錢水煎

錢水煎

地黃丸 治腎虛解臚或行遲語遲等症

熟地黃八錢酒洗益腎水真陰補血虛山茱萸肉補腎添精乾山藥涼腎瀉陰中之火治足少陰無汗之骨蒸白茯苓各三錢入壬癸壯丹皮 澤瀉各三錢 右地

黃忤膏餘爲末加煉蜜丸如桐子大每服二三十九丸空心白湯送下

四君子湯 治脾氣虛弱飲食不化腸鳴泄瀉或嘔噦吐逆

人參 白茯苓 白朮 甘草炙各五分水煎服

四物湯 治肝經血虛發熱日晡益體或煩躁不寐

當歸 熟地黃各二錢白芍藥一錢芎藭五分 右作二劑水煎服

八珍湯 治氣血俱虛或因失血過多或因尅伐元氣以致內熱發熱肢體痠痺 卽四物四君子二湯合服

十全大補湯 治氣血虛熱或因病後惡寒發熱或自汗盜汗食少體倦或發熱作渴頭痛眩暈等症 卽八

珍湯加黃耆肉桂

六君子湯 治脾胃虛弱體瘦面黃或久患瘧痢不思乳食或嘔吐泄瀉飲食不化或時患飲食停滯或母有

前症致兒爲患

人參 白朮 茯苓各二錢 陳皮 半夏 甘草各一錢右每服二三錢薑棗水煎

補中益氣湯 治中氣不足困睡發熱或元氣虛弱感冒風寒諸症或乳母勞役發熱致兒爲患

黃耆 人參 白朮 甘草 當歸 陳皮各五分 升麻 柴胡各二分

右七味加薑棗水煎

香砂助胃膏 治胃寒吐瀉乳食不化

人參 白朮 白茯苓各五錢 甘草 丁香 砂仁 白豆蔻 煨脾胃進食

肉豆蔻 四個煨溫中補脾下氣運化 乾山藥一兩 右爲末煉蜜丸芡實大每服二三丸米飲湯化

肥兒丸 治食積五疳頸項結核髮稀成穗發熱作渴等症

黃連 神麴 木香 檳榔 肉豆蔻 史君子 麥芽 右爲末

糊丸如麻子大每服三五丸米飲下良久用五味異功散二服以助胃氣

九味蘆薈丸 治肝脾疳積體復熱渴大便不利或瘰癧結核耳內生瘡等症

蘆薈 黃連 木香 燕蕪 青皮 白雷丸 鶴虱草各一兩

麝香三錢 右爲末蒸餅糊丸如麻子大每服一二錢空心白湯下

木香丸 治冷疝

木香 青黛 檳榔 肉豆蔻 麝香 各一錢半續隨子一兩去油蝦蟆三個燒存性右爲末

蜜丸如萊豆大每服三五丸煎薄荷湯下

胡黃連丸 治熱疔

胡黃連

黃連各五錢

礞砂二錢另研

右為末填入猪膽內以綫紮懸掛銚中淡漿水煮數沸取出研

入蘆薈麝香各二錢飯和丸如麻子大每服一二十丸米飲下

如聖丸 治冷熱疔瀉

史君子 取肉一兩胡黃連

川黃連

白蘼夷炒各二兩五錢

麝香五分另研

乾蝦蟆五個酒煮許膏

右為末以蝦蟆

膏忤丸麻子大每服一二十丸煎人參湯下

蘭香散 治鼻疔赤爛

蘭香葉二錢燒灰銅青

輕粉各五分

為末乾貼

白粉散 治諸疔瘡

海螵蛸三分 白芨二分

輕粉一分

右為末先用漿水洗拭乾貼

蟾蜍丸 治無辜疔症一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢愈

蟾蜍一個夏月流涎中取腹大不跳不鳴身多瘰者

右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食一晝夜用布袋盛

蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾為末入麝香一字粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效如神

蘇萋散 治蟲動口內流涎

白蘼夷

乾漆炒各等分右為末每服五六分米飲下

安蟲散 治蟲動心痛

胡粉炒黃

檳榔

川楝子

鶴虱各三錢

枯白礬二錢半

右為末每服五六分痛時米飲調下

白玉散 治丹瘤

白土二錢五分 寒水石五錢 爲末用米醋或新水調塗

切華散 治熱毒口瘡

黃柏炒 蒲黃 青黛 人中白烟各等分 爲末敷

四方活命飲 治一切毒瘡未成內消已成即潰此消毒排膿止痛之聖藥也若膿出而腫痛不止者元氣虛也當補之

穿山甲 白芷 防風 沒藥 甘草 赤芍藥 歸尾 乳香

花粉 貝母各一錢 金銀花 陳皮各三錢 皂角刺二錢 右每服二三錢酒水各半煎

消積丸 治食積大便酸臭發熱 丁香九粒 縮砂十二粒 巴豆二粒去皮心膜 烏梅肉三個 右爲末麩糊丸黍米大每服五七丸溫水下

保和丸 治食積 山查 神麴各二兩 半夏 茯苓各一兩 陳皮 蓮翹 蘿蔔子各五錢 右爲末粥

糊丸如桐子大每服一二十九丸白湯下

四神丸 治脾胃稟虛泄瀉不食或乳母患此致兒爲患 肉豆蔻二兩 補骨脂四兩 五味子二兩 吳茱萸一兩 右爲末用水二碗生薑八兩紅棗一百枚煮熟用

棗肉和末丸如麻子大每服二三十丸空心食前白湯下子母並服

五苓散 治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利 澤瀉五錢 猪苓 官桂 赤茯苓 白朮各三錢 右爲末每服一二錢白湯調下

白虎湯 治傷暑煩燥身熱痰盛頭痛口燥大渴 知母一兩半 石膏四兩 白粳米八錢 甘草炙五錢 右爲末每服一二錢水煎

蘭臺軌範 卷八 小兒科

十二

地黃清肺飲 治肺疔嗽痰唾稠粘

阿膠一錢 炒 鼠粘子二分 炒 馬兜鈴

甘草各五分 炙

杏仁七枚 去皮尖

糯米十粒 炒

右每服一錢水煎此方似脫

地黃一味否則即前阿膠散方矣

參蘇飲 治感冒風寒或腹脹少食泄瀉嘔吐或手足並冷喘促痰涎

人參

紫蘇

陳皮

半夏

茯苓

枳殼炒

桔梗炒

前胡

乾葛

甘草炒各五分 木香三分

為末每服一二錢水煎

小柴胡湯

治傷寒濕熱患身熱惡風頭痛項強四肢煩疼寒熱往來嘔吐痰實及中暑病瘧

柴胡八錢

半夏湯泡

黃芩

人參各三分

甘草炙二錢

右每服一二錢薑水煎

加味逍遙散

治乳母肝脾氣血虛弱發熱致兒為患

當歸

白朮

茯苓

芍藥炒黃各一錢

柴胡

牡丹皮

山梔炒

甘草

水煎服

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱或囊癰便毒小便澀滯

龍膽草酒炒五分 車前子 炒木通

歸尾

澤瀉

甘草

黃芩

生地

山梔各三分 水煎服

茵陳湯 治身熱鼻乾汗出二便赤澀濕熱發黃

茵陳六錢

梔子二枚

大黃二錢

每服一錢水煎

黃連香薷飲

香薷四兩

厚朴二兩

黃連

右每服一二錢將朴連同生薑炒令紫色入香薷水酒各一盞煎冷服

金匱加減腎氣丸

治脾胃虛腰重脚輕小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱者此症多因脾

胃虛弱治失其宜元氣復傷而變者非此藥不救

白茯苓三兩 附子泡五錢 川牛膝 肉桂 澤瀉 車前子 山黃肉 山藥

牡丹皮各一兩 熟地黃四兩搗碎 酒拌許煎 右為末和地黃加煉蜜杵丸如桐子大每服一二十丸空心米湯下

五色丸 治五癩 珠砂 眞珠各五錢 水銀 雄黃各一錢 黑鉛三兩同水 飯結成砂 右為末煉蜜丸麻子大每服三四丸

煎銀花薄荷湯下 斷痢丹 治痢差後變症不止 黃耆壹炙 鉤藤鈎 細辛 甘草各五錢 蛇退三寸酒炙 蟬退去土 四個牛黃一字另研 右為末煮

蜜肉為丸麻子大每服五七丸人參煎湯下 糲銀丸 治風涎膈熱及乳食不消腹脹喘促 巴豆 水銀各五錢 京墨八錢大燒 醋研 黑鉛二錢半 水銀煎 麝香五分 另研 右為末陳米粥丸如菘豆大每服二三

丸煎薄荷湯下 利驚丸 治急驚 天竺黃二錢 輕粉 青黛各一錢 黑牽牛炒五錢 右為末蜜丸如豆大每歲服一丸薄荷湯化下

小續命湯 治中風不省人事涎鳴失音肢體張或時厥冷 麻黃去節 人參 黃芩 芍藥 芍藥 甘草炒 杏仁去皮尖炒 漢防己 官桂各五錢 防風七錢五分 附子泡去皮 鹽二錢 右各另為末和勻每服一錢薑棗水煎有熱減桂附

鉤藤鈎飲 治吐脾胃虧損虛風慢驚 鉤藤鈎三分 蟬退 防風炒 人參 麻黃 白僵蠶炒 天麻 蠟尾去毒炒 各五錢 甘草炙 芎藭各二錢 中麝香一錢 另研為末每服一二錢水煎

蘭 靈軌 卷八 小兒科 十三

大青膏 治傷風吐瀉身溫氣熱驚搐

天麻 青黛各一錢 白附子 乾蠍去毒 烏梢蛇肉酒浸焙研碎砂 天竺黃二錢 麝香二分

右為末生蜜和膏每服一豆顆許月中兒用半顆薄荷湯化下

百祥丸 治痘瘡黑陷及嗽而吐青綠水

紅牙大戟 陰乾藥水煮軟去骨復入原汁中燉 右焙乾為末水丸粟米大每服十丸赤芝麻湯送下

牛李膏 治痘瘡黑陷

牛李子一味許汁石器內熬膏每服皂子大煎杏膠湯化下

雄黃散 治痘後牙齦生疔蝕瘡

雄黃一錢 銅綠二錢 同研細量瘡大小搽其上

歸脾湯 治乳母脾經氣鬱致兒為患

人參 白朮 茯苓 黃耆 龍眼肉各二錢 遠志一錢 酸棗仁 木香

甘草五分 右薑棗水煎服加柴胡山梔名加味歸脾湯

越鞠丸 治乳母六鬱傳兒為患或胸滿吐酸齒痛癩疥等症

香朮 神麴 香附子 山查 山梔炒 芎藭 麥芽炒各等分 右為末水

調神麴糊丸 桐子大每服二三十丸白滾湯下子母並服

安神丸 治邪熱驚啼心肝壯面黃頰赤 麥門冬去心焙牙硝 白苓茯 乾山藥 寒水石 甘草各五錢 硃砂一兩 龍腦二分半

右為末煉蜜丸芡實大每服半丸砂糖水化下

火花膏 治夜啼

燈花一顆塗乳上令兒吮之

蟬退鈎藤散 治肚疼驚啼

鈎藤 天麻 茯苓

芎藭 白芍藥各二錢 甘草

蟬退各二錢 每服一錢

燈心湯下

羚羊角丸 治行遲

羚羊角 鎊 虎脛骨 炙黃生地黄 煨 酸棗仁 白茯苓各五錢 肉桂

防風 當歸

黃耆各二錢半 右為末煉蜜丸每服一皂子大白湯化下

止汗散 治睡而自汗

故蒲扇一把燒存性研為末每服三錢溫酒調下

當歸六黃湯 治血虛不足虛火內動盜汗不止

當歸 熟地黄 黃耆炒 黃柏以下俱黃芩炒黑

黃連 生地黄各等分 每服一

錢水煎服

團參湯 治心血虛熱自汗盜汗

人參 當歸各等分 右用猪心一片每服三錢水煎服

參附湯 治稟賦不足上氣喘急自汗盜汗或病久陽氣脫陷急宜服之

人參五錢 附子泡一兩 每服一錢薑水煎

人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉或久病虛損口乾食少欬而下痢驚熱自汗

白芍藥一錢半 人參 陳皮 黃耆蜜炙 桂心 當歸 白朮炒 甘草炙各一錢

熟地黄 五味子杵炒各七分 遠志五分 每服二三錢薑棗水煎

浴體法 治胎肥胎熱胎怯

烏蛇肉酒浸焙

白礬

青黛各三錢

天麻二錢

蠍尾去毒

硃砂各五分

麝香二分半

右爲末桃

枝一握水煎浴之勿浴背

神效當歸膏 治跌撲湯火等瘡不問已潰未潰

當歸

黃蠟

生地黃各一兩麻油六兩

右先將當歸地黃入油煎黑去渣入蠟鑄化俟冷攪

勻卽成膏矣

以上皆直訣所載之方以下諸方皆取別本附入者

保命散

方秘

治一切急驚慢驚痰涎湧塞手足抽搐目直神昏夜啼晝倦吐乳瀉白種種惡症

珍珠

牛黃各三分

琥珀五分

膽星

白附子

蟬退

天蟲

芥茯

皂角

防風

茯神各二錢

天竺黃研

橘紅

甘草

薄荷

硃砂各一錢

天麻三錢

全蠍十個酒浸礞石三錢煨

冰片

麝香各三分

右爲末和勻每服一二分或用神麴糊

丸麻子大每服一二十丸量兒大小加減鉤藤一錢薄荷三分泡湯下凡小兒有病卽宜少與乳食若似驚風卽宜斷乳如欲食與米飲一杓必欲食乳須先將乳擠空然後以空乳塞令吮否則乳下喉中卽成頑痰雖神丹無效俟少安漸與乳可也

治疳積方 不落水雞肝酒洗同黃蠟一錢頓熟去蠟吃

治赤瘡方

寒水石

黃栢

黃連

大黃

鉛粉

枯礬

白搨粉

冰片

青黛 右藥隨舉幾味研麻油調塗

治痘出眼中方 取田雞膽點之愈

治癩方 不拘頭面遍身痛癢黃水出俱效

黃連一兩 蛇床子五錢 五倍子一兩 輕粉三錢 黃柏 枯礬各五錢 川椒二錢 冰片一錢
同研麻油調塗

治骨蒸方

銀柴胡八分 鮮骨皮一錢 酒洗真青蒿八分 川連 犀角 丹皮各五分 甘草三分 元參一錢

竹葉廿片 蘆根一兩 水煎服

治遺尿方 幼幼新書

雞臙脰一具 桑螵蛸三枚 炒甘草三分 黃耆 牡蠣各五錢 爲粗末每用一錢水一盞煎去渣服

治牙疳方

人中白一錢 枯礬三分 紅褐子二錢 雜脫皮二錢 霜梅八分 雄黃 硼砂各五分 青銅三分

右爲末煎濃茶調搽吐出涎

治吐乳方 幼幼新書

蓮子心七枚 煨丁香三粒 人參三分 右同研乳汁浸令兒吮食

治螻螂子方 卽妬乳也

青黛一錢 元明粉三錢 硼砂一錢 薄荷五分 水片一分 右同研細擦口內兩頤吐出涎一日用

四五次 自古無螻螂子之病凡小兒變蒸之候每有口內微腫惡乳之時名曰妬乳不治自愈其或不能坐視則用此方塗口亦易愈近日海濱妖婦造割螻螂子之法以騙人取利強者幸愈弱者俱死惟松江蘇州最受其害蓋小兒兩頤內外皮有兩層中空處有脂膜一塊人人皆然割去復生妖婦以此惑人人見果有如螻螂子者遂相信不疑死而不悔深可憐憫除蘇松之外天下並無有生螻螂子而死者斷不可爲其所愚而受害也

損 小兒股內無方因跌而起一足不伸髀左右大小不同腰脊歪斜脊骨高起俱屬不治或久而成毒亦爲
廢人