

本草備要

二附三



增訂本草備要目錄

一卷

牡丹皮 續斷 骨碎補 益母草子 淫蘭蘭草 白薇 艾斬艾

延胡索 紅花胭脂 茵草 紫葺葺 凌霄花 大小薊 三七又二

地榆 蘘黃 谷稻 茵茹 菴蓎子 欒金 薑黃片子

莪朮 荆三稜 白茅根劍 蘆根 芎根皮 薔薇根整實

芭蕉根 大黃 萹苈 黃連 胡黃連 苦參 知母

龍胆草 葶藶 大青 牽牛 防己漢已 葶藶甜 甘遂

大戟 商陸 葶藶 澤漆 常山蜀漆 藜蘆

木通 通草 澤瀉 車前子 燈草 瞿麥 扁蓄

天仙籐 地膚子葉 石韋凡草 海金沙 茵陳 香薷香 青蒿

附子烏頭 天雄 烏附尖 側子 草烏頭射 白附子 破故紙 肉蓯蓉 瑤陽

巴戟天 胡盧 仙茅 淫羊藿 蛇床子 兔絲子 覆盆子

蒸藜沙苑 蒺藜 刺蒺藜 使君子 益智子 砂仁 白豆蔻 肉豆蔻

草薹草薹 刺蒺藜 香附 木香 藿香 茴香大小 八角 甘松香 山柰

良薑紅荳 菘 萹芡 煙草 金銀花膏 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝

鶴虱 山薑根 牛蒡子根 山慈菴 漏蘆 貫眾 射干

續隨子 馬蘭子根 葉 麻子 白頭翁 玉瓜子 玉不留行 冬葵子春

子 蜀 白鮮皮 葶藶拔薶 土茯苓赤 白 白欬赤 欬 葶藶子 旱蓮草膏

寄奴草 馬鞭草 穀精草 青箱子 消石 藜蘆 馬勃木 驚

增訂本草備要卷之二

休寧汪 昂初菴著輯

男汪 端其兩

弟汪 桓煅武恭訂

姪汪 惟寵子錫

同鄭會慶 魯魯訂

姪婿 仇 灑天 同較

草部

牡丹皮

馮伏火 而補血



辛甘微寒入手足少陰心厥陰肝包瀉血中伏火丹色

故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世
人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景醫
氣丸用之和血涼血則枯破積血則新血不

生通經脈為吐衄必用之藥血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅治中風五勞驚癇

癱筋脈伸縮抽掣為癱癇或手足抽掣口眼喎邪卒然眩仆吐涎
身軟時發時止為癰蒼陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致除煩

本草備要草部 牡丹皮 續斷 骨碎補 卷之二

執癢癰瘡血下胞胎退無汗之骨蒸張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神不足者手

少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精為志故腎臟志火之精為神故心臟神

紅者八藥肉厚者佳酒拌蒸用貝母兔絲大黃忌蒜胡荽硃砂時珍曰花

白者補赤者利人所宜分別之

續斷

補肝腎理筋骨



苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷中

補不足經疏云味甘故然煖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎

漏懷妊胎帶遺精腸風血痢星齋方平胃散一兩川

米飲下泊癰痔腫毒又主金瘡折跌以功止痛生肌外科需為上

劑川產其狀如雞脚皮黃皺節節斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃

為使

骨碎補

補腎治

折傷

經曰腎

者胃之

閉也前

陰利水

後陰利

穀

益母草

一名茺

蔚

通行瘀

血生新

血



苦溫補腎故治耳鳴耳鳴必由腎虛及腎虛久瀉研末入豬

心食之腎主二便久瀉多腎主骨故治折傷以功命屬腎虛不可專責脾胃也

傳傷牙痛炒黑為末擦牙燕下亦良又入厥陰肝能破血止血

處入血行傷故治折傷傷粥和味裏傷處

根似薑而扁長去毛用或密拌

傷粥和味裏傷處

蒸



辛微苦寒入手足厥陰肝消水行血去瘀生新調

經解毒瘀血去則經調治血風血暈血痛血淋胎痛產難崩

中帶下帶脉橫於腰間病生於此故名為帶亦屬血

血屬氣氣虛者補中益氣而兼升降血虛者

養血滋陰為經產良藥消疔腫乳癰亦取其散通大小便然辛散之藥

而兼調氣

瞳子散大者忌服益母子主治畧同調經益精明目血帶病目者則宜之活血

益母草

順氣逐風血行則風散行中有補治心煩頭痛血氣血熱之候胎產帶崩令人


有子有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產

消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良益母根莖

忌鐵子微炒用

澤蘭

通行血消水



苦泄熱甘和血辛散鬱善舒脾入足太陰厥陰肝脾通

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕

散水腫防已為使治產後血癱腰痛瘀行未盡吐血鼻洪目痛

頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻為女科要藥古方

滯蘭丸甚多時珍曰蘭草澤蘭一類二種俱生下濕紫莖素枝赤節綠葉

葉對節生者細齒但以莖圓節長葉光有岐者為蘭草莖微方節短葉

有毛者為澤蘭嫩時可投音那而佩之楚詞所謂紉秋蘭以為佩是也

朱文公離騷辨證云必花葉俱香燥濕不戀方可刈佩今之蘭惠花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩吳人呼為香草俗

名孩兒菊夏曰采置髮中則髮不脯浸油塗髮去垢香澤故名澤蘭蘭草走氣分故能利水道除痰

癖殺蠱辟惡而為消渴良藥經曰數食肥甘傳為消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能

消水腫塗癰毒破瘀除癥而為婦人要藥以為今之山蘭者誤矣防已

為使寇宗奭朱丹溪並以蘭草為山蘭之葉李時珍考眾說以譏之按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經閩產者力勝李

士材云蘭藥稟金水之氣故人肺臟東垣方中常用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集

諸家之言曰陳避齋閑覽云楚騷之蘭或以為鄒絮香或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故

陳正齋著盜蘭說以譏之方虛谷言蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得

蘭名楊升菴云世以如蒲骨者為蘭九畹之受誣也久矣又吳草廬有蘭說云蘭為醫經上品有根有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因

閩產為勝則是建蘭矣

既名幽蘭正合騷經矣

升菴九種多有

澤蘭

朱確故
陳文燭
作正揚
以辨之

黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草溺于流俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癰平其種盛于閩朱子聞人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭為蘭何以惑之甚也昂按朱子辨蘭援離騷紉佩以為證竊謂紉佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之墜露餐秋菊之落英豈真菱荷可飲而英可餐乎又云製菱荷以為衣集芙蓉以為裳豈真菱荷可衣芙蓉可裳乎宋儒釋經執泥恐未可為定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬水經之澤蘭無疑也然離騷不常曰春蘭今秋菊乎不又曰結幽蘭而延佇乎不又曰疏石蘭以為芳乎若秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又不得為山蘭當是何等之蘭乎且山蘭為花中最上之品古今評者列之梅菊之前今反屈于孩兒菊之下以為盜襲其名世間至賤之草皆收入本草獨山蘭清芬佳品攢蕪不錄何其不幸若所之甚也本草殺蠱之藥良多皆未必有驗至于行水消痰固山蘭之葉力所優為者也蓋李時珍陳方吳楊輩皆沉定陳藏器以澤蘭蘭草為一類二種遂併騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂令蘭草無復有用之者不思若以為一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭草反列之上品而澤蘭止為中品乎况一入氣分一入血分迥然不同也又騷經言蘭香凡五除木蘭人所共識其餘春蘭秋蘭幽蘭石蘭若皆以為孩兒菊是不符二類一種且四種一類矣而以爲九種之受誣豈理也哉蓋本經

澤蘭可
哇賤品
幽字何
可當也

白微
瀉血熱

蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不用其花也騷經言秋蘭所以別
乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是
山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也
寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以謬多識之士



苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身

熱之滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚
灼故身熱交滿痰隨火湧故不

知血厥汗出過多血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦
人尤多此症宜白微湯曰微當喘各一兩參

五錢甘草錢熱淋温瘡惕惕寒熱酸痛婦人傷中淋

露血熱千金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

延孔女人仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種
弱水也產虛煩嘔子往往用之益不孕婦緣于血熱血少而其源起于

真陰不足陽勝而內熱故營血自枯也益陰清熱則血似牛膝而短

小柔軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸


本草

白微

卷二四

艾葉

宜理氣
血燥逐
寒濕



苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰太理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠艾湯良治吐血崩

帶治帶腹痛冷痢霍亂轉筋皆理氣血逐寒濕之效 灸蛇治癩

醋煎外科有用乾艾作湯投白攀二三錢洗瘡然後敷藥以之灸者火

能透諸經而治百病血熱為病者禁用灸火則氣下行入藥則熱上衝

者以熟艾裝袋肥臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾八襪內 陳者良揉搗如綿謂之熟艾灸火用

婦人丸散醋煮搗餅再為末用入茯苓數片煎服宜鮮苦酒醋香附

為使艾附九調婦人諸病朱時重湯陰艾自明成化來以蘄州艾為勝云灸酒壘一灸使透蒙峯發明並以野艾為真蘄艾雖香實非

艾 煙

濯蘭町
哇賤品
幽字何
可當也

白微
瀉血熱

蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不用其花也騷經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也
寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以謬多識之士



苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身

熱妄滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼故身熱文滿痰隨火湧故不

知血厥汗出過多血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此症宜白微湯曰微當歸各一兩參

五錢甘草錢丸淋温瘡惕惕寒熱酸痛寒熱作則營氣不婦人傷中淋

半每服五錢散露血熱于金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

露丹溪曰此則河間所謂熱甚廷孔鬱結神無所依不能收禁之意也
延孔女人仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種

弱水也子往往用之益不羸綠于血熱血少而其源起于真陰不足陽勝而內熱故營血自枯也益陰清熱則血
似牛膝而短

小柔軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸

艾葉

宜理氣
血燥逐
寒濕



苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰太理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠艾湯良治吐衄崩

帶治帶腹痛冷痢霍亂轉筋皆理氣血逐寒濕之效灸蛇治癰

醋煎外科有用乾艾作湯投白攀二三錢洗瘡然後敷藥以之灸音火

者蓋人血氣冷必假艾力以佐腸而艾性又能殺虫也灸火則氣下行八藥則熱上衝

能透諸經而治百病血熱為病者禁用不可過劑。丹田氣弱臍腹冷


者以熟艾裝袋肥臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾八襪內陳者良揉搗如綿謂之熟艾灸火用

婦人丸散醋煮搗餅再為末用入茯苓數片煎服宜飲苦酒也香附

為使艾附九調婦人諸病朱時重湯陰艾自明成化來則以蘄州艾為豚云灸酒樓一灸使透蒙竿發明並以野艾為真蘄艾雖香實非

延胡索

宜活血
利氣



辛苦而溫入手足大陰肺厥陰肝經能行血中氣

滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內外

者痛通則痛癥瘕崩淋月候不調氣血不和因而疑滯不以時至產後

血暈暴血上衝折傷積血疝氣危急為治血利氣第一藥然辛溫走而

不守獨用力迅宜兼補氣血藥通經墜胎血熱氣虛者莖角根如半夏肉黃小而

堅者良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

紅花古名

紅藍花
通行血
潤燥



辛苦甘溫入肺經而破瘀血活血瘀行則血活有熱結於中慕吐紫黑

血者吐出為好吐未盡加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行潤燥消腫止痛凡

熱血瘀則作腫作痛治經閉便難血運口噤胎死腹中非活血行血不

能瘡血熱本草不言治瘡喉痺不通又能入心經生新血須兼補益藥為佐使俗用

艾葉 延胡索 紅花 卷三五

染紅併作胭脂

胭脂活血解毒痘疔挑破以油胭脂傳之良

少用養血多則行血過用能使

血行不止而斃

血生于心色藏于肝属于衝任紅花汗與相類故治血病有產婦血悶而死名監陸氏以紅花數十斤煮湯浸

婦于上而薰之湯冷再加半日而蘇金匱有紅籃花迺云治婦人六十二種風

葶藶

通行血



色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血

本經苦寒八厥

陰血分

肝心包能行血止血

能行故能止消瘀通經又能止吐崩尿血消痰

通經

酒煎一兩治風痺黃疽

疽有五黃疽穀疽酒疽黃汗疽女勞疽此蓋蓄

血發黃不專于濕熱者也女勞疽必屬腎症亦不可以濕熱例治當用四物知相壯其水參木培其氣隨症而加利惡清熱藥

崩運撲

損痔瘻瘡癰血少者忌用

根可染絳忌鐵

紫草

瀉血熱滑腸



甘鹹氣寒入厥陰血分

心包涼血活血利九竅通二

便鹹寒性滑

治心腹邪氣

即熱也

水腫五疔癰癤惡瘡益熱明致

及痘瘡血執毒盛二便閉澇者血熱則毒閉得紫草涼之則血行而青

得陽氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣者忌用

去頭鬚酒洗

凌露花

一名紫

葳

瀉血熱



甘酸而寒入厥陰血分心包能去血中伏火破血去

瘀主產乳除痰崩帶癥瘕腸結皆不大血閉淋悶風痒

血熱生風之症外科多用孕婦忌之本經云養胎經疏云破血之藥非所宜也肺癰有用之為君藥者

麥香花為末和密陀僧唾調敷酒難甚驗 簪生花開五辨黃赤有黑不可近鼻聞傷腦

大小薊

瀉涼血



甘温大明皆能破血下氣行而帶補治吐衄腸癰女

子赤白沃安胎涼血小薊力微能破瘀生新保精養

血退熱補虛不能如大薊之消癰毒丹溪曰小薊治下焦結熱血淋

本草菁要草

茵草

紫草

凌露花

夫小薊

卷二六

本事方一人冷氣入陰囊腫
滿疼痛煎大薊汗服立瘥

兩薊相似花如髻大薊莖高而葉皺小

薊莖低而葉不皺皆用根

三七亦各

山漆
瀉散瘀
定痛



甘苦微温散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰

腫醋磨全即散已為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二

破者為末杖後敷之去瘀消腫易愈大抵此藥近時始出軍
陽明厥陰血分之藥故治血病

中特之從廣西山洞來者畧似白芨地黃有節味微甘頗似人參以末

摻猪血中血化為水者真近出一種葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤

香根大如牛蒡味甘苦易繁衍云是三七
治金瘡折傷血病甚効與南中來者不同

地榆

清止血



苦酸微寒性沉而瀉本草未嘗言瀉然能收八下焦

除血熱治吐衄崩中血虛腸風而見也血瘀者為癥

蘇頌著
本草圖經

毒積久而發也。或前為近血，出腸胃，莫後為遠血，出肺肝。蘇頌曰：古方斷下多用之。寇宗似

蒲黃

生滑行
血炒瀉
止血



甘平厥陰血分藥。肝包生用性滑，行血消瘀，通經脈，利小便，祛心腹膀胱寒熱。同五靈脂，治心腹瘵，撲打損傷，瘡癩諸腫。一婦舌脹滿口，以蒲黃頰擦，此曉乃

薑宋等分，搽之愈。時珍曰：觀此則蒲黃之涼血活血可知矣。蓋舌為心苗，心包和火，乃其臣使，得乾薑是陰陽相濟也。炒黑性瀉，止一切血崩帶泄精。香蒲花中澁層湯成八藥。

香柏

生用破
血灸用
止血




生用辛平，破血通經，治癥瘕淋結，灸用辛溫，止血治

腸風脫肛。生石上，拳鑿如雞足，俗呼萬年松。凡使

鹽水煮半日，井水煮半焙用。

蘭茹

瀉破血



菴藷子

瀉行水
散血



鬱金

直行氣
解鬱瀉
泄血破
瘀



本草綱目

辛寒有小毒蝕惡肉排膿血殺疥更除熱痺破癥瘕

內經同烏劍骨
始婦人血枯
根如萊菔皮黃肉白葉長微潤折之

有汁結實如豆一顆三粒甘草為使

苦辛微寒別錄
八肝經血分行水散血散中有補治

陽痿經澁腰膝骨節重痛產後血氣作痛閃到折傷

撲打方巨則見之
多用之自能制虫則爛

葉似菊而薄莖似艾而粗苴意為使

辛苦氣寒純陽之品其性輕揚上行入心及包絡兼

入肺經涼心散肝鬱下氣破血
行滯氣亦不損正
氣破瘀血亦能生

新治吐衄尿血婦人經脈逆行
諸症用鬱金未加非
血

汁薑汁童便服其血自
清痰中帶血者加竹瀝
血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失心
類多毒笑
尚知畏懼

藟黃
瀉破血
行氣



症屬不足狂多忿怒人莫能制癩屬有餘此病多因驚憂血塞于心
竅所致鬱金七兩白礬三兩米泔丸服名白金九鬱金入心散惡血明
礬化頑**瘡毒入心**鬱金一兩甘草二錢半煮乾焙研末水片五分每用
突故也**瘡毒入心**一錢加猪血五七滴新汲水下治疔疽如有白泡忽
搗入腹紫**下蠱毒**同升麻服
黑無膿不吐則下
出川廣體銳圓如蟬肚外黃內赤色鮮
微香味苦帶甘真市人多以
藟黃偽之

苦辛本草大寒藏器大明曰熱色黃入脾兼入肝經理血中之氣
下氣破血除風消腫功力烈于鬱金治氣脹血積產
後敗血攻心通月經療撲損疔疔者能入手臂治風

寒濕痺血虛臂痛者勿用時珍曰入臂
治痛其兼理血中之氣可知
出川廣陳藏器曰鬱金苦寒
色赤藟黃辛溫色黃

遊味苦色青二物不同所用谷別經疏曰藟黃主治介乎三稜鬱金之
間時珍曰藟黃鬱金莪述形狀功用大畧相近但鬱金入心專治血莪
黃入脾兼治血中之氣述八肝治氣中之血稍為不同今時以扁如乾

莪者為片子藟黃圓如蟬腹者為蟬肚鬱金並可雜色述形雖似鬱金

藟黃
鬱金
二八

面色不黃也

我述音

瀉破血行氣消積



辛苦氣溫八肝經血分破氣中之血能通肝消痰通

經開胃化食解毒止痛治心腹諸痛治氣吐酸奔豚

瘕癖酒醋磨服瘕音賢小腹積瘕癖多見于男子瘕

治積聚諸氣良按五積心積曰伏梁起膈上至心下肝積曰肥氣在左脇肺積曰息贖在右脇脾積曰痞氣在胃脘右側腎積曰奔豚在小腹

上至心下治之不宜專用下藥恐損真氣宜干破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯也衰其

大半而止過者死東垣五積方川三稜莪朮皆兼入參贊助成功按治積諸藥神麩麥芽化穀食萊菔化麵食阿魏山杏花肉食紫蘇花

魚膽青蔥花枳積消酒積腐香消酒積菓積荒花牽牛大戟行水飲三稜莪朮常用消癥瘕木香攢榔行氣滯礞石蛤粉攻痰積巴豆攻冷積

大黃芒硝攻熱積雄黃職粉雖為泄劑亦能益氣王好古曰故治氣短攻涎積疔虫水蛭攻血積

九集香丸諸湯根如生薑我生根下似卵不齊硬難擣灰火煨透散中多用之

荆三稜

瀉行氣

破血消

積

破血消

積

皂莖根

瀉火補

中止血

止歲

乘熱搗之分

或醋磨酒磨或者熱用分



病魂如右文理五色

力峻虛者慎用

苦平色白屬金

皮黑八肝金血分破血中之氣

聚兼八脾經散一切血瘀氣結

瘡硬食停老塊堅積

乃堅者削之從血藥則治血從氣藥則治氣須輔以健脾補氣藥良皆有人患癥瘕死遺言開腹取之得

三稜柄消成水乃知此藥可療癥瘕消腫止痛通乳墮胎功近香附而

色黃體重若鮑魚而小者良醋浸炒或麩裏煨

甘寒入手少陰

足太陰陽明脾補中益氣除伏熱

消瘀血利小便解酒毒治吐衄諸血上行則吐血肺

火盛則衄血茅根甘和血寒涼血引火下降故治血之燥損瘀血搗汁服名茅花湯亦治鼻衄麻淋

閉寒熱血瘀則閉寒熱則寒熱作矣

淋瀝崩中則崩傷寒噦逆也東垣作乾嘔之甚者



本草黃芩草

我迷 荆三稜 白茅根

卷二九

未市熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水時珍曰良藥也世人以微是月熱喘急內熱煩渴黃疸水腫而忽之惟事苦寒之劑傷神却之氣

烏足知
此哉
茅針潰癰瘡酒煮服一針潰孔二針潰二孔

蘆根

瀉熱止嘔



甘益胃寒降火治嘔噎反胃胃熱火升則嘔逆食不下金匱方蘆根煎服

消渴客熱傷寒內熱止小便數肺為水之上源脾氣散精上歸于肺始能

通調水道下輸膀胱腎為水臟而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也虛中空故八心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而小便復其常道矣
能解魚蟹河豚毒 取逆水肥厚者去鬚節用

葶根

瀉熱散痲



甘寒而滑補陰破癆解熱潤燥治天行熱疾大渴大

狂胎動下血諸淋血淋馬賊赤遊丹毒癰疽發黃金

瘡折傷止血雞骨硬搗如龍胆雞骨雞湯下魚對魚湯下汁能化血為水葶皮與瘡婦

作枕止血運安腹上止產後腹痛散痲之功瀉葶汁療消渴

荆三稜

瀉行氣

破血消

積

破血消

積

白茅根

瀉火補

中止血

止歲

乘熱搗之分

或醋磨酒磨或者熱用分

八血



苦平色白屬金皮黑肉白入肝金血分破血中之氣肝亦通

聚兼入脾經散一切血瘀氣結痞硬食停老塊積

乃堅者削之從血藥則治血從氣藥則治氣須輔以健脾補氣藥良昔有人患癥瘕死遺言開腹取之得

病魂如右文理五色削成刀柄因卸消腫止痛通乳臨胎功近香附而三稜柄消成水乃知此藥可療癥瘕

力峻虛者慎用

色黃體重若鮑魚而小者良醋浸炒或麩裏煨

甘寒入手少陰心足太陰陽明脾補中益氣除伏熱

消瘀血利小便解酒毒治吐衄諸血心肝火旺通血

火盛則衄血茅根甘和血寒涼血引火下降故治之之襟損瘀血搗汁服各茅花湯亦治鼻衄

閉寒熱血瘀則閉閉寒熱則寒熱作矣淋瀝崩中血熱傷寒噦逆即呃逆說文曰噦氣膈也東垣作乾嘔之甚者

本草備要

荻蓬 荆三稜 白茅根

卷二九

末市熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水時珍曰良藥也世人以微是月熱喘急內熱煩渴黃疸水腫而忽之惟事苦寒之劑傷神和之氣

烏足知 此哉 茅針潰癰瘡 酒煎服一針潰 孔二針潰二孔

蘆根

瀉熱止 嘔



甘益胃寒降火治嘔噦反胃

胃熱火升則嘔逆食不 下金匱方蘆根煎服

消渴客熱傷寒內熱止小便

反肺為水之上源脾氣 故精上歸于肺始能

通調水道下輸膀胱腎為水臟而主二便三經有熱則小便數甚至不 能少忍火性急速故也蘆中空故八心肺清上焦熱熱解則肺之氣化 行而小便復 能解魚蟹河豚毒 取逆水肥厚者去鬚節用 其常道矣

葶根

瀉熱散 痲



甘寒而渴補陰破癆解熱潤燥治天行熱疾大渴大

狂胎動下血諸淋血淋鳩貼赤遊丹毒癰疽發黃金

瘡折傷 止血 魚骨硬 搗如龍胆雞骨雞 湯下魚對魚湯下 汁能化血為水葶皮與癰婦

作枕止血運安腹上止產後腹痛 散痲葶汁療消渴 之功

薔薇根
瀼濕熱



苦瀼而冷八胃大腸經除風熱濕熱生肌殺虫治泄痢消渴牙痛口糜煎汁含漱遺尿好眠癰疽瘡癬花有

芭蕉根
瀼熱



味甘大寒治天行熱狂煩悶消渴產後血脹並鴉片服癰腫結毒為末油調敷宿後者佳

大黃
大瀼血
分濕熱
下有形
積滯



大苦大寒八足太陰脾手足陽明厥陰大腸胃心包肝血分其性浮而不沉其用走而不守若酒浸亦能引至至高之分仲景太陽門調胃承氣湯大黃註曰酒浸陽明門大承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小

承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣在上非酒不至苦用生者則遺至高之邪熱病愈後或目赤喉痺頭腫膈上熱疾生也

大黃黃芩草 蘆根 葶根 薔薇根 芭蕉根 大黃 卷二十一

以蕩滌腸胃下燥結而除厥熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥糞故譫語宜下之譫

音濕熱障瘧下痢赤白腹痛裏急黃疽水腫癰瘡積聚積久成形謂之積屬陰聚散無

常謂之聚屬陽積多足留飲宿食心腹痞滿二便不通皆土鬱之吐血衄

血血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏火行水除痰餌膿消腫能推

噎致新然傷元氣而耗陰血下陰若病在氣分胃虛血弱人禁用氣分

而用之是為誅伐無過東垣曰能推噎致新如定禍亂以致太平所以

有將軍之號時珍曰仲景湯心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連

黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿凌之軟者

濁大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之

則痞滿乃兼傷管血邪結上焦川之上腕當心故曰瀉心經曰大陰所
至為痞滿又曰濁氣在上則生臌脹是已病發于陽而反下之則結胸
乃熱邪陷入血分亦在上腕故大陷胸湯丸皆用大黃亦傷脾胃血分
之邪而降其濁氣也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用
半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少
陰不足元陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心木不足

臌音嘔

黃芩
瀉火除

肝肺各受火邪而病作故用黃芩較肺黃連故肝肺者陰之主肝者心
之母血之合也肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱
就以苦補其心蓋一舉而兩得之李士材曰古人用大黃治虛勞吐
衄意甚深微蓋濁陰不降則清陽不生瘀血不去則新血不生也

川產錦紋者長有酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻黃芩為使利者不

得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳夷
堅志湯火傷者搗生大黃醋調敷止痛無癢



苦八心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治癖疔腹

痛便血自溢寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積痰
血痰食之不同寒宜溫熱宜清虛宜苦實宜下食
宜消導瘀血宜行散痰濕宜化痰利濕痛時
手不可按者為實痛按之痛止者為虛痛 寒熱往

來邪在黃疽五淋血閉實熱在氣逆癰疽瘡瘍及諸失血消痰丹溪以

痰假其降火也按痰
因火動當先降火 利水解渴安胎胎孕宜清熱涼血養陰遺陽補勝

膀水酒炒則上行瀉肺火利胸中氣肺主氣熱傷氣治上焦之風熱濕

丹溪曰黃芩火嗽喉腫五臭肺
熱上中二焦藥
目赤腫痛過服損胃血虛寒中者禁

用得柴胡退寒熱得芍藥治病得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得
自木安胎之聖藥時珍曰仲景治少陽症小柴胡湯大陽小陽合病

下利黃芩湯小陽症下後心滿瀉心湯並用之蓋黃連苦寒人心瀉熱
除脾家濕熱使胃火不流八肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者

苦寒傷土損其母也少陽症雖在半表半裏而心膈痞滿實兼心脾土
焦之邪心煩喜嘔然不欲食又兼脾胃中焦之症故用黃芩以治手

足少陽相火黃芩亦少陽藥也楊士瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰
柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治

肺熱身如火煩燥引飲而書盛者宜一味黃芩湯以瀉
肺經氣分之火黃芩一兩煎服木事方用治崩中暴下黃明者良中

虛者名枯芩即片芩瀉肺火清肌表之熱肉實名條芩即子芩瀉大腸火

補膀胱水上行酒炒瀉肝胆火猪胆汁炒山茱萸骨為使畏丹皮丹砂

黃連

瀉火燥



大苦大寒入心瀉火

王海藏曰瀉心實瀉
脾也實則瀉其子
鎮肝涼血

凡治血防風為土部之使黃連燥濕開鬱解渴能治
為中部之使地榆為下部之使

消除煩益肝胆厚腸胃消心瘕能去心止盜汗涼心治腸瀉痢何血日

連丸濕熱鬱而為痢苦連治痢要藥紫口者熱壅上焦同人參煎湯脾

之但得下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼

以解表次用苦寒以攻裏機要云後重宜下腹痛宜和身重宜除濕脈

旺宜去風風邪內結宜汗身冷自汗宜溫膠血稠整宜軍劑以湯之下

痢赤屬血分白屬氣分載氏曰俗謂赤熱自寒痞滿燥濕開縵仲景治

者非也通作濕熱處治但有新久虛實之分痞滿九種心下痞五等

瀉心湯清熱腹痛清熱心痛伏梁積心自痛背傷八乳浸點或合歸芍等癰疽瘡

皆用之積心疥諸痛癢瘡酒毒胎毒小兒初生合甘草明目傳信方羊肝一具黃連

治名羊肝丸定驚肝止汗解毒除疳同猪肝殺尤旣得苦虛寒為病者禁用

久服黃連苦參反熱從火化也昂按灸上作苦味苦必燥燥則熱矣且

苦寒沉陰肅殺代傷生和之氣也韓懋曰黃連與肉桂同行能交心腎

子頃刻時珍曰治痢用香連丸瀉連丸用黃連乾薑薑黃散用黃連生

薑左金丸用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛止下血用黃連大蒜一

陰一陽寒因熱用熱因

寒用最得製方之妙

出宣州者粗肥出四川者瘦小狀類鷹屎連

黃連

卷二十五

珠者良去毛治心火生用盧火醋炒肝胆火猪胆汁炒土焦火酒炒有

醋嘈雜等症亦有吐酸者名酢心
宜黃連吳茱萸降火開鬱酢音醋
中焦火薑汁炒下焦火鹽水或重便

炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼

赤人乳浸時珍曰諸法不獨為之引葶葢辛熱制其寒苦鹹寒制其燥性用者詳之黃芩龍骨為使惡菊花

立參殭蠶白鮮皮畏欬冬牛膝忌猪肉時珍曰方有藏連丸黃連猪皮丸豈忌肉而不忌藏臍乎殺

烏豆巴豆黃連瀉心火佐以龍胆瀉肝胆火白芍瀉脾火石當瀉胃火知母瀉腎火黃栢瀉膀胱火木通瀉小腸火黃芩瀉肺

火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝胆火黃連佐之瀉三焦火黃芩佐之鄭奠二口熱鬱惡心兀兀欲吐用黃連數分甚効

胡黃連

瀉熱療驚疳




苦寒去心熱益肝胆厚腸胃治骨蒸勞熱五心煩熱

心高手三消渴而多飲為上消肺熱也心移熱于肺傳為消渴是也多食善飢為中消胃熱

也痺成爲消中是也渴而小更宜早壯痔瘡脈痔數有膏爲下消腎熱而水虧也三消陽痔血痔濕熱

苦參
瀉火燥
穢補陰

下流傷血分無所施洩
則通肛門而為痔腫
藥朱二九曰解吃烟
毒合茶服之甚効
性味功用同黃連故名出波斯國今奉臨南海
亦有之心黑外黃折之塵出如烟者真其惡同黃連



苦燥濕寒勝熱沉陰主腎補陰益精養肝胆安五臟

濕熱去則血氣和平而五藏自安利九竅生津止渴明目止淚淚為肝熱

治溫病血痢純下清血者風傷用也宜散風涼血易下如荳汁者濕傷脾也宜清熱參濕月

風濕赤黃疽酒毒熱生風濕生蠱又能祛風逐水殺虫治大腸疥癩然

大苦大寒肝腎虛而無熱者勿服張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草

曰五味入胃各歸其所毒攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也

也玉水註曰氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏絕故令人暴夭筆談云久用苦參擦牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九

藥能醫

病不能

養人食

能養人

不能醫

病

知母

瀉火補

水潤燥

東垣治

便秘以

渴不渴

分之

之真價

五

六二

肉菜食養盡之無使過之傷其正也按人參補脾沙參補肺紫需米
參補肝丹參補心玄參補腎苦參不在五參之內然名參者皆補米

泔浸去腥氣蒸用玄參為使惡貝母克經子漏盧反黎盧酒煎或醋者

能吐天
行暗毒



辛苦寒滲上清肺金而瀉火瀉胃熱勝膀胱邪下潤腎

燥而滋陰八二經氣分黃相入二經血分故消痰定

嗽止渴安胎莫非清火之用治傷寒煩熱唇勞產勞易蒸退有

母燥渴虛煩久瘡下痢治嗽者清肺火也治渴者清二便消淨腫小

利則腫消東垣曰熱在上焦氣分結秘而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱

絕其化源宜用參濕之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便

悶而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大
苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有
熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥但
膀胱熱宜瀉膀胱此正治而因肺熱不能生木則清肺此隔二之治如

龍胆草
瀉肝胆
火下焦
濕熱

因脾濕不通而精不上升故肺不能生水則潤胃健脾此隔三之治瀉
膀胱黃柏知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二水之類昂按凡病皆
右隔二隔三之然苦寒傷胃而瀉腸多服令人瀉李士材曰苦寒肅殺
治不獨便閉也然苦寒傷胃而瀉腸多服令人瀉非長養萬物者也世
以其滋陰施之虛損之人則得酒良上行酒浸下行鹽水拌忌鐵
如水益深矣特表出以為成



大苦大寒沉陰下行益肝胆而瀉火相火寄于肝明
邪熱即所兼入膀胱腎經陰下焦之濕熱與防已同
以補之也

功酒浸亦能外行上行治骨間寒熱腎主驚癇邪氣

肝經時氣溫熱熱痢瘡黃寒濕脚氣足傷寒濕則成脚氣腫而痛者為
風火時氣溫熱熱痢瘡黃寒濕脚氣濕脚氣宜清熱利濕搜風又有變

縮枯細痛而不腫者名咽喉風熱赤睛努肉瀉肝胆火能明目元素曰
乾脚氣宜養血潤燥柴胡為主龍胆為使目疾

要藥昂按若目疾初起宜發散忌用寒涼癰疽癩疥過服損胃
甘草水浸一宿曝用小豆

貫眾為使忌地黃


本草綱目卷之... 知母 龍胆草 卷三十四

青黛

瀉肝散
鬱火

大青

瀉心胃
熱毒



蓄蘊風熱毒氣若不出富作腸風
內痔婦不能禁酒物果仍發痔
研置柿餅中煨食
名聖餅子治略血

碧者水飛淨用
故須陶淨

鹹寒色青瀉肝散五臟鬱火解中下焦蓄蘊風熱
日一婦患臍腹二陰遍生濕癩熱痒而扁出黃汁二
便澁用鰾鱧松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜
酒喜食魚蝦發風之物仍用馬齒莧四兩研爛入青
黛一兩和塗熱痛皆去仍服入正散而愈此中下焦

小兒驚癇疳熱丹熱傳癩瘡蛇犬毒
卽旋花取嬌

微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發

疔熱甚傷血裏實表虛則發斑輕如珍子重如錦斑
紫黑者熱極而胃爛也多死活人治赤疔疔痛疔行

犀角大黃道熱痢丹毒喉痺
清湯 處處有之高三三尺

莖圓莖葉對節生八月開小紅花成繖實大如椒色赤用莖葉

華年

大瀉氣
分濕熱



辛熱有毒屬火善走入肺經瀉氣分之濕熱肺主氣

金而能達者腎命門走精嚥通下焦鬱遏及大腸風

秘氣秘利大小便逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘滿

痼瘕氣塊若濕熱在血分胃弱氣虛人禁用東垣曰辛牛苦寒誤矣其味辛辣久嚼猛烈雄壯所

謂苦寒寒在哉乃瀉氣之藥比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主

血中之濕宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣

使氣血俱損也王好古曰以氣藥引則入氣以大黃引則入血時珍曰

一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥結服硝黃藥則若同知如此

三十餘年其人體肥膏粱而多鬱口吐酸痰乃實此乃三焦氣滯有升

無降津液皆化為痰不能下潤腸腑非血燥也潤劑留滯硝黃入血不
能入氣故無効用牽牛為末皂角高丸緩服便通外甥素多酒色病二
便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不効子言此乃濕熱之邪在精道
壅隧路病在二陰之間故前阻水便後阻大便秘不在大腸膀胱也用
棟實苗香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天真丹用
牽牛鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂
破故紙諸藥深得補瀉兼施之妙

有黑白二種黑者力速亦名取子

長青膏受草

青黛

大青

牽牛

卷二五

防已

通行水

瀉下焦

血分濕

熱

淘去浮者春去皮用得木香乾薑良

此藥漢前未入本草故仲景方中無此別錄始載之朱後始多用者

大辛苦寒

木經平別錄溫

太陽經藥

勝

能行十二經通腠理

利九竅瀉下焦血分濕熱為瘡風水之要藥治肺氣

喘嗽水熱氣諸疔降氣濕瘧氣足傷寒濕為脚氣



喘嗽水熱氣諸疔

降氣濕瘧氣

足傷寒濕為脚氣

則腫熱則痛防已為主藥溫加以仁蒼朮木瓜大通熱加芩柏風加羌活草薺痰加竹瀝南星痛加香附木香活血加四物人便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加胆草又有足跟痛者屬腎虛不與脚氣同論

瘡或濕熱流入十二經致三陰不通者非此不可然性險而健陰虛及

濕熱在上焦氣分者禁用

十劑曰通可去滯通草防已之屬是也通草即木通是徐之才亦以行水者為通與燥劑

無以別矣木通甘淡瀉氣介

出漢中根大而虛心有花紋色黃名

漢防已黑點黃腥木強者名木防已不佳

燥穢然口治風用水酒洗用防已治水用漢防已

木集以

行水為

通劑改

熱藥為

燥劑

惡細辛畏單薺

薺

大瀉氣

秘通行

水



辛苦大寒屬火性急大能下氣行膀胱水肺中水氣

膈著非此不能除破積聚癥結伏雷熱氣消腫除

痰止嗽定喘水濕泛溢為腫脹通經利便久服令人

虛十劑曰洩可去閉薺大黃之屬是也大黃泄陰分血閉薺泄陽
分氣閉氣味俱厚不咸大黃然有甜苦二種甜者性緩苦者性急泄
肺而傷胃宜大棗輔之仲景有薺大棗瀉肺湯治
肺氣喘息不得臥昂按輔以大棗補土所以制水

色黃合糯米微炒米用得酒長榆皮為使

子如黍米微長

甘遂

大通瀉

經髓水



苦異有毒能瀉腎經及隨道水濕直達水氣所結之

處以攻決為用為下水之聖藥仲景大陷胸湯用之圭十三種

尖腹腫滿名水蠱喻嘉言曰腎為六腑之源脾不能散胃水穀之海五藏

腎者胃之閉也
前陰利水後陰利設

大戟
大通瀉
藏腑水

本草備要

卷二

病于中肺不能通胃之水道于膀胱而病于上腎不能同胃之閉時其蓄泄而病于下以致積水浸淫無所底止王好古曰人者脾肺腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上頭面中四肢下腰膝外皮膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沉之別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之按水腫有痰裏食積瘀血致精不升濁不降而成者有濕熱相生隧道阻塞而成者有燥熱沖擊秘結不通而成者症屬有餘有服寒涼傷飲食中氣虛衰而成者有人病後正氣衰憊而成者有小便不通水液妄行脾莫能制而成者症於不足宜分別治之然其源多由中氣不足而起丹溪曰水病當以健脾為主使脾胃而氣運則水自行宜參苓為君視所候症加減苟徒用利水藥多致不效痰疝積聚留飲宿食痰迷癩癩虛者忌用皮赤肉白根作連珠重者良麩裏煨熟用或用甘草齊苞汁浸三日其瓜蒂為使仲景治心下留飲與甘葦同用取其相反以立功也有治水腫及腫毒者以甘遂末傳腫處濃煎甘草湯服之其腫立消二物相反感應如此



苦寒有毒能瀉臟腑水濕行血發汗利大小便治十二小腹滿急痛積聚癥瘕頸腋腫風毒脚腫通經

噫胎誤服損真氣

時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到人心則迷成癡癩入肺則塞竅為咳喘背冷入汗則脇痛乾嘔寒

熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則癢癩癰腫
噴無澤並以陸涇丹主之疎有音効此乃治痰之本痰之本水也濕也
得氣與火則結為痰大戟能泄藏腑水濕日遂能行經絡水濕白芥子
能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收高功也又曰錢仲陽謂腎為真乃
有補無瀉復云痘症交黑歸腎者用百祥膏下之非瀉腎也瀉其腑則
臟自不實腑者膀胱也百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也竊謂非
獨瀉腑乃腎邪實而瀉肝也實則瀉其子大戟浸水青絲肝胆之色也
痘症毒盛火熾則水益涸風挾外勢則土受虧故津液內竭不能化膿
而成黑陷之症瀉其風火之毒所以救腎挾脾也昂按瀉心乃所以補
心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰復矣機要用大戟一兩棗三枚同
煮焙乾去戟用棗丸

得大棗則不損脾畏菖蒲反甘草

枕塵紫者為上批產白者傷人漿水煮去骨用

商陸

水 大通行



苦寒有毒

諸家辛酸時珍苦寒

沉陰下行與大戟甘遂同功療

水腫脹滿

腫屬脾脹屬肝腫則陰氣猶行如單脹而不腫者名蠱脹為木橫剋土難治腫脹朝

寬暮急為血虛暮寬朝急為氣虛朝暮俱急為氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治

癰疽腫脹喉痺不通薄切醋炒濕熱之病瀉毒傳惡瘡墮胎孕令

人見鬼神取花白者良赤者傷人只堪貼臍入麝豉豆湯浸蒸用得蒜

良

芫花

水 大通行



苦寒有毒去水飲痰癖瘰五水任五臟皮膚脹滿喘

急痛引胸脇咳嗽瘡癰五水者風木皮水正水石水黃汗也水積胸中堅滿如石

名石水汗如栢汗名黃汗久不愈必致癰膿時珍曰仲景治傷寒太陽病表未解心下有水而咳乾嘔發

熱或喘或利者小毒龍湯主之表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔引痛兩脇或喘或嗽者十棗湯王之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從兩便出內經所謂潔淨府去陳莖法也十棗湯芫花甘遂大戟等分煮十枚

葉似

柳二月開花紫碧色葉生花紫陳久者其醋煮過水浸暴用根療疥子

得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山田則入肝得水麥竹葉則入心
 得林米麻黃則入肺得龍骨附二則入腎得草蓰枳槲則入脾蓋無痰
 不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生用多
 用為然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其
 或吐也世人泥于雷效老人久病忌服之說使直藥見疑沉疴難起初
 何愚也○常山吐瘧痰瓜蒂吐熱痰烏附尖吐濕痰萊服子吐氣痰藜
 蘆叶
 風痰
 雞骨者良酒浸蒸或炒用極其為復忌葱薑菜名蜀漆功用
 畧
 古方有蜀漆散取其苗
 性輕場發散上焦邪結甘草水拌蒸

藜蘆
 道引吐



辛寒至苦有毒入口即吐善通項令人噎風癩疔多

用之
 張永和曰一婦病風癩初一二年一作後漸日
 作甚至一日數作求死而已值歲大飢採百草

食見野草若慈果蒸飽良覺不安吐膠凝數日約一
 二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以所食慈

訪人乃慈慈苗即藜蘆是矣李時珍曰和王妃年七十中風不省牙關
 緊閉丸考太醫吏自月池翁診視藥不得八不獲已持去一齒膿煎藜

蘆湯灌之少頃噎氣遂吐痰而
 甦藥不助眩厥疾不瘳誠然
 取地黃用黃蘆為使細切

諸參惡大黃畏葱白吐者服葱湯即止

木通古名

通草輕通行

水瀉小腸火

寒水大腸膀胱



甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱心火降則化津

液肺為水源肺熱清則津液化水道通下通大小腸膀胱導諸濕熱由

小便出故導赤散用之凡利小便者多不利大便以

大便通利九竅血脈關節治胸中煩熱遍身拘痛楊仁齊云遍身隱熱疼

血屬干心宜木通以大渴引飲中焦淋瀝不通下焦心與小腸相

則淋水腫浮大利小便耳聾泄腎火目眩口燥舌乾舌為心苗喉痺咽痛火炎

鼻色音壅熱壅清道鼻則氣空不通失音清脾熱好眠脾主四肢倦則好眠心為除煩

退熱止痛排膿破血催生行經下乳火不亢于內氣順血行汗多者禁

用東垣曰肺受熱邪津液氣化之源絕則寒水斷流膀胱受濕熱瘧閉

本草

水瀉

木通

卷二九

也

通草古名

通脫木
經通利
水退熱

澤瀉

通利水
瀉膀胱

火

本草綱目

中則心煩嘔歲浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性瀉諸經之火
火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小水而不降矣 君火宜
通相火宜澤瀉利
水雖同所用各別
簪有細孔兩頭皆通故通




色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經引熱下行
而利小便味淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁

治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音

淡通取寒降
火利肺氣

退熱催生



汗淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功帶利濕

行水消滯渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水瘕脚氣痲痺淋

瀝陰汗陰明有汗尿血既利水而又止洩精何也此痰精乃濕熱為病不為虛滑者言

世虛渾則當瀉熱之病濕熱既除則清氣上行又能養五臟益氣力起

用補滯之藥
陰氣補虛損止頭旋有聰耳明目之功
脾胃有濕熱則頭重耳鳴目昏
去其濕則熱亦隨去土乃得

卷二

脾胃善燥
腎惡燥
故兼補
為難

車前子
逆行水
瀉熱涼

令而清氣上行故本經列之上品云聰耳多服昏目小便通利而腎水
明目而六味丸用之今人多以昏目疑之虛故也服中有水
屬膀胱過利則水涸而火生仲景八味丸用澤瀉寇宗奭謂其接引桂
附入腎經李時珍曰非接引也乃取其瀉膀胱之邪氣也古人用補藥
必兼瀉邪邪去則補藥得力一關一關此乃玄妙後人不知此理尚一
干補必致偏勝之患矣王履曰地黃山茱萸茯苓丹皮皆腎經藥桂附石
腎命門之藥何待接引乎錢仲陽謂腎為真水有補無瀉或云脾虛腎
旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉瀉其伏留之邪耳易老云去膠
中留垢以其微鹹能瀉伏水故也昂按六味丸有熟地之溫丹皮之涼
山藥之濡茯苓之慘山茱萸之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必有
瀉相和相濟以成平補之功乃平淡之神高所以為古今不易之良方
也即有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二
味極三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加
入有補無瀉且零倍于主責成不專而六味之功且退處于虛位矣製
方配合之本旨矣此鹽水拌或酒浸用忌鐵



甘寒涼血去熱止吐衄消癥瘕明目通淋凡利水之劑多損子

目性此能解汗與小腸之熱濕熱退
而日清矣雷教曰使葉勿使蓋
子甘寒清肺

肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功強陰益精令人有

子賢有二潑車前子能利水竅而固精竅精盛則有子五子衍宗丸用

前易蓮子時珍曰人服食須佐他藥如治濕痺五淋暑濕瀉痢歐陽文

下國醫不能愈夫人云而有藥三文一貼甚効公不肯服天人雜他藥

進之一服而愈問其方乃車前子為末米飲下二錢一云此藥利水而

不動氣水通利則清入滋補藥妙研大利水泄瀉藥

燈草

輕通利水清熱



甘淡而寒降心火心能清肺熱利小腸心與小腸相

則補熱小腸亦清而熱從小便出矣通氣止血治五淋水腫熨灰吹喉

痺塗乳止夜啼草出淨水可見十餘次則

能斷也

瞿麥

通利水
破血



苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥故入
用之五淋大抵皆屬濕熱熱淋宜入正及山梔滑石
之類血淋宜小蘆半膝膏腎虛淋宜補腎不可濁瀉
老人氣虛者宜參米兼水通山梔亦有痰滯中焦皮
作淋者宜行痰兼通利藥最忌發汗汗之必便血不

血利竅與癰消腫明目去翳通經墮胎性利善虛者慎用寇宗奭曰
熱而小腸虛者服之則心心經雖有
熱不清而小腸別作病矣

花用葢殼丹皮為使產後淋當去血花大如錢紅白斑爛色甚媚俗呼洛陽

花用葢殼丹皮為使產後淋當去血

扁蓄一名

扁竹通淋



苦平殺虫疥利小便治黃疸熱淋吐腹腹痛魚鱈下
部煮葉細如竹弱莖蔓引促節有粉二月開紅花

天仙籐

通活血
消腫



苦溫疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫有天仙籐散
葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋一云即青

本草綱目

灼草

瞿麥

扁蓄

天仙籐

卷二十一

地膚子
通利水
補陰



甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利小便而通淋

時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣治小便不通用知柏滋腎之意王節齋曰小便不禁或頻數百方多以為寒而用溫滋之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數也故老入多頻

數是膀胱血多陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病木屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致便數小便既多水盜虛矣故宜治癩疔散惡瘡煎湯補血補血瀉火治其本也收之瀉之治其標也

良葉作浴湯去皮膚風熱丹腫洗眼除雀盲澀痛葉如薔薇赤子類

蚤砂惡蟻

石韋
通淋補



甘苦微寒清肺金以滋化源凡行水之藥必通膀胱皆能先清肺火

而利水道若精氣補五勞利濕清熱之功高陽負對黃帝治勞傷用石韋并

治淋崩發背調酒生石陰柔勒如皮皆有黃毛

去毛微炙用杏仁滑石射干為使得真蒲長生古丸上者名丸葦治淋

海金砂

通淋瀉
濕熱



首寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱治腫滿五淋莖痛
得梔子牙硝蓬砂治傷寒熱狂大熱利小便此釜
底抽薪之義也

茵陳

通利濕
熱治諸
黃



莖細如線引竹木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火
苦燥濕興勝熱入足太陽之膀胱發汗利水以泄太陰

加附子乾薑各
隨寒熱治之

又治傷寒時疾狂熱瘴癘頭痛頭旋女人瘕疝為病
陽明之濕熱胃為治疸黃之藥脾胃有濕熱則發
熱甚者身如橘色汗如柏汗亦有寒濕發黃身黃黃
而色暗大抵治以茵陳為主陽黃加大黃梔子陰黃

香薷

宜通利
濕痞暑



辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺
為清暑之主藥肺氣清則小便行而熱除暑必兼濕

大青黃草

地膚子 石葦 海金砂 茵陳 香薷 卷之三十一

身寒寒
字當熱
字看傷
寒必病
熱
膏
瀉熱補
勞

利濕若無濕但為乾熱非暑也
治嘔逆水腫 熬膏服小
脚氣口氣 煎湯服
治霍亂轉筋 時珍曰暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏反中人內遂病頭痛發熱惡寒煩燥口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散邪和脾則愈若飲食不節勞役作傷之人傷暑大熱大渴汗出如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃內傷之症宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷是重虛其表而濟之熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛者尤不宜多服今人謂能解暑藥用代茶談矣李士材曰香薷為夏月發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若由熱者誤服之反成大害世所未知按潔古云中暑為陰症為不足中熱為陽症為有餘經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑故中暑宜溫散中熱宜清涼
陳者勝 宜冷飲熱服令人瀉



苦寒得春木少陽之令最早 二月生苗故入少陽厥陰血分
治骨蒸勞熱 取汁熬膏
勞虛熱 比苦寒之藥
 青蒿芬香入脾瀉胃子血虛有熱之人以其不犯胃氣也
風毒久瘧久痢瘡

疥惡瘡氣尸疰

時珍日月合通景云伏肉更口米蒿懸門庭可辟邪
 冬至元月各服一錢亦良明清蒿之治鬼淫蓋亦有

所失補中明目也

童便浸葉用熬膏亦良使子勿使葉使根勿使莖

附子

大燥回

陽下腎

命火逐

風寒濕

人入味

丸內亦

從地黃

等補陰

富與韭
汁牛乳



逐在表之風寒

同乾薑桂枝溫經散寒發汗

引溫煖藥達下焦以祛在裏之寒濕能

火下行亦有津

調貼足心者

治三陰傷寒

吳緩曰附子陰確要藥凡傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱面脈沉細者成厥陰

腹痛甚則唇青囊縮者急煩用之若待陰極陽結而用之已遲矣東垣

治陰盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脈七八至但按之則散用薑附

湯加人參投牛勰得汗

而愈此神聖之妙也

中寒中風

卒申日中漸傷日傷輕為感

氣厥痰

厥虛寒而厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脈逆風嘔噦胃膈噎

伐熱厥似寒者誤投立斃宜承氣白虎等湯逆寒嘔噦胃膈噎

多由氣血虛胃冷胃稿而成飲可下而食不可下稿在吸門喉門之厥

會也食下胃腕痛須臾吐出稿在賈門胃之上口也 上焦名噎食下

大黃黃芩

青蒿

附子

卷二五

良久吐出稿在幽門胃之下口也此中焦名腸朝食暮吐稿在關門大
小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積瘀血壅塞胃口者如寒痰
胃冷則宜薑附參朮胃稿者當滋脾世命火冷痢寒瀉亂轉筋脾虛
潤宜四物牛羊乳血瘀者加韭汁脾不足冷痢寒瀉亂轉筋脾虛

中焦為霍亂寒客下焦肝拘攣風痺癥瘕積聚督脈為病脊強而厥小
腎為轉筋熱霍亂者禁用拘攣風痺癥瘕積聚督脈為病脊強而厥小

兒慢驚瘡灰白癰疽不斂一切沉寒痼冷之症經曰陰盛生內力陽寒陽盛生外寒且陽

退陰殺邪辟鬼本草通經鹽胎比陰症用薑附藥宜冷服熱因寒用也

益盛治之以熱則拒格不納用熱藥治飲下嗝之後冷體既消熱性便
發情且不違而致火益此反治之妙也又有寒藥熱飲治熱症者此寒

因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒
此正治也或以寒治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所主而先

其所因蓋借寒藥熱藥為反佐以作向導也亦自從治王好古曰用附
子以補火必防涸水如陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰愈

耗精血口枯而氣無所附麗遂成不救者多矣母為鳥頭附生者為附子連生者為側子細

長者為天雄兩岐者為烏喙五物同出異名附子以西川彰明赤水產

者為最皮黑體圓底平八角重二兩以上者良或云二兩者更勝然難得生用發散

熟用峻補趙嗣其曰仲景麻黃附子辛細湯熟附醋麻黃發中有補四逆湯生附配乾薑補中有發其旨微矣丹溪曰烏附行經伸

景八味丸用為少陰嚮導後世因以為補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以行地黃之滯耳相習用為風藥及補藥殺人多矣昂按附

子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不為功故仲景四逆真武白通諸傷多用之其有功于生民甚大况古人日用常方用之

亦過矣蓋丹溪法重滋陰故每嘗陽藥亦其偏也王節齋曰氣虛用四君子湯血虛用四物湯虛甚者俱宜加熟附益四君四物皆和平寬緩

之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熱藥本不可輕用但當病則雖暑熱時

月亦可用也水浸煨令發折乘熱切片炒黃去火毒用又法甘

草二錢鹽水薑汁童便各半煮熟用畏人參黃耆甘草防風犀角綠

豆童便反貝母半夏積殼白及白欵中其毒者黃連犀角甘草煎湯解

之黃土水亦可解烏頭功同附子而稍緩附子性重暖溫脾逐寒烏

今人用黑豆煮亦佳

尺直青夏草 附子 卷二 四

頭性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭 烏附尖吐風痰治癩

癩取其鋒銳直達病所丹溪治許白雲屢用瓜蒂梔子苦參藜蘆等劑吐之不透後用附子尖和漿水與之始得大吐

膠痰數碗 天雄補下焦命門陽虛寇宗奭張元素皆云補土焦丹溪曰可為下部之佐時珍曰其尖皆向下生散

下行然補下乃所以益上也若上焦陽虛則屬心肺之分當用參耆不當用雄附矣 治風寒濕痺為風家主藥發

汗又能止陰汗 側子散側旁生宜于發散四肢充達皮毛治手足風

濕諸痺

草烏頭

大燥開 頑痰



辛苦大熱搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒頗勝

川烏然至毒無所釀制不可輕投 野生狀類川烏


亦名烏喙薑汁炒或豆腐煮用熬膏名射罔傳射

獸見血死

百附子

燥祛風
濕治面
疾

破故紙
一名補
骨脂
燥補命
火



辛甘有毒大熱純陽助經藥能引藥勢上行治高

上病陽明之脈營下面白附能去補肝虛祛風痰

治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕癢根如

草烏之小者長寸許皺紋有節炮用陶弘景曰此藥入絕無復真者今惟涼州生

辛苦大溫入心包命門補相火以通君火煖丹田壯

元陽縮小便亦治遺尿治五勞七傷五藏之勞要膝冷痛七情之傷膝冷痛

腎冷精流腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能蒸蒸則胃脾胃虛寒遲于運化致飲食



減少腹脹腸鳴嘔涎泄瀉如鼎金之下無火物終不執故補命門相火

即所以補脾破故紙四兩五味三兩肉苁二兩吳茱一兩薑蕪藥九名

四神丸治婦人血氣婦人之血脫氣弱亦墮胎 出南番者色赤嶺南

者色綠酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽水炒者得胡桃麻良惡甘草唐

草烏頭

百附子

破故紙

卷二

芸臺油
菜也

肉苁蓉

補腎命
膺腸

鎖陽
補腸滑

相國方破故紙十兩酒浸蒸為末胡桃肉二十兩去皮爛研密相每日
酒調一匙或水調服白飛霞日破故紙屬火堅固元陽胡桃屬水潤燥
養血有水火相生之妙忌芸
臺羊血加杜仲名青娥丸



一宿刷牙厚甲辟破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵蘇恭曰今人
和劣

甘酸鹹溫八腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓
強筋治五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛崩
帶遺精峻補精血時珍曰補而不峻聚用恐妨心湯
大便長大如臂重至斤許有松子鱗甲者良酒浸



甘溫補陰益精興陽潤燥強筋故治痿弱滑大
便便燥者啖之可代鱗甲鱗甲補比狀類男陽西矣

巴戟天

補腎祛濕



其辛微温入腎經血分強陰益精治五勞七傷辛温

散風濕治風氣脚氣水腫根如連珠擊破中紫而

鮮潔者偽也中雖紫微有白粉粉色而理小增者真

也蜀產佳

山律根似巴戟但色日人或醋煮以亂之

去心酒浸焙用覆盆子為使惡丹麥

胡盧巴

燥補腎命除寒濕



苦温純陽入右腎命門煖丹田狀元陽治腎臟虛冷

陽氣不能歸元

同附子硫黃

痕疝冷氣

同茴香巴戟川烏用棟吳茱萸寒

濕脚氣

出嶺南番舶者良云是番萊服子酒浸暴或蒸或炒

仙茅

燥補腎命



辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺

無子心腹冷氣不能食

温胃腰脚冷痺不能行煖筋相

火盛者息服葉如茅而畧潤根如小指黃白多癭

三直青要草

肉蓯蓉

鎖陽

巴戟天

胡盧巴

仙茅

卷三十一

竹刀去皮切糯米泔浸去赤汁出毒用忌鐵唐凌羅國始進此方當時盛傳服之多効煎前製陰

乾密丸酒服禁食生乳牛肉許真君書云甘能養肉辛能養節若能養氣鹹能養骨酸能養筋滑能養虛和若酒服之必効也

淫羊藿 補腎命



至香甘温入肝腎補命門時珍曰手足陽之精氣堅筋骨利小便治絕陽不與絕陰不度冷風勞氣四肢不仁
手足麻木 一名仙靈脾北部有羊二曰百合食此

藿所致故名去枝毛脂拌炒山藥為使得酒良

蛇林子 補腎命 去風濕



辛苦而温强陽益陰補腎散寒祛風燥濕治陰痿囊濕女子陰痛陰癢濕生虫同子藏虛寒疝不閉
熱 之賢命之病及腰酸體痛帶下脫肛喉痺齒痛濕癬

惡瘡殺虫 風濕諸病煎湯治去風癢時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨補助男子而且有益婦人世人舍

此而求補藥乎遠城
豈非貴耳賤目乎

丹皮貝母巴豆

似少而細微炒殺毒則不辣以地黃汁卦
煎三遍生

兔絲子

平補三陰



其辛和平凝正陽之氣八足三陰肺肝腎強陰益精温而不燥助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴

昂按此人或感

他毒禾可盡歸

管子克絲也

覆盆子

平補肝腎



肥健人補肝腎之効老寧掩筆記子族弟少服兔絲子凡數年飲食倍開飲至數斤腫遂消鬼絲過服尚能作疽以此加金石藥不可不戒無根蔓延草上子黃如黍粒得酒

其酸微温益腎臟而固精補肝虛而明目起陽痿縮

小便寇氏曰服之當澤飢虜鳥長髮椹汁塗髮不自女子多

大宜青艾草

淫羊藿

蛇床子

兔絲子

覆盆子

卷二

孕同密為膏治肺氣虛寒李士材曰強腎無燥熱之偏固精無凝滯之害金玉之品也狀如覆盆

故名去蒂淘淨搗餅用時酒拌蒸葉絞汁滴目中出自眩風除膚赤

收濕止淚

葵藜

平補肝腎



苦溫補腎苦溫瀉肺氣而散肝風益精明目肝以散為補凡

補肝藥皆能明目治虛勞腰痛遺精帶下咳逆肺痿乳閉癥瘕痔漏陰瘡音頽腎肝肺三經之病催生墮胎刺葵藜主惡血

故能破癥下胎沙苑葵藜綠色似腎故補腎炒用亦可代茶刺葵藜三角有刺去刺酒

拌蒸風家宜刺葵藜補腎則沙苑者為優餘功瑞竹堂方齒牙打動者葵藜根燒灰傳之

使君子

補脾殺風消積



甘溫健脾胃除虛熱殺臟蟲治五疳便瀉瀉痢瘡癰

為小兒諸病要藥經疏曰五疳便瀉瀉齒腹重皆由脾胃虛弱四而乳停食滯濕熱瘵

按地黃
胡麻皆
殺虫

益學

燥脾胃
補心腎

砂仁
即

砂密
宣行氣

寒而成脾胃健則積滯清濕熱散水追利而前症盡除矣時珍曰凡能殺虫之藥多是苦辛獨使君子榘子甘而殺虫每月止旬重頭向上中旬頭橫下旬向下道藏云初一至初五重頭向上凡有虫病者每月上旬空心食數粒至皆死而出也

積疴仁如榘亦可煨食久則油不可用忌飲熱茶犯之作瀉

出問蜀五辨有



辛熱本脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門三

焦之不足心為脾胃補火故能生土能瀉精固氣本草又能開發

鬱結使氣宣通味辛能散溫中進食攝涎聖胃縮小

便腎阻膀胱相表裏益智辛溫固腎監水炒同烏藥等分酒煮山藥糊丸鹽湯下名縮泉丸治嘔吐泄瀉食氣犯胃

冷氣腹痛崩帶泄精瀉精固氣因熱出頤南形如棗核用仁

辛溫養氣補肺益腎和胃醒脾快氣調中通行糖滯



治腹痛痞脹痞滯有傷寒下早裏虛邪入而痞者有食壅痰塞而痞者有脾虛氣弱而痞者

疾蔡子 使君子 益智子 砂仁 卷二二

調中

須分虛實治之不宜常用利氣藥恐變為鼓脹鼓脹噎膈嘔吐上氣咳

嗽赤白瀉痢濕熱積滯客于大腸霍亂轉筋奔豚崩帶祛痰逐冷消食

醒酒止痛安胎氣行則痛止散因喉口齒浮熱化銅鐵骨硬玉好古月

慈入肺得人參益智入脾得黃柏茯苓入腎得赤石脂入大小腸腎道

疏日腎虛氣不歸元用為出嶺南研用得擅香豆

白豆蔻

宜行氣
暖胃



辛熱流行三焦溫煖脾胃三焦利脾胃逆而為肺家

本藥肺主散滯氣消酒積除寒燥濕化食寬膨治脾

虛癯疾感寒腹痛吐逆反胃肺皆火盛及白睛翳膜

白睛屬肺能散肺滯太陽經目背紅筋起目背番州者良研

細用

肉苳蔻

一名肉

菓

燥脾瀉

腸

草薺

一名草

菓

燥濕祛

寒除痰

截瘡



草薺外有皺紋內有斑紋糯米粉裏煨熟用忌鐵

辛溫氣香理脾煖胃下氣調中逐冷祛痰消食解酒

治積冷心腹脹痛挾痰挾食者並宜之中惡吐沫小兒吐逆乳

食不下又能瀉大腸止慮瀉冷痢初起忌用出領似

辛熱香散煖胃健脾破氣開鬱燥濕祛寒除痰化食

治瘡癩寒瘧在常山能截瘧或與知母同用取其一陰一陽治寒熱瘧瘧蓋草薺治大陰獨

勝之寒知母治寒客胃痛散滯氣利膈痰因滯困寒者多効霍亂瀉

痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚解口臭氣酒毒魚肉毒故食料用之過劑

助脾熱耗氣損目 閩產名草薺如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁

如砂仁而辛香氣和瀝廣所產名草薺如訶子皮黑厚而稜峭子粗而

本草綱目

白草薺

肉苳蔻

草薺

卷二

辛臭雖是一物微有不同類裏煨熟取仁用忌鐵

香附一名

荜草根

宣調氣

開鬱

素問中

仍有寒

則氣收

熱則氣

泄各九



性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣

藥通行十二經入脈氣分主一切氣人身以氣為主

衰順則平逆則病絕則死矣經曰怒則氣結恐則氣

下喜則氣緩悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣

耗此七情之氣也以香附為利三焦解六鬱鬱火

君隨症而加升降消補之藥利三焦解六鬱鬱氣鬱

血鬱濕鬱食鬱止諸痛通則治多怒多憂飲痞滿胸腫腹脹飲食積聚霍亂

吐瀉腎氣脚氣癰疽瘡瘍血凝氣滯所致香附一味未服名獨勝丸治

亦宜服之大凡瘡疽喜服香藥行氣通血最忌臭穢不潔觸之康祖左
乳痛癰又臆間生核痛楚半載禱張王襲授以方書注製香附為未每
服二錢米飲下遂愈吐血便血崩中帶下月候不調氣為血配血因氣行經成塊
行後作痛氣血俱虛也色淡亦虛也色紫氣之熱色黑則熱之甚也
經者氣之亂肥人痰多而經明氣不運也香附陰中散氣之藥氣順則

血和暢然須輔以涼血補氣之藥丹溪曰能合虛百病能推陳致新故引血藥至氣分而生血此正陽生陰長之義凡虛百病能推陳致新故諸書皆云益氣行中有補丹溪曰天行健運不怠所以生生無窮即此理耳時珍曰凡人病則氣滯而餒香附為氣分君藥臣以參者佐以甘草治虛怯甚速也去毛用生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎

勞微腰膝重硬浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥或

水炒青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且飲薑汁炒

則化痰飲炒黑又能止血鐵時珍曰得參木則補氣得歸地則補血

脚得沉香則升降諸氣得青精蒼木則總解諸鬱得梔子黃連則清降火熱得扶神則交濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則夾壅消脹得紫蘇葱白則發汗散邪得三稜莪朮則磨積得艾葉則治血氣煖子宮乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行則鬱解故服之尤効非宜于婦人不宜于男子也李士材曰乃治標之劑惟氣實血虛者宜之不然恐損氣而燥血愈致其疾矣世流泥于女科仙藥之一語

惜未有發明及此者

木香
官行氣



辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝

氣和脾氣怒則肝氣上肺氣調則金能制木而肝平木不尅土而肺和治一切氣

痛九腫心痛痛屬胃脘曰寒痛熱痛氣痛血氣濕痛痰痛食痛虵痛悸痛益君心不易受邪

真心痛者手足冷過腕節朝發夕死嘔逆反胃霍亂瀉痢後重同檳榔用劉涓子曰痢疾行血則膿血自愈調氣則

後重自除癰閉痰壅氣結瘰癧塊腫毒蠱毒衝脈為病氣逆裏急殺鬼物

禦瘴霧去夜臭實大腸消食安胎胎氣逆則胎不安過癘損真氣丹溪口味辛氣升若陰火衝上

者反助火邪當用黃柏知母少以木香佐之王好古曰本草主氣劣氣不足補也通壅導氣破也安胎健脾胃補也除痰癖癥瘕破也

此注燒曰與補藥為佐則補與瀉藥為君則瀉時珍曰諸氣贖鬱皆屬于肺上焦氣滯用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬于肺中焦氣滯用

之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則癥閉肝氣鬱則為痛下焦氣滯用之者塞者通之也

如結骨味苦粘音者良名青木香今所用者皆廣木香土木香摩外用東垣用黃連

本草綱目

卷二

霍香
宜去惡
氣

茴香
古作
藿香
燥補腎
命門寒
病

製亦有蒸用麵裹煨用者畏用實畏火



辛甘微温入手足太陰肺快氣和中開胃止嘔胃弱
而嘔者忌用去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛
有寒上焦熱能理脾胃之氣古方有霍香正出

交廣方莖有節葉微似茄葉古惟用葉今枝莖亦用之因葉多偽也



大茴辛熱入腎膀胱煖丹田補命門開胃下食調中
止嘔療小腸冷氣癰疔陰腫加有七種氣血寒水筋
經以厥陰肝脉絡陰器也多因寒濕所乞濕脚氣多
致亦有挾虛者當加參木子温散藥中

食損自發瘡小茴辛平理氣開胃亦治寒疝食粒宜之 大如麥粒輕
而有細稜者名大茴出寧夏他處小者名小茴自番舶來實入辦者名

本草綱目卷之... 木香 藿香 茴香

甘松香

八角茴香炒黃用得酒長得鹽則入腎發腎邪故治陰疝受病于肝見症于腎大小
苗各一兩為禾猪脬一箇
連尿入藥酒煮爛為丸服

甘松香

醒脾
宣理氣



甘温芳香理諸氣開脾鬱治腹卒滿痛風疝齒齲脚
膝氣浮煎湯淋洗出凉州及黔蜀葉如茅根根繁密用根

山柰

宣温中
辟惡



辛温煖中辟惡治心腹冷痛寒濕霍亂風虫牙痛
生廣中根葉皆如生薑入合諸香用

良薑

宣燥煖
胃散寒



辛熱煖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛凡心口一點痛俗言心氣痛非也乃胃脘有滯或有虫及因怒因寒而起以良薑酒洗七次香附醋洗七次焙研因寒者薑二錢附

一錢因怒者附一錢薑一錢寒怒兼者每錢半米飲加薑汁一匙鹽霍
少許服初梁纒患心脾痛喪神授此方二味等分服後入各炒分用霍

亂瀉痢吐惡噎膈瘧瘧冷癖肺胃熱者忌之 出嶺南高州子名紅薑

葶藶一作

撥

燥除胃

冷散浮

熱

烟草

宜行氣

辟寒

葶藶散寒醒脾燥濕消食解酒東垣脾胃藥中常用之並東壁土炒用



辛熱除胃冷温中下氣消食祛痰治水瀉氣痢牛乳煎服

虛冷腸鳴亦入大腸經冷痰惡心嘔吐酸水疔癰陰疝辛

散陽明之浮熱治頭痛偏頭痛者口含温水隨左牙

痛寒痛宜乾薑葶藶辛細熱痛宜石膏牙疳風鼻淵多服泄其氣動脾

肺之火損目出南番嶺南亦有類樵子而長青色去挺用頭醋浸刮

淨皮粟免傷入肺



辛温有毒治風寒濕痺滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入

口不循常度頃刻而周一身令人通體俱快醒能使

醉醉能使醒飢能使飽飽能使飢人以代酒代茗終

甘松香 山柰 良薑 葶藶 烟草 卷之三

身不厭故一名然氣薰灼耗血損年人自不覺耳聞塵者佳
烟筒

能解蛇毒

金銀花

瀉熱解青



甘寒八肺散熱解毒是解毒補虛凡物甘療風養血

止渴丹煖日癰疽安後發渴黃者六一湯吞忍治癰

瘰癧楊梅惡瘡腸澀血痢五種尸疰 變冬不凋一名忍冬又名左

花菁荷功花香尤佳釀酒代茶熬膏並忍冬酒治癰疽發皆一切惡

不及生者力速忍冬五兩甘草二兩水二腕煎至一碗再入酒一碗畧
 煎分三服一月一夜吃盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍
 冬丸照前分兩酒煮晒乾同甘草為末以所煮餘酒打糊為
 丸陳藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調常服能稀痘

蒲公英

一名黃花地丁



甘平花黃屬土八太陰陽明脾胃化熱毒解食毒治腫

核痔治乳癰忍冬煎入少酒服搗敷亦良疔毒亦為

本草綱目

卷二

瀉熱解

通淋妙品 諸家不言治 淋試之甚驗 擦牙烏髻髮 瑞竹堂有還少丹方取其通 白汁

塗惡刺 凡蠅蚋諸虫盛夏孕育游諸物上必遺精汁豈久則有毒夫手 觸之成疾名狐尿刺 滲痛不眠百療難效取汁厚塗即愈于金

方極言 共功 葉如蒿 莖花如單瓣菊花 四時有花 花罷飛絮 斷之葉中有

白汁 鄒方升曰一莖兩花高尺許者掘下數尺根大 如拳旁有人形堪抱搗汁酒服治喝噎加神

紫花地

辛苦而寒 治癰疽發背疔腫癩無名腫毒 葉如

丁

柳而細 夏開紫花 結角生平地者起莖生溝壑者起

瀉熱解

蔓

杜牛膝

甘寒微毒 能破血 一婦產後口渴氣喘而赤有班大 便泄小便秘用行血利水藥不効

一名天

用牛膝濃煎膏飲下 能止血吐痰除熱解毒 治

一名地

乳蛾喉痺砂淋血淋 良方云濃煎加小兒牙關緊閉急慢驚風 不省入

金銀花 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝 卷二



瀉熱吐
痰破血
解毒

鶴虱
瀉殺虫

山豈根
瀉熱解
毒

本草綱目

汁人好酒灌之即吐
以醋拌渣傳頌下

重蟹毒

根白如短牛膝地黃為使

煎湯洗厚渣

毒患處良

服汁吐瘡痰

驚風服之亦痰

漱汁止牙痛搗之傳蛇



豈經受木凋

苦辛有小毒殺五臟虫治虵蝮腹痛

肥肉汁
調未服

沈存中筆記云是杜牛膝子

別是一種最

粘人衣有狐氣炒熱則香

苦寒瀉心火以促金氣去肺大腸之風熱

心火降則不灼肺而

金清肺則大腸相表裏
肺金清則大腸亦清

消腫止痛治喉乾喉風齧腫

齒痛

含之

喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解藥諸毒

傳忤瘡蛇狗蜘蛛傷瘰人馬急黃

血熱極

苗蔓如

卷二

牛蒡子

一名鼠

一名子

一名惡


實
瀉熱解

山慈菺

瀉熱解

漏蘆

瀉熱解



霜拭去用根苦寒竹刀刮淨絞汁密和服治中風汗出乃愈湯和猪脂貼瘡腫及反花瘡



辛平潤肺解熱散結除風利咽膈理痰嗽消斑疹利

二便行十二經散諸腫瘡癆之毒利腰膝凝滯之氣

性冷而滑利痘症 實如蒲菊而褐色酒拌蒸待有

虛寒泄瀉者忌服

如反出 如花狀

甘微辛有小毒功最清熱散結治癰瘡疔腫癰癧結

核醋磨 解毒毒蟲毒蛇鼠狂犬傷 根與慈菺小蒜

相類去毛效用 玉樞丹中用之廣筆記云出處州遂

鹹軟堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解

毒通經下乳排膿止血生肌殺蟲治遺精尿血癰疽

天五育草

鵝風山慈菺 牛蒡子 山慈菺漏蘆

卷二二

發背古方以漏蘆湯為稱首

及預解時行痘疹毒

取其寒勝熱又能入陽明故也

出箇中苦茹

油麻枯黑如漆者真甘草拌蒸連翹為使

貫衆

瀉熱解毒



味苦微寒有毒而能解邪熱之毒治崩中帶下產後

血氣脹痛破癥瘕發斑痘王海藏快化骨硬能軟殺

三虫根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳

結砂制永解毒軟堅

以此浸水缸中月飲其水能辟時疾

苦寒有毒能瀉實火降則血散腫消而痰結自解

故能消心脾老血行大陰厥陰之積痰肺脾治喉痺

咽痛為要藥搗汁醋和喻之引涎下治結核癭疝便



射干 瀉火解毒散血消痰

毒瘡母

驚甲煎九治瘡母用之皆取其降厥陰相火也

通經開利大腸鎮肝明目

扁竹花根

也葉橫鋪如鳥羽及扇
故一名鳥扇鳥扇

汁水浸一日箆竹葉煮半日用

續隨子

一名于

金子

寫行水

破血解

毒

馬蘭子

一名蠡

實

瀉濕熱

解毒

蓖麻子

瀉通竅



莖葉相似主療亦相似長干
利水用之得法皆要藥也



辛溫有毒行水破血治癥瘕飲冷氣脹滿蠱毒鬼

疰利大小腸下惡滯物塗疥癬瘡三樞丹用之治百

毒之功 去殼取色白者壓去油用時珍曰續隨子

甘平治寒疝喉痺癰瘡婦人血氣煩悶血運崩

帶利大小腸久服令人瀉 叢生葉似薤而長厚結

角子如麻大赤色有稜炒用治疝用醋拌根葉同功

辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治偏風

不遂喎邪 搗餅左貼右 口噤鼻歪耳聾 搗爛綿裹

續隨子 馬蘭子 蓖麻子

拔毒出
有形滯

白頭翁
瀉熱涼
血

本草備要

痺舌脹油作熱能利水氣治水癰浮腫研服當下青黃水能出有形滯

物治針刺八肉搗取傷處頻看刺出竹木骨硬兩研勻以一稔置舌根

吟燕自胞胎不下蓖麻一粒巴豆一粒麝香一分貼臍中併足心能道

膿拔毒傳癩懸瘡外用屢奏奇功鵝鳩油能引藥氣入內蓖麻油然

有毒熱氣味頗近巴豆內服不可輕率去皮黃連水浸每晨用浸水吞

形如牛蟬黃褐有斑鹽水煮去皮研或用油忌鐵食薑麻一生不得

苦堅腎寒涼血八陽明目分腸治熱毒血痢仲景

痢有白頭翁易合黃連黃柏秦皮東垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之溫

瘧寒熱齒痛骨痛腎主齒骨鼻衄禿瘡癩疔瘰癧血



痔偏墜場傳明目消疣惠處有風反靜無風則搖近根處有茸得酒良

王瓜
土即

瓜根
瀉熱利
水行血

王不留

行

通行血

冬葵子

滑腸利

敷



治畧似栝蒌傷寒發斑用王
瓜搗汁和伏龍肝末服甚効



木刺孕婦忌之



苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴搗汁飲便數帶

下月閉瘀血利大小腸排膿消腫下乳通乳藥多用之單服亦可

墮胎 根如栝蒌之小者味如山藥根子通用經疏曰主

甘苦而平其性行而不佳能走血分通血脈乃陽明

衝任之藥陽明多氣多血除風去痺止血定痛通經利便下

乳催生俗云穿山甲王不留婦人服之乳長流治金瘡止血散血癢血出竹

花如鈴鐺真如燈籠子殼五稜取苗子蒸漿水浸用

甘寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脈行津液利二便

消水腫用榆皮等分煎服通關格下乳滑胎 秋葵復種經

白頭翁 王瓜 王不留行 冬葵子 卷二美

冬至春作子者名冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪入藥 蜀葵花
 赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋關格皆
 取其寒潤滑利之功也

白鮮皮

濕 通祛風



氣寒善行味苦性燥行水故燥 八脾胃除濕熱兼入膀胱
 小腸行水道通關節利九竅為諸黃風痺之要藥一
 白鮮皮湯治產後風時珍日世醫止施之瘡科淺矣 兼治風瘡疥癬女子陰中
 腫痛濕熱乘虛客腎與膀胱所致 根黃白而心實取皮用惡系

蝶蛸桔梗茯苓草薺



通祛風 濕補下

甘苦性平八足陽明厥陰肝胃祛風去濕以固下焦
 主肉屬濕厥補肝虛去風堅筋骨 益精明
 陰王筋屬風風濕去則

焦

治風寒濕痺腰痛久冷關節老血膀胱宿水陰痿矢溺疼痛遺濁痔瘡

惡瘡 諸病皆陽明濕熱流入下焦草薺能除濁分清占与有車薺分清

方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾必因大腸秘熱不通水液

只就小腸大腸愈加乾渴甚則身熱心躁思水即重症也此疾本因貪

酒色或過食辛熱穢膩之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便

時作痛也此便數而痛與淋症瀉而病不同宜用草薺一兩鹽水炒為

末每服二三錢使水道朝人大腸仍以葱湯

頻洗殺道令氣得通則便數及痛自滅也 **有黃白二種黃長鞭音**

白虛軟者畏黃以為畏大黃柴胡前胡皂莢 時珍曰草薺莢莢

土茯苓形不同而

主治不甚相遠豈一類數種平草
薺根細長淺白莢莢根作塊亦黃

土茯苓

通祛濕
熱補脾

胃



甘淡而平陽明主藥 胃大腸 健脾胃祛風濕脾胃健則

營衛從風濕除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨拘

攣楊梅瘡毒 楊梅瘡古方不載明正德間起于嶺表

其症多屬陽明厥陰而兼及他經蓋相

本草綱目

白鮮皮 車薺 土茯苓

卷二十一

火寄于厥陰肌內属于陽明故也醫用輕粉劫劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡即乾愈然毒氣寬入經絡筋骨血液枯槁筋失所養變為拘攣癱漏竟致癆痼土茯苓能制輕粉之毒去陽明濕熱用一兩為君苡仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯

瘰癧瘡腫 濕鬱而為熱管衛不和則生瘡腫經淡能添甘能補患膿

芥者煎湯代茶甚妙

大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種

白者良可煮食亦可生啖

白欬
瀉火散



苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生

肌止痛治癰疽瘡腫面上疱瘡金瘡撲損 箭鏃不出者同丹皮

或半夏為末酒服 飲瘡方多用之 故名每與茶凍耳 同黃柏末油調

蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枚同窠皮烏肉白一種赤欬功用

皆高 鄭莫一日能溫瘧而痢腸風痔瘻赤白帶下

預知子

補勞瀉

熱

旱蓮草

一名鯉

腸又名

金陵草

劉寄奴

草

瀉破血

止血



苦寒補五勞七傷治瘵癖氣塊天行溫疾蛇虫咬毒

殺虫瘵蟲殺衣領中凡遇蟲毒則聞其聲而預知之故耳利便催生 筋生

子如皂莢褐色光潤出蜀中云亦難得

甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏髭于金云當及時多收其效甚速經疏云性

苗如旋覆實似蓮房斷之

有汁須臾而黑熬膏良

苦溫破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐利

一莖直上葉尖長糙澁花白莖黃如小菊花有白

絮如苦蕒絮子細長亦似苦蕒子莖葉花子皆可用

劉裕小字寄奴微時會射一蛇明目見童子林中搗藥問之答曰吾王為劉寄奴所傷合藥敷之裕曰王何不殺之童曰寄奴王者不可殺也

本草請要草

白欬預知子旱蓮草劉寄奴草

卷二

此之不見乃收葉回
每遇金瘡傳之立愈

馬鞭草


瀉破血
消脹殺

虫



穀精草

輕明目



青箱子

一名草
大明



精者熟食之
或作丸茶下

味苦微寒破血通經殺虫消脹治氣血癥瘕癰瘡陰

腫搗陰墟陌甚多方莖葉似益母對生夏秋開細紫

花穗如車前草類蓬蒿而細根白而小用苗葉

辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥陰肝明目退翳之功

在菊花之上亦治喉癰齒痛陽明風熱收穀後荒

田中生葉似嫩秧花如目星小兒雀盲者搗羊用一
具不洗竹刀割開八穀

味苦微寒入厥陰祛風熱鎮肝明目治青盲障翳

再疥惡瘡瞳子散大者能動
陽火類雜冠而穗尖

目 高用明

决明子

瀉肝明目

宜温中 蓼實

馬勃 輕解熱 外用傳

長



甘苦鹹平入肝經除風祛治一切目疾故有决名之

名又曰益腎精 瞳子神光屬腎曰華日明 目甚干黑豆作枕治頭風 狀如馬

蹄俗呼馬蹄英明搗碎煎慈天麻仁

辛温温中明目耐風寒下水氣 時珍曰古人種蓼實 蔬收子入藥今惟酒

麴用其汗耳以香 有香蓼青蓼紫蓼赤蓼木蓼水

蓼馬蓼

辛平輕虛清肺解熱 東垣普濟消 散血止嗽治喉痺

咽痛 吹喉中良或加白礬 鼻衄失音外用傳諸瘡良

生濕地朽木上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉出取

本草綱目

鳥 章 藜 精 草 青 雜 子 决 明 子 蓼 實 馬 勃 太 驚 子 六 二 五

粉用



木鼈芋

瀉熱外
用治瘡

苦温微甘有小毒利大腸

瀉痢疔積癰癤瘡痔乳

癰蛙毒消腫追毒生肌除

黑音早

疔外科

核扁

如鼈綠色揀去油者能毒狗

增訂本草備要目錄

三卷 木部 八十一品

茯苓皮白赤 茯神心木 琥珀 松節 柏子仁 側柏葉 肉桂桂心

桂枝 枸杞子葉 地骨皮 山茱萸 酸棗仁 杜仲 女貞子

楮實皮 桑白皮桑子 桑椹 桑火 桑葉 桑寄生 厚子 獐 黃柏

枳實實 厚朴 檳榔 大腹皮 槐實槐花 苦楝子 蔓荊子

石南葉 辛夷 郁李仁 金櫻子高 訶子 烏藥 五加皮

椿樗白皮 榆白皮 秦皮 海桐皮 蕤仁 密蒙花 芙蓉

山茶 木槿 杉木 烏白朮 皂角刺 肥皂 櫻櫚

茶 吳茱萸 川椒椒目 胡椒畢澄 蘇木 沉香 檀香

紫檀 降真香 丁香 乳香 沒藥 楓脂香 冰片

檀腦 蘇合香 血竭 呵魏 蘆薈 胡桐淚木燕黃

沒石子 衛茅 漆 巴豆霜油 大風子 荆瀝 竹瀝笋生

竹葉 竹茹 天竹黃 雷丸 水楊柳

菓部 三十一品 附虫部水蛭虫二品

大棗 桃仁桃花水蛭 桃葉 虫 杏仁 烏梅鹽梅 栗 陳皮橘核 橘葉

青皮 柿乾霜霜 蒂蒂 木瓜 山楂 梨 枇杷葉 橄欖

白菓 石榴皮 枳椇子 胡桃皮青殼 龍眼 荔枝核殼 梃

松子 落花生 蓮石蓮 蓮蕊 藕節 藕粉 荷葉 茨實

甘蔗白糖 沙糖 薺 蓰

增訂本草備要卷之三

裕文堂藏板

休寧汪昂訂著著輯

男汪端其兩

弟汪桓殿武參訂

姪汪惟寵子錫

同鄭會慶贊襄同訂

姪壻仇雲天一同較

木部

茯苓

補心脾
通行水



甘溫益脾助陽淡滲利竅除濕色白入肺瀉熱而下

通膀胱能通心氣子腎使熱從小便出然必其上源而後能下降利水也○寧

心益氣調營理衛定魄安魂營主血衛主氣治憂患

驚悸心肝心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾口為脾瘵舌為心咳逆肺嘔

噦胃膈中痰水腫淋瀝泄瀉遺精益心腎若虛寒遺溺泄精者

本草備要木

茯苓

卷三一

多拌良

補神 補心

忌用茯苓 小便結者能通多者能止濕除則生津止渴濕熱去退熱安


胎 松根靈氣結成以大塊堅白者良去皮乳拌蒸白者入肺膀胱氣

分赤者入心小腸氣分時珍曰白入補心脾白勝利濕熱赤勝惡白飲

畏地榆秦艽龜甲雄黃息醋 皮專能行水治水腫膚脹以皮行皮之

之凡腫而煩渴便秘溺赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲不煩渴大便糖小

硬數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便



主治畧同茯苓白茯苓入脾腎之用多茯神八心之
用多開心益智安魂養神療風眩心虛健忘多志
節茯苓抱根生者昂按以其抱心去皮及中木用

茯神心木名黃松節療諸筋攣縮偏風喘邪心掣健忘心木一兩乳香

名松節散每服二錢木瓜湯下治一切筋攣疼痛乳香能伸筋木瓜能舒筋也

一錢石礬炒研

琥珀
通行水
散瘀安
神



其平以脂入土而成膏故能通塞以寧心定魂魄

癩邪從鎮墜藥則安心神色赤入手少陰足厥陰血分心肝故能

消瘀血破癥瘕生肌肉合金瘡從辛溫藥則破血生肌其味甘

淡上行能使肺氣下降而通膀胱經曰飲食入胃游溢精氣上輸于肺脾氣散精上歸于肺通調水道下輸

膀胱凡滲藥皆上行而後下降故能治五淋利小便燥脾土從淡滲藥則利竅行水然

不利者反致燥急之苦又能明目磨翳松脂入土年日久結成或云楓脂結成以

摩熱拾芥者真市人多煮雞子及青魚枕傷之摩阿亦能拾芥宜辨用柏子仁末入瓦鍋同煮半

日搗末用

松節

燥濕去

風



松之骨也堅勁不凋故取其苦溫之性以治骨節間

之風濕丹溪曰能燥杵碎浸酒史國公藥酒中用之松脂

大直青木

茯神 琥珀 松節

卷三二

苦甘性燥祛風去濕化毒殺虫生肌止痛養生家鍊之脈食今熬膏多

用之鬪齒有孔松脂經

松毛釀酒煮汁代水亦治風痺脚氣

柏子仁

補心脾 潤肝腎



辛甘而潤其氣清香能透心腎而悅脾昂按凡補脾藥而香能舒脾燥脾藥中兼用最良養心氣潤腎燥助脾滋肝好古曰肝經氣

分藥益智寧神養心聰耳明目甘益血香通竅益血止汗心肝血

除風濕愈驚癇液澤皮膚辟鬼魅 炒研去油油透者勿用畏菊花

側柏葉

補陰涼 血



苦澀微寒本草養陰滋肺而燥土最清血分為補陰

要藥止吐衄崩淋腸風尿血痢一切血症去冷風

濕脾慙節風痛肢節太痛晝靜夜劇名白塗湯火傷

搗爛水調塗 生肌殺虫灰蠟瘡汁烏髭髮 取側者丹溪曰多得月令或

炒或生用桂牡蠣為使惡菊茱宜酒萬木皆向陽柏獨四指受金之正氣堅勁不凋多壽之木故元且飲

椒柏酒
以辟邪

丙桂

大燥補
腎命火



辛甘大熱氣厚純陽入肝腎血分平肝補命門相火

之不足兩腎中間先天祖氣乃真火也人非此火不能有生無此真陽之火則無以蒸糟粕而化

精微脾胃衰敗氣盡而亡矣益陽消陰治痼冷沉寒能發汗疏通

血脈宣導百藥辛則善散熱則通行去營衛風寒表虛自汗陽虛腹中冷痛欬逆結

氣逆亦由氣不歸元桂能引火歸宿丹田木得桂而枯削桂釘木根其木即死又能抑肝風而扶脾

土肝木盛則剋土辛散肝風甘益脾土從治目赤腫痛以熱攻熱名曰從治及脾虛惡食命火不足濕盛

泄瀉土為木剋不能防木古行水方中亦多用桂如五苓散滋腎丸之類補勞明目通經墮胎辛熱能動血故也

出嶺南桂州者良州因桂名色紫肉厚味辛甘者為肉桂入肝腎命門去粗皮

本草綱目卷之... 柏子仁 側柏葉 肉桂 卷三三

用其毒在皮去裏外皮當心者為桂心入枝上嫩皮為桂枝及手足

人參甘草麥冬良息生葱石脂本草有茵桂筒桂性桂板桂之殊今用者亦空分別惟以肉厚氣香者良

桂心

燥補陽
活血



四悸五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪
乘千手少陰之絡邪正相激故冷心痛

桂枝

輕解肌
調營衛



苦入心辛走血能引血化汗化濃內托癰疽瘡瘡同

香治痘瘡灰塌益精明目消瘀生肌補勞傷煖腰膝續筋骨

治風痺癥瘕噎膈腹滿腹內冷痛九種心痛一虫二

心甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通

脈發汗解肌能利肺氣經曰治傷風頭痛無汗中風

自汗有汗能止中猶傷也古文通用自汗膈陽虛桂枝為君芍藥甘草為佐加薑薑名桂枝湯能和

營實調和營衛使邪從汗出而汗自止亦治手足痛風脇風痛風有風痰風濕濕

痰瘀血氣虛血虛之異桂枝用作引經脇風屬肝桂能平肝東垣曰桂
 枝橫行手臂以其為枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則
 發熱肉桂下行而補腎王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發
 汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又
 能閉汗也二義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營弱衛
 強陰虛陽必湊之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪
 無所容遂自汗而解非苦麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者
 以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也○亦惟有
 汗者宜之若傷寒無汗則當以發汗為去而不獨調其營衛矣故曰無
 汗不得服桂枝有汗不得服麻黃也傷寒例曰桂枝下咽陽盛則斃承
 氣入胃陰
 盛則亡

平補而
 潤
枸杞子



甘平

本草

潤肺清肝滋腎益氣生精助陽補虛勞強
 苦寒

筋骨

肝主筋
腎主骨

去風明目

目為肝竅
瞳子屬腎

利大小腸治噎乾

消渴

火能補精壯陽然氣味甘寒而性潤仍是補水
島按吉諺有云出家千里勿食枸杞其色赤屬

之藥所以能滋腎益
 肝明目而治消渴也

南方樹高數尺北方並是大樹以甘州所產紅

本草雷斅木

桂心

桂枝

枸杞子

卷三四

潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮見下葉名天精草苦甘而涼清上焦

心肺客熱代茶止消渴時珍曰皆三焦氣分之藥

地骨皮

瀉熱涼血補正氣



甘淡而寒降肺中伏火瀉肺腎虛熱能涼血而補正

氣故內治五內邪熱熱淫于內治以甘寒地骨一斤生地五斤酒煮服治帶下吐

血尿血搗鮮汁服咳嗽消渴清肺外治肌熱虛汗上除頭風

痛能除風者肝腎同治也肝有熱則自生風與外感之風不同熱退則風自息中平胸脇痛清肝下利大小腸


療在表無定之風邪傳戶有汗之骨蒸李東垣曰地為陰骨為裏皮為表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包絡火

絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外潮人實不知病或風寒散而未盡作潮往來非柴高所能治用地骨皮走表又走裏之藥消其浮游之邪服之未有不愈者特表明之時珍曰枸杞地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以苓連降上焦知柏降下焦致傷元氣惜哉予嘗以青蒿佐地骨退熱果有殊功

甘草水浸一宿用
腸滑者忌枸杞子中寒者忌地骨皮掘鮮者同鮮小煎煎濃汁浸下疳甚効

山茱萸

補肝腎
瀦精氣



辛温酸瀦補腎温肝人二經
固精秘氣強陰助陽安

五藏通九竅
聖濟云如何瀦劑以通九竅經疏云精氣充則九竅通利昂按山茱萸通九竅古今擬之得經疏一言而意旨豁然始漢前人識見深遠不易測識多有如此類者即經疏一語而擴充之

實可發醫人之畫悟也
暖腰膝縮小便治風寒濕痺
温肝故能逐風
鼻塞目黃
肝虛邪客則目黃

耳鳴耳聾
腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功王好古曰滑則氣脫滴劑所以收之仲景八味丸用之爲君其性味可知矣昂按別錄甄權皆云能發汗恐屬誤文酸劑斂瀦何以反發仲景亦安取發汗之藥以爲君乎李士材曰酸屬東方而功多在北方者乙癸同源也

去核用核能滑精惡積梗防風防已

酸棗仁

補而潤
斂汗寧



甘酸而潤
凡仁皆潤
專補肝胆炒熟酸温而香亦能醒脾

故歸脾
湯用之助陰氣堅筋骨除煩止渴
斂陰斂汗經疏曰生津愈汗凡服固

本草綱目

地骨皮 山茱萸 酸棗仁

杜仲
補腰膝



表藥而汗不止者用桑仁炒研同生地白芍五寧心心君易動皆由胆味麥冬竹葉龍眼肉煎服多効汗為心液故也怯所致經曰凡十
 一官皆取一官皆取療胆虛不眠温胆湯中或加用之肝虛則胆亦虛肝不藏魂故不寐血不歸脾臥亦不安金匱治虛勞虛煩
 不眠用酸棗仁湯更仁二升甘草一兩炙知母茯苓芎藭各二兩漆師
 加生薑二兩此補肝之劑經曰臥則血歸于肝蘇頌日一方加桂一兩
 二方桑仁並生用治不得交交疸酸收瀉生用酸平療胆熱好眠時
 眠豈得以煮過便為熟乎香舒脾日今人專以為心家藥殊不知此禮昂投胆熱必有心煩日苦之症何以
 反能好眠乎温胆湯治不眠用二陳加竹茹枳實二味皆涼藥乃以涼
 肺胃之熱非以温胆經之寒也其以温胆名湯者以胆炒研用惡防已
 欲不寒不燥當温為候耳胆熱如眠四字不能無疑也

甘温能補微辛能潤色紫入肝經氣分潤肝燥補肝

虛子能令母實故兼補腎肝充則筋健腎充則骨強

能使筋骨相着皮中有絲有筋骨相着之象治腰膝酸痛經曰腰

府轉移不能腎將德矣膝昔筋之府屈伸不能筋將德矣一少年新要
 得脚軟痛且痛甚作脚氣治不効孫林曰此腎虛也用杜仲一兩半酒

半水煎服六日全愈按腰痛不已者屬腎虛痛有定處屬死血往來走痛屬痰腰痛身重過寒則發屬寒濕或痛或止屬濕熱而其原多木于

腎虛以腰者陰下濕小使餘懨胎漏懷孕胎逐慣墜胎者受孕一兩腎之府也

煎湯浸透炒斷絲續斷二兩酒浸山藥六兩為糊丸或棗肉為丸米飲下二藥大補腎氣托佳胎元則胎不墜

者良去粗皮剉或酥酒炙蜜炙監酒炒薑汁炒斷絲用惡黑參

女貞子

平補肝腎



甘苦而平少陰之精隆冬不凋益肝腎安五藏強腰


膝明耳目烏髮補風虛除百病女貞酒蒸晒乾二

早蓮草十兩蜜丸治虛損百病如四月即搗桑椹汁七月即搗旱蓮汁和藥不必用蜜時珍曰女貞上品妙藥古方罕用何哉

冬青本草作二種實一物也冬採佳酒蒸用近人放蟪出干此樹

楮實

平補助陽



甘寒助陽氣起陰痿補虛勞壯筋骨明目充飢時珍

錄大明皆云楮實大補益而修真秘書又云久服令人骨痠濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯豈非軟骨之

本草通串

杜仲 女貞子 楮實

徵平本草發明甚言其功而云
今補藥中罕用惜未之察耳
取子浸去浮者酒煮用皮善行水治

水腫氣滿
皮可為紙楮汁和白及飛
延調樹接紙永不解脫

桑白皮

瀉肺行
水十劑
作燥以
其行水



甘辛而寒瀉肺火

羅謙甫曰是瀉肺中火邪非瀉肺
氣也火與元氣不兩立火去則氣

得安矣故本經又云益氣東垣曰甘固元氣之不足
而補虛辛瀉肺氣之有餘而止嗽然性不純良不宜
多用錢之瀉白散桑皮地骨各一兩甘草五錢每服
二錢入粳米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能瀉火從

小便出甘草瀉火緩中粳米清肺養血乃瀉肺諸方之準繩也一婦鼻
久不問香臭後因他疾纏仲醇為處方每服桑皮至七八錢服久而鼻

塞忽利二便散瘀血下氣行水止嗽清痰

發明曰肺中有水則生痰而
作嗽除水氣正所以瀉火邪

實則瀉其子也火退氣寧則補益在其中矣
治肺熱喘滿嘔血熱渴水
十劑曰燥可去濕桑白皮赤小豆之類是也

腫臚脹肺氣虛及風寒作嗽者慎用為線可縫金瘡
刮去外皮取日

用如恐其瀉氣
用密衣之
續斷桂心為使息鐵
桑乃箕星之精其木利關節養

津液行水 錄驗方枝皮細去 祛風 桑枝一升細剉炒香水三升熬至二升

其火拔引毒氣祛風寒濕痺 凡癰疽不起瘀肉不腐癩癧流注臃頑惡瘡不愈用桑木片扎成小把燃火吹息致

思處內服 煎補藥 諸膏宜用桑柴內亦宜桑枝攪 桑椹甘凉色黑 補托藥良

入腎而補水利五藏關節安魂鎮神聰耳明目生津止渴 煉膏治服金石藥熱渴

利水消腫解酒烏髭白乾為末置丸取極丸者瀝汁熬膏入蜜煉稠

點湯和酒並妙入燒酒經年愈佳 每日湯點服亦治癩癧名文武膏以椹名文武實也 桑葉甘

寒手足陽明之藥 大陽 涼血 刀斧傷者為未乾貼之妙 燥濕去風明目 採經霜者煎湯洗眼去風

淚洗手足去風癩桑葉黑脂麻等分蜜丸名椹桑丸除濕去風烏須明

自以五月五日六月六日立冬日採者佳一者八年八十四夜能細書

詢之云得一奇方每年九月二十三日桑葉洗目一矣永絕昏暗 未服止盜汗 嚴州有僧每就枕汗出

十年不能療監寺教採帶露桑葉精 乾為末空心米飲下一兩數日而愈 代茶止消渴

桑寄生

補筋骨
散風濕



苦堅腎助筋骨而固齒長髮齒者骨之餘髮者血之餘其益血止

崩漏而下乳安胎三痛皆由血虛外科散瘡瘍道風濕他

樹多寄生以桑上採者為真雜樹恐反有害葉並

用炭

梔子

瀉心肺
三焦之
火



苦寒輕飄象肺色赤入心瀉心肺之邪熱使之屈曲

下行從小便出海藏曰或用為利小便藥非利小便乃肺清則化行而膀胱津液之猗得

此氣化而三焦之鬱火以解熱厥厥有寒熱二症心痛以平

丹溪曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜當溫散久則鬱而成熱

若用溫劑不助痛添病平古方多用梔子為君熱藥為之權導則邪易

伏此病雖久日不食不死吐衄血淋血痢之病以息最清胃院之血炒

若痛止恣食病必再作也吐衄血淋血痢之病以息最清胃院之血炒

氣逆為
火順氣

本草匯曰治實火之血順氣為先氣行則血自歸以治虛寒之血養正

即是降

治心煩懊憹不眠

仲景用梔子鼓湯王好古曰煩者氣也燥者血也故用梔子治肺煩香豉治腎燥亦用作吐藥以邪在上

焦吐之則邪散經所謂其高者因而越之也按尼鼓湯吐虛煩客熱瓜蒂散吐痰食宿寒

五黃古方多用五淋亡血

津枯口渴目赤紫癩白癩蛇蝮瘡瘍


皮膚肺所主故也

生用瀉火炒黑止血

薑汁炒止煩嘔內熱用仁表熱用皮

猪苓

通行木



苦泄滯淡利竅甘助陽入膀胱腎經升而能降開腠發汗利便行水與茯苓同而不補治傷寒溫疫大熱

由暑暑必兼濕經白然耗津液多服損腎昏目

腎水不足則目昏仲景夏傷于暑秋為痲瘧

白木桂為治水之總劑昂按經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣用肉桂辛熱引入膀胱所以化其氣也除桂名四苓散資生經

曰五苓散能生津液亦通大便曾世榮治驚風亦用五苓散曰茯苓安心神澤瀉導小便小腸利而心氣平木得桂而枯能抑肝而風自止可

二五黃生木

桑寄生

梔子

猪苓

卷三八

謂善用五
苓者矣

多生楓樹下塊如猪屎故名

馬屎日通猪屎日苓
苓即屎也古字通用

肉白而

實者良去皮用

黃蘗

瀉相火
補腎水

與音歌



苦寒微辛沉陰下降瀉膀胱相火

引經藥

補腎水

足堅腎潤燥

發明日非真能補也腎苦燥急食辛以
潤之腎欲堅急苦以堅之也相火退

而腎固則無狂蕩之患矣按腎本屬
水虛則熱矣心本屬火虛則寒矣

除濕清熱療下

焦虛骨蒸勞熱

陰虛生

諸痿癱瘓

熱勝則傷血血不榮筋則莖短而為
拘濕勝則傷筋筋不束骨則弛長而

為痿合蒼木名二妙散清熱利濕為治痿要藥或兼
氣虛脾虛腎虛濕痰死血之不一當嗜血虛症加治

目赤耳鳴渴

便閉黃疸水腫

王善夫病便閉腹堅如石腹裂出水飲食不下治滿利
不便藥遍服不効東垣曰此奉養太過膏梁積熱積傷

腎水致膀胱乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經所謂閉則得不
小便格則吐逆者內終所謂無陰則陽無以化也遂處以北方大苦寒

之劑黃柏知母各一兩酒洗焙研桂一錢為引名滋腎丸每
服二百九少焉前陰如月刺火燒刷出床下成流腫脹遂消水瀉執痼

痔血腸風漏下赤白

皆濕熱為病

諸瘡癩癧頭瘡

研未口瘡

密炒研舍凡日瘡瘡用涼藥不効

殺虫安就久

者乃中氣不足虛火上炎宜用反治之法參木甘草補上之虛乾薑散火之標甚者加附子或喻官桂引火歸元

殺虫安就久

服傷胃尺脉弱者禁用

若虛火上炎服此苦寒之劑有寒中之變時珍曰知母佐黃柏滋陰降火有金水相生之義古

水母以蝦為目

云黃柏無知母猶水母之無蝦也蓋黃柏能制命門膀胱陰中之火知母能清肺金滋腎水之花源丹溪曰君火者人火也心火也可以水滅可以直折黃連之藹可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不

可以水濕制之當從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之按火有虛火實火燥火濕火鬱火相火之異虛火宜補實火宜瀉燥火宜滋潤鬱火宜升發濕火申濕鬱為熱多病附腫經所謂諸腹脹大皆屬於熱諸病附腫皆屬於火是也宜利濕清熱而兼補脾相火寄于肝腎乃龍雷之火非苦寒所能勝宜滋陰養血壯水之主以制陽光又按諸病之中火症為多有本經自病者如忿怒生肝火焦思生心火之類是也有子母相尅者如心火尅肺金肝水尅脾土之類是也有藏府相移者如肺火咳嗽久則移熱于大腸而泄瀉心火煩焦久則移熱于小腸而為淋闕之類是也又有別經相移者有數經合病者當從其重者而治之

川產肉厚色深者良生用降實火蜜炙則不傷胃炒黑能止崩帶酒製

治上蜜製治中鹽製治下又未乳調能塗凍瘡

枳實積

壳

瀉破氣行痰



苦酸微寒其功皆能破氣氣行則痰行喘止痞脹消

脾無積血心下不痞濁氣在上則生腹脹東痛刺息

後重除治胸痺結胸食積五膈痰癖癥結嘔逆咳嗽

水腫脇脹肝鬱瀉痢淋閉痔腫腸風除風去瘧羊散開胃健脾所生畧同

但枳實利胸膈枳壳寬腸胃枳實力猛大小承氣湯皆用之丹溪曰枳實瀉痰能衝撞倒壁枳壳

力緩為少異孕婦及氣虛人忌用按本草壳實皆云明日思之不得其解然目疾方中多用之豈以其破得

氣即能升清氣乎本經又言枳實益氣想亦同此理也故厚朴調中亦

有益氣明目之文王好古曰枳實佐以參米乾薑則益氣佐以硝黃產

牛則破氣此木經所以言益氣而復言消痞也張元素曰枳壳泄肺走大腸多用損胸中至高之氣昔湖陽公主難產方士進瘦胎飲用枳壳四兩甘草三兩五月後日服一錢藻古改以枳木名稟胎九寇宗奭明其不然蓋孕婦全賴血氣以養胎血氣充實胎乃易生彼公主產後

飛門口
也魄門
即川門

厚朴

瀉下氣

散滿

同大黃

枳實即


承氣湯

同橘皮

蒼木即

平胃散

過氣實有餘故可服之若槩施則誤矣時珍曰八九月胎氣盛蘊滯用枳壳蘇梗以順氣胎能無滯則產後無虛也氣弱者大非所宜矣
皮厚而小為枳實殼薄虛大為枳殼陳者良炒用時珍曰殼實上世未分魏晉始分用
潔古東垣始分殼治上實治下海藏始分殼主氣實主血然仲景治上焦胸痺痞滿用枳實諸方治下血痢痔腸秘後重用枳壳則實不獨治下而壳不獨治高也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已



若降能瀉實滿辛溫能散濕滿

王好古曰別錄言厚朴溫中益氣消痰下

氣果泄氣平益氣平蓋與枳實大黃同用則瀉實滿所謂消痰下氣是也與橘皮蒼木同用則除濕滿所謂溫中益氣是也與解利藥同用則治傷寒頭痛與瀉利藥同用則厚腸胃大抵味苦性溫用苦則瀉用瀉則補也按脹滿症多不同清補貴得其宜氣虛宜補氣血虛宜補血食積宜消導痰滯宜行痰挾熱宜清熱濕盛宜利濕寒鬱者散寒怒鬱者行氣畜血者消瘀不宜專用行散藥亦有服生者而脹反甚者以挾食挾血挾熱挾寒不可槩作脾虛氣弱治也

明脾胃調和佐蒼米為平胃散平濕**消痰化食厚腸胃行結水破宿**

血殺藏虫治反胃嘔逆喘咳瀉痢冷痛霍亂誤服脫人元氣孕婦忌之

榛樹皮也肉厚紫潤者良去粗皮薑汁炙或醋炒用乾薑為使惡澤

瀉硝石忌豆犯之動氣

檳榔

瀉氣行水破脹攻堅



苦温破滯辛温散邪瀉胸中至高之氣使之下行性

如鐵石能堅諸藥至于下極攻堅去積消食行痰下

水除風殺虫醒酒治痰癖癥結瘡癰癩痢水腫脚氣

脚氣冲心尤須用之治大小便氣秘裏急後重同木童便薑汁温酒調服

水香能過服則損真氣嶺南多瘴以檳榔代茶其功有四醒能使醉醉利氣能使醒飢能使飽飽能使飢然泄藏氣無瘴之

地忌雞心尖長破之作錦紋者程星海曰陰毛生風世鮮良方以檳榔煎水洗即除又方以心紅擦

好之亦

大腹皮

瀉下氣
通行水

槐實
槐即

瀉風熱
涼大腸
瘻音漏



辛泄肺溫和脾下氣行水通大小腸治水腫脚氣瘡

脹痰膈瘴瘧霍亂氣虛者忌用 子似檳榔腹大形

扁故與檳取皮酒洗黑豈湯再洗煨用鷓鴣多破其

苦寒純陰入肝經氣分疎風熱潤肝燥涼大腸治煩

悶風咳痔血腸風蕪前有血名外痔糞後有血名內

痔瘰瘡內有虫名虫痔大法用槐角地榆生地涼血

荅連厄柏清熱防風秦芃祛風濕芎歸人參和血生

血枳壳寬腸升麻升提治腸風暑陰瘡濕癢明目止淚清肝淚

同不宜專用寒涼須兼補劑收功髮十月上已孫漬牛胆中陰乾百日食後吞一皮虫根皮皆

單子及五子者銅槌追碎牛乳拌蒸槐乃虛槐花苦涼入肝大腸血

分而涼血血涼則治風熱自赤赤白泄痢五痔腸風吐崩諸血舌上無

大宜青皮木

檳榔 大腹皮 槐實

卷三十一

如棗者名血陳者良
蚶炒研搽之

苦楝子

一名金

鈴子

瀉濕熱

治疝殺

虫



根皮濃煎加少麝服
下其虫而湯自止

核用用核則槌碎漿水煮一伏時去肉用茴香為使

苦異有小毒能入肝舒筋能導小腸膀胱之熱因引

心包相火下行通利小便為疝氣要藥亦治傷寒熱

狂熱厥腹痛心痛殺三虫療癩疥夷堅志消渴症有虫耗其津液者取

脾胃虛寒忌之 川產良酒蒸寒因熟用去皮取肉去

夏利子

輕宜散

上部風

熱



辛苦微寒輕浮升散八足太陽陽明厥陰經膀胱脾胃搜

風涼血通利九竅治濕痺拘攣頭痛腦鳴大陽脈絡于腦目

赤齒痛齒雖屬腎為骨之餘而上齦屬足陽明下齦屬手陽明陽明風熱上攻則動搖腫痛頭

面風虛之症明目固齒長髮澤肌 去膜打碎用亦有酒蒸炒用之惡

石膏烏頭



石南葉

宜去風
補腎

辛夷
木即

筆花
宜散上
焦風熱

石南補陰祛風則有之然味辛不熱不助相火亦未聞淫邪方中用石南者別錄思男之說始不可信

辛散風骨堅腎補內傷陰衰利筋骨皮毛為治腎虛

胸弱風痺要藥婦人不可久服合思男時珍曰今人絕不知用蓋

為藥性論有人合陰癆之說也不知此藥能令賢強人或籍此縱欲以致痿弱歸咎于藥良可疵也昂按

閉中者佳灰用

辛溫醇浮八肺胃氣分能助胃中清陽上行通於頭

腦中溫解飢通九竅利關節主治鼻淵鼻塞肺主鼻

于腦則鼻多濁涕而淵風寒客于腦則鼻塞經曰腦咀移熱

涕為涕王米曰胆液不澄則為濁涕如泉不已故曰

鼻淵及頭痛面黑音旱黑班目眩齒痛九竅風熱之病然性走竅氣虛

盛者息服時珍曰肺開竅于鼻揚明胃脉環鼻上行腦為元神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為

本草黃芩 木

苦楝子 真荆子 石南葉 辛夷

郁李仁
潤燥瀉
氣破血

金櫻子
齋精固
腸



之不利吾鄉金正希先生嘗語余曰人之記性皆在腦中小兒善忘者腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡人外見一物必有一形影留于腦中焉思今人每記憶往事必閉目上瞪而思索之此即凝神于腦之意也不經先生道破人皆習焉而不察矣李時珍曰腦為元神之府其于此義殆暗符歟
去外皮毛毛射肺令人咳微炒用芫蕪為使惡石脂畏黃耆薑蒲石膏

辛苦而甘八脾經氣分性降下氣行水破血潤燥治
水腫癰急大腸氣滯閉格不通用酒能入胆治悸目
張不眠一婦因大恐而病愈後日張不與錢乙曰目系內連肝胆恐則氣結胆橫不下郁李潤能
然治標之劑多服滲人津液 去皮尖蜜浸研

散結隨酒入胆結去胆下而目眩矣
酸齋八脾肺腎三經固精秘氣治夢洩遺精和炭實為凡名
水陸丹 泄痢便數丹溪曰經絡隧道以通暢為平和不請答將誰執時珍曰無故而食以恣慾則不可苦精氣不固者服之何害 似榴而小黃

訶子

瀉腸斂
肺瀉氣

赤有刺取半黃

熟削

去刺核用熬膏亦良

筆談云熬膏則甘全失清味

苦以泄氣消痰酸以斂肺降火

市垣曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸

補之訶子苦重泄氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用

瀉以收脫止瀉濕以開胃



調中治冷氣腹脹膈氣嘔逆痰嗽喘急
肺挾痰水或被火傷故宜

開火降則渴止台

方有訶子清音湯然苦多酸少雖瀉腸而泄氣氣虛及嗽痢初起者忌

服同烏梅倍子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人參治肺虛寒嗽得陳

同蛇床五味山茱萸
斷杜仲治虛寒帶下

從番舶來番名訶欬勒嶺南亦有六棱黑色肉

厚者良酒蒸一伏時去核取肉用肉則去核生用清金行氣煨熟温

胃固腸

海魚放涎疑滑船不能行投訶子湯尋化為水其化痰可知

本草黃受木

郁李仁

金櫻子

訶子

卷三十三

烏藥

宣順氣



辛溫香最上八脾肺下通腎經能疏胸腹邪逆之氣

一切病之屬氣者皆可治氣順則風散故用以治中

氣中風厥逆痰壅口禁脉伏身溫為中風身冷為中氣又有痰為中風無痰為中氣局方治此亦

用烏藥順氣散許學士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得中氣之症不可作中風治及膀胱冷氣小便

頻數反胃吐食宿食不消渴痢霍亂女人血凝氣滯小兒吐蛔外如瘡

癩疥癘皆成于血逆理氣亦可治之瘡猶大百病氣虛氣熱者禁用時珍

日四磨湯治七情鬱結上氣喘急者降中兼收瀉中兼補也方用人參烏藥沉香枳椇各濃磨汁七分合煎縮泉丸用同益智等分為丸治虛寒便數者取其通陽明少陰也

根有車轂紋形如連珠者良酒浸之宿用亦有煨研用者

辛順氣而化痰苦堅骨而益精溫祛風而勝濕家肌

膚之瘡血癢筋賢之拘攣腎得其養則妄水去而骨壯肝得其養則邪風去而

五加皮

宣祛風

補壯



五加皮

卷三

訶子
瀉腸斂
肺瀉氣

亦有剝取半黃孰則去刺核用熬膏亦良筆談云熬膏則甘全失滋味



苦以泄氣消痰酸以斂肺降火市道日肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸
補之訶子苦重泄氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用瀉以收脫止瀉溫以開胃

調中治冷氣腹脹膈氣嘔逆痰嗽喘急肺挾痰水或被火傷故宜

苦酸以瀉痢脫肛腸風崩帶皆取其酸瀉開音止渴肺斂則音

開火降則渴止台方有訶子清音湯然苦多酸少雖瀉腸而泄氣氣虛及嗽痢初起者息

良同烏梅倍子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人參治肺虛寒嗽得陳月皮砂仁洽冷氣腹脹佐白米蓮子治虛寒久瀉佐糯皮治腸癖便血

同蛇床五味山茱精斷杜仲治虛寒帶下從番舶來番名訶梨勒嶺南亦有六棱黑色肉

厚者良酒蒸一伏時去核取肉用肉則去核生用清五行氣煨熟溫

胃固腸海魚放涎疑滑船不能行投訶子湯尋化為水其化痰可知

大五青豆木 郁李仁 金嬰子 訶子 六三十三

烏藥

宣順氣



辛溫香最上八脾肺下通腎經能疏胸腹邪逆之氣

一切病之屬氣者皆可治氣順則風散故用以治中

氣中風厥逆痰壅口禁脉伏身溫為中風身冷為中氣又有痰為中風無痰為中氣局方治此亦

用烏藥順氣散許學士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁及膀胱冷氣小便

頻數反胃吐食宿食不消渴痢霍亂女人血凝氣滯小兒蛇蚘外如瘡

癩疥癘皆成于血逆理氣亦可治之瘡猶犬百病氣虛氣熱者禁用時珍

日四磨湯治七情鬱結上氣喘急者降中兼收瀉中兼補也方用人參

烏藥沉香枳櫛各濃磨汁七分合煎縮泉并用同益智等分為丸治虛

寒便數者取其根有車鼓紋形如連珠者良酒浸一宿用亦有煨研用者



五加皮

宣祛風

補壯

辛順氣而化痰苦堅骨而益精溫祛風而勝濕逐肌

風之痰血療筋腎之拍擊腎得其養則妄水去而骨壯肝得其養則邪風去而

筋骨

筋強望緩虛羸五藏節脈緩縱千金方補去五月五日採莖七月七日採葉九月九日採根合為未治五勞陰瘰癧

濕女子陰瘰癧濕生小兒腳弱明目愈瘡醜尤良王綸曰風病飲酒能生痰火惟五加浸酒

益人莖青節白皂赤皮黃根黑土應五車之精芬香五葉者佳遠志為

使惡之參

椿樗白

皮

溻腸燥

昂按樗

皮止瀉

痢終是

瀉齋

昂按此

方仍是



苦燥濕寒勝熱瀝收斂入血分而溻血去肺胃之陳

痰治濕熱為病泄瀉久痢崩帶腸風夢遺便數有斷

下之功痢疾滯氣未盡者勿遽用勉強固滯必變他症去疔蠱樗皮尤良時珍

曰椿皮入血分而性溻樗皮入氣分而性利凡血分受病不足者宜椿皮氣分受病有鬱者宜樗皮乾坤生意治瘡腫下藥用樗皮水研服汁取利是其驗矣寇氏曰一婦年四十餘就飲無度多食魚蟹積毒在臍日夜二三十瀉便與膿血雜下大腸連肛門甚痛用止血痢藥不効用腸風藥益甚益腸風有血無膿也服熱藥腹愈痛血愈下服冷藥注瀉食減服溫平藥則若不知年餘符斃或教服人參散樗皮人參各一兩

天直青身木

烏藥一五加皮 椿樗白皮

卷三十四

作痢疾治

榆白皮 滑利峻

秦皮 澆而補 明目

為未空心温酒或米飲下二錢遂愈

而白主治畧同根東引者良去粗皮或醋炙蜜炙用忌肉麪



查真為椿肌實而赤嫩其苗可茹臭者為樗肌虛

甘滑下降八大小腸膀胱經行經脉利諸壅通二便

滲濕熱滑胎產或胎死腹下服汁可下下有形質着之物治五

淋腫滿備急方棉屑作粥食小夜利差喘嗽不眠嵇康養生論榆令人眠瘵疥

癰瘡消赤腫如乳乳癰汁不出內結成腫名妬乳和陳醋浸調日六七易効十劑曰滑可去着冬蔡子榆白皮之屬是也

有赤白二種去粗皮取白用米皮為麵荒年當糧可食香劑以之調和粘滑勝于膠膝

苦寒色青性澆補肝胆而益腎以能平木能除肝熱故治

目疾洗目赤張翳膜驚癩以其收澆而寒故治崩帶下痢仲景

白頭翁湯用之以其澆而補下焦故能益精育子時珍曰天

收瀉故能補今人只知其治
目一節幾于廢乘良為可憐
出西土皮有白點漬水碧色書紙不脫

者真大戟為使惡臭菜葉

海桐皮

宜祛風

濕



苦溫經疏云入血分祛風去濕殺虫能行經絡達病
應兼辛

所治風鑿頑痺腰膝疼痛傳信方海桐皮各二兩
各二兩甘草五錢生地七兩酒二斗浸

此方不得增減早中晚飲常令醺醺疔屬癩癩目

赤煎牙虫煎服或
含漱

出廣南皮白堅韌作索不爛

蕤仁

補明目



甘溫別錄入心肝脾三經消風散熱益水生光三經
微寒藏也血得其養則日疾平凡目病在表當疏風清熱
在裏屬腎虛血少神勞宜補腎養血安神道神為膏
水劇近視治目赤腫痛皆爛淚出亦治心腹邪熱結
為火不足

氣痰痞今人惟用療眼陳藏器叢生有刺實如五味圓扁有紋紫赤
日生治足眼熱治不眠

本草補更木

榆白皮 秦皮 海桐皮 蕤仁

卷三十五

可食取仁浸去皮尖研用

密蒙花
潤肝明
目



不凋其花繁密蒙茸故名揀淨酒浸一宿候乾蜜拌蒸晒三次

甘而微寒入肝經氣血分潤汗燥治目中赤脈

膚翳赤腫眵音搗眼脂淚小兒疳氣攻眼一產蜀中藥冬

芙蓉花

瀉涼血
解毒



辛平性滑涎粘清肺涼血散熱止痛消腫排膿治一切癰疽腫毒有殊功

用芙蓉花或葉或皮或根生搗或乾研末蜜調塗四圍中間留

頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即腫出已消者則易斂瀉科秘其名為清涼膏清露散

鐵箍散皆此物也或加赤小豆末或蒼耳燒有性為末加入亦妙

山茶花

瀉涼血



甘微辛寒色赤入血分治吐衄腸風麻油調末塗湯

火傷用紅者為末入童便薑汁酒調服可代鬱金


木槿

寫熱



杉木

寫散腫



烏白木

寫熱毒



服有赤白二種

苦涼活血潤燥治腸風瀉血痢後熱渴作飲服令人

得睡川產者治癰瘡癰瘡有虫用川槿皮肥皂水浸時時搽之或浸汁磨雄黃尤妙

用根皮

辛温去惡氣散風毒治脚氣腫痛心腹脹滿洗毒瘡

柳子厚纂救死方云得脚氣夜牛痞絕脇塊如石昏困且死鄭洵美傳杉木湯食頃大下塊散氣通用珍

木節一升橘葉一升無葉以皮代大腹抵榔七枚連子槿碎童便三升煮分二服若一服得快利即停後

赤油斑如野雞者作棺尤貴性直燒灰最發火藥

苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟療疔腫解砒毒

極能瀉下凡患腫毒中砒毒者不拘根皮子可作枝揀搗汁多飲得大利即愈虛人忌用

獨

木槿

芙蓉花 山茶花 木槿 杉木 烏白木 三十大

水楊柳

宜行氣

皂角

通關竅
搜風



苦平痘瘡頂陷漿滯不起者用枝煎湯浴之

此因氣凝血滯

或風寒外束而然得此煖氣透達
漿隨煖而行再用助氣血藥更効

枝煎汁治黃疸

辛鹹性燥氣浮而散入肺大腸經金勝木燥勝風故
兼入肝搜風泄熱吹之導之則通上下開竅而泄吐

痰涎搐鼻立作噴嚏治中風口噤胸痺喉痺

凡中風不省人事口禁不能進藥急提頭髮手摺入

中用皂角末或半夏末吹入鼻中有嚏者生無嚏者為肺氣已絕死或
用稀涎散吐之皂角末一兩白礬五錢每用一錢溫水調灌或加藜蘆

少鷹鴟翎探喉合微吐稀涎
再用藥治年老氣虛人忌用服之則除濕去垢最去油膩消痰破堅

段湯泡服治
老人風秘 殺虫下胎治風濕風癩痰喘腫滿堅癥囊結厥陰肝脈絡

經則為囊結塗之則散腫消毒煎膏貼一切瘰癧合蒼朮炒之辟瘟疫濕氣

一種小如豬牙一種長而枯燥一種肥厚多脂多脂者良去燥皮子粒

癩同癩

肥皂筴
鴛鴦毒

櫻欄
膏止血

或密炙酥炙絞汁燒灰用柏實為使惡寒畏人參苦參性能消鐵下結痰者蓋樹

一孔入鐵封之則結痰矣礙見皂角刺辛溫搜風殺虫功同皂筴

但其鋒銳能直達患處潰散佳疽治癰毒如乳風腐惡瘡癩乃管氣熱附風寒客于

脉而不去經日脉風成爲癩脉與胎衣不下癰疽已潰者禁用孕婦忌


之皂角子通大便燥結煨存性用汪機曰其性得濕則滑李時珍曰亦辛以潤之之義非得濕則滑也

辛溫除風濕去垢膩故澡身鹽療無名腫毒有奇功

不拘奇癆惡毒用生肥皂去子弦及筋搗爛醋和敷立愈不愈再敷奇驗此方方書未載若貧人僻地倉卒無藥者用之甚便故特著之集成云

生肥皂火煨存性生油膩粉調傳諸惡瘡

苦能泄熱膏可收脫燒黑能止血紅見黑則止不可燒過櫻欄側柏卷



水楊柳 皂角 肥皂筴 櫻欄

多者初起未可遽用
年久敗壞尤良與髮灰同用更良

茶

寫熱清
神消食



取吐直吐出胆寒
乃已渴而即症
與薑等分濃煎名薑茶飲治赤白痢茶助陰
薑助陽使寒熱平調並能消暑解酒食毒

苦甘微寒下氣消食去痰熱除煩渴清頭目得春如生發之

氣故多肅清上膈之功湯液云茶苦寒下行醒昏睡
如何是清頭目蒙釜日熱下降則上自清矣

清神解酒食油膩燒炙之毒利大小便多飲消脂最能去油

寒胃故濃茶能引吐千金療卒頭痛加破非中冷中風由痰厥氣上冲所致名厥頭痛單煮茶飲

酒後飲茶引入膀胱腎經患瘕疝水腫空心亦忌之

陳細者良粗者損人

吳茱萸

燥祛風
寒濕宜
下氣開



辛苦大熱有小毒充足太陰血分少陰厥陰氣分

腎肝其氣燥故嵩潤肝燥脾温中下氣除濕解鬱去
人肝而旁及脾胃

痰殺虫開腠理逐風寒治厥陰頭痛仲景用吳茱萸湯陰毒

腹痛痛在嘔逆吞酸俗名醋石亦有吐酸者宜降火清痰用吳茱作嚮

食得一方伏苓吳茱湯泡七次等分導蔡中丞苦痰飲率十日一發頭痛背寒嘔出飯

痔疾腸風腳氣水腫口舌生瘡為未醋調貼足心移衝脈為病氣逆裏

急宜此性雖熱而能引熱下行段成式言椒性善下吳茱性上似不盡

陰不降厥氣上逆膈塞脹滿非吳茱不可治利大腸壅氣風痔痢下產

後餘血故產後然走氣動火昏目發瘡血虛有火者禁用 咳者良泡

去苦烈汁用須泡止嘔黃蓮水炒治疝鹽水炒治血醋炒惡丹參硝石

辛熱純陽入肺發汗散寒治風寒咳嗽入脾煖胃燥

濕消食除脹治心腹冷痛吐瀉癖癩飲水腫干金

人冷氣人陰囊腫滿生椒擇淨帛裹着并蘘厚半寸
須臾熱氣大通日再易取消差梅師用桂末塗亦良



川椒

宜散寒
濕燥補

火

本草綱目

吳茱萸 川椒

卷三十八

入右腎命門補火治腎氣上逆能下行導火歸元每日吞二十粒大能溫補下焦陽衰凍數陰

汗洩精下焦虛寒堅齒明目破血通經除癥安虻虫見椒則服仲景虻厥鳥梅丸用之凡虫嚙腹痛者

面白唇紅殺鬼疰虫魚毒最殺勞虫危氏神授丸川椒炒出汗為末米時發時止飲下三錢有人病傳尸勞遇異人傳此方服

至二斤吐出肺胃素熱者忌服丹溪曰食椒既酒則火虫如蛇而安秦鹿名秦椒

俗名花椒實稍大蜀產肉厚皮皺為川椒閉口者殺人微炒去汗搗去

裏面黃殼取紅用名椒紅得鹽豉人使杏仁畏欵冬防風附子雄黃麻仁

凉水椒乃玉衡星之精辟疫伏邪故歲且飲椒栢酒子名椒目苦辛品行水道不行穀道能

治水虫除脹定喘及腎虛耳鳴



胡椒燥快膈酒痰辛辣純陽暖胃快膈下氣消痰治寒痰食積腸滑冷痢陰毒腹瀉胃寒吐水牙齒浮熱作痛合薑茱散之殺一

切魚肉盤置音專上声 養料宜之嗜者衆多食損肺亦氣動火發瘡痔

藏毒齒痛目昏 畢澄茄一類二種主治畧同

蘇木

傷行血



出蘇方國交愛亦有已鐵

甘鹹辛涼入三陰血分行血去瘀發散表裏風氣宜與
防風治產後血暈肘後方者汁服海 脹滿欲死血痛
同用藥方如乳香酒服 血痕經閉氣壅癰腫撲傷排膿止痛多破血少和血

沉香

重宜調氣補陽



辛苦性溫諸木皆浮而沉香獨沉故能下氣而墜痰

涎怒則氣上能平則下氣 能降亦能升氣香入脾故能理諸氣

而詞由東垣日上至天下至 其色黑體陽故入右腎

命門煖精助陽行氣不傷氣溫中不助火治心腹疼

木

胡椒 蘇木 沉香

卷三十九

痛喉口毒痢癰癤邪惡冷風痲痺氣痢氣淋 色黑沉香者良香甘者

性平辛辣者熱入湯劑磨汁用入丸散紙裹置懷中待燥碾之息火

斑者名黃沉如牛角黑者名角沉咀之軟削之卷者名黃蠟沉甚難得淨者名棗香坐沉者名則香雞骨香雖沉而心空並不堪用

檀香

宣理氣



紫檀

重和血



降真香

炎之能降 諸真香



辛溫調脾肺利胸膈去邪惡能引胃氣上升進飲食

為理氣要藥內典云旃檀塗身能除熱惱昂按內典慈念亦稱熱惱蓋諸香多助淫火推檀

香不然故釋氏焚之道書又以檀為恰香不可以供上真

鹹寒血分之藥和榮氣消腫毒傳金瘡止血定痛

辛溫辟惡氣怪異瘡傷折金瘡止血定痛消腫生肌

周崇逐寇破傷血出不止按花藤石散不効軍士李高用紫金藤散敷之血止痛定明血結無癰曾敷

宜辟惡止
血生肌

萬人紫金藤即降
真香之最佳者也

丁香

燥煖胃
補腎



辛溫純陽泄肺溫胃大能療腎壯陽事煖陰治胃
冷雍腸嘔噦呃逆丹溪曰人之陰氣依胃為養土傷則木挾相火直沖清道而上則欬

逆古人以為胃寒用丁香補蒂不能清痰利氣惟助火而已接呃逆有痰阻氣滯食塞不得升降者有火鬱下焦者有傷寒汗吐下後中氣大虛者有陽明內熱失下者有痢疾大下胃虛而陰火上油者時珍曰當視虛實陰陽或泄熱或降氣或溫或補或吐或下可也古方單用補蒂取其苦溫降氣瘠生加丁香生薑取其開鬱散痰蓋從治之法亦嘗有收効者矣朱氏但執以寒治熱矯枉之過矣
疳口臭丹溪曰脾有鬱火滲入肺中濁氣上行發為齒疳齒齲瘡胃

虛灰白不發熱症忌用 有雌雄二種雌即雞舌香力大若用雄去了蓋乳子畏鬱金火

乳香一名

蓋陸香



香竄人心苦溫補腎辛溫通十二經能去風伸筋
仲者敷藥加用 活血調氣托裏護心香徹瘡孔能使毒氣外出不致內攻生肌

丁香 乳香 紫檀 降真香 丁香 乳香 紫三三士

宜活血
伸筋

洗藥
宜散瘀
定痛


本草綱目

止痛治心腹諸痛口噤耳聾癰疽瘡腫產難折傷皆取其活亦治癩狂

以能去風散瘀靈苑辰砂散辰砂一兩乳香棗仁各五錢酒下忒飲
沉醉聽睡一二日勿動驚醒則不可治本事加人參一兩各甯志膏

出諸番如乳頭明透者良市人多以楓香偽之性粘難研水飛過用砥坐熱水研

研之或用燈心同研則易細



荳蔻經疏云應兼辛八十二經散結氣滯血消腫定痛生

肌寇崇兩日血滯則氣壅氣滯心胆虛肝血不足推

致新能治金瘡杖瘡血而發熱作痛惡瘡痔漏翳

目赤肝經血熱後血氣痛破癥墮胎乳香活血沒藥散

生肌故每兼用瘡疽已潰者忌用膿多者勿敷
出諸番赤色類於琥珀者良主治乳石

同

卷三十一

楓脂香

即白膠香
宜調氣血

冰片
一名

龍腦香
宜通竅
散火



苦平活血解毒止痛生肌治吐衄咯血齒痛風癩癰

瘰癧外科要藥 包白微黃能亂乳香功頗相近

辛溫香竇善走能散先入肺傳乎心脾而透骨通清

發散鬱火治驚癩痰迷東坦曰風病有骨髓者宜之若在血脉肌肉凡能引風入

骨如油 目赤膚癢乳調曰點數次王節齋曰冰片大人面 辛熱用之點眼取其拔出火邪蓋

火鬱發之從治法也世人誤以為寒而當用之遂致積熱害日故云眼不點不瞎者此也耳聾鼻癢鼻中癢兩點之

功喉痺舌出散火骨痛齒痛骨痘陷猪心血作引酒或紫草 產難三虫五

痔王綸曰世人誤以為寒不知辛散性甚似乎凉耳諸香皆屬陽豈有 香之至者血反寒乎昂幼時曾問家叔建侯公云薑性何如叔曰體

熱而用涼蓋味辛者多熱然風熱必藉辛以散之風熱散則凍矣此即本草所云水片性寒之義同未有發明之者附記于此

番云是杉脂以白如冰作梅花片者良以杉木炭養之則不耗今人多以樟腦升打亂之 出南

沒藥 楓脂香 水片 卷三十一

樟腦


宜通竅
除濕

蘇合香

宜通竅
辟惡

血竭

補和血
斂瘡



本草綱目

衣篋辟瘡

以樟木切片浸水煎成升打得法能亂水片

辛熱香竄能于水中發火

置水中
焯益熾

通閉利滯除濕殺

虫置鞋中去腳氣

集要云和烏頭為末醋丸彈子
大置足心微火烘之汗出為效

甘溫走竄通竅開鬱辟一切不正之氣殺精鬼出

諸瘡合眾香之汁煎成以筋挑起懸絲不斷者真

甘鹹色赤入血分補心包肝血不足專除血痛散瘀

生新為和血之聖藥治內傷血聚金瘡折跌瘡口不

合止痛生肌性急不可多使引濃

血竭單入血分乳
香沒藥兼人氣分

皆木
脂也

出南香色赤以染透指甲者為真假者是海
每血味大

鹹有
醒氣單礪用同家藥搗
則作塵飛

阿魏

瀉消積
殺虫



辛平一云溫

入脾胃消肉積殺細虫去真氣

諺云黃芩無假阿魏

無真劉純云阿魏無真却
有真真而止息是為珍

解薑菜自死牛馬肉毒治

心腹冷痛瘧痢

瘧痢多由積滯而起

傳尸疰勞瘵虫

出西番

木脂熬成極真試取少許安銅器一宿沾處自如銀汞者真

人多以胡蒜白麝之

用鉢研細熱酒器上煆過入藥

蘆薈

瀉熱殺虫



大苦大寒功尚清熱殺虫涼肝明目鎮心除煩治小

兒驚癇五疳傳蠶齒濕癬


甘草末和傅

吹鼻殺腦疳除鼻

癢小兒脾胃虛寒作瀉者勿服 出波斯國木脂也味苦色綠者真

胡桐淚

瀉熱殺虫



苦能殺虫鹹能入胃軟堅大寒能除熱治咽喉熱痛

磨掃

齒齲風疳瘰癧結核

蘇頌曰古方稀用今口齒家多用為要藥

出

五青木

積腦

蘇合香

血竭

阿魏

蘆薈

胡桐淚

卷三三十二

涼肅乃胡桐脂入土得斥齒之氣結成如小石片水淚狀如膏油

蕪夷

官散屋濕瀉消積殺虫



辛散滿苦殺虫温燥濕化食諸虫皆因濕而生去氣食皆因寒而滯而五

藏皮膚肢節風濕心腹積冷癥瘕直指方云嗜酒為酒鬱多氣人血入干氣為氣鬱虛勞人敗血雜痰為血鬱如虫之行土侵人咽下蝕人肝或附脇皆

或臆胸腹惟用蕪夷炒兼煖胃理氣益血之藥乃可殺之

痔瘻瘡癩小兒驚瘖冷痢得訶子豆寇良胃中有

虫食即作痛和麩炒黃為末米飲下

形類榆葉陳久氣羶者良

沒厚子

精外用染鬚




苦温入腎瀉精固氣收陰汗烏髭髮 出大食諸番

顆小紋細者佳炒研用虫食成孔者揀去忌銅鐵器

衛矛

鬼箭夾瀉破血



苦寒時珍破陳血通經落胎殺虫祛崇 幹有三羽

葉似野茶酥炙用

藥

寫破血
消積殺

出

巴豆

大燥大
瀉



辛溫有毒功專行血殺虫消年深堅結之積滯丹溪

性急而飛補用之中節積滯能
去後補性內行人不知也 破日久凝結之瘀血化

瘀血續筋骨絕傷損傷必有 治傳尸勞瘵痕疔蛇虫深得蟹
為水續筋骨絕傷瘀血停滯

炒令烟盡入藥或燒存性用半夏為使畏川椒紫蘇雞子蟹深得蟹

辛熱有大毒生猛而熟少緩可升可降能止能行開

竅宣滯去藏府沉寒最為斬關奪門之將破痰癖血

瘦氣痰食積生冷硬物所傷大腹水腫瀉痢驚癇口

喎耳聾牙痛喉痺纏喉急痺緩治則死用解毒丸雄

皮油為丸每服五分津嚥下雄黃破結氣鬱金散惡血巴豆下稠涎然

孫厲劑不可輕用或用紙撚蘸巴豆油燃火刺喉或搗巴豆綿裹臍左
右納鼻中吐出惡涎紫血 其毒性又能解毒殺虫療瘡瘍蛇蝎諸毒痰
即寬鼻離少生瘡無碍

本草精要木 蘇夷 沒石子 衛矛 漆 巴豆 卷三 二十三

用大可劫病微用亦可和中通經爛胎巴豆稟火烈之氣爛人肌肉試以少許擦皮膚即發一泡况腸

胃耶不可輕用王好古曰去心皮膜油生用為急治水穀道路之劑炒去烟令紫黑用為緩治消堅磨積之劑可以通腸可以止瀉世所不知也時珍曰一婦年六十餘溏瀉五載犯生冷油膩肉食即作痛服升澁

藥瀉反甚脉沉而滑此乃脾胃久傷積冷凝滯法常以熱下之用蠟置巴豆丸五十粒服二日不利而愈一名剛子雷敷曰紫小色黃者為巴

自是每用治瀉痢愈者近百人三蔞色黑者為豆小而兩

頭尖者為剛子剛子殺人時珍曰此說殊乖蓋緊小者為雌有稜及兩頭尖者是雄雄者更峻耳用之得宜皆有功力不去膜則傷胃不去心

藏器法
連白膜
服

則作或用殼用仁用油生用炒用醋煮燒存性用研去油名巴豆霜若

花為使畏大黃黃連涼水中其毒者以此解之得火長油作紙燃燃火

吹息或重鼻或刺喉能行惡涎惡血治中風中惡癩厥氣厥喉痺不通

一切急病大黃巴豆同為峻下之劑但大黃性寒府病多熱者宜之巴豆性熱藏病多寒者宜之故仲景治傷寒傳裏多熱者多用

大黃東垣治五積屬藏者多用
巴豆與大黃同服反不瀉入

大楓子

燥痰外用治瘡




辛熱有毒取油治瘡癰疥癩有殺虫劫毒之功丹溪

工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者

出

荆瀝

宜通經絡滑痰瀉熱



甘平除風熱化痰涎開經絡行血氣治中風失音驚

癩痰迷眩暈煩悶消渴熱癩為去風化痰妙藥氣虛

食少者忌之

延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用荆瀝丹溪曰虛痰用竹瀝實痰用荆瀝並薑汁助送則不疑宜滯

牛荆

俗名黃荆取尺餘架磚上中間火灸兩頭承取汁用

竹瀝

瀉火祛痰潤燥



甘寒而滑消風降火潤燥行痰養血益陰竹之有瀝猶人之有

血也故能補陰清火利竅明目治中風口噤痰迷大熱風癩

狂煩悶產乳方姓娠若煩名子煩竹瀝不限多少細服梅師加茯苓煎消渴血虛

汗然寒胃滑腸有寒濕者易服經疏云中風要藥凡中風未有不因陰虛火旺痰熱壅結所致如果外來風邪

妄得復用此寒滑之藥治之哉丹溪曰痰在經絡四肢皮裏膜外者非此不能運行又曰味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補胎後不

得虛胎前不損子世人因本草大寒二字棄而不用然人食筍至老未

有因寒而病者瀝即筍之液也又假火而成何寒如此之甚耶治法云竹瀝和米煮粥能治反胃竹類甚多淡竹肉薄節間有粉多汁而甘最良箬竹堅

而節促皮白如霜苦竹本粗葉大筍味苦入藥惟此三種功用畧同竹

茹即刮取青皮竹瀝如取荆瀝法薑汁為使蓋能除痰且濟其寒美矣發瘡瘡本

未載昂按筍蕨多食皆能燥血故筍有刮腸籜之名惟同肉煮食則無害也

竹茹

瀉上焦煩熱涼



甘而微寒開胃土之鬱清肺金之燥涼血除濕治上

焦煩熱皮人肺主上焦溫氣寒熱膈噎嘔吐血

衄血清肺涼胃幽血肺痿驚癇散肝崩中胎動氣

淡竹葉

瀉上焦
煩熱



辛淡甘寒涼心緩脾消痰止渴除上焦風邪煩熱生

竹上故治上焦伸景治傷寒發熱大渴有竹葉石膏湯乃假其辛寒以散陽明之邪熱也咳逆喘

促嘔噦吐血中風失音小兒驚癇 竹生一年以上者嫩而有力

天竹黃

瀉熱豁
痰涼驚



甘而微寒涼心經去風熱利竅豁痰鎮肝明目功同

竹瀝而性和緩無寒滑之患治大人中風不語小兒

客忤驚癇為尤宜 出南海大竹之津氣結成即竹內黃

粉
片片如竹節者真

雷丸

瀉消積
殺虫



苦寒有小毒入胃大腸經功專消積殺虫楊勸得異疾每發語

腹中有小聲應之久漸声大有道士曰此應声虫也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應服之而愈

竹之餘氣得霹靂而生故名大小如栗竹刀刮去

天竹黃 雷丸 淡竹葉 竹茹 卷二十五

赤裡柳
宜解毒



黑皮甘草水浸一宿酒拌蒸或炮用厚朴羌花為使惡葛根

一名西河柳能使疹毒外出未服四錢治疹疹不出喘嗽悶亂沙糖調服治疹後痢

菓部

大棗

補脾胃
潤心肺
和中藥



甘溫脾經血分藥補土益氣滋脾土潤心肺調營衛

緩陰血生津液悅顏色通九竅助十二經和百藥傷

寒及補劑加用之以發脾胃升騰之氣多食損齒屬齒

腎土中滿症忌之甘令人滿大建中湯心下痞者減湯棗與甘草同例

也治水飲脇痛有土棗成無己曰仲景治奔豚用大棗者滋脾土以平腎氣

湯益脾上以勝妄水也 北產肥潤者良昂按金華南棗更勝于 附毒忌窗魚同食北徽寧所產亦有佳者殺烏

桃仁

瀉破血

潤燥

孫思邈

著于全

方

孟詵著

食療本

草



苦平微甘

孟詵辛温

厥陰血分藥

心包

苦以泄血滯甘

以緩肝氣而生新血

成無己曰肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急宜急食甘以緩

之通大腸血秘治熱入血室

衝脉血燥血痞損傷積血

血痢經閉欬逆上氣

血和則氣降

皮膚血熱燥癢畜血發

熱如狂 仲景治膀胱畜血有桃仁承氣湯即調胃承氣湯加桃仁桂枝
又抵當湯用桃仁大黃虫水蛭水蛭即馬蟻蚊食血之虫能
遍肝經聚血性最難死雖多為未得水即活若人腹中生子
為患田泥和水飲下之虫虫即咬虫因其食血故用以治血
血不足者

禁用 行血連皮尖生用潤燥去皮尖炒用俱研碎或燒存性用雙仁

者有毒不可食香附為使 桃仁苦平下宿水除痰飲消積聚利二便

療風狂

范純佑女喪夫發狂夜斷窗櫺登桃樹食花幾盡自是遂愈以能瀉痰飲滯血也

桃葉能發汗

凡傷寒風

痺發汗不出以火煨地用水酒之乾桃葉厚二三寸席臥温覆取太汗
傳粉極燥即瘧麥麩砂皆可如此法用○桃為五木之精其枝葉花

仁並能辟邪食醫心鏡桃仁煮粥
治鬼症咳嗽生桃食多生癰瘡

杏仁

瀉肺解肌潤燥下氣



辛苦甘溫而利瀉肺解肌能發汗除風散寒降氣行痰

潤燥消積素麩豆粉近之則爛通大腸氣秘治時行頭痛上焦

風燥欬逆上氣杏仁炒研蜜和為丸舍燕煩熱喘促有小毒能殺

虫治瘡制狗毒可毒狗消狗肉積錫毒肺虛而欬者禁用東垣曰杏仁下喘治氣桃仁療狂治血俱

治大便秘當分氣血書便難屬陽氣夜便難屬陰血婦人便秘不可過泄脉浮屬氣用杏仁陳皮脉沉屬血用桃仁陳皮肺與大腸相表裏賁門上主往來魄門下主收閉為氣之通道故並用陳皮佐之○杏仁紫苑並能解肺鬱利小便
去皮尖炒研發散連

皮尖研雙仁者殺人得火良惡黃耆黃芩葛根

烏梅

瀉腸斂



酸澁而溫脾肺血分之菓斂肺肺欲收急食酸以收之瀉腸涌

痰消腫清熱解毒生津止渴酸酒殺虫治久嗽瀉痢

補腎 栗



梁莊肅公血痢陳應之用烏梅胡黃連灶下土等分爲末茶調服而愈
 會魯公血痢百餘日國醫不能療應之用監梅肉研爛合臘茶入醋服
 一啜瘰癧諸症初起霍亂吐逆反胃勞熱骨蒸皆取其安蚘厥攻而眩
 而安瘰癧者皆忌用
 小虫得酸則伏仲
 景有虺厥烏梅丸去黑痣蝕惡肉癰瘡後生惡肉煙
 酸走筋七病
 無多食酸
 先入筋齒軟則易開若
 用鐵器攪開恐傷其齒驚癩喉痺傳乳癰腫毒刺入肉中出瘡中努肉
 搗餅貼
 之即收
 青梅薰黑爲烏梅稀灰汁淋蒸則不蠹孟詵云烏梅鹽漬爲
 白梅稀灰汁淋蒸則不蠹孟詵云烏梅時珍曰梅花于冬而實于夏得木之全氣故最酸胆爲甲木肝爲
 胡桃即解衣生微點者梅葉
 煎湯洗之搗洗葛衣亦佳

鹹溫厚腸胃補腎氣寇宗奭曰小兒不可多食生
 則難化熱則滯氣能解羊羶

本草綱目

杏仁 烏梅 栗

卷三十三

陳皮

能燥能
宜有補
有瀉可
升可降



辛能散苦能燥能瀉溫能補能和同補藥則補瀉藥

則瀉升藥則升降藥則降為脾肺氣分之藥脾為氣母肺為

氣篇凡補藥瀉藥必佐陳皮以利氣調中快膈導滯消痰大法治痰以

主潔古曰陳皮枳壳利其氣而痰自下利水破癥宣通五藏統治百病皆取其理氣燥濕

之功人身以氣為主氣順濕除則百病散金匱云能解魚毒食毒多服久服損人元氣入補養藥則

留白入下氣消痰藥則去白聖濟云不去白皮生痰去白名橘紅兼能除寒發表

皮能發亥治疝痛葉散乳癰皆能入厥陰行肝氣消腫散毒腰腎令痛

散皮膚木橋核炒酒服良十劑日宜可去壅生薑橋

皮之屬是也泊宅篇曰莫強中食已輒胸滿不下百治不効偶家人合

橋皮湯嘗之似有味連日欲之一日坐廳事覺胸中有物墜下目澄汗
濡大驚扶歸腹疼痛下數塊如鐵彈臭不可聞自此胸次廓然蓋脾之
冷積也牛年服藥不知功乃在橋皮方用橋紅一斤甘草鹽各四兩煮
乾點服名二賢散蒸餅丸名潤下丸治痰特有驗世醫惟知半夏南星
枳壳茯苓之屬何足語此哉丹溪曰治痰利藥過多則脾虛痰易生而

本草綱目 卷三

青皮
瀉肝破
氣散積

炒用

反多又曰胃氣亦賴痰以養
不可攻盡攻盡則虛而愈劇
半夏亦然故
同名二陳湯治痰咳重傾漫晒治痰積薑汁炒泊下焦鹽水炒核去皮
陳則烈氣消
無燥散之患



辛苦而溫色青氣烈入肝胆氣分疏肝瀉肺
柴胡疏
上焦用

凡瀉氣藥皆云瀉肺破滯削堅除痰消痞治肝氣鬱

積腸痛多怒久瘧結癖入肝散邪入脾除痰瘧家必
用之品故清脾飲以之為君

疝痛乳腫丹溪曰乳房屬陽明乳頭屬厥陰乳母或因忿怒鬱悶厚味
釀積致厥陰之氣不行故發不得出陽明之血騰沸故熱甚

而化膿亦有其子有滯痰膈熱含乳而睡噓氣致生結核者初起便須
忍痛揉軟吮令汁透自可消散治法以青皮疎肝滯石膏清胃熱甘草

節行濁血瓜蒞消腫導毒或加沒藥橘葉金銀花蒲公英皂角刺當歸
歸佐以少酒若干腫處灸三五壯尤捷久則回陷名乳岩不可治矣最

能發汗皮能透皮有汗及氣虛人禁用
陳皮升浮入脾肺治高毒皮沉
降入肝胆治低炒之以醋所謂

本草補遺

陳皮 青皮

卷三十八

柿乾
潤肺瀉
腸寧嗽

肝欲散急食辛以散之
以酸泄之以苦降之也
橘之青而未黃者醋炒用
古方無用者未以
後始與陳皮分用



甘平性瀉
生肺性寒
脾肺血分之藥
健脾瀉腸潤肺寧嗽

而消宿血治肺痰熱咳咯血反胃
有人二世病反胃
得一方柿乾同乾

飯日日食不
飲水遂愈
腸風痔漏
柿與大腸相表裏藏清則府
熱亦除泊宅編柿乾燒灰飲

服二錢
治下血
柿霜乃其精液生津化痰清上焦心肺之熱為尤佳治咽喉口

舌瘡痛息蟹
柿蒂止呃逆
古方單用取其苦溫降氣濟生加丁香生
薑取其開鬱散痰亦從治之法產寶云瘞

後呃逆煩亂柿餅
一個煮汁熱飲

木瓜

補和脾
舒筋瀉

歛肺



酸瀉而溫入脾肺血分歛肺和胃理脾伐肝化食
酸能

歛歛則化
與山查同
止渴
酸能生津
氣脫能收氣滯能和調營衛利

筋骨去濕熱消水脹治霍亂轉筋
夏月除熱邪傷脾
胃腸不開陰不降

胖音肥
足肚也

則揮霍撩亂上吐下瀉甚則肝木乘脾而筋為之轉也食療云煮汁飲
良時珍曰肝雖王筋而轉筋則因風寒濕熱襲傷脾胃所致轉筋必起
于足腓腓及宗筋皆屬陽明木瓜治轉筋取其理筋以發肝也土病則
金衰而木盛故用酸溫以收脾肺之耗散而藉其走筋以平肝邪乃土
中瀉木以助金也陶弘景曰凡瀉痢脚氣脾主四肢或寒濕傷于足絡
轉筋呼木瓜名寫木瓜字皆愈瀉痢脚氣或胃受濕熱之物上輪于脾
下流至足則成脚氣惡寒發熱狀類傷寒第脛腫掣痛為異耳宜利濕
清熱忌用補劑及淋洗昔有患足痺者赴舟見舟中一袋以足倚之北
及登岸足已善步矣詢袋中何物乃木瓜也腰足無力多食損齒骨病癰閉酸收大甚鄭真
濇之品世用治水腫腹脹誤矣有大蔡舟過金陵愛其芬馥購數百顆
置之舟中艤舟人皆病溺不得出醫以過利藥罔効迎予視之聞西面
皆木瓜香笑謂諸人曰徹去此物溺即出矣陳耆香壽飲用之取
不必用藥也于是盡投江中頃之溺皆如舊

肺生
金
忌鐵

山查
古字

作槎
瀉滯氣



酸甘鹹溫健脾行氣散瘀化痰消食磨積消油膩腥

麥牙消穀積者不同凡煮老雞硬
肉按數枚則易爛其消肉即可知
小兒痘疹止兒

柿乾 木瓜 山查

卷三十九

消積散
瘵化痰

梨
潤腸瀉
火清熱

枕作痛惡露積于太陰少腹作痛名兒枕痛砂糖調服多食令人嘈煩易飢反伐脾胃生發之氣破泄大過中氣受傷凡服人參不相宜者服山查即解氣補一破氣也有大小二種小者入藥一名棠棣子去皮核用一云核亦有力化食磨積



甘微酸寒潤肺涼心消痰降火止渴解酒利大小腸

治傷寒發熱熱嗽痰喘中風失音搗汁頻服聖惠方梨汁煮粥治小兒

心藏風熱昏燥切片貼湯火傷多食冷利脾虛泄瀉及乳婦

血虛人忌之生者清大府之熱熟者滋五藏之陰實火宜生虛火宜熟泊宅編有仕宦病消

渴醫謂不過三十餘日死或棄官歸途遇一醫令致北梨二担訖則瘥宜如其言食及五六十枚而病愈楊吉老介醫述甚著一士有疾厭厭不聊往謁之楊曰汝症熱已極氣血全消三年當此疽死不可為也土不樂而退聞茅山一道士醫術道神但不肯以技自名乃衣僮僕之服詣山拜之願執役瘠下道士喜爾祇事左右歷兩月久覺其與常隸別扣所從來再拜謝過始以實告道士笑曰世間那有醫不得的病試診

脉又笑曰吾亦無藥與汝便可下山買好梨目食一顆梨盡取乾者泡湯和洋食之疾自當平土人用戒經一歲復見吉老顏貌映澤脉息和平驚曰君必遇異人土人以告楊衣冠焚香望茅山設拜蓋自咎其學之未至也

清痰止咳嗽○與萊菔相間收藏則不爛或削梨蒂押萊菔

搗汁用熬膏亦良加薑汁

枇杷葉
瀉肺降火



桃大食後夜臥各含化一丸未終劑而愈

葉濕重二兩乾重三錢為氣足拭淨毛毛射肺令人咳

治胃病薑汁炙治肺病蜜炙

橄欖
宜清肺



甘瀉而溫脾胃之菓清咽生津除煩醒酒解河豚毒

投入及魚骨硬如無橄欖以核磨水服橄欖本作舟楫魚撥着即浮出物之相畏有如此

大宜廣菓

梨 枇杷葉 橄欖

卷三十三

者核燒灰傳疰疔良

白菓一名

銀杏 瀉欵皮 去痰

石櫛皮

瀉腸外 用染鬚



腫脹小兒發驚動

疔者食于枝漿澤手向浣油膩時珍目去痰濁之功可以類推

甘苦而温性瀉而收熟食温肺益氣色白屬金故入肺定痰

哮喘嗽縮小便止帶濁生食降痰解酒消毒殺虫

酸瀉而温能瀉腸止瀉痢下血燥未崩帶脫肛瀉痢

脫肛者以石櫛皮陳壁土加明礬少許濃煎薰洗再用五倍子炒研敷托而止之浸水汁器

如墨烏鬚方綠雲油中用之勿犯鐵器客座新聞云一人患

腹脹夏成疹之日飲食如常非水腫蠱脹乃濕熱生虫之象也以石櫛棒樹東引根皮枳柳各五錢空心

服腹大痛瀉虫長丈餘遂愈

枳椇子

一名木

蜜

潤解酒



甘平止渴除煩潤五藏解酒毒葛根解酒而發散不

如枳椇屋外有枳椇
耐屋內釀酒多不佳趙以得治酒毒房勞病熱者加
葛根于補氣血藥中一貼微汗反懈怠熱如故知氣
血虛不禁葛根之散也必得枳椇方可偶得乾者加
入即愈東坡集云揭隸臣病消渴日飲水數斗飯亦

倍進小便頻數服消渴藥日甚延張朕診之曰笑君幾誤死取塵香當
四子以酒儒作十許丸枳椇子煎湯吞之遂愈問其故財曰消渴時中
皆脾弱腎敗土不制水而成今穎臣脾脉極熱腎脉不衰當由酒菓過
度積熱在脾所以多食多飲飲多溲不得不多非消非渴也麝香接酒
菓枳椇能勝酒故假二物以去其酒菓之
毒也雷敷日凡使麝香用當門子尤妙
俗名雞距以實琴曲如雞

距蜀呼為棘枸經霜黃赤甚甘其葉入酒酒化為水

味甘氣熱皮濇皮歛肺定喘固腎濇精今藥中空肉

潤皮汁青黑屬水入腎通命門利三焦溫肺潤腸補

氣養血佐補骨脂一木一火大補下焦胡桃屬木破

胡桃

補命門

肉潤皮



白菓 石榴皮 枳椇子 胡桃

男女交媾皆稟此命火而結胎人之窮通壽夭皆根于此


木火相生之妙古云黃柏無知母破故紙無胡桃猶水母之無蝦也時珍曰三焦者元氣之別使命門者三焦之平原命門指所居之府而府為藏精係胞之物三焦指所治之部而名為出納腐熱之司一為體一為用也其體非脂非肉白膜裏之在脊骨第七節兩腎中央系著于脊下通二腎上通心肺貫腦為生命之原相火之主精氣之府人物皆有之生人生物皆由此出內經所謂七節之旁中有少必是也難經誤以右腎為命門高陽生承謬誤脈訣至朱肱陳言戴起宗始闢之夫腎命相通藏精而惡燥胡桃頗類其狀汁青黑故人北方性破故紙潤燥而調血使精氣內充血脉通利諸疾自除矣**三焦通利故上而虛寒喘嗽**能溫肺化痰濕有桃三枚蓋三片臥時嚼服即飲湯復嚼薑桃如前數靜臥必愈邁如言服且而痰消嗽止淇輯切子病痰喘夢觀音令服人參胡桃湯服之而愈明日剝去皮喘復非仍連皮用信宿而瘥蓋皮能斂肺也胡桃葱白薑茶等分搗煎能發汗散寒**下而腰脚虛痛**能補內而心腹諸痛外而瘡諸毒能調中和營皆可除也然動風痰助腎火皮連同燒酒細嚼三枚能久戰**有痰火積熱者少服油者有毒故殺虫治瘡殼外青皮壓**

油烏髮潤燥養血去皮用斂瀉連皮用

龍眼肉
補心脾

荔枝核
宜散寒

樞實
潤肺



甘溫歸脾益脾長智一名益智養心葆血心為脾母故歸脾湯

用之治思慮勞傷心脾及腸風下血心生血脾統血思慮過多則心

脾傷而血耗致有健忘怔忡驚悸諸病歸脾湯能引血歸脾而生補之賜風亦由血不歸脾而妄行

甘瀉而溫入肝腎散滯氣辟寒邪治胃脘痛婦人血

氣痛煨存性五錢香附一兩為末每服二錢鹽湯或米飲下名獨痛散單服醋腸下益効其實

雙結核似罌丸罌音聿腎子也故治癩疔疔腫有逆類象形


之義煨存性酒調服加茴香清皮各炒為末酒服亦良殼發痘瘡燒存性用荔枝連殼煨研

止呃逆生荔枝多食則醉以殼浸水解之此即食物不消還以木物解之之義

甘瀉潤肺本草未嘗言潤然潤劑殺虫有虫積者宜也故寇氏云多食瀉腸殺虫止旬日日食

虫乃絕

海松子
潤燥



甘溫潤肺溫胃散水除風治欬嗽松子一兩胡桃二兩鍊蜜和服治肺燥咳虛秘同柏子仁麻仁溶出療東雲南松鬚五

落花生
新增
補脾潤



辛能潤肺脊能舒脾藥中佳品 出閩廣藤生花落地而實結故名按落花生本草未收本無當醫藥之用然能益脾潤肺實佳菓也因世人謗之者多附見于此明其有利無害也 炒食

蓮子
補脾瀉
腸固精




甘溫而瀉脾之菓也脾者黃宮故能交水火而熯心腎安靜上下君相火君古方治心腎不交勞傷白濁有蓮子清心飲補心腎有喘九蓮益十二經脈血氣瀉精氣厚腸胃除寒熱治脾泄

久痢白濁遺女人崩帶及諸血病大便燥者勿服 去心皮蒸熟焙

蓮蓬鬚
滴精

藕
血散

乾用得茯苓山藥白朮枸杞良黑而沉水者為石蓮清心除煩開胃進
食帶治噤口痢淋濁諸症石蓮入水則沉入鹵則浮煎蓋人以之試鹵
八得食之髮黑不老肆中石蓮產
廣中樹上其味大苦不宜入藥 蓮心為末米飲下療產後血竭



甘溫而瀉清心通腎益血固精烏鬚黑髮止夢洩遺
精吐崩諸血畧與蓮子同功



瀉平解熱毒消瘀血止吐衄淋痢一切血症和生地
汁童便
服藕生甘寒涼血散瘀宋大官作血蛤誤藕落皮血
遂誤散不疑一人病血淋痛
脹欲死李時珍曰髮灰二錢藕汁調服三
日而愈梅師方產後餘血上沖煮汁服 止渴除煩

聖惠方藕汁蜜和
服治時氣煩渴

解酒毒釐毒搗爛熱
酒調服煮熟甘溫益胃補心多乳
象心止瀉

能實 大腸 止怒久服令人權益心
之効生擣金瘡傷折熟擣塗折裂凍瘡肘後
方卒

大直南夏集 海松子 落花生 蓮子 蓮蓬鬚 藕節 卷三 三三三

中毒箭者藕汁飲多多益善孟詵日產
中忌生冷獨藕不忌為能散瘀血也

荷葉

輕宜升
陽散瘀



苦平其色青其形仰其中空其象震震仰孟感少陽用

膽之氣燒飯合藥裨助脾胃而升發陽氣潔古枳朮丸用荷葉

燒飯為丸痘瘡倒壓者用此發之下聞人規日勝于大牙

龍能散瘀血留好血治吐衄崩淋損傷產瘀熬香末服一切血症洗腎囊風

東垣曰雷頭風症風面疔瘡腫痛皆寒惡熱狀如傷寒病在三陽不可
過用寒藥重劑誅罰無過處清震湯治之荷葉一枚升麻蒼朮各五錢

煎服鄭奠一日荷葉研末
酒服三錢治遺精極驗

芡實

雞頭

子

補脾瀉

精



甘澀固腎益精補脾去濕治泄瀉帶濁小便不禁勞

遺滑精同金櫻膏為丸腰膝痠痛吳子野曰人之食

之使華液流通轉相灌溉其功勝下乳石也
經驗後方煮熟研膏合梗米煮粥食益精氣 蒸熟

甘蔗
補脾潤
燥

葶藶
烏芋一
名地栗
補中瀉
熱消食
菱俗名
菱角
瀉解暑
止渴

搗粉用酒精藥或連殼用
李惟熙云菱寒夾暖
菱花背日芙蓉向日



肺和中消痰治嗽多食助熱
損齒生虫紫砂糖功用畧同

甘寒和中助脾除熱潤燥止渴
治消消痰解酒毒利

二便
外臺方嚼嚙或搗汁
治發熱口乾便澇 治嘔噦反胃
梅師方蔗汁
蓋汁胡服

大便秘結
蔗汁熬之名石密即白霜糖唐大歷間有
鄒和尙始傳造法性味甘溫補脾緩肝潤

甘微寒滑益氣安中開胃消食
飯後宜食之 除胸中實熱

治五腫噎膈
憂膈悲氣膈熱膈寒膈噎膈亦
五腫氣噎食噎勞噎憂噎思噎 消渴黃

瘧症血蠱毒
未服能毀銅積之物故能開五膈消宿食治誤吞銅也

音菱
甘寒安中消暑止渴解酒 有兩角三角

四角老嫩之殊
武陵以三角四角者爲菱記兩角者
爲菱菱花隨月而轉猶葵花之向日

五五南豆菓
荷葉 芡實 甘蔗 葶藶 菱 西瓜 三三四

西瓜
瀉暑



甘寒解暑除煩利便醒酒名天生白虎湯
西瓜甜瓜皆屬生冷
 多食傷脾功濕衛生歌云瓜桃生冷宜小食免至秋
 來成瘧痢瓜性寒曝之尤寒稽食賦云瓜曝則寒油
 煎則冷物
 性之異也

本草綱目

卷三