



• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30  
JAPAN

852  
35

飛尸血厥

瘓瘻

七顫振

六驚悸

九

顛狂

血風攻脾不能食

閩氏  
齋庭

飛尸血厥

夫飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸喪聞哀哭便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯亂常覺昏發每節氣至變輒成大惡皆宜用忍冬葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如鷄子大日三服人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩

冒移時方寤此由汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服白薇湯倉公散

丹溪云凡人忽手足逆冷肌膚起如米粒頭面青黑精神恍惚或錯言妄語或牙關緊急或昏寐仆倒弔死問喪入廟登墓多有此病先以蘇合香丸灌之次服調氣散雜病平胃散雜病中氣平胃散玉機微義云卒厥飛戶客忤鬼擊口噤用麻黃湯傷寒太陽寒厥表熱裏寒則下利清穀食入則吐脉沉手足冷用四逆湯傷寒熟厥

腹滿身重難轉面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脈沉滑用白虎湯雜病發熱錦衣楊永興舉家避眚有僕沉醉失避者既而神思昏昧遍身青傷各煎金銀藤忍冬葉湯灌之愈一婦人忽昏憒發譫語自云爲前謀賴某人銀兩某神責我將你起解往城隍理問兩脚踝膝齶處皆青腫痛不可忍口稱苦楚次日左脛痛尚不正用金銀藤兩許水煎服卽愈一婦人入古墓患前證以紫金錠磨汁灌之卽甦通政余子華太常汪用之皆因往吊而卒死喪家想卽是證也

太乙神精丹

方見雜病譫妄

蘇合香丸

方見雜病卒中

雄硃散

方見雜病譜妄

白薇湯

白薇

當歸名壹兩

人參半兩

甘艸貳錢半

右㕮咀每服伍錢水二盞煎至一盞溫服

倉公散

治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血卽死不知人及卧麌齒脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末

九籥衛生方無瓜蒂末有皂角末

梨蘆末

雄黃

研

礬石

研各等分

右爲細末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通便活

未嘗再吹以得嚏爲度此藥能起死人恐皂角者爲正

補遺內鼻散

治尸厥脉動而無氣氣閉不通靜而

若效名卒厥

石菖蒲

去毛爲末

右每用二字內鼻中吹之令久仍以桂末安舌下

硫黃散

治尸厥奄然死去四肢厥冷不省人事腹

中氣走如雷鳴

焰硝

半兩

硫黃

壹兩

右細研分三服酒調灌下如火行五里又進一服

不過三服即甦

瘓癰

薛醫藥綱目云瘓者筋脈急也癰者筋脈緩也急則引而縮緩則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰瘓瘓俗謂之發搐是也凡癲癇風痙破傷風三證皆能瘓癰但癲癇則乍地不省風痙瘓癰則角弓反張破傷風瘓癰則有瘡口竊謂瘓者屬肝經風熱血燥或肝火妄動血傷瘓者屬肝經血氣不足或肝火汗多亡血以致手足伸縮不已抽搐不利若因風熱血燥用麝羊角散妊娠加釣藤山梔若肝火妄動用加味四物湯即四物加柴胡丹皮山梔加釣藤釣山梔若肝經血氣不

遇所

足用八珍湯卽雜病虛勞門八物湯加釣藤鈎山梔若肝火亡  
血用加味逍遙散調經加釣藤鈎山梔如不應須用六  
味丸虛勞雜病以補腎水生肝木為主佐以前劑治之若  
其脉長弦者是肝之本脉則易治其脉短澁者是肺  
金尅肝木也則難治其面色青中見黑者是水生木  
也當自愈青中見白者是金尅木也必難愈一婦  
人素口苦月經不調或寒熱妊娠五月兩臂或拘急  
或緩縱此肝火傷血所致也用四物加柴胡山梔丹  
皮釣藤鈎而愈一姪婦因怒寒熱頸項動掉四肢抽  
搐此肝火血虛風熱用加味逍遙加釣藤鈎數劑痊

顫振

黃帝曰人之顫者何氣使然岐伯曰胃氣不實則諸  
脉虛諸脉虛則筋脈懈墮筋脈懈墮則行陰用力不  
復故為顫因其所在補分肉間醫學綱目云顫振與  
瘓瘻相類瘓瘻則手足牽引而或伸或屈顫振則但  
顫動而不伸屈也胃虛有痰用參术以補氣茯苓半  
夏以行痰如實熱積滯用張子和三法薛顫振者  
掉眩也易曰鼓萬物者莫疾乎風鼓之為言動也太  
抵掉眩乃風木之搖運也諸風掉眩皆屬於肝治法  
若肝木實熱用瀉青丸幼科肝木虛熱用六味丸雜病

虛勞肺金尅肝木用瀉白散雜病發熱肝木虛弱用逍遙散  
經調加參术釣藤鈎脾血虛弱用六君子湯雜病傷虛勞加芎  
歸釣藤鈎胃氣虛弱用補中益氣湯雜病傷虛勞加釣藤  
鈎若產後顫振乃氣血虧損虛火益盛而生風也切  
不可以風爲論必當大補斯無誤矣 一婦人性善  
怒發熟經水非過期則不及肢體倦怠飲食少思而  
顫振余謂脾氣不足肝經血少而火盛也午前以調  
中益氣湯加茯苓貞母送六味丸午後以逍遙散送  
六味丸兩月餘而愈 一婦人身顫振口妄言諸藥  
不効余以爲鬱怒所致詢其故蓋爲素嫌其夫而含

怒久矣投以小柴胡湯傷寒少陽稍可又用加味歸脾湯  
歸脾湯加柴胡山梔而愈

交加散 治癥瘕或顫振或產後不省人事口吐痰涎

當歸

荆芥穗各等分

右爲細末每服三錢水一盞酒少許煎至七分灌

下咽卽有生理

增損柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐咬牙昏冒異證

柴胡

捌錢

黃芪

炒伍錢

黃芩

炒

菖

石膏 各肆錢

半夏 參錢

知母

甘草 炙各  
貳錢

右爲麞末每服半兩薑五片棗四枚水煎溫服  
本事青鹽丸 治肝腎虛損腰膝無力顫振  
麞香末 卷兩 兔絲子 肆兩 乾山藥 貳兩

青鹽 研  
壹兩

又先將兔絲子洗淨無灰酒浸晒七日冬天近火  
煨炙乾另爲細末和酒糊丸梧子大每服五七  
十九溫酒或鹽湯下常服壯筋力進飲食二婦人  
素患足蹠曳服此藥履地如故

本事星附散 治中風能言而手足蹠曳脉虛浮而  
數

天南星

製同  
半夏

半夏 薄切片薑  
汁浸透

黑附子 炮

白附子

炮

川烏頭 炮

白僵蠶 炒

沒藥

人參

白茯苓 各等  
分

右爲麞末每服二錢酒水各一盞同煎至八分去  
滓熱進三服汗出即瘥 在桐廬有患此證用  
前藥三服得汗手足卽能舉動  
三因獨活散 治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪  
使止氣不守正位致頭搖擺手足顫掉漸成目昏

獨活

地骨皮

細辛

芎藭

菊花

甘味

去風

甘草炙等分

者

防風

右爲麤末每服三錢水盞半煎至一盞去滓煎取

清汁六分入竹瀝少許再煎

半

沸食後溫服日

二服

世傳茯苓丸 治手臂抽掣或戰掉不能舉物服此藥立愈又治脾氣虛弱痰邪相搏停伏中脘以致臂內筋脈攣急而痛

茯苓

半夏薑製各

枳殼薑炒半兩

風化朴硝壹兩

右爲末薑汁糊丸桐子大每服二十丸食後薑湯

下

驚悸失血心神不安

婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神爲諸臟之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛襲之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變惚恍而憂懼也

排風湯亦可用

薛丹溪先生云驚悸

者血虛用硃砂安神丸痰迷心竅用定志丸怔忡者屬火屬痰思慮便動者屬虛時作時止者火動也假如病因驚而致驚則神出其舍痰乘而入矣蓋人之所生者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所由生也治當調養心血和平心氣而已金氏

婦暑月赴筵因坐次失序自愧成病言語失倫兩脈  
弦數予曰當補脾導瘀清熱不信以數巫者噴水呪  
之而死或謂病既無邪以邪治之何至於死予曰暑  
月赴筵外受蒸熱辛辣適口內傷鬱熱而况舊有積  
痰加之愧悶其痰愈盛又驚以法尺益驚其神而氣  
血不寧噴以法水閉其肌膚而汗不得泄內燔則陰  
既銷而陽不能獨立不死何待故滑伯仁先生云若  
膽氣虛寒用茯神湯膽氣實熱用酸棗仁丸心氣虛  
熱用定志膏茯苓補心湯心氣實熱用硃砂安神丸  
茯神散文學歸雲橋內人月事不及期忽崩血昏

慣發熱不寐或謂血熱妄行投以寒劑益甚或謂胎  
成受傷投以止血亦不効余曰此脾氣虛弱無以統  
攝故耳法當補脾而血自止用補中益氣湯雜病傷  
加炮薑不數劑而驗惟終夜少寐驚悸別服八物湯  
不効余曰雜矣乃與歸脾湯雜病健忘加炮薑以補心脾  
遂如初一婦人勞則心跳怔忡寒熱往來用歸脾  
湯為主佐以八珍湯諸證漸愈又用加味道遙散寧  
志丸而安後復作服歸脾定志二藥卽愈一婦人  
患驚悸怔忡日晡發熱月經過期飲食少思用八珍  
湯加遠志山藥酸棗仁三十餘劑漸愈佐以歸脾湯

全愈後因勞發熱食少體倦用補中益氣湯又因怒適月經去血不止前證復作先以加味逍遙散熱退經止又用養心湯治之而痊一婦人驚悸怔忡無

寐自汗盜汗飲食不甘急惰嗜卧用歸脾湯而愈至年餘懷抱鬱結患前證兼衄血便血仍用前湯而愈

茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神

去木

人參

去蘆

龍齒

另研

獨活

去蘆

酸棗仁

各壹兩微炒

防風

去蘆

遠志

去心

桂心

細辛

去苗

白术

去蘆各半錢

甘草

炙

乾薑

炮各半兩

右咬咀每服五錢水一中盞半煎至二大盞去粗溫服不拘時候

龍齒丸 治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不

妥

龍齒

另研

人參

去蘆

當歸

去蘆

天麻

各半錢

生乾地黃

各貳錢半

檳榔

另研

犀角屑

各半兩

遠志

去心

麝香

壹錢另研

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每

服三十丸薄荷湯送下不拘時

朱賁琥珀散

治婦人血風驚悸

琥珀研

沒藥研

木香

當歸

芍藥

白芷

羌活

土瓜根

牡丹皮去心

白术

桂心各壹兩

延胡索

右爲末每服壹錢水壹盞煎至七分加酒壹分再煎少時熟服重者數服効

茯苓補心湯 治心氣不足善悲愁怒衄血面黃五

心煩熱或咽喉痛舌本作強

茯苓

肆兩

桂心

甘艸炒

麥門冬

去心各

紫石英煖

人參各壹兩

大棗枝

貳拾

赤小豆貳粒

茯神湯

治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨

處胸中煩悶

茯神去禾

酸棗仁炒

黃芪炒

柏子仁炒

白芍藥炒

五味子炒各壹兩

桂心

熟地黃自製

人參

驚悸

甘草炒各半兩

右每五錢薑水煎服

酸棗仁丸

治膽氣實熱不得睡卧神思不妥驚悸

怔忡各半兩

茯神去木

酸棗仁炒

遠志去心

柏子仁炒

防風各一錢

枳殼麸炒

生地黃杵膏各半兩

青竹茹貳錢

定志丸

治心神虛怯神思不安或語言鬼怪喜笑

驚悸各半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服七八十九白湯下

人參

茯苓各一錢

菖蒲

遠志去心各一錢內

右為末蜜丸如前服

養心湯 治心血虛驚悸怔忡不寧或盜汗無寐發

熱煩躁各半兩

黃芪炒

白茯苓

茯神去木

半夏麌

當歸酒拌

川芎各半兩

辣桂去皮

柏子仁

酸棗仁炒

五味子杵炒

人參錢各參

甘草炙肆錢

右每服三五錢薑棗水煎服

驚悸

大計二

卷三

硃砂安神丸

治心經血虛頭暉心神驚悸等證

硃砂

飛過伍錢

黃連

酒洗陸錢

甘草

炙伍分

生地黃

當歸各壹錢

右為末飯糊為丸每服十五丸如工服不應當

服歸脾湯補之

治要茯苓散

治心經實熱口乾煩渴眠卧不安或

心神恍忽

茯神

麥門冬各壹兩

升麻各壹兩

貳錢半

大棗拾貳枚

去心通草

桂心各朱錢半

知母壹兩

去心

紫苑

赤石脂壹兩半

錢半

淡竹茹伍錢

右每服壹兩水煎

失血心神不安

薛前證若脾肝鬱熱用加味逍遙散

脾肝鬱結用加味歸脾湯脾胃虛弱氣血不足用八

珍湯十全大補湯脾肺虛弱氣血不足用補中益氣

湯六君子湯痰氣鬱滯用六君桔梗貝母如不應用審

孫氣虛但補脾胃如不應用獨參湯如惡寒發熱屬

氣血俱虛內熱晡熱屬血虛作渴面赤是血脫煩躁

皆宜甘苦之劑以補陽氣而生陰血經云血脫補氣

若用寒涼之劑以降火則誤矣仍審所屬之因治之

寧志膏 治婦人因失血過多，心神不安，言語失常，

不得睡卧

辰砂研

酸棗仁炒

人參

白茯神去木

琥珀各壹分 研

滴乳香壹錢 研

右為末，和停每服壹錢濃煎，燈心棗湯空心調下。

一方無茯神琥珀蜜丸如彈子大薄荷湯化下壹丸

茯苓補心湯 婦人以血旺氣壅為本，心主血，肝藏血，今血壅而氣盛者，由心氣虛耗不能主血，又不能制乎肺金，使肺金得以乘乎肝木，肝之虧損則血不能藏，漸致枯涸，不榮經絡，故月事不調矣。此

方專補心元之虛，抑其肺氣之乘，調和榮衛，滋養血脈，其疾自然平復矣。

卽參蘇飲內除木香與四物湯對分，和以薑棗煎，每服四錢，食前溫服。

參蘇飲方見發熱

四物湯

妙香散 治心氣不足，精神恍忽，虛煩少睡，盜汗等，證

半夏

遠志去心炒

山藥薑汁炙

甘草炒伍錢

茯苓去木通治

黃芪各壹兩

人參

桔梗各伍錢

辰砂另研 參錢

麝香另研貳錢

木香貳錢伍分

右爲細末每服貳錢溫酒調下

半夏湯 治膽腑實熱精神恍忽寒熱泄瀉或寢汗

憎風善太息

半夏壹錢伍分

黃芩

遠志去骨各壹錢

生地黃貳錢伍分

秫米壹合

酸棗仁炒參錢

右作一劑長流水煎服

獨參湯 治元氣虛弱惡寒發熱或作渴煩躁痰喘氣促或氣虛卒中不語口噤或痰涎上湧手足逆

冷或難產產後不省喘急用好人參二兩或三四兩加炮薑五錢水煎徐徐服蓋人參性寒故以薑佐之如不應急加附子

顛狂

大夫婦人顛狂病者由血氣虛受風邪所爲也人稟陰陽之氣而生而風邪入并於陰則爲顛入并於陽則爲狂陰之與陽有虛有實隨其虛時爲邪所併則發也顛者卒發意不樂直視化地吐涎沫口渴目急手足擦戾無所覺知良久乃甦狂者少卧不飢自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰顛狂也 素問云陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經肝屬木鐵落金也以金制木之意予嘗治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視衆醫多用心藥治

之無效予投養正丹二貼煎乳香湯送下以三生飲  
佐之立愈又一男子亦曾病此證亦用此藥收效且  
養正丹與百一方抱膽丸無異抱膽丸內無硫黃有  
乳香也

薛

劉宗厚先生云有在母腹中受驚者或

有間大驚而得者蓋驚則神不守舍舍空則痰涎歸  
之或飲食失節胃氣有傷痰停胸膈而作當尋火尋  
痰固元氣若頑痰膠固上膈必先用吐法若在腸胃  
亦須下之竊謂此證若因元氣虛弱或痰盛發熱等  
皆是虛象如慢驚證無風可祛無痰可逐但補脾胃

生氣健旺神智自清痰涎自化若誤用辛散祛逐腦

麝之劑必為敗證一婦人素清苦因驚而顛或用  
風痰等藥愈甚余用參芪歸木濃煎佐以薑汁竹瀝  
服三斤餘方愈

防風散 治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無  
度或心神恐懼或言語失常

防風

扶神

去木

獨活

龍齒

研

菖蒲

去毛

石膏

禹餘糧

牡蠣

各壹兩

桂心

各半

甘草

朱錢半

蛇蛻

壹尺

真言

右爲粗末每服參錢水壹盞半煎，去滓溫服。

又方

羚羊角屑

人參

生乾地黃各半錢

獨活

遠志去心

菖蒲去毛

防風兩各半

茯神去木

石膏

麥門冬去心

龍齒別研

白鮮皮兩各壹錢

右爲粗末每服參錢水煎溫服無時。

牛黃清心丸亦可用

方見雜病中風

餘詳雜病本門。

血風煩悶

大婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪入之搏於血脉使氣不通而不潤則生於熱或肢節疼痛口乾少食皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也。薛前證多屬肝脾血虛發熱宜參照前寒熱方論主治酸棗仁散治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁飲食減少並皆治之。

酸棗仁

赤芍藥

赤茯苓去皮

當歸去蘆

紅花子

生乾地黃

羚羊角屑各半錢

防風去叉

羌活去蘆

牛膝酒浸

芎藭

桂心

地骨皮

麥門冬去心

甘草炙各半兩

右爲㕮咀每服八錢水壹中盞半生薑柒片薄荷  
柒葉煎至壹大盞去滓溫服不拘時

紫石英散

紫石英

茯神

麥門冬

去心

人參去蘆

遠志去心

酸棗仁

當歸去蘆

黃芩

各半錢

羚羊角

屑

防風去蘆

黃芪

各半兩

甘草

錢半

枚煎至壹大盞去滓溫服不拘時

當歸散

治婦人血風潮熱

當歸去蘆

芍藥

玄胡索

甘草炙各半兩

熟地黃各壹兩

大黃

蒸柒錢半

桂心半兩

右爲細末每服壹錢水壹盞入乾胭脂壹錢同煎  
至陸分去滓食後溫服

赤芍藥散

治婦人氣血不和心胸煩悶不思飲食

四肢少力頭目昏眩身體疼痛

牡丹皮

白芍苓

赤芍藥

血風煩悶

白芷

甘草

各貳兩

柴胡

壹兩半

右為細末每服貳錢水壹盞生薑壹片棗壹枚同煎至米分溫服食後臨卧

血風攻脾不能食

大脾屬於土脾為中州意智之臟也其肝心肺腎皆受脾之精氣以榮養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人氣血不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既虛為邪所乘則不能消任五穀故不能食也 蔡經云胃乃脾之剛脾乃胃之柔傷胃則脾無所稟受傷脾則不能為胃運化是以脾胃為之表裏籍飲食以滋養百脉者也竊謂前證若飲食所傷六君子湯雜病虛勞卷一若風寒勞役所傷補中益氣湯雜病傷勞卷二若風寒

所傷用入參理中湯雜病霍亂木旺乘土六君加柴胡嘔吐腹痛或大便不實前湯加木香胸膈虛痞或肚腹不寬六君子湯鬱怒傷損肝脾歸脾湯雜病健忘命門火衰火味丸雜病虛勞仍審諸經錯雜之邪而治之假如不能食而肌肉削乃脾胃經本病右關脉緩而弱乃脾胃之本脈若見弦緊或四肢滿明淋溲便難轉筋此肝之脾胃病也若兼洪大或肌熱煩熱面赤此心之脾胃病也若兼沉細或善恐善欠此腎之脾胃病也各當於本經藥中加兼證之藥此東垣先生之治法

也一婦人停食飽悶或用人參養胃湯木香檳榔丸而泄瀉吐痰腹中成塊又與二陳黃連厚朴反加腹脹不食余以爲脾胃氣虛不能消磨用補中益氣加茯苓半夏五十餘劑脾胃健而諸證痊一婦人飲食每用碗許若稍加非太便不實必吞酸嚙腐或用一陳黃連枳實反加內熱作嘔余曰此未傳寒中不信仍作火治虛證悉至月經不止余用六君加炮薑木香數劑諸證漸退又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全愈後因飲食勞倦兼以怒氣飲食頓少元氣頓怯仍用前藥更加發熱脉洪大按之而

虛兩尺如無此命門火衰用補中益氣加薑桂及八味丸兼服兩月餘諸證尋愈此證若因中氣虛弱用人參理中湯或六君子加木香炮薑不應用左金丸兩脇脹痛或越鞠丸雜病虛寒加附子理中湯中寒無有不愈一婦人飲食後或腹脹或吞酸自服枳术丸飲食日少胸膈痞滿腿內酸痛畏見風寒或用養胃湯腿痛浮腫益盛月經不行余以爲鬱結所傷脾虛濕熱下注侵晨用四君子旁歸二陳午後以前湯送越鞠丸諸證漸愈又用歸脾八珍二湯兼服兩月餘而經行一婦人胸滿少食或腹脹吞酸或經候不

調此中氣虛而不能施化也用補中益氣加砂仁香附煨薑而飲食進更以六君芎歸貝母桔梗而經自調一婦人年三十餘忽不進食日飲清茶水果三年餘矣余謂脾氣鬱結用歸脾加吳茱萸四劑遂飲食如常若人脾腎虛而不飲食當以四神丸治之一婦人不進飲食二年矣日飲清茶果品之類肝脾二脉弦浮按之微而結滯余謂肝脾氣鬱用六君木香吳茱萸下痰積甚多飲食頓進形體始瘦卧牀月餘仍服六君之類而康

草豆蔻散

治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲

食

草豆蔻

去皮，白茯苓

去皮，枇杷葉炙

半夏

湯洗朱次切作  
片各半錢半

高良薑

白术

去蘆，

縮砂仁

桂心

木香

青橘皮

甘草炙各

人參

去蘆，  
壹兩

青橘皮

甘草半兩

右咬咀，每服五錢水壹中盞半生薑七片煎至壹太盞，大淳溫服，不拘時候。  
訶梨勒散 治婦人血風氣攻脾胃，腹脇妨悶，四肢煩疼，或時癥逆不下飲食，

訶梨勒皮

陳橘皮

各壹兩半夏

湯洗朱次切片

人參

去蘆，

桂心

白术

去蘆，

細辛

去苗土，

當歸

炒去蘆，

甘草炙各

藿香

赤茯苓去皮，

芍藥各半錢

右製煎服法同前。

神麴丸 治婦人血風氣攻脾胃，腹脇脹滿不思飲食

神麴

白术去蘆，

附子炮去皮臍，

枳實

麸炒去穰，

訶梨勒皮

桂心

食茱萸

木香

陳橘皮去白，

人參

去蘆各壹兩

桔梗

去蘆

乾薑

炮各半兩

右爲細末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服參拾丸空心食前生薑湯下日進貳服

進食散 李潛云治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾胃虛全不入食者只兩服能食

陳云此方旣有川烏治益風攻

脾不食豆無良驗

青皮

陳皮

粉草

桂心

良薑

各貳錢半去核

草豆蔻仁

各叁枚

訶子

伍枚去核

爲細末每服壹錢水壹盞生薑叁片煎七分溫服

### 身體骨節疼痛

大婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調爲風所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也薛東垣先生云飲食失節脾胃虛弱乃血所生病故口中津液不行若火熱來乘土位故肢體發熱作渴若肝經血熱用四物雜病虛勞羌活黃芩黃檗肝經血虛用逍遙散調山梔川芎風濕兼痰用四物南星半夏羌活蒼朮風濕傷腳腰痛暑濕傷氣用清燥湯雜病氣鬱合用羌活勝濕湯雜病暑濕傷氣用清燥湯傷暑氣鬱合用四君木香枳殼檳榔胃氣受傷用補中益氣肝脾用四君木香枳殼檳榔胃氣受傷用補中益氣

湯雜病傷勞倦瘀血流注用四物桃仁紅花骨痛筋攣用當歸沒藥丸本條倦怠無力用補中益氣羌活川芎一婦人自汗盜汗發熱晡熱體倦少食月經不調吐痰甚多二年後遍身作痛陰雨益甚此氣虛而風寒所乘用小續命湯疼痛頓止又用補中益氣加味歸脾三十餘劑諸證悉愈一婦人月經不調且素有痛風遇勞必作用衆手重按痛稍止此氣血俱虛用十全大補雜病虛勞加獨活而痛痊用六味丸雜病虛勞逍遙散而經調一婦人肢體作痛面色痿黃時或未白發熱惡寒吐瀉食少腹痛脹月經不時或始崩漏

或痰盛喘嗽頭目眩痛或五心煩熱口渴飲湯或健忘驚悸盜汗無寐等證臥牀年許悉屬肝脾虧損氣血不足所致用十全大補加味歸脾兼服月餘諸證悉痊

芎藶散

壹兩

思飲食

川芎

壹兩

酸棗仁

炒

木香

枳殼去穰炒

桂心

當歸

去蘆

赤茯苓去皮

赤芍藥

牛膝酒浸各半錢

羌活去蘆

甘草炙各半兩

右爲哎咀，每服參錢水壹大盞半薑五片煎至壹大盞去滓熱服，不拘時候。

海桐皮散 治婦人血風身體骨節疼痛。

海桐皮

桂心

白芷

當歸

去蘆

漏蘆

川芎

川大黃

木香

檀榔

各半

麝羊角屑

各壹兩

赤芍藥

沒藥

另研

右爲細末，每服貳錢溫酒調下，不拘時。

虎骨散 治婦人血風攻疰身體疼痛。

虎胫骨

壹兩半

麝香

貳錢半

桂心

川芎

海桐皮

當歸

去蘆

牛膝

酒浸

天麻

附子

炮去皮臍

骨碎補

沒藥

另研

琥珀

另研

羌活

去蘆

木香

各半

右爲細末，入研藥令勻，每服貳錢溫酒調下，不拘時候。日進貳服。

何首烏散 治婦人血風身體骨節疼痛，或手足痺，腰胯沉重牽拽，不隨並皆治之。

何首烏

羌活

去蘆

當歸

炒去蘆

赤箭

附子

炮去皮臍

桂心

赤芍藥

芎芻

羚羊角屑各半錢半兩

歲靈仙

牛膝酒浸各一兩

防風半兩去蘆

右爲細末，每服貳錢豆淋酒調下。

通靈丸

治男子婦人手足疼痛，風走注痛不可忍。

白附子炮

僵蠶炒各一兩

全蝎半兩炒

麝香另研壹字

右爲細末，煉蜜和丸如梧子大，每服貳參十九溫酒送下，日進參服不拘時。

當歸沒藥丸

治婦人血風血氣，腹脇刺痛，筋攣骨痺，手足麻木皮膚瘡癩，並宜服之。

當歸

去蘆

五靈脂炒各一兩

沒藥半兩另研

右爲細末，醋糊和丸，如梧子大，每服參拾丸，空心溫酒送下，生薑湯亦可。日進貳服。

四生丸

治血風骨節疼痛，舉臂不起，行履艱難，遍身麻痺。

白僵蠶炒

地龍去土

白附子生

五靈脂炒

草烏頭去皮尖，生各等分

右爲細末，以米糊和丸，梧子大，每服貳拾丸，溫酒送下，或作末酒調半錢，亦可。日進貳服，不拘時候。

羚羊角散

治血風身體疼痛，手足無力，心神壅悶。

羊角屑

酸棗仁 炒

生乾地黃

檳榔

各一兩

五加皮

當歸

骨碎補

炒去毛

赤芍藥

羌活

各一錢半

防風

海桐皮

川芎

各一錢半

甘草

半兩

右爲末，每服貳錢，溫酒調下。

羌活勝濕湯 治頭痛，脊痛似折，項似拔。

羌活

獨活 各一錢

藁本

防風

甘草 炙各半錢

蔓荆子

川芎 各一錢半  
右水煎服。如身重，腰沉沉然。

是濕熱也。加黃檗一錢，附子半錢，蒼朮貳錢。

走症痛

大夫婦人體虛，受風邪之氣，隨血而行。或淫易皮膚卒然掣痛，遊走無有常處，故名爲走症也。加減小續命湯主之。  
薛東垣云：若人身體沉重，走症疼痛，此濕熱相搏，或風熱鬱而不得伸，附著於有形，也是證多因飲食起居失節，或因七情勞役失宜，脾胃虧損，腠理不密，外邪所侵，以致內熱，晡熱自汗，盜汗，或經候不調，飲食不甘，治法濕熱腫痛者，清燥湯雜病傷暑兼；瘻，佐以二陳湯雜病；肝火作痛者，加味逍遙散；脾鬱作痛者，加味歸脾湯；血虛作痛者，四物湯；氣虛作痛，

者四君子湯氣血俱虛者八珍湯俱加羌活川芎月經先期而痛者加味逍遙散頭眩倦怠而痛者補中益氣湯大抵按之痛甚者病氣實按之痛緩者元氣虛勞役而痛者亦元氣虛也飲食失宜而痛者脾氣虛也惱怒而痛者肝火盛也若晝輕而夜重者血分病也一婦人歷節發熱作渴飲食少思月經過期其脉舉之洪大按之微細用附子八物湯四劑而痛止用加味逍遙而元氣復用六味丸而月經調一婦人體肥胖素有熱月經先期患痛風下體微腫痛甚則小便頻數身重脉緩此風濕血虛有熱用羌活

勝濕湯二劑腫痛漸愈用清燥湯數劑小便漸清用加味逍遙散內熱漸愈又爲飲食停滯發熱仍痛面目浮腫用六君加柴胡升麻而愈又因怒氣小腹痞悶寒熱嘔吐用前藥加山梔木香而安惟小腹下墜似欲去後此脾氣下陷用補中益氣而愈後因勞役怒氣作嘔吐痰遍身腫痛經行寒熱此肝木侮脾土用六君加柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中益氣而安一婦人飲食少畏風寒患痛風嘔吐寒熱脈弦緊用附子八物湯而四肢痛愈用獨活寄生湯而腰痛漸痊惟兩膝腫痛用大防風湯而痛漸愈用

歸脾逍遙而元氣復

沒藥散 治婦人血風走疰肢節疼痛發時來往不定

沒藥 另研

乳香 另研

芎芻

當歸 炒去蘆

桂心

漏蘆 去蘆

木香 各半兩

白芷

琥珀 另研

地龍 去土微炒各半錢

安息香 另研

麝香 另細研各貳錢半

為細末入研藥

拌勻每服壹錢溫酒調下不拘時

琥珀散

治婦人血風走疰疼痛來往疼痛

琥珀 另研

當歸 去蘆

牛膝 酒浸

羌活

去蘆

川大黃

剉微炒各半錢半

桂心

壹兩

沒藥 另研

血竭 另研

乾漆

炒烟盡

玄胡索

防風 去蘆

羚羊角屑

各半兩

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時日進貳服

虎骨散

治婦人血風走疰疼痛痛不可忍

虎脛骨

酥炙貳兩

乾蝎 炒

琥珀 另研各半兩

當歸 炒

威靈仙

牛膝 酒浸

羌活 去蘆

漏蘆 去蘆

芎窮

沒藥 另研各半錢

右爲細末每服貳錢溫酒調下不拘時候日進貳服

雄黃散 治婦人血風走疰疼痛

雄黃

研水飛去皮

血竭

另研

赤箭

側子

炮去皮

桂心

沒藥

另研

木香

白芥子

地龍

炒去土

蜘蛛

各半兩生用

麝香

貳錢半另研

烏蛇

貳兩酒浸去皮骨炒微黃

右爲細末入研藥更研令勻每服貳錢熟酒調下不拘時候日進貳服

漏蘆散 治婦人血風走疰疼痛無有常處

漏蘆

當歸

牛膝

各參分

桂心

地龍

去土

防風

羌活

白芷

沒藥

研

甜瓜子

各半兩

虎脛骨

酥炙

敗龜板

醋炙各壹兩

右爲細末每服貳錢熟酒調下無時

四生丸

見前

麝香丸

治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲

蟻晝靜夜劇及一切手足不測疼痛

大八角川烏頭

參枝去皮尖生用

生全蝎

貳拾箇

生黑豆

貳拾粒

生地龍

去土半兩

爲細末入麝香壹字同研停糯米糊爲丸如菉豆大每服七丸甚者拾丸夜卧令鬲空溫酒吞下微出冷汗一身便瘥許學士云予得此方凡歷節及不測疼痛一服便瘥在歙州日有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如蟲蟻其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服效

芍藥知母湯治諸肢節疼痛身體魁癩脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐

桂心

知母

防風

各肆兩

芍藥

麻黃

去根節

甘艸

各參兩

附子貳兩炮

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑五片煎七分去滓空心服一方有白术川芎杏仁半夏

附子八物湯

治風歷節疼痛四肢如鎚鑽不可忍

附子

乾薑

芍藥

茯苓

人參

甘艸

桂心各參兩

白朮肆兩

右咬咀每服四大錢水貳盞煎七分去滓食前服

一方去桂用乾地黃貳兩

獨活寄生湯

方見雜病腰痛

卷之二  
小續命湯 治白虎歷節痛不可忍

方見雜病中風

陳一婦人先自兩足踝骨痛不可忍次日流於膝三日流於髀骨甚疼至於肩肩流於肘肘流於後溪或如鎚鍛或如虫竄痛不可忍晝靜夜劇服諸藥無効召僕診之六脉緊急曰此真歷節證也非解散之藥不能愈但用小續命湯一劑而痊又鄧安人夏月亦病歷節痛不可忍諸藥無効召僕診之入迎與心脉虛此因中暑而得合洗股酒蒸黃連丸衆醫莫不笑用此藥服一貼即愈自後與人良驗

治婦人血風走疰腰膝骨節疼痛不可忍

附子生

薰陸香

杏仁研

桂心

當歸

芸薹子

芫花

巴豆去皮

松脂

壹兩半

右爲細末鎔黃蠟五兩攪和諸藥捏作片子包裹痛處立効

又方

芫花

桂心各壹兩

漢椒貳兩

桑根白皮

參兩

芸薹子

柳艸屑各伍

右爲細末用醋一升拌和蒸令熟用青布裹熨痛

處冷卽更入醋蒸用之

治婦人血風走疰腰胯脚膝疼痛

天仙子

川烏頭生

附子生

各壹兩

右爲細末以酒煎成膏攤於帛上敷貼痛處多半年者不過三上効

頭目眩暉

大婦人頭眩由氣虛風入於腦循脈引於目系目系急而然也邪甚則必癲素問云頭痛癲疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎猶蒙招搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暉猶家者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暉之狀故肝厥頭痛不同也薛丹溪先生云眩者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也若風則

有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也若鬱結生痰而眩暈者此七情虛火上逆也若淫慾過度而眩暈者此腎虛氣不歸源也若吐衄漏崩而眩暈者此肝虛不能攝血也有早起眩暈須臾自定者元氣虛也正元飲雜病自汎下黑錫丹頭痛傷濕頭暈用腎着湯傷濕加川芎有痰用青州白丸子雜病中風頭風熱也久則目昏偏頭風相火也久則目緊便澁皆宜出血以開表之竊謂前證肝虛頭暈用釣藤散腎虛頭暈六味丸雜病虛勞頭暈吐痰養正丹不應八味丸雜病虛勞血虛四物參苓白朮不應當歸補血

湯雜病勞倦氣虛四君歸芪不應補中益氣湯雜病肝木實瀉青丸雜病頭痛虛用地黃丸虛勞不應川芎散脾氣虛二陳參木柴胡升麻不應益氣湯加茯苓半夏脾胃有痰半夏白朮天麻湯風痰上涌四神散發熱惡寒八物湯雜病虛勞七情氣逆四七湯傷濕而暈除濕湯雜病中濕一婦素頭暈不時而作月經遲而少此中氣虛弱不能上升而頭暈不能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞什地月經如涌此勞傷火動用前湯加五味子一劑而愈前證雖云氣無所附實因脾胃虧損耳一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下

詳下嘈雜門

養正丹 治虛風頭眩吐涎不色。此藥升降陰陽，補接真氣，非止頭眩而已。

黑鉛

水銀

硫黃

朱砂

研各  
壹兩

右用建殘壹隻，火上鎔，成汁。次下水銀，用柳枝子打停，取下歇少時，入貳味，打停候冷，取下研爲粉。以糯米軟飯丸，如棗豆大。每服參拾丸，棗湯吞下，空心食前日，貳服。

釣藤散

本事

治肝厥頭暉，清頭目。

釣藤

陳皮

去白

半夏

湯洗柒次  
切片子

麥門冬

去心

茯苓

去皮

茯神

去木

人參

去蘆

甘菊花

防風

去蘆  
各半兩

甘草

炙  
貳錢半

石膏

壹兩

右咬咀，每服四錢水，壹盞半生薑七片煎至壹盞去滓，熱服。日進貳服。

獨活散

去滓，治婦人風眩頭疼，嘔逆，身體時痛，情思昏悶。

獨活

壹兩

白术

去蘆

防風

去蘆

細辛

去苗

人參

去蘆

芎藭

豆自取量

半夏湯

水沈米次

炙甘草

荆芥各半  
錢半

半夏切片子  
兩

赤芍藥各半  
兩

石膏貳兩

右㕮咀每服八錢水壹中盞半生薑七片薄荷七葉煎至壹大盞去滓溫服不拘時

川芎散 治風眩頭暉

川芎

山藥

白茯神去木

甘菊花野菊不用

人參各半兩去蘆

山茱萸肉壹兩

右爲細末每服貳錢溫酒調下不拘時候日進參服

四神散 治婦人血風眩暉頭痛

川芎

當歸

去蘆

旋復花

荆芥穗各等分

菊花

當歸

去蘆

旋復花

右爲細末每服貳錢水壹盞葱白參守茶末壹錢煎至七分通口服良久去枕仰卧少時  
斗門方 治血風頭旋或不知人事用喝起草嫩心陰乾爲末酒服貳錢其功甚効卽前蒼耳散治頭旋如天動地轉名曰心眩膽礬壹兩細研用麪餅劑壹箇拌勻勒如骰子大瓦上焙乾每服壹骰爲末燈心竹茹煎湯調下此去痰之法當審而用之

頭痛

薛東垣云足太陽頭痛脉浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黃為主手少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主足陽明頭痛身熱目疼鼻乾惡寒發熱脉浮緩而長升麻湯升麻葛根或石膏白芷為主手太陽頭痛有痰體重或腹痛為癩癬脉沉緩蒼朮半夏南星為主足少陰經頭痛足寒氣逆為寒厥脉沉細麻黃附子細辛湯傷寒太陽為主足厥陰頭項痛或吐涎沫厥冷脉浮緩吳茱萸湯傷寒吐主之諸血虛頭痛當歸川芎為主諸氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中

益氣湯

雜病勞倦

少加川芎蔓荆細辛，痰厥頭痛，半夏白

朮天麻湯

眩暈雜病

厥逆頭痛，羌活附子湯

頭痛雜病

如濕氣

在頭者，以苦吐之，不可執方而治。若脉雜亂，而病見  
不一，且補胃為主。一婦人因勞耳鳴，頭痛體倦，用  
補中益氣加麥門五味，而痊。三年後得子，因飲食勞  
倦，前證益甚。月經不調，晡熱內熱，自汗盜汗，用六味  
地黃丸補中益氣湯頓愈。經云：頭痛耳鳴，九竅不利。  
腸胃之所生也。故脾胃一虛，耳目九竅皆為之病。  
一婦人兩眉稜痛，後及太陽，面青善怒。此肝經風熱  
之證，用選奇湯

頭痛雜病

合逍遙散

調經

加山梔天麻黃芪

半夏黃芩而愈。此證失治，多致傷目，或兩耳出膿，則  
危矣。

旋覆花湯 許叔微云：婦人患頭風者，十居其半。每  
發必掉眩，如在車船上蓋。因血虛肝有風邪襲之，  
爾予嘗處旋覆花湯。此方修合服之，比他藥甚効。

川芎

當歸

去蘆

羌活

去蘆

旋覆花

細辛

去苗

蔓荆子

去蘆

防風

去蘆各

石膏

藁本

去蘆

荆芥穗

半夏麩

乾地黃

甘草

炙各半兩

右咬咀每服五錢水壹盞半生薑五片煎至七分去滓溫服日進貳服

七生丸 治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥氣厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治之

川烏頭

草烏頭

天南星

參味並生去皮

半夏

冷水洗去滑

川芎

白芷

石膏

並生用各等分

右爲細末研韭菜自然汁丸如梧桐子大每服七丸加至拾丸嚼生葱茶送下食後日進貳服

陳嘗治鄧安人頭痛如破諸藥無効加北細辛等分全蠶減半爲丸服貳拾粒卽愈

藥隱老人云若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒中於骨髓留而不去腦爲髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲鬚穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右白附子散

白附子

炮壹兩

烏頭

炮去皮臍

天南星

炮

麻黃

不去根節各半兩

乾薑

炮

全蠶

炒伍枚

麝香

另研壹字

右爲細末每服壹錢溫酒調下不拘時候

治頭風痛不可忍

硝石

人中白

腦子 各等分

右研令極細每用一字搐入鼻中

川芎茶調散

治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛

薄荷

捌兩

川芎

荆芥 各肆

羌活

白芷

防風

甘草

炙各貳兩

細辛 壹兩

右爲末每服貳錢食後茶清調下

如聖餅子

和劑

治男婦氣厥上盛丁虛痰飲風寒伏留

陽經偏正頭疼痛連腦顛吐逆心目瞑耳聾常

服清頭目消風化痰暖胃

防風

生半夏

天麻 各半

天南星 洗

川烏

去皮尖

乾薑 各壹兩

川芎

甘艸

炙各貳兩

爲細末湯浸蒸餅和丸茱實大捻作餅子日乾每服伍餅同荆芥穗參伍莖細嚼茶酒湯任下無時若頭痛筋攣骨重少氣噦噫腹滿時驚不嗜卧欬嗽煩冤其脉舉之則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥頭痛宜玉真丸與硫黃丸

玉真丸

硫黃

研參兩

硝石 貳分

石膏

煅研

半夏 湯洗爲末各壹兩

右研令停勻生薑自然汁打糊圓如梧子大生薑

湯下參拾圓

一方無半夏有天南星

硫黃丸

治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不

治服此除根

硝石

壹兩

硫黃

貳兩

右研令極細滴水丸如指頭大空心蠟茶清嚼下  
壹丸百一方云中暑者以水服之下咽即洒然  
治傷冷以艾湯下

裕陵傳王荆公偏頭疼方石是禁中祕方用生薑菔  
汁蜆殼仰卧注鼻中左痛注左右痛注右或兩鼻皆  
注亦可數十年患皆一注而愈

心痛

大夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪  
氣乘於心也其痛發有死者有不死者成證者心為  
諸臟之主而主於神其正經不可傷傷之而痛者名  
為真心痛朝發夕死夕發旦死心之支別絡為風冷  
所乘而痛者故痛發乍輕乍甚而成證者也薛前  
證若寒邪所傷溫散之飲食停滯消導之肝火妄動  
辛平之脾氣鬱結和解之仍與後六證方藥同用  
一婦人久患心痛飲食少思諸藥到口卽吐予以為  
脾土虛弱用白朮一味同黃土炒去土每服壹兩以

米泔煎濃徐服少許數日後自能大飲用三斤餘而不愈因執喪旬月每欲眩仆一日感氣忽患心脾高腫作疼手不可按而嘔吐不止六脉微細或見其形實誤認諸痛不可補氣乃用青皮木香五味吳茱萸等藥而愈繼復患瘧且墮胎又投理氣行血之藥病雖去元氣轉脫再投參芪歸木附子薑桂劑間用八味丸五日寢食漸甘六脉全復此證若心脾疼痛絕逆乎至診之曰形雖實而脉虛極反用理氣之劑損其真氣故也連投參芪歸木附子薑桂劑間用

時卽服此等藥瘧亦不作矣

天烏藥散

治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥

莪茂

桂心

當歸炒

桃仁

青皮

木香各等分

爲末每服貳錢熱酒調下

阿魏丸 治婦人血氣攻心疼及一切積冷氣

當歸

桂心

青皮

附子炮

阿魏麪裏煨以度白度

白术

川芎各壹兩

吳茱萸炮

木香

乾薑各參分

檳榔

肉豆蔻煨

延胡索

莪朶各壹兩

朱砂細研半兩

右爲末先以醋壹升煎阿魏成膏和藥末搗參百  
杵丸如梧桐子大每服貳拾丸食前熟酒下  
雞舌香散 治男子婦人九種心痛一切冷氣

良薑

剉細油炒

桂心

赤芍藥各分

右爲細末每服貳錢水壹盞入鹽木瓜參片同煎  
七分溫服鹽湯點亦可血氣疝瘕痛用熟醋湯調  
下忌生冷

應痛散 治心脾痛不可忍者婦人脾血氣作心脾

痛尤効前方同只無桂心用醋煎醋湯點亦可  
乙未年春初次女年十五經脉未行初一日心痛  
如刺吐飲不止脈沉緩弦細以蘇合香丸神保丸  
沉香丸理中丸訶子散七氣湯皆無効余思之此  
證非蟲卽飲作疾非局方九痛丸則不可遂合與  
服一二丸卽愈矣

陳氏二神丸 治婦人血氣不和作痛不止及下血  
無時月水不調

真蒲黃炒

草撥鹽炒

右等分爲細末煉蜜丸如梧子大每服參拾丸空

心痛

大半二

醫方

心溫酒下如不能飲米飲吞下兩服即止  
陳日華抽刀散 治婦人血風血氣等疾武興戎司  
機宜俟愷不至云見一道人用此方療病不一而足遂  
以爲獻真至是奇妙

五靈脂炒壹兩 茂義

桂心

芸薹子炒各半兩

右爲末每服貳大錢酒半盞水半盞煎至八分疾  
作熟服

失笑散見產後心痛 詞子散見霍亂亦妙

靈苑方 治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂爲細

末每服壹錢酒壹盞煎沸熟服

局方四七湯加良薑又沉香降氣湯分心氣飲皆治  
心痛良三方並見

心腹痛

大婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘於其體與真氣相擊而痛其痛隨氣上下或上衝於心或下攻於腹故云血氣攻心腹痛也薛前證若氣滯血瘀用沒藥散勞傷元氣用補中益氣湯雜病傷肝脾鬱結用四七湯雜病怒動肝火用小柴胡湯熱入肝脾血虛用四物湯治肺脾氣虛用四君子湯雜病血室肝氣虛弱用補中益氣湯氣血俱虛用八珍湯即雜病虛勞八物湯一婦人每怒心腹作痛久而不愈此肝火傷脾氣也用炒山梔一兩生薑五片煎服而痛止更以二

陳加山梔桔梗乃不再發。一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛諸藥不應用歸脾湯雜病健忘倍加炒山梔而愈。陳湖陸小朴母久患心腹疼痛每作必胸滿嘔吐手足俱冷面赤唇麻咽乾舌燥寒熱不時月餘竟夕不安其脉洪大衆以瘓火治之屢止屢作迨至已春發頻而甚仍用前藥反劇此寒涼損真之故內真寒而外假熱也且脈息洪弦而有怪狀乃肺氣虧損肝木乘之而然當溫補胃氣遂用補中益氣湯加半夏茯苓吳茱萸木香丁服熟寐徹曉洪脈頓歛怪脉頓除諸證釋然。

三神丸 治室女血氣腹中刺痛痛引心端經行澀少或月水不調以致疼痛

橘皮

貳兩焙

當歸

酒浸炒

玄胡索

醋煮各壹兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空

心溫酒送下

沒藥散 治一切血氣脣腹撮痛及產後惡露不下

見枕塊痛

沒藥

血竭

桂心

玄胡索

當歸

蒲黃

紅花

乾漆

炒烟盡

木香

芍藥各等分

右爲細末每服貳錢食前溫酒調下

大延胡索散 治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索

當歸

川芎

赤芍藥

桃仁各半兩

枳殼

熟地黃壹兩

右咬咀每服參錢水壹盞薑叁片煎至七分去滓

熟服

琥珀散 治婦人血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不止

琥珀

另研

沒藥

另研

當歸

炒

赤芍藥

牡丹皮

延胡索

蒲黃

莪茂

桂心各等分

右爲末每服壹錢溫酒調下

瑞金散 治婦人血氣撮痛月經不行預兆嘔吐疼

痛

玄胡索

牡丹皮

紅花各壹錢

片薑黃

貳錢半

赤芍藥

莪茂

作壹服水壹鐘酒壹鐘同煎至壹鐘食前服

牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛不

思飲食

牡丹皮

京三稜

赤芍藥

玄胡索

官桂 各壹錢

當歸各壹錢半

莪朶

牛膝各貳錢

右煎服法同前

八慨散 治血氣心腹疗痛立驗

當歸

厚朴

芍藥

枳殼製

人參各肆分

甘草

茯苓各伍分

肉豆蔻貳分

右爲末水貳升煮取八合空心分參服

又八仙散

靈苑

治證同前

棕櫚

貳兩

當歸壹兩並剉碎丁處燒成炭細研

麝香

壹錢細研

右同研令停每服壹錢溫酒調下

玄胡索湯 治婦人室女七情所感血與氣併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦一切血氣經候不調並宜服之

玄胡索

蒲黃

赤芍藥

片薑黃

當歸去蘆各壹錢半

乳香

木香不見火

官桂不見火

沒藥各壹錢

八角形  
甘草 半錢

方系二

右作壹服水貳鍾生薑卷片煎至壹鍾食前服  
大効琥珀散靈苑 治婦人心膈迷悶腹臟搘撮疼痛  
氣急氣悶月信不調等疾

烏藥

莪茂 各貳兩

當歸 壹兩

右並生爲細末溫酒調一錢服服後以食壓之忌  
生冷油膩等物如是產後諸疾炒生薑酒調下  
治血氣不調臍下痛

桑耳

菴蘭子

桂心

土瓜根

川芎

甘艸 貳分

牛膝

赤茯苓

大黃

白芍藥 各半錢

乾地黃

捌分

右爲末煉蜜丸如梧桐子大醋湯吞下貳十丸  
麝痛散 治婦人血氣刺痛

荔枝核

燒存性

香附子

去毛炒

右爲細末鹽湯米飲調下貳錢不拘時候

沒藥散 治婦人血氣疼痛不可忍者

出博濟方

紅花

沒藥

研 延胡索

當歸 各等分

右爲末每服貳錢童便半錢酒半錢同煎至六分

心用利  
熱服用燒赤秤錘淬過調服亦可常服只用溫酒

菖蒲丸 治婦人脾血積氣及心脾疼

菖蒲九節者 陸兩

吳茱萸炮

香附子炒去毛 各肆兩

右三味並剉細以釀醋五升煮乾為度焙乾研細末以好神麪打糊為丸如梧桐子大空心食前以淡薑湯吞下四五拾丸日參服橘皮湯下亦好

手拈散 治血氣心腹疼痛

草菓

玄胡索

五靈脂

爲末每貳錢溫酒調服

沒藥各等分

木香枳术丸 破滯氣消飲食開胃進食消化痰涎

木香

枳實炒各壹兩

白术

貳兩

右每服五錢薑棗水煎服

木香化滯湯 治脾胃虛弱飲食停滯腹脹作痛或心下痞滿不思飲食若憂愁飲食而致者尤宜用之

木香

紅花各參錢

橘皮

當歸尾

枳實炒各貳錢

柴胡

肆錢

草豆蔻

甘草炙各半兩

半夏

壹兩

右每服參五錢薑水煎服

心腹痛

丸利二

木香

白术

甘草

小腹痛

大婦人小腹疼痛者此由胞絡之間夙有風冷搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛也

薛中

前證若氣寒血結用威靈仙散氣滯血凝用當歸散肝經血虛用四物湯治加參术柴胡肝經濕熱用龍膽瀉肝湯雜病淋肝脾氣虛用六君子湯雜病虛勞加柴胡芍藥肝脾虛寒用六君子加柴胡肉桂若兼嘔吐加木香四肢逆冷再加炮薑通府張益威不其妹小腹痛服附子理中湯附子服過八十餘枚此乃沉寒痼冷之甚不多有者

聖集

大威靈散

治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

威靈仙

壹兩

當歸

沒藥

木香

桂心

各半兩

右爲細末無時熟酒調下壹錢服忌茶

當歸散

治婦人久積血氣疗刺小腹疼痛四肢無

力不能飲食

當歸

炒

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳殼

延胡索

各等分

右爲細末熟酒調下壹錢無時候

追氣丸

靈芝

治婦人血刺小腹疼痛不可忍

芸薹子

微炒

桂心

各壹兩

良薑

半兩

爲細末醋糊丸如梧桐子大每服五丸不拘時淡

醋湯下常服補血虛破氣塊甚有効

石灰散

治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方

右取猪貼脊血半盞於湯上候用杖子攪停後用

石灰於火上燒令黃爲末羅過灰壹錢同血攪停放溫服立愈

予嘗用紫金皮爲細末醋糊丸如櫻桃大又治婦人血氣小腹疼痛以溫酒磨下壹丸及有心腹痛者亦良

吳茱萸湯

治婦人素虛又爲風冷乘氣停滯腹脇

刺痛

吳茱萸

湯洗

當歸去蘆各

桔梗去蘆

細辛

去苗半

熟地黃

貳錢

防風去蘆

乾薑

炮各

甘草

炙半

桔梗

去蘆

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾空心服

椒紅丸

治婦人血氣不調臟腑積冷臍腹疔痛肌

體日瘦

椒紅

阿魏去核

沉香

當歸

去蘆

阿魏

去核

蓬术

附子

炮去皮臍

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾空心服

白术

各壹兩

肉豆蔻

另研

良薑

丁香

各半兩

麝香

貳錢半

瓜薑

右爲細末

煉蜜和丸如梧子大

每服參拾丸空心用溫酒送下

大腹皮飲

治婦人血癖單腹痛

大腹皮

防已

木通

桑白皮

厚朴

瓜薑

黃芪

陳皮

枳殼

大黃

蒸各壹錢

青皮

壹錢半

五味子

半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾入酒半盞再煎一二

小腸痛  
沸去滓食前服

丁香兩  
白朮兩  
桑白皮一錢半  
肉豆蔻一錢半  
白芷

項筋強痛

陳良甫云婦人項筋拘攣強痛每得此疾療之似易而實難然方冊中所載亦少縱有言之議論亦畧以予考之然旣有是疾必有是方何古人言此疾證尚且略又無的然之論詳之必是挾諸疾而生所以絕無專門予因暇白摭古名方以備檢閱然自明學識淺鄙未必全備博學之士見其遺缺尚冀補而完之夫頸項之處乃屬足太陽膀胱之經又許大學云是足少陰腎之經蓋腎與膀胱爲表裏故也以感外邪論之則有太陽經先因感風又感寒濕致令外證

發熱惡寒與傷寒相似頸項強急腰身反張如中風  
狀瘡癰口噤其身體凡凡古人以強直爲症其脉沉  
遲弦細新產血虛多汗出喜中風亦有此證詳見產

後中風茲不贅錄又有挫枕轉項不得者與三五

七散追風散仍與急風散擦項上若因被風吹頭

目昏眩太陽并腦俱痛項背筋脈拘急可與蝎附散

都梁丸許太學治項筋強痛不可轉側以木瓜煎

味丸雜病虛勞風熱淫肝加味道遙散調經怒動肝火加味

小柴胡熱入血室肝經血虛加味四物湯即四物加柴胡丹皮山梔

腎不能生肝六味丸膀胱氣滯羌活勝濕湯

雜病腰痛

太抵肝火旺則肝血虛而筋燥頸項強急或腰背反  
張或四肢攣拳或頸項等處結核一婦人耳內或  
耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火兼  
傷脾胃用四君加柴胡升麻黃芪芍藥而愈後因勞  
役怒氣嘔吐脇脹用六君子湯加山梔柴胡而安  
一婦人因怒寒熱作渴左目緊小頭頸動掉四肢抽  
搐遍身疼痛此血虛肝熱則生風也用加味道遙加  
釣藤鉤數劑諸證漸愈又用八珍湯而痊

追風散治年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血

氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暉心忪煩熱百節痠疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血

風攻症頭自昏痛皆治之

川烏

炮去皮睛

防風

去蘆

石膏

煅

川芎

甘草

炙

荆芥穗

白僵蠶

炒去絲各壹兩

天南星

炮

天麻

地龍

白附子

炮

全蝎

去尾針

白芷

研各半

沒藥

研

乳香

研

雄黃

研各貳錢半

草烏頭

參兩內蘸令冷餘一半生用

丹砂

另研壹兩水飛

黑豆

貳錢伍分同草

麝香

另研貳錢半

急風散

右爲細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨時服常服清頭目利咽喉消風化痰

草烏頭

參兩內蘸令冷餘一半生用

丹砂

另研壹兩水飛

黑豆

貳錢伍分同草

麝香

另研貳錢半

右爲細末入研藥勻停酒調塗痛處

蝎附散 治一切風邪頭痛夾腦風痰涎壅盛嘔逆惡心口吐清水暗風旋暉眼見黑花牙關緊急口眼喎斜面赤瞞動頭項拘急肩背引疼耳聟目昏四肢麻木及沐浴出暴感風邪頭自昏痛兩太陽

疼遠年頭風服諸藥無効並皆治之

全蝎

炮

雄黃

水飛

硃砂

各壹錢半小飛

附子

炮去皮臍

川烏頭

炮去皮臍

麻黃

去節

天南星

薑製

防風

去蘆

白僵蠶

炒各參錢

藁本

去蘆土

白芷

各半兩

右爲細末每服半錢葱茶調下食後孕婦不可服  
京城之醫用此藥兼嚼如聖餅子治眼羞明多  
淚見物不明有效一方用白附子蝎稍

木瓜煎

宣州木瓜

貳枚切薄作蓋剝去瓢

沒藥

貳兩另研

右二味入木瓜中用蓋子合竹簾定之飯上蒸  
三四次爛研成膏子每服三匙生地黃汁半盞無  
灰好酒一盞調和服之有久患此病自午後發  
黃昏時定予曰此患必先從足起經言十二經絡  
各有筋惟足少陰之筋自足至頭大抵筋皆肝  
之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽  
中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶祕  
法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣  
故發於是時予授此方三服而愈

餘證治論方俱詳雜病本門

兩脇脹痛

夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪正交爭衝擊故令兩脇脹痛也

薛東垣先生

云胸脇作痛口苦舌乾寒熱往來發嘔發吐四肢滿悶淋洩便難腹中急痛此肝木之妄行也竊謂前證若暴怒傷血用小柴胡芎歸山梔氣虛用四物參木柴梔若久怒傷氣用六君芎歸山梔若氣血俱虛用六味地黃丸若經行腹痛寒熱晡熱或月經不調發熱痰咳少食嗜卧體痛用八珍柴胡丹皮若脇脹發

熱口渴，唾痰或小便淋瀝，頸項結核，或盜汗，便血，諸血失音，六味丸，若兩脇作脹，視物不明，或筋脈拘急，面色青，小腹痛，或小便不調，用補肝散，若聚用香燥之劑，反傷清和之氣，則血無所生。諸證作焉，丹溪先生云：右脇痛，用推氣散；小龍薈丸，當歸龍薈丸，控涎丹，抑青丸，十棗湯，皆病氣元氣俱實之劑，用者審之。一婦人性急，吐血發熱，兩脇脹痛，日晡益甚，此怒氣傷肝，氣血俱虛也。朝用逍遙散，倍加炒黑山梔黃，茱萸，貝母，桔梗，麥門冬，夕以歸脾湯送地黃丸而愈。一婦婦內熱，晡熱肢體痠麻，不時吐痰，或用清氣散，調理而康。

化瘀藥，喉間不利，白帶，腹脹，用行氣散；血藥，胸痛不利，肢體時麻，此鬱怒傷肝，脾而藥益甚也。予則朝用歸脾湯，以解脾鬱，生脾氣，又用加味道，逍遙散，以清肝火，生肝血，百餘劑而愈。後因怒飲食日少，肢體時麻，此乃肝火侮土，用補中益氣，加山梔茯苓半夏而痊。又飲食失調，兼有怒氣，肢體麻甚，月經如注，脉浮洪，而數，此脾受肝傷，不能統血，而致崩，肝氣虧損，陰血而脉大繼，用六君，如芎歸炮薑，而血崩止，又用補中益氣加炮薑茯苓半夏，而元氣復，更用歸脾湯逍遙散，調理而康。

靈寶散

治婦人血氣攻刺痛引兩脇

丁香

木香

乳香

玄胡索

當歸

白芍藥各等分

草豆蔻散

治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛

草豆蔻

诃子肉各一兩

桂心

苦梗

厚朴各三分

甘艸壹分

川芎

當歸

乾薑

檳榔各半

右爲粗末每服肆錢水壹盞煎去滓食前熱

服

菴藺子散 治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻兩脇脹痛

坐卧不安

菴藺子

延胡索

桃仁

琥珀

當歸

桂心各一兩

赤芍藥

木香

沒藥各半

右爲末每服貳錢溫酒調下

人參紫金丸 治婦人榮衛不和心腹刺痛胸膈脹

滿不運飲食

紫金皮

蒼术

石菖蒲各一兩

香附子

貳兩

人參

半兩

木香

參錢

右爲朱米糊丸如梧子大食後薑湯吞下參拾丸  
氣針丸 治久積風壅踈利氣滯空胸膈止刺痛

木香

青皮

去白

大黃

炮

檳榔

各壹兩

黑牽牛

貳兩半生半炒

右爲朱煉蜜丸如梧子大溫水下參拾丸 鄧安  
人年五十忽然氣痛投神保丸愈不一二十日再痛  
再服神保丸六七十粒大腑不通其疾轉甚亦有  
要用沉香木香薑桂芍藥而未敢投痛甚則築心  
築背築之兩脇似有兩柴十字挿定心脇叫聲徹

夫召子診之六脉沉伏乍來乍去衆問何如予曰  
夫丸痛之脉亦可準也但以證辨用藥觀其人質  
肥偉問其太腑數日不通余曰實痛也其不必脹  
但以入按之痛甚手不可向邇此太實也經云太  
滿太實者可下之用氣針丸伍陸百粒是晚愈  
又已未在金陵有家提幹異內人病心脇脹痛衆  
醫投木香沉香檳榔大腹芍藥薑桂之類益甚召  
予診之六脉弦緊而和不似病脉但診之時兩手  
如火以此知其實痛也衆問如何治療僕曰大凡  
心腹刺痛不可便作虛冷治之有一醫答曰非冷

卽何熱卽生風冷生氣是也予曰不然難經云虛則痒實則痛又仲景云腹痛者桂枝加大黃湯痛甚者桂枝加大黃湯提幹曰荆布素弱子曰有可辨處遇痛時使一婢按之若痛止是虛寒證也按之轉甚手不可近此實痛也卽令婢按之手不可近叫呼異常予曰此實熱無可疑者當用大柴胡湯治之衆不從予責狀而投之八服愈論脇肋痛服木通散亦可治男子

心下脇肋少腹疼痛皆素有積寒而溫暖湯散亦可主治甚者以溫藥下之心下與小腹痛諸書並有效

方而脇肋下痛鮮獲治法此

木通散

治脇肋苦痛偏効併心下脇肋并少腹牽

引痛者皆主之

木通

去皮節

青皮

去白

川棟子

去皮核各壹兩

以上二味用巴豆半兩炒黃去巴豆不用

舶上懷香

壹兩炒

義茂

木香

滑石

各半兩

右爲細末煎葱白酒調參錢壹服愈甚者不過再服

三腕散

治中焦虛痞兩脇氣痛面白手足浮腫木

便秘澁，兼治脚氣

大腹皮

紫蘇

乾木瓜

獨活

各壹兩

川芎

木香

沉香

陳皮

檳榔

各叁分

右㕮咀每服參錢水壹盞煎至柒分去滓空心熱服日中再服。戊午秋在京城有一婦人中焦虛痞腹膨脹痛，太便秘結，六脉虛弱，諸醫服藥無效子投此藥，不終劑而愈。

補遺局方青木香丸沉香降氣湯小烏沉湯四磨湯

皆可用

薛左金丸

金丸名

治肝火胸脇脹痛或發寒熱或頭

目作痛，或大便不實，或小便淋秘，或小腹疼痛及一切肝火之證。

黃連

炒陸兩

吳茱萸

壹兩湯片時用煮

右爲末粥丸白术陳皮湯下

當歸龍薈丸治肝經實火胸脇脹痛或太便秘結

小便澁滯凡屬肝經實火皆宜用之

當歸

炒

龍膽艸

炒焦

梔子仁

炒

黃連

炒

黃芩

壹兩炒各

大黃

炒

青黛

各伍錢

木香

貳錢半

蘆薈

另研伍分

右爲末，用神麃糊丸、桐子大每服貳拾丸，薑湯下。補肝散 治肝腎二經氣血虧損，脇脹作痛，或脇脹頭暈寒熱發熱，或遍身作痛，經候不調。

山茱萸肉

當歸

五味子

炒杵

山藥

白木瓜

各半兩

黃芪

炒

川芎

熟地黃

自製

白术

炒各壹錢

獨活

酥棗仁

肆兩

右爲末，每服五錢，棗水煎服。

腰痛

藥隱老人論曰：夫腎主於腰，女人腎藏繫於胞絡。若腎氣虛弱，外感六淫，內傷七情，皆致腰痛。古方亦有五種之說，如風腰痛，宜小續命湯加桃仁杜仲煎服；脾胃氣痞及寒濕腰痛，宜五積散（雜病中寒加桃仁）；如虛損及五種腰痛，服青娥丸（雜病腰痛神應丸，全上皆可用也）。如氣滯腰痛，服如神湯必効。（薛陳無擇先生云：若形體虛羸，面色黧黑，腿足痿軟，不能行立，此失志所為也。腹急脇脹目視，眩暉，宗筋弛縱，白淫下注，此鬱結所為也。肌肉不仁，飲食不化，腸胃脹滿，閉塞腰

腰痛此憂思所爲也。皆屬內。若腰冷作痛。身重不渴。小便自利。飲食如故。因勞汗出。腰痠。脇痛或墜墮。血滯或房勞精竭。皆屬不內外。因也。竊謂前證失志腎虛者。六味丸。雜病虛勞腎虛寒者。八味丸。雜病虛勞鬱怒傷肝者。龍膽瀉肝湯。雜病淋虛用六味丸補肝散。雜病腰痛憂慮傷脾者。歸脾湯。雜病健忘逍遙散。經腎着者。寒則附湯。雜病傷濕虛則腎着湯。全上腰膝痛者。寄生湯養腎散。雜病腰痛血滯者。如神湯。舒筋散。房勞腰痛者。青娥丸。十補丸。見前虛勞一婦人腰痛三年矣。每痛必面青頭暉目緊。余以爲肝脾氣虛。用補肝散而愈。三年後因。

勞役患頭痛。兼惡心。用補中益氣湯。雜病傷勞倦加茯苓半夏蔓荆子而愈。一婦人苦腰痛數年不愈。余用白朮一味。大劑服。不三月而痊。乃胃氣虛閉之證。故用白朮也。

如神湯 治男子婦人氣虛腰痛。一方有杜仲無當歸

玄胡索

當歸

去蘆

桂心

等分

右爲細末。每服參錢溫酒調下。甚者不過數服。獨活寄生湯 夫腰痛者。皆由腎氣虛弱。臥冷濕地。當風。所得不時。速治喜流入脚膝。爲偏枯。冷癰緩弱。疼重。或腰痛拘攣。脚膝重痺。宜急服之。

獨活

參兩

桑寄生

續斷

杜仲

炒去絲

北細辛

川牛膝

秦艽

茯苓

白芍藥

桂心

川芎

防風

人參

熟地黃

當歸

各貳兩

右㕮咀每服參錢水壹錢煎至七分去滓溫服空心氣虛下利除地黃并治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痛痺弱不得屈伸此藥最能除風消血肘後有附子故無寄生人參當歸粉草近人將治歷節風腳氣流注亦効

舒筋散 治腰痛神効

門挫亦良

玄胡索

炒

杜仲

薑汁炒

官桂

去粗皮

羌活

芍藥

各等分

右爲末酒調下貳錢

又方 禰核炒香研酒去粗下青木香丸

方見

又方 天羅布瓜子仁炒焦擂酒熟服留查炒熟封

痛處効

腰脚疼痛

夫腎主於腰脚，女人腎臟繫於胞絡。若勞傷腎氣虛弱，而風冷客於胞絡，邪氣與真氣交爭，故令腰脚疼痛也。治當以補元氣為主，佐以祛邪之劑。薛前證若真陽衰敗，寒邪乘襲，手足俱冷，頭痛惡寒，或嘔吐腹痛等證，宜用本方。若氣血虛弱，寒邪所感，惡寒發熱，頭痛作渴，或嘔吐腹痛等證，宜用五積散。雜病中寒若元氣虛弱，濕熱所傷，兩脰腫痛，寒熱身疼，或嘔吐不食等證，宜用檳榔散。雜病傷濕若脾胃虛弱，元氣下陷，寒熱嘔吐，發熱頭痛，喘渴體倦等證，宜用補中益

氣湯雜病傷勞倦若足三陰精血虧損陰火內動內熱晡熱作渴痰甚小便頻數等證宜用六味地黃丸雜病虛勞  
若足三陰陽氣虛敗惡寒發熱手足俱冷吐痰不食二便滑數等證宜用八味地黃丸雜病虛勞○一婦人先腰胯作痛後兩腿亦痛余以爲足三陰虛寒外邪所傷用小續命湯及獨活寄生湯或作或止所用飲食極熟腹中方快余曰邪氣去而元氣虛寒也診其脉果沉細用養腎散本條漸愈又用十補丸虛勞而痊○一婦人所患同前但發熱作渴喜冷飲食脈洪數按之遲濶余以爲血虛有熱用羚羊角散身體去濶

榔加白朮茯苓數劑更用加味逍遙散結核而瘥○一婦人患前證時或腿膝作痛脈浮數按之遲緩此元氣虛而風濕所乘用獨活寄生湯頓愈又用八珍湯而安○一婦人因怒患前證寒熱往來口苦不食晡熱內熱余以爲肝火血虛先用小柴胡湯加山梔頓愈又用加味逍遙散而瘳○一婦人患前證寒熱頭痛殊類傷寒此寒邪之證用瀉蘇敗毒散而安又用補中益氣調補而愈

虎骨丸 治婦人血風攻注腰脚骨節疼痛不可忍  
虎脛骨酥炙 貥龜酥炙 檳榔

用房利刑

方利二

百三

牛膝酒浸各壹兩

當歸去蘆炒

川大黃炒

木香去蘆各半錢

桃仁浸炒

海桐皮各半錢

防風去蘆各半錢

附子炮去皮臍

赤芍藥

桂心

血竭

沒藥另研

地龍去土炒各半兩

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服參拾丸空心食前溫酒下日貳服

仙靈脾散 治婦人血風攻注腰脚疼痛秀

仙靈脾

桃仁麸炒

檳榔各壹兩

羌活去蘆炒

海桐皮

牛膝酒浸

當歸去蘆炒

芎菊

骨碎補

玄胡索

桂心

枳殼去瓤炒

木香

蕃藴子各柒錢半

蜘蛛

炒半兩

麝香另研貳錢半

狗脊

天麻

藁本散

治婦人血風流注腰脚疼痛不可忍

藁本去蘆土研壹兩半

狗脊

天麻

骨碎補研

蟬殼微炒各壹兩

虎脣骨

醋炙另研

敗龜醋炙

穿山甲

各貳兩

麝香

半兩  
另研

右爲細末入麝香拌勻每服貳錢生薑豆淋酒調

下空心食前日二服

敗龜散 治婦人風毒流注腰脚疼痛行步艱難

敗龜醋炙

虎脰骨

各貳兩

白僵蠶

炒

薏苡仁

當歸

去蘆

杜仲

各壹兩

桂心

乳香

另研

沒藥另研

地龍

土

桂心

各貳錢半

右爲細末每服貳錢食前溫薄荷酒調下

骨碎補散 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急

骨碎補炒

草薢

酒浸

桃仁薌炒

海桐皮

牛膝

酒浸

桂心

檳榔

各壹兩

附子炮去皮臍

川芎

各柒錢

當歸

去蘆

右爲㕮咀每服五錢水一大盞半生薑參片棗壹

枚煎至一大盞去滓溫服

附子散 治婦人腰脚積年疼痛不瘥

附子炮去皮臍

桂心

沒藥

另研

威靈仙

乾漆

炒去煙

牛膝

酒浸

各壹兩

右爲細末每服貳錢溫酒調下食前日進二服  
養腎散 治腎經虛弱風寒所侵以致腰脚疼痛不

能步履

蒼术

壹兩

乾蝎

叁錢

天麻

草烏頭

炮去皮

黑附子

炮去皮臍各貳錢

右爲末每服壹錢酒調服麻痺少時隨愈孕婦勿  
服此治風寒傷腎膀胱虛寒之良藥用之得宜殊  
有神効

臂痛

大夫婦人臂痛筋脉攣急不得屈伸遇寒則劇由肝  
虛爲風寒邪氣流於血脉客於經絡搏於筋筋不榮  
則乾急而痛其脉緊細宜服柏子仁丸舒筋湯若臂  
痛不能舉或左或右時復轉移一臂由中腕伏痰脾  
氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而  
氣不下上攻於臂故痛其脉沉細宜茯苓丸控涎丹  
益氣湯血氣俱虛用加味逍遙散中氣虛用補中  
湯脾腎虛寒用柏子仁丸脾胃實熱用茯苓丸水不

能生末用六味丸逍遙散怒動肝火用小柴胡加川芎當歸眩暈晡熱用四物柴梔丹皮肺熱月經不調用加味逍遙散食少體倦無寐盜汗用加味歸脾湯先太宜人偏身作痛筋骨尤甚不能屈伸口乾目赤頭眩痰壅胸膈不利小便赤短夜間殊甚遍身作痒如蟲行此屬肝腎氣虛而熱也用六味地黃丸料加山梔柴胡而愈

柏子仁丸

指迷

柏子仁

附子

炮

酥棗仁

炒

桂心

石斛

去根切酒蒸炒

鹿茸

酥炙

黃芪

蜜水炙各壹兩

一方二云等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大空心酒下參拾丸

舒筋湯 治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子菖黃

肆兩甘草

羌活

各壹兩

白术

海桐皮

當歸

赤芍藥

各貳兩

右爲粗末每服參錢水一盞半煎七分去滓溫服

如腰以下疾空心服腰以上疾食後服

茯苓丸 治臂痛不能舉手或左或右時復轉移由  
伏痰在內中脘停滯脾氣不行上與氣搏四肢屬  
脾脾滯而氣不升故上行攻臂其脉沉細者是也  
後人謂此臂痛乃痰證也用以治痰無不効者予  
嘗以此藥治入隨服隨愈世所謂療藥多矣未有  
立効如茯苓丸速也

茯苓

壹兩

半夏 貳兩

枳殼

半兩去  
穰炒

風化朴硝

半兩

右爲末薑汁煮糊丸

名梧子大生薑湯

下貳拾丸

食後服

控涎丹

凡人忽患胷背手足頸項腰胯隱痛不可

忍連筋骨牽引鈎痛坐卧不寧時時走易不定俗  
醫不曉謂之走症便用藥及針灸皆無益又疑是  
風毒結聚欲爲癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰涎  
伏在心膈上下變爲此疾或令人頭痛不可舉或  
神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中  
如鋸聲多流唾涎手腳重腿冷脾氣脣不通誤認  
爲癰疽亦非也凡有此疾但以此藥不過數服卽  
愈

甘遂

去心

大戟

去皮

真白芥子

炒各等分

右爲細末糊丸如梧桐子大臨臥淡薑湯下五七丸如疾猛再加至十丸

白芥子散 治臂痛牽引背胛或輒或作由榮衛循行失度痰滯經絡或似癰瘍

真白芥子

木鼈子

各參兩  
麸炒

沒藥

另研

桂心

木香

各半兩

右爲末每服壹錢溫酒下愚按前三方脾氣虛弱者必佐以六君子湯中氣虛弱者必佐以補中益氣湯氣血虛者必佐以八珍湯脾氣鬱滯者必

佐以歸脾湯肝經怒氣者必佐以逍遙散若專用前方治之胃氣益虛病氣益甚不可不謹

流氣飲 治七情氣滯胸膈悶痞咽喉不利嘔噦面浮二便不調或氣攻肩背脇肋作痛或脚氣喘急腹脹便閉元氣充實者宜用此藥慎之

紫蘇葉

黃芪

炒

青皮

去白

當歸

半夏

薑製

桔梗

烏藥

芍藥

炒

茯苓

陳皮

各半錢  
伍分

防風

各伍錢  
麸炒

川芎

甘草

各貳錢  
伍分  
炙壹兩  
半

大腹子

薑製  
壹兩

右每服半兩薑棗水煎服

四物湯 治血滯中風血虛手足不遂如臂痛加紅花煎

交加散加木瓜牛膝治冷癰肩臂作痛卽人參敗毒和五積散

烏藥順氣散加羌活木瓜治外邪氣滯筋骨作痛或痰氣不利

方見雜病中氣

秦艽地黃湯 治肝膽經風熱血燥肩臂疼痛或筋脉引急或時牽痛其內證發熱或寒熱晡熱月經

不調或肢體酸痛等證

秦艽

熟地黃

白芍

當歸

各壹錢

川芎

芍藥

牡丹皮

茯苓

各壹錢伍分

釣藤鈎

壹錢

柴胡

甘草

炙各參分

右水煎服

脚氣

陳臨川云凡頭痛身熱肢節痛大便秘或嘔逆而腳屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜檳榔生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痛或行起忽倒或兩脰腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁皮頑不知疼痛或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或脅滿氣急或遍體酸痛皆脚氣之候黃帝所謂緩風濕痺是也頑弱為緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續命湯主之煎入生薑自暑中自然汗最妙

之成

桂一半，主之。大煩躁者，紫雪最良。若無紫雪，以百合薄荷煎冷水調服，極妙。大便祕者，脾約丸、麻仁丸三和散主之。仍針灸為佳。股補藥與湯淋洗，皆醫家之太禁也。夫婦人脚氣與丈夫不同。男子則腎臟虛弱，為風濕所乘。女子以胞絡氣虛，為風毒所搏。是以胞絡屬於腎也。腎主於腰脚，又肝脾腎三臟經絡起於足十趾。若臟腑虛損，則風邪先客於腳。從下而上動於氣，故名脚氣也。此皆由體虛或當風取涼，或久坐卑濕，或產後勞損，或恚怒悲傷，肝則心氣不足，致月候不通。因其虛傷風毒，傳入筋骨，則令皮膚不仁。

筋骨疼痛，肢體不隨，筋脉拘攣，或時冷疼，或發腫滿，或兩脚痺弱，或舉體轉筋，目眩心煩，見食嘔吐，精神昏憊，肢節煩疼，小便赤黃，大便祕澀。如此證候，其婦人脚氣療之，與丈夫不同。以其氣血不調，胎姪產損傷之，是以療寡婦及尼，與妻妾殊別，卽其義也。閨嚴用和先生云：前證初患不覺，因他病乃發。先從腳起，或緩弱痺痛，不能行履，或兩脰腫滿，或足膝細小，或心中怔忡，或小腹不仁，或舉體轉筋，或見食作嘔，或胸滿氣急，偏體酸痛，其脉浮而弦者，因於風濕而弱者，因於濕洪而數者，因於熱遲而滯者，因於寒而

子由於腎氣虧損，女子血海虛弱，七情所致，竊謂前證若足三陰虛弱，用還少丹。雜病虛勞若脾氣虛寒，用八味丸。雜病虛勞若飲食停滯，齶腹脹浮腫，作痛，此脾氣下陷，用六君子。雜病虛勞少加柴胡升麻，不應須用八味丸。若發熱口渴，月經不調，兩腿無力，此足三陰血虛火燥，用六味八味二丸兼服。前證西方之人多患之，因素食乳酪，脾胃壅滯，脛足腫滿，至於南方亦有因膏粱厚味，濕熱下注，而患者故古人謂之壅疾。所用之方多疎通發散之劑，然感於房勞過度，虧損三陰，治法又當以固本為主，故六物附子為元氣虛弱寒。

邪內侵之聖藥

大腹皮散 治婦人風毒脚氣，肢節煩疼，心神昏悶，並宜服之。

大腹皮

桑白皮

木通

去皮

羌活

去蘆

赤芍藥

荆芥

獨活

去蘆

青橘皮

去白

乾木瓜

各壹兩

枳殼

去瓤

紫蘇葉

各貳兩

右㕮咀，每服入錢水壹中盞半，生薑五片，葱白七寸，煎至壹大盞，去滓，食前溫服。

紫蘇飲 治婦人風毒脚氣，心腹痞塞，痰飲停積，不

思飲食脚重虛腫

紫蘇葉

木通去皮

茴香

桑根白皮各壹兩

獨活去蘆

羌活去蘆

乾木瓜

青橘皮去白

甘草炙各半兩

大腹皮半兩

枳殼去瓤炒貳兩

荆芥半兩

右㕮咀每服八錢水一大盞半生薑五片連鬚葱白壹莖煎至一大盞去滓溫服不拘時日進二服四白散治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲食四肢羸瘦筋脈拘攣脚痛不能行立

黃芪去蘆

厚朴薑製

益智仁

陳皮去白

藿香

白扁豆

白术去蘆各壹兩

白茯苓去皮

白豆蔻仁

人參去蘆

甘草炙

天台烏藥各半兩

芍藥壹兩半

檀香

沉香各貳錢半兩

右爲細末每服參錢水壹盞生薑參片棗子壹枚煎至七分和溫服日進二服諸證減退只有脚攣痛不能行服蒼朮丸治之

蒼朮丸 大治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行履

兼補下部

乳香另研

沒藥各貳錢另研

川牛膝酒浸

青鹽各半兩

熟芩

肆錢米搘過研末

全蝎壹錢炒研

川烏頭去皮臍

叁錢炮

右件爲細末入研藥空心用大木瓜壹枚切丁頭留作蓋去穰入上件藥於木瓜內將蓋簽定安於黑豆中蒸令極爛取出皮連藥研成膏却入生蒼朮末不以多少拌令得所丸如梧桐子大每服五十丸空心用木瓜湯下或溫鹽酒亦得日進三服忌血與蒜

餘證方論並詳雜病本門

### 癰瘍瘙痒

大夫婦人體虛爲風邪氣客於皮膚復傷風寒所以則發風瘙癰疹若赤疹者由寒濕客於肌中極熱熱結則成赤疹也得大熱則發取冷則瘥也白疹者由風氣客於肌中熱熱與風相搏則成白疹也得天陰雨寒則發出風傷亦發得晴煖則減著衣煖亦瘥脉浮而洪浮卽爲風洪則爲氣風氣相搏則生癰疹身體瘙痒凡人汗出不可當風露卧及浴後出早使人身振寒熱以生風疹也藥隱老人云治婦人遍身時發瘙痒或赤腫癰疹五心煩熱血風攻疰與人參

荆芥散

虛勞而風

消風散

雜病頭痛

四物湯

通治

加荆芥或人參

當歸散或逍遙散兼服導赤丸如不通者食後服皂角丸氣虛老人不可久服如服皂角丸不退者此凝滯熱甚者宜先服青木香丸三兩服以開氣道服蒺藜散立効薛前證有身發疙瘩或如丹毒痒痛不常或膿水淋漓發熱煩渴或頭自昏眩日晡益甚或寒熱發熱月經不調皆肝經風熱血燥用加味逍遙散調經爲主佐以四君芎歸若忿怒身發疙瘩痛痒寒熱乃肝火血燥用加味小柴胡湯熟入血室氣血俱虛用八珍加柴胡牡丹皮若夜間發熱作渴譫語乃熱入

血室用小柴胡湯加生地黃血虛四物合小柴胡後用加味逍遙散調理若鬱結食少體倦內熱晡熱乃脾經血燥用加味歸脾湯寒熱加山梔熟地黃若遊走癰瘍乃血風走注用何首烏散血虛逍遙散風熱消風散若專用風藥復傷陰血必致筋攣等證一婦人身發疙瘩或如丹毒痒痛不常搔碎成瘡膿水淋漓發熱煩渴頭目眩暈日晡益甚此血虛內熱之證也以當歸飲加柴胡山梔仁治之而愈一婦人患前證肢體疼痛頭目不清自汗盜汗月水不調肚腹作痛食少倦怠先用人參荆芥散後用逍遙散治

之而痊。一婦人因忿怒身發疙瘩，憎寒發熱，余謂肝火用小柴胡湯加山梔黃連治之而愈，後口苦脇痛小便淋漓，復用前藥全愈。一婦人患前證，發熱夜間譖語，此血分有熱以小柴胡湯加生地黃治之而安，後用四物加柴胡山梔丹皮而熱退，又用逍遙散全愈。一室女年十四歲天癸未至，身發赤癰癩痛，左關脉弦數，此因肝火血熱以小柴胡湯加山梔生地黃牡丹皮治之而愈。若因怒而致者，又當治以前藥。

何首烏散 治婦人血風皮膚瘙痒，心神煩悶及血

風遊走不定並宜服之

何首烏

防風

白蒺藜

枳殼

天麻

殭蠶

胡麻

茺蔚子

蔓荆子

各等分

右爲細末，每服貳錢煎茵陳湯調下，無時。

蒺藜散 治婦人風癩皮膚中如蟲行，及生癰疹搔

乏作瘡，面腫心煩並宜服之

白蒺藜

芥艸

鷹羊角屑

各柒錢半

黃芩

人參去蘆

苦參去蘆

防風去蘆

蛇床子

秦艽去蘆

防風去蘆

麻黃

去節

當歸

炒去

甘草

炙

枳殼

辦炒去瓢

細草

去苗半兩

右㕮咀每服五錢水壹中盞半煎至壹大盞去滓溫服不拘時日進二十服

治婦人風痒癰疹不瘥

蒼耳花葉子

各等分

右爲細末每服貳錢豆淋酒調下不拘時候日進二服

治癰疹

右用白蜜不以多少好酒調下已試有驗

治皮膚有風熱遍身生癰疹

牛蒡子

水煮一兩淨晒乾炒令香

浮萍

蒸過焙乾等分

右爲細末每服貳錢薄荷湯調下日二服

又治風氣客於皮膚搔之不已

蟬蛻

洗

大葉薄荷

右等分爲細末每服貳參錢溫酒調下無時

又方

露蜂房

洗過密炙令焦蛇蛻各等分

右爲細末每服壹貳錢溫酒調下不拘時

治婦人風癩癰疹身痒不止宜用淋漬方

馬蘭

茺蔚子

白礬

白蒺藜

茵芋

羊桃根

凌霄花

各貳兩

蒴藋根

草薢葉

各壹兩

右㕮咀以水貳斗煮取壹斗去粗於避風處洗之

又方

凌霄花

參兩

蒴藋根

半斤

右件藥以水七升煮取參升濾去滓入白礬末貳兩攪勻以綿漬頻拭於疹上後煮槐柳湯浴之

又方 以醋漿水磨白礬塗之

女科證治準繩卷之二

