


聖王濟總錄

百五

庫文閣内			
函	冊	號	漢
300	200	176	
内閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數	200	(176)	
函號	300	212	



小兒發熱

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

大學東  
校典藉  
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一百七十八

小兒門

大德重校聖濟總錄卷第一百七十八

小兒冷痢

小兒熱痢

小兒赤白痢

小兒血痢

小兒膿血痢

小兒蠱毒痢

日本  
醫學  
圖書

總錄一百七十八



擘破同煎至三分去滓分溫二服空心午後各一服  
量兒大小以意加減

治小兒秋後大腸挾冷下痢不止訶梨勒散方

訶梨勒煨去核 肉豆蔻去殼 當歸切

赤石脂煨 蜜陀僧別研 枳殼去麩

龍骨 乾薑炮 厚朴去麩皮薑汁

右九味搗羅為散一二歲兒每服半錢七米飲調空

心午後各一服更量兒大小以意加之

治小兒下痢白膿黃者湯方

黃耆剉 芎藭 乾薑炮

人參

黃芩去黑

當歸切

甘草炙各

桂去麩皮

右八味麤搗篩一歲兒每一錢匕水半盞同煎至三

分去滓分溫二服空心日晚各一服量兒大小以意

加減

治小兒冷痢心腹脹滿乾嘔不止陳橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白

人參壹

甘草炙半

右三味麤搗篩一歲兒每一錢匕水半盞生薑二片

同煎至三分去滓分溫三服食前日再隨兒大小以

意增減

治小兒虛冷藏府滑泄不止白丸子方

硫黃半兩

附子炮裂去皮臍取未碎半兩

消石研

鍾乳研

白龍骨研

寒食麩各壹分

右六味同研令勻細麩糊丸如麻子大每服三五丸

量兒大小加減粥飲下疾愈即止

治小兒冷痢腹痛艾香散方

艾葉炒

木香

黃連去須各半兩

龍骨研

訶梨勒煨取皮

當歸切焙各參分

乾薑炮裂壹分

右七味搗研為散每服半錢匕米飲調下食前服

治小兒秋深冷痢止腹痛蜀椒丸方

蜀椒

去目及閉口者炒汗出壹兩

乾薑炮裂壹分

右二味搗羅為末鍊蜜和丸小豆大一歲兒空心麩

湯下五丸未止日午再服量兒大小以意加減

治小兒冷痢白膿臍下絞刺痛木香丸方

木香壹兩

訶梨勒煨去核壹兩

右二味搗羅為末以粳米飯和為丸如麻子大一二

歲兒三丸五歲兒五丸米飲下食前服

治小兒白痢人參湯方

人參貳兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙壹兩

甘草貳兩

白茯苓

去黑皮壹兩

檉皮貳兩

桔梗

炒壹兩

右六味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三分去滓分溫二服乳食前量兒大小以意加減

治小兒冷痢訶梨勒丸方

訶梨勒

煨去核半兩

桂

去麤皮壹分

赤石脂

半兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸更入白中搗三五百杵丸如麻子大一二歲兒三九三四歲兒五九空心午

後各一服米飲下

治小兒白痢阿膠飲方

阿膠

炙令燥壹兩

黃芩

去黑心壹兩

黃連

去須半兩

右三味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三分去滓分溫二服空心日晚各一服量兒大小以意

增減

治小兒冷痢白膿茯苓飲方

白茯苓

去黑皮壹兩

人參

壹兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙到壹兩半

桔梗

炒壹兩

檉皮

炙壹兩

右五味麤搗篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓分

溫二服食前日二量兒大小以意增減

治小兒下痢色白小便赤調中人參飲方

人參分參 龍骨壹兩 厚朴去麤皮生薑汁炙到壹分

當歸炮切 乾薑炮裂 白茯苓去黑皮

甘草炙各壹兩 右七味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三

分去滓分溫二服空心日晚各一量兒大小以意加

減

治小兒冷痢腹痛龍骨湯方

龍骨

甘草炙

黃連去須各壹兩

小乾薑炮裂 當歸切焙各壹分

右五味麤搗篩一歲兒每半錢匕水半盞煎至三分

去滓分溫二服日再量兒大小以意加減

治小兒冷痢當歸湯方

當歸炮切

黃連去須

赤石脂

乾薑炮裂

龍骨

酸石榴皮微炙

厚朴去麤皮生薑汁炙到各參分

右七味麤搗篩每一錢匕水一盞煎至五分去滓分

溫二服食前日一量兒大小以意加減



治小兒腸胃虛弱清濁不分痢下青白或如凝脂陳寒  
痼冷或下黑瘀豆蔻散方

肉豆蔻

去殼壹枚

縮沙

去皮柒枚

訶梨勒

去核參枚

鉛丹

炒

胡粉

炒

龍骨

各貳錢

白礬

壹分

天仙子

壹分與白礬和令勻入在橡罇子內合定用麻線纏

定炭火內燒黑存性細研

右八味搗研為散再研令勻每服半錢匕米飲調下

乳食前服

治小兒冷痢心腹痛悶不美乳食嘔逆不止丁香丸方

丁香

硫黃

胡椒

桂

去麤皮各壹錢

陳橘皮

去白焙

附子

炮裂去皮臍各壹分

肉豆蔻

去殼壹枚

右七味搗羅為細末用生薑汁煮麪糊和丸如菉豆

大每服五丸生薑艾湯下妳食前服量兒大小加減

服

治小兒脾胃虛弱清濁不分因成冷痢其色青白甚則

色黑厚朴丸方

厚朴

去麤皮生薑汁製炙黃色壹兩

肉豆蔻

麪裹炮裂壹兩

訶梨勒

參枚麪裹炮用皮

龍骨

半兩

木香

壹兩

右五味搗羅爲細末水浸炊餅心和丸如麻子大一  
二歲兒每服十九溫米飲下日三服

治小兒冷痢便下青白或如凝脂或下瘀黑厚朴湯方

厚朴去蟲皮生薑汁炙剉蒼朮米泔浸切焙陳橘皮去白焙各壹兩

甘草炙剉乾薑炮參右五味麤搗篩每服一錢匕水一盞入生薑二片棗

一枚擘煎至五分去滓溫服

治小兒冷痢或下青白或下瘀黑或如凝脂補脾丸方

肉豆蔻炮去殼壹枚爲末龍骨燒研

乳香研蕪荑人研炒麝香研各壹錢

右五味同研勻輒飯丸如麻子大每服五七丸陳米

飲下

治小兒冷痢或下青白或下瘀黑或如凝脂草節丸方

烏頭炮裂去皮臍黃連去須吳茱萸湯洗焙炒

乾薑壹錢右四味搗羅爲末醋煮麩糊和丸如黍米大每服七

丸草節湯下

小兒熱痢

論曰小兒挾熱痢此由邪熱在於腸間因胃氣不和乳

食傷動故令腹痛腸鳴下痢黃赤名熱痢

總錄一

八

八

八

八

八

治小兒熱痢下重或下痢如血汁香連丸方

白木香去須各半兩 黃連去須各半兩

右二味搗羅為細末醋浸炊餅和丸如棗豆大每服二十九米飲下不計時候

治小兒赤痢經時不止犀角丸方

犀角鎔屑壹兩壹分 黃連去須壹兩半 女萎壹兩

白頭翁去蘆頭壹兩半 茜根參分 枳殼去瓢麩炒黃參分

甘草炙半兩 赤石脂壹兩壹分 黃芩去黑心壹兩

乾藍兩半 檉皮炙參分 龍骨壹兩

黃蘗去麤皮壹兩半

右一十三味搗羅為細末鍊蜜和搗五百杵丸如麻子大一二歲兒每服三丸三歲至六歲兒可四五丸空心午後各一服米飲下

治小兒卒下熱痢赤石脂湯方

赤石脂兩壹分 黃連去須壹兩 石膏碎

甘草炙 龍骨炙 知母焙

前胡去蘆 赤茯苓去黑皮 桂去麤皮

芍藥各壹分

右一十味麤搗篩一二歲兒每半錢匕入棗一枚擘破水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一

服小兒熱毒下痢如魚腦手足壯熱黃連白頭翁湯方

治小兒熱毒下痢如魚腦手足壯熱黃連白頭翁湯方

黃連去須 白頭翁 醋石榴皮炙

犀角鎊屑各半兩

右四味麤搗篩一二歲兒每半錢七水七分煎至四

分去滓分溫二服空心午間日晚各一服

治小兒熱痢牡蠣丸方

牡蠣煨 黃連去須 黃蘗去麤皮

龍骨 赤石脂 人參

甘草炙各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜和搗千餘杵丸如麻子大一

三歲兒每服三丸四歲至六歲兒五丸米飲下空心

午後各一服

治小兒熱痢不止梔子丸方

梔子人 黃蘗去麤皮 白礬熟汁

棗大者肆枚

右四味搗羅為細末鍊蜜和丸如麻子大二歲兒

每服三丸三四歲兒每服五丸米飲下空心午後各

一服

治小兒熱痢壯熱全不食乳食乳即吐熊膽散方

熊膽兩半 黃連參分 馬齒莧乾者炒

無食子煨壹 蚘蛇膽兩半 犀角鎊屑壹兩

右六味搗羅為細散一二日兒每服一字匕新汲水調服空心午後各一服

治小兒熱痢不止黃芩知母湯方

黃芩去黑心 知母焙各壹兩 萎蕤參分

小黃蘗去麤皮炙半兩 甘草炙半兩

右五味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫三服空心午後各一服

治小兒熱毒痢下膿血羚羊角湯方

羚羊角鎊屑參分 地榆壹兩 吳藍參分

黃連去須壹兩 黃芩去黑心半兩 茜根參分

當歸焙切 阿膠炙燥 赤石脂各壹兩

甘草炙半兩

右一十味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服

治小兒熱毒痢下血黃連飲方

黃連去須壹兩半 白蘘荷根壹兩 犀角鎊屑壹兩

黃芩去黑心壹兩 白頭翁去蘆頭參分 茜根判壹兩

藍青乾者參分 甘草炙半兩

右八味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服

治小兒熱痢壯熱多渴而痢烏梅湯方

烏梅肉

去核 貳枚 焙

黃連

去須

藍葉

各壹分

犀角

銜

阿膠

炙 燥

甘草

炙 各半兩

右六味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服

治小兒熱痢黃連湯方

黃連

去須 壹兩

黃蘗

去麤皮 炙 半兩

阿膠

炙 半兩

右三味除阿膠外麤搗篩每服半錢匕酒半盞入阿

膠一片同煎至二分去滓空心日午近晚各一服

治小兒熱痢腹中疼痛或血痢黃連湯方

黃連

去須

山梔子

人 各參分

右二味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服

治小兒赤痢血痢訶梨勒散方

訶梨勒

煨 去核

梔子

去殼 各壹兩

右二味搗羅為細散一二歲兒每服半錢匕米飲調下空心午後各一服

治小兒久熱痢不下乳三物湯方

大黃生剉 甘草炙剉

麥門冬去心焙等分

右三味麤搗篩每二錢匕水一盞煎至五分去滓分溫三服空腹量兒大小加減服

小兒赤白痢

論曰小兒痢下赤白由脾胃不和乳食所傷留滯腸中與津液相搏腸虛則泄故為痢也虛而有熱則赤虛而有寒則白冷熱不調則赤白相兼膿血雜下故名赤白痢

治小兒赤白痢腹肚疴痛不思飲食羸瘦赤石脂丸方

赤石脂

白礬燒令汁盡

訶梨勒皮

白朮

黃耆剉

厚朴

去麤皮生薑汁炙剉

醋石榴皮

乾木瓜

焙各半兩

肉豆蔻

去殼壹枚

乾薑炮壹分

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大每服五丸溫米飲下空心午後服量兒大小加減

治小兒赤白痢不止當歸丸方

當歸切焙半兩

黃連須去

龍骨

人參各壹分

無食子炮貳枚

鹿角燒

豉炒各壹分

右七味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大每服五丸溫米

飲下空心午後服量兒大小加減

治小兒下痢赤白鹿角丸方

鹿角鎊

燕蕩人炒

附子炮裂去臍皮各壹分

赤石脂兩半

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服五丸溫

米飲下空心日晚各一服量兒大小加減

治小兒赤白痢日夜三五十行白朮湯方

白朮壹兩

乾薑壹分

白茯苓去黑皮

甘草壹兩

附子炮裂去臍皮

右五味麤搗篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓分

溫三服空心食前服量兒大小加減

治小兒赤白痢人參湯方

人參壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

白茯苓去黑皮

桔梗剉炒各壹兩

樺皮去麤皮炙貳兩

甘草兩半

右六味麤搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓

早晨午後服量兒大小加減

治小兒赤白痢腹痛日夜頻數厚朴散方

厚朴去麤皮生薑汁炙參分

人參兩半

赤石脂

龍骨各壹兩

地榆



乾薑炮

當歸切焙各半兩

黃連去須壹兩

右八味搗羅為散每服半錢匕空心米飲調下午後  
再服量兒大小加減

治小兒赤白痢日夜數十行腹痛後重犀角湯方

犀角鎊

苦參

黃連去須三合

地榆

黃蘗去麤皮炙各壹兩

右五味搗篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓分  
溫二服空心午後服量兒大小加減

治小兒赤白痢久痢成疳黃蘗散方

黃蘗去麤皮炙

黃連去須

桃白皮炙

胡粉炒

白茯苓

去黑皮各壹兩丁香壹分

右六味搗羅為散每服半錢匕米飲調下空心午後  
服量兒大小加減

治小兒赤白痢挾熱多渴宜服藍葉湯方

藍葉壹分

黃連去須半兩

白茯苓

去黑皮壹分

冬瓜子炒半兩

右四味搗篩每一錢匕入蜜少許水一小盞煎至  
五分去滓分溫二服空心午後服量兒大小加減

治小兒赤白痢鹿茸散方

鹿茸

去皮毛炙

甘草炙

訶梨勒

煨去核各半兩

右三味搗羅為散每服半錢匕食前日三米飲調下  
量兒大小加減

治小兒赤白痢黃連散方

黃連須去 檳榔剉

右二味各搗羅為散如患赤痢黃連末二錢匕檳榔末一錢匕白痢黃連末一錢匕檳榔末二錢匕和勻  
每服半錢匕米飲調下量兒大小加減

治小兒赤白痢腹內疼痛煩渴木香黃連散方

木香 黃連去須各半兩 訶梨勒炮去核拾貳枚

肉豆蔻去殼貳枚 甘草炙半兩

右五味搗羅為散每服半錢匕米飲調下

治小兒赤白痢及水瀉麝香丸方

麝香研半錢 巴豆染粒去皮水半盞用蛤粉壹匙頭同煮水盡去心膜細研

丹砂研 硫黃各壹分研 草烏頭炮去皮取末壹錢

砒霜研半錢

右六味搗研為末用棗肉和丸如黍米大每服一丸  
水瀉并痢秋後蛤粉水下夏至後新汲水下赤白痢  
生薑湯下更量兒大小以意加減

治小兒赤白痢神捷散方

大棗肆枚 梔子人枚伍 乾薑半栗子大

右三味並燒黑色研為散每服半錢匕米飲調下

治小兒赤白痢方

糝麻子壹兩

右一味搗羅為散蜜水調下半錢匕食前加減服

治小兒赤白痢龍骨散方

龍骨研

白石脂研

胡粉炒

白礬枯過各壹兩

訶梨勒皮貳兩

黃連去須

陳橘皮去白麩炒

阿膠炙燥

當歸切焙

人參

厚朴去麩皮生薑汁炙各壹兩半

右一十一味搗羅為散每一錢匕空腹煮白粥飲調

下目二

治小兒赤白痢黃連丸方

黃連去須

龍骨

赤石脂

當歸剉炒各參分

白石脂

烏梅肉炒

黃芩去黑心各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸空

腹煮白粥飲研下日二服漸加至十九

治小兒赤白痢裏急後重訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核

地榆去苗微炙

醋石榴皮炙焦

高良薑

赤石脂各半兩

吳茱萸湯洗焙乾炒壹分

黃連去須參分

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服七丸溫米飲下空心午後各一看見大小以意加減

治小兒下痢赤白乳食減少腹痛滿悶中黃散方

定粉

鉛丹

貳味銀器內同炒令赤

海螵蛸

龍骨各壹錢

訶梨勒

炮去核貳錢

右五味搗羅為散每服半錢匕紫蘘木瓜湯調下量

兒大小加減服

治小兒赤白痢腹痛黃連湯方

黃連去須壹兩

乾薑炮

艾葉炒各半兩

治小兒烏梅肉參

右四味咬咀每服二錢匕以水八分一盞煎去滓取三分空腹溫服

治小兒血痢

論曰熱痢不差則變血痢由痢久腸虛熱毒留滯血脉妄行流滲腸間腸虛則泄故為血痢也

治小兒血痢茜根飲方

茜根剉壹兩

地榆批剉參分

馬蘭子

微炒壹分

黃連去須

黃蘗

去麤皮微炙

黃芩

去黑心各壹兩半

當歸切焙壹兩

右七味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水七分入生薑二片同煎至四分去滓分溫二服空心晚食前各一服更隨兒大小以意加減

治小兒血痢無度黃連湯方

黃連去須壹兩半 艾葉微炒壹分 阿膠炙令燥半兩

右四味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水七分入葱白二寸并須切同煎至四分去滓分溫三服空心午後各一服量兒大小以意加減

治小兒血痢無度黃連湯方

黃連去須壹兩半 白朮炙兩 甘草炙兩 黃藥子壹分

治小兒瀉血不定

右六味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水七分煎至三分去滓分溫二服食前日二隨兒大小以意加減

小兒瀉血不定 樗根白皮炙香剉參分 無食子壹枚

右五味麤搗篩每一錢匕水七分煎至四分去滓分

溫二服早晨晚後各一量兒大小加減

治小兒血痢不止

肉豆蔻去殼壹枚 茜根剉半兩 茶末壹分

治小兒血痢不止麝香散方

治小兒血痢不止麝香散方

小麝香壹錢 鹿角屑半兩 炒微焦 亂髮灰兩半

右三味同研為散每服半錢七粥飲調下日三四服  
量兒大小加減

治小兒血痢地榆湯方

地榆剉 黃藥去麤皮 微炙 黃連去須

黃芩去黑心 各壹兩半 馬藺子微炙 半兩 茜根剉 壹兩

右六味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞入生薑  
一片同煎至三分去滓分溫二服食前日再隨兒大

小以意增減

治小兒血痢薤白飲方

薤白拾莖 切 香豉壹合 山梔子人枚伍

黃連去須 半兩

右四味除香豉薤白外餘麤搗篩一二歲兒每一錢  
匕水七分入香豉二七粒薤白一莖切同煎至三分  
去滓分溫二服量兒大小增減

治小兒藏府虛滑瀉血腹痛固腸丸方

槐鵝半兩 炒 黃色 肉豆蔻參枚 麩 裏燒香 乾薑炮裂 半兩

枯礬壹分

右四味搗研細為末麩糊為丸如麻子大乳香湯下  
一二歲兒每服十九日進二服

治小兒脾毒瀉血蝟皮散方

刺蝟皮剉

陳槐花

白礬

鹿角屑

各壹兩

王瓜

半兩

右五味同入沙合子內用鹽泥固濟令乾燒令通赤

取出為細散每服半錢匕入生薑自然汁兩三點用

臘茶清調下

治小兒腸虛腹脹瀉血不止地榆丸方

地榆

草豆蔻

黃耆

枳殼剉炒去

剉半兩

右四味搗羅為細末麵糊為丸麻子大二三歲兒每

服十九草節湯下日三服

治小兒血痢不止胡黃連丸方

胡黃連

黃連

丁香

小盧會

五靈脂

乾薑

檳榔

木香

麝香

右九味搗研為末用炊餅丸如麻子大每服三五丸

量兒加減溫米飲下

治小兒血痢犀角飲方

犀角

檉皮

右二味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水七分煎至四

分去滓分溫二服空心午後各一服量兒大小加減  
治小兒毒熱血痢香豉飲方

香豉

微炒

梔子

伍枚

黃連

去須

右三味麤搗篩每一錢七水七分入薤白兩莖切同

煎至四分去滓分溫二服空心日晚各一量兒大小

加減

治小兒血痢腹痛減食四肢瘦弱渴不止黃芩丸方

黃芩

去黑

地榆

龍骨

人參

白朮

厚朴

去麤皮生薑

兩

白茯苓

去黑

漏蘆

去蘆頭各

酸石榴皮

切炒

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服七丸空

腹米飲下日二更量兒大小加減服

治小兒熱痢不差血脈妄行變成血痢青橘丸方

青橘皮

去白

黃連

去須

右二味搗為末用豮豬膽汁和却入膽內以米泔煮

熟取出入麝香少許研勻丸如黍米大每服十五丸

白米飲下

治小兒血痢煩躁方

右取藍青汁量兒大小分減服之



小兒膿血痢者由腸胃虛弱冷熱不調寒多則色白或如凝脂與膿兼下熱多則色赤或似梔子汁甚則純下鮮血冷熱交攻膿血雜下治法當分其冷熱疳蟲而治之則無不差

治小兒下痢膿血腸鳴腹痛赤石脂散方

赤石脂

研

龍骨

研

地榆

研

黃連

去須各青兩

厚朴

去麤皮生薑汁塗炙伍徧

人參

各參

當歸

剉

乾薑

炮裂各半兩

右八味搗羅為散每服半錢匕用米飲調下日二如

要丸鍊蜜丸如麻子大乳汁下五丸至七丸空心午後各一服隨兒大小以意加減

治小兒膿血痢石榴皮散方

醋石榴皮

微炒

乾薑

炮裂

黃連

須

訶梨勒

煨去核各壹分

右四味搗羅為細散每服半錢匕空心午後各米飲

調下一服隨兒大小以意加減

治小兒下痢膿血腹痛腸鳴乾薑散方

乾薑

炮裂

黃連

去須參分

人參

參分

肉豆蔻

去殼壹枚

當歸

剉參分

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙伍徧

兩半

右六味搗羅為細散每服半錢匕以粥飲調下空心  
午後各一服量兒大小加減

治小兒膿血痢肉豆蔻散方

肉豆蔻貳枚  
去殼

當歸剉  
半錢

蜜陀僧研

訶梨勒核  
去

黃連去  
須

枳殼去瓢  
麩炒  
各一分

龍骨分半

乾薑炮裂  
半兩

右八味搗羅為散每服半錢匕空心米飲調下隨兒

大小以意加減

治小兒膿血痢黃連丸方

黃連去  
須

龍骨研

黃芩去黑  
心

白石脂研

當歸剉  
焙

赤石脂研各  
參分

烏梅肉微炒各  
半兩

右七味先以四味搗羅為細末入研藥和勻鍊蜜丸  
如麻子大每服五丸空心晚食前米飲下量兒大小

加減

治小兒下痢膿血腹痛虛煩肉豆蔻丸方

肉豆蔻去  
殼

木香

訶梨勒炮去核  
各參錢

蜜陀僧壹  
錢

人參

白茯苓去黑皮  
各壹分

右六味搗羅為細末用燒粟米飯丸如棗豆大每服

七丸温米飲下

治小兒百疳內下痢如魚腦赤白雜痢腹痛多啼乾藍湯方

乾藍葉

升麻

芍藥各壹兩

梔子人肆枚

右四味麤搗篩百碎至二百日兒每一錢匕以水半盞入香豉七枚薤白一莖拍破同煎至三分去滓分温三服食前隨兒大小以意增減

治小兒膿血滯痢當歸黃連湯方

當歸剉焙壹兩

黃連去須參分

桂去麤皮參分

赤石脂壹兩壹分

人參參分

乾薑炮裂參分

龍骨壹兩

白頭翁參分

甘草炙參分

附子炮裂去皮臍壹兩壹分

右一十味剉如麻豆每一錢匕水七分煎至四分去滓分温二服空心午後各一服兒大以意加之久冷者去白頭翁加牡蠣三分

治小兒腸澼下膿血白石脂散方

白石脂燒令赤壹分 亂髮燒灰壹分

甘草炙令赤半兩

右三味搗研為細散每服一字至半錢匕早晨午後各一服米飲調下隨兒大小以意加減

治小兒藏毒久痢下膿血如聖散方

右用好棗一枚去核入鉛丹半錢匕礶砂一皂子大  
膩粉抄一錢匕三味細研入在棗內用大麥麩裏煨  
灰火燒香熟為度去麩爛研為粉每一枚棗分兩服  
煎槐花湯調下二服定

治小兒純痢膿血鮮湯丸方

粉霜

膩粉

丹砂

礶砂各壹錢

白丁香壹錢

乳香半錢

巴豆去皮心半錢  
不出油研

右七味研為細末煮棗肉和成劑每服旋丸如粟米

大二丸量兒大小加減煎魚鮓湯下次用調胃藥和  
之

治小兒下痢膿血寒熱不除蠟蜜丸方

豉捌拾粒炒  
令黃焦

大豆炒令黃香  
去皮半兩黃連去須壹分

巴豆貳拾枚去皮心麩  
炒令香出油盡

芫花醋炒  
魚

消石各壹分

右六味擣羅為細末入鎔蠟一分并鍊蜜和丸如黍  
米大一二百日内兒每服二丸一二歲兒每服可五  
丸三四歲兒每服七丸米飲下空心隨兒大小加減  
服之

治小兒一切痢疾丹砂丸方

丹砂研半錢

砒霜研半錢

巴豆霜研

朱硫黃研

麝香研

菜豆粉研各壹分

右六味同細研令勻用燒飯為丸如菜豆大每服三

丸血痢煎黃芩湯下白痢煎附子湯下疳痢哈粉湯

下

治小兒熱毒痢下膿血羚羊角湯方

羚羊角屑

茜根

吳藍各參分

黃連去須

赤石脂炒

地榆

大當歸剉炒

阿膠炙燥各壹兩

黃芩去黑心

甘草炙各半兩

右十味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎去滓取五

分空腹分溫三服

小兒蠱毒痢

論曰小兒下痢瘀血如雞鴨肝片隨痢而下者蠱毒痢

也此由歲時寒暑不調有毒厲之氣中兒腸胃其邪與

血氣相搏變而成痢血毒氣盛熱則傷損府藏如中蠱

之狀故名蠱毒痢

治小兒蠱毒痢下血體羸黃連飲方

黃連去須壹兩

犀角鎊

白蘘荷根

黃芩去黑心

茜根各參分

敗鼓皮炙

小藍青各參分

甘草炙

白頭翁去蘆頭各半兩

右九味麤搗篩一二百日兒每半錢匕水半盞煎至

三分去滓分溫二服更量兒大小加減

治小兒蠱毒痢下血不止犀角飲方

犀角鎊

地脉草各壹兩

右二味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水一盞煎至五

分去滓分溫二服更量兒大小加減

治小兒蠱毒血痢地榆飲方

地榆

黃蘗去麤皮炙

黃連去須

馬芹子炒

黃芩去黑心各參分

蔓菁根洗切半兩

右六味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水一盞入生薑

少許煎至五分去滓分溫二服

治小兒蠱毒血痢發甚心神煩悶腹脹不欲飲食犀角

散方

犀角屑參分

白蘘荷根參分

地榆參分微炙

桔梗參分去蘆頭

蘇枋木參分

右五味搗羅為散每服一錢匕水一盞煎至五分去

滓溫服不拘時候量兒分減服

又方

葱白兩參

香鼓金參

梔子柴枚

黃連兩壹

右四味搗篩為散每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治小兒蠱毒血痢犀角樗皮散方

梁州樗皮貳兩半炙剉

犀角屑壹兩

右二味剉篩令勻每服二錢匕水一盞煎至五分去滓溫服量兒大小以意加減

治小兒蠱毒血痢身體壯熱煩悶升麻散方

升麻

白蘘荷根各壹兩犀角錢

芍藥各參分

敗鼓皮炙魚壹分乾藍

甘草炙各半兩

右七味麤搗篩一二歲小兒每用半錢匕水半盞入豉七粒煎至三分去滓分溫二服空心午後各一更量兒大小加減

治小兒蠱毒血痢犀角地榆湯方

犀角錢

地脉草各壹兩

地榆剉參分

右三味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水一小盞入蜜半匙煎至五分去滓分溫二服更量兒大小加減

平滋潤至正分法...

亦三...

...

...

...

...

...

...

大德重校聖濟總錄卷第一百七十八





