

書

世醫得效方卷第十一

建寧路官醫提領陳

志

刊行

南豐州醫李教授危

亦林

編集

江西等處官醫副提奉余

賜山

校正

小方科

活幼論

嘗謂木有根葉永則有源根葉盛則枝葉暢茂源深則其
流必長小兒面交母元氣而生成元氣盛則肌膚充實驚
疳積熱无由而生月寒暑濕略病即愈元氣虛則體質怯
弱諸證易生所患輕則藥能調治所患重則可治者鮮故

試碎之後或不能言或不能行或手拳不展髮不生斯猶
可治甚則初生之時睛風撮口下腸等證鎖肚重舌先
古焦遍躰青黑如此證狀非急療則百无一活若其餘諸
病不一治之之道當觀形容察色聽聲切脉觀形則先觀其
形若兩眼先精光黑睛先運轉目捷先鋒芒如魚眼插眼
若不治或神藏於內而外若昏困神氣不賦息豈无再活
之理察色者若面目俱青眼睛竄視此為驚邪入肝面紅
眼赤悵悵夜啼則驚邪入心面青悲叫啣牙乃驚邪
入腎面色淡白喘息氣乏則驚邪入肺面黃嘔吐不食虛
多睡乃驚邪入脾皆隨其狀而治之若夫聽聲則睡中
驚啼聲悍者易治聲沉不響者難治或舌如鴉中彈者

治至於切脉虛則細而遲實則洪而數次當有紋候男左
女右手辨之從虎口內至第一節是風關第二節是氣關
第三節是命關第一節赤紋乃飛禽內射人驚赤紋微乃
火驚黑則水驚兼打撲驚青色乃天雷四足驚內隱青紋
微屈則是急風快紋穹乃停食候第二節氣關紫色紋是
驚疳青色紋乃疳傳肝經白則疳傳肺經若黃色乃傳脾
經黑色難安第二節命關青黑紋現三關通度斜歸指甲
則不治至於驚疳積執四證驚者虛悵怔忡氣怯神散痰
涎來去其瀉必青積漸生風其證有冷熱虛實冷則燥之
虛則溫之實則利之執則涼之是為活法急驚之候通關
截風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已後又急須和

胃鎮心不可過用寒涼等劑其或口中出血兩足擺跳腹
肚搖動摸体尋表神昏氣促噴藥不下通閉不噉心中痛
絕忽大叫者難愈慢驚之候宜於生胃氣藥和以截風定
搐不可太燥其或四肢厥冷吐瀉如嗽面黯唇快胃痛鴨
聲口生白瘡髮直搖頭喘急涎鳴口眼手足一边牽引者
難愈慢脾十救一二祇當生胃回陽如太衝脈在則取百
會穴多灸之若身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟大小便不
禁虛痰上攻呼吸氣麓脉來浮數是謂陰盛強陽錯認陽
氣已復直与峻藥下痰痰隨氣下人以醫殺也此則覆
燈將絕之證雖不藥亦無生意矣又有喉中痰涎声如拽
鋸一兩日間閉目不開此為虛痰飽養其氣痰下痰亦

未可保蘇合香白圓子輩姑與之男子婦人有此證亦當

證各瘧病發癰天嚙亦風之種類舉身僵仆有汗不惡寒

手足冷口噤為柔瘧無汗惡寒身反張咬齒為剛瘧得之

未易施治諸癰八證馬癰張口搖頭馬鳴反折手癰喜揚

吐舌大癰手屈兩足拳攣雞癰搖頭反折並屬陽瘧癰口

吐涎未振目視人生癰目視腹脹烏癰唇口撮聚手足俱

搖蛇癰身軟頭舉吐舌視人並屬陰瘧治法須辨其冷熱順

逆豁痰除風其或目睛不轉口噤無聲唇面青黑壯

熱下血厥逆吐利汗出壯熱不止體軟不睡眼

之候天嚙者壯熱翻眼手足搐掣如魚之上

日學毋過食熱毒逆復乳兒兼挾風邪所致但當解

利風熱則應手而愈。發為風諸證，有不可治者。總而論之，項筋無力，魚口氣，籠齒，齒咬人，瀉下如痰，血手足搐，溺不停，目以開不開，身軟口噤不食，木舌乾澀，及張脊強，顛陷不動，啼不作聲，冷汗如雨，慢脾炎不醒，視物不轉，睛眼上赤，赤脈，盧扁復生亦無如之。何若疳候，兒童二十歲已下為疳。二十歲以上為癆瘵，與疳皆氣血虛備。臟腑受傷，故有肝心脾肺腎五疳，各有蛔疳，脊中腦疳，乾疳，疳渴，疳瀉，疳痢，腫脹，疳勞，無辜疳，丁奚，哺露，治之各有方。其病多因乳哺失常，腸胃停滯，或妄服吐下藥，津液內竭而得之。故其為候，面皮光急，毛髮焦稀，頭縮鼻乾，淡唇白，兩眼昏爛，揉鼻，擗眉，脊脊聳，身黃，齒甲咬牙，焦渴，汗澀，曰瀉，酸肚脹。

腸鳴，瘰結，潮熱，或身多瘡疥，酷嗜瓜果，鹹酸，灰火，泥土，多飲水者，皆其證也。惟腎疳害人最速者，蓋腎虛受邪，熱疳氣奔上焦，故以走馬為喻。初作口氣，次第齒黑，盛則齟齬，熱血迸出，甚則齒脫，宜急治之。縱得全活，齒不復生。其餘諸疳，如或飲水不已，滑泄不休，舌上黧黑，目睛青筋，眼角黑氣，小便如乳，牙黑，骨枯，脫肛，欬逆，氣促，身上粟生，斑黑，唇白，腹高，人中平滿，抱著手足，垂鞞無力，襯著脚心，全不知疼，身躄，變冷為五絕，宜有瘰疬，疔積者，面目浮黃，溇脹，脹痛，覆睡多困，酷嗜不食，或大腸秘澀，小便如油，或便利無禁，糞白酸穢，此皆其證也。其或面黑，瀉黑，肚脹，泄下不止，氣痿，手心有瘡，瘦弱，柔輒亦莫能療，熱之為病，有實有虛。

實者兩臉深紅唇口紅紫燥渴焦煩大小便難啼叫無時
時發極熱虛者面色青白恍惚微潮口中清冷泄瀉虛汗
或乍冷乍溫上壅下利水穀不分乃冷熱不調外有十證
熱者潮熱如瘧風熱不減乳食積熱多吐傷寒脚手冷耳
鼻脚稍手指尖冷乃麻疹之證唇汗口珠乃變蒸候也多
瀉多渴疳之爲熱面青脉大驚熱的矣脾痛啼聲不息瘵
毒驟然目閉面如丹胎中全不受熱諸吐乳食化面色黑
隨食隨吐通身冷則爲不治諸瀉日久不宜緊澁之藥卒
止先須調氣和中若洞瀉不止乳食不進無有愈期汗多
舌出唇江眼閉搖頭氣壅兩脇動口生血瘡吐瀉得之者
曰胃爛夫亡轉盼至於八痢則有魚口噤口五色脫肛

毒脾毒冷積疳痢無非便下膿血裏急外重腸腹急痛且
夜無度治之當何如須究其因先以去積寬腸通氣之劑
續爲之斷下鮮有不愈其或所下如魚腸血水壯熱煩渴
不食自汗小便不利未知有瘰瘡疹一證迺表虛裏實其
根於臟腑所患重麻疹表實裏虛其根於皮膚所患輕不
治亦自愈至若痘疹多因時令不正氣候傳染加之外感
風寒內積邪熱而得大抵與傷寒相類發熱煩燥臉赤唇
紅身痛頭疼耳鼻脚稍手中指俱冷噴嚏呵欠喘嗽痰涎
或乍寒乍熱疑似之間當視其耳後有紅脉赤縷及見心
胃間細點如粟起爲眞首尾不可汗下宜溫涼之劑解毒
和中安表大要如有人作寵炊樣務得鬆耳其或熱極生

周或發驚搖但當清心散風切不可投以驚之藥及灼艾
蓋灸則火助熱熾投以驚藥則毒氣內伏反為大害仍忌
諸般臭穢煎炒油煙父母行房梳頭等觸犯未發而觸則
毒氣入心則亂而死已發而觸則瘡痛如割以至黑爛切
宜禁戒仍燒帶諸香及打醋炭噴麝香酒於漏窠以辟穢
濁之氣却不可以田舍兒不忌無恙為常法病此者多不
服藥豈知未發已發則合解散正發則合活氣血若依此
非惟出疎亦易乾斃仍免後慮若不依此則邪盛瘡密收
亦費力餘毒為患致生癰疽疥癩赤眼咽喉口瘡之疾至
於善惡之證猶當細認如善證則乳食如常大便或一日
一次或兩日一次通者只須用和不冷不熱之藥自保十

平全如惡證則春夏屬陽為順秋冬為逆冬月寒腎水得
時多歸於腎或先如癰後發渴其瘡色如黯血此腎證也
不治春膿疱為金尅不夏黑陷為水尅火秋斑子為火尅
金冬疹子為土尅水並逆鼻有黑氣或舌黑瘡已出而譫
語燥渴小便澀泄瀉不入食瘡成餅搭黯慘不發其聲焦
啞兩眼閉而黑睛矇昧面腫鼻陷目閉頰齒齒頭面腫大
瘡盡抓破或臭不可近或脚冷至膝瘡小黒而焦風攻頤
頤唇項腫硬曾高而突以上證狀均不可治外此至於風
寒暑濕之感與大人無異治之法特劑量差少耳雜證則
隨方備治吁為醫道之大方脉為難活幼尤難以其臟腑
脆嫩皮膚軟弱血氣未盛經絡如絲脉息如毫易虛易實

易冷易熱兼之口不能言手不能指疾痛之莫知非觀形
察色聽聲切脉究其病源詳其陰陽表裏虛實而能療之
者蓋亦寡矣若妄投藥餌即生他證可不戒之

初生

試探法 嬰兒在胎口中有惡物纏生不候聲出急用軟帛
或綿裹手指蘸黃連甘草汁拭口惡汁稍定更以蜜少
許調朱砂末一字抹入口中鎮心安神解惡物之毒一
生免瘡且之患姓婦臨月預辨之

刺治法 小兒纔生下即死用此法可救活急看兒口中懸
離前脰上有泡以手指摘破用帛捏拭血令淨若血入
喉即不可治

四氣法 初生氣欲絕不能啼者必是難產或冒寒所致急
以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置炭火爐
中燒之仍作大帛熱醮清油點著於臍帶上往來遍帶
燎之蓋臍帶連兒臍得火氣由臍入腹更以熱醋湯盪
洗臍帶須臾氣回啼泣如常方可浴洗了却斷臍帶
通便法 初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水
漱口了吸啞兒前後心并臍下手足心共七處每一處
凡三五次漱口吸啞取紅赤為度須臾自通不爾無生
意者此證遇此法可謂再生

貼額藥

治出胎時被風吹鼻塞服藥未退

右用天南星為末生姜自然汁調或膏貼額上病去除

奇方 治初生下遍身無皮但是紅肉宜速以白早米粉乾撲候生皮方止

又治生下遍身如魚泡又如水晶碎則成水流疹

右用密陀僧研縮羅內羅過乾糝仍服蘇合香圓見中氣類

又治七日腎縮乃初生受寒所致

右用硫黃茱萸各半兩為末研大蒜調塗其腹仍以蛇床子微火燒熏之

噤風

辰砂膏 治眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故形見於喉舌或為風邪擊搏致之

辰砂 三升

鵬砂

馬牙砂各半 玄明粉 二升

全蝎

真珠末絡一

生麝一字

右為末好油帛封裹自然成膏每服一豆粒許用乳汁調傳乳頭上吮下金銀薄荷湯下亦可有潮甘草湯服

益神散 和胃進乳消痰

白茯苓

人參

草果仁

蘇子微炒

木香濕節暴熱火內煨

甘草

陳皮

厚朴上籠皮姜汁炒

右劉散每服一錢生薑一片紅棗一枚末乳前服合澤乳母服

單方 治初生七日口噤

右用牛黃一錢細研以竹瀝調一字灌之更以猪乳點於口中

臍風

天麻圓 治因斷臍後為水濕風冷所乘入於臍流於心脾遂令肚脹臍腫身軀重著四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐此藥利驚下痰凡釣腸鎖肚撮口皆可用
南星炮 白附子炮 牙硝 天麻
五靈脂 全蝎焙 輕粉半水 巴霜一字
右為末稀糊圓麻子大每服一圓薄奇姜錢泡湯送下若臍邊青黑及瓜甲黑者不治

正聖散 治同上

蜈蚣一條酒湯去毒炙

瞿麥半水

蝎梢五箇去毒

直僵去毒

右為末每一字吹入鼻啼則可醫仍服薄奇調一字服

聖散

赤脚蜈蚣半條酒炙

麝香少許

川烏尖生

右為末每服半字金銀器湯調下

治臍腫

先用荆芥水洗了葱葉一皮火上炙過地上出火毒以手指甲刮薄內搭放腫處次日便消用通心散

毒以手指甲刮薄內搭放腫處次日便消用通心散

小驚圓

方見後

安臍散

治臍中汁出或赤腫響痛或因水與乳入臍所致

右當歸為末傳蝦蟇燒灰白石脂末油髮灰傳皆可

撮口

僵蚕方 治面黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾執
流毒心脾故令舌強唇青聚口撮面飲乳有妨

右用直僵蚕二枚去背畧炒為末蜜調傅唇中效

天麻圓 治釣腸鎖肚等撮口內氣引痛腸胃鬱結不通則

亟宜踈利此藥特效方見前若口出白沫四肢冰冷最為

惡候一臘見之尤急又法極驗其兒齒齦上有小泡子如

粟米狀以溫湯蘸乾乾高裹手指輕擦破即開口便安胎用

蠟精散 治胎風及百日內撮口胎風

右用蠟梢四十九箇每一箇用薄奇葉捲定以綿扎放

砂鉢中衮轉炒令薄奇乾酥為度再用白倭蚕四十九

箇生姜汁沙乾去絲背同為末更以腦子生麝香少許

研勻紫雄雞肝二片煎湯調下

不乳

奇方 治初生不飲乳及不小便

右用葱白一寸四破之以乳汁銀石器煎灌之立效

又治初生口噤不開不收乳

右用赤足蜈蚣一條去足炙令焦細研如粉每用半水

以猪乳汁二合和勻分三四次灌之

茯苓圓 初生兒穢口不前惡穢入腹腹滿短氣不能飲乳

赤茯苓去皮 川黃連去鬚 枳殼炒 各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每一圓乳汁調灌下

川貝姜散 治產婦取冷太過胎中受寒令兒腹痛不飲乳

木香

陳皮

檳榔各一分官桂

川白姜

甘草各半分

右剉每取一掬水一合煎以綿蘸與之嘔加木瓜丁香

變蒸

惺惺散治亦多蒸亦變者上氣蒸者體熱輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有續感寒邪者但寒象則耳冷體冷上唇頭白泡如魚目珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹痛啼叫不已每服一錢麥湯調下熱甚麥門冬薄荷葉湯下方見後外感類

紫羅圓治亦多蒸亦變不解并發傷寒溫壯汗後熱不歇及

帝有痰癖哺乳不進乳則止現生寒後熱者

代赭石二十粒赤石脂二十粒巴豆五粒杏仁五十粒

右以二石為末別研巴豆杏仁為膏相和更搗一二千

杵當自相得若硬入少蜜同杵之圓如粟米大用密器

收每服二圓與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至

日中當小利熱除若未全除明日更與二粒百日兒服

五粒以此准定增減此藥兼治驚積痰癖食癩溫壯諸

疾無所不治雖下亦不虛人

人參散治變蒸骨熱心煩啼叫

人參

甘草

麥門冬去心北柴胡

龍膽草

防風各壹錢

右劉散每服三字水一盞煎服

當歸散 治變蒸有寒無熱

當歸 一銖 木香 官桂 辣者 甘草

人參 各壹銖

右劉散每一錢水一盞薑三片紅棗一枚煎食前服

調氣散 治變蒸吐瀉不乳多啼

木香 香附炒去毛 厚朴去麩皮 人參

橘皮 藿香去土 甘草炙

右劉散每服三字水一盞生薑二片紅棗一枚煎溫服
以上證狀治之但當以平和之劑微表熱者微利之
或不治亦當自愈

通治

乳哺法 凡初乳先須捏去宿乳後與之毋欲寐即奪其乳

恐睡困不知飽足兒啼未定氣息未調乳母勿遽以乳
飲之故不得下停滯胸膈而成嘔吐乳後不與食哺後
不與乳脾胃怯弱乳食相併難以化幼則成嘔而結
於腹中作疼大則成疳成積成疳皆自此始

護胎法 小兒肌膚未實若厚衣過煖傷皮膚損血脈發瘡

癩汗出腠理不開風邪易入若天氣和暖抱之使見風
日則血氣堅剛肌肉硬可耐風寒不致疾病今人懷抱
小兒不著地氣致令筋骨緩弱疾病易生非愛護之法
相兒命短長法

凡兒三歲已上十歲以下視其性氣高下即可知其夭壽
兒小時識悟通敏過人者多夭小兒骨法成就威儀迴
轉遲舒稍費人精神離塚者壽預知人意迴旋敏速者
亦夭初生叫聲連延相厲者壽聲絕而復揚急者不壽
啼聲散啼聲深汗不流頭四破小使疑如脂骨常搖手
足頭毛不周匝者並不成人胛中無血者好胛小者縮
身軟弱如無骨者汗血者多死並不壽鮮白長大如縫
通達黑者並壽目視不正數動者夭非佳早坐早行早
齒早語皆惡性非佳人髮稀少者強不聽人額上有旋
毛妨父母或早貴初生枕骨不成能言而死死骨不成
能偃而死掌骨不成能匍匐而死踵骨不成能行而死

臍骨不成能立而死身不收者死股間無生肉者死
下破者死陰不起者死陰囊下白者死赤者亦死

四君子湯 隨證加味量兒大小用

人參 白朮 茯苓 甘草 各等分

右爲末每服一錢 傷寒麻黃豆豉北柴胡 吐瀉南

木香藿香乾葛 潮熱牛黃鬱金朴硝全蝎薄荷 麻

豆牛蒡子紫草蟬退荆芥 腹脹枳殼木通蘇子薑系

冷瀉扁豆肉豆蔻薑錢棗子 咳逆肉豆蔻木通 大

熱苦竹瀝 積熱上攻茅根淡竹葉甘草 乳食不下

呵子木香 時行咳嗽藿香枳殼薑錢 暴風燥痒荆

芥牛蒡子枳殼高良薑蟬退 鼻流清涕羌活麻黃防

風 泄瀉肉豆蔻木香 滑腸呵子榴皮 臟毒形如

白利或有血根如魚腦髓豆蔻地榆栗殼 赤痢栗殼

烏梅 白痢栗殼白薑 大便不利大黃朴消 小便

不利木通車前子 霍亂木瓜藿香夏月加香薷 腹

痛茴香附子或用澤瀉郁李仁薑棗或只用木瓜豆蔻

腹緊積候三稜檳榔薑湯下 有淋火麻子仁生熟皆

可車前子海金沙葶藶子下 瀉血生地黃瞿麥 渴

枇杷葉炙去毛瓜根 咳嗽杏仁炒去皮尖貝母知母

薑錢蘇子 夜睡驚喘茯苓酸棗仁 驚邪癩奇朱砂

犀角人參 顛癇甘草朱砂茯苓牛黃乳香犀角人參

鉛白霜 喉痺犀角杏仁當歸百合大黃 口瘡

雞內金腦子黃芩朴消苦竹葉 唾血生地黃當歸雞

節側柏人參蒲黃 血衄蒲黃山梔子淡竹葉 目赤

秦皮菊花苦竹葉甘草 疔虫檳榔史君子松殼苦棟

皮 頭昏石膏川芎 癩瘡及腋下氣塊肚痛此氣疾

也用天雄參稜朴消大黃 五心熱犀角腦子磨刀水

下 氣不升降沉香蘇子 養氣肥兒檳榔木香紫蘇

葉紅棗

驚候 附天病

大安神圓 又名**大驚圓** 治心熱夜啼煩燥常用安神定志

去驚

人參 去盡 茯苓 各半兩 甘草 壹兩 僵蚕 去絲 半

白木半兩

桔梗尾半兩 辰砂半兩

全蝎伍箇

金銀箔各陸

麥門冬去心

木香各半兩

酸棗仁湯去

皮殼蚌

大赭石半兩

右為末水圓或蜜圓

急驚潮熱竹青薄荷葉

夜啼

龜心土

傷風荆芥湯

疹豆蟬退去足翼

搐搦防

風常服金銀薄荷

慢驚冬瓜子仁

凡驚風已退

神志未定加琥珀三錢別研遠志半兩去心薑汁炒

為度加入

星香散

治無慢風搐搦竄視延潮

南星圓 鉤者 木香

橘紅各一分 全蝎二枝

右劉散水貳盞生薑四斤慢煎熟頻灌大便去涎即愈

朱復丹

治驚風昏塞以二二圓薄荷泡湯研灌下得泄即愈

凡驚風對證用藥已效若覺未甚蘇省可與服

又方安神圓定驚

麥門冬焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石各半

朱砂參錢

甘草半兩

龍腦貳字

右為末煉蜜圓雞頭大每服半圓沙糖水化下不拘時

奪命丹

治急慢驚風

蛇含石醋淬

大赭石各一兩

全蝎去毒

鐵孕 粉半兩

右為末每服一錢薄荷煎湯入雄雞冠血少許潮熱入

朱砂病安常用安神圓

安神圓

鬱金 一名角水浸

黃連

牙銷

木香 不見火 藿香

龍膽草 各五錢 全蝎 去毒

右為末糊圓用雄黃朱砂麝香金銀箔為衣

風痰是驚熱重麻仁蟬退防風 白痢白薑罌粟殼

赤痢甘草烏梅 潮熱桃柳枝 鎮驚薄荷可燈心吐

霍香 瀉木瓜陳米 夜啼燈心薄荷可窳心土 精神

不爽冬瓜子仁 大便不通枳殼大黃朴消 盤腸瀉

氣瀉藤天癆亦用 嗽烏梅桑白皮 吐不止丁香末

效黃荆葉 常服金銀薄荷並酌量用

通心散 治心氣通小便退潮熱分水穀反治旋螺風

木通 去皮即 連翹 瞿麥 梔子仁

黃苓 甘草 各等分

右剉散每服二錢水一盞燈心麥門冬去心煎 春盛

蟬退防風夏加茯苓車前子秋加牛蒡升麻冬加山梔

予連翹 瀉氣用釣藤川練子或加白茅根竹葉 口

瘡地黃野苧根湯 旋螺風如赤腫而痛者先用土牛

膝澤蘭煎水洗

大青膏 一歲可用 **甘露飲** 同服此藥治志驚初作傷寒不

解終日溫熱漸溥風候

驚風形證不明言其陰證軍身又溫若作陽證又不大搐

乃陰陽不和宜用 **大風溫陰湯** 同下 **大驚馬圓** **小驚馬圓** 均可

用 方並見前後

利驚

驚風天瀉心熱夜啼驚癇

蟬退

陸拾箇去
土足翼

荆芥穗 乙兩

甘草 半兩
蜜炙

大黃

半兩
畏畏

黃芩

半兩
生用

蝎梢

五拾箇
去毒

右劉散每服二錢水一盞白茅根煎溫服夜啼蟬退疹

瘡紫草得利止

利驚

身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤抽掣

青黛

輕粉 各一錢

天竺黃 二錢

黑牽牛

未生
半兩

右同研蜜圓如小豆大一歲一圓食後薄可水下

入參湯

加枳殼防風最能利驚即小柴胡湯

方見大方
科傷寒類

宜

治同上 方見后

胎驚

治兒在胎中受驚故生未滿月而發驚

右用朱砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中

入麝香當門子尤妙

急驚

急驚涎卒然得之初發潮熱首直視牙關緊急手足搐搦

面紅盛頭額遍身汗出口中熱氣大小便黃赤其脉浮數

宜用通關散 **通心散** 大凡驚風乃心受驚肝主風致筋脉

搐搦肝又主筋宜 **涼肝圓** **大青圓**

理治緣 肝主風宜先涼肝而風自退而色青乃肝

風作宜用凡是肝疾者使用眼疾屬肝亦宜用又可加減

用如眼疾加山梔子龍膽無妨

龍膽草

參錢

大黃

當歸

川芎

山梔子仁 羌活

防風 去各伍錢

右為末蜜圓沙糖竹葉湯下

大青膏

天麻 一錢

白附子 半錢

蝎梢 半錢

朱砂 一字

青黛 一斗

天竺黃 一字

麝香

烏蛇肉 半斤

右為末蜜圓雞頭大每服一錢薄荷班竹葉煎湯下

加味普濟圓

治急驚痰壅目上視手足抽掣昏沉不省

事方見風科

普濟湯

治急驚風角弓反張

人參

黃芩

杏仁

石膏 各乙斤

麻黃

甘草

桂心

芍藥

乾葛

升麻

當歸 去尾

獨活 各三錢

右剉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫服

釣藤飲

治一切驚風潮搐眼視昏迷但是驚風變易皆可服之

麻黃 去節

粉草 各參錢

蟬退 五箇 去足翼

升麻 三斤

龍膽草 二斤

天竺黃

釣藤

羌活

獨活

防風 各三斤

右剉散每服二錢竹葉三皮薄荷三皮煎不拘時溫服

金剛散

不但初生但有風證即用

右以麝香蝎梢薄荷葉蜈蚣牛黃青黛共為末研勻用棗肉膏調新綿上塗勻貼火灸煖手頻熨之百日外兒

更可用浴躰法

浴躰法 驚風及傷風不醒漸傳風證僵仆皆可用

右用天麻蝎尾朱砂烏蛇肉酒浸白礬麝香青黛為末
每三錢水三椀桃枝一握并葉煎十沸溫熱浴勿浴背

慢驚

慢驚風證得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼之藥其

證眼慢騰七或露睛手足瘳癢面色青白渾身四肢冷默

默不聲其脉沉澤用**白木散**益黃散防風冬瓜仁煎服

神圓 冬瓜仁湯磨化方並見后

南星散 宜利過多脾困眼慢涎盛四肢不舉不思飲食

天南星冬半箇炒 冬瓜子仁 白扁豆略

右為末每服一錢生薑二片防風少許煎湯調服

防風散 治慢驚不省手足微動眼上視昏睡

天麻 防風 人參各乙兩 全蝎去毒

僵蚕炒 粉草各五錢 朱砂 雄黃各錢

麝香半錢

右煉蜜圓小指頭大人參湯化一圓不以時候冬瓜仁

湯尤妙

觀音散 治胃氣不和脾困下瀉過多不思飲食乳食不化

精神昏慢四肢困冷

人參 白木紙裹煨 扁豆炒 白茯苓

冬瓜子仁 酸棗仁去皮 甘草各半兩

藿香

枳殼去穢各錢半 紫蘇葉少許 木香不見火

石蓮肉去心

嫩黃耆各半兩

右為末每服一錢烏梅湯冬瓜子仁陳米湯調皆可

五苓散

止吐瀉每服壹錢紫蘇梗陳米湯調下方見大方科傷暑類

小續命散

治吐利脾胃虛風慢驚馬

釣藤三錢

蟬退拾个

防風

人參各錢

麻黃貳木

僵蚕

天麻

全蝎去毒

甘草

川芎各錢

麝香少許

右劉散每服二錢水一盞煎藥加附子少許乳食前服

南附湯

治洩瀉虛脫生風名慢驚風及因服冷藥多者

南星

生附子二錢

全蝎五箇去毒

劉散每服二錢水一盞薑二片煎五分量大小旋服

湯

治吐瀉虛脫成慢驚風

大附子

生或炮去皮癢

右劉散每服一錢水一大盞生薑伍片丁香伍粒煎五

分量大小與之急無丁香亦可屢收奇功

蘇合香圓

治風搐搦必須理氣益氣平則痰下關竅自通

方見大方科中

灸法

治急慢驚風危極不可救者

先當兩乳頭上男左女右灸三壯次灸髮際眉心額會

三壯手足大指當甲角以物縛兩手作一處以艾騎縫

灸男近左邊女近右邊半甲半肉之間灸三壯先脚後

手亦可治陰陽諸癩病艾炷如麥子大

慢脾

藥附湯治慢脾風面青額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若瘵驚則無驚可瘵但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯而然爾世所謂慢風難瘵者慢脾風是也

附子炮去皮

木香一子半

白附子一木

甘草炙半木

右劉散每服三錢水一盞生薑伍片煎取一半以匙送

下若手足煖而蘇者即止

川烏散驅風回陽

真川烏

生

全蝎去毒

木香各半分

右為末每服三字生薑四片煎取其半旋滴入口中嘔吐加丁香

金液丹清心回陽

祛風回陽理痰二藥等分為末每服

半錢陳米飲調下

方見大方科瀉分類

生附四君子湯助胃回陽

右以四君子湯加生附子末四分之一厥逆者對加每服半錢薑五片慢火熟煎以匙送下

回陽氣豁風痰

全蝎七箇 去毒 附子炮 錢 南星炮 白附子炮
木香各壹錢

右剉散每服半錢水一盞生薑四片慢火熟煎旋服

靈藥

正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎傷瀉者勿用研為末

以少許米飲調下或糕粒圓如粟米大兒兩三圓米飲灌

下方見大方 科痢冷類

震靈丹

治慢脾風吐瀉不止每服一圓研人參南木香煎

湯乘熱調下

方見大方 科痢冷類

灸法同前

截風

神效

若見搐搦不已或為狂迷悶角弓反張或昏沉

直視頻嘆不省變為癇證亟宜服此藥以除之却未
可多進更須以疎風藥相間調理凡服此藥亦須先以木
香烏藥枳殼檳榔磨少許灌之却服庶使關節通透藥力
無不到

花蛇頭酒浸去皮 骨伍錢

全蝎拾伍箇 去毒 紫粉伍錢

生麝香半錢 五靈脂伍分 朱砂叁錢

真麝香

沉香 白附子各伍錢

金銀箔各伍

蛇含玉或兩沙窩煨令亦濃煎甘草湯 以手搥得酥為度方可用

一方加防風

白蚕

南星

天麻各伍錢 片腦子半分

右為末煉蜜圓小指頭大每服大者一圓小者半圓隨

證依後大風膏湯引下

大風膏 定諸般風搗

花蛇酒浸方蜈蚣酒浸夫全蝎去毒

蛇含石式兩燒紅大猪石去毒

天竺黃伍錢天麻三錢防風一兩青黛

紫粉各叁僵蚕去絲白附子 辰砂各伍錢

麝香半錢天南星叁兩薑汁

右為末煉蜜圓久留用麩糊圓如小指頭大每服大者

一圓小者半圓 慢驚冬瓜子仁煎湯下 搗搗雞冠

血薄奇 急驚斑竹葉薄奇 化涎桑白皮湯 退潮

熱薄奇磨刀水 止嗽此五味子杏仁 夜啼燈心龜

心土蟬退 濃磨灌下

奪命散 大控風痰不問慢驚急驚風痰壅塞咽喉其聲如

大朝百藥不能過咽命在須臾服此良久藥裏死隨大便

過如稠涕膠粘乃藥之神效無此證不可服

真青蒙石

始清各壹兩

右同入甘鍋內瓦片蓋定監泥固濟炭火煨通紅須待

硝盡如炭藥冷如金色取出研細為末急驚痰壅身熱

如火濃煎薄奇湯入蜜少許調勻微溫服之 慢驚慢

脾加青州白圓子三粒研為末生薑自然汁調若稀糊

入熟蜜少許調勻溫服

防風散 消痰順氣疎風

半夏

防風各半

枳殼去穢

茯苓各半兩

陳皮

右劉散每服壹錢入生薑紫蘇葉同煎服效

人參羌活散 治壯熱延潮牙關緊急

柴胡去苗

地骨皮去土

前胡去苗

天麻酒浸炙

人參去蘆

羌活

獨活去蘆

羌活去苗

枳殼去穢

茯苓去皮

甘草各半兩

桔梗一錢半

右劉散每服二錢水一盞薄芎少許煎溫服不拘時候

銀白散 治或吐或瀉延鳴微喘露睛驚跳

石蓮肉

白扁豆炒

茯苓各壹分

人參

天麻

白附子炮

全蝎炒

木香

甘草炒

藿香各半分

陳米炒

右為末每服一錢薑一片冬瓜子仁茶粉同煎或用東米飲調下 此藥助胃祛風作慢發與通用

辟瘟散

赤蜈蚣壹條

直僵蚕

南星

麝香一字

猪牙皂角壹錢

右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥

兩三點淡出自開

噴鼻散

半夏壹錢

皂角半錢

右為末以豆許用管子吹入鼻立醒

諸癩

治陽證風癩身熱啼叫手足抽掣面自牽引
口禁痰涎腹肚緊膨皆由血脈不斂氣骨不聚為風邪所
傷驚恠所觸方見前

牛黃清心圓治躁悶項背強直腰脊支張時發時醒方見
風科通治類

琥珀圓治陰證風癩面色黯晦瞪眼直視四肢軟緩身體
無熱手足清冷不甚抽掣不啼哭兼治諸癩陰證則除片
腦子加綿附子炮切片為末入同圓方見前

小兒驚風圓治陽證驚癩心熱恍惚驚悸四體抽掣潮熱昏迷
乍熱乍醒或為驚恠所觸而致方見前

南川湯治陰證驚癩體冷強直手足微動昏睡不醒口噤
涎流或聲或嘿方見前

養神圓治食癩肚脹身軟腰脊強直目睛青赤皆由乳哺
失節結癖所致方見前

得神湯治小兒顛癩及婦人心風諸疾

右用其遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和汁煮
末將猪心批作两片以藥入在內用線縛定外以皮
包裹水濕入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細
辰砂末一錢和勻分作四圓每服一圓猪心煎湯化下
并服別取猪心煎湯神效

養神湯治頭癩連年不瘥濃煎人參湯下
方見大方
科癩冷類

治瘡後疔不能言

右以大天南星濕紙裹煨為末每服一字猪膽汁調下

腦疔散 治小兒心竅有血疔不能言每服伍圓木香陳皮

甘草煎湯吞下蓋方內有黃連能去心中惡血方見后

大法 見慢驚馬類

外感

傷寒傷風鼻塞頭痛或鼻流清涕唇紅面赤焦啼凡傷寒

宜解表幼者麥湯散一二發額上有粘汗妙滿口生瘡

頻出汗只在頭上光如油難治

麥湯散 治夾驚夾食傷寒三劑急救

滑石

石膏

知母

貝母

麻黃

杏仁炒研

甘草

甜葶藶

人參

北地骨皮去骨各等分

右為末每服一水小麥二十粒煎湯下涎盛氣促桑白

皮暢下

散 治風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目溢多睡咳

氣龜鼻衄清涕兼治交蒸

白朮

桔梗

細辛

人參

甘草

茯苓

瓜蒌根各等分

右劉散每服二錢水一盞薄荷三葉煎至半盞時匕與

服古方謂小兒壯熱昏睡傷風熱瘡疹傷食皆相似

未能辨認間但服

香烏湯 **參蘇飲** 治同上 方並見大方科傷寒類

柴胡散 治傷風傷寒熱氣壅延盛胸膈不利或時行疹症未分或痢疾潮熱但是一切積熱溫壯皆宜

柴胡 二刀 人參 甘草 黃芩 各一刀

半夏 包紫灰 麻黃 各五刀

右劉散每服二錢生薑三片薄荷三皮白竹青少許煎溫服 鼻衄加生地黃 瘡疾姜朮桃柳皮地骨皮痢疾作熱用 涎盛桑白皮

人參黃連散 治傷風傷寒發熱頭痛 方見前

傷暑香蘇散 治身熱惡寒頭痛或往來寒熱如瘧煩燥渴甚嘔吐背寒面垢洩瀉昏悶脉伏每服貳分水一盞茵陳

東前草各二莖煎熱服嘔吐加藿香木瓜洩瀉烏梅陳皮

熱瀉黃連每服並各加少許 方見大方科

五苓散 治法湯引同前泄瀉不止 **香蘇散** 治傷風傷寒小使澀大便

梅煎湯下 方並見大方科傷暑及嘔胃類

傷暑香蘇散 治身重脚弱關節痠發熱惡寒小便澀大便

泄自汗或浮滿因久在甲濕或為雨露所襲每服二錢水一盞加炒蒼朮車前子木瓜少許生薑二片煎熱服小便多是效 方見大方科傷寒類

不換金正氣散 治同上

蒼朮 切 兩 米泔浸 藿香葉 陳皮 各五錢

半夏 各五錢 白茯苓 粉草 各五錢

右判散每服一錢生薑二片紅棗一枚煎食前溫服

理中湯 **平胃散** 治傷濕腹痛泄瀉不食每服一錢空心蘇

鹽湯下 方見大方科嘔吐類

諸熱

潮熱通心飲 治下來下去潮熱心煩面赤口乾如瘡狀煎

甘露飲 治同上

寒水石

石膏

欒金

甘草

薄荷 各等分

右為末每服一錢食後薄荷湯調下

天竺黃散 退潮理急驚解唇紅面赤煩燥焦啼

瓜根

甘草

欒金

天竺黃

連翹

防風

牙硝 各等分

右為末每一錢潮熱燈心茅根煎湯下急驚竹葉湯下

涌露散 治伏暑潮熱及小腑不利作渴煩熱頭疼煩燥見

大方科泄瀉類

通心飲

解熱

涼肚圓

疎風

已上方並見前

止瀉圓

壓驚

易積丸

肚疼其糞必臭

葱湯圓

白朮散

方並見后

盧氏感應圓

治諸積旋圓如粟米大每服二粒圓米飲下

葛湯亦可 科見大方 科諸積類

麻子丸

耳鼻脚指中指冷臉赤唇紅肌膚細急宜服

安蘇飲

科傷寒類

溫酒散

方見前

變毒藥 治法并方見前

相熱渴而多瀉 白朮散

方並見后

煇毒藥 皮膚痛啼哭 入參黃活散 入生薑薄苛紫草麥門

冬去心煎 方見前

胎動難乳方 解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不

通不能進乳食

澤瀉 乙兩 二猪苓

赤茯苓

天花粉 各七

生地黄 乙兩 茵陳

甘草 各五錢

右判散每服二錢水一

盞煎食後令乳母捏去宿乳却服

生地黄湯 治生下遍身皆黃狀如金色身上壯熱大小便

不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而

此證乳母宜服并略與兒服之

生乾地黄

赤芍藥

川芎

當歸

天花粉 各等分

右判散每服二錢水一盞煎食後服

汗五心煩燥大病瘥後餘毒不解

犀角

地骨皮

秦艽

麥門冬 去心

枳殼 煨

大黃 煨

柴胡

茯苓

赤芍藥

桑白皮

黃耆

人參

酸棗 醋炙

知母 各等分

有痰加半夏

右判散每服二錢水一盞煎食後少許煎溫服加桃枝

三寸亦可疝病熱似骨蒸者及久病后或虛熱時復來
作者用瘡疾亦用

又方

犀角

地骨皮

芍藥

柴胡

乾葛

甘草 各等分

右判散每服二錢水一盞薄荷五葉煎服瘡疾生髮二
片薄荷可五葉煎

實熱過心赤者心也心氣熱以此宣導如熱甚但用漏

心飲此藥但可治心熱或虛熱或人怯不宜服熱盛者

生乾地黃兩 木通肆兩

黃芩

甘草 各一

右判散每服一錢水一盞燈心拾莖白茅根二莖煎

黃連皮煎溫服不拘時候

白散治肺氣盛致令鼻塞乳食不下或氣壅喘噎熱嗽

亦治

正地骨皮

桑白皮

甘草 各等分

右為末每服壹錢粳米百餘粒煎湯下

瀉黃散治脾經有熱口唇生瘡偷針贅等疾

藿香葉

梔子仁

石膏

甘草

防風 各等分

右用蜜酒微炒香為末每服一錢溫熱水調不拘時服

原肝

解熱疎風 方見前

寒水石散治凡病多因驚則心氣不行鬱而生涎遂成大

疾宜常服利小腸去心熱自少驚涎亦不成疾

寒水石 白滑石 各二 甘草 半兩

右為末量大小暑月冷水調寒月溫湯調被驚及心熱坐卧不安者服之即安

白卷散治慢驚後多服熱藥以致別生熱證唇裂口瘡咽乾煩躁以此解之兼治吐蟲

大豆黃卷 水浸黑日生 貫衆 板藍根 甘草 各一兩

右剉散每服壹錢水壹盞煎甚者參錢漿水一盞清油數點煎不拘時服

八散治蘊聚一切熱毒明心氣利二便方見大方科積熱類

身壯熱頭目碎痛背膊拘急大執衝上夜心舌乾唇焦喉腫痛涕唾稠粘痰壅喫食有阻心神煩燥眼溢睛疼挾熱傷寒鼻塞語音不出百節疼痛二便不利麩豆瘡時行殭疫狂語多渴及天壟風夜驚並宜服之方見大方科積熱類

皂角膏瀉腎氣治腎經有熱陰囊赤腫癢痛大腑秘澀

大黃 五末 黑牽牛 半炒 猪牙皂角 各一兩

右為末煉蜜圓菜豆大每服七粒溫水空心下

菊延膏治初生肺壅鼻塞乳食不下

右用牙皂草烏取葱涎拌成膏貼顛上

虛執散治虛執潮作亦治傷寒壯熱

知母

柴胡

甘草

人參

地骨皮

赤茯苓

半夏

各等分

右劉散每服二錢水一盞薑二片煎溫服

甘麥散 治胃中客熱口臭不思飲食或飢煩不欲食齒齦腫疼膿血滿口咽中有瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發未發並宜服之

天門冬去心

麥門冬去心

熟乾地黄

批把葉去

枳殼去穢

生乾地黄

黃芩

石斛去

山茵陳

甘草

各等分

右劉散每服二錢水一盞煎食后臨卧溫服

人參黃耆散 治發熱自汗虛煩

人參

黃耆

楊芍藥各五

粉草三

右劉散每服二錢水一盞生薑二片紅棗一枚麥子三十粒空心溫服

痰嗽

半夏圓 治風癱痰盛咽膈不利

半夏五兩

白礬

括過 乙兩 二升半

人參乙兩

右為末生薑自然汁糊為圓粟米大每服二十圓食后臨卧生薑湯下

桑白皮圓 治肺壅咳嗽痰多方見后久嗽不宜卒止先須調

氣用桑白皮

方見大方科

傷寒和解類

蘇合香湯

方

諸氣類

並加人參五味子烏梅桑白皮紅棗斟酌用

金匱要略治熱嗽 **葶藶散**治肺感寒邪咳嗽聲重

大麥冬清肺湯治肺胃俱寒咳嗽喘息方見傷寒

浴毒清飲治痰壅咳嗽不止

白礬二水半南星 半夏 蚌粉

知母 貝母 甘草各五末 人參 三末

右判散每服二錢生姜二片烏梅半箇煎澄清徐徐吸

服效亦治因飲乳逆氣觸於肺經作嗽久不止壽星團

兼服方見風科

聖旨圓治風痰上壅

右以靈砂青州白圓子各一十粒姜蘇湯化開服效

聖旨圓治咳逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣

天定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

真蘇子 呵子去核 蘿蔔子 杏仁去皮尖

木香 人參去蘆 青皮 甘草各七末

右判散每服一錢水 薑姜二片煎量大小減益溫服

疹瘡

天解虛證 **參蘇飲**治瘡疹已發未發潮熱痰嗽臉赤手足

微冷每服二錢生薑二片葱白一根山楂子根參寸同煎

熱服合滓乳母服方見大方

退口散治發熱頭痛欲作疹瘡每服一錢乾桑白皮三寸

去赤煎湯調不拘時服方見前

退口散如聖湯治身熱如火頭痛頰赤面紅呵欠鼻瘡瘡疹

已未出時宜服

白芍藥

川升麻各乙甘草

紫草各五子

乾葛乙兩

木通五子
去皮節

右劉散每服二錢水一中盞入生薑二片葱白二根山
楂子根冬寸同煎熟服壯熱心煩如人參亦在冬石膏
麥門冬去心

人參若結散治疹且因多服執藥發而不透身腫頭面兩
目皆腫連日風搐奮身硬直方見前

發之方見大方料傷寒類
治時令不正發為疹瘡解腸胃中一切熱毒皆可

治天行疹豆活血解毒或覺細牛有比證預防

赤小豆

黑豆

菜豆各乙升甘草半兩

右淘淨水煮熟逐日空心任意服已染則輕解未染服
之七日不發

發出治豆瘡欲發未發或未透者

紫草

北方藥去蘆麻黃去節

當歸

甘草各等分

右劉散每服二錢水一盞煎米不拘時服

不除一切惡候或被風吹復不見入皮膚內者
味四聖散治瘡豆出不快及變陷倒壓面小便赤澁餘熱

紫草茸

木通去皮節

南木香

黃耆炒

川芎

甘草

人參 各等分 蟬退 去足

右劉散每服二錢水一盞煎不拘時候溫服大便秘加枳殼少許大便如常加糯米百粒性解毒能釀而發之

紫草

木香

茯苓

白朮

甘草 各等分

右劉散每服二錢水一盞糯米三十粒煎溫服蓋紫草能利大便木香白朮所以佐之也

紫草

紫草

人參 去盡

木通 去皮節 茯苓

糯米 各等分 甘草 減半

右劉散每服二錢水一盞煎溫服大便利者可入商香去此草

快球散 治 豆瘡出不快

紫草

蟬退 去足 人參

白芍藥 各一

木通 乙未

甘草 減半

右劉散每服二錢水一盞煎溫服

人參 去盡 治同上 方見前

豆瘡 治 豆瘡已出未出煩燥大人同

此白芍藥 不以多少

右為末白湯調下大能活 血止豆瘡脹痛屢用屢效

治四肢冷極疹瘡黯色不發或泄瀉不止身熱重

者不宜服 方見大方
科中寒類

黃芩煎湯 治挾熱作疹瘡不出煩燥不得眠

黃芩 七水半 赤芍藥 甘草 各五水

右判散每服三錢水一盞煎溫服若胃中虛冷其人能
食飲水即噦脉浮發熱口鼻中燥或衄加大棗一校嘔
者加半夏少許生薑三片煎食少者加人參紅棗煎量
大小加減服

萬金散 治瘡疹已出未能勻遍色不紅潤

防風 各二水 人參 蟬退 各二水

右為末羅蔔煎湯調下服了急用芥子末白湯調如膏
塗兒脚心乾即再傳其毒漸漸復出瘡疹依前紅活

治瘡疹出不透腹痛甚或黑厥面者

右以蟬退二十五箇去足翼洗淨為末每服一錢熱水
調下腹痛立止而出透神效乳母亦可服一錢

又方 用乾山楂子為細末湯點服立見出透紅活荔枝殼
煎湯溫服亦效

發脹 治瘡豆已發或為風冷所折榮衛不和或為
宿食所傷內氣壅遏以致冰硬並主之

青皮 去白 陳皮 去白 桔梗 去薑 枳殼 去穰

當歸 去尾 半夏 湯洗 川芎 木通 去皮節

乾葛 甘草 紫蘇 紫草 各等分

人參 煨半

右劉散每二錢姜二片棗一枚煎服未效加楂根三寸

欬集正氣散治疹瘡根脚白色水龍頂淡紅色而不發加

川芎若惡寒加官桂劫傷寒類

龍腦散治時疾豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘

妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜且速治不爾毒入臟死

主龍腦壹錢

石研細旋滴猪心血和團如小指頭大每服一團心順

狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者溫酒化下少時

心神便定得睡瘡疹發透依常將息取安或只用猪尾

血亦可

救陷治賢虛證疹毒變黑

雞心檳榔二箇

陳皮去白

青皮去穢

甘草炙各五錢半黑牽牛貳兩半生半炒熟

右為末蜜湯調下氣怯者加南木香一錢先下黑糞次

下揭糞後以四君子湯加厚朴木香陳米湯服和胃良

冬養黃藥自微出又以葫蘆煎酒傳其身即發起

獨聖散治疹瘡陷入不發黑色而氣欲絕服此漸蘇紅潤

穿山甲湯洗淨炒

右為末每服半錢入麝香少許南木香煎湯調下或紫

草煎湯入紅酒少許服

五福化毒丹減毒方見后

人商散治瘡且初出光壯忽然黑陷心煩性燥氣喘妄語

或見鬼神並宜速治不然毒氣入臟必死
人齒燒存性

右為末每箇作一服酒調下

神效酒 治疹瘡黑陷不起以好酒磨化三五粒服效

神效散 治瘡疹漸黑面陷大便不固乳母同服亦可

人參 白朮 肉豆蔻 白茯苓

黃耆 各半兩 甘草 貳錢半

右劉散每服一錢水一盞姜二片棗一枚煎五分乳母
倍之若夫渴手足厥冷詳病加炮附子入

催乾 治疹瘡出大盛者以此解之

芍藥 生地黄 牡丹 犀角屑 無以并

右劉散每服二錢水一盞煎溫服欲乾犀角飲方見后

小驚圓方見前

如聖湯 治疹瘡毒攻咽喉腫痛

桔梗 甘草 牛蒡子 各一分 麥門冬 錢半

右為末每服一錢沸湯點服入竹葉煎尤妙

護眼神效膏 治疹瘡正發時可用以防豆花入眼生翳

黃蘗 一兩 真桑豆粉 兩 甘草 四兩 紅花 貳兩

右為末生清油調塗兩眼四畔用之瘡豆面上亦少或
但用乾胭脂塗抹亦可

加瀝四物湯 治班瘡入目或瘡豆收後

當歸尾 芍藥 川芎 蒼朮

白菊花

乾葛

羌活各等分

右劉散每服二錢水一盞入生地黃少許搥碎同煎半盞量兒大小服之乳食後服忌一切動風毒物雖愈后忌三二月日方可

蟬菊散治班瘡入目或病後生翳障

蟬退

淨洗去塵土

白菊花

各等分

右劉散每服二錢水一盞入蜜少許煎乳食後量兒大小與之屢驗

天明散治疹豆入眼

决明子

赤芍藥各半瓜根

甘草各一分

右為末每服一錢蜜水調下

天麻散治疹瘡後毒氣不散生翳障并治暴赤眼疼翳障者明

羌活

蟬退去足

防風

蛇退

菊花

穀精草

木賊

甘草

梔子

白茯苓

大黃

黃連

沙苑蒺藜

各半兩

右為末每服一錢清米泔溫煖調下

奇方治瘡疹入眼用兔屎焙乾為末茶清調下瘡疹安後

方可服多服即愈仍治昏翳

父治豌豆瘡入目痛楚恐傷眼睛淨陰乾為末每服三錢隨記大小以羊子肝半箇入盞內以杖刺碎爛投水

半合攪取汁調下食後服不甚者一錢差已傷目者十服差

蜜蒙花散治疹且瘡并諸毒氣入眼昏暗生翳膜

蜜蒙花半錢 青箱子 决明子 車前子各半錢

右為末白羊肝一片破開作三片摻藥令勻却合作一片以濕紙裹火煨於地上出火毒米泔嚼下空心服

决明散治豆瘡入眼雖赤白障翳膜遮漫黑睛但得瞳子不陷者可治之

石决明煨 川芎 黄蘗各一两 蒼朮半兩

右為末用兔肝成無以白羯羊肝代之研爛搜和負如菘豆大每服三三十圓食後臨卧米泔下

又方用穀精草者白柿喫仍用菘豆根燒灰淋水以生而清者洗下面濃者服之

通聖散治豆瘡入眼生翳

菘豆皮 穀精草去根 白菊花各壹兩

右剉散每服二大錢乾柿一枚生粟米泔一盞同煎候米泔盡只將乾柿去核食之不指時候日三枚淺者五七日可效遠者半月

决明散 治班瘡入眼方見眼科

重藥 真穀精草 蛤粉各等分每服二錢水一盞入猪肝二

片青竹葉十皮煎熟先熏後服

方 右以黃連去鬚白滑石銅青用絹帛包泡湯候溫洗

寒耳丹 治疹瘡入眼

右以水銀一錢國丹伍錢同圓作六圓入鎔銀窩中圓
瓦上蓋濕紙糊護定用香爐盛炭火燒一日後取出以
薄綿裹之疹瘡在右則塞右耳在左塞左耳立見墜下
治毒氣壅遏壯熱心煩瘡疹雖出未絕
勻透口舌生瘡不能吮乳

牛蒡子

各兩

荆芥穗

甘草

各壹兩

防風

川升麻

各壹兩

犀角

各壹錢

麥門冬

去心

桔梗

各壹兩

右劉散每服二錢水一盞煎去滓令溫時時令啣或煩
灌之大便利不宜服

治瘡疹

治喉腫痛餘

毒未盡

鼠粘子

壹兩

升麻

甘草

射干

各壹兩

右劉散每服三錢水一盞煎溫服不以時候

連翹

治瘡疹壯熱小便不通餘毒未解

連翹

瞿麥

荆芥

木通

車前子

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬退

甘草

各壹兩

山梔仁

去殼

黃芩

各壹錢

右劉散每服二錢加紫草煎溫服

五福化毒丹

治瘡疹餘毒上攻口齒及治蘊積毒熱驚惕

狂燥頰赤咽乾口舌生瘡夜卧不寧語語煩渴頭面身軀

多生瘡癰朱眼等疾亦名青黛圓

人參 半兩

玄參 兩半

茯苓 壹兩

青黛

甘草

各伍錢

桔梗 壹兩

牙消 半兩

麝香

腦子

各半錢

方無腦子有金銀膏

右為未蜜圓每兩作十二圓一歲兒一圓分四服用薄

荷湯下瘡疹上攻口齒涎血臭氣生地黃自然汁化一

圓用雞翎刷在口內熱疔肌肉黃瘦省自夜不見物陳

粟米泔水化下食後臨睡服

甘露飲

解毒殊效方見前

大瘡成方

右用黃牛糞乾傅膿多痛甚者乾淨黃土為末傅之

遍口中痛不能食者五福化毒丹或生蜜浸清黃柏取

汁啖之為愈凡瘡欲成痂頻以面油乳酥清蜜潤之可

揭即揭血出無害若乾硬已久必成癩瘰如茶醋如猪

肝猪血之屬妄與食之則已脫之迹必為之驚憐然而

瘡加已脫肌肉衝熒不可盪洗太早亦不可以手加之

葫荑酒能辟惡氣左右所不可無或瘡木降真用之亦

可曰聖瘡七日熱而發七日泡而乾又七日則平復

瘡舊矣大抵調順血氣溫和脾胃均平冷熱則瘡出為

甚易若實上虛上損不足而益有餘則瘡出為其難調

解之法無以逾此

生血散

治疹子出多疼痛及体痛時時叫喚方見前

敗草散治瘡疹抓搔成瘡膿血淋漓

右用多年蓋屋爛草或蓋牆草不以多少曬乾為末乾
貼無肯若渾身瘡破膿水不絕粘沾衣服難以坐卧可
用三二升攤於席土令兒坐卧少即乾貼以其草經霜
雪雨露感天地陰陽之氣多善解瘡毒或用蒼麥粉為
枝核燒灰糝瘡上亦好

秘方治水泡豆瘡

苦參

滑石

蚌粉

輕粉

川白芷

各等分

右為末乾糝之立效

通治水瘡散治疥瘡疹身熱作渴

木香

大腹皮

人參去蘆

桂心

赤茯苓

去皮青皮去核

前胡去蘆

阿膠剉去蘆

半夏姜製

丁香

甘草

各等分

右劉散每服二錢水一盞姜二片煎空心溫服

瘡癩散治且出欲醫未醫之間頭溫手冷腹脹瀉瀉急服

此切不可與蜜水

木香

當歸各參

官桂去皮

白木

茯苓

各三分

陳皮

厚朴去蘆皮

人參去蘆

肉豆蔻

丁香各半

附子炮去皮

半夏姜製各

右劉散每服二錢水一盞姜二片煎服

白木散

治五已醫身熱不退清神生津除煩止渴

人參

白木

藿香葉

木香

甘草

白茯苓各一兩

乾葛或兩

右劉散每服二錢水一盞煎不以時溫服

人參麥門冬散治發熱煩渴

麥門冬壹兩

去心

人參去蘆

甘草炙

陳皮

白木

厚朴

姜汁炒各半兩

右劉散每服二錢水一盞煎不拘時微溫服

消風散治疹且或發透或未透忽面青暴吼是為風邪所

傷此藥主之疹且證以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅絲

驗之然須見心膈間細點如粟起則為真是加蟬退未

月科並一證矣

五苓散治小便赤澁加燈心拾葉麥門冬去心車前子冬

半錢煎湯調入參湯加枳殼去穢切少許治大便秘結內

煩外熱未效更加四順清涼飲少許方見大方科傷暑及

人參湯即小柴胡湯

四順清涼飲治同上熱實者用方見大方

大如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗

甘草生

牛蒡子炒各壹兩麥門冬去心半兩

右為末每服二錢沸湯點細細啣服入竹葉五皮煎湯

尤妙

枳殼桔梗湯治胃腹脹滿

桔梗

枳殼各一兩

右劉散每服二錢水二盞煎至一盞分二服

二陣湯 治痰癰吐食每服二錢生薑二牛烏梅半斤煎服
方見大方科噎吐類

理中湯 治下利嘔逆加水香熟附子每服一各半錢方大方

豆蔻圓 治疹豆滑泄不止水穀不化

木香

縮砂仁

白龍骨

呵子肉

赤石脂

枯白礬

肉豆蔻

各半兩

石為末麩糊圓如黍米大每服三十圓至五十圓煎異
功散下或瀉水穀白色淡黃色木香散下 方見前

蘇合香圓 治疹瘡為陰邪穢氣所傷亦令變壞可用醋炭

重後必蘇湯化服解之

方見大方科中氣類

治豆瘡欲癸未癸便服之此藥以毒攻毒
然瘡出亦少快無惡證

右於冬月先取人猪猪犬糞各等分於高處黃土窖五日
取出却用沙鍋盛蓋鹽泥固濟日乾於臘月八日
令通紅取出去火毒為末入麝香少許每用一字蜜調
氣溫湯化下或挑少許於舌上用乳汁嚥之此方多秘
不須令病家知之

參 治豆瘡後餘熱不退

柴胡

甘草多

黑參

人參

龍膽草

麥門冬

去心

右劉散每服三錢水一盞煎稍熟服不拘時量大小加減

木筆花散 治豆瘡出後有餘瘡生塞鼻中不能睡卧
右用木筆花研為細末加生麝香少許葱白蘸藥入鼻
中數次即通

滅癩散 治且瘡愈後癩癧落其癩尤豎或凹或凸用此
韶粉即水粉輕粉一丸
右同研勻猪脂油調塗

又方

白蜜不以多少塗於瘡上其癩易落且無疤痕亦不臭
穢或用升麻同蜜煎摩痕上并數食之

綿繭散 治且瘡後身軀及肢節上生疔蝕瘡膿水不絕
右以出蛾綿繭不拘多少用白礬焙碎寒入甬內令滿

以蜜及火燒候白礬汁益取出研細每用乾貼且瘡內若
不卑治則潰筋骨以致難治

瘡疾

表解香蘇香薷散 治春傷風夏伏暑作瘧其證自汗惡風
先熱後寒或但熱不寒每服三錢生姜三片葱白二根水
一大盞煎服方並見火方科

十神湯 治夏傷濕秋傷風作瘧其證寒熱自汗嘔吐身疼
每服三錢水一大盞生姜三片木瓜二片煎秋末感風冷

冬又傷寒或感溫暖之氣先寒後熱亦服方見大方

六散 分陰陽和榮衛用人參少許茵陳車前草各一根
煎湯服弱者木瓜紫蘇湯或服方並見大方

人參湯治熱多寒少每服二錢生薑二片麥門冬十粒去

心正地骨皮少許煎多服取效即小柴胡湯方見大方科傷寒陽證類

普胃散治寒多熱少方見大方科皮瘡類

手功散治熱瘡多效

知母 貝母 柴胡去聲 常山

甘草 山梔子 檳榔各在牙 蟬退 十十

地骨皮 去骨五寸

右劉散每服三錢用桃柳枝各五寸煎未效用過路葉藤五寸煎服

截瘡藥金圓方見大方一度瘡類

易脾圓化痰消積進食駐顏反治氣喘疔積

杏仁乾兩去皮尖用 半夏薑兩生薑白焙

巴豆五粒去殼并心膜以皮帛出油

右為未用大好北棗七枚入燈心水蒸去皮核取肉為圓每服五圓常服燈心棗子煎湯下注顏檳榔煎湯消宿食陳米湯空心臨睡服化痰烏梅湯治瘡蒜湯或雞水下消痞癖此方大效

通神餅截瘡有功

甘草末叁分 菘豆末 敗荷葉各叁分 砒霜半分

朱砂一分半 定粉半錢 腦子 麝香各妙許

金銀箔十片

右煉蜜圓梧桐子大作餅子用蠟半圓或一圓大者二

圓而止一日只一服不可過多服時用并花水或桃柳
枝煎水磨化向北服了忌燒熱飲食亦可繫於候鍊如
參苓白朮散愈後調理脾胃方見大方

癖氣

紅圓子治血膜包水僻側於脇傍時時作痛發寒熱瘧疾
中腕多蓄黃水日久結癖亦效

三稜煨

莪木煨

芫花

桃仁去皮

杏仁去破

朱砂

烏梅炒

巴豆

右為末醋糊圓小菜豆大朱砂為衣米湯空腹下

三稜

莪木

川練

去毒

陳皮

去白

青皮

去白

芫花

右以芫花醋浸一夜炒漸乾入三稜莪木同炒又入川練
陳皮青皮同炒焦取為末等分如各半兩杏仁亦用半
兩去皮尖別研巴豆二十粒去油膜和勻醋糊圓黍米
大一歲二圓臨睡米飲下此二方稍相似不若於方中
和桃仁與烏梅則尤妙又用蒜湯下蕩脾圓化痰涎一
日一服或兩服日用如此服蠲水亦可

木散

貼疔癖

水蠶多用

獨蒜半錢

雄黃半錢

右杵為膏入醋少許蠟紙貼患處

灸法兩乳下一寸各二壯

痞結

表理中圓治虛氣痞塞胸膈留飲聚水腹脇或加脹滿
手不可近**四君子湯**加枳實去穢炒乾姜炮為末煉蜜
圓景豆大熱湯化下渴加瓜蒌根下利加牡蛎粉各等分
已用經驗

痞積散湯治熱氣痞滿胸膈兩脇按之則痛

枳殼去穢

桔梗去蘆半夏湯洗

黃芩

瓜蒌仁

黃連去穢

右劉散生姜麥門冬去心煎服利黃涎沫即安

客忤

人參圓治神氣嫩弱外邪客氣軟玄田異物暴觸忤口吐

黃白沫水敷鮮雜面色變易喘息暗痛及熱痰癢狀似
癰但眼不上竄視其口中懸壅左右若有小小腫核即
以竹針刺潰之或以指爪摘破急作醋炭降真香皂角燻
之却服此方見大方
科中氣類

右每服一圓姜湯調開頻上與服次用豉三合水濕搗
為圓如雞子大摩兒顛上及足心各五六遍次摩脐心
及上上良久擘開自有毛即擲之大法宜辟邪正氣散
驚定心延久難為力也

雄麝散治客忤腹痛危急

雄黃一分明乳香半斤生麝香一字

右為末每一字刺雞冠血調灌之

犀角散 治客忤驚啼將熱

天麻

犀角

麥門冬 去心

鈎藤

朱砂 各一分

鐵粉

雄黃 半分

生麝香 少許

右為末每服半匙金銀煎湯調但服安神圓亦可筋具

黃土散 治小兒卒客所

竈中黃土

蚯蚓糞

各等分

右研細水調塗兒頭上及五心良

氏小兒方十卷

書