

植物名實圖考

植物名實圖考長編卷之九

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

隰草

蓼

女青

蛇含

連翹

葶藶

夏枯草

旋覆花

草蒿

青葙子

蓋草

萹蓄

陸英

蒴藋

王不畱行

艾

惡實

小薊

大青

虎杖

荳草

白蘘荷

苧根附神苧法

苧蘆圖譜

苧畧

苦芙

芭蕉

馬鞭草

牡蒿

蘆根

附蓬疏廣要兼葭

鼠尾草

商實

蒲公草

鱠腸

卽旱蓮草

三白草

龍葵

劉寄奴

蓼馬蓼

本草經蓼實味辛溫主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰癧馬蓼去腸中蛭蟲輕身

爾雅蓄虞蓼註虞蓼澤蓼

別錄蓼葉無毒歸舌除大小腸邪氣利中益志生雷澤川澤閒隱居云此類最多人所食有三種一是紫蓼相似而紫色一香蓼亦相似而香並不甚辛而好食一是青蓼人家常用其葉有圓者有尖者以圓者爲勝所用卽是此乾之以釀酒主風冷大良馬蓼生下濕地莖斑葉大有黑點亦有兩三種其最大者名

龍鼓卽是荎草已在上卷中品

蜀本草圖經蓼類甚多有紫蓼赤蓼青蓼馬蓼水蓼香蓼木蓼等其類有七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相似而俱薄馬水二蓼葉俱闊大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉似柘葉諸蓼花皆紅白子皆赤黑木蓼花黃白子皮青滑

藥性論云蓼實使歸鼻除腎氣兼能去癙蕘葉主邪氣又云食之發心痛令人寒熱損骨髓小兒頭瘡搗末和白蜜又和雞子白塗上蟲出不作瘢若霍亂轉筋取子一把香豉一升先切葉以水三升煮取二升內豉汁中更煮取一升半分二服又與大

麥麴相宜

圖經蓼實生雷澤川澤今在處有之蓼類甚多有紫蓼赤蓼二
名紅蓼青蓼香蓼馬蓼水蓼木蓼等凡七種紫亦二種葉俱小
狹而厚青香二種葉亦相似而俱薄馬水二種葉俱闊大上有
黑點此六種花皆紅白子皆青黑木蓼一名天蓼亦有大小二
種蔓生葉似柘葉花黃白子皮青滑陶隱居云青蓼入藥然其
蓼但堪食人以馬蓼爲莊草已見上條餘亦無用蘇恭以水蓼
亦入藥水煮擣腳者多生水澤中周頌所謂以薅荼蓼爾雅所
謂蕷虞蓼是也又三茅君傳有作白蓼醫方白蓼藥譜無聞疑

卽青蓼也或云紅蓼亦可作醬

齊民要術曰三月可種荏蓼荏性甚易生蓼尤宜水畦種也蓼
作菹者長二寸則剪絹袋盛沈於醬甕中又常更剪常得嫩者
若待秋子成而落莖既堅硬葉又枯燥也取子者候實成速取之性易凋零晚則盡落五月六
月中蓼可爲蘿以食覓崔寔曰正月可種蓼家政法曰三月可

種蓼

本草綱目李時珍曰韓保升所說甚明古人種蓼爲蔬收子入
藥故禮記烹雞豚魚鼈皆實蓼於其腹中而和羹膾亦須切蓼
也後世飲食不用人亦不復栽惟造酒麴者用其汁耳今但以

平澤所生香蓼青蓼紫蓼爲良

曲洧舊聞潦洧之源出馬嶺今在河南府永安界號玉仙山歷城東南爲潦洧其水清有魚數種土人不善施網罟冬積柴水中爲罌以取之以擣澤蓼雜煮大麥撒深潭中魚食之輒死浮水上可俯掇久之復活謂之醉魚云

爾雅翼蓄虞蓼郭氏云卽蓼之生水澤者也蓼類甚多有紫蓼赤蓼青蓼馬蓼水蓼香蓼木蓼等紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉相似馬水二蓼葉俱闊大上有黑點諸蓼花皆紅白子赤黑木蓼一名天蓼蔓生葉如柘花果白子皮青滑其最大者

名蘿已見別章中蓼者妨稼之草故詩曰以薅荼蓼荼蓼朽止
黍稷茂止然于調和有用故內則云膾秋用蓼鶉羹雞羹鴛
之蓼醸謂切雜之也漢尹郡尉書有種芥葵蓼韭葱諸篇而長
沙定王故宮有蓼園周頌曰未堪家多難予又集于蓼蓼辛物
故以爲多難之喻越王苦思報吳臥則以蓼楚辭曰蓼蟲不知
徙乎葵菜言蓼辛葵甘蟲各安其故不知遷也而魏子曰蓼蟲
在蓼則生在芥則死非蓼仁而芥賊也本不可失

後山談叢何承矩于雄州北築愛景臺植蓼花日至其處吟詩
數十二首刻石人以謂何六宅愛蓼花不知經始塘泊也

說文解字注蓼辛菜句蓄虞也蓼爲辛菜故內則用以和用其
莖葉非用實也蓄虞見下文蓄字下此云蓼蓄虞也下文蓄虞
蓼也是爲轉注正與蘇桂荏也荏蘇也同特以篆籀異其處
耳顏注急就篇乃云虞蓼一名蓄叔重云蓼一名蓄虞非也夫
釋艸一篇許君偶用異其讀者往往而是其萌蘊蓄爲夢灌渝
也鎬侯莎爲莎鎬侯也綦月爾爲綦土夫也蕡葑蓀爲葑須從
也何所疑於蓼諱蓄虞哉某氏孫炎郭璞皆蓄爲句虞蓼爲句
蓼借爲蓼蕭之蓼長大兒从艸蓼聲盧鳥切古音在三部

植物名集圖考

四

蛇含

本草經蛇全

龜

味苦微寒主驚

寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠

瘻惡瘡頭瘍一名蛇銜

別錄無毒療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒生益州山谷八
月採陰乾陶隱居云卽是蛇銜蛇銜有兩種並生石上當用細
葉花者處處有之亦生黃土地不必皆生石上也

唐本草註云全字乃是含陶見誤本宜改爲含含銜義同見古
本草也

圖經蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下濕地蜀

中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者爲上八月採根陰乾古經錄驗方治赤癰用蛇銜草搗極爛傅之差赤癰者由冷濕傅於肌中甚卽爲熱乃成赤癰得天熱則劇冷則減是也古今諸丹毒瘡腫方家通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以爲若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢卽蘿摩之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此

抱樸子云蛇銜膏連已斷之指

女青

本草經女青味辛平主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘡辟不祥一名雀瓢

別錄有毒蛇銜根也生朱崖八月採陰乾陶隱居云若是蛇銜不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一時則疫癘不犯彌宜識真者

唐本草注此草卽雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白色亦

本草綱目李時珍曰女青有二是藤生乃蘇恭所說似蘿摩
者一種草生則蛇銜根也蛇銜有大小二種葉細者蛇銜用苗
莖葉大者爲龍銜用根故王燾外臺秘要龍銜膏用龍銜根煎
膏治癰腫金瘡者卽此女青也陳藏器言女青蘿摩不能分別
張揖廣雅言女青是葛類皆是指藤生女青非此女青也別錄

明說女青是蛇銜根一言可據諸家止因其生朱崖致疑非矣
方土各有相傳不同爾况又不知有兩女青乎又羅浮山記云

山有男青似女青此則不知是草生藤生者也

按女青南越筆記以爲卽女貞

羅浮山記之女青也

連翹

本草經連翹味苦平主寒熱鼠登瘰癧腫惡瘡癰結執蠱
毒一名異翹一名蘭華一名折根一名軼一名三廉

爾雅連異翹注一名連苦又名連草本草云

別錄無毒去白蟲生泰山山谷八月採陰乾處處有今用莖連
花實也

唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇花黃可
愛生下濕地著子似椿實之未開者作房翹出衆草其小翹生
崗原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今京下惟

用大翹子不用莖花也

圖經云連翹生泰山山谷今近京及河中汀寧府澤潤淄兗鼎
岳利諸州南康軍皆有之有大翹小翹二種生下濕地或山崗
上葉青黃而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可
愛秋結實似蓮作房翹出衆草以此得名根黃如蒿根八月採
房陰乾其小翹生岡原之上葉花實皆似大翹而細南方生者
葉狹而小莖短纏高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如粟
粒一名旱蓮草南人用花葉中品鱠腸亦名旱蓮人或以此當
旱蓮非也今南中醫家說云連翹蓋有兩種一種似椿實之未

開者壳小緊而外完無跗萼割之則中解氣甚芬馥其實纏乾
振之皆落不著莖也一種乃如齒荀殼柔外有跗萼抱之無解
脈亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異也今如齒荀者江
南山澤間極多如椿實者乃自蜀中來用之亦勝江南者據本
草言則蜀中來者爲勝然未見其莖葉如何也

救荒本草連翹今密縣梁家衝山谷中有之科苗高三四尺莖
稈赤色葉如榆葉大面光色青黃邊微細鋸齒又似金銀花葉
微尖瓣開花黃色可愛結房狀似山梔子蒴微圓而無棱瓣蒴
中有子如雀舌樣極小其子折之則片片相比如翹以此得名

採嫩葉，熟換水浸去苦味，淘洗淨，油鹽調食。

草藥

本草經草藥味辛寒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道一名大室一名大適

爾雅草藥注實葉皆似芥一名狗薺

別錄苦大寒無毒下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱拂痒利小腹久服令人虛一名丁厯一名草蒿生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良榆皮爲之使惡

殭蠶石龍芮

圖經曰草藥生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有

之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似蕡根白枝莖俱青
三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立秋後採實暴
乾月令孟夏之月靡草死許慎鄭康成注皆云靡草蕡蓼之
屬是也至夏則枯死故此時採之張仲景治肺癰喘不得臥蓼
大棗瀉肺湯主之蓼炒黃色搗末爲丸大如彈丸每服用
大棗二十枚水三升煎之取二升然後內入一彈丸更煎取一
升頻服之支飲不得息亦主之崔知弟方療上氣欬嗽引長氣
不得臥或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之蓼子三升微
火熬搗篩爲散以清酒五升漬之冬七日夏三日初服如桃許

大日三夜一冬日二夜二量其氣力取微利一三爲度如患急
困者不得待日滿亦可以綿細絞卽服其葶藶單莖向上葉端
出角角麤且短又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細長取
時必須分別前件二種也又篋中方治嗽含膏丸曹州葶藶子
一兩紙襯熬令黑知母一兩貝母一兩三物同搗篩以棗肉半
兩別銷沙糖一兩半同入藥中和爲九大如彈丸每服以新綿
裹丸含之徐徐燕津甚者不過三丸今醫家亦多用之

雷公礦炙論凡使勿用赤鬚子真相似葶藶子只是味微甘苦
葶藶子入項苦凡使以糯米相合於竈上微微焙待米熟去米

本草綱目

單搗用

子母秘錄治小兒白禿夢魘搗末以湯洗訖塗上

本草綱目李時珍曰按爾雅云蘋夢魘也郭璞注云實皆似芥
一名狗齊然則狗齊卽是夢魘矣蓋夢魘有甜苦二種狗齊味
微甘卽甜夢魘也或云甜夢魘是菥蓂子攷其功用亦似不然

夏枯草

本草經夏枯草味苦辛寒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散瘻結氣腳腫濕痺輕身一名夕旬一名乃東

別錄無毒一名燕面生蜀郡川谷四月採

圖經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦有之冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共爲末每服一錢謄茶調下無

時候服

救荒本草夏枯草今祥符西田野中有之苗高二三尺其葉對
節生葉似旋復葉而極長大邊有細鋸齒背白上多氣脈紋路
葉端開花作穗長二三寸許其花紫白似丹參花葉味苦採嫩
葉燥熟換水浸淘去苦味油鹽調食

本草綱目李時珍曰黎居士易簡方夏枯草治目疼用沙糖水
浸一夜用取其能解內熱緩肝火也樓全善云夏枯草治目珠
疼至夜則甚者神效或用苦寒藥點之反甚者亦神效蓋目珠
連日本卽係也屬厥陰之經夜甚及點苦寒藥反甚者夜與寒

亦陰故也夏枯稟陰陽之氣補厥陰血脈故治此如神以陽治
陰也一男子至夜目珠疼連眉棱骨及頭半邊腫痛用黃連膏
點之反甚諸藥不效炙厥陰少陽疼隨止半日又作月餘以夏
枯草二兩香附二兩甘草四錢爲末每服一錢半清茶調服下
咽則疼減半至四五服良愈矣

旋覆花

本草經旋覆花味鹹溫主結氣脇下滿驚悸除水去五藏間寒熱補中下氣一名金沸草一名戴椹

爾雅蕷盜庚注旋覆似菊疏蕷一名盜庚也

別錄甘微溫冷利有小毒消胸上痰結唾如膠漆心脇痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵曠利大腸通血脈益色澤一名戴椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十日成陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又有旋蓄根出河南來北國亦有形似蕷蕷惟合旋蓄膏用之餘無所入非此旋覆花

本草綱目

根也

蜀本圖經云旋覆花葉似水蘇黃花如菊今所在皆有六月至

九月採花

圖經曰旋覆花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近

水傍大似紅藍而無刺長一二丈已來葉如柳莖細六月開花

如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼爲金錢花七八月採

花暴乾二十日成今近都人家園圃所蒔金錢花花葉並如上

說極易繁盛恐卽此旋覆也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅

噫氣不除有七物旋覆代赭湯又治婦人有三物旋覆湯胡治

有餘痰飲在兩脇脹滿等旋覆花收效尤多

外臺秘要救急續斷筋法取旋覆花草根淨洗土搗量瘡大小傳之日一二易以差爲度

又方砍研筋斷者以旋覆根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡上十日卽斷筋便續此方出蘇景仲家療奴用效

本草衍義旋覆花葉如大菊又如艾蒿七八月有花大如梧桐子花淡黃緣繁茂圓而覆下亦一異也其香過於菊行痰水去頭目風其味甘苦辛亦走散之藥也其旋花四月五月有花別一種非此花也

救荒本草旋覆花今處處有之苗多近水傍初生大如紅花葉而無刺苗長二三尺已來葉似柳葉稍寬大莖細如蒿蔓開花似菊花如銅錢大深黃色花味鹹甘性溫微冷利有小毒葉味苦採葉煤熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

草蒿

本草經草蒿味苦寒主疥癬癩痒惡瘡殺蟲留熱在骨節間明目一名青蒿一名方潰

爾雅蒿藾疏曰蒿一名藾詩小雅云食野之蒿陸璣云青蒿也荆豫之間汝南汝陰皆云藾孫炎云荆楚之間謂蒿爲藾郭云今人呼青蒿香中炙啖者爲藾是也

別錄無毒生華陰川澤陶隱居云處處有之卽今青蒿人亦取雜香菜食也

唐本草注云此蒿接傳金瘡大止血生肉止疼痛良蜀本圖經

云葉似茵陳蒿而背不白高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼爲犧蒿爲其臭似犧北人呼爲青蒿

圖經曰草蒿卽青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者炙作飲香尤佳青蒿亦名方濱凡使子勿使葉使根勿使莖四者若同反以成疾得童子小便浸之良治骨蒸勞熱爲最古方多單用者葛氏治金刃初傷取生青蒿搗傅上以綿裹瘡血止卽愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣環童子小便五大

斗澄過青蒿五斗八九月採帶子者最好細剉二物相和內好
大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中
以微火煎可二大斗澄過青蒿卽取猪膽十枚相和煎一大
斗半除火待冷以新甕器盛每欲服時取甘草二三兩熟炙搗
末以前和搗一千杵爲丸空腹粥飲下二十九漸增至三十九
止

本草衍義草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以爲蔬根
赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青色
者陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩窠迥然青色

土人謂之爲香蒿莖葉與常蒿一同常蒿色淡青此蒿色深青故氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何嘗不青嶺外代答大蒿客梧道中久無霜雪處蒿草不凋年深滋長大者可作屋柱小亦中肩輿之杠漕屬王仲顯沿檄失轎杠從者斫道旁木代之行數里輒脆折怪視之蒿也古有蒿柱之說豈其類乎

說文解字注蔽香蒿也詩食野之蒿爾雅毛傳皆云蒿蔽也郭璞云今人呼爲青蒿香中炙啖者爲蔽从艸臥聲去刃切十二部莖蔽或从堅按陸德明曰蔽字林作莖

木草經青葙子味苦微寒主邪氣皮膚中熱風癩身痒殺三蟲
名草決明療脣口青一名草蒿一名萎蒿

別錄無毒惡瘡疥疎痔蝕下部墮精子生平谷道傍三月採莖
葉陰乾五月六月採子陶隱居云處處有似麥柵花其子甚細
後又有草蒿別本亦作草橐今卽主療殊相類形名又相似極
多足爲疑而實兩種也

唐本草注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而
扁光似覓實而大生下濕地四月五月採荆襄人名爲覓蓄草

本草綱目 卷之二
搗汁單服大療溫癘甘露

圖經云青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似黃砦根似蒿根而白直下獨莖而生六月八月採子又有一種花黃名陶朱術苗亦相似恐不堪用之

雷敷炮炙論凡用勿使思蓂子並鼠細子其二件真似青葙子只是味不同其思蓂子甜煎之有涎凡用先燒鐵白杵單搗用之

本草衍義曰青葙子經中並不言治眼藥性論始言之能治眼
藏熱毒衝眼赤障青盲

本草綱目

卷之三

蓋草

本草蓋草苦平無毒主久欬止氣喘逆久寒驚悸癲眩白秃瘍氣殺皮膚小蟲

爾雅菜王芻註菜蓐也今呼鵝腳莎疏舍人云一名王芻某氏云菜鹿蓐也郭云蓐也今呼鵝腳莎詩衛風云瞻彼淇澳菜竹猗猗是也

別錄無毒可以染黃色生青衣川谷九月十月採陶隱居云青衣在益州西

廣本草注云此葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荆

襄人煮以染黃色極鮮好洗瘡有效俗名菉蓐草

說文解字注蓋艸也蘇恭掌禹錫皆云俗名菉蓐艸爾雅所謂

王芻詩淇澳之菉也按說文有蓋又別有菉則許意蓋非菉字

从艸𦵯聲徐刀切十二部大雅以爲進字

篇蓄

本草經篇蓄味苦平主浸溼疥瘡疽痔殺三蟲

爾雅竹篇蓄註似小藜赤莖節好生道傍可食又一枚蟲疏李巡曰一物二名也孫炎引詩衛風云荼竹猗猗郭云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲按陶隱居本草註云處處有布地而生節間白華葉細綠人謂之篇竹煮汁與小兒飲療蛇蟲是也別錄無毒療女子陰蝕生東萊山谷五月採陰乾

藥性論云篇竹使味甘煮汁與小兒服主蛇蟲等咬心心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎如餡

空心服蟲自下皆盡也主患痔疾者常取葉搗汁服效治熱黃
取汁頓服一升多年者再服之根一握洗去土搗汁服之一升
服丹石毒發衝目腫痛又傳熱腫效

圖經曰萹蓄一名萹竹出東萊山谷今在處有之春中布地生
道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青
黃色根如蒿根四月五月採苗陰乾

李衍竹譜萹竹南北在處下濕地俱有之布地而生莖綠紫有
節葉似竹醫家用爲利水道藥廣西安南者葉大可煮爲菜
救荒本草萹蓄一名萹竹今在處有之布地生道傍苗似石竹

葉微闊嫩綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細淡桃紅色結小

細子根如蒿根葉苗味苦採苗葉爛熟水淘淨油鹽調食

按直隸鄉

村中亦呼爲竹葉菜

資暇錄詩衛風淇澳篇云菉竹漪漪按陸璣草木疏稱郭璞云
菉王芻也今呼爲鴟腳莎一名卽鹿葦草又云萹竹似小藜赤
莖節韓詩作蕩亦云蕩萹竹則明知非筍竹矣今爲辭賦皆引
漪漪入竹事大誤也當時謝莊竹贊云瞻彼中唐綠竹漪漪便

襲其謬

毛詩陸疏廣要竹爾雅云竹萹蓄郭註似小藜赤莖節好生道

傍可食又殺蟲李巡曰一物二名也孫炎引詩衛風云菉竹漪漪按陶隱居本草註云處處有布地而生節間白華葉細綠人謂之萹竹鬻汁與小兒飲療蛇蟲鄭註卽萹竹也韓詩緣蕩漪漪薄萹筑也陸德明曰蕩萹竹也石經同萹竹亦作扁竹蜀本草云葉如竹莖有節細如釵股生下濕地圖經云晉中布地生道傍苗似瞿麥葉細緣如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根如蒿根爾雅翼云九章曰擗大薄之芳蕘兮舉長洲之宿莽惜吾不及古之人兮吾誰與玩此芳草解萹蓄與雜菜兮備以爲交佩王逸曰言已解折萹蓄雜以香菜合而佩之修飾

彌盛也然萹蓄雜菜皆非芳草逸義非是蓋言解去萹蓄與雜
菜而佩芳蒞宿莽爲交佩爾然則竹又惡物與衛風相反耶又
云萹蓄旣似竹則宜謂之竹爾按璣所說則又合錄與竹爲一
草未知其審然古今說者皆言淇水旁自生竹箭故古人言伐
竹淇衛又曰淇衛之箭如此多矣蓋淇水宜竹箭自古已然然
說文引詩作篆竹韓詩作錄薄菉旣非色而薄又非竹不可合
爲綠色之竹箭故析而解之云菉王芻薄萹筭也然則淇澳自
出竹箭不妨兼有菉竹二草耶按錄一作菉王芻也竹一作薄
萹蓄也毛詩說皆同而竹譜朱傳皆以爲卽漢書淇園之竹酈

賦負簷林筭桂箭射筒柚梧簾勞竹譜單名者箎篁棘單苦甘
弓筋笏箒簾蓋狗蘆簷之屬雙名者蘇麻般腸百葉雞脰簾
篠之屬廣志有雲母攤篠漢利之屬酉陽雜俎有箒箒之屬筠
譜至八十五種竹筍及諸方志有疎節人面綿貓叢澀碧玉電
斑之屬難以具載然多出交廣荒外非詩人所盡見也竹田曰
篁竹胎曰筍竹膚曰箠竹皮曰筠竹裏曰笨竹枚曰箇竹約曰
節剖竹未去節曰蔣竹死曰筠竹有雌雄雄者多筍五月十三
日謂之竹醉日栽竹多茂盛其性惡寒好溫故曰九河鮮育五
嶺實繁然處處有之不似葦蓄但盛於淇川也上文皆馮嗣宗

辨證可謂詳明博雅矣但遍搜陸疏刻本並未載木賊惟馮本多其草澀礪可以洗攬笏及盤枕利於刀錯俗呼爲木賊數語因多木賊草一辨然木賊產秦隴間不聞產於淇衛未知昔人何以云然

按萹蓄木賊近水處皆有何止盛於淇衛秦隴萹蓄北方謂之竹葉菜滇南尚呼萹蓄古語流傳及於遐裔注書者拘文牽義殆猶愧之

說文解字注薄水萹莞也謂萹莞之生於水者謂之薄也統言則曰萹莞析言則有水陸之異異其名因異其字詩衛風綠竹

猗猗音義曰竹韓詩作蕩葦蕘也石經亦作蕩按石經者蓋漢一字石經魯詩也西京賦李注引韓詩綠蕘如簣玉篇曰蕘同蕩从艸水毒聲讀若督徒沃切三部葦葦蕘也三字句釋艸云竹葦蕘按竹者釋毛詩衛風之竹也韓魯詩皆作蕩毛詩獨段借作竹爾雅與毛詩合蕘蕘疊韻通用本艸經亦作葦蕘从艸扁聲方沔切十二部蕘葦蕘也从艸蕘省聲陟玉切三部按此不云玳聲而云蕘省聲者以玳字工聲蕘字竹亦聲也玳篆錯本在後苦下范上

植物名實圖考

卷三

陸英

本草經陸英味苦寒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足腳腫

別錄無毒生熊耳川谷及冤句立秋採

唐本草注此卽蒴藋是也後人不識浪出蒴藋條此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨樹名木英此三英也花葉並相似

圖經曰陸英生熊耳川谷及冤句蒴藋不載所出州土但云生田野今所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接

骨春夏採葉秋冬採根莖或云卽陸英也本經別立一條陶隱居亦以爲一物蘇恭云藥對及古方有葫蘆無言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條不言所用葫蘆條云用葉根莖蓋一物而所用別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華蕚也華蕚榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然則此物旣有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用葫蘆者有用

蒴藋根者有用葉者三用各別正與經載三時所採者相會謂
陸英爲花無疑也

本草綱目李時珍曰陶蘇本草甄權藥性論皆言陸英卽蒴藋
必有所據馬志寇宗奭雖破其說而無的據仍當是一物分根
莖花葉用如蘇頌所云也

按諸說多以陸英蒴藋爲一物但主治不同今滇南有一種
全類陸英而結子黑色破其莖有紅汁俗呼血滿草浸腿腳
治腫痺極效或卽陸英也

本草綱目

卷之三

蒴蘽

別錄蒴蘽味酸溫有毒主風癰癧瘻身痒濕痺可作浴湯一名
董草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根陶隱居云田野墟
村中甚多絕療風痺痒痛多用傅洗不堪入服亦有酒漬根梢
飲之者

唐本草註此陸英也剥出此條爾雅云芨董草郭註云烏頭苗
也檢二董別名又無此者蜀人謂烏頭苗爲董草陶引此條不
知所因處藥對及古方無蒴蘽唯言陸英也

本草衍義蒴蘽與陸英既性味及出產處不同治療又別自是

本草名實圖考
卷之二
三物斷無疑焉况蒴蘿花白子初青如菉豆顆每朵如盞面大
又平有一二百子十月方熟紅豈得言剥出此條孟浪之甚
也

按蒴蘿今通呼爲接骨草市醫以爲要藥白花成簇俗呼真
珠花子如珊瑚又呼珊瑚花氣味近臭多生廢圃蕪穢處圖
經以爲葉似水芹綱目以爲每枝五葉皆極確然葉莖深青
葉對排甚密故市醫名爲排風籐又呼爲鐵籬笆皆以形色
呼之

說文解字注蘿葦草也依集韻類篇李仁甫本作葦廣韻望謹

音蘿也名醫別錄蒴蘿一名董草一名芨按下籀文內有董字
云根如蕡葉如細柳未知是一否 凡物有異名同實者釋草
曰芨董草陸德明謂卽本艸之蒴蘿按郭釋以烏頭烏頭名董
見國語而芨名無見陸說爲長錯本董作釐一曰拜商蘿釋艸
商作蕡說文言一曰者有二例一是兼採別說一是同物二名
此二皆未詳何屬疑董草爲蒴蘿拜商蘿爲今之灰蘿也灰蘿
似藜左傳斬之蓬蒿藜蘿李燾本商作蕡宋麻沙大徐本亦作
啻蓋許所據爾雅不同今本从艸翟聲徒弔切二部芨董艸也
見上从艸及聲讀若急居立切七部

本草綱目

卷之二

王不留行

本草經王不留行味苦主金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒久服輕身耐老增壽

別錄甘平無毒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產生泰山山谷二月八月採陶隱居云今處處有人言是蓼子亦不爾葉似酸漿子似菘子而多入癰瘻方用之

蜀本草經云葉似松藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粒今所在有之三月收苗五月收子曬乾

圖經王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆有之莖苗

俱青高七八寸已來根黃色如齊根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀又似猪籃花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草河北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風癰有王不留行湯最效梅師方治竹木鍼刺在肉中不出疼痛以王不留行為末熟水調方寸匕卽出

救荒本草王不留行又名剪金草一名禁宮花一名剪金花今祥符沙壩間有之苗高一尺餘其莖對節生叉葉似石竹子葉而寬短莖對生腳葉似槐葉而狹長開粉紅花結蒴如松子

而寬短拂莖對生腳葉似槐葉而狹長開粉紅花結蒴如松子
大似粟殼樣極小有子如葶藶子大而黑色採嫩葉爛熟換
水淘去苦味油鹽調食子可搗爲麵食

本草綱目李時珍曰多生麥地中苗高者一二尺三四月開小
花如鐸鈴狀紅白色結實如燈籠草子殼有五棱殼內包一實
大如豆實內細子大如松子生白熟黑正圓如珠可愛 按此
說與前諸說異

才生之年

三

艾

爾雅艾冰臺註今艾蒿疏一名冰臺卽今艾蒿也詩王風云彼采艾兮是也

別錄艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部
屬瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一
名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風陶隱居云搗
艾葉以灸百病亦止傷血汗又殺蛇蟲苦酒煎葉療癬甚良

圖經艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以復道
者爲佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白

以苗短者爲佳三月五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生搗葉取汁飲止心腹惡氣古亦用熟艾搗金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許揉團之內瓦甌中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甌目下燒艾一時久知矣又治癩取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺婢卽差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

志林端午日未出於艾中以意求其似人者輒擷之以灸殊有

效幼時見一書中云爾忘其爲何書也艾未有眞似人者於明暗間苟以意命之而已萬法皆妄無一眞者何復疑耶

素問北方者天地所閉藏之域也西北方陰也是以閉藏之氣惟此更甚其地高陵居風寒冰冽其民樂野處而乳食地高陵居西北之勢也風寒冰冽陰氣勝也野處乳食北人之性也藏寒生滿病其治宜艾炳故艾炳者亦從北方來注夫秋收之氣收於內冬藏之氣直閉藏於至陰之下是以中上虛寒而胸腹之間生脹滿之病矣艾名冰臺削冰令圓舉而向日以艾承其影則得火夫陽生於陰火生於水艾能得水中之眞陽者也北

方陰氣獨盛陽氣閉藏用艾炳灸之能通接元陽於至陰之下是以灸炳之法亦從北方而來也夫人與天地參也天有寒暑之往來人有陰陽之出入經曰陷下則灸之則四方之民陽氣陷藏亦宜艾炳故曰艾炳之法亦從北方來

本草綱目李時珍曰凡灸艾火者宜用陽燧火珠承日取太陽真火其次則鑽槐取火爲良若急卒難備卽用真麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點於炷滋潤灸瘡至愈不痛也其夏金擊石鑽燧八木之火皆不可用邵子云火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火是矣八木者松火難瘥柏火傷神多汗桑火傷

肌肉柘火傷氣脈棗火傷內吐血橘火傷營衛經絡榆火傷骨
失志竹火傷筋損目也南齊書載武帝時有沙門從北齊齋赤
火來其火赤於常火而小云以療疾貴賤爭取之灸之七炷多
得其驗吳興楊道慶虛疾二十年灸之卽瘥咸稱爲聖火詔禁
之不止不知此火何物之火也

荆楚歲時記五月五日採艾以爲人懸門戶上以禳毒氣接宗
測字文度嘗以五月五日雞未鳴時採艾見似人者攬而取之
用簽有驗

獨醒雜志樞密孫公抃生數日患臍風已不救家人乃盛以盤

合將棄諸江道遇老嫗曰兒可活卽與俱歸以艾灸臍下遂活博物志積艾草三年後燒津液下流成鉛錫已試有驗

楚辭芳草譜蕭與艾皆香草離騷則薄之曰戶服艾以盈腰兮謂幽蘭其不可佩然要之庶人所服比之蘭蕙則有間矣

說文解字注莫艸也可以染留黃糸部緺下曰帛莫艸染色也

留黃辭賦家多作流黃皇侃禮記義疏作驃黃土剋水故中央

驃黃色黃黑也漢諸侯王縠綬晉灼曰縠艸名出琅邪平昌縣

似艾可染黃因以爲綬名玉裁按縠同音段借字也漢制縠綬

在紫綬之上其色黃而近綠故徐廣云似綠或云似紫綬名綬

綬者非也綢紫青色與綬不同从艸戾聲卽計切十五部

按今艾亦用以染黃莫似艾古亦云艾綬附錄於此
又艾爻臺也見釋艸張華博物志曰削冰令圓舉以向日以艾
於後承其影則得火从艸又聲五蓋切十五部古多借爲文字
治也又訓養也

植物名實圖考

卷之二

三

惡實

別錄惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出
中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤陶隱居
云方藥不復用

圖經惡實卽牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長
實似葡萄核而褐色外殼如栗核小而多刺鼠過之則綴惹不
可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤
益人秋後採子入藥用根葉亦可生搗入少鹽花以搗腫毒又
冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用繁牛蒡子

根取時須避風以竹刀或荆刀刮去土用生布拭了搗絞取汁一大升和灼然好蜜四大合溫分爲兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至潁陽食一頓熱肉便中暴風外甥盧氏爲潁陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方頭風及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁一升合無灰酒一升鹽花一匙頭塘火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可

食療本草根作脯食之良熱毒腫搗根及葉封之杖瘡金瘡取

葉貼之永不畏風又癱緩及丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩盞隨性多少飲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟接吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麵作飯煮食尤良又皮毛間習習如蟲行煮根汁浴之夏浴慎風卻入其子炒過末之如茶煎三七通利小便

救荒本草牛蒡子俗名夜叉頭根謂之牛菜生魯平山澤今處處有之苗高二三尺葉如芋葉長大而澀花淡紫色實似蘿蔔而褐色外殼如粟核而小多刺殼中有子如半粒麥而匾小根

長尺餘麓如拇指其色灰黯採葉爛熟水浸去邪氣淘洗淨油鹽調食及取根洗淨煮熟食之

山家清供牛蒡脯孟冬後採根去皮淨洗煮毋失之過槌匾壓以鹽醬茴薑薑椒熟油諸料研細一兩火焙乾食之如肉脯之味筍與蓮肺同法

小薊

別錄大小薊根味甘溫主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血効鼻令人肥健五月採陶隱居云大薊是虎薊小薊是猫薊葉並多刺相似田野甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒

唐本草註云大小薊葉雖相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也

圖經小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺薊苗

高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼爲千
鍼草當二月苗初生二三寸時并根作茹食之甚美四月採苗
九月採根並陰乾入藥亦生搗根絞汁飲以止吐血衄血下血
皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦
療癰腫小薊專主血疾

救荒本草刺薊菜本草名小薊俗名青刺薊北人呼爲千鍼草
今處處有之苗高尺餘葉似苦苣葉莖葉俱有刺而葉不皺葉
中心出花頭如紅藍花而青紫色味甘性溫採嫩苗葉爛熟水
浸淘淨油鹽調食甚美

大青

別錄大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖陰乾陶隱居云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近道長尺許紫莖除時行熟毒爲良

圖經大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南眉蜀濛淄諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之

本草綱目李時珍曰處處有之高二三尺莖圓葉長三四寸面青背淡對節而生八月開小花紅色成簇結青實大如椒顆九月色赤

虎杖

雅蓀虎杖註似葢草而龐大有細刺可以染赤
別錄虎杖根微溫主通利月水破留血癥結陶隱居云田野甚
多此狀如大馬蓼莖斑而葉闊極主暴瘕酒漬根服之也

圖經虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之三月生苗
莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝了葉似小杏葉七月開
花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有
高丈餘者二月三月採根暴乾河東人燒根灰貼諸惡瘡浙中
醫工取根洗去皺皮剉焙擣篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸痔

下血甚佳俗間以甘草同煎爲飲色如琥珀可愛瓶盛置井中
令冷徹如冰極解暑毒其汁染米作糜饌益美

本草衍義虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木
高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖藥差大爲異仍
莖葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中旬已花片四出
其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多
煎根汁爲飲不得甘草則不堪飲藥性論云和甘草煎嘗之甘
美其味甘卽是甘草之味非虎杖也論其政治則甚當

老學菴筆記齊民要術有鹹杺子法用杺木皮漬鴨卵今吳人

用虎杖根漬之亦古遺法

相物名實圖考

卷一

莊草

爾雅紅籠古其大者歸註俗呼紅草爲籠鼓語轉耳詩經隱韻遊龍陸璣疏遊龍一名馬蓼葉龐大而赤白色生水澤中高丈餘

圖經莊草卽水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯治腳氣耳

救荒本草白水莊苗採嫩苗葉爛熟水浸淘淨油鹽調食洗淨

蒸食亦可。

按陸疏廣要以本草衍義水蓼與水紅相似遂以爲龍非蓼而引埤雅天蓼一名龍爲證不知水荭花莖與蓼無異而葉大近圓不似他蓼葉皆尖長北方至今呼爲水荭或轉荭爲蓬然則莊之爲龍爲蓬正合爾雅注龍古語轉之說

爾雅翼龍紅草也一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘今人猶謂之水紅草而爾雅又謂之龍古鄭詩稱山有喬松隰有游龍云游龍者言其枝葉之放縱也龍與荷華是隰草之偉者然所配扶蘇喬松不同接管子有五栗五沃五位五蔭五壤

五浮之土謂之上土五沃之土則桐梓株櫟秀生莖起五臭疇
生蓮與蘂蕪藪本自芷然則首章言扶蘇荷華應此五沃之土
也其五位口其山之淺有龍與卉羣木安遂條長數丈其桑其
松其杞其茸次章言喬松游龍應此五位之土也此皆土之最
美者特非子都子充而狂且狡童之爲見則所美非美矣淮南
言水草之始海閭生屈龍屈龍生容華容華生蘋蘋生萍藻萍
藻生浮草凡浮生不根荄者生于萍藻屈龍豈亦此龍草邪歛
爲屈縱爲游是或一道也

曲洧舊聞紅蓼卽詩所謂游龍也俗呼水紅江東人別澤蓼呼

之爲火蓼道家方書亦有用者呼爲鶴膝草取其莖之形似也
然澤蓼有二種味辛者酒家用以造麴餘不入用也

白蘘荷

別錄白蘘荷微溫主中蠱及瘧陶隱居云今人乃呼赤者爲蘘荷白者爲覆菹葉同一種爾於人食之赤者爲勝藥用白者中蠱者服其汁并卧其葉卽呼蠱主姓名亦主溪毒沙蠍輩多食損藥勢又不利腳人家種白蘘荷亦云辟蛇

唐本草注云白蘘荷根主諸惡瘡殺蠱毒根心主稻麥芒入目中不出者以汁注目中卽出

圖經白蘘荷舊不注所出州土今荆襄江湖間多種之北地亦有春初生葉似甘蕉根似薑而肥其根堪爲菹其性好陰在木

下生者尤美潘岳閑居賦云蘘荷依陰時藿向陽是也宗懷荆楚歲時記曰仲冬以鹽藏蘘荷以備冬儲又以防蠱史遊急就篇云蘘荷冬日藏其來遠矣干寶搜神記云其外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱家人蜜以蘘荷置其席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小小走自此解蠱藥多用之周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗懷以謂嘉草卽蘘荷是也陳藏器云蘘荷茜根爲主蠱之最然有赤白二種白者入藥昔人呼爲覆蘓赤者堪噉及作梅果多用之古方以乾末水服主喉痺

按蘘荷古以爲蘓近世幾無識者李時珍據楊升菴說以甘

蕉卽蘘荷前人已非之矣廣西志以陽藿爲蘘荷尚有依據
又以草石蠶爲蘘荷則大不類

齊民要術說文曰蘘荷一名蓄菹搜神記曰蘘荷或爲嘉草
蘘荷宜在樹陰下二月種之一種永生亦不須鋤微須加糞以
土覆其上八月初踏其苗令死不踏則根不滋潤九月中取旁
生根爲菹亦可醬中藏之十月終以穀麥種覆之不覆則凍死
二月掃去之食經藏蘘荷法蘘荷一石洗清以苦酒六斗盛銅
盆中著火上使小沸以蘘荷稍稍投之小萎便出著席上令冷
下苦酒三斗以三升鹽著中乾梅三升以鹽酢澆上綿覆罷口

二十日便可食矣

說文蘘荷也一名荷苴

荆楚歲時記仲冬鹽藏蘘荷用備冬儲又以防蠱

丹鉛錄邱文莊羣書抄方載中蠱毒用白蘘荷引柳子厚詩云
云且曰子厚在柳州種之其地必有此種仕於茲土者其物色
之蓋亦不知爲何物也余謂邱公之博洽而不識世之識者亦
罕矣按松江志引急就章注曰白蘘荷卽今甘露考之本草其
形性正同

廣雅疏證蘘荷尊苴也說文云蘘荷一名蓄蘂蓄蘂與苴同

亦名苴尊楚詞大招云醯豚若狗膾苴尊只王注云苴尊蘘荷也雜用膾炙切蘘荷以爲香備衆物也或作尊菹九歎云耘藜蘘與蘘荷王注云蘘荷尊菹也或作菰苴或作覆菹古今注云蘘荷似菰苴而白菰苴色紫花生根中花未散時可食久置則消爛不爲實矣名醫別錄云白蘘荷微溫主中蠱及瘧陶注云今人乃呼赤者蘘荷白者爲覆菹葉同一種爾於人食之赤者爲勝藥用白者古今注以紫白蘘荷白爲蘘荷別錄注以赤爲蘘荷白爲尊苴二說不同廣韻則云尊苴大蘘荷名是又以大小分也其實蘘荷尊苴皆大名後世說者多歧耳或作溥苴或

作巴且史記司馬相如傳諸蔗蕷且漢書作巴且張氏注云尊
苴蘘荷也文穎云巴且一名巴蕉顏師古云文說巴且是也且
音子余反尊音晉各反尊苴自蘘荷耳非巴且也案巴尊古同
聲尊苴正可通作巴且且張云尊苴蘘荷也蓋一本有作尊苴
者故史記索隱引郭璞子虛賦注云巴且蘘荷屬則亦以巴且
爲尊苴也顏師古言尊苴非巴且殆不通假借之例耳蘘荷之
草性宜陰地古今注云葉似薑宜陰翳地種之常依陰而生齊
民要術云蘘荷二月種之宜在樹陰下閑居賦所謂蘘荷依陰
者也蘘荷葉似薑故古人多與薑並言漢書司馬相如傳云茈

薑蘘荷齊民要術引崔實四民月令云九月藏茈薑蘘荷其歲若溫皆待十月是則蘘荷又可爲禦冬之菜故急就篇云老善蘘荷冬日藏而蘇頌本草圖經亦引荆楚歲時記云仲冬以鹽藏蘘荷也或單謂之荷七諫云列樹芋荷謂芋渠與蘘荷也後漢書馬融傳云蘘荷芋渠是也又謂之嘉草周官庶民掌除毒蠱以嘉草攻之御覽引干寶搜神記云今世攻蠱多用蘘荷根往往有驗蘘荷或謂嘉草蓋此卽干氏周官注說又於此言之耳蘇頌本草圖經引荆楚歲時記亦與搜神記同

說文解字注蘘蘘荷也三字句蘘荷見上林賦劉向九歎張衡

南都賦潘岳閑居賦一名蓄蘓史記子虛賦作搏且漢書作巴
且王逸作蓴菹顏師古作蓴苴名醫別錄作覆菹皆字異音近
景差大招則倒之曰苴蓴崔豹古今注曰似薑宜陰翳地師古
曰根旁生筭可以爲菹又治蠱毒宗懷荆楚歲時記云仲冬以
鹽藏蘘荷以備冬儲急就篇所云老薑蘘荷冬日藏也从艸蘘
聲汝羊切十部

詩經可以漚綺陸璣疏云綺亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆楊之間一歲三收今官園種之歲再割便生剝之以鎌若竹刮其表厚皮自脫但得其裏如筋者煮之用緝謂之徽苧今南越綺布皆用此麻

別錄苧根寒主小兒赤冉其漬苧汁療渴陶隱居云卽今績苧爾又有山苧亦相似可入用也

唐本草注別錄云根安胎帖熱丹毒腫有大效漬苧汁主消渴也

本草拾遺苧破血漬苧與產婦溫服之將苧麻與產婦枕之止血量產後腹痛以苧安腹上則止蠶咬人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蠶不生也

日華子云味甘滑冷無毒治心膈熱漏胎下血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱冒毒箭蛇蟲咬

圖經苧根舊不載所出州土今閩蜀浙江多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似孕婦胎損方所須又主白丹濃煮水浴之日三四差韋苗療癰疽發

背初覺未成膿者以苧根葉熟搗傅上日夜數易之膿消則差矣

本草衍義苧根如蕁麻花如白楊而長成穗生每一朵凡數十穗青白色

聖惠方治姪娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分溫作二服

肘後方丹者惡毒之瘡五色無常苧根三升水三斗煮浴每日塗之

斗門方治五種淋用苧麻根兩莖打碎以水一盞半煎取半盞

本草綱目 卷之三
穎服卽通大妙

梅師方治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之卽死速消方搗苧根傅之數易

救荒本草苧根舊云閩蜀江浙多有之今許州人家田園中亦有種者苗高七八尺一科十數莖葉如楮葉而不花叉面青背白上有短毛又似蘇子葉其葉間出細穗花如白楊而長每二朵凡十數穗花青白色子熟茶褐色其根黃白色如手指粗短根地中至春自生不須藏種根味甘採根刮洗去皮煮極熟食之甜美

本草綱目李時珍曰苧家苧也又有山苧野苧也有紫苧葉面
紫白苧葉面青其背皆白可刮洗煮食救荒味甘美其子茶褐
色九月收之二月可種宿根亦自生

苧根

苧

隰草卷之九

植物名實圖考

卷一

附種苧及麻苧圖譜

農桑輯要種苧麻法三四月種子者初用沙薄地爲上兩和地爲次圍圃內種之如無園瀕河近井處亦得先倒勵土一二遍然後作畦闊半步長四步再勵一遍用腳浮躡或杖背浮按稍實不然著水虛懸再杷平隔宿用水飲畦明日細齒杷浮穀起土再杷平隨時用濕潤畦土半升子粒一合相和勵撒子一合可種六七畦撒畢不用覆土覆土則不出於畦內用極細梢杖三四根撥刺令平可畦搭二三尺高棚上用細箔遮蓋五六月內炎熱時箔上加苦重蓋爲要陰密不致曬死但地皮稍乾用

煥等細灑水於棚上常令其下濕潤

或子未生芽苗或出力弱不禁注水陸澆故也

遇天陰及早夜撤去覆箔至十日後苗出有草卽拔苗高三指

不須用棚如地稍乾用微水輕澆約長二寸卻擇比前稍壯地

別作畦移栽臨移時隔宿先將有苗畦澆過明日亦將做下空

畦澆過將苧麻苗用刀器帶土掘出轉移在內相離四寸一栽

務要頻鋤三五日一澆如此將護二十日之後十日半月一澆

至十月後用牛驢馬生糞蓋厚一尺預選秋耕擺熟肥地更用

細糞糞過來年春首移栽地氣已動爲上時芽動爲中時苗長

爲下待栽去掘區成行方圍相去一尺五寸每畦中再苗多出

栽於區內擁土區中以水澆之若夏秋移栽須趁雨水地濕分根連土於側近地內分栽亦可移栽年深宿根者移時用刀斧將根截斷長可三四指栽時成行作區方圍各離一尺五寸每區卧栽三二根棋盤相對擁土畢然後下水候三五日復澆苗高勤鋤旱則澆之若地遠移栽者須根科少帶原土蒲包封裏外復用席包掩合勿透風日雖數百里外栽之亦活栽培法如前初年長約一尺便割一鎌麻未堪用再候長成所割卽堪續用至十月卽將割過根楂用牛馬糞蓋厚一尺不至凍死元扈曰如此蓋厚則栽得過冬所以中土得種若北方未知可否吾鄉三十度上下地方蓋厚一二寸卽得矣至二月初

水生卷之二

把去糞令苗出以後歲歲如此

壓條滋陰如桑法移栽亦可

第三年根科交

蔭稠密不移必漸不旺卽將本科周圍稠密新科再依前法分
栽每歲可割三鎌每割時須根傍小芽出土約高五分其大麻
卽爲可割大麻旣割其小芽榮長便是下次再割麻也若小芽
過高大麻不割不惟小芽不旺又損已成之麻大約五月初一
鎌六月半一鎌八月半一鎌唯中間一鎌長疾麻亦最好刈倒
時隨卽用竹刀或鐵刀從稍分批開用手剝下皮卽以刀刮其
白瓢其浮上皴皮自去縛作小叢搭於房上夜露晝曝如此五
七日其麻自然潔白然後收之若值陰雨卽於屋底風道內搭

涼聲

去

恐經雨黑漬故也所剝之麻春夏秋渴暖時分績與常法

同若於冬月用溫水潤濕易爲分擘也如乾硬難分其績既成
纏作纓子於水瓮內浸一宿紡車紡訖用桑柴灰淋下水內浸
一宿撈出每纏五兩可用淨水一盞細石灰拌勻置於器物內
停放一宿至來日澤去石灰卻用黍楷灰淋水煮過自然白輕
曬乾再用清水煮一度別用水擺拔極淨曬乾逗成纏鋪經蔭
織造與常法同此麻一歲三割每畝得麻三十斤少不下二十
斤目今陳蔡間每斤價錢三百文已過常麻數倍善績者麻皮
一斤得績一斤細者有一斤織布一疋次斤半一疋又次二斤

三斤一疋其布柔勒潔白比之常布又價高一二倍然則此麻但栽植有成便自宿根可謂暫勞永逸矣

王禎麻苧圖譜叙曰麻苧之有用具南北不無異同民俗豈能通變如南人不解刈麻北人不解治苧及有漚浸審生熟之節車紡分大小之工凡繩絡繩纓皆其所出今併所附類一條列庶使南北互相爲法云

元扈先生曰苧性畏寒不宜北土北方地氣所絕無如之何然綺衣漚綺卽又北方自古有之宜試種爲得

刈刀

刈刀獲麻叉也或作兩叉但用鎌柄旋插其叉俯身控刈取其平穩便易北方種麻頗多或至連頓另有刀工各具其器割刈根莖剗削梢葉甚有速效南東惟用拔取頗費工力故錄此篇首志其便也

漚池

漚池漚浸漬也池猶泓也凡藝麻之鄉如無水處則當掘地成池或甃以磚石蓄水於內用作漚所大凡北方治麻刈倒卽乘之卧置於池水要寒燠得宜麻亦生熟有節須人體測得法則麻皮潔白柔軟可績細布南方但連根拔麻遇用則旋浸旋剝

其麻片黃皮粗厚不任細績雖南北習尚不同然北方隨刈卽
漚於池可爲上法又問之南方造苧者謂苧性本難輒與漚麻
不同以先績苧已紡成纏乃用乾石灰拌和累日夏天三日冬天五日春秋
約中既必抖去別用石灰煮熟待冷於清水中濯淨然後用蘆簾
平鋪水面如水淺則用大盆盛水鋪簾或卓攤纏浸曝每日換水亦可攤纏於上半浸半曝
遇夜收起漚乾次日如前候纏極白方可起布此治苧池漚之
法須假水浴日曬而成北人未之省也今書之冀南北通用至有理可推廣其意別用之也

本草綱目

莢刮刀

莢刮刀刮莢皮叉也煅鐵爲之長三寸許捲成小槽內插短柄兩叉向上以繩爲用仰置手中將所剝莢皮橫覆叉上以大指就按刮之莢膚卽脫農桑輯要云莢刈倒時用手剝下皮以刀刮之其浮皴自去今制爲兩叉鐵刀尤便於用

績蠻

績蠻盛麻績器也。績集韻云：輯也。蠻說文曰：籠也。又姑簍也。字從竹，或以條莖編之，用則一也。大小深淺隨其所宜制之。麻苧、蕉葛等爲之，綿絰皆本於此。有日用生財之道也。

林物名實圖考

卷六

小紡車

小紡車此車之制凡麻苧之鄉在在有之前圖具陳茲不復述
隋書鄭善果母清河崔氏恒自紡績善果曰母何自勤如是耶
答曰紡績婦人之務上自王后下至大夫妻各有所製若隋業
者是爲驕逸吾雖不知禮其可自敗名乎今士大夫妻妾衣被
纖美曾不知紡績之事聞此鄭母之言自當悟也

大紡車其製長餘二丈闊約五尺先造地拊木相四角立柱各
高五尺中穿橫桄上架枋木其枋木兩頭山口卧受捲轡長軒
鐵軸次於前地拊上立長木座座上列臼以承轡底鐵箕夫轡

一尺二寸圍一尺
轡上具用丈貞載
裹以句蠶油用木

車成簾子一尺二寸圍一尺
二寸簾三寸二枚內受績纏

王禎麻苧圖譜

卷之九

隰草卷之九

又於額枋前排置小鐵叉分勒績條轉上長軒仍就左右別架車輪兩座通絡皮弦下經列轡上拶轉軒旋鼓或人或畜轉動左邊大輪弦隨輪轉衆機皆動上下相應緩急相宜遂使績條成緊纏於軒上晝夜紡績百斤或衆家績多乃集於車下秤績分纏不勞可畢中原麻布之鄉皆用之又新置絲線紡車一上法但差小耳比之露地術架合線特爲省易因附於此

蟠

車

蟠車纏纏具也又謂之撥車南人謂撥拊又云車柂南北人皆慣用習見已圖於前茲不必述

纏刷

纏刷疏布縷器也束草根爲之通柄長可尺許圍可尺餘其纏

縷杼軸既畢架以父木下用重物擊之纏縷已均布者以手執此就加漿糊順下刷之卽增光澤可受機織此造布之內雖曰細具然不可闕

布機釋名曰布列諸縷淮南子曰伯餘之初作布也伯餘黃帝臣也綫麻索縷手經指掛後世爲之機杼幅疋廣長疎密之制存焉農家春秋績織最爲要具

行臺監察御史詹雲卿造布之法曰揀一色白苧麻水潤分成縷粗細任意旋緝旋搓本俗於腿上搓作纏逗成鋪不必車紡亦勿熟漚只經生纏論帖穿苧如常法以發過稀糊調細豆麵

刷過更用油水刷之於天氣濕潤時不透風處或地窖子中灑
地令潤經織爲佳若風日高燥則纏縷乾脆難織每織必先以
油水潤苧及潤纏經織成生布於好灰水中浸蘸曬乾再蘸再
曬如此二日不得揉搓再蘸濕了於乾灰內周徧滲浥兩時久
納於熟灰水內浸濕於甌中蒸之文武火養二三日頻頻翻覩
要識灰性及火候緊漫次用淨水澣濯天晴再三帶水搭曬如
前不計次數惟以潔白爲度灰須上等白者落黎桑柴豆稽等
灰入少許炭灰妙北方古有此法今獨肅寧用之

鐵勒布法將揀下雜色苧麻水潤分縷隨緝隨搓 織皆如前

法水煮過便是先將生苧麻折作二尺五寸長不斷曬乾蒸過帶濕剝下去粗皮如常法水潤緝搓如前

麻鐵黎布法將雜色老火麻帶濕曲折作二尺五寸長曬乾收之欲用時旋於木甌中蒸過趁濕剝下曬乾以木桿子兩箇夾麻順厯數次至麻性頗軟堪緝爲度水潤緝績紡作纏生織成布水煮便是

王禎曰此布妙處惟在不搓揉了麻之骨力好灰水蘸曬布子潔白而已雖曰蘸曬頗煩而省纏織熟纏等工亦多比之南布或有價高數倍者真良法也碑文板印布與世之治生君子共之

繩車綵合絳緊作繩也其車之制先立簾簾一座植木止之簾上加置橫板一片長可五尺闊可四寸橫板中間排鑿八竅或六竅各竅內置棹枝或鐵或木皆彎如牛角又作橫木一莖列竅穿其棹枝復別作一車亦如上法兩車相對約量遠近將所成絳緊各結於兩車棹枝之足車首各一人將棹枝所穿橫木俱各攬轉候絳股勻緊卻將三股或四股合而爲一各結於棹枝一足計成二繩然後將另制瓜木置於所合絳緊之首復攬其棹枝使絳緊成繩瓜木自行繩盡乃止凡農事中用繩頗多故田家習制此具遂列於農譜之內

經車續臘梟累具也造作簾簾高二尺上穿橫軸長可二尺
餘貫以軒轂左手引麻牽軒既轉右手續接麻皮成緊縱纏上
軒經縷既盈乃脫軒付之繩車或則別用

綴

車

綴車繩繩器也通俗文曰單繩曰綴揉木作捲中貫軸柄長可
尺餘以捲之上角用繩麻皮右手執柄轉之左手續麻股既成

繫則纏於捲上或隨繩車用之以助糾綃經繫又農家用作經
織麻履牛衣簾箔等物此綴車復有大小之分也

旋椎

旋椎掉麻紵具也截木長可六寸頭徑三寸許兩間研細棕如腰鼓中作小竅插一鉤簾長可四寸用繫麻皮於上以左手懸

之右手撥旋麻既成緊就纏椎上餘麻挽於鉤內復續之如前所成經緯可作粗布亦可織履農隙時老稚皆能作此雖係瑣細之具然於貧民不爲無補故繫於此

苧畧

雩婁農曰徐元扈謂北方無苧詩可以漚紵綺爲絲此誤也苧麻屬故言漚絲不可漚菅麻苧皆草絲則非其類江南安慶寧國池州山地多有苧要以江西湖南及閩粵爲盛江西之撫州建昌寧都廣信贛州南安袁州苧最饒緝纏織線猶嘉湖之治絲宜黃之機上白市者驚其名然非佳品寧都州俗無不緝麻之家敏者一日可績三四兩鈍者亦兩以上請織匠織成布一機長者十餘丈短者亦十丈以上四五兩織成一疋布者爲最細次六七兩次八九兩則粗矣夏布墟則安福鄆之會同集仁

義鄉之固厚集懷德鄉之璜溪集在城則軍山集每月集期土人商賈難還如雲計城鄉所產歲鬻數十萬緡女紅之利普矣石城縣志亦曰石邑夏布歲出數十萬疋外貿吳越燕毫間贛州各邑皆業苧閩賈於二月時放苧錢夏秋收苧歸而造布然不如寧都布潔白細密苧以瘦韌潔白爲上其黃者曰糙麻婦功間日緝濯柔細經時累月織成一衣曰女兒布苧之精者無逾此居人服之商估不可得也湖南則瀏陽湘鄉攸縣茶陵醴陵皆麻鄉往時巴陵道州武陵郴州皆貢練綺今則並瀏陽上供亦栽肥地苧深四五尺剝至三四次擇避風處蔲之夏有苧

市捆載以售溪蠻叢笑云漢傳載闕千闕千獫言紵巾有織
細白苧麻以旬月而成名娘子布則亦女兒布之類非僅獫名
也苗人據矮機席地而織設虛場以麻布易所無也寰宇記宜
州有都洛麻狹幅布今語曰多羅麻廣西志梧州出絡布以絡
麻織成因名並苧類也桂海虞衡志練子出兩江州崗大畧似
苧布有花紋者謂之花練彼人亦自貴重嶺外代答邕州左右
江西崗產苧麻土人擇其細長者爲練子暑衣之輕涼離汗者
也花練一端長四丈重數十錢卷入之小竹筒尙有餘地以染
真紅尤易著色厥價不廉稍細者一疋數十緡也粵之新會有

細苧蓋左思所謂筭中黃潤者凡疊布必成筭一筭十端而葛
之大者率以兩端爲一連苧則一端爲一連他布則以六丈爲
端四丈爲疋此其別也禹貢曰島㠭卉服傳曰島㠭南海島上
尼也卉草也卉服葛越也葛越南方之布以葛爲之以其產於
越故曰葛越也左思曰蕉葛升越弱於羅紝正義曰卉服葛越
蕉竹之屬越卽苧祿也漢徐氏女贈其夫以越布鄧后賜諸貴
人白越是也漢書云粵地多果布之湊韋昭曰布葛布也顏師
古曰布謂諸雜細布皆是也其黃潤者生苧也細者爲絰粗者
爲苧苧一作綺禹貢曰厥篚織貝傳曰織細綺也疏曰細綺布

也其曰花練曰穀纏曰細都曰弱析皆其類志稱蠻布織蕉竹
苧麻都落等麻有青黃白絡火五種黃白曰苧亦曰白緒青絡
曰麻火曰火麻都落卽絡也馬援在交趾嘗衣都布單衣都布
者絡布也絡者言麻之可經可絡者也其細者當暑服之涼爽
無油汗氣煉之柔熟如椿椒繭綢可以禦冬新興縣最盛估人
率以綿布易之其女紅治絡麻者十之九治苧者十之三治蕉
十之一紡蠻作繭者于之一而已又有魚凍布莞中女子以絲
兼苧爲之柔滑而白若魚凍謂紗羅多澣則黃此布愈澣則愈
白云

卷之三

三

苦葵

別錄苦葵微寒主面目通身漆瘡陶隱居云處處有之僥人取莖生食之五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗

蜀本草圖經注子若猫薊莖圓無刺五月採苗堪生噉所在下濕地有之

食療本草苦葵微寒生食治漆瘡五月五日採暴乾作灰傅面目通身漆瘡不堪多食爾

本草綱目李時珍曰爾雅鉤芙蓉卽此苦葵也葵大如拇指中空莖頭有臺似薊初生可食許慎說文言江南人食之下氣今浙

東人清明節采其嫩苗食之云一年不生瘡癩亦搗汁和米爲食其色清久留不敗造化指南云苦葵大者名苦蔴葉如地黃味苦初生有白毛入夏抽莖有毛開白花甚繁結細實其無花實者名地膽草汁苦如膽也處處濕地有之人爐火家用按江西亦

呼爲地
膽草

說文解字注苦艸也味苦江南食之呂下氣名醫別錄云苦葵主瘀瘡不云可下氣漢人謂豫章長沙爲江南从艸天聲烏浩

切二部

寒主癰腫結熱陶隱居云本出廣州今都下江

異惟子不堪食爾根搗傅熱腫甚良又有五葉
全人籬援間作藤俗人呼爲籠草取其根搗傅癰癩亦效

唐本草注云五葉卽烏蘡草也其甘蕉根味甘寒無毒搗汁服
主產後血脹悶傅腫去熱毒亦效嶺南者子大味甘冷不益人
此間但有花汁無實

日華子云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發
熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益髮腫毒游風風癆頭痛并

研晉傅芭蕉油冷無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火
瘡

圖經曰甘蕉根舊不著所出州郡今出二廣閩中蜀者有花閩
廣者實極美可噉他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種
之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此云甘蕉乃是有子者葉大抵與
芭蕉相類但其卷心中抽莖作花初生萼如倒垂菌苔有十數
層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉
白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有
青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以

爲珍果閩人灰埋其皮令錫滑續以爲布如古之錫袁焉其根
極冷搗汁以傅腫毒蓐婦血妨亦可飲之又芭蕉根性亦相類
俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭
蕉油治暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差極有奇效
取之用竹筒插皮中如取漆法

南方草木狀甘蕉望之如樹株大者一圍餘葉長一丈或七八
尺廣尺餘二尺許花大如酒杯形色如芙蓉著莖末百餘子大
各爲房相連累甜美亦可蜜藏根如芋魁大者如車轂實隨華
每華一闔各有六子先後相次子不俱生花不俱落一名芭蕉

或曰芭苴剝其子上皮色黃白味似葡萄甜而脆亦療饑此有三種子大如拇指長而銳有類羊角名羊角蕉味最甘好一種子大如雞卵有類牛乳名牛乳蕉微減羊角一種大如藕子長六七寸形正方少甘最下也其莖解散如絲以灰練之可紡績爲繩絡謂之蕉葛雖脆而好黃白不如葛赤色也交廣俱有之三輔黃圖曰漢武帝元鼎六年破南越建扶荔宮以植所得奇草異木有甘蕉二本

齊民要術廣志曰芭蕉一曰芭苴或曰甘蕉莖如荷芋重皮相裹大如盂升葉廣二尺長一丈子有角子長六七寸有蒂三四

寸角著蒂生爲行列兩兩共對若相抱形剝其上皮色黃白味似葡萄甜而脆亦飽人其根大如芋魁大一種青色其莖解散如絲織以爲葛謂之蕉葛雖脆而好色黃白不如葛色出交趾建安 南方異物志曰甘蕉草類望之如樹株大者一圍餘葉長一丈或七八尺廣尺餘華大如酒盃形色如芙蓉莖末百餘子大各爲房根似芋魁大者如車轂實在華每華一鬚各有六子先後相次子不俱生華不俱落此蕉有三種一種子大如拇指長而銳有似羊角名羊角蕉味最甘好一種大如雞卵有似羊乳味微減羊角蕉一種蕉大如藕長六七寸形正方名方蕉少

甘味最弱其莖如芋取濩而煮之則如絲可紡績也 異物志
曰芭蕉葉大如筵席其莖如芽取蕉而煮之則如絲可紡績女
工以爲繩絡則今交趾葛也其內心如蒜鵝頭生大如今梓因
爲實房著其心齊一房有數十枚其實皮赤如火剖之中黑剝
其皮食其肉如飴蜜甚美食之四五枚可飽而餘滋味猶在齒
牙間一名甘蕉 顧微廣州記曰甘蕉與吳花實根葉不異直
是南土暖不經霜凍四時花葉展其熟甘未熟時亦苦澀

益部方物記蕉無中幹花產葉間緣葉外敷絳萼凝殷石紅蕉花
於芭蕉蓋自一種葉小其花鮮明可喜蜀人語染深紅者謂之

蕉紅蓋倣其殷麗云

嶺外代答芭蕉極大者凌冬不凋中抽一幹節節有花如菌苔
花謝有實一穗數枚如肥阜長數寸去皮取肉軟爛如綠柿極
甘冷四季實以梅汁漬暴乾按匾所云芭蕉乾是也 雞蕉則
甚小亦四季實 芽蕉小如雞蕉尤香嫩甘美南人珍之非他
蕉比秋初方實

嶺南雜記蕉子最多蕉心抽一莖叢生一二三十莖如肥阜而三
棱剖之肉如爛瓜味如蜜箇香瓜名爲棒槌蕉自夏徂冬賣此
最久有玫瑰蕉作玫瑰花香又有狗牙蕉二種小而甘品貴於

椿梔其不實者有紅蕉中抽一花如蓮蕊葉葉遞開紅赤奪目久而不謝名百日紅有蕉葛不花不實人家沿山溪種之老則碓置溪中俟爛揉其筋織爲葛布亦有粗細產高要廣利寶查等村者佳然一年卽黑而脆遜葛遠矣

南越筆記草之大者曰芭蕉雖復扶疎若樹株而莖幹虛軟苞裏重皮皮之中無所謂膚也卽有微心亦柔脆不堅蓋草之質爲多故吾以屬於草其大者兼圍高二丈餘葉長丈廣尺至三尺中分如幅帛有雙角其葉必二三開則三落落不至地但懸挂莖間乾之可以作書陸佃云蕉不落葉一葉舒則一葉焦

是花出於心每一心輒抽一莖作花聞雷而振振者如倒
垂菡萏層層作卷瓣瓣中無蕊悉是瓣漸大則花出瓣中每一
花開必三四月乃闔一花闔成十餘子十花則成百餘子大小
各爲房隨花而長長至五六寸許先後相次兩兩相抱其子不
俱生花不俱落終年花實相代謝雖歷歲寒不凋此其爲異也
子以香牙蕉爲美一名龍奶奶乳也美若龍之乳不可多得然
食之寒氣沁心頗有邪甜之目其葉有硃砂斑點植必以木夾
之否則結實時風必吹折故一名折腰娘曰牛乳蕉曰皺槌蕉
曰極蕉皆大而味淡皺槌蕉有核如梧子大而三棱曰佛手蕉

者子長六七寸小而皮薄味甜是皆甘蕉之知名者粵故芭蕉之國土人多種以爲業其根以蔬實以餌糧餅餌絲以布其絲紿與荃葛同而柔韌遜之名布蕉布蕉多種山間其土瘠石多則絲堅勒土肥則多實而絲脆不堪爲布謠曰衣蕉宜瘠食蕉宜肥肥宜蕉子瘠宜蕉絲子熟時大小排比或以十餘二十餘爲一梳彼此相餉子瞻詩西都蕉向熟時致一梳黃其形象梳子長短者如梳齒黃時生割之置稻穀中數日卽熟熟乃大香可食增城之西洲人多種蕉種至三四年卽盡伐以種白蕉白蕉得種蕉地益繁盛甜美而白蕉種至二年又復種蕉蕉中間

檀香芋與小桔橘芋蘋等皆得芳好其蕉與蔗相代而生氣味
相入故勝於他處所產

廣西通志觀音蕉葉似芭蕉中心發紅芽初出如卷旗漸分大
瓣如蓮而瓣擴不甚放色鮮艷奪目可歷數月又名觀音蓮

本草名實圖考

卷三

馬鞭草

別錄馬鞭草主下部墮瘡陶隱居云村墟陌甚多莖似細辛花紫色葉微似蓬蒿也

唐本草注苗似狼牙及茺蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘故名馬鞭都不似蓬蒿也

圖經曰馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江柳州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一

石煮取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加四五豆神良

聖惠方治白癩用馬鞭草不限多少爲末每服食前用荆芥薄荷湯調下一錢七又方治婦人月水滯澀不快通結成瘕者大欲死用馬鞭草根苗五觔剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前溫酒調下半匙

千金方食魚鱠及生肉住胸膈不化必成癰瘍搗馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得卽消又方治喉痺躁腫連頰吐血數者者馬喉痺馬鞭草一握勿見風截去兩頭搗取汁服之

集驗方治男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗馬鞭草塗之

馬鞭草

指

陽草卷之九

植物名實圖考

古

牡蒿

爾雅蔚牡蒿注蒿之無子者

別錄牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脈滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用

唐本草注云齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄無光澤

本草綱目齊頭蒿三四月生苗其葉扁而本狹末多有禿歧嫩時可茹鹿食九草此其一也秋開細黃花結實大如車前實而內子微細不可見故人以爲無子也

按陸疏蔚牡蒿一名馬新蒿唐本草角蒿卽馬新蒿係重出

今牡蒿各說已具馬新蒿下復退出牡蒿似卽以牡蒿爲馬先蒿而唐注又云齊頭蒿殊不詳晰茲就李時珍所述核之似卽救荒本草之水辣菜姑附圖識以存一說其實牡蒿據爾雅無子之說以駁陸疏則可若謂卽齊頭蒿亦未見確據也

蘆根

別錄蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利陶隱居云當掘取甘辛者其露出及浮水中者並不堪用也

圖經曰蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用謹按爾雅謂蘆根爲葭華郭云蘆葦也葦卽蘆之成者謂蒹爲蘆蘆似葦而細長高數尺江東人呼蘆蕩與荻同音謂茭爲亂亂似葦而小中實江東呼爲烏蘆者或謂之

荻荻至秋堅成卽謂之葍其華皆名茗其萌筍皆名蘢若然所謂蘆葍通一物也所謂蒹今作簾者是也所謂茭人以當薪爨者是也今人罕能別蒹茭與蘆葍又北人以葍與蘆爲二物水傍下濕所生者皆名葍其細不及指人家池圃所植者爲蘆其莖差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葍者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔噦切根水煮頓服一升必效方以童子小便煮服不過三升差其蓬葍主卒得霍亂氣息危急者取一把煮濃汁頓服二升差兼主魚蟹中毒服之尤佳其筍味小苦堪食味如竹筍但極冷耳

補筆談藥中有用蘆根及葦子葦葉者蘆葦之類凡有十數種
蘆葦葭菼葦葦蕙華之類皆是也名字錯亂人莫能分或疑蘆
似葦而小則亂非葦也今人云葭一名華郭璞云亂似葦是一
物按爾雅云菼葦葦蘆蓋一物也名字雖多合之則是一種耳
今世俗只有蘆與荻兩名按詩疏亦將葭菼等衆名判爲二物
曰此物初生爲菼長大爲亂成則名爲葦初生爲葭長大爲蘆
成則名爲葦故先儒釋亂爲葦釋葭爲葦予今詳諸家所釋葭
蘆葦皆蘆也則菼葦葦自當是荻耳詩云葭菼揭揭則葭蘆也
菼荻也又曰葦葦則葦荻也葦蘆也連文言之明非一物又詩

釋文云亂江東人呼之爲烏蘆今吳中烏蘆草乃荻屬也則信
亂爲荻明矣然名南彼苗者葦謂之初生可也秦風曰蒹葭蒼
蒼白露爲霜則散文言之霜降之時亦得謂之葦不必初生若
對文須分大小之名而荻芽似竹筍味甘脆可食莖脆可曲如
鉤馬鞭節花嫩時紫脆老則白如散絲葉色重狹長而白脊一
類小者可爲曲薄其餘唯堪供爨耳蘆芽味稍甜作蔬尤美莖
直花穗生如狐尾褐色葉闊大而色淺此堪作障席筐筥織壁
覆屋絞繩雜用以其柔韌且直故也今藥中所用蘆根葦子皆
葉以此證之蘆葦乃是一物皆當用蘆無用荻理

農桑輯要曰葦四月苗高尺許選好葦連根裁成土墩如椀口
大於下濕地內掘區栽之縱橫相去一二尺欲得力則密藏至冬放火
燒過次年春芽出便成好葦十月後刈之

一法二月熟耕地作壠取根卧裁以土覆之次年成葦

又壓栽法其葦長時掘地成渠將莖祛倒以土壓之露其梢凡
葉向上者亦植令出土下便生根上便成筍與壓桑無異五年
之後根交當隔一尺許斷一鑊卽滋旺矣其花絮沾濕地卽生
蘆然不如根栽者三月初生其心挺出其下本大如箸上銳
而細有黃黑勃著之汗人手把取正白者噉之甜脆

釋草小記葢葦之類見於說文爾雅者凡十餘名爲校錄之則二物也據說文初生曰葵一曰亂一曰鴟得三名自是曰蕎曰蕎則漸長未秀時又得二名也然於葵曰蘋之初生於蕎曰蘋之未秀蘋爲葵之屬字不從艸今以釋葵蕎必从艸之字其爲蘋字之譌無疑然則旣秀而成名之曰蘋合此六名宜爲一物蘋之別於葦者也而說文於蘋字但解以艸出於亂字又解曰八月亂爲葦何也又據說文葭葦之未秀者葦大葭也是葭葦又宜爲一物而別於蘋者也爾雅釋草又以葭蘆連文郭璞注云葦也雖說文於蘆字但有蘆葭齊根之解未及葭葦然當合

爾雅說文足成其義且夏小正傳云蕡未秀爲葵今本蘿或譌蘿秀未
秀爲蘆蘆之爲葦決矣况釋草葵今本蘿亂連文釋言又有葵駢也葵
亂也之文三名互釋已與說文相合則說文蘆字之解宜取爾
雅以足成之蕡至八月成葦亂至八月亦成蕡與葦不異故說
文曰八月亂爲葦殆散文互通非合二物爲一也大車之詩毛
傳謂葵爲蘆之初生孔冲遠疑其以蕡葵爲一物然觀八月蕡
葦傳云亂爲葦蕡爲葦判然不相假借毛氏何嘗合爲一物乎
夏小正七月秀蕡葦傳云未秀則不爲蕡葦秀然後爲蕡葦然
則蕡葦從其華而名之也蕡从葦葦鵠屬有毛角華之象也葦

从韋者从韉省皆以其華之象而因以諧其聲也然則韋未秀爲蘆蘆之言大也言大於菼菼蓋謂韋之體本大於蘆雖其少時已然也蘆未秀爲菼菼色青白狀其少也爾雅云韋醜芳說文云芳韋華又云莉芳也據此則二物之華通名爲芳於韋醜芳下卽云葭華葭華猶云韋華韋芳葭華重文互見以申明之非謂葭又名曰華也下云蒹葭葭蘆菼醜其萌蘿者謂韋醜之萌皆名蘿郭璞云今江東呼蘆筍者是也釋言菼醜也菼醜也毛傳於他詩皆引菼醜之文於大車毳衣如菼獨引菼醜之文故郭璞注釋言云詩曰毳衣如菼菼草色如騫在青白之間然

則菼有駢名著其色也爾雅釋畜蒼白雜毛駢故陸德明音義
於釋言則曰如駢馬色而邢昺之疏亦曰郭云青白之間以釋
畜云蒼白雜毛駢故也駢从馬爾雅注疏釋文皆不譌惟詩傳
詩箋詩疏今皆从鳥蓋後世轉寫之譌宜据爾雅改正之也說
文綯帛駢色也引詩曰毳衣如綯說文以毳衣如帛色之綯毛
傳以毳衣如草色之菼比物雖不同其言如駢馬之色則一也
說文駢馬蒼黑雜毛以菼色青白證之則爾雅蒼白是說文蒼
黑非也案玉篇上接字林廣韻本之唐韻二書肅胎說文並作
蒼白足證唐以前無作蒼黑者至宋人著集韻類篇禮部韻畧

引說文始作蒼黑豈說文至唐宋間轉寫或譌與今考覈既定似當據爾雅正之近有言易學者語余蒼筤竹解同竹箭之有筠蓋初生竹色嫩青猶帶白者震東方也於時爲春故以象之余深然其言今考葢葦因思說卦爲蒼筤竹爲葢葦相連取象益信蒼白二字爲不可易矣玉篇廣韻又收荻字亦作
適並以葢解之陸璣亦云蘆或謂之荻至秋堅成則謂之葢是葢有七名矣郭璞注蒹葭曰似葢而細高數尺江東呼爲蘆音廉釋文葢本今作葢曰似葢似葦則蒹葭又一物矣然从說文葢未秀之解不得別爲一物郭注茭蘆曰似葦而小實中江東呼爲烏蘆

余謂葦葦類有大者中空小者中實二種據以別二物得之詩
白華菅兮白茅束兮菅茅亦葦葦醜然菅柔忍而茅脆其用大
別間嘗考之茅短者不過一二尺秀於三月一莖秀只一條小
兒采食之吾歎呼茅尾讀曰米四月成荼白如雪菅有種小者
五月秀初色紫後漸白每莖末其秀疏散多者數十條取其莖
爲埽彗呼茗帚歎人謂之荻芒江北人謂之芭芒其心之包莖
者只一葉未秀時拔之亦可爲繩作屨大者八月始秀每莖末
十餘節每節爲小莖數十參差旋繞而至於末荼生小莖上其
白如雪其密不可以數計也荼落則莖末禿然無疏散長出數

十條者故不可爲埽彗但可用爲流星桿耳

爆竹類之火引上升於霄者俗呼流

星歛人謂之蘆芒江北人謂之家芒亦呼八月芒

余細察菅秀有莖如稻之

穀殼兩片中含一點蓋卽其子之不實者其白毛徧生穀殼上穀有小柄長一二分亦有白毛

其心之包莖者

拔出剝之有三重未秀皆可取爲繩作屨也夫荻者葦也小而

實中者今菅之小者類焉故謂之荻芒蘆者葦也大而中空者

今管之大者類焉故謂之蘆芒如此則蘆荻別菅之兩種亦別

而茅別於菅亦不待言矣爾雅志杜榮郭璞注今葦草似茅皮可以爲繩索屨屨其爲菅也無疑矣釋文志音亡字亦作芒按

說文芒草端也未有以爲菅者且廣韻音同忙吾歛人呼菅爲

芒者音同盲爲異然後世詩人有芒屨之稱宜卽菅屨也然則字本作𦵹省心而書之成芒耳至音亡音盲或古今方言不同今北人呼之音同忙也爾雅謂𦵹杜榮者榮之言華葦也郭注葦𦵹其實葦云莖頭有葦臺名葦其注山海經曰翁頭下毛余謂菅實皆戴毛所謂荼故曰杜榮謂其戴毛者乃菅之白華也詩言白華菅兮豈謂蘆芒與若荻芒其初華乃紫色也篇中言
菅有三種可補釋茶

二中所未備

說文解字注蒹葦之未秀者蒙上茅秀而及葦之秀與未秀也凡經言葦葦言蒹葭言莫菼皆並舉二物蒹菼葦一也今人所

謂荻也。葭葦一也。今人所謂蘆也。萑一名亂。一名鷩。一名蒹葦。一名華。釋艸曰。葭華蒹蘆每二字爲一物。又曰。葭蘆菼亂亦每二字爲一物。葭蘆卽葭華也。菼亂卽蒹蘆也。夏小正傳毛公許君說皆同。此舍人李巡樊光則云。蘆亂爲一艸。陸璣郭璞則又兼葭菼爲三矣。夏小正七月秀葦葦。傳云未秀則不爲葦。葦秀然後爲萑葦。又曰。葦未秀爲菼。葦未秀爲蘆。按已秀曰葦。未秀則曰蒹。曰亂曰菼也。於此不列葦篆者。以小篆大篆隔之也。从艸兼聲。古恬切七部。

又曰芳葦華也。釋艸曰。葦醜芳顏注漢書云。蒹錐者是也。取其

脫穎秀出故曰芳方言錐謂之鎔音苕因此凡言芳秀者多借
苕字爲之韓詩葦蕘字作蕘釋艸藁茶莽蘆芳皆謂艸之秀
幽風傳曰茶葦苕也夏小正傳曰茶葦葦之秀是與茅秀同名
荼矣葦華大於葦華故葭一名華从艸刀聲徒聊切二部莉芳
也檀弓君臨臣喪以巫祝桃荔執戈注荔苕可埽不祥玉藻
膳於君有葦桃荔注荔焚埽也按許云葦鄭云葦菼者此統言
不別也芳帝花退用穎爲之芳一名荔从艸列聲
貞薛切十五部

本草綱目

卷

附陸疏廣要兼葭

陸璣詩疏蒹水草也堅實牛食之令牛肥強青徐州人謂之蒹
寃州遼東通語也葭一名蘆菼一名亂亂或謂之荻至秋堅成
則謂之萑其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細
揚州人謂之馬尾以今語驗之則蘆亂別草也毛晉廣要按蒹
葭二物相類而異種者也蒹小而中實凡曰萑曰蕘曰菼曰
曰蘆曰華曰芳曰馬尾一物六名皆葭也蓋因其萌也同時其
秀也同時其堅成也亦同時又同產河洲江渚間故詩人往往

並詠如蕡葵揭揭八月萑葦及此篇三詠蒹葭是也陸疏原云
蘆薊別草但李巡認爲一草朱子河廣注云葦蒹葭之屬毛公
大車傳云菼蘆之始生偶爾相混後人遂不能分別耳因分疏
於右以俟讀者採擇焉蒹爾雅釋草云蒹葭郭注云高數尺江
東呼爲蘆鄭注云荻也蘆屬而郭注云菼郭鄭俱云似葦而小
可爲箔實中江東呼爲烏蘆又釋言云菼鷩也菼薊
也郭注云菼草色如青白之間廣雅云邁葦也埤雅云葦卽今之荻一名
蒹蒹葦之未秀者也一名簾高數尺今人以爲簾箔因此爲名
至秋堅成謂之葦說文曰葦之初生一曰薊一曰鷩夏小正云
葦未秀爲菼大車曰毳衣如菼說文曰綈鷩帛也引此毳衣如

葵蓋青白如葵故謂之綉一曰葵元色字說曰葵中赤始生本
黑黑已而赤故謂之葵其根旁行牽揉盤互其形無辨矣而又
強焉故謂之亂亂之始生常以無辨惟其強焉乃能爲亂又鵠
鵠云予所將茶傳曰茶桂茗今女匠亦以桂茶絮巢其色白故
傳曰望而視之欲其茶白也葭爾雅釋草云葭蘆郭注云
郭云卽今蘆也
鄭云亦謂蘆花葦醜芳郭云其類皆有芳秀
邢云葦卽蘆之成者埤雅云葦卽今之
蘆一名葭葭葦之未秀者也一名華夏小正云葦未秀爲蘆先
儒以爲葦如葦而細按禮曰土鼓蕡桴葦籥伊祁氏之樂也葦
管中籥則葦小而葦大矣是故謂之偉其字从葦荀子曰柔從

若蒲葦葦可緯爲簿席又云爾雅曰葦醜芳言其華皆有芳秀今風輒吹揚如雪其聚於地如絮淮南子云季夏令滂人入材葦又按夏小正博雅埤雅爾雅註疏郭璞孫炎葦與陸疏甚合但李巡樊光及字說未免相戾毛傳朱註稍有異同今合考之其始萌曰蘿則蒹葭同名其餘皆異名矣據夏小正云七月秀葦未秀則不爲葦葦秀然後爲葦葦則曰葦曰葦皆堅成後之名也鵩鶲云余所持茶河廣云一葦杭之是也曰邇曰蒹曰荻則葦未秀之名也曰蘆則葦未秀之名曰華曰芳則葦吐花之名也曰菼曰鰥曰艷曰鳥蘆則葦始生之名王風云毳衣如

葵是也曰馬尾則葦始生之名名南云彼苗者葦是也字說雖不足據其莢強而莖弱莢高而莖下二語頗得其形似

植物集成

卷之三

鼠尾草

爾雅勸鼠尾註可以染皁疏可以染皁草也一名勸一名鼠尾本草有白華者有赤華者又一名陵粗

別錄鼠尾草無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主自下赤花者主赤下一名勸一名陵粗生平澤中四月採葉七月採花陰乾陶隱居云田野甚多人採作滋染皁用用療下瘻當濃煮汁令可丸服之今人亦用作飲

圖經鼠尾草舊不載所出州土生平澤中今所在有之惟黔中採爲藥如蒿夏生莖端作四五穗穗若車前花有赤白二色爾

雅謂勦鼠尾注云可以染阜草也四月採葉七月採花陰乾古治痢多用之姚氏云煨煮汁如薄飴飲五合日三赤下用赤花白下用白花差

救荒本草鼠菊本草名鼠尾草一名勦一名陵粗出黔州及所在平澤有之今鈞州新鄭岡野間亦有之苗高一二尺葉似菊花葉微小而肥厚又似野艾蒿葉而脆色淡綠莖端作四五穗穗似車前子穗而極疎細開五瓣淡粉紫色花又有赤白二色花者黔中者苗如蒿採葉燥熟換水浸去苦味再以水淘令淨油鹽調食

按陵疏苔之華苔一名陵時亦名鼠尾似王芻生下濕水中七八月中華紫似金紫草可染阜鬻以沐髮卽黑葉青如藍而多華廣要以爲苔卽陵霄陸疏謬按爾雅旣云勦鼠尾又云苔陵苔自不應合爲一物

本草名實圖考

商實

唐本草商實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫注云一作蕡字人取皮爲索者也別本注云今人作布及索蕡麻也實似大麻子熟結癰腫無頭吞之則爲頭易穴九月十月採實陰乾

圖經曰商實舊不載所出州土今處處有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六尺葉似芋而薄花黃實蒂殼如芻葵中子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根

農政全書綠麻與黃麻同時熟刈作小束池內漚之爛去青皮

取其麻片潔白如雪耐水爛可織爲毯被及作汲綆牛索或作牛衣雨衣草覆等具農家歲歲不可無者又種穄麻法地宜肥濕早者四月種遲者六月亦可繁密處芟去則長

爾雅翼穄枲屬高四五尺或六七尺葉似芋而薄實如大麻子今人績以爲布及造繩索說文云穄枲屬引詩衣錦穄衣或作𦵧又作𦵧音與𦵧畝之𦵧同又云𦵧穄也引詩衣錦𦵧衣示反而字書𦵧或作𦵧然則穄𦵧皆𦵧𦵧一物也今詩用此𦵧字說者引玉藻禪爲祠祠與𦵧同以爲衣裳用錦而上加禪縠焉以爲庶人之妻嫁服則與許氏說異中庸曰衣

錦尚絅惡其文之著也

植物名實圖考

李

蒲公草

唐本草蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及封之立消一名構繩草

圖經曰蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有之
春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花色黃如
金錢斷其莖有白汁出人亦噉之俗呼爲蒲公英語訛爲僕公
醫是也水煮汁以療婦人乳癰又搗以傅瘡皆佳又治惡刺及
狐尿刺摘取根莖白汁塗之惟多塗立差此方出孫思邈千
金方其序云余以貞觀五年七月十五日夜以左手中指背觸

著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟
小豆色嘗聞長者論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦
卽差未十日而平復楊炎南行方亦著其效云

本草衍義曰蒲公草今地丁也四時常有花花罷飛絮絮中有一
子落處卽生所以庭院間有者蓋因風而來也

救荒本草孛孛丁菜又名黃花苗南俗名黃花郎採苗葉燥熟油鹽調

食

野菜譜白鼓釘一名蒲公英四時皆有雖極寒天小而可用采
之熟食

按固始俗呼黃狗 噉其嫩葉採以飼蠶蛾初出者

廣雅疏證雞狗孺哺公也諸書無言哺公草者古今注云燕支
花似蒲公唐本草云蒲公草一名耩耩草孺曹憲音奴侯反耩
集韻音古項切又音居侯切狗孺構耩聲正相近哺公蒲公聲
亦相近其是與但雞狗孺三字不相連疑雞下脫去一字唐本
草注云蒲公草葉似苦苣花黃斷有白汁人皆噉之宋蘇頌圖
經云俗呼爲蒲公英 語訛爲僕公馨寇宗奭衍義云今地丁也
四時常有花花罷飛絮絮中有子落處卽生又案玉篇蒲乃侯
切草也集韻蕩奴侯切草名蓋孺或作蕩

蒲公草

隰草卷之九

木牛之不復聞

七

鱠腸 即旱通鱠

唐本草鱠腸味甘酸平無毒主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傳之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地注苗們旋覆一名蓮子草所在坑渠間有之

日華子排膿止血通小腸長鬚髮傳一切瘡並蠶癟

圖經鱠腸卽蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小蓮房蘇恭云苗似旋覆者是一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之

蓮翹者二種摘其苗皆有汁出須臾而黑故多作烏龜髮藥用
之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思邈
千金月令云益鬚髮變白爲黑金陵草煎方金陵草一秤六月
以後收採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛搗
研新布綾取汁又以紗絹濾令滓盡內通油器鉢盛之日中煎
五日又取生薑一斤綾汁白蜜一斤合和入煎中以柳木籠攪
勿停手令勻調又置日中煎之令如稀餳爲藥成矣每旦日及
午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸
如梧子大依前法酒服三十丸及時多含製爲佳其效甚速

三白草

唐本草三白草味甘辛寒有小毒主水腫腳氣利大小便消痰
破癩除積聚消丁腫生池澤畔

本草拾遺三白草搗絞汁服令人吐逆除胸膈熱痰亦主瘧及
小兒瘡滿按此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔
田三葉白草便秀故謂之三白

酉陽雜俎三白草此草初生不白入夏葉端方白農人候之蒔
田曰三葉白草畢秀矣其葉似薯蕷

本草綱目李時珍曰三白草生田澤畔高二三尺莖如蓼葉如

商陸及青葙四月其顛三葉面上三次變作白色餘葉仍青不變俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實根長白虛軟有節鬚狀如泥菖蒲根造化指南云五月採花及根可製雄黃

按三白草江西湖南多有庸醫以其嫩根白柔遂呼爲百節藕以爲王孫主治誤甚此草葉未白時與王孫極相似唯王孫根長一二尺柔嫩有節宛如初生之藕此草初生根細嫩老則黃硬斷而橫裁之卽生白蒻極易長也

水蓼

唐本草水蓼主蛇毒搗傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬
將脚消氣腫注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍別本注云生
於淺水澤中故名水蓼其葉大於家蓼水接食之勝於蓼子
本草衍義曰水莊子不以多少微炒一半餘一半生用同爲末
好酒調二錢日三服食後夜卧各一服治療癰破者亦治水蓼
大率與水紅相似但枝低爾今造酒取以水浸汁和麴作麴亦
假其辛味

集驗方治腳痛成瘡先剉水蓼煮湯令溫熱得所頻頻淋洗瘡

植物名實圖考

卷之三

乾自安

劉寄奴

唐本草劉寄奴草味苦溫主破血下脹多服令人痢生江南注云莖似艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗葉互生別本注云昔人將此草療金瘡止血爲要藥產後餘疾下血止痛極效

蜀本圖經葉似菊高四五尺花白實黃白作穗蒿之類也今出
越州夏收苗日乾之

圖經曰劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四棱高三三尺已來葉青似柳四月開碎小黃

白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似蒿苣六月七月採苗花子通用也

經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦無痕大凡湯著處先用鹽末摻之護肉不壞然後藥末傅之

救荒本草野生薑本草名劉寄奴生江南其越州滁州皆有之今中牟南沙岡間亦有之莖似艾蒿長二三尺餘葉似菊葉而瘦細又似野艾蒿葉亦瘦細開花白色結實黃白色作細筒子葫兒蓋蒿之類也其子似稗而細苗葉味苦採嫩葉焯熟水浸

泡去苦味油鹽調食

本草綱目李時珍曰劉寄奴一莖直上葉似蕎麥尖長糙澀面深背淡九月莖端分開數枝一攢簇十朵小花白瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦買花之絮其子細長亦如苦買子所云實如黍稗者似與此不同其葉亦非蒿類

按江南所用劉寄奴皆如李時珍說其似艾蒿者別一種

南史宋本紀宋高祖武皇帝諱裕字德輿小字寄奴彭城縣綏興里人姓劉氏雄傑有大度身長七尺六寸嘗伐荻新洲見大蛇長數丈射之傷明日復至洲裏聞有杵臼聲徃覘之見童子

數人皆青衣搗藥問其故曰我王爲劉寄奴所射合散傳之帝曰王神何不殺之答曰劉寄奴王者不死不可殺帝叱之皆散仍收藥而反又經客下邳逆旅會一沙門謂帝曰江表當亂安之者其在君乎帝先患手瘡積年不愈沙門有一黃藥因留與帝既而忽亡帝以黃敷敷之其瘡一傅卽愈寶其餘及所得童子藥每遇金瘡傅之並驗

龍葵

唐本草龍葵味苦寒微甘滑無毒食之解勞少睡去虛熱脾
子療丁腫所在有之註卽關河間謂之苦菜者葉圓花白子若
牛李子生青熟黑但堪煮食不任生噉

圖經龍葵舊云所在有之今近處亦稀惟北方有之北人謂之
苦葵葉圓似排風而無毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排
風子但堪煮食不任生噉其實赤者名赤珠服之變白令黑不
與葱薤同食根亦入藥用今醫以治發背癰疽成瘡者其方龍
葵根一兩剉麝香一分研先搗龍葵根羅爲末入麝香研令勻

塗於瘡上甚善

食療本草主丁腫患火丹瘡和土杵傅之尤良

食醫心鏡主解勞少睡去熱腫龍葵菜作羹粥食之並得

救荒本草天茄苗兒生田野中苗高一尺許莖有線楞葉似姑娘草葉而大又似和尚菜葉卻小開五瓣小白花結子似野葡萄大紫黑色味甜採嫩葉焯熟水浸去邪味淘淨油鹽調食其子熟時亦可摘食採葉傅貼腫毒金瘡拔毒

圖經又曰老鴉眼睛草生江湖間葉如茄子葉故名天茄子

本草綱目李時珍曰龍葵龍珠一類二種也皆處處有之四月

生苗嫩時可食柔滑漸高三三尺莖大如筋似燈籠草而無毛葉似茄葉而小五月以後開小白花五出黃蕊結子正圓大如五味子上有小蒂數顆同綴其味酸中有細子亦如茄子之子但生青熟黑者爲龍葵生青熟赤者爲龍珠功用亦相彷彿蘇頌圖經菜部旣注龍葵復於外類重出老鴉眼睛草蓋不知其卽一物也

按陸疏廣要薄言采芑顏氏家訓云江南別有苦菜葉似酸漿其花或紫或白子大如珠或赤或黑此菜可以釋勞案郭景純注爾雅云此乃藏黃除也今河北謂之龍葵梁世講

禮者以此爲苦菜既無宿根至春子方生耳亦大誤也據此
則龍葵卽穢也

李時珍以
穢爲敗醬