

脈

經



脈經十卷

四部叢刊初編子部

上海商務印書館
縮印元刊本

脉經序

晉太醫令王叔和撰

脉理精微其體難辨絃繁浮沈展轉相類在心易了
 指下難明謂沈為伏則方治求非以緩為遲則危殆
 立至況有數候俱見異病同脉者乎夫醫藥為用性
 命所繫和鵠至妙猶或加思仲景明審亦候形證一
 毫有疑則考校以求驗故傷寒有承氣之戒嘔噦發
 下焦之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述奧而不
 售遂令末學昧於原本乎茲偏見各逞己能致微病
 成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集岐
 伯以來逮于華陀經論要決合為十卷百病根源各
 以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳戴且葛
 呂張所傳異同咸悉載錄誠能留心研窮究其微顯
 則可以比蹤古賢代無天橫矣

天地以生物為心如古之聖賢若夫主論教人
 以勞而濟人之生也得其書而自秘者豈天地
 聖賢之心乎夫治病莫善於明脉注各出於
 王氏脉經之為精家本堂而花不不不秘先以
 針灸遺生多梓行矣今復刻脉經並其書之庶
 以傳當世濟人之道且垂負古人若盡之志云
 晉天曆庚午仲夏達安堂日增誌于廣勤書堂

脉經序目錄

新刊王氏脉經目錄

朝散大夫光祿大夫守尚書右僕射兼中書侍郎王叔和撰 林德等類次

卷第一

脉形狀指下秘訣

平脉早晏法

分別三關境界脉候所主

辨尺寸陰陽榮衛度數

平脉視人大小長短男女逆順法

持脉輕重法

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順

辨肺臟病脉陰陽大法

辨脉陰陽大法

平虛實

從橫逆順伏匿脉

辨發性恐怖雜脉

邊疾短長雜病法

平人得病所起脉

診病將差難已脉

卷第二

平三關陰陽二十四氣脉

平人迎神門氣口前後脉

平三關病候并治宜

平奇經八脉病候八脉為病不在三關

平三關陰陽二十四氣脉

卷第三

肝膽部

心小腸部

脾胃部

肺大腸部

腎膀胱部

卷第四

辨三部九候脉證

平雜病脉

診五藏六腑氣絕證候

診四時相反脉

診脉動止投數鍊數死期年月

診百病死生决

診損至脉

辨三部九候脉證

卷第五

張仲景論脉

扁鵲華佗察聲色要訣

扁鵲診諸反逆死脉要訣

扁鵲陰陽脉法

診三部虛實决死生

卷第六

肝病證

心病證

脾病證

肺病證

腎病證

三焦病證

膽病證

小腸病證

胃病證

大腸病證

膀胱病證

卷第七

病不可發汗證

病發汗以後證

病可吐證

病可下證

病可温證

病可灸證

病可刺證

病可水證

病可發汗證

病不可吐證

病不可下證

病發汗吐下以後證

病不可灸證

病不可刺證

病不可水證

病不可火證

病可火證

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證

重實重虛陰陽相附生死證 熱病十逆死日證

熱病五藏氣絕死日證 熱病至厥死日證

熱病損脉死日證

熱病生死期日證

卷第八

平卒中厥脉證

平陽毒陰毒百合狐惑脉證

平血痺虛勞脉證

平消渴小便利淋脉證

平黃疸寒熱瘧疾脉證

平胃痺心痛短氣實脉證

平驚悸吐下血骨痠血脉證

平肺痿肺癰欬逆上氣喘飲脉證

平癰腫腸癰金瘡侵淫脉證

卷第九

平產後諸病鬱冒中風發熱煩嘔下利證

平帶下絕產無子亡血居經證

平鬱胃五崩漏下經閉不利腹中諸病證

平咽中如有炙腐喜悲熱入血室腹滿證

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證

平婦人病生死證

平小兒雜病證

平瘧濕腸脉證

平霍亂轉筋脉證

平中風歷筋脉證

平水氣黃汗氣分脉證

平腹痛寒疝宿食

平五藏積聚脉證

平嘔噎下痢脉證

平妊娠分別男女將產諸證

卷第十

手檢圖三十一部

目錄畢

新刊王氏脉經卷第一

朝散太李光祿卿醫教劉宗閣檢校護軍臣林億等類次

○脉形狀指下秘決第一 二十四種

浮脉舉之有餘按之不足浮於手

乳脉浮大而軟按之中央空兩邊實一日手下

洪脉極大在指下而大一日浮

滑脉往來前却流利展轉然與數相似一日浮中如有力

數脉去來促急一日息六七至

促脉來去數時一止復來

弦脉舉之無有按之如弓弦狀一日如張弓弦按之

緊脉數如切繩狀一日如轉

沈脉舉之不足按之有餘一日重按

伏脉極重指按之著骨乃得一日平尺微動一日按之不足舉

革脉有似沈伏實大而長微絃革為半

實脉大而長微強按之隱指幅滿然一日沈

微脉極細而軟或欲絕若有若無一日小也一日手下快一日

瀉脉細而逢往來難且散或一止復來短而止或曰散也

細脉小大於微常有但細耳

軟脉極軟而浮細一日按之無有字之有餘一日細小而軟軟

弱脉極軟而沈細按之欲絕得字之無有

虛脉逢大而軟按之不足隱指豁然空

散脉大而散散者氣實血虛有表裏

緩脉去來亦逢小駛於遲一日浮大而軟

遲脉呼吸三至去來極遲一日率之不足按之虛平

結脉往來緩時一止復來一日按之虛平率之無有

代脉來數中止不能自還因而復動脉結者生代者死

動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖陽論云陰陽

浮與乳相類

滑與數相類

沈與伏相類

軟與弱相類

平脉早晏法第二

黃帝問曰夫診脉常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動

陽氣未散飲食未進經脉未盛經脉調均調勻氣血未亂故

乃可診過此非也千金同素問大切脉動靜而視精明察五色

觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脉候所主第三

從魚際至高骨其骨自高却行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰

尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關為界陽出三

分陰入三分故曰三陰三陽陽生於尺動於寸陰生於寸動於

尺寸主射上焦出頭及皮毛竟手關主射中焦腹及胃尺主射

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脉獨取寸口以法五藏六腑死生吉凶之候

者何謂也然寸口者脉之大會手太陰之動脉也人一呼脉行

三寸一吸脉行三十呼吸定息脉行六寸人一日一夜九一萬三千五百息脉行五十度周於身瀉水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度為一周也時故五十度而復會於手太陽太陰者寸口也即五藏六腑之所始終故法取於寸口

脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之大會要也從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸為尺分寸為寸故陰得尺內一寸陽得寸內九分寸終始一寸九分故曰尺寸也

脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及速上魚為溢為外關內格此陰乘之脉也關之後者陰之動也脉當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入尺為覆為內關外格此陽乘之脉故曰覆溢是真藏之脉也人不病自死

平脉視人大小長短男女逆順法第五

九診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短皆如其人形性者則言反之者則為逆也脉三部大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒四五歲脉呼吸八至細數者言千金寶云人大而脉細人細而脉大人氣而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉躁人壯而脉細人虛而脉大此皆為逆逆則難治反此為順易治婦人脉常欲弱於丈夫小兒四五歲者脉自脈疾呼吸八至也男左大為順女右大為順肥人脈沈瘦人脈浮

持脉輕重法第六

脉有輕重何謂也然初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部也菽者小豆言脉輕如三小豆之重也如六菽之重與血脉也作皮毛之間者肺氣所行故言肺部也

相得者心部也心主血脉次於肺如六豆之重如九菽之重與肌肉相得者脾部也脾在中中央主肌肉故如十二菽之重與筋平者肝部也肝筋又在脾按之至骨舉之來疾者腎部也腎主骨其筋又在脾按之至骨舉之來疾者腎部也脉沈至骨故曰輕重也

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

脉法讚云肝心出左肺肺出右腎與命門俱出尺部魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男右大順女關前一分人命之主左為人迎右為氣口神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈諸經損減各隨其部察按陰陽誰與先後千金云三後誰陰病治官陽病治府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入病愈

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太陽為表裏以小腸合為府合於上焦名曰神庭在龜尾下五分

肝部在左手關上是也足厥陰經也與足少陽為表裏以膽合為府合於中焦名曰胞門一作少陽在太倉左右三寸

腎部在左手關後尺中是也足少陰經也與足太陽為表裏以膀胱合為府合於下焦在關元左

肺部在右手關前寸口是也手太陽經也與手陽明為表裏以肺合為府合於上焦名曰膻中在雲門

脾部在右手關上是也足太陰經也與足陽明為表裏以胃合為府合於中焦脾胃之間名曰章門在季脇前一寸半

腎部在右手關後尺中是也足少陰經也與足太陽為表裏以膀胱合為府合於下焦在關元右左腎腎右為子戶名曰三焦

辨藏腑病脉陰陽大法第八

脉何以知藏腑之病也然數者腑也遲者藏也數即有熱遲即

生寒諸陽為熱諸陰為寒故別知藏腑之病也辨者陽故其脈數陰行疾病則遲

脈來浮大者此為肺脈也脈來沈滑如石腎脈也脈來如弓弦者肝脈也脈來疾去遲心脈也脈來當見而不見為病病有深淺但當知如何受邪

辨脉陰陽大法第九

脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脉在中浮者陽也沈者陰也故曰陰陽

心脾俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短澁者肺也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也按之要舉指來實者腎也脾者中州故其脉在中千金翼云通篇是陰陽之脉也脉有陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沈之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也

經言脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陰二陽一陰三陰如此言之寸口有六脉俱動耶然經言如此者非有六脉俱動也謂浮沈長短滑澁也浮者陽也滑者陽也長者陽也沈者陰也澁者陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脉來沈而滑也一陰二陽者謂脉來沈滑而長也一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脉來浮而澁也一陽二陰者謂脉來長而沈澁也一陽三陰者謂脉來沈澁而短時一浮也各以其經所在名病之逆順也凡脉大為陽浮為陽數為陽動為陽長為陽滑為陽沈為陰澁為陰弱為陰絀為陰短為陰微為陰是為二陰三陽也陽病見陰脉者反也主

死陰病見陽脉者順也主生關前為陽關後為陰傷數則吐血陰微則不利陽絛則頭痛陰絛則腹痛陽微則發汗陰微則自下陽數口生瘡陰數加微必寒而煩撓不得眠也陰浮陽則強陽附陰則癩得陽為腑得陰為藏無陽則厥無陰則嘔陽微則不能呼陰微則不能吸呼吸不足膏中短氣依此陰陽以察病也

寸口脉浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱寸口脉沈細者名曰陽中之陰病苦傷悲不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉

尺脉沈細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久立陰氣衰小便餘澀陰下濕痿

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然

尺脉牢而長關上無有此為陰干陽其人苦兩脛重赤腹引腰痛寸口脉壯大尺中無有此為陽干陰其人苦腰背痛陰中傷足脛寒夫風傷陽寒傷陰陽病順陰陰病逆陽陽病易治陰病難治在腸胃之間以藥和之若在經脉之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診之虛實脉之虛實者脉來要者為虛牢者為實病之虛實者出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實診之虛實者痿者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛故曰虛實也問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所謂

重實者言大熱病氣熱脉滿是謂重實

問曰經絡俱實如何以治之答曰經絡皆實是寸脉急而尺緩也當俱治之故曰滑則順瀆則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久

從橫逆順伏匿脉第十一

問曰脉有相乘有從仲景從字有橫有逆有順何謂也師曰水行乘火金行乘木名曰從火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順

經言脉有伏匿者伏匿於何藏而言伏匿也然謂陰陽更相乘更相伏也脉居陰部反見陽脉者為陽乘陰也脉雖時沈澀而短此陽中伏陰脉若陽部反見陰脉者為陰乘陽也脉雖時浮滑而長此為陰中伏陽也重陰者顯重陽者狂脫陽者見鬼脫陰者目盲

辨災恠恐怖雜脉第十二

問曰脉有殘賊何謂師曰脉有絃有滑有澀有浮有沈此六脉為殘賊能與諸經作病

問曰管為人所難繫脉何所從而來師曰假令亡汗若吐肺中寒故令緊假令熱者坐飲冷水故令緊假令下利者以胃中虛冷故令緊也

問曰翕奄沈名曰滑何謂師曰沈為純陰翕為三陽陰陽和合故脉滑也

問曰脉有災恠何謂師曰假令人病脉得太陽脉與病形證相應因為作湯比還遂湯之時病者因反大吐若下痢仲景利病腹中痛因問言我前來脉時不見此證今反變異故是名為災

恠因問何緣作此吐瀉答曰或有先服藥本發作故為災恠也

問曰人病恐怖其脉何類師曰形脉如循絲索然其面白脫色問曰人媿者其脉何等類師曰其脉自浮而弱面形乍白乍赤問曰人不飲其脉何類師曰其脉自澀而唇口乾燥也言遲者風也搖頭言者其裏痛也行遲者其表強也坐而伏者短氣也坐而下一勝者必腰痛裏實護腹如懷卵者必心痛師持脉病人欠者無病也脉之因伸者無病也者病也假令向蹙卧關師到不驚起而目眦視云云面仰視者云云三止脉之咽唾此為詐病假令脉自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數千百處乃愈

遲疾短長雜病法第十三

黃帝問曰全關胃氣手少陽二焦四時五行脉法夫人言脉有二陰三陽知病存亡脉外以知內尺寸大小頭關之歧伯曰寸口之中外別浮沈前後左右虛實死生之要皆見寸口之中脉從前來者為實邪從後來者為虛邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病得一作者為正邪外結者病癰腫內結者病疝瘕也聞來而急者病正在心澀氣也脉來疾者為風也脉來滑者為病食也脉來滑躁者病有熱也脉來澀者為病寒濕也脉逆順之道不與眾殊

師曰夫呼者脉之頭也初持之來疾去遲此為出疾入遲為內虛外實初持脉來遲去疾此為出遲入疾為內實外虛也

脉數則在府遲則在藏脉長而弦病在肝編論云肝病脉滑脉數則在心編論云心大而脉下堅上虛病在脾編論云脾病脉滑而微浮病在肺編論云肺大而堅病在腎編論云腎小而脈滑者多血少氣脉澀者少血多氣脉大者血氣俱多又云脉來大

者多血少氣脉澀者少血多氣脉大者血氣俱多又云脉來大

而堅者血氣俱實脈小者血氣俱少又云脈來細而微者血氣俱虛沈細清疾者熱遲緊者寒又云俱熱則清疾為熱陰沈細為寒脈盛滑緊者病在外熱脈小實而緊者病在內冷脈小弱而澁者謂之久病脈清浮而疾者謂之新病脈浮滑其人外熱風走刺有欲難治脈沈而緊上焦有熱下寒得冷即便下脈沈而細下焦有寒小便數時苦絞痛下利重脈浮緊且清直者外熱內冷不得大小便脈洪大緊急病速進在外苦頭發熱癰腫脈細小緊急病速進在中寒為疝瘕積聚腹中刺痛脈沈重而真前絕者病血在腸間脈沈重而中散者因寒食成癥脈真前而中散絕者病消渴一云病後轉而沈重者氣微陽在背中脈右轉出不至寸口者內有肉癥脈累累如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去脈累累中止不至寸口轉者結熱在小腸腹中伏留不去脈直前左右彈者病在血脈中脈血也脈後而左右彈者病在筋骨中也脈大後小即頭痛目眩脈前小後大即骨痛短氣上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈雖困無所苦夫脈若血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少太素細黃則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊結緯緯其去如絃絕者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而絃急者病在內浮而洪大者病在外脈實者病在內脈虛者病在外在上為表在下為裏浮為在表沈為在裏

平人得病所起第十四

何以知春得病無肝脈也無心脈夏得病無肺脈秋得病無腎

脈冬得病無脾脈四季之月得病

假令肝病者西行若食雞肉得之當以秋時發得病以庚辛日也家有腥死女子見之以明要為災不者若感金銀物得之

假令脾病東行若食雉兔肉及諸木果實得之不者當以春時發得病以甲乙日也

假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬癸日也

假令肺病南行若食馬肉及麀鹿肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也

假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當以長夏時發得病以戊己日也

假令得王麻當於縣官家得之

假令得相麻當於嫁娶家得之或相慶賀家得之

假令得胎麻當於產乳家得之

假令得囚麻當於囚徒家得之

假令得休麻其人素有宿病不治自愈

假令得死麻當於死喪家感傷得之

診病將差難已脈第十五

問曰假令病人欲差脈而知愈何以別之

何以知人夏月得病諸陽入陰也

何以知人食飲中毒浮之無陽微細之不可知也但有陰脈來疾去疾此相為水氣之毒也脈遲者食乾物得之

師曰寸關尺大小遲疾浮沈同等雖有寒熱不解者此脉陰陽為平復當自愈
人病其寸口之脉與人迎之脉大小及浮沈等者病難已

新刊王氏脉經卷第一

新刊王氏脉經卷第二

朝散李光遠知五藏別經開經院護軍臣林億等類次

平三關陰陽二十四氣脉第一

平人迎神門氣口前後脉第一

平三關病候并治宜第一

平奇經八脉病第四經故以繫此卷之末

平三關陰陽二十四氣脉第一

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦臍痺小腹中有死瘕王王字月本王字作五即冷上搶心刺手心主經治陰心主在掌後橫理中即太陵

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急痺一作痛小腸有熱沉也小便赤黃刺手太陽經治陽一作外太陽在手小指外側本節陷中即復翳

左手關前寸口陰絕者無心脉也苦心下毒痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手太陽經治陽

左手關前寸口陰實者心實也苦心下有水氣憂急發之刺手心主經治陰

左手關上陽絕者無膽脉也若膝疼口中苦眯目善畏如見鬼狀多驚少力刺足厥陰經治陰在足大指間即大指或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也苦腹中實不安身軀習習也刺足少陽經治陽在足上第三指本節後一寸第一指常不小指次指即陽沈也

左手關上陰絕者無肝脉也苦癢遍滿難言骨上有邪氣善吐吐刺足少陽經治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足厥陰經治陰
左手關後尺中陽絕者無勝腕脈也苦逆冷婦人月使不調王
月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動
脈即太陰

左手關後尺中陽實者勝腕實也苦逆冷脊下有邪氣相引痛
刺足太陽經治陽在足小指外側本節後陷中即束骨

左手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足下熱兩臂裏急精氣竭
少勞倦所致刺足太陽經治陽

左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眩暈耳聾悵
悵善鳴刺足少陰經治陰

右手關前寸口陽絕者無太陽脈也苦少氣心下有水氣立秋
節即效刺手太陰經治陰在魚際間即太淵

右手關前寸口陽實者太陽實也苦腸中切痛如錘刀所刺無
休息時刺手陽明經治陽在手腕中即陽谿

右手關前寸口陰絕者無肺脈也苦短氣欬逆喉中塞噎逆刺
手陽明經治陽

右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胸中滿彭彭與有相引
刺手太陰經治陰

右手關上陽絕者無胃脈也苦吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰
經治陰在足大指本節後一寸即也

右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏一作福不思食物得食不
能消刺足陽明經治陽在足上動脈即衝陽

右手關上陰絕者無脾脈也苦少氣下利腹滿身重四肢不飲
動善嘔刺足陽明經治陽

右手關上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便難刺足太
陰經治陰

右手關後尺中陽絕者無手少陰脈也苦足逆寒絕產帶下無子
陰中寒刺足少陰經治陰

右手關後尺中陽實者勝腕實也苦少腹滿引腰痛刺足太陽
經治陽

右手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足逆冷上搶臂痛夢入水
見鬼善厭寐黑色物來搏人上刺足太陽經治陽

右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰痛內寒熱刺足少
陰經治陰

右脈二十四氣事
平人迎神門氣口前後脈第二
心實

左手寸口人迎以前脈陰實者主厥陰經也病苦閉大便不利
腹滿四肢重身熱苦胃脹刺三里

心虛

左手寸口人迎以前脈陰虛者主厥陰經也病苦悸恐不樂心
腹痛難以言心如寒狀恍惚

小腸實

左手寸口人迎以前脈陽實者主太陽經也病苦身熱熱來去
汗出不出一作汗而煩心中滿身重口中生瘡

小腸虛

左手寸口人迎以前脈陽虛者主太陽經也病苦顛際偏頭痛
耳煩痛

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與太陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥以胃氣不轉水穀實也

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與太陽經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢寒腸澼

肝實

左手關上脉陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自忿忿如怒狀

肝虛

左手關上脉陰虛者足厥陰經也病苦脅下敗寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰痛

膽實

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛酒惡寒脇痛

膽虛

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖覺坐不能起僵仆目黃矢精疏眵

肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消

肝膽俱虛

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚

腎實

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦膀胱脹閉少腹與腰脊相引痛

腎虛

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩噤乾骨脇時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背攣急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四肢黑耳聾

膀胱實

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛足腫不可以按地

膀胱虛

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也中痛引腰脊不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦脊攣反折戴眼氣上搶心脊痛不能自反側

肺實

右手寸口氣口以前脉陰實者手太陽經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲區狀

肺虛

右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陽經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲區狀

肺虛

右手寸口氣口以前脈陰虛者手足太陰經也病苦少氣不足以息噤乾不朝津液

大腸實

右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腹滿喜喘效面赤身熱喉咽一本作咽中如核狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脈陰虛者手陽明經也病苦胃中喘腸鳴虛渴唇口乾目急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手足太陰與陽明經俱實虛病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脣吻不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手足太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嚕嚕時晝見光明情中不樂或如恐怖

脾胃實

右手關上脈陰實者足太陰經也病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不得卧

脾胃虛

右手關上脈陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆舊亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴

胃實

右手關上脈陽實者足陽明經也病苦腹中堅痛而熱十金作痛汗不出如溫瘧唇口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛

胃虛

右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧惡寒洒洒目急腹中痛虛鳴耳虛作時寒時熱唇口乾面目浮腫

脾胃俱實

右手關上脈陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅脘脇下痛胃氣不轉大便難時反泄利腹中痛上衝肺肝動五藏立喘鳴多驚身熱汗不出喉痺精少

脾胃俱虛

右手關上脈陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已

腎實

右手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦痺身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩

腎虛

右手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦足脛小弱惡風寒脈代絕時不至足寒上重下輕行不可以按地少腹脹滿上脘脅痛引肋下

膀胱實

右手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦轉胞不得小便頭眩痛煩滿脊背強

膀胱虛

右手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也病苦肌肉振動脚中筋急耳聾忽不聞惡風颺颺作聲

腎膀胱俱實

右手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也
病苦瀕疾頭重與目相引痛厥欲起走反服大風多汗

腎膀胱俱虛

右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也
病苦心痛者重不自收暴反出時時苦澀泄寒中泄腎心俱
痛○一說云腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右
腎合三焦

平三關病候并治宜第三

寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風池風府向
火灸身摩治風骨擾令汗出

寸口脉緊苦頭痛骨肉疼是傷寒宜服麻黃湯發汗針眉衝顛
顛摩治傷寒膏

寸口脉微苦寒為飢宜服五味子湯摩柴薑膏令汗出

寸口脉數即為吐以有熱在胃管薑膏中宜服藥吐之及針胃
管服除熱湯若是傷寒七八日至十日熱在中煩滿渴者宜服
知母湯

寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄熨之摩
以風膏灸諸治風穴

寸口脉滑陽實胃中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨關瀉之

寸口脉絃心下幅幅微頭痛心下有水氣宜服甘遂圓針期門
瀉之

寸口脉弱陽氣虛自汗出而短氣宜服茯苓湯內補散適飲食
消息勿極勞針胃管補之

寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針三里

補之三里一
作胃管

寸口脉孔吐血微孔者衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黃土
湯灸臍中

寸口脉伏胃中逆氣噎塞不通是胃中冷氣衝心宜服前
胡湯大三建圓針巨關上管灸臍中

寸口脉沉胃中引脅痛胃中有水氣宜服澤漆湯針巨關瀉之
寸口脉濡陽氣弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯著預圓內
補散牡蠣散并粉針太衝補之

寸口脉逆上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯調
和飲食以暖之

寸口脉實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛即生寒在脾胃食不消
化有熱即宜服竹葉湯葛根湯有寒宜服柴薑圓生薑湯

寸口脉細發熱吸吐宜服薑龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗
湯灸中府

寸口脉洪大胃脇滿宜服生薑湯白薇圓亦可紫苑湯下之針
上管期門章門

右上部寸口十七條

關脉浮腹滿不欲食浮為虛滿宜服平胃圓茯苓湯生薑前胡
湯針胃管先瀉後補之

關脉緊心下苦滿急痛脉緊者為實宜服柴薑圓歸湯又大黃
湯兩治之良針巨關下管瀉之千金云服柴薑圓歸湯

關脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子圓針巨關
補之

關脉數胃中有客熱宜服知母圓除熱湯針巨關上管瀉之

關脈緩其人欲食此胃氣不調脾胃不足宜服平胃圓補脾湯針章門補之

關脈滑胃中有熱滑為熱實以氣滿故不欲食食即吐逆宜服紫莞湯下之大平胃圓針胃管瀉之千金云宜服朴消麻黃湯平胃圓

關脈絀胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故爾宜服茱萸湯溫調飲食針胃管補之

關脈弱胃氣虛胃中有寒熱脈弱為虛熱作病其說至有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針胃管補之

關脈瀉血氣逆冷脈瀉為血虛以中焦有微熱宜服乾地黃湯內補散針足大衝上補之

關脈孔大便去血數斗者以腸輸傷故也宜服生地黃并生疴皮湯灸臍輸若重下去血者針關元甚者宜服龍骨圓必愈

關脈伏中焦有水氣滯泄宜服水銀圓針關元利小便澹泄便止

關脈沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇伏苓圓附子湯針胃管補之

關脈濡苦虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎圓針關元補之

關脈遲胃中寒宜服桂枝圓茱萸湯針胃管補之

關脈實胃中痛宜服梔子湯茱萸烏頭圓針胃管補之

關脈牢脾胃氣寒盛熱即腹滿響響宜服紫苑圓瀉脾圓針灸胃管瀉之

右中部關脈十八條

尺脈浮下熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散針橫骨關元瀉之

尺脈繁腫下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補之

尺脈微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯本更有針氣海

尺脈數熱寒腫下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚散針橫骨瀉之

尺脈緩腳弱下腫小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥散針橫骨瀉之

尺脈滑血氣實婦人經脈不利男子尿血宜服朴消煎大黃湯下去經血鐵關元瀉之

尺脈絀小腹疼小腰及脚中拘急宜服建中湯當歸湯針血海瀉之

尺脈弱陽氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃湯伏苓湯針關元補之

尺脈瀉足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足大衝補之

尺脈孔下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯交丹田關元亦針補之

尺脈伏小腹痛癥疝水穀不化宜服大平胃圓桂枝圓針關元補之指橫骨圓云云

尺脈沈腰背痛宜服腎氣圓針章門補之

右下部關脈八條

尺脈瀉苦小便難千金云脚不收風痺宜服瞿麥湯白魚散針關元瀉之

尺脈遲下焦有寒宜服桂枝圓針氣海關元補之

尺脈實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩以利大便

針關元補之止小便

尺脉牢腹滿陰中急宜服葶藶子茱萸圓針丹田關元中極

平奇經八脉病第四

脉有奇經八脉者何謂也然有陽維陰維有陽蹻陰蹻有衝有督有任有帶之脉凡此八脉者皆不拘於經故曰奇經八脉也經有十二絡有十五九二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖設溝渠通利水道以備不虞天雨降下溝渠溢滿滂沛妄行當此之時聖人不能復圖也此絡脉流溢諸經不能復拘也

奇經八脉者既不拘於十二經管何起何繫也然陽維者起於諸陽之會陰維者起於諸陰之交陽維陰維者維絡於身溢蓄不能環流澆灌諸經者也陽蹻者起於跟中循外踝而上行入風池陰蹻者亦起於跟中循內踝而上行至咽喉交會衝腦衝脉者起於關元循腹裏直上至咽喉中一云衝脉者起於氣衝而散也督脉者起於下極之輸並於脊裏循脊上至風府衝脉者陰脉之海也督脉者陽脉之海也任脉者起於胞門子戶夾臍上行至胸中一云任脉者起於中脘帶脉者起於季肋季肋細作廻身一周此八者皆不繫於十二經故曰奇經八脉者也奇經之為病何如然陽維維於陽陰維維於陰陰陽不能相維張然失志空容謂細作不能自收持然者其人驚即細自收持即失志陽維為病苦寒熱陰維為病苦心痛謂細作衝脉為病心痛也謂細作陰蹻為病陽蹻而陰急謂細作陽蹻而陽急謂細作以上急陽蹻為病陰蹻而陽急謂細作以上急陰蹻為病陽蹻而陽急謂細作以上急陽蹻為病陰蹻而陽急謂細作以上急陰蹻為病陽蹻而陽急謂細作以上急

強而厥謂脈在背病即其任之為病其內者結男子為七疝女子為瘕聚其病從七病而來帶之為病苦腰痛腰脊容謂細作若生水中狀即其脈從故令腰容也此奇經八脉之為病也

診得陽維脉浮者雙起目眩陽盛實苦有息酒酒如寒

診得陰維脉沈大而實者苦背脊中痛脇下支滿心痛

診得陰維如實珠者男子兩脇實腰中痛女子陰中痛如有瘡狀

診得帶脉左右連臍腰脊痛衝陰股也

兩手脉浮之俱有陽沈之俱有陰陰陽皆實證者此為衝督之脉也衝督之脉者十二經之道路也衝督用事則十二經不復

朝於寸口其人皆苦悵惚狂疑不者必當由豫有兩心也兩手陽脉浮而細微綿綿不可知俱有陰脉亦復細綿綿此為陰蹻

陽蹻之脉也此家曾有病鬼魅風死苦悵惚亡人為禍也

診得陽蹻拘急陰蹻病緩

尺寸俱浮直上直下此為督脉腰脊強病不得悅仰大人癩病

小入風痲疾

脉來中央浮直上下痛者督脉也動苦膝自膝寒大人癩小兒

痲也灸頂上三圓正當頂上

尺寸脉俱牢此直上直下此為衝脉管中有寒疝也

脉來中央堅實徑至關者衝脉也動苦少腹痛上搶心有瘕疝

絕孕遺失溺脇支煩煩也橫寸口邊九九此為任脉苦腹中有

氣如指上搶心不得悅仰拘急脉來緊細實長至關者任脉也

動苦少腹繞臍下引橫骨陰中切痛取臍下二寸

新刊王氏脉經卷第一

新刊王氏脈經卷第三

朝襲奔茲嶽如直松關判登閣檢院 護軍 臣林億等類次

肝膽部第一

心小腸部第二

脾胃部第二

肺大腸部第四

腎膀胱部第五

肝膽部第一

肝象不肝於木與膽合為府膽為清其經足厥陰肝脈與足少陽為表裏肝陽故為表裏其脈絃絃肝脈之其相冬三月水相木王春三月發夏三月夏火王囚季夏六月王囚囚死秋二月木死其王日甲乙王時平日日出也並金其困日戊己困時食時日昃也並土其死日庚辛死時晡時日入也並其神魂所藏者其主色其養筋肝氣所劫其候目肝候則目赤其聲呼其色青其臭臊其液泣肝其味酸其宜苦若火其惡辛味

肝俞在背第九椎募在期門上兩乳下膽俞在背第十椎募在日月穴在期門下五分

右新撰並出素問諸經各人撰集或混雜相涉煩而難了今抄要分別五臟各為一部

冬至之後得甲子少陽起於夜半肝家王又至者陰陽更始之數也少陽騰也騰者木也生於水故起夜半肝者東方木肝為其氣常微少故言少陽云夜半子者水也肝者東方木肝為其氣常微少故言少陽云夜半子者水也肝者東方木肝為其氣常微少故言少陽云夜半子者水也肝者東方木肝為其氣常微少故言少陽云夜半子者水也

世不止不可下下之而地春以胃氣為本不可犯也胃者土也利不參故言屬虛通利也胃者土也胃者土也利不參故言屬虛通利也胃者土也胃者土也利不參故言屬虛通利也

右四時經

黃帝問曰春脈如絃何如而絃岐伯曰春脈肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長故曰絃反此者病黃帝曰何如而反岐伯曰其氣來實而強此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中黃帝曰春脈太過與不及其病皆何如岐伯曰太過則令人善忘性怒忽眩冒而癩疾不及則令人省脇痛引背下則兩脇脹滿黃帝曰善肝脈來濡弱招招如揭竿末梢曰平之絃如揭竿末梢曰平以胃氣為本肝脈來盈實而滑如循長竿曰肝病肝脈來急而益勁如新張弓弦曰肝死

真肝脈至中外急如循刀刃者貴然難云然如按琴瑟絃色青白不澤毛折乃死

春胃微絃曰平絃多胃少曰肝病但絃無胃曰死有胃而毛曰

秋病毛甚曰全病

肝藏血血舍冤悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不敢正當

人其精不守令人陰縮陰縮而筋攣兩脇骨不舉毛悴色天

死于秋

春肝木王其脈絃細而長名曰平脈也反得浮濇而短者千金而是肺之乘肝金之刻木為賊邪大逆十死不治月年數至反得洪大而散者千金是心之乘肝子之扶母為實邪雖病自愈反得沈濡而滑者其腎之乘肝母之歸子為虛邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為微邪雖病

亭喘息則安轉孔穴者諸臟之禁并轉治其順且液脾之津液
得還者其根殊肝心為母子肝者則心刺腎為安聲其味為鹹
脾主言聲為其子助於倚坐母敗溼臭如腥金為水母而歸水
脾故言安生鹹骨味也相刻賊傷 土得其子則成為山金得其
剋故敗宅溼臭而腥故云然也 土得其子則成為山金得其
母名曰丘矣

右四時經

黃帝曰四時之序逆順之變異也然脾脈獨何主岐伯曰脾者
土也孤藏以灌四傍者也曰然則脾善惡可得見乎曰善者不
可見惡者可見曰惡者何如曰其來如水之流者此謂太過病
在外如鳥之喙此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不舉
其不及則令人九竅壅塞不通名曰重強

脾脈來而和柔相離如雞足踐地曰平長夏以胃氣為本脾脈
來實而盈數如雞舉足曰脾病脾脈來堅兌如鳥之喙如鳥之
距如筍之滿如水之溜曰脾死真脾脈至弱而下踈乍散一作數
色青黃不澤毛折乃死

長夏胃微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死濡弱有
石曰冬病石甚曰今病

脾藏榮榮舍意憂憂不解則傷意傷則悶亂四股不舉毛悴
色夭死于春

六月季夏建未坤未之開土之位脾王之時其脈大阿阿而緩
名曰平脈反得絃細而長者是肝之乘脾木之刻土為賊邪大
逆于死不治反得浮一作金濇而短者是肺之乘脾子之扶母

為實邪雖病自愈反得洪大而散者一作金是心之乘脾母
之歸子為虛邪雖病易治反得沈瀉而滑者腎之乘脾水之陵

土為微邪雖病即差

脾脈甚長而弱一作長來疎去數垂至曰平三至曰離經病
四至脫精五至死六至命盡足太陰脈也脾脈急其為癰癧微
急為脾中滿食飲入而還出後沫沫緩甚為痿厥微緩為風痲
四肢不用心慧然若無病大甚為擊小微大為痞氣暴大膿血
在腸胃之外小甚為寒熱微小為消痺滑甚為積癥微滑為蟲
毒蛇腸鳴熱瀉甚為腸積微瀉為內潰多下膿血也足太陰氣
絕則脈不營其口脣口脣者肌肉之本也脈不營則肌肉濡肌
肉濡則人中滿人中滿則脣反脣及者肉先死甲為乙死木勝
土也

脾死藏浮之脈大緩一作堅按之中如覆杯絮絮狀如播者死云
脾死藏浮之脈大緩一作堅按之中如覆杯絮絮狀如播者死云
如肉肉

右素問鍼經張仲景

肺大腸部第四

肺象金與大腸合為府大腸為傳其經手太陰肺大陰與手陽
明為表裏手陽明大其脈浮大形也其相季夏六月季夏土
其王秋三月廢冬三月囚春三月死夏三月夏六月其王日庚
辛王時晡時日入其困日甲乙困時平旦日出其死日丙丁死
時禺中日中其神魄其主聲其養皮毛其候鼻其聲其色白
其臭腥其液涕其味辛其宜鹹其惡苦肺俞在背第三椎或五
也補寡在中府大腸俞在背第十六椎在天樞傍各
半寸

右新撰

肺者西方金萬物之所終命性剛故西方割斷萬宿葉落柯

善其技條其仇然獨在其脈為微浮毛衝氣遂善其技者善其之
樂得秋隨風則本但有秋微如毛也衝氣數則在上遂則在
在此時陽氣則運陽為虛微如毛也衝氣數則在上遂則在
下故名曰毛陰陽秋節而昇轉在陽位故一時數而在上也此
時陰陽用事陽即下藏其氣則陽當陷而不陷陰當昇而不昇為
反遷是以肺脈數微如毛也陽當陷而不陷陰當昇而不昇為
邪所中陰陽交易則不時定一陽中邪則捲陰中邪則緊捲
則惡寒緊則為慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃來出者
其人拘捲也緊者脈緊也此謂初中風寒之時脈緊其人則寒
寒止而脈便微弱弱則其人發熱數則則脈浮浮者瘧解人則寒
也日中且發暮中暮發言瘧發皆隨其初瘧有遠近脈有淺疾
周有度數行有漏刻漏謂人五藏肝心脾肺腎也心在膻上
在膻下則則其氣入是為遠也心為陰其脈遲數則謂肺之
長短周身行諸榮衛之行也行陰陽各二十五度為一周也以
百刻也邊在上傷毛采數在下傷下焦有惡則見有善則
匿來也人之皮毛肺氣所行下焦在膻下陰之所治也其脈應
遲今反數故言傷下焦中脾也其平善者陽氣下陷陰氣則
溫言陽氣下陷陽反在下陰反在巔故名曰長而且留陰陽交
時欲入血脈和平言可長留第一時

右四時經

黃帝問曰秋脈如浮何如而浮岐伯對曰秋脈肺也西方金也
萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮其氣來急去散故曰
浮反此者病黃帝曰何如而反岐伯曰其氣來毛而中央堅兩
傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中黃帝
曰秋脈太過與不及其病何如岐伯曰太過則令人氣逆而背
痛溫溫內細溫溫然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血
下聞病音
肺脈來厭厭毒毒如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本難經云平脈

循榆莢曰春平秋肅謂如肺脈來不上不下如循雞羽曰肺病
重蓋按之益大曰秋平脈脈來來不上不下如循雞羽曰肺病
不字吳源無肺脈來如物之浮如風吹毛曰肺死
胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有絃曰春
病絃甚曰今病

肺藏氣氣含魄善樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮
華焦毛悴也夭死于夏秋金肺王其脈浮作微瀉而短曰平
脈反得洪大而散者大瀉是心之乘肺火之刻金為賊邪
大逆下死不治一本云四日丙丁反得沈濡而滑者是腎之乘肺
子之扶母為突邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘肺母之
歸子為虛邪雖病易治反得絃細而長者是肝之乘肺木之陵
金為虛邪雖病即差肺脈來汎汎輕如微風吹鳥背上毛再至
曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡手太陰脈也
肺脈急甚為癩疾微急為肺寒熱急墮欬唾血引腰背骨苦鼻
息肉不通緩甚為多汗微緩為痿偏風偏風頭以下汗出不可
止大甚為腫微汗為肺痺引骨背起腰內小甚為癢泄微小
為消瘰滑甚為息貫上氣微滑為上下出血瀉甚為嘔血微瀉
為鼠瘻在頸支掖之間下不勝其上其能喜酸
手太陰氣絕則皮毛焦大陰者行氣溫皮毛者也氣弗管則皮
毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷者則爪爪一作
皮枯毛折毛折者則氣氣字先死丙篤丁死火勝金也
肺死藏浮之虛按之弱如蔥葉平無根者死

右素問鍼經張仲景

腎膀胱部第五

蓋足少陰脈也

腎脈急甚為骨疼癩疾微急為奔豚沈厥足不收不得前後緩其為折脊微緩為洞下洞下者食不化入咽還出大甚為陰痿微大為石水起臍下以至小腹腫垂垂然上至胃管死不治小甚為洞泄微小為消痺滑甚為癰癩微滑為骨痿坐不能起目無所見視見黑花滑甚為大癰微滑為不月水沈痔

足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而濡骨隨者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不相親則肉濡而却肉濡而却故齒長而始_髮髮無澤髮無澤者骨先死戊為己死土勝水也

腎死藏浮之堅按之亂如轉圓益下入尺中者死

右素問鍼經張仲景

新刊王氏脈經卷第三

脈經卷四

新刊王氏脈經卷第四

朝散奉先輝卿真秘閣判官簡檢院主簿軍臣林億等類次

辨三部九候脈證第一

平雜病脈第二

診五藏六腑氣絕證候第三

診四時相反脈第四

診損至脈第五

診脈動止投數變數死期年月第六

診百病死生決第七

診三部虛實決死生第八

辨三部九候脈證第一

經言所謂三部者寸關尺也九候者每部中有天地人也上部主候從骨以上至頭中部主候從膈以下至氣街下部主候從氣街以下至足浮沈牢結遲疾滑澀各自異名分理繁之勿怠觀變所以別三部九候知病之所起審而明之針灸亦然也故先候脈寸中寸中於九浮在皮膚沈細在裏昭昭天道可得長久上部之候牢結沈滑有積氣在膀胱微細而弱引裏急頭痛欬逆氣上下心膈上有熱者口乾渴燥病從寸口邪入上者名曰解脈來至狀如琴絃苦少腹痛女子經月不利孔竅生瘡男子病痔左右脇下有瘡上部不通者苦少腹痛腸鳴寸口中虛弱者傷氣氣不足大如桃李實苦痺也寸口直上者逆虛也如浮虛者油利也中部脈結者腹中積聚若在膀胱兩脅下有熱脈浮而大風從胃管入水脹乾瀝心下澹澹如有桃李核

胃中有寒時若煩痛不食食即心痛胃脹支滿膈上積食下有熱時寒熱淋露脈橫出下者氣氣在膀胱病即着右橫關入寸口中者膈中不通喉中咽難刺關元入少陰下部脈者其脈來至浮大者脾也與風集合時上頭痛引腰背小滑者厥也足下熱煩滿逆上瘡心上至喉中狀如惡肉脾傷也病少腹下在膝諸骨節間寒清不可屈伸脈急如絃者筋急足牽結者四肢重從尺邪入陽明者寒熱也大風邪入少陰女子漏白下赤男子溺血陰萎不起引少腹痛

人有三百六十脉法三百六十日三部者寸關尺也尺脈為陰陰脈常沈而逢寸關為陽陽脈俱停而連氣出為動入為息故陽脈六息七息十三投陰脈八息七息十五投此其常也二十八脉相逐上下一脉不來知疾所苦尺勝治下寸勝治上尺寸俱平治中央臍以上陽也法於天臍以下陰也法於地臍為中關頭為天足為地有表無裏邪之所止得鬼病何謂表裏寸尺為表關為裏兩頭有脈關中絕不至也尺脉上不至關為陰絕寸脉下不至關為陽絕陰絕而陽微死不治三部脉或至或不吐者死上部無脉下部有脈雖困無所苦所以然者譬如人之有尺樹之有根雖枝葉枯槁根本將自生末有根本即自有氣故知不死也寸口脉平而死者何也然諸十二經脉者皆係於生氣之原所謂生氣之原者非謂十二經之根本也謂腎間動氣也此五藏六府之本十二經之根呼吸之門三焦之原一名守邪之神也故氣者人根本也根絕則莖枯矣寸口脉平而死者生氣獨絕於內也

之神以命門之神固守邪氣不得妄入入則死矣此岐伯曰形骸雖死於內其心便死其脈不復反得動脈也盛脈細少氣不足以息者死形瘦脈大胃中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病三部九候皆相失者死上下左右之脉相應如參春者病甚上下左右相失不可數者死中部之候蛙獨調與眾藏相失者死中部之候相滅者死目內陷者死黃帝曰及陰夏陽奈何岐伯曰九候之脉皆沈細懸絕者為陰主冬故以夜半死盛躁喘數者為陽主夏故以日中死是故寒熱者平旦死熱中及熱病者日中死病風者以日夕死病水者以夜半死其脉乍數乍疎乍遲乍疾者以日乘四季死形肉以脫九候雖調猶死七診雖見九候皆順者不死所言不死者風氣之病及經月之病似七診之病而非也故言不死者有七診之病其脉候亦敗者死矣必發噦噫必審問其所始病與今之所方病而右各切循其脉視其經絡浮沈以上下逆順循之其脉疾者不病其脉遲者病脉不往來者死皮膚著者死

兩手脉結上部者濡結中部者緩結三里者豆起弱反在關濡反在顛微在其上濡反在下微即陽氣不足沾熱汗出瀉即無血厥而且寒黃帝問曰余每欲視色持脉獨調其尺以言其病從外知內為奈何岐伯對曰審其尺之緩急小大滑澀肉之堅脆而病形變矣矣調之何如對曰脉急者尺之皮膚亦急脉緩者尺之皮膚亦緩脉小者尺之皮膚減而少脉大者尺之皮膚亦大脉滑者尺之皮膚亦滑脉滿者尺之皮膚亦滿凡此六變有微有其故善調尺者不待于寸善調脉者不待于色能參合行之可為上工尺膚滑以溼澤者風也尺內弱解亦安卧脫肉者寒熱也尺膚滑者風痺也尺膚癢如枯魚之鱗者水淡飲

也尺膚熱甚麻盛躁者病溫也其脈盛而滑者汗且出尺膚寒甚脈小者泄少氣尺膚焮然焮然甲乙作先熱後寒者寒熱也尺膚先寒久持之而熱者亦寒熱也尺焮然熱久迎大者實奪血尺緊入迎脈小甚則少氣色白有加者立死肘所獨熱者腰以上熱肘前獨熱者膺前熱肘後獨熱者肩背熱肘後寒以下三四寸腸中有蟲手所獨熱者腰以上熱臂中獨熱者腰腹熱掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒魚上白肉有青脈者胃中有寒

諸浮者沈諸滑諸澀諸弦者緊若在寸口膈以上病若在關

上胃以下病若在尺中腎以下病

寸口脈滑而遲不沈不浮不長不短為無病左右同法

寸口太過不及寸口之脈中手短者曰頭痛中手長者曰足脛痛中手促上擊者曰有背痛

寸口脈浮而盛者病在外

寸口脈沈而堅者病在中

寸口脈沈而弱者曰寒熱一作氣及疝瘦少腹痛

寸口脈沈而弱髮必墮落

寸口脈沈而堅苦心下有寒時瘧有積聚

寸口脈沈滑中短氣

寸口脈沈而喘者寒熱

寸口脈但實者心勞

寸口脈緊或浮膈上有寒肺下有水氣

脈緊而長過寸口者注病

脈緊寸口者中風風頭痛亦如之千金翼云亦為傷寒與痛

脈弦寸口者宿食降者頭痛

脈來過寸入魚際者遺尿

脈出魚際逆氣喘息

寸口脈微澀如羹上肥陽氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰

寸口脈偏絕則臂偏不遂其人兩手俱絕者不可治兩手前部陽絕者舌心下寒毒喙中熱

關上脈浮而大風在胃中張口有息心下澹澹食飲嘔

關上脈微浮積熱在胃中嘔吐蛇蠱心健忘

關上脈滑而大小不勻必吐辨其為病方欲進不出一二

復欲發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止者死

關上脈緊而滑者蛇動

關上脈澀而堅大而實按之不減有力為中焦實有伏結在脾肺氣寒實熱在胃中

關上脈澀澀大而尺寸細者其人必心腹冷積癥瘕結聚

復欲發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止

關上脈時來時去乍大乍小乍疎乍數者胃中寒熱羸劣

欲飲食如瘥狀

尺脈浮者客陽在下焦

尺脈細微溇泄下冷利

尺脈弱寸彊胃絡脈傷

尺脈虛小者是脛寒痿痺脚痠

尺脈澀下血不利多汗素問又云尺澀

尺脈滑而疾為血虛

尺脈沈而滑者寸白蟲

尺脉細而急者筋攣痺不能行

尺脉蒼蒼熱者謂之熱中腰膝疼小便赤熱

尺脉偏滑疾面赤如醉外熱則病

平雜病脉第二

滑為實為下又為陽數為虛為熱浮為風為虛動為痛為驚

沈為水為實鬼疰為虛為悸

遲則為寒滑則少血緩則為虛洪則為氣一作熱緊則為寒

數為瘥

瘥脉自弦弦數多熱弦遲多寒微則為虛代則死

弦為痛痺一作痺偏弦為飲擊弦則臂下拘急而痛其人

瀆惡寒

瀆脉大寒熱在中

伏者霍亂

安卧脉盛謂之脫血

凡亡汗肺中寒飲冷水欬嗽下利胃中虛冷此等其脉並緊

浮而大者風

浮大者中風頭重鼻塞

浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉

滑而浮散者攤緩風

滑者鬼疰

澀而緊痺病

浮洪大長者風眩癱疾

大緊疾者癰病

弦而鈎脇下如刀刺狀如蠶戶至困不死

緊而急者道尸

洪大者傷寒熱病

浮洪大者傷寒秋吉春成病

浮而滑者宿食

浮滑而疾者食不消脾不磨

短疾而滑酒病

浮而細滑傷飲

遲而滑中寒有癥結

駛而緊積聚有擊痛

弦急痞瘕小腹痛又為癰病一作瘰癧

遲而滑者脹

盛而緊曰脹

弦小者寒痺

沈而弦者懸飲內痛

弦數有寒飲冬夏難治

緊而滑者吐逆

小弱而瀆胃反

遲而緩者有寒

微而緊者有寒

沈而遲腹臑有冷病

微弱者有寒少氣

實緊胃中有寒苦不能食時利者難治一作時難治

滑數心下結熱盛

滑疾胃中有熱

纏而骨日熱中

沈_{一作}而急病傷寒暴發虛熱

浮而絕者氣

辟大而滑中有短氣

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當數也

沈而數中水冬不治自愈

短而數心痛心煩

弦而緊脇痛藏傷有瘀血_{一作有}

沈而滑為下重亦為脊脊痛

脈來細而滑按之能虛因急持且者僵仆從高墜下病在內

微浮秋吉冬成病

微數雖甚不成病不可勞

浮滑疾緊者以台自病久易愈

陽邪來見浮洪

陰邪來見沈細

水穀來見堅實

脈來乍大乍小乍長乍短者為祟

脈來洪大_二者社祟

脈來沈_二澤_二四支不仁而重土祟

脈與肌肉相得父持之至者可下之

弦小緊者可下之

緊而數寒熱俱發必下乃愈

弦遲者宜溫藥

緊數者可發其汗

診五藏六腑氣絕證候第三

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏臥目視而不見人

汗泣_{一作}出如水流不止_{一日}死

病人膽絕七日死何以知之眉髮之傾

病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青呼罵不休_{一日}死

病人心絕一日死何以知之有息回視立死_{一日}死

病人腸小腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白

汗不止

病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱臃脹泄利不

覺出無特度_{一日}死

病人胃絕五日死何以知之脊痛胃中重不可反覆_{一日}死

病人肉絕六日死何以知之耳乾舌皆腫溺血大便赤_{一日}死

足腫_九

病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還_{一日}死

病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

病人腎絕四日死何以知之齒為暴枯面為正黑口中黃色

胛中欲折白汗出如流水_{一日}死

病人骨絕齒黃落十日死

諸浮脈無根者皆死已上五藏六腑為根也

診四時相反脈證第四

春三月木王肝脈治當先至心脈次之肺脈次之腎脈次之此

為四時王相順脈也到六月土王脾脈當先至而反不至反得

腎脈此為腎反脾也七十日死何謂腎反脾夏火王心脈當先

至肺脈次之而反得腎脈是謂腎反脾期五月六月為丙丁

脾反肝二十日死何為脾反肝春肝脉當先至而反不至脾脉先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙

腎反肝三歲死何謂腎反肝春肝脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反肝也期七月八月忌庚辛

腎反心二歲死何謂腎反心夏心脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反心也期六月心戊己肺金之氣脈未至論

推五行亦類也
脚待求別錄也

診損至脉第五

脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脉也何謂損一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此損之脉也至脉從上下損脉從上下也損脉之為病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脉血脈虛少不能榮於五藏六府也三損損於肌肉肌肉消瘦食飲不為肌膚四損於筋筋緩不能自收持五損於骨二痿不能起於牀反此者至於收病也從上下者骨蒸不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者益其榮衛損其脾者調其飲食適其糞溼損其肝者緩其中損其腎者益其精氣此治損之法也

脉有一呼再至一吸再至一呼三至一吸三至一呼四至一吸四至一呼五至一吸五至一呼六至一吸六至一呼一至一吸

一至再呼一至再吸一至呼吸再至脉來如此何以別知其病也然脉來一呼再至一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸

三至為適得病前大後小即頭痛目眩前小後大即當滿短氣

一呼四至一吸四至病適欲其脉洪大者若煩滿沈細者腹中痛滑者傷熱滿者中霧露一呼五至一吸五至其人當困沈細即夜加浮大即晝加不大小雖困可治其有大小者為難治一呼六至一吸六至為十死脉也沈細夜死浮大晝死一呼一至一吸一至各曰損人雖能行猶當一作着牀所以然者血氣皆不足故也再呼一至再吸一至者曰无慮无慮者當死也人雖能行名曰行尸

扁鵲曰脉一出入曰平再出 入少陰三出 入太陰四出

一入厥陰再入 一出少陽三入 出陽明四入 出太陽脉出

者為陽入者為陰故人一呼而脉再動氣行三寸一吸而脉再

動氣行三寸呼吸定息脉五動一呼一吸為一息氣行六寸人

十息脉五十動氣行六尺二十息脉百動為一備之氣以應四

時天有三百六十五日人有三百六十五節晝夜漏下水百刻

一備之氣脉行丈二尺一日一夜行於十二辰氣行尺則周遍

於身與天道相合故曰平平者无病也一陰一陽是也脉再動

為一至再至而緊即奪氣一刻百二十五息十刻十二百五十

息百刻萬二千五百息一刻為一度一度氣行一周身晝夜五

十度脉三至者離經一呼而脉二動氣行四寸半人息脉七

動氣行九寸十息脉七十動氣行九尺一備之氣脉百四十動

氣行一丈八天一周於身氣過百八十度故曰離經離經者病

一陰二陽是也三至而緊則奪血脈四至則奪精一呼而脉四

動氣行六寸人息脉九動氣行尺二寸人十息脉九十動氣

行一丈二尺一備之氣脉百八十動氣行一丈四尺一周於身

氣過三百六十度再過於身不及五節一時之氣而重至謂脉

浮瀆者五藏无精難治一陰三陽是也四至而緊則羸形脈五至者死一呼而脈五動氣行六寸半當行七寸一息脈十一動

氣行尺三寸當行尺八寸十息脈百一十動氣行丈三寸當行丈五尺

一備之氣脈二百二十動氣行一丈六尺當行一丈二尺一周於身三百

六十五節氣行過五百四十度再周於身過百七十度一節之

氣而至此氣浮瀆經行血氣竭不守於中五藏痿瘠精神散

亡脈五至而緊則死三陰一陰一陽是也雖五猶未如之何也

脈一損一乘者人一呼而脈一動一息而脈再動氣行三寸

十息脈二十動氣行三尺一備之氣脈四十動氣行六尺不及

周身百八十節氣短不能周過於身若少氣身軀懈墜矣脈再

損者人一息而脈一動氣行一寸五分人十息脈十動氣行尺

五寸一備之氣脈二十動氣行三尺不及周身二百節氣血

盡經中不能及故曰離經血去不在其處小大便皆血也脈三

損者人一息復一呼而脈一動十息脈七動氣行尺五寸當行尺五寸

分一備之氣脈十四動氣行三尺一寸當行三寸不及周身二百

九十七節故曰爭氣行血流不能相與俱微氣閉實則骨痛藏

枯而爭於中其氣不朝血凝於中死矣脈四損者再息而脈一

動人十息脈五動氣行七寸半一備之氣脈十動氣行尺五寸

消者是意損也身安卧不便利耳目不明是魂損也呼吸不

相通五色不華是魄損也四肢皆見脈為亂是神損也大損三

十歲中損二十歲下損十歲損各以春夏秋冬立人人長脈短

者是天損二十歲人短脈長者是中損二十歲手足皆細是下

損十歲失精氣者一歲而損男子左脈短右脈長是為陽損半

歲女子右脈短左脈長是為陰損半歲春脈當得肝脈反得脾

肺之脈損夏脈當得心脈反得腎肺之脈損秋脈當得肺脈反

得肝心之脈損冬脈當得腎脈反得心脾之脈損當審切寸口

之脈知絕不絕前後去為絕掌上相擊堅如彈石為上脈虛盡

下脈尚有是為有胃氣上脈盡下脈堅如彈石為有胃氣上下

脈皆盡者死不絕不消者皆生是損脈也至之為言言語音深

遠視償償是志之至也身體粗大飲食暴多是意之至也語言

妄身手足相引是魂之至也龍蔥垂色是魄之至也脈微小不

相應呼吸自大是神之至也是至脈之法也死生相應病各得

其氣者生十得其半也黃帝曰善

診脈動止按數踈數死期年月第六

脈一動一止二日死經云二動一止三日死三動一止四日

死或五日死四動一止六日死五動一止五日死或七日死六

動一止八日死七動一止九日死八動一止十日死九動一止

九日死又云十一日死經云十三日死十動一止立夏死經云

春十一動一止夏至死經云立夏死十二動一止立秋

死經云秋死十四十五動一止立冬死經云立冬死二十動一止一歲

死若立秋死二十一動一止一歲死二十五動一止立冬死

或一歲死三十動一止一歲者一歲死三十五動一止三歲死

四十動一止四歲死五十動一止五歲死不滿五十動一止五歲死

脉來五十投而不止者五藏皆受氣即無病千金云五行晝夜百刻五德相生

脉來四十投而一止者一藏無氣却後四歲春草生而死

脉來三十投而一止者二藏無氣却後三歲黍熟而死

脉來二十投而一止者三藏無氣却後二歲黍稷赤而死

脉來十投而一止者四藏無氣歲中死得節不動出清明日死遠不出穀雨死矣

脉來五動而一止者五藏無氣却後五日而死

脉一來而久住者宿病在心主中治

脉二來而久住者病在肝枝中治

脉三來而久住者病在脾下中治

脉四來而久住者病在腎間中治

脉五來而久住者病在肺枝中治

五脉病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

診百病死生決第七

診傷寒熱盛脉浮大者生沈小者死

傷寒已得汗脉沈小者生浮大者死

温病二四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治

温病穰穰大熱其脉細小者死千金穰穰

温病下利腹中痛甚者死不治

温病汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅彊急者主虛緩

者死

温病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾者八日死四五日頭痛腹痛而吐脉來細彊十二日死八九日頭不

疼身不痛目不赤色不變而反利脉來燥燥按之不彈手時

大心下堅十七日死

熱病七八日脉不軟端一作不散者當瘡瘡後三日温汗

不出者死

熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌焦乾黑

者死

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難差

熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治

熱病已得汗常大熱不去者亦死作傳

熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治

熱病發熱熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下利

診人被風不仁痿廢其脉虛者生堅急疾者死

診癩病虛則可治實則死

癩疾脉實堅者生脉沈細小者死

癩疾脉搏大滑者又久自己其脉沈小急實不可治小緊急

亦不可療

診頭痛目痛久視無所見者死又視

診人心腹積聚其脉堅彊急者生虛弱者死又實彊者生沈

者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長者死腹脹滿便

血脉大時絕極下血脉小疾者死

心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死

腸澼便血身熱則死寒則生

腸澼下白沫脉沈則生浮則死

腸澼下膿血脉懸絕則死滑大則生

腸澼之屬身熱脉不懸絕滑大者生懸澼者死以截期之

腸澼下膿血脉沈小流連者生數疾且大有熱者死

腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死

洞洩食不化不得留下膿血脉微小連者生緊急者死

澁注脉緩時小結者生浮大數者死

蠶蝕陰左其脉虛小者生緊急者死

欬嗽脉沈緊者死浮直者生浮軟者生小流伏匿者死

欬嗽羸瘦脉形堅大者死

欬脫形發熱脉小緊急者死肌瘦下云不脫形熱不去者死

效而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絕者死

吐血衄血脉滑小弱者生實大者死

汗出若衄其脉小滑者生大躁者死

唾血脉緊彊者死滑者生

吐血而效上氣其脉數有熱不得卧者死

上氣脉數者死謂其形損故也

上氣喘息低昂其脉滑手足溫者生脉濕四肢寒者死

上氣面浮腫有息其脉大不可治加利必死又甚

上氣注液其脉虛壅伏匿者生堅彊者死

寒氣上攻脉實而順滑者生實而逆澁者死大寒云寒氣暴

日實而滑則生實而澁則死矣其形盡滿何如曰至形盡滿

者厥急大堅尺滿而不應如長者順則生逆則死何謂順則

生逆則死曰尺謂順者手足溫也謂逆者手足寒也

瘡腫脉實大病久可治脉懸小緊急病久不可治

消渴脉數大者生細小浮短者死

消渴脉沈小者生實堅大者死

水病脉洪大者可治微細者不可治

水病脹閉其脉浮大軟者生沈細虛小者死

水病腹大如鼓脉實者生虛者死

卒中惡吐血數升脉沈數細者死浮大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊大而浮者死緊細而

微者亦生

病瘡腰脊強急瘳瘳者皆不可治

寒熱更癢其脉代絕者死

金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死

金瘡出血脉沈小者生浮大者死

斫瘡出血一二石脉來大二十日死

斫刺俱有病多少血出不止斷者其脉止脉來大者七日

死滑細者生

從高傾仆內有血腹脹滿其脉堅彊者生小弱者死

人為百藥所中傷脉浮澁而疾者生微細者死淋大而澤者

生千金蓮

人病甚而脉不調者難差

人病甚而脉洪者易差

人內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不得

安靜者死

脉實滿手足寒頭熱春生夏死

老人脉微陽羸陰彊者生脉熾大加息一作者死陰弱陽彊脉至而代奇一作月而死

尺脉濇而堅為血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血久成結瘕得病以冬時黍稷赤而死

尺脉細而微者血氣俱不足細而有力者是穀氣不充病得節軟動蕞葉生而死此病秋時得之

左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至關關至尺三部之位處動搖各異不同其人病仲夏得之此脉桃花落而

死一作花作葉

右手寸口脉偏沈伏乍小乍大朝來浮大暮夜沈伏浮大即太過上出魚際沈伏即下不至關中往來無常時復來者

榆葉枯落而死一作葉

右手尺部脉三十動一止有頃更還二十動一止乍動乍踈

連連相因不與息數相應其人雖食穀猶不愈蠶草生而死

左手尺部脉四十動而一止而復來來逆如循直木如循

張弓弦絀絀然如兩人共引一索至立冬死千金作至立春而死

診三部脉虛實決死生第八

三部脉調而和者生

三部脉廢者死

三部脉虛其人長病得之死虛而濇長病亦死虛而滑亦死

虛而緩亦死虛而弦急癩病亦死

三部脉實而大長病得之死實而滑長病得之生卒病得之

三部脉羸非其人脉一作得之死

三部脉寬長病得之死卒病得之生

三部脉細而軟長病得之生細而數亦生微而緊亦生

三部脉大而數長病得之生卒病得之死

三部脉微而伏長病得之死

三部脉軟濡一作長病得之不治自愈治之死卒病得之生

三部脉浮而結長病得之死浮而滑長病亦死浮而數長病風得之生卒病得之死

三部脉乳長病得之生卒病得之死

三部脉弦而數長病得之生卒病得之死

三部脉章長病得之死卒病得之生

三部脉堅而數如銀釵股蠱毒病必死數而軟蠱毒病得之生

三部脉澀澀如羹上肥長病得之死卒病得之生

三部脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生

三部脉如霹靂長病得之死二十日死

三部脉如弓弦長病得之死

三部脉累累如貫珠長病得之死

三部脉如水澆然流長病不治自愈治之反死二云如水澆長病不治自愈者

三部脉如屋漏長病十日死千金云十日死

三部脉如雀啄長病七日死

三部脉如釜中湯沸朝得晝死夜半得日中死日中得夜半死

三部脉急切腹間病又婉轉腹痛針上下差

新刊王氏脉經卷第五

朝散李光遠孫蘇蘭劉聲簡陸慶蓮輩臣林億等類次

張仲景論脉第一

扁鵲陰陽脉法第二

扁鵲脉法第三

扁鵲華佗察聲色要訣第四

扁鵲診諸反逆死脉要訣第五

張仲景論脉第一

脉有二部陰陽相乘榮衛氣血在人脉躬千金作而呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作劬家形容春弦

秋浮冬沉夏洪察色觀脉大小不同一時之間變無經常尺

寸參差或短或長上下垂錯或存或亡病輒改易進退低昂

心迷意惑動失紀綱願為緩陳令得分明

師曰子之所問道之根源脉有三部尺寸及關榮衛流行不

失衝鋒腎沉心洪肺浮肝弦此自經常不失錄分出入昇降

漏刻周旋水下二刻刻謂等水下二刻刻謂等水脈一周身旋復寸口

虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則緊弦沈潛水

瀆支飲急弦動弦為痛數洪熱煩設有不應知變所緣三部

不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空見終必有奸審

審表裏二候別分知邪所舍消息診看料度臍臑獨見若神

為子條記傳與賢人

扁鵲陰陽脉法第二

脉平且曰太陽日中見陽明晡時曰少陽黃昏曰少陰夜半

曰大陰雞鳴曰厥陰是二陰三陽時也

少陽之脉小乍大乍長乍短動搖六分壬十一月甲子夜半正月二月甲子王

太陽之脉洪大以長其來浮於筋上動搖九分二月四月甲子王

陽明之脉浮大以短動搖三分太前小後狀如科斗其至跳

五月六月甲子王

少陰之脉緊細動搖六分壬五月甲子日申七月八月甲子王

太陰之脉緊細以長乘於筋上動搖九分九月十月甲子王

厥陰之脉沈短以緊動搖三分十一月十二月甲子王

厥陰之脉急弦動搖至六分已上病逢脉寒少腹痛引腰形

喘者死脉緩者可治刺足厥陰入五分

少陽之脉乍短乍長乍大乍小動搖至六分已上病頭痛脇

下滿嘔可治按即死解刺兩季肋端足少陽也入七分

陽明之脉洪大以浮其來滑而跳大前細后狀如科斗動搖

至三分已上病眩頭痛腹滿痛嘔可治按即死刺臍上四寸

臍下二寸各六分

從二月至八月陽脉在表從八月至正月陽脉在裏附陽脉

強附陰脉弱至即驚安則痢澀細而沈不瀾澀即泄洩即煩

煩即渴渴即腹滿滿即擾擾即腸游游即厥代乍至乍不至

大而沈即欬欬即上氣上氣甚則有息有息甚則口舌血出

血出其即鼻血出變出寸口陰陽表裏以互相乘如風有道

陰脉乘陽也寸口中前後溢者行風寸口中外突因不滿者

三風四溫寸口者勞風勞風者大病亦發缺行汗出亦發與

風者上下微二扶骨是其診也表緩腹內急者與風也攣雷

實夾者飄風從陰趨陽者風邪一來調一來連鬼邪也陰綫陽急者表有風來入藏也陰急者風已抱陽入腹上逐逐下宛宛不能至陽流飲也上下血微陰強者為漏僻陽強者酒僻也偏偷不過微反陽濟衆也陰扶骨絕者從寸口前頓趨於陰汗水也來調四布者欲病水也陰脉不偷陽脉傷復少津寸口中後大前允至陽四實者僻食小過陽一分者七日僻二分者十日僻三分者十五日僻四分者二十日僻四分中伏不過者半歲僻數數不至胃陰一分飲舖餌僻也外勾者久僻也內卷者十日以還外強內弱者裏大核也并浮而弦者汗核并浮緊而數如沈病暑食粥一作有內緊而伏麥飲者餅寸口脉倚陽緊細以微瓜菜皮也若倚如緊養藏來也隨隨無數生肉僻也附陽者灸肉僻也小倚生浮大如故生麥豆也

扁鵲脉法第三

扁鵲曰人一息脉二至謂平脉體形無苦人一息脉三至謂病脉一息四至謂瘴者脫脉氣其眼睛青者死人一息脉五至以上死不可治也都聲一作息病脉來動取極五至病有六七至也扁鵲曰平和之氣不緩不急不滑不澀不存不亡不短不長不愧不仰不從不橫此謂平脉腎一作受如此則一作身無苦也扁鵲曰脉氣弦急病在肝少食多厭裏急多言頭眩目痛腹滿筋攣癩疾上氣少腹積堅時時唾血咽喉中乾相病之法視色聽聲觀病之所在候脉要訣豈不微乎脉浮如數無熱者風也若浮如數而有熱者氣也脉洪大者又兩乳旁動脉復數加有寒熱此傷寒病也若脈長病如脉浮溢

寸口復有微熱此疰氣病也如復效又多熱乍劇乍差難治也又瘳無劇者易差不效者易治也

扁鵲華佗鑿聲色要訣第四

- 病人五藏已奪神明不守聲嘶者死
- 病人循衣縫謔言者不可治
- 病人陰陽俱絕掣衣撥髮妄言者死
- 病人妄語錯亂又不能語者不治熱病者可治
- 病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死
- 病人兩目皆有黃色起者其病方愈
- 病人面黃目青者不死青如草滋死
- 病人面黃目赤者不死赤如衄血死
- 病人面黃目白者不死白如枯骨死
- 病人面黃目黑者不死黑如始死
- 病人面目俱等者不死
- 病人面黑目青者不死
- 病人面青目白者不死
- 病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經
- 膽氣妄泄目則為青雖有天赦不可復生
- 病人面赤目白者十日死憂志思慮心氣內索面也及好急
- 求瘡瘵
- 病人面白目黑者死此謂榮華已去血脈空索
- 病人面黑目白者八日死腎氣內傷疰疢留積

病人面青目黃者五日死病人著牀心痛短氣脾竭內傷百日復愈能起傍徨因坐於地其正倚牀能治此者可謂神良
 病人面無精光若土色不受飲食者四日死
 病人目無精光及牙齒黑色者不治
 病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死
 病人耳目及顴頰赤者死在五日中午
 病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩顴上者亦死在五日中午
 病人黑氣出天中下至鼻上顴上者死
 病人及健人黑色若白色起入目及鼻口死在三日中午
 病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死
 病人面黑目直視惡風者死
 病人面黑脣青者死
 病人面青脣黑者死
 病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死
 病人面回回直視有身著一日死
 病人頭目久痛卒視無所見者死
 病人陰結陽絕目精脫恍惚者死
 病人陰陽絕竭目睚陷者死
 病人脣系傾者七日死
 病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死
 病人口張者三日死
 病人脣青人中反三日死
 病人脣反人中反者死
 病人脣口忽乾者不治

病人脣腫齒焦者死
 病人陰陽俱竭其齒如熟小豆其脈駛者死
 病人齒牙變黑者十三日死
 病人舌卷外縮者必死
 病人汗出不流舌卷黑者死
 病人髮直者十五日死
 病人髮如乾麻善怒者死
 病人髮與眉衝起者死
 病人爪甲青者死
 病人爪甲白者不治
 病人手足爪甲下肉黑者八日死
 病人禁衛竭絕面浮腫者死
 病人卒腫其面蒼黑者死
 病人手掌腫無文者死
 病人臍腫反出者死
 病人陰囊空俱腫者死
 病人脈絕口張足腫五日死
 病人足趺上腫兩膝大如斗者十日死
 病人臥遺屎不覺者死
 病人尸臭者不可治
 肝病皮黑肺之日庚辛死
 心病目黑腎之日壬癸死
 脾病脣青肝之日甲乙死
 肺病頰赤目腫心之日丙丁死

腎病面腫脣黃脾之日戊己死

青欲如蒼璧之澤不欲如鹽

赤欲如帛裏朱不欲如赭

白欲如鷄羽不欲如鹽

黑欲如漆不欲如灰

黃欲如羅裏雄黃不欲如黄土

目色赤者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃色不可

名者病胃中

診目病赤脉從上下者太陽病也從下上者陽明病也從外

入內者少陽病也

診寒熱瘰癧目中有赤脉從上下至瞳子見一脈一歲死見

一脈半一歲半死見二脈二歲死見三脈半三歲死見三

脈三歲死

診齠齒痛按其陽明之脉來有過者獨熱在右右熱在左左

熱在上上熱在上下下熱

診血者脉多赤多熱多青多痛多黑為久痺多赤多黑多青

比見者寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也女卧

少黃赤脉小而滑者不嗜食

扁鵲診諸反逆死脉要訣第五

齒鳴曰夫相死脉之氣如群鳥之聚一馬之馭系水交馳之

狀如懸石之落出助之上藏筋之下堅關之裏不在禁衛伺

候交射不可知也

死脉人平

脉來如彈石去如解索者死

脉困病人脉如蝦之游如魚之翔者死

脉如懸薄卷索者死

脉如轉豆者死脉如偃刀者死脉涌涌不去者死脉忽去忽

來暫止復來者死脉中侈者死脉分絕者死

脉有表無裏者死經名曰結去即死何謂結脉在指下如麻

子動搖屬腎名曰結去死近也脉五來一止不復增減者死

經名曰代何謂代脉五來一止也脉七來是一息半時不

復增減亦名曰代正死不疑

經言病或有死或有不治自愈或有連年月而不已其死生

存亡可切脉而知之邪然可具知也設病者若閉目不欲見

人者脉當得肝脉弦急而長反得肺脉浮短而滑者死也病

若閉目而渴心下牢者脉當得腎實而數反得沈滑而微者

死病若吐血瘦軀者脉當得沈細而反浮大牢者死病若

謔言妄語身當有熱脉當洪大而反手足四逆脉反沈細微

者死病若大腰而澀脉當微細而澀反得緊大而滑者死此

之謂也

經言形脉與病相反者死奈何然病若頭痛目痛脉反短滑

者死之

病若腰痛脉反浮大而長者死

病若腰滿而喘脉反滑利而沈者死

病若四肢厥逆脉反浮大而短者死

病若耳聾眩及浮大而瀉者死千金翼云脈大者生沈遲細者難治

病若自眩眩脈反大而緩者死
左者病而右痛右者病而左瀉下有病而上痛上有病而下痛此為逆逆者死不可治脈來沈之絕瀉浮之不止推手者半月死一作日脈來微細而絕者人病當死

人病脈不病者生脈病人不病者死
人病尸厥呼之不應脈絕者死脈當大反小者死

肥人脈細小如絲欲絕者死
羸人得繚脈者死

人身澀而脈來往滑者死
人身滑而脈來往澀者死

人身小而脈來往大者死
人身大而脈來往小者死

人身短而脈來往長者死
人身長而脈來往短者死

尺脈不應寸時如繩半日死千金云尺脈上應寸口大遲者半日死

肝脾俱至則穀不化肝多即死
肺肝俱至則癰疽四脚重肺多即死

心肺俱至則痺消渴懈怠心多即死
腎心俱至則難言九竅不通四肢不舉腎多即死

脾腎俱至則五藏敗壞脾多即死
肝心俱至則熱甚痲癩汗不出妄見邪

肝腎俱至則疝瘕少腹痛婦人月使不來肝滿腎滿肺滿皆實則為臌肺之雍喘而兩肢滿肝癰臌臌滿則則驚不得小

便腎雍脚膝下至小腹滿脛有大小髀肝大跛易偏枯心肺滿大癰癩筋攣肝脈小急癰癩筋攣肝脈暴有所驚駭脈不至若瘡不治自已腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆為癆腎脈井沈為石水并浮為風水并虛為死并小弦欲驚腎脈大急沈肝脈大急沈皆為心脈搏滑急為心病肺脈沈搏為肺病脾脈外鼓沈為腸澼久自已肝脈小緩為腸澼易治腎脈小搏沈為腸澼下血血溫身熱者死心肝澼亦下血

二截同病者可治其脈小沈瀉者為腸澼其身熱者死熱見七日死胃脈沈鼓滑胃外鼓大心脈小緊急皆腸偏枯男子發左女子發右不瘡古轉可治二十日起其順者瘡三歲起年不滿二十者三歲死脈至而搏血衄身有熱者死脈來如懸鈞浮為熱脈至如喘名曰氣厥氣厥者不知與人言素問甲乙

脈至如數使人暴驚三四日自已脈至浮合浮合如數一息十至十至以上是為經氣予不足也微見九十日死脈至如火新然是心精之予奪也草乾而死脈至如散葉是肝氣予虛也木葉落而死木葉落

脈至如雀者雀者脈塞而設是腎氣予不足也懸去囊韋而死脈至如泥丸是胃精予不足也榆葉落而死氣胸炎

脈至如橫格是膽氣予不足也木熱而死脈至如弦纒是胞精予不足也病善言下霜而死不言可治脈至如交漆者左右傍至也微見四十日死甲乙作脈至如涌泉浮鼓肌中是太陽氣予不足也少氣味非英而死脈至委委土賴土

狀按之不得是肌氣予不足也五色先見黑白一作發死脈至如懸雍懸雍者浮揣切之益大是十二俞之予不足也

水凝而死脉至如偃刀偃刀者浮之小急也按之堅大急五
藏發熱寒熱獨并於肘也如此其人不得坐立春而死脉至
如丸滑不直手不直手者按之不可得也是大腸氣予不足
也晝業生而死脉至如春者令人善恐不欲坐卧行立常聽
是小腸氣予不足也季秋而死

問曰嘗以春二月中脉一病人其脉反沈師記言到秋當死
其病反愈到七月復病因往脉之其脉續沈復記言至冬死
問曰二月中得沈脉何以故處之至秋死也師曰二月之時
其脉自當瀉弱而弦得沈脉到秋自沈脉見浮即死故知到
秋當死也七月之時脉復得沈何以處之至冬當死師曰沈
脉屬腎其藏脉也非時妄見
經言王相因死冬脉本王脉不再見故知至夏當死也然後
至冬復病王以冬至日死故知為語華佗做此

新刊王氏脉經卷第六

朔數未年 光祿卿直秘閣判茶園使 直學軍臣 林億 等類次

肝病證第一

臍病證第二

心病證第三

小腸病證第四

脾病證第五

胃病證第六

肺病證第七

大腸病證第八

腎病證第九

膀胱病證第十

三焦病證第十一

肝足厥陰經病證第一

肝氣虛則恐實則怒肝氣虛則夢見園死生章得其時則夢
伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢山林樹木

病在肝平且慧下睛盛夜半靜

病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不通身痛
體重二日之胃而腹脹三日之腎少腹腰脊痛脛痠十日不

已死冬日入夏食肝脉搏堅而長色不青當病墜墮若搏

因血在脇下令人喘逆若奕而散其色澤者當病溢飲溢飲

者濕暴多飲而溢一作入肌皮腸胃之外也

肝脉沈之而急浮之亦然苦脇下痛有氣上滿引少腹四痛

新刊王氏脉經卷第五

時小便難苦目眩頭痛腰背痛足為逆寒時瘥女人月使不來時亡時有得之少時有所墜墮

青脉之至也長而左右彈診曰有積氣在心下支脉名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

肝中風者頭目暈兩脇痛行常偃令人嗜甘如阻歸狀

肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然赤發熱有汗背

中煩熱肝中寒者其人兩臂不舉古本又作燥喜太息背

痛不得轉側時盜汗欬食已吐其汁肝主骨中喘怒罵其脉

沈宵中又室欲令人推按之有熱鼻窒

九有所墜墜惡血留內若有所大怒氣上而不能下積於左

脇下則傷肝肝傷者其人脫肉又臥口欲得張時時手足青

目眩腫人痛此為肝藏傷所致也

肝脹者脇下滿而痛引少腹

肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微

生小便續通

肺乘肝即為癰腫心乘肝必吐利

肝著者其病人常欲蹈其背上先未苦時但欲飲熱肝之積

名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀久不愈發

欬逆痰瘧連歲月不已以季夏戊己日得之何也肺病傳肝

壯背第九椎五十壯

肝病者必兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目眩疏無所見

耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經

足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者邪在

肝則兩脇中痛寒中惡血在內肝善癢節時腫取之行間以

引脇下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脉已

去其瘕足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足上廉去

內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循股入陰毛

中環陰器抵少腹俠胃屬肝絡膈上貫膈布脇肋循喉嚨之

後上入頰頰連目系上出額與督脉會於顛其支者從目系

下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注肺中是動則病

腰痛不可以俛仰丈夫頰疝婦人少腹腫其則啞乾面塵脫

色是主肝所生病者青滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉瘡盛者則

寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎

足厥陰之別名曰蠱溝去內踝上五寸別走少陰其別者循

經上辜結於莖其病氣逆則臑腫卒疝實則挺長熱虛則暴

癢取之所別肝病者滿脇脹善怒呼身體有熱而復惡

寒四肢不孝面自白身體滑其脉當弦長而急今反短滿其

色當青而反白者此是金之刻木為大逆十死不治

膽足少陽經病證第一

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之噎中介

介然數唾候在足少陽之本末亦見其脉之陷下者灸之其

寒熱刺陽陵泉善嘔有苦汁長太息心中澹澹善悲恐如人

將捕之邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰

膽足少陽經病證第一

膽足少陽經病證第一

膽足少陽經病證第一

膽足少陽經病證第一

嘔膈刺三里以下胃氣逆刺足少陽經絡以閉膈却調其虛實以去其邪也

膈脹者脇下痛脹口苦太息厥氣客於膈則夢蘭訟

足少陽之脉起於目兌臂上抵頭角下耳後循頸行

手少陽之脉前至肩上却交手少陽之後入缺盆其支者從

耳後入耳中出走耳前至兌臂後其支者別兌臂下大迎合

手少陽於頰一本云別於頰上加頰車下頰合缺盆以下

臂中貫膈絡肝為膈循脇裏出氣街遠毛際橫入髀厭中其

直者從缺盆下腋循臂中過季脇下合髀厭中以下循髀陽

出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前

循足趺上出小指次指之端其支者趺上入大指之間循大

指歧內出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息

心脇痛不能反側甚則面微塵鼻無膏澤足外反熱是為陽

厥是主骨所生病者頭痛角領痛目兌臂痛缺盆中腫痛腋

下腫馬刀挾癭汗出振寒瘡實中脇肋解膝外至胫總骨外

踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸

口虛者則人迎反小於寸口也

心手少陰經病證第三

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢殺火陽物得其

時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於心則夢丘

山煙火

病在心日中晝夜半甚平日靜

病先發於心者心痛一日之肺喘效三日之肝脇痛支滿五

日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中

心脈搏堅而長當病舌卷不能言其要而散者當病消渴而已

心脈沈之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛食不下喜咽

唾時手足熱煩滿時忘不樂善太息得之憂思亦脉之至也

喘而堅言曰有積氣在中時寒於食名曰心痺得之外疾思

慮而心虛故邪從之

心脉急多白心忪少腹當有形其以心為牡藏小腸為之使

故少腹

邪使使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者

其人即畏一作合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰

氣衰者即為癩陽氣衰者即為狂五藏者魂魄之宅舍精神

之所依託也魂魄飛揚者其五藏空虛也即邪神居之神靈

所使鬼而下之脉短而微其截不足則魂魄不安魂屬於肝

魄屬於肺肺主津液即為津泣肺氣衰者即為泣出肝氣衰

者魂則不安肝主善怒其聲呼

心中風者身熱發熱不能起心中飢而欲食食則嘔

心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心如

蠱注其脉浮者自吐乃愈

愁憂思慮則傷心心傷則苦驚善忘善怒心傷者其人勞倦

即頭面赤而下重心中痛徹背背發煩熱常勝挑手其脉弦

此為心癰瘍所致也

心脹者煩心短氣卧不安

心水者其人身體重一作而少氣不得卧煩而躁其陰大腫

腎榮心必痿

真心痛手足清至節心痛甚且發死夕發旦死

心膈痛懷懷發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中熱苦

渴涎出者是蛇咬也以手聚而堅持之母火得移以大針刺

之灸持之蟲不動乃出針腸中有蟲蛇咬食不可取以小針

心之積名曰伏梁起於臍上上至心大如臂久不愈病煩

心二痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心二當傳肺肺通以

秋王王者不受邪心復欲還腎二不肯受因腎結為積故知

伏梁以秋得之

心病其色赤心痛氣短手掌煩熱或啼笑罵言悲恐怒慮面

赤身熱其脈尖大而數此為可治春當刺中衝夏刺勞宮季

夏刺太陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤宜瀉之此是手少陰也

又當灸巨闕五十壯背第五椎百壯

心病者背內痛脇支滿兩脇下痛膺背有甲間痛兩臂內痛

虛則背腹大脇下與腰背相引而痛取其經手少陰太陽舌

下血者其變病刺邪中血者

邪在心則病心痛善恐時眩仆視有餘不足而謂之其輸

○黃帝曰手少陰之脈獨無輸何也歧伯曰少陰者心脈也心

者五臟六腑之大主也心為帝王精神之所舍其藏堅固邪

不能客客之則傷心心傷則神去神去則身死矣故諸邪在

於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈也故少陰無輸焉

少陰無輸心不病乎

對曰其外經肺病藏不病故獨取其經於掌后兌骨之端也

○手少陰之脈起於掌中出屬心包下膈歷絡三焦其支者

循臂出脇下腋三寸上抵腋下循膈內行太陰少陰之間入

肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌

中循小指次指出其端是動則病手心熱肘臂變急腫甚

則臂脇支痛心中澹三大動而赤目黃善笑不休是主脈所

生病者煩心二痛掌中熱甚者則寸口大一倍於人迎虛者

則寸口反小於人迎也

○手少陰之別名曰內關去腕二寸出於兩筋間循經以上繫

於心包絡心系氣安則心痛虛則為煩心取之兩筋間

○心病煩悶少氣大熱熱盪心嘔吐欬逆狂言汗出如珠身

體厥冷其脈當浮今反沈濡而滑其色當赤而反黑者此是

水之刻火為大逆十死不治

小腸手太陽經病證第四

○小腸病者少腹痛腰脊控暈去而痛時窘之復其前熱若寒甚

獨有上熱及手小指次指之間熱者其候也

○少腹控暈引腰脊一衝心邪在小腸者連暈系屬於脊貫肝

肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於百結於厥

者故取之直原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨

虛下廉以去之按其所過之經以調之

○小腸有寒其人下重便膿血有熱必痔

○小腸有宿食當發熱明日復止

○小腸脹者少腹脹引腹而痛

○厥氣客於小腸則夢數色街穢

○手太陽之脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上

循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循膈外後廉出有解結

有甲交有上入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支

者從缺盆循頸上頰至目兌背却入耳中其支者別頰上頰
抵鼻至目內眦斜絡於顙是動則病噎痛頰腫不可以顧首
似按膈似折是主液所生病者耳聾目黃頰頰腫頭有膈肘
臂外後廉痛盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小
於寸口也

脾足大陰經病證第五

- 脾氣虛則四肢不用五藏不安實則脾脹溼漫不利
- 脾氣虛則夢飲食不足得其時則夢築垣蓋屋脾氣盛則夢
歌樂體重手足不舉厥氣客於脾則夢丘陵大澤墮至風雨
- 病在脾日眩慧平旦甚日中持下補靜
- 病先發於脾閉塞不通身痛體重一日之胃而腹脹二日之
腎少腹腰脊痛脛痠三日之膀胱皆脹筋痛小便閉十日不
已死人定夏夏食
- 脾脈搏堅而長其色黃當病少氣其裏而散色不澤者當病
足耐腫若水狀
- 脾脈沈之而滯浮之而虛者腹脹煩滿胃中有熱不嗜食食
而不化大便難四肢苦痺時不仁得之房內月使不來來而
頻併
- 黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子
同法得之疾使四肢汗出當風
- 寸口脈弦而滑弦則為痛滑則為實痛即為急實即為踴痛
踴相搏即腎腸捨急
- 跌陽脈浮而游浮即胃氣微溢即脾氣衰微長相搏即呼吸
不得此為脾家失度

寸口脈變緊即為入其氣不出無表有裏心下痞堅
跌陽脈微而游微即無胃氣游即傷脾寒在於膈而反下之
寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噎寒在胃膈上虛下
實穀氣不通為閉塞之病

寸口脈緩而遲緩則為陽其氣長遲則為陰寒氣促榮衛俱
和剛柔相得二脈相承其氣必強

跌陽脈滑而緊滑則胃氣實緊則脾氣傷得食而不消者此
脾不治也能食而腹不滿此為胃氣有餘腹滿而不能食心
下如飢此為胃氣不行心氣虛也得食而滿者此為脾家不
治

脾中風者翕三發熱形如醉人腹中煩重及肉瞶瞶而短氣
也

凡有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣候
陽離別陽不從陰故以三分候死生

脾氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止名曰脾
氣弱或五液注下青黃赤白黑病人鼻下平者胃病也微赤
者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治質黑者胃先病
微燥而渴者可治不渴者不可治臍反出者此為脾先落云

統○脾脹者善噦四肢急體重不能衣一作

脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

跌陽脈浮而游浮則胃氣強游則小便數浮游相搏大便則
堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而反不渴

凡人病脈以解而反暮微煩者人見病者差妄而強與殺脾
胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

○脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤久不愈病四肢不收黃糜食飲不為肌膚以冬壬癸日得之何也肝病傳脾脾當傳腎腎適以冬壬王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受因留結為積故知痞氣以冬得之

○脾病其色黃飲食不消腹苦脹滿體重節痛大便不利其脉微緩而長此為可治宜服平胃圓瀉脾圓菜重圓附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺大都季夏刺公孫秋刺商丘皆補之又當灸章門五十壯背第十一椎百壯

○脾病者必身重苦飢足痿不收素則作善肌行善瘦脚下痛虛則腹脹腸鳴漉食不化取其經足太陰陽明少陰並者邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹脹陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調其二里

○足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腓內脰胛骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病古本強食則嘔吐一作胃胃痛腹脹善噫得後與氣則快然而衰身體重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心下急痛寒瘧漉瀉油水閉

黃疸好卧不能食肉骨青強立股膝內痛厥足大指不用盛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎足大陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腹中切痛虛則鼓脹取之所別

○脾病其色黃體青失渡直視脣反張爪甲青飲食吐逆體重

節痛四肢不舉其脉當浮大而緩今反弦急其色當黃今反青此是木之刺土為大逆十死不治

胃足陽明經病證第六

○胃病者腹脹胃管當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里

○飲食不下隔塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之在下管則散而去

○胃脘搏堅而長其色赤當病折脾其要而散者當病食痺脾痛

○胃中有癥食冷物者痛不能食食熱即能

○胃脹者腹滿胃管痛鼻聞焦臭妨於食大便難

○診得胃脉病形何如曰胃實則脈虛則澀

○病先發於胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脛痠三日之膀胱背脛筋痛小便閉五日上之脾閉塞不通身痛體重上之六日不已死冬夜半後夏日跌作三日脉浮而乳浮則為陽乳則為陰浮乳相搏胃氣生熱其陽則絕

○跌陽脉浮者胃氣虛也跌陽脉浮大者此胃家微虛煩亂必日再行乳而有胃氣者脉注之大而更微按之乳故知乳而有胃氣也

○跌陽脉數者胃中有熱即消穀引食跌陽脉瀯者胃中有寒水穀不化跌陽脉澀澀而浮者其病難治跌陽脉浮者故

久病跌陽脉虛則遺溺實則失氣

○動作頭痛重熱煎朝者篤胃厥氣客於胃則夢飲食

○足陽明之脉起於鼻交頰中旁約太陽之脉下循鼻外入上齒牙還出俠口環唇下交承漿却循頰後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顛其支者從大迎前下入迎循喉嚨入缺盤下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣街中其支者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀間抵伏兔下入膝膕中下循胫外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者別附上入大指間出其端是動則病痿然振寒善伸數欠顏黑病至證人與人聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而敷其則欲上高而歌棄衣而走青鸞腹脹是為肝厥是主血物胃所生病者狂瘧瘵一作温淫汗出衄衄口喝唇緊頸腫喉痺大腹水腫膝膕痛循膺乳街股伏兔克厭足跗上臍胃痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢弱色黃氣不足則身以前皆寒懷胃中寒則脹滿盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

肺手大陰經病證第七

○肺氣虛則鼻息利少氣實則喘噦肯憑仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉二得其時則夢見丘戰肺氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客于肺則夢飛揚見金鐵之器守物
○病在肺下脯慧日中甚夜半靜
○病先發於肺喘欬三日之肝脇痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出
○肺脉搏堅而長當病垂血其濡而散者當病漏汗一作漉至今不復散發

○肺脉沈之而數浮之而喘苦洗三寒熱脹滿腸中熱小便赤有背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風白脉之至也喘而浮大上虛下實驚有積氣在管中喘而虛名曰肺痺寒熱得之因醉而使內也

○肺中風者口燥而喘身運而重胃而腫脹

○肺中寒者其人吐濁涕

○形寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行肺傷者其人勞倦則效唾血其脉細緊浮數皆吐血此為躁擾噴怒得之肺傷氣擁所致

○肺脹者虛而滿喘欬逆倚息自如脫狀其脉浮

○肺水者其人身體重而小便難時大便鴨溇肝乘肺必作虛

○脉乘而弱弱久在閏寒冬在顛浮反在上弱反在下浮則為陽弱則血不足必弱為虛浮弱自別浮則自出弱則為入浮則為出不入此為有表無裏弱則為入不出此為無表有裏陽出極汗齋腰而還此為無表有裏故名曰厥陽在當汗出不汗出

○跌陽脉浮緩少陽微緊微為血虛緊為微寒此為鼠乳其病為肺

○肺之積名曰息貫在右脇下覆大如杯久不愈病洒寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺肺當傳肝肝通以春壬壬者不受邪肺復欲還心不肯受因留結為積故知息貫以春得之肝病其色白身軀俱寒无熱時時效其脉微遲為可治宜服五味子大補肺湯為肺散春當

刺少商夏刺魚際甘瀉之季夏刺太淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當灸臚中百壯背第二椎二十五壯

肺病者必喘欬逆氣有息背痛汗出免陰股膝牽髀膈胛足皆痛虛則少氣不能報息耳聾噤乾取其經手太陽足太陽之外厥陰內少陰血者

邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣氣喘汗出欬動有背取之膺中外輪臂第三椎之傍以手痛按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

手太陽之脉起於中膈下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下循臚內行少陰心主之前下肘中後循臂內上貫下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨而喘欬缺盆中痛其則交兩手而發是為臂厥是主肺所生病者欬上氣喘

喝煩心背滿臚臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則有背痛風汗出小便數而欠氣虛則有背痛寒少氣不足以息溺色交卒遺失無度盛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

手太陽之別名曰列缺起於腋下腕上二分間別走陽明其別者並太陽之經直入掌中散入於魚際其實則手兌掌起虛則欠欬小便遺數取之去腕一寸半肺病身量有熱欬短氣唾出膿血其脈當短澁今反浮大其色當白而反赤者此是火之刻金為大逆十死不治

大腸手陽明經病證第八

○大腸病者腸中切痛而鳴濯二冬日重感于寒則泄當臚而

痛不能久立與胃同候取巨虛上廉腸中雷鳴氣上衝皆喘不能久立邪在大腸刺盲之原巨虛上廉三里

○大腸有寒驚瀉有熱便腸垢
○大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀
○大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

○厥氣客於大腸則夢田野
○手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉出合谷兩骨之間入兩筋之中循臂上廉入肘後廉循臚外前廉

上有出臚骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆直入上頸貫頰入下齒縫中還出俠口交人中左之右右之左上俠鼻孔是動則病齒痛頰腫是

主津所生病者目黃口乾乾咽喉痺肩前臚痛大指次指痛不用氣盛有餘則常麻所過者熱腫虛則寒慄不復感者則人迎大二倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

腎足少陰經病證第九

○腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑腎氣虛則夢見舟船溺人得其夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬

厥氣客於腎則夢臨淵沒居水中
○病在腎夜不安慧日乘四季其下腑靜
○病先發於腎少腹腰脊痛脛痠三日之勝脫背股筋痛小便閉二日之上之心心痛三日之小腸脹四日不已死冬大食夏晏哺

○腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其突而散者當病少血

○腎脉沈之大而堅浮之大而緊若手足骨腫厥而陰不具腰脊痛小腹腫心下有水氣時脹則時得之浴水中身未乾而合房內及勞倦發之

○黑脉之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎痺得之沐浴清水而卧

○凡有所用力率重若入房過度汗出如浴水則傷腎腎脹者腹滿引背央三然腰髀痛

○腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻頭汗其足逆寒大便反堅

○腎者之為病從腰以下冷腰重如帶五千錢

○腎者之病其人身體重腰中冷如水狀一作如水流狀一作如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故是其證也病屬下臍從身勞汗出衣裏冷濕故又得之

○腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨癢少氣以夏丙丁日得之何也脾病傷腎腎當傷心心適以夏王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受因留結為積故知奔豚以夏得之水流夜疾何以故

師曰土休故流疾而有聲人亦應之人夜卧則脾不動搖脉為之數疾也

○腎病其色黑其氣虛弱吸二少氣兩耳若聾腰痛時失精飲食減少膝以下清其脉沈滑而遲此為可治宜服內補散

建中湯腎氣圓地黃煎香當刺涌泉秋刺伏留夏刺陰谷皆補之夏補之夏刺然谷去夏刺大溪皆瀉之又當灸京門五

十壯督第十四椎百壯

○腎病者必腹大臍腫痛喘欬身重汗出如憎風虛即背脊中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少陰大陽血者

○邪在腎則骨痛陰痺陰痺者按之而不得腫脹腰痛大便難有皆頸項強痛時眩取之涌泉窻窻視有血者取之

○足少陰之脉起於小指之下斜趨足心出然骨之下循內踝之後別入跟中以上膈內出膈中內廉上股內後廉貫脊為腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本其

支者從肺出絡心注膻中是動則病飢而不欲食面黑如炭色一作色欬唾則有血喉鳴而喘坐而欲起目眈眈無所見心

懸若飢狀氣不足則善恐心惕二若人將捕之是為骨厥一作痿是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗝乾及痛煩心

痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛灸則強食而生害一作緩帶被髮大杖重覆而寒盛者則寸口大再

倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

○足少陰之別名曰大鍾當踝後緣跟別走太陽其別者並經上走於心包下貫腰脊其病氣逆則煩悶突則閉癰虛則腰

痛取之所別腎病手足逆冷面赤目黃小便不禁骨節煩疼少腹結痛氣衝於心其脈當沈細而滑今反浮大其色當黑而反黃此是土之刻水為大逆十死不治

○膀胱足太陽經病證第十

○膀胱病者少腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得有上熱若脉陷足小指外側反脛踵後皆熱若脉陷者取委中

○膀胱脹者少腹滿而氣墜

○病先發於膀胱者皆服筋痛小便閉五日之腎少腹腰脊痛

脛痠一日之小腸脹一日之脾閉塞不通身痛體重二日不

已死冬雞鳴夏下晡日云

○厥氣客於膀胱則夢遊行

○足太陽之脉起於目内眦上額交頰上其支者從頰至耳上

角其直者從頰入絡腦還出別下項循有腭内俠脊抵腰中

入膂脊絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫腎入

膂中其支者從膂内左右別下貫髓一作過膂樞膂外後

廣過下合膂中以下貫膂内出外踝之後循京骨至小指外

側是動則病衝頭痛目似眩項似按脊痛腰似折髀不可以

曲膂如結膂如列是為蹠厥是主筋所生病者痔瘡狂顛疾

頭腦頂痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膂膂脚管痛小指不用

盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

二膂手少陽經病證第十一

○二膂病者膂脹氣滿小腹充堅不得小便寤急溢則為水留
則為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見於臑
取委陽

○少腹病腫不得小便邪在三膂約取太陽大絡視其結脉與
厥陰小絡結而血者腫上及胃管取三里

○三膂脹者氣滿於皮膚殼三然而堅不疼熱在上膂因然為
肺痿熱在中膂因堅熱在下膂因溺血

○手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕
出臂外兩骨之間上貫肘循膂外上肩而交出足少陽之後

入缺盆交膂中散絡心包下膂徧屬三膂其支者從膂中上
出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以益下額至顛其支者

從耳後入耳中出走耳前過客主人煎頰至目兌皆是動
則病耳聾輝二焯三噬腫喉痺是主氣所生病者汗出目兌
皆痛類腫耳後有膂肘臂外皆痛小指次指不用盛者則人
迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

新刊王氏脉經卷第六

新刊王氏脉經卷第七

黃帝 靈樞 素問

觀數奪此種聖書秘開則登閣禁院上護軍臣林億等類次

病不可發汗證第一

病可發汗證第一

病發汗以後證第三

病不可吐證第四

病可吐證第五

病不可下證第六

病可下證第七

病發汗吐下以後證第八

病可溫證第九

病不可灸證第十

病可灸證第十一

病不可刺證第十二

病可刺證第十三

病不可水證第十四

病可水證第十五

病不可火證第十六

病可火證第十七

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證第十八

重實重虛陰陽相附生死證第十九

熱病生死期日證第二十

熱病十逆死日證第二十一

熱病五藏氣絕死日證第二十二

熱病至脉死日證第二十三

熱病損脉死日證第二十四

病不可發汗證第一

少陰病脉細沈數病為在裏不可發其汗

脉浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脉遲者不可發其汗何以知然此為榮氣不足血微少故也

少陰病脉微而微弱不可發其汗無陽故也

脉濡而弱弱反在關濡反在顯微反在止澀反在下微則陽氣不足澀則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澀則無血

厥而且寒陽微發汗躁不得眠

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運

惡寒食即反吐穀不得前一云穀不消化

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣微絕手足逆冷欲得蹠

卧不能自溫

諸脉數動微弱並不可發汗發汗則大便難腹中乾一云小便乾

中胃燥而煩其形相象根本異源

脉濡而弱弱反在關濡反在顯微反在上微反在下弦為陽

運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛不可發汗發汗

則寒慄不能自還發者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利

心中飢煩晡時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發

汗濇而苦滿一作腹中復堅

厥不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎穀不得前

諸逆發汗微者難愈劇者言亂眩者死命將難全太陽病

得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多寒少其人不嘔清便

續自可一日再三發其脈微而惡寒此為陰陽俱虛不可復

發汗也

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱則無陽也不可復發其

汗咽乾燥者不可發汗

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

衄家不可攻其表汗出必額暈脈上促急而緊直視而不能

胸不得眠

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰痿可與禹餘糧圓

淋家不可發汗發其汗必便血

瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則痊一作癰

冬時發其汗必吐利口中爛生瘡

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

欬而小便利若失小便不可攻其表汗出則厥逆冷汗出多

極發其汗亦堅

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深者

熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發其汗必口傷爛赤

病人脈數數為有熱常消穀引食反吐者醫發其汗陽微膈

氣虛脈則為數數為客陽不能消穀胃中虛冷故令吐也

傷寒四五日其脈沈煩而喘滿脈沈者病為在裏反發其汗

津液越出大便為難表虛裏實久則譫語

傷寒頭痛拿拿發熱形象中風常微汗出又自嘔者下之益

煩心懊憹如飢發汗則致瘥身強難以屈伸熯之則發黃不

得小便久則發欬唾

太陽病發其汗因致瘥

傷寒脈弦細頭痛而反發熱此為少陽少陽不可發其汗

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結背心下痞堅者

不可發其汗

少陰病發而下利譫語者此被火氣劫故也小便必難以強

責少陰汗也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從

口鼻或從目出一一作耳目者是為下厥上竭為難治

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脈異經病雖俱傷於

風其人自有痼疾則不得同法其人素傷於風因復傷於熱

風熱相薄則發風溫四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在

少陰厥陰不可發汗汗出譫言獨語內煩躁擾不得臥驚

目亂無精治之復發其汗如此者醫殺之也

傷寒濕溫其人常傷於濕因而中腸濕熱相薄則發濕溫病

若兩脛逆冷腹滿又背頭目痛苦妄言治在足太陰不可發

汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色萎名曰重暈

如此者死醫殺之也出右一首

病可發汗證第一

大法春夏宜發汗

九發汗欲令手足皆周至數聚一時間益佳但不欲如水流

離若病不鮮當重發汗汗多則下陽陽虛不得重發汗也

九服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

九云可發汗而無湯者圍散亦可用要以汗出為解然不如湯隨證良

大陽病外證未解其脉浮弱當以汗解宜桂枝湯

大陽病脉浮而數者可發其汗屬桂枝湯證

陽明病脉遲汗出多微惡寒表為未解可發其汗屬桂枝湯

夫病脉浮大問病者言但堅耳設利者為虛大逆緊為實汗

出而解何以故脉浮當以汗解

傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必謔語弱有發熱脉

浮解之當汗出愈

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發熱此屬陽明脉浮

虛者當發其汗屬桂枝湯證

病常自汗出此為榮氣和榮氣和而外不解此衛不和也榮

行脉中為陰主內衛行脉外為陽主外復發其汗衛和則愈

屬桂枝湯證

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其

時發汗即愈屬桂枝湯證

脉浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱

病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病不解熱結膀胱其人如強血必自下下者即愈其外

未解者尚未可攻當先解其外屬桂枝湯證

太陽病下之微喘者表未解故也屬桂枝加厚朴杏子湯證

傷寒脉浮緊不發其汗因衄屬麻黃湯證

太陰病脉浮者可發其汗屬桂枝湯證

大陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解表候續

在此當發其汗服湯微除發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以

然者陽氣重故也屬麻黃湯證

脉浮者病在表可發其汗屬桂枝湯證

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反青一作便

請此為不在裏故在表也當發其汗頭痛者必衄屬桂枝湯證

下利後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

大陽病頭痛發熱汗出惡風若惡寒屬桂枝湯證

大陽中風陽浮而陰濡弱者自發濡弱者汗自出當

惡寒浙折惡風拿拿發熱鼻鳴乾嘔屬桂枝湯證

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風屬桂

枝湯證

太陽病下之氣上衝可與桂枝湯不衝不可與之

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者法當先刺風池風府却

與桂枝湯則愈

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發責脈氣從少腹上

衝心者灸其核上一壯與桂枝加桂湯

太陽病項背強几几反汗出惡風屬桂枝加葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風屬葛根湯

太陽與陽明合病而自利不嘔者屬葛根湯證

太陽與陽明合病不下利但嘔屬葛根加半夏湯

太陽病桂枝證醫久下之遂利不止其脉促者表未解喘而

汗出屬葛根黃芩黃連湯

太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘屬
麻黃湯證

太陽與陽明同病喘而骨滿不可下也屬麻黃湯證

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁頭痛
屬大青龍湯脈微弱汗出惡風不可服之服之則厥筋傷肉

關此為逆也

傷寒脈浮緩其身不疼但重者有輕時無少陰證者大青龍
湯發之

傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或嘔或
小便不利小腹滿或微喘屬小青龍湯

傷寒心下水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者此寒
去欲為解屬小青龍湯證

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣
不通一作按鼻乾不得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮
熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮與

小柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不渴腹滿加噦不治

太陽病十日以去脈浮細嗜臥此為外解設胃滿脇痛與小
柴胡湯脈浮者屬麻黃湯證

中風往來寒熱傷寒五六日以後骨脇苦滿嘿嘿不欲飲食
煩心喜嘔或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞堅或

心中悸小便不利或不渴外有微熱或欬者屬小柴胡湯

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴屬小
柴胡湯證

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未

去者屬柴胡桂枝湯

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無
證故微發汗也

脈浮小便不利微熱消渴與五苓散利小便發汗

病發汗以後證第三

一陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽
明續自微汗出不惡寒若太陽證不能不可下下之為逆如

此者可小發其汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解
之熏之若發汗不大徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗而不

汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其
人短氣但坐汗出而不徹故也更發其汗即愈何以知其汗

不徹脈澀故以知之

未持脈時病人以手自冒之師因教試令欬而不即效者此
必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口為逆若重發其汗必吐下不止

陽明病本自汗出豎復重發其汗病已差其人微煩不了了
此大便堅也以亡津液胃中乾燥故令其取當問小便日幾

行若本且二四行今日再行者必知大便不久出今為小便
數少津液當還入胃中故知必當大便也

發汗多又復發其汗此為亡陽若譫語脈短者死脈自和者
不死

傷寒發其汗身自為黃所以然者寒濕相搏在裏不詳故也
病人有寒復發其汗胃中冷必吐衄

太陽病發其汗遂瀉而不止其人惡風小便難四肢微急難
以屈伸屬桂枝加附子湯

服桂枝湯大汗出若脈但洪大與桂枝湯若其形如瘥一日
再發汗出便解屬桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出大煩渴不解若脈洪大屬白虎湯
傷寒脈浮自汗出小便數煩復仲景類伏微惡寒而脚蹇急

反與桂枝欲攻其表得之便厥咽乾煩燥吐逆當作甘草乾
薑湯以後其陽厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸
而胃氣不和謔語可與承氣湯重發其汗復加燒針者屬四

逆湯
傷寒發汗已解半日許復煩其脈浮數可復發其汗屬桂枝
湯證

發汗後身體疼痛其脈沈遲屬桂枝加芍藥生薑人參湯
發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱可以麻黃杏仁

甘草石膏湯
發汗過多已後其人叉手自冒心心中悸而欲得按之屬桂
枝甘草湯

發汗後其人臍下悸欲作貴脈屬茯苓桂枝甘草大棗湯
發汗後腹脹滿屬厚朴生薑半夏甘草人參湯

發其汗不暍而反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯不惡
寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯

太陽病發汗若大汗出胃中燥煩不得眠其人欲飲水當稍
飲之令胃中和則愈

發汗已脈浮而數復煩渴者屬五苓散

傷寒汗出而渴屬五苓散證不渴屬茯苓甘草湯
太陽病發其汗汗出不解其人發熱心中悸頭眩身憊而動

振振欲擗地屬真武湯
傷寒汗出解之後胃中不和心中痞堅乾噦食且脇下有水
氣腹中雷鳴而利屬生薑瀉心湯

傷寒發熱汗出不解後心中痞堅嘔而下利屬大柴胡湯
太陽病二日發其汗不解蒸蒸發熱者屬於胃也屬承氣湯

大汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆而惡寒屬四逆湯
發汗多亡陽謔語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通
津液後自愈

病不可吐證第四
太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細
而數此腎吐之過也若得病一日二日吐之腹中飢口不能

食三四日吐之不喜糜粥飲食冷食朝食暮吐此腎吐之
所致也此為小逆

太陽病吐之者但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此
為吐之內煩也

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足
寒脈弦遲此皆中實不可下若膈上有寒飲乾嘔者不可吐

當溫之
諸四逆厥者不可吐之虛家亦然

病可吐證第五
大法春宜吐

九服湯吐中病便止不必盡劑也

病如桂枝證其頭不痛項不強寸口脈微細胃中痞堅氣上
撞咽喉不得息此為曾有寒當吐之

病者上膈實胃中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有濁
唾下利日十餘行其脈反遲寸口微滑此可吐之吐之利即止

少陰病飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐當速吐之宿
食在上膈當吐之

病者手足厥冷脈乍緊邪結在胃中心下滿而煩飢不能食
病在胃中當吐之

病不可下證第六

脈濡而弱弱反在關濡反在顛微反在上澀反在下微則腸
氣不足澀則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩澀則無血

厥而且寒陽微不可下下之則心下痞堅

動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸

動氣在左不可下下之則腹裏拘急食不下動氣反劇身雖
有熱則反欲飲

動氣在上不可下下之則掌極熱煩身浮冷熱汗自泄欲水
自灌

動氣在下不可下下之則膝滿卒起頭眩食則下清穀心下
痞堅

咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下卧則欲蹠身

體急痛復下利日十數行

諸外實不可下下之則發微熱亡脈則厥當臍極熱

諸虛不可下下之則渴引水者易愈惡水者劇

脈濡而弱弱反在關濡反在顛弦反在上微反在下弦為陽

運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛虛者不可下微
則為欬欬則吐涎沫下之欬則止而利不休胃中如蠶齧粥
入則出小便不利兩脇拘急喘急為難頸背相牽臂則不仁
極寒及汗出軀冷若水眼睛不慧語言不休數氣多入則為
除中口雖欲言舌不得前

脈濡而弱弱反在關濡反在顛浮反在上數反在下浮則為
陽虛數則為無血浮則為虛數則生熱浮則為虛自汗而惡

寒數則為痛振而寒慄微弱在關胃下為急喘汗不得呼吸
呼吸之中痛在於脇振寒相搏其形如癡醫反下之令脈急

數發熱狂走見鬼心下為痞小便淋瀝少腹甚堅小便血也
脈濡而眩濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡

寒寒緊胃氣冷微嘔心內煩醫以為大熱鮮肌而發汗亡陽
虛煩躁心下苦痞堅裏裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚

悵快不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施及水灌
其身客熱應時罷燥燥而振寒重被而獲之汗出而胃顛體

暢而又振小便為微難寒氣因水發清殺不容聞嘔變反腸
出顛倒不得安手足為微逆身冷而內煩遂欲從後救安可
復追還

脈浮而大浮為氣實大為血虛血虛為無陰孤陽獨下陰部
小便難胞中虛全反小便利而大汗出法衛家當微令反更

實津液四射榮竭血盡干煩不眠血薄肉消而成暴液醫復
以毒藥攻其胃此為重虛客腸去有期必下如汚泥而死

跌陽脈遲而緩胃氣如經跌陽脈浮而數浮則傷胃數則動
脾此非本病醫持下之所為也榮衛內陷其數先微脈反但

浮其人必堅氣噫而除何以言之脾脉本緩今數脉動脾其數先微故知脾氣不治大便堅氣噫而除今脉反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如前仲景前字作法病者則飢數脉不時則生惡瘡脉數者久數不止則邪結正氣不能復正氣却結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脉數者不可下下之必煩利不止少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱澀者復不可下之

脉浮大應發其汗醫反下之此為大逆

脉浮而大心下反堅有熱屬截攻之不全微汗屬府溲數則堅汗多即愈汗少便難脉遲尚未可攻

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明欲自汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之為逆

結骨證其脉浮大不可下下之即死

太陽與陽明合病喘而實滿不可下之

太陽與少陽併病心下痞堅頸項強而眩勿下之

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

病欲吐者不可下之

大陽病有外證未解不可下下之為逆

病發於陽而反下之熱入因作結骨發於陰而反下之因作瘡瘡脉浮堅而下之緊反入裏因作瘡

夫病陽多者熱下之則堅

本虛攻其熱必

無陽陰強而堅下之必清穀而腰滿

大陰之為病腹滿而吐食不下下之益甚腹時自痛肯下結堅

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食甚者則欲吐下之不肯止

少陰病其人飲食入則吐心中温温欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲此胃中實不可下也

傷寒五六日不結骨腹滿脉虛微厥者不可下下之亡血死

傷寒發熱但頭痛微汗出發其汗則不識人熯之則喘不得小便心腹滿下之則短氣而腹滿小便難頭痛背強加温針則必衄

傷寒其脉陰陽俱緊瘧寒發熱則脉欲厥厥者脉初來大漸漸小更來漸大是其候也惡寒甚者拿拿汗出喉中痛熱多者目赤睛不慧豎發發之咽中則傷若復下之則兩目閉塞多清穀熱多便膿血重之則發黃熯之則咽燥小便利者可救難者必危殆

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃臯衄不可制食水者必嘔惡水者厥下之咽中生瘡假令手足温者下重便膿血頭痛目黃者下之目閉食水者下之其脉必厥其聲啞咽喉塞發其汗則戰慄陰陽俱虛惡水者下之裏冷不嗜食大便完穀出發其汗口中傷舌上胎滑煩躁厥數實不大便六七日後必便血復發其汗小便即自利

得病二三者脉弱無太陽柴胡證而煩躁心下堅至四日雖能食以承氣湯少與微和之今小安至六日與承氣湯一升不大便六七日小便少者雖不大便但頭堅後溲未定成其

堅攻之必唐當須小便利定堅乃可攻之

撒結無陽證寒而不執傷寒論云不其人反靜舌上胎滑者

不可攻也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅不可與若不大便六七日

日恐有燥屎欲知之法可少與小承氣湯腹中轉矢氣者此

為有燥屎乃可攻之若不轉矢氣者此但頭堅後溇不可攻

之攻之必腹滿不能食飲水者即噦其後發熱者必復堅

以小承氣湯和之若不轉矢氣者慎不可攻之

陽明病身合色赤者不可攻也必發熱色黃者小便不利也

陽明病當心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者死止者愈

陽明病自汗出若發其汗小便自利此為內竭雖堅不可攻

之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及猪膽汁皆

可以導

下利其脉浮大此為虛以強下之故也設脉浮重因爾腸鳴

屬當歸四逆湯

病可下證第七

大法秋宜下

九可下者以湯勝圓散中病便止不必盡三服

陽明病發熱汗多者急下之屬大柴胡湯

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之屬承氣湯

少陰病六七日腹滿不大便者急下之屬承氣湯證
少陰病下利清水色青者心下必痛口乾燥者可下之屬大
柴胡湯承氣湯證

下利三部脉皆平按其心下堅者可下之屬承氣湯證

陽明與少陰合病而利脉不負者為順負者失也互相刺賊

為負

滑而數者有宿食當下之屬大柴胡承氣湯證

傷寒後脉沈沈為內實注云云脉沈實下之解屬大柴胡湯證

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者

此為實急下之屬大柴胡湯承氣湯證

太陽病未解其脉陰陽俱沈必先振汗出解但陽微者先汗

之而解但陰微者先下之而解屬大柴胡湯證作尺索

脉雙弦遲心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之屬承氣湯證

結背者項亦強如柔痙狀下之即和

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之屬大柴胡湯證

太陽病六七日表證續在其脉微沈反不結背其人發狂此

熱在下厥少腹當堅而滿小便自利者下血乃愈所以然者

以太陽隨經瘀熱在裏故也屬抵當湯

太陽病身黃其脉沈結少腹堅小便不利為無血小便自利

其人如狂者血證諦屬抵當湯證

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此為血當下之

屬抵當圓證

陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃但頭汗出其身無

有齋頸而還小便不利渴引水疑此為瘀熱在裏身必發黃

屬茵陳蒿湯

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜
忘雖堅大便必黑屬抵當湯證汗出而譫語者有燥屎在胃

中此風也過經乃可下之若早語言亂以表虛裏實故也下之則愈屬大柴胡湯承氣湯證

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日脯所發者屬陽明脉實者當下之屬大柴胡湯承氣湯證

陽明病謔語有潮熱而反不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳屬承氣湯證

太陽中風下利嘔逆表解乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引腹下痛嘔則短氣汗出不惡寒此為表解裏未和屬十棗湯

太陽病不解執結勝脫其人如狂血自下下之即愈其外未解尚未可攻當先解外外解小腹痛急結者乃可攻之屬桃人承氣湯

傷寒七八日身黃如橘小便不利少腹微滿屬茵陳蒿湯證傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱屬大柴胡湯證但結胃無大熱此為水結在胃脇頭微汗出與大陷胸湯

傷寒六七日結胸熱實其脉沈緊心下痛按之如石脈更大大陷胸湯

陽明病其人汗多津液外出胃中燥大便必堅堅者則謔語屬承氣湯證

陽明病不吐下而心煩者可與承氣湯

陽明病其脉遲雖汗出而不惡寒其體一本必重短氣腹滿而喘有潮熱如此者其外為解可攻其裏若手足濇然汗出者此大便已堅屬承氣湯其熱不潮未可與承氣湯若腹滿大而大便者屬小承氣湯微和胃湯勿令至大下

陽明病謔語發潮熱其脉滑疾如此者屬承氣湯因與承氣湯一升腹中轉矢氣者復與一升如不轉矢氣者勿更與之明日又不大便脉反微澀者此為裏虛為難治不可更與承氣湯

一陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱汗出大便難而謔語者下之愈屬承氣湯證

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也屬承氣湯證

病發汗吐下以後證第八師曰病人脉微而澀者此為醫所病也大發其汗又數大下之其入亡血病當惡寒而發熱無休止時夏月盛熱而與神

雖著覆衣冬月盛寒而與神神裸其體所以然者陽微即惡寒陰弱即發熱故神神發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故

與神神著覆衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故與神神裸其體又陰脉遲澀故知亡血

太陽病三日已發其汗吐下溫針而不解此為壞病桂枝復不中與也觀其脉證知犯何逆隨證而治之

脉浮數法當汗出而愈而下之則身體重心悸不可發其汗當自汗出而解所以然者尺中脉浮此裏虛須表裏實津液和即自汗出愈

九病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者自愈大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便利必自愈

下以後復發其汗必振寒又其脉微細所以然者內外俱虛

故也

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因冒冑家
當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和然後下之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫再三下之不能多
作食其人脇下滿面目及身黃頸項強小便難與柴胡湯後
必下重本渴飲水而嘔柴胡湯復不中與也食穀者噦

太陽病二三日終不能卧但欲起者心下必結其脈微弱者
此本寒也而反下之利止者必結實未止者四五日復重下
之此挾熱利也

太陽病下之其脈促不結實者此為欲解其脈浮者必結實
其脈緊者必咽痛其脈弦者必兩脇拘急其脈細而數者頭
痛未止其脈沈而緊者必欲嘔其脈沈而滑者挾熱利其脈

浮而滑者必下血
太陽少陽併病而反下之成結實心下堅下利不復止水漿
不肯下其人必心煩

脈浮緊而下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳
傷寒吐下發汗虛煩脈甚微八九日心下痞堅脇下痛氣上
衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必噦所以然
者胃中虛冷故也

陽明病脈遲食難用飽飽即發煩頭眩者必小便難此欲作
穀疸雖下之其腹滿如故耳所以然者脈遲故也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心
下痞者此為贗下之也

傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人外氣憊鬱復與之水
以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也
吐下發汗後其人脈平而小煩者以新虛不勝穀氣故也
太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞此表裏
俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加火針因而煩面色青黃
膚潤如此者為難治全色微黃手足溫者易愈
服桂枝湯下之頭項強痛拿拿發熱無汗心下滿微痛小便
不利屬桂枝去桂加茯苓木湯

太陽病先發其汗不鮮而下之其脈浮者不愈浮為在外而
反下之故令不愈今脈浮故在外當解其外則愈屬桂枝湯
下以後復發其汗者則晝日煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴
而無表證其脈沈微身無大熱屬乾姜附子湯

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞骨起即頭眩其脈沈緊
發汗即動經身為振搖屬茯苓桂枝木甘草湯

發汗吐下以後不鮮煩躁屬茯苓四逆湯
傷寒發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹屬
梔子湯若少氣梔子甘草湯若嘔梔子生薑湯若腹滿者梔
子厚朴湯

發汗若下之煩熱胃中寒者屬梔子湯證
太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胃中痛大便反溇其
腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者與承氣湯不尔者不可
與於嘔胃中痛微溇此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日
晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胃湯

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日
晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胃湯

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日
晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胃湯

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日
晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胃湯

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日
晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胃湯

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日
晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胃湯

太陽病重發其汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日
晡所小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近屬大陷胃湯

傷寒五六日其人已發汗而復下之背脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解屬柴胡桂枝乾姜湯

傷寒汗出若吐下解後心下痞堅噎氣不除者屬旋代赭湯。大下已後不可更行桂枝湯汗出而喘无大熱可以麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解也不可攻其痞當先解表解乃攻其痞解表屬桂枝湯攻痞屬大黃黃連瀉心湯

傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡風大渴舌上乾燥而煩飲水數升屬白虎湯

傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼神之狀若劇者發則不識人循衣妄撮怵惕不安微喘直視脉弦者生澁者死微者但發熱譫語屬承氣湯若下者勿復服

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺溺發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷自汗屬白虎湯證

陽明病其脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反偏惡熱其身軀重發其汗即躁心憤二而反譫語加溫針必休惕又煩躁不得眠下之即胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者屬梔子湯證

陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊懣若飢不能食但頭汗出屬梔子湯證

陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微

滿頭堅後溲者不可下之有燥屎者屬承氣湯證

太陽病吐下發汗後微煩小便數大便因堅可與小承氣湯和之則愈

大汗若大下而厥冷者屬四逆湯證

太陽病下之其脉促肯滿者屬桂枝去芍藥湯若微寒屬桂枝去芍藥加附子湯

傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者未欲解也屬梔子湯證

傷寒下後煩而腹滿卧起不安屬梔子厚朴湯

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩屬梔子乾姜湯

傷寒醫下之續得下利清穀不止身軀疼痛急當救裏身軀疼痛清使自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

太陽病過經十餘日反再下之後四五日柴胡證續在先與小柴胡湯嘔止小安嘔不止心下急其人譫二微煩者為未解與大柴胡湯下者止

傷寒十三日不解肯脇滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本當柴胡湯下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後屬柴胡加芒消湯

傷寒十三日過經而證語內有熱也當以湯下之小便利者大便當堅而反利其脉調和者知醫以丸藥下之非其治也

自利者其脉當微厥全反和者此為內實屬承氣湯證

傷寒八九日下之肯滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側屬柴胡加龍骨牡蠣湯

傷寒八九日下之肯滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側屬柴胡加龍骨牡蠣湯

火逆下之因燒針煩躁屬桂枝甘草龍車牡蠣湯

大陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為

虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒其表未解豎反下之動數

則逢頭痛即眩一云膈胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中

懊懣陽氣內陷心下因堅則為結實屬大陷胷湯若不結實

但頭汗出其餘无有奇頸而还小便不利身必發黃

傷寒五六日嘔而發熱柴胡湯證具而以佐藥下之柴胡證

仍在復与柴胡湯此雖以下不為逆也必蒸三而振却發熱

汗出而解若心下滿而堅痛者此為結實屬大陷胷湯若但

滿而不痛者此為痞柴胡復不中与也屬半夏瀉心湯

本以下之故心下痞与之瀉心其痞不解其人渴而口燥小

便不利者屬五苓散一方言忍之一日乃愈

傷寒中風豎及下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴

心下痞堅而滿乾嘔而煩不能得安豎見心下痞為病不

復重下之其痞益甚此非結熱但胃中虛客氣上逆故使之

堅屬甘草瀉心湯

傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯已後以佐藥

下之利不止豎以理中与之利益其理中理中膳此利在下

膈屬赤石脂禹餘糧湯若不止者當利其小便

大陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止心下痞堅表

裏不解屬桂枝人參湯

傷寒吐後腹滿者与承氣湯

病者无表裏證發熱七八日脈雖浮數者可下之假令下已

脈數不解今熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘵屬

抵當湯若脈數不解而不止必夾血便膿血

大陽病豎及下之因腹滿時痛為屬太陰屬桂枝加芍藥湯

大實痛屬桂枝加大黃湯

傷寒六七日其人大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至喉

咽不利唾膿血泄利不止為難治屬麻黃升麻湯

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更速吐一本作更食入即

出屬乾姜黃芩黃連人參湯

病可溫證第九

大法冬宜服溫熱藥及灸

師曰病發熱頭痛脈反沈若不差身體更疼痛當救其裏宜

溫藥四逆湯

下利腹痛身體疼痛先溫其裏宜四逆湯

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當溫之宜四逆輩

少陰病其人欲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之

手足寒脈弦遲若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當溫之宜四

逆湯

少陰病脈沈者急當溫之宜四逆湯

下利飲食者就當溫之

下利脈遲緊者為痛未欲止當溫之得冷者滿而便腸垢

下利其脈浮大此為虛以強下之故也設脈浮革因爾腸鳴

當溫之宜當歸四逆湯

少陰病下利脈微澀者即嘔汗出必數更衣反少當溫之

傷寒醫下之續得下利清穀不止身微疼痛急當救裏宜溫

之以四逆湯

病不可灸證第十

微數之脉慎不可灸因火為邪則為煩逆直虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力傷骨傷筋血難復也

脉浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從腰以下必當量而痺此為火逆若欲自解當先煩煩乃有汗隨汗而解何以知之脉浮故知汗出當解

脉浮熱甚而灸之此為實實以虛治因火而動咽燥必唾血

病可灸證第十一

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發背脈氣從少腹上撞者灸其核上一壯一本作與桂枝加桂湯

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死脉不至者灸其少陰七壯

少陰病下利脉微濇者即嘔汗出必數更衣反少當溫其上灸之可五十壯

諸下利皆可灸足大都五壯二云商丘陰陵泉皆三壯

下利手足厥無脉灸之不溫反微喘者死少陰負跌陽者為順也

傷寒六七日其脉微手足厥煩躁其厥陰厥不還者死傷寒脉促手足厥逆可灸之為可灸少陰厥陰主逆

病不可刺證第十二

大怒無刺一作新 已刺無怒一作新 新內無刺

大勞無刺一作新 已刺無勞

大醉無刺 已刺無醉

大飽無刺

大飢無刺

無刺大驚

無刺大驚

已刺無飽 大飢無刺 已刺無飢

大渴無刺 已刺無渴 無刺大驚

無刺大驚 無刺大驚 無刺大驚

皆爭者勿刺也其可刺者急取之不汗則溲所謂勿刺者有死徵也無刺病與脉相逆者上工刺未生其次刺未盛其次刺已衰粗工逆此謂之伐形此九

病可刺證第十三

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再經者當針足陽明使經不傳則愈

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府乃却與桂枝湯則愈

傷寒腹滿而譫語寸口脉浮而緊者此為肝乘脾名縱當刺期門

傷寒發熱當發惡寒其人大渴欲飲酢漿者其腹必滿而自汗出小便利其病欲解此為肝乘脾名曰橫當刺期門

陽明病下血而譫語此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而瀉之澱然汗出者則愈

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脉遲身涼肯脇下滿如結背狀其人譫語此為熱入血室當刺期門隨其虛實而取之平病云熱入血室無犯胃氣及上三焦與此相反豈謂藥不謂針耶

太陽與少陽併病頭痛項強而眩時如結胃心下痞堅當刺大杼第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語譫語則眩弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

肺弦證語五日不止當刺期門

少陰病下利便膿血者可刺

婦人傷寒懷身腹滿不得小便加從腰以下重如有水氣狀
懷身七月太陽當養不養此心氣實當刺為勞宮及關元小
便利則愈

傷寒喉痺刺手少陰少陰在腕當小指後動脈是也針入三
分補之

問曰病有汗出而身熱煩滿煩滿不為汗解者何對曰汗出
而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥也太
陽主氣故先受邪少陰與為表裏也得熱則上從之從之則
厥治之表裏刺之飲之湯

熱病三日氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以寫其熱
而出其汗實其陰以補其不足所謂五十九刺者兩手外內
側各三九十二痛五指間各一九八痛足亦如是頭入髮一
寸傍三分各三九六痛更入髮三寸邊各五九十痛耳前後
口下項中各一九六痛額上一

熱病先膚痛窒塞充面取之皮以第一針五十九可菌為乾
奇刺一云鼻索皮於肺不得索之火火心也

熱病啞乾多飲善驚臥不能安取之膚肉以第六針五十九
目眦赤索肉於脾不得索之木木肝也

熱病而骨脇痛手足躁取之筋間以第四針對於四達一作逆
筋辟目浸索筋於肝不得索之金金肺也

熱病數驚瘈瘲而狂取之脈以第四針急寫有餘者癩疾毛
髮去索血脈於心不得索之水水腎也

熱病而身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四針五十九骨

病食齧牙齒耳清索骨於腎無一本得索之土土脾也

熱病先身溼傍飲傍飲數大煩悶乾腎取之以第一針五十
九膚脹口乾寒汗

熱病頭痛攝頰一作目脈緊善衄厥熱也取之以第三針視
有餘不足寒熱病
熱病體重腸中熱取之以第四針於其輸及下諸指間索氣
於胃絡得氣也
熱病使臍痛急骨脇支滿取之湧泉與太陽陽明一云陰以
第四針針啞裏
熱病而汗且出反脈順可汗者取之魚際太陽大都太白寫
之則熱去補之則汗出汗出太甚者取踝上橫文以止之
熱病七日八日脈口動喘而眩者急刺之汗且自出淺刺手
大指間
熱病先骨脇痛手足躁刺足少陽補手太陽瘧甚為五十九刺
熱病先手臂痛刺手陽明太陽而汗出止
熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止
熱病先身重骨痛耳聾目瞑刺足少陰病甚為五十九刺云
陽少
熱病先眩冒而熱骨脇痛刺足少陰少陽
熱病始足脛者先取足陽明而汗出
病不可水證第十四
殺汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘
傷寒大吐大下之極虛復極汗者其人大氣怫鬱復與之水
以發其汗因得瘳所以然者胃中寒冷故也

陽明病潮熱微堅可以承氣湯不堅勿與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中不轉失氣者此為但頭堅後澹不可攻之攻之必腹滿不能食欲飲水者即噦

陽明病若胃中虛冷其人不能食飲水即噦

下利其脈浮大此為虛以強下之故也設脈浮革因爾腸鳴當溫之與水即噦

病在陽當以汗解而反以水噴之若濯之其熱却不得去益煩皮上粟起意欲飲水反不渴宜文蛤散若不差與五苓散若寒實結骨無執證者與三物小陷胃湯曰散亦可身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水噴之洗之益令熱却不得出當汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

寸口脈浮大醫反下之此為大逆浮即無血大即為寒寒氣相搏即為腸鳴醫乃不知而反飲水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即餒

寸口脈濡而弱濡即惡寒弱即發熱濡弱相搏微氣衰微骨中苦煩此非結熱而反薄居水漬布冷鈹貼之陽氣遂微諸府無所依陰脈凝聚結在心下而不肯移胃中虛冷水穀不化小便縱通復不能多微則可救聚寒心下當奈何也

病可水證第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃中和則愈

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈太陽病寸口緩關上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞者此為

醫下也若不下其人復不惡寒而渴者為轉屬陽明小便數者大便即堅不更衣十日無所苦也欲飲水者但與之當以法救渴宜五苓散

寸口脈洪而大數而滑洪大則榮氣長滑數則胃氣實榮長則陽盛佛鬱不得出身胃實則堅難大便則乾燥三脹閉塞津液不通醫發其汗陽盛不周復重下之胃燥熱畜大便遂瀝小便不利禁衛相搏心煩發熱兩眼如火鼻乾面赤舌燥齒黃佳故大渴過經成壞病針藥所不能制與水灌枯槁傷氣微散身寒溫衣覆汗出表裏通然其病即除形脈多不同此愈非法治但醫所當慎妄犯傷榮衛

霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水屬五苓散

嘔吐而病在膈上後必思水者急與猪苓散飲之水亦得也

病不可火證第十六

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流洩失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出齋頸而還復滿而微喘口乾咽爛或不大便又則譫語甚者至噦手足躁擾循衣摸床小便利者其人可治

太陽病醫發其汗遂發熱而惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰復復加火針因而煩面色青黃膚潤如此者為難治今色微黃手足溫者愈

傷寒加溫針必驚

陽脈浮陰脈弱則血虛血虛則筋傷其脈沈者榮氣微也其脈浮而汗出如流珠者衛氣衰也榮氣微加燒針血留不行

更發熱而躁煩也

傷寒脈浮而盤以火迫劫之亡陽驚狂卧起不安屬桂枝去

芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

問曰得病十五十六日身熱黃下利狂欲走師脈之言當下

清血如脈肝乃愈後如師言何以知之師曰寸口脈陽浮陰

濡弱陽浮則為風陰濡弱為少血浮虛受風少血發熱惡寒

洒淅項強頭眩豎加火重鬱令汗出惡寒遂甚客熱因火而

發佛鬱蒸肌膚身目為黃小便微難短氣從鼻出血而復下

之胃无津液油利遂不止熱痰在膀胱畜結成積聚狀如豚

肝當下未下心乱迷憤狂走起水不能自制畜血若去目明

心了此皆醫所為无他禍患微輕得愈極者不治

傷寒其脈不弦緊而弱者必瀉被火必謬言弱者發熱脈浮

解之當汗出愈

太陽病以火重之不得汗其人必躁到經不解必有清血

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

陽明病其脈浮緊咽乾口腹滿而喘發熱汗出而不惡寒反

偏惡熱其身軀重發其汗則躁心憤二而反謬語加温針必

休傷又煩躁不得眠

少陰病欬而下利謬語是為被火氣劫故也小便必難為強

責少陰汗出

太陽病二日而燒瓦發其背大汗出火氣入胃胃中竭燥必

發謬語十餘日振而反汗出者此為欲解其汗從腰以下不

得汗其人欲小便反不得嘔欲失溲足下惡風大便堅者小

便當數而反不數及多便已其頭卓然而痛其人足心必熱

殺氣下流故也

病可火證第十七

下利穀道中痛當溫之以為宜熱不熅熅之一方炙枳實熨

之。熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭及生死證第十八

問曰溫病汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病

名為何對曰名曰陰陽交者死人所以汗出者生於殺殺

生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝精勝

則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒

復熱者邪勝也不能食者精无俾也汗而熱留者壽可立而

傾也

夫汗出而脈尚躁盛者死此今脈不汗相應此不勝其病

也狂言者是失志失志者死有三死不見一生雖愈必死

熱病已得汗而脈尚躁盛此陽脈之極也死其得汗而脈靜

者生也

熱病脈尚躁盛而不得汗者此陽脈之極也死脈躁盛得汗

者生也

熱病已得汗而脈尚躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死

熱病陰陽交者死

熱病煩已而汗脈當靜

太陽病脈反躁盛者是陰陽交死復得汗脈靜者生

熱病陰陽交者熱煩身躁太陽寸口脈兩衝尚躁盛是陰陽

交死得汗脈靜者生

熱病陽進陰退頭獨汗出死陰進陽退腰以下至足汗出亦

死陰陽俱進汗出已熱如故亦死陰陽俱退汗出已寒慄不

止卓口氣冷亦死右熱病陰陽交部

熱病所謂并陰者熱病已得汗因得泄是謂并陰故治一作治

熱病所謂并陽者熱病已得汗脉尚躁盛大熱汗出雖不汗

出若衄是謂并陽故治右熱病并陰陽部

少陰病惡寒踈而利手足逆者不治

少陰病下利止而眩時時自胃者死

少陰病其人吐利躁逆者死

少陰病四逆惡寒而踈其脉不至其人不可煩而躁者死

少陰病六七日其人息高者死

少陰病脉微細沈但欲臥汗出不煩自欲吐五六日自利復

煩躁不得臥寐者死

少陰病下利若利止惡寒而踈手足溫者可治

少陰病惡寒而踈時時自煩欲去其衣被者可治

少陰病下利止厥逆無脉干煩一本作乾服湯藥其脉暴出者

死微細者生右少陰部

傷寒六七日其脉微手足厥煩躁其厥陰厥不還者死

傷寒下利厥逆躁不能臥者死

傷寒發熱下利至厥不止者死

傷寒厥逆六七日不利便發熱而利者生其人汗出利不止

者死但有陰無陽故也

傷寒五六日不結胃脘濡脉虛復厥者不可下下之亡血死

傷寒發熱而厥七日下利者為難治右部

熱病不知所痛不能自收口乾陽熱甚陰煩有寒者熱在膈

死不治

熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲不止腹大而脹

尚不厭飲目無精光死不治

脾傷即中風陰陽氣別離陰不從陽故以三分候其死生

傷寒欬逆上氣其脉散者死謂其人形損故也

傷寒下利日十餘行其人脉反實者死

病者脇下素有痞而下在臍傍痛引少腹入陰俠陰筋此為

臧結死

夫實則證語虛則鄭聲鄭聲者重語是也直視證語喘滿者

死若下利者亦死

結實證悉具而躁者死

吐舌下卷者死唾如膠者難解舌頭四邊徐有津液此為欲

解病者至經上脘有色脉自和為欲解色赤者未解右陰陽

重實重虛陰陽相附生死證第十九

問曰何謂重實對曰邪氣盛則實精氣奪則虛重實者肉大

熱病氣熱脉滿是謂重實

問曰經絡俱實何如對曰經絡皆實是寸脉急而尺為也皆

當俱治故曰滑則順瀉則逆夫虛實者皆從其物類始五藏

骨肉滑利可以長又寒氣暴上脉滿實實而滑順則生實而

瀉逆則死形盡滿脉急大堅尺滿而不應順則生逆則死所

謂順者手足溫所謂逆者手足寒也

問曰何謂重虛對曰脉虛氣虛尺虛是謂重虛也所謂氣虛

者言無常也尺虛者行步巨然也脉虛者不象陰也如此者

滑則生瀉則死氣虛者肺虛也氣逆者足寒也未其時則生

當其時則死餘藏皆如此也

脈實滿手足寒頭熱者春秋則生冬夏則死脈浮而滿者
身有執者死絡氣不足經氣有餘脈熱而尺寒秋冬為逆春
夏為順經虛絡滿者又熱滿而寒瀦春夏死秋冬生絡滿經
虛炎陰刺陽經滿絡虛刺陰炎陽

問曰秋冬無極陰春夏無極陽何謂也對曰無極陽者春夏
無數虛陽明陽明虛則狂無極陰者秋冬無數虛大陰大陰
虛則死右重實

熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上寒陰氣下爭還
心腹滿者死所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下寒陽氣
上爭還得汗者生右陰陽

熱病生死期日證第二十

太陽之脈色紫顛骨熱病也榮未夫曰今且得汗待時自己
與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病氣內連腎少陽之
脈色紫頰前熱病也榮未夫曰今且得汗待時自己與少陰
脈爭見者死期不過二日

熱病七八日脈微小病者溲血口中乾一日半而死脈代者
一日死

熱病七八日脈不躁喘不數後三日中有汗三日不汗四日
死未曾汗勿庸刺作庸

熱病三四日脈不喘其動均者身雖煩熱今日得汗生傳曰
始府入藏終陰復還陽故得汗

熱病七八日脈不喘其動均者生微熱在陽不陰今自汗也
熱病七八日脈不喘動數均者病當瘳期三日不得汗四日死
熱病身面盡黃而腫心熱口乾舌卷焦黃黑身麻臭伏毒傷

肺中脾者死
熱病瘵癡狂言不得汗瘵癡不止伏毒傷肝中臍者死
熱病汗不出出不至足嘔臍吐血善驚不得卧伏毒在肝臍
足少陽者死

熱病十逆死證第二十一

熱病腹滿兩腹脹身熱者不得大小便脈瀦小疾一逆見死
熱病腸鳴腹瀦四肢清泄注注脈浮大而洪不已二逆見死
熱病大衄不止腹中痛脈浮大絕喘而短氣三逆見死
熱病嘔且便血奪形肉身熱其脈絕動疾四逆見死
熱病欬喘悸眩身熱脈小疾奪形肉五逆見死

熱病腹大而脹四肢清奪形肉短氣六逆見一旬內死

熱病腹脹便血脈大時時小絕汗出而喘口乾舌焦視不見
人七逆見一旬死

熱病身熱其脈轉小欬而便血目眦陷妄言手循衣縫口乾
躁擾不得卧八逆見一時死

熱病褻飛狂走不能食腹滿首痛引腰膝背嘔血九逆見一
時死

熱病嘔血喘欬煩滿身黃其腹鼓脹泄不止脈絕十逆見一
時死

熱病五藏氣絕死日證第二十二

熱病肺氣絕喘逆欬唾血手足腹腫面黃振慄不能言語死
魄與皮毛俱去故肺先死丙日篤丁日死
熱病脾氣絕頭痛嘔宿汁不得食嘔逆吐血水漿不得入狂
言譫語腹大滿四肢不收意不樂死脈與肉氣俱去故脾先

死甲日篤乙日死

熱病心主氣絕煩滿骨痛一作噬腫不可咽欲飲不能飲歌

哭而笑死神與榮脉俱去故心先死壬日篤癸日死

熱病肝氣絕僵仆不安地嘔血恐懼洒漸惡寒血妄出遺

尿溺死魄與筋血俱去故肝先死庚日篤辛日死

熱病腎氣絕喘悸吐逆腫疽尻離目視不明骨痛短氣喘滿

汗出如珠死精與骨髓俱去故腎先死戊日篤己日死

故外見腫子青小水甲枯髮墜身澀齒挺而垢人皮面厚塵

黑軟而唾血渴飲數飲大滿此五藏絕表病也

熱病至脉死日證第二十二

熱病脉四至二日死脉四至者平人一至病人脉四至也

熱病脉五至一日死時一大至半日死忽忽悶亂者死

熱病脉六至半日死忽忽痰大至有頃死

熱病脉損日死證第二十四

熱病脉四損二日死所謂四損者平人四至病人脉一至名

曰四損

熱病脉五損一日死所謂五損者平人五至病人脉一至名

曰五損

熱病脉六損一時死所謂六損者平人六至病人脉一至名

曰六損若絕不至或久乃至立死

治傷寒形證所宜進退 王叔和集仲景評脉要論

新刊王氏脉經卷第七

新刊王氏脉經卷第八

朝散大夫光祿卿其秘閣劉崇開檢校護軍臣林德等類次

平卒尸厥脉證第一

平瘧濕腸脉證第一

平陽毒陰毒百合瓜瓞脉證第三

平霍亂轉筋脉證第四

平中風肝筋脉證第五

平血痺虛勞脉證第六

平消渴小便利淋脉證第七

平水氣黃汗氣分脉證第八

平黃疸寒熱瘧脉證第九

平胃痺心痛短氣胃脉證第十

平腹滿寒疝宿食脉證第十一

平驚悸吐下血骨滿癰毒脉證第十二

平嘔噦下痢脉證第十四

平肺痿肺癰發逆上氣喘飲脉證第十五

平癰腫腸癰金瘡侵淫脉證第十六

平卒尸厥脉證第一

寸口沈大而滑沈則為實滑則為氣實氣相搏血氣入於藏

即死入於腑即愈此為卒厥不知人臂青身冷為入藏即死

如身溫和汗自出為入腑而復自愈

平瘧濕腸脉證第一

平瘧濕腸脉證第一

平瘧濕腸脉證第一

大陽病發熱無汗而反惡寒者名剛症

大陽病發熱汗出而不惡寒者名柔症惡寒

大陽病發熱其脈沈而細者為瘥

大陽病發其汗因致瘥論云發其汗太多因致瘥

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤自脈赤獨頭動搖者為瘥論云獨頭面赤平口

大陽病無汗而小便反少氣上衝胃口噤不得語欲作剛症

葛根湯主之

剛症為病皆滿口噤臥不着席脚攣急其人必斷齒可與大

承氣湯

瘥病發其汗已其脈冷冷如蛇暴腹脹大者為欲解脈如故

反伏弦者必瘥論云瘥也

瘥脈來按之築築而弦直上下行

瘥家其脈伏堅直上下

夫風病下之則瘥復發其汗必拘急

大陽病其證備身體強凡凡然脈沈遲此為瘥栴栴桂枝湯

主之

瘥病有灸瘡難療

瘥家雖身瘥痛不可發其汗汗出則瘥

大陽病關節疼痛脈沈而緩者為中濕論云中濕為濕痺之利其小便

病者一身盡瘥論云瘥熱日晡即刺此為風濕汗出所致也

論云此病傷於汗出當

濕家之為病一身盡瘥發熱而身色熏黃也

濕家之為病其人但頭汗出而背強欲得被覆向火若下之

早則噤或皆滿小便不利舌上如胎此為丹田有熱曾上

有寒渴欲飲而不能飲則口燥也

濕家下之額上汗出微喘小便利論云若下利不止者亦死

問曰風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨不止師

云此可發汗而其病不愈者何也答曰發其汗汗大出者但

風氣去濕氣續在是故不愈若治風濕者發其汗微微似欲

出汗首則風濕俱去也

濕家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗為宜慎不可以

火攻之

風濕脈浮身重汗出惡風者防己湯主之

病人喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在

頭中寒濕故鼻塞內藥草中即愈論云濕家病身疼痛發熱

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈

浮虛而澀者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者

朮附子湯主之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣

小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

大陽中熱喝是也其人汗出惡寒身熱而渴也白虎湯主之

大陽中喝身熱疼痛而脈微弱此以夏月傷冷水行皮膚

中所致也瓜蒂湯主之

大陽中喝發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細乳蓬小便已洒

洒然毛聳手足逆冷小有勞身熱口前開板齒燥者發其汗

惡寒則甚加温針則發熱益其數下之淋復甚

平陽毒陰毒百合狐惑脉證第三

陽毒為病身重腰背痛煩悶不安任言或走或見鬼或吐血下痢其脉浮大數面赤斑斑如錦文喉咽痛膿血五日可治至七日不可治也有傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陰毒并麻湯主之

陰毒為病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沈細緊數身如被打五六日可治至七日不可治也或傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒并草湯主之

百合之為病其狀常默默臥復不能臥或如強健人欲得出行而復不能行意欲得食復不能食或有美時或有不聞飲食臭時如寒無寒如熱無熱朝至口苦小便赤黃身形如和其脉微數百脉一宗悉病各隨證治之百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦為逆其病難治千金方云見於陰而以陽則陰不得解也復發其病愈逆也見於陽而以陰則陽不得解也下之其病不愈狐惑為病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉為蝕蝕於陰為狐狐惑之病並不欲飲食聞食臭其面目乍赤乍白乍黑其毒蝕於上者則聲喝其毒蝕下部者咽乾蝕於上部滿心湯主之蝕於下部苦參湯洗之蝕於肛者雄黃熏之

眼得之七八日目四背黃墨者能食者膿已成也赤小豆當歸散主之

病人或從呼吸上蝕其咽或從下膈蝕其肛陰蝕上為蝕蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之

平霍亂轉筋脉證第四

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此為霍亂問曰病者發熱頭痛身體疼惡寒而復吐利當屬何病師曰當為霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其脉微澀本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必吐利轉筋為病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞爪白散主之

平中風歷節脉證第五

夫風之為病當半身不遂或偏臂不遂者此為痺脉微而數中風使然

頭痛脉滑者中風風脉虛弱也

寸口脉浮而堅緊則為寒浮則為虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣則急正氣引邪陽僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經則重不勝邪入於腑則不識人邪入於藏舌即難言口吐涎

寸口脉遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡衞遲則為中風邪氣中經則身癢而癢癢心氣不足邪氣入中則骨滿而短氣

跌陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出

少陰脉浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏則疼痛如擊

盛人脈瀯小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致也

寸口脈沈而弱沈則主骨弱則主筋沈則為腎弱則為肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節也味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄賊則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便為歷節也

病歷節疼痛不可屈伸鳥頭湯主之

諸肢節疼痛身體魁濼脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐桂枝芍藥知母湯主之

平血痺虛勞脈證第六

問曰血痺從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重因疲勞汗出取不時動搖加被微風遂得之形如風狀巢原云其狀如被微風所吹但以脈自微瀯在寸口關上小緊宜針引陽氣令脈和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風狀黃耆桂五物湯主之

夫欲治病當先知其證何趣乃當攻之耳

男子平人脈大為勞極虛亦為勞

男子勞之為病其脈浮大手足暖春夏劇秋冬差陰寒精自出酸削不能行少陰虛痛

人年五十六其脈浮大者痺俠背行苦腸鳴馬刀俠頸者皆為勞得之

男子平人脈虛弱細微者喜盜汗出也

男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸其脈浮者裏虛也

男子脈虛沈弦無寒熱短氣裏急小便不利而色白時時目眩此人喜嘔少腹滿此為勞使之然

男子脈微弱而澀為無子精氣清冷

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩痛目眩髮落脈極虛乳達為清穀亡血失精

脈得諸乳動微緊男子失精女子夢交通桂枝加龍骨牡蠣湯主人

脈沈小遲名脫氣其人疾行則喘鳴手足逆寒腹滿其則澹泄食不消化也

脈弦而大弦則為城大則為孔城則為寒孔則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

平消渴小便利淋脈證第七

師曰厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢而不飲食食即吐下之不肯止

寸口脈浮而遲浮則為虛遲則為勞虛則衛氣不足遲則榮氣竭跌陽脈浮而數浮則為氣數則消穀而緊要緊則澹數澹數則緊作緊數相搏則為消渴

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣圓主之

師曰熱在結一作下焦則溺血亦令人淋閉不通淋之為病小便如粟狀少腹弦急痛引臍中寸口脈細而數數則為熱細則為寒數為強吐跌陽脈數胃中有熱則消穀引食大便必堅小便則數少陰脈數婦人則陰中生瘡男子則氣淋淋家不可發汗發汗則必便血

平水氣黃汗氣分脈證第八

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外證肘腫按之沒指不惡風其腹如鼓如鼓不渴當發其汗正水其脉沈遲外證自喘石水其脉自沈外證腹滿不喘黃汗其脉沈遲身體發熱背滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿

脉浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強則為癰癰身體為癰癰為泄風又為癰癰氣強則為水誰以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不惡風者小便通利上膈有寒其口多涎此為黃汗

寸口脉沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目暴上微擁如新臥起狀其頸脉動時時欬按其手足上脘而不起者風水太陽病脉浮而緊法當骨節疼痛而反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而冷狀如周痺皆中空不能食反聚痛蹇蹇不眠此為黃汗痛在骨節欬而不喘不渴者此為脾脹其形如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗

風水其脉浮浮為在表其人能食頭痛汗出表無佗病病者言但下重故從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸防已黃耆湯主之一云風水脉浮身重汗出

風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出而無大熱者越婢湯主之

師曰裏水者一身面目洪腫其脉沈小便不利故令病水假

如小便自利亡津液故令渴也越婢加木湯主之其二云皮水

面浮腫小便不利故令病水假令小便自利亡津液故令渴也

皮水之為病四肢腫水氣在皮膚中四肢重動者防已茯苓湯主之

跌陽脉當伏今反緊本自有寒疝癰腫中痛醫反下之

則背滿短氣

跌陽脉當伏今反數本自有熱消穀一作消渴小便數今反不利此欲作水

寸口脉浮而淫浮脉熱淫脉熱淫脉熱淫脉熱淫脉熱淫

而數浮脉熱數脉止熱止相搏名曰伏沈伏相搏名曰水沈

則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚則為水矣

寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒水不沾流

走在腸間

少陰脉緊而沈緊則為痛沈則為水小便即難師曰脉得諸

沈者當貴有水身體腫重水病脉出者死

夫水病人目下有卧蠶面目黃澤脉伏其人消渴病水腹大

小便不利其脉沈絕者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也

答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈

水之為病其脉沈小厲少陰浮者為風無水虛脹者為氣水

發其汗即已沈者與附子麻黃湯浮者與杏子湯

心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其陰大腫

肝水者其腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津液微生小

便續通

便續通

肺水者其身體小便難時時鴨瀉

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足

逆冷面又瘦一云大反堅

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈

師曰寸口脈沈而遲沈則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脈

伏水穀不化脾氣衰則驚瀆胃氣衰則身腫

少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經

為血血不利則為水名曰血分一云水

問曰病者若水面目身體四肢皆腫小便不利師脈之不言

水反言骨中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其

脈何類師曰寸口脈沈而緊沈為水緊為寒沈緊相搏結在

關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結

寒微動緊氣上衝喉咽塞噎膈下急痛腎以為留飲而大下

之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥飲水小

便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶丸下水當時如

小差食飲過度腫復如前背脇苦痛象若奔豚其水揚溢則

浮欬喘逆當先攻擊衝氣令止乃治欬教止自喘自差先治

新病病當在後

黃汗之病身體洪腫一作發熱汗出而渴而渴作不渴狀如風水

汗沾衣色正黃如蘗汗其脈自沈

問曰黃汗之病從何得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔

入得之黃蒼考藥桂枝苦酒湯主之

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬履節食色汗出又身常

暮則盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱者久久其身必

甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者又必

身腫則背脊中痛又從腰以上必汗出下無汗腰寬弛痛如

有物在皮中狀刺者不能食身疼重煩躁小便不利此為黃

汗桂枝加黃耆湯主之

寸口脈遲而滑遲則為寒滑為血不足跌陽脈微而遲微則

為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不

利榮衛不利則腹滿胸脇相逐氣轉勝脫榮衛俱勞陽氣不

通則身冷陰氣不通則骨疼陽前通則要寒陰前通則痺不

仁陰陽相得其氣乃行太氣一轉其氣乃散實則失氣虛則

遺瀉名曰氣分氣分心下墜大如盤邊如旋杯水飲所作桂

枝去芍藥加麻黃細辛附子湯主之

心下墜大如盤邊如旋盤水飲所作枳實木湯主之

平黃疸寒熱瘧脈證第九

凡黃候其寸口脈近掌無脈口鼻冷並不可治脈沈渴飲飲

水小便不利者皆發黃

腹滿舌痿黃躁不得睡屬黃家

師曰病黃疸發熱煩喘背滿口躁者以發病時火劫其汗兩

熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在

裏當下之

師曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上為差反劇

為難治

又曰疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部

其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也

師曰諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之宜桂枝加薑湯又男子黃小便自利當與小建中湯

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜大黃黃蘗梔子芒消湯

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之

夫病酒黃疸必小便不利其喉心中熱足下熱是其證也心中懊憹而熱不能食時飲吐名曰酒疸

酒黃疸者或無熱墮言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沈弦者先下之

酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈酒疸黃色心下結熱而煩

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如噉蒜齏狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之

寸口脈微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節疼痛當煩不煩而極汗出跌陽脈緩而遲胃氣反強

少陰脈微微則傷精陰氣寒少陰不足穀氣反強飽則煩滿滿則發熱客熱消穀發已復飢熱則腹滿微則傷精穀強

則瘦名曰穀寒熱陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩者必小便難此欲

作穀疸難下之腹滿如故所以然者脈遲故也師曰寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦

煩脾色必黃瘕熱以行跌陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即滿也又

脈浮為傷腎跌陽脈緊為傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體

盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮則發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治

黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑

時澹此女勞之病非水也腹滿者難治消石礬石散主之夫瘧脈自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之

弦遲者可溫藥若脈緊數者可發汗針灸之浮大者吐之脈弦數者風發也以飲食消息止之

瘧病結為癥瘕名曰瘧母醬煎圓主之瘧但見熱者溫瘧也其脈平身無寒但熱骨節痠煩時嘔朝

發暮解暮發朝解名曰溫瘧白虎加桂枝湯主之瘧多寒者牡蠣也蜀漆散主之

平胃痺心痛短氣黃豚豚證第十師曰夫脈當取太過與不及陽微陰弦則胃痺而痛所以然

者胃其極虛也今陽虛知在上脘所以胃痺心痛者以其脈陰弦故也

胃痺之病喘息欬唾胃甘痛短氣寸口脈沈而遲關上小緊數者枯槁羶白白酒湯主之

平人無寒熱短氣不足以息者實也賁脈病者從少腹起上衝咽喉發作時欲死復止皆從驚得

其氣上衝胃腹脹及往來寒熱賁脈湯主之

師曰瘧有黃脈有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之

平腹滿寒疝宿食脈證第十一

跌陽脈微效法當腹滿不痛者必下部閉塞大便難兩胫云脚疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之

病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之古黃未下者下之黃自去腹滿時減減復如故此為寒當與溫藥

跌陽脈緊而浮緊則為痛浮則為虛虛則腸鳴緊則堅滿雙脈弦而遲者必心下堅脈大而緊者陽中有陰也可下之病腹中滿痛為實當下之

腹滿不減減不足言當下之病腹滿發熱數十日脈浮而數飲食如故厚朴三物湯主之寸口脈遲而緩遲則為寒緩即為氣氣寒相搏轉絞而痛寸口脈遲而澀遲為寒澀為無血

夫中寒家喜火其人清涕出發熱色和者善噎中寒其人下利以裏虛也欲噎不能此人肚中寒痛一作夫度人絀臍痛必有風以穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

寸口脈弦者則脇下俱急而痛其人當啻惡寒也寸口脈浮而滑頭中痛跌陽脈緩而遲緩則為寒遲則為虛虛寒相搏則欲食溫假令食冷則咽痛

寸口脈微尺中堅而澀緊則為寒微則為虛澀則血不足故知發汗而復下之也緊在中央知寒尚在此木寒氣何為發汗復下之耶

夫脈浮而數乃弦狀如弓弦按之不移脈數弦者當下其寒脇下偏痛其脈緊弦此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯寸口脈弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則寒緊則不欲食弦緊相搏則為寒疝

跌陽脈浮而遲浮則為風虛遲則為寒疝寒疝繞臍痛若發則白汗出手足厥寒其脈沈弦者大烏頭湯主之

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有宿食寸口脈緊如轉索左右無常者有宿食

寸口脈緊即頭痛風寒或腹中有宿食不化脈滑而數者實也有宿食當下之

下利不欲食者有宿食當下之大下後六七日不大便煩不解腹滿痛此有燥屎也所以然者本有宿食故也

宿食在上管當吐之平五藏積聚脈證第十二

問曰病有積有聚有繫氣繫下作何謂也師曰積者藏病也終不移聚者腑病也發作有時變轉痛移為可治繫氣者脇下痛按之則愈愈復疑為繫氣夫病已愈不得復發全病復發即為繫氣也

諸積大法脈來細而附骨者乃積也細一作結寸口積在胃中微出寸口積在喉中關上積在臍脘上關上積在心下微下關積在少腹尺積在氣街脈出在左積在左脈出在右積在右

脈兩出積在中央各以其部處之

脈

診得肺積脈浮而毛按之碎易脇下氣逆背相引痛少氣善忘自嗜皮膚寒秋差夏劇王皮中時痛如蟲緣之狀甚者如針刺時養其色白

診得心積脈沈而孔上下無常處病皆滿悻腹中熱面赤盛乾心煩掌中熱甚即唾血主身瘦癯主血盛夏差劇其色赤診得脾積脈浮大而長飢則減飽則見腹起腹穀爭減心下累累如桃李起見於外腹瀉嘔泄腸鳴四肢重足脛腫厥不能即是主肌肉損其色黃

診得肝積脈弦而細兩脇下痛邪走心下足腫寒脇痛引少腹男子積疝女子瘦淋身無膏澤喜轉筋爪甲枯黑春差秋劇其色青

診得腎積脈沈而急苦脊與腰相引痛飢則見飽則減少腹裏急口乾咽腫傷爛目眦眦骨中寒主髓厥善忘其色黑

寸口脈沈而橫者脇下及腹中有橫積痛其脈弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕脈弦緊而微細者瘕也夫寒痺癥瘕積聚之脈皆弦緊若在心下即寸弦緊在胃管即關弦緊在臍下即尺弦緊在臍左右上下也

又脈癥法左手脈積癥在左右手脈積癥在右脈頭大者在左脈小者在右

又法積脈見左積在右見右積在左偏得洪實而滑亦為積弦緊亦為積為寒痺為疝痛內有積不見脈難治見一脉作腸相應為易治諸不相應為不治

左手脈大右手脈小上病在左脇下病在左足右手脈大左手脈小上病在右脇下病在右足

脈弦而伏者腹中有癥不可轉也必死不治

脈來細而沈時直者身有癰腫若腹中有伏梁

脈來小沈而實者胃中有積聚不下食食即吐

平驚悸衄吐下血骨滿痰血脈證第十三

寸口脈動而弱動則為驚弱則為悸

跌陽脈微而浮浮則胃氣虛微則不能食此恐懼之脈憂迫所作也驚生病者其脈止而復來其人目睛不轉不能呼氣

寸口脈緊跌陽脈浮胃氣則虛

寸口脈緊寒之實也寒在上臆骨中必滿而噎胃氣虛者跌陽脈浮少陽脈緊心下必悸何以言之寒水相搏二氣相爭

是以悸

脈得諸澀濡弱為亡血

寸口脈弦而大弦則為臧大則為孔臧則為寒孔則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血

亡血家不可攻其表汗出則寒薄而振

問曰病衄連日不止其脈何類師曰脈來輕輕在肌肉尺中

自溢脈浮云尺目睛黃衄必未止量黃去目睛尋知衄全止

師曰從春至夏發衄者太陽從秋至冬發衄者陽明

寸口脈微弱尺脈澀弱則發熱澀為無血其人必厥微嘔夫厥當眩不眩而反頭痛痛為實下虛上實必衄也

太陽脈大而浮必衄吐血

病人面無血色無寒熱脈沈弦者衄也

衄家不可發其汗汗出必額上促急而緊直視而不能胸不得眠

脈浮弱手按之絕者下血煩數者必吐血

寸口脈微而弱氣血俱虛男子則吐血女子則下血嘔吐汗

出者為可

跌陽脈微而弱春以胃氣為本吐利者為可不者此為有水

氣其腹必滿小便則難

病人身熱脈小絕者吐血若下血婦人亡經此為寒脈逆者

脊上有寒悸氣喜唾

脈有陰陽跌陽少陰脈皆微其人不吐下必亡血

脈沈為在裏榮衛內結胃滿必吐血

男子盛大其脈陰陽微跌陽亦微獨少陰浮大必便血而失

精設言淋者當小便不利

跌陽脈弦必腸痔下血

病人骨痛脣痿舌青口燥其人但欲漱水不欲嚥無寒熱脈

微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血當汗出不出內結

亦為瘀血病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為

陰伏是瘀血也當下之

下血先見血後見便此近血也先見便後見血此遠血也

平嘔吐噦下利脈證第十四

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治

跌陽脈浮者胃氣虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出不

入其人即嘔而不得食恐怖而死寬緩即差

夫嘔家有癰脹者不可治嘔膿盡自愈
先嘔却渴者此為欲解先渴却嘔者為水停心下此屬飲家
嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲也

問曰病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者何也

師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數為客熱不能消穀

胃中虛冷故吐也

陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦為吐

寸緊尺澀其人胃滿不能食而吐吐止者為下之故不能食

設言未止者此為胃反故尺為之微澀也

寸口脈緊而乳緊則為寒乳則為虛虛寒相搏脈為陰結而

遲其人則噎閉上脈數其人則吐

脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於上醫反

下之今脈反弦故名曰虛

跌陽脈微而澀微則下利澀則吐逆殺不得入也

寸口脈微而數微則無氣無氣則手足虛寒虛則血不足血不

足則胃中冷跌陽脈浮而澀浮則為虛澀則傷脾脾傷則不

磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而澀其病

難治

夫吐家脈來形狀如新卧起

病人欲吐者不可下之

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者瘧瘵散主之

噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈

夫六腑氣絕於外者手足寒上氣腳縮五藏氣絕於內者下

利不禁下甚者手足不仁

下利脈沈弦者下重其脈大者為未止脈微弱數者為欲自
止雖發熱不死
脈滑按之虛絕者其人必下利

下利有微熱其人瀉脈弱者今自愈

下利脈數若微發熱汗自出者自愈設脈復緊者為未解

下利寸脈反浮數尺中自澀其人必清膿血

下利手足厥無脈灸之不溫若脈不還反微喘者死

少陰負跌陽者為順也

下利脈數而浮者今自愈設不差其人必清膿血以有熱故也

下利後脈絕手足厥冷時時脈還手足溫者生脈不還者死

下利脈反弦發熱身汗者自愈

下利氣者當利其小便

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿其藏寒者當下之

下利脈沈而遲其人面少赤身有微熱

下利清穀必鬱冒汗出而解其入微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表

下利脈遲而滑者實也利未欲止當下之

下利脈反滑者當有所去下乃愈

下利差至其年月日時復發此為病不盡當復下之

下利而謔語者為有燥屎也宜下之

下利而腹痛滿為寒實當下之

下利腹中堅者當下之

下利後更煩按其心下濡者為虛煩也

下利後脈三部皆平按其心下堅者可下之

下利脈浮大者虛也以強下之故也設脈浮革因爾腸鳴當

溫之

病者痿黃躁而不渴胃中寒實而下利不止者死

夫風寒下者不可下之下之後心下堅痛脈遲者為寒但當溫之脈沈緊下之亦然脈大浮弦下之當已

平肺痿肺癰欬逆上氣淡飲脈證第十五

問曰熱在上膈者因欬為肺痿肺癰之病從何得之

師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難數被駭藥下利重亡津液故得之

寸口脈不出而反發汗陽脈早索陰脈不澀三焦踈入而不出陰脈不澀身體及冷其內反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜亦如豚腦但坐發汗故也

肺痿其人欬欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利甚則脈浮弱

肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者以上虛不能制下也此為肺中冷必飲多涎唾并草乾姜湯以治其藏

師曰肺痿欬唾咽燥飲水者自愈自張口者短氣也

欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也

問曰寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者何也

師曰此為肺痿之病若口中辟辟燥欬則胃中隱隱痛脈反滑數此為肺癰

欬唾膿血脈數虛者為肺痿脈數實者為肺癰

問曰病欬逆脈之何以知此為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脈何類

師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可殺膿成則死

欬而宜滿振寒脈數咽乾不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者為肺癰桔梗湯主之

肺癰背滿脹一身面目浮腫壘塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆下氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

寸口脈數跌陽脈緊寒熱相搏故振寒而欬跌陽脈浮絞胃氣如經此為肺癰

問曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處

師曰假令膿在背者為肺癰其人脈數欬唾有膿血設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也

夫病吐血喘欬上氣其脈數有熱不得卧者死上氣面浮腫者息其脈浮大不治又加利尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗則愈一云然而上氣肺脹其脈沈沈下

夫酒客欬者必致吐血此坐極飲過度所致也

欬家脈弦為有水可與十棗湯下之欬而脈浮其人不可不食如是四十日乃已一云三然而時發熱脈弦者非虛也

此為背中心寒實所致也當吐之欬家其脈弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐之其脈沈者不可發汗久欬數歲其

脈弱者可治實大數者不可治其脈虛者必苦胃其人本有支飲在背中心故也治屬欬家

問曰夫飲有四何謂也師曰有淡飲留飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間澀澀有聲謂之淡飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲

水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲欬逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲

留飲者脇下痛引缺盆欬嘔轉盛一云背中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脈沈者有留飲

夫心下有留飲其人背寒冷大如手

病者脈伏其人欲自利者反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

病淡飲者當以溫藥和之

心下有淡飲背脇支滿目眩甘草草湯主之

病澹飲者當發其汗小青龍湯主之

支飲亦喘而不能卧加短氣其脈平也

胸間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沈取得之數十日醫吐下之不愈未防已湯主之

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

夫有支飲家欬煩背中心痛者不卒死至一百日或一歲可與十棗湯

胸上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出自出

眩其人振振身劇必有伏飲

夫病人飲水多必暴喘滿九食少飲多心下水停甚者則悸

微者短氣

脉雙弦者寒也皆天下後晝虛脉偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣

病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沈細非風也必有飲

在上臑其脉虛者為微勞勞衛氣不周故也又又自差三灸

腹滿口苦乾燥此腸間有水氣也防已椒目葶藶大黃充主之

假令瘦人臍下悸吐涎沫而顛眩者水也五苓散主之

先渴却嘔為水停心下此為飲家半夏加茯苓湯主之

水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎味飲飲水

平癰腫腸癰金瘡侵淫脉證第十六

脉數身無熱內有癰也數此為腸有膿或附子散發湯主之

諸浮數脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發其癰

脉微而遲必發熱弱而數為振寒當發癰腫

脉浮而數身體無熱其形嘿嘿骨中微躁一作謂不知痛之

所在此人當發癰腫

脉滑而數數則為熱滑則為實滑則主華數則主衛榮衛相

逢則結為癰熱之所過則為膿也

師曰諸癰腫欲知有膿與無膿以手攪腫上熱者為有膿不

熱者為無膿

問曰官羽林婦病醫脉之何以知婦人腸中有膿為下之則愈師曰寸口脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則

為衛衛數下降榮滑上昇榮衛相干血為濁敗少腹痞堅小便或澀或時汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊聚為痰血

血下則愈

腸癰之為病其身體甲錯腹皮支急按之濡如腫狀腸癰

者少腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自汗出復惡寒

其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可

下也大黃牡丹湯主之

問曰寸口脉微而澀法當亡血若汗出設不汗者云何

答曰若身有瘡被刀器所傷亡血故也

侵淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者不可

治之

新刊王氏脉經卷第八

新刊王氏脈經卷第九

朝散李壽光綠寶秘閣副學蘭陵院護軍臣林億等類次

平妊娠分別男女將產諸證第一

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證第二

平產後諸病鬱胃中風發熱煩嘔下利證第三

平帶下絕產無子亡血居經證第四

平鬱胃五崩漏下經閉不利腹中諸病證第五

平咽中如有多腐喜悲熱入血室腹滿證第六

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證第七

平婦人病生死證第八

平小兒雜病證第九

平妊娠分別男女將產諸證第一

脈平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脈動甚若妊子也少陰心脈也心主血脈又腎名胞門子戶尺中腎脈也尺中之脈按之不絕法妊娠也三部脈沈浮正等按之無絕者有娠也妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也婦人妊娠四月欲知男女法左疾為男右疾為女俱疾為生二子
又法得太陽脈為男得大陽脈為女太陰脈沈太陽脈浮
又法左手沈實為男右手浮大為女左右手俱沈實強生二男
左右手俱浮大強生二女
又法尺脈左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如

實狀

又法左右尺俱浮為產二男不爾則女作男生左右尺俱沈為產二女不爾則男作女生也

又法遣妊婦人面南行還復呼之左迴首者是男右迴首者是女也

又法看上圍時夫從後急呼之左迴首者是男右迴首者是女也

又法婦人妊娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女也

婦人懷妊離經其脈浮設腹痛引腰脊為今欲生也但離經若不病也

又法婦人欲生其脈離經夜半覺日中則生也

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證第二

婦人懷胎一月之時足厥陰脈養二月足少陽脈養三月手心主脈養四月手少陽脈養五月足太陰脈養六月足陽明脈養七月手太陰脈養八月手陽明脈養九月足少陰脈養十月足大陽脈養諸陰陽各養三十日活兒手太陽少陰不養者下主

月水上為乳汁活兒養母懷妊者不可灸刺其經必墮胎

婦人懷妊三月而渴其脈反遲者欲為水分復腹痛者必墮胎

○脈浮汗出者必閉其脈數者必發癰腫五月六月脈數者必向壞脈緊者必胞滿脈遲者必腹滿而喘脈浮者必水壞為腫

○問曰有一婦人年二十所其脈浮數發熱嘔飲時下利不欲食脈復浮經水絕何也師曰法當有娠何以故此虛家法當微

弱而反浮數此為戴陽陰陽和合法當妊娠到立秋熱當自去何以知然數則為熱二者是火是木之子死於未未為六月

位土王火休廢陰氣生秋節氣至火氣當罷熱自除去其病愈

師曰乳後三月有所見後三月來脉無所見此便是軀有兒者

護之恐病利也何以故懷妊陽氣內養乳中虛冷故令兒利

婦人懷妊六月七月脉弦發熱其胎踰腹腹痛惡寒者小腹

如翁之狀所以然者子藏閉故也當以附子湯溫其藏

婦人懷妊七月脉實大年強者生沈細者死

婦人懷妊八月脉实大年強弦緊者生沈細者死

婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非特孤漿

預下故也

師曰寸口脉洪而瀦洪則為氣瀦則為血氣動丹田其形即溫

瀦在於下胎冷若水陽氣胎活陰氣必終欲別陰陽其下必殞

假令陽終奮然若杯

問曰婦人懷妊病師脉之何以知此婦人雙胎其一獨死其一

獨生而為下其死者其病即愈然後竟免軀其脉何類別之

。師曰寸口脉衛氣平調榮氣緩舒陽施陰化精盛有餘陰陽

俱盛故成雙軀今少陰微緊血即濁凝經養不周胎則偏大少

腹冷滿膠臏疼痛腰重起難此為血理若不早去害母失胎

師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不長欲知生死令人摸

之如覆杯者則男如肘頭參差起者女也冷在何面冷者為死

茯苓圓

問曰婦人病經水斷一二月而反經來今脉反微澀何也師曰

此前月中若當下利故令妨經利止月經當自下此非軀也

婦人經自斷而有軀其脉反弦恐其後必大下不成軀也

婦人懷軀七月而不可知時之衄血而轉筋者此為軀也衄時

嚔而動者非軀也

脉來近去遠故曰反以為有軀而反斷此為有陽無陰故也

婦人經月下但為微少師脉之反言有軀其後審然其脉何類

何以別之師曰寸口脉陰陽俱平榮衛調和按之滑浮之則輕

陽明少陰各如經法身反洒淅不欲飲食頭痛心亂嘔噦欲吐

呼則微數吸則不驚陽多氣益陰清氣盛滑則多實六經養成

所以月見陰見陽精汁疑胞散散者損墮設復陽盛雙妊一胎

今陽不足故令激經也

婦人懷妊小便難飲如故當歸貝母苦參圓主之

婦人懷妊有水氣身重小便不利洒洒惡寒起即頭眩葵子茯

苓散主之

婦人懷妊宜服當歸散即易產無疾苦

師曰有一婦人來診脉一作自道經斷不來師言一月為衄二月

為血三月為居經是定作軀也或為血積譬如雞乳子熟者為

祿寒者多濁且當須後月復來經當入月幾日來假令以七日

所來因言宜須後月十日所來相間設其主復來者因脉之脉

反沈而瀦因閉曾經半生若瀦下亡血者定為有軀其人言实

有宜是當護之今經微弱恐復不安設言當奈何當為合藥以

治之

師曰有一婦人來診自道經斷即去師曰一月血為閉二月若
有若無三月為血積譬如雞伏子中寒即濁中熱即祿欲令胎
壽當治其母使寒懷子命則不壽也譬如雞伏子試取雞一毛
拔去覆子不濁中寒者濁中夫人有軀少腹寒手掌反逆奈何
得有軀婦人因言當奈何師曰當與溫經湯設與夫家俱來者
有軀與父母家俱來者當言寒多久不作軀

師曰有一婦人來診因言陰陽俱和調陽氣長陰氣短但出不
入去近來遠故曰反以為有軀偏反血斷斷來幾日假令審實
者因言急當治恐經復下設令言中人若寒婦無夫曾夜夢寐
交通邪氣或懷久作癥瘕急當治下服二湯設復不愈因言髮
湯當中下胎而反不下此何等意邪可使其將視赤烏赤一作
師曰若宮里張氏不差復來相問臣博等詳此文理脈論不屬

師曰脈婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名為軀
桂枝主之法六十日當有娠設有醫治逆者却一月加吐下者
則絕之方在傷寒中

婦人脈平而虛者乳子法也平而微者實奄續法也而反微瀆
其人不亡血下利而反其其脈虛俱坐乳大兒及乳小兒此自
其常不能令其虛竭病與亡血虛等必眩冒而短氣也

師曰有一婦人好裝衣來診而得脈瀆因問曾乳子下利乃當
得此脈耳曾半生瀆下者可設不者經斷三月六月設乳子瀆
下可為奄續斷小兒勿乳須利止復來相問脈之

師曰寸口脈微遲尺微於寸寸遲為寒在上臍下當吐耳今尺
反虛復為強下之如此發背滿而痛者必吐血少腹痛腰痛

者必下血師曰寸口脈微而弱氣血俱虛若下血嘔吐汗出者
可不者跌陽脈微而弱春以胃氣為本吐利者可不者此為水
氣其腹必滿小便則難

師曰有一婦人年六十所經水常自下設久得病利少腹堅滿
者為難治

師曰有一婦人來診言經水少不知前者何也師曰曾更下利
若汗出小便利者何可以故師曰亡其津液故令經水少設經
下反多於前者當所苦困當言恐大便難身無復汗也

師曰寸口脈沈而遲沈則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脈伏
水穀不化脾氣衰則驚瀆胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰脈
細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水
名曰血分水分

師曰寸口脈沈而數數則為出沈則為入出則為陽實入則為
陰結跌陽脈微而弦微則無胃氣弦則不得息少陰脈沈而滑
沈則為在裏滑則為實沈滑相搏血結胸門其臧不瀉經絡不
通名曰血分

問曰病有血分何謂也師曰經水前斷後病水名曰血分此病
為難治

問曰病有水分何謂也師曰先病水後經水斷名曰水分此病
易治何以故去水其經自當下

脈濡而弱弱及在關濡及在顛達在上緊在下遲則為寒名曰
渾陽濁則濕名曰霧緊則陰氣慄脈及濡弱濡則中濕弱則中
寒寒濕相搏名曰痺腰脊骨節舌煩肌為不仁此當為痺而反

懷軀遲歸經體重以下脚為附腫按之沒指腰冷不仁此為水
懷喘則倚息小便不通緊脉為嘔血氣無餘此為水分榮衛車
亡此為非軀

平產後諸病鬱胃中風發熱煩嘔下利證第三

問曰新產婦人有二病一者病痊初作二者病鬱胃三者大便
難何謂也師曰新產亡血虛多汗出喜中風故令病痊何故鬱
胃師曰亡血復汗寒多故令鬱胃何故大便難師曰亡津液胃
燥故大便難產婦鬱胃其脉微弱嘔不能食大便反堅但願汗
出所以然者血虛而厥厥而必冒胃家欲解必大汗出以血虛
下厥孤陽上出故但願汗出所以生婦喜汗出者亡陰血虛陽
氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也小柴胡
湯主之病能食七八日而更發熱者此為胃熱氣承氣湯
主之方在傷寒中

婦人產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時有熱心下堅
乾嘔汗出雖久陽且譫續在可與陽且方在傷寒中桂枝是也
○婦人產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之

婦人產後腹中疝痛可與當歸羊肉湯
師曰產婦腹痛煩滿不得臥法當枳實芍藥散主之假令不愈
者此為腹中有乾血者膠下與下瘀血湯

婦人產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不大便四
五日跌陽脉微實再倍其人發熱日晡所煩燥者不能食譫語
利之則愈宜承氣湯以熱在裏結在膀胱也方在傷寒中

婦人產中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大圓主之
婦人熱利重下新產虛極白頭羽加甘草湯主之千金方又加阿膠

平帶下絕產無子亡血昏經證第四

師曰婦人帶下六極之病脉浮則為腸鳴腥滿緊則為腹中痛
數則為陰中癢痛則生瘡眩則陰痿墜痛

師曰帶下有二門一曰胞門二曰龍門三曰玉門已產為胞門
未產為龍門未嫁女為玉門

問曰未出門女有三病何謂也師曰一病者經水初下陰中熱
或有當風或有弱者二病者或有以寒水洗之三病者或見丹
下驚怖得病為帶下

師曰婦人帶下九實中事假令得鼠乳之病劇易當劇有期當
庚辛為期餘皆放此

問曰有一婦人年五十所病但苦背痛時時腹中痛少食多厭
喜脹脹其脉陽微關尺小緊形脉不相應願知所說師曰當問
病者飲食何如假令病者言我不欲飲食聞穀氣臭者病為在
上膈假令病者言我少多為飲食不食亦可病為在中膈假令
病者言我自飲食如故病為在下膈為病為帶下當以帶下治
之

婦人帶下經水不利少腹滿痛經一月再見土瓜根散主之
婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

師曰有一婦人將一女子年十五所來問診言女年十四時經
水自下今經反斷其母言恐怖師曰言此女為是夫人親女非
耶若親者當相為說之婦人因答言自是女爾師曰所以問者
無他夫人年十四時亦以經水下所以斷此為避年勿怪後當
自下

婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之絕產

師曰脉微弱而澀年少得此為無子中年得此為絕產

師曰少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血

絕產惡寒

師曰肥人脉細胞有寒故令少子其色黃者背上有寒

婦人少腹硬音音磊音切音轉痛而復自解發作無常經反斷膀胱

中結聚蒸痛下引陰中氣衝者久必兩脇拘急

問曰婦人年五十所病下利數日不止暮則發熱少腹裏急

痛腹滿手掌熱唇口乾燥何也師曰此病傷帶下何以故曾經

半產瘀血在少腹中不去何以知之其證唇口乾燥故知之當

與溫經湯

問曰婦人病下利而經水反斷者何也師曰但當止利經自當

下勿怪所以利不止而血斷者但下利亡津液故經斷利止津

液復經當自下

婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足本自有微寒故不

引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其經必復下

師曰寸口脉微而澀微則衛氣不足澀則血氣無餘衛不足其

息短其形燥血不足其形逆榮衛俱虛言語謬誤跌陽脉浮而

澀澀則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣澀則失液少陰脉

微而澀微則無精邊則陰中寒澀則血不來此為居經三月一

來

師曰脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為不可者此為

居經三月一來
問曰婦人妊娠三月師脉之言此婦人非軀今月經當下其脉

反弱則少血孤陽獨叫陰不能吸二氣不停衛降榮竭陰為積

寒陽為聚熱陽盛不潤經絡不足陰虛陽往一作故令少血時

發酒浙咽燥汗出或溲稠數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故

知非軀畜煩滿洩月粟一經三月一來陰盛則瀉名曰居經

問曰婦人年五十所一朝而清血二三日不止何以治之師曰

此婦人前絕生經水不下今反清血此為居經不須治當自止

經水下常五日止者五日愈

婦人月經一月再來者經來其脉欲自知常而反微不利不汗

出者其經一月必來

平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證第五

問曰婦人病經水適下而發其汗則鬱冒不知人何也師曰經

水下故為裏虛而發其汗為表復虛此為表裏俱虛故令鬱冒

也

問曰婦人病如癩疾鬱冒一日二十餘發師脉之反言帶下皆

如師言其脉何類何以別之師曰寸口脉澀而緊澀則陽氣微

緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽不和邪氣舍於榮衛

疾疾作疾起年少時經水來以合房室移時過度精感命門開經

下血虛百脉皆張中極感陽動微風激成寒因虛舍榮衛冷積

於丹田發動上衝奔在首膈津液掩口入涎唾涌溢出眩冒狀

如厥氣衝解裏熱粗瞽名為癩灸之因大刺

問曰婦人病苦氣上衝背眩冒吐涎沫解裏氣衝熱師脉之不

名帶下其脉何類何以別之師曰寸口脉沈而微沈則衛氣伏

微則榮氣絕陽伏則為疹陰絕則亡血病當小便不利津液閉

少亡血損經絡因寒為氣厥手足苦痺氣從丹田起上至背脇
沈寒悌鬱於上背中空寒氣壓陽部而翁如醉形躄似肥此乃
浮虛醫反下之長針復重虛寒衝久發眩冒故知為血厥也
問曰五崩何等類師曰白崩者形如涕赤崩者形如絳津黃崩
者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如衄血也
師曰有一婦人來脉反得微瀦法當吐若下利而言不因言夫
人年幾何夫人年七十七四十九經水當斷反至今不止以故致
此虛也

寸口脉弦而大弦則為減大則為乳減則為寒乳則為虛寒虛
相搏脉則為葦婦人則半產漏下旋復花湯主之

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之

婦人經水不利抵當湯主之在傷寒中

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物礬石圓主

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之腹中疼痛始

婦人腹中痛小建中湯主之腹中痛小建中湯主之

平咽中如有炙腐狀半夏厚朴湯主之

婦人咽中如有炙腐狀半夏厚朴湯主之

婦人臍燥喜悲傷欲哭象如神靈所以數欠甘草小麥湯主

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脉違身涼首

脇下滿如結骨狀其人謔語此為熱入血室當刺期門隨其虛

實而取之

婦人中風七八日續有寒熱發作有時經水適斷者此為熱入

血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方在傷

寒中

婦人傷寒發熱經水適來晝日了暮則謔語如見鬼狀此為
熱入血室無犯胃氣若上二膳必當自愈二手
陽明病下血而謔語此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨
其實而瀉之瀉然汗出者則愈
婦人少腹滿如敦敦狀要醫云小便微難而不渴生後生後者
此為水與血并結在血室大黃甘遂湯主之

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證第七

婦人陰寒溫中坐藥蛇床子散主之

婦人若坐藥強下其經目眶為痛足跟難以踐地心中狀如懸

師曰得病轉胞不得溺也何以故師曰此人故肌盛頭暈身滿

今反羸瘦頭暈中空感一作胞系了矣故致此病但利小便則

愈宜服腎氣丸以中有茯苓故也方在虛勞中

師曰脉得浮緊法當身軀疼痛設不痛者當射云何因當射言

若腸中痛腹中鳴效者因失便婦人得此脉者法當陰吹

師曰寸口脉浮而弱浮則為虛弱則無血浮則短氣弱則有熱

而自汗出跌陽脉浮而濇浮則氣滿濇則有寒喜噫吞酸其氣

而下少腹則寒少陰脉弱而微微則少血弱則生風微弱相搏

陰中惡寒胃氣下泄吹而正喧

師曰胃氣下泄吹而正喧此殺氣之實也膏薑導之

少陰脉清而數者陰中則生瘡

少陰脉數則氣淋陰中生瘡

婦人陰中蝕瘡爛狼牙湯洗之

婦人臍腫如瓜陰中疼引臂痛者杏人湯主之

婦人臍腫如瓜陰中疼引臂痛者杏人湯主之

少陰脈弦者白腸必擬核

少陰脈浮而動浮則為虛動則為痛婦人則脫下

平婦人病生死證第八

診婦人漏血下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生

診婦人漏下赤白不止脈小虛滑者生大緊實數者死

診婦人新生乳子脈沈小滑者生實大堅弦急者死

診婦人疝瘕積聚脈弦急者生虛弱小者死

診婦人新生乳子因得熱病其脈懸小四肢濕者生寒清者死

診婦人生產因中風傷寒熱病喘鳴而有息脈實大浮緩者生

小急者死

診婦人生產之後寸口脈炎疾不調者死沈微附骨不絕者生

。金瘡在陰處出血不絕陰脈不能至陽者死接陽而復出者

生

平小兒雜病證第九

小兒脈呼吸八至者平九至者傷十至者困

診小兒脈法多雀鬪要以三部脈為主若緊為風瀰沈者乳不

消弦急者客忤氣

小兒是其日數應變蒸之時身熱而脈亂汗不出不欲食食輒

吐現者脈亂無苦也

小兒脈沈而數者骨間有熱欲以腹按冷清也

小兒大便赤青辦穢溲沫脉小手足寒難已脉小手足溫易已

小兒病困汗出如珠者身不流者死

小兒病其頭毛皆上逆者必死耳間青脉起者瘰癧

小兒病而肉陷入其口脣乾目皮反口中氣出冷足与頭相抵

臥不舉身手足四肢垂其臥正首如得縛其掌中冷皆死至千日不可復治之

新刊王氏脈經卷第九

新刊王氏脉經卷第十

手檢圖三十一部

朝散李杲 北極堂直秘劉宗素 關德 護軍 臣林億 等類次

經言肺者人之五藏華蓋也上以應天解理萬物主行精氣法五行四時知五味十口之中陰陽交會中有五部前後左右各有所主上下中央分為九道浮沈結散知邪所在其道

奈何

歧伯曰脉大而弱者氣實血虛也脉大而長者病在下低浮直上下交通者陽脉也堅在腎急在肝實在前如外者足太陽也中央如外者足陽明也後如外者足少陽也中央直前者手少陰也中央直中者手心主也中央直後者手太陽也前如內者足厥陰也中央如內者足太陰也後如內者足少陰也前部左右彈者陽蹻也中部左右彈者帶脉也後部左右彈者陰蹻也從少陽之厥陰者陰維也從少陰之太陽者陽維也來大時小者陰絡也來小時大者陽絡也前如外者足太陽也動苦頭項腰痛浮為風瀆為寒熱緊為宿食

前如外者足太陽也動苦目眩頭項腰背強痛也

男子陰下濕女子月水不利少腹痛引命門陰中痛

子藏閉浮為風瀆為寒血滑為勞熱緊為宿食鍼入九分却至六分

中央如外者足陽明也動苦頭痛面赤微滑苦大便不利腸

鳴不能食足胫痺

中央如外者足陽明也動苦頭痛面赤熱浮微滑苦大便不

利喜氣滿滑者為飲瀆為嗜卧腸鳴不能食足胫痺鍼入九分却至六分

後如外者足少陽也動苦腰背胛股肢節痛後如外者足少陽也浮為氣瀆瀆為風血急為轉筋絃為勞鍼入九分却至六分

右足三陽脉

前如內者足厥陰也動苦小腹痛月經不利子藏閉前如內者足厥陰也動苦小腹痛與腰相連大便不利小便難壅中痛女子月水不利陰中寒子門雍絕內少腹急男子疝氣兩丸上入淋也鍼入六分却至三分

中央如內者足太陰也動苦胃中痛食不下欬唾有血足脛寒少氣身重從腰上狀如居水中

中央如內者足太陰也動苦腹滿上膈有寒食不下病以飲食得之沈瀆者苦身重四肢不動食不化煩滿不能卧足脛痛苦寒時欬血泄利黃鍼入六分却至三分

後如內者足少陰也動苦少腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

後如內者足少陰也動苦小腹痛與心相引背痛淋從高墮下傷於內小便血

是也

中部左右彈者帶脈也動苦少腹痛引命門女子月水不來絕經復下止陰碎寒令人無子男子苦少腹拘急或失精也

後部左右彈者陰蹻也動苦顛癩寒熱皮膚強_{一作痺}後部左右彈者陰蹻也動苦少腹痛裏急腰及髓窮下相連陰中痛男子陰汗女子漏下不止

右陽蹻陰蹻帶脈

中央直前者手少陰也動苦心痛微堅腰脇急實堅者為感忤純虛者為下利腸鳴滑者為有娠女子陰中瘰癧痛出玉門上一分前

中央直中者手心主也動苦心疲面赤食苦咽多喜怒微浮者苦悲傷恍惚不樂也澇為心下寒沈為恐怖如人捕之狀也時寒熱有血氣

中央直後者手太陰也動苦效逆氣不得息浮為內風緊瀦者官中有積熱時效血也有沈熱

右手二陰脈

從少陰斜至太陽是陽維也動苦肌肉痺癢

從少陰斜至太陽是陽維也動苦顛癩小羊鳴手足相引甚者失音不能言癩疾直取客主人兩陽維脈在外踝絕骨下二寸

從少陽斜至厥陰是陰維也動苦顛癩僵仆羊鳴

從少陽斜至厥陰是陰維也動苦僵仆失音肌肉淫癢汗出惡風

脈來暫大暫小是陰絡也_{一作}動苦肉痺應時自發身洗洗

也

脈來暫小暫大者是陽絡也_{一作}動苦皮膚痛下部不仁汗出而寒也

右陽維陰維陽絡陰絡脈

前部橫於寸口九丸者任脈也動苦少腹痛逆氣搶心胸拘急不得俛仰

三部俱牢直上直下者衝脈也動苦胸中有寒疝

三部俱浮直上直下者腎脈也動苦腰脊強痛不得俛仰大人顛小兒癩

右任衝腎三脈

肺脈之來也如循榆葉曰平如風吹毛曰病如狀連珠者死期丙丁日馬中日中

心脈之來也如反芡芡大曰平如連珠曰病前曲後居如帶鉤者死期壬癸日人定夜半

肝脈之來也搏而若曰平如張新弓弦曰病如難踐地者死期庚辛日晡時日入

脾脈之來也阿阿如緩曰平如雞舉足曰病如鳥之啄如水之滿者死期甲乙日平旦日出

腎脈之來也微細以長曰平來如彈石曰病去如解索者死期戊己日食時日昃黃昏雞鳴

右平五藏脈

寸口中脈躁竟尺關中無脈應陽于陰也動苦腰背腹痛陰中若傷足寒刺足太陽少陰直絕骨入九分太陰五壯

尺中脈堅實竟尺寸口無脈應陰于陽也動苦兩脛腰重少

腰痛顛疾刺足太陰踝上三寸鍼入五分又灸太陽陽蹻在足外踝上三寸直絕骨是也

寸口脈緊直至魚際下小按之如持維竿一作維毛狀其病腸鳴

足痺痛酸腹滿不能食得之寒溫刺陽蹻在外踝上三寸間也入五分此脈出魚際

寸口脈沈著骨反仰其手乃得之此腎脈也動苦少腹痛腰體酸顛疾刺腎俞入七分又刺陰維入五分

初持寸口中脈如細堅狀久按之大而深動苦心下有寒胸脅苦痛陰中痛不破近丈夫也此陰逆刺期門入六分又刺腎俞入五分可灸胃管七壯

初持寸口中脈如躁狀洪大久按之細而堅牢動苦腰腹相引痛以下至足胫重也不能食刺腎俞入四分至五分亦可灸胃管七壯

尺寸俱沈但有關上脈苦寒心下痛

尺寸俱沈關上無有者苦心下喘

尺寸俱數有熱俱遲有寒

尺寸俱微厥血氣不足其人少氣

尺寸俱濡弱發熱惡寒出汗一云內溫熱手足過冷汗出短氣

寸口沈胸中痛引背一云短氣

尺中沈引背痛
寸口伏胸中有逆氣
關上伏有水氣泄瀉
尺中伏水穀不消

寸口弦胃中拘急一作心下幅幅

關上弦胃中有寒心下拘急

尺中弦少腹臍下拘急

寸口緊頭痛逆氣

關上緊心下痛

尺中緊臍下少腹痛

寸口濇無陽少氣

關上濇無血厥冷

尺中濇無陰厥冷

寸口微無陽外寒

關上微中實一作胃虛能食故裏急

尺中微無陰厥冷腹中拘急

寸口滑胸滿逆
關上滑中實逆
尺中滑下利少氣
寸口數即吐
關上數胃中有熱
尺中數惡寒小便赤黃
寸口實即生熱虛即生寒
關上實即痛虛即脹滿
尺中實即小便難少腹牢痛虛即閉塞
寸口衄吐血微衄衄血
關上衄胃中虛
尺中衄下血微衄衄小便血

寸口浮其人中風發熱頭痛

關上浮腹痛心下滿

尺中浮心便難

寸口遲上焦有寒

關上遲弱無胃氣有熱

尺中遲下焦有寒背痛

寸口滿陽弱自汗出

關上濡下重

尺中濡少血發熱惡寒

寸弱陽氣少

關弱無胃氣

尺弱少血

右雜言三部二十四種脈

新刊王氏脈經卷第十