



John Astley Esq





12. 30.



THE  
**NATURAL HISTORY**  
O F

*CAROLINA, FLORIDA and the BAHAMA ISLANDS:*

Containing the FIGURES OF

**BIRDS, BEASTS, FISHES, SERPENTS, INSECTS, and PLANTS:**

Particularly the FOREST-TREES, SHRUBS, and other PLANTS, not hitherto described, or very incorrectly figured by Authors.

Together with their DESCRIPTIONS in *English* and *French*.

To which are added,

**OBSERVATIONS on the AIR, SOIL, and WATERS:**

With Remarks upon

**AGRICULTURE, GRAIN, PULSE, ROOTS, &c.**

To the Whole

Is Prefixed a new and correct Map of the Countries Treated of.

By *MARK CATESBY*, F. R. S.

---

V O L. II.

---

**HISTOIRE NATURELLE**  
DE

*La CAROLINE, la FLORIDE, & les ISLES BAHAMA:*

Contenant les DESSEINS

Des OISEAUX, ANIMAUX, POISSONS, SERPENTS, INSECTES, & PLANTES.

Et en particulier,

Des ARBRES des Forets, ARBRISSEAUX, & autres PLANTES, qui n'ont point été decris jusques à présent par les Auteurs, ou peu exactement dessinés.

*Avec leur Descriptions en François & en Anglois.*

A quoi on a adjouté,

**Des Observations sur l'Air, le Sol, & les Eaux;**

Avec des Remarques sur l'Agriculture, les Grains, les Legumes, les Racines, &c.

Le tout est precedé d'une CARTE nouvelle & exacte des Païs dont ils s'agit.

Par *MARC CATESBY*, de la Société Royale.

---

TOME II.

---

L O N D O N .

Printed at the Expence of the AUTHOR: and Sold by W. INNYS, at the West End of St. Paul's; R. MANBY, on Ludgate-Hill; Mr. HAUKEE, at the Royal Society House, and by the AUTHOR.

MDCCXLIII.



T O H E R

R O T A L H I G H N E S S

T H E

P R I N C E S S of W A L E S.

M A D A M,

OME of the most wonderful Productions of *America* have now the Honour to lay themselves at the Feet of your ROYAL HIGHNESS: Things new and strange to the Inhabitants of this Side of the Globe; and, which must therefore necessarily excite, in Minds of infinitely less Discernment and Piety than that of your ROYAL HIGHNESS, exalted and religious Sentiments of the Power, Wisdom, and Goodness of that Almighty Being, who not only formed the Universe, but has adorned every Part of it with an inconceivable Variety of Beauty and Magnificence.

Ir was in Obedience to the Commands of our late *most Gracious QUEEN*, who condescended to over-look and approve my Drawings of the most extraordinary Curiosities of Nature observable in *Carolina*, and the adjacent Countries subject to the Crown of *Great Britain*, that I applied myself to compile a *Natural History* of those Parts of the World; and *Her Majesty* was pleased to take the first Volume of this Work under her own *Royal Patronage*.

SUCH an Instance of Goodness emboldened me to hope your ROYAL HIGHNESS would vouchsafe the like Honour to this second and last Volume; and I have been so happy not only to obtain Pardon for my Presumption, but likewise to find the utmost of my Ambition gratified in the Leave you have been pleased to grant me, of publishing my Labours under the Protection of your *Illustrious Name*.

D E D I C A T I O N.

HAPPY is it for Knowledge, when Princes love it, and become its Patrons! That you MADAM, may long live to be so, adorning your high Station with every Princely Virtue, and enjoying, together with your *Royal CONSORT*, Wealth, Honour, Power, Fame, the Affection of grateful Nations, and every Worldly Blessing; and that the like Happiness may attend your lovely Offspring, and be to endless Ages, perpetuated to their Posterity, is the fervent Prayer of

M A D A M,

*Your ROYAL HIGHNESS's*

*Most Dutiful,*

*Most Humble,*



*And most Devoted Servant,*

MARK CATESBY.



T

*Umbra minor &c.*



*Vulpis Bahamenis.*

MC

*UMBRA MINOR, marina maxillis longioribus.*

Vide Sloan, Hist. Jam. Tab. 247. Fig. 3.

*Barracuda.*

HIS Fish grows to a large Size; some of them I have seen ten Feet in Length, and some I was told are much longer, tho' the more common Length is that of about six or eight Feet. It is long in Proportion to its Thickness. And in Shape resembles somewhat the *European Pike*; the Eyes are large and bright, the Mouth is very wide, having the under Jaw longer than the upper; the upper Jaw is armed with four large Teeth, placed at the fore Part of the under Jaw: Next the Head are placed ten smaller Teeth, being five on each Side; and in the fore-part of the same Jaw grows one single large Tooth. On the Back grow two short Fins, distant from one another, with six Ribs in each Fin; near the Gills grow two more at a like Distance, lower on the Belly, was another Pair, and a single one a little behind the Anus; in all seven Fins: The Tail wide and forked.

This Fish was covered with thin Scales of a middling Size; dark brown on the Back, lightning gradually to the Belly, which was white. It is a swift Swimming, and very voracious Fish, preying on most others; and some of the largest Size have frequently attacked and devoured Men as they were washing in the Sea. They are in great Plenty in all the shallow Seas of the *Bahama-Islands*, and in many other Places between the *Tropicks*, the Flesh has a very rank and disagreeable Savour both to the Nose and Palate, and are frequently poisonous, causing great Sicknes, Vomiting, and intolerable Pain in the Head, with loss of Hair and Nails; yet the hungry *Bahamians*, frequently repast on their unwholesome Carcasses.



*E* Poisson devient fort grand; j'en ai vu de dix pieds de long: & l'on m'a dit qu'il y en avoit de beaucoup plus grands, quoy qu'ordinairement ils ne soient pas de plus de six ou huit pieds. Sa grosseur ne repond pas à sa longueur, & il ressemble assez au Brochet d'Europe; ses yeux sont grands & brillants, sa gueule est fort large, & la machoire inférieure est plus longue que la supérieure; la machoire supérieure est armée de quatre dents fort grandes, placées au-devant de la machoire inférieure: proche de la tête on trouve dix petites dents, cinq de chaque côté, & au-devant de la même machoire une seule grosse dent. Il a sur le dos deux nageoires fort courtes, éloignées l'une de l'autre, & composées chacune de six costes; il y en a deux autres proche des Oïdes, également éloignées; un peu plus bas sur le ventre il y en a une autre faire, & une seule un peu au-delà de l'anus; en tout sept nageoires. La queue est grande & fourchue.

*Ce Poisson etoit couvert d'écaillles minces de moyenne grandeur, d'un brun foncé sur le dos, & qui s'éclaircissaient à mesure qu'elles approchoient du ventre, qui étoit blanc. C'est un poisson vorace, & qui nage fort vite. Il se nourrit de la plupart des autres poissons, & quelques uns des plus grands ont souvent attaqué des hommes qui se baignoient dans la Mer. Ils sont en grand nombre dans tous les Bassin des îles Bahama, & en plusieurs autres endroits entre les Tropiques: leur chair a un goût rance & désagréable qui offense également le palais & l'odorat, & quelquefois c'est une espèce de poison, qui rend très malade, cause des vomissements & des douleurs de tête insupportables, & fait tomber les cheveux; cependant les Bahamiens affamés ne laissent pas de manger assez souvent d'un mets si malfaisant.*

*VULPIS BAHAMENSIS.*

**T**HE Length of this Fish is usually about sixteen Inches and very small and tapering towards the Tail, which is remarkably wide and forked: The Mouth is pretty wide with a single Row of small sharp Teeth in each Mandible. It is covered with somewhat large thin Scales of an Umber Colour on the Back and whitish on the Belly. It hath five Fins, one on the Back, another a little below it on the Belly; and another between that and the Tail, with a Pair under the Gills.

**L**A longeur de ce Poisson est environ de seize pouces, il est fort mince & pointu vers la queue, qui est fort large & fourchue: Sa gueule est assez fendue, & n'a à chaque machoire qu'un rang de petites dents pointues. Il est couvert d'écaillles assez larges & minces, de couleur d'ambre sur le dos, & blanchâtres sur le ventre; il a cinq nageoires, une sur le dos, une autre un peu plus bas sur le ventre; une troisième entre celle-cy & la queue, & une faire sous les Oïdes.

*PERCA marina gibbosa cinerea.*

*The Margate Fish.*



HIS Fish has a rounding Back, making a curved Line between the Head and Tail; the Iris of the Eye white, with a Tincture of yellow; the Mouth moderately wide, and red within; the upper Mandible hanging a little over the lower; both of them have a single Row of small sharp Teeth; the Scales are rather large, of a blackish brown Colour, but as the Bellies of most Fish are lightest colour'd, so is the Belly of this Fish much lighter than the Back: From the Head at some Distance from the Ridge of the Back, runs parallel to it a narrow black curved Line to the Tail. It had six Finns, two under the Gills, one on the middle of the Back, strengthened with several Ligulae or sharp pointed Bones, behind which and joining to it is another pliant even Finn; one under the Abdomen, and a sixth behind the Anus. They are one of the most numerous kinds of Fish, frequenting the Bahama-Islands, and are esteemed very good Meat.



Le Poisson a le dos uouté, en sorte qu'il fait une ligne courbe entre la tête & la queue; l'Iris de ses yeux est blanc avec une nuance de jaune; sa gueule modérément fendue, & rouge en dedans; la machoire superieure avançant un peu plus que l'inférieure: l'une & l'autre est garnie d'un simple rang de petites dents pointuës. Ses écailles sont assez grandes, d'un brun noirâtre; mais comme le ventre de la plupart des poissons est d'une couleur claire, le ventre de celui-cy est beaucoup plus clair que son dos. Une raye noire & étroite s'étend depuis sa tête jusque à sa queue, parallèlement à la courbure de son dos. Il a six nageoires, deux sous les ouies, une sur le milieu du dos, fortifiée de plusieurs épines aiguës, derrière & joignant celle-là, il y en a une autre souple & sans cotes; une autre sous l'Abdomen, & la sixième derrière l'Anus. C'est une des espèces de poissons les plus nombreuses qui se trouvent proche des Isles Bahama, & on les regarde comme une très bonne nourriture.

*SAURUS ex cinereo nigricans.*

*The Sea Sparrow-Hawk.*

HIS is a slender long Fish, with middle-sized brown Scales; the Eye black, the Iris reddish; the Mouth very wide, both Mandibles being thick set with small sharp irregular sized Teeth. It hath six Finns, two behind the Gills, one under the Abdomen, one behind the Anus, and one on the middle of the Back, besides a very small one between that and the Tail. The Tail forked.

This Fish was caught on the Coast of Carolina, and is the only one I have ever seen. It was of the Size of the Figure.

Ce Poisson est long & menu avec des écailles moyennes & brunes; l'œil noir, l'Iris rougâtre, la gueule fort fendue, les deux mandibules sont garnies de petites dents pointuës, inégales & fort serrées. Il a six nageoires; deux derrière les ouies, une sous le ventre, une derrière l'anus, & une sur le milieu du dos, outre une très petite entre celle-cy & la queue. Sa queue est fourchue.

Ce Poisson fut pris sur la côte de la Caroline, & c'est le seul que j'aie jamais vu; il étoit de même grandeur que la Figure.

T 2

Percia &c.




Sauritus &c.





T 3



Perca rubra &c.

*PERCA marina, pinna dorsi divisa.*

*The Croker.*

**H**IIS Figure represents the common Size of the Fish, as they are found in most of the Rivers in *Virginia*, but in deeper Waters, as in the great Bay of *Chesapeake* they are taken sometimes three Feet in Length. It is covered with Scales of a reddish Umber Colour. The Iris of the Eye of a gold Colour: The Mouth wide, with Rows of very small sharp Teeth. It had six Finns, one on the middle of the Back of a triangular Form; one extending from that to the Tail of a red Colour, two behind the Gills, and two under the Belly. The Tail was red and notched.

This Fish is tolerable good Meat.



*A Figure représente la taille ordinaire de ce Poisson, tel qu'on le trouve dans la plus-part des Rivieres de la Virginie; mais dans des Eaux plus profondes, comme dans la Baye de Chesapeake, on en prend quelquefois de trois pieds de long. Il est couvert d'écailles d'un rouge doré; l'Iris de ses yeux couleur d'or; la gueule large, garnie de rangées de tres petites dents pointues. Il avoit six nageoires, une sur le milieu du dos, de forme triangulaire; une autre rouge, qui s'étend depuis celle là jusques à la queue; deux derrière les ouïes, & deux sous le ventre; la queue étoit rouge & entaillée. Ce Poisson est assez bon à manger.*

*PERCA marina rubra.*

*The Squirrel.*

**T**Hese Fish are most commonly of the Size of this Figure, tho' some of them grow to four times the Bigness: The Eye is large; the Iris yellow; the Mouth rather small, with many small Teeth like those of a Pearch: The whole Fish was red; having six Finns, one on the Back strengthened with many large pointed Bones, behind which and joining to it shoot fourth a long pliant sharp pointed Finn, it had also a long Finn under the Abdomen, with another behind the Anus, guarded by a strong sharp Bone annexed to it by a thin Membrane. This is a good eating Fish.

**C**ES Poissons sont ordinairement de la grandeur de la Figure, quoique quelques-uns deviennent quatre fois plus gros; leurs yeux sont grands; l'Iris est jaune; la gueule petite, avec plusieurs petites dents, comme celles d'une Perche. Tout ce Poisson est rouge. Il a six nageoires, une sur le dos, fortifiée de plusieurs os piquants, elle est jointe par derrière à une autre nageoire longue & pliante, & se terminant en pointe aiguë; il en a aussi une longue sous le ventre, & une autre derrière l'anus; elle est défendue par un os fort & pointu, auquel elle est attachée par une membrane fort mince. Ce Poisson est très bon à manger.

*PERCA marina rhomboidalis fasciata.*

*The Pork Fish*



HIS Fish is broad and short, and somewhat flat, with a rising Back; the Eye of a bright yellow; the Mouth moderately wide, with many very small sharp Teeth: The whole Body was covered with dark gray and yellow Scales in Rows, alternately from the Head to the Tail. It had five Finns, one from the Top of the Back, reaching almost to the Tail, the fore-part having sharp pointed Bones, the hind-part more thin and pliant; two behind the Gills, one under the Abdomen, and one behind the Anus, guarded with a large pointed Bone. All the Finns were yellow, as was the Tail, which was forked. The Bahamians esteem this a good Fish.



E Poisson est large & court, & un peu plat avec le dos vouté; son œil est d'un jaune brillant, sa gueule modérément fendue, garnie d'un grand nombre de petites dents très pointues: tout son corps est couvert d'écailles d'un gris obscur, & jaunes rangées alternativement depuis la tête jusques à la queue. Il a cinq nageoires, une depuis le milieu du dos, presque jusques à la queue; le devant en est garni de pointes roides & aiguës; vers la queue elle est plus mince & plus souple: il en a deux autres derrière les ouïes, une sous le ventre, & la cinquième derrière l'anus, armée d'un grand os pointu. Toutes ces nageoires sont jaunes, de même que la queue, qui est fourchue. Les Bahamiens croient ce poisson très bon.

*PERCA marina pinnis branchialibus carens.*

*The Schoolmaster.*

SOMETIMES these Fish grow to the Length of a Foot, though this is the more common Size. This was covered with large thin Scales of a dirty red Colour; the Eye large, somewhat oval, with a yellow Iris: It had no more than three Fins, one on the Back, the fore-part of which had sharp Spines; one under the Abdomen, and another between the Anus and the Tail, guarded in the fore-part with three sharp Bones. The Tail was forked; all the Finns and Tail were of a deep yellow Colour.

Q Uelquefois ces Poissons croissent jusques à un pied; quoique ce soit ici leur taille la plus ordinaire. Celui-cy étoit couvert de grandes écailles minces d'un rouge obscur; les yeux étoient grands, un peu ovales, avec un Iris jaune: Il n'avoit que trois nageoires, une sur le dos, dont le devant étoit garni d'épines pointues; une sous le ventre, & une autre entre l'anus & la queue; celle-cy étoit fortifiée par devant de trois os pointus. Sa queue étoit fourchue; les nageoires & la queue étoient d'un jaune foncé.

T 4

Perca rhomboidalis &c.



Perca fluviatilis &c.





T<sub>5</sub>



*Percá venenosa &c.*

*PERCA marina venenosa punctata.*

*The Rock-Fish.*



HESE Fish are sometimes found two or three Feet in Length, though the common Length is about one or one Foot and an half, The whole Fish was covered with smooth thin Scales of a dark brown Colour, very dark on the Back and light on the Belly, sprinkled over with red Spots bordered with black. The Eye was deep red: It had five Finns; one on the Back of different Texture, the fore-part having sharp Spines, the hind tender and pliant; under the Abdomen was another, and another behind the Anus, and two behind the Gills, the Ends of which were yellow. The Tail was broad, and a little notched. This Fish has the worst Character for its poisonous Quality of any other among the *Bahama Islands*, but whether they are eatable from any particular Places I know not; many of their poisonous Fishes being not so when caught in some Places; of which the Inhabitants can give a near Guess, but sometimes they are miserably deceived.



ON trouve quelques-uns de ces Poissons, qui ont jusques à deux & trois pieds de long, quoique d'ordinaire ils n'ayent qu'un pied ou un pied & demi de longueur. Tout ce Poisson étoit couvert d'écailles minces & unies, d'un brun obscur fort foncé sur le dos, & plus clair sur le uentre, & tout parsemé de taches rouges bordées de noir: Ses yeux étoient d'un rouge foncé, il avoit cinq nageoires, une sur le dos d'inegale structure, le devant en étoit garni d'épines fort piquantes, & le derrière étoit mince & souple. Il y en avoit une autre sous le ventre, un autre derrière l'anus, & deux derrière les Oüies, dont les extrémités étoient jaunes. Sa queue étoit large, & un peu entaillée. Ce Poisson est fort décrié dans les Isles Babamà a cause de sa qualité venimeuse, mais je ne scçai pas s'il n'y en a pas de bons à manger, car plusieurs de leurs Poissons uenimeux n'ont point cette mauvaise qualité, lorsqu'on les pêche en certains endroits, que les habitans ne connoissent pas si sûrement qu'ils n'y soient quelquefois miserablement trompés.

*PERCA marina capite striato.**The Grunt.*

HIS Fish is commonly a Foot in Length, the Eyes of a bright yellow: the Body covered with large brown Scales, edged with yellow: From the Eye to the Tail extends a Row of smaller Scales within the large ones: The Mouth is wide and red within; the lower Mandible longest, having a single Row of small sharp Teeth: The Head elegantly striped with yellow and blue alternately, the Back was armed with a sharp spiny Finn, joining to which between it and the Tail, was another small and more tender Finn; on each Side the Gills were two long pointed Finns, one under the Abdomen, and another behind the Anus, with a strong pointed Bone joining to it.



*E* Poisson est ordinairement d'un pied de long, ses yeux sont d'un jaune fort vif, il est couvert de grandes écailles brunes bordées de jaune; depuis les yeux jusques à la queue il y a une rangée de petites écailles parmi les grandes: Sa gueule est large & rouge en dedans; sa machoire inferieure est la plus longue, elle est garnie d'un seul rang de petites dents pointuës: Sa tête est agreablement rayée alternativement de Bleu & de jaune, son dos étoit armé d'une nageoire garnie de pointes fort roides, & entre celle-cy & la queue il y avoit une autre petite nageoire plus souple. De chaque côté des Ouires il y avoit deux longues nageires pointuës; une sous le ventre, & une autre derrière l'anus, à laquelle se joignoit un os fort & pointu.

*ALBULA Bahamensis.**The Mullet.*

THE Figure shews the usual Size of these Fish, the Eye large with a light Iris: The Mouth small and without Teeth; about the middle of the Back was a small Finn, and another near the Tail: Under the fore-part of the Belly was a small Finn, and another between the Anus and the Tail: The Tail large and forked: The Scales of this Fish were large and of a shining Colour. They are esteemed good eating Fish, and are caught in great Quantities in particular Parts of the *Bahama* Seas, at the times they go in Shoales to spawn.

*L*A Figure fait voir la grandeur ordinaire de ce Poisson: ses yeux sont grands, avec un Iris d'un blanc clair; sa bouche petite & sans dents; vers le milieu du dos il avoit une petite nageoire, & une autre proche la queue; une petite sous le ventre, & une autre entre l'anus & la queue: Sa queue grande & fourchue: Ses écailles étoient grandes, & d'une couleur brillante. On regarde ces Poissons comme un bon manger, & l'on en prend une grande quantité en certains endroits des Mers de Bahama, lors qu'ils s'assemblent pour frayer.


MC



Albula &c.

Perca &c.


T o







Perca &c



T 7



Perca canda nigra.

*PERCA marina puncticulata.**The Negro Fish.*

His Fish was in Shape not unlike a Pearch, and in Length usually from six to ten Inches, of a dark brown Colour; sprinkled thick all over with small blue Spots: The Iris of the Eye red and yellow, blended in each other: The Mouth wide, with a single Row of sharp Teeth in each Mandible; The Number of Finns were five, one on the Back, the fore-part of which was strengthened with spiny Bones, the hind-part was more tender and pliant; behind the Gills were two more, and one under the Abdomen, with a fifth behind the Anus, having two sharp pointed Bones annexed to it. The Tail convex at the End.



*E Poisson ressemble assez à la Perche, sa longeur est ordinairement depuis six jusques à dix pouces, sa couleur est d'un brun obscur, tout tacheté de petites marques bleues, fort proches les unes des autres. L'Iris de ses yeux est rouge & jaune meslés ensemble : sa gueule large, avec un rang de dents pointuës à chaque machoire ; il avoit cinq nageoires, une sur le dos, dont le devant étoit fortifié d'os pointus, le derrière en étoit plus mince & plus souple : Il y en avoit deux de plus derrière les Ouiés, une sous le ventre, & la cinquiesme derrière l'anus, à laquelle étoient joints deux os fort piquants : Sa queue étoit arrondie par son extrémité.*

*PERCA marina cauda nigra.**The Black-Tail.*

**T**HIS Fish is usually of the Size of the precedent, dusky black on the Back, and lighter towards the Belly, with single Rows of yellow Scales from the Head to the Tail. The Mouth and Teeth like those of a Pearch. The Iris of the Eyes dark gray: A large prickly Finn on the Back, was joined by another smaller one, with an even Edge: Behind the Gills were two more, under the Abdomen was another, and one behind the Anus, with a sharp Bone annexed to the fore-part of it, The Tail was black and bordered round the Edges, with a broad List of white, and very forked.

**C**E Poisson est ordinairement de la même grandeur que le précédent, d'un noir obscur sur le dos, & plus clair vers le ventre, avec des rangs d'écailles jaunes, depuis la tête jusques à la queue ; sa gueule & ses dents comme celles de la Perche ; l'Iris de ses yeux d'un gris foncé : Il avoit sur le dos une grande nageoire garnie de pointes, jointe à une plus petite, dont l'extremité étoit égale & sans piquants ; il y en avoit deux de plus derrière les Ouiés, une sous le ventre, & enfin une derrière l'anus, qui étoit attachée par devant à un os fort pointu : Sa queue étoit noire, bordée tout autour d'une large bande blanche, & elle étoit très fourchue.

## HIRUNDO.

*The Flying Fish.*

HIS Fish had a small Mouth without Teeth: The Body somewhat long and round: The two Finns behind the Gills are extraordinary large, and spread very wide. On the hind-part of the Back was another small Finn, and under it on the Belly was a fourth. The Tail large and forked: The Scales like those of a Herring, but of a darker Colour. These Fish are seen in most Parts of the Torrid Zone, and inhabit not the Northern Climates; yet in Summer some few wander to the Latitude of 40 Degrees.

As they are a Prey to both Fish and Fowl, Nature has given them those large Finns, which serve them not only for Swimming, but likewise for Flight. They are good eating Fish, and are caught plentifully on the Coasts of Barbados, where at certain Seasons of the Year the Markets are supplied with them.



E Poisson avoit une petite bouche sans dents, son corps étoit un peu rond & long; les deux nageoires derrière les Ouiés sont extrêmement grandes, & fort larges, il y avoit sur le bas de son dos une autre petite nageoire, & immédiatement sous celle-là la quatrième étoit placée sur le ventre. Sa queue est grande & fourchue; Ses écailles sont comme celles du Hareng, mais d'une couleur plus foncée. On voit ces Poissons presque dans toute la Zone Torride, & ils n'habitent point les climats du Nord, cependant ils ne laissent pas de s'avancer dans l'Eté jusques à la latitude de 40 degrés.

Comme ils sont également la proye des Poissons & des Oiseaux, la Nature leur a donné ces grandes nageoires qui ne leur servent pas seulement à nager, mais aussi à voler. Ce Poisson est très bon à manger, on en prend quantité sur les côtes des Barbades, & dans certaines Saisons les marchés en sont abondamment fournis.

PERCA *Marina sectatrix.**The Rudder Fish.*

**T**HIS is the common Size of this Fish. The Finn on the Back was prickly before and not behind: Two Finns were placed behind the Gills, one under the Abdomen, and a fifth between that and the Tail; to the fore-part of which is joined three sharp pointed Bones: The upper Part of the Body was brown, with large Spots of dusky yellow; the under part of the Body was alternately streaked with white and yellow; the Eyes and Gills were variously colour'd with white, red and yellow: the Tail forked and red at the End. These Fish are most commonly seen in warm Climates, and in crossing the Atlantick Ocean Ships Rudders are seldom free from them: they seem to gather their Nutriment from the Slime adhering to the Rudder and Bottom of the Ships; and tho' so small a Fish, they keep Pace with Ships in their swiftest Course.


**T**ELLE est la taille ordinaire de ce Poisson. La nageoire de dessus son dos étoit garnie de piquants par devant & non par derrière; il avoit deux nageoires derrière les Ouiés, une sous le ventre, & une cinquième entre celle-là & la queue, cette dernière a par devant trois Os pointus qui lui sont attachés: le dessus de son corps étoit brun avec de grandes taches d'un jaune obscur: le dessous de son corps étoit rayé alternativement de blanc & de jaune: Ses yeux & ses Ouiés étoient meslés de blanc, de rouge, & de jaune: Sa queue fourchue & rouge à son extrémité. Ces Poissons se trouvent plus communément dans les climats chauds, & en traversant l'Océan Atlantique, il s'en attache presque toujours au gouvernail des vaisseaux; il semble qu'ils tirent leur nourriture du limon dont le gouvernail & le fonds des Vaisseaux est couvert; & quelque petit que soit ce Poisson, il suit les Vaisseaux dans leur course la plus rapide.

PERCA *fluviatilis gibbosa ventre luteo.**The Fresh-Water Pearch.*


**T**HIS Pearch is generally small, rarely growing to the Size of a Man's Hand: The upper-part of it dusky blue, the Back being darkest; the Belly yellow; the Gill's blue, with some Streaks of dark yellow, with a red Spot at the Angle of each Gill; joining to which was a black Spot, which distinguished it from all the Fish I have ever seen: It had one Finn on the Back, the fore-part of which had prickly Spines, the hind-part smooth; two behind the Gills, a prickly one under the Abdomen; and another between that and the Tail, with two Prickles: The Tail forked, the Tail and Finns brown, except that under the Abdomen. Of these Fish there are plenty both in Carolina and Virginia: They are found mostly in Mill-Ponds and other standing fresh Waters: They are called by some Ground Pearch, from their burrowing into, and covering themselves in the Mud or Sand.

## Perche d'eau douce.


**C**ETTE Perche est ordinairement petite, elle devient rarement aussi grande que la main: Le dessus en est d'un bleu foncé, le dos est le plus obscur, le ventre jaune, les Ouiés bleus, avec quelques rayures d'un jaune brun, & une tache rouge à l'angle de chaque Ouié, auprès duquel il y avoit une tache noire, Ce qui distingue ce Poisson de tout autre que j'ayé jamais vu: Il avoit une nageoire sur le dos, dont le devant étoit garni d'os piquants, & le derrière tout uni, deux derrière les Ouiés, une piquante sous le ventre, & une autre armée de deux pointes entre celle-là & la queue: la queue fourchue, la queue & les nageoires brunes, hors celle de dessous le ventre. Il y a quantité de ces Poissons à la Caroline & à la Virginie, on les trouve ordinairement dans les Etangs des moulins & d'autres eaux douces dormantes; quelques uns les appellent Perches de Terre, parce qu'ils s'enfoncent dans la vase, où dans le sable.



Hirundo



Perca &c.




Perca fluviatilis &c.





T 9



Turdus &c.

*TURDUS PINNIS, branchialibus carens.**The mangrove Snapper.*

The Figure represents the usual Size of this Fish ; The Colour of it was that of Umber, dark on the Back, and light on the Belly : The Sides of the Mouth were red, as were some Parts of the Gills with a faint Tincture of blue : The Nose was pointed, the Mouth wide, and at the End of each Mandible were two large Teeth ; It had no more than three Fins, a very long prickly one, covering the greater Part of the Back, one under the Abdomen, and a third behind the Anus : The Tail large, ending in a concave Curve. It is esteemed pretty good Food.



*A Figure représente la grandeur ordinaire de ce Poisson, il étoit couleur de Terre d'Ombre, foncée sur le dos & claire sur le ventre. Les côtés de sa bouche étoient rouges, de même qu'une partie des Ouyes, avec une nuance pâle de bleu : Son museau étoit pointu, sa bouche large, & à l'extrémité de chaque machoire il avoit deux grandes dents ; Il n'avoit que trois nageoires, une fort longue & armée de piquants qui couvroit la plus grande partie de son dos, une sous le ventre, & la troisième derrière l'anus : Sa queue grande & se terminant par une ligne concave. On le croit un assez bon mets.*

## TURDUS Rhomboidalis.

## The Tang.



HE Figure shews the common Size of this Fish, tho' some are twice as big : The Body is covered with small Scales of a dusky Blue; A large prickly Finn reach'd from over the Eyes the

length of the Back almost to the Tail ; another grows out from the Fore-part of the Abdomen, and a third beginning about the middle of the Abdomen reaches likewise to the Tail. The Finns and Tail were of a brighter Blue than the Body : The Tail broad, both Sides shooting into sharp Points, the Mouth of a singular Structure, very small and without Teeth, and consequently of no Defence ; But Nature has supplyed that deficiency by Arming in a singuler Manner the Tail on each Side with a strong sharp-pointed Bone, which in Defense of himself he extends when Danger approaches. This Weapon with the prickly Finns seem to deter the voracious Fish that prey on others from attacking him. Yet I have seen a Barracuda pursue and bite off a third Part of him behind ; which when he had swallowed he deliberately bit off half the remaining Part, and devoured the whole Fish at the third mouth-full. These and such like Accidents I have often been diverted with in the shallow Seas of the Bahama Islands ; where the Water is so exceeding clear, that the smallest Shell may be distinctly seen at several Fathom depth, when the Water is smooth. It is accounted a good eating Fish.



ETTE Planche représente la Taille de ce Poisson, quoy qu'il y en ait quelques-uns deux fois plus grands : Son corps est couvert de petites Ecailles d'un bleu obscur ;

une grande nageoire piquante s'étend depuis au-dessus des yeux tout le long du dos presque jusques à la queue, une autre sort de la partie antérieure du ventre, & une troisième commence vers le milieu de l'abdomen, & va de même jusques à la queue ; les nageoires & la queue étoient d'un bleu plus clair que le corps, la queue large, ses deux côtés se terminant en pointes aiguës, la bouche d'une forme particulière, fort petite, sans dents, & de nulle défense par conséquent ; mais la nature a supplié à ce défaut, en armant la queue de ce Poisson de chaque côté d'un os fort & pointu, qu'il étend pour sa défense lors que quelque danger le menace : cette arme & ses nageoires piquantes semblent épouvanter les poissons voraces & les empêcher d'attaquer celui-ci. J'ai cepndant vu un Barracuda en poursuivre un, & le mordre par derrière, ensorte qu'il en coupa environ le tiers, & après avoir avalé ce morceau, il coupa la moitié du reste & devora tout le poisson en trois bouchées. J'ai souvent eût le plaisir de voir ces sortes de combats dans les bas-fonds des Isles Bahama, où l'eau est si parfaitement claire qu'on peut distinguer le moindre coquillage à plusieurs brasses de profondeur, lors que l'eau n'est point agitée. Ce poisson passe pour un très bon mets.

## TURDUS

## cauda convexa.

## The Yellow Fish.


SOME of these Fish were a Foot in length : This had small thin Scales of a reddish yellow Colour, the Mouth wide, the under Mandible longer than the upper, and with a double Row of small Teeth ; at the End of the upper Mandible were fixed three large Teeth, with some very small ones within the Roof of the Mouth, the Irides of the Eyes red. It had five Finns, a long prickly one on the Back, two behind the Gills, one under the Abdomen, and another behind the Anus, to which is joined by a thin Membrane a sharp-pointed Bone. The Tail rounding or convex.

## Poisson Jaune.

quelques-uns de ces Poissons ont un pied de long ; celui-ci avoit de petites écailles minces d'un jaune tirant sur le rouge, la bouche large, la mandibule inférieure plus longue que la supérieure, avec un double rang de petites dents : à l'extrémité de la mandibule supérieure étoient trois grosses dents avec quelques-unes très-petites attachées au palais ; l'Iris des yeux rouge. Il avoit cinq nageoires : une longue & piquante sur le dos, deux derrière les Ouyes, une sous le ventre, & une autre derrière l'anus, à laquelle un os pointu est attaché par une membrane très mince. La queue s'arrondissoit par son extrémité.

Tur

Turdus Rhomboidalis




Turdus &c





T 11

*Turdus flavus*



*Turdus &c*



226

## TURDUS FLAVUS.

## The Hog-Fish.

**T**HE largest Size of this Fish, that I have observed, was as big again as this Figure: The whole Fish including the Eyes and Fins of a yellowish red; The Head resembles that of a Hog, being sharp snouted. The End of the upper Mandible is armed with large sharp Teeth, opposite to which in the under Jaw are two of the like Size, the Rest of the Teeth are small, sharp and thick sett; The upper Mandible is cartilaginous, and so disjointed from the Head that it can dilate it and contract it at Pleasure. On the Back was one long spiny Fin; two more were placed behind the Gills, one under the Abdomen, and one behind the Anus, guarded before by three sharp Bones; the Tail of an oblong Square, except that the Edges terminate in two Points.



*E plus grand de ces Poissons que j'aie remarqué, étoit le double de celui que représente la Figure: Tout le poisson avec les nageoires & les yeux est d'un rouge jaunâtre; sa tête ressemble à celle d'un porc-eau, & son museau se termine en pointe. L'extrémité de la mandibule supérieure est armée de grandes dents pointuës; vis-à-vis desquelles il y en a deux de la même sorte dans la Mandibule inférieure; les autres dents sont petites, pointuës & fort serrées; la mandibule supérieure est cartilagineuse, & articulée avec latéte de maniere qu'il peut l'avancer ou la retirer à sa fantaisie. Il a sur le dos une longue nageoire pi-quante; il en a deux autres derrière les Oïes, une sous le ventre, & une derrière l'anus, armée par devant d'os pointus; la queue est un quarré long, excepté que ses bords se terminent en deux pointes.*

## TURDUS cinereus peltatus.

## The Shad.

**T**HE Colour of this Fish is light gray with some of its Scales tinctured with Purple, the Eyes large and yellow, the Fore-part of the Head growing narrow towards the Nose, the Mouth small and without Teeth; But what is most singular in this Fish, is, that the Fore-part of its Head was of a cartilaginous Substance, the Back-part strong and bony; which seems designed for a Sheild to secure the defenceless Part, which he contracts under it when Danger approaches: A long spiny Fin covered the greater Part of its Back, ending almost at his Tail; The lower-part of which was covered with a double Skin the whole Length; Behind the Gills were two more, and one under the Abdomen, with a fifth behind the Anus; the Tail wide and forked. This is esteemed a good Fish.

**L**A couleur de ce Poisson est gris-clair, & quelques-unes de ses écailles ont une Teinture de violet, ses yeux grands & jaunes, le devant de sa tête s'étressoit vers le nez, sa bouche petite & sans dents; mais ce qu'il y a de plus singulier en ce poisson, est que le devant de sa tête est d'une substance cartilagineuse, & le derrière fort & osseux; il semble que ce soit une espèce de bouclier sous lequel il retire & met en sûrete en cas de danger la partie qui est sans défense: une longue nageoire épineuse couvroit la plus grande partie de son dos, & ne finissoit presque qu'à sa queue, dont le bas est couvert d'une double peau dans toute sa longueur; derrière les Oïes il y en avoit deux autres, une sous l'abdomen, & une cinquième derrière l'anus; la queue grande & fourchue. Ce poisson passe pour être bon.

*TURDUS Oculo radiato.**The Pudding-Wife.*

HESE Fish are sometimes 16 Inches long, tho' generally of a smaller Size; the Eye red, from the Circumference of which are spread seven blue Rays; At the End of each Mandible are three large Teeth with the ordinary Rows of smaller Teeth; the upper Mandible is loose and can be contracted upon Occasion under the adjoyning bony-part of the Head, in like Manner as in the Hogfish. The Body of the Fish was covered with large Scales of a brownish Olive Colour, having the Edge of every Scale blue; the Gills are also marked with five or six irregular Lines of blue, almost the whole Length. On the Back was extended a long yellow Finn, bordered with a blue indented Line; To the hind-part of the Belly was fixed another suchlike yellow Finn bordered also with a blue indented Line, and another small yellow Finn under the Abdomen verged in the fore-part with blue; besides two behind the Gills of a dirty Colour: From one of these Fins extends obliquely round the Belly to the other a broad List with four Lines of blue and yellow alternately. The Tail spreads widest at the End, half next the Body of a dusky dark Colour; the End of a reddish yellow:



*ES Poissons ont quelquefois seize pouces de long, quoiqu'ordinairement ils soient plus petits; leur œil est rouge, & de sa circonference sortent sept rayons bleus; à l'extrémité de chaque mâchoire il y a trois grandes dents, outre les rangs ordinaires de petites dents; la mâchoire supérieure est libre, & peut se retirer sous la partie osseuse de la tête quand il est nécessaire, de même que dans le poisson décrit ci-dessus. Le corps de ce poisson étoit couvert de grandes écailles de couleur brune & olivâtre, dont le bord est bleu; les Oïdes sont aussi marquées presque dans toute leur longueur de cinq ou six lignes bleues irrégulières. Sur son dos s'étendoit une longue nageoire jaune, bordée d'une ligne bleue dentelée; & vers la partie du ventre, proche de la queue, il y avoit une autre nageoire semblable bordée d'une ligne bleue dentelée, une autre petite nageoire jaune sous l'abdomen, bordée de bleu par devant, outre deux autres derrière les Oïdes, d'une couleur brune; une large bande composée de quatre petites lignes bleues & jaunes, disposées alternativement, s'étend obliquement autour du ventre, d'une nageoire à l'autre. La queue s'élargit beaucoup à son extrémité; sa moitié la plus proche du corps est d'une couleur brune obscure, & le reste d'un jaune rougeâtre.*

*ALBURNUS**AMERICANUS.**The Carolina Whiting.*


**T**HIS Figure shews the general Size of these Fish: The Iris of the Eye yellow; the whole Fish of a light brown Colour; the Belly lightest, the Gills having a faint Tincture of red; the Mouth wide, with very small Teeth; the upper Jaw reaches beyond the lower, the under Lip having five or six fleshy Barbels, resembling Teeth hanging to it on the out Side. It had one small Finn on the Middle of the Back; two behind the Gills, one under the Abdomen, and another behind the Anus; the Tail unequally notched, the lower-part extending beyond the upper. The Market at Charlestown in Carolina is plentifully supplyed with these Fish, and are accounted tolerable good Meat.

## Merlan de la Caroline.

**L**A Planche fait voir la taille ordinaire de ce Poisson: L'Iris de ses yeux est jaune; tout le poisson d'un brun clair; le ventre plus clair que le reste; les Oïdes ont une nuance faîle de rouge; sa bouche est large, ses dents très petites; la mâchoire supérieure s'avance au-delà de l'inférieure, celle-cy a cinq ou six excroissances charnues qui ressemblent à des dents, & qui pendent en dehors. Il avoit une petite nageoire sur le milieu du dos; deux derrière les oïdes, une sous le ventre, & une autre derrière l'anus; la queue inégalement entaillée, le dessous étant plus long que le dessus. Le Marché de Charlestown à la Caroline est abondamment pourvu de ces Poissons, & on les trouve parfaitement bons.

T/2

Turdus &c




Albuminis

DG





Mormijrus &c.



## *MORMYRUS ex cinereo nigricans.*

### *The Bone-Fish.*

**A**HE Back of this Fish was dark-brown, the Belly white, the Iris of the Eye white; On the Back was one long spiny Finn: Behind the Gills were two more, and one behind the Anus; the Tail black and large, making a very wide Fork. They are in Plenty on the Coasts of the Bahama-Islands; and as I remember, are called there Bone-Fish.



### Poisson osseux.

**E**Dos de ce Poisson étoit d'un Brun foncé, le ventre blanc, l'Iris des yeux blanc; Il avoit sur le dos une longue nageoire piquante: Il y en avoit deux autres derrière les Ouyes, & une derrière l'Anus; la queue étoit noire & grande, formant une Fourche fort large. Ils se trouvent en quantité sur les Côtes des Isles Bahamà; & autant qu'il m'en souvient, on les appelle là Poissons osseux.

## *CORALLINA fruticosa elatior ramis quaqua-versum expansis teretibus.*

Sloan. Hist. Jam. Vol. I. p. 57.

### *The Sea-Feather.*

**T**HE Size of these Plants is various some growing to the Height of three Feet, tho' usually a Foot, and a Foot and half: spreading into long Slender pliant, stalks of an Horny transparent Substance of a light brown Colour; but incrusted over with a purple or reddish coralline Coat or Bark. The horny Part divested of the coralline burns and stinks like common Horn. They grow in the Sea usually in five, or ten and fifteen Fathom Water, and are frequently found on the Shores of Virginia, Carolina, and sometimes on the Bahama Islands. These Plants do not grow horizontally, but upright as most Land-Plants doe, as doth also the great Sea-Fan; which is usually thought to grow horizontally. This Mistake I concieve proceeds from the Structure of that Plant, judging it from its flat and close Contexture not able to withstand the Impetuosity of the Waves but in that Position.

### Plume de Mer.

**C**ES Plantes varient fort en grandeur, les unes croissant jusques à trois pieds, quoiqu'ordinairement elles ne passent pas un pied, ou un pied & demi: Elles se divisent en branches longues, minces & pliantes, d'une Substance semblable à la Corne, & presque transparente, d'un Brun clair; mais toute couverte d'une Ecorce coralline violette ou rougeâtre. La partie qui ressemble à la corne, dépouillée de cette croute coralline, brûle & sent mauvais comme la corne ordinaire. Ces Plantes croissent dans la Mer à cinq, dix ou même quinze brasses de profondeur; On les trouve communément sur les Rivages de la Caroline, & quelques-fois sus ceux des Isles Bahama. Elles ne croissent pas horizontalement, mais tout droit comme les plantes terrestres, non plus que celles qu'on appelle le grand Eventail de Mer; quoiqu'on croie communément le contraire. Je m'imagine que ce qui donne lieu à cette erreur, est la forme de la Plante; car on conjecture que platte & ferrée comme elle est, elle ne pourroit soutenir le mouvement impétueux des vagues si elle n'étoit couchée horizontalement.

C U G U P U G U A C U    *Brasil.*

Sloan. Hist. Jam. Tab. 247.

*The Hind.*

THESE Fish are usually of the Size of this Figure, tho' some of them are twice the Bigness: The Iris of the Eyes were bright yellow and red blended together; the Mouth very wide with Rows of very small sharp Teeth, besides two large ones at the End of the upper Mandible. The whole Fish instead of Scales was covered with a thick Skin variously coloured; viz the Head of a muddy Red, the Back of a dark reddish Brown, the Sides green and Belly white; the whole sprinkled very thick with red Spots. It had five Finns: one on the Back, the Fore-part of which was strengthned with strong sharp-pointed Bones, the Hind-part with a smooth Edge and pliant: two behind the Gills; one under the Abdomen, and another behind the Anus, with two sharp-pointed Bones joyned to the Fore-part of it; the Tail wide and rounding at the End when spread, with a black Verge. They are esteemed a good Fish, and are plentiful in the shallow Seas of the Bahama Islands.



ES Poissons sont ordinairement de la grandeur de la Figure, quoiqu'il y en ait quelques-uns deux fois plus grands: Les Iris de leurs yeux étoient d'un jaune brillant mêlé de rouge; la gueule fort large, avec des rangées de très petites dents acérées, outre deux grandes placées à l'extrémité de la mandibule supérieure. Tout le poisson étoit couvert au lieu d'écailles d'une peau épaisse de diverses couleurs; la Tête d'un Rouge pâle, le dos d'un Brun foncé & rougâtre, les côtés verds & le ventre blanc; le tout moucheté de tâches rouges, fort proches les unes des autres. Il avoit cinq nageoires: une sur le Dos dont le devant étoit fortifié d'Os très forts & piquants; le derrière avoit son bord tout uni & étoit souple: deux derrière les Ouiyes; une sous l'Abdomen, & une autre derrière l'Anus, avec deux Os pointus qui y sont attachés par devant; la queue large & s'arrondissant par son extrémité, lorsqu'elle est étendue, elle est bordée de noir. Ils passent pour un bon mets, & il y en a beaucoup dans les Basfonds des îles Bahama.

## S A L T A T R I X.

*Skipjack.*

THIS Fish had a bright yellowish Eye, the Mouth wide, both Mandibles armed with a single Row of sharp Teeth; the Scales are small of a shining Brightness; and when just taken are green on the Back, which in *Virginia* has given them the Name of *Green Fish*; but in *Carolina* it hath obtained the other Name from its frequent Skipping out of the Water. It had five Finns; two behind the Gills, one on the Hind-part of the Back, another opposite to it under the Belly, and one under the Abdomen; the Tail wide and forked. It is esteemed a tolerable good Fish.

*Le Sauteur.*

C E Poisson avoit l'Oeil brillant & jaunâtre, la Gueule large, les deux Machoires garnies d'un seul Rang de Dents aiguës; ses Ecailles sont petites, d'un brillant fort éclatant; elles sont vertes sur le Dos lorsque le Poisson vient d'être pris, ce qui lui a fait donner le Nom de Poisson vert; mais dans la Caroline on l'a nommé Sauteur, parce qu'il saute très souvent hors de l'Eau. Il avoit cinq Nageoires: une sur le derrière du Dos, une autre justement au-dessous sous le Ventre, deux derrière les Ouiyes, & la cinquième sous l'Abdomen; la Queue est large & fourchue. Il passe pour un assez bon Poisson.

T 4

Curgupuguacu



SMC





T 45

Synodus.

The Back Fin.



## S U I L L U S.

*The great Hog-Fish.*

THESE Fish are taken of several Sizes; but the largest that I have seen was between three and four Feet, as this was: The Iris of the Eye red, the upper Mandible of a fleshy callous Substance and of a reddish purple Colour; which was guarded by a bony Substance as by a Sheild; the upper Part of which to the Eye was black, from under the Eye to the Angle of the Mouth it was purple sprinkled thick over with crooked blue Lines in Form of Wormes; The End of the upper Mandible was armed with four large Teeth, at the End of the under Mandible were also two of the like Size: the Rest of the Teeth were small and in single Rows: The Inside of the Mouth was of a blood-red Colour, the under Jaw yellow. From the Eyes to the Tail, the Back was covered with large purple Scales, those on the Belly lighter with stains of yellow: On the Back was a remarkable black Finn dividing at the Basis and branching into four long pliant Flagelli large at the Basis, and gradually decreasing to their Points, and bending backwards: Behind the Gills were two yellow Finns, and another imperfect one or rather Beard under the Throat. The Tail of this Fish being cut off before I had it, I cannot say of what Form it was.

*Le grand Pourceau.*

ES Poissons sont d'une Grandeur differente; mais les plus grands que j'aye vus étoient entre trois & quatre pieds, tel qu'étoit celui-cy: L'Iris des Yeux rouge, la Machoire superieure d'une Substance charnuë & calleuse, & d'une Couleur violette tirant sur le rouge; elle étoit défendue & couverte d'une Substance osseuse, qui lui servoit comme de Bouclier, dont le dessus jusques à l'Oeil étoit noir, & depuis le dessous de l'Oeil jusques au coin de la Gueule il étoit violet, tout parsemé de petites Lignes bleues ondées en forme de petits Vers; Le bout de la Machoire superieure étoit armé de quatre Dents fort grandes, il y en avoit aussi deux semblables au bout de la Machoire inferieure; les autres Dents étoient petites, & il n'y en avoit qu'un rang, tant en haut qu'en bas: Le dedans de la Gueule étoit d'un rouge de Sang; la Machoire inferieure étoit jaune. Depuis les Yeux jusques à la Queue, le Dos étoit couvert de grandes Ecailles violettes, celles du Ventre étoient semblables, mais plus claires, avec quelques tâches jaunes: Sur le Dos il y avoit une grande Nageoire noire, fort remarquable; elle se divisoit à sa Base en quatre longues Branches souples, s'étressant toujours jusques à leur extrémité qui se terminoit en pointe, & recourbées vers la Queue: Derrière les Oyes il y avoit deux Nageoires jaunes, & une autre, ou plutôt une espece de Barbe, sous la Gorge. Comme on avoit coupé la Queue de ce Poisson avant que je l'eusse vu, je ne saurois dire quelle en étoit la Forme.

## A U R A T A   B A H A M E N S I S.

## The Porgy.



*ROND ELITIUS* Lib. V.  
Cap. II. describes and names  
his *Aurata* from the yellow  
Spots between the Eyes, and  
tho' ours want those Spots ;  
We conceive by the general Resemblance it  
may be referred to the same Kind, and from  
the yellow Irides of it's Eyes may deserve  
that golden Name. *Rondelitius* describes  
his *Aurata* with Silver-Eyes, whereas ours  
are Gold-coloured ; which is the principal  
Difference between them.

These Fish are commonly 12 and 16  
Inches in Length, the Eyes very large, the  
Irides of a shining Gold-Colour, the Back  
brown, the Belly lighter ; The End of the  
upper Mandible had one single Tooth, the  
lower Mandible having two of the like Size ;  
besides many very small ones within the  
Roof of it's Mouth : One large prickly Finn  
covered the greater Part of the Back ; from  
behind the Gills grow two long Finns, one  
under the Abdomen, and another between  
the Anus and the Tail ; the Tail was forked.  
It is esteemed a good eating Fish, they  
are plentiful about the Bahama Islands.



ONDELET Liv. V. Chap. II. dé-  
crit les Tâches jaunes que  
la Dorade a entre les Yeux, &  
c'est de-là qu'il lui donne son  
nom ; Mais quoique la nôtre  
n'ait pas ces Tâches, nous croyons cepen-  
dant qu'on peut la mettre dans la même  
Classe, à cause de la Ressemblance qu'il y  
a entre elles, & que les Iris jaunes de ses  
Yeux suffisent pour lui mériter le Nom  
de Dorade. Rondelet décrit sa Dorade avec  
des Yeux argentés, au lieu que la nostre les  
a couleur d'Or ; ce qui en fait la principale  
Difference.

Ces Poissons ont ordinairement depuis  
douze jusques à seize Pouces de Longueur,  
les Yeux fort grands, les Iris d'un Couleur  
d'Or brillant, le Dos brun, le Ventre plus  
clair : L'extrémité de la Machoire supe-  
rieure n'étoit garnie que d'une seule Dent,  
au lieu que l'inferieure en avoit deux de  
la même grandeur ; outre cela il y en a  
plusieurs petites attachées à son Palais :  
Une grande Nageoire épineuse couvroit la  
plus grande partie de son Dos ; derrière  
les Ouyes sortoient deux longues Nageoi-  
res ; il y en avoit une autre sous le Ventre,  
& une autre entre l'Anus & la Queue ;  
la Queue étoit fourchue. Il passe pour un  
Poisson très delicat, & se trouve en quan-  
tité aux environs des Isles Bahama.

T. C.



Aurata.





T 17

Salpa &c.



Petimbuabo &c.

## *S A L P A purpurascens variegata.*

*The Lane-Snapper.*

 LL the Fish that I have observed of this Kind exceed not the Length of a Foot, but were generally of the Size of the Figure : The Eye large with a broad red Iris ; the whole Body was covered with purple Scales darkest on the Back, and paler on the Belly, with Stripes of yellow extending from the Nose to the Tail. On the Back was a long spiny yellow Finn : on each Side the Gills were two purple Fins ; one single Finn grows from the fore-part of the Belly, and another from behind the Anus which were both yellow. The Tail red and forked.



E n'ai point vu de Poissons de cette Espece qui eussent plus d'un pied de long, & la plus part étoient de la même grandeur que la Figure : L'œil grand, avec un large Iris rouge ; tout le Corps étoit couvert d'Ecailles violettes, plus foncées sur le Dos & plus claires sur le Ventre, avec des Rayeures jaunes qui s'étendent depuis le Nez jusques à la Queue. Il avoit sur le Dos une longue Nageoire épineuse & jaune : à chaque côté des Ouires il y avoit deux Nageoires violettes ; il en sort une de la partie antérieure de son Ventre, & une autre entre la Queue & l'Anus, elles sont toutes deux jaunes. La Queue est rouge & fourchue.

## *P E T I M B U A B O BRASIL.*

Will. p. 233 & App. 22.

*The Tobaccopipe-Fish.*

**T**HIS being the only Fish of the Kind I have seen, I cannot ascertain the usual Size of it. This was almost a Foot in Length ; the fore-part from the Nose to half Way the Body near of an equal Bigness, from which it grew tapering to the Tail, which was forked and from which grows a slender taper Whip four Inches long, of the Consistence of a Whalebone ; the Mouth narrow, from which to the Eyes was almost three Inches. On the Back were placed three small Finns at equal Distances ; Under the Belly and opposite to those of the Back were also three of the like Finns ; The whole Fish was of a brown Colour. They are sometimes taken on the Coasts of Jamaica, whence I had this.

**C**OMME c'est ici le seul Poisson de cette Espece que j'aye jamais vu, je ne puis rien dire de certain sur sa grandeur ordinaire. Celui-cy avoit presque un pied de long ; le devant depuis le Nez jusques à la moitié du Corps étoit à peu près de la même Grosseur, ensuite il alloit en diminuant jusques à la Queue, qui étoit fourchue, & de laquelle il sort un Corps mince & comme un Fouet, de quatre Pouces de long, & de la unique Consistence que de la Baleine ; la Bouche étroite & éloignée des Yeux presque de trois Pouces. Sur le Dos étoient placées à égales Distances trois petites Nageoires, auxquelles respondoient exactement trois autres Nageoires situées sous le Ventre ; Tout le Poisson étoit brun. On en prend quelquefois sur les Côtes de la Jamaique, d'où j'ay eu celui-cy.

## NOVACULÆ Cærulea.

Will. p. 214. T. O. 2.


*The Blue Fish.*

OME of these Fish are twice the Bigness of this; but I think they are seldom found much larger. The Head is of an odd Structure and like that of the Whale, which produces the Sperma Ceti; the Mouth is small, each Mandible armed with a single Row of even Teeth so closely joined that they seem entire Bones; the Iris of the Eye red. On the Back was a long pliant Finn, somewhat indented on the Edge; Behind the Gills were two Finns, one under the Abdomen, and another behind the Anus; the Tail forked; The whole Fish entirely blue. They are frequently taken among the Bahama-Islands, and in most of the Seas between the Tropicks.

*Poisson Bleu.*

NTRE ces Poissons, il y en a quelques-uns deux fois plus grands que celui-cy; mais je croy qu'on en trouve rarement de beaucoup plus grands. La Tête est fort extraordinaire & ressemble à celle de la Baleine, dont on tire le Blanc de Baleine; la Bouche est petite, chaque Mâchoire garnie d'un simple Rang de Dents toutes égales & si serrées qu'il semble que ce n'est qu'un Os tout d'une Piece; l'Iris des Yeux rouge. Sur le Dos il y avoit une longue nageoire souple, un peu dentelée par son Bord; Derrière les Ouyes il y avoit deux Nageoires, une sous l'Abdomen, & une autre derrière l'Anus; la Queue fourchue; Tout ce Poisson est bleu. On en prend souvent entre les Isles Bahama, & dans la pluspart des Mers qui sont entre les Tropiques.

T 18




Novacula





T 9

T



The form of a Tooth  


Unicornis pectoralis.

*UNICORNIS, Piscis Bahamensis.*

The Bahama Unicorn Fish.



HESE Fish sometimes grow to the Length of three Feet. This was in Shape not unlike a rolling Pin the biggest Part of it being the Middle, growing tapering towards the Head and Tail; the Eye large, with a light coloured Iris encircled with blue; two solid white Bones covered with a thin Skin formed each Mandible, in which were inserted six Teeth, two in the upper and four in the under Jaw, which was longer than the upper. On the hind Part of the Back grows a pretty long stiff Finn, opposite to which; under the Belly grows another of the like Finns, and two behind the Gills; the Tail-finn was long, stiff and bony, serrated at the End and when spread very wide. The Structure of this Fish as well as it's Marks are very singular and different from any other. Yet the most remarkable Part of it is a tapering sharp-pointed Bone, growing from the Top of the Back, a little behind the Eyes, which it can raise and point backward and forward at his Pleasure, and when laid along on it's Back reaches to the Finn; this Bone is very brittle and easily broke by which one would think it not so defensive a Weapon as otherwise Nature seems to have designed it for. A brown Olive-coloured Skin without Scales covered the whole Fish, with many blue waved Lines of different Lengths some long ones resembling Worms, and others Maggots, between which were sprinkled many round black Patches. The Guts were full of *Corallium porosum*, small Shells and other coralline Substances, most of which was Ground very small; which by the Strength and Hardness of it's Jaws Nature has enabled it to perform. These Fish are not eat, being accounted poisonous. They most frequent those seas amongst the Bahama Islands, where the Corals are most plentiful.

Poisson, Licorne de Bahama.



ES Poissans croissent quelques-fois jusques à trois pieds. Celui-cy ressemblait assez par sa Taille à un Rouleau de Tapisser, le Milieu étant plus gros que les deux Bouts qui alloient en diminuant vers la Tête & la Queue; l'Oeil grand, avec un Iris clair bordé de bleu; deux Os blancs & solides, couverts d'une Peau très mince, formoient les Mâchoires, dans lesquelles étoient plantées six Dents, deux dans la Supérieure, & quatre dans l'inférieure, qui étoit la plus longue. Sur le derrière du Dos s'élève une longue Nageoire roide, & vis-à-vis de celle-là il y en a une autre sous le Ventre, toute semblable, & deux derrière les Oyes; la Nageoire de la Queue étoit longue, roide & osseuse, dentelée à son extrémité, & fort large lors qu'elle étoit étendue. La Forme de ce Poisson & ses Couleurs sont très singulieres, & ne lui sont communes avec aucun autre. Cependant ce qu'il a de plus remarquable est un Os conique & très aigu, qui naît du milieu de son Dos, un peu derrière les Yeux, il peut l'élever & l'abaisser tantôt en avant, & tantôt en arrière, comme il lui plaît, & lors qu'il le couche sur son Dos il atteint jusques à la Nageoire: cet Os est fort cassant, ce qui donneroit lieu de penser qu'il n'est pas d'une assez grande Défense pour répondre à l'Usage auquel il semble que la Nature l'a destiné. Tout le Poisson étoit couvert d'une Peau sans Ecailles d'un Brun olivâtre, avec plusieurs Rayeures bleuées ondées de différentes Longueurs, les plus longues ressemblants à des Vers, & les autres à des Vermisseaux; les Interstices en étoient semées de plusieurs tâches noires & rondes; ses Intestins étoient remplis de Coral poreux, de petites Coquilles & d'autres Matières corallines, dont la plus grande partie étoit réduite en poussière fort menuë; ce que la Nature l'a rendu capable de faire en lui donnant des Mâchoires fortes & dures. On ne mange point ces poissons; car on les croit venimeux. Ils fréquentent beaucoup les Mers d'entre les îles Bahama, où il y a de plus de Coraux.

*MURÆNA maculata, nigra & viridis.*


*The Muray.*



THE Structure of this Fish resembles that of our common Eel: The Iris of the Eye white; two fleshy Barbels hang from the Nostrils; a Finn with an even white Ridge begins behind the Head and extends the whole Length of the Back. The whole Body is covered with a light gray Skin, sprinkled with innumerable black Spots. One Kind of this Fish is green and spotted same manner with black, perhaps of different Sex only. However, the Inhabitants of the Bahama-Isles will eat only the green Sort, rejecting those which are black as thinking them poisonous. It is customary and frequent for these Fish as they lye lurking among the hollow Rocks and Corals, to bite Peoples legs that are exposed to them, tho' their Bite is of no other ill Consequence than fetching Blood.



*E Poisson ressemble par sa Forme à notre Anguille commune : L'Iris de ses Yeux est blanc ; deux longues Excrecences charmées pendent de ses Narines ; une Nageoire, dont le Bord est blanc & égal, commence derrière la Tête & s'étend sur toute la Louguer du Dos. Tout le Corps est couvert d'une Peau d'un Gris clair, moucheté d'une infinité de Tâches noires. Il y en a une Espèce qui est verte & mouchetée de noir aussi ; peut-être n'est-ce que le Sexe qui est différent. Quoi qu'il en soit, les Habitans des Isles Bahama ne veulent manger que l'Espèce verte, & rejettent ceux qui sont noirs, les croyant venimeux. Souvent ces Poissons, lorsqu'ils sont cachés dans les Roches creusées ou parmy les Coraux, mordent les Jambes des Hommes qui se trouvent à leur portée ; mais ces morsures n'ont d'autre suite que de tirer un peu de Sang.*




Murcena





T 21



Pl. 21. T 21. 1814

Lithophyton &c

*MURÆNA MACULATA NIGRA.**The black Murey.*

HE Form of these is like that of the green Murey differing only in Colour, these being black and spotted all over, very thick with blacker Spots; they are very ravenous & strong, and when pulled out of the Water with a Hook and Line will by their violent twistings break off and often bring up with them Branches of Coral or other Sea Vegetables amongst which they sport, and are mostly found. Some of them arrive to the Length of four Feet, tho' they are most commonly smaller.

*Anguille de Mer noire tachetée.*

*A forme de celle-cy est la même que celle de la Lamproye verte; elles ne diffèrent que par leur couleur: Celle dont nous parlons est noire, & toute couverte de taches plus noires que le fond & fort serrées; elle est très vorace & très forte, & lorsqu'on les prend à la ligne, en les retirant de l'eau, on trouve souvent avec elles des branches de Corail ou d'autres Plantes marines, parmi lesquelles elles se plaisent & restent ordinairement, & qu'elles ont rompues par les mouvements & les agitations violentes qu'elles se donnent en se sentant prises. Quelques unes croissent jusques à quatre pieds de long, quoique communément elles soient plus petites.*

*Lithophyton longè racemosum cortice flavo perforato.*

THESE, as also certain other Submarine Productions, are mostly found to abound in quiet Coves or small Bays of the Sea, defended from the impetuosity of the Waves by Rocks: And as little Birds retreat to Bushes for Security from Hawks, so do the small defenceless Fish to these quiet Places, where these and innumerable other branching Coralline Plants serve them as a hidden Retreat to evade the Attacks of these Mureys, and others of the rapacious kinds of Fish: Tho' I have seen many of the Coralline Plants growing, I don't remember in what Manner these grow, whether erect or lying on the Ground, I rather think the latter from its flexibility and weightiness of its Branches: While growing in the Sea or immediately cast a-Shore, its Bark is of a deep yellow Colour and perforated with innumerable little Holes.

*C*ELLES-CY, comme plusieurs autres productions du fond de la Mer, se trouvent le plus souvent en plus grande quantité dans de petites Bayes tranquilles, & qui sont défendues par des Rochers de la violence des Vagues: Et de même que les petits Oiseaux se retirent dans les buissons pour se mettre en sûreté contre les Oiseaux de proie, par un semblable instinct les petits Poissons sans sans défense se retirent dans ces endroits tranquilles, où cette Plante Coralline & une infinité d'autres leur fournissent un asile qui en les cachant les met à couvert des attaques des Lamproyes & des autres espèces de Poissons voraces. Quoique j'aye vu croître plusieurs Plantes Corallines, je ne me souviens pas en quelle situation celles-cy croissent, si elles sont droites ou couchées sur la terre, je pâche plutôt pour le dernier, à cause de la flexibilité & de la pesanteur des branches de la plante: Tandis qu'elle est dans la Mer, ou lors qu'on vient de l'en tirer, la couleur de son écorce est d'un jaune foncé, & l'écorce est percée d'une infinité de petits trous.

TURDUS OCULO RADIATO.  
GUAPERVA MAXIMA CAUDATA. Will. Tab. I. 23.


The Old Wife.



HE usual Size of this Fish is nearly that of the Figure, tho' some are twice as big, but I don't remember any exceeding that. It is broad and somewhat flat, tapering away gradually, both towards the Head and Tail; The Mouth is very small, armed with about twelve Teeth; The Lips of a brown colour, bordered with blue; from a little above the Nose runs a curved broad List of Blue towards the Throat, parallel to it from the Corner of the Mouth extends another narrower blue Line; About one third Part from the Nose towards the Back, are placed the Eyes, of a deep yellow Colour, from which are displayed irregularly nine or ten blue Rays; It had six Fins, two seemed as if they were designed for Defence only; one of which was placed on the middle of the Back, and another of the same Size opposite to it under the Belly, that on the Back had three very strong sharp Bones, the foremost largest, the Fin under the Belly had one only of these large pointed Bones; Between the upper armed Fin and the Tail was placed a large pliant Fin, widening from the Tail gradually towards the forepart and running into a tapering Whip or *Flagellum*; Opposite to this and under the Anus was another such like broad Fin, but without the *Flagellum* as that above, or possibly it might have been broken off. The Tail very wide and forked, shooting into very long Points: Below the Gills on each Side were placed a broad pliant light-coloured Fin, a little curved or turning up; From the Ridge of the Back extends obliquely towards the Belly six obscure dusky Lines; The Body of the Fish is brown, except that the Belly and Throat are lightest, with a Mixture of reddish Yellow; The two hindmost Fins were of a sordid dark Blue, but verged with bright Blue. They are tolerable good Fish when their rough Skin is stripped off. All the Fish of this Form I have observed to be slow Swimmers, and that they are a Prey to the larger and voracious Kinds, and tho' Nature seems not to have left them altogether defenceless, their Enemies generally evade the Danger of their Weapons by biting the hind part of the Body short off, but as the Nature of all rapacious Animals is to pursue and devour with furious Eagerness, I conjecture that sometimes by advancing a little too far they are caught by these sharp Bones, one entering the upper, and the other the lower Jaw which keeps the Mouth from closing, the Consequence of which is that the Devourer will soon be drowned except he can instantly extricate himself from his Prey: An Instance of which I shall relate in the Account of the Water Viper.



A taille ordinaire de ce Poisson est à peu près celle de la figure, quoy qu'il y en ait de deux fois plus grands; mais je ne me souviens pas d'en avoir vu qui passassent cela. Il est large & un peu plat, diminuant & s'arrondissant peu à peu vers la queue & vers la tête; sa bouche est fort petite, armée d'environ douze dents, les lèvres d'une couleur brune, bordées de bleu; une large bande bleue courbée, s'étend depuis un peu au dessus du nez vers la gorge; une autre de la même couleur, mais plus étroite est parallèle à la première, & commence aux coins de la bouche; les yeux sont placés environ à un tiers de l'espace qui est entre le nez & le dos; ils sont d'un jaune foncé, d'où s'étendent irrégulièrement dix ou douze rayons bleus. Il avait six nageoires, dont deux ne semblaient destinées qu'à la défense, l'une étoit placée sur le milieu du dos, & l'autre de la même grandeur étoit placée vis-à-vis sous le ventre: Celle du dos avoit trois os pointus très forts, celui de devant étoit le plus grand; la nageoire de dessous le ventre n'avoit qu'un de ces grands os pointus: Entre la nageoire armée supérieure & la queue il y avoit une grande nageoire souple, qui s'élargissoit graduellement de la queue vers le devant, & s'allongeait en une espèce de fouët. Vis-à-vis de celle-là & sous l'anus on voyoit une autre nageoire semblable, mais sans le fouët de la nageoire supérieure; mais peut-être avoit il été rompu: La queue étoit large & fourchuë, & pouroit de longues pointes; au dessous des cuyes de chaque côté étoit placée une large nageoire pliante & d'une couleur claire, un peu recourbée en dessus: Du milieu du dos il descend obliquement vers le ventre six lignes d'un brun obscur; le corps du poisson est brun, excepté que la gorge & le ventre sont plus clairs, avec un mélange d'un jaune rougeâtre: Les deux nageoires de derrière étoient d'un bleu sale & foncé, mais bordé d'un bleu vif. C'est un poisson assez bon à manger, après qu'on l'a déponillé de sa peau rude. J'ai remarqué que tous les poissons de cette forme nagent lentement, & qu'ils sont la proye de ceux qui sont plus grands & voraces; & quoi qu'il semble que la nature ne les ait pas laissés absolument sans défense, leurs ennemis évitent ordinairement le danger de leurs armes défensives, en ne coupant avec les dents qu'une petite portion de leur corps du côté de la queue; mais comme tous les animaux de proye poursuivent & devorent avec une furieuse ardeur, je conjecture que quelquefois en s'avancant trop il s'enferrent dans ces Os pointus, dont l'un entre dans la mâchoire supérieure & l'autre dans l'inférieure, ce qui les empêche de fermer la gueule, d'où il arrive que celui qui voulloit devorer ce poisson, est bientôt noyé, à moins qu'il ne puisse se défaire de sa proye. J'en rapporterai un exemple en parlant de la Vipere d'Eau.







T<sub>23</sub>



Bagre &c

## BAGRE secundæ Speciei Marggr. affinis.

## The Cat Fish.

OME of these Fish are two Foot in Length. They are without Scales, of a dusky black on the Back, and of a pale Flesh Colour on the Belly. It had six Fins, one under each Gill, one on the Fore-part of the Back of a Conick form, between which and the Tail a smaller one; one under the Abdomen, and another between it and the Tail: The Tail small and forked, which with the Fins are of a dusky red Colour; the Eyes small, of a deep yellow or Gold Colour: From under each Eye shoots forth a very long fleshy Barb; before the Eyes grow likewise two more very small, and to the under Lip hang several more. Its Head is very large and rounding, with a very wide Mouth, capable of receiving a Fish as big as itself. They prey on their own kind as well as other kinds of Fish, tho' their Teeth are very small; they frequent both fresh and salt Waters in most of the Rivers in the Northern Parts of *America*; their Flesh taste like that of an Eel, and are accounted good eating Fish; There is another kind of this Fish, which has two long sharp Bones on each Side of the Jaws, which it can contract and extend in Defence of it self.



Uelques uns de ces poisssons ont deux pieds de long. Ils sont sans écailles, d'un noir obscur sur le dos, & d'une couleur de chair pâle sur le ventre. Il avoit six nageoires, une de forme conique sur la partie supérieure du dos, & une plus petite entre celle-la & la queue, une sous le ventre, & une autre entre celle-là & la queue. La queue est petite & fourchue, & de même que les nageoires, elle est d'un rouge obscur: Les yeux sont petits, d'un jaune foncé, ou couleur d'Or; au dessous de chaque œil il naît une longue barbe charnue, & au devant des yeux il y en a deux autres fort petites, & il en pend plusieurs autres à la lèvre inférieure. Sa tête est fort grosse & ronde, avec une bouche fort large, & capable de recevoir un poisson aussi gros que lui; ils mangent ceux de leur propre espèce aussi bien que d'autres, quoique leurs dents soient très petites; ils vivent dans l'eau douce de même que dans l'eau salée, & l'on en trouve dans presque toutes les rivières de l'Amerique Septentrionale: Leur chair a le goust de celle de l'Anguille; & on les regarde comme un bon manger. Il y a une autre espèce de ce poisson, qui a deux longs os pointus de chaque côté des mâchoires, qu'il peut retirer & pousser en dehors pour sa défense.

*HARENUS MINOR, BAHAMENSIS.**The Pilchard.*

THESE Fish are very numerous in the Shallows near the low and flat Parts of the *Bahama Islands*, they are carried through small Channels a little Way within Land, where vast Quantities of them are taken at the ebbing of the Tide, by the Inhabitants stopping up the Channels they came in at; They are small silver-scaled Fish, resembling somewhat a Herring, but smaller and tolerable good Food.



*ES poisssons sont en grand nombre dans les Bas-fonds des Isles Bahama, dans les endroits bas & plats; ils sont portés par de petits canaux un peu avant dans les terres, où l'on en prend quantité lorsque la marée se retire; les habitants n'ont pour cela qu'à fermer les canaux par ou ils sont uenus. Ce sont de petits poisssons aux écailles argentées qui ressemblent un peu au Hareng, mais plus petits, & assez bons à manger.*

*Arbor, Populi nigræ foliis; fructu reni-formi mono-spermo.*

THIS large Shrub or small Tree, was of the Height of about twelve Feet with Leaves, resembling those of the black Popler, set alternately, The Fruit are somewhat of the Form of a Kidney, tho' more resembling the Nut or Seed of the *Accajou*, but not so big; The Fruit, though not mature, seemed to be at full Bigness and was single dividing in the middle like a Bean, and that enclosed in a Film or thin Skin, three or four hanging in a Cluster on Footstalks about an Inch long. The Flowers I never saw: It grows near the Sea.

*Ce petit arbre étoit environ de la hauteur de dix pieds, ses feuilles ressemblent à celles du Peuplier noir & sont rangées alternativement; le fruit ressemble en quelque sorte à un Rognon, & encore plus à la noix ou à la finece de l'Acajou, mais il n'est pas si gros. Quoique ce fruit ne fût pas mûr, il jémeblait ne devoir plus grossir; il étoit unique, & se divisoit par le milieu comme une fève; & celui-cy renfermoit dans une peau assez mince trois ou quatre fruits attachés en bouquet à des pédicules d'un pouce environ. Je n'ai jamais vu les fleurs, il croît proche de la mer.*

Arbor Populi &c

T 24




Harengus &c





T 25



Anthea &c.

*ANTHEA quartus Rondeletii.* Will. 325. T. x. 5.

*Forte etiam Orpheus veterum.* Rondeletii, Gesn. 252.

*The Mutton Fish.*

 THE Size of these Fish is various, some being smaller and others much larger then the Figure. The upper Part of the Head is of a dusky Black; The under Part and Gills are shaded variously with Purple and Red; The upper Part of the Back of a dark reddish Brown, the Red brightning gradually to the Belly, which is white faintly stained with Red; The Irides of the Eyes of a bright Red; The Mouth somewhat wide, each Mandible having a single Row of very small sharp Teeth: It had five Fins, a long spiny One on it's Back like that of a Pearch, of an Umber Colour, two behind the Gills, one under the Abdomen, and another near the Tail; The Tail broad, forked and red: as are all the Fins, except That on the Back; The Shape of this Fish in general resembles That of a Pearch; For the Excellency of it's Tast it is in greater Esteem than any other at the *Bahama Islands*.



*A taille de ces Poissons varie beaucoup, quelque uns sont plus grands & d'autres plus petits que la figure. Le dessus de la tête est d'un noir obscur; le dessous de la tête & les Ouyès sont nués differement de violet & de rouge; Le dessus du Dos est d'un brun rougeâtre obscur, le rouge s'éclaircit peu à peu vers le Ventre qui est blanc avec une nuance foible de rouge. Les Iris des yeux sont d'un rouge brillant; La bouche assez large, chaque machoire n'ayant qu'un rang de petites dents très aiguës. Il avoit cinq nageoires, une longue & piquante sur le dos, comme celle d'une perche, d'un jaune sale, deux derrière les oïyes, une sous le ventre, & uée autre proche la queue; la queue large, fourchue & rouge, de même que toutes les nageoires hors celles du dos; En gros, ce poisson ressemble à la perche; Son goût excellent le met dessus de tous les autres poissons dans les Isles Bahama.*

H h

## REMOARA. Hist. Jam. Vol. I. p. 28.

## The Sucking-Fish.



IR Hans Sloane in his Natural History of Jamaica, seems to think it needless to describe this Fish, because (says he) it has been described and figured by most natural Historians, therefore he little more than recites the Authors that have mentioned it, with the different Names they have call'd it by; but as it has not been exhibited in its natural Colours, I hope it may not be thought improper to give it a Place here, and to add some Remarks not before observed: It is usually about a Foot in Length, the Head large, equal in Bigness to the Body, which grows smaller gradually to the Tail, which is small. It hath six Fins, two growing from behind the Gills, two more under the Throat, a long one on the Back, and opposite to it under the Belly another of the same Form and Size; the Tail forked: What this Fish hath peculiar to it self is, that the Crown of the Head is flat and of an oval Form, with a Ridge or rising, running length ways, and cross ways to this 16 Ridges with hollow Furrows between, by which Structure it can fix it self to any Animal or other Substance, as they are often found adhering to the Sides of Ships, and the Bodies of Sharks and other large Fish: But the Notion that this small Fish was able to stop a Ship under Sail or a Whale in Swimming, is entirely fabulous; all they can do is no more, than what Shells or Corals and other Foulnesses, which make her Sail somewhat the slower. I have taken five of them from off the Body of a Shark; which were fixed so fast to different Parts of his Body, that it required great Strength to separate them: I have seen them disengaged and swimming very deliberately near the Shark's Mouth, without his attempting to swallow them, the Reason of which I am not able to give.

## Remore.



L semble que Mr. le Chevalier Sloane, dans son Histoire naturelle de la Jamaïque, croie qu'il est inutile de décrire ce poisson, parce qu'il a été décrit & représenté par la pluspart des Ecrivains de l'Histoire naturelle; c'est pourquoi il ne fait guères que nommer les Auteurs qui en ont fait mention, & que rapporter les différents noms qu'ils lui ont donné. Mais comme il n'a point été représenté tel qu'il est par rapport à ses couleurs, j'espère qu'on ne trouvera pas mal-à-propos si je lui donne place ici, & si j'y adjoute quelques remarques nouvelles. Il est communément d'un pied de long, la tête aussi grosse que le corps, qui va toujours en diminuant jusques à la queue qui est petite. Il a six nageoires, deux qui naissent derrière les Oïes, deux autres sous la gorge, une longue sur le dos, & précisément sous celle-là une autre sous le ventre, de la même forme & de la même grandeur, la queue est fourchuë. Ce que ce poisson a qui lui est particulier, c'est que le dessus de sa tête est plat & ovale avec une élévation qui le traverse en toute sa longueur, & qui est traversée elle-même de seize sillons séparés par des interstices vides: Par cette conformation il peut s'attacher à un animal, ou à quelque autre substance, ainsi qu'on les trouve souvent attachés aux côtés des Vaisseaux, des Requins ou d'autres grands poissons: Mais l'opinion de ceux qui croient que ce petit poisson pouvoit arrêter un vaisseau à la voile, ou une baleine qui nage, est entièrement fabuleuse; il ne fait rien de plus que les coquillages, les coraux & les autres saletés qui retardent le cours d'un vaisseau. J'en ai pris cinq sur le corps d'un Requin, où ils étoient si fortement attachés en divers endroits, qu'on ne pouvoit les en séparer qu'avec beaucoup de peine; je les ai vus libres & nageant hardiment autour de la gueule d'un Requin sans qu'il entreprît de les devorer, c'est de quoi je ne puis rendre aucune raison:

Phylanthes Americana Planta flores ad foliorum crenas proferens.  
Hort. Amstel. Tom. I. --- 121.

**T**HIS Shrub rises to the Height of five or six Feet, with many upright Stems growing from the Root; the Leaves are usually four, and some five Inches long, having both edges serrated or widely notched, at somewhat less than an Inch distant from one another; from every of these Notches grow a very small monopetalous red Flower, succeeded by small round red Berries. They grow on many of the Bahama-Islands.

CET arbrisseau s'élève à la hauteur de cinq ou six pieds, avec plusieurs tiges toutes droites qui naissent de la racine, les feuilles sont ordinairement longues de quatre pouces, quelques unes de cinq; les bords en sont dentelées, ou entaillées, de manière qu'il y a presque un pouce de distance entre chaque coche; de chacune de ces coches naît une très petite fleur monopétale rouge, il leur succède de petites Bayes rondes & rouges. Ils croissent en plusieurs des îles Bahama.




Remora.





T27



27

Solea lunata &c

## SOLEA LUNATA ET PUNCTATA.

## The Sole.

**S**HIS Fish was about ten Inches long, and five in Breadth, of an oval Figure; to what Bigness they arrive at I know not, this being the only one of the kind I have seen; the Eyes are both placed on one Side, as in others of the Sole kind: From the Nose along the whole Length of the Back, almost to the Tail, runs a stiff prickly Fin, a small Fin grows under the Throat, and where this ends, begins such another Fin as that on the Back which extends along the Belly almost to the Tail: The Tail is in Form of a Rhombus or Lozenge; The Body of the Fish brown, sprinkled over with Figures of an oval Form, being like semi-circles with their Ends pointing to one another, or like Circles divided in the middle, of a bright blue colour; whether they are eatable I know not, nor could I be informed, they being very rarely caught.



## Sole.

*E* Poisson étoit long d'environ dix pouces & large de cinq, de figure ovale: Je ne sais pas jusques à quelle grandeur ils parviennent, car je n'ai jamais vu que celui-cy. Les yeux sont placés tous les deux du même côté, comme dans les autres espèces de Soles. Sur toute la longueur du dos, depuis le nez presque jusques à la queue, il y avoit une nageoire roide & pointue. Il y a une petite nageoire sous la gorge, & là où elle finit il en commence une autre semblable à celle du dos, & qui s'étend sous tout le ventre, presque jusques à la queue; la queue est en forme de lozenge. Le corps du poisson est brun, parsemé de tâches d'un bleu vif, de figure ovale, qui ressemblent à des demi cercles, dont les extrémités sont tournées les unes vers les autres, ou comme des cercles coupés au milieu. Je ne sais pas si ces poissons sont bons à manger, & l'on n'a pu m'en instruire, parce qu'on n'en prend que très rarement.

## ORBIS LÆVIS VARIEGATUS.

## The Globe Fish.



HIS Fish (no doubt of it) has received its Name from the Form, which is almost globular, except that the Tail extends beyond the spherical Form. It has a small Mouth, near which the Eyes are placed, and behind them two small Fins, the Fin of the Tail is forked. The upper part of the Body of an Olive Colour, marked with many irregular curved white Stripes; the Belly dusky white. These Fish are found in *Virginia* and many other Parts of *America*.



L est certain que ce Poisson a pris son nom de sa forme, qui est presque globulaire, excepté que la queue s'étend au delà du globe; il a une petite bouche, auprès de laquelle ses yeux sont placés, & derrière eux deux petites nageoires. La nageoire de la queue est fourchue; le dessus du corps couleur d'olive, marqué de plusieurs lignes blanches courbées & sans ordre; le ventre d'un blanc sale. On trouve ces poissons à la Virginie, & plusieurs autres endroits de l'Amerique.

## Cornus, foliis Salicis Laureæ acuminatis; floribus albis; fructu Sassafras.

THIS Tree is usually but of small Stature, growing to the Height of about sixteen feet; the Leaves grow alternately on Foot-stalks of about an Inch long, they resemble somewhat those of the common Bay, but are more taper and pointing at the End; they are light green, smooth and shining: On the Tops of the Branches are placed many small white hexapetalous flowers, which are succeeded by green Berries in a reddish Calix, growing to red Foot-stalks of an Inch long, resembling much the Berries of *Sassafras*.

CET arbre n'est pas ordinairement fort haut, il ne s'élève qu'à la hauteur de seize pieds; les feuilles sont rangées alternativement, & attachées par des pédicules d'environ un pouce; elles ressemblent un peu à celles du Laurier commun, mais elles vont plus en diminuant, & sont plus pointuës à leur extrémité; elles sont d'un verd clair, unies & brillantes. Les fleurs qui sont blanches sont composées de six feuilles & naissent aux sommets des branches; il leur succède des Bayes vertes dans un calice rougeâtre, qui sont attachées à des pédicules rouges, longs d'un pouce; elles ressemblent beaucoup aux Bayes du Sassafras.

## An Phaseolus minor lactescens flore purpureo. Hist. Jam. Vol. I. --- 162.

THIS Plant creeps up, and is supported by Trees and Shrubs near which it grows, the Leaves are trifoliate, the Flowers papilionaceous, and of a purple Colour, succeeded by Pods, like those of our common Pease, but thicker, more rounding, and somewhat less; these Pods contain usually seven or eight small round brown Pease,

CETTE plante rampe, & monte sur les arbres & les arbustes auprès desquels elle se trouve; les feuilles sont attachées trois à une queue, les fleurs légumineuses & violettes; il leur succède des Coques semblables à celles de nos pois communs, mais plus épaisses, plus arrondies, & un peu plus petites: Ces coques renferment ordinairement sept ou huit petits pois bruns & ronds.



An Phaseolus &c.

Orbis &c.





T29



Pfittacus &c.

## *PSITTACUS PISCIS VIRIDIS, BAHAMENSIS.*

### *The Parrot Fish.*

HE Mouth of this Fish is large, paved as it were with blunt Teeth closely connected after the Manner of the *Lupus marinus*. The Body is covered with large green Scales, the Eyes are red and yellow; the upper part of the Head brown, the lower part and the Gills blue, bordered with dusky red; a Streak of red extends from the Throat behind the Gills, at the upper End of which is a bright yellow Spot: The Fins are five in Number, one extending almost the Length of the Back, of a Bay or Cinnamon Colour; there are two behind the Gills blended with black, green and purplish Colours, with the upper Edge verged with blue; under the Abdomen is another red Fin, verged with blue, under the Anus extends another long, narrow, green Fin, with a List of red through the middle of it; at the Basis of the Tail on each Side was a large yellow Spot. The Tail large, forked, and green, with a curved red Line running through the middle, parallel to the Curve of the Tail, and ending in two Points. This Fish is more remarkable for its Beauty, than esteemed for Delicacy; they are taken on the Coasts of *Hispaniola*, *Cuba*, and the *Bahama Islands*.



*A bouche de ce Poisson est grande & pavée, pour ainsi dire, de dents emouffées, fort serrées entr-elles, comme celles du Loup marin. Le corps est couvert de larges écailles vertes, les yeux sont rouges & jaunes, le dessus de la tête brun, le dessous & les ouyes bleus, bordés d'un rouge obscur; une raye rouge s'étend depuis la gorge jusques derrière les ouyes, & à son extrémité supérieure il y a une tache d'un jaune brillant. Les nageoires sont au nombre de cinq, la première s'étend presque sur tout le dos, & est de couleur brune ou canelle; il y en a deux derrière les ouyes, mêlées de noir de verd & de violet, l'extrémité supérieure en est bordée de bleu: Sous le ventre il y a une autre nageoire rouge bordée de bleu; sous l'anus est placée une longue & étroite nageoire verte, traversée dans son milieu d'une ligne rouge: A la base de la queue il y avoit de chaque côté une grande tache jaune. La queue est grande, fourchu & verte, avec une ligne rouge qui passe par le milieu, en suivant la courbure de la queue, & qui finit en deux pointes. Ce poisson est plus remarquable par sa beauté, qu'il n'est estimé par la delicateſſe de ſon gouſt. On le prend ſur les côtes de l'Isle de St. Domingue, de Cuba, & des Isles Bahama.*

*ACUS MAXIMA, SQUAMMOSA, VIRIDIS.**The green Gar-Fish.*

HESE Fish arrives to three Feet in Length, have a very long Mouth or rather Bill, armed with many small Teeth, the Eyes were placed very low; the upper part of the Body green, the Belly pale red: It had six Fins, two under the Fore-part of the Belly, two under the Hind-part of the Belly, and one near the Tail; opposite to which on the Back was another smaller one; the Tail of an oval Form, of a Brick red Colour, sprinkled with round black Spots, as were the two Fins next the Tail, and of the same Colour, the other Fins were of a fainter red. The whole Body was covered with an entire hard bony Coat, divided into large Scales, which on the Belly were of an oblong square Form, and placed obliquely. These Fish are found in Ponds and fresh water Rivers in *Virginia*.



*E poisson croît jusques à trois pieds de long ; sa bouche, ou plutôt son bec est très long, armé de plusieurs petites dents ; les yeux étoient placés fort bas ; le dessus du corps verd, le ventre rouge pâle. Il avoit six nageoires, deux sous la partie antérieure du ventre, deux sous la partie postérieure du ventre, & une proche la queue ; au dessus de celle-cy précisement il y en avoit une autre plus petite sur le dos : La queue étoit ovale, d'un rouge couleur de brique, mouchetée de taches noires & rondes, de même que les deux nageoires proche la queue qui étoient aussi de la même couleur ; les autres nageoires étoient d'un rouge plus pâle. Tout le corps étoit couvert d'une enveloppe dure & osseuse, divisée en grandes écailles ; sous le ventre elles étoient taillées en quarrés oblongs placés obliquement. On trouve ces poissons dans les étangs & les rivières d'eau douce à la Virginie.*

*Frutex aquaticus, floribus luteis, fructu rotundo quinque-capsulari.*

THESE Plants grow usually about twelve Feet high, arising with innumerable small Stems, alternately bent, from which shoots forth smaller Twigs, set with small pointed smooth Leaves; the Flowers grow on the Tops of the Branches before they open, being inclosed in small brown pointed *Periantheums*, set on short Foot-stalks; are hexapetalous, of a deep yellow Colour, with long *Apices* of the same Colour: They grow in shallow, fresh Water Ponds, in the Woods of *Virginia* and *Carolina*, and in the beginning of *February* adorn the Woods, when few other Plants appear in Blossom: The Flowers are succeeded by small round *Capula's*, which in *March* and *April* divide into four Parts and disclose their Seeds, which are very small, and being dispersed by the Wind into watery Places, spring up very thick and blossom in a short Time.

*C*ES plantes s'élèvent ordinairement jusques à douze pieds ou environ, avec une infinité de petites branches courbées alternativement, d'où sortent de plus petites branches encore garnies de petites feuilles lisses & pointues ; les fleurs naissent aux extrémités des branches, avant de s'ouvrir elles sont enfermées dans un petit calice brun & pointu, attaché à un pédicule court ; elles sont à six feuilles d'un jaune foncé, avec de longues étamines de la même couleur. Ces plantes croissent dans des Etangs d'eau douce & peu profonds, dans les bois de la Virginie & de la Caroline ; & au commencement de Février que peu d'autres plantes paroissent en fleurs, celles-cy ornent déjà les forêts. Il succède à ces fleurs de petites capsules rondes ; au mois de Mars & d'Avril elles se divisent en quatre, & laissent voir les semences qui sont fort petites ; le vent les disperse, & lorsqu'elles tombent dans les endroits marécageux, elles y poussent fort épais & y fleurissent en peu de temps.

*Fruitex aquatinus &c*







T<sup>31</sup>



An Acarauna &c.

*An ACARAUNA major pinnis cornutis; an Paru  
Brasilienſibus?* Marg. Will. App. <sup>23.</sup> T. o. 3. ?

### The Angel Fish.



THE Form of this Fish is so odd and singular, that without exhibiting its Figure, it would be difficult to give an Idea of it by Words only. This was somewhat less than two Inches thick, the Head and whole Body exclusive of the Fins and Tail, forms an oval Figure, from the hind-part of the Back, and also from the Belly shoot forth two large and very long tapering Fins of equal Size, ending in Points, the half of these Fins next the Body is blue, the rest towards the Points red: The Tail of an Orange Colour, convex at the End. Two small Fins grow behind the Gills, one on each Side, of an Orange Colour, the Basis being black: Under the Abdomen grows another small sharp pointed red Fin, the Fore-part of which is edged with blue: On the Fore-part of the Back grows three sharp-pointed Bones, under the Hind-part of the Belly are also three of the like sharp-pointed Bones. The Irides of the Eyes yellow, with two Streaks of blue, one crossing the upper, and the other the under Part of the Irides; the Colour of the Head yellow and dusky blue; the upper Gill was armed with many pointed Bones. Tho' the Shape of this Fish is singular, the most remarkable Parts of it are the Scales, which are of a dusky green Colour, upon which large Scales are innumerable very small ones. These Fish are taken on the Coasts of Carolina, but on the Coasts of the Bahama Islands are found the same shaped Fish, with both small and large Scales deeply verged with Gold. This Coat of small Scales over the large ones, is a Singularity I believe peculiar to this Fish. They are esteemed in Carolina an excellent eating Fish, and at the Bahama-Islands inferior to none they have.



*A forme de ce poisson est si bizarre, & si particulière, qu'il seroit très difficile d'en donner une idée par une simple description, sans le secours d'une figure. Celui-cy avoit un peu moins de deux pouces d'épaisseur, la tête & le reste du corps, excepté les nageoires & la queue, sont de figure ovale; il part du bas du dos, de même que du ventre, deux nageoires semblables, grandes & très longues, qui vont en diminuant & se terminent en pointes; la moitié la plus froche du corps est bleue, l'autre moitié vers la pointe est rouge. La queue est couleur d'orange & convexe par son extrémité. Il y a deux petites nageoires derrière les ouies, une de chaque côté, de couleur d'orange, & dont la base est noire. Sous le ventre il y a une autre petite nageoire rouge, pointue, le devant en est bordé de bleu. Sur la partie antérieure du dos il y a trois os piquants, & il y en a trois semblables sous la partie postérieure du ventre; les iris des yeux sont jaunes, avec deux rayes bleuées, dont l'une traverse la partie inférieure, & l'autre la partie supérieure de l'iris; la couleur de la tête étoit jaune & d'un bleu sale, l'ouïe supérieure étoit armée de plusieurs os piquants. Quoy que la forme de ce poisson soit singulière, il n'a rien de plus remarquable que les écailles, qui sont d'un verd brun, & sur ces grandes écailles il y en a une infinité de très petites. On prend ces poissons sur les côtes de la Caroline; mais on trouve des poissons de la même forme sur les côtes des îles Bahama, avec de grandes & de petites écailles qui ont un large bord doré. Je crois que cette couche de petites écailles par dessus les grandes, est une singularité qui ne se trouve que dans ce poisson. Il passe à la Caroline pour un très excellent mangé; & aux îles Bahama il ne le cède en bonté à aucun autre.*

*CANCER terrestris, Cuniculos sub terra agens.*

Nat. Hist. Jam. Vol. I. T. II.

*The Land Crab.*

HE Bahama-Islands as well as most Lands between the *Tropicks*, abound with these Animals, in some Places the Ground being almost covered with them, so thick they are, when out of their Holes that the Earth seems to move as they crawl about. If any one has a Stick in their Hand, they will not suffer themselves to be approached so near as without it, and if walking regardless amongst them without any Thing in Hand, they will approach you with menacing Gestures, and with one of their Claws raised threaten to attack you. They make their Holes like Rabbits in sandy Lands, in some of the mountainous Islands; they in breeding Time annually descend the Hills in vast Numbers to lay their Eggs near the Sea, whatever they meet with in their Passage they go over, never going aside let Houses, Churches or what will stand in their Way: They have been known to enter in at a Window, and on a Bed, where People who never before had seen any, were not a little surprized. They are of various Sizes, the largest about six Inches wide; they walk Side-ways like the Sea-Crab, and are shaped like them, some are black, some yellow, some red and others variegated with red, white, and yellow mixed. Some of these as well as the Fish of this Country are poisonous, of which several People have died, particularly of the black kind. The light-coloured are reckoned best, and when full in Flesh are very well tasted. In some of the Sugar Islands they are eat without Danger, and are no small help to the Negro Slaves, who on many of the Islands would fare very hard without them. They feed on Vegetables.

*Crabe de Terre.*

ES Isles Bahama de même que la plupart des terres qui sont entre les Tropiques, ont une grande quantité de ces animaux; dans quelques endroits la terre en est presque couverte, ils sont si serrés, lorsqu'ils sortent de leurs trous, qu'il semble que la terre se remue à mesure qu'ils avancent. Ils ne souffrent pas, qu'une personne qui a un baton à la main, les approche de si près qu'une autre qui n'en a point; & s'en se promène au milieu d'eux sans y prendre garde, & sans avoir rien à la main, ils s'approcheront de vous avec des gestes menaçants, & feront mine de vous attaquer en tenant une de leur pattes élevée. Ils font des trous comme des lapins, dans un terroir sablonneux, dans quelquesunes des Isles montagneuses; tous les ans au Printemps ils descendent des collines en grand nombre pour aller jeter leurs auss proche la mer, ils passent par dessus tout ce qu'ils rencontrent dans leur chemin, ne se détournant jamais, quoi qu'il se trouve dans leur passage, soit maisons ou Eglises: On les a vus entrer par une fenêtre & aller à un lit où des gens qui ne les avaient jamais vus n'étoient pas peu surpris. Ils sont de différentes grandeurs, les plus grands sont larges d'environ six pouces, ils marchent de costé comme les Cancres de Mer, & sont faits de même: Il y en a de noirs, de jaunes, de rouges, de bigarrés de rouge, de blanc & de jaune mêlés ensemble. Quelquesunes de ces Crabes, comme le poisson de ce País, sont venimeuses, & plusieurs personnes en sont mortes, sur tout les noires sont dangereuses. Celles dont les couleurs sont claires, sont estimées les meilleures, & lorsqu'elles sont bien pleines elles ont fort bon goût. On en mange sans danger dans quelquesunes des Isles Antilles, & ce n'est pas un petit secours pour les Nègres qui sans cela feroient mauvaise chère dans la pluspart de ces Isles. Elles se nourrissent de plantes.

*Tapia trifolia fructu majore oblongo.*


**T**HIS usually grows but to a small Tree of about 20 Feet high, and the Body about eight or ten Inches Diameter; the Leaves are trifoliate, hanging opposite to each other on long Stalks, the Fruit likewise hang on very long Stalks, and are of the Size and Shape of *Spaniſh* Olives, and of a yellow Colour, enclosing a Stone like that of a Plum. Of these Fruit amongst many others these Crabs feed.

**C**ET arbre ne croît ordinairement qu'à la hauteur de vingt pieds, son tronc n'a que huit ou dix pouces de diamètre. Ses feuilles sont attachées trois à trois à une queue, pendantes vis-à-vis les unes des autres sur de longues tiges; le fruit pend aussi à de longues tiges, il est de la même grosseur que les olives d'Espagne, & de couleur jaune, il renferme un noyau comme celui d'une prune. Les Crabes se nourrissent de ces fruits, comme de plusieurs autres.

T32

DG

Tapia &c.







Manghala &c.

T<sub>33</sub>.



# CANCELLOUS TERRESTRIS BAHAMENSIS.

## The Hermit Crab.

 HE Fore-part of this Crab, being about one half of its Body is crustaceous, and of a purple Colour, the Hind-part is soft and tender, of a livid fleshy Colour, and covered over with only a soft Skin, which not being so defensible as the crustaceous Part, and being more liable to be bruised or hurt by the Attacks of Animals that prey on them, Nature hath directed it for the Security of that tender Part to get into and inhabit the empty Shell of a Fish that best fits its Size and Shape: When the Crab grows too big for the Shell to contain, it leaves that and seeks another more commodious, so continues changing his Habitat.on as he increases in largeness, which from being no bigger than will fill the Shell of a small Snail or Periwinkle, will become when at full Growth bigger than that here figured: They crawl very fast with the Shell on their Back, and at the Approach of Danger draw themselves within the Shell, and thrusting out the larger Claw in a defensive Posture, and will pinch very hard whatever molests them: They frequent most those Parts of the Sea-Shores which are covered with Trees and Shrubs, producing various wild Fruits, on which they subsist, tho' I have seen them feed on the Fragments of Fish and other animal Substances, cast on Shoar. They being roasted in the Shell are esteemed delicate. I don't remember to have seen any of them to go into the Sea. The Shells they mostly make use of are of the *Buccinum* Kind, whose spiral Form is most fit to hold them fast, and secure them in the Shell, in which they can fix themselves so fast, by Means of short Claws at their Tails, that in pulling them out of it, the tender Part separates from the crustaceous, and remain in the spiral Part of the Shell. Fig. 1. shews the Animal in the Shell. Fig. 2. shews the Animal out of the Shell.



*A partie antérieure de ce Cancre, ce qui fait environ la moitié de son corps, est crustacée, & de couleur violette, l'autre moitié est molle & tendre, de couleur de chair livide, & n'est couverte que d'une peau molle; cette partie n'étant donc pas si bien défendue que la crustacée, & étant plus exposée à être écrasée ou blessée par les attaques des animaux qui se nourrissent de ces Cancres, la nature lui a donné l'instinct de se fourrer & de se loger dans la coquille vide du poisson qui convient le mieux à sa taille pour la sûreté de cette partie tendre: Et lorsque le cancre devient trop grand pour la coquille, il la quitte & en cherche une plus commode, & continue ainsi à changer d'habitation à mesure qu'il croît. D'abord il n'est pas plus grand qu'il ne faut pour remplir la coquille d'un petit Limaçon ou d'un Petoncle, mais lorsqu'il a pris toute sa crûe, il est plus grand que celui de la figure: Ils rampent fort vite avec leur coquille sur le dos, & à l'approche du danger ils s'y fourrent, & en avançant leur plus grande patte, ils se tiennent sur la défensive, & pincent fort serré tout ce qui les incomode; ils fréquentent sur tout ces endroits des côtes qui sont couverts d'arbres & de buissons, farce qu'ils vivent des fruits sauvages que ces arbres produisent; quoique j'en aye vu manger des morceaux de poisson, & d'autres substances animales que la mer jette sur la côte. On les regarde comme un metz friand, après qu'ils sont grillés dans leur coquille. Je ne me souviens pas d'en avoir vu aucun aller à la mer. Les coquilles dont ils se servent le plus sont celles de l'espèce des Buccines, dont la forme spirale est la plus propre à les bien retenir, & les mettre en sûreté dans la coquille, où ils peuvent s'attacher si fortement par le moyen des ongles courts qu'ils ont à la queue, qu'en les en voulant retirer la partie crustacée se sépare de la molle qui reste dans les convolutions de la coquille. La première figure représente l'animal dans sa coquille, & la seconde le représente hors de sa coquille.*

## Manghala arbor Curassavica, foliis Salignis. Hort. Amst.

BUTTON-WOOD, Hist. Jam. Vol. I. p. 18.

**A**S Sir Hans Sloane in his Natural History of Jamaica, has accurately described this Tree, I conceive it necessary to add only what I know more concerning it. They grow always near the Sea and in Salt Water, and are found on all the Coasts of America between the Tropicks in greater Plenty than any other Shrub: They being small, I know of no Mechanick Use they are put to, but for burning, it is esteemed the best Wood in these Latitudes. Where these Trees are found, there are generally under them great Plenty of Hermit Crabs, which probably may feed on its fallen Fruit.

## Frutex trifolius resinosus; floribus tetra-petalis albis racemosis.

**T**HIS Shrub grows to the Height of about six Feet, producing trifoliated, pointed, stiff, shining Leaves growing opposite to one another on Foot-Stalks two Inches long, and at the Ends of the Branches grow four or five slender Stalks set with many very small white Flowers.

**C**OMME Mr. le Chevalier Sloane, dans son Histoire naturelle de la Jamaïque, a décrit exactement cet arbre, il ne me reste qu'à y ajouter ce que j'en connais de plus. Ils croissent toujours proche de la mer, & en l'eau salée, & on en trouve un plus grand nombre que de tout autre arbuste sur toutes les côtes de l'Amérique, entre les Tropiques: Je ne connais aucun usage méchanique auquel ils soient employés à cause de leur petite taille, mais on les regarde comme le meilleur bois à brûler qui soit dans ces latitudes. Par tout où l'on trouve ces arbres, il y a ordinairement sous eux grande quantité de ces Bernard l'hermite, qui se nourrissent apparemment de leurs fruits lorsqu'ils sont tombés.

**C**ET arbuste s'élève environ à la hauteur de six pieds, il produit des feuilles roides, luisantes, attachées trois à trois à des queues de deux pouces de long, & placées vis-à-vis les unes des autres, & aux extrémités de branches il naît quatre ou cinq pédicules minces, garnis de plusieurs fleurs blanches très petites.

The Structure of Crabs and other crustaceous Fish is so intricate, they being composed of so many irregular Parts that an exact Description without the Figure would be very tedious to the Reader, I shall therefore content my Self to describe them in fewer Words, yet sufficient to distinguish them from others of the same Tribe; hoping the Figures will make amends for any Deficiencies in the Descriptions.

La forme des Cancres & des autres poissos crustacés est si difficile à expliquer exactement, à cause de l'irregularité des parties dont ils sont composés, qu'une description complète seroit fort ennuyeuse au lecteur, sans le secours de la figure; c'est pourquoi je me contenterai de les décrire en peu de mots, qui suffiront cependant pour les distinguer chacun de ceux de la même classe; dans l'espérance que les figures suppléeront à ce qui manquera aux descriptions.

## CANCELLUS maximus Bahamensis. The Sea Hermit Crab.



HIS Crab was eight Inches long, the Eyes when extended from their Sockets a full Inch in Length, on each Side of the Eyes was a short Horn, from the Nose proceed two Pair of Feelers, one Pair much shorter than the other and forked at their Ends, on each Side of the Mouth are a Pair of Pinchers or short Claws. It had two large scaly Claws alike in Size and Shape, having three Joints in each, the Head, Legs, Claws and Fore-part of the Body crustaceous; the Hind-part, which is the larger Part of the Body is of a tender fleshy Substance, and covered with only a thin Skin, the Head is large and round, the crustaceous Part of the Body short With six Ribs running Lengthways of it; a small semi-circular Shield crosses the Body at the joining of the crustaceous to the tender Part; from under which and on the Back of the Fish grow two small Legs with four Joints each, and forked at the Ends, a little above which grow two more such like Legs of three Joints each, above which are four more, two of a Side much longer and slenderer, having five Joints a-piece; all these are set with bristly Hairs. The fleshy Part of the Body is divided into eleven Parts or Jonts by ten circular Membranes or Rings; it tapers and grows very small towards the Tail, which is again crustaceous: Out of it arises three crooked Claws beset with Bristles, by which the Creature holds it self fast in the Shell it hath chosen for its Habitation, by hooking these Claws into the small Turns or spiral Cavities thereof, from one Side of the fleshy Part of the Body arise four Tufts of Hair, somewhat resembling Feathers, each about two Inches long, and on the other Side are 10 or 12 small short Tufts of Hairs. These Crabs inhabit the Shells of the *Buccinum magnum variegatum*, Lister 359. N° 12. they abide in the shallow Parts of the Sea, near the Shores of the Bahama-Islands, and like the Land Hermit Crab, get into those Shells only that are empty, not dispossessing any Fish of its Shell, and therefore have been improperly called the Soldier Crab.



Bernard l'Hermite de Mer.

Le Crabe étoit long de huit pouces, ses yeux lorsqu'ils étoient entièrement poussés hors de leurs orbites, avoient un bon pouce de longueur, de chaque côté des yeux il y avoit une corne courte, il part du nez deux paires d'Antennes, dont une paire est beaucoup plus courte que l'autre, & fourchue à son extrémité. De chaque côté de la bouche il y a une paire de serres ou de pattes courtes. Il avoit deux grandes pattes écaillées toutes semblables en forme & en grandeur, ayant chacune trois articulations; la tête, les jambes, les serres & la partie antérieure du corps sont crustacées; la partie postérieure du corps qui est la plus grande, est d'une substance charnue, tendre & n'est couverte que d'une peau mince, la tête est grande & ronde, la partie crustacée du corps est courte avec six costes qui s'étendent dans sa longueur, une espèce de petit bouclier en demi cercle traverse le corps dans l'endroit où la partie crustacée & la partie charnue se joignent, il sort de dessous ce bouclier sur le dos du poisson deux petites pattes à quatre articulations chacune, & fourchues à leur extrémité, un peu au dessus de celles-ci il y a deux autres pattes à trois articulations chacune, au dessus desquelles il y en a quatre de plus, deux de chaque côté, beaucoup plus longues & plus étroites, elles ont chacune cinq articulations; toutes celles-là sont garnies de poils rudes & forts. La partie charnue du corps est divisée en onze parties ou divisions par dix membranes circulaires ou anneaux, elle va en diminuant & devient fort menuë vers la queue, qui est aussi crustacée, il en sort trois angles crochus garnis de poils, c'est par leur moyen que cette créature s'attache fermement à la coquille qu'elle a choisie pour son habitation, en accrochant ces ongles dans les petites circonvolutions, ou la cavité spirale de cette coquille; d'un côté de cette partie charnue naissent quatre touffes de poils qui ressemblent en quelque manière à des plumes d'environ deux pouces de long, & de l'autre côté il y a dix ou douze petites touffes de poils courts. Ces Cancres se logent dans le coquillage que Lister 359. No. 12, nomme *Buccinum magnum variegatum*. Ils se tiennent dans les bas-fonds proche des côtes des îles Bahama, & de même que Bernard l'Hermite de terre ils n'entrent que dans les coquilles vides, sans chasser aucun poisson de la sienne; c'est donc sans raison qu'on les a appelés Soldats.

## Lithophyton compressum obscurè lutescens marginibus purpureis asperis.

THESE Plants grow at the Bottom of the shallow Seas of the Bahama-Islands, some of them arrive to the Height of near three Feet, tho' most of them not above half so high; the Joints are thinner, and grow at greater Distances than any other of the Coralline kind I have observed; the Branches are somewhat flat of a dusky Yellow or Straw Colour, with a faint Stain of Purple at the Edges, which is not peculiar to this Plant, but is what a great many other Substances, besides the Sea Shrubs, are much liable to.

CES plantes croissent au fonds des Bas-fonds des îles Bahama. Quelques unes s'élèvent jusqu'à la hauteur de trois pieds, quoique la plupart ne parviennent pas au delà de la moitié de cette hauteur. Les nœuds en sont moins nombreux, & plus éloignés les uns des autres que je l'aye jamais observé dans aucune plante Coralline. Les branches sont un peu plates, d'un jaune obscur, ou de couleur de paille, avec une faible nuance de violet vers les bords, ce qui n'est pas particulier à cette plante, mais ce qui s'observe souvent en plusieurs autres substances que les arbustes maritimes.

T 34



Cancellus maximus

Lithophyton &c





T<sub>35</sub>.



Cancer arenarius.

Lithophyton &c.

## CANCER ARENARIUS.

*The Sand Crab.*

HESE Crabs are usually about the Size of the Figure, most of them light brown or dusky white. It hath eight Legs and two Claws, one of which is twice the Bigness of the other: These Claws serve them both to defend and feed themselves with. The Head has two square Holes which are Receptacles for its Eyes, out of which it thrusts them and draw them in again at Pleasure. Their Abode is on the sandy Shoars of *Ilathera*, and many others of the *Bahama*-Islands. They run very fast, and retreat from Danger into little deep Holes they make in the Sand.

*Le Cancre de Sable.*

ES Cancres sont ordinairement de la grosseur de la figure, la pluspart d'un brun clair, ou d'un blanc sâle; il a huit jambes & deux serres, dont l'une est deux fois plus grande que l'autre; ces serres lui servent pour sa défense, & pour prendre sa nourriture; sa tête a deux trous quarrés, qui sont les receptacles de ses yeux, d'où il les élance & où il les retire comme il veut. Ils se tiennent sur les rivages sableux de l'Isle Ilathera, & la pluspart des Isles Bahama: Ils courrent fort vite, & évitent le danger en se retirant dans de petits trous profonds qu'ils font dans le sable.

*Lithophyton pinnatum purpureum asperum.*

THIS grows usually between three and four Foot high, with three or four tapering stiff Stalks, with a few smaller ones branching from them; these Stalks are thick set with single Sprigs of about two Inches long; the whole Plant incrusted with a purple Bark, which being rubbed off, the inner Part appears of a shining black like Ebony.

CELUI-cy croît ordinairement depuis trois jusques à quatre pieds de hauteur, avec trois ou quatre tiges roides, & qui vont en diminuant, d'où naissent en forme de branches quelques autres plus petites & en petit nombre, ces tiges sont toutes couvertes de petits rejettons de deux pouces de long ou environ; toute la plante est incrustée d'une écorce violette, quand elle en est détachée le dedans paroît d'un noir luisant comme de l'Ebene.

## PAGURUS MACULATUS.

*The red motled Rock Crab.*

THE Body of this Crab is round; The Legs larger and longer than in other Kinds, the Claws red, except which, the whole is motled in a beautiful Manner with Red and White. These Crabs inhabit the Rocks hanging over the Sea; they are the nimblest of all other Crabs; they run with surprising Agility along the upright Side of a Rock, and even under Rocks that hang horizontally over the Sea; this they are often necessitated to do for escaping the Assaults of rapacious Birds which pursue them. These Crabs so far as I could observe never go to Land, but frequent mostly those Parts of the Promontories and Islands of Rocks, in and near the Sea, where by the continual and violent Agitation of the Waves against the Rocks, they are always wet, continually receiving the Spray of the Sea, which often washes them into it, but they instantly return to the Rock again, not being able to live under Water, and yet requiring more of that Element than any of the crustaceous Kinds that are not Fish.

*Cancre de Rocher tacheté.*

*E* corps de ce Cancre est rond, les pattes plus longues & plus grosses que dans les autres espèces, les serres rouges, tout le reste tacheté d'une manière fort agréable de rouge & de blanc; ces Cancres se tiennent dans les rochers qui s'avancent sur la mer, ils sont les plus agiles de tous les Cancres, ils courent avec une agilité surprenante sur le côté perpendiculaire d'un rocher, & même sur le dessous des rochers qui s'avancent horizontalement sur la mer, à quoy ils sont souvent obligés pour échaper aux attaques des oiseaux de proye qui les poursuivent. Ces Cancres, autant que j'ay pu l'observer, ne vont jamais dans les terres, mais ils se tiennent presque toujours dans ces endroits des Promontoires & des Isles de Rochers dans la mer, ou sur ses bords, là où par la violente & continue agitation des vagues contre les rochers ils sont toujours mouillés, en étant continuellement exposés au choc de la mer qui les emporte souvent, mais ils retournent d'abord à leur rocher, car ils ne peuvent pas vivre sous l'eau, & cependant ils ont plus besoin de cet élément qu'aucune autre espèce de crustacés qui ne sont pas des poissons.

## CANCER CHELIS CRASSISSIMI S.

*The rough-shelled Crab.*

THESE Crabs are usually of the Size of the Figure, and are commonly taken from the Bottom of the Sea in shallow Water, the Legs contrary to the precedent are small in Proportion to its Body, the two Claws remarkable large and flat. But as the Structure of this Fish is so much better understood by the Figure of it than by the most tedious Description, I shall only observe that the whole Shell is covered with innumerable little Tubercles, resembling Shagrine: The Colour of it is brown variously stained with purple: The Structure of this Crab is singular, and in nothing more than the nearness of the Eyes to one another, and the uncommon Width and Largeness of its Claws.

*Cancre à la coque raboteuse.*

*C*ES Cancres sont ordinairement de la grandeur de la figure, on a coutume de les prendre au fond des eaus basses; leurs jambes, au contraire des precedents, sont petites à proportion de leur corps; les deux mordants sont extrêmement grands & plats, mais comme la forme de ce poisson est infinité plus aisée à comprendre par la figure, que par la plus longue description je ne ferai qu'une seule remarque, qui est que toute l'écailler est couverte de petits tubercules sans nombre, & qu'elle ressemble à du Chagrin, sa couleur est brune tachée de violet en différentes manières. La forme de ce Cancre est singulière, & sur tout en ce que ses yeux sont si proches l'un de l'autre, & que ses mordants sont si grands & si larges.

Pagurus Maculatus.

T36.



Cancer chelis crassissimus.





T37.



Cancer Chelis Rubris.

Titanokeraophyton &c.

## CANCER MARINUS CHELIS RUBRIS.

### The red claw Crab.

 HIS Crab is commonly of the Size of the Figure, of a brown Colour: It hath two Claws of unequal Bigness, red at the Ends, and eight Legs, which seem of less Use to them than in other Crabs, for when on the Ground they crawl with slow Pace, dragging their Bodies after them, but are mostly seen grasping with their Claws and hanging to some Sea Plant or other marine Substance.

Cancre marin aux mordants rouges.



E Cancre est ordinairement de la même grandeur que la figure, d'une couleur brune; il a deux mordants d'iné-gale grandeur & rouges à leurs extrémités, & huit jambes dont il semble faire moins d'usage que les autres Cancres ne font des leurs; car lorsqu'il est sur la terre, il se traîne lentement en tirant son corps après lui, mais le plus souvent on les voit attachés par leurs mordants, & pendans à quelque plante ou autre substance marine.

### *Titanokeratophyton ramosissimum, crusta eleganti tuberculata.*

THIS Plant rises from one to two Feet in Height, covered with a very thick tuberculated Incrustation, which while it is growing in the Water, is covered with a thick Slime or Mucilage. The whole Plant is pliant and very ponderous, both which it retains when dry, the Colour of it is deep yellow, as well while it is growing as when dry.

CETTE plante croît depuis un jusques à deux pieds de haut, elle est couverte d'une croûte fort épaisse & chagrinée; tandis que cette plante croît dans l'eau, cette croûte est couverte d'une matière visqueuse, ou d'un mucilage fort épais: Toute la plante est souple & fort pesante, elle retient ces qualités quoique secche, sa couleur est un jaune foncé, aussi bien quand elle est sur pied, que lorsqu'elle est secche.

*Of the different Kinds of Sea-Tortoise,  
with their Properties in general.*



HE Sea-Tortoise is by our Sailors vulgarly called *Turtle*, whereof there are four distinct kinds: The green *Turtle*, the *Hawks-bill*, the *Logger-head* *Turtle* and the *Trunk* *Turtle*.

They are all eatable, but the green *Turtle* is that which all the maritime Inhabitants in America, that live between the *Tropicks*, subsist much upon. They much excell the other kinds of *Turtle*, and are in great Esteem for the wholesome and agreeable Food they afford.

All Sorts of *Turtle* except the *Loggerhead* *Turtle* are timerous and make little Resistance when taken, but in Time of Coition all the kinds are very furious and regardless of Danger: The male Copulates by the help of two Horns or Claws under his fore-Fins, by which he holds and clings to the fleshy Part of the Neck of the Female: They usually continue in Copulation above 14 Days: They have four Legs, which are of much greater Use to them as Fins to swim with, than as Legs to walk with, which they do awkwardly and with slow Pace. They never go on Shoar but to lay their Eggs, which is in April; they then crawl up from the Sea above the flowing of high Water, and dig a Hole above two Feet deep in the Sand, into which they drop in one Night above an hundred Eggs, at which Time they are so intent on Natures Work that they regard none that approach them, but will drop their Eggs into a Hat if held under them, but if they are disturbed before they begin to lay, they will forsake the Place and seek another. They lay their Eggs at three, and sometimes at four different Times, there being fourteen Days between every Time, so that they hatch and creep from their Holes into the Sea at different Times also: When they have laid their Complement of Eggs they fill the Hole with Sand, and leave them to be hatched by the Heat of the Sun, which is usually performed in about three Weeks.

Des différentes espèces de Tortuës de Mer,  
& de leur propriétés en general.



OS matelots appellent ordinairement la Tortuë de mer *Turtle*: Il y en a quatre espèces différentes, la Tortuë Franche, le Caret, la Caoüanne & celle que les Anglois appellent le Cofre. Elles sont toutes bonnes à manger, mais la Tortuë franche est celle dont tous les habitants de l'Amérique, qui sont entre les Tropiques, se nourrissent principalement; elle est beaucoup préférable aux autres espèces, & l'on en fait grand cas, parce que c'est un mets également sain & agréable.

Toutes les espèces de Tortuës, excepté la Cacouanne, sont craintives, & ne font point de résistance lorsqu'elles sont prises, mais quand elles sont en chaleur elles deviennent furieuses & ne font point d'attention au danger: Le mâle s'attache à la femelle par le moyen de deux cornes ou ongues placées sous ses nageoires de devant, dont il tient la partie charnue du col de la femelle, & s'y attache; ils demeurent ordinaiement plus de quatorze jours de suite dans l'accouplement: Les Tortuës ont quatre jambes qui leur servent beaucoup plus pour nager, que pour marcher, ce qu'elles font lentement & de mauvaise grâce; elles ne vont jamais sur le rivage que pour y pondre leur œufs, ce qui se fait au mois d'Avril; elles se traînent alors de la mer jusqu'au dessus de l'endroit où montent les plus hautes marées, & font un trou de plus de deux pieds de profondeur, dans le sable, dans lequel elles pondent dans une nuit plus de cent œufs; pendant ce temps là elles sont si occupées de leur ponte, qu'elles ne semblent pas s'apercevoir de ceux qui les approchent, & elles laisseront tomber leurs œufs dans un chapeau si on le tient sous elles; mais si on vient à les troubler avant qu'elles aient commencé leur ponte, elles quitteront la place & en chercheront une autre; elles pondent tous leurs œufs à trois ou quatre différentes reprises, en mettant quatorze jours d'intervalle entre chacune; ensuite qu'elles couvent & sortent de leurs trous pour aller à la mer à différentes reprises aussi: Quant elles ont achevé leur ponte elles remplissent le trou de sable, & laissent à la chaleur du soleil à faire éclore leurs œufs, ce qui s'achève au bout d'environ trois semaines.

## TE STUDIO

### *The green Turtle.*

HERE are great Plenty of this Kind of *Turtle* amongst the *Bahama-Islands*, yet none breed there, they come from *Cuba* and the Continent. Their Eggs, which differ much, and are plainly distinguishable from those of the other Kinds, being never found there; whereas most of these Islands do plentifully abound with the Eggs of the others. This Kind is preferred to the Rest, and is esteemed a very Wholsome and delicious Food: It receives its Name from the Fat of it being of a green Colour. Sir Hans Sloane has informed us in his Natural History of *Jamaica*, that 40 Sloops are employed by the Inhabitants of *Port Royal* in *Jamaica* for the catching them: Their Markets are supplied with *Turtle* as ours in *England* are with Butchers Meat. The *Bahamians* carry many of them to *Carolina* where they turn to good Account, not because that plentiful Country wants provision, but they are esteemed there as a rarity, and for the Delicacy of their Flesh. These feed on a Kind of Gras growing at the Bottom of the Sea commonly called *Turtle Gras*.

*Alga marina, graminea angustissimo folio.* Hist. Jam. 61. --- Vol. I.

THIS Plant grows in shallow Water; several grassy narrow Blades shoot from a stringy fibrous Socket, which arises from the Root, fixed at the Bottom of the Sea.

*marina viridis.*

*Tortuë verte, ou Tortuë Franche, Rochf.*

IL y a une grande quantité de ces Tortuës autour des îles Bahama; cependant elles n'y pondent pas, elles y viennent de Cuba & du Continent; leurs œufs qui sont fort différents de ceux des autres espèces, & aisés à reconnaître, ne se trouvent jamais dans ces îles, au lieu que les œufs des autres espèces y sont en grande abondance. Cette espèce est préférée aux autres, & en la regarde comme un manger sain & délicieux. Elle prend son nom de la couleur de sa graisse. Mr. le Chevalier Sloane nous a appris dans son Histoire naturelle de la Jamaïque, que les habitants de Port Royal à la Jamaïque, emploient quarante bâques à la pêche de ces Tortuës; leurs marchés en sont fournis comme les nôtres en Angleterre le sont de grosse viande. Les Bahamians en portent beaucoup à la Caroline où ils s'en défont avantageusement, non que ce pays abondant manque de provisions, mais on les regarde là comme une rareté, & on les estime à cause de la délicatesse de leur chair. Elles se nourrissent d'une espèce d'herbe qui vient au fond de la mer, appelée communément herbe aux Tortuës.

CETTE plante croît dans des eaux basses. Sa racine qui est attachée au fond de la mer pousse un étuy fibreux, d'où sortent plusieurs feuilles herbeuses & étroites.

T 38.







39



40

## Of the Manner of taking Turtle.

HE Inhabitants of the Bahama-Islands by often Practice are very dextrous in catching them, particularly the green Turtle. In April they go in little Boats to the Coasts of Cuba, and other neighbouring Islands, where in the Evening, especially in Moon-light Nights they watch the going and returning of the Turtle, to and from their Nests, at which Time they turn them on their Backs, where they leave them, and proceed on turning all they meet, for they cannot get on their Feet again when once turn'd. Some are so large that it requires three Men to turn one of them. The Way by which Turtle are most commonly taken at the Bahama-Islands is by striking them with a small Iron Peg of two Inches long, this Peg is put in a Socket at the End of a Staff 12 Feet long. Two Men usually set out for this Work in a little light Boat or Canoe, one to row and gently steer the Boat, while the other stands at the Head of it with his Striker. The Turtle are sometimes discovered by their swimming with their Head and Back out of the Water, but they are oftenest discovered lying at the Bottom, a Fathom or more deep. If the Turtle perceives he is discovered, he starts up to make his Escape, the Men in the Boat pursuing him, endeavour to keep Sight of him, which they often loose and recover again by the Turtle putting his Nose out of the Water to breathe; thus they pursue him, one paddling or rowing, while the other stands ready with his Striker; it is sometimes half an Hour before he is tired; then he sinks at once to the Bottom, which gives them an Opportunity of striking him, which is by piercing the Shell of the Turtle through with the iron Peg, which slips out of the Socket, but is fastened by a String to the Pole. If he is spent and tired by being long pursued, he tamely submits when struck to be taken into the Boat or hauled a-Shoar. There are Men, who by diving will get on their Backs, and by pressing down their Hind-part, and raising the Fore-part of them by Force, bring them to the Top of the Water, while another slips a Noose about their Necks.

## De la manière de prendre la Tortuë.



Force de s'y être exercés, les habitans des Isles Bahama-sont fort adroits à prendre les Tortuës, sur tout la franche; au mois d'Avril ils vont dans de petits batteaux sur les costes de Cuba, & des autres îles voisines, là où le soir, sur tout lorsque la lune brille, ils guettent les Tortuës lorsqu'elles vont à leur nids, ou qu'elles retournent à la mer, & alors ils les tournent sur le dos, & les laissent en cette situation, & continuent à tourner toutes celles qu'ils rencontrent, car elles ne peuvent pas se retourner sur leurs jambes: Il y en a de si grandes qu'il faut trois hommes pour les tourner. On prend ordinairement les Tortuës aux îles Bahama, en les perçant avec une petite cheville de fer de deux pouces de long, cette cheville est placée dans une cavité, au bout d'un baton de douze pieds; ordinairement deux hommes vont ensemble à cette pêche dans un petit bateau léger ou un Canot, l'un gouverne le bateau et rame doucement, tandis que l'autre se tient sur le devant avec son harpon. Quelquesfois on voit la Tortuë qui nage la tête & le dos hors de l'eau, mais le plus souvent on l'aperçoit couchée au fond de la mer à une brace ou plus de profondeur. Si la Tortuë connoît qu'on l'a découverte, elle s'élance en haut pour s'échapper, les hommes du bateau en la poursuivant tâchent de ne pas la perdre de vue, ce qui leur arrive souvent, mais ils la revoyent bientôt, parceque la Tortuë est obligée de mettre le nez hors de l'eau pour respirer, ainsi ils la poursuivent, l'un ramant, & l'autre se tenant prest avec son harpon; il se passe quelquefois demie heure avant qu'elle soit lasse, alors elle tombe tout d'un coup au fond, ce qui leur fournit l'occasion de la harponner, ce qui se fait en perçant l'écailler de la Tortuë tout au travers avec la cheville de fer, qui s'échappe de la cavité, mais qui est attachée au baston avec une corde: si la Tortuë est lasse & épuisée pour avoir été long temps poursuivie, lorsqu'elle est percée elle ne fait aucune résistance, & se laisse mettre dans le bateau, ou tirer sur le rivage. Il y a des hommes qui en plongeant se mettent sur le dos de la Tortuë, & en pressant sur sa partie postérieure, & faisant éléver de force sa partie antérieure, ils l'amenent jusqu'à la superficie de l'eau, tandis qu'un autre homme passe un neud coulant autour de son col.

## TESTUDO

### The Hawks-bill Turtle.

THIS Kind of Turtle receives its Name from the Form of its Mouth, resembling that of an Hawk's beak; the upper Jaw hanging more over the under Jaw than in the other Kinds. As the green Turtle is most valued for the Food it affords, this is next in Esteem for the usefulness of its Shell, so well known in Mechanick Uses. The Strength and Beauty of the Shell is sufficient to distinguish it from the other Kinds of Turtle, besides, their Head and Neck extended is longer than in others; the Hind-part of the Shell is narrower, and indented with sharp-pointed Notches; the Fore Legs are longer than in any of the other Kinds. These Turtle are said to feed most on a Sea Fungus, by the Inhabitants called *Jews-ears*.

## Caretta. Rochefort.

### La Tortuë Carret. Rochefort, Ibid.

CETTE espèce de Tortuë prend son nom Anglois de la forme de sa bouche, qui ressemble au bec d'un Faucon; la mâchoire supérieure avançant plus sur l'inférieure que dans les autres espèces. Comme la Tortuë verte est la plus estimée à cause de la bonté de sa chair, celle-cy a le second rang, à cause de l'utilité de son écaille, qui est employée comme on fait, à plusieurs usages mechaniques: La force & la beauté de cette écaille suffit pour la distinguer des autres espèces de Tortuës, outre que sa tête & son col sont plus longs lorsqu'ils sont étendus que ceux des autres; la derrière de l'écaille est plus étroite & dentelée d'entailles aiguës. Les pattes de devant sont plus longues que celles d'aucune des autres espèces. On dit que ces Tortuës se nourrissent principalement d'un Fungus marin que les habitants appellent Oreille de Juif.

*TE STUDO marina Cauanna.* Raij. Syn. quad. p. 257.

*The Loggerhead Turtle.*



HE Head of this Turtle is bigger in Proportion, and has a fiercer Aspect than the other kinds, its Legs are also shorter, the upper Shell is broader in the middle and narrower at the Hind-part than others. They are the boldest, most voracious and foulest Feeders of all the Turtle; their Flesh is rank, therefore they are little sought after, which occasions them to be more numerous than any of the other kinds.

They range the Ocean over, an Instance of which (amongst many that I have known) hapened the 20<sup>th</sup> of April 1725. in the Latitude of 30 Degrees North, when our Boat was hoisted out, and a Loggerhead Turtle struck as it was sleeping on the Surface of the Water; this by our reckoning appeared to be Midway between the *Azores* and the *Bahama-Islands*, either of which Places being the nearest Land it could come from, or that they are known to frequent, there being none on the North Continent of *America*, farther North than Cape *Florida*. It being amphibeous, and yet at so great a Distance from Land in breeding Time, makes it the more remarkable. They feed mostly on Shell-Fish, the great Strength and Hardness of their Beaks enabling them to break very large Shells, particularly the *Buccinum*, mentioned above in p. 134. Pieces of which I have taken out of their Stomachs; and have seen Fractures upon large Shells, which the Turtlers told me were caused by the Bite of these Turtle.

*les, que les pescheurs m'ont assuré avoir été faites par la morsure de ces Tortuës.*

*TE STUDO arcuata.*

*The Trunk Turtle.*

Never saw one of these Turtle, they are not common, being but rarely taken: I was told they grow to a very large Size, of a narrow Form, but very deep, the uppär Shell being more convex than in the other kinds of Turtle. Their Flesh is rank, but affords a large Quantity of Oil, which is all it is valued for.

\* In the Repository of the Royal Society is a Turtle preserved entire, which I take to be of this Species.

La Tortue Caoüanne. Rochefort, *Ibid.*




*A tête de cette Tortue est plus grande à proportion, & a l'air plus fier que celle des autres espèces; ses jambes sont aussi plus courtes, l'écaillle de dessus est plus large au milieu & plus étroite par derrière que dans les autres espèces. Elles sont plus hardies, plus voraces, & se nourrissent de choses plus sales que les autres Tortuës; leur chair est rance, c'est pourquoi on ne les cherche guères, ce qui fait qu'elles sont en plus grand nombre qu'aucune des autres espèces. Elles parcourrent tout l'Ocean; parmi plusieurs exemples que je connois, j'en citerai un qui arriva le 20 d'Avril 1725. A trente degrés de latitude au nord, on mit notre chaloupe dehors, & on harponna une de ces Tortuës, qui dormoit sur la surface de la mer; cet endroit étoit selon notre estime à moitié chemin des Azores aux îles Bahama, ces îles étant les terres les plus proches d'où elle put venir, ou qu'on sache que ces tortuës frequentent, car il n'y en a aucune dans le continent septentrional de l'Amerique, plus avant vers la nord, que le cap de la Floride. Comme elle est amphibia, il est d'autant plus surprenant qu'elle fût si loin en mer dans la saison de la ponte. Elles se nourrissent sur tout de coquillage. La grande force & la dureté de leurs machoires les mettant en état de rompre de très grandes coquilles, sur tout le Buccinum, dont il est parlé cy-dessus, p. 34. J'en ai tiré des morceaux de leurs estomacs, & j'ai vu des cassures sur les grandes coquilles, que les pescheurs m'ont assuré avoir été faites par la morsure de ces Tortuës.*

La Tortuë appellée *le Coffre*.

*J*e n'ai jamais vu aucune de ces Tortuës, elles ne sont pas communes, car on en prend rarement; on m'a dit qu'elles devenoient extrêmement grandes, étroites, mais fort épaisses, l'écaillle de dessus étant plus convexe que dans les autres espèces de tortuës. Leur chair est rance, mais on en tire une grande quantité d'huile, & c'est ce qui en fait tout le mérite.

*Il y a dans le cabinet de la Société Roiale une tortuë conservée toute entière, que je crois de cette espèce.*

T<sub>40.</sub>









*Vipera caudisona.*

The Section of a Rattle.



A Rattle of twenty-four joints.



A Tooth.

## Of SERPENTS.



HAVE seen in Carolina eighteen or nineteen Sorts of Serpents; whereof four are of the Viper kind, the others of the Snake kind. It is well known, that the most distinguishing Characteristicks of the Viper is, that it brings forth its young alive; and of the Snake, that it lays Eggs, out of which its young are afterwards hatch'd. But besides this Difference, the Viper has long hollow Fangs or Tusks, with an opening near the Point, thro' which they inject their Poison when they bite; its other Teeth are like those of Snakes: Beside's which I have observed the following external Marks; the Viper hath the Neck small, the Head broad, the Cheeks extending wide, their Scales rough, the Body short and thick in most; is slow of Motion, can swell his Head and Neck when irritated; hath the Aspect terrible and ugly: Whereas Snakes have the Head small, the Body long, the Scales smooth, are nimble and of an harmleſs Aspect. All Serpents, as well Vipers as Snakes, have forked Tongues, which serve to catch the Insects they feed on; when they are disturbed they thrust them out of their Mouth and shake them.

## VIPERA CAUDISONA AMERICANA.

### The Rattle-Snake.

**O**f these Vipers the Rattle Snake is most formidable, being the largest and most terrible of all the rest: The largest I ever saw, was one about eight Feet in Length, weighing between eight and nine Pounds: This Monster was gliding into the House of Colonel Blake, of Carolina; and had certainly taken his Alabord there undiscovered, had not the Domestick Animals allarm'd the Family with their repeated Outcries; the Hogs, Dogs and Poultry united in their Hatred to him, shewing the greatest Confection, by erecting their Bristles and Feathers, and expressing their Wrath and Indignation, surrounded him, but carefully kept their Distance; while he, regardless of their Threats, glided slowly along.

It is not uncommon to have them come into Houses, a very extraordinary Instance of which happen'd to myself in the same Gentleman's House, in the Month of February 1723; the Servant in making the Bed in a Ground Room, (but a few Minutes after I left it) on turning down the Cloaths, discovered a Rattle-Snake, lying coiled between the Sheets, in the middle of the Bed.

They are the most inactive and slow moving Snake of all others, and are never the Aggressors, except in what they prey upon; for unless they are disturbed they will not bite, and when provoked, they give Warning by shaking their Rattles. These are commonly believed to be the most deadly venomous Serpent of any in these Parts of America, I believe they are so, as being generally the largest, and making a deeper Wound, and injecting a greater Quantity of Poison, tho' I know not why any of the three other kinds of Vipers may not be as venomous as a Rattle-Snake, if as big, the Structure of their deadly Fangs being formed alike in all. The most successful Remedy the Indians seem to have, is to suck the Wound, which in a flight Bite has sometimes a good Effect; tho' the recovered Person never fails of having annual Pains at the Time they were bit. They have likewise some Roots, which they pretend will effect the Cure, particularly a kind of *Ajaram*, commonly called *Heart-Snake-root*, a kind of *Chrysanthemum*, called *St. Anthony's Cross*, and some others; but that which they rely on most, and which most of the Virginian and Carolina Indians carry dry in their Pockets, is a small tuberous Root, which they procure from the remote Parts of the Country; this they chew, and swallow the Juice, applying some to the Wound. Having by travelling much with Indians, had frequent Opportunities of seeing the direful Effects of the Bites of these Snakes, it always seemed and was apparent to me, that the good Effects usually attributed to their Remedies, is owing more to the Force of Nature, or the Slightness of the Bite of a small Snake in a muciferous Part, &c. The Person thus bit, I have known to survive without any Assistance for many Hours, but where a Rattle-Snake with full Force penetrates with his deadly Fangs, and pricks a Vein or Artery, inevitable Death ensues, and that, as I have often seen, in less than two Minutes. The Indians know their Destiny the Minute they are bit, and when they perceive it mortal, apply no Remedy, concluding all Efforts in vain. If the Bite happeneth in a fleshy Part, they immediately cut it out, to stop the Current of the Poison. I could heartily wish, that Oil of Olives immediately applied to the Wound, might have as good Success against the Venom of these Snakes, as it hath been found in England to have had against the Poison of the common Adder.

The Colour of the Head of this Rattle-Snake is brown, the Eye red, the Upper Part of the Body of a brownish yellow, transversely marked with irregular broad black Lists. The Rattle is of a brown Colour, composed of several horny membranous Cells, of an undulated pyramidal Figure, which are articulated one within the other, so that the Point of the first Cell reaches as far as the Basis or protuberant Ring of the third and so on, which Articulation being very loose, gives Liberty to the Parts of the Cells that are inclosed within the outward Rings, to strike against the Sides of them, and so to cause the rattling Noise, which is heard when the Snake shakes its Tail. I have given a Section of a Rattle, that this Structure might the better appear.

The Charming, as it's commonly called, or attractive Power this Snake is said to have of drawing to it Animals, and devouring them, is generally believed in America; as for my own part, I never saw the Action, but a great many from whom I have had it related, all agree in the manner of the Proceeds; which is, that the Animals, particularly Birds and Squirrels (which principally are their Prey) no sooner spy the Snake than they skip from Spray to Spray, hovering and approaching gradually nearer their Enemy, regardless of any other Danger; but with distracted Gestures and Outcries descend, tho' from the top of the loftiest Trees to the Mouth of the Snake, who openeth his Jaws, take them in, and in an instant swallows them.

*In les animaux pour les dévorer. Je n'ai jamais été témoin de cette action, mais toutes sur la maniére de l'opération. Les animaux, disent ils, & particulièrement les Oiseaux & les Ecureuils, dont ces serpents sont leur principale nourriture, n'en ont pas pluost aperçus un, qu'ils sautent de branche en branche, volant & approchant de leur ennemi, sans s'apercevoir auement du danger; & avec des gelles & des cris qui marquent leur écouffissement, ils descendent même du sommet des arbres les plus élevés, jusqu'au serpent qui ouvre sa gueule, les prend & les avale dans l'instant.*

## Des SERPENS.



'AI vu à la Caroline dix-huit ou dix-neuf espèces de Serpents; dont quatre sont des Vipères, & les autres sont des Serpents. L'on fait assez, que ce qui caractérise particulièrement les Vipères & les Serpents, c'est que les Vipères mettent bas leurs petits vivants, & que les Serpents vident des Oeufs, dont leurs petits éclosent ensuite. Mais autre cette différence, la Vipère a de longues dents canines creuses, avec un orifice près de leur pointe, au travers duquel elles lancent leur poison quand elles mordent: Leurs autres dents sont semblables à celles des autres Serpents; outre cela j'ay observé les marques extérieures suivantes: La Vipère a le col menu, la tête large, les joues étendues, ses écailles sont rudes. Le corps de la plupart est court, & fort épais; elle est lente dans ses mouvements; & peut enfler sa tête & son col quand elle est irritée; elle a le regard laid & terrible; au lieu que les Serpents ont la tête menuë, le corps long, & les écailles lisses; ils sont agiles, & ont le regard doux. Tous les Serpents en general, Vipères & autres, ont des langues fourchues, qui leur servent à attraper les Insectes, dont ils se nourrissent. Quand ils se trouvent surpris, ils lancent cette langue hors de leur gueule en l'agitant.

## VIPERA CAUDISONA AMERICANA.

### Serpent à Sonnette.

**D**e ces Vipères, celle qu'on appelle le Serpent à Sonnette, est la plus redoutable, parce qu'elle est la plus grande, & la plus terrible de toutes les autres. Le plus grand que j'ay jamais vu, était long environ huit à neuf pieds, & pesoit entre huit & neuf livres. Ce Monstre se glissa dans la Alaison du Col. Blake de la Caroline, & il y auroit certainement établi sa demeure sans être découvert, si tous les animaux domestiques n'avoient pas alarmé la Famille par leurs cris redoublés: les Chiens, les Poissons & la Volaille unis ensemble dans la baigne qu'il lui portoient, faisoient voir une extrême Confusion en bâillant leurs poils & leurs plumes; & en marquant leur colère & leur indignation ils se rangeoient autour de lui, sans cependant l'approcher d'assez près pour être exposé à ses atteintes; pendant que lui imprisoit leurs menaces & rampoit leste. Il n'est pas rare d'en voir venir dans les Maisons; il m'en est arrivé à moi-même un exemple fort extraordinaire, au mois de Fevrier 1723, dans la Alaison de la même Personne que je viens de citer: Un Domestique étauoit venu pour faire mon Lit dans ma Chambre basse, quelques minutes après mon lever, aperçut, en renversant la couverture, un Serpent à sonnette, replié en rond entre les Draps.

Cette Vipère est de tous les Serpents le moins actif, & le plus lent dans ses mouvements; elles n'attaquent jamais, excepté les Animaux dont elles font leur proye, car à moins qu'on ne les chagrine, elles ne prennent pas la peine de mordre; & quand on les attaque elles commencent par avertir en agitant leur sonnette. On les regarde communément comme les plus dangereuses & les plus venimeuses de tous les Serpents qui se trouvent dans cette Contrée de l'Amérique. Je n'y pas de peine à le croire, parce qu'érant généralement les plus grands, ils sont des blessures plus profondes, & ils y jettent une plus grande quantité de Venin; mais je ne veux pas pourquer une Vipère des trois autres espèces, ne seroit pas aussi venimeuse que le Serpent à sonnette, si elle éroit aussi grande, puisque leurs dents empoisonnées sont exactement formées de même. Le Remède que les Indians semblent employer avec le plus de succès, contre leurs morsures, est de sucer la plaie; cela produit quelquefois un bon effet, quand la blessure n'est pas considérable, quoique la personne guérie ne manque jamais de ressentir tous les ans des douleurs périodiques, dans le même sens où elle a été mordue. Il ont aussi quelques racines, avec lesquelles ils prétendent se guérir; du nombre de ces racines sont particulièrement une espèce de Cabaret, appellée communément racine du Cœur de Serpents, & une espèce de Chrysanthemum, appellée Croix de St. Antoine, & quelques autres. Mais ils ont le plus de confiance en une petite racine tubéreuse, qu'on fait venir des parties les plus intérieures du País; les Indians de la Virginie & de la Caroline la portent sèche dans leurs poches, & dans le besoin ils la muent, en ayant le jus, & en appliquent une partie sur la plaie. Ayant beaucoup voyagé avec les Indians, j'ay eu de fréquentes occasions de voir les terribles effets des morsures de ces Serpents; & il m'a toujours paru, à n'en pouvoir douter, que les effets salutaires communément attribués à ces sortes de remèdes, viennent plutôt des forces de la nature, ou d'une Aporfure légère faite par un petit Serpent dans une partie mucilagineuse, &c. J'en ai vu, qui sans aucun secours ont survécu plusieurs heures après avoir été mordus. Mais quand un Serpent à sonnette enfoncé avec force ses dents meurtrières, & qu'il pique une veine ou une artère, la mort est inévitable, & si j'ose dire que j'ai souvent vu des personnes en mourir en moins de deux minutes. Les Indians connaissent leur sort dans l'instant même de la morsure, & quand ils sentent que la blessure est mortelle, ils ne font aucun remede, persuadés que tous leurs efforts seraient inutiles. S'ils se trouvent mordus dans une partie charnue, ils coupent cette partie sur le champ, pour empêcher le poison de pénétrer plus avant. Il feroit à souhaiter, que l'huile d'olive appliquée immédiatement sur la morsure faite par cette espèce de Serpents, pût avoir un aussi heureux succès que celui qu'on a trouvé qu'elle avoit en Angleterre contre le venin des vipères ordinaires.

Ce Serpent à Sonnette a la tête brune, l'œil rouge, le dessus du corps d'un jaune brunâtre, marqué en travers par de grandes rayes noires & irrégulières. La sonnette est brune, composée de plusieurs cellules, formées d'une membrane qui ressemble à de la corne, leur forme est pyramidale & ordée; elles sont embêtées les unes dans les autres, de sorte que la pointe de la première cellule s'étend aussi loin que la base ou l'anneau renflé de la troisième, & ainsi des autres; cette articulation ayant beaucoup de jeu, donne la liberté aux parties qui sont enfermées dans les anneaux extérieurs, de frapper contre leur côté, & de produire ce bruit sonnant qu'on entend quand ce Serpent renvoie sa queue. J'ai représenté la coupe d'une de ces sonnettes, pour faire mieux entendre cette conformatio.

On croit généralement à l'Amérique, ce qu'on dit de ce Serpent, qu'il a le pouvoir enchanter, comme on l'appelle, ou la vertu attractive de faire venir à un grand nombre de personnes à qui je n'ai entendu faire le recit, conviennent les Oiseaux & les Ecureuils, dont ces serpents sont leur principale nourriture, & avec des cris qui marquent leur écouffissement, ils descendent même du sommet des arbres les plus élevés, jusqu'au serpent qui ouvre sa gueule, les prend & les avale dans l'instant.

*VIPERA caudisoma Americana minor.*

*The Small Rattle-Snake.*



Attle-Snakes of this Size being differently marked and coloured from the large ones, as appear by the Figures, makes it generally concluded they are different, tho' this is not sufficient to prove it; for I have observed that some kinds change their Marks and Colours as they cast off their *Exuviae*; others at the shedding of their *Exuviae* retain their Colours, particularly those that are of one Colour. This Observation I often proved, by assisting many of them to strip off their old Coats. Whether this little Rattle-Snake be of a different Species or not, must be left to future Enquiry. The Bite of this Snake is venomous, but it being small doth not always prove mortal.

The Ground Colour of this Serpent is brown, shaded on the Back with red; along which are large black Spots, indented with a white Verge.

All kinds of Serpents at mature Age retain their specifick Colours: It is while they are young and growing, that some of them are differently marked at the Change of their *Exuviae*, which I shall observe in their following Descriptions, so far as I know. The common Opinion is, that Rattle-Snakes have the same Number of Joints as they are Years old, which can be only conjectural, and seems to be a Mistake, for small Snakes have often more Joints than large.

*Petit Serpent à Sonnette.*



ES Serpens à Sonnette de cette taille, ayant des marques & des couleurs différentes des grands, comme il paroit par les figures, on conclut en general, qu'ils sont d'une espèce différente, quoy qu'il n'y en ait pas de preuves suffisantes; car j'ai observé que quelques espèces de Serpens changent leurs marques & leur couleurs, en changeant de peau, & qu'il y en a d'autres, qui lors de ce changement retiennent leur couleurs, particulièrement ceux qui sont d'une seule couleur. J'ay souvent confirmé cette observation, en aidant à plusieurs à se dépouiller de leur veille peau. Que ce petit Serpent à sonnette soit d'une espèce différente ou non, c'est ce que nous laisserons à decider à ceux qui feront de nouvelles recherches. La morsure de ce Serpent est très venimeuse, mais comme l'animal est petit, son poison n'est pas toujours mortel.

Le fond de la couleur de ce Serpent est brun, il est nué de rouge sur le dos, avec de grandes tâches noires tout du long, bordées d'une raye blanche.

Les serpens, de quelque espèce qu'ils soient, retiennent leurs couleurs particulières, quand ils sont parvenus à leur âge de maturité: C'est pendant qu'ils sont jeunes, & qu'ils croissent encore, que plusieurs d'entre eux changent leurs marques & leurs couleurs en changeant de peau; ce que je remarquerai dans les descriptions suivantes autant que je le saurai. L'opinion commune est, que les Serpens à Sonnette ont autant de jointures dans leurs sonnettes qu'ils ont d'années: ce qui ne peut être qu'une simple conjecture, & a bien l'air d'être une fausseté; car les petits serpens ont souvent plus de jointures dans leurs sonnettes que les grands.

*Frutex foliis oblongis serratis alternis, Acaciæ floribus luteis, fructu brevi, calyculato viridi.*

**T**HIS Shrub grows usually to the Height of eight or ten Feet, with many tough Stalks growing in alternate bendings: The Leaves are serrated, and grow alternately at the Angles of every bending: The Flowers grow in Spikes at the Ends of the smaller Branches, are pappous, globular, and sweet scented. The Fruit is about the Size of a large Pea, and shaped like an Acorn, except that the Cup is divided into four or five Sections. They grow on most of the *Bahama Islands*.

CET Arbrisseau croît ordinairement à la hauteur de huit ou dix pieds, & pousse plusieurs tiges dures, qui croissent en angles ou coudes alternativement. Les feuilles sont dentelées & naissent alternativement à chaque angle que forment les branches. Les fleurs croissent en Epi aux sommets des petites branches. Elles sont en aigrettes, rondes, & d'une odeur agréable. Le fruit est à peu près de la grosseur d'un gros poids, & ressemble à un gland, excepté que la calote est divisée en quatre ou cinq parties. Ces arbrisseaux se trouvent dans la plupart des îles Bahama.

*Acacia, Buxi foliis rotundioribus, floribus albis, siliqua lata compressa.*

**T**HIESE Trees grow very high, with large strait Trunks, some being above three Feet Diameter, with very large spreading Limbs, the exterior Branches of the Tree are very small and pliant, thick set with pinnated Leaves. The Flowers are pappous, white and globular, and are succeeded by flat thin Pods, an Inch broad, and almost five long, and are usually twisted, inclosing many flat brown Seeds. This is an excellent Wood, and next to what is here called *Madera* (which is the *Mahogany* of *Jamaica*) is the best Wood these Islands afford, much of it being brought from thence to *England* for Joiner's Work: The Grain is not altogether so close as that of the *Madera*, yet excels it in a variable shining, like watcrod Sattin, and is mistakenly called *Mahogany* by the *Bahamians*.

CES arbres s'élèvent fort haut; leurs troncs sont droits & gris, quelques uns ayant plus de trois pieds de diamètre, avec de gros rameaux qui s'étendent au large, les branches extérieures sont fort menues & pliantes, très garnies de feuilles rangées par paires: Les fleurs sont en aigrette, elles sont blanches & rondes, il leur succède des coiffes minces & plates, d'un pouce de large & presque de cinq de long, ordinairement torfes les unes dans les autres, en renfermant plusieurs grains plats & bruns: Ce bois, après celui qu'on appelle ici *Madera* (qui est le *Mahagoni* de la *Jamaïque*), est le meilleur que ces îles fournissent, on en apporte une grande quantité en Angleterre qu'on fait servir à des ouvrages de Menuiserie. Le grain n'en est pas si serré que celui du *Madera*, quoiqu'il le surpassé par la variété de ses ondes brillantes, semblables à du satin noir. Les habitans des îles Bahama se méprisent en nommant cet arbre *Mahagoni*.



Vipera caudisona minor.





43



Vipera Aquatica.

Fritsch Sc.

## VIPERA AQUATICA.

The Water Viper.



HE Back and Head of this Serpent is brown, the Belly marked transversely with black and yellow alternately, as are the Sides of the Neck. The Neck small, the Head large, armed with the like destructive Weapons as the Rattle-Snake, which next to it is reckon'd the largest of any other Viper in these Parts; and contrary to most other Vipers are very nimble, and particularly dextrous in catching Fish. In Summer great Numbers of these Serpents are seen lying on the Branches of Trees hanging over Rivers, from which at the Approach of a Boat, they drop into the Water, and often into the Boat on the Men's Heads: They lie in this Manner to surprise either Birds or Fish, after these last they plunge, and pursue them with great Swiftnes, and catch some of a large Size, which they carry on Shore and swallow whole: One of these Serpents I surprized swimming a Shore with a large Cat-Fish, of a different kind from that described Vol. II. p. 22, this having two sharp Bones, on each Side its Gills, which were so fixed in the Jaws of the Snake, that he could not disengage himself with all his Twists and Distortions, and in that Condition being in Danger of drowning, was necessitated to swim a-shore, where the Murderer was slain. This Serpent in *Carolina* commonly goes by the Name of the Water Rattle-Snake, not that it hath a Rattle, but many of them are very large, and coloured not much unlike the Rattle-Snake, and their Bite is said to be as mortal. They frequent Water, and are never seen at any great Distance from it. The Tail of this Viper is small toward the End, and terminates in a blunt horny Point, about half an Inch long: This harmless little Thing hath given a dreadful Character to its Owner, attributing to him another Instrument of Destruction besides that he had before, imposing a belief on the Credulous, that he is the terrible Horn-Snake, armed with Death at both Ends, tho' in reality of equal Truth with that of the two-headed *Amphisbæna*; yet we are told, that this fatal Horn by a Jerk of the Tail, not only mortally wounds Men and other Animals, but if by Chance struck into a young Tree, whose Bark is more easily penetrable than in an old one, the Tree instantly withers, turns black and dies:



Vipère d'Eau.

**E**dos & la tête de ce serpent sont bruns; il a le ventre & les côtés du col marqués en travers de noir & de jaune alternativement. Son col est menu, sa tête grosse, armée des mêmes dents meurtrières que le Serpent à Sonnette, & après lui, on le croit la plus grande de toutes les autres vipères du pays. Les vipères de cette espèce sont au contraire de toutes les autres, très agiles, & en particulier très adroites à prendre le poisson. On voit dans l'été un grand nombre de ces serpents couchés sur des branches d'arbres, qui pendent sur les rivières, dans lesquelles ils se laissent tomber, quand ils voyent approcher un bateau, souvent même ils se jettent dans le bateau, ou sur la tête des hommes. Ils se postent en cette manière, pour surprendre les oiseaux & les poissons; ils se lancent dans l'eau sur ces derniers, & les poursuivent avec beaucoup de vitesse; & ils en prennent de gros, qu'ils aportent sur le rivage & les avalent tout entiers. Je surpris un jour un de ces serpents, nageant vers le bord avec un grand Cat-Fish, d'une différente espèce de ceux dont on a donné la description Vol. II. pag. 22. Celui-ci ayant de chaque côté des ouïes, deux arrêtes pointuës qui s'étoient enfoncées de travers dans les machoires du serpent, de façon que ne pouvant se débarrasser, malgré tous ses efforts & ses mouvements, & se voyant en danger de se noyer, il se trouva obligé de nager à terre, où ce meurtrier fut tué. Dans la Caroline on donne communément à ce serpent le nom de Serpent d'Eau à Sonnette, ce n'est pas qu'il ait de sonnette, mais parce qu'il y en a dans cette espèce de fort grands, & que leurs couleurs ne diffèrent guères de celles du Serpent à Sonnette; on dit aussi que leurs morsures ne sont pas moins mortelles. Ils fréquentent l'eau, & on ne les en voit jamais fort éloignez. La queue de cette vipère est menuë vers la fin, & se termine par une pointe obtuse, d'une substance semblable à de la corne, d'un demi pouce de long. Cette pointe quoiqu'incapable de faire aucun mal, a donné une idée effrayante de ce serpent, en faisant croire que c'étoit un second instrument, avec lequel il pouvoit faire autant de mal qu'avec ses dents; d'où quelques personnes credules ont inferé qu'il étoit ce terrible serpent à corne, dont la tête & la queue peuvent également donner la mort; quoique cela soit réellement aussi fabuleux que ce qu'on dit du serpent à deux têtes. Cependant on dit de cette fatale corne, que par un coup de queue, elle blesse à mort, non seulement les hommes & les autres animaux, mais encore, que si par hazard ils l'enfoncent dans un jeune arbre, dont l'écorce est plus tendre & plus aisée à pénétrer que celle d'un vieux, dans le même instant l'arbre se fane, noircit & meurt.

Frutex foliis serratis, floribus longioribus spicatis subviridibus, capsula pentagona.

THESE Shrubs are usually slender in the main Stem, spreading into many plant Branches, to the Height of about ten Feet, with thin Leaves set alternately, having their Edges finely serrated: The Flowers are tubulous, small, of a greenish white, with a Pointel reaching a little above the Verge of the Cup; they are closely set horizontally on one Side of the slender Stalks; these Flowers are succeeded by round Berries, which when ripe open, dividing into five Sections, enclosing many small Seeds. They grow in moist Places in *Carolina* and *Virginia*.

**C**ET arbrisseau, dont la principale tige est pour l'ordinaire fort menuë, s'élève avec plusieurs branches pliantes à la hauteur d'environ dix pieds; Ses feuilles sont minces, rangées alternativement & délicatement dentées en leurs bords; les fleurs sont d'un blanc verdâtre, petites, tubulaires, avec un pinceau qui s'élève un peu au dessus des bords du calice. Elles sont attracées horizontalement tout contre un des costés des petites branches. A ces fleurs succèdent des baies rondes, qui s'ouvrent lorsqu'elles sont en maturité; chaque baie se partage en cinq loges qui renferment plusieurs petites semences. Cet arbrisseau croît dans les lieux humides de la Virginie & de la Caroline.

## VIPERA NIGRA.

*The black Viper.*

HIS Serpent is short and thick, of slow Motion, spreads his Head, when irritated, surprisingly broad and flat, threatening with a horrid His. They are very venomous, having the like Fangs of Destruction as the Rattle-Snake, and their Bite is said to be as deadly. They generally frequent the higher Lands, and are of a rusty black Colour in all their Stages of Life.




E Serpent est court, gros & d'un mouvement tardif. Lorsqu'il est irrité il étend sa tête, & la rend extraordinairement platte & large, en menaçant avec un horrible siflement. Ces serpens sont très venimeux, ayant les mêmes dents destructives que le Serpent à Sonnette, & leurs morsures passent pour aussi mortelles. Ils fréquentent généralement les endroits élevés; ils sont d'un noir rouâtre dans les différents âges de leur vie.

*Arbor foliis pinnatis, spica pendula sericea.* Alp. p. 2.

THIS Plant grows usually to the Height of eight or ten Feet, composed of many Stems, arising close together from the Root; the Branches grow into Bendings, making Angles at regular Distances; from every of which Bend, or Angle, shoot forth its pinnated Leaves, with very small Lobes; and also the Flowers, which are pappous: From every of these Angles or Joints, also grow two sharp Thorns; the Flowers hang singly, and sometimes two together, on Foot-stalks three Inches long, are globulous and of a perfumed Smell. *Alpinus's* differ from mine only in the Pods, his growing erect, mine hanging.

CETTE plante croît d'ordinaire à la hauteur de huit à dix pieds, & pousse plusieurs tiges, fort serrées les unes contre les autres, en sortant de la racine. Ses branches viennent en coude, faisant des angles à des distances régulières; de chacun de ces angles naissent des feuilles rangées par paires, avec de très petits lobes, & les fleurs qui sont en aigrettes: A chaque angle croissent aussi deux épines très piquantes. Les fleurs viennent seule à seule, & quelquefois deux à deux, suspendues par des pedicules de trois pouces de long; elles sont sphériques & parfumées. La plante que décrit Alpinus, diffère de celle-ey, en ce que ses coiffes s'élèvent toutes droites, au lieu que celles de la mienne sont pendantes.







45

Annum &c.



Vipera hispida.

## V I P E R A F U S C A.

## The Brown Viper.

 HIS Viper is the Size of the precedent, in Length about two Feet, and large in Proportion. It is also a very slow moving and sluggish Reptile, advancing deliberately, even to escape Danger; yet will defend himself with much Fierceness when attacked, and its Bite is said to be as venomous as any: They retain their brown Colour in all Stages of Life. They are found in *Virginia* and *Carolina*, in the last of which Places they are called the *Trunchion Snake*. They prey on Lizards, Efts, and other Animals.

## Vipère brune.



ETTE vipère est de la même grandeur que la précédente, c'est-à-dire, longue d'environ deux pieds, & grosse à proportion. C'est un reptile paresseux, qui se meut lentement, & qui marche posément même pour éviter le danger; cependant si on l'attaque, il se défend avec beaucoup de fureur. Ses morsures passent pour aussi venimeuses que celles d'aucun autre. Ces vipères retiennent leur couleur brune dans tous leurs différents âges. Ils se trouvent dans la Virginie & dans la Caroline; dans la dernière on les appelle Trunchion Snake. Ils se nourrissent de Lezards de différente espèce, & d'autres animaux.

*Arum maximum Aegyptiacum, quod vulgo Colocasia.* C. Bauh. Pin. p. 195.

Sloane Hist. Jam. Vol. I. p. 166. *Arum Aegyptiacum*, F. Colum. Ecphr. Part. II. p. 1.

THE Roots of this Plant are tuberous, with many small Fibres growing from them; some of them weigh six or eight Pound, of an irregular Form, the Outside of a rusty brown Colour, the Inside white. The Leaves grow out of the Earth, with only their Foot-stalks, to the Height of four or five Feet; they are shaped somewhat like a Heart, of a pale Green, very ample, some of them being two Feet wide, and more in Length. The Flower in Form resembles that of the common *Arum*, tho' in Colour different, the Hood is green without, and of a light yellow within; the Pistil is long and slender, of a light purple Colour.

Sir Hans Sloane, has so amply treated of this useful Plant, that I shall only leave only to add a few Remarks more. It is a Tropick Plant, not caring to encrease much in *Carolina*, and will grow no where North of that Colony; yet the Negro's there (who are very fond of them) by annually taking up the Roots to prevent rotting, get a small Encrave: They are of so acrimonious a Quality, that there is a Necessity of boiling them eight or ten Hours before they are eatable. A little before I left *Carolina*, there was introduced a new Kind, wholly without that bad Quality, and requiring no more than common Time to boil them, and may be eat raw, without offending the Throat or Palate; this was a welcome Improvement among the Negro's, and was esteemed a Blessing; they being delighted with all their African Food, particularly this, which a great Part of Africa subsists much on.

LES racines de cette plante sont tubereuses, garnies de plusieurs petits filaments qui en sortent; il y en a quelques unes qui pèsent depuis six jusques à huit livres; elles sont d'une forme irrégulière, d'un brun rouillé en dehors, & blanches en dedans. Les feuilles sortent de la terre, seulement avec leurs pedicules, & croissent jusques à la hauteur de quatre ou cinq pieds; leur forme approche de celle d'un cœur; elles sont d'un vert pâle, fort grandes, quelques unes ayant deux pieds de large, & encore plus de long. La fleur ressemble par la forme à celle du Pied de Veau ordinaire, mais la couleur en est différente; le cornet étant vert en dehors, & d'un jaune pâle en dedans: Le pistile est long & menu, d'une couleur purpurine.

Mr. Le Chevalier Hans Sloane, a fait une description si ample de cette plante utile, que je ne demanderai permission que d'ajouter seulement quelques remarques de plus. Cette plante ne plaît qu'entre les Tropiques; elle ne profite pas beaucoup dans la Caroline, & ne croît point du tout dans les parties qui sont au nord de cette Colonie; cependant les Nègres, qui en sont fort friands, ne laissent pas d'y en recueillir quelque peu par les soins qu'ils prennent de ramasser tous les ans les racines, pour les préserver de la pourriture. Elles sont d'une qualité si acre, qu'on est obligé de les faire bouillir huit ou dix heures, avant qu'elles soient bonnes à manger. Quelque tems avant mon départ de la Caroline, on en introduisit une nouvelle espèce, qui n'avait point du tout la mauvaise qualité des premières, ne demandant qu'un tems ordinaire pour cuire; on pouvoit même la manger crue, sans offenser le palais ni la gorge. Cette découverte fut très agréable aux Nègres, qui la regardèrent même comme une faveur du Ciel, étant charmés de tous les mets Africains, & particulièrement de cette racine, qui fait la subsistance d'une grande partie de l'Afrique.

The Subject of this Plate is as it appeared to me at a great Inundation, where by the Violence of the Current, Fish, Reptiles, with other Animals and Insects, were dislodged from their Holes, &c. floating upon Heaps of Vegetable Refuse, where the voracious and larger Serpents were continually preying upon the smaller, as well those of their own Kind, as others, which in that Confusion were more easily surprized.

Le sujet de cette planche est ce que j'aperçus dans une grande inondation, où par la violence du courant, les poissons, les reptiles, & d'autres animaux ou insectes étant délogés de leurs trous, flottaient sur des monticules de bois & de plantes, ou devenoient la proye des gros serpents continuellement occupez à devorer les petits, ceux de leur propre espèce aussi bien que les autres, qu'il étoit plus aisé de prendre en cette confusion.

*ANGUIS VENTRE CUPREI COLORIS.**The Copper-belly Snake.*

HESE Snakes sometimes approach near to the Size of the Rattle-Snake. They are of a brown Colour, except their Bellies, which are of a muddy Red or Copper Colour. They frequent Water, and very probably prey on Fish; but Birds and such other Animals, as they are able to overcome, they devour; frequently entring the Houses of Poultry, sucking their Eggs, and devouring the Fowls. They are bold, nimble and active, but are generally reputed not venomous, and have no Fangs like the Viper kind. I never observed their Colours to vary.



Serpent à ventre couleur de cuivre.

*ES serpens approchent quelquesfois de la grandeur du Serpent à Sonnette. Ils sont bruns, excepté leur ventre, qui est d'un rouge sombre, tirant sur le cuivre. Ils fréquentent l'eau, & vraisemblablement ils se nourrissent de poisson. Ils ne laissent pas de dévorer les oiseaux & les autres animaux, dont ils peuvent se rendre les maîtres, entrant fréquemment dans les poulaillers, où ils sucent les œufs & mangent les volailles. Ils sont hardis, agiles & dispos, mais en general ils ne passent pas pour venimeux; ils n'ont pas ces mêmes dents empoisonnées qu'ont les vipères. Je n'ai jamais observé que leurs couleurs changent.*

*An Ricinoides Æleagni folio?**The ILATHERA BARK.*

THESE Shrubs grow plentifully on most of the Bahama Islands, seldom above ten Feet high, and rarely so big as a Man's Leg, tho' tis probable, that before these Islands were exhausted of so much of it, that it grew to a larger Size: The Leaves are long, narrow, and sharp-pointed, and of a very pale light green Colour; at the Ends of the smaller Branches grow Spikes of small hexapetalous white Flowers, with yellow Apices, which are succeeded by tricarpular pale green Berries, of the Size of Peas, each Berry containing three small black Seeds, one in every Capsule. The Bark of this Tree being burnt, yields a fine Perfume; infused in either Wine or Water, gives a fine aromatic Bitter.

*La Chachrille.*

*CES arbrisseaux croissent abondamment dans la plupart des îles Bahama. Ils passent rarement la hauteur de dix pieds, & on en voit peu d'aussi gros que la jambe d'un homme; quoiqu'il soit probable qu'avant qu'en en tirât une si grande quantité de ces îles, il s'en trouvoit de plus gros. Leurs feuilles sont longues, étroites & piquantes; elles sont d'un vert clair & fort pâle. A l'extrémité de chaque une des plus petites branches, naissent des épis de petites fleurs hexapétales, blanches, avec des sommets jaunes; il leur succède des baies divisées en trois capsules, d'un vert pâle, & de la grosseur d'un pois. Ces baies contiennent trois petits grains noirs, un dans chaque capsule. L'Ecorce de cet arbre étant brûlée, répand un parfum exquis, & infusée dans du vin ou de l'eau, elle donne un amer délicat & aromatique.*

46.



An. Recemoides &c.

Anguis &c.





47



Fraxex &c.

Anguis &c.

*ANGUIS GRACILIS CÆRULEO-VIRIDIS.**The blueish green Snake.*

**H**IIS harmless Snake frequents the Branches of Trees, and very nimbly squirms among the Leaves, living on Insects, which I believe are its only Food. Their usual Size and Length is that of the Figure. They are all over green, enclining more to blue than yellow. The Nose of this Species turning up, sufficiently distinguishes it from another green Snake I shall hereafter describe.

*Serpent d'un vert bleuâtre.*

*E*s Serpent qui n'est point dangereux, se tient dans les branches des arbres, & se glisse fort legèrement entre les feuilles, vivant d'insectes dont je croi qu'il fait sa seule nourriture. Leur grosseur & leur longueur ordinaire est semblable à la figure. Ils sont par tout le corps d'un vert tirant plus sur le bleu que sur le jaune. Leur néz qui est tourné en haut, les distingue suffisamment d'un autre serpent vert, dont je donnerai cy après la description.

*Frutex baccifer, verticillatus; folijs scabris latis dentatis, & conjugatis; baccis purpurijs dense congestis.*

**T**HESE Shrubs arise with several StalkS from the Ground, branching out on each Side, and in Height about four or five Feet; most of the Stalks are surrounded with Clusters of very small red Flowers, having four Petals each, with yellow Stamina, and growing at the Distance of about two Inches asunder, beginning to flower at the Bottom, and successively proceeding to flower to the Top of the Branch: From every Tuft of Flowers, grow opposite to each other a Pair of serrated rough Leaves, the Berries which succeed the Flowers grow in Clusters, so closely connected, that none of their Foot-stalks can be perceived without separating them, which then discovers them to be held together by many small branching Stalks. These Berries are covered with a shining red Skin, containing many very small Seeds. They blossom in April and May, the Berries are ripe in July. They grow in the Woods, near Charles-Town in Carolina.

*C*ES arbrisseaux s'élèvent de la terre par plusieurs tiges, d'où sortent des branches de chaque côté, ils croissent à la hauteur de quatre à cinq pieds: La plupart des tiges sont entourées de bouquets de très petites fleurs rouges, ayant quatre feuilles avec des étamines jaunes, placés à la distance d'environ deux pouces les uns des autres. Ils commencent à fleurir par le bas, & continuent successivement jusqu'au bout de la branche: De chaque bouquet de fleurs naissent à l'opposite l'une de l'autre deux feuilles rudes & dentelées. Les baies qui succèdent aux fleurs viennent en grappes; & ces baies sont si serrées les unes contre les autres, que sans les séparer il est impossible d'apercevoir leurs pedicules; & alors vous les voyez attachées à de petits pedicules blancs. Ces baies sont couvertes d'une peau d'un rouge éclatant, & elles contiennent plusieurs grains. Ces arbrisseaux sont en fleur au mois d'Avril & de Mai, & leur fruit est mûr en Juillet. Ils croissent dans les bois, près de Charles-Town dans la Caroline.

## ANGUIS NIGER.

*The Black Snake.*

HIS at its full Growth is a large and very long Snake, some being six Feet in Length. They are all over of a shining black, never changing their Colour. They are very nimble and beneficial in killing Rats, which they pursue with wonderful Agility to the Roofs and all Parts of Houses and Barns, where Rats are able to run; for which Service they are preserved by most of the Inhabitants. They are bold and furious, leaping at and biting those that attack them, tho' no Harm ensues, their Bite not being venomous.

It is commonly said in *Carolina*, that they will attack and swallow Rattle-Snakes; it is certain most or all Snakes will devour one another, not only of their own, but of other Kinds; which I have often seen after a long Struggle, one swallow another, but little less than itself: They are the most numerous of all the Snakes.

*Serpent noir.*

*ES Serpens, lorsqu'ils ont fait leur crue, sont fort gros & fort grands, puisqu'il s'en trouve quelques uns de six pieds de long: Ils sont partout le corps d'un noir éclatant, & leur couleur ne change jamais: Ils sont extrêmement agiles & utiles, car ils font la chasse aux rats, qu'ils poursuivent avec une vitesse incroyable jusques sur les toits des maisons & des granges, & partout; c'est pourquoi la pluspart des habitans du pays les conservent. Ils sont hardis & furieux, jusqu'à sauter sur ceux qui les attaquent & à les mordre, mais il n'en arrive pas grand mal, leurs morsures n'étant pas venimeuses.*

*On dit communément à la Caroline, qu'ils attaquent, & qu'ils avalent les Serpens à Sonnette. Il est certain que les Serpens se dévorent les uns les autres, non seulement ceux de leur propre espèce, mais aussi les autres; j'en ai souvent vu, qu'après un long combat, l'un avaloit l'autre, quoiqu'il ne fût guères moins grand que le vainqueur. Cette espèce de Serpens est plus nombreuse que pas une autre.*

*Frutex Rubo similis, non spinosus, capreolatus; fructu racemoſo cæruleo Mori-formi.*

**T**HIS twining Plant supports its self by Trees and Shrubs that grow near it, on which they twist, and are assisted by small Tendrils: From the main Stem grow alternately smaller Branches, with trifoliated Leaves, which are indented round the Edges, on Footstalls an Inch long: The Flowers are very small, in Form of a Cup, divided into four pointed Petals, growing in Spikes many together, on very short Stalks. The Buds of the Flowers before they open, are in Shape of an Acorn. The whole Spike of Flowers with their Stalks are red, except the Tops of the Buds, which are yellow. The Berries are of the Size of large Peas, of a purple Colour, round, with Proruberancies like those of Mulberries, and containing such like Seed: One long red Stalk, dividing into smaller curved Pedicels, supports the Fruit, which were strait while the Flowers remained. This Plant was in Blossom and Fruit at the same Time, which was in May, on the Island *Hathera*.

**C**ETTE plante tortuë & pliante se soutient par le moyen des autres arbres, qui croissent auprès d'elle, avec lesquels elle s'entortille, aidée par de petits tendrons. De la principale tige naissent alternativement de petites branches garnies de feuilles en treille & dentelées tout autour, avec des queues d'un pouce de long. Les fleurs sont fort petites, en forme de godets divisés en quatre feuilles pointues, croissant en épis, plusieurs ensemble sur des pedicules fort courts. Les boutons des fleurs avancent de s'épanouir, ressemblent à un gland. L'Épi entier des fleurs est rouge, avec sa tige, excepté l'extrémité du bouton, qui est jaune. Les baies sont rondes, de la grosseur d'un gros poix, d'une couleur purpurine, avec des excrérences charnues tout autour, semblables à celles des Murens, renfermant des grains tout pareils: Une longue tige rouge se divisant en plusieurs pedicules menus & recourbés, soutient les fruits, & ces mêmes pedicules sont droits, quand ils ne soutiennent que les fleurs. Cette plante étoit en fleur & en fruit dans le même tems, savoir au mois de May, dans l'île d'*Hathera*.









Corolodendron &amp;c.

Anguis &amp;c.

## *ANGUIS MINOR FUSCUS MACULATUS.*

*The little brown Bead Snake. Petit Serpent brun au Chapelet.*

 HESE are always small, seldom appear above Ground, but are dug up and found twisting about the Roots of Shrubs and other Plants. All the Back and upper Part of the Body, have transverse Spots of brown and white, so disposed, as to make some Resemblance of a String of Beads, which seems to have given its *English Name*.

It is an harmless Snake.



*ES Serpens sont toujours petits; on les voit rarement sur la terre, mais on les trouve enfouis sous terre, & entortillés autour des racines des arbrisseaux & des autres plantes: Tout leur dos & le dessus de leur corps est marqué en travers, par des taches brunes & blanches, disposées de façon, qu'elles ressemblent à des grains de chapelet enfilés, ce qui semble leur avoir donné leur nom en Anglois, Serpent au Chapelet.*

*Ce Serpent n'est point dangereux.*

*Corallodendron humile, spica florum longissima coccinea, radice crassissimo.*

**T**HIS Shrub rises from the Ground with many straight, taper, pithy Stalks, to the Height of five or six Feet; the upper Part of which, for about twenty Inches, are thick set with papilionaceous Scarlet Flowers, with yellow Stamina: In May the Flowers begin to blow at the Bottom, producing successively its beautiful Blossoms to the End of the Stalk; the Flowers are set two and three together, on short Foot-stalks: In August the Fruit is ripe, consisting of Pods, in Shape and Size resembling Kidney-Beans, containing also such like Seeds, but of a bright Scarlet Colour. In Winter the whole Plant dies to the Ground, leaving as a Monument of fading Glory its withered Stalks, which remain standing the whole Winter, and are towards their Bottoms as big as the largest walking Cane. The Leaves consist of three triangular Lobes, growing mostly near the Ground and lower Parts of the Plant. The Root of this Plant resembles that of Briony, being large at Top, running down into the Earth four or five Feet, white within, and covered with a brown Rind; some of them so large, that they weigh upwards of twenty Pounds.

*CES arbrisseaux s'élèvent de la terre, à la hauteur de cinq ou six pieds, par plusieurs tiges droites, qui vont en diminuant, menuës & moelleuses; le haut des tiges de la longueur d'environ vingt pouces, est couvert de fleurs légumineuses, d'un rouge écarlate, avec des étamines jaunes. Au mois de Mai les fleurs commencent par le bas à s'épanouir, & continuent successivement jusqu'à la pointe de la tige: Ces fleurs sont attachées deux ou trois ensemble à des queues fort courtes; en Août le fruit est mûr, il consiste en des coques, semblables par leur grandeur à celles des Fèves d'haricot. Elles contiennent aussi des fèves semblables, mais d'un écarlate très vif. Aux approches de l'hiver toute la plante meurt, à la réserve de la racine, laissant comme un monument de sa gloire passagère, ses tiges secches qui restent sur pied tout l'hiver; elles sont aussi grosses vers le bas, qu'une très grosse canne; les feuilles consistent en trois lobes triangulaires, qui croissent ordinairement près de la terre, & aux parties les plus basses de la plante. Sa racine ressemble à celle de la Bryone, étant large par le haut, & s'enfonçant dans la terre à quatre ou cinq pieds de profondeur; elle est blanche en dedans, & couverte d'une écorce brune. Il s'en trouve de si grosses, qu'elles pèsent plus de vingt livres.*

## ANGUIS GRACILIS FUSCUS.

*The Ribbon-Snake.*

HIS is a slender Snake, usually not much bigger than the Figure. The Upper Part of the Body dark brown, with three parallel white Lines, extending the whole Length of the Body; the Belly white. They are very nimble and inoffensive.

## Serpent grefle &amp; brun.



*E* Serpent est long & grefle, n'étant d'ordinaire pas plus grand que la figure; le dessus de son corps est d'un brun foncé, avec trois rayes blanches & parallèles, qui s'étendent tout du long du corps: Le ventre est blanc. Ces Serpens sont très agiles, & point dangereux.

*Arbor baccifera, laurifolia, aromatica, fructu viridi calyculato racemoſo.*  
Hist. Jam. Vol. II. p. 87. *Cortex Winteranus.* Offic:

## WINTER'S BARK.

THESE Trees grow usually about twenty Feet high, and eight or ten Inches in Thicknes, in the thick Woods of moit of the Bahama-Islands; the Leaves are narrow at the Stalk, growing wider at their Ends, which are broad and rounding, having a middle Rib only; they are very smooth, and of a light shining Green: In May and June, the Flowers, which are pentapetalous, come forth in Clusters at the Ends of the Branches; they are red and very fragrant, and are succeeded by round Berries in Size of large Peas, green, and when ripe (which is in February) purple, containing three shining black Seeds, flat on one Side, otherwise not unlike in Shape to a Kidney Bean; these Seeds in the Berry, are invellop'd in a slimy Mucilage. The whole Plant is very Aromatick, the Bark particularly being more used in Distilling, and in greater Esteem in the more Northern Parts of the World than in England. This Bark is that which is commonly known at the Shops by the Name of *Winter's Bark*, tho' truly not the right, as Sir Hans Sloane has judiciously informed us.

## L'Ecorce du Capitaine Winter, ou la Canelle blanche.

*C*ES arbres croissent environ à la hauteur de vingt pieds; ils ont huit à dix pouces d'épaisseur; ils se trouvent dans les plus épaisses Forêts des Isles Bahama. Leurs feuilles sont étroites vers la queue, & vont en s'étendant jusqu'au bout, qui est large & arrondi, n'ayant qu'une coûte au milieu; elles sont très lisses, & d'un vert clair & brillant. Les fleurs viennent en Mai & Juin; elles sont à cinq pétales, & croissent par bouquets aux extrémités des branches: Elles sont rouges & très odoriferantes, il leur succède des baies vertes, de la grosseur d'un gros pois, & quand elles sont mûres, ce qui arrive en Février, elles sont purpurines, & contiennent trois grains d'un noir brillant, plats d'un café, & à peu près de la taille d'une fève d'haricot; ces grains sont enveloppés, dans la baie, d'un mucilage gluant. La plante en son entier est très aromatique, mais particulièrement l'écorce, qui est plus en usage pour la distillation, & plus estimée dans tous les pays du nord, qu'en Angleterre; Cette écorce est celle qui est connue dans les boutiques, sous le nom de Canelle blanche, quoique ce ne soit pas réellement la véritable, comme Mr. Le Chevalier Hans Sloane nous en a judicieusement informez.



Calycidato, Xc.

Anguis Xc.





51



Pseudo &c. Flos. Passions &c.

Anguis &c.

## *ANGUIS GRACILIS MACULATUS.*

### *The Spotted Ribbon-Snake.*

 HIS is a slender Snake, usually about the Size of the Figure, the Upper Part of it was Brown, spotted with Black, the Belly White, on the Ridge of the Back extends a List of White, the whole Length of it. They are Harmless, and without any Characteristick of a Viper.

### *Serpent grele & tacheté.*



*Elui-cy est un Serpent menu, ordinairement de la même grandeur que la figure; le dessus en étoit brun marqué de noir, le ventre blanc; sur le milieu du dos s'étend une raye blanche dans toute sa longueur. Ils ne sont point dangereux, & n'ont aucun des characteristiques de la Vipère.*

*Pseuso-Santalum croceum.* Hist. Jam. Vol. II. p. 184.

### *BRASILETTO.*

THE Value of this Wood has occasioned a Scarcity of it on the Bahama Islands, particularly the largest Trees being cut down; so that to what Dimensions they grow, where largest, I know not; the Biggest of those remaining, not exceeding two or three Inches in Thickness, and eight or nine Feet in Height, the Branches are slender and full of small Prickles, the Leaves are pinnated, the Lobes growing opposite to each other, broad at their Ends, with one Notch. The Flowers are white, papilionaceous, with many *Stamina* and yellow *Apices*, growing in a pyramidal Spike, at the End of a long slender Stalk: The Pods inclose several small round Seeds. The Inhabitants of the Bahama Islands formerly got great Part of their Subsistence by cutting this Wood, but it is now much exhausted. It is used in Dying, there being yearly great Quantities of it sent from these Islands, and other Parts of the West-Indies to England for that Use.

*L'Eſtime que l'on fait de ce Bois, est causé qu'il eſt devenu fort rare aux Iſles Bahama, ſur tout on y a coupé les plus gros arbres; en forte que je ne ſais jusques à quelle groſſeur ils peuvent parvenir; les plus grands de ceux qui reſtent ſur pied n'ayant que huit à neuf pieds de haut, & deux ou trois pouces de diamètre; les branches étoient menuës, & pleines de petits piquants, les feuilles diſpoſées par paires, leurs lobes oppoſés les uns aux autres, larges à leur extrémité, avec une entaille; les fleurs ſont blanches, legumineuſes, garnies de pluſieurs étamines, & de pluſieurs ſommets jaunes, qui forment une pointe piramidale, au bout d'une longue tige menuë: Les coſſes renferment pluſieurs petites ſemences rondes. Autrefois les habitans des Iſles Bahama gagnoiſent en partie leur vie à exploiter ce bois, mais aujourdhui il n'en reſte presque plus. On s'en ſert pour la teinture, & l'on en envoie tous les ans une grande quantité de ces Iſles, & de pluſieurs autres endroits des Indes occidentales, en Angleterre pour cet uſage.*

### *Flos Passionis minimus, trilobatus flore sub-cæruleo.*

THE Leaves of this Passion Flower, reſemble that of the *Hepatica*, conſisting of three Lobes, or rather a Leaf diſſeptiſed by three Segments. The Flower is of a Peach Colour, formed like others of the Kind, except that the Cup is longer than ordinary. The Fruit is ſmall, round, and of a deep blue Colour.

*LES feuilles de cette fleur de la Paſſion, reſemblerent à celles de l'Hépatique; elles conſiſtent en trois lobes, ou plutôt en une feuille diſſeptiſée en trois ſegments. Cette fleur eſt couleur de Peſcher, de la même forme que celles de ſon eſpèce, excepté que le calice en eſt plus long que dans les autres. Le fruit eſt petit, rond & d'un bleu foncé.*

# ANGUIS ANNULATUS.

## The Chain-Snake.



HIS Serpent was of the Size of the Figure; it was the only one of the Kind I ever saw, nor was it known to any of the Inhabitants I shew'd it to; therefore as it wanted a Name, the best I could think of was, that of Chain-Snake, from some Resemblance of a Chain that seems in many Places to environ the Body, tho' these Marks extend but half Way round; the Belly being marked, as the Piece cut off represents: The Colour of this Snake was of a dark dusky Blue, except the Chain-like Marks of the Back, which were yellow, as were likewise some square Spots on the Belly: The angular Form of its Lips were singular. It seemed not to be of the Viper Kind.



## Serpent à Chaine.

*E* Serpent étoit de la grandeur de la figure; c'est le seul de son espèce que j'aie jamais vu, & il n'étoit connu d'aucun des habitans à qui je le fis voir; ainsi comme il n'avoit point de nom, le plus convenable que j'aye pu imaginer, est celui de Serpent à chaine, à cause de ses marques, qui en plusieurs endroits ressemblent à une chaîne qui entoureroit son corps, quoiqu'elles ne s'étendent qu'à la moitié de sa grosseur; le ventre étant marqué comme la pièce qu'on en a coupée le fait voir: La couleur de ce serpent étoit d'un bleu sâle foncé, hors les marques du dos, qui ressemblent à une chaîne, qui sont jaunes, de même que quelques taches quarrées du ventre: La forme anguleuse de ses lèvres est singulière. Il ne paroiffoit pas être de l'espèce des Vipères.

## Frutex Lauri longiore folio.

THIS Shrub is a Native of *Virginia*, and grows in wet Swamps and standing Waters; it rises from the Ground with many Stems to the Height of eight or ten Feet, of a reddish Colour. The Leaves are placed alternately an Inch from one another, and are in Shape like those of a Bay, stiff and shining; at the Pedicles of the Leaves grow the Flowers, which are tubulous, of a pale red Colour, and set on Stalks two and three Inches long; these Flowers are succeeded by small conic Seed-Vessels about the Size of large Peas, which when ripe open in two Parts, and display many small black Seeds. It retains the Leaves all the Winter.

*CET arbrisseau est originaire de la Virginie, il croît dans des marais & des eaux dormantes; il sort de terre avec plusieurs tiges, & s'élève à la hauteur de huit ou dix pieds; il est de couleur rougeâtre, les feuilles sont placées alternativement, & éloignées d'un pouce: Elles sont à peu près semblables à celles du Laurier, roides & luisantes; les fleurs naissent proche les pedicules des feuilles, elles sont tubuleuses, d'un rouge pâle, & attachées à des tiges longues de deux ou trois pouces; il leur succède de petites capsules coniques, de la grosseur d'un gros pois; lorsqu'elles sont mûres elles s'ouvrent, & font voir un grand nombre de petites semences noires. Il garde ses feuilles tout l'hiver.*



Ernest K. C.

*Anguis annulatus* Sc.





53



Apocynum Sc.

Anguis Sc.

*ANGUIS VIRIDIS MACULATUS.**The Green Spotted Snake.*

HESE Serpents sometimes grow to four times the Bigness of the Figure, are said not to be venomous, and are great Robbers of Hen-Roosts, sucking Eggs, tho' their Size seldom enables them to devour the Fowls. As the change of Marks and Colour in some Serpents cause Confusion in distinguishing them, I would willingly avoid Mistakes, by describing the same Snake twice, and multiplying the Kinds to more than there are: And I am diffident in determining, whether this be a different Kind from the spotted Ribbon-Snake, p. 51. Which somewhat resembles it, tho' of a different Colour.

*Serpent vert tacheté.*

*L*y a de ces serpens qui croissent jusques à être plus grands quatre fois que la figure. On dit qu'ils ne sont pas venimeux; ils volent souvent les poullailliers, ou ils sucent les œufs, quoiqu'ils soient rarement de taille à devorer la volaille. Comme le changement de marques & de couleurs qui arrive à quelques serpents, cause de la confusion dans les espèces que l'on en établit, je voudrois bien tâcher d'éviter les méprises, & ne pas multiplier sans nécessité les espèces, en décrivant deux fois le même; & je suis en doute, si celui-cy n'est pas de la même espèce que celui qui est décrit page 51, qui lui ressemble en quelque sorte, quoiqu'il soit d'une couleur différente.

*Apocynum Scandens, Salicis folio, flore amplio pleno.*

**T**HIS Plant trails upon, and is supported by Trees and Shrubs to the Height of ten, and sometimes twenty Feet, the Leaves stand by Pairs on Footstalks an Inch long, shaped not unlike those of a Sallow, of a shining Green, and stiff, their Veins hardly discernable. These Leaves are apt to curl, or turn back as the Figure represents; The Flowers grow at the Ends of the smaller Branches, six or eight in a Cluster, on Footstalks above an Inch long, are rubulous, having five Petals at the Mouth of the Tube, with broad square Ends.

They resemble in Shape the Flowers of the *Mangus*. *Hort. Malab.* T. 39.

The Seed-Vessels, as is usual in this Tribe, grow by Pairs, are eight or ten Inches long, cylindrical and bend inwards, growing a little tapering towards their Points, which meet and touch one another exactly: The Colour of the whole Flower is yellow: The Pods when ripe discharge small flat milky Seeds, with white Down, like most other *Apocynums*. They grow on many of the *Bahama Islands*.

**C**ETTE plante rampe, & est supportée par les arbres & les arbisseaux, sur lesquels elle monte à la hauteur de dix pieds, & quelquefois jusques à vingt; ses feuilles sont disposées par paires sur des queues d'un pouce de long, elles sont taillées à peu près comme celles du *Saulé*, d'un verd clair, & roides; on peut à peine discerner leurs veines: Elles sont sujettes à se frire, ou à se renverser en arrière, comme on le voit dans la figure. Les fleurs viennent aux extrémités des petites branches, six ou huit en un bouquet, sur des tiges de plus d'un pouce de long; elles sont tubuleuses, le haut du tube est garni de cinq feuilles larges & quarrees à leur extrémité; elles sont faites comme celles du *Mangus*, *Hort. Malab.* T. 39. Les semences sont renfermées dans des capsules qui sont rangées par paires, ainsi qu'il est ordinaire à cette espèce, longues de huit ou dix pouces, cylindriques, pliées en dedans, diminuant un peu vers leurs pointes qui se rencontrent, & s'appliquent exactement l'une à l'autre: La couleur de toute la fleur est jaune: Lorsque les coiffes sont mûres, elles laissent tomber de petites sémences plates & laiteuses, avec un duvet blanc, comme la plupart des autres *Apocynas*. Ces Plantes croissent en plusieurs des îles Bahama.

## ANGUIS FLAGELLI FORMIS.

### *The Coach-whip Snake.*



HIS is a very long slender Snake, particularly the hind Part, it diminishes gradually to the Tail, and from the Resemblance of a Coach-Whip has received its Name. The Colour of it is brown, it is very active and nimble, running very swiftly. They are inoffensive, yet the *Indians* report (not without gaining many Profelytes to their silly Belief) that they will by a Jerk of their Tail separate a Man in two Parts; they are generally about the Size of the Figure, tho' sometimes they are twice as big. They retain their Colour in all Stages.



*E* Serpent est très long & menu, sur tout en sa partie postérieure, il va en diminuant jusques à sa queue, & la ressemblance qu'il a avec un Fouet de Cucher, lui a fait donner le nom qu'il a: Sa couleur est brune, il est fort actif & fort souple; il court d'une grande vitesse, il n'est point dangereux, cependant les Indians assurent qu'ils peuvent separer un homme en deux d'un coup de queue, & ce conte ne manque pas d'être crû de bien des gens: Ces Serpents sont ordinairement de la grandeur de la figure, quoiqu'il y en ait de deux fois plus grands; ils gardent toujours la même couleur.

### *Lychnis viscosa, Virginiana, flore ampio coccineo: seu Muscipula Regia.*

D. Banister Phytogr. Tab. 203. Fig. 1.

THE Height of this Plant is usually about a Foot, rising with several Stems, which divide into smaller Stalks, on which grow the Flowers on Footstalks half an Inch long: The Flower is red, tubulous, consisting of five Petals, with a deep Notch at the End of each, besides an angular Point on each Side: The Leaves grow opposite to one another without Footstalks. They are frequently found in the sandy Woods near *Charles-Town* in *Carolina*.

*L*a hauteur de cette plante est communément d'environ un pied, elle sort de terre avec plusieurs tiges qui se subdivisent en petites branches, sur lesquelles naissent les fleurs attachées à des pédicules d'un demi pouce: La fleur est rouge, tubuleuse, composée de cinq feuilles, qui ont chaqu'une une entaille profonde à leur extrémité, outre une pointe anguleuse de chaque côté; les feuilles sont vis-à-vis les unes des autres sans queues: On trouve ordinairement ces plantes dans les bois sablonneux qui sont auprès de *Charles-Town* dans la Caroline.

Lychni's Sc.



Augnus Sc.





55



Anguis &c.

Viscum &c.

## ANGUIS e rubro &amp; albo varius.

## The Corn Snake.

**H**IIS Snake is sometimes twice as big as the Figure. It is all over beautifully marked with red, and white, which seems to have given it the Name of Corn-Snake ; there being some *Maize* or *Indian Corn* much resembling this in Colour ; they are Robbers of Hen-Roosts, otherwise they are harmless. They are common in *Virginia* and *Carolina*.



## Serpent de Bled.

*E*s Serpent est quelquefois deux fois aussi grand que la figure ; il est par tout marqué de rouge & de blanc, d'une manière fort agréable ; & il semble que c'est de là qu'il a pris son nom de Serpent de Bled, car il y a une espèce de Mays, ou de Bled d'Inde, qui lui ressemble beaucoup en couleur. Ils volent les Poulaillers, c'est le seul mal qu'ils fassent. Ils sont communs à la Virginie & à la Caroline.

## Viscum Caryophylloides ramosum, floribus minimis albis.

**T**HIS Plant from a bulbous Root riseth with four or five, and sometimes more succulent Leaves ; which before it flowers, resemble both in Root and Leaf a *Narcissus* ; from the middle of the Leaves riseth a slender stiff Stem, about eighteen Inches long, at the upper Part of which are alternately placed its Flowers, singly on short Footstalks. The Flower is hollow, the Back of the Cup growing into a pointed Petal, and from the Bottom of the Cup on each Side spreads two pointed Petals, the whole Flower of a light Green, within the Hollow of it are yellow Stamina. These Flowers are succeeded by small semilunar Seed-Vessels, both Ends being blunt, and one bigger than the other, containing very small dusty Seeds. They grow on bare Rocks on many of the *Bahama Islands*, and sometimes upon Trees, in the Manner of *Mistletoe*.

*C*ETTE plante s'élève d'une racine bulbeuse, avec quatre ou cinq feuilles succulentes, & quelquesfois d'avantage ; avant qu'elle fleurisse elle ressemble par sa racine & par ses feuilles à un *Narcisse* : Il s'élève du milieu des feuilles une tige mince & roide, longue d'environ dix huit pouces, les fleurs sont placées alternativement à son extrémité, chaqu'une soutenue par un pedicule court ; la fleur est creusée, le derrière du calice se changeant en une feuille pointue, & du fond du calice il s'étend de chaque côté deux feuilles pointues, toute la fleur est d'un vert clair, dans les vétustes il y a des étamines jaunes. Il succède à ces fleurs de petits fruits, faits en demi-lune, dont les deux bouts, d'inégale grosseur, sont émouffés ; ils contiennent de petites semences menuës comme de la poussière. Ces plantes croissent dans plusieurs des îles Bahama sur des rochers nuds, & quelquesfois sur les arbres, comme une espèce de Guy.

## ANGUIS CAPITE VIPERINO.

## The Hog-nose Snake.



HESE Snakes are seldom much larger than the Figure, short bodyed, and very large towards the Head, with Cheeks swelling out like those of Vipers, the Nose turning up like that of a Hog, his whole Visage being very ugly: I suspected he was of the venomous Tribe, till searching in his Mouth for the hollow Viper's Fangs, I could discover only small Teeth, yet being a small one, they might not yet appear. It having so much of the Characteristick of Vipers, besides its slow Motion and Sluggishness, that I can't help suspecting him to be a Viper. The Crown of the Head and Back of this Serpent was brown, with many large black Spots, regularly placed; the hindmost Part of the Body having transverse yellow Bars between the black Spots: The Belly dusky white, with smaller black Spots.

## Serpent à la tête de Vipère.



E Serpent est rarement beaucoup plus grand que la figure; son corps est court, & fort gros vers la tête, dont les joues s'enflent comme celles de la Vipère; le nez est tourné en haut comme celui d'un Pourceau, & toute sa face fort laide. Je soupçonne qu'il étoit de l'espèce venimeuse, mais en cherchant dans sa gueule les dents canines creuses de la Vipère, je n'y trouvai que de petites dents, mais comme il étoit encore jeune peut-être ne paroisoient elles pas encore; car ayant tout des caractéristiques de la Vipère, outre la lenteur & la paresse, je ne puis m'empêcher de penser que ce soit une Vipère. Le dessus de la tête & du dos de ce Serpent étoit brun, avec plusieurs grandes taches noires placées avec symétrie, l'extremité postérieure avoit des rayes jaunes transversales entre les taches noires; le ventre étoit d'un blanc sale, avec des taches noires plus petites.

## Lilium, sive Martagon Canadense, flore luteo punctato. Acad. R. Par.

## Martagon de Canada.

A Martagon being so singular in its Structure, and so well known, I shall only mention wherein these differ and excel in Beauty all the other Kinds hitherto known.

This Plate exhibits the Flowers of two Kinds, because I conceive their Difference being little, may be expressed in few Words, without giving an unnecessary Plate. This Plant has its Flowers growing alternately, on long Footstalks, of an Orange and Lemmon Colour, thick spotted with dark Brown. The largest Flower is from another Kind of Martagon. The Flowers of this have their Pedicels arising all together from the top of the Stalk; the Flowers are much larger, as are its scaly Roots, and the usual Height of the Plant is six Feet. This elegant and stately Martagon was introduced into England from Pensilvania by my Friend Mr. Peter Collinson, in whose curious Garden it flow'd in Perfection, after the Manner described.

L E Martagon ayant tant de singularités dans sa forme, & étant si connu, je ne parlerai que de ce qui distingue celui-cy des autres, & le met au dessus d'eux par sa beauté. Cette planche représente les fleurs de deux espèces, parce que je crois que leur différence n'estant pas considérable, on peut l'expliquer en peu de mots, sans donner une planche de plus qui seroit inutile. Les fleurs de cette plante naissent sur de longs pedicules, où elles sont placées alternativement, couleur d'orange & de citron tachetées fort près à près d'un brun foncé. La plus grande fleur appartient à une autre espèce de Martagon: Les pedicules des fleurs de celui-cy sortent tous en même temps du haut de la tige, ses fleurs sont beaucoup plus grandes, de même que ses racines écaillées, & la hauteur ordinaire de cette plante est six pieds. Mon ami Mr. Pierre Collinson est le premier qui ait fait connoître en Angleterre ce superbe & beau Martagon, qui lui avoit été envoyé de Pensilvanie, & il a fleuri en perfection de la manière que je viens de le décrire, dans le beau jardin de ce curieux.



Anguis &c.

Lilium &c.







## ANGUIS VIRIDI S.

### The Green Snake.

**H**IIS inoffensive little Snakes abides among the Branches of Trees and Shrubs, catching Flies and other Insects, on which they feed: They are generally about the Size of the Figure; they are easily reclaimed from their Wildness, becoming tame and familiar, and are very harmless, so that some People will carry them in their Bosoms.



### Serpent vert.

*E* petit Serpent, sans venin, se tient dans les branches des arbres & des buissons, où il attrape des mouches & d'autres insectes dont il se nourrit: Ils sont ordinairement de la grandeur de la figure, on les apprivoise aisément; ils deviennent doux & familiers, sans faire aucun mal, ensorte qu'il y a des gens qui les portent dans leur sein.

*Cassena vera Floridanorum, Arbuscula baccifera Alaterni facie, foliis alternatim sitis, tetrapyrrene.* Pluk. Mant.

**T**HIS Shrub usually rises from the Ground with several Stems, to the Height of twelve Feet, shooting into many upright slender stiff Branches, covered with whitish smooth Bark, set alternately with small evergreen serrated Leaves, resembling those of *Alaternus*: Its Flowers are small, white, and grow promiscuously amongst the Leaves, and are succeeded by small spherical Berries on short Footstalks; these Berries turn red in October, and remain so all the Winter, which with the green Leaves and white Bark makes an elegant Appearance. But the great Esteem and Use the *American Indians* have for it, gives it a greater Character. They say, that from the earliest Times the Virtues of this Shrub has been known, and in Use among them, prepared in the Manner they now do it, which is after having dried, or rather parched the Leaves in a Porridge-Pot over a slow Fire, they keep it for Use: Of this they prepare their beloved Liquor, making a strong Decoction of it, which they drink in large Quantities, as well for their Health as with great Gust and Pleasure, without any Sugar or other Mixture, yet they drink and digest it with Ease, repeating it very often, and swallowing many Quarts. They have an annual Custom in the Spring of Drinking it with Ceremony, the Town having notice from the King or Principal, the Inhabitants assemble at the Town-House having previously by Fire purged their Houses of all their old Furniture, and supplied them with new, the King is first served with a Bowl or Conch-shell never used before of this emetic Broth, by the next to him in Eminence, and he by the next is served, and so on till he comes to the Women and Children: They say it restores lost Appetite, strengthens the Stomach, giving them Agility and Courage in War, &c. It grows chiefly in the Maritime Parts of the Country, from whence those *Indians* supply the Mountain *Indians* with it, carrying on the like Trade with it in *Florida*, as the Spaniards do with the South-Sea Tea from *Parraguay* to *Buenos-ayres*; *Florida* being in the same Latitude North, as *Parraguay* is South; and observing by comparing the Leaves of both, no apparent Difference in them, induces me to believe they are both the same Plant. In *South Carolina* it is called *Cassena*. In *Virginia* and *North Carolina* it is known by the Name of *Yapon*, in the latter of which Places it is as much in Use among the white People as among the *Indians*, at least among those who inhabit the Sea Coasts.

**C**ET arbrisseau s'élève ordinairement avec plusieurs tiges à la hauteur de douze pieds, elles se divisent en plusieurs branches menuës, roides, couvertes d'une écorce lisse & blanchâtre, garnies de petites feuilles dentelées, toujours vertes, rangées alternativement, semblables à celles de l'*Alaterne*: Ses fleurs sont petites, blanches, & viennent ça & là parmi les feuilles, il leur succède de petites baies sphériques, attachées à des pédicules courts: Ces baies deviennent rouges au mois d'Octobre, & demeurent en cet état tout l'hiver, ce qui joint au vert des feuilles, & à la blancheur de l'écorce, produit un effet très agréable; mais le merite de cet arbrisseau est encore plus relevé par l'estime que les Américains ont pour lui & l'usage qu'ils en font: Ils disent que ses vertus ont été connues parmi eux depuis les premiers temps, & qu'ils s'en sont servis en le préparant de la même manière qu'ils le font aujourd'hui; ce qui se fait en séchant, ou plutôt en grillant sur un petit feu dans un pot, les feuilles que l'on veut garder: Ils font de ces feuilles une forte décoction qui est leur brûlage favori, dont ils boivent une grande quantité autant par plaisir & par gout, que pour leur santé; ils n'y mêlent ni sucre ni autre chose, & ils en avalent plusieurs pintes, qu'ils vomissent avec la même facilité, ce qu'ils repètent souvent. Ils ont une coutume annuelle au printemps de boire cette liqueur en cérémonie; la ville étant avertie par le Roy ou le chef, les habitans s'assemblent à la maison de ville, après avoir purgé leurs maisons de tous leur vieux meubles, & les avoir garnies de nouveaux utensiles; le Roy est servi le premier d'un bol de cette liqueur émettant dans un vase ou une coquille qui n'a jamais servi, par le plus dignifié après lui, celui là par un autre, & ainsi de suite jusqu'aux femmes & aux enfans. Ils disent que ce bouillon rétablit l'appétit, fortifie l'estomac, & leur donne de l'agilité & du courage à la guerre, &c. Il croît le plus communément dans les endroits du pays qui sont vers la mer, d'où les Indiens en fournissent à ceux des montagnes, & ils en font le même commerce à la *Floride*, que les Espagnols du *Théâtre de la mer du Sud*, du *Paraguay* à *Buenos-Ayres*. La *Floride* étant dans la même latitude au Nord, que le *Paraguay* est au Sud, & ne trouvant aucune différence entre les feuilles de l'un & de l'autre, je suis porté à croire que c'est la même plante. On le nomme au sud de la *Caroline*, *Cassena*; à la *Virginie* & au nord de la *Caroline* elle est connue sous le nom de *Yapon*: Dans le dernier de ces endroits elle est autant en usage parmi les Blancs que parmi les habitants, du moins les Blancs qui demeurent sur la côte.

*ANGUIS e cæruleo & albo varius.*

*The Wampum Snake.*

 HIS Snake receives its name from the Resemblance it has to Indian Money called *Wampum*, which is made of Shells cut into regular Pieces, and strung with a Mixture of Blue and White. Some of these Snakes are large, being five Feet in Length; yet there is no Harm in their Bite, but as all the largest Snakes are voracious, so will they devour what Animals they are able to overcome: The Back of this Serpent was dark Blue, the Belly finely clouded with brighter Blue, the Head small in Proportion to its Body. They seem to retain their Colour and Marks at every Change of their *Exuviae*. They are found in *Virginia* and *Carolina*.

Serpent nommé Wampum.



E Serpent prend son nom de la ressemblance qu'il a avec une monnoie Indienne, appelée Wampum, qui est faite de coquilles taillées en pièces d'une figure régulière & enfilées, avec un cordon mêlé de bleu & de blanc. Quelques uns de ces Serpents ont jusques à cinq pieds de long, & cependant leurs morsure n'est point dangereuse; mais comme tous les grands serpents sont voraces, ceux-cy devorent tous les animaux dont ils peuvent être les maîtres. Le dos de ce serpent étoit d'un bleu foncé, son ventre agréablement nué d'un bleu plus clair, sa tête petite à proportion de son corps. Il semble qu'ils gardent leur couleur & leurs taches en changeant de peau: ils sont à la Virginie & à la Caroline.

*Lilium Carolinianum, flore croceo punctato, petalis longioribus & angustioribus.*

*The RED LILLY.*

THIS Lilly grows from a single bulbous scaly Root about the Size of a Walnut, rising with a single Stalk to the Height of about two Feet, to which from the Bottom on the Flower are set opposite to each other narrow Leaves. One Flower only is produced on the Top of the Stalk, consisting of six Petals, every of which have a Footstalk an Inch long; these Petals turn back in a graceful Manner and are tapering, terminating in Points and edged with small Indentures: From the Bottom of the Flower rises six very long Stamina with their Apices, surrounding a *Pistil*; the whole Flower is variously shaded with Red, Orange and Lemon Colours. They grow on open moist *Savannas* in many Parts of *Carolina*.

*Lis Rouge.*

C<sup>E</sup> Lis croît d'une seule racine bulbeuse & écaillée, environ de la grosseur d'une noix, laquelle ne produit qu'une tige qui s'élève à la hauteur de deux pieds & qui est garnie dans toute sa longueur de feuilles étroites rangées les unes vis-à-vis des autres. Il ne naît qu'une fleur au haut de la tige; elle consiste en six feuilles, dont chaque une a un pédicule d'un pouce de long; elles se renversent d'une manière fort agréable, & vont en diminuant & enfin se terminent en pointe, & sont un peu dentelées par leurs bords. Il s'élève du fond de la fleur six longues étamines avec leurs sommets, qui entourent un *Pistil*: Toute la fleur est différemment nuée de rouge, d'orange & de citron. Ils croissent en plusieurs endroits de la Caroline, dans de grandes prairies humides & découvertes.



Lilium &c.

Anagis &c.





59



*Caecilia Maculata.*

Chrysanthemum.

## CÆCILIA MACULATA.

## The Glass Snake.

HE Head of this Snake is very small, the Tongue of a singular Form, as in the Figure is represented: They are of various Sizes, most of them are less than the Figure, the upper Part of the Body is of a Colour blended Brown and Green, most regularly and elegantly spotted with yellow, the Belly yellow, the undermost Part of which is brightest. Their Skin is very smooth, and shining with smaller Scales, more closely connected, and of a different Structure from other Serpents: A small Blow with a Stick will cause the Body to separate, not only at the Place struck, but at two or three other Places; the Muscles being articulated in a singular Manner quite through to the Vertebra, they are generally said to be harmless, They appear earlier in the Spring than any other Serpent, and are numerous in the sandy Woods of *Virginia* and *Carolina*.

## Serpent de Verre.



*A tête de ce Serpent est fort petite, la langue d'une forme singulière, comme elle est représentée dans la figure: Ils sont de différentes grandeurs, la pluspart sont plus petits que la figure; le dessus du corps est d'une couleur meslée de brun & de vert, tacheté très régulièrement & très agréablement de jaune: Le ventre est jaune, plus clair dans le milieu que dans les côtés; leur peau est fort lisse & fort luisante, étant garnie de plus petites écailles, qui sont plus serrées & d'une autre structure que dans les autres serpents: Si on les frappe légèrement avec un baton, leur corps se sépare non seulement en l'endroit où on l'a frapé, mais en deux ou trois autres, leur muscles étant articulés d'une manière singulière, jusqu'aux vertèbres mêmes: On dit communément qu'ils ne sont point dangereux. Ils paroissent de meilleure heure au printemps qu'aucun autre serpent, & ils sont en grand nombre dans les bois sablonneux de la Virginie & de la Caroline.*

## Chrysanthemum Americanum, Doronici folio, flore Persici coloris, umbone magno prominente ex atro purpureo, viridi, &amp; aureo fulgente.

**T**HIS Plant usually rises about six Feet from the Ground, with several large Stalks, producing on their Tops the first blown and largest Flowers, succeeded by many smaller ones from the side Branches; it continues flowering at least three Months: The Leaves grow alternately along the Stalks, resembling in Form and Manner of growing those of a Tulip. The Flower is of a Peach Colour, crowned with a very large scaly Cone or Seed Vessel, from the Basis of which proceeds the Petals of the Flower hanging round it, in Form of an Umbrella. The Petals are narrow, four Inches long, and deeply notched at their Ends: They grow on the Banks of the Savanna River, about five hundred Miles from the Mouth of it. We have had it flower in *England*, but it is now lost.

**C**ETTE plante s'élève ordinairement à la hauteur d'environ six pieds, avec plusieurs grosses tiges qui portent à leur sommet les premières & les plus grandes de ses fleurs qui sont suivies de plusieurs autres plus petites qui naissent sur les menuës branches; elle continuë à fleurir au moins pendant trois mois. Les feuilles sont placées alternativement sur les tiges, elles ressemblent par leur forme & leur manière de croître à celles de la Tulipe. La fleur est couleur de Pescher, couronnée par un cône ou fruit écaillé fort gros, de la base duquel naissent les feuilles de la fleur, qui pendent tout autour de lui, comme un Parasol. Ces feuilles sont étroites, longues de quatre pouces, & profondément entaillées à leur extrémité: Elles croissent sur les bords de la rivière Savanna, environ, cinq cent milles au dessous de son embouchure. Nous avons eu cette fleur en Angleterre, mais à présent elle est perdue.

*ANGUIS niger, maculis rubris & luteis eleganter varius.*

*The Bead Snake.*



THESE Snakes are usually about the Size of the Figure, some less, and some I have seen three or four Times as big.

The ground Colour of them is black, deeper on the Back and fainter under the Belly: The upper Part of the Body is adorned with large Spots of a bright red Colour, between which, at regular Distances are yellow Spots. They live mostly under Ground, and are seldom seen above, but are frequently found and dug up with Potatoes, at the Time those Roots are taken out of the Ground, which is in *September* and *October*. They have nothing of a Viper, either in Form or Quality, but are very inoffensive.



*Serpent au Chapelet.*

ES Serpents sont ordinairement de la grandeur de la figure, quelques uns moins, & j'en ai vu de trois ou quatre fois plus grands. Le fond de leur couleur est noir plus foncé sur le dos, & plus pâle sous le ventre; le dessus du corps est orné de grandes taches d'un rouge vif, entre lesquelles sont placées à des distances régulières des taches jaunes: Ils vivent presque toujours sous terre, & on les voit rarement dessus, mais souvent on les trouve en bêchant les Patates lorsqu'on retire ces racines de terre, ce qui se fait en Septembre ou en Octobre; ils n'ont rien de la Vipère, soit dans leur forme, soit dans leurs qualités, car ils ne sont aucunement dangereux.

*Convolvulus Radice tuberoso esculento.* Hist. Jam. Vol. I. p. 150.

*The Virginian Potato.*

THIS excellent Root seems to merit the Preference of all others, not only in Regard to the Wholsomness and Delicacy of its Food; but for its more general use to Mankind than any other Root, it being one great Part, if not the principal Substinance of the greater Part of Africa, and is likewise in great Use, both in America and in the Southern Parts of Asia. They being of so easy Culture, so quick of Growth, and of so vast an Increase, that the propagating it, seems more agreeable to the Indolence of the Barbarians, than cultivating Grains, which require a longer Time with more Labour and Uncertainty: In all our Colonies of America as well Islands, as Continent, these Roots are in great Esteem and Use. The common white People as well as the Negro Slaves subsisting much upon them, nor are they thought unworthy a Place at principal Tables. In Virginia and to the North thereof, they are Annuals, and produce no Flowers. They plant them in March, and dig them up in October, and to prevent their rotting, keep them in Holes under Ground near their Fires: In Carolina, where the Winters are more moderate, they are not necessitated to keep them so warm: And in the Bahama Islands, and other Places between the Tropicks, they are perennial and produce Flowers, yet are annually planted. The most Kinds, and best Potatoes, that I observed, were in Virginia, and because the Names, they are called by in different Colonies, are so various, I shall call them by those Names only by which they are known there.

I have observed only five Kinds of Potatoes specifically different from one another, the Common, the Bermudas, the Brimstone, the Carrot, and the Claret Potatoes.

The Common Potato is of a muddy red Colour on the outside, but being cut appears white with a reddish Cast, they commonly weigh from half a Pound, to four, five or six Pounds, usually are long, irregularly shaped and pointed at both Ends; this is an excellent Kind, and is most planted.

The Bermudas Potato is larger and rounder than the Common, very white within, and covered with a white Skin, this is a tender Kind, requiring more Warmth in keeping, and a different Culture from the rest, this is the most delicate Sort, but not so much planted as the Common Potato, because of its not keeping so well. This Potato only produces a white Flower, the Flowers of the other Kinds being purple.

The Brimstone Potato grows to a large Size, and is shaped like the Common, the Colour of it hath given its Name, and in Goodness it is esteemed next to the Common.

The Carrot Potato is named so, from its Colour both without and within, being like that of a Carrot, these grow to a very large Size, and are of great Increase, tho' of little Esteem, being the most insipid.

The Claret Potato seems to be propagated more as a Curiosity than for any peculiar Excellence it hath. The Colour of it without and within is that of Claret.

*Patate de la Virginie.*

CETTE excellente racine semble mériter d'être préférée à toutes les autres, non seulement à cause qu'elle fournit une nourriture très saine & très délicate, mais parce qu'elle est d'un usage plus général au genre humain qu'aucune autre racine, car elle nourrit en grande partie, si ce n'est pas entièrement la plus part des habitans d'Afrique, & elle est aussi d'un grand usage dans l'Amérique & les parties de l'Asie qui sont au midi. La facilité qu'il y a de les cultiver, la promptitude avec laquelle elles croissent, leur prodigieuse multiplication, semblent marquer qu'il convient mieux à l'indolence des Barbares de continuer à en planter, que de s'attaquer à la culture du blé qui demande plus de temps & de travail, & dont la récolte est plus incertaine. Dans toutes nos colonies de l'Amérique, tant dans le Continent que dans les îles, elles sont fort estimées & fort en usage. Le petit peuple parmi les Blancs s'en nourrit de même que les Noirs, et on ne les bannit pas des meilleures tables. A la Virginie, & dans les Cantons qui en sont au nord, elles sont annuelles & ne produisent point de fleurs; on les plante en Mars, & on les retire de la terre en Octobre, & pour les empêcher de pourrir on les garde dans des trous sous terre proche du feu: A la Caroline où les hivers sont plus modérés ils ne sont pas obligés de les tenir si chaudement: Et aux îles Bahamas, & ailleurs entre les Tropiques, elles sont perpétuelles & poussent des fleurs, cependant on les plante chaque année. C'est à la Virginie que j'ay vu les meilleures Patates, & d'un plus grand nombre d'espèces; & parce que dans les diverses colonies on leur donne des noms très différents, je ne me servirai que de ceux par lesquels elles sont connues à la Virginie.

J'en ay observé que cinq espèces de Patates bien distinctes, les Communes, celles de Bermudes, les Souffrées, les Carottes, & les Vermeilles.

Les Patates communes sont en dehors d'un rougeâtre, mais en dedans elles sont blanches, avec une nuance de rouge; elles pèsent ordinairement depuis une jauge à cinq ou six livres, elles sont les plus souvent longues, d'une figure irrégulière, & pointuées par les deux bouts; cette espèce est excellente, & celle qu'on plante le plus.

Les Patates des Bermudes sont plus grosses & plus rondes que les communes, fort blanches en dedans, & couvertes d'une peau blanche: Cette espèce est plus tendre que les autres, & demande plus de chaleur pour la conserver & une culture différente; elle est aussi la plus delicate, mais on en plante moins que de la commune, parce qu'elle ne se conserve pas si bien: Cette Patate ne produit qu'une fleur blanche, les fleurs des autres espèces sont d'un pourpre vif.

La Patate souffrée devient fort grosse, sa forme est semblable à la Patate commune, sa couleur lui a donné le nom qu'elle porte, & on la range comme la meilleure après la commune.

La Patate Carotte, ainsi nommée de sa couleur tant interne qu'externe, qui est semblable à celle d'une Carotte, devient très grosse & multiplie beaucoup, quoq' qu'en ne l'estime guère, à cause qu'elle est la plus insipide.

La Patate Vermeil est plutôt cultivée comme une curiosité, qu'à cause d'aucune bonne qualité qui lui soit particulière; sa couleur en dedans & en dehors est semblable à celle du vin rouge.



Convolvulus sc.

Anguis sc.







## MAGNOLIA altissima, flore ingenti candido.

### The Laurel Tree of Carolina.

 HESE Trees are commonly two Foot and an half, and sometimes three Feet in Diameter, rising with a strait Trunc, to the Height of eighty Feet and upwards, with a regular shaped Head. The Leaves are shaped like those of the *Lauro-cerasus*, but much larger, of a shining bright Green, except their under Sides, which are of a Russet red Colour, with a hoary roughnes, like Buff. This Particularity in the Leaves doth not appear before the Tree is large, the young ones having their Leaves green on both Sides. In *May* the Blossoms open, which are large, white and very fragrant, somewhat resembling in Form a single Peony: The Petals are usually ten, and sometimes eleven and twelve in Number; they are thick and succulent, in the midst of which is placed the *Ovarium*, closely surrounded with *Apices*, which before the Petals fall off, swells to the Size of a Pigeon's Egg, and when fully grown, is formed into an oval Cone, in Size of a Goose's Egg. It is green at first, but when ripe of a reddish Purple. On the Superficies are many little Protuberances, in each of which lies a single Seed, somewhat less than a Kidney Bean, covered with a red Film: In *August*, at which Time the Fruit is ripe, every one of these little Swellings openeth, and dischargeth its Seeds, which do not fall immediately to the Ground, but hang pendant by small white Threads, about two Inches long.

This stately Tree perfumes the Woods, and displays its Beauties from *May* till *November*, producing first its fragrant and ample Blossoms, succeeded by its glittering Fruit. It retains the Leaves all the Year, which being of two Colours have a pretty Effect, when waved by the Wind, displaying first one Side, and then the other.

What much adds to the Value of this Tree is, that it is so far naturalized and become a Denizon to our Country and Climate, as to adorn first the Garden of that worthy and curious Baronet, Sir *John Colliton*, of *Exmouth* in *Devonshire*, where for these three Years past, it has produced Plenty of Blossoms, since that and in the Year 1737, one of them blossom'd at *Parsons Green*, in the Garden of the Right Honourable Sir *Charles Wager*; one of which Blossoms expanded, measured eleven Inches over.

Their Native Place is *Florida* and *South Carolina*, to the North of which I have never seen any, nor heard that they grow.

### Laurier de la Caroline.



ES arbres ont ordinairement deux pieds & demi, & quelquefois trois pieds de diametre, il s'elevent à la hauteur de dix-huit pieds & au dessus, leur tronc est droit & leurs branches forment un bouquet regulier. Leurs feuilles ont la même figure que celles du Laurier-cerise; mais elles sont beaucoup plus grandes, d'un verd clair & vif, excepté que le dessous en est d'un rouge roux, & velu, comme un espece de Buflé; cette singularité des feuilles ne paroit que lorsque l'arbre est grand, car les feuilles des petits sont vertes des deux côtés. Les fleurs s'ouvrent en *May*, elles sont grandes, blanches, & de fort bonne odeur; elles ressemblent en quelque sorte à celles de *Pivoine simple*, elles sont ordinairement composées de dix pétales, quelquefois d'onze, & même de douze; lesquelles petales sont épaisses & succulentes; l'ovaire est placé au milieu, & entouré de sommets; avant que les petales tombent, il devient gros comme un œuf de pigeon, & quand il a fini de croître, il prend la forme d'un cône ovale, de la grosseur d'un œuf d'oye; il est verd d'abord, il devient ensuite rouge, avec un melange de verd; sa superficie est semée de petites éminences, dans chacune desquelles une semence est renfermée, un peu moins grosse qu'un Phasole, couverte d'une membrane rouge: Au mois d'*Aoust*, tems auquel le fruit est mûr, chacune de ces petites éminences s'ouvrent & laissent échaper sa semence; elle ne tombe pas pour cela immédiatement à terre, mais elle pend par un petit filet blanc, d'environ deux pouces de long.

Cet arbre magnifique parfume les bois & étale ses beautés depuis *May* jusques en *Novembre*, produisant d'abord ses grandes & odoriferantes fleurs, auxquelles succèdent ses fruits brillans. Il garde ses feuilles toute l'année, & comme elles sont de deux couleurs, elles produisent un effet fort agréable lorsqu'elles sont agitées par le vent, qui expose à la vue tantôt un de leur côtés, & tantôt l'autre.

Ce qui augmente encore beaucoup le mérite de cet arbre, c'est qu'il est si bien naturalisé dans notre Pays, & qu'il est si bien accommodé à notre climat, qu'il sert d'ornemens depuis trois ans, aux jardin de l'illustre & curieux Mr. Jean Colliton, Chevalier Baronet, demeurant à Exmouth, dans la Province de Devon; là où il étale ses belles fleurs en abondance depuis ce tems, & dans l'année 1737, il en a fleuri un autre à Parsons Green, dans le jardin de Mr. l'Admiral Charles Wager; une de ces fleurs entièrement ouverte avoit onze pouces de diamètre.

Ces arbres sont originaires de la Floride, & du Sud de la Caroline. Je n'en ai jamais vu dans le Nord de ce Pays, ni n'ai oui dire, qu'il y en eust.

*PUTORIUS Americanus striatus.*

*The Pol-Cat.*



HIS in Shape is not unlike our common Polcat, except that the Nose of this is somewhat longer: The Colour of all I have seen is black and white, tho' not always alike marked; this had a List of white, extending from the hind-part of the Head, along the Ridge of the Back, to the Rump, with four others, two on each Side, running parallel with it. When one of them is attacked by a Dog, to appear formidable, it so changes its usual Form, by bristling up its Hairs, and contracting its Length into a round Form, that it makes a very odd and terrible Appearance. This menacing Behaviour, however insufficient to deter its Enemy, is seconded by a Repulse far more prevailing, for from some secret Duct, it emits such fetid Effluviums, that the Atmosphere for a large Space round shall be so infected with them, that Men and other Animals are impatient till they are quit of it. This Stench is insupportable to some Dogs, and necessitates them to let their Game escape; others by thrusting their Noses into the Earth renew their Attacks till they have killed it, but rarely care to have more to do with such noisome Game, which for four or five Hours distracts them. The Indians notwithstanding esteem their Flesh a Dainty, of which I have eat, and found it well tasted. I have known them brought up young, made Domestick, and prove tame and very active, without exercising that Faculty, which Fear and Self-Preservation perhaps only prompts them to. They hide themselves in hollow Trees and Rocks, and are found in most of the Northern Continent of America. Their Food is Insects and wild Fruit.



*Putois.*

Elui-cy, par sa taille, n'est pas fort different de notre Putois commun, si ce n'est que son nez est un peu plus long, tous ceux que j'ay vus étoient noirs & blancs, quoqu'ils ne fussent pas marqués de la même manière, celui-cy avoit une raye blanche, qui s'étendoit depuis le derriere de la tête tout le long du milieu du dos, jusqu'au croupion, avec quatre autres rayes de chaque côté, qui lui étoient paralleles. Lorsqu'un de ces animaux est attaqué par un chien, pour paroître plus terrible il change si fort sa figure, herissant son poil, & se ramassant tout le corps, qu'il est presque tout rond, ce qui le rend étrange & affreux en même temps, cependant cet air menaçant ne suffisant pas pour épouvanter son ennemi, il emploie pour le repousser un moyen beaucoup plus efficace, car il jette de quelques conduits secrets une odeur si empestée, qu'il empoisonne l'air qui l'entoure fort loin autour de lui, si bien que hommes & animaux ont un grand empressement à s'en éloigner; il y a des chiens à qui cette puanteur est insupportable, & elle les oblige à laisser échapper leur proye; il y en a d'autres, qui en enfonçant leur nez dans la terre, renouvellent leurs attaques jusqu'à ce qu'ils aient tué le Putois, mais rarement dans la suite se soucient-ils de poursuivre un gibier si désagréable, qui les fait souffrir pendant quatre ou cinq heures. Les Indiens cependant en regardent la chair comme une délicatesse, j'en ai mangé & l'ai trouvée de bon goût. J'en ai vu qu'on a apprivoisé quand ils étoient encore petits, ils sont devenus doux & fort vivis, & ils n'exerçoient point cette faculté à laquelle la peur & l'intérêt de leur préservation les force peut-être d'avoir recours. Ils se cachent dans le creux des arbres, & les trous des rochers; on en trouve dans presque tout le continent septentrional de l'Amerique; ils se nourrissent d'insectes & de fruits sauvages.

*Pseudo-Phalangium ramosum.*

**T**HIS Plant trails on the Ground. The Top of each Stalk terminates in a single hollow Leaf, which clasps almost clofe, and from its Footstalk arises short round Pedicels, supporting the Flowers, which consist of two blue Petals, standing erect on one Side, and one very small white Petal lying flat facing them, enclosed by a Calyx of three Leaves; they contain several yellow Stamina, and are succeeded by a Seed Vessel, containing three Seeds.

**C**E TTE plante traîne à terre. L'extremité de chaque tige se termine en une seule feuille creuse, qui se ferme presque entièrement; il sort de la tige des pedicules courts & ronds; ils soutiennent des fleurs, lesquelles consistent en deux pétales bleus, placées tout droit d'un côté, & en une autre petite pétale blanche, couchée tout plat de l'autre côté; ces pétales sont renfermées dans un calice de trois feuilles; elles sont garnies de plusieurs étamines jaunes, & il leur succède des fruits qui contiennent trois séminces.

T. 86.







T. 63.



# LACERTUS omnium maximus, Crocodilus dictus.

## The Alligator.

HE Largeness, Strength, and terrible Appearance of this formidable Animal, occasioning it to be so often observed and described, I conceive it less necessary to be so particular in its description as otherwise I should be in so remarkable a Creature: I shall therefore endeavour to observe some Things which have been omitted by others. They are amphibious, and tho' the largest and greatest Numbers inhabit the Torrid Zone, the Continent abounds with them ten Degrees more North, particularly as far as the River Neus in Norib Carolina, in the Latitude of about 33, beyond which I have never heard of any, which Latitude nearly answers to the Northernmost Parts of Africa, where they are likewise found. They frequent not only salt Rivers near the Sea, but Streams of fresh Water in the Upper Parts of the Country, and in Lakes of salt and fresh Water, on the Banks of which they lie lurking among Reeds, to surprise Cattle and other Animals.

In Jamaica and many Parts of the Continent they are found above twenty Foot in Length: They cannot be more terrible in their Aspect than they are formidable, and mischievous in their Natures, sparing neither Man nor Beast they can surprize, pulling them under Water, that being dead, they may with greater Facility and without Struggle, or Resistance, devour them. As Quadrupeds do not so often come in their Way, they mostly subsist on Fish, but as Providence, for the Preservation, or to prevent the Extinction, of defenceless Creatures, hath in many Instances restrain'd the devouring Appetites of voracious Animals, by some Impediment or other, so this destructive Monster, by the close Connexion of the Joints of his Vertebrae, can neither swim nor run any other Ways than strait forward, and is consequently disabled from turning with that Agility, requisite to catch his Prey by Pursuit, therefore they do it by Surprise in the Water, as well as by Land; for effecting of which Nature seems in some measure to have recompensed their Want of Agility, by giving them a Power of deceiving and catching their Prey, by a Sagacity peculiar to them, as well as by the outer Form and Colour of their Body, which on Land resembles an old dirty Log or Tree, and in the Water frequently lies floating on the Surface, and there has the like Appearance, by which and his silent Artifice, Fish, Fowl, Turtle, and all other Animals are deceived, suddenly catch'd and devoured.

Carnivorous Animals get their Food with more Difficulty and less Certainty than others, and are often necessitated to fast a long Time, which a slow Concoction enables them to endure: Reptiles particularly, by swallowing what they eat whole, digest slowly, eat seldom, and live long without Food. Wolves are said to gorge themselves with Mud, to supply the Want of better Food; for the like Cause may Alligators swallow Stones and other Substances, to distend and prevent the Contraction of their Intestines when empty, and not to help Digestion, which they seem to be in no Need of. For in the greater Number of many I have opened, nothing has appeared but clumps of Lightwood and Pieces of Pine Tree Coal, some of which weighed eight Pounds, and were reduced and wore so smooth from their first angular roughness, that they seemed to have remained in them many Months. They lay a great Number of Eggs at one Time, in the sandy Banks of Rivers and Lakes, which are hatched by the Heat of the Sun, without further Care of the Parents. The young ones so soon as they are disengaged from their Shells, betake them to the Water and shift for themselves; but while young they serve as a Prey, not only to ravenous Fish, but to their own Species. It is to be admired that so vast an Animal should at first be contained in an Egg, no bigger than that of a Turkey.

In South Carolina they are very numerous, but the Northern Situation of that Country, occasions their being of a smaller Size than those nearer the Line, and they rarely attack Men or Cattle, yet are great Devourers of Hogs. In Carolina they lie torpid from about October to March, in Caverns and Hollows in the Banks of Rivers; and at their coming out in the Spring, make an hideous bellowing Noise. The Hind-part of their Belly and Tail are eat by the Indians. The Flesh is delicately white, but has so perfumed a Taste and Smell, that I could never relish it with Pleasure. The Figure here exhibited, represents the Size and Figure of an Alligator, soon after the breaking out of the Shell.

## Candela Americana, foliis Laurinis, flore tetrapetalo luteo, fructu angustiore.

### The MANGROVE TREE.

THESE Trees vary in Height, being in some Places twenty, in others above thirty Feet high, in Proportion to the Depth or Richness of the muddy Soil in which they grow. The Bark is smooth, of a light brown, in the smaller Branches inclining to red: The Leaves are somewhat like those of the Bay, with their middle Veins yellow, having Inch long Foot-stalks: The smaller Branches are jointed at the Distance of every Inch: The Flowers grow usually two or three together, and sometimes on single Foot-stalks, of two or three Inches in Length, having each four yellow Petals; which before they open are covered with a greenish Calyx, dividing into four Parts; the Flower is succeeded by green succulent Substances, in Form not unlike a Pear, at the small End of which hang a single Seed, about six Inches in Length, in Form of a Bobbin, with which Lace is made. These Seeds when they fall, are carried floating on the Water, and lodged on muddy Banks, where their larger Ends settle in the Mud, and take Root, the smaller Ends sprouting, as in the Figure. These Trees propagate not only by their Seeds in this Manner, but the smaller Branches falling into the Mud strike Root, and in a few Years become Trees, which increase in like Manner, and extend their Progress some Miles.

In shallow Salt Water these impenetrable Woods of Mangroves, are frequented by great Numbers of Alligators, which being too big to enter the closest Recesses of these Thickets, the smaller ones find a secure Retreat from the Jaws of their voracious Parents: These watery Woods are also plentifully studded with ravenous Fish, Turtles, and other Animals, which prey continually one upon the other, and the Alligators on them all, so that in no Place have I ever seen such remarkable Scenes of Devastation as amongst these Mangroves, in Andros, one of the Bahama Islands, where the Fragments of half devoured Carcasses were usually floating on the Water. They grow in most Parts of the Earth under the Torrid Zone, and are found but a little North or South of the Tropicks. The Hortus Malabaricus describes two or three Kinds, Vol. VI. p. 59. 61. 63. 65.

## Crocodile des Indes Occidentales.



A grandeur, la force & l'aspect terrible de cette animal reducible ayant donné lieu aux observateurs de le décrire si souvent, je crois que je suis en quelque sorte dispensé d'entrer dans un détail aussi particulier sur son sujet, que j'y serais obligé sans cela pour une creature si remarquable, je tâcheray donc de n'observer que les caractères qui ont échappé aux autres. Ils sont amphibiens, & quoique les plus grands nombre habitent la Zone Torride, il y en a beaucoup dans le Continent, dix degrés plus avant vers le Nord, particulièrement aussi loin que la Rivière Neus dans la Caroline septentrionale, environ au trente troisième degré de latitude, je n'ai jamais oui parlé d'aucun de ces animaux au delà. Cette latitude répond à peu près aux parallèles de l'Afrique les plus septentrionales, où on en trouve aussi. Ils fréquentent non seulement les rivières salées proche de la mer, mais aussi le courant des eaux douces plus avant dans les terres, & les lacs d'eaux salées & d'eaux douces. Ils se tiennent cachés sur leurs bords, parmi les rochers, pour surprendre le bétail & les autres animaux.

On en trouve à la Jamaïque, & dans plusieurs endroits du Continent de plus de vingt pieds de long: Quelque terrible que soit leur aspect, leur naturel en est encore plus mechant & plus à craindre, il n'épargne ni hommes ni bêtes, & lorsqu'ils peuvent les surprendre il les tire sous l'eau, afin de les tuer, pour pouvoir ensuite les dévorer avec plus de facilité, & plus à leur aise. Comme les Quadrupèdes ne s'exposent pas souvent à leur attaque, ils se nourrissent presque toujours du poisson; de même que la Providence a restreint dans plusieurs cas la voracité des animaux carnassiers en vue d'empêcher la destruction de ceux qui sont sans défense, ainsi ce monstre destructeur, par la connection serrée des jointures de ses vertèbres, est empêché de nager ou de courir qu'en ligne droite, & par conséquent il ne peut se tourner avec l'agilité nécessaire pour attraper sa proie en la poursuivant, c'est pourquoi ils ne s'en saisissent que par surprise, soit dans l'eau, soit sur la terre: Il semble que la nature ait en quelque sorte compensé leur manque d'agilité à attraper leur proie, en leur donnant le pouvoir de s'en rendre maître par adresse, & pour cela elles les douent d'une sagacité singulière, oultre que leur corps par sa forme extérieure, & par sa couleur ressemble sur terre à une vieille bûche sale, & qu'il flotte souvent sur la surface de l'eau où il paraît de même comme un tronc d'arbre: Cet apparence, & le silence de cet animal artificieux trompent le poisson, les oiseaux, les tortues de mer, & tous les autres animaux, facilite au Crocodile le moyen de s'en saisir & de les dévorer.

Les animaux carnassiers attrapent leur nourriture avec plus de difficulté & d'incertitude que les autres, ils sont souvent obligé de seurer pendant long tems, à quoy la lenteur de leur digestion les rend très propres. Les reptiles en particulier qui avalent ce qu'ils mangent tout entier, digèrent lentement, mangent rarement, & vivent long tems sans prendre de nourriture. On dit que les Loups se remplissent de fange pour suppléer à une meilleure nourriture; c'est pour la même raison que les Crocodiles peuvent avaler des pierres & d'autres substances pour étendre leurs intestins, & empêcher qu'ils ne se contractent lorsqu'ils sont vidés, & non pas pour aider à leur digestion, secours dont ils ne semblent pas avoir besoin; car dans la plus grande partie de ceux que j'ai ouverts, je n'y ai trouvé que des morsceaux de bois raviné, & de charbons de Sapias, dont quelques pieces pesaient jusqu'à huit livres; leur surface inégale s'étoit tellement usée & étoit devenu si poros qu'il sembloit qu'ils y avoient demeuré plusieurs mois; ils pondent un grand nombre d'œufs à une fois sur les bords sableux des rivière & des lacs; ces œufs délorent par la chaleur du soleil, sans que leurs parents en prennent d'autres soins; aussi-tot que les petits sont éclor ils courent à l'eau & pouvoient eux-mêmes à leur nourriture, mais lorsqu'ils sont encore jeunes ils sont la proye non seulement des poissons voraces, mais des Crocodiles mêmes. Il est surprenant qu'un si grand animal soit contenu d'abord dans un œuf, qui n'est pas plus gros, que celui d'un porle d'Indes.

Il y en a un grand nombre dans le Sud de la Caroline, mais la situation septentrionale de ce pays, fait qu'ils sont de plus petite taille que ceux qui naissent plus proche de la Ligne, & qu'ils attaquent rarement les hommes ou les bestiaux, cependant ils sont grands mangeurs de cochons. A la Caroline ils demeurent engourdis dans des cavernes & des trous sur le bord des rivieres, depuis environ le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mars, & lorsqu'ils en sortent au printemps, ils migrent d'une manière effroyable. Les Indiens mangent la partie postérieure du ventre de ces animaux & leur queue. La chair en est d'une blancheur délicate, mais elle a un goût & une odeur de parfum si forte que je n'ai jamais pu en manger avec plaisir. La figure cy-jointe représente un Crocodile de la même grandeur qu'il est peu de tems après être éclor.

## Arbre des Banianes.

CES arbres croissent inégalement, on en trouve en quelques endroits de vingt pieds. En d'autres de plus de trente pieds de haut, à proportion de la profondeur ou de la force de terrain sanguin ou ils sont plantés; l'écorce est unie d'un brun clair, qui pâche un peu vers le rouge dans les petites branches; les feuilles ressemblent un peu à celles du Laurier, la veine du milieu en est jaune, & les pedicules d'un pouce de long; les plus petites branches ont des nœuds, à chaque pouce de distance les fleurs naissent, ordinairement deux ou trois ensemble, & quelques-unes bacunes a sa forme particulière de deux ou trois pouces de long; elles ont quatre pétales jaunes: avant qu'elles s'ouvrent elles sont converties d'un calice verdâtre, qui se divise en quatre parties; et leur face des substance vertes succulentes, qui ressemblent assez à une poire, il pend à leur petit bout une seule semence d'environ six pouces de long, à peu près de la forme d'un fuseau à dentelle: lorsque ces semences tombent, elles sont portées sur l'eau vers les bords sanguins, dans lesquelles elles se fixent sur leur bout le plus gros & y prennent racine, leur petit bout poussant, comme il est représenté dans la figure. Ces arbres ne se multiplient pas seulement par leur semence, comme je viens de l'écrire, mais leurs petites branches tombent dans la vase, y prennent racine, & en peu d'années deviennent des arbres, qui se multiplient de même, & qui occupent quelques milliers de terrains.

Dans les eaux bâties salées ces bois impenetrables d'arbres de Banianes, eachent un grand nombre de Crocodiles, qui étant trop gros pour penetrer dans le plus épais de ces buissons, les plus petits y trouvent un asyle sûr, contre la voracité de leurs cruel parents. Ces forêts d'eau sont aussi remplies d'une grande quantité de poissons voraces, de tortues, & d'autres animaux qui cherchent continuellement à se dévorer les uns des autres, & de Crocodiles, qui les mangent tout tant qu'ils sont, c'est-à-dire que je n'y ouis nulle part tant de marque de carnage que parmi ces arbres des Banianes, à Androne une des îles Bahama, où les fragmens de Carrapate à demi dévorée flottent ordinairement sur l'eau. Ils croissent préférant pour tout sous la Zone Torride, & l'on n'en trouve guères au delà des Tropiques. Le Hortus Malabaricus en décrit deux ou trois espèces, Vol. VI. p. 59. 61. 63. 65.

*LACERTUS INDICUS*, Senembi & Iguana dictus.  
Raii, Synop. Quad. p. 265.

*The Guana.*



HIS Kind of Lizard somewhat resembles the Crocodile or Alligator in Shape, but has a shorter Head, and a serrated Crest on the Ridge of the Back, extending from behind its Head to the middle of the Tail. They are of various Sizes, from two to five Feet in Length, their Mouths are furnished with exceeding small Teeth, but their Jaws are armed with a bony Beak, with which they bite with great Strength: They inhabit warm Countries only, and are rarely to be met with any where North, or South, of the Tropicks. Many of the Bahama Islands abound with them, they nestle in hollow Rocks and Trees; their Eggs have not an hard Shell, like the Eggs of Alligators, but a Skin only, like those of Turtle, and are esteem'd good Food; they lay a great Number of them at a Time in the Earth, which are there hatched by the Sun's Heat. These Guana's are a great Part of the Subsistence of the Inhabitants of the Bahama Islands, for which Purpose they visit many of the remote Keys and Islands in their Sloops to catch them, which they do by Dogs trained up for that Purpose, which are so dexterous as not often to kill them, which if they do, they serve only for present spending; if otherwise they few up their Mouths to prevent their biting, and put them into the Hold of their Sloop till they have catched a sufficient Number, which they either carry alive for Sale to Carolina, or salt and barrel up for the Use of their Families at Home. These Guana's feed wholly on Vegetables and Fruit, particularly on a Kind of Fungus, growing at the Roots of Trees, and of this and others of the Anona Kind. Their Flesh is easy of Digestion, delicate, and well tasted; they are sometimes roasted, but the more common Way is to boil them, taking out the Leaves of Fat, which they melt and clarify; this they put into a Calabash or Dish, into which they dip the Flesh of the Guana as they eat it: It is remarkable that this Fat which adheres to the Inside of the Abdomen, imbibes the Colour of the Fruit they last eat, which I have frequently seen tinged with pale red, yellow, and sometimes of a purple Colour, which last was from eating the *Prunus Maritima*, which Fruit at the same Time I took out of them. Tho' they are not amphibious, they are said to keep under Water above an Hour: When they swim they use not their Feet, but clasp them close to their Body, and guide themselves with their Tails: They swallow all they eat whole. They cannot run fast, their Holes being a greater Security to them than their Heels. They are so impatient of Cold, that they rarely appear out of their Holes, but when the Sun shines.

*Le grand Lezard, ou Guannas.*



ETTE espèce de Lezard ressemble un peu par sa taille au Crocodile, mais il a la tête plus courte & la partie la plus éminente de son dos est garnie d'une crête dentelée, qui s'étend depuis le derrière de la tête, jusqu'au milieu de la queue; ils sont de diverses grandeurs depuis deux jusqu'à cinq pieds de long, leur bouche est garnie de très petites dents, mais leur mâchoires sont formées en bec osseux, avec lequel ils mordent d'une grande force: Ils n'habitent que les pays chauds, & on n'en trouve que rarement soit au Nord, soit au Sud au delà des Tropiques, il y en a beaucoup dans plusieurs des îles Bahama: ils font leurs nids en des trous de rochers & d'arbres; leurs œufs n'ont point de coque dure comme ceux des Crocodiles, mais une simple peau comme les œufs de Tortues, & ils sont bons à manger: Ils en pondent un grand nombre à la fois dans la terre, que la chaleur du soleil y fait éclore. Ces Lezards fournissent aux habitans des îles Bahama, une bonne partie de leur subsistance: ils vont dans leurs chaloupes visiter la pluspart des îles les moins fréquentées, & des quays les plus éloignés, pour attraper ces animaux, ce qu'ils font par le moyen de chiens, qui sont dressés à cela, & si adroits qu'ils les tuent rarement, parce que s'ils le faisaient, ils seraient obligés de les manger sur le champ: Lorsqu'ils les prennent en vie ils leur couvrent la bouche pour les empêcher de mordre, & les mettent au fond de cale de leurs chaloupes, où ils les laissent jusqu'à ce qu'ils en aient pris suffisamment, ensuite, où ils les portent vendre tous en vie à la Caroline, où ils les salent & les mettent en baril pour l'usage de leur familles: Ces Lezards se nourrissent entièrement de végétaux & de fruits, & ils aiment sur tout une espèce de champignon qui croît au pied de arbres des Banianas & d'Anona. La chair en est d'une bonne digestion, delicate & de bon goût, quelquefois on les rotit, mais la manière la plus commune est de les bouillir en étant la graisse, que l'on fait fondre & que l'on clarifie; on la met ensuite dans un calabasse, ou dans un plat, & où l'on y trempe la viande, à mesure qu'on la mange; il est à remarquer que cette graisse, qui est attachée au dedans du ventre, s'imbibe de la couleur du fruit, qu'ils ont mangé le dernier, je l'ai souvent vu tinsé d'un rouge pâle, de jaune, & quelquesfois de violet, cette dernière couleur lui a été donnée par le fruit nommé *Prunus Maritima*, que je leur attrrois en même tems du corps. Quoiqu'ils ne soient pas amphibia, ils peuvent rester, à ce que l'on dit, plus d'une heure sous l'eau; ils ne servent point de leurs pieds pour nager, qu'ils tiennent pendant ce tems-là collés à leur corps & ils ne se conduisent qu'avec la queue, ils avancent tout entier tout ce qu'ils mangent; ils ne sauroient courir fort vite, & leurs trous les mettent plus en sûreté que la vitesse de leur jambes: Ils craignent fort le froid, qu'ils ne sortent guères de leurs trous, que lorsque le soleil brille.

*ANONA maxima, foliis latis fructu maximo luteo conoïde, cortice glabro.*

THIS Shrub or small Tree grows to the Height of about sixteen Feet, with a small Trunc, and smooth greenish Bark, the Leaves thick, stiff, and shaped like those of a Limon, the Flowers I did not see. The Fruit is in Size and Form of the Figure, covered with a smooth yellowish green Skin. The Pulp or Flesh of the Fruit of the Consistence of a ripe Pear, containing many conic brown Seeds: This is an eatable Fruit, very sweet, but somewhat insipid, yet it is the Food of Guana's and many other wild Creatures.

CET arbrisseau s'eleve jusques à environ seize pieds de hauteur, son tronc est menu, son écorce verdâtre & lisse, la feuille épaisse, roide & de la même forme que celle du citronnier. Je n'ai point vu les fleurs. Le fruit est de la forme qu'il est représenté dans la figure, couvert d'une peau douce d'un vert jaunâtre; la pulpe ou la chair du fruit est de la consistance d'une poire mure, elles contiennent plusieurs semences coniques brunes; il est bon à manger, fort doux, mais un peu insipide, cependant c'est la nourriture des Lezards, & de plusieurs autres animaux sauvages,

T.64.



Lacertus Ind:

Anona





T. 65.



# LACERTUS VIRIDIS CAROLINENSIS.

## The Green Lizard of Carolina.



HESE Lizards are usually about five Inches long, of a dusky green Colour. They frequent Houses, are familiar and harmless, and are suffered with Impunity to sport and catch Flies on Tables and Windows, which they do very dexterously, and no less divertingly. They appear chiefly in Summer, and at the Approach of cold Weather, they retreat to their Winter Recesses, and lie torpid in the Hollows and Crevices of rotten Trees. These Lizards change their Colour in some Measure, like the Camelion, for in a hot Day their Colour has been a bright Green, the next Day changing Cold, the same Lizard appeared brown. They are a Prey to Cats, and ravenous Birds. It frequently happens that a few warm Sun-shiny Days so invigorates them, that they will come out of their Winter Retirements and appear abroad, when on a sudden the Weather changing to Cold, so enfeebles them, that they are incapacitated to creep to their Winter Holes, and die of Cold.

## Lezard verd de la Caroline.



ES Lezards ont ordinairement cinq pouces de long, ils sont d'un verd foncé, ils frequentent les maisons, sont familiers, & ne font point de mal; on les laisse jouer & attraper des mouches sur les tables & sur les fenêtres, ce qu'ils font avec beaucoup d'adresse, & d'une maniere fort divertissante. Ils ne paroissent guères qu'en été, & ils se retirent aux approches du froid dans leur retraite d'hiver, savoir les trous & les crevasses des arbres pourris, là où ils restent engourdis pendant cette saison. Ces Lezards changent leur couleur presque comme le Cameleon, car dans un jour chaud ils paroissent d'un verd brillant, & le lendemain s'il fait froid, le même Lezard paraît brun: Ils sont la proye des Chats & des Oiseaux de proye; il arrive souvent que quelques jours chauds & seraient les ranime si bien, qu'ils sortent de leur retraite d'hiver, & paroissent debors, en suite le tems devenant froid tout d'un coup, les rend si faibles, qu'ils n'ont pas la force de rentrer dans leurs trous, & qu'ils meurent de froid.

# LIQUID-AMBARI Arbor, seu Styraciflua, Aceris folio, fructu Tribuloïde, i.e. Pericarpo orbiculari ex quam plurimis apicibus coagmentato, semen recondens. Plukenet. Almagest. Bot. pag. 224. Phytogr. Tab. 42. Fig. 6.

## The SWEET GUM-TREE.

THE Trunc of this Tree is commonly two Foot in Diameter, strait and free from Branches to the Height of about fifteen Feet; from which the Branches spread and rise in a Conic Form to the Height of Forty Feet and upward from the Ground. The Leaves are five-pointed, being divided into so many deep Sections, and are set on long slender Pedicles. In February, before the Leaves are formed, the Blossoms begin to break forth from the Tops of the Branches into Spikes of yellowish red, pappous, globular Flowers, which when the Apices are blown off by the Wind, swell gradually, retaining their round Form, to the full Maturity of their Seed Vessels, which are thick set with pointed hollow Protuberances, and splitting open discharge their Seeds, each Cell containing a Seed, winged at one End with many small Grains, distinct from the Seed.

The Wood is good Timber, and is used in Wainscoting, &c. The Grain is fine, and some of it beautifully variegated, and very fit for curious Works in Joinery, but when wrought too green, is apt to shrink and fly from its Joints, to prevent which no less than eight or ten Years is sufficient to season its Planks; yet the regular Form and Beauty of this Tree deserves the Regard of the Curious, none of the American Trees affecting more our Soil and Climate. From between the Wood and the Bark of this Tree issues a fragrant Gum, which trickles from the wounded Trees, and by the Heat of the Sun congeals into transparent resinous Drops, which the Indians chew, esteeming it a Preservative of their Teeth: The Bark is also of singular Use to them for covering their Houses, which has frequently given me an Opportunity of gathering the Gum from Trees so strip'd of their Bark, one of which would yield an Hat full of Gum. This Gum smells so like the Balsam of Tolu, that it is not easy to distinguish them.

LE tronc de cet arbre a communement deux pieds de diamètre, il est droit & sans branches jusqu'à la hauteur d'environ quinze pieds, là où les branches commencent à s'étendre & s'élèvent, en formant un cône, jusqu'à la hauteur de quarante pieds & plus, depuis la terre: Les feuilles ont cinq pointes, étant divisées en autant de sections, & elles sont attachées à de longues queues minces: au mois de Fevrier, avant que les feuilles soient formées, les fleurs commencent à sortir des extrémités des branches, en épis, d'un rouge jaunâtre, à aigrettes & en grêlots: lorsque le vent en a emporté les sommets elles s'enfent peu à peu, gardant leur figure ronde jusqu'à la parfaite maturité des vaisseaux qui contiennent la semence, ils sont couverts de protubérances pointues, qui se fendent, s'ouvrent, & laissent tomber les semences. Ces vaisseaux sont composés de plusieurs cellules, chaque cellule contient une seule semence ailée, avec quantité de petits grains, qui diffèrent entièrement de la semence.

Le bois en est propre à la charpente, on s'en sert à boiser, &c. Le grain en est fin, & il y en a de marbré d'une maniere fort agréable & propre aux plus beaux ouvrages de menuiserie; mais quand on l'emploie avant qu'il soit bien sec, il est sujet à se retirer & à se déjouer; pour prévenir cet inconvenienc il en faut garder les planches huit ou dix ans au moins: Cependant la beauté & la forme régulière de cet arbre mérite l'attention des Curieux, sur tout, n'y ayant aucun arbre de l'Amérique qui se plaise plus dans notre climat: Il sort d'entre le bois & l'écorce de cet arbre une gomme odoriferante, qui s'écoule des playes que l'on fait aux arbres, & qui se condense par la chaleur du soleil en larmes transparentes: Les Indiens la mangent, croyant que c'est un préservatif pour leurs dents; son écorce leur est aussi fort utile pour couvrir leurs maisons, ce qui m'a donné souvent occasion de ramasser cette gomme sur les arbres qu'on avoit ainsi dépouillés de leurs écorces, dont un seul pourroit en fournir plein un chapeau; cette gomme a une odeur si pareille à celle du Beaume de Tolu, qu'il n'est pas aisé de les distinguer.

*LACERTUS VIRIDIS JAMAICENSIS.**The Green Lizard of Jamaica.*

 **H**IS Lizard is usually six Inches long, of a shining grass green Colour. It is common in *Jamaica*, frequenting Hedges and Trees, but are not seen in Houses that I observed. When they are approach'd to, they by filling their Throat with Wind swell it into a globular Form, and a scarlet Colour, which when contracted the red disappears, and returns to the Colour of the rest of the Body. This swelling Action seems to proceed from menacing, or deterring one from coming near him, tho' they are inoffensive.

*Lezard verd de la Jamaique.*

**E** Lezard est ordinairement long de six pouces, d'un verd d'herbe fort vif, il est commun à la Jamaïque; il se tient dans les hayes & dans les arbres, mais je n'ai point observé qu'on en voie dans les maisons; quand on en approche ils enflent leur gozier, comme une boule, en le remplissant de vent, & alors il paroissent d'un rouge vif; mais cette couleur disparaît, lorsqu'ils se contracte, & il redevient de la même couleur que le reste du corps: Il semble que cette enflure a pour but de menacer ou d'épouvanter, pour empêcher qu'on n'approche de lui, quoiqu'il ne soit point dangereux.

*LIGNUM CAMPECHIANUM; species quædam Brasil.* Joh. de Laet.  
Sloane, Hist. Jamaic. Vol. II. p. 183.

**LOGWOOD.**

**I**N the Year 1725, I saw three of these Trees in the Island of *Providence*, which were raised from Seeds brought from the Bay of *Honduras*, by Mr. *Spatcher*, a Person of more than common Curiosity. He told me they were of three Years Growth, from the Seeds, they were then about fourteen Feet high; their Trunks strait, and about seven or eight Inches thick; their Heads branching regularly, and being in full Blossom, made a beautiful Appearance. The Leaves are pinnated, consisting of four, and some five Pair of Lobes, set opposite to each other, and are in Shape of an Heart: From the Tops of the Branches shoot forth many Spikes of small pentapetalous yellow Flowers, every one of which before it opens, is covered with a purple *Calyx*. The Flowers are succeeded by small flat Pods, about two Inches long, which when ripe split open in the middle, and disclose five or six small flat Seeds.

The bloody Disputes which this useful Tree has occasioned between the *Spaniards* and *English* are too well known to say much of here, only I could wish that the Inhabitants of our Southern Plantations could be induced to propagate it, as well for their own Advantage, as that we may be supplied by them, when wholly deprived of getting it from the *Spaniards*, as we have hitherto done either by Force or Stealth.

If upon a Rock these Trees will in four Years bear Seeds, and grow to the Thickness of eight Inches, a much quicker Progress may be expected when planted in a deep moist Soil, which *Jamaica* and many other of our Islands abound in.

**Bois de Campêche.**

**E**N l'année 1725 je vis trois de ces arbres à l'Isle de la Providence, ils étaient venus de l'île apportée du Golfe d'Honduras par Monsieur *Spatcher*, homme extrêmement curieux; il me dit qu'il y avait quatre ans qu'on les avait semés; ils avaient alors environ 14 pieds de hauteur, leurs troncs étaient droits, & de sept ou huit pouces de diamètre; leurs branches s'étendant régulièrement, & leurs fleurs étant alors dans leur perfection, ils faisaient un très bel effet, leurs feuilles crenelées consistaient, quelqueunes de quatre, d'autres de cinq paires de lobes, placés vis à vis les uns des autres; elles ont la figure d'un cœur: il sort du bout des branches plusieurs épis de petites fleurs jaunes, à cinq feuilles, dont chacune avant de s'ouvrir est couverte d'une calice violet, à ces fleurs il succède de petites coques plates, d'environ deux pouces de long; lorsqu'elles sont mûres elles s'ouvrent en se fendant par le milieu, & laissent voir cinq ou six petites semences plates.

On fait trop quelles terribles démolies cet arbre si utile, a causé entre les Espagnols & les Anglois, pour m'y étendre beaucoup ici, je souhaite seulement que les habitans de nos plantations méridionales fussent engagés à multiplier, & à cultiver cet arbre autant pour leur avantage, qu'afin de pouvoir nous le fournir, quand par force ou par finesse nous ne pourrons plus en avoir des Espagnols, comme nous avons fait jusqu'à présent: Si sur un rocher ces arbres en quatre ans de tems portent des semences, & grossissent jusqu'à huit pouces de diamètre, on doit croire, qu'ils croiront encore bien plus vite, étant plantés dans un terroir humide & profond, tel qu'il y en a beaucoup à la Jamaïque & dans plusieurs autres de nos îles.







T. 67.



*Lacertus cauda carulea.*

Ac

dc

## LACERTUS CAUDA CÆRULEA.

## The Blue-Tail Lizard.

**H**IIS Lizard is usually small, seldom exceeding six Inches in Length, the Head short, the Tail is blue, the rest of the Body brown; except that from the Nose runs five yellow Lines at equal Distances, along the Back to the Tail. They are seen often on the Ground, and frequent hollow Trees. Some People suspect them to be venomous, tho' I never heard of an Instance to confirm it. They are found in *Virginia* and *Carolina*.

## Lezard à la queuë bleue.



*E* Lezard est ordinairement petit, n'ayant guères que six pouces de long; sa tête est courte, sa queuë bleue, & le reste du corps brun, excepté qu'il y a cinq lignes jaunes qui s'étendent depuis le nez parallèlement le long du dos jusques à la queuë; on les voit souvent sur la terre, & ils frequentent les arbres creux. Il y a des gens qui les soupçonnent d'être venimeux; quoysque je n'aye jamais oüï parler d'accident qui confirme cette opinion. On les trouve à la Virginie & à la Caroline.

## ANONA fructu viridi lævi, Pyri inversi forma.

**T**HIS Shrub grows usually to the Height of about ten or twelve Feet, the Branches grow with Bindings; at the Distances of two Inches from one another, at the Angles of which shoot forth its Leaves alternately, which in Shape are like those of the Bay-Tree, with very short Footstalks. The Flowers hang single on Footstalks, about an Inch long, and are composed of six Petals, viz. Three which are round and white, and three larger green ones, which are pointed, and cover the round ones: In the middle of the Flower appears the Ovarium, encircled with pappous yellow Stamina. The Flower when spread open is in Form of a Triangle: The Fruit is in Form somewhat like a Pear inverted, and as big as One of the largest Size, covered with a smooth green Skin, which contains a Pulp like that of an over ripe Pear; with many conic dark brown Seeds, placed at Distances within the Fruit. These, with most of the other Kinds of *Anona*, are Food for *Guana's*, smaller Lizards, and other Animals: These are Natives of *Hispaniola*, *Ilathera*, *Andros Isles*, &c. but nowhere North of the Northern Tropic.

The Fruit of some of the Sorts of *Anona* have from their Taste obtained among the English the Names of Custard Apple, Sugar Apple, and Sour Sops.

**C**ET arbrisseau s'élève ordinairement à la hauteur de dix ou douze pieds; les branches croissent avec des coudes éloignés de deux pouces, l'un de l'autre: des angles desquels naissent des feuilles alternes, qui ressemblent par leur forme à celle du Laurier, & dont les queuës sont très courtes: Les fleurs pendent, chacune par un pedicule d'environ un pouce de long, elles sont composées de six pétales, dont trois sont rondes & blanches, & trois autres plus grandes sont vertes & pointuës, & couvrent les rondes; l'ovaire paraît au milieu de la fleur, entouré d'étamines jaunes & à aigrettes, lorsque la fleur est entièrement ouverte elle est triangulaire; leur fruit ressemble un peu à une poire renversée, & il est de la taille d'une des plus grosses, il est couvert d'une peau verte & lissée, qui renferme une pulpe semblable à celle d'une poire trop mure, & plusieurs séminces coniques d'un brun foncé, éloignées les unes des autres dans le fruit. Cette espèce d'*Anona*, comme la plupart des autres, sert à nourrir les *Guannas*, les petits *Lezards* & d'autres animaux. Elle est originaire des îles St. Domingue, Ilathera, Andros, &c. mais on n'en voit nulle part au delà du Tropique septentrional.

Les fruits de quelques espèces d'*Anona* ont été nommés par les Anglois, à cause de leur goût, pommes de sucre, pommes de crème, pommes aigres.

## LACERTUS GRISSEUS.

## The Lyon Lizard.



HESE Lizards are usually five or six Inches long; they are all over of a gray Colour, but streaked with Lines of a lighter gray; the Legs are long. It cocks its Tail with a round twirl, and looks fierce, from which it may perhaps have taken its *English* Name. They are inoffensive, frequenting the Rocks on the Sea Shores of *Cuba*, *Hispaniola*, &c. They are nimble, and run with surprising Swiftnes, yet are a Prey to Sea Gulls and other ravenous Birds.



## Lezard-Lyon.

ES Lezards sont ordinairement longs de cinq ou six pouces, ils sont tous gris, avec des rayes d'un gris plus clair, ils ont les jambes longues; ils redressent leur queue, en la tournant en rond, & ils ont l'air fier; c'est peut-être de là qu'ils tirent leur Nom Anglois. Ils ne sont point dangereux, ils se tiennent dans les rochers sur le bord de la mer des Isles Cuba, St. Domingue, &c. Ils sont agiles, & courrent d'une vitesse surprenante, cependant ils sont la proye des Moëtes: & d'autres oiseaux de proye.

## VISCUM Caryophylloides, foliis longis in apice incisis, floris labello albo trifido, petalis luteis, longis angustissimis.

THESE Plants usually grow to the Height of about eighteen Inches, with one, and sometimes two upright Stalks, bearing long Leaves, notched at the Ends, alternately placed on them, the Foot or Basis of the Leaf encompassing the Stalk; on the Top of this Plant shot forth two Footstalks, on one was placed a Flower, and on the other a Seed Vessel, fully formed. The Flower consisted of five long narrow yellow Petals, placed on the Ovarium, whick was long and swelling towards the upper End, of a pale green Colour: From the Center of the five Petals, grew a cylindrical succulent white Stem, from the Top of which shot forth three other white Petals, the middlemost of which was longest. At the End of the other Footstalk was formed a Seed Vessel, in Shape not unlike a Nine-pin, having four prominent Ribs extending from End to End, at equal Distances, in which were many small Seeds, divided by thin Membranes, and the withered Flower remained at the Top.

CES plantes croissent ordinairement jusques à la hauteur de dix huit pouces, avec une, & quelquefois deux tiges, toutes droites, garnies de feuilles alternes, longues, & entaillées à leur extrémité; la base de la feuille embrasse la tige; du haut de cette plante naissent deux pedicules, dont l'un soutient une fleur, & l'autre un fruit dans sa perfection. La fleur étoit composée de cinq pétales jaunes, longues, & étroites, placées sur un ovaire long, & s'enfiant vers son sommet, d'un vert pâle; il s'elevoit du centre de ces cinq pétales une tige blanche, cylindrique & succulente, qui portoit à son extrémité trois autres pétales blanches, dont celle du milieu étoit la plus longue; l'autre tige portoit à son extrémité un fruit, dont la forme ressemble assez à une quille, étant garni de quatre côtes éminentes, qui s'étendent d'un bout à l'autre, placées à distances égales, & divisées par des membranes minces; la fleur toute fanée étoit encore attachée au haut de ce fruit.

T. 68.







T. 69.



*Rana Terrestris*

*Sarracena*

## RANA TERRÆ STRIS.

## The Land Frog.



HE Back and Upper-part of this Frog is gray, and thick spotted with dark brown Spots; the Belly dusky white, and faintly spotted: The *Irides* of the Eyes red. They vary somewhat in Colour, some being more gray, others inclining to brown: Their Bodies are large, resembling more a Toad than a Frog, yet they do not crawl as Toads do, but leap; they are seen most in wet Weather, yet are very frequent in the higher Lands, and appear in the hottest time of the Day: They feed on Insects, particularly of one Kind, which the following Accident seems to confirm. As I was sitting in a sultry Evening, with some Company without Doors, one of us let fall from a Pipe of Tobacco some light burning Ashes, which was immediately catched up and swallowed by a Frog of this Kind. This put us upon tempting him with a red hot Wood Coal, not less than the End of ones Finger, which he also swallowed greedily; thus afterwards I always found one or other of them easily deceived in this Manner, as I imagine, by taking it to be a *Cicindela*, or *Fire-Fly*, which in hot Nights are very numerous in *Virginia* and *Carolina*, where also these Frogs abound.



## Grenouille de Terre.

*E* dos & le dessus de cette Grenouille sont gris, & tachetés de marques d'un brun obscur, fort proche les unes des autres, le ventre d'un blanc sale & légèrement marqué; l'Iris rouge; elles varient quelquesfois par rapport à la couleur, les unes étant plus grises, les autres penchent vers le brun, leurs corps sont gros, & ressemblent plus à un Crapeau qu'à une Grenouille, cependant elles ne rampent pas comme les Crafaux, mais elles sautent. On en voit davantage dans les tems humides, elles sont cependant fort communes dans les terres élevées, & paroissent dans le temp le plus chaud du jour; elles se nourrissent d'Insectes, sur tout d'une certaine espèce, ce que le fait, que je vais rapporter, semble confirmer. Étant un soir hors de la maison par une tems fort chaud avec plusieurs personnes, un de la compagnie laissa tomber de sa pipe un peu de tabac brûlant, qui fut d'abord attrapé & avalé par une Grenouille de cette espèce; cela nous donna l'idée de lui présenter un charbon de bois bien allumé, gros comme le bout de mon doigt, qu'elle avala aussi avec avidité, & j'ay constamment éprouvé depuis que les autres étoient aisement trompée de la même maniere; je m'imagine qu'elles prennent ces charbons pour un des Vers luisants, que l'on voit en grand nombre pendant les nuits chaudes à la Virginie, & à la Caroline, là où il y a aussi le plus de ces Grenouilles.

SARRACENA, foliis longioribus & angustioribus; Bucanephylon elatius  
Virginianum, &c. Pluk. Alm. p. 72. T. 152. f. 3.

AS this and the following Plate exhibit two Plants of the same Genus, and which in many Parts of their Structure agree with the Description of each other, I found it necessary to refer from one to the other in order to explain some Parts, which are not alike displayed in both Plates, and consequently cannot give to perfect an Idea without such Reference.

The Leaves of this Plant are tubulous, and ribbed, arising from a knotty fibrous Root, to the Height of about three Feet; they are small at the Root, widening gradually to the Mouth of the Tube, which in young Leaves are closed, but open by Degrees, as the Leaf increaseth, and when near its full Growth arches over the Mouth of the Tube, in Form of a Fryar's Cowl, Fig. 1. This Cowl expands itself till the Leaf is at full Bigness, having its Inside of a greenish Yellow, veined with Purple, Fig. 2, yet retaining somewhat the Position it first had, by hanging over the Mouth of the Tube, which otherwise would be filled with Rain, and fall by the Weight of Water, it being of a thin Substance, and of a yellowish green Colour; The Flowers, which hang inclining, grow each on a single Foot-stalk, of between two and three Feet high, springing from the Root, in like Manner with the Leaves. While the Flower is in bloom, many small yellow *Apices*, hanging by Threads, surround the *Ovarium*, to which is fixed by a *Stylus*, a pentagonal thin Membrane, in Form of a Shield, hanging horizontally; between the Intercelles of which hang five thin Petals, growing from the Basis of the *Ovarium*: On the Top is placed the *Calyx* divided into five Sections, and compleats the whole Flower, which remains not long in this perfect State, for the five Petals, after continuing a Day or two, fall off, leaving the Remains of the Flower, which continue several Months in the State and Form represented in the next Plate, Fig. 3. The *Capsula* or Seed Vessel incloses a Core, from which it separates when the Seeds are ripe, and divides into five Parts, each of which is again divided by a thin Membrane, by which ten Cells are formed, in which the Seeds lie: Fig. 4, shews the under Part of the Flower, as it appears when spread open, with the Shield reflected, resembling somewhat the Seat of a Side-Saddle, from which in *Virginia* it has received its Name of Side-Saddle Flower. These Plants grow in Bogs and watery Places in *Carolina*, *Virginia*, *Maryland* and *Pensylvania*.

*C*OMME cette planche & la suivante représentent des plantes du même genre, & dont plusieurs parties conviennent dans leur structure; j'en cru qu'il étoit à propos de renvoyer d'une planche à l'autre dans la description, afin de faire mieux connaître quelques parties qui ne sont pas également bien représentées dans les deux planches, & qui ne peuvent par conséquent en donner une idée si exacte sans un pareil renvoi.

Les feuilles de cette plante sont tubulaires & à côtes, elle s'élève d'une racine noire & fibreuse, à la hauteur d'environ trois pieds; elles sont petites vers la racine, & s'élargissent peu à peu jusqu'à l'embouchure du tube, qui est fermé dans les jeunes feuilles, mais qui s'ouvre par degrés, à mesure que la feuille croît, & lorsqu'elle est près de sa perfection elle se renverse sur l'ouverture du tube, comme le Capuchon d'un Moine, Figure 1. Ce capuchon s'étend jusqu'à ce que la feuille cesse de croître, il est d'un jaune verdâtre par dedans, avec des veines violettes, fig. 2. Il retient cependant quelque chose de la position qu'il avoit d'abord, étant toujours pincé sur l'ouverture du tube, qui autrement se remplirait de pluie, & tomberoit par le poids de cette eau, car il est d'une substance très mince, & d'un vert tirant sur le jaune; les fleurs qui sont renversées, sont attachées chacune à une tige de deux à trois pieds de long, elles naissent de la racine de la même manière que les feuilles; tandis que la fleur est épanouie l'ovaire est entouré de plusieurs sommets jaunes, attachés à des fillets, une membrane mince & pentagonale, en forme de bouclier, est attachée à cet ovaire par un piston, & pend horizontalement; entre ces interstices sont attachés cinq pétales minces, qui naissent de la base de l'ovaire, sur le haut, est placé le calice, divisé en cinq sections, & il achève la composition de toute la fleur. Elle ne demeure pas long tems dans cet état de perfection, car les cinq pétales tombent après avoir duré un ou deux jours, laissant le reste de la fleur, qui continue plusieurs mois dans l'état où elle est représentée dans la planche suivante, Fig. 3. La Capsule qui renferme les semences contient un Trogno, dont elle se sépare lorsque les semences sont mures, & se disloquent en cinq parties dont chacune est divisée par une membrane mince, en sorte qu'il se forme dix cellules, dans lesquelles sont les semences: La figure 4 fait voir le dessous de la fleur, tel qu'il est lorsqu'elle s'ouvre entièrement avec son dessous renversé, ressemblant en quelque sorte au Siège d'une Selle de Femme, d'où on l'a nommé à la Virginie, Side Saddle Flower, c'est à dire Fleur Selle. Ces plantes croissent dans des lieux marécageux à la Caroline, à la Virginie, Marieland, & la Pensylvanie.

## R A N A A Q U A T I C A.

## The Water Frog.



HESE Frogs are of various Sizes, tho' commonly about the Bigness of the Figure: Their Limbs are very long; the Upper-part of the Head, Body, and Limbs dusky Green, spotted with Black: From the Eyes to the Rump extends two yellow Lines; two white Lines also reach from each Eye to the Nose: The Eyes are large, black, and circled with Yellow *Irides*. These are not seen on dry Land, they frequent Rivulets and Ditches of Water, and will leap at once five or six Yards.



## Grenouille d'Eau.

ES Grenouilles sont de différentes grandeurs, quoiqu'ordinairement elle soient de celle de la figure. Leur membres sont fort longs, le dessus de leur tête, de leur corps, & de leur membres sont d'un verd foncé, tacheté de noir. Depuis les yeux jusqu'au croupion s'étendent deux lignes jaunes, il y en a deux autres blanches, qui vont de chaque œil au nez. Les yeux sont grands, noirs, & leur Iris fait un cercle jaune. On ne les voit que dans les lieux marécageux. Elles se tiennent dans les ruisseaux & les fossés pleins d'eau; & ils sautent depuis quinze jusqu'à dix-huit pieds loin.

SARRACE NA, foliis brevioribus latioribus.  
SARRACE NA Canadensis, foliis cavis & auritis. Hist. R. H. 657.

THE Leaves of this, like the precedent, spring from a fibrous Root, to the Height of six or eight Inches, they are likewise hollow, swelling and more protuberant than the former, and differently shaped, as in the Figure; they are of a yellow green Colour, striped and veined with Purple.

The Flowers of this Plant rise considerably higher than the Leaves, and are of a purple Colour, except which the Flowers and Seed Vessels of this and the precedent are formed alike. The Hollow of these Leaves, as well as of the other Kind, always retain some Water, and seem to serve as an Asylum or secure Retreat for numerous Insects from Frogs and other Animals, which feed on them.

These Plants grow usually in the same Places with the foregoing.

ES feuilles de cette plante, de même que celles de la precedente, naissent d'une racine fibreuse & s'élèvent depuis six jusqu'à huit pouces, elles sont creuses de même, mais plus renflées, & d'une autre forme, comme il paroit dans la figure; elles sont rayées de verd & de jaune, avec des veines violettes. Les fleurs de cette plante s'élèvent beaucoup plus que les feuilles, elles sont violettes, au reste les fleurs & les fruits de celle-cy ressemblent en tout à ceux de la precedente. Il y a toujours de l'eau dans le creux de ces feuilles, aussi bien que dans celles de l'autre espèce; il semble qu'elles soient faites pour servir d'azile & de retraite à un grand nombre d'insectes qui s'y cachent, des Grenouilles & des autres animaux, qui en font leur proye. Ces plantes croissent ordinairement dans les mêmes endroits que les precedentes.


T. 76.







T. 71.



Ranunculus

Arum

MC

# RANA VIRIDIS ARBOREA.

## The Green Tree Frog.



HIS Frog was of a bright grass Green, with two light yellow Lines extending the Length of its Body on both Sides: The Eyes were black and large, with a yellow Circle round them; but what is most remarkable in this Frog are its Feet, which, as in all the other Kinds of Frogs, had four Toes on each of the fore Feet, and five on the hind Feet; but of a different Structure from other Frogs, they being round, fleshy, and concave, somewhat like the Mouth of a Leech. They most commonly are found adhering to the under Sides of green Leaves, which they seem to do for their Security, to conceal themselves from their rapacious Enemies, as Birds, Snakes, &c. which they could not do without this extraordinary Structure of their Toes, by which they cleave to the smoothest Leaf by Suction: and if they are held at four Yards Distance from a reclining Looking-Glass, will at one Leap stick fast to it. They are numerous in *Virginia* and *Carolina*, frequenting both herbaceous Plants, and the loftiest Trees. They appear seldom in the Day, but at Night are very active and noisy, leaping from Spray to Spray, on the tallest Trees, catching Fire Flies and other Insects, incessantly chirping chit chit chit chit.



## Grenouille d'Arbre verte.

ETTE Grenouille étoit d'un verd d'herbe fort vif, avec deux rayes d'un jaune clair, qui parcouroient la longueur de son corps, une de chaque côté. Les yeux noirs & grands, entourés d'un cercle jaune. Mais ce qu'il y a de plus particulier dans cette Grenouille sont ses pieds, ceux de devant ont (comme il est ordinaire à toutes les Grenouilles) quatre doits, & ceux de derrière cinq, mais d'une forme particulière à cette espèce ici, étant charnus, ronds & concaves, à peu près comme la bouche d'une Sangsue. On les trouve ordinairement attachées au dessous des feuilles vertes, ce qu'elles semblent faire pour leur sûreté, afin de se cacher à leurs ennemis voraces, les Oiseaux, les Serpents, &c. Cette situation leur seroit impossible sans la structure extraordinaire des doigts de leurs pâtes, car par son moyen elles se colent aux feuilles les plus lissées, pour ainsi dire, en suçant, & si on les tient à douze pieds de distance d'un miroir panché, d'un sault elles s'y attachent fortement. Elles sont en grand nombre à la Virginie ; à la Caroline elles fréquentent les herbes & les arbres les plus élevés. On les voit rarement pendant le jour, mais elles remuent & font beaucoup de bruit pendant la nuit, sautant de branche en branche sur les plus hauts arbres, & attrapant les mouches luisantes & d'autres insectes, croassant sans cesse tchit tchit tchit tchit.

## ARUM Americanum, Bétæ folio

### The SCUNK WEED.

THIS Plant before the Leaves appeared, arrived at its full Size, as is here exhibited, consisting of three succulent, monopetalous, hollow Flowers, with short Stems, disclosing, as within an Nitch, its Pointel, of an oval Form, having its Superficies impressed with chequered Lines: Before the Leaves open, they appear pale Green, but in a short Time become spotted with Green and Purple blended together: At the Decay of the Flowers the Leaves appear of the Size here exhibited, and usually four or five in Number.

The Introduction of this most curious Plant with innumerable others, is owing to the indefatigable Attachment of Mr. Collinson, who in the Year 1735, received it from Pennsylvania, and in the Spring following it displayed itself in this Manner at Peckham.

As the Flowers of this Plant were engraven before I had an Opportunity of seeing the Leaves, I was obliged to introduce a Leaf in the Manner as in the Plate.

### Pied de Veau de l'Amerique.

AVANT que les feuilles de cette plante parussent, elle avoit atteint toute sa grandeur, elle conſtoit, comme elle est ici représentée, en trois fleurs monopétales, creuses, & succulentes, avec des tiges courtes, le Piftil, qui est ovale, & dont la superficie a des impressions rangées en échiquier, paroît au dedans, comme dans une niche. Avant que les feuilles s'ouvrent, elles sont d'un verd pâle, mais en peu de tems elles deviennent tachetées de verd & de violet mêlés ensemble; quand les fleurs se paſſent, les feuilles sont de la grandeur dont elles sont ici représentées, & il y en a ordinairement quatre ou cinq.

On doit aux soins infatigables de Mr. Collinson l'introduction de cette plante curieuse, & d'une infinité d'autres dans notre climat, il l'a reçue de Pensylvanie, en 1735, & elle fleurit le printemps suivant à Peckham, telle qu'on la voit ici.

J'ay été obligé de placer une des feuilles, ainsi qu'elle l'est dans la figure, parce que la fleur de cette plante étoit gravée, avant que j'eusse eu occasion de voir les feuilles.

# RANA maxima Americana Aquatica.

## The Bull Frog.



HE Figure here exhibited is smaller than many of these Frogs I have seen: The Eyes were oval, very large and prominent, the Pupils having yellow Circles round them: The *Irides* of a dusky red, encompassed with a yellow Circle behind, and a little below the Eyes appear the Ears, of a circular Form, and covered with a thin transparent Membrane, which is the *Membrana Tympani* itself, which in this Species of Animals lies quite bare, and exposed, being even with the Surface of the rest of the Skin, having no *Meatus Auditorius*, or Passage leading to it, nor any Thing like an outward Ear to guard it.

The Colour of the upper Part of this Frog, was dusky brown, thick set with large irregular shaped Spots, of a dark brown Colour, the whole being blended with a yellowish Green, particularly the fore-part of the Head and Chaps; the Belly dusky white, with a Mixture of Yellow, and faintly spotted. These Frogs are less numerous than any other of the Frog kind, and frequent Springs only, which in *Virginia* abound in the Sides of every little Hill, where by the continual running of the Water, a small Pond or Hole is usually made before the Mouth of the Spring, which is rarely without being possessed by a Pair of these Frogs: They are usually sitting on the Verge of the Holé, and when surprized, with a long Leap or two enter the Mouth of the Spring, where they are secure. It is the general Belief of the People in *Virginia*, that they keep the Springs clean, and purify the Water, wherefore they never kill, or molest them, but superstitiously believe it bodes them ill so to do.

The Noise they make has caused their Name; for at a few Yards Distance their Bellowing sounds very much like that of a Bull a quarter of a Mile off, and what adds to the Force of the Sound, is their sitting within the hollow Mouth of the Spring. Tho' the imaginary Usefulness of these Frogs is frequently a Means of their Preservation, yet their voracious Appetites often causes their Destruction, they being great Devourers of young Ducks and Goslings, which they swallow whole; this provokes the good Wives to destroy them, but as they are not very numerous, this Mischief is the easier prevented.

## Grenouille mugissante.



A figure qui est ici est plus petite que plusieurs de ces Grenouilles que j'ay vuës: les yeux étoient ovales, fort grands & protuberans; les pupilles étoient bordées de cercles jaunes, les Iris d'un rouge foncé, entourés d'un cercle jaune; derrière & un peu au dessous des yeux on voit les oreilles, de forme circulaire, & couvertes d'une membrane mince & transparente, qui est celle du Timpan; car dans cette espèce d'animaux elle est entièrement nue & découverte, & au niveau du reste de la peau, n'y ayant ni conduit de l'oreille, ni passage qui mène à elle, n'y oreille externe pour la garder.

La couleur de tout le dessus de cette Grenouille étoit d'un brun foncé, toute couverte de grandes taches irrégulières d'un brun encore plus obscur, le tout mêlé d'un vert jaunâtre, particulièrement le devant de la tête & les mâchoires; le ventre d'un blanc pâle, avec une nuance de jaune, & légèrement tacheté. Ces Grenouilles sont en plus petit nombre que celles d'aucune autre espèce, elles n'habitent que les fontaines qui se trouvent très frequemment aux côtés de chaque petite colline de la Virginie. Ces sources forment de petits étangs par le courant continual de leurs eaux, précisément devant l'endroit d'où elles sortent des terres, chacun de ces trous ou petits lacs est ordinairement possédé par un couple de ces Grenouilles. Elles sont posées à l'entrée de ce trou, & lorsqu'on les surprend, en un saut ou deux elles rentrent dans la source de la fontaine, où elles sont en sûreté. A la Virginie le peuple croît communément qu'elles purifient les eaux, & tiennent les fontaines propres, c'est pourquoi ils ne les tuent & ne les inquiètent jamais, & ils ont la superstition de s'imaginer que cela seroit pour eux de mauvais augure.

Le bruit, qu'elles font, leur a fait donner le nom qu'elles portent; à une petite distance leur mugissement ressemble beaucoup à celui d'un taureau qui seroit éloigné d'un quart de mille, & ce qui augmente la force de ce son, c'est qu'elles se placent dans le creux de la fontaine. Quoique l'utilité imaginaire de ces Grenouilles soit souvent la cause de leur préservation, cependant leur voracité les fait perir assez frequemment, car étant fort friandes des jeunes oissons & des canettes qu'elles avalent toutes entières, elles s'attirent souvent la colère des bonnes femmes qui les tuent pour se vanger, mais comme il n'y a pas beaucoup de ces Grenouilles, il est d'autant plus aisé d'empêcher ce malheur.

# HELLEBORINE.

## The LADY'S SLIPPER of Pensilvania.

THIS Plant from a fibrous Root rises with two or three single Stems, to the Height of ten or twelve Inches, with long ribbed Leaves, growing alternately, the Flower as it is longer resembles more a Slipper than any other of this Tribe that I have seen: It differs also from others of this Kind, in having a Slit from the Top to the Bottom of the Slipper; over the Hollow of which is fixed two small oval Bodies or Knobs, over which hangs a thin Membrane or Lappet, of a pale Red or Rose Colour, and under these Knobs is another Membrane of the like Form, but of a green Colour: The Four exterior Petals that compleat the Flower are placed cross-ways, and are of a yellowish Green, ribbed and stained with Red. The Slipper is of a greenish Yellow, with a Tinctorie of Red. This curious Helleborine was sent from Pensilvania by Mr. John Bertram, who by his Industry and Inclination to the Searches into Nature, has discovered and sent over a great many new Productions both Animal and Vegetable. This Plant flowered in Mr. Collinson's Garden in April, 1738.

## SABOT de Pensilvanie.

La racine de cette plante est fibreuse, il en sort deux ou trois tiges, qui s'élèvent à la hauteur de dix ou de douze pouces, avec de longues feuilles à côtes & alternes, comme la fleur est plus longue que celle des autres espèces que j'ay vuës, elle ressemble davantage à une pantoufle, ou à un sabot, de plus elle diffère des autres fleurs de cette espèce, en ce que cette pantoufle est fendue du haut en bas; au dessus de l'ouverture de cette pantoufle sont attachés deux petits corps ovales, ou deux nœuds, qui sont couverts par une membrane mince d'un rouge pâle, ou couleur de Rose, & au dessous de ces nœuds, il y a un autre membrane de la même forme, mais verte. Les quatres pétales extérieurs qui forment la fleur, sont placés en croix d'un vert jaunâtre, à côtes & tachées de rouge; la pantoufle est d'un jaune verdâtre, avec une nuance de rouge. M. Jean Bertram nous a envoyé de Pensilvania cette curieuse fleur, le même dont l'industrie & l'inclination à étudier la nature lui ont fait découvrir & envoyer à ses amis un grand nombre de nouvelles productions, tant animales que végétales. Cette plante a fleuri dans le jardin de Mr. Collinson, au mois d'Avril, 1738.

T. 72.







T. 73.



## SCIURUS NIGER.

## The Black Squirrel.

 HIS Squirrel is about the Size of the preceedent, many of these being entirely black; some have their Noses only white, some their Feet white, others the End of the Tail white, and some others have white round their Necks. The Tails of these are somewhat less, and not so long as those of the gray Fox Squirrel, yet this little Difference, with that of their Colour, seemed to me at first hardly sufficient to determine them two Species, but by their breeding, associating, and other Circumstances I observed, I am convinced of the common Opinion that they are two different Species. These with the gray Fox Squirrel are very numerous and destructive to Corn in the Fields, for which reason, as well as for the Delicacy of their Flesh no Quarter is given them.

## Ecureuil Noir.



ET Ecureuil est à peu près de la taille du precedent, plusieurs de cette espèce sont entièrement noirs, quelques uns n'ont que le nez de blanc, d'autres les pieds, d'autres le bout de la queue, d'autres enfin ont du blanc autour du cou; les queues de ceux-cy ne sont pas tout à fait si grosses, ni si longues que celles de l'Ecureuil gris, & du suivant, mais cette légère difference, outre celle de leur couleur, ne me sembloit pas d'abord assez considerable, pour en faire deux espèces, cependant après avoir observé la maniere dont ils elevent leurs petits, celles dont ils vivent en société & d'autres circonstances, j'ay été persuadé que ce sont deux espèces différentes, comme on le croit ordinairement. Cet Ecureuil-cy, de même que le gris suivant est fort commun, & leur grand nombre les rend très prejudiciables aux bleds de la campagne; pour cette raison, & à cause de la delicateſſe de leur chair on ne leur fait aucun quartier.

CALCEOLUS Marianus glaber, Petalis angustis. Pet. H. 1. 5. Raii, Hist. III. App. 243. Vid. Pluk. Tab. 418. fig. 2.

## The Yellow LADY'S SLIPPER:

T HIS Plant rises with three or more Stems to the Height of twelve or sixteen Inches, each Stem having three or four rough, pointed, nervous Leaves, growing alternately, and enclosing their Stalk at their Basis; on the Top of every Stalk grows the Flower, which is yellow, hollow, of an oblong Form, resembling an Egg on the back-part, tho' on the fore-part open, having an Apron or Lappet hanging over the Hollow: At the Pedicles of which are fixed two small oval Parts or Knobs, of the Size of Ant's Eggs: From the Back of this yellow concave Flower grow four Petals, or Leaves of different Dimensions, viz. one standing upright, two more slender and wreathed, spreading on each Side horizontally, and a fourth to the joining of the Stalk to the Ovarium, to which the Flower is fixed; these four Petals are green, thick spotted with brownish red, the Seed Vessel, as I remember, is pentagonal, of an oblong Form, containing innumerable small dusty Seeds: They grow on the sandy Banks of Rivers in Carolina, Virginia, and Pensilvania, from which last Place they were introduced to the Garden of Mr. Peter Collinson at Peckham, where they flowered in Perfection.

## Sabot Jaune.

CETTE plante s'eleve avec trois tiges ou plus, depuis douze jusques à seize pouces, chaque tige a trois ou quatre feuilles rudes, pointuës & nerveuses, alternes, & renfermant la tige de la fleur à leur bâze, elle naît au sommet de chaque tige, elle est jaune, creuse, & de forme oblongue, ressemblant à un œuf par derrière, quoiqu'ouverte par devant, avec un espèce de tablier pendant sur l'ouverture, au pedicule de laquelle sont fixées deux petits corps ovales, ou deux nœuds de la grosseur des œufs de fourmis; du derrière de cette fleur jaune & concave sortent quatre feuilles de différentes dimensions; savoir, une qui se tient tout droit, deux autres plus minces, & tournées en spirales, qui s'étendent de chaque côté horizontalement, & une quatrième, qui s'étend jusqu'à la jointure du pedicule avec l'ovaire, auquel la fleur est attachée: Ces quatre pétales sont vertes, tachetées fort près à près de rouge brun. Le fruit, autant que je m'en souviens, est pentagone, de forme oblongue, contenant une infinité de semences menuës, comme de la poussière. Ces fleurs croissent sur les bords sablonneux des rivières à la Caroline, à la Virginie, & à la Pensilvanie; & c'est de ce dernier endroit qu'elles ont été apportées dans les jardins de Mr. Collinson à Peckham où elles ont fleuri en perfection.

*S C I U R U S Virginianus cinereus major.*

Raii, Syn. Quad. p. 215.

*The Gray Fox Squirrel.*



HESE Squirrels are as large as an half grown Rabbit, the whole Structure of their Bodies and Limbs, thicker in Proportion, and of a grosser and more clumsy Make than our common Squirrels: Their Heads and Ears are also shorter. The Colour of their Bodies is gray, as is their Tails, which when they turn back extends the whole Length of, and covers their Bodies. They have the like active Gestures as the common Squirrels. Their Size is no Protection against the Assaults and Rapine of ravenous Hawks. They are injurious to the Planters of *Virginia* and *Carolina*, by destroying their Corn and Pulse.

*Le grand Ecureuil gris.*



ES Ecureuils sont aussi grands qu'un jeune Lapin, qui a atteint la moitié de sa crue, la structure de tout leur corps & de leurs membres est plus épaisse, plus grossiere & plus pesante que celles de nos Ecureuils communs; leur têtes & leurs oreilles sont aussi plus courtes, leurs corps & leurs queue sont gris; & lorsqu'ils renversent celle-cy, elle s'étend sur toute leur longueur, & couvre entierement leur corps: Leur action est aussi vive que celle des Ecureuils ordinaires: Leur taille ne les met pas à couvert des assauts & de la voracité des oiseaux de proye. Ils incommodent beaucoup les planteurs de la Virginie & de la Caroline, en gâtant leurs grains & leurs légumes,

*VISCOM Caryophilloides, floribus parvis luteis punctatis.*

T HIS Plant rises from a bulbous Root, with three or four Leaves, like those of the *Narcissus*, having one strait single Stem, to the Height of twelve or more Inches, on each Side of which are eight, ten, or more Flowers, set alternately on pretty long Footstalks: Five yellow Petals, spotted with dark brown, set on a green cylindrical, ribbed *Capsula*, with *Stamina*, compose the Flower; in the Seed Vessel are contained a great many very small Seeds, divided by thin Membranes. These Plants grow on Rocks, and to the Trunks of Trees in many of the *Bahama* Islands.

CETTE plante s'élève d'une racine bulbeuse, avec trois ou quatre feuilles, semblables à celles d'un Narcisse, & une seule tige droite, à la hauteur de douze pouces ou plus: cette tige est garnie de chaque côté de huit ou dix fleurs, & même davantage, placées alternativement sur des pedicules assez longs; elles sont composées d'étamines, de cinq pétales jaunes, tachetés de brun obscur, attachés à une capsule verte, cylindrique & cannelée. Le fruit contient un grand nombre de très petites semences, séparées par des membranes minces. Ces plantes croissent sur les rochers & les troncs des arbres, en plusieurs des îles Bahama.

T. 74.



*Wykum*

*Sciurus*





T<sub>75</sub>.



*Sciurus*

*Cornus*

*SCIURUS STRIATUS.**The Ground Squirrel.*

 **H**IS is about half the Size of an English Squirrel, and almost of the same Colour, except that a Pair of black Lists, with a yellowish white List between them, extend almost the Length of the Body on both Sides; also a single black List runs along the Ridge of the Back. The Eyes are black and large, the Ears rounding, the Tail long, flat, and thick set with Hairs, which are much shorter than those of other Squirrels. These Squirrels abide in the Woods of Carolina, Virginia, &c. Their Food is Nuts, Acorns, and such like as other Squirrels feed on. They being brought up tame, are very familiar and active.

The Fruit which the Squirrel is feeding on, belongs to a Tree or Shrub which General Ogletorp brought from Georgia by the Name of the Wild Nutmeg; from its being aromatic, and other Circumstances, induces me to think it is the Fruit of the Plant I have described, p. 46. Vol. I. which Description is imperfect, because the Fruit was not then formed: The Size and Form of this is as 'tis here represented. It divides into four Openings, discovering four dark green Seeds within the Fruit.



*Elui-cy est environ plus petit de la moitié que l'Ecureuil Anglois, & presque de la même couleur, excepté qu'une bande d'un blanc jaunâtre, bordée de chaque côté d'une bande noire, s'étend presque dans toute la longueur de son corps sur les côtés, outre une seule raye noire, qui est placée sur le milieu du dos; leurs yeux sont noirs & grands, leurs oreilles arondies, la queue longue, plate & bien garnie de poil beaucoup plus court que dans les autres espèces d'Ecureuils; ceux-cy se tiennent dans les bois de la Caroline, de la Virginie, &c. Ils se nourrissent de noisettes, de glands, & de fruits de cette sorte, dont les autres Ecureuils se nourrissent aussi. Ceux que l'on prend soin d'aprioyer de bonne-heure, sont fort vifs & fort familiers.*

*Le fruit, que cet Ecureuil mange, appartient à un arbisseau que le General Ogletorp a apporté de la Georgie, sous le nom de Muscade sauvage; je juge, de ce qu'il est arboratique, & par quelques autres circonstances, que c'est le fruit d'une plante que j'ay décrite page 46. Volume I. dont la description est inparfaite, parceque le fruit n'avoit pas atteint alors sa grosseur & sa forme, telles qu'elles sont ici représentées. Ils se divisent en quatre ouvertures, qui laissent voir au dedans quatre semences d'un verd brun.*

*CORNU S, foliis Laurinis, fructu majore luteo.**The MASTIC TREE.*

**T**HIS Tree grows usually to the Height of about fifty Feet, with a Trunc two or three Foot thick, having a greenish white smooth Bark. The Leaves hang promiscuously on long Footstalks, and are in Form somewhat like those of a Pear Tree, from the Sides of the Branches grow small pentapetalous yellow Flowers, which are succeeded by yellow oval Fruit, in Size and Shape of small Plums, inclosing an oval brown Stone. The Fruit is eat, and is sweet and luscious, but serves chiefly for the Sustenance of Birds and other Animals. The Wood is esteemed good Timber; they grow in Abbaco and other of the Bahama Islands.

*Arbre de Mastic.*

**C**ET Arbre s'élève ordinairement à la hauteur de cinquante pieds; son Tronc a deux ou trois pieds d'épaisseur; l'Ecorce est polie & d'un blanc verdâtre; les Feuilles sont attachées sans ordre à de longues queues, & ressemblent un peu à celles du Poirier. Il sort des côtes des Branches de petites Fleurs jaunes à cinq feuilles, qui sont suivies d'un Fruit ovale, jaune, & de la forme d'une petite Prune, renfermant un Noyau brun, & ovale. On mange ce fruit, il est doux & mielleux, mais il sert principalement à nourrir les Oiseaux & d'autres Animaux: On estime le bois pour la charpente; ils viennent en Abbaco & en quelques autres des îles Bahama.

## SCIURUS VOLANS.

## The Flying Squirrel.



HIS is about the Size of the Ground Squirrel, but has a somewhat shorter Body and Head: The Ears were round, the Eyes black, and large; the Body covered with very fine Hair, as soft, tho' longer than that of a Mole, of a light Mouse Dun Colour: The Tail long, broad, and flat, the Hairs of it exceeding fine and soft.

These Squirrels have not membranous Wings like those of a Bat, whereby they can fly to any great Distance, but have only Membranes, covered with their Furr, which grow along their Sides, and are attached to their Legs, by which they can expand them, and so help themselves in leaping from one Tree to another, as I shall mention in the following Page.

These Species of Squirrels hath been lately discovered in *Poland*, an accurate Description and Print thereof, communicated by the ingenious and curious Mr. Klein, Secretary to the City of *Dantick* is published in the *Philosophical Transactions*, N° 427. p. 32.

## Ecureuil Volant.



*Elui-cy est à peu près de la grosseur de l'Ecureüil de Terre, mais il a le corps & la tête un peu plus courts. Ses creilles sont rudes, ses yeux noirs & grands, son corps est couvert d'un poil fort fin, & aussi doux que celui d'une taupe, quoique plus long, de couleur de Souris clair, sa queue est longue, large & plate, garnie de poil extremement fin & doux.*

*Ces Ecureüils n'ont pas des ailes membraneuses comme celles d'une Chauve-Souris, dont ils puissent se servir pour voler à une grande distance, ils n'ont que des membranes couvertes de poil, attachées à leurs jambes, & s'étendant de chaque côté de leurs corps : Lorsqu'ils sautent d'un arbre à l'autre, ils se soutiennent en l'air par l'extension de ces membranes, comme je le remarqueray dans la page suivante.*

*On a découvert depuis peu en Pologne cette espèce d'Ecureüil, le curieux & ingénieux Mr. Klein, Secrétaire de la ville de Dantzig, en a envoyé une description exacte avec la figure, à la Société Royale, On la trouve dans les Mémoires Philosophiques. No. 427. Page 32.*

## GUAJACANA.

THESE Trees are from fourteen to eighteen, and sometimes twenty Feet in Height, with a Trunc seldom above ten Inches thick, and Leaves like those of a Pear. In April the Blossoms appear, growing along the Sides of the Branches, on very short Footfalls; they are monopetalous, succulent, and of a green Colour, divided into four Segments, in the middle of which stands the Ovarium, which when grown to their full Size are nearly as big as *Orleance Plums*: As the Fruit swells the four Petals, which composed the Flower, spread, and become hard and dry. The Fruit, which is of a transparent reddish yellow Colour, incloseth four flat Stones. These Trees grow plentifully in *Carolina*, *Virginia*, and most of the Northern Colonies in *America*, and are lately become naturalized to our Climate, having here ripen'd its Fruit in the open Air. The Fruit of these Trees are ripe at different Times, some in *August*, others in *November*, and will hang after the Leaves are dropped till *December*; the Fruit having then lost much of its watery Parts, is shrivelled, candied, and very luscious, resembling in Taste and Consistence Raisins of the Sun. The Fruit of these Trees are a great Support to Birds, Squirrels, and various other Animals. The Stone split in two Parts exhibits the Tree in Embryo, with its Stem or Trunc, with the two *Folia Seminalia*, in a more conspicuous Manner than in any other Seed I have ever met with.

*CES arbres croissent depuis quatorze jusqu'à dix huit & quelques-fois vingt pieds de hauteur; le tronc a rarement plus de dix pouces de diamètre, les feuilles sont semblables à celles du poirier. Les fleurs paroissent en Avril, elles sont attachées par des pedicules fort courts tout le long des côtés des branches, elles sont monopétales, succulentes, & vertes, divisées en quatre segments, au milieu desquels est l'ovaire : lorsque le fruit est parvenu à sa maturité, il est presque aussi gros qu'une Prune d'Orléans ; à mesure que le fruit s'enfle, les quatres pétales qui composaient la fleur s'étendent & deviennent dures & sèches ; le fruit qui est transparent, & d'un jaune tirant sur le rouge, renferme ou contient quatre noyaux plats. Il y a une grande quantité de ces arbres à la Caroline, à la Virginie, & dans la plupart des Colonies septentrionales de l'Amérique. Ils ont été depuis peu naturalisés dans notre climat, où leur fruit a meuri en plein air : Les fruits de ces arbres meurissent en différents tems, les uns en Août, les autres en Novembre, & ils demeurent attachés à l'arbre après la chute des feuilles jusqu'en Décembre ; ayant perdu alors ses parties les plus aquueuses, il se ride, se candiſt, & est extrêmement douçâtre, & il ressemble par le goût & par sa consistance aux raisins secs. Le fruit de ces arbres est une grande ressource pour les Oiseaux, les Ecureuils, & plusieurs autres Animaux. Si l'on fend le noyau en deux, on y apperçoit l'arbre en embrion, avec sa tige & son tronc, & ses deux Folia Seminalia, d'une manière plus distincte qu'en aucune autre semence que j'aye jamais observée.*

T. 76.



*Sciurus Volans*

*Guajacana*





T<sub>77</sub>



## The Flying Squirrel,

Its Posture and Manner of FLYING.

**H**ESE Squirrels are gregarious, travelling from one Tree to another in Companies of ten, or twelve together. When I first saw them, I took them for dead Leaves, blown one Way by the Wind, but was not long so deceived, when I perceived many of them to follow one another in one Direction: They will fly fourscore Yards from one Tree to another. They cannot rise in their Flight, nor keep in a horizontal Line, but descend gradually, so that in Proportion to the Distance the Tree, they design to fly to, is from them, so much the higher they mount on the Tree they fly from, that they may reach some Part of the Tree, even the lowest Part, rather than fall to the Ground, which exposes them to Peril, but having once recovered the Trunc of a Tree, no Animal seems nimble enough to take them. Their Food is that of other Squirrels, viz. Nuts, Acorns, Pine-Seeds, *Pishimon* Berries, &c.



## Ecureuil Volant,

Son Attitude & sa maniere de Voler.



*E*S Ecureuils voyagent en Compagnie, & sautent en bande de dix ou douze à la fois; lorsque je les vis pour la premiere fois, je les pris pour des feuilles seches, que le vent poufsoit du même côté, mais je ne fus pas long tems dans cette erreur, lors que j'en vis plusieurs qui se suivoient: Ils voleront la longueur de quarante toises d'un arbre à l'autre, ils ne peuvent pas s'elever dans leur vol, ni se tenir dans un ligne parallele à l'horizon, mais il descendent peu à peu, ensorte qu'a proportion de l'éloignement où est l'arbre, sur lequel ils ont dessein de voler, ils montent plus haut dans celui d'où ils partent, afin qu'ils puissent attraper quelque partie de celui qu'ils ont en vue, quand même ce seroit le pied, & qu'ils ne tombent pas à terre, ce qui les mettroit en danger, mais quand ils ont une fois gagné le tronc d'un arbre, ils ne semble pas qu'aucun Animal soit assés agile pour les attraper; leur nourriture est la même que celle des autres Ecureuils, scavaroir des Noisettes, des Glands, des Amandes de Pignons, des Bayes de Pisthemons.

## VISCUM Caryophylloides, Aloës foliis viridibus acuminatis, floribus racemosis luteis.

**T**HE Root of this Plant is tuberous, having many small Fibres, which grow spreading on Rocks, and adhere close to the bare Surface of them, and sometimes to the Trunks and Limbs of Trees: This succulent Plant is maintained only by what Nutriment its Fibres receive from the Crevices of the Bark into which they insinuate: It is usually from one to two Foot in Height: Its Leaves and Manner of growing resemble those of an Aloë, but are more concave, and spotted with White on both Sides, resembling Mould. From the middle of the Leaves arose a stiff Stalk, which divided at the Top into seven or eight smaller Stalks, on which were placed alternately on short Footstalks yellow Flowers, not blown open; and having never seen a Plant that was blown, I can only refer to the Figure of this here exhibited.

*L*A racine de cette plante est tubereuse, garnie de plusieurs petites fibres qui s'étendent en croissant sur les rocs, & s'attachent fortement à leur surface toute nüe, & quelquefois au tronc & aux branches des arbres. Cette plante succulente ne se nourrit que de ce que ces fibres tirent des crevasses de l'écorce, dans laquelle elles s'insinuent; elle est ordinairement d'un ou de deux pieds de haut; ses feuilles & leur maniere de croire ressemblent à celles de l'Aloës, mais elles sont plus concaves, & tachetées de blanc des deux côtés, comme si elles étoient moisies; il s'elevoit du milieu des feuilles une tige roide, qui se divisoit à son extremité en sept ou huit plus petites tiges, sur lesquelles étoient placées alternativement des fleurs jaunes, soutenues par des pedicules fort courts; comme elles n'étoient pas ouvertes, & que je n'en ai jamais vu qui le fussent, je ne puis que renvoyer à la figure que j'en donne.

VULPIS CINEREUS Americanus.

The Gray Fox.



HESE Foxes are all over of a grisly gray Colour, in Shape and Size little different from those in *Europe*. They live not in Holes under Ground, but in hollow Trees, to which they retreat when hunted, affording the Hunter seldom above a Mile Chase before they enter their Hole, from which they are usually smoaked out. They are equally mischievous with those in *Europe*, destroying Poultry, &c.



Renard gris.

ES Renards sont entierement d'un gris argenté, & different très peu par leur grandeur de ceux d'*Europe*, ils n'habitent pas dans des trous sous terre, mais dans les trous des arbres, où ils se retirent lorsqu'on les poursuit, ils ne se laissent guères chasser qu'un mile avant d'entrer dans leur trou, d'où on les fait ordinairement sortir en les ensuivant, ils sont aussi mal faisants que ceux d'*Europe*, detruisant la volaille, &c.

GENTIANA forte? quæ Periclymeni Virginiani flore coccineo, Planta Marylandica spicata erecta, foliis conjugatis. D. Sherard. R. Hist. III. Dendr. 3. N. 23.

The INDIAN PINK.

THIS Plant rises usually with four or five Stalks, of about twelve or fourteen Inches in Height, every one of which has three or four Pair of sharp-pointed Leaves, set opposite to each other. On the Top of the Stalks on one Side, are placed about ten or twevle monopetalous, tubelous, red Flowers: The Flower divides at Top into five Sections, the Inside of which is yellow; from the middle of the Flower arose a long yellow *Stylus*, with *Stamina*. This Plant was in Blossom, the First of August 1738, in the Garden of Mr. Christ. Gray at Fulham, and endures the Winter without any Protection.

A Decoction made of this Plant is good against Worms.

CETTE plante s'eleve ordinairement avec quatre ou cinq tiges d'environ douze ou quatorze pouces de haut, dont chacune a trois ou quatre paires de feuilles pointuës, placées vis à vis les unes des autres, & à leur extrémité d'un côté de la tige il y a environ dix ou douze fleurs rouges, monopétales, & tubuleuses: Cette fleur se divise par le haut en cinq sections, le dedans en est jaune, il s'elevoit du milieu de la fleur un long style jaune, avec des étaunes. Cette plante étoit en fleur, ce premier d'Aoust 1738, dans le jardin de Mr. Christ. Gray à Fulham, & elle souffre l'hiver en plein air.

On recommande la decoction de cette plante comme utile contre les vers.

T 78.



Gentian.

Vulpes.





T. 79.



## CUNICULUS BAHAMENSIS.

## The Bahama Coney.

  
**H**IS Creature is a little less than the common Wild Rabbit, and of a brown Colour, without a Mixture of gray Hairs. Its Ears, Feet and Tail resemble those of a Rat, in other Parts it is somewhat like a Rabbit. They feed wholly on wild Fruit and other Vegetables: When surpriz'd by Hunters they retreat to Holes in Rocks. Their Flesh is esteemed very good, it has more the Taste of a Pig than that of a Rabbit. I take it to be nearly of the Kind of the *Mus Alpinus*, or *Marmot*. Raii Syn. Quad. p. 221.

## Lapin de Bahama.

  
**E**T Animal est un peu plus petit que le Lapin de Garrenne ordinaire; il est brun sans aucun mélange de gris, ses oreilles, ses pieds & sa queue ressemblent à ceux d'un Rat, dans le reste il est à peu près comme un Lapin. Ils se nourrissent entièrement de fruits sauvages & d'autres végétaux; lorsqu'ils sont surpris par les chasseurs, ils se retirent dans les trous des rochers: On trouve leur chair fort bonne; elle a plus le goût du Cochon que celui du Lapin. Je croi que c'est à peu près la même espèce que le Rat des Alpes, ou la Marmotte. Raii. Syn. Quad. p. 221.

## PITTONIAE similis, Laureolæ foliis, floribus albis, baccis rubris.

**T**HIS Shrub rises to the Height of twelve Feet, more or less; the Leaves grow alternately on long Footstalks; the Flowers grow many together on Footstalks half an Inch long, on the Tops of the Branches: They are tubulous, monopetalous, and divided round the Edges by five Sections, as is the *Calyx*: The Flowers are succeeded by spherical red Berries, of the Size represented, inclosing several Seeds, like those of the white Thorn. This Plant grows on many of the *Bahama Islands*, and is called there *Strong Back*. The Inhabitants there make Decoctions of its Bark, of which they make much Use, attributing to it great Virtues, as strengthening the Stomach, restoring lost Appetite, and other like Virtues, as the *Cassena* is said to have on the Continent. The Coneys, Guana's and Birds are great Lovers of the Berries. They grow on Rocks on many of the *Bahama Islands*.

**C**ET arbrisseau s'élève à la hauteur de douze pieds, plus ou moins; ses feuilles sont alternes, placées sur de longues tiges; les fleurs naissent ensemble, attachées par des pedicules d'un demi pouce de long à l'extremité des branches. Elles sont tubuleuses, monopétales, & divisées dans leur bord en cinq sections, de même que le calice. Il leur succède des baies rondes & rouges, de la grosseur qu'elles sont représentées, renfermant plusieurs semences, comme celles de l'épine blanche. Cette plante croît dans plusieurs des îles Bahama, & on l'y appelle Strong Back. Les habitans font une décoction de l'écorce dont ils se servent beaucoup, lui attribuant de grandes vertus, comme de fortifier l'estomach, de redonner l'appétit, & d'autres effets tels qu'on dit que le Cassena en produit dans le Continent. Les Lapins, les Guanas, & les Oiseaux en aiment beaucoup les baies: Elles croissent sur des rochers en plusieurs des îles Bahama.

*MAGNOLIA, amplissimo flore albo, fructu coccineo.**The Umbrella Tree.*

HESE Trees are from sixteen to twenty Feet in Height, with a Trunc seldom above five Inches thick, the Bark of which is white, the Wood soft and spongy, the Leaves are usually thirty Inches in Length, and about five broad at the widest Part, they grow in horizontal Circles, representing somewhat the Appearance of an Umbrella. From the middle of one of these Circles of Leaves rises the Flower, which is white, composed of ten or eleven Petals, the three outermost of which are of a pale Green, and before the Blossom opens, encloses the rest of the Petals, and when the Flower is full blown, they hang in the Manner here represented. The Structure of the *Ovarium*, Seed Vessel, &c. so nearly ressembles those Parts of the *Magnolia altissima*, that I conceive the Figures as they are here exhibited, without any farther Description, will give a sufficient Idea of them.

In *Virginia* I have never seen above two or three of these Trees, which grow at one Place; in *Carolina* they are more frequent, and grow in rich Land. They drop their Leaves at the Approach of Winter.



*ES Arbres s'élevent depuis seize jusques à vingt pieds; leur tronc a rarement plus de cinq pouces de diamètre, l'écorce en est blanche, le bois mou & spongieux, les feuilles ont ordinairement trente pouces de long, & environ cinq pouces dans leur plus grande largeur; elles sont attachées en cercles paralelles à l'horizon, & forment à peu près un espèce de Parasol: Du milieu d'un de ces cercles de feuilles sort la fleur, qui est blanche & composée de dix ou onze petales, les trois exterieures sont d'un verd pâle, & avant que la fleur s'ouvre elles enveloppent les autres, mais lorsqu'elle est entierement ouverte, elles pendent de la maniere qu'elles sont représentées dans la figure. La structure de l'ovaire, de la capsule, de la semence, &c. ressemble si fort à celle des mêmes parties du Magnolia altissima, qu'il me semble que les figures, telles qu'elles sont ici suffisent pour en donner une idée, sans une plus longue description.*

*Je n'ay jamais vu en Virginie que deux ou trois de ces arbres, qui sont dans le même endroit, ils sont plus communs à la Caroline, & croissent dans les terres grasses. Leur feuilles tombent aux approches de l'hiver.*









*ARBOR foliis pinnatis, nullo impari Alam claudente, nervo ad latus unum excurrente, fructu anguloso magno, semine alato instar Pinus.*

### The MAHOGONY TREE.



THESE Trees grow to a great Height, and are usually four Foot Diameter; the Bark is of a brown Colour, the Leaves are pinnated, growing by Pairs on slender Stalks, the Ribs of the Leaves (like those of the *Tilia*) run on one Side, dividing the Leaf unequally. Not having an Opportunity of seeing its Flowers in their perfect State, I was necessitated to figure the best Fragment of it I could find, which was withered and imperfect, but by spreading the Petals I could distinguish the little Flowers to be pentapetalous, as represented by a Sprig at N° 1. The curious Structure of the Seed-Vessel is thus: The whole Fruit before the Parts are divided, is a very hard smooth Cone, in Size and Form of a Goose's Egg, growing erect on a Stalk four or five Inches long: As this Fruit grows ripe it begins to open, and separate into five equal Parts, each consisting of an hard Shell, near half an Inch thick, lined within by a thin Skin or Membrane, which immediately encloses the Seeds; the Seeds lie disposed in the Manner of those of an *Apocynum*; they are winged, and are attached to the hollow Sides of an hard pentagonal Core, which forms the Middle of the Cone: When the Shell falls off, the Seeds are left exposed to the Wind, and are soon dissipated by it, leaving the Core standing, which continues so, many Months after. The Excellency of this Wood for all Domestic Uses is now sufficiently known in *England*: And at the *Bahama Islands*, and other Countries, where it grows naturally, it is in no less Esteem for Ship-building, having Properties for that Use excelling Oak, and all other Wood, viz. Durableness, resisting Gunshots, and burying the Shot without Splintering.

No one would imagine, that Trees of this Magnitude should grow on solid Rocks, and that these Rocks should afford sufficient Nutriment to raise and increase the Trunks of them to the Thickness of four Feet or more in Diameter; but so it is, and the Manner of their Rise and Progress I have observed as follows: The Seeds being winged are dispersed on the Surface of the Ground, some falling into the Chinks of the Rocks, and strike Root, if the Fibres find Resistance from the Hardness of the Rock, they creep out on the Surface of it, and seek another Chink, into which they creep, and swell to such a Size and Strength, that at length the Rock breaks, and is forced to admit of the Roots deeper Penetration, and with this little Nutriment the Tree increases to a stupendious Size in a few Years, it being a quick Grower.



ES arbres croissent fort haut, ils ont ordinairement quatre pieds de diamètre, l'écorce est brune, & les feuilles sont disposées par paire, & croissent par paires sur des pedicules fort menues, les nets des feuilles (comme ceux des *Tilleuls*) se jettent d'un côté & partagent la feuille inégalement. N'ayant pas eu Occasion de voir ses fleurs dans leur perfection, j'ai été obligé de représenter le meilleur fragment que j'ay pu trouver quoique flétris & imparfaits, mais en étendant les pétales j'aperçus que ses petites fleurs étoient de cinq feuilles comme on les voit représentées au N° 1. La forme du vaisseau qui contient la Semence est très curieuse. Le fruit entier, avant que ses parties se séparent, est un cone dur & uni, de la grosseur d'un œuf d'eye, il vient droit sur une queue longue de quatre ou cinq pouces. A mesure que ce fruit meurt, il commence à s'ouvrir & se séparer en cinq parties égales, dont chacune a une écaille de l'épaisseur d'un demi pouce, doublée en dedans d'une peau mince qui couvre immédiatement les grains des Semences. Les Semences sont arangées comme celles d'un *Apocynum*; elles sont ailées & attachées au côté creux d'un tronçon dur & pentagonal, qui forme le milieu du cone: Quand l'écaille tombe, les grains demeurent exposés au vent & en sont bientôt emportés, le tronçon continue attaché encore quelques mois après. On connaît en Angleterre à présent l'excellence de ce bois pour tous les usages domestiques. Il est fort estimé dans les îles Bahama, & autres Pays, où il croît naturellement, on s'en sert à batir des vaisseaux, étant plus propre à cela que le chêne & que tout autre bois, par sa durabilité, & par sa résistance au canons, car les boulets s'y ensiflent sans faire éclater.

On a peine à s'imaginer que des arbres d'une telle grandeur puissent croître sur des rochers, & que ces mêmes rochers puissent fournir une nourriture suffisante à faire monter & à grossir le tronc jusqu'à quatre pieds & plus de diamètre, cela est pourtant vrai, & j'ai fait les observations suivantes sur la production & l'accroissement de cet arbre: Les semences étant ailées sont dispersées sur la surface de la terre, quelques unes tombent dans les fentes des rochers, & y prennent racine, si les fibres trouvent de la résistance par la dureté des rochers, ils remontent sur la surface & cherchent une autre fente dans laquelle ils entrent, & deviennent si gros & si forts que le rocher est forcé de s'ouvrir afin que les racines puissent penetrer plus avant. Ces arbres deviennent extrêmement hauts & épais avec si peu de nourriture en peu d'années.

1 The Flowers.

2 A Cone beginning to open.

3 A Cone opened, with its winged Seeds as they lie in it.

4 A single Seed.

5 One of the Parts of the Shell of the Cone.

6 The Core to which the Seeds hang.

7 A Plant of Mistletoe, growing on the Mahogany Tree.

1 Les Fleurs.

2 Un cone qui commence à s'ouvrir.

3 Un cone ouvert ou paroît la disposition des semences ailées.

4 Une seule semence.

5 Une partie de l'écaille du cone.

6 Le tronçon d'où pendent les semences.

7 Une plante de Guy croissante sur l'arbre.

### *Viscum foliis longioribus baccis rubris.*

HIS Mistletoe had long smooth shining green Leaves, growing by Pairs, the Berries were round, red, and somewhat smaller than those of the common Mistletoe. They grow in Clusters to Stalks of above an Inch long, which shoot forth by Pairs, from between the Joinings of the Leaves to the Stalk. They grow to Mahogany and other Trees of the *Bahama Islands*.

CETTE plante a les feuilles longues & unies, d'un verd luisant, elles croissent par paires, les baies sont rondes, rouges, & un peu plus petites que celles du Guy commun, elles croissent en grappe sur des queues de la longueur d'un peu plus d'un pouce, qui sort par paires d'entre les aisselles des feuilles à leur tige. Le Guy croît sur cette espèce & autres arbres des îles de Bahama.

*BIGNONIA AMERICANA*, *capreolis donata,*  
*siliqua breviore.* Tournefort Inst.



HESE Plants usually grow on the shady Banks of Rivers, rising with many slender pliant Stems to the Height of twenty, and sometimes thirty Feet, being supported by Trees and Shrubs, growing near them, on which they climb and clasp their Tendrils. From the Joints of these trailing Stalks shoot forth their Leaves, Flowers, and Tendrils, four Leaves grow at every Joint, set by Pairs on two horizontal short Stalks: The Flowers are set on Footstalks, of above an Inch in Length, are monopetalous, and divided into five Sections, which reflect back, and are of a bright yellow within; but the outside of the Flower is of a bright Cinnamon Colour, and has within it four *Stamina* with a *Stylus*. The Seeds are winged, and fixed to a *Placenta* within a Pod. This elegant Plant is a Native of both *Virginia* and *Carolina*, and blows there in *May*, but in *England* not before *August*.



ES plantes croissent ordinairement sur les bords ombragez des rivieres, elles s'elevent par plusieurs tiges minces & pliantes à la hauteur de 20 & quelquefois de 30 pieds, étant supportées par des arbres ou arbrisseaux, qui croissent près d'eux, sur lesquels elles montent en s'attachant avec leurs tendrons. Les feuilles, fleurs & tendrons sortent des jointures de ces tiges, il en vient quatre à chaque jointure, disposées par paires sur deux pedicules courtes & horizontales. Les fleurs croissent sur une queue d'un pouce de long, elles sont monopetales & divisées en cinq sections qui se replient en arrière, le dedans est d'un jaune vif, mais le dehors de la fleur est de la couleur de Canelle claire, elle a en dedans quatre étamines avec un stile. Les semences sont ailées & attachées à une Placenta dans une cosse. Cette belle plante croit dans la Virginie & la Caroline, elle y fleurit au mois de Mai, mais en Angleterre elle ne fleurit qu'au mois d'Août,

N. B. In the following Plates are interspersed some remarkable Butterflies, whose Colours are so various and intricately blended, that their Figures and Descriptions, would give but a faint Idea of their Beauty, without being illuminated; which alone answers the Purpose. But as some Copies may appear uncoloured, it will be necessary to supply that Deficiency by Words.

N. B. On a mêlé dans les Planches suivantes quelques Papillons très curieux, dont les couleurs sont si diversifiées & si entremêlées que les dessins & les descriptions ne donneroient qu'une idée imparfaite de leur beauté, s'ils n'étoient illuminé, parcequ'il n'y a que cela, qui puisse en faire voir la variété. Mais comme peut-être quelques Exemplaires ne seront pas illuminés, il fera nécessaire d'y suppléer par une Description.









*FRUTEX VIRGINIANUS trifolius, Ulmi samaris;*  
BANISTERI. Pluk. Alma, 159.

**F**HESE Trees usually grow to the Height of twelve or fifteen Feet with a Trunk as big as one's Leg, having a pale greenish smooth Bark. Its Leaves are trifoliate, set on long Footstalks. The Flowers grow in spiked Bunches, many of them together, each Flower having four white Petals, and are succeeded by Bunches or Clusters of Seeds.

These Trees grow on the upper Parts of the *Savannah* River in *Carolina*, and no where that ever I saw in the lower inhabited Parts of the Country.



*ES arbres croissent ordinairement de la hauteur de douze ou quinze pieds, le tronc est de la grosseur de la jambe, & l'écorce est unie & d'un vert pâle. Les feuilles sont divisées en trois sur des pedicules longues. Les fleurs croissent en touffes pointues & plusieurs ensemble, chaque fleur a quatre petales blancs, auxquels succèdent des bouquets de semence.*

*Ces arbres croissent dans la partie supérieure de la Rivière Savanna dans la Caroline, & je ne l'ai vu dans aucun endroit de la partie inférieure, qui est habitée.*

*PAPILIO CAUDATUS maximus, Carolianus, Umbris striisque nigris.*  
Pet. Mus. N° 505.

**T**HE Body of this Butterfly has its Back black and Sides yellow, the whole Length of it. The Ground of all the Wings is yellow; the two fore Wings have their upper Margins verged with black, besides other Marks of Black. The lower Parts of the four Wings are deeply verged with black, through which in the upper Wings run a Row of yellow Spots: From the lower Part of the two under Wings shoot forth two Tails. These Butterflies are Inhabitants of *Virginia* and *Carolina*.

**L**E Corps de ce Papillon a le dos noir & les côtez jaunes dans toute sa longueur, le fond des ailes est jaune. Les deux ailes de devant ont leurs marges de dessus bordées de noir outre plusieurs autres marques noires. Les parties inférieures des quatre ailes ont une large bordure noire, marquettée de taches jaunes dans les ailes supérieures. Il sort deux queues de la partie inférieure des deux ailes basses.  
Ces Papillons se trouvent dans la Virginie & la Caroline.

*PHILADELPHUS flore albo majore inodoro.*



HIS is a small Tree, rising to the Height of about sixteen Feet or upwards, with a slender Trunc; the Wood hard and brittle, from the larger upright Stalks grow smaller ones horizontally and opposite to one another, on which are placed the Leaves by Pairs, shaped like those of a Pear; At the ends of these smaller Stalks were also placed the Flowers, growing usually two or three together on Footstalks of about an Inch long. These Flowers are composed of four white Petals, adorn'd in the Middle with a Tuft of thrummy Stamina, a Triple Stilus, and crowned with yellow Apices.

These Flowers are succeeded by round mucronated Capsulas, containing many small Seeds in Cells divided by thin Membranes. The only Tree of this kind I ever saw, was growing on the Bank of the Savana River near its Cataracts.



ET arbre est petit, il ne s'eleve qu'à la hauteur de seize pieds ou plus, la tige ou le tronc est mince: Le bois est dur & frêle; des tiges grosses & droites il en sort de plus petites horizontalement & vis à vis les unes des autres; les feuilles y sont disposées par paires, & ressemblent à celles du poirier. Au bout de ces petites branches on trouve les fleurs, qui croissent ordinairement deux ou trois ensemble sur une queue d'environ un pouce de long. Ces fleurs sont composées de quatre pétales blancs ornés dans le milieu d'une touffe d'étamines, un triple stile & couronnées de somets jaunes.

A ces fleurs succèdent des capsules rondes se terminant en pointes, qui contiennent plusieurs petites semences dans des cellules divisées par des membranes minces. Le seul arbre de cette espèce, que j'aye jamais vu, croissoit sur le bord de la rivière Savanna, près de ses cataractes.

*S MIL AX non Spinosa baccis rubris.*

THESE Plants are always supported by Trees and Shrubs, on which they creep and clasp with their Tendrils, the Leaves are long and narrow at both Ends; they are thick, stiff, and shining, with a single Rib in the Middle, and are set alternately at wide Distances. At the Ends of the smaller Branches are produced hexapetalous greenish white Flowers which grow in umbelliferous Tufts, and are succeeded by globular mucilaginous red Berries, each Berry containing a very hard round Stone. These Plants with their glittering Scarlet Fruit, and by retaining their green Leaves, make an elegant appearance all the Winter, at which Season the Berries serve as Food to Thrushes and other Birds, and the whole Plant as a warm shelter for them in that cold Season: They grow in Bogs and watery Land in Carolina.

CES Plantes sont toujours supportées par des arbres ou arbrisseaux sur lesquels ils montent à l'aide de leurs tendrils; Les feuilles sont longues & étroites aux deux bouts; elles sont épaisses, dures & luisantes, avec une seule côte dans le milieu, elles sont placées alternativement & éloignées les unes des autres. Il croît au bout des petites branches des fleurs hexapétales d'un blanc verdâtre qui sont disposées en umbelles. Il leur succèdent des baies mucilagineuses rondes & rouges avec un noyau dur & rond. Ces Plantes paraissent extrêmement belles pendant tout l'hiver avec leur fruit d'écarlate & leurs feuilles toujours vertes; les Grives & autres oiseaux mangent ces grains pendant l'hiver, & la Plante leur donne aussi un couvert contre le froid. Elles croissent dans les endroits marécageux & inondés de la Caroline.

*P HALÆ NA plumata caudata, Caroliniana, virescens oculata. Pet. Mus.*  
P. 69. N° 733.

The four Eye'd Night BUTTERFLY.

Papillon de nuit à quatre yeux.

THE Body of this is dusky white, except that near the Head, there is a transverse Stripe of Copper Colour, its Legs are Copper Colour; the Antennæ broad pointed at the Ends, and pinnated; the Ground Colour of all the Wings is greenish yellow, the upper Edge of the two upper Wings are verged with Copper Colour, as are the exterior Edges of all four Wings: In the Middle of every Wing is a Spot resembling an Eye, the Sight of which is transparent like Izing-glaſs; the Place of the Iris is a white Border below, and a red one above, joined to a List of black of equal Length. The singular Form of the lower Wings seem to distinguish it from all other Butterflies. The Chryſſalides of these Flies are found in Winter hanging pendant to the Twigs of leafleſs Trees of an oval Form and ſilky Conſtance.

These Flies are found in Virginia, Carolina, Maryland, and Philadelphia, &c.

Le Corps de celui-ci est d'un blanc brunâtre, excepté près de la tête où il a une raye en travers de couleur de cuivre, ses pieds sont aussi couleur de cuivre, les Antennes sont pointées aux bouts & en forme des plumes, le fond des ailes est d'un jaune verdâtre, la marge supérieure des deux ailes supérieures est bordée d'une couleur de cuivre, de même que les marges extérieures des quatre ailes: Au milieu de chaque aile on voit une tache qui ressemble à un Oeil dont la prunelle est transparente comme le Talc; l'endroit de l'iris est une bordure blanche en bas & une rouge sur le haut, à laquelle se joint une ligne noire d'une longueur égale. La forme singulière des ailes inférieures distinguent ce Papillon de tous les autres. On trouve les Chryſſalides de ces Moucheſ en hiver qui pendent aux branches des arbres ſans feuilles d'une forme, ovale, & d'une confiſſion approchant de la ſoye. On trouve de ces Moucheſ dans la Virginie, Caroline, Maryland, Philadelphie &c.







85



*ANONA fructu lutescente, lævi, scrotum Arietis referente.*



THE Trunks of these Trees are seldom bigger than the Small of a Man's Leg, and are about ten or twelve Feet high, having a smooth greenish brown Bark. In March when the Leaves begin to sprout, its Blooms appear, consisting each of six greenish white Petals. The Fruit grows in Clusters of three, and sometimes four together; they are at first green, and when ripe yellow, covered with a thin smooth Skin, which contains a yellow Pulp, of a sweet luscious Taste; in the Middle of which lye in two Rows, twelve Seeds divided by so many thin Membranes. All Parts of the Tree have a rank, if not a foetid Smell; nor is the Fruit relished but by very few, except Negro's. These Trees grow usually in low shady Swamps, and in a very fat Soil.



*E*Tronc de ces arbres n'est ordinairement que de la grosseur du bas de la Jambe, ils ont environ dix ou douze pieds de haut, l'écorce est unie & d'un brun verdâtre. Les feuilles commencent, à venir au mois de Mars, les fleurs paroissent alors & consistent chacune de six petals d'un blanc verdâtre. Le fruit croît en grape de trois & quelques fois de quatre, il est verd au commencement, & jaune quand il est meur, couvert d'une peau unie & mince qui renferme une poulpe jaune d'un goût doux & fade, & au milieu on y trouve douze semences en deux rangs, chaque pepin est séparé par une petite membrane mince. Toutes les parties de cet arbre ont une odeur forte, ou pour mieux dire puante; il n'y a presque personne qui mange de ce fruit, excepte les Negres. Ces arbres croissent ordinairement dans des endroits bas & ombrageux, & sur une bonne terre grasse.

*ANONA maxima, foliis oblongis, angustis; fructu maximo luteo conoide; cortice glabro in areolas angulares distincto.*



HIS differs from the Custard Apple, Hist. Jam. Vol. II. p. 167. in having the *areolæ* angular, whereas those are round like the Scales of Fish.

These Shrubs grow sometimes with a single Trunk, but more commonly they rise with several small Stems to the Height of about ten Feet, the Leaves are shaped like those of the Bay, set alternately on stiff slender Stalks, from which also hang single Flowers, consisting each of three greenish sharp-pointed Petals, the whole Plant has a strong foetid Smell. The Fruit when ripe is of a roundish conic Form, covered with angular Protuberances, within which is a sweet insipid Pulp, with several shining black Seeds lodged therein. The Fruit of this Tree is esteemed not unwholesome, and are eat by some People, but they serve mostly for Food to *Guanas*, and other Animals inhabiting the Bahama Islands, on which they grow.



*ELUI-CI est different de l'Anona, Hist. Jam. Vol. II. p. 167. ayant les protuberances angulaires au lieu que les autres les ont rondes comme une écaille de poisson.*

*Ces Arbrisseaux n'ont quelquefois qu'un seul tronc, la plupart en ont pourtant plusieurs d'environ dix pieds de haut, les feuilles ont la forme de celles du Laurier, rangées alternativement sur des petites pedicules roids, d'où pendent aussi les fleurs simples composées chacune de trois petals fort pointus & verdâtres. Cette Plante a une odeur forte & désagréable. Quand le fruit est meur, il est presque conique, & couvert d'une sorte de bosses angulaires où il y a une poule douce & fade avec plusieurs grains noirs & luisans. On n'en croit pas le fruit mal-sain, il y a des gens qui en mangent, il sert de nourriture aux Guanas & autres animaux des Isles Bahama où ces arbrisseaux croissent.*

*PHALÆNA magna, ex rufa & albo varia, Americana.*

The largest *Carolina* Moth.

**T**HIS Moth has a large Body, the *Abdomen* is encompassed by five Rings of a muddy red Colour, the Eyes are large and spherical, the Legs fix in Number and large, the *Antennæ* broad and feathered, the Area or Ground Colour of all the Wings is of a reddish brown Colour, with these following additional Marks; in the Middle of every Wing is a large red and white Spot, in Form resembling a Kidney, one third of the lower Part of every Wing is bordered with alternate Lists of white, red, yellow, black and brown, the further Corner of the two upper Wings have each an oval black Spot, in which is a semicircular white Mark.

Thus much of its Description with the bare Figure is sufficient to distinguish this Butterfly.

**T**HE Catterpillar of this Moth is enclosed by two Silk Bags of an oval Shape, the innermost smooth within, on the outside the Silk lying loose, and is covered by another Membrane of a thinner, smoother, and of a more compact Texture, and not of so uniform a Structure, as appears by the Figure, tho' they frequently vary in Size, and somewhat in Form. These Bags are found artfully fixed to the Twigs of Trees, some hanging pendant, others horizontally. This Moth is a Native of *Carolina*, and other Provinces more North.

**C**ETTE Papillon a le corps grand, l'abdomen est entouré de cinq anneaux d'un rouge sale, les yeux sont grands, & ronds, elle a six grandes jambes, les antennes larges & plumacés, le fond des ailes est d'un rouge brun, elle a de plus les taches suivantes: Il y a au milieu de chaque aile une tache assez grande rouge & blanche, en forme d'une faveole; le tiers de la partie inférieure de chaque aile est bordé de bandes alternativement de blanches rouges, jaunes, noires & brunes, le coin les plus éloigné des deux ailes supérieures a une tache noire & ovale dans laquelle il y a une marque blanche semicirculaire. La description & la figure de ce Papillon suffiront pour le faire distinguer des autres.

**L**A Chenille de cette Papillon est enfermée dans deux enveloppes de soie de forme ovale, l'intérieure est unie en dedans, & en dehors les files ne sont point attachées, l'un à l'autre; elle est couverte d'une autre membrane plus mince & plus unie & d'une contexture plus serrée, & d'une construction qui n'est pas uniforme, comme on le voit dans la figure, quoi qu'elles diffèrent souvent en grosseur & un peu en forme. On trouve ces espèces de cocon artificiellement attachées aux branches des arbres quelques unes pendantes & d'autres horizontalement. Cette Papillon se trouve dans la Caroline & autres Provinces plus au Nord.









*ANONA* foliis Laurinis, in summitate incisis; fructu compresso  
scabro fuso, in medio acumine longo.

The SAPPADILLO TREE.

**A**HES Trees grow to a middling Height and Size, having a rough brown Bark. Their Leaves are of an oblong Oval Form, with a Notch at their Ends. The Flowers seemed to be monopetalous, but as I had not an Opportunity of seeing them in Blossom, I am necessitated to refer to this Plate, which shews at Fig. 1. the Fragments of the decayed Flowers, and Fig. 2. the Buds of the Blossoms hanging pendant; tho' the Fruit generally grow erect to Foot-stalks of above an Inch long, and are usually of the Size of a large Walnut, round, but compressed, having a very rough russet Coat of a brown Colour, with a sharp brittle Spine growing out of it; under this Coat is a spongy Pulp, full of milky Juice of a pleasant Sweetness when the Fruit is perfectly ripe; but if not, very astringent and disagreeable. Several hard Seeds are contain'd within the Fruit, of the Form here exhibited. These Trees grow on *Andros*, and some other of the *Bahama* Islands, and are Food for, and much coveted by Birds, *Guana's* and other Animals.

*CONVOLVULUS* foliis variis, inferioribus trifariis divisus, superioribus sagittatis; floribus ex rubro purpureis.

**T**HIS *Convolvulus* climbs upon Trees and Shrubs in dark Thickets and shady Woods. The Leaves are sharp-pointed, in Form not unlike the Head of an Arrow or Javelin, except some Leaves towards the Root, were trifoliate and remarkably different from the rest. The Flower is tubulous, with an open pentagonal Cup, and of a purple red Colour. This with the *Anona* I found joined in the Manner here exhibited.



*ES* Arbres viennent à une grandeur & grosseur assez mediocre, l'écorce en est brune & dure. Les feuilles sont d'une figure oblongue avec une entaille à leur extrémité. Les fleurs paroissent être monopétales, mais comme je n'ai pas eu l'occasion de les voir en fleur, je suis obligé de renvoyer le Lecteur à la Planche qui fait voir dans la fig. 1. les fragmens de quelques fleurs flétries & à la fig. 2. les boutons des fleurs qui pendent; quoique le fruit croisse ordinairement droit en haut sur une queue d'un pouce de long, il est à peu près de la grosseur d'une noix, rond & aplati dans une couverture brune & rude d'où il sort une épine pointue & frêle, il y a sous cette enveloppe une poulpe spongieuse, pleine d'un jus laiteux d'une douceur agréable quand le fruit est tout à fait meur; mais s'il ne l'est pas il est astringent & désagréable. On trouve dans ce fruit plusieurs semences dures & de la forme semblable à la figure. Ces arbres croissent dans l'Isle Andros & autres des Isles Bahama, les oiseaux, les Guanas & autres animaux en mangent le fruit qu'ils aiment extremement.

**C**E Liseron monte sur les arbres & arbrisseaux dans les bosquets & bois ombragés. Les feuilles sont pointues & ressemblent à la pointe d'une flèche ou d'une Javeline, il s'en trouve quelques unes vers la racine qui sont découpées en trefles, & different beaucoup des autres. La fleur est tubuleuse & forme une Coupe ouverte pentagonale, d'un violet tirant sur le rouge. J'ai trouvé ce Liseron joint à l'*Anona* de la manière qu'il est représenté ici.

*VIScum radice bulbosa; Floris labello carneo, ceteris sordide luteis.*



HIS bulbous rooted Plant grows only to the Trunks, and on the Limbs of Trees. Its Fibres insinuating into the Crevices of the Bark where they take such firm Rooting that great Strength is required to tear them from the Trees. The Roots grow many of them in a Cluster; from each Bulb rises one, and sometimes two smooth yellow green Leaves, like those of a Narcissus, except that they are concave on the Inside, and capable of receiving and conveying Water to the Roots for their Nutrition and Refreshment: From the Roots also arise a single stiff, small Stalk of about sixteen Inches in Length; on the Top of which are set several Flowers, each consisting of five dirty yellow Petals, spreading open at equal Distances, in the Centre of which came forth the remaining Part of the Flower, resembling somewhat the Flower of an *Orchis*, as exhibited here in its progressive Appearance and different Positions. They grow on the *Bahama Islands*.



ETTE plante à racine bulbeuse, ne croit que contre les troncs & les branches des arbres, ses fibres s'insinuent dans les fentes de l'écorce, où ils se cramponent si bien qu'on à de la peine à les en arracher. Plusieurs racines croissent en paquet, de chaque bulbe il s'élève une & quelquefois deux feuilles lisses d'un vert jaunâtre, comme celle du Narcisse, excepté qu'elles sont concaves en dedans & capables de recevoir de l'eau & la conduire vers la racine pour la rafraîchir & la nourrir: Il s'élève aussi de la racine une petite tige droite de la hauteur d'environ 16 pouces, au bout de laquelle on voit plusieurs fleurs, chacune consiste en cinq pétales d'un jaune sale, qui s'ouvrent en distances égales, le reste de la fleur sort du milieu d'elle & ressemble un peu à la fleur d'un Orchis, comme il se voit ici dans la figure, où l'on a représenté les changemens qui lui arrivent en croissant, & ses différentes positions. Cette plante croît dans les îles Bahama.

*VIScum Cariophylloides, Lilii albi foliis, Floris labello brevi purpureo, ceteris Petalis ex luteo virescentibus.*

THESE Plants after the Manner of the precedent grow upon Trees, and sometimes upon Rocks, being also bulbous, one Bulb producing usually two Lilly-like Leaves, between which shoots up a green succulent Stalk, with Flowers at the Top; set alternately on Inch long Foot-stalks, as appears in the Figure. These also grow on the *Bahama Islands*.

CES plantes aussi bien que la précédente, croissent contre les arbres & quelque fois sur les rochers, elles sont aussi bulbeuses, un bulbe produit ordinairement deux feuilles qui ressemblent à celles du Lis, il sort une tige verte succulente d'entre ces deux feuilles & des fleurs au haut rangées alternativement sur des queueüs d'un pouce de long, comme on le voit dans la figure. Cette plante croît aussi dans les îles Bahama.

PAPILLIO, &c.

THE Body of this Butterfly is black, with a few white Spots near the Head. The Ground of all the Wings is red, through which runs many black Lines or Ribs in different Directions: The Wings are verged round with black, through which runs a double Line of white Spots. The outermost Corner of the two fore Wings are blended with red and black, with some larger Spots of white. These Butterflies are common in most of the Northern Colonies in America.

Le corps de ce Papillon est noir & a quelques taches blanches près de la tête: Le fond de toutes les ailes est rouge mais traversé par plusieurs lignes ou bandes noires posées en différentes directions: Les ailes sont bordées de noir au travers duquel on voit une double rangée de tâches blanches. Le coin extérieur des deux ailes de devant est entremêlé de rouge & de noir avec quelques tâches de blanc. On voit de ces Papillons dans presque toutes les Colonies du Nord de l'Amérique.







89



*VISCUM Cariophylloides angustifolium, Floribus longis tubulosis cæruleis, ex spicis squamosis cæruleis erumpentibus.*

The WILD PINE.

HIS Plant rises from a round tuberous Root, with many Fibres spreading on the Surface of the Limbs and Branches of Trees, insinuating a little Way into the Bark; from the Root grow many concave Leaves, folded in a Manner like those of the *Ananas*, the Outsides are prominent and large below, tapering into narrow grassy Points, reflected back and hanging down; from the Middle rises a round streight Stalk, at the Top of which are placed five (more or less) red scaly Spikes five or six Inches long, from the Sides of which shoot forth obliquely, several cylindrical, tubulous, monopetalous blue Flowers, with several *Stamina*, and a yellow *Stylus*; the Flower consisting of one Leaf only, is folded spirally in a singular Manner. These Plants grow to various Sizes, from one to two Feet and upwards in Height, growing always erect.

But what recommends this useful and very singular Plant is, that its hollow Leaves lapping over one another, are so closely placed, that one Plant will contain two Quarts of clear Water. In many Countries between the Tropicks that are destitute of Water, having neither Springs nor Rivers, these Plants abound, and are of great Benefit in relieving the Thirsty in Distress, as I have often experienced in Draughts of this refreshing Water, which tho' receiving the Heat of the Sun's perpendicular Rays, was always as cool as from a Spring.

These Plants are common on many of the *Bahama Islands*, and usually grow on large Trees, particularly to *Mahogony*, *Sappadillo*, *Mancanel*, &c. which are sometimes so covered with them, that they seem to be the Leaves and Blossoms of the Tree on which they grow, and make a very elegant Appearance.



Anana Sauvage.

ETTE Plante sort d'une racine ronde & tuberculeuse avec quantité de fibres qui se repandent sur la surface des branches & des autres parties des arbres, où elles s'insinuent un peu dans l'écorce: Il vient de la racine plusieurs feuilles concaves pliées en quelque façon comme celles de l'*Ananas*; ils sont promenants en dehors & large; embas elles vont toujours en diminuant, & se terminent enfin en des pointes étrictes & herbenes retournées en arrière & pendentes. Il sort du milieu une tige ronde & droite, au haut de laquelle il se trouve cinq pointes rouges & écaillées plus ou moins de cinq ou six pouces de long, des côtes desquels sort obliquement plusieurs fleurs bleues cylindriques, tubuleuses & monopétales avec plusieurs étamines; & un stile jaune: la fleur n'est composée que d'une seule feuille, & pliée en spirale d'une maniere particulière. Ces Plantes ne sont pas toutes de la même hauteur, elles ont deuis un pied jusques à deux, & sont toujours toutes droites. L'usage le plus excellent de cette plante utile & admirable vient de ce que ses feuilles étant creuses pliées l'une dans l'autre sont en si grand nombre, qu'une seule plante contient deux quartes d'eau claire. Dans plusieurs païs entre les Tropiques, où l'eau manque, n'ayant ni fontaines ni rivieres, on trouve grand nombre de ces Plantes, qui sont d'un grand secours aux gens alterez, comme j'ai expérimenté souvent moi-même en buvant des bons coups de cette eau rafraîchissante; car quoique le soleil y darde ses rayons perpendiculairement, elle est toujours aussi fraîche que celle d'une fontaine. Ces Plantes sont assez communes dans plusieurs des Isles Bahama, & viennent ordinairement sur les grands arbres, & particulièrement sur le Mahogony, le Sappadillo, le Mancanel, &c. qui en sont quelquefois si couverts, qu'il semble que ce soient les feuilles & les fleurs de l'arbre même sur lequel elles croissent, ce qui fait une veue fort agreeable.

*LOCUSTA Caroliniana, elytris fuscis; alis interioribus nigris, ad extremitates luteis.*

Sauterelle.

THE whole Body with the Legs and the two fore Wings of this Grasshopper is of a brown Colour; the two broad Wings which are placed behind, are black, and bordered with yellow towards their Extremities. These Grasshoppers are found in *Carolina*.

TOUT le corps, les jambes & les deux ailes de devant de cette Sauterelle est de couleur brune: Les deux grandes ailes de derrière sont noires & bordées de jaune vers leurs extrémités. On trouve de ces Sauterelles dans la Caroline.

*KETMIA, amplissimo Tiliae folio, subtus argenteo, Flore magno luteo.*

The MAHO-TREE.



HESE Trees usually rise with several Stems about five or six Inches thick, and twenty five or thirty Feet high, with a light brown smooth Bark. The Leaves are set on pretty long Footstalks, and are in Shape of an Heart, their under Sides being of a pale light Green. Its Flowers are compos'd of five yellow Petals, standing in a green pentaphyllous Calix. Its Seed Vessel is divided into five Cells, by the same Number of thin Membranes, and contain many black Seeds, formed like those of the Mallow Kind. The inner Rind of this Tree is very strong, and of great Esteem, which the following Recital from Dampier may serve to illustrate. ‘They (the Musketo Indians) make their Lines both for Fishing and Striking, with the Bark of Maho, which is a Sort of Tree or Shrub, that grows plentifully all over the West Indies, and whose Bark is made up of Strings, or Threads, very strong; you may draw it off either in Flakes or small Threads, as you have Occasion. ‘Tis fit for any Manner of Cordage, and Privateers often make their Rigging of it’.

Sir Hans Sloane, in his *Nat. Hist. of Jamaica*, Vol. I. p. 215. has been yet more particular in the Uses of this Tree.



ES Arbres ont ordinairement plusieurs Tiges de l'épaisseur de cinq ou six pouces, & de 25 ou 30 pieds de hauteur, avec une Ecorce unie & brune: Les feuilles tiennent à des pedicules assez longues & sont de la forme d'un Cœur; le dessous en est d'un verd pale & léger: Les fleurs sont composées de cinq petals jaunes dans un Calix verd à cinq sections. Le vaisseau, qui contient la semence, est divisé en cinq cellules par autant de membranes très minces, qui renferment quantité de graines noires qui ressemblent à celles de la Marve. L'Ecorce interne de cet arbre est très forte & en grande estime, comme on peut voir dans le Recit suivant tiré de Dampierre: ‘Les Indiens nommés Musquito ne font leurs lignes à pêcher, & les cordes de leurs harpons que de l'écorce du Maho, qui est une espece d'arbre ou arbrisseau, qui croît en abondance dans tout l'Amérique, & dont l'écorce est composée de fibres ou filets très forts; on peut l'ôter par morceaux ou par filets, comme vous voulez. Il est propre à toute sorte de Cordage. Les Armateurs en font souvent leurs cordages’.

Monsieur Sloane parle plus particulièrement de cet arbre dans son *Histoire Nat. de la Jamaïque*, Vol. I. p. 215.

*PHALÆNA fusca, &c.*

THE under Part of the Body of this Moth is of a dusky white, encompassed by five brown Rings, the Ground Colour of all the Rings on the under Side is brown, and blended with innumerable waved Lines; near the Shoulder of each upper Wing is a black Spot, in Form of an Horshoe, in the Curve of which is a white Spot; at the further Corners of the same Wing is another black Spot shaped like an Heart, near which are two other black Marks in Form of Bellemnites, The lower Part of these upper Wings are also bordered with broad waved white Lines. On the upper Part of the lower Part of the Wings are two black Spots, in Form likewise of an Heart, with a Crescent of yellow in the Middle of each; below which are two other yellow Crescents bordered with black, and below them are two large black Spots, in each of which is a narrow Semicircle of white, and bordered with a List of yellow, over which joins a Crescent of black, and above that another of brown.

LA partie inférieure du corps de cet insecte est d'un blanc obscur, environné de cinq anneaux bruns; le fond de toutes les ailes par dessous est aussi brun & entremêlé d'une infinité de lignes ondées: Pres de l'épaule de chaque aile de dessus se trouve une tache noire de la figure d'un fer à cheval, dans la courbure de laquelle est une tache blanche: il y a une autre tache noire au bout du coin de la même aile en forme de cœur; & deux autres marques noires tout auprès en forme de Bellemnites: la partie inférieure de ces ailes de dessus est aussi bordée de lignes blanches ondées. Il y a deux taches noires sur la partie supérieure des deux ailes de dessous, en forme de cœur, avec un croissant jaune dans le milieu de chacune, & au dessous il y a deux autres croissants jaunes bordés de noir, & plus bas deux grandes taches noires & dans chacune un demi-cercle blanc & étroit bordé de jaune, il se trouve un croissant noir au dessus, & par dessus ce dernier un autre de couleur brune.

90



D.G.







*CARTOPHYLLUS spurius inodorus, Folio subrotundo  
scabro, flore racemoſo hexapetaloidē coccineo ſpeciosiſſimo.*

Hift. Jam. Vol. II. p. 20. T. 164.

 **H**ESE shrubby Trees grow from eight to twelve Feet in Height, and are usually four or five Inches thick, with a yellowish brown Bark; the Leaves are placed alternately: they are of a dark green Colour, and very rough, shaped like an Heart: The Flowers grow many of them together, they are red, tubulous, spreading open at the Top, and divided into six Sections, the whole standing in a yellowish brown Calix: The Fruit is in Size, and Form of a Pidgeon's Egg, covered with a pale green smooth Skin: The Flesh is of the Consistence of an Apple, and when ripe smells very much like it; in the Middle lies a large Stone, in Form of a Pear, and resembles a dry Tulip Root: The Wood is of a very dark brown Colour, approaching to black, very ponderous, and contains much Gum, in Smell and Appearance resembling Aloes, and is by the Inhabitants of the Bahama Islands (where it grows) called *Lignum Aloes*.



*ES especes d'Arbrisseaux s'elevent depuis huit jusque à douze pieds, ils ont ordinairement quatre ou cinq pouces de Diametre; leur Ecorce est d'un brun jaunâtre; les feuilles sont alternes, d'un verd obscur fort rude, & taillées en cœur: Plusieurs des fleurs naissent ensemble; elles sont rouges tubuleuses, elles s'ouvrent à leur extrémité & se divisent en six sections: toute la fleur est placée dans un calice brun jaunâtre. Le fruit est de la forme & de la grosseur d'un œuf de pigeon, couvert d'une peau unie d'un verd pale. sa chair est de la même consistance, que celle d'une Pomme, & lors qu'elle est meure, elle a beaucoup de son odeur; elle renferme un gros Noyau fait en paille, qui ressemble à une racine sèche de Tulipe; le bois est d'un brun fort obscur presque noir, très pesant & fort gommeux; par son odeur & son apparence il ressemble à l'Aloës: les habitants des îles Bahama, où il croît l'appellent bois d'Aloës.*

*CONVOLVULUS minor Pentaphyllos, flore purpureo minore.*

**T**HIS *Convolvulus* is always found trailing upon Trees and Shrubs; and as I found two such elegant Plants in their natural Embraces, I thought it better to exhibit them here in that very Appearance, than to divorce them: The Leaves are digitated; the Flowers are rather tubulous than Bell shaped; the Outside of them are light green, the Inside purple, with their Verges reflected back, and divided into six Sections. They grow on Rocks on many of the Bahama Islands.

*PHALÆNA ingens, Caroliniana, Oculata è luteo fusca, lineis dilutè purpureis insignita.*

The Great Moth.

**T**HIS Moth hath a large hairy Body, encompassed by six brown Rings, the Antennæ are feather'd; the Ground Colour of the Backside of both Pair of Wings is of a reddish yellow Colour with the following Marks; in the Middle of each of the upper Wings is an oval Eye, or transparent Spot bordered with Black, and at the further Corner of the same Pair of Wings, are in each two small black Spots; a purple and white angular Line crosses each of these Wings near the Shoulders; another purple Line crosses each of these Wings towards the Bottom. The lower Pair of Wings are adorned also with two transparent Spots or Eyes, encompassed with black, blue and yellow Borders. A broad black List, joined to another of purple, crosses these Wings toward the Bottom.

Papillon de nuit, la plus grande, de la Caroline.

*CETTE Papillon a le corps gros & velu, entouré de six anneaux brunes, ses Antennes sont plumacées, le fond du derrière de ses deux paires d'ailes est d'un jaune rougeâtre avec les marques suivantes. Au milieu de chacune des ailes supérieures il y a un œil ovale ou une tache transparante bordée de noir, & au coin extérieur de la même paire d'ailes il y a sur chacune deux petites taches noires; une ligne violette, blanche & angulaire traverse chaque aile proche des épaules, & une autre ligne violette les traverse vers le bas; les ailes inférieures sont aussi ornées de deux taches transparentes ou yeux entouré, de bords noirs, bleus & jaunes; une raye noire & large jointe à une autre violette traverse ses ailes vers le bas.*

*PLUMERIA Flore Roseo odoratissimo. Tournef. Inst.*



HESE Trees rise usually to the Height of about fourteen or sixteen Feet, with a Trunk five or six Inches thick, from which shoot irregularly its Branches, which are large and succulent, on the Top of which are placed the Leaves and Flowers. The Leaves grow many of them together, they are about seven or eight Inches in Length, and two or three broad, of a shining Green. The Flowers are tubulous, and are divided into five Segments; they are of a Rose Colour, and very fragrant. The Seeds are contain'd in a double Pod, like the Rest of the *Neriums*. This elegant Plant was at first introduced from the Continent of *America* to *Barbadoes*, and other of our Sugar Islands, where it is planted in Gardens, and in great Esteem for its Odour and Ornament,



ES Arbres s'élevent ordinairement depuis quatorze jusqu'à seize pieds, avec un tronc de cinq ou six pouces de Diametre; les branches en naissent irregulierement; elles sont grosses & succulentes; les feuilles & les fleurs sont placées à leurs extrémités; les feuilles croisent plusieurs ensemble d'environ sept ou huit pouces de long, & deux ou trois de large d'un verd clair: Les Fleurs sont tubuleuses & divisées en cinq segmens; elles sont de couleur de Rose & fort odorantes; les semences sont contenues dans une double cosse, comme celle des autres Lauriers-roses. Cette belle plante fût d'abord apportée aux Barbades du Continent de l'Amerique, & en d'autres de nos Isles Antilles là où on la cultive dans les jardins, & on l'estime beaucoup à cause de sa beauté & de sa bonne odeur.









*PLUMERIA* *flore niveo, foliis brevioribus obtusis.*  
Plum. Cat.

HIS Shrub grows usually to the Height of ten Feet. Its Leaves are long, in Form, like those of the Oleander, but somewhat blunter at their Ends; they grow in Bunches, at the Ends of the Branches, from which also rises a succulent shining green Stalk, five Inches long, on the Top of which grow the Flowers, in a Cluster, which are mostly white, monopetalous, and tubulous, divided at the Top into five deep Sections, the Inside of which is yellow, as is the Outside of the Tube, tho' not so bright.

The Seed-vessel is a double Pod, seven Inches long, curved at the Insides, and both Ends meeting: At their Time of Maturity the curved Side of each Pod splits open, and displays the Seeds, which are disposed in like Manner as the Scales of Fish.



ET arbrisseau s'eleve ordinairement à la hauteur de dix pieds: ses feuilles sont longues, & ressemblent un peu à celles du Laurier-rose, mais elles sont un peu plus obtuses à leur extremité, elles viennent au bout des branches par paquets, d'où il sort aussi une tige verte & succulente, longue de cinq pouces, au haut de laquelle les fleurs sont attachées en bouquet pour la plus grande partie blanches, monopetales & tubuleuses, divisées à leur extremité par cinq coupures profondes dont le dedans est jaune comme le dehors du tube, quoique la couleur de ce dernier ne soit pas si vive: Le vaisseau qui contient les semences est une double cosse longue de sept pouces courbée en dedans, & dont les deux bouts se joignent, lors qu'elles sont mûres le côté convexe de chaque cosse se fend & montre ses semences qui sont disposées comme les écaillés d'un poisson.

*GRANDILLA, foliis Sarsaparillæ trinerviis; flore purpureo; fructu Olivæformi cæruleo.*

THE Leaves of this Kind of Passion-Flower, are of an oblong oval Form, having three parallel Ribs, extending from the Stalk to the End, with smaller Veins, running obliquely to their Edges: The Flower is made up of ten narrow purple Petals, five of which are long, the other five about half as long: The Pointal arising from the Center of the Flower, is longer than in any other of this Tribe, that I have observed. The Embrio at the End of it, swells to a Fruit, of the Size and Form of an Olive: These Plants, as likewise the Plant on which this is supported, grow plentifully on many of the Bahama Islands, where I painted them in the natural Appearance as is here represented.

LES feuilles de cette espèce de fleur de la Passion sont oblongues & ovales, elles ont trois nerfs parallèles qui s'étendent depuis la queue jusqu'au bout de la feuille, accompagnées de petites veines, qui vont obliquement jusques à leur bord; la fleur est composée de dix pétales étroites & violettes, dont cinq sont plus longues de la moitié que les autres cinq; le stile qui s'élève du centre de la fleur est plus long qu'en aucune autre fleur du même genre que j'aye vue: l'embryon, qui est à son extrémité, devient un fruit en grossissant, gros & fait comme une olive: Ces plantes, & celles par lesquelles elles sont soutenus, sont très communes en plusieurs des îles Bahama, où je les ai dessinées d'après les plantes mêmes comme elles sont ici représentées.

*CERASUS latiore folio ; fructu racemoſo purpureo majore.*

PIGEON-PLUM.



HIS is a large Tree, with a smooth light coloured Bark, the Leaves are about the Size of those of a Pear, but more rounding at the Points. The Fruit is round, and grows in Bunches, like Currans, but larger, and of a purple Colour, with a single Stone in the Middle: In December the Fruit is ripe, and is the Food of Pigeons and many wild Animals; it is a pleasant tasted Fruit, the Wood is hard and durable: It grows on Rocks, on many of the Bahama Islands.



ET arbre est fort grand, son écorce est unie & d'une couleur clair, ses feuilles ressemblent à celle du poirier, quoique plus arondies à leur extrémité, son fruit est rond, & croit en grape comme les petites Groseilles, mais plus gros & violet avec un seul pepin dans le milieu ; il meurit en Decembre, & sert de nourriture aux pigeons & à plusieurs animaux sauvages ; il est de bon goût : Le bois de cet arbre est dur & ne se corrompt pas aisément ; il croit sur des rochers en plusieurs des Isles Bahama.

*ERUCA maxima cornuta.* Hist. Jam. Vol. II. p. 220.

The great horned CATTERPILLAR.

THIS Catterpillar is about four Inches long, besides the Head and Tail, it consists of ten Joints, or Rings of a yellow Colour; on the Head, which is black, grew four Pair of Horns, smooth, and of a reddish brown towards the Bottom, jagged or bearded and black towards the Top; on each of the Rings arise short jagged black Horns, one standing on the Back and two on each Side, below which is a round *trachæa* on each Side; likewise the Horn of the Back of the last Ring is longest: The Flap of the Tail is of a bright bay Colour. It hath eight Feet, and six *Papillæ*.

Grande Chenille à Corne.

CETTE Chenille est longue, d'environ quatre pouces outre la tête & la queue, son corps est composé de dix anneaux jaunes ; sa tête est noire, & porte quatre paires de cornes unies & d'un brun rougâtre vers le bas, dentellées ou barbues & noires vers le haut ; sur chaque anneau il s'élève cinq petites cornes noires barbues ; une élevée sur le milieu du dos & deux de chaque côté ; au dessous desquelles il y a une trachée ronde ; de plus la corne du milieu du dernier anneau est la plus longue de toutes ; l'appendice de la queue est d'un brun clair ; elle a huit pieds & six mammelons.









*MANCANILLA Pyri facie. Plumier Plant. Americ.  
Juglandi affinis Arbor Julifera, &c. Hist. Jam. Vol. II. p. 3.*

The MANCAEEL-TREE.

THESE Trees usually grow to a large Size, having a light coloured smooth Bark, under which is contained a white milky Juice, of a very poisonous Nature; the Leaves are smooth, serrated, somewhat short, and pointed. The Flowers grow at the Ends of the Branches, consisting of small Tufts of very little yellow papous Blossoms, placed at Intervals, the Length of about three Inches: The Fruit was the Size of the Figure, growing erect, and shaped like a Pear, or rather a Fig; but not being ripe, or even full grown, I had no Opportunity of seeing its Seeds, which Sir Hans Sloane, in his *Nat. Hist.* of *Jamaica* says are several, somewhat resembling those of a Melon, and are contain'd in a roundish very hard Stone, with many sharp Points on each Side of it.

The Wood of this Tree is close grained, very heavy and durable, beautifully shaded with dark, and lighter Streaks, for which it is in great Esteem for Tables and Cabinets, and other curious Works in Joynerie; but the virulent and dangerous Properties of these Trees, causes a general Fear, or at least Caution, in felling them; this I was not sufficiently satisfied of, 'till assisting in the cutting down a Tree of this Kind on *Andros Island*, I paid for my Incredulity, some of the milky poisonous Juice spurting in my Eyes, I was two Days totally deprived of Sight, and my Eyes, and Face, much swelled, and felt a violent prickling Pain, the first twenty-four Hours, which from that Time abated gradually with the Swelling, and went off without any Application, or Remedy, none in that uninhabited Island being to be had: It is no Wonder that the Sap of this Tree should be so virulent, when Rain or Dew, falling from its Leaves on the naked Flesh, causes Blisters on the Skin, and even the *Effluvia* of it are so noxious as to affect the Senses of those which stand any Time under its Shade: Other malignant Effects are commonly attributed to it, but I think with little Probability, one Charge of their pernicious Quality is, that Animals which feed on the Fruit, are so infected by it that Death is often the Fate of those that feed on such Animals: this is refuted in the Instance of *Guana's* feeding on the Apples of Mancaneel without Harm to those who eat these same *Guana's*, p. 64. Vol. II. the Report also that the *Baracudas* and other Fish receive their poisonous Quality by feeding on Mancaneel Apples, this is likewise erroneous, there being very few of these Trees on those of the *Bahama Islands*, I was at, and none growing on the Sea-shore, nor within many Miles of those Parts of the *Bahama Seas*, where these infectious Fish are known to abound; and admitting they were in Plenty, the Nature and Position of the Land admits of no Conveyance by Channels or otherwise into the Sea. Thus it is evident that the Fruit of these Trees will not infect the Flesh of Animals, and supposing they had that Effect, the Quantity of the Fruit, received into the Sea, would not be sufficient to infect the thousandth Part of the Fish that are generally known to be poisonous. As to the real Cause of poison Fish in the *Bahama Seas*, and elsewhere near the *Tropicks*, I shall attempt to account for it in another Place. In the mean Time I beg Leave to refer to the above learned Author, who has given farther Particulars relating to this remarkable Tree in his *Natural History of Jamaica*, Vol. II. p. 4.

*VISCUM foliis latoribus; baccis purpureis pediculis incidentibus.*

THE Leaves of this Misleto grow by Pairs, they are narrow at their Beginning, and broad at their Ends, set on slender pliant Stalks, growing confusely, after the Manner of the common Misletoe; between every Pair of Leaves shoots forth two slender Stalks of about three Inches long, with Pairs of oblong purple coloured Berries, set opposite to each other.

These Plants I found growing on many of the *Mancaneel* Trees, but did not observe them on any other Tree.

*PAPILIO medius, Gadetanus, ex nigro & sulphureo varius, maculis coccineis notatus.*

THE upper Part of the Body of this Fly is black, with two Rows of red Spots, below which on each Side are the like Number of white Spots; the upper Sides of the four Wings are variously marked with yellow, brown, and red Spots, which last are all encompassed with brown: The under Part of the Wings are differently marked, tho' with the same Colours, except that the two lower Wings have a large Portion of white.



MANCENILLIER.

ES arbres deviennent ordinairement fort grands, leur écorce est unie, & d'une couleur claire; on trouve au dessous un suc laiteux qui est un poison tres dangereux; les feuilles sont liées dentellées un peu courtes & pointues: les fleurs naissent aux extrémités des branches, elles consistent en bouquets des fleurs jaunes papuees fort petites, placées par intervalles & occupant environ trois pouces de longueur; le fruit étoit de la même grandeur que la figure; il croit tout droit, & a la forme d'une poire, ou plutôt d'une figue; mais comme il n'étoit pas encore mûr, ou même arrivé à sa juste grandeur, je n'ai pas vu ses semences, que Monsieur Sloane dans son *Histoire de la Jamaïque* dit être en grand nombre ressemblant un peu à celles du melon, & renfermées dans un noyau presque rond, très dur & garni de pointes fortes iugées de chaque côté.

Le bois de cet arbre a le grain serré, il est fort pesant & durable, ondé fort agréablement de veines claires & obscures, ce qui le fait rechercher pour les tables & autres les plus beaux ouvrages de menuiserie; mais la qualité venimeuse de ces arbres fait, qu'on craint de les abattre, où du moins on est obligé à des grandes précautions en le faisant. J'étois un peu incrédule sur cet article jusqu'à ce que j'en fus convaincu par ma propre expérience en voyant couper un de ces arbres à l'île Andros, car un peu de ce suc laiteux & venimeux, me sautant dans les yeux je fus entièrement aveugle pendant deux jours, j'eus les yeux & le visage fort enflé, & pendant vingt & quatre heures je sentis une violent douleur, elle diminua ensuite peu à peu avec l'ensuive, & se passa enfin sans application extérieure, ni aucune remède; car il n'y en avoit point à trouver dans cette île inhabitée: il n'est pas surprenant que la sève de cet arbre soit si virulente puis que la pluie ou la rosée, qui tombe de ses feuilles sur un corps nu, y fait des ampoules; & même ses exhalaisons sont si dangereuses qu'elles affectent les sens de ceux qui s'arrêtent quelque tems sous son ombre, on lui attribue encore d'autre mauvais effets, mais je crois sans beaucoup de probabilité: On dit comme une preuve de sa qualité pernicieuse, que les animaux, qui vivent de son fruit, en sont si infectés, qu'il cause souvent la mort de ceux qui les mangent; cela est refuté par l'exemple des *Iguanas* qui mangent les pommes du Mancenillier sans qu'il arrive de mal à ceux, qui mangent ces *Iguana's*, pag. 64. Vol. II. L'opinion, que l'on a, que quelques poisssons prennent leur qualité venimeuse en se nourrissant de ces pommes, est aussi mal fondée, car il y a peu de ces arbres dans les îles Bahama où j'ai été, & aucunne vient sur le rivage, ni à plusieurs miles pres de ces endroits des mers Bahama où ces poisssons se trouvent en quantité, & quand il y auroit plusieurs, la nature & la situation du terroir ne permettroit pas, qu'ils fussent portés à la mer de quelque maniere, que ce soit. Ainsi il est évident, que le fruit de ces arbres ne peut infester la choir des animaux, & quand il auroit cette qualité, il en va si peu à la mer qu'il ne seroit pas capable de la communiquer à la millième partie des poisssons que l'on fait être venimeux. Je tâcherai d'expliquer dans un autre endroit ce qui rend tant de poisssons venimeux dans les mers de Bahama, & ailleurs entre les Tropiques, en attendant je prie le lecteur de consulter le savant auteur cité ci-dessus, qui dans son *Histoire de la Jam.* Vol. II. p. 4. s'est étendu d'avantage sur cet arbre extraordinaire.

LES feuilles de ce Guy croissent par paires, elles sont étroites à leur commencement, & large à leur extrémité, attachées à des pedicules minces & plians, elles naissent confusément comme celles du Guy commun, entre chaque paire de feuilles il pousse deux petites tiges d'environ trois pouces garnies d'une paire de baies longues violettes vis à vis l'une de l'autre; je n'ai trouvé de ces plantes que sur des Mancenilliers.

LE dessus du corps de ce Papillon est noir, garni de deux rangs de taches rouges, qui ont sous elles autant de taches blanches; le dessus des quatres ailes sont différemment marquées de jaune, de brun & de rouge, les taches de cette dernière couleur sont toutes entourées de brun, le dessus des ailes ont des taches différemment disposées, quoique des mêmes couleurs, excepté que les deux ailes inférieures ont beaucoup de blanc.

*PRUNUS maritima racemosa, folio rotundo glabro; fructu minore purpureo.* Hist. Jam. Vol. II. p. 129.

The MANGROVE GRAPE TREE.



HE Trunks of these Trees are frequently two Feet thick, and seldom aspire above the Height of twenty or twenty-five Feet, the Bark is smooth, and of a brown Colour, the Leaves are set alternately, they are thick, broad, and almost round; and are eight, and some ten Inches Diameter; their middle Ribs are large and of a purple Colour, as are the smaller Veins; below the Pedicles of the Leaves, the Stalks are surrounded with a thin Purple Skin, or Membrane, an Inch in Width. The Flower-Stalks are usually ten Inches long, thick, succulent, and spongy, and rise at the Pedicles of the Leaves, usually standing upright, these Stalks except about three Inches of their lower Parts are thick set to the End; with small pentapetalous, greenish white Flowers, with yellow Stamina: These Flowers are succeeded by Pear shaped Fruit, about the Bigness of Cherries, resembling them also in the Consistence of their Pulp, and smooth Skin, but are of a purple Colour, inclosing a roundish Shell, thinner than that of a Filbert, and pointed at one End, within which lies the Kernel, of a singular and pretty Form, being flat at one End, and conic at the other, divided by three deep Furrows. This Fruit has a refreshing agreeable Taste, and is esteem'd very wholesome, but if the Stone be kept long in the Mouth, it is violently astringent: I never saw any but what grew near the Sea. They are plentiful on many of the Bahama Islands, and in many other Countries between the Tropicks, but are no where to be found North or South of them: The Flower-stalk when the Fruit approaches to Ripe ness, is shrunk, and much less than when the Blossoms were on it.

Dampier says the Wood of this Tree makes a strong Fire, therefore ued by the Privateers to harden the Steels of their Guns, when faulty.



ESTRONS de ces arbres ont ordinairement deux pieds de diametre, & ne s'elevent gueres qu'à vingt ou vingt & cinq pieds; leur écorce est unie & brune, leurs feuilles sont alter es, épaisses, larges, & presque rondes, elles ont huit, & quelquefois dix pou es de diametre; la côte du milieu est grosse & violette comme les autres petites veines; au dessous des pedicules des feuilles les tiges sont entourées d'une peau mince & violette large d'un pouce; les tiges des fleurs ont ordinairement huit pouces de long, elles sont épaisses succulentes & spongieuses, elles naissent à la queuee des feuilles, & sont ordinairement toutes droites; ces tiges à trois pouces environ de leur naissance sont entierement couvertes jusques à leur extremité de petites fleurs a cinq petales d'un blanc verdâtre, avec des étamines jaunes; il succede à ces fleurs des fruits en forme de pois gros à peu près comme une cerise, & leur ressemblant par la consistence de leur pulpe & de la lissure de leur peau, mais elles sont violettes & renferment une coque ronde, plus mince que celle des noisettes, & pointue par un bout, dans laquelle se trouve le noyau dont la forme est jolie & singuliere, étant plate par un bout, conique par l'autre, & divisée par trois sillons profonds. Ce fruit est d'un goût rafraichissant & agréable, on le croit fort Jain, mais si on en garde long tems le noyau dans sa bou che, il est fort astringent; je n'ai jamais vu de ces arbres que proche de la mer, il y en a un grand nombre dans plusieurs des Isles Bahama, & partout entre les Tropiques, mais on n'en trouve point au delà, ni au nord, ni au sud. La tige des fleurs se fanne, & se diminue, quand le fruit commence à meurir, & devient beaucoup plus petite, que lorsqu'elle étoit couverte de fleurs. Dampier dit que le bois de ces arbres fait un feu fort vif, & c'est pour cela, que les Armateurs s'en servent pour tramer l'acier de leurs fusils, quand il n'est pas bon.

*PHALÆNA Caroliniana, minor; fulva, maculis nigris alba linea, pulchrè aspersis.* Pet. Gaz. Nat. Tab. III. Fig. 2.

Papillon de Nuit.

THIS Moth has a dusky white Body, with a few black Spots near the Head; the two upper Wings are yellow, each of which is crossed by six white Lines, spotted with black; the two under Wings are red, with their lower Parts verged with black. These Moths are found in Carolina.

LE corps de ce Papillon est d'un blanc obscur, avec un petit nombre de taches noires vers la tête, les deux ailes supérieures sont jaunes, & traversées chacune de six lignes blanches, tachetées de noir; celles de dessous sont rouges, le bas en est bordé de noir. On trouve ces Papillons à la Caroline.









*ACACIA* foliis amplioribus; siliquis cincinnatis. Plum. Cat.

**A**N the Bahama Islands these Trees grow to about fifteen Inches in Thickness, and thirty or more Feet in Height; with a rough brown Bark: The Leaves are like those of the *Phillirea*, growing by Pairs. The Flowers are globular, composed of numerous scarlet Filaments, produced from small green *Capsula*'s; many of the Flowers grow together on long Footstalks, at the Ends of slender Branches, making an elegant Appearance. The Flowers are succeeded by Pods, of a reddish brown Colour, containing many flatish round shining black Seeds, which when ripe are discharged from out of the Pods, but hang thereto by a scarlet mucilaginous, spongy Substance, which incloses a third Part of every Seed: The Pods grow three or four together, in a wreathed or spiral Manner, which Nature seems to have designed for displaying its Beauties to Advantage; for had the Pods been straight, as those of French Beans, these glittering Seeds would have been much obscured. The Seeds are Food of Wild Pigeons, &c.

**C**ES Arbres croissent aux Isles Bahama jusques à avoir quinze pouces de diametre & trente pieds de hauteur & même plus; leur écorce est rude & brune: leurs feuilles, qui sont placées par paires, ressemblent à celles du *Phillirea*; les fleurs sont globuleuses composées d'un grand nombre de filets écarlates produites de petites capsules vertes; plusieurs de ces fleurs naissent ensemble sur de longues pedicules aux extrémités des petites branches, ce qui fait un fort beau spectacle: il leur succède des coques d'un brun rougâtre qui contiennent plusieurs semences d'un noir luisant, rondes & aplatiées; lorsqu'elles sont mûres les coques les laissent échaper, mais elles y restent pendues par une substance mucilagineuse, molle & écarlate, qui enferme le tiers de chaque graine; les coques viennent trois ou quatre ensemble tournées en spirales, ce qui semble que la Nature a fait pour en déployer mieux les beautés, car si les coques avoient été toutes droites comme celles des Haricots, ces graines brillantes n'auroient pas si fort frappé les yeux. Elles servent de nourriture aux Pigeons sauvages, &c.

*PAPILIO diurna, prima, omnium maxima.* Mouffet p. 98. Raii Hist. Insect. p. 111. *Mamankanois* in M. S. D<sup>ni</sup>. Gualteri Raleigh penes D. Hans Sloane.

**T**HE Body of this Fly is yellow and black, the Eyes spherical, it is eight Inches from the Extremity of one upper Wing to the other, which are pointed, as are likewise the Bottom of the under Wings: The Edges of the four Wings are indented, except the upper Margin of each Pair: The Area or Ground of the four Wings is of a Brimstone Colour: The anterior Margins of the upper Wings are verged with Black, having several Strips or Lists running transversely cross the Wings, from which run many black Lines; the under Part of all four Wings are deeply verged with black, and spotted with yellow Crescents; the Verges of the lower Wings having also some round blue Spots.

**L**E corps de ce Papillon est jaune & noir, ses yeux sont sphériques, il y a huit pouces de l'extrémité d'une des ailes supérieures à l'extremité de l'autre, elles sont pointuës de même que le bas des ailes inférieures: les bords de toutes les ailes sont dentellées excepté le bord supérieur de chaque pair; le fond est couleur de souffre, les bords antérieurs des ailes supérieures sont bordées de noir, elles ont plusieurs rayes ou bandes qui les traversent d'où partent un grand nombre de lignes noires: Le dessous des ailes a une large bordure noire, & est tachetée de croissants jaunes, les bordure des ailes inférieures ont aussi quelques taches bleues.

*CHAMÆDAPHNE* foliis Tini, floribus bullatis  
umbellatis.



HIS ever green Shrub rises usually to the Height of five or six Feet, and sometimes twice that Height: The Stems of some are as big as the small of a Man's Leg, though generally they are smaller, and covered with a rough brown Bark: The Wood is very close grained, heavy and hard, like Box: The Limbs in general are crooked and grow irregular, but are thick cloathed with stiff smooth Leaves, of a shining bright green, most of which are contracted, as in the Figure: The Flowers grow in Bunches on the Tops of the Branches, to Foot-stalks of three Inches long; they are white, stain'd with purplish red; consisting of one Leaf in Form of a Cup, divided at the Verge into five Sections; in the Middle is a *Stilus*, and ten *Stamina*, which when the Flower first opens, appear lying close to the Sides of the Cup, at equal Distances; their *Apices* being lodged in ten little hollow Cells, which being prominent on the Outside, appear as so many little Tuberles: The Flowers are succeeded by small round *Capsulas*; which when ripe open in five Parts, and discharge its small Dust like Seeds. This Plant is a Native of *Carolina*, *Virginia*, and other Parts of the Northern Continent of *America*, yet are not common, but are found only in particular Places: They grow on Rocks, hanging over Rivulets, and running Streams, and on the Sides of barren Hills, in a Soil the most steril, and least productive of any I ever saw.

The noxious Qualities of this elegant Plant lessens that Esteem which its Beauty claims; for the Deer feed on its green Leaves with Impunity; yet when Cattle and Sheep, by severe Winters deprived of better Food, feed on the Leaves of these Plants, a great many of them die annually: They blossom in *May*, and continue in Flower a great Part of the Summer.

As all Plants have their peculiar Beauties, 'tis difficult to assign to any one an Elegance excelling all others, yet considering the curious Structure of the Flower, and beautiful Appearance of this whole Plant; I know of no Shrub that has a better Claim to it. After several unsuccessful Attempts to propagate it from Seeds, I procured Plants of it at several Times from *America*, but with little better Success, for they gradually diminished, and produced no Blossoms; 'till my curious Friend Mr. Peter Collinson, excited by a View of its dried Specimens, and Description of it, procured some Plants of it from *Pennsylvania*, which Climate being nearer to that of *England*, than from whence mine came, some Bunches of Blossoms were produced in *July* 1740, and in 1741, in my Garden at *Fulham*.



ET Arbrisseau toujours verd s'eleve ordinairement à la hauteur de cinq ou six pieds & quelquefois au double; la tige de quelques uns est aussi grosse que le bas de la jambe d'un homme, quoiqu'elle soit ordinairement plus petite; elle est couverte d'une écorce rude & brune: Le bois a le grain fort serré, il est pesant & dur comme du Bois; les branches en general sont tortuës & poussent irregulièrement, mais elles sont couvertes d'un grand nombre de feuilles roides & lisses d'un verd gai dont la plupart sont recouquillées comme dans la figure: Les fleurs croissent en bouquets à l'extremité des branches sur des pedicules longs de trois pouces, elles sont blanches avec des taches d'un rouge violet, elles consistent en une seule feuille en coupe, divisée par ses bords en cinq sections; elles ont au milieu un piston & dix étamines, qui lorsque la fleur s'ouvre, paroissent comme collées à égales distances sur les côtez de la coupe, leurs sommet étant logé en dix petites niches, qui faisant saillie de l'autre côté semblent autant de petites tubercles: Il succede à ces fleurs de petites capsules rondes qui s'ouvrent en quatre en meurissant & laissent tomber ces graines fort menuës, Cette plante naît à la Caroline, à la Virginie, & en d'autres endroits du Continent Septentrional de l'Amerique, cependant elles ne sont pas communes, elles ne viennent qu'en certaines endroits sur des rochers qui avancent dans les ruisseaux & des courans d'eau, & sur les côtez des Montagnes, dans un terrain le plus stérile que j'aie jamais vu.

Les mauvaises qualités de cette belle plante diminuent beaucoup l'estime que sa beauté semble meriter; car quoique les Daims mangent de ces feuilles avec impunity, cependant lors que les Bestiaux, que des rudes hivers ont privé d'une meilleure nourriture, sont obligés d'y avoir recours, il en meurt un grand nombre chaque année. Cet arbrisseau commence à fleurir en Mai, & continue en fleur une grande partie de l'Eté.

Comme toutes les plantes ont leur beauté particulière, il est difficile de trouver en aucunes un merite par où elles surpassent toutes les autres, cependant si l'on considère la beauté de toute cette plante & la structure curieuse de ses fleurs je n'en connais point qui puisse plus justement pretendre à la preference. Après avoir tenté inutilement plusieurs fois de la faire venir de semence, on m'en a envoyé plusieurs plantes de l'Amerique, qui n'ont guères eu un meilleur succès, car elles ont diminué peu à peu & n'ont point fleuri jusques à ce, que mon curieux Ami Mons. Pierre Collinson animé par la vue d'une partie de cette plante deschêlée & sa description, en fit venir de *Pennsylvania*; & ce Climat approchant plus de celui d'Angleterre, que celui d'où venaient les miennes, ces dernières ont poussé quelques bouquets de fleurs dans mon Jardin de *Fulham*, au Mois de Juillet des Années 1740 & 1741.









*CENCHRAMIDEA Arbor saxis adnascens, obrotundo pingui folio; fructu pomiformi, in plurimas capsulas granula ficolnea stilo columnari octogono præduro adhærentia continentes, diviso; Balsamum fundens.* Pluk. Almag.

The BALSAM-TREE.

 HESE Trees usually grow about six Inches thick, and twenty Feet in Height, having a smooth light coloured Bark. The Leaves grow by Pairs, they are thick, and succulent, having a large Rib in the Middle, from which run transversely narrow freight Lines, parallel and close to one another: In June it produces ample fair Flowers, composed of six white Petals, stained with purple: In the Middle of the Flower is formed the Rudiment of the Fruit, which is almost spherical, and increases to the Size of a middling Apple: From the Stalk to the Crown of the Fruit runs eight Lines like the Meridians on a Globe, from Pole to Pole.

When the Fruit becomes ripe it opens at these Lines, and divides into eight Parts, disclosing many mucilaginous scarlet Seeds, resembling those of a Pomgranate, the Mucilage being washed off, the Seeds appear white, and hard, containing a Kernel: These Seeds are contained in the hollow Furrows of an Octogonal Core. The whole Plant is exceeding beautiful, and particularly the Structure of the Fruit in all its Parts, is a most exquisite Piece of natural Mechanism.

These Trees grow on Rocks, and frequently on the Limbs, and Trunks of Trees; occasioned by Birds scattering or voiding the Seeds, which being glutinous like those of Misletto, take Root and grow. But finding not sufficient Nutriment to increase in Growth, the Roots spread on the Bark or Superficies of the Tree till they find a decayed Hole or other Lodgment wherein is some small Portion of Soil, into which they enter and become a Tree: But the Fertility of this Second Plantation being exhausted, one or more of the Roots are discharged out of the Hole, and fall directly to the Ground, tho' at forty Feet distance, here again they take Root, and become a much larger Tree than before: The Rosin of this Tree is used for the Cure of Sores in Horses, and also instead of Tallow for Boats and other Vessels. They grow on the Bahama Islands, and on many other Islands of America, between the Tropicks.

- N° 1. Shews the Appearance of the Flower before it opens.
- 2. The same in another Position.
- 3. The Flower wide open.
- 4. The Fruit while young, with the Rosin stick-ing to it.
- 5. The Fruit at its full Size.
- 6. The Fruit open, and displaying its scarlet Seeds.



ES arbres croissent ordinairement à la hauteur de vingt pieds, leur tronc est d'environ six pouces de diametre, l'écorce lisse & d'une couleur claire: les feuilles viennent par paires, elles sont succulentes & épaisses, ayant une grosse nervure dans le milieu d'où partent en travers des lignes droites & étroites, parallèles & serrées: Il produit en Juin de belles grandes fleurs, composée de six petales blanches tachées de violet; au milieu de la fleur est formé le rudiment du fruit qui est presque sphérique & qui devient gros environ comme une pomme moyenne, du pedicule du fruit il s'étend huit lignes jusques à sa couronne comme les Meridiens d'une sphère d'un Pole à l'autre.

Lorsqu'il est mûr il s'ouvre à l'endroit de ces lignes, & se divise en huit parties, laissant voir plusieurs graines mucilagineuses & écarlates qui ressemblent à celles d'une Grenade; quand on en a lavé le mucilage les semences paroissent blanches & dures contenant un noyau, elles sont renfermées dans les sillons d'un trognon octogone, toute la plante est très belle, particulièrement la structure du fruit dans toutes ses parties qui forment une pièce excellente de mecanisme naturel.

Ces arbres croissent sur les rochers, & souvent sur les branches & les troncs des autres arbres, car les oiseaux repandant ou vuidant leurs graines, elles s'attachent par sa glutinosité comme celle de Guy, prennent racine & croissent: mais ne trouvant pas assez de nourriture pour leur accroissement les racines s'étendent sur la surface des arbres jusqu'au qu'elles trouvent quelques crevasses ou quelque trou causé par la pourriture, dans lequel elles entrent, & y trouvant quelque portion de sol deviennent un arbre, mais la fertilité de ce secoud terrain étant epuisée il sort une ou plusieurs racines de ce trou, qui tombent directement à terre, quand il en seroit à quarante pieds de distance, là elles prennent de nouveau racine & deviennent un beaucoup plus grand arbre qu'auparavant. On se sert de la Resine de cet arbre pour les playes des Chevaux, & aussi on en frotte les Batteau & autres vaisseaux au lieu de Suif. Ils croissent dans les Isles Bahama, & dans plusieurs autres Isles de l'Amérique entre les Tropiques.

- N° 1. montre la fleur avant qu'elle s'ouvre.
- 2. La même dans une autre position.
- 3. La fleur toute ouverte.
- 4. Le fruit encore petit, avec la Resine attachée.
- 5. Le fruit dans sa juste grandeur.
- 6. Le fruit ouvert & montrant ses graines écarlates.

*FRUTEX Spinosus Buxi foliis, plurimis simul nascentibus; flore tetrapetaloidē, pendulo, sordide flavo, tubo longissimo; fructu ovali croceo, semina parva continente.*

CATESBÆA. *Lycium Catesbeii, Authore D. Gronovio.*

- Calyx. *Perianthium quadridentatum, minimum, acutum, persistens.*  
 Corolla. *Monopetala, infundibuli-formis: Tubus omnium longissimus, rectus; superne sensim crassior. Limbus semiadrifidus, latus, erecto-planus.*  
 Stamina. *Filamenta quatuor, intra collum tubi enata. Antheræ, oblongæ erectæ, corollæ fere longiores.*  
 Pistillum. *Germen subrotundum, infra receptaculum floris. Stylus filiformis, longitudine corollæ. Stigma simplex.*  
 Fericarpium. *Bacca Ovalis, coronata, unilocularis.*  
 Semina. *Plura, angulata.*



EAR the Town of Nassau, in Providence, one of the Bahama Islands, I saw two of these Trees growing, which were all I ever saw, the largest of them was about four Inches thick, and twelve or fourteen Feet in Height; the Bark was smooth, of a greenish russet Colour, and the Wood seemingly tough and hard: The Leaves were like those of Box, but smaller; they grow in Clusters round the Stalks, by Intervals of an Inch Space, more or less; from every Cluster shoots forth two sharp pliant Spines: The Flowers are tubulous, of a yellow Colour about six Inches long, hanging pendulous: They are monopetalous, being very small at the Calix, and wide at the Mouth, in Form of a Roman Trumpet, except that their Verge is divided into four deep Segments, which are usually reflected back.

The Fruit is of an Oval Form, and of the Size of a Pullet's Egg; the Flesh or Pulp of it is like that of a ripe Apple, covered with a smooth yellow Skin; the Middle of the Fruit is hollow, containing many small triangular Seeds, adhering to a Pithy Placenta, which runs through the Fruit: The Fruit has an agreeable Tartness, and good Flavour, and seems as if it was capable of being improved by Cultivation, but is little known. In the Year 1726 there was several young Plants of it raised by many to whom I distributed Seeds, that I brought from Providence; but none were so successful in raising it, as Mr. Powers, a skilful and curious Gardiner, at Mr. Blathwait's of Derham, near Bath, who raised a Plant which produced many fair and ample Blossoms, some Specimens of which he sent to my Friend Mr. Peter Collinson, in the Year 1734.



RES de la Ville de Nassau dans l'Isle de la Providence, une des Isles Bahama, je vis deux de ces Arbres sur pied, & ce sont les seuls que j'aie jamais vu, le plus gros avoit environ quatre pouces de diametre, & douze ou quatorze pieds de haut; l'écorce étoit unie d'un brun verdâtre, & le bois paroisoit dur & pas fragile: les feuilles étoient comme celles du Bouis, mais plus petites; elles croissent en bouquets autour des tiges par intervalles d'un pouce plus ou moins; de chaque bouquet il sort deux épines pointues & pliantes; les fleurs sont tubuleuses, jaunes, d'environ six pouces de long & pendantes, elles sont monopétales, fort minces dans le calice, & large à leur ouverture comme une Trompette Romaine, excepté que leur bord est divisé en quatre segments profonds qui se renversent ordinairement en arrière.

Le fruit est oval, de la grosseur d'un œuf de Poulet, la pulpe en est semblable à celle d'une pomme mure, couverte d'un peau unie & jaune; le milieu du fruit est creux, qui renferme plusieurs petites semences triangulaires, attachées à un Placenta moins qui traverse le fruit. Ce fruit a une agréable acidité & une bonne odeur, il semble qu'on pourroit l'améliorer en le cultivant, mais il est peu connu: En 1726 on éleva plusieurs de ces jeunes plantes provenant des semences que j'avais apportées de l'Isle de la Providence, & que j'avois distribuée à plusieurs de mes amis, mais personne ne fut plus heureux que Mons. Powers, habile & curieux Jardinier de Mons. Blathwait, à sa maison de Derham auprès de Bath, car il éleva une de ces plantes qui produisit plusieurs belles & grandes fleurs dont il envoya quelques échantillons à mon ami Mons. Collinson en l'année 1734.

*PAPILIO caudatus Carolinianus; fuscus, striis pallescensibus; linea & maculis sanguineis subtus ornatus. Pet. Mus. p. 50. N° 508.*

THE Back of this Butterfly is black, as is the Ground of the four Wings. Several white Lines crosses the upper Wings obliquely; the two under Wings have likewise two white Lines, extending downwards; they have besides four white Spots, with one red and a blue Spot in each Wing; the under Side of the Wing, besides several white Lines, has two red, and three blue Spots.

N. B. It is not without Reluctancy, that I here exhibit a Plant with my own Name annexed to it; but the Regard and Obligations I owe to my learned Friend Dr. J. F. Gronovius of Leyden, who was pleased some Years since to honour me, tho' undeservedly, with the Title of this Genus, obliges me not to suppress it.

C E Papillon a le dos noir, de même que le fond de ses quatre ailes; plusieurs rayes blanches traversent ses ailes supérieures obliquement, les deux ailes de dessous ont pareillement deux rayes blanches qui s'étendent vers le bas; elles ont en outre quatre taches blanches une rouge & une bleue sur chaque aile; le dessous des ailes outre plusieurs lignes blanches a trois taches bleues & deux rouges.

N. B. Ce n'est pas sans repugnance, que je donne la description d'une plante, qui porte mon nom; mais le respect & les obligations, que je dois à mon ami le Docteur J. F. Gronovius, de Leyde, qui me fit l'honneur, sans que je le meritois, d'entituler ce genre de plants de mon nom, m'obligent à ne le pas supprimer.









# A P P E N D I X.

*UROGALLUS minor, fuscus cervice, plumis Alas imitantibus donata.*

Le Cocq de bois d'Amerique.



**HIS**—Bird was about a third part bigger than a common Partridge. The bill was brown; the eyes black, with hazle-coloured irides; the legs were covered with yellowish downy feathers to its toes; the tail was short, having the under-part of a dusky black; except which, the plumage of the whole Bird was of a reddish brown, marked transversly with black and white waved lines intermixed. The feathers of the crown of the head were long, and when erected, formed a little crest. But what is singular and extraordinary in this Bird, and distinguishes it from all others yet known, are two tufts of feathers resembling little wings, three inches long, placed on the hind part of the neck near the head, opposite to one another; each of these tufts were made up of five feathers lapping one over another, somewhat like those of a Bird's wing, gradually decreasing in length.

These little wings (if so they may be call'd) were fixed to the neck in such a manner, that the Bird has the power of contracting and dilating them. When disturbed, it would spread these little wings horizontally; at other times it would let them fall on each side of the Neck. The Hen had not these neck-feathers; except which, there appeared very little difference between this and the Cock. From the structure and resemblance of these neck-feathers to real wings, they may possibly assist the Bird in running or flying, or both, especially as the wings are short in proportion to its heavy body.

Some of these Birds, in the year 1743, I saw at the right honourable the Earl of Wilmington's at Chiswick, who told me they were natives of America, but from what particular part they came his Lordship knew not.



**E**T Oiseau étoit à peu près d'un tiers plus gros que nos Perdrix ordinaires. Le bec étoit brun; les yeux noirs, avec des iris de couleur de noisette; les jambes étoient couvertes de plumes de duvet de couleur jaunâtre jusqu'aux doigts du pied; la queue étoit courte & le côté inférieur d'un noir sombre; mais à cela près le plumage de l'Oiseau étoit d'un brun rougeâtre, marqué transversalement de lignes blanches & noires, mêlées & comme tissées ensemble. Les plumes de la couronne de la tête étoient longues, & en se dressant, elles formaient une petite huppe. Mais ce qu'il y a de singulier & d'extraordinaire dans cet Oiseau & qui le distingue de tous les autres connus jusqu'à présent, ce sont deux touffes de plumes, ressemblantes à de petites ailes, de la longueur de trois pouces, placées sur le derrière du cou & assez près de la tête, opposées l'une à l'autre; chacune de ces touffes est composée de cinq plumes couchées les unes sur les autres; à peu près comme celles d'une aile d'Oiseau & décroissant par degrés en longueur.

Ces petites ailes, si on peut les nommer ainsi, étoient attachées au cou d'une manière qui donne à l'Oiseau le pouvoir de les resserrer ou de les étendre comme les autres. Si on le trouble, il ne manque pas d'expliquer ces petites ailes horizontalement; mais autrement il les laisse tomber de chaque côté du cou. La femelle n'avoit point ces sortes de plumes au cou; à cela près on remarquoit peu de différence entr' elle & son mâle. De la structure de ces plumes de cou & de leur ressemblance aux véritables ailes, on peut conjecturer que l'Oiseau s'en aide, ou pour courir, ou pour voler, ou pour l'un & l'autre, d'autant plus que ses véritables ailes sont courtes à proportion de la pezanteur de son corps.

Je vis quelques-uns de ces Oiseaux, en 1743, à Chiswick \* chez Mylord Comte de Wilmington, qui m'assura qu'ils étoient originaires d'Amérique, quoiqu'il ne scût pas l'endroit particulier d'où ils étoient venus.

\* Petit village à deux lieus de Londres vers l'Ouest,

## M E A D I A.

### Generis Character.

Cal.	Perianthium monophyllum, semiquinque fidum, persiflens; Lacinij lanceolatis, reflexis, demum longissimis, revolutis.
Cor.	Monopetala quinque fida, tubo acreta, sursum reflexa: Laciniae longissimae, lingueformes, acutæ.
	Tubus Cylindricus, germen involvens, corollam sustinens.
Stam.	Filamenta quinque brevissima, tubo insidentia. Antheræ longæ, lanceolatae, didymæ.
Pist.	Germen conicum, testum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma.
Per.	Capula ovata, unilocularis, bivalvis, apice debiscens.
Sem.	Plurima parva. Receptaculum columnare, liberum.
Obs.	Tali apparet singularis structura in scissis, in quibus emarginatis, Corolla a tubo fuit separata, & diversa, in aliis vero arte connexa; adeo ut apoditicæ determinare impossibile fuit, an tubus ille fuerit staminum coartatio, ut in monadelphis pendentiis Cl. LINN. (a quibus insigniter differt corollæ connexione & situ) an vero ad corollam pertineret ut in Cyclamine, & Diapensia LINN. Dubium solves autopis in virvis.

**T**HE leaves of this Plant are of a pale green, and resemble those of the common garden-lettice. From the middle of the leaves rises a single stalk about a foot high, on the summit of which are fixed together many reclining foot-stalks, on every one of which hang pendant a single flower, the whole forming a cluster of about twenty. The flower consists of a green calyx with five sections, and one reflexed petal divided almost to the bottom by five segments, in the manner of the *Autumn Cyclamen*. The Apices are connected together in a point. Tho' the flowers hang down, the seed-vessels afterwards turn up, and stand erect on their foot-stalks.

It flowered in Mr. Collinson's garden at Peckham in September 1744, from seeds sent him by Mr. Bartram, who gathered them from beyond the *Apalachian* mountains, which lie parallel with *Virginia*. The seeds were contained in a long membranous capsule, which opens into four parts and discharges its very small seeds.

**L**E S feuilles de cette Plante sont d'un vert-pâle, & ressemblent à celles de la laitue commune de nos jardins. Du milieu des feuilles s'élève une tige unique, de la hauteur à peu près d'un pied, sur le sommet de laquelle sont attachées ensemble divers pédicules penchés, au bout desquels pend à chacun une fleur unique, le tout formant une espèce de groupe, ou de bouquet qui en contient vingt, ou environ. La fleur consiste en un calice divisé en 5 parties, & un pétale refléchi, divisé presque jusqu'au bout par cinq segments, à la manière du Pain de pourceau d'Automne. Les apices sont liés ensemble dans un point. Quoique les fleurs soient pendantes, les vaisseaux de la semence se relèvent dans la suite & se dressent sur leurs pédicules.

Cette Plante donna sa fleur ici en Septembre 1744, dans le jardin de Mr. Collinson à Peckham, la semence lui étoit venue de Virginie de la part de Mr. Bartram, qui l'avoit recueillie lui-même par delà les Montagnes Apalachiennes, parallèles à la Virginie où il fait sa demeure. Cette sorte de semence est contenuë dans une longue & membranueuse capsule, qui s'ouvre en quatre parties, & se décharge ainsi de ses très-petites graines.

To this new Genus of Plants I have given the name of the learned Dr. Richard Mead, Physician to His Majesty, and F. R. S. in gratitude for his zealous patronage of Arts and Sciences in general, and in particular for his generous assistance towards carrying the original design of this work into execution.

## S C O L O P E N D R A.



HESE Insects are of different sizes. Some of them are eight inches in length, others not above four. The body is divided by twenty annuli, with double the number of legs, every one of which has four joints, with a single claw at their ends; besides two members like legs growing from its hindmost part, having five joints each. From each side of the head proceeds a pair of sharp-pointed forceps, which are its poisonous weapons, and a pair of antennæ. The bite of this Insect in *Jamaica* is said to be as pernicious as that of a Scorpion. We have in *England* a diminutive species of this Insect which is inoffensive.



ES Insectes sont de diverses grandeurs. Il y en a qui sont de huit pouces, & d'autres qui n'en ont pas plus de quatre. Le corps est divisé par vingt anneaux, avec quarante jambes, dont chacune a quatre jointures, avec une espece de griffe au bout; sans compter deux autres membres, qui ressemblent à des jambes & qui croissent, de leur partie la plus postérieure, ayant chacun cinq jointures. De chaque côté de la tête sort une paire de pincettes ou tenailles très-pointées, qui sont ses armes empoisonnées, avec une paire d'antennes. La morsure de cet Insecte passe, dans la Jamaïque, pour être aussi venimeuse que celle du Scorpion. Nous en avons une espece en Angleterre, beaucoup plus petite que celle-ci, mais elle ne fait point de mal.

## H A M A M E L I S.

THE usual height of these Plants is ten or twelve feet. They resemble nut-trees at a little distance; the leaves of which this likewise resembles, or rather those of the alder-tree. The flower is pale yellow, consisting of a triangular involucrum; a calix divided by four segments, from which proceed four slender petals, about two inches long. It has also four stamens, and a stamen hardly to be discerned with the naked eye. It flowers at *Carolina* in October, continuing long in blossom, then sets its fruit for the next summer. The seed-vessel consists of a double capsule, which when ripe splits half open, and discloses two hard black shining seeds, having a white spot at their bigger ends, each seed lying in its distinct cell, separated by a thin membrane. These seeds are sometimes tricapsular.

For this Plant I am obliged to Mr. Clayton, who in the Year 1743 sent it me in a case of earth from *Virginia*. It arrived in Christmas, and was then in full blossom.

S I R,

" This is a new Genus of Plants, which I have likewise had an opportunity of describing from the live Plant, which I call *Trilopus*, on account of the triple husk of the fruit, so remarkable, but not described in its character. The inner Putamen of the nut is of a hard horny substance, double, inclosing each seed, opening at top, and divided by a valve of the middle husk, which is of a leathern substance, inclosing the whole nut, opening cross-wise at top. The outer husk resembles the cup of an acorn inclosing half the nut. The petals are as it were double at the base, a small petaliform *Nectarium*, of the length of the *Perianthium*, being affixed to the base of each petal.

JOHN MITCHELL.

M O N S I E U R ,

" C'est ici un nouveau Genre de Plante, que j'ai eu aussi l'occasion de décrire d'après la Plante même, encore sur pied, & dont je rends compte par rapport à la triple gousse qui renferme son fruit & qui est si remarquable, mais qui n'a pas été décrite dans son vrai caractère. L'écailler intérieure de la noix est d'une substance dure & corneuse, double, renfermant chacune sa semence, & s'ouvrant au sommet par une valve de la gousse du milieu, qui est d'une substance coriace, renfermant la noix entière, & s'ouvrant à travers au sommet. La gousse extérieure ressemble au calice d'un gland, renfermant la moitié de la noix. Les pétales sont, comme il semble, doubles à la base, un petit Nectarium en forme de pétale de la longueur du Perianthium étant comme attaché à la base de chaque pétale.

JEAN MITCHELL.










M O N E D U L A T O T A N I G R A,  
Hist. Jam. 298. Vol. 2.

*The Razor-billed Black-bird of Jamaica.*

 **H**IS Bird is somewhat less than our Jackdaw. It appears at a distance all over black, but at a nearer view some of the feathers were blended with shining purple and green. The singular make of the bill resembles that of the *Razor-bill*, *Willoug*, p. 323, tab. 65, the upper mandible being remarkably prominent, rising arch-wise, with an high and very thin edge.

Sir Hans Sloane informs us, that it subsists on Beetles and Grasshoppers. It also feeds on fruit and grain. They appear in flocks, and are querulous, and very noisy. They are numerous in *Jamaica*, *Hispaniola*, &c.

 *E*T Oiseau est un peu plus petit que notre Choucas. A distance il paroît tout noir, mais considéré de près, quelques unes de ses plumes sont mêlées d'un pourpre & d'un verd assez brillants. La figure singulière de son bec ressemble à celle du Alka Hoicri, la mandibule supérieure débordant d'une maniere remarquable, & s'élevant en forme d'arche avec un sommet assez haut & très-mince.

*M*onsieur le Chevalier Hans Sloane nous apprend que cet Oiseau vit d'Escarbots & de Sauterelles. Il se nourrit aussi de fruits & de graines. Ils ne paroissent que par troupes, sont plaintifs & fort bruyants. On en voit beaucoup dans la Jamaïque, dans l'Hispaniola, &c.

*Calceolus, flore maximo rubente, purpureis venis notato, foliis amplis hirsutis crematis, radice dentis canini.*

Le S A B O T des Indes.

**T**HIS Plant produces the most elegant flower of all the Helleborine tribe, and is in great esteem with the *North American Indians* for decking their Hair, &c. they call it the *Moccasin* flower, which also signifies in their language a *Shoe*, or *Slipper*.

**C**ETTE Plante produit la plus élégante fleur de toutes les espèces d'Elleborine, qui nous soient connues, & elle est fort estimée des Indiens septentrionaux de l'Amerique pour l'ornement de leurs cheveux, &c. Ils la nomment en leur langue la fleur Moccassine, comme qui diroit le soulier, ou la pantoufle,

## VESPA ICHNEUMON TRIPILIS, PENSYLVANIENSIS.

La Guêpe Ichneumon de Pensylvanie.

 HAT is most remarkable in this Fly, is the three long bristly Hairs growing from it; one from the anus, one from the extremity of the abdomen, and the third a little above it. The abdomen had three joints or annuli crossing it. The antennæ were long. It had four wings, two long and two short. The size of the Fly was the same of the figure here represented. This odd Fly was a native of Pensylvania, and was sent from thence to Mr. Collinson, amongst many other remarkable insects by Mr. John Bartram.


Since I graved it, I found it figured by Mr. Petiver.

 E qu'il y a de plus remarquable dans cette mouche, ce sont trois longs poils roides, qui en sortent; l'un de l'anus, l'autre de l'extrémité de l'abdomen, & le troisième d'un peu au dessus. L'Abdomen a trois jointures ou anneaux qui le traversent. Les antennes sont longues. Il a quatre ailes, deux longues & deux courtes. Pour la grosseur de la mouche, elle est la même que celle de la figure qu'on en voit ici. Cet Insecte bizarre est de Pensylvanie & fut envoyé de-là à Mr. Collinson, avec beaucoup d'autres très-remarquables par Mr. Jean Bartram.

Depuis que j'en ai gravé la figure, j'ai trouvé que j'avois été prévenu par Mr. Petiver.


*Rhus glabrum Panicula speciosa coccinea.*

Le S U M A C, &c.

 THIS Plant, except the panicle, so nearly resembles the *Rhus Virginianum panicula sparsa ramis patulis glabris*, Hort. Elt. Vol. 2. p. 323. that it can hardly be distinguished from it. It rises to the height of six or seven feet, with a straight stem, and produces its panicles at the ends of the branches. The flowers consist of five petals, as in the other kinds. The spike of this is not so divided as that to which I have compared it, nor so compact and close as that of the *Rhus Virginianum*, C. B. P. But that which distinguishes it, and gives it the preference to all the other species of it, is the resplendency of its scarlet panicles; the colour of which begins to appear in July with a tincture of yellow; but as the fruit ripens, the scarlet heightens, as appears by plants in their full lustre in Mr. Christopher Gray's garden at Fulham.

The berries that compose the panicles are yellow, thick set with numerous filaments, or small threads of a purple or scarlet-colour, best discerned by a Microscope, which receiving a reflexion from the yellow, causes the scarlet colour, which nothing can excel, more especially when the sun shines upon it.

N. B. A warm summer is requisite to perfect the colour in our climate.

 CETTE Plante, au panicule près, ressemble si fort au *Rhus Virginianum panicula sparsa ramis patulis glabris*, Hort. Elt. Vol. 2. p. 323. qu'il y aurroit de la peine à les distinguer. Elle s'eleve jusqu'à la hauteur de six ou sept piez, avec une tige droite, & produit ses panicules au bout de ses branches. La fleur consiste en cinq petalæ, comme dans les autres sortes. L'Epi de celle-ci n'est pas autant divisé que celui auquel je l'ai comparé, ni si compact & resserré que celui du *Rhus Virginianum* C. B. P. Mais ce qui la distingue & lui donne la préférence sur toutes ses autres espèces, est l'éclat de ses panicules d'écarlate; dont la couleur commence à paraître au mois de Juillet, avec une teinture de jaune; mais à mesure que le fruit meurt, l'écarlate se renforce, comme on le voit par les plantes mêmes dans leur plein lustre au jardin de Mr. Christophe Gray à Fulham.

Les bayes qui composent les panicules sont jaunes, serrées d'un grand nombre de fibres ou fils déliés de couleur de pourpre ou d'écarlate, qu'on ne discerne bien qu'avec le Microscope, & qui recevant la reflexion du jaune, donnent cette couleur d'écarlate, que rien ne peut exceller, sur-tout quand les rayons du soleil tombent dessus.

Notez qu'il n'y a qu'un Eté fort chaud qui puisse perfectionner cette couleur dans notre climat.

4







5



The Yellow and Black PYE.



HIS is about the size of a Black-bird; the irides of the eyes were yellow, surrounded by a bluish skin; the bill was black, and somewhat more than an inch long; the head was black; the throat had long-pointed feathers, hanging loosely down; the upper-part of the back, black, as were the wings, with a mixture of white, and under the quill feathers brown; the neck and under-part of the body, with the hind-part of the back and rump of a reddish yellow. They are called in *Jamaica*, *Bonano Birds*, that fruit being a part of their Food. They are very sprightly and active Birds, and are often kept in cages for their docility and antique gestures.

**E**T Oiseau est à peu près de la grosseur d'un Merle; les iris des yeux sont jaunes, environnez d'une peau bluâtre; le bec est noir, long de plus d'un pouce; la tête noire; la gorge a de longues plumes en pointe, qui lui pendent négligemment; la partie supérieure du dos, noire, comme étoient les ailes, avec un mélange de blanc, & sous les griffes plumes, brunes; le cou & le dessous du corps, avec la partie des dos & du croupion, d'un jaune roussâtre. On les nomme dans la Jamaïque, Oiseaux au Bonana, parce qu'ils tirent de ce fruit une partie de leur nourriture. Ce sont des Oiseaux fort vifs & pleins d'activité, aussi les met-on en cage très-souvent, à cause de leur docilité & de la singularité de leurs mouvements, & de leurs postures.

Lilio-Narcissus Polianthus, flore albo.

LYS-NARCISSÉ.

THIS Plant has a bulbous root, from which rises a thick succulent stalk to the height of seven or eight inches; on the top of which grows a cluster of about eight or ten small green bulbs, from every one of which proceeds a monopetalous tubulous white flower. The upper-part of the tube divides into six narrow petals, inclosing a cup with its verge divided into twelve sections, having a stulus, six stamens, with yellow apices. The whole clustre of flowers is inclosed by a perianthium, which divides in two and discloses the whole bunch, yet remains hanging to the stalk while the flowers continue; the leaves are of a deep shining green, like those of the *Lilio-Narcissus flore luteo autumnalis minor*.

These Plants I saw growing in a bog near *Palluchucula*, an Indian Town on the *Savanna* river within the precinct of *Georgia*.

Vespa Ichneumon cœrulea.

La Guêpe Azurée.

**C**ETTE Plante a une racine bulbeuse, d'où s'élève une tige épaisse & succulente jusqu'à la hauteur de sept ou huit pouces; sur le sommet de laquelle croît un bouquet d'environ huit ou dix petites bulbes vertes, de chaque desquelles sort une fleur blanche monopétale & tubuleuse. La partie supérieure du tube se divise en six pétales, qui renferment une coupe avec sa verge, partagée en douze sections, ayant un pistil & six étamines, avec leurs sommets jaunes. Le bouquet entier des fleurs est enclos par un perianthium, qui se partage en deux & découvre le bouquet entier, & avec cela reste pendu sur la tige tant que les fleurs durent. Les feuilles sont d'un vert foncé, & luisant, comme celle du Lys Narcisse à fleur jaune.

J'ai vu ces sortes de Plantes croître dans une fondrière près de *Palluchucula*, bourg Indien sur la Savanne, fameuse rivière de *Georgie*.

THIS Wasp is about three quarters of an inch in length. A pipe or fistula of a quarter of an inch long, joins the thorax to the abdomen, all which are of a deep blue. It had six legs. The Wings were blended with brown and blue, having each a black spot at their ends.

Mr. Collinson, in the *Philos. Transf.* of the Royal Society, N. 476. p. 363. has described and figured two ichneumon Wasps, with their Nests, from *Pennsylvania*; but as the descriptions of the colours in his and mine does not exactly agree, it cannot be absolutely determined whether his and mine be the same.

This species of Wasp form cylindrical pipes of clay, about the bigness, but twice the length of one's little finger; these they fix horizontally under sheds or penthouses, joining eight, ten, or more of them together side by side; these tubes are divided by several partitions, forming as many cells, in every one of which they lay an egg, and fill up the vacancy with Spiders, and close up the cell securely. It is to be observed that the Wasp cripples the Spiders, with an intent not only to disable them from crawling away while she is accumulating a sufficient store of them, but also that they continue alive to serve the nymphæ with a supply of fresh food, till it enters into its change; in order for which it spins itself a silken case, in which it lies in its chrysalis state all the Winter, and in the Spring gnaws its way through the clay structure and takes its flight. They are silent, but in the very action of plastering and forming their fabrics, which so soon as they set about they strike up their odd musical notes, and with surprising dexterity and odd gesticulations carefully perform the business they are about, and then cease singing till they return with a fresh mouthful of moist clay, repeating their labour in this manner till the whole is finished.

**C**ette espèce de Guêpe étoit environ de trois quarts de pouce en longueur. Une fistule d'un quart de pouce de long joint le thorax à l'abdomen, l'un & l'autre d'un bleu foncé. Elle avoit six piez. Les ailes étoient mêlées de brun & de bleu, ayant chacune une tache noire au bout.

Mr. Collinson, dans les Transactions de la Société Royale, N. 476. p. 363. a décrit & figuré deux Guêpes Ichneumon, avec leurs nids, de *Pennsylvanie*; mais comme les descriptions des couleurs dans la sienne & dans la mienne ne conviennent pas exactement, on ne peut pas déterminer absolument si la sienne & la mienne sont la même.

Cette espèce de Guêpe ayant formé de petit tuyaux ou fistules cylindriques d'argile, environ de l'épaisseur du petit doigt, & de la longueur de deux de ces doigts en long; elles les fixent horizontalement sous les couverts ou chantiers des Maisons, en joignant huit, ou dix, ou davantage ensemble à côté les uns des autres; ces tubes sont divisés en plusieurs partitions, qui forment autant de cellules distinctes, dans chacune desquelles elles déposent un œuf, & remplissent les interstices d'araignées, après quoi elles ferment la cellule aussi sûrement qu'elles peuvent. Il faut observer que la Guêpe en éjambant comme elle fait d'abord les araignées, ne se propage pas seulement de leur être les moyens de s'évader pendant qu'elle est après à en accumuler une quantité suffisante, mais aussi de les conserver en vie pour servir à la nymphe de nourriture fraîche, jusqu'à ce qu'elle entre dans sa métamorphose; pour laquelle fin aussi elle se file à elle-même une enveloppe de soie, où elle reste tout l'hiver dans son lit-de-parade, & dans le printemps elle se fait un chemin hors du tube & prend son vol. Ordinairement elles gardent le silence, mais dans l'action, c'est à dire, quand elles sont occupées à pastrin & à façonnner leurs tubes, aussi-tôt elles bourdonnent leurs notes ennuieuses, & avec une dextérité surprenante & des postures singulières, elles exécutent galement l'ouvrage entrepris, après quoi elles cessent de chanter jusqu'à ce qu'elles reviennent avec une bouche fraîche pleine d'argile, encore toute humide, réitérant leur bégaiement avec leur chant jusqu'à ce que tout soit fini.

N. B. La Guêpe qu'on trouvera décrite ci-dessous à la page 13, forme aussi un nid d'argile, mais d'une structure différente de celle-ci, quoique la méthode du travail & l'accompagnement du bourdon dans l'une & dans l'autre soient à peu près ou tant à fait les mêmes.

Du reste, ces sortes de Guêpes ne paraissent pas être fort tentées de nos végétaux, car elles ne subsistent que d'Insectes; les araignées en particulier paraissent être leur principale nourriture; elles les saisissent & les emportent dans leur bouche, quoi qu'il y en ait d'aussi grosses que les Guêpes qui les prennent; que s'il y en a quelques-unes qui se trouvent trop puissante pour être emportée de plein vol; en ce cas-là la Guêpe se contente de la traîner jusqu'à son nid; j'en ai vu un exemple dans une araignée d'une excessive grosseur, tirée cependant jusqu'au haut du mur par une de ces Guêpes, & conduite jusqu'à son nid, & quand on les eut pesées toutes deux séparément, il se trouva que le poids de l'araignée étoit à celui de la Guêpe comme huit à un.

## C A C A O   A R B O R.

## The CACAO TREE.

**T**HE trunks of these trees are about eight inches thick, and twelve foot in height, with a shining smooth bark. The leaves grow alternately, are broad and pointed, set on flat pedicles near an inch long. The flowers put forth only from the trunk and larger branches, in clusters of about eight or ten; each flower consisting of five capsular leaves, and five petals, with stamens and a style. From one of these little tufts of blossoms usually succeeds a single fruit about the bigness of a Swan's egg, but longer, more tapering, and ending in a point. The fruit hangs pendant, and, when ripe, has a shell of a purple colour, in substance somewhat like that of a pomegranate, and furrowed from end to end, containing in the middle many kernels of the size of acorns, inclosed in a mucilaginous substance, and which are known amongst us by the name of *Cacao Nuts*, of which is made chocolate.

What remains sufficient to be said of this excellent tree, is the following short transcript from an author of great observation, and whose veracity I have often experienced. *Dampier*, Vol. 1. p. 61.

"A Cacao-tree (says he) at its full growth is a foot and an half thick, and seven or eight feet to the branches. A well-bearing tree ordinarily has about twenty or thirty cods upon it; two crops of them are produced in a year, one in December, but the best in June. They neither ripen nor are gathered at once; but for three weeks or a month, when the season is, the Overseers of the Plantations go every day about to see which are turn'd yellow, cutting at once it may be not above one from a tree. The cods thus gathered they lay in heaps to sweat, and then bursting the shells with their hands they pull out the nuts. There are generally near an hundred nuts in a cod. When taken out they dry them in the sun upon mats spread on the ground; after which they need no more care, having a thin hard skin of their own, and much oil, which preserves them. Salt-water will not hurt them; for we had our bags rotted, lying in the bottom of our ship, and yet the nuts never the worse. The trees are raised from nuts set in the places where they are to bear, which they do in four or five years, without transplanting. They shelter the trees while young from the sun and winds, with plantains set about them, which are destroyed by such time that the Cacao-trees are of a pretty good body, and able to endure the scorching heat of the sun.

The Cacao-tree is a native of America, and grows in no other part of the world. The places of its growth are in the Bay of Campeachy, on Costa Rica between Portabel and Nicaragua, the coast of Caraccos, Guaiquil, and Colima.

At Jamaica, in the year 1714, I saw the remains of extensive Cacao-walks, planted by the Spaniards, when in possession of that Island; a sufficient inducement, it must be thought, for their successors to continue the same gainful agriculture; when the profits, as well as the culture of the plant, was and is still as well known to us as to the Spaniards themselves. Whatever infatuation continues to possess our countrymen in the neglect of it, 'tis certain that the balance of trade, in this branch, is considerably against us; the Spaniards, and of late the French, supplying not only us, and our northern Colonies, but all Europe with this valuable commodity, I cannot but think it deserves the consideration of the legislature; for were a method found to encourage its cultivation, our Sugar-islands (being as well adapted to the growth of it as any part of America) might not only supply our home-consumption, but come in for a share of exportation to foreign markets.

## Le CACAO.

**L**E tronc de cette sorte d'arbre a pour l'ordinaire huit pouces de diamètre, & douze pieds de hauteur, avec une écorce lisse & luisante. Les feuilles croissent alternativement, elles sont larges & finissent en pointe, sur des pédicules plats & longs d'un pouce. Les fleurs ne partent que du tronc & des plus grosses branches, en pelotons d'environ huit ou dix; chaque fleur consistant en cinq feuilles capsulaires, & cinq pétales avec des étamines & un pistile. D'une de ces petites touffes de fleurs sort ordinairement un seul fruit de la grosseur environ d'un œuf de Cigne, mais plus long, s'abaisse & finissant en pointe. Ce fruit reste pendant, & quand il est mûr, il a une écorce de couleur de pourpre, d'une substance à peu près pareille à celle d'une écorce de Grenade, sillonnée d'un bout à l'autre, ayant au milieu plusieurs cornues ou amandes de la grosseur d'un gland, renfermées dans une substance mucilagineuse, & connus parmi nous sous le nom de noix de Cacao, dont on fait le Chocolat.

Ce qui reste à dire de plus essentiel de cet excellent arbre, se trouvera dans la notice suivante qu'en donne un Auteur de grande observation, & dont j'ai éprouvé la véracité bien des fois. C'est le Sr Dampier dans le 1. Tome de ses Voyages, p. 6<sup>2</sup>. de la 3. Ed. Fr.

"L'Arbre, dit-il, qui produit le Cacao, a le corps d'environ un pied & demi de grosseur tout au plus, & sept ou huit pieds de haut jusqu'aux branches. Un arbre qui produit bien, porte d'ordinaire environ vingt ou trente de ces gousses; on en fait deux récoltes par an, une au mois de Décembre, & l'autre, qui est la meilleure, au mois de Juin. Comme elles ne meurent pas toutes à la fois, on ne les cueillit pas aussi toutes en même temps; durant trois semaines ou un mois, dans le temps de la maturité, les inspecteurs vont tous les jours aux Plantations pour voir si elles jaunissent, & n'en coupent qu'une chaque fois d'un seul arbre. Après qu'on a ainsi cueilli les gousses, on en fait divers monceaux pour les faire suer, ensuite on casse l'enveloppe avec la main, & on en tire les noix. Il y a ordinairement près d'cent noix dans une gousse. Après qu'on a tiré les noix, on les fait sécher au soleil sur des nattes étendues à terre; ce qui étant fait, il n'y a plus d'autres soins à prendre, parce qu'elles ont une peau déliée & dure, & beaucoup d'huile, qui les conservent. L'eau salée ne les endommage point; car nous en avions à fond de cale dans des valises pourries, qui n'en furent pas moins bonnes pour cela. On élève de petits arbres à Cacao par le moyen des noix, qu'on plante dans les mêmes endroits où ils doivent produire, ce qu'ils font dans quatre ou cinq ans, sans avoir la peine de les transplanter. Et pour les garantir des injures du soleil & des vents, on les entoure de Plantains, que l'on détruit dès que les Cacaotiers sont d'une grosseur raisonnable, & en état de résister aux ardeurs du soleil.

Du reste l'arbre du Cacao est une plante de l'Amérique, qui ne croît en aucun autre endroit du monde. Les lieux où il vient avec le plus de succès sont la Baye de Campeche, sur la Côte-Riche, entre Portabel & Nicaragua, la côte de Caraccos, de Guaiquil, & de Colima.

Me trouvant à la Jamaïque, en 1714, j'y vis des restes de grandes allées de Cacao, plantés par les Espagnols dans le temps qu'ils étaient en possession de cette île; motif suffisant, ce me semble, à leurs successeurs pour la continuation d'une agriculture si profitable; puisque nous en savons la manière, & les avantages, aussi bien que les Espagnols mêmes. Car enfin quelle que puisse être l'infatuation de nos gens à s'obstiner à la négliger, il est certain que la balance du commerce, par rapport à cette branche particulière, est considérablement contre nous; les Espagnols, & depuis peu les François, suppléant à ce qui nous manque de cette estimable marchandise, non seulement à nous & à nos colonies du Nord, mais aussi à toute l'Europe. Ce qui n'est pas indigne, ce me semble, de la considération de notre Gouvernement; car si on trouvoit un moyen d'encourager cette espèce de culture, nos îles de Sucre, qui y sont aussi propres qu'aucune autre partie de l'Amérique, pourroient, avec le temps, non seulement nous fournir assez de Cacao pour notre consommation, mais même devenir une branche d'exportation pour les pays étrangers.









24

VOLUBILIS SILIQUOSA MEXICANA PLANTAGINI  
FOLIO.


Hist. Jam. 180. Vol. I.

The VANELLOE.

 HIS Plant climbeth up the adjacent trees and shrubs by the help of clasping tendrils. The leaves are about eight inches in length, broadest near the foot-stalks, and tapering gradually to a point; and are deeply furrowed longitudinally with seven ribs, the middle rib being most prominent. The flower is composed of five petals, with a cup in the center formed not unlike that of a Foxglove. The foreside of the flower is white, the backside yellow, the middle of the cup has also a dash of brighter yellow. Its seeds are very small, and black, and are contained in a long pod, which when ripe splits open, and discharges them. With this fruit the Spaniards perfume their chocolate, and employ Indians to cure the pods, which they do by laying them in the sun to dry; then dipping them in an oil drawn from the kernel of the *Acajou* nut. This perfume is so little agreeable to an English palate, that it is rarely made use of any more in our American Plantations than at home, and therefore not cultivated by us.

They grow naturally in many places between the Tropicks, particularly at Boccatoro, lying in ten degrees north latitude.

La VANILLE.

 ETTE Plante monte sur les arbres ou arbrisseaux adjacents à l'aide de ses tendrons qui s'y attachent & les embrassent. Les feuilles ont environ huit pouces de longueur, plus larges du côté du pédicule & diminuant par degréz jusqu'à la pointe; outre cela, elles sont fortifiées de sept côtes longitudinales, celle du milieu étant la plus relevée. La fleur est composée de cinq pétales avec une coupe dans le centre, formée à peu près comme celle de la *Digitale*. Le devant de la fleur est blanc, le derrière jaune, le milieu de la coupe a aussi une couche d'un jaune luisant. Sa semence est fort petite, noire, & contenue dans une longue gousse, qui étant parvenu à maturité se fend, s'ouvre & s'en décharge. C'est avec ce fruit que les Espagnols parfument leur chocolat, pour cet effet ils employent les Indiens pour en faire sécher les gousses au soleil; après quoi ils les plongent dans une huile qu'ils tirent des cerneaux de la noix d'*Acajou*. Ce parfum est si peu agréable à nos Anglois, qu'on en fait rarement usage en Angleterre, ou dans nos Planta-tion de l'Amerique, excepté dans quelques maisons particulières, & voilà pourquoi la plante n'est point cultivée parmi nous.

Elle croit naturellement en plusieurs endroits entre les deux Tropiques & particulierement à Boccatoro, au dizième degré de latitude septentrionale.


# HIRUNDO CAUDA ACULEATA AMERICANA.

*The American Swallow.*



HIS is a little less than the *English House-Swallow*, but very like it in shape. It is all over of a brown colour, except that the under-part of the body and tail is of a lighter brown; particularly the throat is almost white. The Cock has some feathers faintly stained with purple, except which he differs not in colour from the Hen. The singularity of this Bird is, that the shafts of the tail-feathers are very stiff, sharp-pointed, and bare of feathers at their ends, which seem designed by Nature for the support of their bodies, while they are in an erect posture building their nests, which they do in chimnies, with little sticks interwoven and cemented together with a kind of glue, or gum. Their periodical retiring from, and returning to *Virginia* and *Carolina*, is at the same seasons as our Swallows do in *England*; therefore the place they retire to from *Carolina* is I think most probably *Brazil*, some part of which is in the same latitude in the southern hemisphere, as *Carolina* is in the northern, where the seasons reverting, they may by this alternate change enjoy the year round an agreeable equality of climate; and what strengthens the probability of it is, that the description of the *Brazilian Andorinha* of *Margravius* agrees well with that of this Bird, except that he takes no notice of the spines in the tail, which he might probably overlook.

*N. B.* If it were ascertain'd that this *Virginia* Swallow was the same of *Margravius's Andorinha*, it would, I think, confirm that most probable hypothesis, That *Birds of passage (particularly Swallows) pass to the same latitude in the southern Hemisphere, as the northern latitude from whence they came.*



*L'Hirondelle d'Amérique.*

ELLE CI est un peu plus petite que notre Hirondelle commune d'Angleterre. Elle est par-tout d'une couleur brune, excepté que sous le corps & à la queue elle est d'un brun plus clair; & que la gorge particulierement est presque blanche. Le Male a quelques plumes legere-ment marquées de pourpre, à cela près il ne differe point en couleur de la Femelle. Ce qu'il y a de singu-lier dans cet Oiseau, c'est que les extremitez des plumes de la queue sont fort roides, pointues & denudées de plumes à leurs bouts, qui semblent destinez par la Na-ture à soutenir leurs corps, pendant qu'elles sont en po-sture droite, bâissant leurs nids, comme elles font, dans les cheminées, entrelassez de petits bâtons, & cimentez ensemble avec une espèce de glu ou de gomme. Leur retraite aussi bien que leur retour périodique en Vir-ginie & en Caroline, arrivent dans les mêmes saisons qu'ici en Angleterre par rapport à nos Hirondelles; ainsi je croi que l'endroit où elles se retirent de Caro-line est probablement le Bresil, dont une partie est dans la même latitude Méridionale, que la Caroline l'est dans la septentrionale, & où par conséquent les saisons revenant, elles peuvent, par cette alternative, jouir tout le long de l'année d'une agréable égalité de climat; & ce qui fortifie la probabilité de cette pensée, c'est que la description de l'Andorinha du Brezil par Margravius est assez conforme avec celle de cet Oiseau, excepté qu'il ne parle point de ces especes de pointes qu'il a à la queue, & dont peutêtre il ne s'est point apperçu.

N.B. Sil étoit démontré que l'Hirondelle de Virginie fut la même que l'Andorinha de Margravius, ce seroit, je pense, une confirmation de cette hypothèse très-pro-bable, Que les Oiseaux de passage, & en particulier l'Hirondelle, passent à la même latitude dans l'He-misphère méridional, que celle dont ils viennent, dans le septentrional.

*Lilium angustifolium, flore rubro singulari.*

*Le Lys-rouge de Pensylvanie.*

THIS Lily rises from the ground with one, two, or three straight stalks, each of them bearing a single flower at the height of about sixteen inches. The leaves are narrow, and stained at their ends with purple. The flower consists of a pointal and six stamens, rising from the center of six deep scarlet petals spotted with very dark red or purple, and their back-sides covered with an hairy roughness, as is also the upper-part of the stalk. It is a native of *Pensylvania*, and blossom'd in Mr. Peter Collinson's garden at Peckham, Anno 1743.

LE TTE espèce de Lys s'eleve de terre avec une, deux, ou trois tiges droites, chaque tige portant une seule fleur jusqu'à la hauteur d'environ seize pouces. Les feuilles sont étroites & marquées de pourpre vers leurs bouts. La fleur consiste en un pistille & six étamines, qui s'élèvent du centre de six pétales d'un Ecarlate-foncé, tachetée d'un rouge, ou pourpre fort obscur; & leur côtéz d'embas couverts d'une rude chevelure, comme aussi la partie su-périeure de la tige. Il croit en Pensylvanie, mais il a fleuri dans le jardin de Mr. Pierre Collinson à Peckham, en 1743.









*Pomifera, seu potius prunifera Indica, nuce viniformi summo pomo innascente, Cajous vel Acajous dicta.*

Raii Hist. Cat. Jam.

The CUSHEW TREE.

 HE trunks of some of these trees are a foot and an half thick, and about twenty feet in height, forming a regular-headed handsome tree, with oval leaves. The flowers grow at the ends of the branches in clusters; each flower is composed of a green calix, and five small narrow petals of a purple colour and fragrant smell, and is succeeded by a nut not unlike in form and size to a Hare's kidney, of a shining brown colour, containing a kernel resembling an Almond in size and taste. The shell inclosing this kernel is double, and contains an acrimonious caustick inflammable oil. The nut appears next after the flower, and grows almost to its full size before the fruit shews itself, which at length appears between the foot-stalk and the nut; and not as Madam Merian has unluckily figured hers, placing the fruit at the end, and the nut joining to the stalk instead of the fruit. The fruit when full grown resembles somewhat a Cathrine-pear, having a thin smooth skin of a yellow or red colour, and sometimes blended with both colours, hanging three or four in a cluster. This fruit consists of a fiberous spongy substance, which in eating is to be sucked, but not swallowed, and yields a pleasant-tasted vinous juice, somewhat astringent, but esteemed very wholesome.

They grow in *Jamaica, Hispaniola,* and many other places of *America* within the Tropicks.

Le CAJOU, ou ACAJOU.

 E corps ou le tronc de quelques-uns de ces arbres a un pié & demi de diametre, & environ vingt de hauteur, & forme un arbre d'une tête régulière & qui a de la beauté, avec des feuilles ovales. Les fleurs croissent au bout des branches en forme de pelotons ou de bouquets; chaque fleur est composée d'un calice vert & de cinq petits pétales étroits de couleur de pourpre & d'une odeur agréable; à la fleur succède une noix assez ressemblante en forme & en grosseur à un rognon de lièvre, d'un brun très-luisant, & qui renferme un cerneau de la grosseur & du goût d'une amande. L'Ecorce qui enveloppe ce cerneau est double, & contient une huile acre, caustique & inflammable. La noix paroît immédiatement après la fleur, & croit presques jusqu'à sa pleine grosseur avant que le fruit se montre, lequel enfin vient à paroître entre la tige & la noix; & non pas comme Mademoiselle Merian les a malheureusement figurez, en plaçant le fruit au bout, & la noix à côté de la tige au lieu du fruit. Le fruit étant parvenu à sa parfaite maturité, ressemble à peu près à une poire de S<sup>e</sup>. Catherine, ayant une peau mince & douce d'un jaune tirant sur le rouge & quelquefois de ces deux couleurs mêlées ensemble, trois ou quatre de ces fruits pendent à la fois & forment une espèce de groupe. Ce fruit est d'une substance fibreuse & spongieuse, qu'on doit sucer en le mangeant, mais non pas l'avaler, & donne un jus vineux d'un goût agréable, un peu astringent à la vérité, mais d'ailleurs estimé très-sain.


L'Arbre croit dans la Jamaïque, dans l'Hispaniola, & en plusieurs autres endroits du Nouveau-monde entre les deux Tropiques.

# ARDEA CRISTATA MAXIMA AMERICANA.

The largest crested HERON. Fig. 1.



S I did not measure the length of this Bird, I can only guess it to be not less than four feet and an half high, when erect. The bill measured almost eight inches from the angle of the mouth to the end of it; and was of a yellowish brown colour behind the eyes; and under the throat of a light brownish yellow. The crest on its head was made up of long narrow brown feathers, the longest being five inches in length, which it could erect and let fall at pleasure. The neck and breast brown, but paler, and spotted on the under-part. The rest of the body and legs brown, except the quill feathers, which are black. They feed not only on Fish and Frogs, but on Lizards, Efts, &c. They are natives of *Virginia*.



O M M E je ne mesurai pas la grandeur de cet Oiseau, je puis seulement conjecturer qu'il n'avoit pas moins de quatre pieds & demis de haut lorsqu'il se dressoit. A l'égard du bec, dont je pris la mesure, il avoit presque huit pouces de l'angle de la bouche jusqu'à son extrémité; derrière les yeux il étoit d'une couleur brune tirant sur le jaune; & sous la gorge d'un jaune-brun plus clair. La huppe qu'il avoit sur la tête étoit composée de plumes longues & étroites de couleur brune, les plus longues ayant jusqu'à cinq pouces de longueur, tellesquelles il pouvoit dresser ou laisser tomber comme il voulloit. Le cou & la poitrine étoit brune, mais plus pâle & tacheté au dessous; le reste du corps & les jambes brunes, excepté les grandes plumes, qui étoient noires. Ces animaux se nourrissent non seulement de poisson & de grenouilles, mais aussi de Lézards grands & petits, & naissent dans la Virginie.

## Stellio aquaticus minor Americanus.

The SPOTTED EFT. Fig. 2.

T HESE are found in ditches, ponds, and standing-waters, and are the food of Herons and Serpents. This was five inches long, having a large head. It had four toes on each of the fore-feet, and five on the hind-feet, a double row of white round spots extending from the crown of the head to the hind-legs, from which to the end of the tail they were single. They are as inoffensive as our common Water-Efts.

## Le Petit-Lizard étoilé. Fig. 2.

## Pulex minimus, cutem penetrans, Americanus.

The CHEGO. Fig. 3.

I T is a very small kind of Flea, that is found only in warm climates; it is a very troublesome Infest, especially to Negroes and others that go bare-foot, and are slovenly. They penetrate the skin, under which they lay a bunch or bag of eggs which swell to the bigness of small pea or tar, and give great pain till 'tis taken out; to perform which, great care is required for fear of breaking the bag, which endangers a mortification, and the loss of a leg, and sometimes life itself. This Infest, in its natural size, is not above a fourth part so big as the common Flea, but magnified by a Microscope it appeared of the size of the figure here represented. From the mouth issued a hollow tube, like that of the common Flea, between a pair of antennæ. It had fix jointed legs, and something resembling a tail under which is represented one of its eggs, the size of which is so small that it can hardly be discerned by the naked eye; but magnified by a glass, appeared as here represented. These Chegoes are a nuisance to most parts of America between the Tropicks. See Sir HANS SLOANE's Hist. Jamaic. Introd. P. CXXIV. and Vol. II. p. 191, 192.

O N les trouve dans les saffres, les étangs, & toutes sortes d'eaux eau-piètes, où ils deviennent la proye & la nourriture des Herons & des Serpents. Celui-ci étoit de cinq pouces de long, avec une grasse tête. Il avoit quatre doigts à chaque pied de devant, & cinq autres pieds de derrière; une double rangée de taches blanches & rondes qui s'étendent de la couronne de la tête jusqu'aux jambes de derrière, mais de la jupon au bout de la queue les taches n'étoient qu'une à une. Ils ne font pas plus de mal en Virginie, que parmi nous nos Salamandres d'eau.

## Le CHEGO. Fig. 3.

## Scarabæus capricornus minimus cutem penetrans.

Fig. 4.

I N the year 1725, I being at the house of his Excellency Mr. Phinney, then Governor of the Bahama Islands, who as he was searching of his feet for Chegoes, at the time we were viewing them through a Microscope, produced an odd Infest on the point of his needle as at Fig. 4, which he then picked out of his foot. I shewed it to Negroes and others, and none of them had seen the like. The natural size of this Infest was that of the spot over its head; but magnified, it appeared of the size and form here exhibited. I think it may be called as above.

Fig. 4.

C'EST une espèce de Puce très-petite, qu'on ne trouve que dans les plus chauds climats; & un Infest des plus incommodes à beaucoup de personnes, particulièrement aux Noirs, & autres qui vont nus-pieds, & qui sont mal-propres. Ils penetrent dans la peau, sous laquelle ils déposent un sac de leurs œufs tel que jusqu'à la grosseur d'un petit poïs, & cause de grandes douleurs jusqu'à ce qu'on l'ait tiré; opération qui demande beaucoup de soin, de peur qu'en rompant le sac, vous ne courriez risque d'une mortification ou gangrène dans la partie, ou de la perte d'une jambe, ou quelquefois même de la vie. Cet Infest, dans sa grosseur naturelle, n'excède pas la quarantième partie d'une Puce commune, mais grossi par le Microscope il paraît de la grandeur & de la figure ici représentée. De la bouche il sort un tube creux, comme celui d'une Puce ordinaire, entre les deux antennæ. Il a six jambes avec leurs jointures, & quelque chose de ressemblant à une queue, sous laquelle est représenté un des œufs; qui sont si petits qu'on a de la peine à les distinguer à l'œil; mais étant grossis par un verre, ils paraissent tels qu'on les voit ici. Enfin ce Chego est d'une grande nuisance pour la plus grande partie du Nouveau-Monde, au moins entre les deux Tropiques. Volez M. le Chev. HANS SLOANE, Hist. Jam. Introd. p. CXXIV. & Vol. II. p. 191, 192.

## Blatta Americana.

The COCKROACH. Fig. 5.

T HESE are very troublesome and destructive Vermin, and are so numerous and voracious, that it is impossible to keep Villages of any kind from being devoured by them, without close covering. They are flat, and so thin that few cheifs or boxes can exclude them. They eat not only leather, parchment and woollen, but linen and paper. They disappear in Winter, and appear most numerous in the hottest days in Summer. It is at night they commit their depredations, and bite people in their beds, especially childrens fingers that are greasy. They lay innumerable eggs, creeping into the holes of old walls and rubbish, where they lie torpid all the Winter. Some have wings, and others are without, perhaps of different Sexes.

Fig. 5.

## Blatta maxima fusca peltata. Fig. 6.

T HIS is three times bigger than the common Cockroach. The head and part of the thorax was covered with an hemispherical shining hard shield, from under which proceeded two other membranes of the like consistence, which covered part of the abdomen. The abdomen was crossed with eight annuli of a shining brown colour. The face of it had somewhat the resemblance of a Monkey. The antennæ were about an inch long. It had fix legs, each having three joints, the lowermost joint fet with sharp pricks, and crooked claws at their ends. They are found in *Carolina*. What they subsist on, and in what manner they are propagated, I know not, having seen but this one of the kind. \*

C'EST une espèce de Vermine qui fait incommode & même détructrice; d'ailleurs elle est si nombreuse & si vorace, qu'il n'est pas possible de garantir aucune sorte de vivres de leur voracité, à moins que de les couvrir d'une manière fort refermée. Ces Infests sont plats & si minces, qu'il y a peu de chances ou de boëtes assez compactes pour les exclure. Ils mangent non seulement le cuir, le parchemin & la laine, mais le linge même & le papier. Ils disparaissent en hiver, mais ils reparoissent en grand nombre dans les jours les plus chauds de l'Eté. C'est pendant la nuit qu'ils font leur ravage, qu'ils noircissent les gens dans leurs lits, & surtout les doigts des enfants où il est résé quelque chose de gras. Ils déposent leurs œufs sans nombre dans les trous ou mazures des ruelles murailles, où ils restent engourdis tout l'hiver. Il y en a qui ont des ailes & d'autres qui n'en ont point, ce qui marque peut-être la différence des Sexes.

## Scarabæus Peltatus. Fig. 7.

A Membranous yellow shield, with a dark brown spot in the middle of it, covered part of the Head and thorax; the wings covering the remaining part of the body, which were of a dusky purple, mottled with shining spots of the same colour. It had fix black legs, each leg having two joints only. Each wing was strengthened within-side by a thin membranous yellow ridge extending the length of them. The remaining under-part of the wing of a shining green colour. This Infest was from *Pensylvania*.

C'EST une membrane jaune en forme d'écu, avec une tache d'un brun-obscur au milieu, couvrant une partie de la tête & du thorax de cet Escarbot; les ailes lui couvrent le reste du corps, lesquelles étoient d'un pourpre sombre, parsemées de taches luisantes de la même couleur. Il avoit fix jambes noires & à chacune deux jointures seulement. Chaque aile étoit formée en dedans d'un rebord mince & membraneux, qui s'étendoit tout du long de l'aile: le rebord du dessous de l'aile étoit d'un vert luisant. On a en cet Infest de Pensylvanie.









# SCAROBÆUS PILULARIS AMERICANUS.

## The TUMBLE-TURDS.

 HIS is the most numerous and remarkable of the Beetle kind of any in North-America. They appear in April, and continue the summer-months, or till about September, at which time they disappear, and are no more seen till the following Spring. Their constant employ, in which they are indefatigable, is, in order to continue their Species, to provide proper nidi to deposite their eggs; this they do by forming round pellets of human dung, or that of cattle, in the middle of which they lay an egg. These pellets, in September, they convey three feet deep in the earth, where they lie till the approach of Spring, when the eggs become animate, burst their nests, and find their way out of the earth. I have attentively admir'd their industry, and mutual assisting one another in rolling these globular balls from the place they made them to that of their interment, which is usually the distance of some yards more or less; this they perform breech foremost, by raising their hind part, and forcing along the ball with their hind feet. Two or three are sometimes engaged in trundling one ball, which often meeting with impediments by the unevenness of the ground, is deserted by them, yet by others is again attempted with success; except it rolls into a deep hollow or chink, where they are necessitated to leave it, repeating the like action with the next ball that falls in their way. No one seems to know their own ball, but an equal care for all seems to affect the whole Community. They form these pellets while the dung remains moist, and leave them to harden in the sun before they attempt to roll them; in doing which, they and the balls are continually tumbling and rolling one over another down the little eminencies; but not discouraged thereby, repeat their attempts, and usually surmount these difficulties.

These Insects being endowed with the like sagacity of the *Turky-buzzard*, (Vol. I. p. 6.) find out their subsistence by the excellency of their noses, which direct them in flights to the excrement just fallen from Man or Beast, on which they instantly drop, and fall unanimously to work in forming balls, &c. which they temper with a mixture of earth. So intent they are at their work, that tho' handled, or otherwise interrupted, they persist in their economical employment without apprehension of danger.

The size of it is that of the figure here exhibited. It is all over of a dusky black. It has six legs, two joined to the thorax, and four to the abdomen.

The MALE. There are always accompanying these just mentioned, some larger ones of a different and more elegant structure and colour, which are much less numerous, being about one in twenty to the others. The thorax of this is covered with a shield of a crimson metallic lustre, the head and lower part of the shield of the like lustre, blended with green. From the crown of the head rises a shining black horn recurved backward. The sheaths of the wings are ribbed, and of a shining deep green; as are the thighs and under-part of the abdomen. These are commonly called *King Tumble-Turds*, tho' by what appears they assume no preeminence, but without distinction partake of the like dirty drudgery with the rest.

I think this can be no other than the Male of that first described, notwithstanding the great difference that appears in their outer structure and colour, and the disparity of number.

N. B. It is certain that *Pliny*, from *Aristotle*, has made mention in his *Nat. Hist.* Book XI. Chap. 28. of a kind of Beetles who roll large balls of dung with their feet backwards, and lodge therein against the rigour of the Winter, small worms, which become their young ones; others fly, &c. But as neither of them have given us a particular description of this Species, it is hardly possible to determine if those in America are precisely the same as those mentioned by these two Authors, I shall add to this remark, which I received from the reverend and learned Mr. Durand, That I received one of these Beetles from *Gibraltar*, with its ball, very different from those of America, from which I conjecture, that the *Gibraltar* sort is probably that of *Aristotle*.

\* *Aliud rufus eorum genus, qui è simo ingentes pilas averfi pedibus volant, parvoque in iis contra rigorem hiemis vermiculos sui factus nidulantur: volitant alii, &c.*  
Hist. Nat. L. XI. S. 34. Ed. Hard.

† *Et Ariſt. Hist. Anim. Lib. 5. Cap. 18. Hi pilularii diſti, quod ſtercus volant, in quo condunt ſe per hiemem, vermiculosque pariant, unde Scarabæi proveniunt.*

## Lilium sive Martagon Canadense, floribus magis flavis, non reflexis.

### Le LYS DE CANADA, ou le MARTAGON.

C E TTE espece singuliere de Martagon s'eleve jusqu'à la hauteur d'environ quatre piez. Sur le sommet de la Tige sont placeez ensemble environ douze pedicules, auxquels sont attachées leurs fleurs pendantes. La difference entre ce Martagon & les autres confie principalement en ceci, qu'au lieu que les petales des autres sortes de Martagon sont reflechis en spirale, dans celui-ci ils ne reflechissent que très-peu, & pas plus que ceux de nos communs Lys-blancs.

Ces Plantes sont provenues de racines écaillées, envoyées de Pensylvanie, & ont fleuri plusieurs années de suite dans le jardin de Mr. Collinson à Peckham,

THIS singular Kind of *Martagon* rises to the height of almost four feet. On the summit of the stem are set altogether, about twelve pedicels, to which are fix'd its reclining flowers. The difference between this and other *Martagons* consists principally in this particular, that whereas the petals of the other kinds of *Martagons* are reflected with a twirl, in this kind they reflect very little, not more than those of the common white Lily.

These Plants were produced from scaly roots sent from *Pensylvania*, and have flowered several years in Mr. Collinson's garden at *Peckham*.

## PERDIX STYLVESTRIS VIRGINIANA.

The American Partridge.



HIS is about half the size of the Perdix Cinerea, or common Partridge, which it somewhat resembles in colour, though differently marked; particularly the head has three black lines, one above and two below the eyes, with two intermediate yellowish white lines. The bill is black, the iris of the eye red, the quill feathers of a dark brown, as is the tail; except which, the whole plumage of the body is of a reddish brown colour, variously mixed black and white; the legs and feet brown. They covey and roost on the branches of trees, frequenting woods and shady swamps more than open fields. Their flesh is remarkably white, and very delicate, but of a different taste from our common Partridge; they lay as great a number of eggs.

La Perdrix Americaine.



ELLE-CI est plus petite de la moitié que la Perdrix commune, qui lui ressemble un peu en couleur, quoique celle de l'Amérique soit différemment tachetée; entr'autres la tête à trois lignes noires, une au dessus & deux au dessous des yeux, avec deux autres entre deux d'un blanc jaunâtre. Le bec est noir, l'iris de l'œil rouge, les grandes plumes d'un brun obscur, comme le queuë; à cela près, tout le plumage du corps est d'une couleur brune-roussâtre, bigarré de noir & de blanc; les jambes & les pieds bruns. Elles s'attroupent & perchent sur les branches des arbres, fréquentant les bois & marais ombragez plus que les campagnes ouvertes. La chair en est singulièrement blanche, & très-délicate, quoique d'un goût différent de nos perdrix; & du reste elles pondent autant d'œufs que les nôtres.

*Lilio narcissus Virginianus.* Park.

The ATTAMUSCO LILY.

THIS Plant sends forth from a bulbous root its narrow *Narcissus*-like leaves. The flowers grow singly on stalks about a foot in height, consisting of one leaf cut in six deep sections. From its center rises a stiltus and six stamina, with yellow apices. The flower just before opening is stained with a rose-colour, which, as the flower declines, grows fainter. It is a native of *Virginia* and *Carolina*, where in particular places the pastures are as thick sprinkled with them and Martagons, as Cowslips and Orchis's are with us in *England*.

Le Lys d'Attamusco.

D'UNE racine bulbeuse cette Plante pousse ses feuilles étroites, assez revenantes au Narcisse. Les fleurs croissent une à une, sur des tiges d'environ un pié de haut, consistant en une feuille coupée en six profondes sections. De son centre s'élève un filet & six étamines avec des sommets jaunes. La fleur, un peu avant que de s'ouvrir, est comme teinte d'une couleur de rose, qui a mesure que la fleur décline s'affaiblit à proportion. Ce Lys croît en Virginie & en Caroline, où en certains lieux les prez en sont parsemmez, aussi bien que de Martagons, aussi épais, que les nôtres en Angleterre le sont d'Orchis & de Primevere.

12









**T**HIS Shrub rises from the ground, with several stiff inflexible stems, to an ordinary height. The leaves are serrated, and grow alternately, resembling those of the Syringa. The flower resembles that of a single Rose, consisting of five white concave petals, with a point rising from a pale green ovariun, surrounded by many purple stamens, with bluish apices. It is remarkable, that one particular petal in every flower is stained with a faint greenish yellow. The calix is divided into five segments. The Capsula has a hairy roughness on the outside, is of a conic form, and when ripe splits open and discloses five membranous cells, every one of which contains a single oblong brown shining seed. For this elegant Plant I am obliged to my good friend Mr. Clayton, who sent it me from Virginia, and three months after its arrival it blossomed in my garden at Fulham, in May 1742.

## S I R,

"The Plant which you shewed me by the name of *Steuartia*, I take to be a new genus of Plants, the same that I called *Malachodendron*. But I humbly conceive that the generical character of it, which you shewed me in the *Acta Suecica*, is so faulty, that it will not even determine the proper class of this Plant in any system of Botany, instead of establishing the true genus. It is there referred to the class of *Polyandria Monogynia*, Linnæi, whereas it properly belongs to the class of *Monadelphus Polyandria*, in which it makes a new tribe or order of *Pentagynia*, which alone distinguishes it from all the tribe of *mahuaceous* Plants, under which it is properly included in all systems of Botany: for the petals are connected at the base, and drop off united together, which (according to Ray and Tournefort) makes the flower *monopetalous*. The stamens are connected in a ring at their base, and are inserted to the base of the petal. There are five styles, as I shewed you in a specimen I have. The fruit is a dry capsula with five sharp angles, five cells, and five valves which open at top, and are not crowned with the calix, which remains on their base. The seeds are single in each cell, of an oblong, oval, triangular shape.

JOHN MITCHELL.

The right honourable and ingenious Earl of Bute will, I hope, excuse my calling this new genus of Plants after his name.

*Regulus Cristatus.*

## Le Roitelet hupé.

**A**S this is an English as well as an American Bird, I shall only observe, that by comparing this American one with the description of Mr. Willughby's European one, they agreed in every particular, and therefore I refer to his *Ornithology*, p. 227. of the English Edition.

This Bird, which is the least of all European Birds, is likewise an inhabitant in the parallel latitudes of the Old and New World.

In Winter sun-shine days, they are wont to associate with other Creepers, particularly the Certhia, the Sitta, the Parus-ater, the Parus Caudata, and other Tit-mice, ranging the woods together, from tree to tree, as if they were all of one brood, running up and down the bark of lofty oaks, from the crevices of which they collect their food, which are insects lodged in their Winter-dormitories, in a torpid state. In manner the same little Birds feed in America, frequenting Juniper, Fir, and Pine-trees, this repeating Zilzilperle, as Gesner relates his *Parus Sylvaticus* to do.

**T**HIS Wasp is a little above an inch long. The wings of a yellowish brown colour. The head, thorax, and abdomen of a very dark brown, almost black; the whole having some spots of yellow. It had six yellowish legs. The abdomen was oval, joined to the thorax by a small fistula of almost half an inch long.

**E**T arbrisseau s'élève de la terre avec plusieurs tiges roides & inflexibles jusqu'à une hauteur ordinaire. Les feuilles sont dentelées & croissent alternativement, ressemblantes à celles du Syringa. La fleur ressemble à celle d'une simple Rose, consistant en cinq pétales blancs & concaves, avec un stylet qui sort d'un ovaire vert-pâle, environné de plusieurs étamines de pourpre, avec des sommets bluâtres. Il est remarquable qu'un pétales en particulier, dans chaque fleur, est teint d'un jaune verdâtre assez foible. La calice est partagé en cinq segments. La capsule a une rude chevelure en dehors, elle est d'une figure conique, & quand elle est parvenue à maturité, elle se fend & découvre cinq cellules membranuses, chacune desquelles contient une seule fécondation oblongue, d'un brun luisant. Je suis redevable de cette belle Plante à mon bon ami Monsieur Clayton, qui me l'a envoyée de Virginie, & trois mois après qu'elle me fut parvenue, elle fleurit dans mon jardin à Fulham en May 1742.

## M O N S I E U R,

"La Plante que vous me faites voir sous le nom de *Steuartia*, je la regarde comme un nouveau genre de Plante, & la même que j'ai nommée *Malachodendron*, arbre tendre. Mais je conçois avec toute l'humbleté qui me convient, que le caractère générique dans les mémoires de l'Academie d'Uppsal, dites *Acta Suecica*, que vous me faites voir, est si fautif, qu'il ne détermine pas même la classe propre de la Plante, dans quel système Botanique que ce soit, bien loin d'en établir le vrai genre. Elle est rapportée là à la classe du *Polyandria Monogynia* de Linné, quoi qu'elle appartienne proprement à la classe des *Monadelphus Polyandria*, dans laquelle elle fait une nouvelle tribu des *Pentagynia*; & cela seul la distingue de la tribu entière des marbes, sous laquelle elle est proprement renfermée dans tous les systèmes de Botanique: car les pétales sont attachés à la base, & tombent unis ensemble, ce qui, suivant les principes de Ray & de Tournefort, rend la fleur Monopétale. Les étamines sont liées en forme d'anneau, à leur base, & sont inserées dans la base même du pétale. Il y a cinq pistilles, comme je vous le montrerai dans le spécimen que j'en ai. Le fruit est une capsule sèche avec cinq angles aigus, cinq cellules & cinq valves, qui s'ouvrent au sommet, & ne sont point couronnées du calice, qui reste à leur base. Il n'y a qu'une fécondation dans chaque cellule, d'une figure oblongue, ovale & triangulaire.

J E A N M I T C H E L L.

**C**OUME c'est ici un Oiseau d'Angleterre aussi bien que du Nouveau-Monde, je me contenterai d'observer qu'après avoir comparé celui-ci, qui est l'Américain, avec la description que nous a donnée Mons. Willugby de celui d'Europe, j'ai trouvé qu'ils conviennent en tout, & voilà pourquoi je renvoie mes lecteurs à son *Ornithologie*, pag. 227. de l'édition Angloise. Cet Oiseau, qui est le plus petit de tous nos Oiseaux Européens, est aussi un habitant du Nouveau-Monde comme de l'Ancien, & dans leurs latitudes parallèles.

En hiver, quand il fait soleil, ils ont coutume de s'assembler avec d'autres Grimpereaux, & particulièrement le Certhia, le Sitta, la Mésange noire, & la Haute-queue, & d'autres Mésanges, courant les bois ensemble, d'un arbre à l'autre, comme s'ils étaient tous d'une même couvée, montant & descendant sur l'écorce des plus hauts chênes, des fentes & des crevasses, desquels ils recueillent leur nourriture, c'est à dire des Insectes, logez dans leurs dormitoires d'hiver & dans un état engourdi. C'est de la même manière que ces petits Oiseaux se nourrissent en Amérique, fréquentant le Pin, le Sapin, le Genevrier, & celui-ci répétant le Zilzil-perle, comme Gesner nous rapporta que fait le *Parus Sylvaticus*, ou la Mésange des bois.

*Vespa Ichneumon.*

## La Guêpe Ichneumon.

**E**LLE a plus d'un pouce de longueur. Les ailes sont d'un brun jaunâtre. La tête, le thorax, & l'abdomen, d'un brun fort obscur, le tout ayant quelques taches de jaune. Elle a six jambes de couleur jaunâtre. L'abdomen est ovale & joint au thorax par une petite fistule, longue d'environ un demi-pouce.

## AVIS TROPICORUM.

## The TROPICK BIRD.



THE tail of this Bird is generally, tho' erroneously, reported by unobserving Mariners to consist of but one feather. Mr. Willughby's description of it, tho' very particular, was from a dried case of the Bird, which, by being defective, seems to be the cause why his description differs somewhat from ours, which was made from the living Bird. The legs in this, by long keeping, had lost their red colour, which all that I have seen, while living, have. This Bird is about the size of a Partridge, and has very long wings. The bill is red, with an angle under the lower mandible like those of the Gull kind, of which it is a species. The eyes are encompassed with black, which ends in a point towards the back of the head. Three or four of the larger quill feathers, towards their ends, are black, tipped with white; all the rest of the Bird is white, except the back, which is variegated with curved lines of black. The legs and feet are of a vermillion red. The toes are webbed. The tail consists of two long straight narrow feathers, almost of equal breadth from their quills to their points.

These Birds are rarely seen but between the Tropicks, at the remotest distance from land. Their name seems to imply the limits of their abode; and tho' they are seldom seen but a few degrees north or south of either Tropick, yet one of their breeding-places is almost nine degrees from the northern Tropick, viz. at Bermudas, where, from the high rocks that environ those Islands, I have shot them at the time of their breeding; but those cliffs being inaccessible, prevented my seeing their nests and eggs. They breed also in great numbers on some little Islands at the east-end of Porto-Rico.

*Larus minimus marinus, naribus tubulatis.*

## The Storm-Finck, or Pittrel.

THIS is about the size of a Chaffinch. The whole Bird, except the rump, which is white, is of a dusky-brown colour; the back being somewhat darker than the belly. The bill is half an inch long, slender, dark brown, and crooked at the end. By opening the head of one of these Birds, I found that the nostrils consisted of two parallel tubes, proceeding from within the head, and running half way along the upper mandible of the bill, forming thereon a protuberance. The wings extended an inch beyond the tail. The legs were slender. The feet were webbed with a very small claw on each heel, without a toe. They rove all over the Atlantick Ocean, and are seen on the coasts of America as well as on those of Europe, and many hundred leagues from each Shore. Their appearance is generally believed by Mariners to prognosticate a storm, or bad weather; and I must confess I never saw them but in a troubled Sea. They use their wings and feet with surprising celerity. Their wings are long, and resemble those of Swallows, with which they are equally swift, but without making such angles or short turns in their flight, as Swallows do, but fly in a direct line. Tho' their feet are formed for swimming, they are likewise so for running, which use they seem most to put them to, being oftenest seen in the action of running swiftly on the surface of the waves in their greatest agitation, but with the assistance of their wings.

The Storm-Finck, in Hoier's Epistle to Clusius, is the Bird here described; and tho' its nostrils give it so singular a characteristick, and that they are so numerous in all our adjacent seas, yet they have not been figured before nor sufficiently described. As contrarily remarkable it is, that Mr. Edwards in his Ornithology, lately published, has fortunately brought to light the knowledge of three more of this Genus not known before, which he has well described and figured. This Bird, with the three beforementioned, seem to me apparently of the Gull-kind.



## L'Oiseau des Tropiques.

A queue de cet Oiseau passe généralement, quoique faussement, ne confiser qu'en une seule plume. Cette erreur est due au rapport de quelques gens de mer, qui ne sont pas grands observateurs. La description qu'en donne Mr. Willughby, quoique très-particularisée, fut faite sur un de ces Oiseaux déjà mort & desséché depuis quelque temps, ce qui n'a pu que la rendre défectueuse, & un peu différente de la nôtre, qui a été faite d'après l'Oiseau vivant. Dans la sienne, les jambes, à la longueur du temps que l'Oiseau avoit été renfermé, avoient perdu leur beau rouge, quoique dans tous ceux que j'ai vus en vie, elles eussent cette couleur. Cet Oiseau est environ de la grosseur d'une Perdrix, & a les ailes fort longues. Le bec est rouge avec un angle sous la mandibule inférieure comme dans les autres sortes de Mouette, dont celui-ci est une espèce. Les yeux sont environnez de noir, qui se termine en une pointe vers le derrière de la tête. Trois ou quatre des grandes plumes, de tuyau vers leurs extrémités, sont noires, marquées de blanc; tout le reste de l'Oiseau est blanc, excepté le dos, qui est bigarré de lignes courbes de noir. Les jambes & les piez sont d'un rouge de vermillon. Les doigts sont garnis des membranes. La queue consiste en deux longues plumes droites & serrées, d'une largeur presqu'égale depuis le tuyau jusqu'à la pointe.

On voit rarement ces Oiseaux excepté entre les Tropiques & à une distance très-éloignée de terre. Leur nom semble renfermer les limites de leur séjour; & quoiqu'on les voie rarement à peu de degré au delà des Tropiques, cependant un des lieux où ils multiplient, est éloigné du Tropique Septentrional de près de neuf degrés, j'entend les îles Bermudes, où j'en ai tué à coups de fusil dans le temps de leur couvée, de dessus les hauts rochers qui environnent ces îles. Mais comme ces pointes sont inaccessibles, je n'ai pu parvenir ni à leurs nids, ni à leurs œufs. Ils nichent encore en grand nombre dans quelques petites îles à l'est de Porto-Rico.

## Le Pinson de Mer, ou de Tempête.

C E L U I - C I est à peu près de la grosseur d'un Pinson. L'Oiseau entier excepté le crâne qui est blanc, est d'une couleur sombre & brune; le dos étant un peu plus obscur que le ventre. Le bec a un demi pouce de long, il est mince, d'un brun obscur, & crochu au bout: en ouvrant la tête d'un de ces oiseaux je trouvai que les narines se trouvent en dedans de la tête, & qui s'étendent jusqu'à moitié de la mandibule supérieure, où ils forment une éminence. Les ailes sont longues & s'étendent un pouce au delà de la queue. Les jambes sont minces. Les piez sont garnis d'une membrane comme ceux d'un Canard, & il a un très-petit angle à chaque talon sans avoir un doigt de derrière; les pieds & les jambes sont également bruns. Ces Oiseaux volent de tous côtés sur l'Océan Atlantique, on les voit sur les côtes de l'Amérique aussi bien que sur celles de l'Europe, à plusieurs centaines de lieues de terre. Les gens de Mer, dès qu'ils les aperçoivent, croient généralement que c'est un prongue de tempête, ou de mauvais tems; & il faut avouer que je ne les ai jamais vus que dans un tems de tourmente. Ils se servent de leurs ailes & de leurs piez avec une vélocité surprenante. Leurs ailes sont longues & ressemblent à celles des Hirondelles, avec lesquelles elles les égalent en vitesse, mais sans faire de ces sortes d'angles ou tours de Zig-zag dans leur vol, comme font nos Hirondelles: au contraire ils volent en ligne droite. Quoique leurs piez soient formez pour nager, ils le sont aussi pour courir, & c'est l'usage qu'ils en font le plus souvent, & dans lesquels ils sont vus dans l'action même lorsqu'ils courrent avec tant de célérité sur la surface des vagues dans leur plus grande agitation, sans préjudice du secours qu'ils tirent de leurs ailes: je ne doute point que ce ne soit le Storm-finck de Hoier (Mr. Willughby \*), qu'on peut nommer en François le Pinson de Mer, ou de Tempête.

Le Pinson de Mer, mentionné dans la lettre de Mr. Hoier à Mr. Cluse, est le même Oiseau qui est ici décrit; & quoique les narines lui donnent une caractéristique toute singulière, & qu'ils sont très-nombreux dans nos mers circonvoisines, aucun auteur n'en a donné auparavant la figure, autre que leurs descriptions sont très-défectueuses. Au contraire il est à remarquer que Mr. Edwards, dans sa description de quelques Oiseaux dernièrement publiée, a eu l'avantage de nous donner la connoissance de trois autres de ce genre ci-devant inconnus, & dont il a donné de bonnes descriptions & des figures justes. Cet Oiseau, avec les trois au-dessus mentionnez, me semblent être évidemment du genre des Mouettes.

\* Orinth. p. 395.

14







15



16

*Magnolia flore albo, folio majore acuminato haud albicante.* Clayt.

*La Magnolie à grandes-feuilles.*

  
HE seminal parts of this Plant, the ovary and cone, have so near an affinity and resemblance to the other species of this Genus, that it is needless to be particular in their descriptions, otherwise than to observe where in this differs from them.

The leaves are broad, some of them being above five inches wide, and eight in length, ending in a sharp point. The flower is five inches wide, consisting of twelve white petals, in the center of which is the ovary environed by the apices, as in the other kinds. The cone, when full grown, is as big as a small hen's egg, but a little longer, and of the like structure with the rest of the Genus. It flowers the first of all the kinds of *Magnolia*, which I think is in April.

Specimens of this tree were first sent me in the year 1736, by my worthy friend John Clayton, Esq; of Virginia, and from the only tree known in that country. Since which Mr. Bartram of Pennsylvania has discovered many of them in that Province, from the seeds of which I am in hopes of raising some. Mr. Bartram saw them growing on the north branch of Susquehannah River; some of them were above an hundred feet in height. The wood has a fine grain, very tough, and of an Orange colour. The Indians make bowls of the wood.

  
ES parties séminales de cette Plante, l'ovaire & le cone, ont tant d'affinité & de ressemblance avec les autres espèces de ce genre, qu'il est inutile de s'arrêter à leur description: contentons-nous d'observer en quoi celle-ci diffère des autres.


Les feuilles sont larges, quelques-unes ont plus de cinq pouces de largeur sur huit pouces de longueur, & finissent en une pointe aiguë. La fleur aussi est large de cinq pouces, consistant en douze pétales blancs, dans le centre desquels est l'ovaire, environné de ces sommets, comme dans les autres sortes. Le cone, quand il est parvenu à sa pleine crue, est aussi gros qu'un petit œuf de poule, mais un peu plus long, & de la même structure que les autres du même genre. Elle donne sa fleur avant toutes les autres sortes de *Magnolia*, c'est à dire, en Avril, si je ne me trompe.

Des échantillons de cette Plante me furent d'abord envoyés en 1736, par mon digne ami Jean Clayton, escuyer, de Virginie, & du seul arbre de cette espèce, qui fut alors connu dans ce pays-là: Mais depuis, Mr. Bartram de Pensylvanie en a découvert plusieurs autres dans sa province, des semences desquels j'ai quelque espérance d'en faire croître ici. Mr. Bartram les a vus sur pied sur la branche septentrionale de la Rivière Susque-hannah; quelques uns avoient jusqu'à cent piez de haut. Le bois est d'un beau grain, fort dur, & couleur d'Orange. Les Indiens en font des gamelles.

*Formica villosa coccinea.*

*The VELVET ANT.*

IT had six legs, with short crooked antennæ. The abdomen large, with a black list crossing the lower part of it, and another black spot at the joining to the thorax; except which, the whole body and head resembled crimson velvet. The trunk, or shell of the body, is of so strong and hard a texture, that being trod upon by Men or Cattle, they receive no harm. They have a long sting in their tails, which causes inflammation and great pain for half an hour to those who are stung by them, which usually happens to Negroes, and others that go bare-footed. They are mostly seen running very nimbly on sandy roads in the hottest summer weather. They are always seen single. What they feed on, and in what manner they breed, and where they secure themselves in winter, is to me unknown.

  
ILLE avoit six jambes avec des antennes courtes & courbes. L'Abdomen assez gros avec une lisere noire qui en traverse le bas, & une autre tache noire à la jointure du thorax, à la réserve de laquelle le corps entier avec la tête ressemble à du velours cramoisi. Le tronc, ou l'écaille du corps, est d'une contexture si forte & si dure, qu'Homme ou Bête, en marchant dessus, ne sauroient leur faire de mal. Elles ont à la queue un éguillon assez long, qui cause à ceux qui en sont piquez une inflammation sur la partie avec une grande douleur pendant une demi-heure. Ce qui arrive assez souvent aux Negres ou autres qui vont nuds piez. On les voit courir avec beaucoup d'agilité principalement dans les chemins sabuleux, & dans les plus grandes chaleurs. Mais on n'en voit gueres qu'une à la fois. De savoir maintenant de quoi elles vivent; comment elles multiplient; & où elles se retirent en hiver; c'est sur quoi je n'ai aucune lumiere.

*Le Fourmi Veloutée.*

## Caprimulgus minor Americanus.

### The WHIP-POOR-WILL.



**H**IS nocturnal Bird is about a third part less than the *Caprimulgus*, or *Goat-Sucker of Europe*. The length of it, from the bill, is eight inches; and from the shoulder of the wing to the end of it, is seven inches. The length of the bill, from the base of the upper mandible to the end of it, is half an inch long; two thirds of which being covered with feathers, there is visible so small a part of it, that, in proportion to the bigness of the bird, it seems to have the smallest bill of any other. From the bases of the bill shot forth some stiff bristly hairs. The throat has a white luff half round its neck. The breast is white, faintly stained with red and transverse dark lines. The quill feathers of the wings are of a dark brown colour, except a broad white luff crossing five of them on the middle of each wing. The tail feathers, except the three uppermost, have also two white spots near their ends. The plumage of all the rest of the body is brown, irregularly mixed, or powdered with an obscure reddish colour. The legs are very short, being but half an inch in length, and formed like those of the Goat-sucker; having also the insides of the middle toe ferrated.

This Bird I have mentioned in the Addenda to this Volume; but having since received two of them from *Virginia*, it has enabled me to exhibit the figure of it, and also to add to the description of it some remarks sent me by Mr. *Clayton* concerning it, as follows:

'The *Whippoorwill* is not so large as the Bird called here the *East-India Bat*, i. e. *Caprimulgus*, but in shape, and colour of the feathers, it very much resembles it, having also at each side of its mouth three or four stiff black hairs like those of a horse's mane, two or three inches long. These Birds visit us about the middle of April, from which time, till the end of June, they are heard every night, beginning about dusk, and continuing till break of day; but it is chiefly in the upper or western parts that they are so very frequent. I never heard but one in the maritime parts, although my abode has been always there; but near the mountains, within a few minutes after sun-set, they begin, and make so very loud and shrill a noise all night, which the echoes from the rocks and sides of mountains increase to such a degree, that the first time I lodged there I could hardly get any sleep. The shooting them in the night is very difficult, they never appearing in the day-time. Their cry is pretty much like the sound of the pronunciation of the words *Whip-poor-will*, with a kind of chucking noise between every other or every two or three cries, and they lay the accent very strong upon the last word *Will*, and least of all upon the middle one.'

'The Indians say these Birds were never known 'till a great massacre was made of their countryfolks by the *English*, and that they are the Souls or remainders of Spirits of the massacred *Indians*. Abundance of people here look upon them as Birds of ill omen, and are very melancholy if one of them happens to light upon their house, or near their door, and set up his cry (as they will sometimes upon the very threshold) for they verily believe one of the family will die very soon after. These Birds, as I have been credibly informed, breed exactly as the *Goat-Sucker* before mentioned, which is thus: they lay only two eggs of a dark greenish colour, spotted and scrawled about with black, in the plain beaten paths, without the least sign of any nest, upon which they sit very close, and will suffer a very near approach before they fly off.'

N. B. This concludes the whole number of Birds exhibited in both Volumes, containing in all 113, and in which are also contained all the land birds I have ever seen, or could discover in that part of *North-America* included between the 30th and 45th degrees of Latitude. And tho' more kinds may not improbably remain unknown within those limits, yet north of them I think there cannot reasonably be thought to be many new species, because there are not only but a few Birds at the northern limits, but also because animals in general, and particularly Birds, diminish in number of species so much the nearer they approach the Pole.

### Aureliana Canadensis R. P. Lafiteau.

#### The GINSENG, or NINSIN of the Chinese.

**G**INSENG is the root of a medicinal plant of the highest esteem with the *Chinese*. Their principal Physicians have wrote many volumes of its virtues. Most of the Writers of *China* take notice of the *Ginseng*; yet it was very little known 'till Father *Jartoux*, a Jesuit and Missionary in *China*, who being employed, by order of the Emperor, in making a Map of *Tartary*, in the year 1709, had an opportunity of seeing growing in a Village about four leagues from the Kingdom of *Cora*. That Father took the opportunity to make a draught of the Plant, and give an accurate description thereof, which being published in the *Memoirs of the Academy of Sciences at Paris*, gave light to the discovery of the same Plant in *Canada* and *Pennsylvania*; from which last place it was sent to Mr. *Collinson*, in whose curious Garden at *Peckham* it has the preceding two or three years, and also this year 1746, produced its blossoms and berries as it appears in the figure here exhibited, and agrees so exactly to the Father's description of the *Chinese Ginseng*, that no doubt can be made of its being the very Species he describes. But as the Jesuit's account is too long to be inserted here, I shall relate only what is most remarkable, adding to my Figure the blossoms, which the Father owns he never saw. The Father's account is as follows:

'The place of its growth is between the 30th and 45th degree of Latitude, upon the declivities of mountains, in thick forests, and upon the banks of torrents. That part of the country in which this precious root grows, is on every side featur'd by a barrier of wooden stakes, and about which guards continually patrol, to hinder the *Chinese* from going out and looking after this root. Yet how vigilant soever they are, greedines after gain incites the *Chinese* to lurk about privately in these deferts, sometimes to the number of two or three thousand, at the hazard of losing their liberty, and all the fruit of their labour, if they are taken either as they go out of, or come into the province; it grows in.

'The Emperor having a mind that the *Tartars* should reap all the advantage that is to be made of this Plant, rather than the *Chinese*, gave orders, in 1709, to 10000 *Tartars* to go and gather all that they could of the *Ginseng*, upon condition that each Person should give him two ounces, and that the rest should be paid for weight for weight, in pure silver. It was computed that by this means the Emperor would get this year about 20000 *Chinese* pounds of it, which would cost him above one fourth part of its real value.'

'The *Ginseng* (says Father *Jartoux*) we have observed is an ingredient in most of the medicines which the *Chinese* Physicians prescribe to the better sort of Patients. They affirm that it is a sovereign remedy for all weakneses occasioned by excessive fatigues, either of body or mind; that it attenuates and carries off pititious humours, cures weaknes of the lungs and the pleury, stops vomiting, strengthens the stomach, and helps the appetite, disperses fumes and vapours, fortifies the breath, and is a remedy for short and weak breathing, strengthens the vital spirits, and is good against dizziness of the head and dimness of sight, and that it prolongs life to extreme old age.'

'No body can imagine (adds the Father) that the *Chinese* and *Tartars* would set so high a value upon this root, if it did not constantly produce a good effect. Those that are in health often made use of it to make themselves more vigorous and strong; and I am perswaded (adds the Father) it would prove an excellent medicine in the hands of any European who understands Pharmacy, if he had but a sufficient quantity of it to make such trials as are necessary, to examine the nature of it chemically, and to apply it in a proper quantity, according to the nature of the disease for which it may be beneficial.' It is certain that tubifiles increases the motion of, and warms the blood, that it helps digestion, and invigorates in a very sensible manner.

'After I had digested the root (he goes on) I observed the state of my pulse, and then took half of the root raw as it was, and unprepared; in an hour after I found my pulse much fuller and quicker; I had an appetite, and perceived myself much more vigorous, and could bear labour better and easier than before. Four days after, finding myself so fatigued and weary that I could scarce sit on horseback, a Mandarin who was in company with us perceiving it, gave me one of these roots; I took half of it immediately, and in an hour after I was not the least fatigued of any weariness. I have often made use of it since, and always with the same success. *Tous* far Father *Jartoux*.

This Plant had a straight round stem, and arose to about the height of ten inches; from the top of which shot forth three smaller stalks of three or four inches long, each of which had at their ends five ferrated leaves on short foot-stalks. From the summit of the stem arose perpendicularly another shorter stalk, on the top of which was placed a globular bunch of red berries, the pedicels of which spreading circularly, formed the radii of a sphere. These berries were double, containing each two flattish rough seeds covered with a thin skin. The flowers were very small, composed of five round white petals, with five stamens and a stellus, rising from a calyx with five sections.

The root is white, three or four times the size of the stem, and grows tapering to the end, and is usually about three inches in length, more or less; and it often parts in two or three branches,

**C**E T Oiseau nocturne est plus petit que le *Caprimulgus*, ou *Tette-chèvre* de notre Europe, environ d'un tiers. Sa longeur depuis le bec est de huit pouces; & depuis l'épaule de l'aile jusqu'au bout, de sept. La longeur du bec, de la base de la mandibule supérieure jusqu'à la pointe, est de la moitié d'un pouce; les deux tiers de laquelle étaient couverts de plumes, il n'en reste de visibles qu'une si petite partie, qu'à proportion de la grosseur de l'Oiseau, il semble qu'il ait le bec plus petit qu'aucun autre. De la base du bec sortent quelques poils durs & râides. La gorge à comme une lisière blanche en demi-cercle autour du cou. La poitrine est blanche, avec une légère teinte de rouge & des lignes noires transversales. Les grandes plumes des ailes sont d'un brun-objour, à la réserve d'une grande lisière blanche qui en traverse cinq au milieu de chaque aile. Les plumes de la queue, excepté les trois plus hautes, ont aussi deux racines blanches près de leurs bouts. Le plumage du reste du corps est brun, mêlé irrégulièrement, ou plus marqué d'un rouge obscur. Les jambes sont courtes, n'ayant qu'un demi-pouce de longueur, & formées comme celles du *Tette-chèvre*; ayant aussi une membrane dentelle en dedans du doigt du milieu de chaque pied.

J'ai mention de cet Oiseau dans mes Additions à ce volume; mais depuis, en ayant reçu deux de Virginie, je me suis trouvé en état d'en donner la figure, & d'ajouter encore à la description qu'on en trouve ici quelques remarques qui m'ont été envoyées par Mr. *Clayton* sur le même sujet; les voici:

'Le *Whippoorwill* n'est pas si gros que l'Oiseau qu'on appelle ici *Est-India bat*, c'est à dire, *Tette-chèvre*, mais dans la taille & dans le couleur de ses plumes lui ressemble fort, ayant aussi à chaque côté de la bouche trois ou quatre poils râides, comme ceux de la criniere d'un cheval, de la longueur de deux ou trois pouces. Ces Oiseaux nous rendent visite environ à la Mi-Avril, depuis quelque temps jusqu'à la fin de Juin; on les entend toutes les nuits, en commençant sur la brune & continuant jusqu'à la pointe du jour; mais c'est principalement dans le haut du pays & dans les quartiers du couchant qu'ils sont en si grand nombre. Je n'en ai jamais vu qu'un seul sur nos côtes maritimes, quoi que mon frère ordinaire ait toujours été là. Mais qu'un des montagnes, peu de minutes après le couche du soleil, ils commencent & font toute la nuit un bruit si violent & si aiguë, & que les Echos des rochers & des flancs des montagnes redoublent à tel point, que la première fois que je m'y trouvais logé, j'eus de la peine à prendre quelque sommeil. Les tuer à corps de fusil pendant la nuit est une chose très-difficile, parce qu'ils ne paraissent jamais de jour. Leur cri est assez semblable au son de la prononciation de ces trois monstres, *Whip-poor-will*, avec une sorte de cloquement entre chacun de ces mots, ou après les deux premiers, ou après les trois, en appuyant toujours fortement sur le dernier, *Will*, & moins sur le second que sur aucun autre.'

'Les Indiens vous disent que ces Oiseaux ont été inconnus jusqu'à un grand massacre qui fut fait de leurs compatriotes par les Anglois, & que ce sont les amis ou les Esprits revenants des Indiens massacrés. Quantité de nos gens les regardent ici comme des Oiseaux de mauvais augure, & ils sont fort tristes s'il arrive qu'un de ces animaux vienne perchier sur son roî, ou près de sa porte. Il y faire entendre son cri, comme ils font quelquefois sur le seuil même. Car en ce cas ils croient fermement que quelqu'un de la famille mourra bientôt épri. Du reste ces Oiseaux, comme Tette-chèvres étonnés ont été informé de bonne part, nient & font leurs œufs exactement comme les Tette-chèvres dont on a parlé à leur manière suivante: Ils ne font que deux œufs à la fois d'un brun verdâtre, tachettes ou griffonnage de noir, qu'ils déposent dans les fentes des plus battus, sans la moindre apparence de nid, & qu'ils couvent d'une manière très-cluse, jusqu'à souffrir qu'on les approche de fort près, avant que de s'envoler.'

C'est ici la conclusion de tous les Oiseaux représentés dans les deux volumes de cet Ouvrage, qui en contient 113; en tout, dans lequel sont aussi contenus tous les Oiseaux de terre que j'ye j'ye jamais vu ou que j'ye pû décoverir dans cette partie de l'Amérique septentrionale, renfermée entre le 30. & le 45. degré de Latitude. Et quoiqu'il en reste encore probablement dans ces limites plusieurs genres qui nous sont inconnus, cependant si on passe ces limites de côté du Nord, je ne pense pas qu'on puisse raisonnementablement y supposer beaucoup de nouvelles espèces, parce que non seulement il n'y a peu d'Oiseaux à ces bornes vers le Nord, mais qu'aussi les animaux en general & en particulier les Oiseaux diminuent en nombre d'espèces à mesure qu'ils approchent du Pole.

#### Le GINSENG des Chinois.

**L**E *Ginseng* est la racine d'une Plante medicinale de la plus haute estimee parmi les Chinois. Leurs principaux medecins ont écrit plusieurs volumes concernant ses vertus. La plupart des Auteurs qui ont traité de la Chine n'oublient pas de faire mention du *Ginseng*; avec tout cela, il étoit peu connu jusqu'à ce que le P. *Jartoux*, Jésuite & Missionnaire dans la Chine, ayant été employé, par ordre de l'Empereur, à faire une carte de la Tartarie en 1709, en occasion de voir cette Plante croissant dans un village environ à quatre lieues du Royaume de Corée. Ce Père prit cette occasion de la definir & d'en faire une description exacte, qui ayant été publiée dans les Mémoires de l'Acad. R. des Sciences à Paris, donna quelque jour à la découverte de la même Plante en Canada & en Pennsylvanie; & où elle fut envoyée à Mr. *Collinson*, dans le curieux Jardin duquel à Peckham, & elle a produit cette année 1746, & les deux precedentes, ses fleurs & ses baies, comme elle paraît dans la figure ici jointe, & convient si exactement à la description du *Ginseng* des Chinois donné par le Missionnaire, qu'on ne peut douter que ce se soit la vraie espèce qu'il a décrite. Mais comme et qu'il en dit trop long pour être inseré ici, je n'en rapporterai que ce qu'il y a de plus remarquable, en ajoutant à ma figure la fleur entière que le Père avoit jamais vu. Voici les propres paroles du Jésuite:

'A l'égard des lieux où croît cette racine, on peut dire en general que c'est entre le 39. & le 47. degré de Latitude Boréale, c'est sur le pentant de ces montagnes, & dans ces forêts épaissest sur le bord des rivières ou autour des rochers, au pied des arbres & au milieu de toutes sortes d'herbes qui se trouve la Plante de *Ginseng*. Les endroits où il croît sont tous à fait séparés de la Province, par une barrière de pieux de bois, aux environs de laquelle des gardes redoutables continuellement, pour empêcher les Chinois d'en sortir & d'aller chercher cette racine. Cependant quelque vigilance qu'on y apporte, l'avidité du gain inspire aux Chinois le fecer de le glisser dans ces deserts, quelquefois jusqu'au nombre de 2 ou 3000, au risque de perdre leur liberté, & le fruit de leurs peines, qu'ils sont surpris en sortant de la province, ou en y rentrant. L'Empereur souhaitant que les Tartares profitassent de ce gain préférablement aux Chinois, a donné ordre, en 1709, à dix mille Tartars d'aller ramasser eux-mêmes tout ce qu'ils pourroient de *Ginseng*, à condition que chacun d'eux en donneroit à sa Majesté deux onces du meilleur, & que le reste seroit payé au poids d'argent fin. Par ce moyen on compte qu'le Empereur en aurroit cette année-là environ vingt mille Livres Chinoises, qui ne lui coûteroit gueres que la quatrième partie de ce qu'elles valent.'

'Les plus belles medecins de la Chine, ajoutent-ils, le font entrer dans tous les remedes qu'ils donnent aux grands Seigneurs. Ils prétendent que c'est un remede souverain pour les épuisements causés par des travaux excessifs de corps & d'esprit; qu'elle distrait les fièvres, qu'elle gêne la forteesse des poumons & la pluie; qu'elle arrête les vomissements, qu'elle fortifie l'osmancab, & ouvre l'appétit; qu'elle distrait les vapours, qu'elle remede à la respiration difficile & précipite en fortifiant la poitrine, qu'elle fortifie les esprits vitaux & produit de la lymphé dans le sang, enfin qu'elle est bonne pour les vertiges & les éblouissements, & qu'elle prolonge la vie aux vieillards.'

'On ne peut gueres s'imaginer que les Chinois & les Tartars fissent un si grand cas de cette racine, & elle ne produisent pas en effet de bons effets. Ceux même qui se portent bien en usage pourront se rendre robustes; & je suis persuadé qu'en toutes les mains des Européens qui entendent la Pharmacie, ce feront un excellent remede, s'ils en açoient assez pour en faire les épreuves nécessaires, pour en examiner la nature par la voie de la Chimie, & pour l'appliquer dans la quantité convenable suivant la nature du mal auquel elle peut être salutaire.'

'Après l'avoir dégagée, continué-t-il, je me tâtais le poux, je pris ensuite la moitié de cette racine toute crue sans aucune préparation; & une heure après je trouvais le poux beaucoup plus plat & plus râpé; j'eus de l'appétit; me sentis beaucoup plus de vigueur, & une facilité pour le travail que je n'avais pas auparavant. Quatre jours après, me trouvant si fatigué & si éprouvé de travail qu'à peine me pouvois-je tenir à cheval, un Mandarin de notre troupe qui s'en aperçut, me donna une de ces racines; j'en pris sur le champ la moitié, & une heure après je ne ressentis plus de faiblesse. J'en ai usé depuis assez souvent, toujours avec le même succès. Jusqu'ici le P. *Jartoux*.

Cette Plante a une tige droite & ronde, & s'élève enroulée à la hauteur de six pouces; du sommet de laquelle sortent trois petites tiges de trois ou quatre pouces de long, chacune desquelles a au bout cinq feuilles entières sur des pédicules assez courts. Du sommet de la tige s'élève perpendiculairement une autre petite tige, sur le sommet de laquelle est placé un groupe globulaire de baies rouges, dont les pédicules s'étendent circulairement, formant les rayons d'une sphère. Ces baies sont doubles, contenant chacune deux semences plates & aspres, couvertes d'une peau mince. Les baies sont très-petites, composées de cinq pétales roses & blanches, avec cinq étamines & un pistil, qui sort d'un calice avec cinq segments.'

'La racine est blanche, trois ou quatre fois plus grosse que la tige, mais elle diminue toujours jusqu'au bout, ordinairement de la longueur de trois pouces, plus ou moins; quelquefois elle se partage en deux ou trois branches,








27



DC


*Chamærhododendros lauri-folio semper virens, floribus bullatis corymbosis.*

 HIS tree riseth to the height of about sixteen feet, producing evergreen leaves in shape like the Lauro-Cerasus, of a shining dark green. The flowers grow in clusters, the buds or rudiment of which appear in Autumn, wrapped up in a conic scaly perianthium, on which is lodged a viscous matter, which protects them from the severe cold in Winter. These buds dilating in the following Spring, break forth into twenty or more monopetalous flowers divided into five segments, and set singly on pedicles half an inch long. These flowers, when blown, appear white, but on a near view, are of a faint blush colour, which as the flower decays grow paler. One of the five petals is longer and more concave than the rest, and is blended with yellow, green, and purple specks, being a viscous matter on the extremities of very fine hairs. The convex side of the same petal is also speckled with yellowish green. The pointel rises from the center of the flower, and has its head adorned with scarlet, and surrounded by ten stamina, whereof three are long and seven short, whose farina issues out at a small round hole on its top. This elegant tree adorns the western and remote parts of *Pensylvania*, always growing in the most sterill soil, or on the rocky declivities of hills and river banks, in shady moist places.


 *ET* arbre s'eleve jusqu'à la hauteur de seize piez ou environ, produisant des feuilles toujours vertes semblables pour la forme au Laurier-cerize, & d'un verd obscur & luisant. Les fleurs croissant en bouquets, le jet ou le bouton desquelles paroît en Automne, enveloppé dans un perianthium écaillé & de figure conique, sur lequel est logée une certaine matiere visqueuse, qui les protege contre la sévérité du froid en hyver. Ces boutons se dilatant au printemps qui suit, s'ouvrent en vingt ou plus fleurs monopetales, divisées en cinq segmens, & placées chacune sur des pedicules d'un demi-pouce de long. Ces fleurs étant épanouies paroissent blanches, mais en les regardant de près, elles sont d'une couleur de pêche affoiblie, qui devient toujours plus pâle à mesure que la fleur déchoit. Un de ces cinq petales est plus long & plus concave que les autres, & est mélé de taches jaunes, vertes & pourprées, qui sont une matiere visqueuse logée sur les extremitez des crins très menus. Le côté convexe du même petale est aussi tacheté de verd jaunâtre. Le pistile s'eleve du centre de la fleur, & a la tête ornée d'écarlate & environnée de dix étamines, dont trois sont longues & sept courtes, desquelles la farine sort d'une petite ouverture ronde qui est sur le sommet. Ce bel arbre décore les parties les plus occidentales & les plus écartées de Pensylvanie, croissant toujours dans les terroirs les plus steriles, sur les pentes des rochers & des montagnes & sur le bord des rivieres, dans des lieux humides & ombragez.

Plusieurs de ces arbres encore jeunes ont été envoyez de Pensylvanie par Mr. Bartram, qui est le premier qui les ait découverts dans ce pays-là; mais jusqu'à présent ils n'ont produit ici aucune fleur; & quoi qu'il y ait déjà quelques années qu'ils ont été plantez, ils ne font que des progrès assez lents dans leur accroissement, & semblent être du nombre de ces Plantes de l'Amérique, qui n'aiment ni notre terroir, ni notre climat.

*Chamædaphne semper virens, foliis oblongis angustis, foliorum fasciculis oppositis è foliorum aliis.*

 HE leaves of this Plant are shaped like those of the Salow, or *Salix folio rotundo*, and are ever green, like the *Camædaphne foliis tini*, to which it bears a near resemblance in the structure of its flowers, being monopetalous, with a stilus and ten stamina, which grow in small clusters opposite to each other, out of the ale of the upper-leaves. The cup is also indented in the like curious manner, and of a blush Rose-colour.

It seems to be of Shrub-growth, not rising above four or five feet high. This Shrub is a native of *Pensylvania*, and produced its blossoms at *Peckham* in *September*, 1743, and several succeeding years.

 *E* feuilles de cette Plante sont à peu près de la figure de celles du Saule & tombent à l'approche de l'hyver, tout le contraire de celle du Camædaphné foliis tini, voyez ci-dessus, pag. 98. A cela près, c'est ici la seule espece jusqu'à présent connuë de cette belle Plante, à laquelle celle-ci ressemble beaucoup, & dans la structure de ses fleurs, étant comme elle monopetales, avec un pistile & dix étamines, & particulièrement ayant la verge de sa coupe endentée avec la même élégance, & d'une couleur de Rose-vive.

Elle paroît n'être qu'un Arbrisseau, ne s'elevant qu'à quatre ou six piez de hauteur. Cet Arbrisseau, dont la fleur est si belle, fut envoyé de Pensylvanie à Mons. Pierre Collinson par mon bon Ami Mons. Bartram, que chacun sait être si curieux de ces sortes de choses, & donna sa fleur à Peckham pour la premiere fois en Septembre, 1743.

## LE P U S J A V E N S I S.

## The JAVA HARE.

**I**T was about the bigness of an ordinary sized Hare, covered with hair of a reddish brown colour; the head small in proportion to the body; the eyes were large and prominent; the ears like those of a Rat; except which, the head partook of the likeness both of a Deer and an Hare; the hindpart of the body and thighs remarkably big; the legs were long; the fore-feet has each four toes, the outermost being very short; the hind-feet had only three toes on each foot; it had a very short tail; it was very tame and inoffensive, and fed only on fruit and other vegetables. They are natives of Java and Sumatra. This was in the possession of his Grace the Duke of RICHMOND, who was pleased to think it worth a place in this collection.

## Le Liévre de Java.

**L**étoit de la grosseur d'un lièvre d'une taille ordinaire, couvert d'un poil brun & roussâtre; la tête petite à proportion du corps; les yeux grands & avancez, les oreilles comme celles d'un Rat; à cela près, la tête participoit à la ressemblance du Daim & du Lièvre; le rable & les cuisses d'une grosseur remarquable; les jambes étoient longues; les piez de devant avoient chacun quatre doigts, le plus externe étant fort court; les piez de derrière n'avoient chacun que trois doigts; pour la queue, elle étoit très-courte. Il étoit fort doux & ne faisoit aucun mal, il ne mangeoit que du fruit ou des herbages. L'Animal est originaire de Java & de Sumatra. Celui dont on voit ici la figure appartenoit à Mylord Duc de RICHMOND, qui a eu la bonté de le juger digne d'avoir place dans cette collection.

\* *Ficus citrii folio,\* fructu parvo purpureo.*

**T**HIS tree grows to a large size, having a light-coloured smooth bark. The leaves are shaped like those of the Citron-tree. The fruit grows three or four of them together from the sides of the branches, on a foot-stalk somewhat less than an inch long. The fruit is about the bigness of a Sloe, but shaped like a Fig, and covered with a thin purple skin, containing small seeds in pulp of the same purple colour, which has a sweet insipid taste, but is much coveted by Birds and other Animals. They grow on rocks on the Bahama Islands.

**C**E *T* arbre croit jusqu'à une grosseur considerable, d'une écorce douce & d'une couleur claire. Les feuilles sont de la figure de celles d'un Citronnier. A l'égard du fruit, ils viennent trois ou quatre ensemble des aisselles des branches sur un pédicule qui n'a pas tout à fait un pouce de longueur. Ce fruit est à peu près de la grosseur d'une Prunelle sauvage, mais de la figure d'une figue, & couvert d'une peau mince & pourprine, contenant de petites semences en pulpe de la même couleur, mais il n'a qu'un goût douçâtre & insipide, dont cependant les Oiseaux & d'autres têtes sont fort avides. Ces arbres croissent dans les fentes des rochers dans les Isles de Bahama.

\* *Ficus Indica.* Theophrast. Hist. Plant. lib. IV. c. 5. Strabo. Geograph. lib. V. Plin. lib. XII. c. 5. Q. Curtius lib. IX. c. 1,







2010



## VIPERA MARINA.

### The VIPER-MOUTH.

 **H**IS Fish is eighteen inches in length. The fins six in number, *viz.* one on the fore-part of the back, which terminates in a stiff hair or bristle four inches long; a pair of sharp-pointed fins grow under the gullet, and another pair under the middle of the belly; with a single one behind the anus. The number of teeth in each jaw was unequal; the upper-jaw had eight teeth, the two second being much longer than the other six, each having an angular bending near their ends. The two fore-teeth of the under-jaw are almost of equal length with those two of the upper-jaw just mentioned, but without those bendings. These four large teeth being too long to be contained within the mouth, are, at the shutting it, excluded; those of the upper-jaw lying close to the under-one, and those of the under-jaw lying close to the crown of the head. It is without scales. In the state it was sent me, it was of a brown colour, resembling that of the common Viper; but when just taken out of the Water they are, as I am told, of a green colour, but marked all over with small hexangular divisions. This odd Fish was sent me from *Gibraltar*, in the Harbour of which place it was taken, and is now preserved in the celebrated Repository of Sir HANS SLOANE.

 **E** Poisson a dix-huit pouces de long : six nageoires ; une sur le devant du dos, laquelle se termine en une espèce de soye rude & roide, de la longueur de quatre pouces ; deux autres lui croisent sous la gorge, lesquelles finissent en pointe aiguë ; deux autres sous le milieu du corps ; & enfin une fizzième au delà de l'anus. Le nombre de ses dents à chaque gencive n'est pas égal ; la gencive supérieure en a huit, les deux seconde à chaque côté plus longues que les autres, chacune ayant une courbure angulaire près du bout. Les deux dents de devant de la gencive inférieure sont à peu près de la longueur des deux seconde de la gencive supérieure susmentionnées, mais sans courbure angulaire. Ces quatre grosses dents étant trop longues pour être renfermées dans la bouche, demeurent en dehors lorsqu'elle la ferme ; celles de la gencive supérieure demeurant renfermées avec l'inférieure, & celles de la gencive inférieure demeurant renfermées sous la couronne de la tête. Elle n'a point d'écaillles. Dans l'état où je la reçus, elle étoit d'une couleur brune, assez ressemblante à celle d'une Vipere commune, quoiqu'en sortant de l'eau elles soient vertes, à ce qu'on m'a assuré, & marquées par-tout de petites divisions exangulaires. Ce Poisson extraordinaire me fut envoyé de Gibraltar, où il avoit été pêché dans le havre même : & présentement il est conservé dans le fameux Cabinet de Raretz de Mr. Le Chevalier HANS SLOANE.

### Cataphractus Americanus.

**T**HIS Fish was ten inches long, and about four broad. The whole upper-part of the body was covered with bone. The eyes were large, the mouth was small and void of teeth. On the back stood, reclining towards the tail, a flat pointed bone three inches long, and serrated on the upper edge, which being fixed in a socket, the Fish could erect and depress at pleasure. Under each gill was placed another such-like bone, except that both edges were serrated, the teeth on one side standing retrograde to the teeth of the other. The fore-part of the body and head was covered intirely with bone, marked with many regular lines, forming octogons, pentagons, &c. The hind-part of the body was also covered with bone, but in a different manner, *viz.* with thin narrow plates of bone extending lengthways from the back to the belly, and lapping over one another. Each side of this Fish had about thirty of these bones, which gradually diminished in size toward the tail; the middle of every one of these bones had a flat sharp point, like that of a lancet, which standing horizontally, and close to one another, formed an even line on each side. On the hind-part of the back, in the place of a fin, for about half its length, extended a ridge of a cartilaginous substance, ending at its tail. The belly only was membranous, and void of bone.

It had five fins, a very small one under each of the gills, one on each side of the abdomen, and a single one near the tail. This Fish being one of those called *leather-mouthed*, and having no teeth for defence, Nature seems to have compensated that deficiency by giving him weapons and armour in a very extraordinary manner. It was taken on the coast of *New England*, and is deposited in the *Museum* of Sir HANS SLOANE.

**C**e Poisson avoit dix pouces de longeur & environ quatre de large. Toute la partie supérieure du corps étoit couverte d'os. Les yeux étoient grands, la bouche petite & sans dents. Sur le dos il avoit penché vers la queue un os plat & pointu de trois pouces de longeur, dont la partie supérieure étoit en forme de scie, & comme cet os étoit arrêté dans un soubassement, il pouvoit le dresser ou le déprimer comme il voulloit. Sous chaque ouïe étoit placé un autre os, à peu près semblable, excepté que les deux bords en étoient endentez, les dents d'un côté étant comme retrogrades aux dents de l'autre. La tête & le devant du corps étoient entièrement couverts d'os, marqué de plusieurs lignes régulières, qui formoient des pentagones, des octogones, &c. Le derrière du corps étoit aussi couvert d'os, mais différemment, c'est à dire de lames minces & étroites, qui s'étendoient depuis le dos jusques au ventre couchées les unes sur les autres. Chaque côté du Poisson avoit environ trente de ces os, qui diminuoient par degrés jusqu'à la queue. Le milieu de chacun de ces os avoit une pointe plate & aiguë, comme celle d'une lancette, lesquelles dressées horizontalement & près les unes des autres, forment une ligne égale de chaque côté. Sur le derrière du dos, au lieu d'une nageoire, environ la moitié de sa longeur, s'étendoit une éminence d'une substance cartilagineuse qui se terminoit à la queue. Il n'y avoit que le ventre qui fut membraneux & sans os.

Il avoit cinq nageoires, une très-petite sous chaque ouïe, une à chaque côté de l'abdomen, & une seule près de la queue. Ce Poisson étant un de ceux qu'on nomme *bouche-de cuir* & n'ayant aucunes dents pour sa défense, il semble que la Nature ait compensé ce défaut en lui donnant des armes & une armure entière des plus extraordinaires. Il fut pris sur la côte de la Nouelle Angleterre & se voit présentement dans le Cabinet de Mons. le Chevalier HANS SLOANE.

## BISON AMERICANUS.

## Le Bison Américain.



HIS beast I have already described in the Account of Beasts, p. 27. but having then by me only a sketch of the Animal, which I thought not sufficient to make a true figure from, I have since been enabled to exhibit a perfect likeness of this awful Creature.



AI déjà donné la description de cet Animal dans mes Recits des Bêtes, p. 27. mais n'ayant alors par devers moi qu'une légère esquisse de l'Animal, que je ne crus pas suffisante pour en faire une véritable figure, je me suis trouvé depuis en état de donner une parfaite ressemblance de cette terrible bête.

## Pseudo Acacia hispida floribus roseis.

## L'Acacia à fleurs-de-rose.

THE flowers and leaves differ little in their shape from the *Pseudo Acacia flore albo*. The stalks and larger branches are thick set with prickly hairs, and with sharp spines placed alternately. The flowers, which are papilionaceous are of a faint purple or rose-colour, and of a fragrant smell. I never saw any of these trees but at one place near the Apalachian mountains, where Bufellos had left their dung; and some of the trees had their branches pulled down, from which I conjecture they had been browsing on the leaves. What with the bright verdure of the leaves, and the beauty of its flowers, few trees make a more elegant appearance. I visited them again at the proper time to get some seeds, but the ravaging Indians had burn'd the woods many miles round, and totally destroyed them, to my great disappointment; so that all I was able to procure of this specious tree was some Specimens of it which remain in the *Hortus Siccus* of Sir H. Sloane, and that of Professor Dillenius at Oxford. But since I am informed that a plant of this tree has been introduced from America by Sir John Colliton, Bart. to his Gardens at Exmouth in Devonshire.

I confess it is now time to conclude this extensive and laborious Work; yet I am conscious it has been no longer in hand than the nature of the thing required; nor indeed can it be thought my Interest to have protracted it. The greatest deliberation and caution were necessary in the whole progress, since errors must have been apparent to the judicious Reader, and would inevitably have been but too certain a consequence of a precipitate performance. However there are other reasons which might plead my excuse, should the length of time offend any who have encouraged this Work. The whole was done within my house, and by my own hands; for as my honour and credit were alone concerned, I was resolved not to hazard them by committing any part of the Work to another person; besides, should any of my original Paintings have been lost, they would have been irretrievable to me, without making another voyage to America, since a perpetual inspection of them was so necessary towards the exhibition of truth and accuracy in my descriptions.

I arrogate nothing to myself upon this performance, so much as the strong inclination I had to these kinds of subjects, join'd to the love of truth, that were my constant attendants and influencers. Nor can I ever cease to acknowledge the kind dispensation of Providence, in making me the happy instrument of composing a work of such labour and consequence, the materials of which were collected from the living subjects themselves, and in their native abodes; which circumstances, tho' so very essential to a Natural Historian, we know of no other History of Animals in which they are sufficiently apparent; for the Picture of an Animal, taken from its stuffed skin or case, can afford but a very imperfect idea of the creature, compared with what is done from the Life, not only as to what regards their Shape, Spirit, and Gesture, but also their beautiful colours. The charming plumage of Birds loses much of its lustre by death, or by their being removed from their native Climates; but of all others the inhabitants of the waters are subject to the greatest and most sudden changes, and the most brilliant fade the soonest, insomuch that some species of Fish, deprived but a few minutes of their element, like beauty in a human countenance extinguished with life, visibly degenerate from a pleasing variety of the most glorious colours imaginable, to such as are extremely dull and sordid.

And as for Plants, it is easy to conceive how imperfect the Figures must be which are drawn from dried Specimens, in comparison of those taken from living Plants, as all those are which I have exhibited.

From these Observations it may be inferred, that however accurately human art may be exercised in the representation of Animals, it falls far more short of that imitable perfection so visible in Nature itself, than when attended with the circumspection and advantages I was blessed with in the compiling of my History, and which I flatter myself are in some measure conspicuous therein.

LES fleurs & les feuilles diffèrent peu pour la forme de la Pseudo-Acacia flore albo. Les Tiges & les griffes branches sont épaisses de poils picquans, & armées d'épines aiguës, placées alternativement. Les fleurs, qui sont papillonées, sont d'un pourpre faible, ou plutôt de couleur de rose, & d'une odeur agréable. Je n'ai jamais vu de ces arbres qu'en un seul endroit, proche des montagnes Apalachiennes, où des Buffles avaient laissé leur peinte & dont quelques branches furent abattues, d'où je conjecture que ces Animaux en avaient brouté les feuilles. A considérer l'éclatante verdure de ses feuilles & la beauté de ses fleurs, il y a peu d'arbres qui fassent une aussi belle figure. Je ne manquai pas de leur rendre une seconde visite dans le temps que je crus d'en tirer quelques semences: mais les Indiens détructeurs avaient brûlé tous les bois plusieurs milles à la ronde & tout à fait détruit ces Plantes, à mon grand désapointement: j'abien que tout ce que je fus en état de me procurer de ce bel arbre, se reduist à quelques échantillons qui en restent encore dans la collection de Mr. le Chevalier H. Sloane, & dans celle du Professeur Dillenius à Oxford. Mais depuis, j'ai vu qu'une plante entière de cet arbre avait passé de l'Amérique dans les Jardins de Mr. le Chevalier Colliton à Exmouth en Devonshire.

Je confesse qu'il est temps enfin de conclure un ouvrage de l'étendue & du travail de celui-ci. Je ferais pourtant mieux que personne, qu'il n'a été entre les mains de l'Auteur, qu'autant de tems que la nature du sujet le demandoit: comme on conviendra sans doute qu'il n'étoit pas de mon intérêt de l'avoir traîné en longueur. La délibération & la précaution la plus grande étoient nécessaires depuis le commencement jusqu'à la fin, parce que les erreurs n'avaient pas manqué d'être appercues du lecteur judicieux, & taxées inévitablement comme une conséquence trop certaine d'un travail précipité. Cependant il y a d'autres raisons qui pourroient me justifier, si la longueur du tems avoit pu choquer quelques-uns de ceux qui ont encouragé cet ouvrage. Le tout a été fait dans ma propre maison, & exécuté par mes propres mains: car comme mon honneur & mon crédit y étoient uniquement concernez, j'avois résolu de ne les point hazarder en confiant à une autre personne l'exécution de quelque partie de l'ouvrage: outre que si quelqu'un de mes desseins originaux fut venu à se perdre par cette voie, il ne m'auroit pas été possible d'en réparer la perte, à moins que de faire un second voyage en Amérique: d'autant plus que l'impression perpétuelle des mêmes desseins m'étoit nécessaire pour la représentation de la vérité & l'exacitude de mes descriptions.

Je ne m'arrogue rien, dans l'exécution de mon projet, si ce n'est peut-être une forte inclination que j'ai toujours eue pour des sujets de cette nature, jointe à l'amour de la vérité, les deux véritables principes, qui m'ont constamment accompagné & animé jusqu'à la fin. J'ajouterai même que je ne saurois jamais cesser de reconnaître la dispensation favorable de la Providence en se servant de moi comme d'un instrument bâtreux pour la composition d'un ouvrage si laborieux & si important, & dont tous les matériaux ont été tirés & recueillis des sujets mêmes pleins de vie & dans leurs demeures naturelles: circonstances si essentielles à une véritable Histoire Naturelle, & qui pourtant ne paroissent pas suffisamment dans aucune autre Histoire d'Animaux que nous fabbons. Car pour ce qui est du dessin ou de la peinture d'un Animal tirée de sa peau rembourrée, ou de son poil, elle ne saurait nous donner qu'une idée très-imparfaite de la créature, comparée à celle qu'on a tirée au vif, non seulement par rapport à la taille, à l'esprit, & au port, mais aussi à la beauté des couleurs. Ce qui nous charme dans le plumage des Oiseaux perd beaucoup de son lustre dès qu'ils meurent, ou dès qu'ils sont transportés hors de leur climat natal. Mais entre tous les autres, les habitants des eaux sont sujets aux changements les plus grands & les plus soudains, jusques-là que les plus brillants se ternissent le plus tôt, & qu'il y a des espèces de poisson, qui peu de minutes après avoir été privés de leur élément, à peu près comme nos beautés humaines dès qu'elles ont perdu la vie, degénèrent visiblement & perdent cette variété agréable des plus belles couleurs qu'on puisse imaginer, pour en prendre d'autres également tristes & sordides.

Et pour ce qui est des Plantes, il est aisé de concevoir combien doivent être imparfaites les figures qu'on en tire d'échantillons déjà secs, en comparaison de celles qu'on déline d'après les Plantes vivantes, comme sont toutes celles que je représente dans mon Livre.

On peut inférer de toutes ces Observations, qu'à quelque degré d'exacitude qu'on puisse porter l'exercice de l'art dans la représentation des Animaux, on demeure encore fort loin de cette perfection imitable qui est si visible dans la Nature même, lorsqu'on la considère avec toute la circonspection & tous les avantages que j'ai eu le bonheur d'avoir dans la composition de mon Histoire, & qui, si je ne me trompe, y doivent être assez évidents.





# T H E I N D E X.

N. B. The Numbers in Roman Letters refer to the Pages in The Account of CAROLINA and the BAHAMA Islands.  
The Numbers in Figures refer to the Pages and Plates of each Volume, having I. or II. prefixed to them to denote the first or second Volume.

<b>A</b>	Cat Fish	II. 23	Fig Tree	xxi.
Borigines of America	vii.	Catterpillar	II. 29	I. 29
Agriculture of Carolina	xvi.	Catalpa	I. 49	I. 42
Air of the Bahama Islands	xxxviii.	Captives Toes cut off	xiii.	I. 64
— of Carolina	i.	Caverns of Salt Water	xxxix.	I. 43
— thickened by the Smoke of Tar-kilns and Fire Hunting	ii.	Caviaia to make Chat yellow breasted	xxxiv.	I. 44
Alligator	II. 63	Chatterer	I. 50	I. 41
America colder than the old World in parallel Latitudes	II. 31	Cherry, black Cluster,	I. 46	xxxiii.
Angel-fish	xii.	Coco Plum	I. 28	xii.
Animals, few in the Bahama Islands	xii.	Cochineal produced in Carolina	I. 9	xlii.
— abound most between the Tropicks ib.	ib.	Colour of a Bird changes while breeding	v.	I. 73
Apalatian Mountains,	v.	Colour of a Bird not perfect 'till 3 Years	xxxi.	I. 53
Apple-Trees	xix.	Coney Bahama	I. 25	I. 54
Arts and Manufactures of the Indians	xi.	Conserve of Coco Plums	xli.	ib.
Ash of Carolina	I. 80	Cookery of the Indians	I. 87	II. 8
<b>B</b>	Corks made of the Roots of a Tree	II. 79	Flying Fish	vii.
Bahama Coney	xxxviii.	Coronets of the Bills of Woodpeckers	II. 79	I. 26
Balsam Tree	II. 99	Courage in a small Bird singular	I. 25	vii.
— produced from a Poplar	I. 34	Cowpen Bird	ix.	II. 78
Baltimore Bird	I. 48	Crab Land	I. 60	I. 68
Baltimore Baftard	I. 49	— red Claw	I. 16	II. 72
Barley	xviii.	— Sand	I. 55	II. 69
Baracuda Fish	ii. i.	red motled Rock	I. 34	II. 70
Bark Ilathera, or Eleutheria	II. 46	— Hermit	II. 32	II. 71
— Winter	II. 50	Sea Hermit	II. 37	II. 72
Bafs	xxxiii.	— rough Shelled	II. 35	II. 69
Bay sweet Flower	I. 39	Cradles of the Indians	II. 36	xx.
Bay red	I. 63	Crane hooping	xv.	GAR-Fish green
Bay, purple Berry.	I. 61	Creatures in Torrid Zone most numerous	I. 75	Globe-Fish
Bay, Loblolly.	I. 44	xliii.	Glippetrae 100 Miles from the Sea in Virg.	vii.
Beasts	xxiv.	Creeper Finch	I. 83	Goat-sucker
Bear	xxv.	— Pine	I. 64	Goose Canada
— White	xxvi.	yellow Throat	I. 61	Grapes
Beaver	xxix.	Croker	II. 3	— fatten Fish
Bemines abounding in Seals	xxxviii.	Curlew white	I. 82	Grafs a Kind of which Turtle feed
Bind Weed, purple.	I. 35	— brown	I. 83	II. 38
Tird, red	I. 38	Cuckow of Carolina	I. 9	Grain of Europe
Birds most destructive to Corn	I. 13	Culinary Plants	xix.	xviii.
Birds of America excell in Beauty	xxxv.	Curlew red	I. 84	Pulfe, Roots, Fruit and Herbage, with
Birds which breed and abide the Summer in Carolina	xxxvi.	Cut Water	I. 90	their Cultivation
Birds which abide the Winter in Carolina, and retire North in the Spring	ib.	Cypres	I. 11	Gray Squirrel
Bittern small	J. 80	Cypres Seeds, Food of Parrots	ib.	Greenland Deer
— crested	I. 79	D	— blue	Groosbeak red
— brown	I. 78	Eluge, Signs of it in Carolina and Virg.	I. 38	— purple
Bill of the Flamingo	I. 74	Devil Fish	I. 39	Grunt
Blackberries	xxi.	Diet-drink made of the Roots of a Smilax	ib.	II. 6
Black Tail	II. 17	Dogs Bane	xxxii.	Guana
Blue Fish	II. 18	Dogwood Tree	I. 52	Gull laughing
Blue Bird	I. 47	Dopchick pied Bill	I. 58	Gum Elimi Tree
Bone Fish	II. 13	Drum Fish black and red	I. 27	Gum Aromatic from sweet Gum Tree
Booby	I. 87	Duck Buffels Head	I. 91	II. 65
— great	I. 86	Dove Ground	I. 95	a good Vulnary
Brafilletto	II. 51	Duck Summer	I. 98	Guacum broad leav'd
Brims a crafty Indian his Stratagem	xiv.	Ducks breed in Woodpeckers Holes	I. 96	H
Broom Rape	I. 36	Eagle bald	I. 26	Abitations of the Indians
Bunched Guinea Corn	xv.	Earth impregnated with Salt	I. 97	x.
Buller Bush	I. 75	Eddoes	I. 98	Hawk, Fishing.
Bullfinch black	I. 68	Employments of the Babamians	I. 99	I. 2
Button Wood	II. 33	European Birds in America	I. 93	Hawk Swallow Tail
<b>C</b>	F	F	I. 94	I. 4
Andles made of Myrtle Berries	I. 69	Allow Deer	I. 95	Pigeon
Canes good Fodder for Cattle	iv.	Fat of Guana's its Properties	I. 96	little
Carolina when discovered	i.	Fatback a Fish	xxviii.	I. 94
Cataracts obstruct Navigation	v.	*	xxxviii.	Healthiness of the Pabama Islands
Cat Island the first Land discovered	xxxviii.		xxxv.	xxxviii.
Cat Bird	I. 66		Hickory	I. 58
			xxxv.	Hind Fish.
			xxviii.	Holly Dahoon
			11. 64	Hogs
			xxxiii.	Hog-fish
				Hog-fish

# The INDE X.

- |  | R                                       |
|--|---|
| Hog fish the great                           | xxxviii.                                |
| Honmony, a Preparation of Maiz               | xxix.                                   |
| Honeyfuckle upright                          | xxix.                                   |
| Hoops made of Hickory Wood the best          | II. 41                                  |
| Horse  | ib. 42                                  |
| Humming Bird                                 | xxxv.                                   |
| Hurricanes in Carolina, their fatal Effects  | Remarks on American Birds               |
|  | xvii.                                   |
| J Ackdaw purple                              | Kinds and Culture                       |
| Jay blue                                     | xvii.                                   |
| Jessamy yellow                               | Rivers nor Springs in the Bahama Isles  |
| Indians of Carolina and Florida              | xlii.                                   |
| Shape, Features,                             | Rock Fish                               |
| Women carry great Burdens                    | Rosin of the Balsam Tree, its Uses      |
| their Habits                                 | Rudder Fish                             |
| a sweet People                               | S                                       |
| Habits of the Women                          | Sappadillo                              |
| Habits of the Men in War                     | Saffafraſ                               |
| Arms and Weapons                             | Sea Sparrow-Hawk                        |
| are temperate                                | Feather                                 |
| Food and Cookery                             | Sennagars, a Nation of Indians          |
| Habitations and Buildings                    | Serpents of Carolina                    |
| Arts and Manufactures                        | Seven Years Apple                       |
| Hunting                                      | Scales of the Angel Fish singular       |
| Sagacity                                     | Scalping, a barbarous Custom of Indians |
| Sennegars a Nation of                        | Scent of the Turky Buzzard excelling    |
| cut off the Toes of their Captives           | Schoolmaster                            |
| Drunkenneſs                                  | Scunk Weed                              |
| Wars   | Shad                                    |
| Scalping a barbarous Custom                  | Shark                                   |
| Caution and Temerity                         | Sheep                                   |
| Principles of Honour                         | Shell of a River Turtle eatable         |
| savage Nature and Cruelty                    | Shells                                  |
| healthy Conſtitutions                        | their different abroad                  |
| little Knowledge of Physick                  | Ship drove three Miles into the Woods   |
| sweating and ſcarrifying                     | Skipjack                                |
| ſalubrious Drink of                          | Small-pox fatal to Indians              |
| Women peaceable and patient                  | Snake Rattle                            |
| Indian Pink                                  | xxix.                                   |
| Inſects                                      | small                                   |
| Inundations annual in Carolina               | Water                                   |
| Inundation of Fish                           | black                                   |
| Ivy of Virginia deſtructive to Sheep         | brown                                   |
| K  | Copper Belly                            |
| K Idney Beans                                | bluish green                            |
| King Fisher                                  | black                                   |
| L  | Bead, little brown                      |
| Lady's Slipper yellow                        | Ribbon                                  |
| of Penſylvania.                              | spotted                                 |
| Lane Snapper                                 | Chain                                   |
| Land the beſt liable to Inundations          | green spotted                           |
| impoveriſhed by Inundations                  | Coach-whip                              |
| Lark   | Corn                                    |
| large  | Hognose                                 |
| Laurel-Tree of Carolina                      | green                                   |
| Lemon Tree                                   | Wampum                                  |
| Lily-Thorn                                   | Glaſs                                   |
| Limbs of Oak broke by Pigeons                | Bead                                    |
| Linnet blue                                  | Root                                    |
| Lizard Lyon                                  | Snow Bird                               |
| Blue-Tail                                    | Soap Wood                               |
| green of Jamaica                             | Soap made of the Berries of a Tree      |
| of Carolina                                  | Soil of Carolina                        |
| Loblolly Bay                                 | of the Bahama Islands                   |
| Logwood                                      | Sole                                    |
| M  | Song Birds, few in America              |
| M A I Z, or Indian Corn, different Kinds and | Soree                                   |
| Culture                                      | Sorrel Tree                             |
| Mancaneel Tree                               | Sparrow little                          |
| Maho Bark, its Uses                          | Alabama                                 |
| Mahogany Tree                                | Spiked Guinea Corn                      |
| Mangrove Grape-Tree                          | Squirrel black                          |
| Snapper                                      | gray Fox                                |
| Margate Fish                                 | ground                                  |
| Maſtick Tree                                 | flying                                  |
| Maple, red Flowering.                        | Stag                                    |
| Martagon                                     | Starling, red Wing.                     |
| Martin purple                                | Star Flower little yellow               |
| May Apple                                    | Stones near the Surface for 300 Miles   |
| Minerals Signs of them                       | none within the Settlements             |
| Migratory Fish of Uſe to Mariners            | Strongback, a Decoction of it much uſed |
| Mifletto with red Berries                    | II. 79                                  |
| with purple Berries                          | the Manner of taking them               |
| Moccasins, or Indian Shoes                   | XXXI.                                   |
| Mock Bird                                    | to pickle                               |
| Monex  | Sweating-Houſes of the Indians          |
|  | Subterraneous Fluxes of the Sea         |
|  | Sucking Fish                            |
| J  | T                                       |
| Ackdaw purple                                | Ang                                     |
| Jay blue                                     | Teal blue Wing                          |
| Jessamy yellow                               | II. 10                                  |
| Indians of Carolina and Florida              | I. 99                                   |
| Shape, Features,                             | Teal                                    |
| Women carry great Burdens                    |   |
| their Habits                                 |   |
| a sweet People                               |   |
| Habits of the Women                          |   |
| Habits of the Men in War                     |   |
| Arms and Weapons                             |   |
| are temperate                                |   |
| Food and Cookery                             |   |
| Habitations and Buildings                    |   |
| Arts and Manufactures                        |   |
| Hunting                                      |   |
| Sagacity                                     |   |
| Sennegars a Nation of                        |   |
| cut off the Toes of their Captives           |   |
| Drunkenneſs                                  |   |
| Wars   |   |
| Scalping a barbarous Custom                  |   |
| Caution and Temerity                         |   |
| Principles of Honour                         |   |
| savage Nature and Cruelty                    |   |
| healthy Conſtitutions                        |   |
| little Knowledge of Physick                  |   |
| sweating and ſcarrifying                     |   |
| ſalubrious Drink of                          |   |
| Women peaceable and patient                  |   |
| Indian Pink                                  |   |
| Inſects                                      |   |
| Inundations annual in Carolina               |   |
| Inundation of Fish                           |   |
| Ivy of Virginia deſtructive to Sheep         |   |
| K  |   |
| K Idney Beans                                |   |
| King Fisher                                  |   |
| L  |   |
| Lady's Slipper yellow                        |   |
| of Penſylvania.                              |   |
| Lane Snapper                                 |   |
| Land the beſt liable to Inundations          |   |
| impoveriſhed by Inundations                  |   |
| Lark   |   |
| large  |   |
| Laurel-Tree of Carolina                      |   |
| Lemon Tree                                   |   |
| Lily-Thorn                                   |   |
| Limbs of Oak broke by Pigeons                |   |
| Linnet blue                                  |   |
| Lizard Lyon                                  |   |
| Blue-Tail                                    |   |
| green of Jamaica                             |   |
| of Carolina                                  |   |
| Loblolly Bay                                 |   |
| Logwood                                      |   |
| M  |   |
| M A I Z, or Indian Corn, different Kinds and |   |
| Culture                                      |   |
| Mancaneel Tree                               |   |
| Maho Bark, its Uses                          |   |
| Mahogany Tree                                |   |
| Mangrove Grape-Tree                          |   |
| Snapper                                      |   |
| Margate Fish                                 |   |
| Maſtick Tree                                 |   |
| Maple, red Flowering.                        |   |
| Martagon                                     |   |
| Martin purple                                |   |
| May Apple                                    |   |
| Minerals Signs of them                       |   |
| Migratory Fish of Uſe to Mariners            |   |
| Mifletto with red Berries                    |   |
| with purple Berries                          |   |
| Moccasins, or Indian Shoes                   |   |
| Mock Bird                                    |   |
| Monex  |   |
| J  |   |
| Ackdaw purple                                |   |
| Jay blue                                     |   |
| Jessamy yellow                               |   |
| Indians of Carolina and Florida              |   |
| Shape, Features,                             |   |
| Women carry great Burdens                    |   |
| their Habits                                 |   |
| a sweet People                               |   |
| Habits of the Women                          |   |
| Habits of the Men in War                     |   |
| Arms and Weapons                             |   |
| are temperate                                |   |
| Food and Cookery                             |   |
| Habitations and Buildings                    |   |
| Arts and Manufactures                        |   |
| Hunting                                      |   |
| Sagacity                                     |   |
| Sennegars a Nation of                        |   |
| cut off the Toes of their Captives           |   |
| Drunkenneſs                                  |   |
| Wars   |   |
| Scalping a barbarous Custom                  |   |
| Caution and Temerity                         |   |
| Principles of Honour                         |   |
| savage Nature and Cruelty                    |   |
| healthy Conſtitutions                        |   |
| little Knowledge of Physick                  |   |
| sweating and ſcarrifying                     |   |
| ſalubrious Drink of                          |   |
| Women peaceable and patient                  |   |
| Indian Pink                                  |   |
| Inſects                                      |   |
| Inundations annual in Carolina               |   |
| Inundation of Fish                           |   |
| Ivy of Virginia deſtructive to Sheep         |   |
| K  |   |
| K Idney Beans                                |   |
| King Fisher                                  |   |
| L  |   |
| Lady's Slipper yellow                        |   |
| of Penſylvania.                              |   |
| Lane Snapper                                 |   |
| Land the beſt liable to Inundations          |   |
| impoveriſhed by Inundations                  |   |
| Lark   |   |
| large  |   |
| Laurel-Tree of Carolina                      |   |
| Lemon Tree                                   |   |
| Lily-Thorn                                   |   |
| Limbs of Oak broke by Pigeons                |   |
| Linnet blue                                  |   |
| Lizard Lyon                                  |   |
| Blue-Tail                                    |   |
| green of Jamaica                             |   |
| of Carolina                                  |   |
| Loblolly Bay                                 |   |
| Logwood                                      |   |
| M  |   |
| M A I Z, or Indian Corn, different Kinds and |   |
| Culture                                      |   |
| Mancaneel Tree                               |   |
| Maho Bark, its Uses                          |   |
| Mahogany Tree                                |   |
| Mangrove Grape-Tree                          |   |
| Snapper                                      |   |
| Margate Fish                                 |   |
| Maſtick Tree                                 |   |
| Maple, red Flowering.                        |   |
| Martagon                                     |   |
| Martin purple                                |   |
| May Apple                                    |   |
| Minerals Signs of them                       |   |
| Migratory Fish of Uſe to Mariners            |   |
| Mifletto with red Berries                    |   |
| with purple Berries                          |   |
| Moccasins, or Indian Shoes                   |   |
| Mock Bird                                    |   |
| Monex  |   |
| J  |   |
| Ackdaw purple                                |   |
| Jay blue                                     |   |
| Jessamy yellow                               |   |
| Indians of Carolina and Florida              |   |
| Shape, Features,                             |   |
| Women carry great Burdens                    |   |
| their Habits                                 |   |
| a sweet People                               |   |
| Habits of the Women                          |   |
| Habits of the Men in War                     |   |
| Arms and Weapons                             |   |
| are temperate                                |   |
| Food and Cookery                             |   |
| Habitations and Buildings                    |   |
| Arts and Manufactures                        |   |
| Hunting                                      |   |
| Sagacity                                     |   |
| Sennegars a Nation of                        |   |
| cut off the Toes of their Captives           |   |
| Drunkenneſs                                  |   |
| Wars   |   |
| Scalping a barbarous Custom                  |   |
| Caution and Temerity                         |   |
| Principles of Honour                         |   |
| savage Nature and Cruelty                    |   |
| healthy Conſtitutions                        |   |
| little Knowledge of Physick                  |   |
| sweating and ſcarrifying                     |   |
| ſalubrious Drink of                          |   |
| Women peaceable and patient                  |   |
| Indian Pink                                  |   |
| Inſects                                      |   |
| Inundations annual in Carolina               |   |
| Inundation of Fish                           |   |
| Ivy of Virginia deſtructive to Sheep         |   |
| K  |   |
| K Idney Beans                                |   |
| King Fisher                                  |   |
| L  |   |
| Lady's Slipper yellow                        |   |
| of Penſylvania.                              |   |
| Lane Snapper                                 |   |
| Land the beſt liable to Inundations          |   |
| impoveriſhed by Inundations                  |   |
| Lark   |   |
| large  |   |
| Laurel-Tree of Carolina                      |   |
| Lemon Tree                                   |   |
| Lily-Thorn                                   |   |
| Limbs of Oak broke by Pigeons                |   |
| Linnet blue                                  |   |
| Lizard Lyon                                  |   |
| Blue-Tail                                    |   |
| green of Jamaica                             |   |
| of Carolina                                  |   |
| Loblolly Bay                                 |   |
| Logwood                                      |   |
| M  |   |
| M A I Z, or Indian Corn, different Kinds and |   |
| Culture                                      |   |
| Mancaneel Tree                               |   |
| Maho Bark, its Uses                          |   |
| Mahogany Tree                                |   |
| Mangrove Grape-Tree                          |   |
| Snapper                                      |   |
| Margate Fish                                 |   |
| Maſtick Tree                                 |   |
| Maple, red Flowering.                        |   |
| Martagon                                     |   |
| Martin purple                                |   |
| May Apple                                    |   |
| Minerals Signs of them                       |   |
| Migratory Fish of Uſe to Mariners            |   |
| Mifletto with red Berries                    |   |
| with purple Berries                          |   |
| Moccasins, or Indian Shoes                   |   |
| Mock Bird                                    |   |
| Monex  |   |
| J  |   |
| Ackdaw purple                                |   |
| Jay blue                                     |   |
| Jessamy yellow                               |   |
| Indians of Carolina and Florida              |   |
| Shape, Features,                             |   |
| Women carry great Burdens                    |   |
| their Habits                                 |   |
| a sweet People                               |   |
| Habits of the Women                          |   |
| Habits of the Men in War                     |   |
| Arms and Weapons                             |   |
| are temperate                                |   |
| Food and Cookery                             |   |
| Habitations and Buildings                    |   |
| Arts and Manufactures                        |   |
| Hunting                                      |   |
| Sagacity                                     |   |
| Sennegars a Nation of                        |   |
| cut off the Toes of their Captives           |   |
| Drunkenneſs                                  |   |
| Wars   |   |
| Scalping a barbarous Custom                  |   |
| Caution and Temerity                         |   |
| Principles of Honour                         |   |
| savage Nature and Cruelty                    |   |
| healthy Conſtitutions                        |   |
| little Knowledge of Physick                  |   |
| sweating and ſcarrifying                     |   |
| ſalubrious Drink of                          |   |
| Women peaceable and patient                  |   |
| Indian Pink                                  |   |
| Inſects                                      |   |
| Inundations annual in Carolina               |   |
| Inundation of Fish                           |   |
| Ivy of Virginia deſtructive to Sheep         |   |
| K  |   |
| K Idney Beans                                |   |
| King Fisher                                  |   |
| L  |   |
| Lady's Slipper yellow                        |   |
| of Penſylvania.                              |   |
| Lane Snapper                                 |   |
| Land the beſt liable to Inundations          |   |
| impoveriſhed by Inundations                  |   |
| Lark   |   |
| large  |   |
| Laurel-Tree of Carolina                      |   |
| Lemon Tree                                   |   |
| Lily-Thorn                                   |   |
| Limbs of Oak broke by Pigeons                |   |
| Linnet blue                                  |   |
| Lizard Lyon                                  |   |
| Blue-Tail                                    |   |
| green of Jamaica                             |   |
| of Carolina                                  |   |
| Loblolly Bay                                 |   |
| Logwood                                      |   |
| M  |   |
| M A I Z, or Indian Corn, different Kinds and |   |
| Culture                                      |   |
| Mancaneel Tree                               |   |
| Maho Bark, its Uses                          |   |
| Mahogany Tree                                |   |
| Mangrove Grape-Tree                          |   |
| Snapper                                      |   |
| Margate Fish                                 |   |
| Maſtick Tree                                 |   |
| Maple, red Flowering.                        |   |
| Martagon                                     |   |
| Martin purple                                |   |
| May Apple                                    |   |
| Minerals Signs of them                       |   |
| Migratory Fish of Uſe to Mariners            |   |
| Mifletto with red Berries                    |   |
| with purple Berries                          |   |
| Moccasins, or Indian Shoes                   |   |
| Mock Bird                                    |   |
| Monex  |   |
| J  |   |
| Ackdaw purple                                |   |
| Jay blue                                     |   |
| Jessamy yellow                               |   |
| Indians of Carolina and Florida              |   |
| Shape, Features,                             |   |
| Women carry great Burdens                    |   |
| their Habits                                 |   |
| a sweet People                               |   |
| Habits of the Women                          |   |
| Habits of the Men in War                     |   |
| Arms and Weapons                             |   |
| are temperate                                |   |
| Food and Cookery                             |   |
| Habitations and Buildings                    |   |
| Arts and Manufactures                        |   |
| Hunting                                      |   |
| Sagacity                                     |   |
| Sennegars a Nation of                        |   |
| cut off the Toes of their Captives           |   |
| Drunkenneſs                                  |   |
| Wars   |   |
| Scalping a barbarous Custom                  |   |
| Caution and Temerity                         |   |
| Principles of Honour                         |   |
| savage Nature and Cruelty                    |   |
| healthy Conſtitutions                        |   |
| little Knowledge of Physick                  |   |
| sweating and ſcarrifying                     |   |
| ſalubrious Drink of                          |   |
| Women peaceable and patient                  |   |
| Indian Pink                                  |   |
| Inſects                                      |   |
| Inundations annual in Carolina               |   |
| Inundation of Fish                           |   |
| Ivy of Virginia deſtructive to Sheep         |   |
| K  |   |
| K Idney Beans                                |   |
| King Fisher                                  |   |
| L  |   |
| Lady's Slipper yellow                        |   |
| of Penſylvania.                              |   |
| Lane Snapper                                 |   |
| Land the beſt liable to Inundations          |   |
| impoveriſhed by Inundations                  |   |
| Lark   |   |
| large  |   |
| Laurel-Tree of Carolina                      |   |
| Lemon Tree                                   |   |
| Lily-Thorn                                   |   |
| Limbs of Oak broke by Pigeons                |   |
| Linnet blue                                  |   |
| Lizard Lyon                                  |   |
| Blue-Tail                                    |   |
| green of Jamaica                             |   |
| of Carolina                                  |   |
| Loblolly Bay                                 |   |
| Logwood                                      |   |
| M  |   |
| M A I Z, or Indian Corn, different Kinds and |   |
| Culture                                      |   |
| Mancaneel Tree                               |   |
| Maho Bark, its Uses                          |   |
| Mahogany Tree                                |   |
| Mangrove Grape-Tree                          |   |
| Snapper                                      |   |
| Margate Fish                                 |   |
| Maſtick Tree                                 |   |
| Maple, red Flowering.                        |   |
| Martagon                                     |   |
| Martin purple                                |   |
| May Apple                                    |   |
| Minerals Signs of them                       |   |
| Migratory Fish of Uſe to Mariners            |   |
| Mifletto with red Berries                    |   |
| with purple Berries                          |   |
| Moccasins, or Indian Shoes                   |   |
| Mock Bird                                    |   |
| Monex  |   |
| J  |   |
| Ackdaw purple                                |   |
| Jay blue                                     |   |
| Jessamy yellow                               |   |
| Indians of Carolina and Florida              |   |
| Shape, Features,                             |   |
| Women carry great Burdens                    |   |
| their Habits                                 |   |
| a sweet People                               |   |
| Habits of the Women                          |   |
| Habits of the Men in War                     |   |
| Arms and Weapons                             |   |
| are temperate                                |   |
| Food and Cookery                             |   |
| Habitations and Buildings                    |   |
| Arts and Manufactures                        |   |
| Hunting                                      |   |
| Sagacity                                     |   |
| Sennegars a Nation of                        |   |
| cut off the Toes of their Captives           |   |
| Drunkenneſs                                  |   |
| Wars   |   |
| Scalping a barbarous Custom                  |   |
| Caution and Temerity                         |   |
| Principles of Honour                         |   |
| savage Nature and Cruelty                    |   |
| healthy Conſtitutions                        |   |
| little Knowledge of Physick                  |   |
| sweating and ſcarrifying                     |   |
| ſalubrious Drink of                          |   |
| Women peaceable and patient                  |   |
| Indian Pink                                  |   |
| Inſects                                      |   |
| Inundations annual in Carolina               |   |
| Inundation of Fish                           |   |
| Ivy of Virginia deſtructive to Sheep         |   |
| K  |   |
| K Idney Beans                                |   |
| King Fisher                                  |   |
| L  |   |
| Lady's Slipper yellow                        |   |
| of Penſylvania.                              |   |
| Lane Snapper                                 |   |
| Land the beſt liable to Inundations          |   |
| impoveriſhed by Inundations                  |   |
| Lark   |   |
| large  |   |
| Laurel-Tree of Carolina                      |   |
| Lemon Tree                                   |   |
| Lily-Thorn                                   |   |
| Limbs of Oak broke by Pigeons                |   |
| Linnet blue                                  |   |
| Lizard Lyon                                  |   |
| Blue-Tail                                    |   |
| green of Jamaica                             |   |
| of Carolina                                  |   |
| Loblolly Bay                                 |   |
| Logwood                                      |   |
| M  |   |
| M A I Z, or Indian Corn, different Kinds and |   |
| Culture                                      |   |
| Mancaneel Tree                               |   |
| Maho Bark, its Uses                          |   |
| Mahogany Tree                                |   |
| Mangrove Grape-Tree                          |   |
| Snapper                                      |   |
| Margate Fish                                 |   |
| Maſtick Tree                                 |   |
| Maple, red Flowering.                        |   |
| Martagon                                     |   |
| Martin purple                                |   |
| May Apple                                    |   |
| Minerals Signs of them                       |   |
| Migratory Fish of Uſe to Mariners            |   |
| Mifletto with red Berries                    |   |
| with purple Berries                          |   |
| Moccasins, or Indian Shoes                   |   |
| Mock Bird                                    |   |
| Monex  |   |
| J  |   |
| Ackdaw purple                                |   |
| Jay blue                                     |   |
| Jessamy yellow                               |   |
| Indians of Carolina and Florida              |   |
| Shape, Features,                             |   |
| Women carry great Burdens                    |   |
| their Habits                                 |   |
| a sweet People                               |   |
| Habits of the Women                          |   |
| Habits of the Men in War                     |   |
| Arms and Weapons                             |   |
| are temperate                                |   |
| Food and Cookery                             |   |
| Habitations and Buildings                    |   |
| Arts and Manufactures                        |   |
| Hunting                                      |   |
| Sagacity                                     |   |
| Sennegars a Nation of                        |   |
| cut off the Toes of their Captives           |   |
| Drunkenneſs                                  |   |
| Wars   |   |
| Scalping a barbarous Custom                  |   |
| Caution and Temerity                         |   |
| Principles of Honour                         |   |
| savage Nature and Cruelty                    |   |
| healthy Conſtitutions                        |   |
| little Knowledge of Physick                  |   |
| sweating and ſcarrifying                     |   |
| ſalubrious Drink of                          |   |
| Women peaceable and patient                  |   |
| Indian Pink                                  |   |
| Inſects                                      |   |
| Inundations annual in Carolina               |   |
| Inundation of Fish                           |   |
| Ivy of Virginia deſtructive to Sheep         |   |
| K  |   |
| K Idney Beans                                |   |
| King Fisher                                  |   |
| L  |   |
| Lady's Slipper yellow                        |   |
| of Penſylvania.                              |   |
| Lane Snapper                                 |   |
| Land the beſt liable to Inundations          |   |
| impoveriſhed by Inundations                  |   |
| Lark   |   |
| large  |   |
| Laurel-Tree of Carolina                      |   |
| Lemon Tree                                   |   |
| Lily-Thorn                                   |   |
| Limbs of Oak broke by Pigeons                |   |
| Linnet blue                                  |   |
| Lizard Lyon                                  |   |
| Blue-Tail                                    |   |
| green of Jamaica                             |   |
| of Carolina                                  |   |
| Loblolly Bay                                 |   |
| Logwood                                      |   |
| M  |   |
| M A I Z, or Indian Corn, different Kinds and |   |
| Culture                                      |   |
| Mancaneel Tree                               |   |
|  |   |

## La T A B L E.

Teal white Face	ib. 100	Turtle Hawkbill	-	ib. 30	Wild Cat	-	-	xxv.
Thrush, Fox colour'd.	ib. 28	— Loggerhead	-	II. 40	Pine	-	-	II. 89
— red leg'd	ib. 30	— Trunk	-	ib. 40	Winds, North-West the coldest in America	1.	-	
— little	ib. 31	— the Manner of taking them	-	ib. 30	Wolf	-	-	xxvi.
Tillage little used in America	xvi.	Turtle Dove of Carolina	-	I. 24	Wood Brafiletto	-	-	II. 51
Timber of the Tulip-Tree of great Use	I. 48	Turky-Buzzard	-	I. 6	— of the Hickory excellent Firing	I. 38	-	
Timous Bahama	ib. 59	Turky, wild	-	xliv.	— of Hickory used in Agriculture	ib. 38	-	
— crested	ib. 57	Tyrant	-	ib. 55	— of the Tupelo its Use	ib. 41	-	
— hooded	ib. 60		U		— of the black Walnut Tree	ib. 67	-	
— yellow	ib. 63	<b>V</b> I N E	-	xxii.	— resembling water'd Sattin	ib. 63	-	
Tobaccopipe-Fish	II. 17	Viper Rattle	-	II. 41	Wood-pecker large white Bill	ib. 16	-	
Tommabawk, an Instrument of War	xii.	Viper Water	-	ib. 43	— large red crested	ib. 17	-	
Tooth-ach Tree	I. 26	— black	-	ib. 44	— gold Wing	ib. 18	-	
Tortois-Sea, their Properties in general	II. 38	— brown	-	ib. 45	— hairy	ib. 19	-	
Towhee Bird	I. 34	Umbrella Tree	-	ib. 80	— red Belly	ib. 20	-	
Toad-stool	ib. 36	Unicorn-Fish of Bahama	-	ib. 19	— red Head	ib. 21	-	
Tree 30 Feet in Circumference	ib. 11		W		— yellow Belly	ib. 21	-	
Trumpet Flower	ib. 65	W ALnut black	-	I. 67	— smallest spotted	ib. 21	-	
Tuccaho, Indian Food	x.	Water of Carolina	-	vi.	Worms killed by a Decoction	II. 78	-	
Tulip Tree	I. 48	Water exceeding clear	-	xlii.	<b>Y</b> A M S	-	xix.	
Tupelo Tree	ib. 41	Whales	-	xxxii.	Yellow Rump	-	I. 58	
Water	ib. 60	Wheat	-	xv.	Yellow Fish	-	II. 10	
Turn Stone	ib. 72	Whipper-will	-	xliv.				
Turtl green	II. 38	Whiting	-	II. 12				

## La T A B L E.

N. B. Les Numeraux en Caraftes Romains regardent les pages dans La Relation de la CAROLINE & des Isles de BAHAMA,  
Les Numeraux en Chiffres denotent les Pages, ou les Planches de chaque Tome, ayans un I. ou un II. prefixé, pour signifier le  
premier, ou le second Tome.

<b>A</b>								
<i>A</i> cacia	-	I. 43	Chat oiseau	-	ib. 66	Grenouille d'Eau	-	ib. 70
Aigle à tête Blanche	-	I. 1.	Chêne blanc de la Virginie	-	ib. 21	Grue blanche de l'Amérique	-	I. 75
Alcée de la Floride	-	I. 44	— noir	-	ib. 19	Gribe aux jambes rouges	-	ib. 30
Alcyon	-	I. 69	— eau	-	ib. 20	Grive aux jambe de Passe	-	I. 29
Alouette	-	I. 32	blanc aux feuilles armées de pointes	-	ib. 21	— rousse	-	ib. 28
— grand	-	I. 33	aux feuilles de saule	-	ib. 22	— petite	-	ib. 31
Alouette de mer	-	I. 72	rouge	-	ib. 23	Gros-bec bleu	-	ib. 39
Anana sauvage	-	II. 89	a feuilles de chataigner	-	ib. 18	— violet	-	ib. 40
Anguille de mer verte	-	II. 20	verd à feuilles oblonges	-	ib. 17	Guaiac, arbre aux fleurs blues	-	ib. 42
— de mer, noire tacketée	-	II. 21	Chenille à cornes grande	-	II. 94	H		
Apocyn	-	I. 58	Chevre-feuille droit	-	I. 57	<b>H</b> E R O N bleu	-	I. 76
Arbre de Banianes	-	II. 63	Chinkapin	-	ib. 9	— petit blanc	-	ib. 77
Arbre Parasol	-	II. 80	Choucas couleur de pourpre	-	ib. 12	Hibou petite	-	ib. 7
Arbre de Mastic	-	II. 75	Collibre	-	ib. 65	Hirondelle marine à la tête blanche	-	ib. 38
Arbre pour le mal des dents	-	I. 26	Cornier male de la Virginie	-	ib. 27	Houx Dahoon	-	ib. 31
Arbre aux fleurs frangées	-	I. 68	Corlieu brun	-	I. 83	I		
Arbrisseau ressemblant au Cericer noir	-	I. 28	rouge	-	ib. 84	Jaseur de la Caroline	-	I. 46
Arbrisseau dont les fruits ressemblent des balles de mousquet	-	II. 75	blanc	-	ib. 82	Iguanas	-	II. 64
Avoine du bord de la mer	-	I. 32	Coucou de la Caroline	-	ib. 9	L		
B			Coupeur d'eau	-	ib. 90	Apin de Bahama	-	II. 79
<b>B</b> Altimore l'oiseau	-	I. 48	Crab de terre	-	II. 32	Laurier au fleurs odorantes	-	I. 39
Bafard	-	I. 49	Crocodile des Indes occidentales	-	ib. 63	— rouge	-	ib. 63
Bernard l'hermite	-	II. 33	Cul-blanc à la poitrine jaune	-	I. 50	Laurier de la Caroline	-	II. 61
— l'hermite de mer	-	II. 34	Cyprès de l'Amérique	E	ib. 11	Lezard verd de la Caroline	-	II. 65
Bignonia	-	I. 37	E		II. 73	— verd de la Jamaïque	-	ib. 66
— aux feuilles de rocou	-	II. 82	Eureuil noir	-	ib. 77	— à la queue bleue	-	ib. 67
— aux feuilles de frêne	-	I. 49	volant	-	II. 74	Lezard-Lion	-	ib. 68
Bois de Champêche	-	I. 65	gris, le grand	-	ib. 75	Licorne de Bahama poison	-	II. 19
— empoisonné	-	II. 66	terre	-	II. 50	Linotte bleue	-	I. 45
Butor brun	-	I. 40	L'Ecorce du Capitain Winter	-	I. 58	Lis rouge	-	ib. 58
buppé	-	I. 78	Elleborine	-	I. 3	Liseron pourpre de la Caroline	M	I. 35
petit	-	I. 79	Epervier à pigeons	-	ib. 5	M A hogany	-	II. 81
Euse à figure de paon	-	I. 80	petit	-	ib. 4	Mancenillier	-	ib. 95
C		I. 6	à queue d'hirondelle	-	ib. 62	Martagon de Canada	-	II. 56
Canard d'Amérique ou grand bec	-	I. 96	Erable aux fleurs rouges	-	ib. 13	Martinet couleur de pourpre	-	I. 51
— de Bahama	-	I. 93	Etourneau à aile rouge	F	Merlan de la Caroline	-	II. 12	
— petit à la tête purpurine	-	I. 95			Mefange de l'Amérique à la gorge jaune	I. 62		
— d'Eté	-	I. 97	Faucon pecheur	-	ib. 73	— brune de l'Amérique	-	ib. 61
buppé	-	I. 94	Flamman	-	ib. 74	— de Bahama	-	ib. 59
petit brun	-	I. 98	bec du, de sa grandeur naturelle	-	ib. 87	— pinçon	-	ib. 64
Cancre à la coque raboteuse	-	II. 36	Fou	-	ib. 86	— au croupion jaune	-	ib. 58
— de rocker tacketé	-	ib.	grand	-	ib. 91	jaune	-	ib. 63
— de sable	-		Foulque à bec varié	G	— butpé	-	ib. 57	
marin aux mordans rouges	-				I. 15	— au capuchon noir	-	ib. 60
Canelle blanche	-	ib. 37	G E A I bleu	-	ib. 30	Moineau noir aux yeux rouges	-	ib. 34
Cardinal	-	II. 50	Gomme Elimi arbre qui produit	-	ib. 47	— petit	-	ib. 35
Chardonneret de l'Amérique	-	I. 38	Gorge rouge de la Caroline	-	ib. 69	— de Bahama	-	ib. 37
Chasbrille	-	I. 43	Grenouille de terre	-	ib. 71	— brun	-	ib. 34
		II. 46	d'arbre, verte	-	ib. 72	— de neige	-	ib. 35
			mugissante					Moqueur

## INDEX Rerum.

<i>Moqueur</i>	ib. 27	<i>Platane occidental</i>	-	<i>I. 56</i>	<i>petit à sonnette</i>	-	<i>II. 42</i>
<i>Mouette rieuse</i>	ib. 89	<i>Plume de mer</i>	-	<i>II. 13</i>	<i>au Chapelet</i>	-	<i>ib. 60</i>
<i>Myrte à chandelle</i>	I. 13. 69	<i>Plusieur criard</i>	-	<i>I. 71</i>	<i>d'un vert bleuâtre</i>	-	<i>ib. 47</i>
<i>N</i>		<i>Poisson volant</i>	-	<i>II. 8</i>	<i>de blé</i>	-	<i>ib. 55</i>
<i>Noyer blanc nommé hickory à la Virginie</i>	I. 38	<i>Pomme de May</i>	-	<i>I. 24</i>	<i>à chaîne</i>	-	<i>ib. 52</i>
<i>— noir</i>	ib. 67	<i>— de sept ans</i>	-	<i>ib. 59</i>	<i>vert tacheté</i>	-	<i>ib. 53</i>
<i>— de la Caroline</i>	ib. 38	<i>Poisson Licorne de Bahama</i>	-	<i>ib. 10</i>	<i>nommē Wampum</i>	-	<i>ib. 58</i>
<i>O</i>		<i>jaune</i>	-	<i>ib. 18</i>	<i>vert</i>	-	<i>ib. 57</i>
<i>Oenothera jaune</i>	ib. 33	<i>bleu</i>	-	<i>ib. 13</i>	<i>à la tête de vipere</i>	-	<i>ib. 56</i>
<i>Ortolan de la Caroline</i>	ib. 14	<i>offeux</i>	-	<i>ib. 15</i>	<i>petit brun au chapelet</i>	-	<i>ib. 49</i>
<i>Orobanche de la Virginie</i>	ib. 36	<i>Porceau, le grand</i>	I.	<i>greffe &amp; brun</i>	-	-	<i>ib. 50</i>
<i>Oreille arbre</i>	ib. 71	<i>Preneur de mouches huppé</i>	-	<i>I. 52</i>	<i>noir</i>	-	<i>ib. 48</i>
<i>P</i>		<i>— d'huîtres</i>	-	<i>ib. 85</i>	<i>de verre</i>	-	<i>ib. 59</i>
<i>Paillon de nuit la plus grande</i>	II. 91	<i>aux yeux rouges</i>	-	<i>ib. 54</i>	<i>à ventre couleur de cuivre</i>	-	<i>ib. 46</i>
<i>— de la Caroline</i>	ib. 86	<i>petit brun</i>	-	<i>ib. 53</i>	<i>greffe &amp; tacheté</i>	-	<i>ib. 51</i>
<i>Patate de la Virginie</i>	ib. 84	<i>de mouches noirâtre</i>	-	<i>Serpentaire de la Virginie</i>	-	-	<i>I. 29</i>
<i>Pelican Américain</i>	I. 81	<i>de mouches rouge</i>	-	<i>T</i>			
<i>Perché d'eau douce</i>	II. 8	<i>Prun de Coco</i>	-	<i>TEPE-Chevre de la Caroline</i>	I. 8		
<i>Perroquet du Paradis de Cuba</i>	ib. 10	<i>Putois</i>	-	<i>Tortues de mer des différentes espèces</i>	de leur		
<i>— de la Caroline</i>	ib. 11			<i>propriétés en général</i>	II. 38		
<i>Peuplier noir de la Caroline</i>	I. 34	<i>QUEUE noir, petit rouge</i>	R	<i>Tortue de la manière de prendre</i>	ib. 39		
<i>Pigeon à la couronne blanche</i>	ib. 25	<i>RAME de l'Amérique</i>	-	<i>carret</i>	ib.		
<i>— de Passe</i>	ib. 23	<i>Remore</i>	-	<i>verte, ou tortue franche</i>	ib. 38		
<i>Pied de veau de l'Amérique</i>	II. 71	<i>Renard gris</i>	-	<i>caouanne, ibid.</i>	ib. 40		
<i>Pic de la première grandeur au bec blanc</i>	I. 16	<i>Riz</i>	-	<i>appelé le coffre</i>	ib.		
<i>Pingouin de trois couleurs</i>	ib. 44	<i>Rossignol de muraille de l'Amérique</i>	S	<i>Tourterelle de la Caroline</i>	I. 24		
<i>— violet</i>	ib. 41	<i>S'abot jaune</i>	-	<i>petit tacheté</i>	I. 26		
<i>— de Bahama</i>	ib. 42	<i>— de Pensilvanie</i>	-	<i>Tulip, arbre</i>	I. 48		
<i>Piverd grand à tête rouge</i>	ib. 17	<i>Sarcelle d'Amérique</i>	-	<i>Tupelo arbre nommé</i>	ib. 41		
<i>— grand aux ailes d'or</i>	ib. 18	<i>— brune de l'Amérique</i>	-	<i>qui croît dans l'eau</i>	ib. 60		
<i>— à ventre rouge</i>	ib. 19	<i>Sauteur</i>	-	<i>Troene aux bayes violettes</i>	ib. 61		
<i>— velu</i>	ib. 19	<i>Sauterelle</i>	-	<i>Tyrann</i>	ib. 55		
<i>— à tête rouge</i>	ib. 20	<i>Smilax à feuille de Laurier</i>	V				
<i>— petit tacheté</i>	ib. 21	<i>Des Serpents</i>	-	<i>VIper à sonnette</i>	II. 41		
<i>— au ventre jaune</i>	ib. 21	<i>Serpent à sonnette</i>	-	<i>— noire</i>	ib. 44		
<i>— petit à la tête noire</i>	ib. 22			<i>— brune</i>	ib. 45		
				<i>— d'eau</i>	ib. 43		

## INDEX Rerum.

N.B. Numeri Romani designant paginas in Relatione CAROLINÆ & Insularum BAHAMENSIVM.  
Figuræ Arithmeticæ cum numero I. vel II. præposito denotant Paginas vel Tabulas in primo vel secundo Volumine.

<i>A</i>		<i>Anguis ventre Cuprei Coloris</i>	ib. 46	<i>Arbor in aqua nascens ; foliis latis acuminatis &amp; non dentatis fructu Eleagni minore</i>	I. 41
<i>Cacia foliis amplioribus siliquis cincin-</i>	II. 97	<i>gracilis Cceruleo-Viridis</i>	ib. 47	<i>&amp; in aqua nascens, foliis latis acuminatis &amp; dentatis, fructu Eleagni majore</i>	I. 60
<i>natis</i>		<i>niger</i>	ib. 48	<i>Guajaci latiore folio, Bignonie flore ceruleo, fructu duro in duas partes difilente, similibus aлатis imbricatim positis</i>	I. 42
<i>Buxi foliis rotundioribus, floribus albis, siliqua lata compressa</i>	II. 42	<i>minor fuscus maculatus</i>	ib. 49	<i>foliis pinnatis, spica pendula sericea</i>	II. 44
<i>— Abruae foliis, triacanthos, capsula ovali</i>		<i>gracilis fuscus</i>	ib. 50	<i>Tulipifera Virginiana tripartito aceris</i>	I. 48
<i>unicum semen claudente</i>	I. 43	<i>gracilis maculatus</i>	ib. 51	<i>folio, media lacinia velut abscissa</i>	I. 48
<i>Acaraua major, pinnis cornutis?</i>	II. 31	<i>annulatus</i>	ib. 52	<i>baccifera laurifolia aromatica, fructu viridi calyculato racemoso</i>	II. 50
<i>Acer Virginianum, folio majore, subtus argenteo, suprà viridi splendente</i>	ib. 62	<i>Viridis maculatus</i>	ib. 53	<i>Lauri folio, floribus ex foliorum aliis pentapetalis, pluribus staminibus donatis</i>	I. 54
<i>Accipiter cauda furcata</i>	ib. 4	<i>Flagelli formis</i>	ib. 54	<i>Jasmini floribus albis, foliis Cenchran-</i>	
<i>— palumbarius</i>	ib. 3	<i>e rubro &amp; albo varius</i>	ib. 55	<i>mideæ, fructu ovali, semenibus parvis nigris mucilagine involutis</i>	ib. 55
<i>— minor</i>	I. 5	<i>Capite Viperino</i>	ib. 56	<i>maritima, foliis conjugatis piriformibus apice in summitate instructis, floribus racemosis luteis</i>	I. 72
<i>— pectorarius</i>	ib. 2	<i>Viridis</i>	ib. 57	<i>Zeylanica, Cotini foliis, subtus lanuginine villosis, floribus albis, cuculi modo laciniatis</i>	
<i>Acus maxima, squammosa, viridis</i>	II. 30	<i>niger, maculis rubris &amp; luteis eliganter</i>	ib. 60	<i>ib. 68</i>	
<i>Agrifolium Carolin. fol. dentat. bacc. rubris</i>	I. 31	<i>varius</i>	ib. 58	<i>Ardea Cærulea</i>	ib. 76
<i>Alauda magna</i>	ib. 33	<i>e ceruleo &amp; albo varius</i>	ib. 67	<i>alba minor Carolinensis</i>	ib. 77
<i>Gutture flavo</i>	ib. 32	<i>Anona maxima, foliis latis fructu maximo luteo</i>	ib. 64	<i>stellaris Americana</i>	ib. 78
<i>Alburnus Americanus</i>	II. 12	<i>conoide, cortice glabro</i>	ib. 64	<i>stellaris cristata Americana</i>	ib. 79
<i>Albulia Bahamensis</i>	ib. 6	<i>fructu viridi lœvi, Pyri inversi forma</i>	ib. 64	<i>stellaris minima</i>	ib. 80
<i>Alcea Floridana quinque-capsularis, Laurinis foliis, leviter crenatis feminibus coniferarum instar alatis</i>	I. 44	<i>lutescente lœvi scrotum arietis referente</i>	ib. 67	<i>Aristolochia pistolochia seu serpentaria Virginiana caule nodofo</i>	ib. 29
<i>Alga marina graminea angustissimo folio</i>	II. 38	<i>maxima, foliis oblongis, angustis, fructu maximo luteo conoide cortice glabro in areolas angustiore distincto</i>	ib. 86	<i>Arum Americanum Betæ folio</i>	ib. 71
<i>Alni folia Americana ferrata, floribus pentape-talis albis, in spicam dispositis</i>	ib. 66	<i>foliis Laurinis in summitate incisis fructu compresso scabro fusco, medio acumine longo</i>	ib. 86	<i>Arum aquaticum minus ; f. Arisarum</i>	ib. 82
<i>Amelanchier Virg. Lauro cerasi folio</i>	I. 68	<i>pleno</i>	II. 87	<i>pene nudo Virginianum</i>	Arum
<i>Anapodophyllum Canadense Morini</i>	ib. 24	<i>Anthea quartus Rondeletii</i>	II. 25		
<i>Anter Canadenis</i>	I. 92	<i>Apocynum scandens folio, cordato flore albo</i>	I. 58		
<i>Anseri Baffano congener avis fluviatilis</i>	ib. 86	<i>falcis folio, flore amplio</i>	II. 53		
<i>— affinis fusca avis</i>	ib. 87	<i>Aquila Capite albo</i>	I. 1		
<i>Anas Americanus lato rostro</i>	ib. 96	<i>Arbor, populi nigrae foliis ; fructu reni-formi monoperno,</i>	II. 24		
<i>— minor ex albo &amp; fusco vario</i>	ib. 98	<i>Arbor, populi nigrae foliis</i>			
<i>— Americanus cristatus elegans</i>	ib. 97	<i>Arbor, populi nigrae foliis</i>			
<i>— Bahamensis rostro plumbeo, macula auranti coloris</i>	ib. 93	<i>Arbor, populi nigrae foliis</i>			
<i>— cristatus</i>	ib. 94	<i>Arboroli pinnatis, nullo impari alam claudenti,</i>			

# INDEX Rerum.

- A**rum sagittariae folio angusto, acumine & auriculis acutissimis I. 83  
— maximum Ägyptiacum quod vulgo Colocafia II. 45  
Aurata Bahamensis — ib. 16
- B**Agre secundae speciei affinis II. 23  
Bignonia arbor Pentaphylla, flore roseo majore siliquis planis, — I. 37  
Bignonia Urucu foliis flore sordide albo, intus maculis purpureis & luteis asperfo siliqua longissima & angustissima ib. 49  
— Fraxini foliis, coccineo flore minore ib. 65  
— Americana, capreolis donata siliqua breviore. II. 80  
Buteo — I. 6
- C**Alceolus Marianus glaber, petalis angustis II. 73  
Cancelius maximus Bahamensis ib. 34  
— terrestris Bahamensis ib. 33  
Cancer terrestris, cuniculos sub terra agens ib. 32  
— Arenarius — ib. 35  
— chelis crassissimus — ib. 36  
— marinus chelis rubris — ib. 37  
Candela Americana, foliis Laurinis, flore tetrapetalo luteo, fructu angustiore ib. 63  
Caprimulgus — I. 8  
Carduelis Americanus — ib. 43  
Caryophyllum spurius inodorus, folio subrotundo scabro, flore racemofo hexapetaloidé coccineo speciosissimo II. 91  
Caftanea pumila Virginiana, fructu racemofo parvo in singulis capsulis echinatis unico I. 9  
Cassena vera Floridanorum, Arbuscula, baccifera Alaterni facie, foliis alternatim sitis tetrapterone — II. 57  
Catephia — ib. 100  
Cœcilia maculata — ib. 59  
Cenchrämidea Arbor axis adnascens, obrotundo pingui folio, fructu pomiformi, in plurimas capitulas granula ficalnea filo columnari hexoctogono præduro adherentia continentes, diviso, Balfamum fundens ib. 99  
Cerasi similis arbuscula Mariana, Poedi folio, flore albo parvo racemofo I. 28  
Cerasus latiore folio fructu racemofo purpureo majore II. 94  
Chamoedaphne foliis Tini, floribus bullatis Umbellatis ib. 98  
Chrysanthemum Bermudense Leucoii foliis virentibus crassis I. 93  
— Americanum Doronici folio, flore Persici coloris, umbone magno prominente ex atro purpureo, viridi, & auro fulgente II. 59  
Cifis Virgin. flore & odore Periclymeni I. 57  
Coccothraustes rubra — ib. 38  
— cerulea — ib. 39  
— purpurea — ib. 40  
Columba capite albo — I. 25  
Convolvulus Carolinensis, angusto sagittato folio flore amplissimo purpureo, radice crassa ib. 35  
— foliis variis, inferioribus trifariam divisis, superioribus sagittatis, floribus ex rubro purpureis — II. 87  
— radice tuberosa esculenta II. 60  
— minor pentaphyllos & heptaphyllos flore purpureo minore II. 91  
Corallina fruticosa elatior ramis quaquaversum expansis teretibus II. 13  
Corallodendron humile, spica florum longissima coccinea, radice crassissima I. 49  
Cornus mas odorata, folio trifido margine piano I. 55  
— mas Virginiana flosculis in Corymbo digestis perianthio tetrapetalo albo I. 27  
— foliis Laurinis, fructu majore luteo II. 75  
— foliis Salicis Laureæ acuminatis; floribus albis; fructu Sassafras — II. 28  
Cuculus Carolinensis — I. 9  
Cugupuguacu Brasil — II. 14  
Cuniculus Bahamensis — II. 79  
Cupressus Americana — I. 11
- E**Ruca maxima cornuta II. 94  
Oenanthe Americana pectore luteo I. 50
- F**LOS Passionis minimus, trilobatus flore sub-ceruleo II. 51  
Fraxinus Carolinensis, foliis angustioribus utrinque acuminatis, pendulis I. 80  
Fringilla Bahamensis — I. 42  
— purpurea — I. 41  
— tricolor — I. 44  
Frutex Lauri folio pendulo, fructu tricocco feme nigro splendente I. 10  
— cotini ferè folio crasso, in summittate deliquium paciente, fructu ovali ceruleo officulum angulosum continente I. 25  
— aquaticus, floribus luteis, fructu rotundo quinque Capsulari — II. 30  
— trifolius resinofus; floribus tetrapetalis albis racemosis II. 33  
— foliis oblongis ferratis alternis, Acaciae floribus luteis, fructu brevi, caliculato viridi II. 42  
— foliis ferratis, floribus longioribus spicatis subviridibus, capsula pentagona II. 43  
— corni foliis conjugatis, floribus instar Anemones stellatae petalis crassis rigidis, colore sordidè rubente; cortice aromatico I. 46  
— baccifer, verticillatus; foliis scabris latissimis & conjugatis; baccis purpuris dense dentatis, & conjugatis; baccis purpuris dense congestis II. 47  
— Rubo similis, non spinosus capriolatus; fructu racemofo cœruleo moriformi II. 48  
Lauri longiore folio II. 52  
— Padi foliis non ferratis, floribus monopetalis albis, campani-formibus, fructu crasso tetragonon I. 64  
— foliis oblongis acuminatis, floribus spicatis uno versu dispositis I. 71  
— Virginianus trifolius ulmi famaris II. 83  
— Bahamensis foliis oblongis succulentis, fructu subrotundo unicum nucleus continentem I. 85  
— Buxi foliis oblongis, baccis pallide virentibus apice donatis I. 98  
— spinosus Buxi foliis plurimis simul nascientibus, flore tetrapetaloidē pendulo, sordide flavo, tubo longissimo fructu ovali croceo, semina parva continentem II. 100
- G**Allinula Americana — I. 70  
Garrulus Carolinensis — I. 46
- Gelseminum five Jasminum luteum odoratum Virginianum scandens, semper virens I. 53  
Gentiana forte? quæ Periclymeni Virginiani flore coccineo, planta Marilandica spicata erecta, foliis conjugatis II. 78  
— Virginiana, Saponariae folio, flore cœruleo longiro — I. 70  
Gramen Myloïcophoron oxyphyllon Carolinianum, &c. I. 32
- Granadilla foliis farfariellæ trinerviis flore purpureo fructu olivæ-formi ceruleo II. 93
- Grillotalpa — I. 8
- Grus Americana alba — I. 75
- Guaicum Arbor — I. 42
- Guajacana — II. 76
- Guaperva maxima caudata — II. 22
- H**Arangus minor Bahamensis II. 24  
Haematopus — I. 85
- Helleborine Liliæ folio caulem ambiente, flore unico hexapetalo, tribus petalis longis angustis obscure purpureis, cœteris brevioribus roseis I. 58
- Helleborine — II. 72
- Hirundo marina minor capite albo I. 38
- purpurea — I. 51
- Piscis — II. 8
- Hortulanus Carolinensis — I. 14
- I**Cterus ex aureo nigroque varius I. 48  
— minor — I. 49
- Ispida — I. 69
- K**Eratophyton dichotomum fuscum I. 73  
— fruticis specie, nigrum I. 74
- Ketmia frutescens glauca, Aceris majoris folio longiore, ferrato, flore carneo I. 77  
— amplissimo Tiliae folio subtus argenteo flore magno luteo II. 90
- L**Acertus omnium maximus, Crocodilus dictus II. 63  
— Indicus, Senembii & Iguana dictus II. 64  
— viridis Carolinensis — ib. 65  
— Jamaicensis — ib. 66  
— cauda cerulea — ib. 67  
— griseus — ib. 68  
Larus major — I. 89  
— rostro inquali — I. 90  
Laurus Carolinensis, foliis acuminatis, baccis cœruleis, pediculis longis rubris, insidentibus I. 63
- Lignum Campechanianum — II. 66
- Ligustrum Lauri folio, fructu violaceo I. 61
- Lilium, five Martagon Canadense, flore luteo punctato — II. 56  
— Carolinianum, flore croceo punctato, petalis longioribus & angustioribus II. 58
- Linaria cerulea — I. 45
- Liquid-Ambri Arbor, seu Styraciflua, Aceris folio, fructu Tribuloide, i.e. Pericarpio orbiculari ex quamplurimis apicibus coagmentato, semen recondente II. 65
- Lithophyton longe racemosum cortice flavo perforato — ib. 21  
— compressum obscure lutescens marginibus purpureis asperis — ib. 34  
— pinnatum purpureum asperum ib. 35
- Lobelia frutescens, Portulacæ folio I. 79
- Locusta Caroliniana elytris fuscis, alis interioribus nigris, ad extremitates luteis II. 89
- Lychnis viscosa, Virgininia, flore amplio coccineo; seu Muscipula Regia ib. 54
- Lyium — ib. 100
- M**Agnolia Lauri folio, subtus albicante I. 39  
— altissima, flore ingenti candido II. 61  
— amplissimo flore albo, fructu cœcreo — ib. 80
- Mamankanois — ib. 97
- Mancanella Pyri facie — ib. 95
- Manghala Arbor Curaçavica foliis Salignis ib. 33
- Mellivora Avis Carolinensis I. 65
- Monedula purpurea — ib. 12
- Morinellus marinus — ib. 72
- Mormyrus ex cinereo nigricans II. 13
- Murcena — ib. 20  
— maculata nigra — ib. 21
- Muscicapa Crisata ventre luteo — I. 52  
— nigrescens — ib. 53  
— fulva — ib. 54
- Oculis rubris — ib. 54
- Corona rubra — ib. 55
- rubra — ib. 56
- vertice nigro — ib. 66
- Myrtus Brabantica similis Carolinensis humilior, foliis latioribus & magis ferratis ib. 13  
— Brabantica similis, Carolinensis, baccata, fructu racemofo sessili, monopyreno ib. 69
- N**Octua Aurita minor — I. 7  
Novacula — II. 18
- Numenius albus — I. 82
- fuscus — ib. 83
- ruber — ib. 84
- Nux Juglans Virginianis — I. 38  
— Carolinensis fructu minimo putamine levii — ib. 38
- nigra Virginianensis — ib. 67
- O**Rbis Iœvis variegatus II. 28  
Ornithogalum luteum parvum foliis gramineis glabris I. 33
- Orobanche Virginiana flore pentapetalo cernuo I. 36
- P**Agurus maculatus — II. 36  
Palumbus migratorius — I. 23
- Papilio caudatus luteus, maximus, Carolinianus Umbris striisque nigris — II. 83
- Papilio

# I N D E X Rerum.

Papilio caeruleus, Carolinianus ; fuscus, striis	Prunus maritima racemosa folio rotundo glabro,	Solea Lunata & Punctata	II. 27
paleacenitibus, linea & maculis sanguineis	fructu minore purpureo	Sturnus niger alis superne rubentibus	I. 13
fultus ornatus	II. 100	Suillus Piscis	II. 15
diuina, cinnamum maxima	I. 97	Syringa Baccifera	I. 20
Parus Americanus luteo	I. 61	T	
gutturo luteo	I. 62	Apia trifolia fructu majore oblongo	II. 32
Bahamensis	I. 59	Terebinthus major Betulae cortice, fructu	
Carolinensis luteus	I. 63	triangulari	I. 30
Cirratus	I. 57	Tetradymia arcuata	II. 40
cuculus nigro	I. 60	Caretta	II. 39
Fringillaris	I. 64	Marina Caouanna	II. 40
Uropygo luteo	I. 58	Marina Viridis	II. 38
Passer fuscus	I. 34	Thymelaea ? foliis obtusis	I. 86
nivalis	I. 36	Titanokeratophyton ramosissimum, crusta ele-	
niger, Oculis rubris	I. 34	ganti tuberculata	II. 37
Passerculus	I. 35	Toxicodendron foliis alatis fructu purpureo Pyri-	
Bicolor Bahamensis	I. 37	formi sparsa	I. 40
Pelicanus Americanus	I. 81	Turdus Avis minor cinereo-albus non macu-	
Perca fluviatilis gibbosa ventre luteo	II. 8	latus	I. 27
marina gibbosa cinerea	II. 2	minimus	I. 31
pinna dorsi divisa	II. 3	Pilaris migratorius	I. 29
rubra	II. 3	Rufus	I. 28
pinnis branchialibus carens	II. 4	viscivorus plumbeus	I. 30
rhomboidalis fasciata	ib.	Turdus Piscis cauda convexa	II. 10
venenosa punctata	II. 5	cinereus peltatus	II. 11
capite striato	II. 6	Flavus	ib.
puncticulata	II. 7	Oculo radiato	II. 12
cauda nigra	ib.	Oc. rad. Guaperva	II. 22
feetatrix	II. 8	Pinnis branchialibus carens	II. 9
Petimbuabo Brasil	II. 17	Rhomboidalis	II. 10
Phalena ingens, Caroliniana, Oculata & luteo		Turtur Carolinenis	I. 24
fusca, lineis dilute purpureis insignita	II. 91	minimus guttatus	I. 26
maxima ex rufa & albo varia Ameri-		V	
cana	II. 86	Viscum Caryophylloides ramosum, floribus	
plumata, caudata Caroliniana virefascens,		minimis albis	II. 55
oculata	II. 84	Caryophylloides, foliis longis in apice	
Caroliniana, minor, fulva, maculis		incisis, floris labello albo trifido, petalis luteis	
nigris, alba linea pulchre asperfis	II. 96	longis angustissimis	II. 68
Phaeolus ? minor lactescens flore purpureo	II. 28	floribus parvis luteis	
Phoenicopterus Bahamensis	I. 73	punctatis	II. 74
Philadelphus flore albo majore inodoro	II. 84	Aloes foliis viridibus	
Phylanthes Americana planta flores ad foliorum		acuminatis, floribus racemosis luteis	II. 77
crenas proferens	II. 26	Lilii albi foliis floris la-	
Pica Glandaria coerulea cristata	I. 15	bello brevi purpureo, ceteris ex luteo vire-	
Picus capite toto rubro	I. 20	centibus	II. 88
major alis aureis	I. 18	angusti folium, floribus	
maximum rostro albo	I. 16	longis tubulosis coeruleis ex spicis squamosis	
medius quasi villosus	I. 19	rubris erumpentibus	II. 89
niger maximus capite rubro	I. 17	foliis longioribus, baccis rubris	II. 81
varius minimus	I. 21	radice bulbosa, floris labello carneo flore	
varius minor, ventre luteo	ib.	ceterum fordide luteo	II. 88
ventre rubro	I. 19	Vipera aquatica	II. 43
Pittoniae similis, Laureola foliis floribus albis,		caudifona Americana	II. 41
baccis rubris	II. 79	caudifona Americana minor	II. 42
Platanus Occidentalis	I. 56	fusca	II. 45
Plumeria flore niveo foliis brevioribus	II. 93	nigra	II. 44
roseo oderatissimo	II. 92	Umbila minor, marina maxillis longioribus	II. 1
Pluvialis vociferus	I. 71	Unicornis	II. 19
Podicipes minor, rostro vario	I. 91	Vulpis cinereus Americanus	II. 78
Populus nigra folio maximo gemmis Balsamum		Piscis Bahamensis	II. 1
odoratissimum fundentibus	I. 34	Z	
Prunus Buxi folio cordato, fructu nigro rotundo	I. 75	Anthoxylum spinosum, Lentisci longio-	
		ribus foliis, Euonimi fructu capsulari, ex	
		insula Jamaicensi	I. 26



## INDEX.

A.	
A Cacia, with Blush-flowers	
Ant, velvet	20
Attamusco, Lily	15
B.	
Beetle, with a yellow Shield	10
Beetle, Tumble-turd	11
Black-bird, Razor-bill	3
Buffelo	20
C.	
Cacao-tree	6
Chego	10
Cock-roach	10
Cushew-tree	9
E.	
Eft, spotted	10
F.	
Fig, with Citron leaves	18
Fifh in Armour	19
Fly Ichneumon	4
G.	
Ginseng	16
Goat-sucker	16
H.	
Hare of Java	18
Heron, largest crested	10
L.	
Lily, Attamusco	12
Lily, finall red	8
M.	
Martagon	11
P.	
Partridge of America	12
Pittrel	14
Pye, yellow and black	5
S.	
Storm-fink	14
Swallow of America	8
T.	
Tropick-bird	14
Tumble-turds	11
V.	
Vanello Plant	7
Viper-mouth	19
Velvet Ant	15
W.	
Whippoor Will	16
Wren Golden-crown	14
Waſp Ichneumon, blue	5
Waſp Ichneumon	13

## INDEX RERUM.

A.	
A Cacia, with Blush-flowers	20
Ant, velvet	15
Attamusco, Lily	12
B.	
Beetle, with a yellow Shield	10
Beetle, Tumble-turd	11
Black-bird, Razor-bill	3
Buffelo	20
C.	
Cacao Arbor	6
Calceolus, flore maximo rubente, purpureis venis notato, foliis amplis hirsutis crenatis, radice dentis Canini	3
Caprimulgus minor Americanus	16
Cataphætus Americanus	19
Chamærhododendros lauri-folio semper virens, floribus bullatis Corymbosif	17
Chamaedaphne semper virens, foliis oblongis angustis, florium fasciculis oppositis è foliorum alis	17
F.	
Ficus citrii folio	18
Formica villosa coccinea	15
H.	
Hamamelis	2
Hirundo Cauda aculeata Americana	8
L.	
Lepus Javensis	18
Lilio Narcissus polianthos, flore albo	5
Lilium angustifolium, flore rubro singulari	8
Lilium five Martagon Canadense floribus magis flavis non reflexis	11
Lilio Narcissus Virginicensis	12
M.	
Magnolia flore albo, folio majore acuminato haud albicante.	15
Meadia	1
Monedula tota Nigra, &c. Hist. Jam. 298. Vol. 2.	3
Martagon	8
P.	
Perdix Sylvestris Virginiana	12
Pica luteo nigra varia	5
Pittrel	14
Pomifera, seu potius prunifera Indica, nuce reniformi summo pomo innacente, Cajous, vel Acajous dicta, Raii Hist. Cat. Jam.	9
Pulex minimus, cutem penetrans, Americanus	10
R.	
Rhus grabrum Panicula speciosa coccinea	4
Regulus Cristatus	13
S.	
Scarobæus Peltatus	10
Scarobæus Pilularis Americanus	11
Scarobæus Capricornus minimus cutem penetrans	10
Scolopendra	2
Stellio aquaticus minor Americanus	10
Steuartia	13
U.	
Urogallus minor fuscus cervice, plumis alas imitantibus donata	1
Vefpa Ichneumon tripilis	4
Vefpa Ichneumon cerulea	5
Vipera Marina	13
Volubilis filiquosa Mexicana Plantagini	19
folio	7

## La TABLE.

I.	Planche. <i>Le Cocq de Bois d'Amérique.</i> <i>La Plante Meadia.</i>
II.	Planche. <i>Le Centipé. L'Hamamelis.</i>
III.	Planche. <i>Le Merle de la Jamaïque. Le Sabot des Indes.</i>
IV.	Planche. <i>La Guêpe Ichneumon de Pensylvanie. Le Sumac.</i>
V.	Planche. <i>La Pie jaune &amp; noire. Le Lys Narcisse. La Guêpe azurée.</i>
VI.	Planche. <i>Le Cacao.</i>
VII.	Planche. <i>La Vanille.</i>
VIII.	Planche. <i>L'Hirondelle d'Amérique.</i> <i>Le Lys-rouge de Pensylvanie.</i>
IX.	Planche. <i>Le Cajou ou Acajou.</i>
X.	Planche. <i>Le Grand Héron huppé. Le Petit-Lézard étoilé. Le Chégo.</i>
XI.	Planche. <i>Le Fouille-merde. Le Lys de Canada, ou Martagon.</i>
XII.	Planche. <i>La Perdrix Américaine L. Lys d'Attamusco.</i>
XIII.	Planche. <i>Steuartia. Le Roitelet huppé. La Guêpe Ichneumon.</i>
XIV.	Planche. <i>L'Oiseau des Tropiques. Le Pinson de Mer, ou de Tempête.</i>
XV.	Planche. <i>La Magnolie à grandes feuilles. La Fourmi Veloutée.</i>
XVI.	Planche. <i>Le Tette-chèvre. Le Gingembre des Chinois.</i>
XVII.	Planche. <i>Le Chamaerbodendros. Le Chamaedaphné.</i>
XVIII.	Planche. <i>Le Lièvre de Java. Le Figuier des Indes.</i>
XIX.	Planche. <i>La Vipère de Mer. Le Poisson cuirassé.</i>
XX.	Planche. <i>Le Bison Americain. L'Acaia à fleurs-de-Rose.</i>













SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01671 1715

