

2949

П. Бахметьевъ.

203 436

114

Б.Л

БАБОЧКИ БОЛГАРИИ.

P. Bachmetjew.

DIE

SCHMETTERLINGE BULGARIENS.

БОЛГАРИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГЪ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

(Вас. Остр., 9 лин., № 12).


1902.

560 db

РМС 71.4

Л. К. К. К.

2949



330

БАБОЧКИ БОЛГАРИИ.

П. Бахметьева.

DIE SCHMETTERLINGE BULGARIENS.

Von

P. Bachmetjew.

1. Введение.

Энтомологическая фауна Болгарии изучалась до послѣдняго времени чисто случайно заѣзжими изслѣдователями, которые собирали энтомологический материалъ только болѣе или менѣе короткое время и, слѣдовательно, не могли составить себѣ полнаго представлениія о нахожденіи различныхъ видовъ насѣкомыхъ въ Болгаріи.

Изученіе же фауны Болгаріи представляетъ значительный интересъ уже по одному тому, что страна эта лежитъ на пути, по которому двигались насѣкомые изъ Малой Азіи въ Западную Европу; кромѣ этого, какъ показываютъ геологическія изслѣдованія Георгія Златарскаго [5], проф. Софійскаго Университета, въ Болгаріи не было ледяного периода, а если онъ и былъ, то пространственно былъ ограниченъ, и небольшіе глетчеры находились тогда только на Рыльскомъ хребтѣ, отдѣляющемъ Турцию отъ Болгаріи на югѣ [8 и 9]. Правда, въ послѣднее время

Стефанъ Бончевъ [4] старается доказать, что и въ Софії, Габрово и Хасково вѣроятно были глетчери; но критика, которой была подвергнута его статья въ Болгарскомъ Природоиспытательномъ Обществѣ, заставляетъ ожидать дальнѣйшихъ изслѣдованій въ этомъ направленіи.

Такимъ образомъ, когда болѣшая часть Европы была подъ льдомъ и водой, въ Болгаріи господствовалъ субтропической климатъ, какъ это показываютъ новѣйшія изслѣдованія Георгія Бончева [2 и 3], профессора въ Софійскомъ Университетѣ, которому удалось при раскопкахъ около Варны найти рядомъ съ костями *Elephas*, *Dinotherium*, *Dremotherium*, *Phoca*, *Rhinoceros*, *Hipparium*, *Cervida*, *Cetotherium*, *Mastodon* еще и кости *Nyaaena* и *Antilopa*.

Благодаря этому обстоятельству, Западная Европа послѣ ледяного періода пріобрѣла свою фауну первоначально, между прочимъ, и изъ Сербіи и Болгаріи.

Не маловажную роль играла Болгарія вмѣстѣ съ Европейской Турціей при передвиженіи насѣкомыхъ и въ ту эпоху, когда Черное море было озеромъ и Дарданельскаго пролива еще не было [1]. Здѣсь тогдашній перешеекъ былъ мѣстомъ для перехода насѣкомыхъ изъ Малой Азіи въ Европу.

Кромѣ географического положенія Болгаріи въ дѣлѣ распространенія азіатскихъ насѣкомыхъ въ Европѣ, Болгарія обладаетъ специальными климатическими условіями, зависящими съ одной стороны отъ гористыхъ мѣстностей, по своему характеру похожихъ на альпійскія, а съ другой — отъ близости моря (Чернаго). Немудрено поэтому, что въ Болгаріи на небольшомъ сравнительно пространствѣ встречаются мѣста съ климатомъ континентальнымъ (напр. Плѣвенъ), съ климатомъ приморскихъ странъ (напр. Варна) и чисто-альпійскимъ (напр. Рыло) [6].

Несомнѣнно поэтому, что различные климатические условія на такомъ сравнительно небольшомъ пространствѣ (99276 кв. килом.) [7] должны были, вслѣдствіе своего вліянія, вызвать къ жизни большое разнообразіе формъ насѣкомыхъ и затѣмъ пере-

давать ихъ въ пограничныя страны по мѣрѣ возникновенія тамъ соотвѣтствующихъ тѣхъ или другихъ условій для полученія скажанаго наслѣдства. Когда же тамъ не были созданы подходящія условія для дальнѣйшей жизни извѣстныхъ насѣкомыхъ, или же если таковыя и были, естественные причины не допускали переселенія насѣкомыхъ, то эти формы оставались существовать только въ Болгаріи и въ тѣхъ странахъ, откуда онѣ пришли. Примѣромъ можетъ служить *Lysaena balcanica* Fr., встрѣчающающаися въ Балканахъ, въ Греціи, Далмациі, Турціи и Персіи, откуда она, по всѣмъ вѣроятіямъ, и зашла. Примѣромъ специально болгарскихъ формъ можетъ служить *Lysaena zephyrus* Friv. и *Cossus balcanicus* Led., встрѣчающаися только на южномъ склонѣ Балканъ и нигдѣ въ другомъ мѣстѣ земного шара.

Настоящая статья не имѣетъ претензіи представить полную картину распределенія бабочекъ въ Болгарскомъ Княжествѣ уже по одному тому, что это въ настоящее время, за неимѣніемъ материала, представляется невозможнымъ; но она содѣржитъ въ себѣ перечисленіе видовъ, найденныхъ до сихъ поръ въ различныхъ мѣстахъ Болгаріи, какъ то: въ Софіи, Рущукѣ, Сливенѣ, Разградѣ, на Рыльскихъ горахъ и проч.

При составленіи этого списка я пользовался материаломъ, опубликованнымъ молодыми болгарскими энтомологами въ различныхъ болгарскихъ журналахъ и отчетахъ гимназій и земледѣльческихъ училищъ, изъ которыхъ нѣкоторые сдѣлались библіографической рѣдкостью, а также и офиціальными рапортами лѣсничихъ министерству земледѣлія и торговли.

Самыми важными вкладами можно считать статьи Хр. Пигулева, В. Ковачева, Д. Иоакимова и А. Марковича. Кромѣ того Хр. Пигулевъ и А. Дрѣновскій любезно предоставили въ мое распоряженіе свои еще ненапечатанныя рукописи. Мой собственный материалъ, который я собираль въ Болгаріи въ теченіе послѣднихъ восьми лѣтъ, послужилъ только основой этой статьѣ. Изъ заграничныхъ изслѣдователей, у которыхъ находятся нужные указанія о болгарской фаунѣ, принятые нами во

вниманіе, упомяну Е. Frivaldszky, J. Mann, M. Nicholl и друг.

Трудность получать здѣсь въ Болгаріи иностранную литературу, особенно средины прошлого столѣтія, не позволила мнѣ воспользоваться указаніями нѣкоторыхъ авторовъ, какъ напр. Ed. Ménétriés, J. Lederer и Elwes, хотя большого ущерба, по моему мнѣнію, отъ этого не произошло, такъ какъ, во первыхъ, очень мало видовъ, приведенныхъ у Hofmann'a [10] для Болгаріи, осталось у меня подъ сомнѣніемъ, а, во-вторыхъ, Elwes собираль вмѣстѣ съ Nicholl и одновременно; послѣднюю же статью я имѣю.

Такъ какъ климатическая условія и flora несомнѣнно вліяютъ на распространеніе насѣкомыхъ, то я позволилъ себѣ предпослать перечню бабочекъ краткое описание характера этихъ факторовъ въ Болгаріи. Болѣе подробныя свѣдѣнія интересующіеся могутъ найти въ статьяхъ, приведенныхъ въ указателяхъ литературы послѣ всячаго отданія.

Въ спискѣ бабочекъ Болгаріи (прежняя Болгарія вмѣстѣ съ неотдѣлимой теперь отъ нея Восточной Румеліей) цифры, поставленныя въ [], относятся къ авторамъ въ спискѣ литературы по энтомології. Тамъ, гдѣ во фразѣ, оканчивающейся точкой съ запятой (;), не стоитъ цифры, данныя приведены мной лично.

Въ заключеніе скажу, что болѣшая часть собранныхъ болгарскими энтомологами бабочекъ была предоставлена мнѣ для определенія; исключеніе составляетъ только г. Хр. Пигулевъ (въ Сливенѣ, а теперь въ Разградѣ), бабочекъ котораго я не видѣлъ.

Виды, которыхъ я не могъ самъ опредѣлить, были любезно опредѣлены д-ромъ Rebel'емъ въ Вѣнѣ (Naturhistorisches Hofmuseum).

Льщу себя надеждой, что настоящая статья принесетъ известную долю пользы и русскимъ энтомологамъ, особенно въ вопросахъ географического распространенія насѣкомыхъ, каковую пріятную миссію на меня и возложилъ редакторъ настоящаго журнала, А. П. Семеновъ.

Литературныя указания къ „Введенію“.

1. **Андрусовъ, Н. И.** Нѣкоторые результаты экспедиціи «Черноморца». Къ вопросу о происхожденіи сѣроводорода въ водахъ Чернаго моря.— Изв. Импер. Русск. Геогр. Общ. XXVIII, стр. 370 — 397. 1892.

2. **Бончевъ, Г.** Разкопки около Месемврия (Реф. на 20/XI 1897 г.).— Годишникъ на Българското Природоизп. Дружество. II. № 3, р. 49 — 50. 1898.

3. **Бончевъ, Г.** Разкопки около Месемврия.— Годишникъ на Българското Природоизп. Дружество. III. № 4, р. 113 — 115. София 1900.

4. **Бончевъ, С.** Приносъ къмъ въпроса — имало ли е на Балканския полуостровъ ледници.— Годишникъ на Българското Природоиспитателно Дружество. II. № 3, р. 42 — 49. 1898.

5. **Златарски, Георги Н.** Черти изъ палеонтологията на България. Академическа рѣчъ, читана прѣдъ събранието отъ прѣподаватели и студенти на Висшето Училище на 8 Ноември 1897 год. отъ избрания за 1897/98 учебна година ректоръ на Висшето Училище.— Училищенъ Прѣгледъ. София 1898.

6. **Марковски, Г.** Мѣнението на температурата въ София, Плѣвенъ, Варна, Бургасъ и Габрово.— Рефератъ 25/II. 1899. Годишникъ на Българското Природоизп. Дружество. III. № 4, р. 82. София 1900.

7. **Славовъ, Ив.** Пространство на княжеството България.— Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. Издава Министерството на народното просвѣщение. I, р. 312 — 315. София 1889.

8. **Цвијић, Ј.** Трагови старих глечара на Рили.— Глас Српске Краљевске Академије. XIX. Први разред 19, р. 1 — 105. 1897.

9. **Cvijic, I.** Das Rilo-Gebirge und seine ehemalige Vergletscherung.—Zeitschr. der Gesellsch. d. Erdk. XXXIII. Berlin 1898.

10. **Hofmann, Ernst.** Die Gross-Schmetterlinge Europas. Zweite Auflage. XXXXI + 240 pag. Stuttgart 1894.

2. Исторический обзоръ.

Первый, давшій вѣрное понятіе объ энтомологической фаунѣ Болгаріи, былъ Эмерихъ фонъ Фривальдскій, родившійся въ 1800 году въ Венгріи. Въ 1833 году онъ послалъ въ Болгарію экспедицію подъ начальствомъ Andreas Füle, которая и обосновалась на южной сторонѣ Балканъ, въ Сливенѣ. Она доставила Фривальдскому около 3000 видовъ насѣкомыхъ и другихъ животныхъ. Такъ какъ турки вскорѣ убили всѣхъ участниковъ экспедиціи, то Фривальдскій послалъ въ Болгарію другую экспедицію, во главѣ которой былъ поставленъ Karl Hinke; эта экспедиція въ 1834 году обслѣдовала южную часть Оракіи и достигла въ 1836 году Македоніи; отсюда въ Буда-Пештъ были высланы многочисленныя коллекціи. Hinke выбралъ мѣстожительствомъ Филишполь (въ южной Болгаріи), откуда и предпринималъ экскурсіи въ Карлово, Калоферъ, Казанлыкъ, Доспатъ, Родопы, на Рильскія горы и въ Самаковъ. Hinke однако-же скоро простудился и умеръ. Начальникомъ третьей экспедиціи, посланной Фривальдскимъ, былъ Stefan Nogel, который, впрочемъ, не былъ долго въ Болгаріи, а остановился въ Малой Азіи (въ Бруссѣ), а затѣмъ былъ на Кавказѣ и вскорѣ сдѣлался служителемъ султана. Четвертая экспедиція (Franz Zach) не дала никакихъ результатовъ.

Такъ окончились экспедиціи, послыаемыя Фривальдскимъ и продолжавшіяся съ небольшими перерывами отъ 1833 до 1845 года, послѣ чего онъ со своимъ братомъ Иваномъ отправился самъ изъ Буда-Пешта на кораблѣ въ Рущукъ (въ апрѣль 1846 года). Отсюда они отправились къ южной сторонѣ Балканъ

и черезъ Сливенъ и Варну — въ Константинополь. Въ послѣдній разъ Фривальдскій посѣтилъ Балканскій полуостровъ въ 1870 году и въ томъ-же году умеръ въ Венгріи.

Всѣ его изслѣдованія опубликованы на венгерскомъ языкѣ въ Анналахъ Венгерской Академіи Наукъ.

Въ 30-хъ годахъ прошлаго столѣтія вѣроятно отчасти въ предѣлахъ Восточной Румеліи собиралъ настѣкомыхъ Dr. Wiedemann; въ обработкѣ этого сбора E. Ménétriés приводится всего 3 вида чешуекрылыхъ.

Въ началѣ 60-годовъ въ тогдашней турецкой провинціи Добруджѣ жилъ въ городѣ Тулчѣ австрійскій полякъ von Malinovskу, который собиралъ нѣсколько лѣтъ бабочекъ и посыпалъ ихъ для опредѣленія въ Вѣнскій придворный Зоологическій Кабінетъ, гдѣ и сохранился ихъ списокъ.

Въ 1861 и 1862 годахъ собирали бабочекъ въ Варнѣ и Сливенѣ Johann и Ludmilla Haberhauer и посыпали ихъ известному австрійскому энтомологу J. Lederer'у, который и опубликовалъ собранный материалъ. Къ моему величайшему сожалѣнію, до настоящей минуты я не получилъ еще заказанного въ Вѣнѣ Wiener Entomol. Monatsschr. (1863), гдѣ эта статья опубликована.

Въ 1865 году посѣтилъ область Добруджу вѣнскій энтомологъ Josef Mann и выбралъ мѣстомъ жительства городъ Тулчу, лежащій на Георгіевскомъ рукавѣ Дуная. Здѣсь онъ пробывъ только три мѣсяца: май, іюнь и іюль и успѣль собрать около 450 видовъ *Macrolepidoptera* и около 460 видовъ *Microlepidoptera*, изъ которыхъ оказались вообще новыми видами: *Eupithecia multilineata* Mn., *Grapholitha gammata* Mn., *Myrmecozela danubella* Mn., *Cerostoma instabilella* Mn., *Gelechia rhodoptera* Mn., *Gelechia istrella* Mn. — Хотя Добруджа и не находится на Болгарской территории, но ея географическое положеніе заставляетъ насъ присоединить фауну этой области къ фаунѣ Болгаріи, такъ какъ съ одной стороны она граничитъ съ Болгаріей и не отдѣлена отъ нея никакими горами, а съ другой

лежитъ на томъ-же берегу Дуная, на которомъ находится и Болгарія.

Въ концѣ 80-годовъ въ Балканахъ, въ селѣ Шипкѣ, жилъ Dr. Mische, тоже собиравшій насѣкомыхъ, но въ литературѣ известны его изслѣдованія о біологии только *Thais cerisyi*, *Saturnia caecigena*, *Acherontia atropos*, *Macroglossa stellatarum* и *Lasiocampa quercifolia*.

Въ 1896 году въ маѣ мѣсяцѣ пріѣхалъ въ Софію известный вѣнскій лепидоптерологъ, Dr. Rebel, посланный Вѣнскимъ обществомъ «Gesellschaft zur Förderung der Naturhistorischen Erforschung des Orients». Онъ пробылъ въ Софіи нѣсколько дней, поѣхалъ затѣмъ въ Сливенъ, гдѣ и дѣлалъ экскурсіи въ теченіе около одного мѣсяца. Кромѣ краткаго отчета о поѣздкѣ до сихъ поръ результаты его экскурсій неизвѣстны. На мой запросъ онъ отвѣтилъ, что думаетъ опубликовать эти результаты въ настоящемъ году.

Въ 1899 году въ іюнѣ мѣсяцѣ въ Софію пріѣхала г-жа M. de la Nicholl изъ Англіи и сдѣлала одну экскурсію въ окрестностяхъ Софіи. Несмотря на свой преклонный возрастъ (70 лѣтъ), ей удалось въ іюнѣ и іюль поймать въ Сливенѣ и на Рыло дневныхъ бабочекъ¹⁾, о существованіи которыхъ въ Болгаріи не было извѣстно; кроме того ея материалъ подтвердилъ существованіе бабочекъ, нахожденіе которыхъ въ Болгаріи считалось сомнительнымъ и даже невѣроятнымъ.

Вмѣстѣ съ ней путешествовалъ и г. Elwes, тоже изъ Англіи. Опубликованные имъ результаты экскурсій остались для меня, однако, неизвѣстными.

Болгарію навѣщали еще и другіе энтомологи, какъ то: Eduard Merkl, V. Apfelbeck, A. Forel, G. Horváth, F. Klapálek, I. Stipanics и друг., но собранный ими материалъ не относится до *Lepidoptera*.

Послѣ освобожденія Болгаріи отъ турецкаго ига, въ новообраз-

1) Ночныхъ она не собирается.

зовавшемся княжествѣ стали появляться свои энтомологи, но болѣею частью получившіе высшее образованіе или въ Россії, или въ Западной Европѣ, или же въ Софійскомъ Университетѣ. На первомъ мѣстѣ стоитъ Н. Недѣлковъ, учитель въ Софійской Гимназіи, обладающій обширными энтомологическими познаніями и готовящій теперь свою работу для «Отечества» — сочиненіе, которое будетъ охватывать разныя отрасли науки и искусства, касающіяся Болгаріи и долженствующаго быть изданнымъ Болгарскимъ правительствомъ въ недалекомъ будущемъ. Затѣмъ идутъ: В. Ковачевъ, учитель въ Рущукской Гимназіи, Х. Пигулевъ, учитель въ Сливенской Гимназіи, Д. Иоакимовъ, асистентъ въ зоологическомъ Институтѣ въ Софіи, А. Марковичъ, учитель въ Разградской Гимназіи, К. Шкорпилъ, учитель въ Филиппопольской Гимназіи, Г. Христовичъ, препараторъ въ Зоологическомъ Институтѣ въ Софіи, К. Малковъ, учитель въ Садовскомъ земледѣльческомъ училищѣ, многообѣщающій студентъ Софійского Университета А. Дрѣновскій и еще многіе другіе, занимающіеся собираемъ насыкомыхъ. Изъ послѣднихъ первымъ считается Іосифъ Габергауеръ, живущій въ Сливенѣ.

Въ 1899 году въ Болгаріи образовалось Энтомологическое Общество, издающее свой органъ «Свѣтулка», который вышелъ до сихъ поръ въ шести номерахъ.

Статьи энтомологического содержанія на болгарскомъ языкѣ разбросаны, кромѣ журнала «Свѣтулки», по различнымъ журналамъ и отчетамъ учебныхъ заведеній, изъ которыхъ нѣкоторые сдѣлались библіографической рѣдкостью. Изъ нихъ самыми-solidными изданіями считаются: «Сборникъ», издаваемый министерствомъ народнаго просвѣщенія, «Периодическо Списание», издаваемое «Книжовнѣмъ Дружествомъ» (будущая Академія Наукъ), «Трудове» Природоиспытательного Общества и др. Эти три журнала издаются въ Софіи.

3. Общій характеръ климата въ Болгарі.

Въ Болгарскомъ Княжествѣ имѣются 105 метеорологическихъ станцій, изъ которыхъ 2 первоклассныхъ, 16 второклассныхъ, 6 третьеклассныхъ и 81 дождемѣрныхъ. Центральное управление находится въ компетентныхъ рукахъ директора С. Вапова. Всѣ наблюденія дѣлаются по правиламъ, принятymъ на интернаціональныхъ конгрессахъ.

Характеръ измѣненія температуры въ различныхъ городахъ показываетъ слѣдующая таблица, составленная для 1899 года. Здѣсь въ колоннѣ 2 р.—7 а. показана средняя мѣсячная разница температуръ въ 2 часа по полудни и въ 7 час. утра; а въ колоннѣ 2 р.—9 р. та же разница въ 2 часа по полудни и въ 9 час. по полудни.

Измѣнчивость температуры воздуха въ Болгарі въ 1899 году.

Мѣсяцъ.	Sливень.	Варна.	Бургазъ.	Самаковъ.	Софія.	Кюстен-дилъ.	Габрово.
	2 р—7 а	2 р—9 р	2 р—7 а	2 р—9 р	2 р—7 а	2 р—9 р	2 р—9 р
Январь.	4,7	3,0	6,4	4,7	7,9	5,8	6,7
Февраль.	5,3	3,3	6,9	4,9	8,9	5,7	7,2
Мартъ.	6,5	4,0	5,6	3,9	7,0	4,2	7,9
Апрѣль.	6,3	5,1	4,5	3,3	5,8	4,4	7,3
Май.	6,1	6,0	3,8	3,9	4,7	4,2	6,2
Июнь.	5,0	5,0	4,1	4,2	6,3	5,3	4,9
Июль.	5,5	5,2	5,1	5,1	6,4	5,7	5,9
Августъ.	6,1	5,1	5,8	4,6	7,6	5,7	6,6
Сентябрь.	6,7	5,5	6,1	4,6	8,5	5,8	7,7
Октябрь.	6,2	4,6	7,6	6,2	8,4	6,2	10,4
Ноябрь.	4,4	3,0	6,3	4,4	6,8	4,4	8,7
Декабрь.	2,5	1,8	3,1	2,5	3,6	3,0	3,8
Средн. за годъ.	5,4	4,3	5,4	4,4	6,5	5,0	6,9
							6,2
							7,0
							5,3
							7,2
							5,3
							7,2
							6,0

(365)

Мѣсяцъ.	Плѣвенъ.	Ломъ.	Стара Загора.	Филиппо- поль.	Казан- лыкъ.	Пазар- жикъ.	Хасково.							
	2 p—9 p	2 p—7 a	2 p—9 p	2 p—7 a	2 p—9 p	2 p—7 a	2 p—9 p							
Январь.	6,8	4,7	5,4	3,8	6,5	4,5	6,2	4,4	7,3	5,8	5,9	3,7	8,8	6,6
Февраль.	7,6	4,7	7,9	4,5	8,2	5,5	8,3	4,6	9,5	5,9	8,4	5,0	11,0	7,2
Мартъ.	8,9	5,7	7,2	4,4	8,3	5,5	9,4	4,8	9,8	6,3	9,2	5,8	10,2	7,0
Апрѣль.	9,6	6,7	10,0	5,7	8,7	6,6	10,0	5,2	9,5	6,8	10,1	6,5	9,3	7,2
Май.	7,6	6,7	7,9	5,2	8,9	—	9,0	5,2	9,0	7,3	11,0	5,4	9,1	7,1
Июнь.	6,2	6,7	6,8	5,6	6,9	6,2	7,9	5,4	7,1	6,8	10,5	5,5	6,5	6,5
Июль.	6,2	6,1	8,4	5,8	6,8	5,6	7,9	5,7	6,8	5,8	9,3	5,7	8,0	6,9
Августъ.	6,8	6,0	7,8	5,6	7,1	5,7	8,5	5,7	8,0	7,0	9,2	6,7	8,5	7,1
Сентябрь.	8,0	6,1	7,6	4,7	8,5	6,5	10,2	6,3	9,5	7,9	10,0	7,0	10,3	7,5
Октябрь.	9,5	7,0	8,7	5,5	8,2	6,1	10,7	7,2	10,1	8,1	10,4	4,5	10,4	7,9
Ноябрь.	5,4	4,7	5,3	4,1	5,8	4,1	7,7	5,2	7,5	5,9	7,8	3,7	8,1	6,0
Декабрь.	3,4	2,4	3,0	1,7	3,5	2,8	3,0	2,2	4,8	3,9	3,0	2,2	4,1	3,1
Средн. за годъ.	7,2	5,6	7,2	4,7	7,3	5,5	8,2	5,2	8,2	6,5	8,7	5,1	8,7	6,7

Такимъ образомъ, средняя годовая измѣнчивость температуръ за данный періодъ въ различныхъ городахъ представляется слѣдующей:

Г о р о д а .	2 p—7 a	2 p—9 p
Сливенъ	5,4	4,3
Варна	5,4	4,4
Бургазъ	6,5	5,0
Самаковъ	6,9	6,2
Софія	7,0	5,3
Кюстендилъ	7,2	5,3
Габрово	7,2	6,0
Плѣвенъ	7,2	5,6
Ломъ	7,2	4,7
Стара-Загора	7,3	5,5
Филиппополь	8,2	5,2
Казанлыкъ	8,2	6,5
Татаръ-Пазаржикъ	8,7	5,1
Хасково	8,7	6,7

т. е. самыми слабыми измѣненіями температуры днемъ и ночью обладаетъ Сливенъ, а самыми сильными — Хасково. Софія занимаетъ пятое мѣсто.

Самый же ходъ температуры въ различные мѣсяцы за 9 лѣтъ виденъ изъ слѣдующей таблицы, гдѣ приведены данныя для краткости только для 4 городовъ: Софіи, какъ гористой мѣстности (540 метр. надъ моремъ), Габрова, какъ низкой мѣстности на сѣверъ отъ Балканъ, Садова тоже, но на югъ отъ Балканъ, и Варны, какъ мѣстности, лежащей на побережье Чернаго моря.

Средняя мѣсячная температура воздуха.

Мѣсяцъ.	Городъ.	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	Среднее за 9 лѣтъ.
Январь.	Софія.	—1,1	—10,4	—6,6	1,8	—5,5	—0,8	—0,6	—0,5	—0,5	—2,7
	Габрово.	—0,4	—8,5	—6,3	4,4	—6,6	—1,0	0,5	2,2	0,5	—1,7
	Варна.	1,3	—4,8	—2,5	7,6	—3,0	1,7	1,8	3,8	1,7	0,8
	Садово.	—0,6	—7,0	—4,6	4,1	—4,8	1,2	0,8	2,6	0,7	—0,8
Февраль.	Софія.	0,8	—4,1	—0,4	—2,5	—1,2	1,9	0,5	2,1	3,3	0,0
	Габрово.	2,1	0,3	—0,8	—2,4	—1,9	1,7	0,6	2,9	5,2	0,9
	Варна.	3,9	2,0	1,7	2,3	1,0	3,6	3,0	4,0	5,2	3,0
	Садово.	3,4	—2,9	2,8	3,5	1,3	5,2	3,6	4,7	5,7	3,0
Мартъ.	Софія.	4,0	2,7	4,2	4,4	6,2	6,7	5,0	4,4	2,4	4,4
	Габрово.	4,3	3,2	4,6	4,3	5,9	7,2	5,1	4,8	2,4	4,6
	Варна.	4,2	4,9	(5,7)	5,7	5,0	7,6	(3,7)	5,3	3,5	5,1
	Садово.	7,6	6,0	7,1	6,4	7,6	8,4	7,1	6,8	4,4	5,7
Апрель.	Софія.	10,3	6,0	10,2	9,1	6,6	10,8	11,3	11,7	9,2	9,5
	Габрово.	10,8	6,7	10,3	9,2	6,3	10,9	11,7	11,5	9,9	9,7
	Варна.	10,6	7,0	9,8	9,9	7,8	11,5	9,6	11,0	9,8	9,7
	Садово.	12,8	9,4	12,5	11,1	9,6	12,9	13,4	13,4	11,5	11,8
Май.	Софія.	15,7	13,5	15,1	14,5	13,9	13,9	15,1	16,7	14,4	14,8
	Габрово.	16,0	13,4	14,9	13,9	13,2	14,2	14,7	16,5	14,8	15,7
	Варна.	16,8	14,0	15,3	15,4	14,1	15,2	15,5	16,3	14,9	15,3
	Садово.	19,6	16,7	18,5	16,0	15,6	20,8	17,0	19,0	16,1	17,7
Июнь.	Софія.	19,4	18,0	17,6	18,0	18,2	17,6	19,5	17,1	18,6	18,2
	Габрово.	19,3	18,2	17,6	17,8	17,8	16,9	19,1	17,7	18,4	18,1
	Варна.	21,5	19,3	20,2	19,2	20,0	19,9	19,2	19,8	20,4	19,9
	Садово.	21,9	21,5	21,3	20,1	20,0	19,1	21,2	19,6	20,4	20,6

Мѣсяцъ.	Городъ.	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	Средніе за 9 лѣтъ.	
	Гоіль (1-я половина).	Софія.	20,7	20,3	22,4	20,5	20,0	22,4	18,2	19,9	18,7	20,3
		Габрово.	21,1	20,2	21,5	20,0	19,1	21,5	18,4	20,2	18,5	20,1
		Варна.	22,8	21,7	20,9	23,3	21,4	23,0	22,4	22,0	21,1	22,1
		Садово.	24,0	23,2	23,8	22,7	22,8	23,5	21,8	22,1	21,3	22,8
	Гоіль (2-я половина).	Софія.	18,7	21,6	24,6	23,5	21,0	19,5	20,0	19,9	21,5	21,1
		Габрово.	19,2	20,4	24,2	22,6	22,1	20,3	19,6	19,4	21,1	21,0
		Варна.	21,6	23,0	25,4	24,5	23,9	23,6	21,3	23,4	23,2	23,3
		Садово.	23,3	24,2	27,0	24,1	23,7	22,5	22,3	22,4	23,2	23,6
	Августъ (1-я половина).	Софія.	19,9	17,4	20,3	21,9	23,1	19,1	18,8	19,5	19,7	20,0
		Габрово.	20,2	18,2	19,8	22,1	23,7	19,0	18,6	19,0	20,6	20,2
		Варна.	22,3	22,4	23,0	24,9	25,5	23,1	22,2	23,1	24,2	23,4
		Садово.	22,7	21,0	23,3	24,0	25,3	21,0	21,0	21,8	23,2	22,6
	Августъ (2-я половина).	Софія.	21,6	18,7	20,8	18,8	19,1	19,9	17,8	17,1	18,2	19,1
		Габрово.	21,3	18,2	19,2	17,6	19,4	20,0	18,8	17,0	18,4	18,9
		Варна.	23,3	21,4	22,1	20,9	21,4	23,1	21,3	20,1	21,3	21,7
		Садово.	22,9	21,4	22,8	20,2	20,3	21,5	20,0	20,1	19,9	21,1
	Сентябрь.	Софія.	18,7	15,4	16,7	15,9	16,9	17,5	15,9	15,8	14,4	16,4
		Габрово.	18,6	15,7	15,6	14,8	17,5	17,3	15,3	16,5	14,4	16,2
		Варна.	20,8	18,3	18,2	17,9	19,8	19,7	18,2	19,5	16,6	18,8
		Садово.	20,8	17,7	18,2	16,9	19,3	19,3	17,7	18,9	15,9	18,3
	Октябрь.	Софія.	12,7	10,6	13,7	12,2	15,0	7,8	12,4	8,6	11,8	11,6
		Габрово.	13,3	11,3	13,8	13,3	14,9	8,9	12,5	9,4	13,3	12,3
		Варна.	16,8	14,7	16,7	15,9	18,1	12,4	15,4	12,3	14,8	15,2
		Садово.	14,9	12,8	15,0	13,7	15,1	10,7	14,2	11,6	13,9	13,5
	Ноябрь.	Софія.	1,8	6,8	2,9	4,8	5,8	0,1	6,2	4,1	7,3	4,4
		Габрово.	2,0	7,5	3,3	5,2	6,0	1,2	7,1	4,5	7,2	4,9
		Варна.	4,8	10,2	7,2	8,9	8,8	3,3	9,6	7,8	11,2	8,0
		Садово.	4,8	8,7	5,6	7,9	7,6	2,3	6,8	6,5	10,0	6,7
	Декабрь.	Софія.	-1,5	0,5	-0,5	-1,3	2,0	-2,7	-1,1	-1,9	0,7	-0,6
		Габрово.	-0,4	0,0	-0,1	-0,1	2,0	-1,5	1,7	-2,4	1,4	0,1
		Варна.	2,9	3,4	4,5	3,0	5,2	1,9	4,6	0,9	5,2	3,5
		Садово.	1,8	3,3	2,5	2,0	2,7	0,3	0,2	1,1	3,6	1,9

Отсюда видно, что средняя температура за 9 лѣтъ распределена въ этихъ городахъ въ различные мѣсяцы слѣдующимъ образомъ:

	Софія.	Габрово.	Варна.	Садово.
Январь	— 2,7	— 1,7	0,8	— 0,8
Февраль	0,0	0,9	3,0	3,0
Мартъ	4,4	4,6	5,1	5,7
Апрель	9,5	9,7	9,7	11,8
Май	14,8	15,7	15,3	17,7
Июнь	18,2	18,1	19,9	20,6
Июль	20,7	20,5	22,7	23,2
Августъ	19,5	19,5	22,5	21,8
Сентябрь	16,4	16,2	18,8	18,3
Октябрь	11,6	12,3	15,2	13,5
Ноябрь	4,4	4,9	8,0	6,7
Декабрь	— 0,6	0,1	3,5	1,9
Среднее годовое . .	9,7	10,1	12,9	12,0

т. е. самой меньшей (9,7) годовой температурой обладаетъ Софія, что и немудрено, такъ какъ этотъ городъ лежить на 540 метр. надъ уровнемъ моря; а самой большей (12,9)— Варна, лежащая на берегу Чернаго моря.

Относительно распределенія дождей въ цѣлой Болгаріи достаточно упомянуть работу г. Марковскаго [1898. 13], сдѣланную имъ на основаніи матеріала, собраннаго центральной метеорологической станціей въ Софії отъ 37 различныхъ наблюдательныхъ пунктовъ за 1894, 1895 и 1896 гг. (въ Софії отъ 1891 до 1896 г.). Изъ этого труда видно, что Болгарію можно раздѣлить на четыре пояса:

Въ 1-мъ поясѣ дождей падаетъ въ годъ 370—490 мм. Онъ простирается по всей Дунайской равнинѣ и содержитъ около 16800 кв. километровъ.

Во 2-мъ поясѣ дождей падаетъ въ годъ 350—530 мм. Онъ занимаетъ побережье Чернаго моря (7000 кв. километровъ).

Въ 3-мъ поясѣ дождей падаетъ въ годъ 380—550 мм. Онъ обнимаетъ области Старо-Загорскую и Оракийскую (7000 кв. километровъ).

Въ 4-мъ поясѣ дождей падаетъ 450—1500 мм. Онъ распространенъ по всѣмъ гористымъ мѣстамъ и занимаетъ пространство около $\frac{2}{3}$ цѣлой Болгаріи. При этомъ въ восточныхъ гористыхъ мѣстностяхъ преобладаютъ осенніе и зимніе дожди, а въ западныхъ — весенніе и лѣтніе.

Къ подобному распределенію Болгаріи относительно климата пришли Шкорпилъ [1892. 16] и Атанасовъ [1897. 1]. Предположенія о такомъ распределеніи были сдѣланы раньше Воеиковымъ [1887], Ганномъ [1887], Фишеромъ [1893] и Роленомъ [1895. 17].

Къ статьѣ Марковскаго приложены двѣ картограммы, одна изъ которыхъ показываетъ годовое распределеніе атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ въ цѣлой Болгаріи.

Литературные указания по метеорологии.

1. Атанасовъ. Статически сборникъ на Княжество Бѣлгариа.— Отдельный оттискъ отъ «Военни Извѣстия» въ Софии 1897.
2. Бѣчеваровъ, М. Метеорологически наблюдения за София (отъ 1-й Мартъ 1887 год. до 1-й Мартъ 1889).— Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. I, р. 291—301. 1889. София.
3. Бѣчеваровъ, М. Нѣколко бѣлѣжки за климатъ въ София.— Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. I, р. 302—306. 1889. София.
4. Вацовъ, Сп. Наблюдения отъ Метеорологическата Станция при Софийската Дѣржавна Гимназия.— Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. X. [13 таблицъ]. 1894; XI. [11 таблицъ]. 1894; XII. [14 таблицъ]. 1895; XIII. [12 таблицъ]. 1896; XIV. [14 таблицъ]. 1897. София.

5. **Вацовъ, Сп.** Наблюденията на държавната метеорологическа станция въ София. — Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. IV, р. 956 — 600. 1891. София.
6. **Вацовъ, С.** Температурата на почвата въ София. — Годишникъ на Българското Природоизпитателно Дружество. III, № 4, р. 82. 1900.
7. **Вацовъ, С.** Земедѣлческо-Метеорологически бюлетинъ за периода отъ 20 Декемврий 1899 до 20 Януарий 1900 (ст. ст.). Издава централната метеорологическа станция въ София. — [То-же самое за периодъ]: отъ 20 Януарий до 16 Февруарий, отъ 17 Февруарий до 18 Мартъ, отъ 19 Мартъ до 17 Априль, отъ 18 Априль до 18 Май, отъ 19 Май до 17 Юни, отъ 18 Юни до 2 Юлий, отъ 3 — 18 Юлий, отъ 19 Юлий — 2 Августъ, отъ 3 — 18 Августъ, отъ 19 Августъ до 17 Сентемврий, отъ 18 Сентемврий до 18 Октомврий, отъ 19 Октомврий до 17 Новемврий, отъ 18 Новемврий до 18 Декемврий 1900 г. [Всякий бюллетенъ по 4 стр.].
8. Годишенъ отчетъ на Метеорологическата Станция въ Стара-Загора за 1896 година. — Отчетъ на Мариинската държавна дѣвическа Гимназия въ Стара-Загора за 1896/97 учебна год.
9. Годишенъ отчетъ на метеорологическата станция при Пловдивската мажска Гимназия «Александъ I» за 1896 година. — Отчетъ на Пловдивската държавна мажска Гимназия «Александъ I» за учебната 1896/97 година, р. 24 — 27. Пловдивъ 1897.
10. **Дуковъ, Н.** Кратъкъ прѣглѣдъ на климатическите особенности на гр. Варна за прѣзъ 1899 година. — Годишенъ отчетъ на Варненската държавна мажка Гимназия «Фердинандъ I» за 1899 — 1900 учебна година (отъ основанието 21 год.), р. 3 — 6. Варна 1900.
11. **Дуковъ, Н.** Годишенъ отчетъ на метеоролгическата станция въ гр. Варна. — [Тамъ-же] одна таблица.
12. **Златарски, Г.** Чертги отъ метеорологията. — Периодическо (371)

Списание на Българското Книжовно Дружество въ Средецъ. I, р. 53 — 72. 1882.

13. **Марковски, Г.** Дъждоветъ въ България. — Годишникъ на Българското Природоизпитателно Дружество. II. № 3, р. 50 — 69. 1898.

14. **Марковски, Г.** Мѣнението на температурата въ София, Плевенъ, Варна, Бургасъ и Габрово. — Годишникъ на Българското Природоизпитателно Дружество. III. № 4, р. 82. 1900.

15. **Сираковъ, П.** Мѣсеченъ бюллетенъ на метеорологическата станция въ с. Садово. — Садово, селско-стопанско списание. III. [Въ концѣ всякой книжки по одной таблицѣ]. Садово 1900.

16. **Шкорпилъ, Х. и К.** География и статистика на Княжество България. 248 pag. [р. 123]. Пловдивъ 1892.

17. **Raulin, V.** Die Regenvertheilung auf der Balkanhalbinsel. — Meteorol. Zeitschr. Wien 1895.

4. Общій характеръ растительности въ Болгаріи.

Флора Болгаріи изучена различными болгарскими ботаниками, какъ то Стефаномъ Георгіевымъ [2—5], Ив. Урумовымъ [24, 60—62], В. Ковачевымъ [9—12], А. Тошевымъ [20—23, 15, 79], А. Явашевымъ [27], Стефаномъ Петковымъ [14, 16], К. Шкорпилемъ [25—26], С. Казанджевымъ [8] и другими. Кроме того за-границей начало изслѣдованию болгарской флоры положилъ Е. Фривальдскій [45—46], Гризебахъ [49—50], Панчичъ [17—18], Буассье [29—31], Форманекъ [40—42] и другіе, приведенные въ спискѣ литературы. Капитальное сочиненіе «Flora Bulgarica» написано однако въ послѣднее время И. Веленовскимъ въ Прагѣ [74—80].

По Веленовскому [1898—80] въ южной Болгарія (теперь южная Болгарія) болѣе половины флоры составлена

изъ элементовъ ориентальной флоры, которая господствуетъ въ Малой Азіи. На сѣверъ отъ Балканъ простирается въ сѣверной Болгаріи флора, состоящая изъ элементовъ по болѣшой части южно-русскихъ, средне-европейскихъ и отчасти азіатскихъ; здѣсь растительность носитъ характеръ степной. Ориентальная и понтійская флора Болгаріи оканчивается приблизительно въ срединѣ Сербіи (близь рѣки Болгарской Моравы). Средиземная флора не проникаетъ въ Болгарію, и только нѣсколько ея видовъ (*Cistus*, *Pancratium*, *Juniperus macrocarpa*) указываютъ на ея остатки.

Болгарская флора по отношенію къ пространству, ею занимаемому, необыкновенно богата, что объясняется разнообразными геологическими и геотектоническими формациами (горами, равнинами, котловинами, долинами, болотами, степями и проч.) и встрѣчей здѣсь европейскихъ и азіатскихъ растеній. До 1898 года въ Болгаріи насчитывалось 2877 чистыхъ видовъ растеній.

Лѣсами покрыты только нѣкоторыя части горъ; въ долинахъ же ихъ почти нѣтъ: они были уничтожены во время разныхъ восстаній и войнъ огнемъ и мечомъ, да и теперь страдаютъ отъ погоды скотомъ.

Порвобытными лѣсами покрыты склоны Балканъ въ Берковицѣ, Тетевенѣ, Троянѣ; затѣмъ дремучіе лѣса находятся въ Родопахъ, въ Бѣлово на Рыло и на сѣверныхъ склонахъ Средней Горы. До 1000 метр. высоты встрѣчаются: *Quercus pedunculata*, *sessiliflora*, *Cerris conferta*, *Ostrya*, *Carpinus Betulus*, *Corylus Colurna*, *Acer Pseudoplatanus*, *platanoides*, *Fraxinus Ornus*, *excelsior*, *Tilia argentea*, *Alnus incana*, *Populus tremula*, *Sorbus Aria*, *torminalis*. Отъ 1000 до 2000 метр. лѣса состоять почти исключительно изъ буковъ (*Fagus silvatica*). На границѣ лѣсовъ къ буку примѣшены нѣкоторыя хвойные деревья.

Большія пространства занимаютъ кустарники въ окрестностяхъ Тырнова, Варны, Разграда и Старой Загоры; они обыкновенно состоять изъ: *Quercus conferta*, *pubescens*, *Rhus Cotinus*, *Acer tataricum*, *campestre*, *Corylus avellana*, *Cornus mas*, *Palmarus*, *Rhamus*, *Carpinus duinensis*, *Prunus spinosa*. Въ болѣе теп-

лыхъ мѣстахъ (Варна, Сливенъ, Хасково, Ени Махала, Карнабадъ) встречается еще *Smilax excelsa* и дикій виноградъ.

Изъ другихъ главныхъ породъ деревьевъ и кустарниковъ въ Болгаріи встречаются:

Syringa vulgaris обыкновененъ въ цѣлой Болгаріи.

Juglans regia (орѣшникъ).

Platanus orientalis въ южн. Болг. и въ Родопахъ.

Prunus laurocerasus.

Castanea vesca только около Берковицы (сѣв. Болг.).

Prunus divaricata почти повсюду.

Aesculus hippocastanum почти повсюду.

Cercis въ вост. Болг. изолированъ.

Betula alba (береза) рѣдко.

Vitis vinifera повсюду.

Picea v. balcanica около Бѣлово.

О состоянії лѣсовъ въ Болгаріи находится богатый статистический матеріалъ въ отчетѣ бывшаго министра земледѣлія и торговли, Іова Титорова [19], а также въ двухъ существующихъ болгарскихъ лѣсоводственныхъ журналахъ: 1) «Лѣсоводъ»—изданіе Болгарскаго Лѣсного Общества и 2) «Лѣсовѣдска Сбирка»—изданіе Лѣсничейскаго Общества. Оба журнала выходятъ всякий мѣсяцъ въ Софіи.

Литературные указания по флорѣ.

1. Апостоловъ, Д. П. Приносъ къ бѣлгарската терминология на Флората въ Македония.—Периодическо Списание на Бѣлгарското Книжовно Дружество въ София. LXI, р. 343—361. 1900.

2. Георгиевъ, Ст. Родопите и Рилската Планина и нихната растителность.—Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. III, р. 324—354. 1890; IV, р. 529—585. 1891; V, р. 311—354. 1891. София.

3. **Георгиевъ, Ст.** Материяли по флората на Южна България (Тракия). — Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнини. I, р. 191 — 254. 1899. София.
4. **Георгиевъ, Ст.** Лютикови растения (*Ranunculaceae*) изъ България. — Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ София. LXI, р. 149 — 165. 1900.
5. † **Георгиевъ, Ст.** Намѣрена ли е до сега *Raymondia serbica* Panč. въ България? — Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнини. XVI—XVII, р. 160—163. 1900. София.
6. **Јуришић, Ж. Ј.** Прилог флори кнезевине Бугарске. — Глас српске краљевске Академије. LVI. Први разред 20, р. 141—184. 1898.
7. **Јуришић, Ж.** Шта су и колико урадили Бугари на познавању флора своје земље а уз припоћ странаца. — Дело, лист за науку, књижевност и друштвени живот. I, II. Београд 1894.
8. **Казанджиевъ, С.** Лишайната флора на България. — Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ София. LXI, р. 470 — 532. 1900.
9. **Ковачевъ, В.** Материали за българската флора. — Трудъ. III. № 1, р. 42 — 52; № 3, р. 317 — 324. Търново 1890.
10. **Ковачевъ, В. Т.** *Trapa natans* въ Съверна България. — Трудъ. III. № 2, р. 214 — 218. 1890.
11. **Ковачевъ, В.** Материали по флората на Съверна България. — Трудъ. IV. № 2, р. 165 — 174; № 3, р. 329 — 336. Търново 1892.
12. **Ковачевъ, В. Т.** Материали по флората на Русенския окръгъ. — Трудове на Българското Природоизпитателно Дружество. I, р. 22 — 61. 1900.
13. **Лазаровъ, Н.** Прѣгледъ на пò - забѣлѣжителнитѣ полезни и врѣдни растения. — Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнини. I, р. 255 — 290. 1899. София.
14. **Петковъ, С.** Приносъ за изучванье на българскитѣ едно-клѣтични зелени сладководни водорасли. — Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ София. LVII, р.

111 — 135. 1898; LVIII, p. 595 — 618. 1899; LIX, p. 791 — 806. 1899.

15. **Матовъ, Д. и Тошевъ, А.** Къмъ българския рѣчникъ. Къмъ терминологията на българската флора. — Книжици за прочитъ съ белетристическо, техническо и забавително съдържание. Книшка 4, p. 291 — 299. Солунъ 1890.

16. **Петковъ, Стефанъ.** Втори приносъ за изучване на сладководните зелени водорасли въ България. — Трудове на Българското Природоизпитателно Дружество. I, p. 1 — 21. 1900.

17. **Панчић, loc.** Траћа за Флору кнежевине Бугарске. I. Путничке белешке; II. Списак биљака у бугарској наћених. — Гласник Српскаг Ученог Друштва. LIII, p. 161 — 231. 1883.

18. **Панчић, loc.** Нова граћа за Флору кнежевине Бугарске. — Гласник Српскаг Ученог Друштва. LXI. 1886.

19. **Титоровъ, И.** Състоянието на горското дѣло въ Българското Княжество. До Негово Царско Височество — Фердинандъ I, Български князъ. Докладъ отъ министра на търговията и земедѣлието. 121 pag. [съ 7 монограмами и картограмами и съ 25 фотографіями]. София, 1901.

20. **Тошевъ, А.** Къмъ терминологията на българската флора. — Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ Србецъ. XXXV, p. 633 — 669. 1890.

21. **Тошевъ, А.** Материалы по флората на България. — Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ София. LI, p. 329 — 356. 1895.

22. **Тошевъ, А.** Материалы по флората на Солунско. — Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. XI, p. 423 — 457. 1894; XII, p. 32 — 57. 1895. София.

23. **Тошевъ, А.** Материалы къмъ флората на Родопите. — Периодическо Списание на Българското Книжовна Дружество въ София. 1901. [подъ печатью].

24. **Урумовъ, Ив. К.** Материалы за флората на Ловченския округъ. — Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. XIV, p. 3 — 85. 1896; XV, p. 3 — 104. 1898. София.

25. Шкорпилъ, Х. и К. География и статистика на княжество България. 248 pag. Пловдивъ 1892. [2. Растения (флора), р. 112 — 113.]

26. Шкорпилъ, Х. Върху Пловдивската флора. (Съ геологически и фаунистически бълѣжки). — Отчетъ на Пловдивската Държавна мажска Гимназия «Александър I» за учебната 1896/97 година, р. 3 — 23. Пловдивъ 1897.

27. Явашовъ, Ананіе Ив. Приносъ за познавание българската флора. — Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ Срѣдецъ. XXI — XXII, р. 279 — 304. 1887; XXVII, р. 291 — 311. 1888; XXXII — XXXIII, р. 287 — 309. 1890; XXXVI, р. 890 — 904. 1891.

28. Abd-ur-Raham Hadji Effendi [Charrel]. Empire Ottomane, Géographie botanique. Faits nouveaux relatifs à la province de Salonique. 48 pag. Salonique 1892.

29. Boissier, E. Diagnoses plantarum orientalium novarum. Vol. secundum. № 8. 128 pag. Parisiis 1849; № 9. 131 pag. Parisiis 1849; № 10. 122 pag. Parisiis 1849; № 11. 136 pag. 1849; № 12. 120 pag. Neocomi 1853; № 13. 114 + III pag. Neocomi 1853.

30. Boissier, E. Diagnoses plantarum novarum praesertim orientalium nonnullis europaeis borealiafricanisque additis. Vol. tertium. Ser. secunda. № 1. 120 pag. Neocomi 1853; № 2. 125 pag. Lipsiae 1856; № 3. 177 pag. Lipsiae 1856; № 4. 146 pag. Lipsiae — Parisiis 1859; № 5. 118 pag. Lipsiae 1856; № 6. 148 pag. Lipsiae — Parisiis 1859.

31. Boissier, E. Plantae Aucherianaе orientales enumeratae, cum novarum specierum descriptione. — Ann. Sciences Natur. Vol. XVI. 1841; Vol. XVII. Paris 1842.

32. Bornm ller, J. Beitr ge zur Kenntniss der Flora des bulgarischen K stenlandes. — Bot. Centralbl. 1888.

33. **Bornmüller, J.** Zur Flora Ost-Bulgariens.—Bot. Centralbl. XLI. XI. Jahrg. № 6, p. 162 — 167. 1890.
34. **Bornmüller, J.** *Alkanna Haussknechii* Bornm. spec. nov.—Oesterr. bot. Zeitschr. XLIV. № 1, p. 16 — 17. 1894.
35. **Boué, A.** La Turquie d'Europe. 2 vol. Paris 1841.
36. **Čelakovský, I.** O novém druhu rodu *Galanthus*. — Zprávy kr. ces. spol. nauk. Praha 1891.
37. **Degen, A. v.** Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. X. Zwei für Europa neue *Cytisus*-Arten in Bulgarien.—Oesterr. bot. Zeitschr. XLIII. № 12, p. 423 — 424. 1893; XV. Vier für die bulgarische Flora neue Pflanzen.—Oesterr. bot. Zeitschr. XLIV, № 6, p. 216 — 217. 1894.
38. **Degen, A. v.** und **Dörfler, Ign.** Beitrag zur Flora Albaniens und Macedoniens. — Denkschrift der k. k. Akad. der Wissensch. Wien. LXIV, p. 701 — 749. 1897.
39. **Dingler, H.** Das Rhodopengebirge in der europäischen Türkei und seine Vegetation. — Zeitschr. des deutsch. und oesterr. Alpenvereins. Jahrg. 1877. Heft 2, p. 195 — 223. München. 1877.
40. **Formánek, Ed.** Beitrag zur Flora von Serbien und Bulgarien.—Verhandl. naturforsch. Vereins in Brünn. XXXI, p. 110 — 136. 1892.
41. **Formánek, Ed.** Dritter Beitrag zur Flora von Serbien und Bulgarien.—Verhandl. Naturf. Ver. XXXVI. Brünn 1897.
42. **Formánek, Ed.** Fünfter Beitrag zur Flora von Macedonien. — Verh. Naturf. Ver. XXXVII. Brünn 1899.
43. **Fritsch, C.** Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel, mit besonderer Berücksichtigung von Serbien. Theil IV.—Verhandl. der. k. k. Zoolog.-bot. Ges. Wien. XLIX, p. 89 — 110; p. 221 — 242. 1899.
44. **Fritsch, C.** Bemerkungen zum Aufsatz von Degen über einige orientalische Pflanzenarten. — Oesterr. bot. Zeitschr. XLIX. № 7, p. 262. 1899.

45. **Frivaldszky, Im.** Bot. Zeitschr. «Flora» in Regensburg 1835, 1836.
46. **Frivaldzsky, Imre.** Közlések, a' Balkany vidékén tett természettudományi utazásról. — A' Madyar Tudós Társaság' Évkönyvei [Годовыя извѣстія венгерского ученаго общества]. Bd. II, p. 235 — 276. 1832 — 1834. Budán 1835. Bd. IV, p. 194 — 207. 1836 — 1838. Budán 1840.
47. **Grisebach, A.** Reise durch Rumelien nach Brussa im Jahre 1839. Bd. I. VI + 362 pp.; Bd. II. IV + 374 pp. Goettingen 1841.
48. **Grisebach, A.** Specilegium florae rumelicae et bithynicae exhibens synopsin plantarum. Vol. I. XII — 548 pag. Brunsvigae 1843.
49. **Grisebach, August.** Gesammelte Abhandlungen und kleinere Schriften zur Pflanzengeographie. VIII + 628 pp. Leipzig 1880.
50. **Grisebach, A.** Die Vegetation der Erde. 2. Auflage. Leipzig 1884/5. Bd. I. XVI + 668 pp. 1884; Bd. II. XII + 694 pp. 1885.
51. **Gheorghieff, St.** Bemerkungen über «Flora Bulgarica, Descriptio et enumeratio systematica plantarum vascularium in principatu Bulgariae sponte nascentium, Supplementum I. Auctore I. Velenovsky. Pragae 1898». — Oesterr. bot. Zeitschr. № 11. 1898.
52. **Halácsy, E. v.** Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel. VIII. — Oesterr. bot. Zeitschr. XLII. № 11, p. 368 — 375; № 12, p. 400 — 401. 1892.
53. **Halácsy, E. v.** *Achillea Urumoffii*. Eine neue Schafgarbenart der Balkanhalbinsel. XLVII. № 4, p. 143. 1897.
54. **Janka.** [Ботаническія свѣдѣнія по флорѣ южной Болгаріи. Опубликованы въ срединѣ прошлаго столѣтія].
55. **Lipsky, W.** *Euphorbia soongarica* Boiss. auf der Balkanhalbinsel. — Oesterr. bot. Zeitschr. XLVII. № 1, p. 1 — 2. 1897.
56. **Polák, Karl.** Zur Flora von Bulgarien. — Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. № 5, p. 163 — 165; № 6, p. 202 — 204. 1891.

57. **Purkyne, E.** Eine asiatische Conifere in den Balkänlandern.—Oesterr. Monatschr. f. Forstwes, p. 446. 1877.
58. **Schaarschmidt-Istvanffi G.** Algae nonnullae a beato E. Frivaldszky in Rumelia lectae.—Természetrajzi Türet. XIII. part. 2—3, p. 67—77. Budapest 1890.
59. **Sestini.** Viaggio da Constantinopoli a Bukaresti fatto l'anno 1879. Roma 1794.
60. **Urumoff, I. K.** Zur Flora von Bulgarien.—Oesterr. bot. Zeitschr. XLIX. № 2, p. 53—56. 1899.
61. **Urumoff, I. K.** Nachträge zur Flora von Bulgarien.—Oesterr. bot. Zeitschr. XLIX. № 6, p. 201—203. 1899.
62. **Urumoff, I. K.** Beiträge zur Flora von Bulgarien.—Oesterr. bot. Zeitschr. XLX. № 1. 1900.
63. **d'Urville.** Enumeratio plantarum, quas in insulis Archipelagi aut litoribus Ponti Euxini annis 1819 et 1820 collegit.—Mém. Soc. Linnéenne de Paris. Vol. I. 1822.
64. **V. Най-обикновенитѣ** нашенски отровни растения.—Природа. I. № 5, p. 77—78. София 1899.
65. **Vandas, K.** Beiträge zur Kenntniss der Flora Bulgariens.—Sitzgsber. d. k. böhm. Ges. d. k. Wiss. Prag 1888.
66. **Velenovský, I.** Ein Beitrag zur Kenntniss der bulgarischen Flora.—Oesterr. bot. Zeitschr. 1884.
67. **Velenovský, I.** Beiträge zur Flora von Ost-Rumelien.—Oesterr. bot. Zeitschr. 1886.
68. **Velenovský, I.** Beiträge zur Flora von Bulgarien.—Abhandl. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Prag 1886.
69. **Velenovský, I.** Neue Beiträge zur Kenntniss der Flora von Ost-Rumelien und Bulgarien.—Sitzgsber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Prag 1887.
70. **Velenovský, I.** Resultate der zweiten botanischen Reise nach Bulgarien.—Sitzgsber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Prag 1888.
71. **Velenovský, I.** Plantae novae bulgaricae. I.—Act. reg. boh. soc. scient. Pragae 1889; II, p. 39—58. 1890.

72. Velenovský, I. *Lepidotrichum*, eine neue Cruciferengattung aus dem Gebiete der pontischen Flora.—Oesterr. bot. Zeitschr. 1889.
73. Velenovský, I. Ueber zwei verkannte Cruciferen.—Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. № 4, p. 121 — 123. 1891.
74. Velenovský, I. Flora Bulgarica. IX + 676 pp. Pragae 1891.
75. Velenovský, I. Nachträge zur «Flora Bulgarica».—Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. № 12, p. 397 — 400. 1891; XLII. № 1, p. 14 — 17. 1892.
76. Velenovský, I. Neue Nachträge zur Flora von Bulgarien.—Sitzber. der k. böhmisch. Gesellsch. der Wissensch. 22 pag. Prag. 1892.
77. Velenovský, I. Dritter Nachtrag zur Flora von Bulgarien.—Sitzber. der k. böhmisch. Gesellsch. der Wissensch. 72 pag. Prag 1893.
78. Velenovský, I. Vierter Nachtrag zur Flora von Bulgarien.—Sitzber. der k. böhmisch. Gesellsch. der Wissensch. 29 pag. Prag 1884.
- 78a. Velenovský, I. Fünfter Nachtrag zur Flora von Bulgarien.—Sitzber. der k. böhmisch. Gesellsch. der Wissensch. 12 pag. Prag 1895.
79. Velenovský, I. Sechster Nachtrag zur Flora von Bulgarien.—Sitzber. böhmisch. Gesellsch. der Wissensch. Math.-naturw. Classe. XXIX. 1898.
80. Velenovský, I. Flora Bulgarica. Supplementum I. XX + 104 pp. Pragae 1898.
81. Velenovský, I. Ueber *Micromeria Frivaldszkyana* Deg. und *M. balcanica* Vel.—Oesterr. bot. Zeitschr. XLIX. № 8, p. 291 — 292. 1899.
82. Velenovský, I. Siebenter Nachtrag zur Flora von Bulgarien.—Sitzber. böhmisch. Gesellsch. der Wissensch. Math.-naturw. Classe. 1899.
83. Velenovský, I. Achter Nachtrag zur Flora von Bulgarien.—Oesterr. bot. Zeitschr. LI. № 1, p. 29 — 32. 1901.

84. **Virhapper, Friedr. jun.** Ueber einen neuen *Dianthus* aus dem Balkan. — Verhandl. der k. k. Zoolog.-bot. Ges. Wien. XLVII. № 1. 1897.

85. **Wagner, H.** Botanische Forschungsreise. — Oesterr. bot. Zeitschr. XLIV. № 1, p. 36 — 39. 1894.

86. **Wettstein, Richard R. v.** Die Omorika-Fichte, *Picea omorika* (Panc.). Eine monographische Studie. — Sitzber. d. k. k. Akad. der Wissensch. Wien. XCIX. X. Bd. X. Hft. Abth. I, p. 503 — 556. 1890.

87. **Wildeman, E. de et Tocheff, A.** Contributions à l'étude de la flore de Bulgarie. — Soc. bot. de Belgique. Bulletin XXXIII. 12 part., p. 61 — 72. 1894.

88. **Zavodni.** Aus dem Orient. — Der Gartenwelt. IV. № 10, p. 112 — 114. 1899.

5. Географическое положение главныхъ мѣстъ, гдѣ были собираемы бабочки.

Софія.

Городъ Софія находится въ западной Болгаріи (въ 65 килом. отъ сербской границы) подъ $42^{\circ}41'40''$ сѣв. широты и $23^{\circ}19'39''$ восточной долготы отъ Гринвича. Онъ расположень въ срединѣ долины (60 килом. длины и 20 килом. ширины) и лежить на 540 метр. надъ уровнемъ моря. Въ 8 килом. къ югу возвышается большая гора Витоша (2300 метр. надъ уровн. моря), направо отъ которой Владайскимъ проходомъ отдѣлена Люлинская гора, а нальво отъ Витоши находится Лозенская гора (Бърдо-Планина); на сѣверѣ отъ запада къ востоку тянется Балканскій хребетъ (Стара Планина) съ многочисленными горами, между которыми

самая высокая Мургашъ (1700 метр. надъ моремъ). На востокъ находятся холмы (Вакарель), а на западъ между скалами Драгомановскій проходъ.

На разстояніі 10 килом. отъ Софіи на востокъ по долинѣ протекаетъ небольшая рѣчка Искръ, берущая свое начало изъ Рыльскихъ горъ и текущая поперекъ Балканского хребта. Въ нее впадаютъ ручейки: Владайская рѣчка и Перловская рѣчка, берущія свое начало на Витошѣ и протекающія по окраинамъ Софіи.

Окрестности Софіи безлѣсны; только по горамъ встрѣчаются низкорослые деревца и очень рѣдко небольшія пространства строевого лѣса (Мургашъ, Кокаленскій монастырь и проч.). Изъ главныхъ породъ деревьевъ и кустарниковъ здѣсь встрѣчаются: букъ, дубъ, тополь, береза (рѣдко), орѣхъ, орѣхникъ, липа, ольха, верба, капштанъ, яблони, груши, сливы, вишни, бузина, тернъ и проч. Прочая растительность не представляетъ большого разнообразія и имѣеть характеръ *субальпійскій*. Подробности относительно флоры окрестностей Софіи находятся въ сочиненіяхъ Веленовскаго, особенно же въ его «Flora Bulgarica», Supplemenum I, на стр. 343 — 347. [80].

Растительность развивается весной очень поздно (въ началѣ апрѣля). Такъ, приѣхавшій сюда въ маѣ 1896 года известный вѣнскій лепидоптерологъ, Dr. Rebel, былъ удивленъ, что многія деревья еще не распустились и поэтому ему не удалось собрать много насѣкомыхъ.

Хотя Веленовскій и друг. и описываютъ климатъ Софіи, какъ нездоровыій и очень измѣнчивыій, но это невѣрно, такъ какъ Софія относительно величины суточной амплитуды температуры изъ 14 городовъ Болгаріи занимаетъ *пятое мѣсто*, а именно средняя годовая амплитуда, напр., въ 1899 году между температурой въ 2 часа по полудни и въ 7 час. утра составляла $7,0^{\circ}$, а между температурами въ 2 часа по полудни и въ 9 час. вечера она была $5,3^{\circ}$.

Слѣдующая таблица содержитъ въ себѣ среднюю мѣсячную температуру въ Софіи за 9 лѣтъ:

Средняя мѣсячная температура въ Софіи въ С°.

Мѣсяцъ.	1892.	1893.	1894.	1895.	1896.	1897.	1898.	1889.	1900.	Сред- нее за 9 лѣтъ.
Январь.	— 1,1	— 10,4	— 6,6	1,8	— 5,5	— 0,8	— 0,6	— 0,5	— 0,5	— 2,7
Февраль.	0,8	— 4,1	— 0,4	— 2,5	— 1,2	1,9	0,5	2,1	3,3	0,0
Мартъ.	4,0	2,7	4,2	4,4	6,2	6,7	5,0	4,4	2,4	4,4
Апрѣль.	10,3	6,0	10,2	9,1	6,6	10,8	11,3	11,7	9,2	9,5
Май.	15,7	13,5	15,1	14,5	13,9	13,9	15,1	16,7	14,4	14,8
Июнь.	19,4	18,0	17,6	18,0	18,2	17,6	19,5	17,1	18,6	18,2
Июль (I полов.).	20,7	20,3	22,4	20,5	20,0	22,4	18,2	19,9	18,7	20,3
Июль (II полов.).	18,7	21,6	24,6	23,5	21,0	19,5	20,0	19,9	21,5	21,1
Августъ (I полов.).	19,9	17,4	20,3	21,9	23,1	19,1	18,8	19,5	19,7	20,0
Августъ (II полов.).	21,6	18,7	20,8	18,8	19,1	19,9	17,8	17,1	18,2	19,1
Сентябрь.	18,7	15,4	16,7	15,9	16,9	17,5	15,9	15,8	14,4	16,4
Октябрь.	12,7	10,6	13,7	12,2	15,0	7,8	12,4	8,6	11,8	11,6
Ноябрь.	1,8	6,8	2,9	4,8	5,8	0,1	6,2	4,1	7,3	4,4
Декабрь.	— 1,5	0,5	— 0,5	— 1,3	2,0	— 2,7	— 1,1	— 1,9	0,7	— 0,6

Среднее годовое 9,7°.

Такимъ образомъ, несмотря на высокое положеніе Софіи надъ моремъ (540 м.), средняя годовая температура здѣсь составляетъ 9,7°.

Максимальная и минимальная температура въ тѣни была въ различные годы слѣдующая:

Годъ.	Температура воздуха въ тѣни.				
	Максимальная.		Минимальная.		
1891	36,5°	6 Августа.	— 21,7°	5 Января.	
1892	32,8	14 Июля.	— 26,0	23 Января.	
1893	34,0	5 Июля.	*— 31,2	16 Января.	
1894	37,1	28 Августа.	— 22,2	16 Января.	
1895	34,7	5 Августа.	— 18,7	11 Декабря.	
1896	*37,2	7 Августа.	— 15,1	29 Января.	
1897	33,3	4 Июля.	— 16,6	12 Ноября.	
1898	34,1	29 Июня.	— 21,7	29 Декабря.	
1899	34,1	25 Июля.	— 18,4	8 Марта.	
1900	31,6	23 Июня.	— 10,4	17 Января.	

Отсюда видно, что самый большой холода господствовалъ въ Софії 1893 года 16 января (нов. ст.) ($-31,2^{\circ}$), а самый большой жаръ быль въ 1896 году 7 августа ($37,2^{\circ}$).

Что касается до атмосферныхъ осадковъ въ Софії, то ясное понятіе объ ихъ количествѣ даетъ слѣдующая таблица:

Мѣсячное количество атмосферныхъ осадковъ въ Софіи въ литрахъ.

Мѣсяцъ.	1892.	1893.	1894.	1895.	1896.	1897.	1898.	1899.	1900.	Сред- нее за 9 лѣтъ.
Январь.	80	70	19	128	6	29	8	21	54	46,1
Февраль.	62	19	7	42	13	33	57	13	64	34,2
Мартъ.	48	21	62	32	35	51	42	52	34	41,9
Апрѣль.	42	32	45	66	93	74	64	13	95	58,2
Май.	94	138	81	52	36	217	148	20	100	95,1
Июнь.	190	87	32	87	46	186	36	71	40	86,1
Июль.	126	39	9	96	81	143	117	59	105	84,0
Августъ.	66	120	31	—	43	51	94	80	226	82,5
Сентябрь.	32	100	33	21	52	32	5	77	3	39,4
Октябрь.	84	35	59	104	2	33	175	63	37	65,8
Ноябрь.	43	47	28	34	164	14	0	37	52	46,6
Декабрь.	67	29	38	83	36	25	34	53	37	44,7

Годовое количество 728,6.

Въ Софії нерѣдко бывають сильныя бури, особенно зимой и лѣтомъ. Первый снѣгъ падаетъ въ октябрѣ, а послѣдній въ началѣ апрѣля, но онъ лежитъ вообще только нѣсколько недѣль (на Витошѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ иногда не таетъ до августа). Часто случается, что зимой послѣ растопленія снѣга земля замерзаетъ, и погода дѣлается холодной и сухой.

Въ теченіе послѣднихъ 5 лѣтъ почва (черноземъ) въ саду Высшаго Училища въ Софії только разъ достигла $-0,5^{\circ}$ на глубинѣ 35 см. Въ 1898 году средняя годовая температура воздуха была $10,1^{\circ}$, а почвы на глубинѣ 65 см. $- 12,02^{\circ}$, а на глубинѣ 125 см. $- 12,10^{\circ}$ [6].

Сливенъ.

Сливенъ находится въ бывшей Восточной Румелии и расположенъ на южныхъ склонахъ Балканъ (270 метр.), онъ лежитъ въ котловинѣ около 1 кил. шириной и 3 кил. длиной. На сѣверъ отъ него непосредственно поднимается круто Балканъ съ горой Бармукъ (750 метр. надъ моремъ); съ запада и юга городъ окружены высокими холмами и открытъ только къ востоку. Здѣсь протекаетъ небольшая рѣчка Куручъ. На востокѣ въ 7 килом. отъ города находится небольшой лѣсъ, состоящій изъ буковъ, дуба, осины, вяза, тополя; въ другихъ мѣстахъ всѣ склоны горъ покрыты кустарниками: шиповникомъ, бузиной, жимолостью и сиренью. Изъ фруктовыхъ деревьевъ здѣсь преобладаютъ: груши, яблони, сливы, миндальныя деревья. Виноградъ растетъ въ изобиліи.

Хотя здѣсь и дуетъ почти постоянный сѣверо-западный вѣтеръ, но климатъ очень мягкий. Разница между максимальной и минимальной суточной температурой въ среднемъ за 1899 годъ была $5,4^{\circ}$, а между температурами въ 2 часа по полудни и въ 9 час. вечера только $4,3^{\circ}$. Относительно такой малой амплитуды Сливенъ занимаетъ первое мѣсто въ Болгаріи.

Въ продолженіе периода 1894 — 1900 гг. максимальная температура воздуха въ тѣни была 39,0 (въ августѣ 1896 года), а минимальная — $12,6^{\circ}$ (въ январѣ 1894 года).

Слѣдующая таблица представляетъ количество атмосферныхъ осадковъ въ литрахъ въ различные мѣсяцы за семь лѣтъ:

Мѣсячное количество атмосферныхъ осадковъ въ Сливенѣ въ литрахъ.

Мѣсяцъ.	1894.	1895.	1896.	1897.	1898.	1899.	1900.	Сред- нее за 7 лѣтъ.
Январь.	0	181	10	99	13	11	78	56
Февраль.	10	153	5	30	33	9	114	50,6
Мартъ.	35	34	17	71	46	39	35	39,6
Апрѣль.	18	45	(5)	103	25	35	74	43,6
Май.	35	67	80	223	38	62	50	76,4
Июнь.	35	67	80	223	38	62	101	86,6
Июль.	3	22	3	54	96	42	60	40,0
Августъ.	66	5	26	0	194	67	5	61,9
Сентябрь.	33	7	65	30	4	65	14	31,1
Октябрь.	37	28	0	24	14	70	12	26,4
Ноябрь.	14	38	118	1	0	12	98	41,6
Декабрь.	38	26	56	16	8	90	127	51,6

Среднее годовое 605 литр.

Всѣ выдающіеся энтомологи выбирали мѣстомъ собиранія насѣкомыхъ именно Сливенъ по причинѣ мягкости климата въ этой мѣстности. Здѣсь въ 30-годахъ прошлаго столѣтія остановилась экспедиція Фривальдскаго, здѣсь собирали бабочекъ Johann и Ludmilla Haberhauer (1861 — 62), сюда пріѣзжали англичане гг. Elwes и Nicholl и, наконецъ, сюда былъ посланъ и Dr. Rebel изъ Вѣны. Такіе рѣдкіе виды, какъ *Chariclea delphinii*, *Ch. victorina*, *Ch. treitschkei*, *Thais cerisyi*, *Crateronyx balcanica*, *Saturnia caecigena* и проч. были найдены здѣсь. Благодаря Хр. Пигулеву, учителю въ Сливенской Гимназіи (мюнхенскому воспитаннику), фауна Сливена можетъ считаться изслѣдованной въ достаточной степени. Нелишнимъ будетъ упомянуть, что здѣсь живетъ постоянно торговецъ насѣкомыми Josef Haberhauer.

Шуменъ.

Этотъ городъ находится на сѣверѣ отъ Балканъ (Прѣславска Планина) и лежитъ въ западномъ концѣ долины (230 метр.), имѣющей въ длину около 20 килом. и въ ширину около 10 килом. На

западъ, съверъ и югъ поднимаются горы, около 200 метр. надъ городомъ. Здѣсь течеть ручеекъ, берущій свое начало въ окружающихъ горахъ. Въ долинѣ находятся небольшіе лѣса (дубъ, рѣдко береза), а на горахъ растетъ орѣшникъ и дикий тернъ. Къ востоку долина открыта и выходитъ къ г. Варнѣ на Черномъ морѣ. Изъ фруктовыхъ деревьевъ преобладаютъ: вишни, яблоки, груши, сливы, абрикосы, миндальныя и тутовыя деревья. Имѣется много луговъ. Лѣтомъ здѣсь очень жарко, а зимой температура умѣренна.

Тырново.

Тырново лежить на склонахъ холмовъ на съверъ отъ Балканъ (190 метр.); здѣсь протекаетъ рѣка Янтра. Окрестности каменистыя и сухія. Небольшіе лѣса лежать на съверъ, югъ и на съверо-востокъ отъ города. Изъ деревьевъ и кустарниковъ преобладаютъ: вязъ, тополь, орѣхъ, орѣшникъ, сирень, вишня, яблоня, груша, слива, абрикосъ, тутовое дерево; имѣется и виноградъ.

Варна.

Этотъ городъ лежить на берегу Чернаго моря. Мѣсто ровное. На западъ лежать два большихъ озера (прѣсноводныя), изъ которыхъ одно имѣть 5 килом. въ длину и 2 — 3 килом. въ ширину (глубина около 200 метр.); черезъ нихъ протекаетъ рѣка Девненская. Имѣется много луговъ и виноградниковъ. На съверѣ находятся на разстоянїи 10 килом. отъ города кустарники, а на югъ и западъ небольшіе лѣса, состоящи преимущественно изъ дуба.

Перемѣна температуры воздуха днемъ и ночью такая-же малая, какъ и въ Сливенѣ. Средняя годовая температура составляетъ $12,9^{\circ}$. Среднее годовое количество атмосферныхъ осадковъ на 1 кв. метр. составляетъ 469 литровъ.

Габрово.

Габрово лежить на съверномъ склонѣ Балканъ по другую сторону Шипкинскаго прохода (375 метр.). На съверъ, западъ и востокъ простираются голые невысокіе холмы. Здѣсь протекаетъ рѣка Янтра, берущая свое начало въ Балканахъ. По направлению къ Балкану тянутся небольшіе лѣса, состоящіе преимущественно изъ дуба. Изъ фруктовыхъ деревьевъ преобладаютъ сливы и дикія яблони; винограду нѣть, луговъ сравнительно мало.

Перемѣна температуры днемъ и ночью здѣсь сильнѣе, чѣмъ въ Софии, и составляетъ въ среднемъ за годъ $7,2^{\circ}$. Средняя годовая температура составляетъ $10,1^{\circ}$.

Рыло.

На границѣ между Болгаріей и Турціей находится горный кряжъ Рыло, отъ котораго на востокъ простираются Родопы. Здѣсь находится гора Мусалла (2930 метр. надъ моремъ) и цѣлый рядъ другихъ высокихъ (2300—2500 метр.) горъ. На высотѣ 1100 метр. построенъ Рыльскій монастырь, а при подошвѣ лежитъ село Рыло. Надъ монастыремъ возвышается Еленинъ-Върхъ (2400 метр.). Здѣсь лежитъ нѣсколько небольшихъ озеръ съ очень холодной водой, изъ которыхъ нѣкоторыя не оттаиваютъ и лѣтомъ (напр. Бозлу-Гъоль).

Растительность здѣсь очень пышная, а склоны горъ покрыты дѣственными лѣсами на громадномъ пространствѣ. Такъ какъ горы этого хребта самыя высокія на Балканскомъ полуостровѣ, то онѣ были изслѣдованы различными учеными въ разныхъ отношеніяхъ. Такъ, сербскій проф. Цвіичъ нашелъ здѣсь слѣды глетчеровъ, давно, впрочемъ, исчезнувшихъ. Проф. Веленовскій (въ Прагѣ) нашелъ здѣсь много рѣдкихъ растеній, изъ которыхъ достаточно упомянуть *Geum bulgaricum*. Здѣсь найдены также такие рѣдкія формы бабочекъ, какъ: *Lycaena eumedon* var. *fyl-*

gia, *Argynnис pales* var. *graeca*, *Erebia gorgone* var. *rhodopensis*, *Erebia ceto*, *Erebia tyndarus* var. *ottomana*, *Erebia euryale* и проч.

Село Рыло лежитъ въ небольшой долинѣ, закрытой со всѣхъ сторонъ горами, и поэтому климатъ здѣсь необыкновенно теплый. Можно сказать, что это мѣсто и Сливенъ представляютъ эльдорадо Болгаріи въ энтомологическомъ отношеніи.

Петроханъ.

На сѣверъ отъ Софіи на Балканскомъ хребтѣ находится *Гинчевскій проходъ*, пролегающій около горы Комъ (1966 метр. надъ моремъ). Здѣсь находился въ старину ханъ (гостинница) «Петроханъ», а теперь стоитъ отель «Скобелевъ II» (1100 метр. надъ моремъ). Сѣверный склонъ Балканъ, а также и самыи хребты покрыты крупнымъ лѣсомъ, по которому течетъ много ручейковъ. Южный склонъ безлѣсный и голый, а также и безводный.

Здѣсь была поймана *Lycaena zephyrus*.

Рущукъ.

Въ сѣверной Болгаріи на Дунай лежитъ Рущукъ (40 метр.). Кругомъ мѣсто почти ровное. Въ 10 килом. находится «Образцовый чифликъ» — сельско-хозяйственное училище, гдѣ имѣется лѣсъ и много луговъ. Въ этомъ-то мѣстѣ преимущественно и были собраны бабочки В. Ковачевымъ и А. Дрѣновскимъ.

Климатъ здѣсь степной.

Другія мѣста не представляютъ для насъ интереса, такъ какъ тамъ до сихъ поръ не было найдено особыхъ видовъ бабочекъ, и поэтому они здѣсь не описываются. Достаточно сказать, что они находятся:

Филишополь въ южной Болгаріи (160 метр.),

Бѣлово между Софией и Филиппополемъ,
Самаковъ между Софией и Рыло (950 метр.),
Видинъ на Дунаѣ въ с. западной Болгаріи (40 метр.),
Дупница между Софией и Рыло,
Бѣла между Рущукомъ и Тырновомъ,
Садово около Филиппополя,
Калоферъ на южныхъ склонахъ Балканъ около Филиппополя,
Казанлыкъ тоже,
Т. Пазаржикъ около Филиппополя,
Ломъ на Дунаѣ около Видина (40 метр.),
Котель близь Сливена, внутри Балканъ,
Разградъ между Рущукомъ и Шуменомъ (205 метр.).

Номера авторовъ, приводимыхъ въ слѣдующемъ за симъ ли-
тературномъ указателѣ по лепидоптерології, стоять въ спискѣ
бабочекъ въ []; тамъ, где этого номера неѣть, нужно подра-
зумѣвать меня. Цифры, стоящія въ (), означаютъ высоту въ
метр. надъ уровнемъ моря. Время летанія бабочекъ приведено
по новому стилю.

Литературные указанія по лепидоптерології.

1. **Б.** Гасеницы по горитѣ и овощнитѣ дѣрвета.—Орало,
иллюстр. вѣстникъ на землед. и стопанство. Органъ на Бѣлгар-
ското Земледѣлческо Дружество въ София. Год. VI. № 11,
р. 166—168. 1899.
2. **Бахметьевъ, П.** Голѣмипата на Бѣлгарскитѣ пеперуди въ
сравнение съ Западно-Европейскитѣ.—Периодическо Списание
на Бѣлгарското Книжовно Дружество въ София. LVII, р. 34—
48. 1898.
3. **Бахметьевъ, П.** Приносъ кѣмъ изучаваньето на пеперудитѣ
въ София и околността ѝ.—Годишникъ на Бѣлгарското Приро-
доизпитателно Дружество. II. № 3, р. 28—41. 1898.

4. **Валачевъ, Ив.** Нѣкои неприятели на овощнитѣ дѣрвета и прѣдназванието имъ отъ тѣхъ. — Орало, иллюстрованъ вѣстникъ за земледѣл. и стопанство. Органъ на Българското Земледѣлч. Дружество въ София. VI. № 17, р. 271—272. 1899.

4 а. **Дрѣновски, Александъръ.** Дополнительный списокъ бабочекъ Софии и окрестностей. Рефератъ, читанный въ студенческомъ природоиспытательномъ обществѣ въ Софии 23 Марта (5 Апрѣля) 1901 года.

4 б. **Дрѣновски, Александъръ.** Дополнительный списокъ бабочекъ Рущука и окрестностей. Рефератъ, читанный въ студенческомъ природоиспытательномъ Обществѣ въ Софии 23 Марта (5 Апрѣля) 1901 года.

5. **Дѣлевъ, Ст.** Два неприятеля въ училищната овощна градина. — Садово, селско-стопанско списание. III. № 7—8, р. 251—252. Садово 1900.

6. **Йоакимовъ, Д.** Приносъ къмъ фауната отъ насѣкоми на Рила-планина. — Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ София. LIX, р. 758—778; LX, р. 858—884. 1899.

7. **Кирковъ, Г.** Врѣдоноснитѣ въ помологията насѣкоми. — Годишникъ на Българското Природоизпитателно Дружество. III. № 4, р. 50. 1900.

8. **Ковачевъ, В. Т.** Материяли за изучване на българската фауна. — Периодическо Списание на Българско Книжовно Дружество въ София. XLVII, р. 742—749. 1894.

9. **Ковачевъ, В. Т.** Материяли по фауната на Русенската околнostъ. — Годишникъ на Българското Природоизпитателно Дружество. II. № 3, р. 20—28. 1898.

10. **Малковъ, К.** Насѣкоми по младата рябица. — Орало, иллюстр. вѣстникъ за земледѣл. и стопанство. Органъ на Българското Земледѣл. Дружество въ София. Год. III. № 24, р. 418—419. 1896.

11. **Малковъ, К.** Неприятели по земледѣлските растения, появени въ голѣмъ размѣръ въ изпитателното поле на Русенското

Държавно Земед. Училище прѣзъ 1898 и 1899 год. — Садово, селско-стопанско списание. III. № 9, р. 332 — 336; № 10 — 11, р. 385 — 388. Садово 1900.

12. **Марковичъ, А.** Приносъ къмъ Lepidopter-ите на Разград. околностъ. — Свѣтулка. Органъ на Българското Ентомологическо дружество. I. № 5, р. 34 — 35. 1900.

12 а. **Марковичъ, А.** Материали по насѣкомата фауна на Разградската околностъ. — Трудове на Българската Природоизпитателно Дружество. II. София 1901. [Находится въ печати].

13. **Недѣлковъ, Н.** Нѣколко думи за вредителните насѣкоми, които се появиха у нашенско по ралицата прѣзъ 1894 година. — Природа, иллюстр. журн. за наука, стопанство, ловъ и рыболовство. II. № 5, р. 77 — 80. София 1895.

14. **П.** Ново намѣрени пеперуди. — Свѣтулка. Органъ на Българското Ентомологическо Дружество. I. № 2, р. 14. 1899.

15. **П. Х.** Приносъ къмъ фауната отъ насѣкоми на Рила-планина. Отъ Д. Иоакимовъ. — Свѣтулка. Органъ на Българското Ентомологическо Дружество. I. № 5, р. 38. 1900.

16. **Пигулевъ.** *Pieris napi* L. — Свѣтулка. Органъ на Българското Ентомологическо Дружество. I. № 3, р. 22; № 4, р. 32. 1899.

17. **Пигулевъ, Хр.** Вертикалното распределение на пеперудите при Сливенъ. — Свѣтулка. Органъ на Българското Ентомологическо Дружество. I. № 1, р. 2 — 3. 1899.

18. **Пигулевъ, Хр.** Насѣкомите при Сливенъ. I. Lepidoptera (пеперуди). — Свѣтулка. Органъ на Българското Ентомологическо дружество. I. № 1, р. 6 — 8; № 2, р. 14 — 16; № 3, р. 22 — 24; № 4, р. 31 — 32. 1899; № 5, р. 39 — 40. 1900.

18 а. **Пугулевъ, Х.** [Рукопись безъ названія, полученная мною отъ автора для справокъ. 1901].

19. **Тодоровъ, Т.** *Botys silacealis* Hb. — Орало, иллюстриранъ вѣстникъ за земедѣлие и стопанство. Органъ на Българското Земедѣлческо Дружество въ София. Год. IV. № 16, р. 253. 1897.

20. **Тошевъ, А.** Къмъ терминологията на Българската фауна.— Периодическо Списание на Българското Книжовно Дружество въ Средецъ. XXXIX.
21. **Трифонъ.** Още единъ неприятъл на лозята. — Орало [предыдущее название]. Год. III. № 12, р. 219 — 220. 1896.
22. **Трифонъ.** Главнитѣ врѣдителни насѣкоми на трандафила и тѣхното уничтожение. — Орало, илюстр. вѣстникъ за земедѣлие и стопанство. Органъ на Българското Земедѣлческо Дружество въ София. Год. IV. № 8, р. 117 — 122; № 9, р. 130 — 131; № 10, р. 148 — 151; № 11, р. 164 — 167; № 12, р. 179 — 181; № 15, р. 232 — 235. 1897.
23. **Трифонъ.** Лозовъ молецъ. — Орало [предыдущее название]. Год. IV. № 18, р. 280 — 281. 1897.
24. **Штраусъ, Адолфъ.** Емерихъ фонъ Фривалдски върху флората и фауната на България и на Балканския Полуостровъ.— Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. VIII, р. 315 — 336. 1892; XIV, р. 86 — 101. 1897. София. [Переводъ съ венгерскаго, но еще не оконченъ].
25. ? Насѣкомитѣ въ Сливенската чипменска вода. — Свѣтулка. Органъ на Българското Ентомологическо Дружество. I. № 3, р. 20. 1899.
26. ? Гасеницитѣ на ливадарската переруда (*Eurycreon sticticalis*). — Сѣячъ, мѣсечно земедѣлческо списание за економия, земедѣлие и скотоводство. III. № 8, р. 507. Варна. 1900.
-
27. **Bachmetjew, P.** Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Sofia (Bulgarien) und Umgebung. — Societas Entomologica. XI. № 17, р. 140 — 141; № 18, р. 150 — 151. 1896; № 20, р. 166 — 167; № 21, р. 174; № 23, р. 191; № 24, р. 198 — 199; XII. № 1, р. 5; № 2, р. 14. 1897.
28. **Bachmetjew, P.** Ueber die Dimensionen der bulgarischen Schmetterlinge in Vergleich zu den West-Europäischen. — So-
(394)

- cietas Entomol. XIV. № 4, p. 25—26; № 5, p. 35—36; № 6, p. 43—45; № 7, p. 49—51. 1899.
- 28 a. **Elwes**: Proc. Entomol. Soc. London. 1900.
29. **Frivaldszky, Imre**. Közlések, á Balkány vidékén tett természettudományi utazásról. — A' Magyar Tudós Társaság' Évkönyvei [Годовыя извѣстія венгерскаго ученаго Общества]. Bd. II, p. 235—276. 1832—1834. Budán 1835.
30. **Haberhauer, Jos.** sen. Einige lepidopterologische Bemerkungen. — Societas Entomologica. VII. № 9, p. 66. 1892.
- 30 a. **Hofmann, Ernst**. Die Gross-Schmetterlinge Europas. Zweite Auflage. XXXXI + 240 pag. Stuttgart. 1894.
31. **Lederer, Julius**. Verzeichniss der von Herrn Johann und Frau Ludmilla Haberhauer 1861 und 1862 bei Varna in Bulgarien und Sliwno in Rumelien gesammelten Lepidopteren. — Wiener Entomol. Monatsschr. VII, p. 17—27; p. 40—47. 1863.
32. **Malinovsky von**. Упомянутъ въ «Aufzählung der im Jahre 1865 in der Dobrudscha gesammelten Schmetterlinge» von Josef Mann [Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien. XVI, p. 321—360. 1866.].
33. **Mann, Josef**. Aufzählung der im Jahre 1865 in der Dobrudscha gesammelten Schetterlinge. — Verh. der k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien. XVI, p. 321—360. 1866.
34. **Ménétriés, Ed.** Insectes nouveaux de la Turquie. — Bull. scient. de l'Acad. des Sc. de St.-Pétersb. I. 1836.
35. **Ménétriés, Ed.** Catalogue d'insectes recueillis entre Constantinople et le Balkan. — Extr. des Mémoires de l'Acad. Impér. des Sciences de St.-Pétersbourg., VI-e sér., t. V. 1838.
36. **Mische**. Bemerkungen über *Thais cerisyi* und einige andere Lepidopteren. — Societas Entomologica. IV. № 14, p. 112. 1889.
37. **Nicholl, Marie B. de la**. Bulgarien Butterflies. — The Entomologist's Record and Journal of Variation. Vol. XII. № 2, p. 29—34; № 3, p. 64—69. 1900.

38. **Rebel, H.** Bericht über eine zoologische Forschungsreise nach Bulgarien und Ostrumelien.—Jahresbericht der Gesellschaft zur Förderung der Naturhistorischen Erforschung des Orients in Wien für das Jahr 1896. Wien.

39. **Rühl, Fritz.** Ueber *Saturnia caecigena*.—Societas Entomologica. IV. № 9, p. 71. 1889.

40. **Rühl, Fritz.** Die Raupen von *Thais cerisyi* Boisd.—IV. № 12, p. 96—97. 1889.

I. Macrolepidoptera.

Rhopalocera.

1. **Papilio podalirius** L.—Въ Софії, Рущукъ [9], Разградъ [12], Сливенъ [18]; близь Рыло [6], обыкновенна; 1-я генерація въ апрѣль и маѣ, 2-я отъ средини іюля до конца сентября; въ Добруджѣ [33]—въ маѣ и іюль.

2. **Papilio machaon** L.—Въ Софії очень рѣдка, въ іюль; чаще въ Рущукѣ [9] въ концѣ апрѣля, въ маѣ, іюнѣ, іюль и августѣ; въ Разградѣ [12] въ срединѣ лѣта; въ Сливенѣ [18] въ маѣ до сентября; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль, но рѣдко.

3. **Thais cerisyi** B.—Въ Тырновѣ замѣчена Его Королевскимъ Высочествомъ княземъ Болгарскимъ Фердинандомъ I. Обыкновенна въ Сливенѣ [18], въ маѣ и іюнѣ; въ Разградѣ [12] очень рѣдка, въ маѣ; тоже и въ Рущукѣ [46]; въ Шипкѣ [36] отъ средины іюня до конца іюля; въ Каваклѣ и Шуменѣ [18 а] въ маѣ и іюнѣ.

4. **Thais polyxena** Schiff.—Въ Софії не особенно рѣдка, въ срединѣ іюня; въ Сливенѣ [18] въ маѣ, іюнѣ и іюль; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ и іюнѣ.

5. **Parnassius apollo** L.—Въ Софії рѣдка, въ іюнь (1000 метр.); въ Сливенѣ [18] въ апрѣль, маѣ и іюнь на высотѣ 1000 метр.;

въ Костенецѣ [37] въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; также въ Калоферѣ, Котелѣ и бл. Рыло [18 а].

6. *Parnassius mnemosyne* L. — Въ маѣ и іюнѣ обыкновенна въ Софії, Рущукѣ [9], Сливенѣ [18], Разградѣ [12 а], близь Рыло [6], въ Добруджѣ [33].

7. *Aporia crataegi* L. — Въ іюнѣ въ огромномъ количествѣ въ Софії; близь Рыло [6]; въ Рущукѣ [9] въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ; въ Разградѣ [12] раннимъ лѣтомъ; въ Сливенѣ [18] обыкновенна отъ мая доавгуста; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюнѣ — іюль.

8. *Pieris brassicae* L. — Въ Софії рѣдка, въ апрѣлѣ; въ Рущукѣ [9] довольно обыкновенна въ маѣ — сентябрѣ; около Рыло [6] обыкновенна (въ іюнѣ); въ Разградѣ [12 а] обыкновенна въ лѣтніе мѣсяца; въ Сливенѣ [18] не встрѣчается; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, обыкновенна.

9. *Pieris krueperi* Stgr. — Въ началѣ апрѣля пойманы два экземпляра въ Разградѣ [18 а].

10. *Pieris rapae* L. — Обыкновенна въ Софії, въ апрѣлѣ — сентябрѣ; также въ Рущукѣ [9], бл. Рыло [6], въ Сливенѣ [18], Разградѣ [12 а]; обыкновенна въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

11. *Pieris rapae* var. *manni* Mayer. Близь Рыло поймана въ концѣ іюня г-жей Nicholl [37], которая однакоже дѣлает замѣчаніе: «not very well marked».

12. *Pieris ergane* Hb. — Въ Софії рѣдка, въ іюнѣ и іюль; въ Рущукѣ [9] пойманъ только одинъ экземпляръ въ іюль; въ Разградѣ [12] обыкновенна въ іюнѣ, іюль иавгустѣ; въ Сливенѣ [37] въ іюль.

13. *Pieris napi* L. — Въ Софії [4 а] рѣдка, въ концѣ іюня; въ Рущукѣ [9] тоже, въ апрѣлѣ —августѣ, гусеницы превращаются въ куколки въ началѣ ноября [10]; въ Сливенѣ [18] пойманъ только одинъ экземпляръ 8 марта 1899; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ.

14. *Pieris daplidice* L. — Въ Софії не часто, въ іюнѣ и іюль; въ Рущукѣ [9] довольно распространена въ маѣ —августѣ; въ

Разградѣ [12] обыкновенна, въ маѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюлѣ [37]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюнѣ.

15. *Pieris daplidice* var. *bellidice* Hb.—Въ Рущукѣ [9] и въ Сливенѣ [18] въ маѣ.

16. *Pieris chloridice* Hb.—Очень рѣдка въ Сливенѣ [18], въ августѣ и сентябрѣ; въ Разградѣ [12 а].

17. *Anthocharis belia* Cr.—Въ концѣ апрѣля въ Рущукѣ [97], рѣдка; въ Сливенѣ [18] обыкновенна, въ маѣ; въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюнѣ.

18. *Anthocharis belia* var. *ausonia* Hb.—Въ Сливенѣ [18] въ концѣ августа; въ Разградѣ [12 а].

19. *Anthocharis cardamines* L.—Въ Софії обыкновенна въ маѣ и іюнѣ (1700 метр.); въ Рущукѣ [9] въ апрѣль и маѣ; въ Разградѣ [12] рѣдка, въ апрѣль; въ Дунницѣ [63] обыкновенна (іюнь); въ Сливенѣ [18] въ маѣ; на Рыло [37] въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ — іюнѣ.

20. *Anthocharis euphenoides* Stgr.—Въ Дунницѣ [6] обыкновенна (іюнь).

21. *Leucophasia sinapis* L.—Обыкновенна въ Софії, отъ начала апрѣля до конца августа; въ Рущукѣ [9] рѣдка, въ іюнѣ — августѣ; въ Сливенѣ [18]; при Рыло [37] въ іюлѣ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ маѣ и іюлѣ.

22. *Leucophasia sinapis* var. *lathyri* Hb. Въ Софії рѣдка, въ маѣ.

23. *Leucophasia sinapis* var. *erysimi* Bkh.—Въ Софії рѣдка (1100 метр.), въ августѣ.

24. *Leucophasia sinapis* var. *diniensis* B. Въ Софії рѣдка, въ сентябрѣ.

25. *Leucophasia duponcheli* Stgr.—Приведена въ фаунѣ Сливена [18], но безъ указанія времени нахожденія; въ южной Болгаріи [18 а] въ іюнѣ и іюлѣ.

26. *Colias hyale* L.—Очень обыкновенна въ Софії, въ іюлѣ — сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюлѣ — августѣ; въ Разградѣ [12 а] обыкновенна въ іюнѣ — сентябрѣ; въ Сливенѣ [18] въ трехъ

генераціяхъ оть мая до сентября; въ Добруджѣ [33] обыкновенна въ іюль.

27. *Colias chrysotheme* Esp.—Около Сливена [18] пойманъ одинъ экземпляръ 28 августа 1898 года; въ Добруджѣ [33] рѣдко, въ маѣ.

28. *Colias erate* Esp.—Очень рѣдка въ Рущукѣ [4 b], въ іюнь.

29. *Colias myrmidone* Esp.—Близь Рыло и въ Костенецѣ [4 a], въ іюнь и іюль [37]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

30. *Colias myrmidone* var. *alba* Stgr.—Въ Самаковѣ и Костенецѣ [4 a], въ іюнь и іюль [37].

31. *Colias edusa* F.—Очень распространена въ Софії оть іюня до октября; также и въ Рущукѣ [9] оть мая до сентября; обыкновенна въ Разградѣ [12] оть іюня до сентября; близь Рыло [6] (іюнь); въ Сливенѣ [18] въ двухъ генераціяхъ въ маѣ—октябрѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль.

32. *Colias edusa* var. *helice* Hb.—Въ Сливенѣ [18] какъ постѣдняя лѣтнія генерація; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюль.

33. *Rhodocera rhamni* L.—Обыкновенна въ Софії, въ апрѣль—іюнь; въ Рущукѣ [9] въ маѣ, іюнь и августѣ; въ Разградѣ [12] рѣдка въ лѣтніе мѣсяцы; въ Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ маѣ и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль, не рѣдка.

34. *Rhodocera farinosa* Z.—Въ центральной Болгаріи въ іюнь, но рѣдка [18 a].

35. *Thecla betulae* L.—Въ Сливенѣ [18] рѣдка, въ іюнь; въ Софії поймана ♀ 10. VII. 1901.

36. *Thecla spini* Schiff.—Въ Софії (1100 метр.), въ іюль; въ Сливенѣ [18] рѣдка, въ іюнь (400 метр.); въ Добруджѣ въ іюнь, не рѣдка.

37. *Thecla ilicis* Esp.—Въ Софії (1100 метр.) въ іюль; въ Сливенѣ и Костенецѣ въ іюль [37]; въ Добруджѣ [33] въ іюнь.

38. *Thecla ilicis* var. *aesculi* Hb.—Въ іюль близь Рыло [6] обыкновенна.

39. *Thecla acaciae* F.—Въ Софії въ іюль; въ Рущукѣ [9] и Сливенѣ [18] (очень рѣдка) въ іюнь и іюль; въ Гинцевскомъ проходѣ [37] въ началѣ августа; въ Добруджѣ [33] рѣдка.

40. *Thecla pruni* L.—Въ Сливенѣ [18] въ іюнь; въ Самаковѣ, Тырновѣ, Калоферѣ [18 а], въ маѣ и іюнь.

41. *Thecla quercus* L.—Въ Софії (1100 метр.) въ августѣ; въ Сливенѣ [18] пойманъ одинъ только экземпляръ 26 мая 1896 года; въ Гинцевскомъ проходѣ [37] въ началѣ августа.

42. *Thecla rubi* L.—Въ Софії въ іюль; въ Сливенѣ [18], Рущукѣ [4 б], на Рыло [37] въ іюнь и іюль; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ.

43. *Thesstor nogelli* H. S.—Въ Добруджѣ [33] въ концѣ іюня.

44. *Polyommatus virgaureae* L.—Въ Софії рѣдка, въ августѣ и сентябрѣ, часто на Мургашѣ и въ Костенецѣ; на Рыло [37] въ іюль; въ Сливенѣ [18] очень рѣдко, въ маѣ — августѣ.

45. *Polyommatus virgaureae* var. *miegii* Vogel.—Въ августѣ на Мургашѣ.

46. *Polyommatus thersamon* Esp.—Въ Софії (1100 метр.) въ маѣ, іюнь и августѣ; очень распространена въ Рущукѣ [9] въ іюнь — августѣ; обыкновенна въ Разградѣ [12] въ маѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюль и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль; тоже и въ Тырновѣ, Самаковѣ, Шуменѣ [18 а].

47. *Polyommatus thersamon* var. *amphale* Esp.—Рѣдка въ Костенецѣ, въ апрѣль и сентябрѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

48. *Polyommatus dispar* Hw.—Въ Разградѣ [12 а].

49. *Polyommatus dispar* var. *rutilus* Wernb.—Рѣдка въ Костенецѣ, въ сентябрѣ; около Рыло [37] въ іюль.

50. *Polyommatus hippothoë* L.—Въ Разградѣ [12]; въ Сливенѣ [18] въ іюль и августѣ. Въ Софії [4 а] (800 метр.) очень рѣдка, въ началѣ іюля; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ маѣ, рѣдка.

51. *Polyommatus alciphron* Rott.—Въ Софії (1100 метр.) рѣдка, въ августѣ; въ Сливенѣ [18] въ маѣ и іюнь; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюнь, рѣдка.

52. *Polyommatus alciphron* var. *gordius* Sulz. — Въ Софії въ маѣ и іюнѣ; обыкновенна у Рыло [6] въ іюнѣ.

53. *Polyommatus dorilis* Hufn. — Въ Софії обыкновенна въ апрѣль, маѣ, августѣ и сентябрѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюнѣ и августѣ; на Рыло [37] въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюлѣ.

54. *Polyommatus phlaeas* L. — Обыкновенна въ Софії въ іюнѣ и октябрѣ; въ Костенецѣ въ апрѣль и сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ августѣ; обыкновенна въ Сливенѣ [18], въ маѣ и августѣ; на Рыло [37] въ іюлѣ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюлѣ, рѣдка; въ Филиппополѣ и Самаковѣ [18 а].

55. *Polyommatus phlaeas* var. *eleus* F. — Нерѣдка въ Софії, въ августѣ и іюлѣ; въ Рущукѣ [4 б] очень рѣдка, въ августѣ.

56. *Lycaena baetica* L. — Въ Сливенѣ [18] въ іюлѣ и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, рѣдка.

57. *Lycaena telicanus* Lang. — Въ Софії [4 а] рѣдка, въ концѣ іюля (800 метр.).

58. *Lycaena balcanica* Frr. — Въ Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ маѣ и іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ и августѣ.

59. *Lycaena tiresias* (?) Rott. — Въ Добруджѣ [33] въ маѣ, рѣдка.

60. *Lycaena argiades* Pall. — У Сливена [18] въ двухъ генераціяхъ, отъ мая до сентября; въ Софії [37] въ іюнѣ.

61. *Lycaena trochilus* Frr. — Близь Сливена [18], въ іюлѣ и августѣ.

62. *Lycaena argyrotoxus* Bgstr. — Обыкновенна въ Софії, въ маѣ, іюнѣ и августѣ до октября; въ Рущукѣ [9] тоже, въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ; въ Сливенѣ [18] отъ мая до октября; въ Самаковѣ [37] въ (іюлѣ); въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

63. *Lycaena argus* L. — Въ Софії рѣдка, въ маѣ и августѣ; въ Сливенѣ [18] обыкновенна отъ мая до октября; въ Гинцевскомъ проходѣ [37] въ началѣ августа; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.

64. *Lycaena zephyrus* Friv. — Въ Гинцевскомъ проходить [37] въ началѣ августа; на южныхъ склонахъ Балканъ [29] въ іюнѣ.

65. *Lycaena orion* Pall. — Въ Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ августѣ и іюль [37]; на Рыло и въ Костенецѣ въ іюль [37]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ, рѣдка.

66. *Lycaena orion* var. *nigricans*. — Встрѣчается часто въ Софіи (800 метр.).

67. *Lycaena baton* Bgstr. — Въ Рущукѣ [9] въ іюнѣ; обыкновенна въ Сливенѣ [18] отъ мая до сентября; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль; въ Тырновѣ, Софіи [18 a].

68. *Lycaena astrarche* Bgstr. — Въ Софіи рѣдко, въ іюнѣ, августѣ и сентябрѣ (1100 метр.), чаще въ Мургашѣ; въ Рущукѣ [9] въ августѣ; обыкновенна въ Сливенѣ [18] въ двухъ генераціяхъ отъ мая до сентября; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюнѣ.

69. *Lycaena astrarche* ab. *allous* Hb. — Очень рѣдка въ Софіи (1100 метр.), въ августѣ.

70. *Lycaena astrarche* var. *aestiva* Stgr. — Очень рѣдка въ Софіи (1100 метр.).

71. *Lycaena anteros* Frr. — Близъ Сливена [18] въ маѣ и іюнѣ; въ Костенецѣ и на Рыло въ іюль [37]; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Самаковѣ [18].

72. *Lycaena eros* O. — Въ Софіи рѣдка, въ маѣ; въ Разградѣ [12 a].

73. *Lycaena eros* var. *eroides* Frv. — Въ Софіи рѣдка, въ іюнѣ; на Рыло и въ Костенецѣ въ іюль [37]; на южныхъ склонахъ Балканъ [29] въ іюнѣ.

74. *Lycaena icarus* Rott. — Обыкновенна въ Софіи, въ маѣ — сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюль, августѣ; близъ Рыло [6] въ іюнѣ пойманъ одинъ экземпляръ и въ іюль [37]; обыкновенна въ Сливенѣ [18] въ 2—3 генераціяхъ; въ Разградѣ [12 a]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ — іюль.

75. *Lycaena icarus* ab. *icarinus* Scriba. — Нерѣдка въ Софії, въ маѣ и іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.

76. *Lycaena eumedon* Esp. — Обыкновенна у Рыло [6] въ іюнѣ и іюль [37]; рѣдка въ Сливенѣ [18] (1100 метр.) въ іюль; въ Добруджѣ [37] въ іюль, рѣдка.

77. *Lycaena eumedon* var. *fylgia* Spångb. — На Рыло [37] въ іюль.

78. *Lycaena amanda* Schn. — Нерѣдка въ Софії, въ іюнѣ — августѣ, а въ Рущукѣ [9] еще и въ сентябрѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; близь Рыло [37] въ іюль.

79. *Lycaena escheri* Hb. — На Рыло [37] въ іюль.

80. *Lycaena bellargus* Rott. — Обыкновенна въ Софії, въ маѣ — октябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ августѣ и сентябрѣ; бл. Рыло [6] въ іюнѣ, іюль [37]; въ Разградѣ обыкновенна цѣлое лѣто; тоже и въ Сливенѣ [18] отъ мая до сентября; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюнѣ — іюль.

81. *Lycaena corydon* Poda. — Въ Софії (1100 метр.), обыкновенна, въ іюль — августѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюль; у Рыло [6] въ іюнѣ; въ двухъ генераціяхъ въ Сливенѣ [18], въ іюнѣ и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль, рѣдка.

82. *Lycaena hylas* Esp. — обыкновенна въ Сливенѣ [18] въ маѣ — августѣ; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ маѣ, рѣдка.

83. *Lycaena meleager* Esp. — Нерѣдка въ Софії (1100 метр.) и на Мургашѣ, въ іюль — сентябрѣ; въ Сливенѣ [18] въ маѣ — іюнѣ; въ Костенецѣ [37] въ іюль; на Рыло [18 а] въ іюнѣ — іюль.

84. *Lycaena admetus* Esp. — При Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ іюнѣ; въ Гинцевскомъ проходѣ [37] въ началѣ августа; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, рѣдка.

85. *Lycaena admetus* var. *ripartii* Frr. — Въ Гинцевскомъ проходѣ [37] въ началѣ августа.

86. *Lycaena damon* Schiff. — Очень рѣдка у Сливена [18] въ іюнѣ.

87. *Lycaena damon* var. *actis* H.-S.—Обыкновенна близь Рыло [6].

88. *Lycaena argiolus* Z.—Въ Софії въ апрѣль и августъ; въ Рущукѣ [9] въ іюль и августъ; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюнь, рѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—августъ.

89. *Lycaena sebrus* B.—Около Сливена [18] поймана въ одномъ экземплярѣ въ маѣ, въ іюль [37]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ, очень рѣдка.

90. *Lycaena minima* Fuessl.—Въ Добруджѣ [33], обыкновенна, въ маѣ и іюнь.

91. *Lycaena semiargus* Rott.—Въ Софії не часто, въ іюль; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ іюнь.

92. *Lycaena semiargus* var. *parnassia* Stgr.—Въ Сливенѣ [37] въ іюль.

93. *Lycaena cyllarus* Rott.—На Рыло и въ Сливенѣ [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ іюнь—іюль.

94. *Lycaena iolas* O.—Близь Сливена [18] въ іюль; въ Добруджѣ [33] очень рѣдка въ маѣ.

95. *Lycaena alcon* F.—На Рыло и въ Костенецѣ [37] въ іюль.

96. *Lycaena arion* Z.—Въ Софії (800 метр.) рѣдка, въ концѣ іюля [4 а]; въ Дупнице [6] и у Рыло [6] обыкновенна въ іюнь; въ Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль, рѣдка; въ Тырновѣ [18 а].

97. *Lycaena arion* var. *obscura* Christ.—Въ Софії (1100 метр.) въ августъ.

98. *Nemeobius lucina* L.—Въ Софії (1100 метр.) рѣдка; близь Рыло [6] обыкновенна, въ іюнь, въ іюль [37]; близь Сливена [18] очень рѣдка, въ августъ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] очень рѣдка, въ маѣ.

99. *Libythea celtis* Esp.—Въ Тырновѣ, Самаковѣ и Софії [18] въ маѣ.

100. *Charaxes jasius* L.—Х. Пигулевъ видѣлъ одинъ экземпляръ близь Сливена 2 сентября 1898 года, но не могъ его поймать [14]; лишь пойманъ другой экземпляръ тамъ-же въ августѣ 1897 года [18 a].
101. *Apatura iris* L.—Въ Софіи не рѣдка, въ іюль; въ Сливенѣ [18] въ маѣ и іюнѣ; въ Костенецѣ и Гинцевскомъ проходѣ [37] въ іюль.
- [86] 102. *Apatura ilia* Schiff.—Въ Софіи рѣдка; въ Рущукѣ [9] въ іюль; близь Сливена [18] въ маѣ.
- она 103. *Apatura ilia* var. *clytie* Schiff.—Въ Софіи не особенно рѣдка, въ іюль; въ Гинцевскомъ проходѣ [37] въ началѣ августа.
104. *Limenitis populi* L.—Одинъ экземпляръ пойманъ въ Котленскомъ Балканѣ (близь Сливена) [18]; на Рыло и въ Костенецѣ [37] въ іюль; въ Самаковѣ [18 a] въ іюнь—іюль.
105. *Limenitis camilla* Schiff.—Въ Софіи очень рѣдка (1100 метр.), въ августѣ; въ Костенецѣ [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль, рѣдка.
106. *Limenitis sibylla* L.—Въ Костенецѣ [37] въ іюль.
107. *Neptis lucilla* F.—Очень рѣдка въ іюль на Котленскомъ Балканѣ [18] въ Костенецѣ и Гинцевскомъ проходѣ [37] въ іюль.
108. *Neptis aceris* Lepech.—Въ іюль на Котленскомъ Балканѣ [18]; въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ маѣ; въ Калоферѣ, Самаковѣ [18 a] очень рѣдка, въ іюнь—іюль.
109. *Vanessa egea* Cr.—Въ Рущукѣ [9] въ іюнь—августѣ; въ Разградѣ [12] обыкновенна въ маѣ; въ Сливенѣ [18] въ двухъ генераціяхъ, оть мая до сентября; на Рыло [37] въ іюль.
110. *Vanessa egea* var. *j-album* Esp.—Въ Южной и центральной Болгаріи [18 a] въ іюль—августѣ.
111. *Vanessa c-album* L.—Обыкновенна въ Софіи, въ апрѣль, іюнь, іюль, августѣ и октябрѣ; также и въ Рущукѣ [9] въ іюль и августѣ; въ Разградѣ [12] въ маѣ; у Рыло [6] въ іюнь,

июль [37]; въ Сливенѣ [18] въ юль; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ и юль.

112. *Vanessa polychloros* L.—Обыкновенна въ Софії, въ апрѣль, іюнь, юль и сентябрь; также и въ Рущукѣ [9] въ маѣ—юль; въ Разградѣ [12] часто въ маѣ и іюнь; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ юль; въ Сливенѣ [18 а] въ апрѣль—маѣ.

113. *Vanessa xanthomelas* Esp.—Въ Софії очень рѣдка, въ концѣ іюня; въ Рущукѣ [9] въ концѣ мая; въ Дупницаѣ [6] и бл. Рыло [6] обыкновенна, въ іюнь.

114. *Vanessa l-album* Esp.—Близь Сливена [18] въ августѣ.

115. *Vanessa urticae* L.—Не особенна рѣдка въ Софії, въ апрѣль, іюнь, юль и августѣ; въ Рущукѣ [9] рѣдка въ іюнь; на Рыло [6] въ іюнь, юль [37]; въ Сливенѣ [18] рѣдка, въ маѣ и юль; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюнь.

116. *Vanessa urticae* var. *turcica* Stgr.—Въ Софії рѣдка.

117. *Vanessa io* L.—Въ Софії очень рѣдка, въ августѣ; въ Рущукѣ [9] не особенно рѣдка, въ апрѣль, іюнь, юль и августѣ; на Рыло [6] въ іюнь; въ Разградѣ [12] не рѣдка, въ маѣ; въ Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ юль; въ Добруджѣ [33] обыкновенна.

118. *Vanessa antiopa* L.—Чрезвычайно рѣдка въ Софії; въ Рущукѣ [4 б] тоже рѣдка, въ іюнь—юль; въ Сливенѣ, Тырновѣ, Самаковѣ и на Рыло [18 а] въ маѣ—іюнь.

119. *Vanessa atalanta* L.—Обыкновенна въ Софії, въ апрѣль—октябрь; также и въ Рущукѣ [9], кроме апрѣля и октября; въ Разградѣ [12]; при Рыло [6] въ іюнь, юль [37]; обыкновенна въ Сливенѣ [18] въ двухъ генераціяхъ; въ Добруджѣ [33] въ юль.

120. *Vanessa cardui* L.—Въ огромномъ количествѣ въ Софії, въ маѣ—октябрь; не особенно часто въ Рущукѣ [9] въ маѣ—августѣ; въ Дупницаѣ [6] въ іюнь; въ Сливенѣ [18] въ трехъ генераціяхъ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ юль.

121. *Malitaea cynthia* Hb.—На Рыло [37] въ юль.

122. *Melitaea maturna* L.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ—іюнь.

123. *Melitaea aurina* Rott. — На Рыло [37] въ юль; въ Добруджѣ [33] въ іюнь.

124. *Melitaea cinxia* L. — Въ Софії [4 а] не часто, въ юль (800 метр.); въ Рущукѣ [9] въ маѣ — августѣ; бл. Рыло [6] обыкновенна, въ іюнь, юль [37]; въ Сливенѣ [18] въ юль [37]; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ маѣ — іюнь.

125. *Melitaea phoebe* Knoch. — Въ Костенецѣ въ сентябрѣ; на Рыло и въ Сливенѣ [37] въ юль; въ Разградѣ [12 а] въ Рущукѣ [4 б] въ начаѣ юля; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюнь — юль; въ Сливенѣ, Тырновѣ [18 а] въ юль — августѣ.

126. *Melitaea phoebe* var. *aetherea* Ev. — Въ Добруджѣ [33] въ іюнь.

127. *Melitaea trivia* Schiff. — На Рыло [37] въ юль; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ іюнь; въ Сливенѣ [37] въ юль, въ Филиппополѣ, Тырновѣ, Самаковѣ [18 а].

128. *Melitaea trivia* var. *nana*. — Вторая генерація въ юль — августѣ въ Сливенѣ, Тырновѣ, Софії, Разградѣ [18 а].

129. *Melitaea didyma* O. — Въ Софії [4 а] не часто, въ юль (900 метр.); въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Разградѣ [12] поймана въ нѣсколькихъ экземплярахъ въ апрѣлѣ 1892 года; въ Добруджѣ [33] въ іюнь — юль, рѣдка.

130. *Melitaea didyma* var. *meridionalis* Stgr. — Въ Софії рѣдка (1100 метр.), въ августѣ.

131. *Melitaea didyma* var. ? — Въ Самаковѣ и Костенецѣ [37] въ юль.

132. *Melitaea dictynna* Esp. — На Рыло и въ Сливенѣ [37] въ юль; въ Добруджѣ [33] въ іюнь, рѣдка.

133. *Melitaea athalia* Rott. — Въ Софії (1100 метр.) въ юль; въ Рущукѣ [9] въ юль — августѣ; на Рыло [37] въ юль; въ Добруджѣ [33] въ іюнь — юль, обыкновенна.

134. *Melitaea aurelia* Nick. — Въ Рущукѣ [9] въ августѣ; на Рыло [6] въ іюнь; въ Самаковѣ [37] въ юль; въ Разградѣ [4 б].

135. *Melitaea parthenie* Brk. — На Рыло [37] въ юль.

136. *Argynnis selene* Schiff. — Въ Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ маѣ и іюнѣ; въ Разградѣ [12 а].

137. *Argynnis euphrosyne* L. — У Рыло [6] обыкновенна, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ маѣ и августѣ; на Рыло [37] въ іюлѣ; въ Разградѣ [12 а]; въ Рущукѣ [4 б] очень рѣдка, въ маѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ не рѣдка.

138. *Argynnis pales* Schiff. — На Рыло и въ Самаковѣ [37] въ іюлѣ.

139. *Argynnis pales* var. *graeca* Stdgr. — На Рыло [37] въ іюлѣ.

140. *Argynnis dia* L. — Въ Костенецѣ въ сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ маѣ и августѣ; обыкновенна въ Сливенѣ [18] въ маѣ и августѣ; на Рыло и въ Самаковѣ [37] въ іюлѣ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, очень рѣдка.

141. *Argynnis daphne* Schiff. — Съ Сливенѣ [18] въ іюнѣ; на Рыло и въ Костенецѣ [37] въ іюлѣ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, очень рѣдка.

142. *Argynnis ino* Esp. — На Рыло и въ Костенецѣ [37] въ іюлѣ; въ Добруджѣ [93] въ іюнѣ.

143. *Argynnis hecate* Esp. — На Рыло [37] въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, обыкновенна.

144. *Argynnis lathonia* L. — Обыкновенна въ Софії, въ апрѣлѣ, въ іюнѣ — сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ апрѣлѣ — августѣ; въ Разградѣ [12] обыкновенна, въ маѣ; въ Дупницѣ [6] обыкновенна, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18] въ трехъ — четырехъ генераціяхъ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ — іюлѣ, обыкновенна.

145. *Argynnis aglaja* L. — Въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюнѣ; на Рыло [37] въ іюлѣ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюлѣ.

146. *Argynnis niobe* L. — Въ Софії [4 а] рѣдка, въ концѣ іюля (900 метр.); въ Рущукѣ [9] въ іюлѣ и августѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюнѣ.

147. *Argynnis niobe* var. *eris* Mg. — На Рыло [37] въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [37] въ іюнѣ (630 метр.).

148. *Argynnis adippe* L. — У Рыло [6] въ іюнь; въ Сливенѣ [18] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль, рѣдка.

149. *Argynnis adippe* var. *cleodoxa* O. — Въ Софії [4 а] рѣдка (900 метр.), въ іюль; въ Рущукѣ [9] въ іюль; въ Сливенѣ [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюнь.

150. *Argynnis paphia* L. — Обыкновенна въ Софії и на Мургашѣ, въ іюнь — сентябрь; въ Рущукѣ [9] тоже обыкновенна, въ іюль — август; въ Сливенѣ [18] въ август; на Рыло [37]; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

151. *Argynnis pandora* Schiff. — Въ Софії (1100 мѣтр.), обыкновенна, въ іюль и август; въ Рущукѣ [9] тоже; въ Сливенѣ [18] въ іюль [37]; въ Костенецѣ [37] въ іюль; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

152. *Melanargia galathea* L. — Въ огромномъ количествѣ въ Софії, въ іюль и август; въ Рущукѣ [9] въ іюнь; въ Разградѣ [12] лѣтомъ; въ Сливенѣ [18] въ август; въ Добруджѣ [33] въ іюль, не рѣдка.

153. *Melanargia galathea* var. *turcica* B. — Въ Сливенѣ [18 а] очень рѣдка, въ іюль [37].

154. *Melanargia galathea* var. *procida* Hbst. — Въ Софії (1100 мѣтр.) въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

155. *Melanargia galathea* var. *leucomelas* Esp. — Въ Сливенѣ [18].

156. *Melanargia larissa* H.-G. — Въ Разградѣ [12] очень рѣдка, въ маѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюнь, іюль [37].

157. *Erebia epiphron* Kn. — Въ Сливенѣ [18] рѣдка, въ іюнь — іюль; на Рыло и въ Самаковѣ [37] въ іюль; въ Тырновѣ [18 а] не рѣдка.

158. *Erebia arete* F. — Въ Сливенѣ [18] въ маѣ и іюль; въ Калоферѣ [18 а].

159. *Erebia manto* Esp. — Въ Бѣловѣ [18 а] рѣдка, въ іюнь — іюль.

160. *Erebia ceto* Hb. — На Рыло [18 а] въ іюнь — іюль.

161. *Erebia ceto* var. *phorcys* Frr.—Рѣдка бл. Малка Марица [18 а], въ іюль.
162. *Erebia medusa* F.—Въ Софії (2000 метр.) въ іюль [4 а]; на Рыло [6] въ іюнь, іюль [37]; въ Добруджѣ [33]; въ Сливенѣ, Калоферѣ, Тырновѣ [18 а] въ іюнь—іюль.
163. *Erebia medusa* var. *eumenis* Frr.—Въ Сливенѣ [37] въ іюль.
164. *Erebia medusa* var. *psodea* Hb.—На Рыло [6] въ іюнь, іюль [37].
165. *Erebia medusa* var. *hippomedusa* O.—На Рыло [6] въ іюнь.
166. *Erebia oeme* Hb.—На Рыло и въ Самаковѣ [37] въ іюль.
167. *Erebia oeme* var. *spodia* Frr.
- [e] 168. *Erebia melas* Hbst.—На Рыло и у Малка Марица [18 а] въ іюнь—іюль.
169. *Erebia lappona* Esp.—На Рыло [37] въ іюль; въ Самаковѣ [18 а].
170. *Erebia tyndarus* Esp.—Около Малка Марица [18 а] въ іюль.
171. *Erebia tyndarus* var. *ottomana* H.-S.—Поймана I. Габергауеромъ на Рыло, въ іюнь—іюль [18 а].
172. *Erebia tyndarus* var. *balcanica*.
- [a] 173. *Erebia gorgane* var. *rhodopensis* Stgr.—Въ Самаковѣ [37], въ іюль.
174. *Erebia aethiops* Esp.—Въ Софії (1100—2000 метр.) не особенно часто, въ іюль, августѣ; въ Костенецѣ [37] въ іюль.
175. *Erebia ligea* L.—Въ Софії обыкновенна (1100 метр.), въ іюль; въ Костенецѣ и Самаковѣ [37] въ іюль.
176. *Erebia euryale* Esp.—На Рыло и въ Самаковѣ [37] въ іюль.
177. *Satyrus hermione* L.—Обыкновенна въ Софії (1100 метр.), въ іюль и августѣ; въ Сливенѣ [18] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

178. *Satyrus circe* F.—Въ Рущукѣ [9] въ іюнь и сентябрѣ; въ Сливенѣ [18] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль, рѣдка.

179. *Satyrus briseis* L.—Обыкновенна въ Софії (700—1100 метр.), въ іюль и августѣ. Болгарскіе экземпляры отличаются отъ зап.-европейскихъ какъ своей величиной, такъ и болѣе черной окраской [2 и 28]. Въ Сливенѣ [18] въ августѣ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

180. *Satyrus anthe* O.—Въ Рущукѣ [9] въ іюль.

181. *Satyrus semele* L.—Обыкновенна въ Софії (800—1100 метр.) и въ Костенецѣ, въ іюль—сентябрѣ; въ Сливенѣ [18] въ августѣ; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

182. *Satyrus semele* var. *aristaeus* Boh.—Въ Софії (1100 метр.) не рѣдка, въ іюль—августѣ.

183. *Satyrus arethusa* Esp.—Довольно часто въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюнь и августѣ; въ Тырновѣ [18 а].

184. *Satyrus arethusa* var. *erythia* Hb.—Обыкновенна въ Софії (800 метр.), въ августѣ; также обыкновенна и въ Рущукѣ [9], въ іюль—августѣ.

185. *Satyrus statilinus* Hfn.—Обыкновенна въ Софії (600—1100 метр.) и Костенецѣ, въ августѣ и сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Варнѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюль и августѣ.

186. *Satyrus statilinus* var. *allionia* F.—Не особенно рѣдка въ Рущукѣ [4 б] въ іюль; въ Добруджѣ [33] рѣдка.

187. *Satyrus dryas* Sc.—Въ Софії рѣдка [4 а], въ іюль и августѣ (900 метр.); въ Сливенѣ [18] въ августѣ.

188. *Pararge roxelana* Cr.—Въ Сливенѣ [18] въ августѣ; тоже въ Златицѣ, Берковицѣ [18 а].

189. *Pararge maera* L.—Въ Софії (1100 метр.) въ іюль и августѣ, не особенно рѣдка; близь Рыло [6] въ іюнь, іюль [37]; въ Сливенѣ [18] обыкновенна, въ августѣ—октябрѣ, въ іюль [37]; въ Самаковѣ [37] въ іюль; въ Разградѣ [12 а]; въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ іюнь; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ маѣ.

190. *Pararge hiera* F.—На Рыло и въ Самаковѣ [37] въ іюль.

191. *Pararge megaera* L.—Въ Софії не рѣдка, въ сентябрѣ, а на горахъ (1100 метр.) въ іюль и августѣ; въ Рущукѣ [9] обыкновенна, въ іюль; въ Разградѣ [12] обыкновенна; въ Сливенѣ [18] тоже, въ августѣ—октябрѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль.

192. *Pararge aegeria* L.—Въ Софії рѣдка, въ іюль; на Рыло [6] въ іюнь; въ Сливенѣ [18] очень рѣдка, въ августѣ; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ маѣ.

193. *Epinephele lycanon* Rott.—Въ Софії рѣдка (1100 метр.), въ іюль и августѣ; въ Рущукѣ [9] тоже; въ Сливенѣ [18] въ двухъ генераціяхъ: въ іюнь и августѣ; въ Гинцевскомъ проходѣ [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] очень рѣдка, въ іюль.

194. *Epinephele janira* L.—Въ большомъ количествѣ въ Софії, въ іюнь—сентябрѣ²⁾; также и въ Рущукѣ [9] въ маѣ—августѣ; при Рыло [6] въ іюнь; въ Разградѣ [12] обыкновенна; въ Сливенѣ [18] въ трехъ генераціяхъ; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

195. *Epinephele ida* Esp.—Въ Софії рѣдка [4 а], въ іюль (800 метр.); въ Добруджѣ [33] въ іюль, рѣдка.

196. *Epinephele tithonus* L.—Въ Сливенѣ [18] въ двухъ генераціяхъ; въ Дорбуджѣ [33] въ іюль.

197. *Epinephele hyperanthus* L.—Въ Софії (1100 метр.) рѣдка, въ іюль—августѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюнь; въ Самаковѣ [37] въ іюль.

198. *Coenonympha leander* Esp.—Въ Софії [4 а] рѣдка, въ іюль (2000 метр.); въ Сливенѣ [18] въ іюнь и іюль; на Рыло [37] въ іюль; въ Разградѣ [12 а].

199. *Coenonympha iphis* Schiff.—Въ Софії рѣдка [4 а], въ іюль—августѣ (800 метр.); на Рыло [37] въ іюль; въ Разградѣ

2) Относительно измѣняемости числа точекъ на задней сторонѣ крыльевъ у софийскихъ экземпляровъ см. мою статью «Zur Varietäten-Frage von *Epinephele janira* L.» въ «Societas entomologica», XII, № 8, p. 57. 1897.

[12 а]; въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ іюнь—іюль; въ Добруджѣ [33] тоже, но не рѣдка.

200. *Coenonympha arcania* L.—Обыкновенна въ Софії (700—1000 метр.), въ іюль—августѣ; на Рыло [37] въ іюль; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ іюнь, рѣдка.

201. *Coenonympha doris* Esp. var.?—Въ Самаковѣ и на Рыло [37] въ іюль.

202. *Coenonympha pamphilus* L.—Въ большомъ количествѣ въ Софії, въ маѣ—октябрѣ; также въ Рущукѣ [9]; при Рыло [6] въ іюнь; въ Разградѣ [12]; въ Сливенѣ [18] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ и іюль.

203. *Coenonympha pamphilus* var. *lyllus* Esp.—Въ Софії рѣдка, въ іюль, августѣ и октябрѣ; въ Сливенѣ [18] тоже.

204. *Spilothyrus alceae* Esp.—Въ Софії въ апрѣль; въ Рущукѣ [9] въ іюль—августѣ; на Рыло [37] въ іюль; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ маѣ—іюль.

205. *Spilothyrus altheae* Hb.—Въ Рущукѣ [9] въ іюль и августѣ; въ Софії [4 а] рѣдка (1000 метр.), въ іюль.

206. *Spilothyrus lavatherae* Esp.—Въ Софії [4 а] рѣдка, въ іюль (700 метр.); въ Добруджѣ [33] въ іюнь, рѣдка; въ Сливенѣ [18] въ іюль [37] и августѣ.

207. *Syrichtus sidae* Esp.—Въ Софії [4 а] рѣдка, въ іюль (700 метр.); въ Сливенѣ [18] въ іюнь и іюль [37]; въ Самаковѣ [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюнь—іюль.

208. *Syrichthus carthami* Hb.—Обыкновенна въ Сливенѣ [18] въ іюль и августѣ; на Рыло [37] въ іюль; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ іюнь, обыкновенна; въ Филиппополѣ, Калоферѣ, Самаковѣ, Софії, Тырновѣ [18 а], въ іюнь—октябрѣ.

209. *Syrichthus alveus* Hb.—Въ Софії рѣдка (1100 метр.), въ августѣ и іюнь [37]; въ Сливенѣ [18] въ августѣ и іюль [37]; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ маѣ—іюнь.

210. *Syrichthus serratae* Rbr.—Обыкновенна въ Сливенѣ
(418)

[18] въ двухъ генераціяхъ: въ маѣ и іюль; въ Костенецѣ [37] въ іюль.

211. *Syrichthus cacaliae* Rbr.—Въ Софії [4 а] очень рѣдка, въ іюль (1000 метр.); на Рыло [37] въ іюль.

212. *Syrichthus malvae* L.—Въ Софії въ іюль; въ Рущукѣ [9] въ іюль—августѣ; у Рыло [6] въ іюнь; въ Сливенѣ [18] въ августѣ и іюль [37]; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ.

213. *Syrichthus orbifer* Hb.—Въ Сливенѣ [18] въ іюнь и іюль; тоже въ Котелѣ, Филиппополѣ [18 а], но рѣдка.

214. *Syrichthus sao* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ, рѣдка.

215. *Nisoniades tages* L.—Въ Софії не рѣдка, въ апрѣль, маѣ, августѣ и сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] рѣдка, въ іюль; обыкновенна въ Сливенѣ [18] въ августѣ и іюль [37]; на Рыло [37] въ іюль; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль, обыкновенна.

216. *Hesperia thaumas* Hufn.—Въ Софії (1100 метр.) въ іюль и августѣ; въ Сливенѣ [18] въ августѣ и сентябрѣ; на Рыло [37] въ іюль; въ Разградѣ [12 а]; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль, обыкновенна.

217. *Hesperia lineola* O.—Не рѣдка въ Софії, въ іюль и августѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнь—августѣ; на Рыло [6] обыкновенна; въ Разградѣ [12 а]; въ Сливенѣ [18 а].

218. *Hesperia actaeon* Esp.—Въ Софії рѣдка (1100 метр.), въ іюль; въ Сливенѣ [18] въ іюль и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль, рѣдка.

219. *Hesperia sylvanus* Esp.—Не рѣдка въ Софії, въ іюль и августѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнь, іюль и августѣ; обыкновенна на Рыло [6] въ іюнь; въ Сливенѣ [18] въ августѣ и сентябрѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль, обыкновенна.

220. *Hesperia comma* L.—Не рѣдка въ Софії (1100 метр.), въ августѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнь—августѣ; въ Сливенѣ [18] въ іюль и августѣ; на Рыло [37] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюнь, рѣдка.

[18] 221. *Carterocephalus palaemon* Pall. — На Рыло [37] въ іюль.

Н е т е р о с е р а.

A. Sphinges.

222. *Acherontia atropos* L. — Въ Софії рѣдка, въ іюнь и октябрь; въ Рущукѣ [9] и Сливенѣ [18] въ августѣ и сентябрѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнь, рѣдка; въ Шипкѣ [36] въ октябрѣ.

223. *Sphinx convolvuli* L. — Въ Софії не особенно рѣдка, въ августѣ и сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Добруджѣ [33]; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

224. *Sphinx ligustri* L. — Въ Добруджѣ [33].

225. *Sphinx pinastri* L. — Рѣдка близь Сливена [18 а].

226. *Deilephila galii* Rott. — Въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

227. *Deilephila enphorbiae* L. — Въ Софії обыкновенна, въ августѣ и сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнь; въ Добруджѣ [33] обыкновенна; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

228. *Deilephila livornica* Esp. — Въ Софії очень рѣдка, весной; въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ сентябрѣ.

229. *Deilephila celerio* L. — Получена въ Софії изъ гусеницы, пойманной 9 сентября 1896 г.; куколка лежала 2 мѣсяца.

230. *Deilephila elpenor* L. — Въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

231. *Deilephila porcellus* L. — Въ Софії рѣдка, въ іюнь; въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ іюнь; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ — сентябрѣ.

232. *Deilephila nerii* L. — Въ Софії гусеницы встречаются часто на олеандрѣ и превращаются въ куколки въ срединѣ августа, а въ концѣ сентября даютъ бабочекъ.

233. *Smerinthus tiliae* L.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюнѣ; тоже въ Сливенѣ [18 а].

234. *Smerinthus quercus* Schiff.—Въ Сливенѣ [18 а] обыкновенна въ августѣ.

235. *Smerinthus ocellata* L.—Въ Софії не рѣдка, въ маѣ, іюль и августѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—іюль.

236. *Smerinthus populi* L.—Въ Софії не рѣдка, въ маѣ, іюль и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, рѣдка; въ Сливенѣ обыкновенна, въ маѣ—іюнѣ [18 а].

237. *Pterogon proserpina* Pall.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.

238. *Macroglossa stellatarum* L.—Въ Софії очень распространена въ маѣ, іюль, августѣ, сентябрѣ и октябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюль, августѣ и сентябрѣ; въ Разградѣ [12] въ маѣ; около Рыло [6] въ концѣ іюня и началѣ іюля; въ Добруджѣ [33] въ маѣ—іюль, обыкновенна; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—октябрѣ.

239. *Macroglossa croatica* Esp.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ, очень рѣдка.

240. *Macroglossa bombyliformis* O.—Въ Софії въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, рѣдка; тоже въ Сливенѣ [18 а].

241. *Macroglossa fuciformis* L.—Не рѣдка около Рыло [6] въ іюнѣ—іюль; тоже въ Добруджѣ [33].

242. *Trochilium apiforme* Cl.—Въ Софії не рѣдка, въ іюнѣ; тоже въ Сливенѣ [18 а].

243. *Sesia scoliaeformis* Bkh.—Рѣдка, въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—іюль.

244. *Sesia spheciiformis* F.—Рѣдка, въ іюнѣ въ Филиппополѣ [18 а].

245. *Sesia tipuliformis* Cl.—Въ Рущукѣ [9] очень рѣдка, въ маѣ; въ Филиппополѣ [18 а] въ іюль.

246. *Sesia masariformis* O.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.

247. *Sesia asiliformis* Rott.—Очень рѣдка, въ іюль въ Филиппополѣ [18 а].

248. *Sesia ichneumoniformis* F.—Рѣдка, въ Сливенѣ [18 а] въ іюль.

249. *Sesia annelata* Z.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
250. *Sesia empiformis* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ; тоже въ Сливенѣ [18 а].
251. *Sesia triannuliformis* Frг.—Въ Добруджѣ [33].
252. *Sesia doleriformis* H.-S.—Въ Филиппополѣ, Костенецѣ [18 а], въ юнѣ—августѣ.
253. *Sesia stelidiformis* Frг.—Въ восточной Болгаріи [18 а] въ юлѣ.
254. *Sesia bibioniformis* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
255. *Sesia muscaeformis* View.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
256. *Sesia prosopiformis* (?) O.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
257. *Sesia leucomelaena* Z.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ.
258. *Sesia affinis* Stgr.—Рѣдка, въ юлѣ въ Сливенѣ, Шуменѣ, Варнѣ [18 а].
259. *Sesia alysoniformis* H.-S.—Въ Софії [4 а] очень рѣдка, въ концѣ юля; тоже въ Сливенѣ [18 а].
260. *Sesia minianiformis* Frг.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ—юлѣ.
261. *Paranthrene brosiformis* (?) Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ, рѣдка (не представляетъ var. вида *tineiformis* Esp.).
262. *Paranthrene myrmosaeformis* H.-S.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ.
263. *Thyris fenestrella* Scop.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ, не рѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ.
264. *Heterogynis penella* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ.
265. *Ino pruni* Schiff.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ.
266. *Ino tenuicornis* Z.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
267. *Ino globulariae* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
268. *Ino statices* L.—Въ Софії [4 а] рѣдка (800 метр.); въ Добруджѣ [33] въ юнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ—юлѣ.
269. *Ino statices* v. *heidemreichi* Led.—Въ Софії не рѣдка, въ юнѣ; въ Добруджѣ [33] тоже.

- [268] 270. *Ino ampelophaga* Bayle.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] обыкновенна, въ іюнѣ—августѣ.
271. *Ino gergon* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, не рѣдка.
272. *Zygaena pilosella* Esp.—Въ Софіи [4 а] рѣдка (700 метр.), въ іюлѣ; въ Дупницѣ и у Рыло [6] обыкновенна, въ іюнѣ—іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.
273. *Zygaena brizae* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.
274. *Zygaena scabiosae* Scheven.—Въ Софіи (1000 метр.) не рѣдка, въ іюлѣ.
275. *Zygaena punctum* O.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ—іюлѣ, рѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.
276. *Zygaena meliloti* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.
277. *Zygaena trifolii* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, не рѣдка.
278. *Zygaena achilleae* Esp.—Въ Софіи (1000 метр.) рѣдка, въ іюлѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, не рѣдка.
279. *Zygaena lonicerae* Esp.—Въ Софіи (1000 метр.) не рѣдка, въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.
280. *Zygaena filipendulae* L.—Въ Софіи въ огромномъ количествѣ, въ маѣ и іюнѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюлѣ; обыкновенна у Рыло [6] въ іюнѣ—іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; тоже у Шипки [18 а], не рѣдка.
281. *Zygaena angelicae* O.—Въ Софіи не рѣдка (1000 метр.), въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, рѣдка.
282. *Zygaena ephialtes* L.—Въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.
283. *Zygaena ephialtes* ab. *coronillae* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.
284. *Zygaena ephialtes* ab. *medusa* Pall.—Въ Софіи очень рѣдка.
285. *Zygaena ephialtes* ab. *trigonellae* Esp.—Въ Софіи [4 а] рѣдка (700 метр.), въ іюлѣ.

286. *Zygaena sedi* F.—На южныхъ склонахъ Балканъ [29] въ іюнѣ.

287. *Zygaena laeta* Hb.—Очень рѣдка въ Софії [4 а], въ іюлѣ.

288. *Zygaena carniolica* Sc.—Въ Софії рѣдка (700 метр.), въ августѣ и сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, обыкновенна; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

289. *Syntomis phegea* L.—Въ Софії (700 метр.) въ огромномъ количествѣ, въ іюлѣ; также въ Рущукѣ [9] въ маѣ и іюнѣ; близь Рыло [6] въ іюнѣ—іюлѣ; въ Разградѣ [12] въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] не рѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

290. *Naclia ancilla* L.—Въ Софії рѣдка (1000 метр.) въ іюлѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.

291. *Naclia punctata* var. *hyalina* Fr.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ—іюлѣ.

B. Bombyces.

292. *Sarrothripa undulana* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] обыкновенна, въ августѣ.

293. *Sarrothripa undulana* ab. *dilutana* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

294. *Earias clorana* L.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Котелѣ [18 а] въ іюлѣ, очень рѣдка.

295. *Nola togatulalis* Hb.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюлѣ.

296. *Nola cucullatella* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

297. *Nola strigula* Schiff.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

298. *Nola chlamydialis* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

299. *Calligenia miniata* Forst.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—іюлѣ.

300. *Setina irrorella* Cl.—Въ Софии [4 а] очень рѣдка (700 метр.), въ юлѣ; тоже и въ Котелѣ [18 а].
301. *Lithosia muscerda* Hufn.—Въ Сливенѣ и на Рыло [18 а] въ юнѣ.
302. *Lithosia griseola* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ.
303. *Lithosia lurideola* Zinck.—Нерѣдка въ Софии въ юлѣ (1000 метр.), а на Мургашѣ въ августѣ и сентябрѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
304. *Lithosia complana* L.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ—августѣ.
305. *Lithosia caniola* Hb.—Въ Софии очень рѣдка [4 а] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ юнѣ, рѣдка.
306. *Lithosia unita* var. *palleola* Hb.—Въ Шуменѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ.
307. *Lithosia lutarella* L.—При Самаковѣ [18 а] въ юнѣ.
308. *Lithosia sororcula* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юлѣ; въ Котелѣ [18 а] тоже.
309. *Emidia striata* L.—Въ Софии рѣдка, въ юлѣ и августѣ; въ Рущукѣ [9] обыкновенна въ юлѣ и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ юлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
310. *Emidia cribrum* L.—Въ Софии [4 а] рѣдка, въ юнѣ; тоже въ Шуменѣ [18 а].
311. *Deiopeia pulchella* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ—юлѣ.
312. *Euchelia jacobaeae* L.—Въ Софии [4 а] очень рѣдка, въ юлѣ; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ.
313. *Nemeophila russula* L.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юнѣ.
314. *Nemeophila plantaginis* L.—Въ Софии [4 а] очень рѣдка (2000 метр.), въ юлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
315. *Callimorpha dominula* L.—Въ Софии [4 а] очень рѣдка (700 метр.), въ юлѣ; въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.

316. *Callimorpha hera* L.—Въ Софии (1000 метр.) почти обыкновенна, въ августѣ; въ Дупница [6] въ іюнѣ—іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ іюль—августѣ.

317. *Arctia caja* L.—Въ Софии очень рѣдка, куколка лежала шесть мѣсяцевъ и 2 сентября (1896 г.) дала бабочку; въ Сливенѣ [18 а] обыкновенна, въ іюль—августѣ.

318. *Arctia villica* L.—Въ Софии не особенно рѣдка (1000 метр.), въ іюль; въ Рущукѣ [9] въ іюнѣ; въ Разградѣ [12] обыкновенна, въ апрѣль; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюль—августѣ.

319. *Arctia purpurata* L.—Въ Софии рѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ, Бѣловѣ и на Рыло [18 а] въ августѣ.

320. *Arctia hebe* L.—Въ Рущукѣ [9] обыкновенна, въ маѣ; въ Разградѣ [12] почти обыкновенна въ апрѣль и маѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюль—сентябрѣ.

321. *Arctia aulica* L.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

322. *Arctia maculosa* Gerning.—Въ Сливенѣ и Бѣловѣ [18 а] въ іюль—августѣ, но рѣдка.

323. *Arctia casta* Esp.—Въ сѣверной Болгаріи [18 а] въ іюль.

324. *Ocnogyna parasita* Hb.—Въ Рущукѣ [9] въ апрѣль; гусеницы отъ мая до іюля въ большомъ количествѣ въ Добруджѣ [33]; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

325. *Spilosoma placida* Friv.—Въ Софии поймалъ въ 1894 году 3 экземпляра въ одинъ день и затѣмъ болѣе не встрѣчалъ; на южныхъ склонахъ Балканъ и около Филиппополя [29] въ маѣ.

326. *Spilosoma fuliginosa* L.—Въ Софии рѣдка, въ маѣ; въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ маѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ, не рѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.

327. *Spilosoma luctifera* Esp.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюнѣ.

328. *Spilosoma luctuosa* H.-G.—Въ Рущукѣ [9] очень рѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ и августѣ.

329. *Spilosoma mendica* Cl.—Въ Софії [4 а] очень рѣдка, въ іюнѣ; въ Рущукѣ [4 б] тоже рѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

330. *Spilosoma lubricipedea* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

331. *Spilosoma menthastris* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.

332. *Spilosoma urticae* Esp.—Въ Софії рѣдка; въ Рущукѣ [4 б] тоже, въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

333. *Hepialus humuli* L.—Въ Сливенѣ, а особенно часто въ Костенецѣ [18 а] въ іюлѣ.

334. *Hepialus sylvinus* L.—Обыкновенна въ Софії, въ іюлѣ и сентябрѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

335. *Hepialus velleda* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

336. *Hepialus lupulinus* L.—Въ Сливенѣ [18] въ августѣ.

337. *Hepialus hecta* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

338. *Cossus cossus* L.—Въ Софії обыкновенна, въ іюлѣ; въ Рущукѣ [9] тоже; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

339. *Cossus balcanicus* Led.—Очень рѣдка; до сихъ поръ въ Сливенѣ [18 а] поймано 5 гусеницъ въ іюнѣ на берестѣ (800—1200 метр. надъ моремъ), которыя и дали бабочекъ.

340. *Cossus terebra* F.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ, рѣдка.

341. *Zeuzera pyrina* L.—Въ Софії очень рѣдка, въ августѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнѣ и іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

342. *Phragmatocia castaneae* Hb.—Въ Добруджѣ [32]; въ Казанлыкѣ [18 а] въ іюлѣ, рѣдка.

343. *Hypopta caestrum* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, рѣдка.

344. *Stygia australis* Latr.—Въ концѣ мая 1898 года г. Пигулевъ собралъ въ церковномъ лѣсу близъ Сливена (770 метр. надъ моремъ) три гусеницы, которыя и дали затѣмъ бабочекъ,

очень похожихъ на южную Французскую форму, но нѣсколько больше по размѣрамъ [18 а].

345. *Endagria ulula* Bkh.—Въ Софії рѣдка, въ іюль; въ Добруджѣ [33] тоже, въ маѣ.

346. *Heterogenes limacodes* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] въ іюль.

347. *Heterogenes asella* Schiff.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюль, обыкновенна.

348. *Psyche unicolor* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ іюль—августѣ.

349. *Psyche villosella* O.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнь.

350. *Psyche uralensis* var. *demissa* Led.—Въ Сливенѣ и Варнѣ [31].

351. *Psyche viciella* Schiff.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюль, обыкновенна.

352. *Psyche plumifera* O.—Въ Софії рѣдка, въ маѣ; въ Добруджѣ [33] тоже; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнь.

353. *Psyche hirsutella* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] обыкновенна, въ іюль.

354. *Epichnopteryx pulla* Esp.—Въ Софії [4 а] рѣдка, въ апрѣль; въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

355. *Fumea pectinella* F.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ, рѣдка.

356. *Fumea nudella* O.—Въ Софії рѣдка, въ маѣ.

357. *Fumea sapho* Mill.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

358. *Fumea intermediella* Br.—Въ Разградѣ [18 а] въ маѣ—іюнь, рѣдка.

359. *Penthophora morio* L.—Въ Софії въ огромномъ количествѣ, въ іюнь; въ Рущукѣ [9] въ іюль; въ Дунницѣ и на Рыло [6] обыкновенна въ іюнь—іюль; въ Добруджѣ [33] тоже; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—августѣ.

360. *Orgyia aurolimbata* Gn.—Въ Разградѣ [18 а] въ маѣ—іюнь, рѣдка.

361. *Orgyia antiqua* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ, обыкновенна.

362. *Laelia coenosa* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ, рѣдка.

363. *Dasychira fascelina* L.—Въ Софії очень рѣдка.

364. *Dasychira pudibunda* L.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—августѣ.

365. *Leucoma salicis* L.—Въ Софії въ огромномъ количествѣ, въ іюлѣ и августѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—августѣ.

366. *Portesia chrysorrhoea* L.—Въ Софії обыкновенна, въ іюлѣ; въ Рущукѣ [4 а] въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ огромномъ количествѣ, въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—августѣ. На основаніи офиціальныхъ донесеній 45 лѣсничихъ въ министерствѣ земледѣлія и торговли, гусеницы появились въ большомъ количествѣ весной 1900 года въ слѣдующихъ районахъ: Балчикъ, Ново-Сельцы, Трѣвна, Дрѣново, Рупчо, Филиппополь, Ломъ, Попово, Хасково, но вслѣдствіе дождливой и холодной погоды почти все погибли.

367. *Portesia similis* Fuessl.—Въ Разградѣ [12] обыкновенна; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

368. *Psilura monacha* L.—Въ Рущукѣ [9] въ іюнѣ.

369. *Ocneria dispar* L.—Въ Софії обыкновенна, въ іюлѣ и августѣ; въ Рущукѣ [4 б] тоже обыкновенна, въ іюнѣ и іюлѣ; въ Казанлыкѣ [22] въ іюлѣ и августѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ. На основаніи офиціальныхъ донесеній 45 лѣсничихъ министерству земледѣлія и торговли, весной 1900 года гусеницы въ большомъ количествѣ появились въ слѣдующихъ мѣстахъ: Балчикъ, Рущукъ, Айтосъ, Вратца, Видинъ, Стара-Загора, Орѣхово, Ломъ, Куртъ-Бунаръ, Панагюрище, Тутраканъ, Берковица, Плѣвенъ; но вслѣдствіе мокрой и холодной погоды все погибли.

370. *Ocneria terebynthi* Frr.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—августѣ, нерѣдка.

371. *Ocneria detrita* Esp.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—августѣ, нерѣдка.

372. *Bombyx crataegi* L.—Въ Сливенъ, Филиппополѣ, Самаковѣ [18 а] въ августѣ—октябрѣ.

373. *Bombyx populi* L.—Въ Разградѣ [18 а] въ іюнѣ—августѣ, нерѣдка.

374. *Bombyx castrensis* L.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, обыкновенна; въ Сливенѣ [18 а] рѣдка, въ іюлѣ—августѣ.

375. *Bombyx neustria* L.—Въ Софії нерѣдка, въ іюнѣ—августѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнѣ; бл. Рыло [6] въ іюнѣ, рѣдка; въ Разградѣ [12] обыкновенна; въ Казанлыкѣ [22] въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна. По офіціальnymъ донесеніямъ 45 лѣсничихъ министерству земледѣлія и торговли гусеницы появились въ большомъ количествѣ весной 1900 года въ слѣдующихъ мѣстахъ: Куртъ-Бунаръ, Берковица, Плевенъ, Казанлыкъ, Карлово, Брѣзникъ, Горне-Орѣхово, Филиппополь, Ловечъ, Вратца.

376. *Bombyx lanestris* L.—Въ Софії въ апрѣлѣ; въ Рущукѣ [9] въ маѣ; тоже и въ Добруджѣ [33].

377. *Bombyx catarax* L.—Въ Сливенѣ и Самаковѣ [18 а] обыкновенна, въ іюнѣ—августѣ.

378. *Bombyx trifolii* Esp.—Въ Софії нерѣдка, въ августѣ; въ Рущукѣ [9] тоже; въ Добруджѣ [33] обыкновенна.

379. *Bombyx trifolii* ab. *medicaginis* Bkh.—Въ Софії рѣдка, въ сентябрѣ.

380. *Bombyx quercus* L.—Въ Ломъ-Паланкѣ въ августѣ; въ Софії очень рѣдка [4 а], въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33]; въ Сливенѣ, Филиппополѣ, Самаковѣ [18 а] въ августѣ.

381. *Bombyx rubi* L.—Въ Софії нерѣдка, въ маѣ и іюнѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

382. *Crateronyx balcanica* H.-S.—Въ Сливенѣ [18 а] очень рѣдка, въ маѣ (1120 метр.).

383. *Crateronyx dumii* L.—Въ Добруджѣ [33], молодыя гусеницы въ маѣ; въ Сливенѣ и Самаковѣ рѣдка, въ августѣ—сентябрѣ [18 а].

384. *Lasiocampa pruni* L.—Въ Рущукѣ [9] въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33]; въ Сливенѣ [18 а] нерѣдка, въ маѣ—іюнѣ.

385. *Lasiocampa quercifolia* L.—Въ Софії обыкновенна, въ іюлѣ и августѣ; тоже и въ Казанлыкѣ [22]; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, нерѣдка; въ Сливенѣ и Самаковѣ [18 а] въ іюнѣ; тоже въ Шипкѣ [36].

386. *Lasiocampa pini* L.—Въ Котелѣ [18 а] въ іюнѣ—іюлѣ, очень рѣдка.

387. *Saturnia pyri* Schiff.—Обыкновенна въ Софії, въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ; въ Рущукѣ [9] тоже, въ маѣ; въ Разградѣ [12] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.

388. *Saturnia spini* Schiff.—Обыкновенна въ Софії, въ маѣ; въ Рущукѣ [9] тоже; въ Сливенѣ, Тырновѣ, Самаковѣ, Бѣловѣ [18 а] рѣдка, въ іюнѣ—августѣ.

389. *Saturnia pavonia* L.—Въ Софії нерѣдка, въ апрѣлѣ и маѣ.

390. *Saturnia caecigena* Kupido. — Нерѣдка въ южной и центральной Болгаріи [18 а], въ іюнѣ; въ Шипкѣ [39].

391. *Aglia tau* L.—Въ Сливенѣ и Филиппополѣ [18 а], но рѣдка.

392. *Drepana falcataria* L.—Въ Сливенѣ и Котелѣ [18 а], въ маѣ—іюнѣ.

393. *Drepana lacerinaria* L.—Въ Сливенѣ [18 а] рѣдка, въ маѣ—іюнѣ.

394. *Cilix glaucata* Sc.—Въ Софії обыкновенна; въ Разградѣ очень рѣдка [18 а], въ іюнѣ.

395. *Harpyia furcula* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

396. *Harpyia erminea* Esp.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ.

397. *Harpyia vinula* L.—Въ Софії рѣдка, въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] нерѣдка, въ маѣ—іюнѣ.

398. *Stauropus fagi* L.—Въ Софії [4 а] очень рѣдка (800 метр.), въ іюлѣ.

399. *Notodontia tremula* Cl.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ, нерѣдка.

400. *Notodonta ziczac* L.—Въ Софии [4 а] не особенно рѣдка, въ маѣ и іюнѣ.
401. *Notodonta dromedarius* L.—Въ Сливенѣ и Разградѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.
402. *Notodonta trimacula* Esp.—Въ Сливенѣ и Тырновѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ, рѣдка.
403. *Notodonta argentina* Schiff.—Въ Добруджѣ [35] нерѣдка, въ іюлѣ.
404. *Lophopteryx camelina* L.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, рѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ, очень рѣдка.
405. *Lophopteryx cuculla* Esp.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—іюлѣ.
406. *Pterostoma palpina* L.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ маѣ.
407. *Ptilophora plumigera* Esp.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—сентябрѣ, нерѣдка.
408. *Cnethocampa processionea* L.—Въ Добруджѣ [33]. На основаніи официальныхъ рапортовъ 45 лѣсничихъ министерству земледѣлія и торговли весной 1900 года появились въ огромномъ количествѣ гусеницы въ слѣдующихъ районахъ: Бреѣзникъ, Горне-Орѣхово, Рущукъ, Айтосъ, Карлово, Кавакли, Попово, Панагюрище, Хасково, Тутраканъ, Бургазъ, однако вслѣдствіе дурной погоды пропали.
409. *Phalera bucephala* L.—Въ Софии въ іюнѣ; тоже въ Добруджѣ [33] нерѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—августѣ.
410. *Phalera bucephalooides* O.—Въ Софии [4 а] рѣдка, въ іюлѣ; въ Сливенѣ, Тырновѣ и Самаковѣ [18 а] въ іюнѣ—іюлѣ.
411. *Pygaera anastomosis* L.—Въ Софии рѣдка, въ іюлѣ, въ Сливенѣ и Разградѣ [18 а] въ іюнѣ—іюлѣ.
412. *Pygaera curtula* L.—Въ Разградѣ [18 а] въ іюнѣ—іюлѣ.
413. *Pygaera anachoreta* F.—Очень рѣдка въ Софии; въ Сливенѣ и Котелѣ [18 а] въ іюнѣ—іюлѣ, рѣдка.
414. *Pygaera pigra* Hfn.—Въ Сливенѣ и Бѣлѣ [18 а] въ іюнѣ.

415. *Thyatira batis* L.—Въ Бълъ [18 а] въ маѣ—іюнѣ, рѣдка.

416. *Cymatophora octogesima* Hb.—Въ Софіи [4 а] рѣдка, въ августѣ; въ Сливенѣ и Разградѣ [18 а] въ апрѣлѣ, рѣдка.

417. *Cymatophora duplaris* L.—Въ Филиппополѣ и Самаковѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

418. *Asphalia ruficollis* F.—Въ Сливенѣ [18 а] въ мартѣ.

419. *Asphalia flavigornis* L.—Въ Сливенѣ и Разградѣ [18 а] въ мартѣ, рѣдка.

420. *Asphalia ridens* F.—Въ Разградѣ, Шуменѣ, Самаковѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

C. Noctuae.

421. *Diloba caeruleocephala* L.—Въ Софіи нерѣдка, въ октомври; въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ августѣ; обыкновенна въ Добруджѣ [33]; въ Сливенѣ и Филиппополѣ [18 а] въ сентябрѣ.

422. *Simyra dentinosa* Fr.—Въ южной Болгаріи [18 а] не-рѣдка, въ мартѣ—апрѣлѣ.

423. *Simyra nervosa* F.—Въ Самаковѣ и Тырновѣ [18 а] въ августѣ.

424. *Arsilanche albovenosa* Goetze.—Въ Рущукѣ [4 б] очень рѣдка, въ іюнѣ.

425. *Clidia geographica* F.—Въ Добруджѣ [32]; въ Сливенѣ и Котелѣ [18 а] въ іюль—сентябрѣ, очень рѣдка.

426. *Demas coryli* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюль.

427. *Acronycta leporina* L.—Въ Варнѣ и Разградѣ [18 а], рѣдка.

428. *Acronycta aceris* L.—Обыкновенна въ Добруджѣ [33], въ маѣ; въ Котелѣ и Самаковѣ [18 а], въ маѣ—іюнѣ.

429. *Acronycta aceris* ab. *candelisequa* Esp.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюнѣ.

430. *Acronycta megacephala* F.—Въ Софіи рѣдка, въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ; въ Котелѣ [18 а] въ іюнѣ—іюль.

431. *Acronycta megacephala* var.? — Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.
432. *Acronycta alni* L. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнѣ.
433. *Acronycta strigosa* F. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — августѣ, рѣдка.
434. *Acronycta auricoma* F. — Въ Сливенѣ [18 а].
435. *Acronycta euphorbiae* F. — Въ Сливенѣ и Филиппополѣ [18 а] въ маѣ.
436. *Acronycta rumicis* L. — Въ Софії рѣдка, въ маѣ; въ Разградѣ [12] обыкновенна; въ Казанлѣкѣ [22] первая генерація въ маѣ, 2-я въ іюль — августѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ и сентябрѣ.
437. *Acronycta ligustri* F. — Въ Сливенѣ [18 а] въ сентябрѣ — октябрѣ, рѣдка.
438. *Bryophila raptricula* Hb. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка въ іюль; въ Сливенѣ, Разградѣ, Самаковѣ [18 а] въ августѣ.
439. *Bryophila strigula* Bkh. — Въ Добруджѣ [32].
440. *Bryophila algae* F. — Въ Добруджѣ [33] въ іюль, рѣдка.
441. *Moma orion* Esp. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнѣ.
442. *Agrotis polygona* F. — Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, рѣдка.
443. *Agrotis signum* F. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — августѣ.
444. *Agrotis jantina* Esp. — Въ Добруджѣ [33] въ іюль.
445. *Agrotis linogrisea* Esp. — Въ Софії (1000 метр.) рѣдка, въ августѣ; въ Бѣлѣ [18 а] рѣдка.
446. *Agrotis fimbria* L. — Въ Софії рѣдка, въ августѣ и сентябрѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль.
447. *Agrotis augur* F. — Въ Видинѣ, Разградѣ [18 а] въ іюль — августѣ.
448. *Agrotis senna* H.-G. — Въ Бѣлѣ [18 а] въ августѣ, рѣдка.
449. *Agrotis pronuba* L. — Въ Софії нерѣдка, въ іюль и октябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — іюль.
450. *Agrotis orbona* Hfn. — Въ Добруджѣ [33] въ іюль.

451. *Agrotis comes* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

452. *Agrotis hyperborea* Zett.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ.

453. *Agrotis triangulum* Hufn.—Въ Софії нерѣдка, въ октомбрѣ; въ Сливенѣ, Котелѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ, нерѣдка.

454. *Agrotis speciosa* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ, рѣдка.

455. *Agrotis c-nigrum* L.—Въ Софії [4 а] обыкновенна, въ августѣ; въ Рушукѣ [4 б] рѣдка, въ юнѣ; въ Добруджѣ [33] въ юнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

456. *Agrotis ditrapezium* Bkh.—Въ Самаковѣ, Бѣлѣ [18 а] въ маѣ, рѣдка.

457. *Agrotis xanthographa* F.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ, нерѣдка.

458. *Agrotis rubi* View.—Въ Сливенѣ и Котелѣ [18 а] въ августѣ.

459. *Agrotis dahlii* Hb.—Въ Рушукѣ [9] рѣдка, въ юнѣ.

460. *Agrotis brunnea* F.—Въ Сливенѣ, Тырновѣ, Шипкѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ, нерѣдка.

461. *Agrotis festiva* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ—сентябрѣ.

462. *Agrotis depunctata* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ сентябрѣ, очень рѣдка.

463. *Agrotis margaritacea* Vill.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ, рѣдка.

464. *Agrotis flammatra* F.—Въ Софії рѣдка, въ августѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—юнѣ.

465. *Agrotis candelisequa* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ началѣ юля.

466. *Agrotis lucipeta* F.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ, рѣдка.

467. *Agrotis putris* L.—Въ Разградѣ [12] обыкновенна; въ Сливенѣ, Тырновѣ [18 а] въ сентябрѣ.

468. *Agrotis signifera* F.—Въ Сливенѣ, Разградѣ [18 а] въ августѣ, рѣдка.
469. *Agrotis forcipula* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.
470. *Agrotis puta* Hb.—Въ Сливенѣ, Тырновѣ, Самаковѣ [18 а] въ сентябрѣ, рѣдка.
471. *Agrotis cinerea* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.
472. *Agrotis exclamationis* L.—Въ Софії въ іюнѣ; въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ іюлѣ; на Рыло [6] обыкновенна, въ іюнѣ—іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ—августѣ.
473. *Agrotis nigricans* L.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.
474. *Agrotis obelisca* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ—сентябрѣ.
475. *Agrotis lycarum* H.-S.—Въ Софії рѣдка, въ октѣбрѣ.
476. *Agrotis saucia* Hb.—Въ Софії рѣдка, въ октѣбрѣ.
477. *Agrotis saucia* ab. *margaritosa* Hw.—Въ Софії [4 а] не особенно рѣдка, въ августѣ.
478. *Agrotis ypsilon* Rott.—Въ Софії обыкновенна, въ октѣбрѣ; въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, рѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ, обыкновенна.
479. *Agrotis segetum* Schiff.—Въ Софії (1000 метр.) въ августѣ, въ Рущукѣ [9] тоже. Въ различныхъ частяхъ Болгаріи [21] приносить большой вредъ винограду; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
480. *Agrotis corticea* Hb.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ.
481. *Agrotis crassa* Hb.—Въ Софії (1000 метр.) не особенно рѣдка, въ августѣ; въ Рущукѣ [9] въ сентябрѣ; въ Добруджѣ [32].
482. *Agrotis vestigialis* Rott.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, нерѣдка.
483. *Neurnonia popularis* F.—Въ Софії въ сентябрѣ.
484. *Neurnonia cespitis* F.—Въ Софії рѣдка, въ октѣбрѣ.
485. *Mamestra leucophaea* View.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

486. *Mamestra nebulosa* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ и сентябрѣ.
487. *Mamestra contigua* Vill.—Въ Сливенѣ и Филиппополѣ [18 а] въ маѣ — юнѣ.
488. *Mamestra thalassina* Rott.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
489. *Mamestra dissimilis* Knoch.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ, нерѣдка; въ Котелѣ, Бѣлѣ [18 а] въ маѣ.
490. *Mamestra brassicae* L.—Въ Софії [4 а] рѣдка, въ юлѣ, въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ юнѣ — юлѣ.
491. *Mamestra persicariae* L.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — юнѣ.
492. *Mamestra albicolon* Hb.—Въ Рушукѣ [9] въ августѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — юнѣ.
493. *Mamestra oleracea* L.—Въ Софії рѣдка, въ маѣ и юнѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ и юлѣ; въ большомъ количествѣ въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ и августѣ.
494. *Mamestra genistae* Bkh.—Въ Софії [4 а] нерѣдка, въ юлѣ; въ Рушукѣ [4 б] рѣже; въ Сливенѣ, Разградѣ [18 а] въ маѣ.
495. *Mamestra dentina* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
496. *Mamestra peregrina* Tn.—Въ Добруджѣ [32].
497. *Mamestra trifolii* Rott.—Въ Софії (900 метр.) рѣдка, въ юлѣ; въ Рушукѣ [4 б] рѣдка, въ юнѣ и юлѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ юнѣ.
498. *Mamestra reticulata* Vill.—Въ Софії [4 а] нерѣдка, въ юнѣ и юлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — сентябрѣ.
499. *Mamestra chrysozona* Bkh.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
500. *Mamestra serena* F. var.?—Въ Софії [4 а] очень рѣдка, въ юлѣ.
501. *Dianthoecia filigramma* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
502. *Dianthoecia albimacula* Bkh.—Въ Сливенѣ, Самаковѣ [18 а] въ апрѣлѣ — маѣ.

503. *Dianthoecia compta* F.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ, рѣдка; въ Сливенѣ, Тырновѣ, Видинѣ [18 а] въ маѣ—юнѣ.
504. *Dianthoecia capsincola* Hb.—Въ Софіи [4 а] рѣдка, въ юлѣ; въ Рущукѣ [4 б] тоже рѣдко; въ юнѣ; въ Сливенѣ, Котелѣ [18 а] въ маѣ, рѣдка.
505. *Dianthoecia cucubali* Fuessl.—Въ Софіи нерѣдка, въ юлѣ; въ Сливенѣ, Бургазѣ [18 а] въ маѣ—августѣ.
507. *Oncocnemis confusa* Fr.—Въ Сливенѣ [18 а] нерѣдка.
508. *Ulochlaena hirta* Hb.—Въ Добруджѣ [32]; въ Т. Сейменѣ [18 а] въ юлѣ; рѣдка.
509. *Ammoconia caecimacula* T.—Въ Софіи рѣдка, въ октобрѣ.
510. *Polia rufocincta* H.-G.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ—сентябрѣ, очень рѣдка.
511. *Dichonbia aeruginea* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ, рѣдка.
512. *Miselia oxyacanthae* L.—Въ Софіи нерѣдка, въ юлѣ.
513. *Luperina virens* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ, очень рѣдка.
514. *Hadena funerea* Hein.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
515. *Hadena adusta* Esp.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юлѣ.
516. *Hadena ochroleuca* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
517. *Hadena maillardii* H.-G.—Въ Софіи [4 а] рѣдка (2000 метр.), въ юлѣ.
518. *Hadena lateritia* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
519. *Hadena monoglypha* Hufn.—Въ Софіи въ юлѣ; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юлѣ.
520. *Hadena sordida* Bkh.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юлѣ.
521. *Hadena basilinea* F.—Въ Сливенѣ, Филиппополѣ [18 а] въ маѣ.
522. *Hadena hepatica* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ—юлѣ.

523. *Hadena didyma* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ, рѣдка.
524. *Hadena didyma* ab. *leucostigma* Esp.—Въ Софії рѣдка.
525. *Hadena literosa* Hw.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
526. *Hadena strigilis* Cl.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
527. *Dipterygia scabriuscula* L.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юнѣ; въ Сливенѣ, Самаковѣ [18 а] въ маѣ—юлѣ.
528. *Rhizogramma detersa* Esp.—Въ Сливенѣ, Габровѣ [18 а] въ маѣ—августѣ.
529. *Eriopus latreillei* Dup.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юлѣ.
530. *Polyphaenis sericata* Esp.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юлѣ.
531. *Trachea atriplicis* L.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
532. *Brotolomia meticulosa* L.—Въ Софії нерѣдка, въ маѣ, юнѣ и октомбрѣ; въ Добруджѣ [33] въ юлѣ; въ Сливенѣ, Бѣловѣ [18 а] въ маѣ.
533. *Helotropha leucostigma* Hb.—Въ Сливенѣ, Видинѣ [18 а] въ августѣ.
534. *Gortyna ochracea* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—августѣ.
535. *Mycteroplus puniceago* B.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юлѣ.
536. *Leucania pallens* L.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юлѣ.
537. *Leucania obsoleta* Hb.—Въ Добруджѣ [32].
538. *Leucania scirpi* Dup.—Въ Софії [4 а] рѣдка, въ августѣ.
539. *Leucania comma* L.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юлѣ; въ Самаковѣ, Видинѣ [18 а] въ маѣ—августѣ.
540. *Leucania lineata* Ev.—Въ Разградѣ [12] обыкновенна въ юлѣ.
541. *Leucania conigera* F.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ—юлѣ.

542. *Leucania evidens* Hb.—Въ Добруджѣ [32]; въ Видинѣ [18 а] въ сентябрѣ.

543. *Leucania vitellina* Hb.—Въ Софии [4 а] очень рѣдка, въ августѣ; въ Добруджѣ [33] тоже рѣдка, въ іюнѣ.

544. *Leucania l-album* L.—Въ Софии рѣдка, въ іюль и октябрѣ; въ Рущукѣ [4 б] тоже рѣдка, въ іюнѣ и іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ сентябрѣ.

545. *Leucania congrua* Hb.—Въ Сливенѣ, Самаковѣ [18 а] въ сентябрѣ.

546. *Leucania albipuncta* F.—Въ Софии [4 а] неособенно рѣдка, въ іюнѣ; въ Рущукѣ [4 б] очень рѣдка, въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33].

547. *Leucania lithargyria* Esp.—Въ Софии въ сентябрѣ; въ Добруджѣ [32].

548. *Grammesia trigrammica* Hfn.—На Рыло [6] въ іюнѣ—іюль; тоже и въ Добруджѣ [33].

549. *Stilbia anomala* Hw.—Въ Сливенѣ [18 а] въ сентябрѣ.

550. *Caradrina exigua* Hb.—Въ Софии [4 а] рѣдка, въ іюль и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

551. *Caradrina quadripunctata* F.—Въ Софии [4 а] обыкновенна, въ іюнѣ и октябрѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ и іюнѣ.

552. *Caradrina pulmonaris* Esp.—Въ Сливенѣ, Тырновѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

553. *Caradrina respersa* Hb.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ, Филиппополѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

554. *Lampetia arcuosa* Hn.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

555. *Rusina tenebrosa* Hb.—Въ Софии (1000 метр.) рѣдка, въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.

556. *Amphipyra tragopogonis* L.—Въ Добруджѣ [32]; въ Сливенѣ [18 а] въ сентябрѣ.

557. *Amphipyra livida* F.—Въ Софии рѣдка, въ октябрѣ; въ Сливенѣ, Видинѣ [18 а] въ маѣ—сентябрѣ.

558. *Amphipyra pyramidea* L. — Въ Рущукѣ [9] въ юлѣ; въ Добруджѣ [33] въ юлѣ; въ Разградѣ, Тырновѣ, Видинѣ [18 а] въ маѣ — сентябрѣ.

559. *Perigrapha cincta* F. — Въ Сливенѣ [18 а] въ мартѣ — маѣ.

560. *Taeniocampa gothica* L. — Въ Добруджѣ [33] въ маѣ; въ Самаковѣ, Видинѣ [18 а] въ маѣ — сентябрѣ.

561. *Taeniocampa rorida* H.-S. — У подножія Балканъ (южная сторона) во фруктовыхъ садахъ [29] въ апрѣлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — сентябрѣ.

562. *Taeniocampa miniosa* F. — Въ Варнѣ и Сливенѣ [31].

563. *Taeniocampa pulverulenta* Esp. — Въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ; въ Варнѣ [31].

564. *Taeniocampa stabilis* View. — Въ Рущукѣ [4 б] нерѣдка, въ юнѣ.

565. *Taeniocampa incerta* Hufn. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ маѣ; въ Сливенѣ [20] въ маѣ — сентябрѣ.

566. *Taeniocampa opima* Hb. — Въ Сливенѣ, Тырновѣ [18 а] въ августѣ — сентябрѣ.

567. *Dicycla oo* L. — Въ Рущукѣ [9] въ юлѣ; въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.

568. *Panolis piniperda* Panz. — Въ Сливенѣ [18] въ апрѣлѣ — маѣ.

569. *Calymnia pyralina* View. — Въ Разградѣ [18 а] въ апрѣлѣ — маѣ.

570. *Calymnia trapezina* L. — Въ Софії (1000 метр.) рѣдка, въ юлѣ и августѣ; въ Сливенѣ, Разградѣ, Самаковѣ [18 а] въ юнѣ — августѣ, рѣдка.

571. *Cosmia abluta* Hb. — Въ Сливенѣ, Тырновѣ, Самаковѣ [18 а] въ сентябрѣ, рѣдка.

572. *Dyschorista fissipunctata* Hw. — Въ Софії (700 метр.) въ юнѣ.

573. *Plastenis retusa* L. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — юнѣ; въ Софії [41] въ юнѣ.

574. *Orthosia helvola* L. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.

575. *Orthosia pistacina* var. *rubetra* Esp.—Въ Софії нерѣдка, въ октЯбрѣ.
576. *Orthosia nitida* F.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—юнѣ.
577. *Orthosia litura* L.—Въ Софії нерѣдка, въ октЯбрѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ.
578. *Xanthia flavago* L.—Въ Софії нерѣдка, въ октЯбрѣ.
579. *Xanthia fulvago* L.—Въ Софії обыкновенна, въ октЯбрѣ; въ Сливенѣ, Тырновѣ, Филишополѣ, Самаковѣ [18 а], въ маѣ—сентябрѣ.
580. *Xanthia fulvago* ab. *flavescens* Esp.—Въ Софії нерѣдка, въ октЯбрѣ.
581. *Xanthia gilvago* Esp.—Въ Софії рѣдка, въ октЯбрѣ.
582. *Hoporina croceago* F.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ.
583. *Orrhodia vaccinii* ab. *spadicea* Hb.—Въ Софії рѣдка, въ октЯбрѣ.
584. *Scoliopteryx libatrix* L.—Въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юнѣ; въ Сливенѣ, Бѣлѣ [18 а] въ сентябрѣ, рѣдка; въ Софії [42] въ юлѣ.
585. *Xylina ornithopus* Rott.—Въ Софії нерѣдка, въ октЯбрѣ; въ Сливенѣ [18 а] весной.
586. *Xylina lapidea* Hb. var. *cupressivora* Stgr.—Въ сѣверной Болгарії [43].
587. *Calocampa vetusta* Hb.—Въ Сливенѣ, Котелѣ [18 а], въ маѣ—юнѣ.
588. *Calocampa exoleta* L.—Въ Софії нерѣдка, въ октЯбрѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ юнѣ—юлѣ; въ Сливенѣ, Филишополѣ [18 а], въ маѣ—юлѣ.
589. *Epimecia ustula* Fr.—Въ Сливенѣ [31].
590. *Calophasia casta* Bkh.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—юлѣ.
591. *Calophasia platyptera* Esp.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юлѣ.
592. *Calophasia freyeri* Friv.—На южныхъ склонахъ Балканъ [29] въ юнѣ.

593. *Calophasia lunula* Hufn. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнѣ; въ Софії [41] въ іюнѣ — іюлѣ.
594. *Cleophana antirrhini* Hb. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — сентябрѣ; обыкновенна въ Варпѣ [31].
595. *Cleophana olivina* H.-S. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — сентябрѣ.
596. *Cucullia verbasci* L. — Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
597. *Cucullia scrophulariae* Cap. — Въ Софії въ маѣ и іюнѣ; близь Рыло [6] въ іюнѣ и іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
598. *Cucullia umbratica* L. — Въ Софії въ іюлѣ.
599. *Cucullia lucifuga* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.
600. *Cucullia artemisiae* Hufn. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
601. *Cucullia tanaceti* Schiff. — Въ Софії рѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
602. *Cucullia xeranthemi* B. — Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, рѣдка; въ Самаковѣ [18 а] въ іюнѣ.
603. *Cucullia formosa* Rogenh. — Въ Шуменѣ [18 а] въ іюнѣ, очень рѣдко.
604. *Eurhopia adulatrix* Hb. — Въ Добруджѣ [33].
605. *Calpe capucina* Esp. — Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, рѣдка; въ Видинѣ [18 а] въ іюнѣ, очень рѣдка.
606. *Plusia triplasia* L. — Въ Софії [4 а] очень рѣдка, въ августѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ — сентябрѣ.
607. *Plusia tripartita* Hufn. — Въ Софії нерѣдка; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.
608. *Plusia deaurata* Esp. — Въ Котелѣ [18 а] въ іюлѣ — августѣ.
609. *Plusia moneta* F. — Въ Рущукѣ [9] очень рѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] весной.
610. *Plusia consona* F. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
611. *Plusia chrysitis* L. — Въ Софії [4 а] очень рѣдка, въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ.
612. *Plusia zosimi* Hb. — Въ Добруджѣ [32].

613. *Plusia chryson* Hb. — Въ Добруджѣ [32].
614. *Plusia gutta* Gn. — Въ Софії [4 а] не особенно рѣдка, въ іюль и августѣ; въ Рущукѣ [4 б] очень рѣдка, въ іюнь; около Рыло [6] обыкновенна, въ іюнь — іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] нѣть.
615. *Plusia iota* L. — Въ Софії (1000 метр.) въ августѣ.
616. *Plusia circumflexa* L. — Въ Сливенѣ, Филиппополѣ [18 а] въ іюль, рѣдка.
617. *Plusia gamma* L. — Въ Софії обыкновенна, въ апрѣль, іюль, августѣ и сентябрѣ; въ Рущукѣ [9] тоже, въ іюнь, іюль и августѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна въ маѣ — іюль; тоже въ Сливенѣ [18 а]; въ Свищовѣ [13].
618. *Plusia ni* Hb. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнь.
619. *Aedia funesta* Esp. — Въ Добруджѣ [33] въ іюнь, рѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнь.
620. *Heliaca tenebrata* Sc. — Въ Добруджѣ [33] въ іюнь; въ Сливенѣ, Самаковѣ [18 а] въ маѣ — іюль.
621. *Heliothis rupicola* H.-B. — Въ Сливенѣ [31].
622. *Heliothis cognatus* Frr. — Въ Добруджѣ [32]; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
623. *Heliothis cardui* Hb. — Въ Добруджѣ [32].
624. *Heliothis ononis* F. — Въ Софії нерѣдка, въ іюль и августѣ; въ Видинѣ [18 а] въ маѣ — іюнь.
625. *Heliothis dipsaceus* L. — Въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюнь; въ Софії [41] въ іюль, августѣ.
626. *Heliothis scutosus* Schiff. — Въ Софії нерѣдка, въ августѣ; также и въ Рущукѣ [4 б] въ іюль и августѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ іюнь — іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнь.
627. *Heliothis peltiger* Schiff. — Въ Софії рѣдка, въ іюль и октябрѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнь — іюль.
628. *Heliothis armiger* Hb. — Въ Софії рѣдка, въ іюль; въ Рущукѣ [4 б] тоже, въ іюль и сентябрѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.

629. *Heliothis incarnata* Fgr.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] рѣдка.

630. *Chariclea delphinii* L.—Въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Сливенѣ поймана I. Габергауеромъ [37]; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюлѣ.

631. *Chariclea victorina* Sodof.—Въ Сливенѣ поймана I. Габергауеромъ [37].

632. *Chariclea treitschkei* Friv.—Въ Сливенѣ [29] въ іюнѣ, а также и въ маѣ [18 а] и іюлѣ [37].

633. *Chariclea purpurites* Tr.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, рѣдка; въ Т. Сейменѣ [18 а] въ маѣ.

634. *Chariclea umbra* Hfn.—Въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ маѣ и іюнѣ; въ Софії [41] въ августѣ.

635. *Xanthodes malvae* Esp.—Въ Сливенѣ, Бѣлѣ [18 а] въ маѣ.

636. *Euterpi laudeti* B.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ.

637. *Acontia urania* Fr.—На южныхъ холмахъ Балканъ [29] въ іюнѣ и іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ.

638. *Acontia titania* Esp.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

639. *Acontia lucida* Hufn.—Въ Софії въ августѣ; тоже и въ Рущукѣ [9], въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ и іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

640. *Acontia luctuosa* Hb.—Въ Софії нерѣдка, въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ; тоже и въ Рущукѣ [9] въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ—іюлѣ; тоже въ Сливенѣ [18 а].

641. *Acontia moldavica* H.-S.—Въ Провадіѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

642. *Talpochares arcuinna* Hb.—Въ Сливенѣ и Самаковѣ [18 а] въ іюнѣ.

643. *Talpochares arcuinna* var. *kuelekana* (?) Stgr.—Въ Разградѣ [12], очень рѣдко.

644. *Talpochares dardouini* B.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ, Бѣлѣ, Самаковѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

645. *Talpochares respersa* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.

646. *Talpochares communimacula* Hb. — Въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ, очень рѣдка.
647. *Talpochares purpurina* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ, нерѣдка.
648. *Talpochares rosea* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
649. *Talpochares ostrina* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
650. *Talpochares parva* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
651. *Erastria argentula* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
652. *Erastria uncula* L. — Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
653. *Erastria oblitterata* Rbr. — Въ Варнѣ [31].
654. *Erastria pusilla* View. — Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
655. *Erastria venustula* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
656. *Erastria fasciana* L. — Въ Сливенѣ [18 а] въ сентябрѣ.
657. *Photheches captiuncula* Fr. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — августѣ.
658. *Prothymia viridaria* Cl. — Обыкновенна въ Добруджѣ [33], въ юнѣ; въ Варнѣ [31].
659. *Agrophila trabealis* Sc. — Въ Софіи обыкновенна, въ августѣ; тоже и въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Добруджѣ [33] тоже, въ маѣ — юлѣ; тоже въ Сливенѣ [18 а].
660. *Haemerosia renalis* Hb. — Въ Сливенѣ [18 а] найдены до сихъ порь только гусеницы (въ маѣ).
661. *Metoponia koekeritziana* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ; въ Самаковѣ, Бѣловѣ и на Рыло [18 а] въ августѣ — сентябрѣ.
662. *Metoponia vespertalis* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
663. *Euclidia mi* Cl. — Въ Добруджѣ [33] въ маѣ и юлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ — юлѣ; въ Софіи [41] въ маѣ и юнѣ.
664. *Euclidia glyphica* L. — Въ Софіи обыкновенна, въ маѣ и юнѣ; у Рыло [6] въ юнѣ — юлѣ; въ Рущукѣ [9] часто, въ юнѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ — юнѣ; въ Сливенѣ, Тырновѣ [18 а], Разградѣ, Самаковѣ, Бѣловѣ, въ юнѣ — юлѣ.

665. *Euclidia triquetra* F.—Въ Софії [4 а] очень рѣдка (700 метр.), въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] перѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ, Филиппополѣ [18 а] въ іюнѣ—іюль.

666. *Leucanitis stolida* F.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—іюль, нерѣдка; въ Софії [41] въ августѣ—сентябрѣ.

667. *Grammodes bifasciata* Petag.—Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—іюль.

668. *Grammodes algira* L.—Въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, нерѣдка; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ, очень рѣдка.

669. *Pseudophia lunaris* Schiff.—Въ Софії рѣдка; въ Рущукѣ [9] въ маѣ; въ Добруджѣ [33], въ маѣ—іюнѣ; въ Бѣлѣ [18 а] въ іюнѣ.

670. *Catephia alchymista* Schiff.—Въ Софії рѣдка, въ іюнѣ; въ Рущукѣ [4 б] очень рѣдка, въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ—сентябрѣ.

671. *Catocala fraxini* L.—Въ Софії рѣдка.

672. *Catocala elocata* Esp.—Въ Софії обыкновенна, въ августѣ, сентябрѣ и октябрѣ; въ Рущукѣ [9] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюль.

673. *Catocala nupta* L.—Въ Софії [4 а] очень рѣдка; въ Добруджѣ [33] тоже, въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

674. *Catocala dilecta* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

675. *Catocala puerpera* Giorna.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

676. *Catocala hymenaea* L.—Въ Софії очень рѣдка, въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

677. *Catocala conversa* Esp.—Въ Добруджѣ [33] въ іюль.

678. *Catocala diversa* H.-G.—Въ Добруджѣ [33] въ іюль; въ Сливенѣ, Филиппополѣ [18 а] въ августѣ.

679. *Spintherops spectrum* Esp.—Въ Сливенѣ, Бѣловѣ [18 а] въ іюль—августѣ.

680. *Spintherops calaphanes* Hb.—Въ Софії [4 а] рѣдка (800 метр.), въ іюль.

681. *Dichagyris melanura* H.-S. — Въ Сливенъ, Тырновъ [18 а] въ іюнѣ — іюль, рѣдка.
682. *Toxocampa lusoria* L. — Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнѣ.
683. *Toxocampa crassae* F. — Въ Добруджѣ [33] въ іюль.
684. *Boletobia fuliginaria* L. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ іюль — августѣ.
685. *Simplicia rectalis* Ev. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюль — августѣ.
686. *Zanclognatha tarsiplumalis* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ іюль.
687. *Zanclognatha tarsicrinialis* Knoch. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюль.
688. *Herminia crinalis* Tr. — Въ Добруджѣ [33], въ іюнѣ.
689. *Herminia tentacularia* L. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ — іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — августѣ.
690. *Herminia derivalis* Hb. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ — іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ, рѣдка; въ Софіи [41] въ маѣ — іюнѣ.
691. *Pechipogon barbalis* Cl. — Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.
692. *Bomolocha fontis* Thub. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнѣ.
693. *Hypena antiqualis* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — іюль.
694. *Hypena rostralis* L. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюль.
695. *Hypena minitalis* Mann. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — іюль.
696. *Hypena obesalis* Tr. — Въ Софіи рѣдка, въ маѣ и іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ.
697. *Orectis proboscidata* H.-S. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюль — августѣ.
698. *Rivula sericealis* Sc. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — сентябрѣ.

699. *Brephos nothum* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ—іюнѣ.

D. Geometrae.

700. *Pseudoterpnia pruinata* Hufn.—Въ Софіи [4 а] очень рѣдка, въ іюлѣ (1500 метр.); въ Рущукѣ [41].

701. *Geometra vernaria* Hb.—Въ Софіи [4 а] рѣдка, въ іюнѣ; тоже въ Рущукѣ [4 б], въ маѣ и іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ—августѣ.

702. *Phorodesma pustulata* Hfn.—Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

703. *Phorodesma smaragdaria* F.—Въ Софіи нерѣдка, въ іюлѣ и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.

704. *Nemoria viridata* L.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

705. *Nemoria pulmentaria* Gn.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ, рѣдка.

706. *Nemoria strigata* Müll.—Въ Рущукѣ [4 б] очень рѣдка, въ іюлѣ.

707. *Thalerà fimbrialis* Sc.—Въ Софіи нерѣдка, въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.

708. *Thalerà putata* L.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

709. *Thalerà lactearia* L.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ.

710. *Acidalia pygmaearia* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

711. *Acidalia trilineata* Sc.—Обыкновенна въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.

712. *Acidalia perochraria* F. R.—Обыкновенна въ Добруджѣ [33], въ маѣ—іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.

713. *Acidalia ochrata* Sc.—Въ Софіи нерѣдка, въ іюлѣ и августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ, нерѣдка.

714. *Acidalia rufaria* Hb.—Въ Софіи [4 а] нерѣдка (800 метр.), въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] тоже.

715. *Acidalia sericeata* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ, рѣдка.
716. *Acidalia moniliata* F.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
717. *Acidalia contiguaria* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
718. *Acidalia dimidiata* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
719. *Acidalia muricata* Hufn.—Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
720. *Acidalia virgularia* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ—юнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
721. *Acidalia pallidata* Bkh.—Въ Добруджѣ [33].
722. *Acidalia subsericeata* Hw.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ маѣ—юнѣ.
723. *Acidalia ostrinaria* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ.
724. *Acidalia bisetata* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ, нерѣдка.
725. *Acidalia politata* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ юлѣ.
726. *Acidalia politata* ab. *abmarginata* Boh.—Въ Софіи рѣдка, въ юнѣ.
727. *Acidalia rusticata* F.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юлѣ; въ Сливенѣ и Бѣлѣ [18 а] въ августѣ.
728. *Acidalia filicata* Hb.—Въ Добруджѣ [33] обикновенна, въ юлѣ.
729. *Acidalia humiliata* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] обикновенна, въ юнѣ.
730. *Acidalia dilutaria* Hb.—Въ Софіи нерѣдка.
731. *Acidalia holosericata* Dup.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ юнѣ.
732. *Acidalia diffluata* H.-S.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юлѣ.
733. *Acidalia degeneraria* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ юнѣ.
734. *Acidalia inornata* var. *deversaria* H.-S.—Нерѣдка въ Добруджѣ [33], въ юлѣ.
735. *Acidalia aversata* L.—Въ Софіи (1000 метр.) въ юлѣ; въ Добруджѣ [33] въ юнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ юлѣ—августѣ.

736. *Acidalia emarginata* L. — Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
737. *Acidalia immorata* L. — Въ Софіи [4 а] очень рѣдка (700 метр.), въ іюль.
738. *Acidalia tessellaria* B. — Въ Рущукѣ [4 б] нерѣдка, въ іюнь; въ Добруджѣ [33] тоже; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
739. *Acidalia rubiginata* Hufn. — Въ Софіи нерѣдка; въ Добруджѣ [33] тоже, въ іюнь — іюль.
740. *Acidalia marginepunctata* Goeze. — Въ Софіи нерѣдка, въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ — іюнь.
741. *Acidalia incanata* L. — Въ Добруджѣ [33] въ іюнь — іюль.
742. *Acidalia remutaria* Hb. — Въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
743. *Acidalia nemoraria* Hb. — На Рыло [6] въ іюнь — іюль; въ Разградѣ, Самаковѣ [18 а] въ іюль — августѣ.
744. *Acidalia umbellaria* Hb. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнь.
745. *Acidalia flaccidaria* Z. — Въ Рущукѣ [9] обыкновенна, въ августѣ.
746. *Acidalia imitaria* Hb. — Въ Добруджѣ [33] въ іюль.
747. *Acidalia ornata* Sc. — Въ Софіи (1000 метр.) въ августѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюнь; въ Сливенѣ [18 а] въ іюль — августѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ — іюль, обыкновенна.
748. *Acidalia congruata* Z. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюль — августѣ.
749. *Acidalia decorata* Bkh. — Въ Добруджѣ [33] въ іюнь.
750. *Zonosoma annulata* Schulze. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюль.
751. *Zonosoma albiocellaria* Hb. — Въ Софіи рѣдка, въ іюнь; въ Добруджѣ [33] въ іюль; въ Сливенѣ, Филиппополѣ [18 а] въ іюнь — августѣ.
752. *Zonosoma porata* F. — Въ Софіи рѣдка, въ апрѣль и іюль; тоже и въ Рущукѣ [4 б]; въ Добруджѣ [33] въ іюнь — іюль.
753. *Zonosoma punctaria* L. — Въ Софіи въ маѣ и іюнь.

754. *Timandra amata* L. — Въ Софії рѣдка, въ маѣ — іюлѣ; въ Рушукѣ [9] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — августѣ.

755. *Pellonia vibicaria* Cl. — Въ Софії обыкновенна, въ іюнѣ — іюлѣ; въ Рушукѣ [4 б] нерѣдка, въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ — іюлѣ.

756. *Pellonia sicanaria* Z. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ — августѣ.

757. *Pellonia calabria* Z. — У Рыло [6] рѣдка, въ іюнѣ — іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ — августѣ.

758. *Pellonia calabria* var. *tabidaria* Z. — Въ Софії рѣдка (800 метр.), въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюлѣ.

759. *Abraxas grossularia* L. — Въ Софії рѣдка, весной; въ Рушукѣ [9] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ — іюлѣ.

760. *Abraxas adustata* Schiff. — Въ Софії обыкновенна, въ апрѣлѣ и іюнѣ; въ Рушукѣ [9] въ августѣ; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнѣ.

761. *Abraxas marginata* L. — Въ Софії [4 а] очень рѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнѣ.

762. *Orthostixis cribalaria* Hb. — Въ Софії не особенно рѣдка (1000 метр.), въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а] тоже.

763. *Cabera pusaria* L. — Въ Софії (1000 метр.) въ іюлѣ; обыкновенна въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.

764. *Numeria pulveraria* L. — Въ Софії въ іюнѣ; въ Рушукѣ [4 б] рѣдка, въ іюлѣ.

765. *Metrocampa marginalaria* L. — Въ Софії [4 а] очень рѣдка (700 метр.); въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюлѣ.

766. *Eugonia erosaria* Bkh. — Въ Разградѣ, Видинѣ, [18 а], въ іюлѣ — августѣ.

767. *Eugonia erosaria* ab. *tiliaria* Hb. — Въ Софії (1000 метр.) рѣдка, въ августѣ.

768. *Eugonia quercaria* Hb. — Въ Разградѣ [18 а] въ іюнѣ.
769. *Selenia lunaria* Schiff. — Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ; въ Софії [41] въ іюнѣ.
770. *Uapterix sambucaria* L. — Въ Софії рѣдка, въ іюлѣ.
771. *Rumina luteolata* L. — Не особенно рѣдка въ Софії, въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] тоже.
772. *Caustoloma flavigera* Hb. — Въ Рущукѣ [4 б] не особенно рѣдка, въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ маѣ; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнѣ.
773. *Venilia macularia* L. — Въ Софії нерѣдка, въ іюнѣ; у Рыло [6] обыкновенна, въ іюнѣ — іюлѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюлѣ; въ Добруджѣ [33] маі — іюнь; тоже въ Сливенѣ [18 а].
774. *Eilicrinia cordaria* Hb. — Въ Разградѣ [18 а] въ іюнѣ.
775. *Eilicrinia trinotata* Metz. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюлѣ.
776. *Macaria alternaria* Hb. — Въ Софії въ іюлѣ.
777. *Macaria signaria* Hb. — Въ Сливенѣ [18 а] въ іюлѣ — августѣ.
778. *Hibernia bajaria* Schiff. — Въ Добруджѣ [32].
779. *Hibernia marginaria* Bkh. — Въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ іюлѣ.
780. *Hibernia defoliaria* Cl. — Въ Казанлыкѣ [22] въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ, иногда и въ февралѣ.
781. *Biston zonarius* Schiff. — Въ Добруджѣ [32].
782. *Biston hirtarius* Cl. — Въ Сливенѣ, Ямболѣ, Котелѣ [18 а], весной.
783. *Biston stratarius* Hufn. — Въ Рущукѣ [9] въ апрѣлѣ.
784. *Amphidasys betularius* L. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнѣ.
785. *Hemerophila abruptaria* Thn b. — Въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.
786. *Synopsia sociaria* Hb. — Въ Софії, въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] въ іюлѣ.
787. *Boarmia cinctaria* Schiff. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ маѣ.

788. **Boarmia gemmaria** Brahm. — Въ Рущукѣ [4 b] не особенно рѣдко, въ іюнѣ и іюль; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ — іюль; въ Разградѣ [18 a] въ августѣ, очень рѣдко.

789. **Boarmia umbraria** Hb. — Въ Сливенѣ [18 a] въ апрѣль и сентябрь.

790. **Boarmia repandata** L. — Въ Софії (1000 метр.) нерѣдка, въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.

791. **Boarmia roboraria** Schiff. — Въ Сливенѣ и Самаковѣ [18 a] въ маѣ — іюнѣ.

792. **Boarmia consortaria** F. — Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюнѣ.

793. **Boarmia selenaria** Hb. — Въ Рущукѣ [4 b] очень рѣдка, въ іюнѣ.

794. **Gnophos stevenaria** B. — Въ Добруджѣ [33] въ іюль.

795. **Gnophos furvata** F. — Въ Софії [4 a] очень рѣдка (700 метр.), въ іюль; въ Сливенѣ [18 a] въ маѣ.

796. **Gnophos pullata** Tr. — Въ Софії (1000 метр.) обыкновенна, въ іюль.

797. **Gnophos obfuxaria** Hb. — Въ Софії (1000 метр.) рѣдка, въ іюль и августѣ.

798. **Fidonia fasciolaria** Rott. — Въ Добруджѣ [33] въ маѣ; въ Сливенѣ, Филиппополѣ [18 a] въ августѣ.

799. **Fidonia limbaria** F. — Въ Сливенѣ [18 a] въ іюль — августѣ.

800. **Fidonia roraria** F. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 a] въ августѣ.

801. **Ematurga atomaria** L. — Въ Софії [4 a] очень рѣдка (700 метр.), въ іюнѣ; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ маѣ — іюнѣ; въ Сливенѣ [18 a] въ маѣ — сентябрь.

802. **Halia brunneata** Thnb. — Въ Сливенѣ [18 a] въ маѣ — іюнѣ.

803. **Phasiane scutularia** Dupr. — Въ Сливенѣ и Самаковѣ [18 a] въ августѣ.

804. *Phasiane glarearia* Brahm. — Въ Рущукѣ [4 b] обыкновенна, въ маѣ, іюнѣ и іюль; въ Добруджѣ [33] тоже.

805. *Phasiane clathrata* L. — Въ Софії нерѣдка, въ апрѣль, маѣ и іюнѣ; въ Рущукѣ [4 b] обыкновенна, въ маѣ и іюнѣ; тоже въ Добруджѣ [33] въ маѣ и іюль; въ Сливенѣ [18 a] въ маѣ — сентябрь.

806. *Eubolia murinaria* F. — Въ Софії въ маѣ и іюнѣ; въ Рущукѣ [4 b] не особенно рѣдка, въ іюнѣ; обыкновенна въ Добруджѣ [33], въ маѣ и іюль.

807. *Scodiona conspersaria* F. — Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 a] въ маѣ — іюль.

808. *Scoria lineata* Sc. — Въ Софії въ огромномъ количествѣ, въ маѣ и іюнѣ; тоже въ Добруджѣ [33]; въ Сливенѣ [18 a] въ іюнѣ.

809. *Aspilates strigillaria* Hb. — Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ.

810. *Aspilates gilvaria* F. — Въ Софії [4 a] въ іюль.

811. *Aspilates ochrearia* Rossi. — Въ Добруджѣ [33], въ маѣ — іюнѣ; въ Варнѣ и Сливенѣ [31].

812. *Aplasta ononaria* Fuesl. — Въ Софії [4 a] очень рѣдка (800 метр.), въ іюль; въ Рущукѣ [4 b] тоже.

813. *Sterrha sacraria* L. — Въ Софії (1000 метр.) нерѣдка, въ августѣ; въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюль; въ Сливенѣ [18 a] въ іюнѣ — іюль.

814. *Lythria purpuraria* L. — Въ Софії обыкновенна, въ апрѣль и іюнѣ; въ Рущукѣ [9] тоже, въ маѣ, іюнѣ, іюль, августѣ и сентябрь; въ Добруджѣ [33] въ маѣ — іюль.

815. *Lythria purpuraria* var. *rotaria* F. — Въ Софії обыкновенна, въ августѣ.

816. *Lythria sanguinaria* Dup. — Въ Сливенѣ [18 a] въ августѣ.

817. *Lythria porphyraria* H.-S. — Въ Софії [4 a] рѣдка.

818. *Ortholitha plumbaria* F. — Въ огромномъ количествѣ въ Софії въ іюнѣ, а на Мургашѣ въ августѣ и сентябрь; въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ іюнѣ.

819. *Ortholitha limitata* Sc. — Въ Софии (500—1000 метр.) не особенно рѣдка, въ августѣ; тоже въ Добруджѣ, въ юль; въ Сливенѣ, Самаковѣ, Калоферѣ [18 а] въ іюнь — юль.

820. *Ortholitha moeniana* Sc. — Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юль; въ Сливенѣ, Бѣловѣ [18 а] въ іюнь — юль.

821. *Ortholitha bipunctaria* Schiff. — Въ Софии [4 а] рѣдка (700 метр.), въ юль; въ Добруджѣ [33] обыкновенна, въ юль; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнь.

822. *Ortholitha vicinaria* Dup. — Въ Софии рѣдка.

823. *Mesotype virgata* Rott. — Въ Софии рѣдка, въ юль; въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

824. *Minoa murinata* Sc. — Въ Софии (1000 метр.) въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ маѣ.

825. *Odezia atrata* L. — Въ Разградѣ [18 а] въ маѣ — іюнь.

826. *Siona decussata* Bkh. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнь.

827. *Lithostege griseata* Schiff. — Въ Рущукѣ [4 б] въ іюнь; нерѣдка въ Добруджѣ [33] въ маѣ.

828. *Lithostege farinata* Hfn. — Въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ іюнь; нерѣдка въ Добруджѣ [33], въ маѣ, 2-я генерація въ концѣ іюля.

829. *Anaitis praeformata* Hb. — Въ Софии [4 а] не особенно рѣдка, въ апрѣль и маѣ; въ Рущукѣ [4 б] нерѣдка, въ іюнь; въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ юль; въ Сливенѣ, Филиппополѣ, Самаковѣ [18 а], въ маѣ — юль.

830. *Anaitis plagiata* L. — Въ Софии нерѣдка, въ маѣ и іюнь; въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ маѣ.

831. *Anaitis fraudulentata* H.-S. — Приведена у Hofmann'a.

832. *Chesias rufata* F. — Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ маѣ.

833. *Lobophora externata* H.-S. — Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюнь, очень рѣдко.

834. *Cheimatobia brumata* L. — Въ Казанлыкѣ [22] отъ средины октября до средины декабря, а иногда въ февраль и мартѣ; въ Сливенѣ, Бѣловѣ [18 а] въ сентябрѣ.

835. *Triphosa dubitata* L.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюль; въ Софії [41] въ апрѣль.
836. *Eucosmia certata* Hb.—Въ Добруджѣ [33] въ іюль.
837. *Eucosmia undulata* L.—Въ Сливенѣ, Разградѣ [18 а] въ маѣ—іюнь.
838. *Scotosia vetulata* Schiff.—Въ Софії нерѣдка, въ іюль.
839. *Scotosia rhamnata* Schiff.—Въ Добруджѣ [33] въ іюль.
840. *Cidaria dotata* L.—Въ Софії нерѣдка (550—1000 метр.), въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюль.
841. *Cidaria fulvata* Forst.—Въ Софії [4 а] рѣдка, въ іюнь; тоже въ Добруджѣ [33], въ іюль.
842. *Cidaria ocellata* L.—Въ Софії [4 а] очень рѣдка, въ іюнь; въ Добруджѣ [33] въ маѣ—іюнь; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнь.
843. *Cidaria variata* Schiff.—На Рыло [6] рѣдка, въ іюнь—іюль.
844. *Cidaria miata* L.—Въ іюнь въ Добруджѣ [33].
845. *Cidaria fluctuata* L.—Въ Софії [4 а] нерѣдка, въ іюль и сентябрь; въ Рущукѣ [4 б] тоже, въ іюнь; обыкновенна въ Добруджѣ [33], въ маѣ—іюль; въ Разградѣ [18 а] въ іюнь.
846. *Cidaria quadrifasciaria* Cl.—Въ Добруджѣ [33] въ іюль.
847. *Cidaria ferrugata* Cl.—Нерѣдка въ Добруджѣ [33], въ іюль—іюль.
848. *Cidaria designata* Rott.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ іюль.
849. *Cidaria fluviata* Hb.—Въ Софії [4 а] рѣдка, въ іюль и сентябрь; въ Рущукѣ [4 б] въ іюнь.
850. *Cidaria dilutata* Bkh.—Въ Софії рѣдка, въ октябрь; въ Сливенѣ [18 а] въ іюнь—іюль.
851. *Cidaria frustata* Tr.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ.
852. *Cidaria riguata* Hb.—Въ Рущукѣ [4 б] рѣдка, въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ маѣ.
853. *Cidaria picata* Hb.—У Рыло [6] обыкновенна, въ іюнь—іюль; въ Софії [41] въ апрѣль.

854. *Cidaria corollaria* var. *unicata* Gn.
855. *Cidaria permixtaria* var. *bulgariata* Mill.—Въ Сливенѣ [31].
856. *Cidaria galiata* Hb.—Обыкновенна въ Добруджѣ [33],
въ іюнѣ — іюль.
857. *Cidaria sociata* Bkh.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ —
іюнѣ.
858. *Cidaria lugubrata* Stgr.—Въ Рущукѣ [4 б] очень рѣдка,
въ іюль.
859. *Cidaria tristata* L.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ
Сливенѣ [18 а] въ маѣ; въ Софіи [41] въ іюль.
860. *Cidaria alchemillata* L.—Нерѣдка въ Добруджѣ [33],
въ іюнѣ.
861. *Cidaria albula* Schiff.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ.
862. *Cidaria candidata* Schiff.—Въ Рущукѣ [4 б] очень
рѣдка, въ іюль; въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ; въ Сливенѣ [18 а]
въ маѣ — іюнѣ.
863. *Cidaria decolorata* Hb.—Въ Добруджѣ [33] рѣдка, въ
маѣ.
864. *Cidaria oblitterata* Hufn.—Въ Добруджѣ [33] въ маѣ.
865. *Cidaria bilineata* L.—Въ Софіи обыкновенна (550—
1000 метр.), въ маѣ и іюнѣ; въ Рущукѣ [9] въ іюль; въ Дуп-
ницѣ [6] рѣдка, въ іюнѣ — іюль; обыкновенна въ Добруджѣ
[33], въ маѣ — іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ августѣ.
866. *Cidaria berberata* Schiff.—Въ Добруджѣ [33] въ
іюнѣ — іюль.
867. *Cidaria rubidata* F.—Въ Добруджѣ [33] въ іюнѣ.
868. *Cidaria comitata* L.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ
іюль; въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — іюль; въ Софіи [41] въ іюль.
869. *Cidaria lapidata* Hb.—Въ Софіи [4 а] рѣдка (700 метр.),
въ іюль; въ Рущукѣ [4 б] не особенно рѣдка, въ іюль — августѣ.
870. *Cidaria corticata* Tr.—Въ Добруджѣ [33] нерѣдка, въ
іюнѣ.
871. *Cidaria vitalbata* Hb.—Рѣдка въ Добруджѣ [33], въ
іюнѣ.

872. *Cidaria tersata* Hb.—Въ София (1000 метр.) обыкновенна, въ юлъ; въ Добруджъ [33] въ юнѣ — юлъ.
873. *Eupithecia oblongata* Thnb.—Въ Добруджъ [33] въ маѣ — юнѣ.
874. *Eupithecia breviculata* Donz.—Въ Добруджъ [33] въ юлъ.
875. *Eupithecia venosata* F.—Въ Добруджъ [33] въ юнѣ.
876. *Eupithecia subnotata* Hb.—Въ Добруджъ [32].
877. *Eupithecia linariata* F.—Въ Добруджъ [33] въ юнѣ.
878. *Eupithecia debiliata* Hb.—Въ Сливенѣ [18 а] въ маѣ — юнѣ.
879. *Eupithecia rectangulata* L.—Въ Добруджъ [33] нерѣдка, въ юнѣ.
880. *Eupithecia succenturiata* L.—Въ Добруджъ [33] въ юнѣ.
881. *Eupithecia innotata* Hufn.—Въ Добруджъ [33] нерѣдка, въ юнѣ.
882. *Eupithecia graphata* Tr.—Въ Сливенѣ [18 а] въ юнѣ — юлъ.
883. *Eupithecia multilineata* Mn.—Въ Добруджъ [33] въ юлъ.
884. *Eupithecia immundata* Z.—Въ Добруджъ [33] нерѣдка, въ юлъ.
885. *Eupithecia castigata* Hb.—Въ Добруджъ [33] нерѣдка, въ юлъ.
886. *Eupithecia sobrinata* Hb.—Въ Добруджъ [33] въ юлъ; въ Сливенѣ [18 а] въ августъ.
887. *Eupithecia pumilata* Hb.—Въ Добруджъ [33] въ маѣ.

Такимъ образомъ въ Болгаріи найдено до сихъ поръ *Macro-lepidoptera*:

	Родовъ:	Видовъ:
<i>Rhopalocera</i>	32	220 ³⁾
<i>Sphinges</i>	15	70
<i>Bombyces</i>	52	129
<i>Noctuae</i>	90	279
<i>Geometrae</i>	56	188
—	—	—
А всего	245	886

Общія заключенія относительно болгарской лепидоптерологіческой фауны будуть сдѣланы въ особой статьѣ.

Дополненія.

Во время печатанія статьи «Бабочки Болгаріи» мнѣ удалось наконецъ получить отъ Цюрихскаго Общества Естествоиспытателей тотъ томъ «Wiener Entomologische Monatschrift», въ которомъ помѣщена статья J. Lederer'a [31], содержащая описание материала, собраннаго Иваномъ и Людмилой Габергауерами въ 1861 и 1862 годахъ въ Варнѣ (на Черномъ морѣ) и въ Сливенѣ (въ южной Болгаріи).

Кромѣ того студентъ Александръ Дрѣновскій [41] успѣлъ собрать въ 1901 году въ Софіи и Рущукѣ нѣсколько новыхъ для Болгаріи видовъ, а здѣшній фотографъ И. Бурешъ [42], предоставивъ въ мое распоряженіе коллекцію, этимъ самымъ обогатилъ списокъ бабочекъ Болгаріи. Сомнительные виды были любезно опредѣлены въ Вѣнскомъ Естественно-историческомъ Музѣѣ д-ромъ H. Rebel'емъ.

Я приведу здѣсь сначала всѣ тѣ виды бабочекъ, которые

3) Такъ какъ № 59 долженъ быть выпущенъ.

хотя и известны изъ главнаго моего списка, но являются новыми для даннаго района или же доказываютъ еще разъ ихъ нахождение въ данномъ округѣ. Для сокращенія имени выпущены, а приводятся только соотвѣтствующіе нумера главнаго списка для данной бабочки.

Статья J. Lederer'a [31] содержитъ:

№ 3 (Сливенъ), № 4, № 5, № 6, № 7 (Варна, Сливенъ), № 8 (Варна, Сливенъ), № 10 (Варна, Сливенъ), № 13 (Варна, Сливенъ), № 14 (Варна, Сливенъ), № 16, № 18, № 21, № 26, № 31, № 32, № 36 (Варна, Сливенъ), № 37 (Варна, Сливенъ), № 39 (Варна, Сливенъ), № 46 (Сливенъ), № 50 (Варна), № 51 (Варна, Сливенъ), № 54, № 56 (Сливенъ), № 57 (Сливенъ), № 64, № 65 (Сливенъ), № 68 (Сливенъ), № 71 (Сливенъ), № 72 (Сливенъ), № 73 (Сливенъ), № 74, № 76 (Сливенъ), № 78, № 80, № 81 (Сливенъ), № 82 (Сливенъ), № 83 (Варна, Сливенъ), № 84 (Сливенъ), № 85 (Сливенъ), № 88, № 90, № 91, № 93 (Сливенъ), № 94, № 95, № 96, № 123 (Варна, Сливенъ), № 124 (Варна, Сливенъ), № 125 (Варна, Сливенъ), № 127 (Варна, Сливенъ), № 129 (Варна, Сливенъ), № 133 (Варна, Сливенъ), № 137 (Варна, Сливенъ), № 140 (Варна, Сливенъ), № 146 (Варна, Сливенъ), № 151 (Сливенъ), № 152 (Сливенъ), № 156, № 163, № 175, № 177 (Варна, Сливенъ), № 178 (Варна), № 179 (Варна), № 181 (Варна), № 187, № 188 (Сливенъ), № 189 (Варна), № 191 (Варна), № 193 (Варна, Сливенъ), № 194 (Варна, Сливенъ), № 198, № 200 (Варна, Сливенъ), № 202 (Варна, Сливенъ), № 205 (Варна, Сливенъ), № 206, № 207 (Варна, Сливенъ), № 208 (Варна, Сливенъ), № 209, № 210 (Варна, Сливенъ), № 212 (Варна, Сливенъ), № 213 (Варна, Сливенъ), № 215 (Варна, Сливенъ), № 216 (Варна, Сливенъ), № 217 (Варна, Сливенъ), № 218 (Варна, Сливенъ), № 219 (Варна, Сливенъ), № 220 (Варна, Сливенъ), № 223, № 224, № 227 (Варна, Сливенъ), № 228 (Варна, Сливенъ), № 234 (Варна), № 245 (Сливенъ), № 246 (Сливенъ), № 247 (Сливенъ), № 248 (Сливенъ), № 249 (Сливенъ), № 250, № 251 (Сливенъ), № 254 (Сливенъ), № 256, № 257 (Сливенъ),

№ 259 (Сливенъ), № 260 (Сливенъ), № 261, № 262 (Сливенъ),
№ 263 (Варна, Сливенъ), № 265 (Сливенъ), № 266 (Сливенъ),
№ 269 (Варна), № 270 (Сливенъ), № 275 (Варна, Сливенъ),
№ 276 (Варна, Сливенъ), № 277 (Варна, Сливенъ), № 278
(Варна, Сливенъ), № 280 (Варна, Сливенъ), № 286 (Сливенъ),
№ 287 (Варна, Сливенъ), № 288 (Варна, Сливенъ), № 289
(Варна, Сливенъ), № 291 (Сливенъ), № 298 (Сливенъ), № 309
(Варна, Сливенъ), № 322 (Варна, Сливенъ), № 324 (Варна),
№ 327, № 332 (Варна), № 339 (Сливенъ), № 351 (Варна), № 354
(Варна), № 359 (Варна), № 362 (Варна), № 367 (Варна, Сли-
венъ), № 369, № 370 (Сливенъ), № 371 (Варна, Сливенъ), № 372
(Сливенъ), № 374 (Варна), № 375 (Варна), № 378 (Варна),
№ 379 (Варна), № 385 (Варна), № 387 (Варна, Сливенъ), № 389
(Варна, Сливенъ), № 390 (Варна, Сливенъ), № 398 (Сливенъ),
№ 403 (Варна), № 410 (Варна), № 412 (Варна), № 422 (Варна,
Сливенъ), № 424 (Варна), № 435 (Варна), № 436 (Варна),
№ 438 (Варна), № 449 (Варна), № 469 (Варна), № 493 (Варна),
№ 500 (Варна), № 510 (Сливенъ), № 511 (Варна, Сливенъ),
№ 516 (Сливенъ), № 534 (Варна), № 550 (Варна), № 555
(Варна), № 558 (Сливенъ), № 593 (Варна), № 595 (Сливенъ),
№ 597 (Варна), № 601 (Варна), № 605 (Сливенъ), № 610 (Сли-
венъ), № 614 (Варна), № 627 (Сливенъ), № 628 (Варна, Сли-
венъ), № 629 (Сливенъ), № 630 (Варна), № 632 (Сливенъ, въ
іюнѣ), № 636, № 637 (Сливенъ), № 638 (Сливенъ), № 644 (Сли-
венъ), № 666 (Варна, Сливенъ), № 668 (Варна, Сливенъ), № 683
(Варна), № 693, № 695, № 703 (Варна), № 704 (Варна), № 723
(Варна), № 728 (Варна), № 737 (Варна), № 752 (Варна), № 758
(Варна, Сливенъ), № 762 (Варна, Сливенъ), № 763 (Варна),
№ 764 (Варна), № 755 (Варна, Сливенъ), № 782 (Варна),
№ 786 (Сливенъ), № 793 (Варна), № 807 (Варна), № 818,
№ 819, № 833 (Варна), № 845, № 865, № 872 (Сливенъ),
№ 877 (Варна).

Ал. Дрѣновскій [41] констатировалъ для Софії существо-
ваніе слѣдующихъ видовъ:

№№: 35 (июль), 51 (июль), 90 (июнь), 123 (июнь, 1500 метр.), 175 (июнь, 1500 метр.), 176 (июль, 2250 метр.), 221 (июнь, 800 метр.), 313 (августъ), 401 (июнь, июль), 428 (августъ), 440 (май, июнь), 458 (августъ), 489 (августъ), 531 (августъ), 536 (июнь, июль), 548 (май), 573 (июнь), 593 (июнь—июль), 625 (июль—августъ), 663 (май—июнь, 800 метр.), 666 (августъ), 690 (май—июнь, 800 метр.), 769 (июнь, 800 метр.), 835 (апрѣль), 853 (июль, 800 метр.), 859 (июль, 800 метр.), 868 (июль, 800 метр.).

Въ Рущукѣ же онъ нашелъ еще:

№№: 26 (июнь), 700, 745 (июнь), 865 (июнь).

И. Бурешъ [42] съ сыновьями поймалъ въ Софіи изъ рѣдкихъ бабочекъ слѣдующіе виды:

№№: 35 (июль), 98 (май), 175 (июль), 221 (июнь), 274 (июль), 279 (июнь—июль), 281 (май—июнь), 284 (июль), 334 (сентябрь), 428 (июль), 493 (июль), 547 (сентябрь), 611 (сентябрь), 627 (сентябрь), 665 (май), 666 (сентябрь), 751 (июль), 795 (августъ—сентябрь).

Новые виды для Болгаріи содержатся въ слѣдующемъ спискѣ, представляющемъ собою дополненіе къ главному, раньше приведенному списку. Цифры въ [] означаютъ данныя, взятые изъ:

[31] = выше упомянутой статьи J. Lederer'a,

[41] = отъ Ал. Дрѣновскаго въ Софіи,

[42] = И. Буреша въ Софіи и

[43] = изъ «Catalog der Lepidopteren», составленнаго О. Staudinger'омъ и H. Rebel'емъ (3-е изданіе, Berlin, 1901). Изъ этого каталога я взялъ только такие виды, которые не находятся ни въ одной изъ цитированныхъ мною статей и которые кроме того въ каталогѣ отмѣчены словами: «Bulg.» [Болгарія], «Rumel.» [Восточная Румелія = Южная Болгарія], «Balc. S.» [сѣверная часть Балканского полуострова]. Виды, означенные словами «Balc.» [Балканский полуостровъ] и «Balc. m.» [южная часть Балканского полуострова], были оставлены безъ вниманія.

Rhopalocera.

888. *Thecla ilicis* var. *caudatula* Z.—Въ Варнѣ и Сливенѣ [31].
889. *Thestor nogelii* var. *dobrogensis* Carad.—Въ Тулчѣ [43].
890. *Lycaena argiades* ab. *coretas* O.—Поймана въ 1862 году [31].
891. *Lycaena argiades* ab. *decolorata* Stgr.—Въ Болгарії [43].
892. *Lycaena icarus* Rott. ab.?—Въ Софії [41] въ маѣ. На переднихъ крыльяхъ третья точка (сверху внизъ) при корнѣ крыльевъ представляетъ длинную дугообразную линію.
893. *Melitaea trivia* var. *fascelis* Esp.—Въ Варнѣ и Сливенѣ [31].
894. *Melitaea britomartis* Assm.—Въ Варнѣ [31].
895. *Argynnis pales* var. *caucasica* Stgr.—Въ Болгарії [43].
896. *Argynnis paphia* ab. *valesina* Esp.—Въ Рущукѣ [41] въ іюнѣ.
897. *Melanargia larissa* var. *herta* H.-G.—Поймана въ 1862 году [31].
898. *Satyrus actaea* var. *cordula* F.—Поймана въ 1862 году [31].
899. *Satyrus actaea* var. *bryce* Hb.—Поймана въ 1862 году [31].
900. *Coenonympha symphita* var. *tiphonides* Stgr.—На Рыло [43].
901. *Coenonympha leander* ab. *obscura* Rühl.—Въ Южной Болгарії [43].
902. *Hesperia cynarae* Rbr.—Поймана въ 1862 году [31].

Sphinges.

903. *Sesia leucopsiformis* Esp.—Въ Софії въ іюлѣ очень рѣдка.
904. *Sesia culiciformis* L.—Въ Софії [42] въ іюлѣ.
905. *Sesia astatiformis* H.-S.—Поймана въ 1862 году [31].

906. *Sesia lanipes* Led. — Поймана въ 1862 году [31].
907. *Sesia chalcidiformis* var. *schmidti* Frr. — Въ Южной Болгаріи [43].
908. *Paranthrene tineiformis* Esp. — Въ Сливенѣ [31].
909. *Ino statices* var. *manni* Led. — Въ Варнѣ [31].
910. *Ino budensis* Spr. — Въ Сливенѣ [31].
911. *Zygaena achilleae* Esp. var.? — Въ Варнѣ и Сливенѣ [31].
912. *Zygaena ephialtes* ab. *aeacus* Esp. — Въ Болгаріи [43].
913. *Zygaena purpuralis* ab. *polygalae* Esp. — Въ Варнѣ и Сливенѣ [31].
914. *Syntomis phegea* var. *phegeus* Esp. — Въ Варнѣ и Сливенѣ [31].

Bombyces.

915. *Setina roscida* Esp. — Въ Болгаріи [43].
916. *Lithosia morosina* H.-S. — Въ Сливенѣ [31].
917. *Gnophria quadra* L. — Въ Софіи [41] въ іюнѣ — августѣ.
918. *Arctia maculosa* var. *simplonica* B. — Въ Сливенѣ [31].
919. *Arctia maculosa* var. *caecilia* Stgr. — Въ Сливенѣ [31].
920. *Psyche opacella* var. *senex* Stgr. — Въ Болгаріи [43].
921. *Psyche ecksteini* Ld. — Въ Болгаріи [43].
922. *Fumea nudella* var. *vestalis* Stgr. — Въ Южной Болгаріи [43].
923. *Bombyx franconica* Esp. — Въ Варнѣ [31].
924. *Lasiocampa bremeri* Kolenati. — Въ Варнѣ [31] въ октябрѣ.

Noctuae.

925. *Acronycta tridens* Schiff. — Въ Варнѣ [31].
926. *Acronycta psi* L. — Въ Варнѣ [31]; въ Софіи [41] въ маѣ.
927. *Bryophila ravula* Hb. — Въ Варнѣ [31].
928. *Bryophila perla* F. — Въ Болгаріи [43].
929. *Agrotis baja* F. — Въ Софіи [41] въ августѣ.

930. *Agrotis leucogaster* Frr.—Въ Софии [41] въ юль—августъ.
931. *Valeria oleagina* F.—Въ Болгаріи [43].
932. *Dichonia convergens* F.—Въ Варнѣ и Сливенѣ [31].
933. *Chloantha radiosa* Esp.—Въ Сливенѣ [31].
934. *Chloantha hyperici* F.—Въ Сливенѣ [31].
935. *Mythimna imbecilla* F.—Въ съверной части Балканскаго полуострова [43].
936. *Rusina umbratica* Goeze.—Въ Болгаріи [43].
937. *Amphyra micans* Ld.—Въ Болгаріи [43].
938. *Amphyra eriopoda* H.-S.—Въ Болгаріи [43].
939. *Pachnobia rubricosa* F.—Въ Болгаріи [43].
940. *Cirrhoedia xerampelina* Hb.—Въ Болгаріи [43].
941. *Orrhodia torrida* Ld.—Въ Болгаріи [43].
942. *Xylina semibrunnea* Hw.—Въ Болгаріи [43].
943. *Cleophana opposita* Ld.—Въ Болгаріи [43].
944. *Cucullia celsiae* H.-S.—Въ Болгаріи [43].
945. *Cucullia blattariae* Esp.—Между Сливеномъ и Варной [31].
946. *Cucullia santonici* Hb.—Въ Варнѣ [31].
947. *Cucullia absynthii* L.—Въ Варнѣ [31].
948. *Telesilla amethystina* Hb.—Въ съверной части Балканскаго Полуострова [43].
949. *Plusia festucae* L.—Въ Софии [41] рѣдка, въ юль—августъ; въ сентябрь [42]; въ Варнѣ [31].
950. *Thalpochares suava* Hb.—Въ Варнѣ [31].
951. *Catocala agamos* Hb.—Въ Варнѣ [31].
952. *Toxocampa limosa* Tr.—Въ Болгаріи [43].
953. *Zanclognatha tarsicristalis* H.-S.—Въ Болгаріи [43].

Geometrae.

954. *Eucrostis herbaria* Hb.—Въ Болгаріи [43].

955. *Acidalia inornata* Hw.—Въ Варнѣ [31].

956. *Acidalia turbidaria* H.-S.—Въ Варнѣ [31].
957. *Pellonia vibicaria* Cl. var.?—Въ Софії [42] въ іюнѣ—іюль. Представляетъ переходъ къ *P. sicanaria* Z.
958. *Selenia bilunaria* Esp.—Въ Софії [41] рѣдка въ іюнѣ (700 метр.).
959. *Crocallis tusciaria* Bkh.—Въ Болгарії [43].
960. *Eurymene dolabraria* L.—Въ Варнѣ [31].
961. *Angerona prunaria* L.—Въ Софії [41] въ маѣ (800 метр.), рѣдка.
962. *Hypoplectis adspersaria* Hb.—Въ сѣверной части Балканскаго полуострова [43].
963. *Anisopteryx aceraria* Schiff.—Въ сѣверной части Балканскаго полуострова [43].
964. *Biston hispidarius* F.—Въ сѣверной части Балканскаго полуострова [43].
965. *Biston alpinus* Sulz.—Въ Варнѣ и Сливенѣ [31].
966. *Biston graecarius* Stgr.—Въ Болгарії [43].
967. *Biston necessarius* Z.—Въ Болгарії [43].
968. *Nychiodes lividaria* Hb.—Между Варной и Сливеномъ въ горахъ [31].
969. *Nychiodes amygdalaria* H.-S.—Въ Болгарії [43].
970. *Gnophos glauzinaria* Hb. var.?—Пойманъ въ Софії [42] 8 августа 1901 года.
971. *Halia wauaria* L.—Въ Софії [41] въ іюль (700 метр.).
972. *Phasiane petraria* Hb.—Въ Софії [41] въ іюнѣ.
973. *Eubolia arenacearia* Hb.—Въ Рущукѣ [41] въ іюнѣ.
974. *Aspilates strigillaria* var. *cretaria* Ev.—Въ Варнѣ [31].
975. *Anaitis simpliciata* Tr.—Въ сѣверной части Балканскаго полуострова [43].
976. *Lobophora halterata* Hufn.—Въ сѣверной части Балканскаго полуострова [43].
977. *Cidaria truncata* Hfn.—Въ Софії [41] рѣдка, въ августѣ.
978. *Cidaria minorata* Tr.—Въ Софії [41] въ іюнѣ (1500 метр.).

979. *Cidaria sordidata* F.—Въ Софії [41] въ іюль (700 метр.).
980. *Eupithecia silenicolata* Mab.—Въ Болгарії [43].
981. *Eupithecia extraversaria* H.-S.—Въ съвернй части Балканскаго полуострова [43].
982. *Eupithecia albipunctata* Hw.—Въ съвернй части Балканскаго полуострова.

Такимъ образомъ этотъ дополнительный списокъ содержитъ:

	Родовъ:	Видовъ:
<i>Rhopalocera</i>	—	15
<i>Sphinges</i>	—	12
<i>Bombyces</i>	1	10
<i>Noctuae</i>	6	29
<i>Geometrae</i>	7	29
	<hr/> 14	<hr/> 95

Всего же до сихъ поръ изъ *Macrolepidoptera* въ Болгарії известно 259 родовъ и 981 видовъ и разновидностей.

Дополненія къ літературнымъ указаніямъ.

На стр. 371 послѣ № 7 должно слѣдовать:
7 а. **Вацовъ, С.** Земледѣлческо-метеорологически бюллетинъ за периода отъ 19 Ноемврий до 19 Декемврий 1899 (ст. ст.). Издава централната метеорологическа станция.—Дѣржавенъ Вѣстникъ. XXII. № 4, р. 9—11. София 1900. Въ томъ-же томъ находятся подобные «бюллетини» и за періоды: отъ 20/XII до 20/I. 1900. (№ 24), отъ 20/I до 16/II (№ 48), отъ 17/II до 18/III. (№ 72), отъ 19/III до 19/IV. (№ 92), отъ 18/IV до 18/V. (№ 113), отъ 19/V до 19/VI (№ 139), отъ 18/VI до 2/VII. (№ 151), отъ 3/VII до 18/VII. (№ 163), отъ 19/VII до 2/VIII. (№ 175), отъ 3/VIII до 18/VIII. (№ 186), отъ 19/VIII до 17/IX. (№ 214),

отъ 18/IX до 18/X. (№ 241), отъ 19/X до 17/XI. (№ 264).
1900.

7 b. **Вацовъ, С.** Бюлетинъ за врѣмето. Издава централната метеорологическа станция въ София.—Дѣржавенъ Вѣстникъ. XIV. (1892), XV. (1893), XVI. (1894), XVII. (1895), XVIII. (1896), XIX. (1897), XX. (1898), XXI. (1899), XXII. (1900), XXIII. (1901). София. [Всякій томъ содържитъ отъ 285 до 288 номеровъ этого «Вѣстника» и во всякомъ номерѣ находятся метеорологическія данния за этотъ день для нѣсколькихъ городовъ Болгаріи и Западной Европы].

Въ концѣ цитаты № 8 должно слѣдоватъ: р. 310—318. 1897.

Въ началѣ цитаты № 9 должно стоять имя: **Витановъ, Хр.**

На стр. 372 послѣ цитаты № 12 должно слѣдоватъ:

12 a. **Мандаджиевъ, Д.** Годишень отчетъ на метеорологическата станция въ гр. Казанлакъ за 1897 година.—Отчетъ на Дѣрж. Педаг., Трикл. и Образц. Училище въ гр. Казанлакъ за учеб. 1897—98 год. 7 табл. 1898.

12 b. **Мандаджиевъ, Д.** Годишень отчетъ на метеорологическата станция прѣзъ 1898 година.—Отчетъ на Казанльшкото Дѣржавно Педагогическо, Трикласно и Образцово Училище за учеб. 1898/99 год. р. 109—113. 1899.

12 c. **Мандаджиевъ, Д.** Годишень отчетъ на метеорологическата станция въ гр. Казанлъкъ за 1899 година.—Отчетъ на Казанльшкото Дѣржавно Педагогическо, Трикласно и Образцово Училище за уч. 1899/900 год. р. 85—86. 1901.

Послѣ цитаты № 14 должно слѣдоватъ:

14 a. **Сираковъ, П. С.** Мѣсечень бюллетинъ на метеорологическата станция въ с. Садово.—Садово, селско-стопански вѣстникъ. II. (1899/1900). № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пловдивъ 1900.

15 a. **Стояновъ, М.** Годишень отчетъ на метеорологическата станция при гимназията за 1897 година.—Отчетъ на Маринската Дѣржавна Дѣвическа Гимназия въ Стара-Загора за 1897/98 учеб. год. р. 223—227. 1898.

15 b. **Цачевъ, Т.** Мъсеченъ бюлетинъ на метеорологическата станция въ с. Садово. — Садово, селско-стопански вѣстникъ I. (1898/99). № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Пловдивъ 1899; II. (1899/900). № 1, 2, 3, 4. Пловдивъ 1899.

Послѣ цитаты № 16 должно слѣдоватъ:

16 a. Годишенъ отчетъ на метеорологическата станция въ Пловдивъ за 1897 година. — Отчетъ на Пловдивската Държавна Мажска Гимназия «Александъ I» за учебната 1897—98 година. 1898. 2 таблицы.

16 b. Годишенъ отчетъ на метеорологическата станция въ Стара-Загора за 1898 година. — Отчетъ на Мариинската Държавна Дѣвическа Гимназия въ Стара-Загора за 1898/9 уч. год. р. 91—94. 1899.

На стр. 376 передъ цитатой № 15 должно стоять:

14 a. **Малковъ, К.** Описание на по-главните плѣвели, които се срѣщатъ въ насъ. — Отчетъ за състоянието на учебното дѣло и фермата на Държ. Земедѣлч. Училище при гр. Русе презъ 1896/7 учеб. год. р. 47—49. 1898.

Такъ какъ работа А. Тошева уже напечатана, то въ концѣ цитаты № 23 должно стоять: LXII. № 2, р. 77—140.

Послѣ цитаты № 23 должно слѣдоватъ:

23 a. **Тошевъ, А.** Материяли по флората на Вършецъ и околноститъ. — Периодическо Списание на Бълг. Книжовно Друж. въ София. LXII. № 6—7, р. 464—495. 1901.

23 b. **Тошевъ, А.** Материяли по флората на Западна България. — Периодическо Списание на Бълг. Книжовно Друж. въ София. 1902. [Печатается].

Въ концѣ цитаты № 24 слѣдуетъ вычеркнуть: XV, р. 3—104. 1898. София, а послѣ этой цитаты должно стоять:

24 a. **Урумовъ, Ив. К.** Материяли за флората на Търновския окрѣгъ. — Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина. XV, р. 3—90. 1898.

24 b. **Урумовъ, Ив. К.** Втора прибавка къмъ флората на Лов-

чанския окрѣгъ.—Сборникъ за Народни Умотворенія, Наука и Книжниниа. XV, р. 91—104. 1898.

24 с. Урумовъ, Ив. К. Приносъ къмъ Българската Флора.— Сборникъ за Народнитѣ Умотворения, Наука и Книжнина. XVIII. 124 pag. София 1901 (отд. оттискъ).

24 d. Урумовъ, Ив. К. Втори приносъ къмъ флората на България.—Периодическо Списание на Бълг. Книжовно Друж. въ София. LXII, № 4—5, р. 293—409. 1901.

24 е. Урумовъ, Ив. Н. Материали за Флората на Ловчанския и Търновския окръгъ.—Сборникъ за Народните Умотворения, Наука и Книжнина. XVIII, 43 pag. София 1901 (отд. оттискъ).

На стр. 378 послѣ цитаты № 35 должно слѣдовать:

35 a. **Bubák, Fr.** Mykologische Beiträge aus Bosnien und Bulgarien.—Sitzber. der k. böhmischen Gesellsch. der Wissensch. Math.-Naturw. Classe. 1900, p. 1—6.

На стр. 386 слѣдуетъ добавить, что въ Сливенѣ растуть еще и фиговыя деревья; городъ открытъ къ югу (а не къ востоку), съ запада же и востока (а не юга) онъ окружены холмами.

На стр. 393 послѣ цитаты № 11 должно слѣдовать:

11 а. **Малковъ, К.** Болести и неприятели по посъветъ въ испитателното поле при Руссенското Държ. Землед. Училище презъ 1896/7 година. — Отчетъ за състоянието на учебното дѣло и Фермата на Държ. Землед. Училище при гр. Русе презъ 1896/7 учебн. год., р. 50—64. 1898.

Поправки къ главному списку бабочекъ.

№ 59 долженъ быть вычеркнутъ, такъ какъ *L. tiresias* Rott. = *L. argiades* Pall. (№ 60).

На стр. 396 у бабочки № 3 слѣдует читать: въ Рущукѣ [49] = (вместо: [46]).

Tiré des «Horae Societatis Entomologicae Rossicae», t. XXXV.

Janvier 1902.

Rédacteur: André Sémenow.

Типографія Імператорської Академії Наукъ (В. О., 9 л., № 12).

†60.00

