

幼科證治準繩 七之



漢書門			
類	號	函	架
110	110	110	110
冊	架	函	號

庫文閣內	
函	架
110	110
冊	架

庫文閣內	
番號	漢 13010
冊數	120 (90)
函號	301 64



幼利證治準繩集之七

金壇王肯堂字泰甫輯

脾

錢脾主困 實則困睡身熱飲水 虛則吐瀉生風

脾病困睡泄瀉不思飲食 脾胃虛寒則面眇白

且無精光口鼻氣冷肌體瘦弱吐水腹痛不思乳食

用益黃散下利用調中丸 傷風手足冷者脾臟怯


也先用益黃散補脾後用大青膏發散 脾病見四

季皆放餘四臟治之順者易治逆者難治 脾怯當

脾

力

一



面赤自黃五臟相反隨證治之 潔脾主濕自病則
 泄瀉多睡體重昏倦脾苦濕急食苦以燥之 實則
 泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散主之 虛則泄瀉色白
 睡露睛白朮散主之 肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓
 半夏湯主之 心乘脾虛邪壯熱體重而瀉羌活黃
 芩蒼朮甘草湯主之 肺乘脾實邪能食不大便而
 嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶丸 腎乘脾微邪惡
 寒泄瀉理中丸之類主之 劉凡脾之得病必察肝
 心兩臟之虛實根其源之所起然後救療蓋肝是脾
 之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼勝心氣虧則脾家生

氣不足盛者抑之則退虧者益之不乏所以有抑脾
 氣益心氣兩藥診其脉肝心兩臟俱和則是脾自至
 疾察其虛實而治之 薛前證實者病氣實而形氣
 虛也若面色眊白吐瀉腹痛口鼻氣冷屬寒水侮土
 宜用益黃散若面青唇黧吐瀉手足並冷此脾土虛
 寒用乾薑理中湯若面色痿黃手足不冷此脾土虛
 弱用人參理中湯若傷風手足並冷吐痰咳嗽吐瀉
 腹脹此脾肺氣虛用五味異功散實脾氣加防風升
 麻散外邪若發於寅卯之時用六君柴胡升麻補脾
 土平肝木然面黃者脾之本色也面赤者火生土為

順面青者木尅土為逆當平其所勝以補元氣為善
海脾苦濕急食苦以燥之白朮脾欲緩急食甘

以緩之甘草以甘補之人參以苦瀉之黃連

脾虛以甘草大棗之類補之如無他證以錢氏益黃

散補之虛則補其母心乃脾之母以炒鹽補心

益黃散錢氏又名補脾散治脾胃虛寒

陳橘皮壹兩青橘皮訶子肉

甘草各半兩 剉炒丁香貳錢

右為細末每服一錢水一盞煎至六分食前溫服

東垣云闡孝忠編集錢氏方以益黃散補土又言

風旺必克脾土當先實其脾味者不審脾中寒熱

一例用補脾藥又不審藥中有丁香青皮辛熱大

瀉肺金脾虛之證豈可及瀉其子為寒水反來侮

土中寒嘔吐腹痛瀉痢青白口鼻中氣冷益黃散

神治之藥也如因服熱藥巴豆之類過劑損其脾

胃或因暑天傷熱積熱損其脾胃而成吐瀉口鼻

中氣熱而成慢驚者不可服之今立一方治胃中

風熱名人參安胃散薛氏云脾土虛寒寒水侮

之如東垣所云諸證宜用此方若因脾土虛弱吐

瀉者用六君子湯加柴胡如不應或手足俱冷屬

月音
虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾虛肝侮必治
以前藥若乳母鬱怒致兒患前證母服加味歸脾
湯

人參安胃散 治脾胃虛熱

黃耆 貳錢

人參

陳皮 壹錢

生甘草

炙甘草 各半

白芍藥 柒分

白茯苓 肆分

黃連 少許

右為麤末每服二三錢水煎五沸去渣溫服

四君子湯

六君子湯 吐瀉 二方見

海脾實以枳實瀉之如無他證以錢氏瀉黃散瀉之

實則瀉其子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

瀉黃散 錢氏 又名瀉脾散

藿香葉 柒錢

山梔子仁 壹兩

石膏 半兩

甘草 叁兩

防風 肆兩去

右剉同蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水

一盞煎至五分溫服清汁無時

薛前證若作渴飲冷卧不露睛手足熱甚或遍身
發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯卧而
露睛手足並冷屬胃經虛熱宜用異功散若面青
搐搦乳食少思肝乘脾也用秘旨補脾湯若面赤

驚悸身熱昏睡心乘脾也用秘旨安神丸若面白
喘嗽肢體倦怠肺乘脾也用補中益氣湯若唇黑
泄瀉手足指冷腎乘脾也用益黃散病後津液不
足口乾作渴宜用七味白朮散若乳母膏粱厚味
七情鬱火所致當審其因而治其母

不乳食

薛經曰胃爲水穀之海六腑之大源也人身氣血腑
臟俱由胃氣而生故東垣之法一以脾胃爲主所謂
補腎不若補脾正此意也在小兒雖得乳食水穀之
氣未全尤仗胃氣胃氣一虛則四臟俱失所養矣故
丹溪謂小兒多肝脾之疾也若面色晄白目無睛光
口中氣冷不食吐水肌瘦腹痛此胃氣虛寒之證用
五味異功散或六君子湯主之若太使不實兼脾虛
也加乾薑溫之中滿不利脾不運也加木香開之喜

冷便秘胃實熱也用瀉黃散涼之命門火衰不能生
主者用八味丸補之稟賦胃氣不足亦用此丸蓋下
真陽充盛則上生脾元自能溫蒸水穀矣
平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脹痛口苦短
氣惡心噯氣吞酸面黃體瘦嗜臥體痛霍亂吐瀉
等證

厚朴 薑汁 伍兩

陳皮

甘草 炙各 壹兩

蒼朮 米泔浸 焙捌兩

右為末每服二錢薑棗水煎沸湯點服亦得常服
調氣煖胃化宿食消痰飲辟四時不正之氣

愚按前證若乳食停滯噯腐吞酸嘔噦惡心者宜
服是方若飲食既消脾胃虛弱嘔吐惡心者則宜
四君子湯

調中丸 治脾胃虛寒

白朮

人參

甘草 炒各 伍分

八味地黃丸即六味地黃丸加肉桂附子各壹兩治
稟賦命門火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食
少思及食而不化腹臍疼痛夜多漩溺等證內經
謂益火之源以消陰翳正此藥也

錢氏益黃散

三名補 脾散

治脾胃虛冷吐瀉

前方見之 前

愚按前方若脾土虛寒或寒水侮土而嘔吐泄瀉
 手足並冷或痰涎上湧睡而露睛不思乳食者宜
 用此方若脾土虛弱吐瀉者用六君柴胡如不應
 或手足俱冷者屬虛寒加木香炮薑若因乳母脾
 虛肝侮亦治以前藥若乳母鬱怒致兒患前症者
 其母兼服加味歸脾湯
 參苓白朮散 主脾胃虛弱飲食不進多困少氣中
 滿痞噫嘔吐逆此藥不寒不熱性味和平常服調
 脾悅色順正去邪

人參去蘆

白茯苓去皮

粉草

白朮

白扁豆炒去殼

山藥去黑皮

縮砂仁

薏苡仁

桔梗炒九味各壹兩

蓮子肉去心

右剉焙為末每服半錢至一錢用棗湯空心調服
 或溫米湯亦可

健脾飲 建脾養胃理嘔吐治瀉痢及諸病後氣色

虛弱有痰惡心腹中微痛飲食減精神慢並宜服
 之

厚朴

去蘆皮剉碎薑汁浸一宿慢火炒

人參

去蘆各壹兩

白茯苓

去皮

肉豆蔻

不乳食

半夏

湯煮透濾仍判焙乾

益智仁

淨香附

良薑

判片東壁土炒

訶子肉

各貳錢半

甘草

炙伍錢

右判每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無

時服

藿香飲

理虛化痰及治脾胃不和飲食少進正氣

除邪

人參

去蘆

半夏

湯煮透濾判片焙乾

赤茯苓

去皮

甘草

炙各壹兩

蒼朮

去蘆皮米泔水浸一宿濾乾判片用火炒至微黃色

陳皮

去白

藿香

去梗各米錢半

厚朴

去蘆皮製壹兩半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心溫服或入燒鹽同煎

治小兒脾胃虛弱飲食少進

用人參白朮茯苓甘草等分爲末每服一錢鹽湯

點服一方加陳皮硝砂

治胃虛氣逆吮乳不食

用人參壹錢丁香藿香葉各半錢水半盞煎熟入

乳汁少許煎服

治胃弱吐逆手足心熱不進乳食

用陳紅麴參錢半白朮壹錢半麩炒甘草炙壹錢

不乳食
為末每服半錢棗湯米飲下
治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

用厚朴薑製壹錢白木半錢乾薑炮甘草炙各參
分水一盞薑二片煎空心熱服

治宿食傷脾消食快膈

用確砂仁枳皮三稜莪朮神麩麥蘖各半兩香附
子壹兩各炒為末麩糊丸如麻子大食後白湯下
隨大小加減丸數

茅先生勻氣散

桔梗

任兩

甘草

炙貳兩

白薑

壹分

確砂仁

陳橘皮

茴香

洗各壹兩

為末半錢或一錢霜木瓜煎湯調服紫蘇鹽湯亦

得寶童多厚朴蒼朮良薑桂烏梅名養脾湯

調理眾病醒脾散

木香

白朮

並濕紙裹煨

人參

茯苓

草菓子

甘草

陳橘皮

厚朴

綱砂水煮

紫蘇子

右等分為末一錢水六分薑一片棗半箇煎四分

通口服

建脾散治小兒胃氣

白茯苓 去皮 人參 各壹兩 厚朴 參兩用薑洗炙

蒼朮 米泔浸宿肆兩 陳橘皮 去白伍兩 甘草 貳兩半生半熟

草菓子 去皮貳兩

右件為末每服一錢薑棗同煎隨大小分減服

調中飲子 治小兒諸疾

肉荳蔻 白木 炮 人參

陳橘皮 去白 訶子 炮去核 茴香

甘草 炙 確砂仁 各半兩 藿香

桂心 檳榔 各錢

右為末每服半錢一錢用薑棗煎水隨兒大小五

分四分煎通口服

寶童壯脾去積進食

京三稜 蓬莪茂 醋紙裏煨 益智 去皮各肆兩

甘草 炙肆兩半 陳皮 青皮 各貳兩

右為末湯點一錢不時服薑棗煎亦得

治患後脾胃虛弱煩熱恍惚睡中多驚氣急煩亂温

養脾胃消進妳食勻氣清神調和臟腑神木散

聖藥白朮 人參 茯苓

石蓮肉 去心 鷲粟米 白扁豆

藿香 甘草 炙

等分細末半小錢棗湯調空心日午服漢東觀音散少白木

粟米多神麴白
芷木香黃耆

聖惠治脾胃不和見食欲嘔心胸壅悶前胡散

前胡各參 蘆根各參 桂心壹分

人參 白朮 赤茯苓

枇杷葉炙 甘草炙 厚朴薑炙各

麤羅一錢冰一小盞薑少許煎五分不時量溫服

張渙集香煎 治脾胃虛不欲食羸瘦

藿香葉 厚朴薑製 丁香

沉香 木香各壹兩 白茯苓

白苳蔻 白朮炮各半兩

右為細末入麝香壹錢水一升蜜半斤大棗二十

枚薑二十片銀石器中慢火熬成膏去薑棗通風

處陰乾每皂子大乳前米飲下

調中散 治小兒冷熱不調致脾胃不和

木香剉 人參去蘆頭 青橘皮湯浸去白焙乾

各壹兩 丁香 白朮

白茯苓 大腹皮剉 甘草

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑三

片煎五分去滓溫服

益胃丹 調冷熱和脾胃

當歸洗焙 木香 白朮 人參

沉香各壹兩 白芍藥 人參去蘆

蓬莪茂 縮砂仁各半兩

右件搗羅為細末白麩糊和如黍米大每服拾粒至拾伍粒點麝香湯下量兒大小加減

丁香黃耆散 治小兒脾胃虛弱不能飲食已漸傷

損榮衛致令肌體羸瘦時時下痢面色青白

丁香 綿黃耆剉 人參去蘆

白朮 當歸洗焙 鱉甲塗酥炙黃去裙襴各

兩壹 胡黃連 甘草炙各半兩

右件搗羅為細末每服壹錢水一盞入生薑二片

棗二枚同煎至五分去滓温服食前

千金地黃丸 治胃氣不調不嗜食生肌肉

乾地黃 大黃各兩陸銖 茯苓拾捌銖

杏仁 柴胡 當歸各半兩

右為末蜜丸如麻子每服五丸日三

嬰孺治三歲兒不食或嘔或頭熱或下利或渴或

手脚熱有時冷每日一劑便能食

鼈甲壹兩 當歸 甘草炙

升麻 各貳錢半

椒 伍拾粒汗

右切水一升煮八合為三服相去人行六七里再服覺身上潤衣蓋取汗微汗勿深

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

脾弱多困

丹溪云脾具坤靜之德而有乾健之運夫胃陽也主氣脾陰也主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣清氣上升糟粕下降納五穀化津液其清者為榮濁者為衛陰陽得此謂之橐籥故東垣以脾胃為五臟之根本也脾氣既弱則健運之令不行化生之功已失職而嗜卧多困所由生焉法當溫補其脾脾氣既旺則臟腑清陽之氣升舉易於運行又何困倦之有海藏用四君子加木香砂仁半夏白朮倍之薑

棗煎服誠良法也若脾虛好睡多驚則是心血虛而
火動之宜安神養血若因心脾氣虛有痰者宜用人
參五味子茯苓以補心氣當歸芍藥酸棗仁以養心
血橘紅半夏以開痰若因脾肺氣虛胸膈有痰用補
中益氣湯以健脾胃膽星天竺丸痰涎以化痰涎若
因飲食停滯而作用四君子湯以益脾土山查神麩
以消飲食若因脾虛而好睡用五味異功散吐瀉以
補脾氣當歸芍藥以生脾血芍藥須用酒拌炒黃不
則酸寒傷脾此假熱以對假寒也若乳母飲酒致兒
昏醉好睡者以乾薑陳皮煎湯解之不應用異功散

加乾葛即愈矣

海藏脾胃不和四君子加白朮一倍薑棗煎 脾困
四君子加木香砂仁人參各半錢煎 脾胃虛弱生
氣多困四君子加炒半夏麩沒石子等分爲末入冬
瓜子少許同煎

本治脾風多困用人參散入慢驚參用

人參

冬瓜仁各半兩

南星切片用漿水薑汁煮

存性 壹兩

右爲細末每一錢右半盞煎二三分溫服

脾胃多困

本然喘大奔一給大半氣喘二三公認
 立補
 小兒火苗同煎
 本然喘大奔一給大半氣喘二三公認
 立補
 小兒火苗同煎
 本然喘大奔一給大半氣喘二三公認
 立補
 小兒火苗同煎

痰涎

聖惠兒多涎者風熱壅脾積聚成涎即乳食不下涎
 沫結實而生壯熱小兒多涎由脾氣不足不能四
 布津液而成若不治其本益中氣而徒去其痰涎痰
 涎雖病液亦元氣所附去之不已遂成虛脫余見驚
 搐壯熱等證醫以下痰小見功效屢下之而致夭亡
 者屢矣錢氏治朱監簿子五歲夜發熱曉如故醫
 以鐵粉丸下涎病益甚至五日大引飲錢取白朮散
 壹兩煎三升任意服朱疑議瀉錢曰縱瀉勿恠

但不可下耳止瀉治痰退熱清神皆此藥也又煎三升服稍盡愈第三日又服三升不渴無涎投阿膠散喘嗽二服安

半夏丸 治痰證若驚搐後風涎潮作服之神效

半夏生用 赤茯苓去皮 枳殼製各壹兩

風化朴硝貳錢

右前三味剉焙為末入乳鉢同朴硝杵勻用生薑自然汁煮糯米粉為丸棗豆大每服三十九至五十九仍以淡薑湯食後臨睡送下兒小煮丸如粟穀大

白附丸 通治小兒咳嗽有痰感冒發熱吐瀉心神

不安神効

南星貳兩 半夏 白附子

白礬各壹兩

右為細末薑汁糊丸如桐子大一歲兒服八丸用

薄荷湯化下南星半夏用冬藏雪水於六月六日浸起曬乾又浸凡丸次方用

膽星天竺丸 治小兒痰涎上壅喘嗽不休

牛膽南星壹兩 半夏湯泡去皮 白附子湯泡去皮

天竺黃叁錢 天麻

防風各貳錢 辰砂壹錢另研水飛

珍海 卷之十 十一

右為末甘草膏為丸芡實大每服一丸空心薄荷淡薑湯化下

牛蒡子散 治小兒心脾壅熱多涎

牛蒡子

梔子仁

甘草

川硝

鬱金 各半

枳殼 壹分 麩炒

右件藥搗細羅為散入龍腦半錢同研令勻不計時候用薄荷水調下半錢量兒大小加減服之

萬全鬱金散 治小兒風熱鎮心壓涎

鬱金

壹兩用皂角貳挺按水一碗以來慢煮鬱金令乾用承淨洗到

天竺黃

馬牙硝

甘草 炙各半兩

朱砂 壹分

龍腦 壹錢

右件藥搗羅為末都研令勻每服半錢用麥門冬熟水調下量兒大小以意加減服

小朱砂丸 治小兒眠睡多驚化風壅痰涎安神

朱砂 壹兩

天南星 牛膽內製者

人參

茯苓

珍珠 研

半夏 生薑半兩同以水煮

一二二百沸取出焙乾各秤末半兩

麝香 各少許

右件同研勻以水浸蒸餅為丸如黍米大每服四五丸不計時候煎金銀湯下

卷之十

力持

十一

痧症 卷之七

張煥治小兒多涎乳食不下涎不流出者乃名脾熱
多涎宜金朱丹

朱砂 細研 水飛

半夏 湯浸 七遍

牛膽南星 各壹 兩

白茯苓 半兩 三

石膏 半兩 細研 水飛

金箔 貳拾 片研

右件都拌勻再細研用生薑自然汁和如黍米大

每服十粒煎人參湯下乳後

譚氏金珠丸 治小兒驚悸心忪化涎痰利胸膈煩

熱止欬嗽

天南星 炮

白礬 焙

半夏 湯浸 柒錢

朱砂 研細 各半兩

人參

乾山藥 各壹 錢

膩粉 貳錢

金箔 拾片

右為細末薄荷汁同水打糊為丸如棗豆大金箔為衣每服一丸食後生薑湯下量力服

半夏丸 治小兒脾熱乳食不下胸膈多涎

半夏 半分 生薑湯洗七遍去滑

皂角子仁 半兩

右件藥搗羅為末用生薑汁和丸如麻子大不計時候以溫水下三丸隨兒大小以意加減

劉氏消乳痰丸 此方出禁中小兒無疾亦宜常服

大半夏 半兩 切作頭子 大用 水壹椀 煮水盡為度 不用 蘿蔔

人參 貳錢 半取

卷之七

八

右二味焙乾同為細末生薑自然汁煮糊為丸如
菘豆大每服二十九或三十九生薑湯下食後服
看兒大小加減

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

吐瀉

曾小兒吐瀉併作即名霍亂有心痛而先吐者有腹
痛而先瀉者莫不由中焦而作上焦主納而不出中
焦主腐化水穀而生榮衛灌溉百骸下焦分別水穀
主出而不納脾居中州胃為水穀之海乳哺入胃脾
能尅化然後水穀分膈上一寸傳變得宜豈有吐瀉
之患凡小兒吐瀉皆因六氣未完六淫易侵兼以調
護失宜乳食不節遂使脾胃虛弱清濁相干蘊作而
然有先瀉而後吐者乃脾胃虛冷其候先瀉白水吐

亦不多口氣緩而神色慢額前有汗六脉沉濡此爲
冷也先吐而後瀉者乃脾胃有熱氣促唇紅吐來面
赤脉紅而數渴飲水漿此爲熱也冷熱之分要須詳
審嬰吐瀉昏睡露睛者胃虛熱錢氏白朮散和中
散主之吐瀉昏睡不露睛者胃實熱錢氏玉露散
河間益元散主之薛手足指冷者脾氣虛寒也用
異功散加木香傷風吐瀉者風木尅脾土也亦用
前藥若飲熱乳而瀉黃者濕熱壅滯也用四苓散
如不瘳或反甚者元氣復傷也用白朮散瀉而腹
中重墜者脾氣下陷也用補中益氣湯若服尅滯

之劑而腹中窄狹者脾氣虛痞也用六君子湯若
面黃瀉青脾虛而肝乘之也用六君柴胡升麻木香
若多噫瀉黃心脾氣虛也用六君炮薑升麻生
下半月旬白內吐者止宜調治其母恐嬰兒藏府脆
弱不勝藥餌故也

夏秋治裏錢小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食
大便乳食不消或白色是傷寒當下之併和胃下用
白餅子和胃用益黃散脾主之
兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便
青白色乳食不消此上實下虛也更有五藏兼見證

五月身
熱瀉黃
九分下
一分補

肺睡露睛喘氣 心驚悸飲水 脾困倦饒睡
肝呵欠煩悶 腎不語畏明 當先視兒兼藏證先
瀉其所實者而補其虛如脾虛益黃散主之此二證
多病於秋夏也

五月夏至後吐瀉身壯熱者此熱也蓋小兒藏府十
分中九分熱也或因傷熱乳食不消瀉深黃色玉露
散主之

玉露散方 一名甘露散

寒水石 半兩軟而微青
黑中有細紋者

生甘草 壹錢

石膏 半兩堅白而有墻壁手不可折者如無以
方解石代之堅白似石膏敲之段段皆方

六月身
湯瀉黃
白色六
分補四
分下

右同為細末每服一字或五分一錢食後溫湯調
是者
下海藏云非腎熱相火
大盛者不宜服此

六月大暑後吐瀉身大溫而似熱臟腑中六分熱四
分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不
食乳食前少服益黃散食後多服玉露散 廣親官
五太尉病吐瀉不止米穀不化眾醫用溫藥一日而
加喘吐不定錢氏曰當以涼藥治之所以然者謂傷
熱在內也用石膏湯三服并服之眾醫皆言吐瀉多
而米穀又不化當補脾何以用涼藥王信眾醫皆用

七月瀉
身溫涼

補脾丁香散三服錢醫後至曰不可服此三日後必
腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所以然者謂
六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大吐瀉
也醫又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當甚
眾師不能治復召錢至見其熱證以白虎湯發熱三
服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與
白虎湯各二服四日用石膏湯一服及旋合麥門冬
黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以硃砂為衣服五丸竹
葉湯化下熱退而安

七月立秋後吐瀉身溫藏府中三分熱七分冷也不

三分下
七分補

能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦
欲大便不渴食前多服益黃散食後少服玉露散
廣親官七太尉七歲病吐瀉是時七月其證全不食
而昏睡睡覺而悶亂哽氣乾嘔大便或有或無不渴
眾醫作驚治之疑睡故也錢曰先補脾後退熱與史
君子丸補脾石膏湯退熱次日又以水銀硫黃末
研和以薑水調下壹字錢曰凡吐瀉五月內九分下
而一分補八月內九分補而一分下此者是脾虛瀉
醫妄治之至於虛損下之即死即當補脾若以史君
子丸恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何

七月瀉身溫涼

卷之十一

七

八月身
冷瀉青
一分下
九分補
下後不
愈隨證
用藥

食而噦錢曰脾虛津少即嘔逆曰何瀉青褐水曰腸
胃至虛冷極故也錢治而愈

八月秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾嘔噦瀉

青褐水當補脾益黃散主之不可下也

田凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐

亡津必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日必愈

如身熱脉大小便黃用五苓益元各半熱湯調温

服之如身涼脉細小便青早晨益黃散午後玉露

散如過四五日困弱宜異功散和中散開胃丸

瀼如有風而瀉用防風羌活謂吐瀉兼肝病有熱

而瀉用黃連黃芩大黃謂吐瀉兼心有寒而瀉用

附子謂吐瀉兼腎病身冷有濕而瀉用白木茯苓

謂吐瀉兼本藏脾病有肺病而瀉用芍藥桂心定

喘麥冬人參甚者多檳榔大便不通加大黃謂吐瀉

喘嗽更詳看病新舊新則止之久則有腸風之患

宜推陳致新法當宣風散痘發導過後用入藏君臣

藥調之宜益黃散

曾有小兒盛夏初秋遇夜乘風渴而飲水過餐生冷

果物攻激腸胃遂乃暴吐暴瀉傳作手足俱痺筋攣

而痛痛則神志不寧以驚證治之誤矣所謂筋遇寒

七馬夏秋冷裏

三三

則引縮又以陽明養宗筋屬胃與大腸因內傷生冷
飲食外感風邪吐瀉交作胃氣因虛不能養其宗筋
亦致攣急此證口氣溫面色慘脈沉緩再以手按兩
膝腕下見筋縮而引於皮間是其候也治以理中湯
加附子半生半炮水薑熟煎空心溫服更詳虛實冷
熱為治可也 有數歲小兒忽患吐瀉始自夏秋晝
近極熱之地解衣乘涼夜卧當風之所致蓋先感熱
後感冷陰陽相搏氣射中焦名為霍亂活人書用香
薷散調治以其能分別水穀升降陰陽又曰熱多欲
飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸詳此治法得

非欲平中焦乎 薛凡暑令吐瀉手足指熱作渴飲
冷者屬陽證宜清涼之劑手足指冷作渴飲熱者屬
陰證宜溫補之劑凡病屬陰證誤用寒涼者死則手
足青黯或徧身皆然
香薷飲 治夏秋臟腑冷熱不調飲食不節吐痢心
腹疼痛發熱煩悶
香薷 參兩
白扁豆
厚朴 各壹兩半
生甘草 二兩
右剉每服二錢水一盞煎服
車前子散 治暑月霍亂吐瀉煩悶引飲不止小便

七篇夏秋治程

不利

白茯苓

豬苓

香薷

車前子炒

人參各等分

右為末燈心湯調下

不換金正氣散

治脾胃不和寒熱往來臟腑虛熱

霍亂吐瀉

厚朴薑製

藿香

陳皮

半夏

蒼朮米泔浸

甘草各等分

右每服二三錢薑棗水煎服

二順散

治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀便

血肚疼

豬苓

澤瀉

茯苓

白朮

甘草炙

官桂

乾薑

杏仁各壹兩去皮尖雙仁炒

右為末每服半錢不拘時水調下或水煎服

六和湯 治心脾不和氣不升降霍亂吐瀉咳嗽胸

滿頭自疼痛嗜卧倦怠并陰陽不分冒暑伏熱煩

悶成痢中酒作渴心逆畏食

人參去蘆

縮砂仁

甘草炙

杏仁泡去皮尖

半夏湯煮透剉焙乾各壹兩

白扁豆炒熟剉去殼壹

吐瀉

斤碎切爛拌勻
釀經宿焙乾

藿香

赤茯苓 去皮 木瓜 各貳

香薷

厚朴 去麤皮薑製慢
火焙乾各肆兩

右每服二錢水一盞薑三片棗一放煎七分無時

溫服或入鹽半字同煎

冬春治表錢傷寒吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣麤大

便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽更有五藏兼見證

當煎入臍君臣藥先服大青膏後服益黃散如先曾

下或無下證慎不可下此乃脾肺受寒不能入脾也

潔古云身溫吐瀉咳嗽是風木入於脾母虛其子
亦弱法當煎檳榔荳蔻湯下大青膏後服益黃散

身溫瀉
黃白咳
嗽先表
後瀉

身熱瀉
黃而渴
先止渴
後表

身涼瀉
青不渴
先補後
表

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃

水此為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴

止後用發散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之

潔古云吐瀉身熱而渴小便少者五苓散主之身熱

而嘔者當服白朮散後煎檳榔木香湯下大青膏

傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白色悶亂不渴噎氣長出

氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發

散補脾益黃散發散大青膏主之此二證多病於春

冬也潔古云身涼吐瀉不渴者則知
為寒煎附子桂枝湯下大青膏

天麻 末壹

白附子 末生壹 蝎尾 去毒生

土瀉冬春治表

刀斗七

表不
者利
後補

朱砂研壹 青黛研壹錢 麝香壹字
烏蛇稍肉 酒浸焙乾 天竺黃壹字
右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂
子大月中兒粳米大同牛黃膏温薄荷水化一處
服之五歲已上同甘露散服之
小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以温補之不已復
以涼藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因
脾氣積虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡
露睛身温風在脾胃故大便不聚而為瀉當去脾間
風風退則痢止宣風散主之後用史君子丸補其胃

亦有諸吐痢久不瘥者則脾虛生風而成慢驚矣
海吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附
子減半生薑煎服
守胃散 治陰陽不和吐瀉不止預防風證常調脾
胃進飲食

- 人參 去蘆 白朮
- 山藥 去黑皮 乾葛
- 南星 剉碎瓦器盛東壁土同炒 甘草
- 藿香 去梗 防風 去蘆 天麻 各半兩
- 白茯苓 去皮 扁豆 炒去殼

右剉每服二錢水一鐘薑二片冬瓜子仁五十粒

吐瀉冬春治表 一 切斗七

搗碎煎七分空心温服如瀉不止入沉香白豆蔻

同煎

釣藤飲 治吐利脾胃氣虛生風

釣藤鈎 貳錢

蟬殼

天麻

防風

蝎尾 去毒

人參 各半

麻黃

殭蠶 炒

甘草 炙

川芎 各貳錢 伍分

麝香 伍分

右為末水煎服虛寒加附子壹錢

身熱瀉黃多渴為熱宜涼劑曾氏云先吐而後瀉者

乃脾胃有熱氣促唇紅吐來面赤脉洪而數渴飲水

漿此為熱也錢氏以吐瀉身熱瀉黃多渴作熱病治

在夏秋用玉露散益黃散相間服在春冬用白朮散

大青膏相間服

錢氏玉露散 方見前

李剛中治夏秋吐瀉

好黃連壹兩入號丹壹兩炒丹焦為細末麪糊丸

如芥子服二三十粒壁土薑湯吞更量數服不妨

丹溪治小兒周歲吐乳腹瀉

白朮

滑石末 各參錢

乾薑 壹錢

陳皮

甘草 炙各伍分

吐瀉

方見前

二二

右為麤末煎服

肢冷瀉青不渴為寒宜溫藥曾氏云先瀉而後吐者乃脾胃虛冷其候先瀉白水或白凍吐亦不多口氣緩而神色慢額前有汗六脉沉濡此為冷也錢氏以吐瀉身涼瀉青不渴作寒病在秋以益黃散主之在冬春以益黃散大青膏相間服

海吐利四肢脹逆腦門低陷四君子加藿香丁香芍藥等分煎服

錢氏益黃散

見脾胃

萬安膏

見性

世和胃丸

治吐瀉不止欲生慢驚

丁香

白朮

各壹兩

半夏

伍錢

藿香

蝎尾

各壹錢

右為末薑汁打糊為丸如小豆大三歲兒二十九薑湯下

理中湯 主溫脾煖胃冷吐冷瀉及胎氣虛中寒腹痛

人參

去蘆

白朮

各壹兩

乾薑

炮

粉草

炙各貳錢半

右件剉焙為末每服半錢或一錢用溫白湯空心調服

理中丸 治吐利不止米穀不化手足厥冷

人參

白朮

乾薑

甘草各一分

右為末麩糊為丸棗豆大每服十丸米飲下或二十丸不拘時候

金液丹 治吐利日久脾胃虛損手足厥冷精神昏

塞多睡露睛口鼻氣涼欲成慢驚風又治大人陽

虛陰盛身冷脉微自汗吐利小便不禁

舶上硫黃拾兩先飛煉去砂石秤研為末用砂

固封曬乾露地先埋一水確盛水滿坐盆子在

土又以泥固濟訖常以三片火養三日三夜定

加頂火一斤

右以柳木搥乳鉢研為末每服二錢生薑米飲調

下多服取效大人藥末壹兩蒸餅壹兩水浸去水

餅和丸桐子大曬乾每服五十九至百丸米飲空

心下

閻氏云吐瀉虛極當速生胃氣宜與理中丸併研

金液丹末煎生薑米飲調灌之惟多服乃效俟胃

氣已生手足漸熱然猶瘕瘕即減金液丹一二分

增青州白丸子一二分同研如上服兼用異功散

羌活膏温白丸釣藤飲子之類仍頻與粥雖至危

者徃徃死中得生十救八九沈存中論金液丹見
小兒吐利劇氣已細服之得活者數人須多服方
驗

錢 荳蔻散 治吐瀉煩渴腹脹小便少

舶上硫黃 壹錢 滑石 伍分 丁香

荳蔻 各半

右為細末每服一字至半錢米飲調下無時

張渙勻胃散 治三焦不調停寒膈上乳哺不消胸

膈痞滿甚則喘逆吐利肌體痿黃

甘草 壹錢 藿香 白荳蔻

人參 各壹兩

木香

乾薑 炮

厚朴 薑炙

丁香 各半

右為細末一錢水一小盞薑二片煎六分溫服

王氏治吐逆兼吐利不止

丁香 藿香 各壹分 木香 壹錢

硫黃 半兩別 研極細 滑石 貳錢研 如粉

右為末每服一錢或半錢米飲調下量大小與之

如瀉即用附子壹枚重半兩者炮去皮臍為末用

用生薑汁搗成餅子用白麩裹之慢火煨麩熟去

麩不用只將附子切焙再搗羅為末每吐兼瀉即

吐瀉 切斗七 三十一

入附子末少許如藥三之一更量虛實以米飲調下神驗吐如激水者亦定吐利不止多成慢驚宜速療之如已成慢驚兼金液丹與之

助胃膏 治脾胃虛寒吐瀉等證

人參

白朮

白茯苓

甘草 炙

丁香 各伍錢

砂仁 肆拾箇

木香 參錢

白荳蔻 拾肆箇

乾山藥 壹兩

肉荳蔻 肆箇

右為末蜜丸芡實大每服十九米飲化下

身溫瀉黃白似渴為寒熱雜合病錢氏治法在夏秋

用玉露散益黃散相間服在冬春用益黃散大青膏相間服

補虛四君子湯

治脾胃氣虛損吐瀉少食

人參

白朮

茯苓

甘草 各等分

右每服二錢薑棗水煎

六君子湯即四君子加陳皮半夏治脾胃氣虛吐瀉不食肌肉消瘦或肺虛痰嗽喘促惡寒或肝虛驚搐目眩自汗諸證並宜服之以滋化源

錢氏異功散

溫中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒

虛冷病先與數服以正其氣

人參

茯苓

白朮

甘草

陳皮各等分

一方加木香

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗二枚同煎

海藏云此方四君子湯補脾湯加減法也

愚按前方治脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有證致兒患此者子母並服之

和劑觀音散 治小兒外感風冷內傷脾胃驅逆吐

瀉不進乳食久則漸至羸瘦大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛則吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進美飲食

石蓮肉去心

人參

神麴炒各錢

茯苓貳錢

甘草炙

木香

綿黃耆炙

白扁豆炒去皮

白朮各壹錢

右剉散每服二錢水一盞棗一枚藿香三葉煎溫服

溫中丸 治小兒瀉白胃寒故也腹痛腸鳴吐酸水

不思飲食霍亂吐瀉

吐瀉補虛

切斗七

三三三

人參 白朮 甘草各等分

右為末薑汁麩糊丸如菘豆大米飲下二三十九無時

和中散 和胃止吐瀉定煩渴治腹痛

人參 茯苓 白朮

甘草炙 乾葛 黃耆炙

白扁豆炒 藿香各等分

右為細末每服三錢水一盞半棗二枚去核生薑

五片煎八分食前溫服海藏云和中散四君子湯加減法

曾氏和中散附 主久病纒瘡面黃清瘦神昏氣弱

脾胃未實食物過傷停飲生痰留滯中脘耗虛真氣或成吐瀉此藥性味甘平大能調治常服和胃氣進飲食悅顏色理風痰

人參去蘆 白扁豆炒去殼 白茯苓去皮

川芎 縮砂仁 半夏製

香附子 甘草炙各壹兩 肉豆蔻

訶子去核各柒錢半

右剉每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空

心溫服或不拘時

毛彬治胃氣不和吐瀉不止痰逆不食平胃引行諸

藥銀白散

半夏壹兩洗七次
焙薑製餅

鷲粟米

人參

白朮

焙

白扁豆炒

白茯苓

山藥各肆錢

右為細末每服二錢水八分薑二片棗一枚煎六

分温服

東垣人參安胃散

脾

除濕胃苓湯

治腸胃受濕嘔吐泄瀉

白朮

茯苓

澤瀉

厚朴

豬苓

陳皮

甘草炒各等分

桂少許

右為末每服二錢薑水燈心陳皮煎湯調下若停食吐瀉小便短少腹脹作痛用此以分利之更用

六君子湯以調補脾胃

治痰

半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉等疾及治寒

痰

半夏

湯浸切焙壹兩

陳粟米

參分陳粳米亦得

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至

八分食前温服

白附丸

痰涎

宿食錢氏云吐瀉乳不化傷食也宜下之馮承務子
五歲吐瀉壯熱不思食飲錢氏見目中黑睛少而白
睛多向色眇白曰此子必多病面色眇白者神怯也
黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱
長成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易實脾胃亦怯更
不可縱恣酒慾若不保養不過壯年也面上常無精
神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷
食也又虛怯不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入
脾則瀉入腎則益虛但宜以消積丸磨化之為微有
食也如傷甚則可下不下則成癖也若實食在內亦

可下也下畢補脾必愈隨其虛實無不效者曾錢
氏曰吐乳瀉黃是傷熱乳吐乳瀉青是傷冷乳皆當
下之此迎奪之法也不若傷熱者用五苓散以導其
逆傷冷者用理中湯以溫其中自然平復脾經積
滯未除再為飲食所傷不吐則瀉不瀉則吐宜以三
稜散化積守胃散和中
丹小兒吐瀉黃疸

- 三稜
- 蓬朮
- 陳皮
- 青皮
- 神麩
- 麥芽
- 黃連
- 甘草
- 白朮

吐瀉

初上

三

茯苓

右為細末生薑燈心湯調服傷乳食吐瀉加山查
時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷
消積丸 治小兒吐瀉大便酸臭

丁香 玖箇

砂仁 拾貳

巴豆 貳箇

烏梅肉 貳箇

右為末麩糊丸菜豆大溫水送下

津液少 豆蔻散治虛寒而渴 本條

白朮散治虛熱而渴 渴

聖惠治渴不止

筍籜

扁豆藤 各半

人參 壹兩

右細剉分六服每水一小盞煎五分不時量分稍
熱服

張渙三和散 治吐利津液燥少

白茯苓 壹兩

烏梅肉 炒乾

乾木瓜

各等分為細末一錢水一小盞煎五分溫時時服

治霍亂煩渴香豆散

藿香

肉豆蔻 各壹兩

白扁豆

人參 各半兩

甘草 炙壹分

為末每一錢水八分盞薑二片煎四分溫服

丁時發人參散 治虛熱及吐利煩渴疎轉後服

人參

乾葛各半兩

生犀角

甘草各壹分

右為末每服一錢水一中盞燈心煎五分煩渴入

新竹葉量服

心腹痛聖惠兒冷熱不調乳哺不節使陰陽清濁之

氣相干而變亂腸胃間則成霍亂而心腹痛者冷氣

與真氣相擊或上攻心下攻腹故痛

外臺療霍亂心腹刺痛吐利

茯苓

桔梗

人參各陸分

白朮伍分

甘草炙

厚朴各肆分

右切片用水三升煮六合溫服

人參散 治霍亂心腹痛不食

人參

白朮

芎藭

草豆蔻

厚朴薑炙

當歸炒

陳皮去白

丁香

桂心各壹分

右搗羅為散不時薑棗米飲調半錢量服

治霍亂乳食不消腹心滿痛

訶梨勒皮半兩

木香

當歸炒

白朮

藿香

陳皮去白各壹分

為細末不時薑湯調半錢量服

肉豆蔻散 治霍亂吐瀉腹痛

肉豆蔻

桂心各壹分

人參去蘆

甘草各半兩

右為麤末每服一錢水一小盞薑少許煎五分不時量見大小分減溫服

禁忌鄭氏云小兒吐瀉因外傷風冷內傷乳食或見啼未定氣息未調以乳飼之氣逆於上則停滯胸膈致令嘔吐氣逆於下則傷脾胃致令泄瀉上下氣逆吐瀉俱作凡小兒只吐不瀉者逆其吐必有痰發驚

者十無一生若只瀉不吐或吐瀉俱發者日久不退亦變陰癘治之當暫斷其乳輕者週時重者三日宜頻與稀粥服藥速効十全八九或者不信是言以小兒藉乳為命不肯暫斷然乳固不可斷也殊不知因乳所傷得之者若再以所傷之乳乳之如抱薪救火藥何功之有其間有不斷服藥得安者蓋輕患也亦有因輕致重天橫者多矣 活幼心書云小兒吐瀉不止大要節乳徐徐用藥調治必安節者樽節之義一日但三次或五次每以乳時不可過飽其吐自減及間以稀粥投之亦能和胃屢見不明此理惟欲進

藥以求速効動輒斷乳三四日致餒甚而胃虛啼聲
不已反激他證蓋人以食爲命孩非乳不活豈容全
斷其乳然乳卽血也血屬陰其性冷吐多胃弱故節
之醫者切須知此乳母亦宜服和氣血調脾胃等藥
愚意不若見大能食者全斷之待其平復兒小不能
飲食者但節之可也

吐

薛嘔吐皆主脾胃古人謂脾虛則嘔胃虛則吐是也
嘔者有聲無物吐者有物無聲若手足指熱喜飲熱
湯或睡而露睛皆胃氣虛弱也用異功散若手足指
熱飲冷或睡不露睛屬胃經實熱也用瀉黃散若作
渴少食或小便色赤胃經虛熱也用七味白朮散大
凡嬰兒在乳母尤當節飲食若乳母停食亦能致兒
吐瀉故不可不慎也 曾論吐之原難以枚舉有冷
吐熱吐積吐傷風嗽吐傷乳吐其吐則同其證有異

各述於後 冷吐乳片不消多吐而少出脉息沉微
面白眼慢氣緩神昏額上汗出此因風寒入胃或食
生冷或傷宿乳胃虛不納而出宜溫胃去風除宿冷
用當歸散水煨薑陳皮煎服或間投沖和飲理中湯
及薑橘湯定吐飲如諸藥不效以參香飲治之 熱
吐面赤唇紅吐次少而出多乳片消而色黃遍體熱
甚或因暑氣在胃或食熱物精神不慢而多煩躁此
熱吐也宜解熱毒用大順飲溫熱水空心調下片五
苓散小柴胡湯並加薑汁緩服及香薷散主之誤服
熱藥先投菘豆飲解之次服止吐之劑 積吐眼胞

浮面微黃足冷肚熱晝輕夜重兒大者脉沉緩此宿
冷滯脾故吐黃酸水或有清痰脉實而滑為食積所
傷吐酸醜氣或宿食併出兒小者乳不化是也先
用五苓散薑汁溫湯調下和解次以烏犀丸主之最
小者投三稜散化癖丸 傷風嗽吐有熱生風有風
生痰痰結胸中肺氣不順連嗽不止和痰吐出此為
嗽吐痰壅而作乃為實證宜去風化痰先投清肺飲
次小柴胡湯為治若嗽久而肺虛土不生金故面白
唇燥乾嗽乾嘔而無痰可溫補為上用茯苓厚朴湯
惺惺散如意膏為治 傷乳吐纔乳哺後即吐或少

停而吐此因乳飲無度脾氣弱不能運化故有此證
譬如小器盛物滿則溢治法宜節乳投三稜散此
外又有風痰吐乃是傷風不解吐乳夾痰若多時必
要生風宜服青州白丸子半夏散疎風下痰之劑皆
可服之毒氣吐出巢氏病源 挾驚吐張煥三香
丹之類 疳積吐出本事方 凡霍亂吐不止者伏
龍肝細末貳錢以蘆稷米炒黃煎湯調下立止或用
白扁豆炒過煎湯調下亦好若白扁豆嫩苗更好
寒吐湯 小兒寒吐者由乳母當風取涼解脫致令風
冷入乳變敗兒若飲之故嘔吐也乳母當食後捏去

舊宿敗乳急服理中湯次用釀乳法其候是寒清痰
夾乳吐出是也凡有此候服藥不効胃氣將絕藥不
能下當服靈砂丸如大便通宜來復丹一藥常用驗
論寒吐之證 面目脹額汗出脉沉遲微寒氣停於
胃故胃不納而吐出也噦逆者由胃氣虛甚過服尅
伐使清氣不升濁氣不降以致氣不宣通而作也風
寒在胃者用理中丸胃氣虛者六君子湯風涼所致
者宜捏去敗乳急服理中丸次服釀乳法若嘔吐清
涎夾乳小便清利用大安丸若因乳母食厚味用東
垣清胃散若乳母飲醇酒用葛花解醒湯飲燒酒服

冷米醋三五杯乳母食生冷而致者用五味異功散
乳母停食者母服大安丸子服異功散乳母勞役者
子母俱服補中益氣湯乳母怒動肝火者用加味逍
遙散乳母鬱怒傷脾者用歸脾湯乳母脾虛血弱者
用六君芎歸其子亦服三五滴氣血虛而乳熱者子
母俱服八珍散仍參熱吐霍亂治之

世萬安膏 治小兒脾胃虛弱腹生疳蟲癥瘕食積
泄瀉常服消疳去積助胃氣和中疎氣滯

人參
青皮

厚朴 薑製
肉桂 夏不用

陳皮
乾薑 各壹兩

木香

沉香

藿香

甘草 各半兩

史君子 炮拾箇

澤瀉 冬不用春

右為末煉蜜丸如芡實大食前米飲化下如熱薄

荷湯下 一方無木香沉香藿香青皮四君子有

白木蒼木茯苓豬苓

朱沉丹 治小兒嘔吐不止

朱砂 貳錢

沉香 貳錢

藿香 參錢

滑石 半兩

丁香 拾肆粒

右為細末每服半錢用新汲水一盞之藤油滴成
花子抄藥在上須臾墜濾去水却用別水空心送

下

定吐紫金核 治小兒一切嘔吐不止

半夏湯洗七次薑製

人參

白朮

木香

丁香

藿香各貳錢半

右為細末稀麩糊為丸如李核大後用沉香壹錢為末朱砂壹錢水飛二味同研勻為衣陰乾每服一丸用小棗壹枚去核納藥在內濕紙裏燒熟嚼與小兒服後以米飲壓之

香銀丸 治吐

丁香

乾葛各壹錢

半夏湯洗切焙

水銀各半兩

右上一三味同為細末將水銀與藥研勻生薑汁丸如麻子大每服一二丸至五七丸煎金銀花湯下無時

本事白朮散 治小兒吐嘔脈遲細有寒

白朮

人參

半夏各貳錢

茯苓

乾薑

甘草各壹錢

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去渣溫服日二三服一方無半夏麩有木香藿香薑橘湯 治脾慢胃冷嘔吐不止

本草

卷十二

四十一

白薑貳錢

陳橘皮去白壹兩

粉草炙叁錢

右件剉焙為末每服半錢或一錢用溫棗湯調化空心少與緩服

定吐飲治吐逆投諸藥不止用此神效

半夏

湯洗七遍焙乾剉如菖豆大篩去細末貳兩

生薑乾淨和皮貳兩

薄桂

去麋皮剉參錢

右生薑切作小方塊菖豆大同前半夏和勻入小鐺內慢火順手炒令香熟帶乾方下桂再炒勻微有香氣以皮紙攤盛地上出火毒候冷略搗去黑焦末每服一錢水一盞薑二片煎七分稍空心少

與緩服

參香飲治胃虛作吐投諸藥不止

人參

去蘆壹兩

沉香

丁香

藿香

和梗

南木香

各貳錢半

右剉每服一錢水一盞煎七分去查臨入薑汁少許作三次空心溫服

熱吐小兒秋夏伏暑多有熱吐其吐黃涎頭額溫五

心熱小便或赤而少乃熱吐也或乾嘔而無物宜香薷飲

薛小兒熱吐者因多食甘甜味之物或乳母膏粱厚味胃經積熱或夏間暑氣內伏於胃所致

若肌肉瞶動煩熱作渴者暑傷胃氣也先用香薷散
次用竹茹湯若吐乳色黃不能受納者胃經有熱也
先用瀉黃散次用人參安胃散若吐出酸穢者乳食
內停也用保和丸吐乳不消者胃氣弱也用異功散
吐而少食腹痛欲按者脾氣虛也用六君子加木香
凡諸證當驗其手指熱則胃熱冷則胃寒熱用瀉黃
散寒用理中湯不熱不寒異功散調之

錢氏玉露散 方見吐瀉

香薷散 治寒溫不適飲食失調或外因風寒暑邪

致吐利心腹疼痛霍亂氣逆發熱頭痛或轉筋拘

急或疼痛嘔噦四肢逆冷

香薷 壹兩

茯苓

白扁豆 炒

厚朴 薑汁製 各伍錢

右每服二三錢水煎加酒半杯冷服立効

竹茹湯 治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止

葛根 半錢

半夏 炮半兩

甘草 炙叁錢

右每服二三錢入竹茹棗許大薑水煎取清汁微

冷細細服加茯苓叁錢尤妙

錢氏藿香散 治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉

過度者宜服

麥門冬焙去心 半夏麩炒 甘草炙各半兩

藿香壹兩用葉 石膏半兩

右為末每服五分至一錢水一盞半煎七分食前温服

本事麥門冬散 治小兒嘔吐脉數有熱

麥門冬 半夏 人參

茯苓各貳錢 甘草壹錢

右為末每服二錢水一盞薑二片煎至五分去渣温服日二三服

湯氏清膈飲子 治小兒伏暑嘔吐

香薷 淡竹葉各壹兩 白茯苓

人參 半夏 檀香

甘草炙各半兩 白粳米壹合

右咬咀薑煎温服木小加減

聖惠麥門冬散 治嘔吐不止心神煩熱

麥門冬焙 淡竹茹各半兩 甘草炙

人參 茅根 陳皮去白焙各壹分

右為麩末每服一錢水一小盞薑少許煎五分稍熱頻服量木小加減

治嘔吐心煩熱蘆根粥

生蘆根

貳兩

粟米

壹合

右用水二大盞煎至一半去滓投米作粥薑蜜少許食

大順飲

解胃暑毒煩渴吐瀉腹痛發熱神昏或衄

血路血及太腑下血小便黃少口乾汗多

細麩

貳拾兩

生薑

拾陸兩

赤茯苓

去皮

粉草

各伍兩

右先以生薑方切如菘豆樣石鉢內杵爛入麩再杵勻攤作薄片烈日中曝乾赤茯苓粉草二味細剉同前薑麩片或曬或焙合研為末每服二錢新

汲井水無時調服或溫熱湯

綠豆飲

解誤服劑熱之毒煩躁悶亂或作吐或狂

渴宜先投下次服對證藥劑

綠豆粉

壹兩

淨黃連

乾葛

甘草

各半兩

右除綠豆粉外餘三味共為細末入乳鉢同綠豆粉杵勻每服半錢至一錢溫豉湯調服益元散治熱吐面赤氣麤小水短少傷暑作吐尤佳

滑石

六錢

甘草

壹錢

右為細末薑汁調燈心湯下吐甚者并花水下

濟生竹茹湯 治熱吐口渴煩躁

益元橘紅 乾葛 甘草

麥門冬 竹茹 生薑

右水煎服 熱甚者加薑連

積吐烏犀丸 主諸積滯夾驚夾風溫胃調脾消進

飲食吐逆醋醜氣面黃肌瘦不拘孩兒生後歲月

遠近並宜可投

烏犀 卽皂莢剉三寸長皮灰火中見青煙起為

白薑 陳皮

川烏 炮去皮臍 巴豆 朱拾米粒去

右硫黃一味先入碾內研細除巴豆外餘四味同

焙為末仍以巴豆薄切在乳鉢內細杵再同前五

味藥末杵勻用粳大米飯包作粽子一太箇小瓦

瓶盛水熟煮候冷取出沙鉢內爛杵細布兜緊捻

出如稠糊安在別器內以藥末亭分同杵細軟丸

粟殼大取諸積每服十五丸或五丸或二十一丸

至三十三丸並用淡薑湯泡冷飯取汁一小盞五

更初空心送下通利三五行以勻氣散止補治積

吐有醋醜氣每服三丸至五丸用淡薑湯入米醋

少許候温空心投下

傷風嘔吐茯苓厚朴湯 主傷寒傷風夾痰嘔逆并

吐瀉後喉涎牽響飲食減少脾胃氣虛

白茯苓 去皮 半夏 湯煮透濾仍到

甘草 炙 厚朴 伍錢去麤皮剉碎每斤用生薑壹斤切薄片杵爛拌

勻浸一宿慢火炒乾用

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片煎七分無時服或加棗一枚去核同煎

傷乳吐乳下嬰兒乳哺太過或兒睡着而更銜乳豈有厭足以致脾不能運胃不能受滿而溢故令嘔吐

長此不已遂致慢驚可不慎乎此候但令節乳為上甚者宜暫斷乳先令乳母服調氣之劑兒服消乳丸化乳消食為上若吐自口角出即是乳多不能消化滿溢之證非病也不可妄投它治吐藥 凡吐乳直出而不停留者謂之哕乳但以炒麥芽參錢橘紅壹錢丁香參分水煎服之立止消乳丸 温中快膈止嘔吐消乳食脉沉者傷食不化故也

香附子 炒貳兩 甘草 炙

縮砂仁 神麴 炒

陳皮 去白各半兩

麥蘖 炒各壹兩

右爲末泡雪糕圓如黍米大七歲以上菘豆大三
十丸食後薑湯下

消食丸 治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積於脾

胃胃爲水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳

哺消化脾傷於冷則宿食不消此藥寬中快氣消

乳食正顏色

縮砂仁

橘皮

三稜 煨

蓬朮 煨

神麴 炒

麥蘖 炒各半兩

香附子 壹兩 炒

右爲末麴糊丸菘豆大食後紫蘇湯下二十丸

又方 治百晬內嘔吐乳妳或大便青色

用少婦乳汁一盞入丁香拾粒陳皮壹錢磁器內

煮數沸稍熟空心以綿球吮服

風痰吐 青州白丸子 治一切風痰小兒驚風

天南星 生

白附子 生各參兩

川烏頭 生去臍尖皮伍錢

半夏 去皮生 柒兩

右用井花水浸次日早再換新水春五日夏三日

秋七日冬十日曬乾爲細末以糯米粉煎粥清爲

圓如菘豆大小兒驚風薄荷湯調下和蘇合香圓

服名蘇青圓

半夏散 治小兒胃虛嘔吐水穀不化

半夏壹兩泡 陳糯米叁錢

右剉散薑五片棗一枚同煎

錢氏鐵粉丸 治涎盛潮搐吐逆

水銀貳錢 朱砂壹分 鐵粉

天南星炮去皮臍取 輕粉貳分

右同研水銀星散盡為度薑汁糊丸如粟米大煎

生薑湯下十五丸至二三十九丸無時

茯苓半夏湯 治諸嘔噦心下堅痞膈間有痰水眩

悸

半夏伍錢 白茯苓貳兩

右剉散每服三錢水一盞生薑三片煎去滓熱服

不拘時

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或

中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏湯洗 橘紅各伍錢 白茯苓叁錢

甘草壹錢

右剉散每服三錢水一盞薑三片烏梅一箇同煎

白附飲 治肝風射脾土痰涎壅盛和飲食吐出蓋

風能生痰痰壅其食故吐出

白附子

南星

半夏

川烏

天麻

陳皮

南木香

全蠍

僵蠶

丁香

生薑

青竹茹

右件剉每服二錢水一盞半薑二片慢火煎七分作五次空心溫服

毒氣吐

巢氏云春夏以湯與兒腸胃脆弱不勝藥勢遂吐下不止藥熏藏府煩懊頓之為中毒氣吐下

千金藿香湯 治毒氣吐下腹脹逆害乳哺

藿香

生薑

青竹茹

甘草

熱加升麻半兩

右咬咀水一升煮八合服一合日三

王氏消妳毒令兒吃乳無毒有毒亦解

升麻

大麻子

右二味酒浸每日早晨與妳子一盞喫了要乳時須先捏去些小方與兒喫

扶驚吐

張煥三香丹 治挾驚嘔吐不止

藿香葉

丁香

半夏

三味為末次入

膩粉

龍腦

麝香

當門子各壹錢並研

七披驚吐

刀斗七

五二三

吐瀉 五十三

右件同拌勻生薑取汁打白麩糊為丸黍米大每服十粒人參薄荷湯下量兒大小加減

殊聖歸命丹 歌曰小兒驚膈吐還頻晝夜連連不

暫停渌水槐黃泔淀汁和蟲乳食一時噴丁香研

共生犀服五膽牛黃立有勲若有得逢如此藥直

饒命困却還寬

丁香

藿香各壹分

生犀末

牛黃各半錢

豬鯽狗蝟熊膽等分共半兩多些無妨

右為末丸如菉豆大量兒大小加減一歲以下煎

苦棟湯研二丸

治驚食胃管不快吐逆乳食或心胸發熱定吐丸

丁香

貳拾壹枚為末

蝎梢

肆拾玖條

半夏

參箇洗焙乾為末

右研勻煮棗肉丸如黍米大每服七丸至十丸金

銀煎湯吞下如傷暑霍乳吐瀉煎香薷散送下

良方治久患翻胃及小兒驚吐諸吐田季散

上好硫黃半兩水銀壹分研如黑煤色每服三錢

生薑四兩取汁酒一盞同薑汁煎熟調藥空心服

衣被蓋覆當自足指間汗出迤邐遍身汗徹即差

此散極浮難調須先滴少水以指緩緩研殺稍稍

增湯使令調和否則浮泛不可服

吐瀉

刀圭

五十四

王氏睡驚丸 治熱化痰鎮心神治驚悸吐逆

半夏 薑製

乳香

犀角 末各壹錢

右件同為末用生薑自然汁煮麩糊為丸如菉豆大薄荷湯臨臥服

丹萬安膏 調脾順氣定驚脾胃不足吐乳黃疸治

小兒一切等疾

木香

檀香

辰砂 各叁錢

沉香 貳錢

香附

黃耆

史君子 各壹兩

檳榔

肉豆蔻

人參

天竺黃 各半兩

白朮

薄荷

甘草 各貳兩

琥珀

真珠

青黛

犀角 各貳錢半

麝香 伍分

右為末煉蜜丸臨臥服薄荷汁或蜜水米飲化下全蠍觀音散 治吐瀉截風定志庶免傳變慢驚

黃耆 炙

人參 各貳錢半

木香

炙甘草

蓮肉

扁豆 炒

茯苓

白芷

全蠍

羌活

防風

天麻 各貳錢

右每服三五錢薑棗煎服

疳積吐本事方治小兒疳積黃瘦吐食

川烏 壹錢

定粉 叁錢

艾灰 貳錢

龍骨 貳錢

右為末滴水丸如龍眼核大捏作餅子每服一餅米飲磨下

補虛安胃六神湯脾胃虛吐瀉不進飲食

黃耆

扁豆

人參

白朮

茯苓

炙甘草

藿香 各等分

每服三四錢薑棗煎服

和劑觀音散 吐瀉

人參散

治小兒臟腑冷若纔喫乳食即又吐出或因喫乳驚觸致作驚肘之狀令小兒外證面唇青

白手足心熱口多清涎吐逆不住或作瀉候青黃紫白兼凍子或如鼻涕雞子清者或乳食不化並宜服之常服開胃益乳食

人參

白朮

茯苓

沉香

白芍藥

甘草 各半兩

右為細末以密器收之遇小兒有前項形證半歲一字二三歲半錢大者一錢煎棗子米飲調下或

止補虛安胃

刀斗二

五十一

陳紫蘇湯亦可或吐瀉并作煎丁香湯下陳皮湯
尤妙

雜方經驗方治小兒吐不定

用五倍子貳箇一生一熟甘草一握濕紙裹炮過
同搗為末每服米泔調下半錢七瘥

掌中金 治小兒喫物喫乳即吐下水乳不得飲食

白豆蔻拾肆箇 甘草壹兩半 砂仁拾肆箇

右為末逐旋安掌中與他乾嗽牙兒乾糝口中亦

可

釀乳法 治初生嬰兒凡有胎熱證當冷乳母服藥

不可求效之速治法當釀乳令兒喫漸次解之百
無一失若遽以冷藥攻之必損脾胃加以嘔吐必
成大患

澤瀉貳兩 豬苓去黑皮 赤茯苓

天花粉各壹兩半 乾生地黃貳兩 山茵陳用葉

甘草各壹兩

右剉散每服五錢水一盞煎六分食後捏去舊乳
却服

吐涎 止水 蟲

錢吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷 吐稠涎及血皆
肺熱 吐水不止者屬心痛胃冷 吐水心痛者蟲

上吐涎朱水蟲

痛 口中吐沫水者後必蟲痛 面皛白無精光口
中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之 丹冬月
吐蛭多是胃虛寒而蟲作吐用錢氏白朮散加丁香
貳粒 亦可用理中湯去甘草加烏梅肉川椒

