準備外科二卷

瘍醫準繩卷之三

金壇王肯堂輯　門人新安閔承詔校

潰瘍

大法 癰疽已破膿出者是也　集驗云癰疽既破膿出肉腐當用拔毒膏貼之邪氣漸退氣血亦虛脉之洪數漸宜減退當內補托裏必使氣血滋榮正氣強盛膿色鮮濃赤腫漸收藥宜補氣生血秋冬微加禦風寒之藥十宣散十全大補湯中用桂是也氣滯加香附如毒勢大退氣血未復多宜用人參當歸黃芪四物湯之類癰疽雖已見膿根脚赤暈反展開闊或

不痛或大痛此毒氣不退金銀白芷散十宣散去厚朴桂倍人參川歸黃芪加忍冬藤連翹犀角瓜蔞根消毒之藥春末夏間及秋初宜加酒芩黃連黃蘗羌活腰已下可去桔梗見膿後須以補氣血藥為主解毒藥助之或不宜於補藥者宜忍冬丸四圍腫焮處用毫針燒赤刺之約一米深紅腫則縮服藥脉得和緩為佳或破後不潰瘡口堅硬者風也用蜈蝎散傅之或蠹肉不腐用雄黃輕粉敷之大忌紅腫不退或飲食進少從權且調理脾胃或兼他證又另議藥治腐肉不知痛痒正黑者可去之但不傷四畔好肉及裏面良肉當去外之黑腐者下皆去黃白如絮之狀膿內有紅血絲路又不可動此項大膿次日必自脫落庶免傷其良肉若怕刀砭三四日必自脫落但用刀去者新肉易長毒氣漸消凡腐肉亦有少臭氣腐敗去後則無變四圍腐者漸漸去令淨用長肉膏貼間日用豬蹄湯洗新肉長如梅李如石榴子紅活可愛日見堆阜或上有白膜皆是吉兆若腐敗去後下面良肉色白而平略無紋理亦不能如米如粟不見漸生之意或膿水清淡或臭此積毒內連五臟血氣枯竭乃是危證肉不能長氣血不榮衛氣不護瘡則

風寒着之用北艾黃芪湯熏洗生肌長肉藥傅之用乳香膏長肉等膏貼之或肉雖長起色紫者遺毒也用地榆湯活血散敷追毒膏貼之即自紅活瘡口漸收仍用長肉膏貼或瘡口痒用細茶葱鹽煎湯熱洗或瘡口易收乃氣血中熱毒故不分消即使長肉必防流注之患或更迷違瘡口如錢大時恐轉他證危殆凡癰疽瘡口已收但皮嫩未可便去膏藥　鬼遺方云凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺已上者其赤腫焮熱者即用緊急收赤腫藥圍定不令引開中心即用拙膿聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大小深淺內發其膿汁膿水大泄急須托裏內補雖破穴膿汁不多再須排膿拔毒透後慎不令再腫須疼止腫消患人自覺輕便即是順疾也最宜節慎飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑即止矣（內補謂參芪之屬排膿謂皂角刺之屬）

（薛）膿熱而不潰者陽氣虛也宜補之如聖愈湯之類　瘀肉不腐者宜大補陽氣更以桑柴火灸之　不作膿膿不潰氣虛也托裏

消毒散去金銀花白芷連翹三味加參朮肉桂如不應暫用十全大補湯　腫赤作痛血凝滯也本方加乳香沒藥如不應暫用仙方活命飲　膿出反痛氣血虛也去三味加參芪歸地　潰後食少無睡或發熱者虛也宜補之內補黃芪湯之類　倦怠嬾言食少不睡者虛也宜補之黃芪人參湯之類　寒氣襲于瘡口不斂或陷下不斂者溫補之十全大補湯　脉大無力或濇而微肌肉遲生者氣血俱虛也峻補之十全大補湯倍用參芪　肉赤而不斂血虛有熱也托裏消毒散去三味加熟地丹皮　肉黯而不斂陽氣虛寒也前散去三味加參芪白斂官桂　漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也前散去三味加人參白朮如不應加薑桂更不應急加附子　肉白而不斂陽氣虛也前散去三味加參芪歸朮　膿多而不斂氣血虛也前散去三味加參芪歸朮熟地黃如不應暫用十全大補湯　飲食少思而不斂胃氣虛也前散去三味加參芪如不應暫用補中益氣湯　飲食難化而不斂脾氣虛也前散去三味加參朮如不應暫用六君子湯又不應佐以八味丸　膿多而帶赤血虛也前散去三味加歸地參朮如不應暫用八珍

湯加牡丹皮出血作痛發熱等另分條在後

【辨膿】集驗云脉緊而數爲膿未成緊去但數爲膿已成以手按上熱者爲有膿不熱者爲無膿按之牢硬未有膿也按之半軟半鞕已有膿也大軟方是膿成也大按之痛者膿深也按之不甚痛者未成膿也按之即復者爲有膿也不復者無膿也小按便痛薄皮剝起者膿淺也按之四痛皮色不變不高阜者膿深也淺者宜藥熨破高突者宜鍼針深者宜烙更詳虛實何如腫處軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也虛腫而黃者水也氣結

膿成宜急破之

微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也留積經久積陰生陽寒化爲熱以此潰必成瘻宜早服內塞藥以排之諸瘻瘤疣贅等至年衰皆自內潰不一於補養而妄行攻蝕必有性命之憂至於瘰癧結核寒熱發渴經久不消其人面色萎黃被熱上蒸已成膿也治見本條手足指稍及乳上宜膿熟大潰方可開之麻豆後肢節上癰稍覺有膿便須決破遲則成彎曲之疾

【取膿】凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者按之色不變膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按

之白良久方赤遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實久而方消　夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾惟癰膿成則宜針疽膿成則宜烙切宜孰視詳審候其潰熟膿透於外其勢盈盈欲出只用替針尤自瘡頭咬開不半日許其膿自出切不可用針刀也丹溪云精要論戒用針刀業外科者當拳拳服膺

替針尤　治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香壹字　礞砂壹字　乳香各壹字　沒藥以上

右灰餅藥內種糯米拾粒其法用石灰伍升爐灰叁升以水伍升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至叁貳升用瓦器盛貯臨用時以小青盞盛取半盞濃汁却用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯米拾肆粒種在皮紙面上一宿即是

右為細末糯米飯尤如麥粒大每用壹粒未破用津貼瘡頭薄處即破膿滯不快則用壹粒納瘡口內使膿不滯好肉易生

又方

雄雀糞貳拾粒　礞砂　陳倉米　沒藥各壹字

皮淺薄者用替針尤

右研勻以米飯丸如粟大每用壹粒貼瘡口眼中

即潰膿出

替針丁香丸

草烏 炙　硇砂　白丁香 堅者

右為末醋調點將破者令速潰若急則無如刀快蜞針一法亦妙見後

梅 治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雄雀糞塗頭上乾即易之雀糞中堅者為雄

本事 治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍用此藥紙即膿出巴豆壹枚去皮膜不去心油鹽豉拾肆粒

口中含去皮令軟同研爛真麝香少許如難丸入少稀糊捏作餅子如鼠糞大大小臨時看瘡口紙之只以紙撚子送入藥須臾必痛忍之良久膿遂出

丹 出一切瘡口用出蛾蠅殼燒存性無灰酒調下每服壹枚服下一个時辰便有瘡口一个若服兩枚出瘡口兩个

精 癰成膿宜針其鐵用馬銜鐵為之形如韭葉兩面皆利可以橫直裂開五六分許取其毒血如覺病輕須先灸而後裂 婁按癰如椒眼數拾粒或如蜂窠

取膿 針

蓮房而膿出痛不除宜用針者以針橫直裂之則毒血挾膿出而愈如無椒眼之類只消直入取膿不必裂之也又法當椒眼上各各灸之亦佳不必裂也

靈鈹針者末如劒鋒以取大膿 素 夫癰氣之息者宜以針開除去之 病疑篇王注云息瘜也死肉也○今世用刀割去死肉者是也

治腐腫者刺腐上視癰大小深淺刺刺大者多血小者深之必端內針為故正 長刺節論○大者多血小者深之八字衍文也大小深淺刺七字取膿之法盡矣備矣

精疽成膿宜烙可用銀篦大二分長六寸火上燒令赤急手熨烙毒上得膿為効 鬼遺 凡癰覺在虛處及眼不見處皆是惡疽如發高腫紫赤皮薄光澤覺裏有膿毒諸藥貼煽不破者宜用熟銅鍼於油火上燎透先用墨筆點定却當頭以鍼淺刺入隨針出膿者順也有不隨針膿出當用白紙作紵紵入針孔引出膿毒當時腫退可及三分如腫不退是一逆也腫不退疼不除但膿出二逆也膿疼不退患人不覺瘡輕三逆也雖用針破出膿亦無所濟須急用引膿托裏湯藥以助其勢力可也更有癰生實處不問淺深如有膿即用針烙無害稍緩即恐傷筋骨內疼凡近筋脉骨節處不得亂行針烙反致他病也 患疽初

生赤硬或在虛處毒氣淺或在實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其患處瘡頭不拘多少其間須有一個最大者即是大膿竅當用熟鐵大針頭如釵脚者於麻油燈上燒令熱透以大頭處按定插入一寸或至二寸膿當下恐未有膿毒出却用白紙作紙子紙入候次日取出其膿即隨紙下矣膿色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出即患人寒戰不禁其有虛處不得妄行針烙　凡患發背覺似有膿成便用大熟鐵針烙當正頭上烙之其烙並用麻油燈上燒令通紅烙入可二寸許初入肉即須橫

插入不得正入恐烙透膜也如已有破處皮爛潰熟更不得用針烙如是橫長赤引開闊當須兩頭下火針令膿毒隨針引出肥人膿汁多瘦人膿汁少如肥人却少瘦人却多多是肉敗壞成膿少是肉不腐爛受氣實也尤宜詳審不可造次便行針烙亦看患人氣脉勻和榮衛氣不節滯血脉不致凝澁即行針烙無畏切須仔細患人氣虛脉氣大者亦不可亂行針烙針烙之法不可容易先看皮紋緊慢厚薄紫赤色大光澤者即可用針烙如皮肉未變不可用針針亦無濟大抵用針只欲引膿如針刺無膿是氣伏也不

可用針烙 丹或問烙法如何曰膿或汪洋欲出奈何皮厚肉深難究者既前無內托之藥先致力於內後又不用烙以開竅脉膿何由出 膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉腠間則毒氣浸淫好肉亦化為膿腐此所以烙法有功於潰瘍也彼根淺而皮薄者何必假此以賣弄假法恐嚇而脅取利也

發表 一男子潰後發熱頭痛脉浮緊虛而兼表邪也以補中益氣湯加川芎白芷二劑而止更以托裏藥而愈 一男子風襲瘡口牙關緊急腰背反張以玉真散一服而愈仍以托裏藥而斂 一男子患癰將斂遍身作痒脉浮以消風散一服而止更以托裏藥而愈

攻裏 薛 一人胸患癰焮痛煩躁發熱作渴脉數而實時季冬予謂此熱毒內蓄須捨時從證欲治以內踈黃連湯彼以時當隆寒乃雜用敗毒藥愈熾仍求治投前湯二劑後去二次諸證悉退以金銀花散加連翹山梔四劑出水而消

清熱 一男子患癰潰而飲酒焮痛發熱服黃連解毒湯二劑而止更以托裏消毒散而愈常治痛而大便秘脉實者用清涼飲治之

【虛】【羅】至元壬午有王伯祿者年五十七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脉沉細而微脉症俱寒舉瘍醫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔起之膿清稀解待日再開之加吃逆不絕彥和與丁香柿蒂湯兩服稍緩待日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憒於左乳下黑盡處灸二七壯又處以乾薑附子木香沉香茴香羌活粗藥㕮咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脉細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛吃逆者胃中虛極也諸腫瘡瘍皆屬心火是定理也此症內外相反須當捨時從症非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸症悉去飲食進瘡勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復噫守常者衆人之見知變者大人之事知常而不知變細事因而取敗者亦多矣況醫乎守常知變豈可同日而語哉　陳錄判母治案見腦疽

托裏溫中湯　治瘡爲寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短促吃逆不絕不得安卧時有昏憒

丁香　沉香　茴香

益智仁　陳皮各壹錢　木香壹錢半

羌活　乾薑炮各叁錢　甘艸炙貳錢

黑附子炮去皮臍肆錢

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫以附子乾薑大辛熱溫中外發陽氣自裏之表以爲君羌活苦辛溫透關節炙甘艸甘溫補脾胃行經絡通血脉胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒爲佐瘡氣內攻氣聚而爲滿木香茴香陳皮苦辛溫治瘡散滿爲使也

右㕮咀作一服水叁盞生薑伍片煎至壹鍾去滓不拘時溫服忌一切冷物

補虛薛一童子腋下患癰不斂膿清脉大倦怠懶食少寐自汗口乾以內補黃芪湯及豆豉餅灸之兩月而愈凡瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可　一男子腰患毒膿熟不潰針之膿太泄反加煩躁以聖愈湯四劑而寧更以人參養榮湯加麥門冬五味子兩月而愈此人後患濕氣遂爲痼疾凡瘡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必

難治療慎之　一婦人患臂癰瘡口紫陷膿清不斂彼以為毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘡瘍之證腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也遂用附子餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈　一婦人患附骨癰久而不斂致腿細短軟脉來遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡膿潰之後脉濇遲緩者易愈以其有胃氣故也脉來細而沉時直者裏虛而欲變證也若煩痛尚未痊也洪滑麤散者難療以其正氣虛而邪氣實也　一男子腰中患此發而不潰其氣血止能發起不能培養為膿也投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參芪歸术膏斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生大凡癰疽藉氣血為主若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脉大而膿愈多屬真氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免矣及患後當調養若瘰癧流注之證尤當補益否則

更患他證必難措置慎之　一上舍年踰四十因怒
脇內作痛不止數日後外結一塊三寸許漫腫色不
赤按之微痛予謂怒氣傷肝致血傷氣鬱為患以小
柴胡湯對四物倍用芎歸黃芪貝母肉桂治之彼謂
丹溪云腫瘍內外皆壅宜托裏表散為主又云凡瘡
未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用況此證為氣血
凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復求治視之虛證併
臻診之胃氣更虛彼欲服予前藥予謂急者先治遂
以四君子湯加酒炒芍藥炮乾薑四劑少得更加當
歸又四劑胃氣漸醒乃去乾薑又加黃芪肉桂芎歸
數劑瘡色少赤并微作痛又二十餘劑而膿成針之
却與十全大補湯喜其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血
凝滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲
以益其虛況各經氣血多寡不同心包絡胸胱小腸
肝經多血少氣三焦膽腎心脾肺少血多氣然前證
正屬膽經少血之臟人年四十以上陰血日衰且脉
證俱屬不足腫瘍內外皆壅宜托裏表散為主乃補
氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂也若腫焮
痛甚煩躁脉大辛熱之劑不但腫瘍不可用雖潰瘍
亦不可用也凡患者須分經絡氣血地部遠近年歲

老幼禀氣虛實及七情所感時令所宜而治之常見以流氣十宣二藥槩治結腫之證以致取敗者多矣

趙無錫華氏年六十患背瘡潰發大如旋盤而色赤想是平日多服金石藥毒發所致問之果然因令侵晨飲羊血三五升始用退熱解毒生氣血之劑煽以生肌膏半月後肌生膿少予因歸令服此藥百餘貼方可安全一月後復來招往視其瘡皮肉已堅厚如常但食少無力因問前日之藥服幾何曰瘡將平遂止不服脉之沉微甚因知其氣血止可供給瘡平而已於真氣則已竭不可治卽古人所謂死於瘡結痂之後果不出半月而死不獨此膿出後之虛若因虛而發癰疽者亦然若以常法攻之則氣血不勝藥力之散而愈虛邪得以乘機入內多成不救

加味十全湯　治癰疽潰後補氣血進飲食

黃芪蒸　地黃蒸　當歸
川芎　人參　茯苓
芍藥炒　白朮　陳皮各壹兩
粉草炙　桂心　五味子各半兩
烏藥柴錢

右㕮咀每服壹兩用水壹椀生薑伍片棗貳枚同

煎分作二服留查晒乾爲末服之丹溪云加味十全湯須看年之老壯資之強弱症之緩急時之寒熱加減用之

丹溪云加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食實爲切要蓋膿血出多陰陽兩虛非此藥何以回生起死惜其不分經絡不載時令又在識者觸類而長之今之外科於瘡瘍腫平痛寬遂以爲安漫不加省往往于結痂後兩三月或半年虛證乃見醫者不察病者不悟無補接調養之功因而轉成他病者惜哉予治一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍鼓飲食如常惟言問不荅肌上起白屑如麩片時在冬月予作極虛處治詢其弟乃知半年前曾於臂背腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五香連翹湯十宣散與之今結痂久矣予爲作參芪白术當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥一斤白屑沒者太半病者自喜呼吸有力補藥應効以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石二錢半以青州白丸子作料煎飲予頓服之予諫之不聽因而不救書以爲警云

補中益氣湯　治瘡瘍之人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪

大而無力或頭痛或惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃耆炙壹錢伍分　甘草炙　人參

當歸酒拌　白术炒各壹錢　升麻

柴胡　陳皮各叁分

作一劑水貳鍾薑叁片棗貳枚煎壹鍾空心服

人參養榮湯　治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黃吸吸短氣飲食無味不能收斂或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他病

白芍藥壹錢半　人參　陳皮

黃芪蜜炙　桂心　當歸酒拌

白术　甘草炙各壹錢　熟地黃酒拌

五味炒杵　茯苓各柒分半　遠志去心炒伍分

作一劑水貳鍾薑叁片棗壹枚煎捌分食前服

四君子湯　治脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃諸症自愈若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之證宜

於前湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用四物沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起若命門火衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母

人參　茯苓　白术各貳錢　甘草炙壹錢

右薑棗水煎服

六君子湯　治脾胃虛弱或寒凉尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣諸症自愈即前方加陳皮半夏

異功散　治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳皮

四物湯　治血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致晡熱內熱煩躁不安皆宜服之經云血生於脾若脾虛不能生血者宜用四君子湯加當歸酒炒白术以補脾

熟地黃　當歸各叁錢　芍藥貳錢　川芎壹錢伍分

右水煎服

八珍湯　調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食退虛熱此氣血虛之大藥也

當歸酒拌　川芎　芍藥炒
熟地黃酒拌　人參　白术炒
茯苓各壹錢　甘草炒伍分

作一劑水貳鍾薑叁片棗貳枚煎捌分食前服

十全大補湯　治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及流注瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰潰而不斂若血氣不足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參　肉桂　地黃酒洗蒸焙
川芎　白芍藥炒　茯苓

白术炒　黃芪鹽水拌炒　當歸酒拌各壹錢
甘艸炙伍分

作一劑用水貳鍾薑棗煎服

歸脾湯　治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不准晡熱內熱或唇瘡流注等症不能消散潰斂

白术　白茯苓　黃芪炒
當歸　龍眼肉　遠志肉

酸棗仁炒各壹錢　木香伍分　甘艸炙叁分
人參壹錢

右薑棗水煎服

黃芪人參湯　治諸瘡破後食少無睡及有虛熱穢
氣所觸者

黃芪貳錢　人參　白术
麥門冬　蒼术　陳皮
升麻　五味子　當歸身
甘草各壹錢　黃蘗炒肆分　炒麴伍分

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

托裏當歸湯　治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂或脹熱
內熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數
大便不實等症

當歸　黃芪　人參
熟地黃　川芎　芍藥各壹錢
柴胡　甘艸各伍分

右水煎服

內補黃芪湯見癰疽兼症痛條
人參散　治癰疽內虛不足

人參　白术　白茯苓
枸杞子各壹兩　熟地黃　黃芪剉各貳兩

桂心　白芍藥　當歸微炒
甘草炙各半兩
右剉碎每服肆錢水壹中盞入生薑半分棗叁枚
煎至陸分去滓不拘時温服
麥門冬湯　治癰疽潰後膿水不絶
麥門冬去心　黄芪剉　五味子炒
白茯苓去黑皮　人參去蘆　官桂去粗皮
當歸切焙　遠志去心　芎藭各壹兩
甘艸炙柒錢半
右㕮咀每服伍錢水壹盞半入生薑半分擘碎大
棗貳枚擘破同煎至壹盞去滓空心温服
護壁都尉　治諸發已潰去舊生新老人氣血虚弱
宜補之此潰後服至愈而止
防風去蘆　厚朴去粗皮薑汁炒　苦梗
白芷　茵芸炙各半兩　川芎
甘草　柳桂　當歸各炙一錢
人參貳錢
右爲末每服貳錢空心温鹽酒調服至瘡口合後
更服爲佳不飲酒木香湯兼服降氣湯尤妙方見
六味丸一名六味地黄丸　此壯水之劑夫人之生以腎爲主

凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗諸血失血失瘠水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黃（生者自製捌兩） 山茱萸肉 山藥（各肆兩）

白茯苓 牡丹皮 澤瀉（各叁兩）

右地黃杵膏餘爲末蜜和丸桐子大每服柒捌十丸滚湯下

八味丸 治命門火衰不能生上以致脾上虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多滑泄即前方加肉桂附子各壹兩經云益火之源以消陰翳即此方也

加減八味丸 治症同前即六味丸加肉桂五味子各壹兩

東垣癰疽用藥加減法 如發背疔腫膿潰前後虛而頭痛者托裏藥內加五味子 恍惚不寧加人參茯神 虛而發熱者加地黃瓜蔞根 潮熱者加柴

胡地骨皮　渴不止者加知母赤小豆　虛煩者加枸杞天門冬　自利者加厚朴　膿多者加當歸川芎　痛甚者加芍藥乳香　肌肉遲生者加白斂官桂　有風邪者加獨活防風　心驚悸者加丹砂　口目瞤動者加羌活細辛　嘔逆者加丁香藿葉　痰多者加半夏陳皮

作痛 丹溪云膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此為虛也宜補之托裏消毒散去後三味加參芪歸地　脉數虛而痛者屬虛火宜滋陰托裏散加生地　脉數實而痛者邪氣實也宜泄之　脉實便秘而痛者邪在內也宜下之

清涼飲 脉濇而痛者氣血虛寒也溫補之定痛托裏散　亦有穢氣所觸者宜和解之東垣黃芪人參湯丹溪云芍藥乳香之類　亦有風寒所逼者宜溫散之敗毒散丹云防風桂枝之類　若有膿為脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之或用利刀剪之腐肉壅塞者去之

丹權小娘瘡後右腿股生瘡破後筋吊疼脉虛而濇詢之小便時疼處亦相應宜與生血導熱

川芎　當歸頭　條芩

生地黃　赤芍藥　牛膝

黃蘗　甘草炙貳分　青皮炒

檳榔 伍分　通草 叁分　桂皮 壹錢

右煎食前熱飲之

人參內托散　治瘡瘍潰膿而作痛者

人參　黃芪　當歸

川芎　厚朴　防風

桔梗　白芷　官桂

紫草　木香　甘草

右入糯米壹撮水煎服

餘見後兼證痛門宜參看

發熱　戴院使云未潰之際憎寒壯熱狂言妄語如見鬼神膿去已多而大熱不休者似為難治蓋毒之得膿猶傷寒表證之得汗已而反大熱則為壞傷寒矣又云患癰毒人膿血已潰所去過多津液枯竭多病於渴縱有發熱躁擾等證不可以治宜用益榮生津之劑若大熱不止者難療　脉浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣（補中益氣湯）　脉濇而熱者血虛也宜補血（四物湯人參養榮湯聖愈湯）　午前熱補氣為主（四君子湯黃芪六一湯）　午後熱補血為主（四物湯聖愈湯）　脉浮數發熱而痛者邪在表也宜散之　脉沉數發熱而痛者邪在內也宜下之

薛瘡瘍發熱煩躁或出血過多或潰膿大泄或汗多亡陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所依浮散於肌表之間而非火也若發熱無寐血虛也用聖愈湯無汗不止氣虛也急用獨參湯發熱煩躁肉瞤筋惕氣血虛也用八珍湯大渴面赤脉洪大而虛陰虛發熱也用當歸補血湯肢體微熱煩躁面赤脉沉而微陰盛發躁也用四君加薑附東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自旺於陽分也晝安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰中也如晝夜俱發熱者重陽無陰也當後補其陰治者詳之

托裏消毒散加減法　頭痛發熱邪在表也本方加川芎羌活若外邪在表而元氣實者暫用人參敗毒散　頭痛惡寒表虛也去金銀花連翹二味倍參芪　發熱飲冷便祕內熱也去參芪歸术加大黃　發熱飲熱便祕內虛也去二味加參芪歸术　面目赤色煩熱作渴脉大而虛血脫發躁也去連翹金銀花白芷三味倍黃芪當歸如不應暫用當歸補血湯　身熱惡衣欲投於水脉沉微細氣脫發躁也去三味加肉桂附子如不應暫用附子理中湯　若婦人勞役恚怒或適經行發熱譫語

補虛

虛寒以桂附佐

或夜間熱甚病在血分也去三味加生地黃牡丹皮柴胡如不應暫用加味四物湯

一男子膿熱不潰微痛少食倦怠發熱予爲針之膿涌出熱益甚乃虛故也急以人參黃芪湯二劑熱愈甚此藥力尚未及也又二劑果應再以當歸補血湯數劑而痊東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脉洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁宜當歸補血湯主之

一儒者患流注發熱作渴頭痛自汗脉洪大按之無力此氣血虛寒也用十全大補加麥門五味治之其症益甚仍用前藥加附子壹錢四劑諸證悉退却去附子加肉桂二十餘劑氣血漸復又因勞心發熱惡寒飲食減少此脾胃復傷元氣下陷用補中益氣加附子一錢二劑熱止食進仍用大補元氣而安後因考試不利懷抱不舒更兼勞役飲食日少形氣日衰吐痰作渴頭痛惡寒或熱來復去或不時而動仍用補中益氣數劑諸症漸愈元氣漸復乃去附子再加肉桂五分百餘劑而愈

一男子背瘡不斂小便赤澁臂腫發熱口乾體倦脉洪數而無力用參芪歸术熟地芍藥陳皮麥門五味炙草肉桂以補元氣引火

歸經脉症益甚此藥力未能及也再劑頓退却去肉
桂又數劑而愈此症因前失補元氣故耳　操江伍
都憲背瘡愈後大熱誤為熱火用苦寒藥一鍾寒熱
益甚欲冷水浴身脉浮大按之全無余曰此陽氣虛
浮於肌表無根之火也急用六君子加附子一劑即
愈

宿食宜下

外舅于見素膏粱厚味四十三歲疽發于背瘍醫投
五香湯躁熱欲狂予固沮之而後已潰後平靜一日
熱復大作五六日益甚脉洪數無倫醫皆以為虛宜
補予私計膏粱之變重以五香之熱當治以苦寒且
大便不行數日矣盍下之以泄其毒乎乃研石膏末
兩許知母二三錢甘草一錢黃瓜蔞一枚和仁搗碎
為一劑命僮熾炭注水而自煎之醫夏生苦口力諫
以隆冬潰瘍無用白虎法余故復加石膏兩許而置
大黃片五錢於袖中湯既沸則以袖籠藥銚若為移
遠火者而潛下大黃於銚中時妻叔二三輩皆環爐
坐注目而視不覺也夏生語于聲甫飲是藥必死別
十聲甫以告余哂之藥成持以飲外舅少頃大便下
結糞及食物未化者滿行清中熱退身涼乃以四君
子湯調之月餘而平先是每旦診脉皆言不思食食

少而瘡大去死肉多自慮何以生肌歛口乎予信之
初意其便溺阻隔而漫下之亦不知爲傷食發熱也
夏生愧甚遂徙去

黃芪散　治癰潰後補虛去客熱

黃芪　石膏各貳兩　知母
麥門冬去心　白芍藥　白茯苓
桂心　熟地黃　人參去蘆
川升麻各壹兩　甘艸炙微赤半兩

右剉碎每服肆錢水壹盞煎陸分去滓溫服日
三四服

當歸補血湯　治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目
赤面紅煩渴引飲晝夜不息脉洪大而虛重按全
無此脉虛血虛也若悞服白虎湯必死宜此主之

黃芪炙壹兩　當歸酒拌叁錢

作一劑水壹鍾半煎陸分服

沉香散　治癰膿潰已絕肌肉內虛尚有餘熱

沉香剉　柴胡去苗　黃芪
麥門冬去心各壹兩　白朮炒各柒錢半　熟地黃貳兩
黃芩　瓜蔞根　甘草生剉各半兩

右剉每服肆錢水壹中盞入竹葉貳柒片小麥伍

拾粒煎至陸分去滓不拘時溫服

加味逍遥散　治肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便欠利

甘草炙　當歸　芍藥酒炒

茯苓　白朮炒

牡丹皮　山梔炒各柴分　柴胡各壹錢

右水煎服

梔子黃芩湯　治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝不到發熱不住用以退熱

漏蘆　連翹　山梔仁

黃芩去心　防風　石韋如無有以桑白皮代

生甘草　生犀角屑　人參

苦參各去蘆　茯苓去皮各貳錢半　生黃芪壹兩去叉蘆

右為粗末每服肆大錢水壹鍾煎至陸分去滓溫服

惡寒　一男子潰而惡寒用四君子湯加桂倍用黃芪大料四劑而止膿水尚多投八珍湯加桂數劑漸少惟瘡口不合以附子餅及十全大補湯每劑加炮附

子五分數劑乃去附子又服月餘而愈　一男子潰後畏寒脉虛以四君子加炮薑四劑而愈以十全大補湯月餘而歛仲景云脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脉虛宜托裏和養血信夫

嘔逆　丹溪治一老人年七十云云見兼症嘔條

五香白术散　寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食方見內癰門肺癰條下

禁忌　丹五香湯即五香連翹湯去射干大黃升麻連翹加參犀角若用於腫瘍猶可借其飛走以攻散其毒使不延蔓若用於潰瘍雖多有參芪甘草之緩補而走泄太多寧不犯仲景已有得汗復汗得下復下重虛之戒可不省乎

精要云血氣聞香則行聞臭則逆又言飲食調令香美益其脾土養其眞氣夫甘而淡者可養脾土若香美者但能起火經以熱傷脾熱傷氣爲戒今曰益脾養氣若施之於腫瘍者似有暢達之理潰瘍後用香美恐有發濕熱損眞陰之患矣

精要云熱盛脉數與漏蘆湯單煮大黃等湯不甚熱胍緩弱只投五香連翹湯夫熱盛胍數若腫瘍時臟腑秘而體實者猶可與大黃若潰瘍後膿血出多者

熱盛脉數去死為近其可下乎緩弱之脉古人皆以為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

膿盛忌追毒丸

精要云初成膿宜用烙得膿利為効亦服神仙追毒丸此又不能無疑者也夫追毒丸下積取毒之藥決無取膿之効今用烙而得膿若在裏之氣血壯實則膿自出如推矣何不以和氣活血之藥佐參芪補劑使膿自托出乎

渴忌追毒丸

精要云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒與清膽湯萬金散五香連翹湯六味車螯散千金漏蘆湯皆可選用下利已後渴尚未止宜用生津補氣藥則津液生氣血完渴自止矣大大渴而與利藥非明示脉症何以知其當下後又言下利後渴又不止却用補藥又不明言脉症恐是但有大渴必與峻下下後尚渴方與補藥夫醫者治未病如此用藥可乎況渴屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍時渴恐因血氣之虛何以待下利後方議其虛哉

潰後咽痛忌琥珀犀角膏

精要論疽疾咽喉口舌生瘡歸罪于不得內托以致熱毒衝心與琥珀犀角膏夫於腫瘍時用之猶或近理若於潰瘍後用之彼犀角腦子之升散寧不助病邪致虛以速其死也耶後有犀角散以大黃佐黃芪

潰後寒熱忌正氣散

用黃芪則知其虛用大黃又似疑其有實熱夫瘡潰體虛縱有舊熱將自漸因膿血而消何必以峻冷利動臟腑若在秋冬何異用刀劍耶

精要論癰疽發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作或間日作必先嘔痰然後寒熱寒熱解大汗出不可專以為有熱亦有氣虛而得者亦有因怒而得者又有先感寒邪脾氣不正而有此證者夫氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾氣不正者當以調脾藥養之今用不換金正氣散悉是溫散瀉衛之藥而欲以一兩人參收拾十四兩之

瘡未合慎風溼

瀉衛可乎若用於腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能無治乎又未知用於腫瘍耶潰瘍耶

鬼遺穴有孔慎風仍慎再合如再合者為風濕邪氣攻搏而再生膿宜如前以通和湯藥依次第用不可急性恐傷氣害人之命也

三因瘡瘍未合風入為破傷風濕入為破傷濕二者害人最急倉卒不知其因甚難認治癰疽瘰癧潰後尤宜謹之

追蝕膿蠹癤之薄皮剝起癰疽之瘡口緊細瘰癧火針破核之後皆可用追蝕破膿之藥癰疽開後瘡口

再閉宜用藥紆以通之或用紙或用髮或用乾稻草葉皆可塗撚紆塗以蟾酥硇砂白丁香巴豆寒食麵之類或用五灰膏隨輕重塗紆用之瘡疽腐敗可用手法去之或用金寶膏去之或用雄黃輕粉傅之多待數日亦自脫落疽破後有蠹肉努出者遠志末酒調塗之則漸漸消去如不消用五灰膏塗之則消癰疽久流膿水不腐不敗氣血不能滋養瘡口滯毒日漸內侵好肉而為蠹肉膿水過處漸成膜管如鵝毛管而軟其瘡口如魚嘴樣日久不能愈筋爛骨壞用金寶膏或塗或紆或封之一日三四次用之不耐痛者一日二次用之其蠹肉膜管消盡以滋潤膏藥貼之　薛新甫云瘡瘍之症膿成者當辨其生熟淺深肉死者當驗其腐潰連脫丹溪先生云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣為主使根本堅固而行經活血佐之令其內消余常治脉症虛弱者用托裏之藥則氣血壯而肉不死脉症實熱者用清熱之劑則毒氣退而肉自生凡瘡聚於筋骨之間肌肉之內皆因血氣虛弱用十全大補湯壯其脾胃則未成自散已成自潰又何死肉之有若不大痛或木痛或不赤或內膿不潰或外肉不腐乃氣血虛弱宜用桑枝灸及

十全大補加薑桂壯其陽氣則四畔即消瘡頭即腐其毒自解又何假於針割若脾胃虛弱飲食少思用六君倍加白术壯其榮氣則肌肉受毒者自活已死者自潰已潰者自斂若初起或因尅伐或犯房事以致色黯而不痛者乃陽氣脫陷變為陰症急用參附湯溫補回陽亦有可生　吳庠史邦直之內侍夏患背疽死肉不潰發熱痛甚作嘔少食口乾飲湯脉洪大按之如無此內真寒而外假熱當捨時從症先用六君加炮薑肉桂四劑飲食頓進諸症頓退又用十全大補仍加薑桂之類五十餘劑而死肉潰又五十餘劑而新肉生斯人氣血充盛而瘡易起易斂使醫者逆知預為托裏必無此患

六合回生丹 又名六合奪命散 治發背癰疽潰爛者有回生之妙

鉛粉 壹兩　輕粉　銀硃

雄黃 兩壹錢貳分半　乳香 箬上炙焦　沒藥 亦炙各貳分半共壹

右六味各擇真正好者研為極細末收貯凡治其病先煎好濃茶將瘡洗淨軟帛拭乾後剖開豬腰子壹枚用藥壹分摻於豬腰子上却傅患處待豬

腰子上發熱如蒸良久取去自此拔毒氣減痛苦定瘡口出膿穢不可手擠第二日依前法仍傳之第三日亦傳之瘡勢惡甚可傳七八九次瘡小只傳一次可愈豬腰子不發熱勿治又治對口瘡同前

沁陽焦閣老先生嘗施此方用藥壹分傳一次則止茶仙施此方加藥至叁伍分傳數次見効尤速功多在拔其毒耳瘡口大者恐一个豬腰子傳之不足可加半个剖腰子法不可剖脫敗兩斷須要相連如大約量瘡口大小摻藥則可用

豬豬腰子爲佳其腰子有毒宜深埋之

若膴瘡日久不愈用黃蠟少加好黃丹化攤紙上量瘡大小裁其蠟紙多者摻藥壹貳分粘在蠟紙上面貼瘡綿帛縛住任瘡出盡惡水即愈若患下疳用豬腰子切作寬片摻藥縛裹疳上或以尖刀穿開豬腰子納藥于內籠套其疳亦良羊魚鵝雞犬鴨及發毒菜物俱忌之

驪龍散 治發背癰疽破與不破二者之間功能捷奏

珍珠伍分 牛糞十二月生用餘月燒存性 鐵鏽各重壹兩

右研細末以豬腦髓和好醋調傅瘡口三五次愈

初起者自消凡發毒品味忌食之

麥飯石膏 在膿潰後圍瘡口

麥飯石不拘多少炭火煆至紅以好米醋淬之如此煆淬十數次研爲末重羅去粗者取細末入乳鉢數人更遞研五七日如麵極細爲妙　白斂研爲細末　鹿角不用自脫者須用帶腦頂骨全者却是生取之角截作二三寸長炭火燒令烟盡研羅爲末再入乳鉢更遞研令極細

右用麥飯石細末貳兩　白斂末貳兩　鹿角灰肆兩最要研得極細方有効粗則反致甚痛細則大能止痛收口排膿精粗之異如此和合量藥末多寡用經年好米醋入銀石器內熬令魚眼沸却旋旋入藥末用竹篾子不住手攪熬一二時久令膏調得所提出以磁器盛之候冷以紙蓋覆勿令着塵用時先以豬蹄湯洗去膿血以故帛挹乾鵝翎蘸膏塗傅四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如錢大未潰能令內消已潰則排膿如湍水逐日瘡口收斂瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥貼瘡但內膜不穿亦能取安洗瘡勿可手觸嫩肉亦不可口氣吹着合藥亦忌腋氣之人及月經有孕婦人見之仍可熬好米醋一大椀收磁器內候逐日用藥于瘡上久則藥乾以鵝翎點醋拂拭藥上勿令綳也初則一日一洗一換藥十日後兩日一換

古方云麥飯石顏色黃白類麥飯曾作磨者尤佳按麥飯石不可作磨狀如麥飯團生粒點如無此石常以舊麵家磨近齒處石代之取其有麥性故也或溪中尋白石如豆如米大者即是也其石大小不等或如拳如鵝卵略如握聚一團麥飯

解毒百用膏

豬牙皂角煨 南星各壹兩 大米壹合炒黑

臭小粉乾者肆兩炒焦去火毒

右爲末和勻蜜水調圍 治擲撲酒醋調圍

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起宜用逼毒散

黃藥子 白藥子各壹兩 赤小豆貳兩

雄黃壹錢

右爲末水調傅

青散子 治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡口生肌

槿花葉盛時收陰乾取肆兩爲末 青赤小豆

白芨各貳兩

右爲末臨時用槿花末叁錢匕白芨小豆末各壹錢匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不

用貼

雄黃解毒散　治一切癰腫潰爛毒勢盛者先用此藥二三次以後用豬蹄湯

雄黃壹兩　白礬肆兩　寒水石煆壹兩

用滚水貳叁碗乘熱入前藥壹兩洗患處以太乙膏或神異膏貼之

豬蹄湯　治一切癰疽腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有口便須用此湯洗

香白芷不見火　黃芩去心　赤芍藥

露蜂房取有蜂兒者　當歸去蘆　羌活

生甘草各等分

右為粗末看疽大小用藥如疽大加料用先將豬豬前蹄兩隻壹斤只用白水叁升煮軟將汁分作二次澄去面上油花盡下面滓肉每次用藥壹兩投於汁中再用文武火煎十數沸去滓以故帛蘸藥湯溫溫徐薄揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗訖以帛揩乾仍避風忌人口氣吹之有狐臭人并月經見行婦人猫犬並不許入病人房洗瘡切勿以手觸着洗疽之方所傳甚多唯此方極効其用露蜂房有理蓋以毒驅毒也

集香散　洗癰疽潰爛

白芷　藿香　茅香

香附子　防風各叁錢　木香

甘草各壹錢

作一劑用水叁盞煎數沸去柤淋洗患處

薛按此方乃馨香之劑也經云血氣聞香則行得臭則逆即此意也若瘡毒將盡宜用之若毒未盡或有瘀肉宜先用雄黃解毒散解之後宜用此方須用膏藥護貼使風邪弗入肌肉易生大凡一有瘡口即用膏藥貼之至收口為度最忌生肌之劑

熏洗方　凡諸發及癰疽瘰癧瘡湯盪火燒等疾或有別作一種穢臭氣息不堪聞者最是惡證或已破未破或小或大皆當作急治之可用忍冬藤一握擂細用無灰酒濾汁服之以滓傅瘡四圍用雲母膏別研亦可剪開大口以護其瘡之上竅其瘡出膿便以豬豬蹄湯等十分淨洗久洗為妙至一二時辰不妨次用後藥熏之

好降真香末　楓香末

右二味於銚中攪熔丸如彈子大却取香爐一枚依爐口造紙煙筒一個如燒龍涎香樣慢火爇之

去死肉藥

緊以煙筒口熏瘡上不拘九數稍倦暫止然後更熏未出膿者即出已出膿者即乾直候生肌合口然後止向後有赤腫去處又再熏大槩欲屏去穢氣也

癰疽有死肉不去者用白丁香霜梅深則紝之淺則乾摻於膏藥上甚妙

海 又方膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡肉不惟惡瘡凡癰毒有惡肉者俱可去

又方雄黃散 以雄黃壹錢另研巴豆不去皮研如泥入乳香沒藥少許再研細少上惡肉自去

烏金膏 治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生若初起腫痛用點數處其毒頓消若肉腐塗之即潰若惡瘡頑瘡元氣無虧久不收斂者內有毒根以紙撚蘸紝其內有等發背因元氣虛弱或因尅伐元氣胃氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰服大補之劑中塗三四寸許至五六日間赤黯之界自有裂紋如刀劃之狀中央漸黑漸脫須用純陽之藥以接其元氣庶能收斂若妄用刀針去肉出血陽隨陰散元氣愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益而又害之

用巴豆一味去殼炒黑研如膏點於患處臨用金之

追毒丹　治瘡疽黑陷者用針刀開瘡內此丹使之潰然後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之

巴豆（柴粒去皮心不去油研如泥）　白丁香　輕粉（各壹錢）　雄黃　黃丹（各貳錢）

右件研和加白麵叁錢滴水為丸如麥大針破瘡內之覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾小者用一粒大者加粒數用之

追毒烏金散　治瘡口惡肉毒潰膿血

巴豆（伍錢）　寒食麵（壹兩）　好細墨（壹錠）

右為細末用水和麵作餅子將巴豆包定休教透氣文武火燒成深黑色為細末量瘡貼之用膽汁就和成錠子新水磨用掃五七次妙

梧桐淚方

癰疽勢腫惡不潰堅硬以快利刀將患處劃成十字路用麵水調稠厚周圍瘡口外高起五分許如塘池樣將淚填半滿用好米醋滴淚上須臾自沸

勿令滚出麵外次日用金銀花煎湯洗淨再如前用一次只用醋洗不痛爛肉自去

薛按此方果惡瘡惡肉不腐宜用之亦有陽氣虛不能腐化者宜用大補之劑

治惡瘡有死肉者及追膿保命

白丁香　輕粉　粉霜

雄黃　麝香各壹錢　巴豆霜叁个

右為細末新飯和作錠子用之

神異膏　治癰疽壞爛及諸瘡發毒

雄黃伍錢　滑石倍用

右為末洗後摻瘡上外用綿子覆蓋相護凡洗後破爛者用此貼之

止痛拔毒膏　治一切瘡發臭爛不可近未破則貼破已破則生肉杖瘡疔瘡皆用之

蟹螫肆拾玖枚　柳枝肆拾玖條　木鱉子柒个

乳香　沒藥　麝香少許

松脂叁錢

右用真清油拾肆兩煎黑柳條焦枯濾去渣入黃丹伍兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪令勻入甆器中收了後用

郭氏青金錠子

銅綠叁錢　青礬　膽礬
輕粉　砒霜　白丁香
苦葶藶各壹錢　腦子少許　麝香

右將葶藶研細次下研藥同研極細打稠糊爲錠子或煉蜜加白芨末壹錢爲錠如麻黃粗細約二三寸長看瘡口深淺紙入疼者可治不疼難治

第一般緊峻碧雲錠子砒霜生開瘡口用

第二般緊緩碧霞錠子砒霜煆去死肉用

第三般緩慢碧玉錠子去砒霜加枯礬生好肉用

碧霞錠子　治年深冷漏日久惡瘡有死肉用之

銅綠　寒水石煆　滑石各叁錢
明礬　膩粉　砒霜
雲母石研如粉各壹錢貳分半

右研細末糊爲錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡口深淺紙之如修合候天色晴明則可

信効錠子　治一切惡瘡

紅娘子　黃丹　砒霜
鷹屎　土硝　白芨
銅綠各壹錢半　腦子　麝香各少許

右研細末些兒乳汁和為錠子用中病即止

紅玉錠子　去夕肉生肌

乾臙脂　白礬枯各叁錢　輕粉

砒霜　黃丹　腦子

麝香各少許

右研極細末稠糊和為錠子用之

時効針頭散　追蝕惡瘡歹肉兼治瘰癧

赤石脂半兩　乳香　白丁香各貳錢

砒霜生　黃丹各壹錢　輕粉

麝香各半錢　蜈蚣壹條焙乾

右為極細末摻於瘡口歹肉自去矣若動刀針其瘡雖可有瘢

追毒餅　治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿脹痛不可忍用此捻成小麥子大入於瘡中永不閉膿水自出瘡自乾好

極好信石半錢　雄黃　雌黃

大硃砂各壹錢　輕粉少許

右研為細末糯米糊丸如麥子大若瘡口閉合生膿將藥入內仍以膏藥貼之

內服內追毒丹方見前

薛按此以毒攻毒之意也嘗治一縣尹背瘡竟背腐潰色黯重若負石甚危喜飲食頻進用桃紅散色漸赤負漸輕再用而肌生更服托裏藥而愈蓋此亦大毒證非此峻藥莫能治此亦用砒故攻毒有効然有氣血虛不能腐潰宜補養氣血常治痃背初起未成膿先用烏金膏或援生膏點患處數點以殺其大勢更服仙方活命飲如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑如外皮腐動用雄黃解毒散洗之每日用烏金膏塗腐處候有瘡口即用紙作撚蘸烏金膏紙入瘡內若有膿爲筋膜間隔不出致作脹痛用針引之腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗如膿稠焮痛飲食如常瘀肉自腐用消毒藥與托裏相兼服之仍用烏金膏塗搽若瘀肉已離好肉即去之如膿不稠不稀仍作痛飲食不甘瘀肉腐遲用桑枝灸患處更用托裏藥主治之瘀肉不腐或膿清稀不焮痛者服大補之劑仍用桑枝灸之以補接陽氣解散鬱毒其肉自腐

翠青錠子　又名善効錠子治腦疽發背惡瘡并潰爛追膿水長肌

銅青 肆錢　明礬 枯　韶粉

乳香 另研　青黛 各壹錢半　白斂

輕粉 各壹錢　麝香 半錢　杏仁 貳柒粒去皮尖另研

如有死肉加白丁香 壹錢

右為細末稠糊為餅子或糯米飯和亦得看淺深紙之直至瘡平復猶可用之大有神効如前數方不宜多用謂犯生砒也此藥無毒恐病家猜疑是毒藥請口內嘗之為憑也

搜膿錠子　先用追蝕等錠子蝕去死肉惡物止有膿水皆宜用之

自然銅　川芎　白芷 各半兩

黃連　白斂 各貳錢半　木香 壹錢半

麝香 少許

右為極細末糯米飯和為錠子用之或作散末乾上亦佳

右二方乃潰瘍必用之要藥余用之救人無筭凡瘡口深而窄者先以綿杖子展淨膿水却以軟飯和成錠子長短大小一以瘡為準須令藥至底乃効外以膏藥護之若瘡口淺而闊大者藥湯洗過拭乾只以乾末摻之如瘡口乾燥以自死竹蘸豆

油點着以盌承取滴下油瀝調前藥末雞羽蘸塗膿汁自止新肉自生神効

麝香輕粉散 治血疳瘡陰蝕瘡耳疳瘡一切惡瘡皆治

麝香 輕粉各半錢 白礬飛過 乳香 沒藥各壹兩 右為細末量瘡乾貼

神効當歸膏 治癰疽瘡毒及湯火杖瘡潰爛最能止痛推陳致新

當歸貳兩 蘇油肆兩 白蠟伍錢如用黃蠟壹兩尤効

先用當歸入油煎至焦黑色去粗入蠟溶化即成膏矣此方用蠟為君煎人每云蠟為外科之要藥生肌定痛續筋補虛其功不可盡述常見善訟者杖後隨食蠟兩許飲酒一兩碗一睡之後血散痛止輕者即消重者雖腐潰亦易愈可見蠟之功為大用者不可忽之

神異膏 精要 治諸般惡毒瘡瘡瘻背癰疽其妙如神

露蜂房 要用蜂兒多者為妙細剪淨壹兩 全蛇蛻 鹽水洗淨焙乾 玄參 去蘆各半兩 綿黃芪 朱錢半 黃丹 伍兩研細後入 杏仁 去皮尖切小片壹兩 男子亂髮 洗淨焙乾如雞子大 眞麻油 壹斤

右件藥先將麻油入銀銚中同亂髮於風爐上慢慢文武火熬候髮焦爛盡以杏仁投入候杏仁色變黑好綿濾去柤再將所熬清油入銀銚內然後入黃芪玄參二味慢火熬一二時取出銚子安一冷風爐上候半時久火方稍息旋入露蜂房蛇蜕二味將柳枝急攪移銚於火上不住手攪慢火熬至黃紫色用綿濾過後復入清油在銚內乘冷投黃丹急攪片時又移銚於火上文武火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少時必候得所然後用瓷器內封收待用或恐偶然熬火太過稍硬難用却入少蠟熬添麻油在內瓷器盛封蓋於甑上蒸乘熱攪勻收而用之膏藥熬成了須用所盛瓷器置淨水盆中出火毒一晝夜歇三日方可用熬此膏藥極難於火候須耐煩看火緊慢火猛即藥中火蘖千萬謹戒膏藥方甚多効無出於此

垣熱瘡寒膏藥

當歸 水洗焙乾壹兩　杏仁 湯浸去皮尖壹百个

黃丹 研細陸兩　肥嫩柳枝 叁兩半切如寸許水洗乾

肥嫩桃枝 壹兩切如寸許洗淨乾　麻油 壹斤

右件先熬麻油熱下桃柳枝熬令半焦以綿裹當歸杏仁同煎至柳枝黑焦爲度去藥查濾油澄淨抹去銚中查滓令淨再上令沸旋旋入黃丹熬成滴水中不散爲度

寒瘡熱膏藥

與寒膏藥同只將當歸身改作當歸稍桃柳枝分兩倒過便是

神仙太乙膏　治八發癰疽及一切惡瘡軟癤不問年月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蜈蚣蠍犬咬傷湯火刀斧所傷皆可內服外貼如發背先以溫水洗瘡淨軟帛拭乾却用緋帛攤膏藥貼瘡即用冷水下血氣不通溫酒送下赤白帶下當歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥置口中含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後服以山梔子湯送下打撲傷損外貼內服橘皮湯下腰膝痛者患處貼之內服鹽湯送下唾血者桑白皮湯下諸漏先以鹽湯洗淨諸瘡並量大小以紙攤貼每服壹丸如櫻桃大蛤粉爲衣其膏可收十年不壞愈久愈烈一方久遠瘰癧同上瘻瘡鹽湯洗貼酒下壹丸婦人血脉不通甘草湯下一切瘡

癤并腫痛瘡及疥癩別煉油少許和膏塗之

玄參　白芷　當歸

赤芍藥　肉桂去粗皮　大黃

生地黃各壹兩

右剉碎用麻油貳斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色濾去粗入黃丹壹斤青柳枝不住手攪候滴水中成珠不粘手爲度傾入磁器中以靴蓋口掘窖子埋陰樹下以土覆三日出火毒欲服九如雞頭子大

金絲萬應膏　治頰撲傷損手足肩背并寒濕脚氣疼痛不可忍小兒脾癖瀉痢咳嗽不肯服藥者

瀝青貳斤半　威靈仙　黃蠟各貳兩

木鼈子貳拾捌个去殼切片子研　苞蔴子壹百个去殼研

沒藥肆兩　乳香各壹兩別研　麻油夏貳兩春秋叁兩冬

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝攪候焦黑色重綿濾過以瀝青入水盆候冷成塊取出秤二斤淨再下鍋鎔開下麻油黃蠟苞麻木鼈子泥不住手槐柳枝攪勻須慢火滴入水中不黏手扯拔如金絲狀方可如硬再旋加油少許如軟加

瀝青試得如法却下乳没未起鍋在炭火上再用
槐柳條攪數百次又以麄布濾膏在水盆内扯拔
如金絲頻換水浸一日却用小銚盛頓如落馬墜
車於被傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉爲驗連換
熱水數次浴之則熱血聚處自消小兒脾疳貼患
處瀉痢貼肚上咳嗽貼背心上

善應膏得効 治諸般惡瘡腫毒發背腦疽癰子牙腫
打撲接骨閃肭刀斧傷杖瘡蛇蟲毒狗馬咬湯火
漆瘡疥癬貼之即愈又治婦人吹乳以藥丸如梧
子大新汲水下貳拾丸肺癰腸癰亦可爲丸吞服
温酒米飲或北梗甘州煎湯皆可不可犯葷手丸
火焙

上等黄丹 捌兩研極細 白膠香
明没藥 滴乳香並別研 大當歸
川白芷 杏仁去皮尖 大黄
草烏頭 川烏頭 赤芍藥
檳榔 生乾地黄 土芎
亂髮淨洗 滴青別研各壹兩

右除乳香没藥外將麄石銚子盛香油壹斤浸藥
一宿慢火煎熬諸藥黑色再入蔥白亂髮煎少時

用生絹帛濾去滓留下壹兩藥油復將所濾油於慢火上熬却將黃丹入油內用長柳條槐條不住手攪候有微烟起提起藥銚將柳條點藥滴在水面上凝結成珠不散方成膏如不成珠上火再熬直待成膏提起藥銚攪無烟出却入乳香沒藥白膠香末攪勻傾出瓷器內將元留下浸藥銚油一併收拾器內用新汲水將藥器坐放水內一日一換過三日出火毒方可用之如膏藥硬約量加黃蠟清油入膏內攪勻得所（熬膏極難於火候須耐煩看火緊慢火猛則藥中火發不担失藥性又燎傷製藥人面目慎之）

玄武膏　治癰疽發背丁腫內外臉瘡陰疰下諸惡瘡及頭頂癰腫不問已潰未潰皆可用大能排膿散毒止疼生肌累有神驗若丁腫先用銀簪或鹿角針於丁瘡中間及四畔針破令惡血出以追毒餅如小麥大擦入孔中却用此膏貼之如瘡壞爛至甚難以藥貼則將皂角二三片煎油調勻此膏如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾愈妙

大巴豆（去殼膜）　木鱉子（去殼各貳兩淨）　黃丹（肆兩研細）

眞清油（拾兩）　槐柳嫩枝（各柒寸長柒條剉細）

右依前法煎熬成膏貼用

金絲膏　治傷筋動骨損痛閃肭風毒惡瘡風濕筋寒諸病

當歸尾　川白芷　杏仁去皮尖

玄參　豬牙皂角去皮炙　草烏生判用各叁錢

白膠香明者捌兩　連鬚葉蔥肥者拾根　滴青明者半斤

乳香　沒藥別研為末各半兩　黃蠟明者壹兩

男子亂髮洗淨拔如雞子大

右用清油半斤將八味依前法熬濾却入膠香滴青攪勻下黃蠟又攪無烟方下乳香沒藥

貼膏法　如瘡有膿血不淨痂瘢閉凝須用藥水洗淨拭乾候水氣乾却用膏貼貼後有黃水膿血出流用紙揩從側畔出一日一換黃水膿血止兩日三日一換貼至愈

長肌膏　治年久諸般爛瘡貼之即愈

白燭油肆錢　黃蠟捌錢　香油捌錢

大楓子去殼切細伍錢　黃連叁錢

番木鼈肉切細貳錢　黃蘗叁錢　右同前濾去粗入後

枯礬叁錢　輕粉叁錢　蜜陀僧伍分研細　各

右將前七味前濾入後三味拌勻俟凝看瘡口大小做薄餅簪穿小孔十數貼瘡上或日易之鹽茶

湯洗瘡洗餅再貼以好為度

生肌 大肌肉者脾胃之所主也潰後收斂遲速乃血氣衰盛使然但當純補脾胃不宜泛敷生肌之劑若膿毒未盡就用生肌反增潰爛壯者輕者不過復潰或遲斂而已怯者重者必致內攻或潰爛而不斂其害大矣　薛氏云瘡不生肌而色赤甚者血熱也四物加山梔連翹色白而無神者氣虛也四君加當歸黃芪肺熱內熱陰血虛也四物加參朮膿水清稀者氣血虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴飲食如常胃火也竹葉黃芪湯不應竹葉石膏湯熱渴而小便頻數腎水虛也用加減八味丸料煎服若敗肉去後新肉微赤四沿白膜者此胃中生氣也但用四君子湯以培補之則不日而斂蓋瘡瘍之作由胃氣不調瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣榮養東垣云胃乃生發之源為人身之本丹溪亦謂治瘡瘍當助胃壯氣使根本牢固誠哉是言也可不慎歟　外治用翠青錠子看淺深紝之如反肉惡物已去止有膿水却用搜膿錠子瘡口淺平則以散末乾上直至膿淨肉滿方用生肌散四畔輕輕掠之歷令漸小以至於合則無他患矣

精要生肌散

寒水石碎　滑石　烏賊骨

龍骨各壹兩　定粉　蜜陀僧

白礬灰　乾臙脂各半兩

右爲細末乾摻用之

平肌散　治諸瘡久不斂

蜜陀僧煅　花蘂石煅　白龍骨各壹兩

乳香另研　輕粉各壹錢

右爲細末和勻乾摻

立應散郭氏　治金瘡血出不止并諸瘡久不生肌

寒水石煅壹兩半　花蘂石　龍骨

黃丹　沒藥各半兩　黃藥子米錢半

一方加白芨乳香輕粉

右爲細末如一切金刃刀鎌傷者用藥敷上絹帛紮之不作膿血瘡膿水乾貼生肌定疼

生肌散

白礬枯　檳榔各壹兩　黃丹

血竭各壹錢　輕粉半錢　蜜陀僧壹錢半

紅玉散

軟石膏煅半兩　黃丹炒壹錢半

完肌散

定粉　枯礬　黃連

乳香　龍骨各貳錢　黃丹

輕粉各壹錢

右各料為極細末貼瘡口生肌長肉看輕重選用之

生肌散　治瘡口不合

木香貳錢　黃丹　枯礬各伍錢

輕粉貳錢

右件各另為細末用豬膽汁拌勻晒乾再研細

患處

〔辟〕按此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不知餘毒未盡肌肉何以得生反增潰爛耳若此方誠有見也亦有氣血俱虛不能生者當用托裏之劑又有風寒襲於瘡所不能生者宜用豆豉餅灸之若流注頑瘡內有膿管或瘀肉或瘰核須用針頭散腐之錠子尤妙如背瘡杖瘡湯火瘡大潰當用神効當歸膏則能去腐生新止痛大有神効

神祕方　治一切瘡已潰者及灸貼之無痂生肉去膿

右用地黃汁壹升松脂貳兩薰陸香壹兩羊腎脂牛酥各如雞子大先於地黃汁煎松脂及香令消即內羊脂酥更用蠟半雞子大一同相和以慢火煎令水盡膏成去滓塗帛貼瘡日一二易

收口　東垣斂瘡口方木香檳榔散用之決無疼痛以蠟油塗覆瘡上生肌斂肉甚速必無惡血瘡口疾合易取平復惟膏粱熱瘡所宜用也貧人害地之寒濕外來寒瘡者禁不可用

木香檳榔散方

木香　檳榔　黃連各等分

石爲極細末新汲水調攤紙上貼之濕則乾貼

治寒瘡斂瘡口藥

當歸身壹錢洗淨晒乾　青皮去白貳分　木香壹分

黃連伍分

右四味爲極細末蠟油調塗取效甚速

保命乳香散　瘡口大者

寒水石煅　滑石各壹兩　乳香

沒藥各半兩　腦子少許

右各研細和勻少許摻瘡口上

聖効散　收斂瘡口

黃蘗壹兩去粗皮細切炒至赤黑色　檳榔　木香各半兩炒令黃色　穿山甲壹兩炒黃　雞胜胵柒枚生用

右爲細末每用少許候大膿出盡洗淨方可乾摻瘡上

桃紅散　斂瘡口定痛辟風邪

滑石肆兩　乳香　輕粉各貳錢

小豆粉壹兩　寒水石叁兩煆

右爲細末乾摻瘡口上　一方攻小豆粉爲定粉

又方治瘡口久不收

小椒去目炒黑壹錢　定粉　風化硝貳錢

白礬貳錢半　乳香　沒藥各壹錢

右爲細末摻之

有人患背疽已潰如碗面大視五臟僅隔膜耳自謂必死用大鯽魚一尾去腸肚以羯羊糞入其中烘焙焦黑極燥爲細末乾摻之瘡口遂收至今無恙此方累用有効須候膿少欲生肌肉時用之

丹精要論癰疽久而瘡口不合其肉白而膿血少此爲瘡口冷滯乃病氣血枯竭不潮於瘡遂致如此用

北艾葉一把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯
澆洗瘡口四圍淨肉以絹帛兒艾葉乘熱澆沃一日
一次洗了須避風仍燒松香以烟薰瘡口良久用神
異膏貼之不可與厭穢之人見若不能禁忌瘡口難
安藥亦無効夫以血氣枯燥不知補接於內惟務熱
洗於外不揣其本而齊其末而乃歸罪於冷滯大抵
潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有
一時之快少頃恐病體自覺疲憊有不耐煩之意非
虛而何可不先議補接乎（補接即參芪歸术之類是也）

蘇亂髮蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每味取壹錢匕酒
調服治瘡久不合神驗（丹溪云髮補陰之功甚大）

丹收斂瘡口止有柳皮白斂煎湯飲之

黃丹散 斂瘡口

黃丹（煅） 白礬（枯） 龍骨
寒水石 乳香（不見火） 木香（不見火）
黃連 黃芩 檳榔
膩粉（各叁錢） 腦子（少許）

右為末隨瘡乾濕用之乾則用溫鹽湯洗濕淨乾
却摻其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不
然則又臂作

[illegible]

[illegible]

[illegible]

內爲骨痺外爲不仁命曰大寒留于谿谷也此用附子灸者蓋此義也

時康祖大夫患心漏二十年當胸數竅血液長流醫皆莫能治或曰竅多則愈損閉則慮穴他岐當存其一二猶爲上策坐此形神困瘁又積苦腰痛行則傴僂不飲酒雖雞魚蟹蛤之屬皆不入口淳熙間通判溫州郡守韓子溫見而憐之爲檢聖惠方載腰痛一門冷熱二症脈之使自擇康祖曰某年老久羸安敢以爲熱始作寒症治療取一方用鹿茸者服之逾旬痛減更覺氣宇和陽遂一意專服悉屏他藥洎月餘腰屈復伸無復呼痛心漏亦愈以告醫者皆莫能測其所以然後九年康祖自鎮江通判滿秩造朝訪子溫則精力倍昔飲啖無所忌云漏愈之後日勝一日子溫書吏吳弼亦苦是疾照方服之浹旬而愈其方本治腰痛用鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍皆貳兩鹽花叁分爲末棗肉丸三十丸空心酒下　天聖中工部尚書忠肅公家有媼病漏十餘年一日有醫過視之曰此可治也即取活鱔一竹針五七枚乃擲鱔于地鱔因屈盤就盤以竹針貫之覆瘡良久取視有白虫數十如針着鱔即鈐置杯水中蠕動如線

復覆之又得十餘枚如是五六醫者曰虫因未盡然餘皆小虫請以常用藥傅之時得檳榔黃連一味即爲散傅之明日乃以乾艾作湯投白礬末二三錢先洗瘡口然後傅藥蓋人血氣冷必假艾力以助陽而艾性亦能殺蟲也如是者再即生肌不逾月愈醫曰瘡一月不治則有虫虫能蠕動氣血亦隨之故瘡漏不可遽合則結毒實虫所爲又曰人無有疾經月不痊則必虛憊婦人則補脾血小兒則防驚痫二廣則并治瘴癘由此醫名大著 有人脚肚上生一瘡久遂成漏經二年百藥不効自度必死一山人見之云此鱔漏耳但以石灰二三升白沸湯泡薰洗如覺瘡痒即是也如其言用灰湯淋洗果痒二兩次遂乾

一婦項下忽生一塊腫漸緣至妳上腫起莫知何病偶用刀刺破出清水一碗日久瘡不合有道人見之曰此蟻漏也緣川飯誤食蟻得此耳詢之果然道人云此易治但用穿山甲數片燒存性灰爲末傅瘡上遂愈蓋穿山甲蟻之畏也 柳休祖者善卜筮其妻病鼠瘤積年不瘥垂命休祖遂卜得順之復按卦合得姓石人治之當獲鼠而愈也既而鄉里有奴姓石能治此病遂灸頭上三處覺佳俄有一鼠逕前而伏

呼猫咋之視鼠頭上有三灸處妻遂差

梅師云經云腎移寒於脾發爲癰腫少氣脾移寒於肝發爲癰腫拘攣又云諸寒癰腫此皆安生岐伯曰生於八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉筋脈聖濟云衣服過厚表易着寒所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸突而成膿如泔而稀久不能瘥瘡口不合變爲痔漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以此

骨碎補丸主之

骨碎補丸方

骨碎補　補骨脂　熟地黃
川當歸　續斷　石楠葉
黃芪　石斛　牛膝
杜仲　萆薢以上各貳兩　附子炮壹兩
白芍藥　川芎　兎絲子
沙參　羌活　防風
獨活　天麻各壹兩半

此方與大偻方相表裏前桂枝拾遺後有木瓜兎絲子白术

右爲末煉蜜丸空心鹽湯下

元戎云邢三郎家小兒病寒疽久不愈先以四物穿山甲湯透之復以地黃當歸湯補之繼以骨碎補丸

外治

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大偻宜用

羌活　防風　細辛
附子　甘草　川芎
續斷　白芍藥　白术
當歸　桂心　麻黃
黃芪　熟地黃

此方與前骨碎補丸相表裏

營氣不從逆于肉理乃生癰腫　陷脉爲瘘留連肉腠腧氣化薄傳爲善畏及爲驚駭

桂附丸　治氣漏諸瘡

桂心　附子炮裂米醋中浸再炮三五次去皮臍
厚朴薑製　粉草炙　白术各壹兩
木香貳錢半　乳香研貳錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下貳叁拾丸丹溪云精要治冷漏諸瘡與桂附丸此冷只因瘡久不合風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖溫

其瀉衛尤速恐不若參芪佐以陳皮庶乎與病情
相得此方治冷漏瘡若寒而虛者只以加味十全
湯隨時令經絡加減用之爲當又虛甚者宜參朮
歸芪膏

陷脉散　治漏瘡及二三十年瘻瘤或大如盂盂久
久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰
令人驚惕卧寐不安體中掣痛愈而復作

乾薑炮　琥珀研　大黃
附子炮去皮各壹兩　丹參柒錢半　石硫黃研
白石英研　鍾乳粉研　烏鰂骨研各半兩

右爲末貯以甆合韋囊勿令泄氣若瘡濕即傅無
汁即煎豬脂和傅之以乾爲度或死肌不消加芒
硝貳兩益佳一法胡燕窠壹枚

丹治漏瘡

川芎半兩　細辛貳錢半　白芷貳錢半
甘草細末

右每日作湯服上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小
用隔年黃麻根刮去粗皮槌軟撚成繩子撚入孔
中至不可入則止日淺一日瘡用好膏藥貼之

子和小渠表三因強寇入家傷其兩脛外膁作瘡數

年不已膿汁常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延爲濕瘡求治戴人曰爾中焦當有綠水二三升涎數掬表曰何也戴人曰當被盜時感驚氣入腹驚則膽傷足少陽經也兼兩外臁皆足少陽之部此膽之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如漚既伏驚涎在中焦飲冷水咽爲驚涎所阻水隨經兩旁入瘡中故飲水瘡中水出乃上湧寒痰汗如流水次下綠水果二三升一夕而痂乾眞可怪也

嘗治足膝下至踝漏瘡通足腫大於好足二倍行步不全用五龍丸大下之者六番每番皆五七行下後用黃蘗蒼朮芪芩地黃甘草升麻葛根南星半夏牛膝滑石桂調之近三四個月而安

本草 治瘻有頭出膿水不止以啄木鳥壹隻燒灰酒調服壹錢匕立瘥

東垣云瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之嘗記卉瘻惡瘡諸藥不効者取蟾蜍前去兩頭安瘡口上以艾炷灸之七壯一易不過柴枚無不効者又法用乞火婆蟲兒灸之同前法累驗神効人皆祕之往往父子不傳

取朽骨久疽及痔漏中有者

取黑骨雞脛骨上等砒霜實之鹽泥固濟火煅通紅取出地上出火毒去鹽泥用骨研細飯丸如粟米大以紙撚送入孔竅內更用膏藥貼之

本事雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之用黃整置石膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒三日三夜其烟上着以雞羽取之以注創惡肉破骨則盡出楊大年嘗記其事族人楊偶年少時有瘍于頰連齒輔車外腫若覆甌肉潰出膿血不輒吐之痛楚難忍療之百方彌久不瘥人語鄭法依法製藥成注之瘡中少頃取朽骨連兩牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃整即瓦盒也

瘡瘡方

豬骨膏 治諸瘡口氣冷不瘥

豬筒骨貳箇取髓　松脂貳錢通明者研　乳香另研
黃連去鬚爲末　白芨研末各貳錢半　鉛丹別研
黃蠟各半兩

右搗研熔蠟和爲膏不拘時傅之

附子散 治冷瘡日夜發歇疼痛

附子半兩炮去皮臍　川椒去目　雄黃細研各
白礬柴錢半火煅研　膩粉貳錢研

爲細末研勻每用清麻油調傅瘡上

雄黃散　治冷瘡煖瘡口

雄黃研　百合　乳香

黃蘗炙去粗皮　墻上爛白蜆殼小蚌蛤子是各壹分

右爲細末研勻先用漿水煎甘草柳枝汁溫洗拭

乾傅之

黑靈散　治漏瘡

牡蠣粉　虢丹　硫黃研各壹分

露蜂房剉貳分

右同炒令烟盡爲細末入髮灰壹分麝香少許和

勻傅之

馬齒莧膏　治一切瘻

馬齒莧陰乾　臘月燭燼各等分一作臘月鼠灰

右爲細末以臘豬脂和先以溫泔清淨洗拭乾然

後以藥傅之日三

治脇下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止

右以鹽少許安白牛耳內然後取牛耳中垢以傅

瘡上即瘥如不用鹽即牛耳不痒難取垢

治諸瘡久不合口用炮附子去皮尖爲細末唾津和

隨瘡大小作餅置患處用艾壯於餅上灸之更服

大補氣血藥用江西豆豉爲餅多灸之亦効

神應膏　宋褚防禦治理宗久漏瘡諸方不効獨此膏愈之如腸毒胃毒爲丸服之神効

當歸壹兩 壹錢　赤芍藥　大黃各壹兩 伍錢

香白芷　官桂各壹兩　玄參壹兩 叁錢

川續斷壹兩 貳錢　莪朮壹兩　生地黃壹兩 貳錢

右九味細剉用眞香油貳斤浸春五日夏三日秋七日冬十日入鍋內以文武火煎令黑色濾去查如熱天用黃丹廿兩冷月十五兩旋旋下丹不住手攪試水中沉爲度不可令婦人雞犬見如漏有孔者以膏送入孔內外以膏攤貼之

檳榔散　治癰疽瘡瘍膿潰之後外觸風寒腫焮膚硬膿水清稀出而不絕肉腐空虛惡汁臭敗瘡邊干及好肌不生及療疽瘻惡瘡浸漬不斂（方見潰瘍斂瘡口藥即木香檳榔黃連等分爲末是也）

治漏外塞藥

蘆甘石（童便煅淬）　牡蠣粉　右爲極細末傅之

烏金散　貼惡瘡疽瘻

橡斗子貳個　一實黃丹　一實白礬末相合定用黑俏麻皮纏了火內燒研細加麝少許洗淨瘡貼之

東垣截痔散　治年深痔瘻瘡

黃連　麝香另研　龍腦各半兩研　蜜陀僧

黃丹　白芨　白斂各壹兩　輕粉壹錢

右爲細末和勻乾摻在紙上以膏貼之

應効散又名托裏散　治氣瘻痔蝕瘡多年不効者

地骨皮不以多少冬月爲細末每用紙撚蘸紙瘡取只要皮蔭乾

口內自然生肉更用米飲調貳錢無時服日三

治漏瘡以五倍子末和血竭末塞之

久漏瘡　足內踝上一寸灸三壯　如在上者肩井　鳩尾

肺脉微緩爲瘻瘻緩者多熱

癰疽所兼諸證

○渴

大法瘡瘍作渴不問腫潰但脉數發熱而渴用竹葉黃芪湯脉不數不發熱或脉數無力而渴或口乾用補中益氣湯若脉數便秘用清涼飲尺脉洪大按之無力而渴用加減八味丸若治口燥舌黃飲水不歇此丸尤妙

薛瘡瘍作渴若焮痛發熱便利調和者上焦熱也用竹葉石膏湯腫痛發熱大便秘澁者內臟熱也用四順清涼飲焮腫痛甚者熱毒蘊結也用仙方活命飲

虛者補之

漫腫微痛者氣血虛壅也用補中益氣湯若因胃火消爍而津液短少者用竹葉黃芪湯若因胃氣虛而不能生津液者用補中益氣湯若因胃氣傷而內亡津液者用七味白术散若因腎水乾涸作渴或口舌乾燥者用加減八味丸或先口乾作渴小便頻數而後患疽或疽愈後作渴飲水或舌黃乾硬小便數而疽生者尤惡候也苟能逆知其因預服加減八味丸補中益氣湯以滋化源可免後患

丹癰疽發渴乃氣血兩虛用參芪以補氣歸芪以養血或忍冬丸黃芪六一湯

實者瀉之

伍氏云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒清熱湯千金漏蘆湯五香連翹湯六味車螯散萬金散皆可選用利後仍渴却用生津補氣藥津液生氣血完渴自止　丹溪曰大渴而與利藥非明示脉證何以知其當下後言利後仍渴却用補藥又不明言脉證恐是但有大渴必下下後尚渴方與補藥古人治未病如此用藥可乎況渴屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍後渴多因氣血之虛何待利後方議其虛也

精要　口乾與口渴不同不宜用丹藥鎮墜用之其禍如反掌用桑枝煎五味湯以救陰水　丹溪曰此妙

方也而不言食味起火怒氣生火房勞激火吾恐渴亦未易除也

李氏云病疽愈後發渴多致不救惟加減八味丸最妙蓋癰疽多因虛而得疽安而渴者服此丸則渴止安而未渴者服此丸永不發渴或未疽而先渴者服此不惟渴止而疽亦不作　薛氏曰前證屬腎水枯涸虛火上炎口乾作渴飲水無度或舌黃作裂小便頻數或痰氣上壅煩躁不寧或二三年先作渴飲水或口舌生瘡兩足發熱痰氣上壅或瘡愈三四年而口乾作渴小便頻數急用前藥多有復生者能逆知其因預服前丸可免此患若兼手足厥冷眞陽虛也宜服八味丸大丸瘡後審其腎水不足用加減八味丸中氣虛弱用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補湯陽氣虛寒加薑桂如不應用八味丸

托裏消毒散加減法　飲冷作渴熱毒也加赤小豆知母如不應暫用竹葉黃芪湯　善食作渴胃火也加石膏山梔天花粉如不應暫用竹葉石膏湯

食少體倦作渴冒氣虛也去正翹金銀花加人參白朮如不應暫用補中益氣湯　膿多而作渴氣血虛也去三味加熟地黃五味子　如不應暫

用十全大補湯加五味子麥門冬　口乾舌燥腎氣虛也去三味加熟地黃山茱萸山藥如不應兼六味丸又不應佐以補中益氣湯　自汗內熱口乾胃氣虛也去三味加參芪歸术如不應暫用六君子湯　盜汗內熱口乾陰血虛也去三味加熟地黃麥門冬五味子如不應暫用當歸六黃湯

竹葉黃芪湯神秘　治癰疽大渴發熱或瀉或小便如淋

生地黃　黃芪各貳錢　當歸酒拌

淡竹葉　川芎　甘艸炙

黃芩炒　白芍藥炒　人參

括蔞根　石膏煅各壹錢　麥門冬去心貳錢

水貳鍾薑叁片煎八分食遠服

薛氏曰前證乃七惡中之一也此方治之其功甚捷亦有左手脉浮大而熱或渴者宜發散表邪右手脉沉實而熱或渴者宜疎去內邪若潰後作渴或小便如淋或脉大而無力者屬氣血虛也宜大補氣血亦有潰後熱不止或作渴遂以為敗證不治若素有胃火或胃經熱毒未盡胃脉尚數者仍宜服前湯服而脉反大熱愈甚渴愈作斯為敗證

蓋因眞氣虛而邪氣實也今之潰瘍畏石膏黃芩二藥性冷多不肯服若胃脉未靜非此藥莫能治也若因循日久煎熬氣血曉血愈多氣血愈虛反成敗證矣治者當捨證從脉可也大抵瘡瘍之證七惡內見一二惡甚可畏虛中見惡證者不治實證無惡候者自愈

托裏黃芪湯　治證同前

黃芪炒陸錢　甘草炙　括蔞根各壹錢

水貳鍾煎捌分頻服本人參壹錢尤妙

薛氏曰愚用此方治氣虛作渴甚効若氣血俱虛或膿血大泄作渴或兼發熱者宜托裏養榮湯

托裏養榮湯

人參　黃芪炙　當歸酒洗

芍藥炒　熟地黃　麥門冬去心

川芎　白朮各壹錢　五味子研

炙甘草各伍分

水貳鍾薑叁片棗貳枚煎捌分食遠服

黃芪六一湯　常服終身可免癰疽實治渴補虛之要劑也

綿黃芪陸兩用淡鹽水潤飯上蒸焙乾　甘草壹兩一半生一半炙

每剉壹兩水貳鍾煎捌分食遠服　或為細末每服貳錢早晨日午白湯調服　加人參尤妙

七味白术散　治胃氣虛或因尅伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思

白术　茯苓去皮　人參各柒錢

甘艸炙壹兩半　木香貳錢半　藿香葉半兩

葛根壹兩　右為細末每服叁伍錢白湯調下

竹葉石膏湯　治癍疽胃火盛腫痛作渴

淡竹葉　石膏　桔梗

木通　薄荷　甘草炙

右薑水煎服

玄參散　治癍疽成膿水不能下食心煩口乾煩渴飲水多四肢羸瘦

玄參　黃連去鬚　土瓜根

麥門冬去心　赤芍藥　白鮮皮各壹兩

升麻柒錢半　火麻仁　川朴硝

川大黃剉炒各壹兩半

右剉每服叁錢水壹中盞入生地黃壹分細切同煎至陸分去滓不拘時溫服

葛根散　治癍腫熱盛口乾煩渴或時乾嘔

葛根　黃芪　升麻
麥門冬去心　瓜蔞根　赤芍藥
梔子仁　生地黃各壹兩　黃芩柒錢半
甘草生用半兩

右剉每服肆錢水壹中盞煎陸分去滓無時溫服

乾葛飲　治發背作渴

黃芩　朴硝各壹兩　乾葛壹兩貳錢半

右剉散每服叁錢用枇杷葉去背上白毛淨洗同煎不拘時服

忍冬丸　治渴疾既愈預防發疽先將忍冬草入瓶內後入無灰酒微火煨一宿取出晒乾少加甘艸俱為末又以所浸餘酒調糊丸如梧桐子大每服陸柒拾丸溫酒下又治五痔諸瘻

桑枝方大治口渴取嫩桑枝細切壹升炒以水叁升煎壹升日服五七劑更多尤妙抱朴子云療風痺乾燥臂痛脚氣四肢拘攣上氣咳嗽久服補肺消食利小便輕身聰明令人光澤其功不能盡述

薛氏曰桑枝補血氣生津液輕身明目補肺腎之良劑也

五味子湯　治腎水枯涸口燥舌乾

黃芪炒叁兩　人參貳兩　五味子

麥門冬去心各壹兩　粉甘草炙伍錢

每服伍錢水煎日夜服五七劑

薛氏曰此方乃六一湯生脉散之複方滋化源之良劑若腎水既涸虛火上炎而口燥作渴者須佐以加減八味丸

加減八味地黃丸

懷慶地黃肥大沉水者酒洗淨磁盆盛之大砂鍋內竹棒架起湯浸過盆底原蓋盖之濕紙糊縫勿令泄氣以火從巳至酉蒸之候冷取出晒極乾秤准剉兩重再如前法蒸之乘熱杵爛入藥　乾山藥　山茱萸肉

五味子各肆兩酒浸蒸焙　牡丹皮　白茯苓

澤瀉各叁兩　肉桂貳兩

右各另爲末入地黃和勻加煉蜜丸如梧桐大每服柒捌拾丸空心食前白湯下

李氏曰一貴人病疽未安而渴作日飲水數升予用前方諸醫大笑云此藥若能止渴我輩不復業醫矣仍用木瓜烏梅百藥煎等渴愈甚不得已用此丸三日渴止又服氣血益壯飲食加倍

○嘔

大法精要云嘔逆有二證一證謂初發不曾服內托

散伏熱在心一證謂氣虛脾氣不正其伏熱在心者與內托散三兩貼氣虛者宜嘉禾散有寒熱宜正氣散兼與山藥丸以補腎　丹溪曰諸逆衝上嘔噦皆屬於火內托散性涼固有降火之理若嘉禾散補力已少徒溫煖以助火耳山藥丸補腎以壯下焦之陰粗爲近理然治嘔須分先後腫瘍時當作毒氣上攻治之潰瘍後當作陰虛治之若年老因疽潰後嘔逆不食者宜參芪白术膏峻補取効佐使藥隨時隨證加減恐用山藥丸緩急未易得力河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵胃也藥中宜倍加白术

瘡瘍作嘔不可泥於毒氣內攻而槩用敗毒等藥如熱甚焮痛邪氣實也仙方活命飲解之作膿焮痛胃氣虛也托裏消毒散補之膿熱脹痛氣血虛也先用托裏散後用針以泄之焮痛便秘熱蘊於內也內踈黃連湯導之若因寒藥傷胃而嘔者托裏健中湯胃寒少食而嘔者托裏益中湯中虛寒淫而嘔者托裏溫中湯肝木乘脾上而嘔者托裏抑青湯胃脘停痰而嘔者托裏清中湯脾虛自病而嘔者托裏益黃湯鬱結傷脾而嘔者托裏越鞠湯若不詳究其源而妄用攻毒之藥則腫者不能潰潰者不能斂矣丹溪

實瀉

雖曰腫瘍當作毒氣攻心治之潰瘍當作陰虛治之亦大槩之言耳今之熱毒內攻而嘔者寡脾胃虛寒而嘔者多豈可膠柱而鼓瑟哉　又曰欲嘔作嘔或外搽內服寒涼或痛甚或感寒邪穢氣而嘔皆胃氣虛也托裏消毒散去三味加藿香倍參朮

熱盛脉數精要與漏蘆湯单煮大黃湯等若不甚熱脉緩弱只投五香連翹湯　丹溪曰熱盛脉數若腫瘍時藏府祕而體實者猶可與也若潰瘍膿血出多熱盛脉數去死為近豈可下乎緩弱之脉古人皆以為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

李氏云癰疽嘔逆是毒氣衝心非脾胃之冷當服內托散楊氏云鼻衄初愈不曾表汗毒在經絡則背發大疽自肩下連腰脇腫硬如石其色紫黑以涼藥投之終夜大嘔連進內托散嘔止瘡潰赤水淋漓四十日而愈又有患癰者痛過徹嘔服此即止今有病疽不服此藥者故引楊氏之言以解世人之惑

丹溪治一老人年七十患背疽徑尺餘已雜與五香十宣數十貼膿血腥穢嘔逆不食者旬餘病人自服內托散膈中不安且素有淋病三十年今所苦者淋之痛與嘔吐不得睡而已急以參芪歸朮煮膏以牛

膝湯入竹瀝飲之三日後盡藥壹斤半淋止思食七日後盡藥四斤膿自涌出而得睡又兼旬而安　一男子年六十餘性好酒肉背疽見膿嘔逆發熱蓋其得內托十宣多矣醫以嘔逆於嘉禾散中加丁香以溫胃行氣時七月大熱脉洪數有力予因謂此脉證在潰瘍尤忌然形氣實只與人參膏和竹瀝飲之盡藥十五斤竹百餘竿而安予曰此病幸安也不薄味必再作仍厚味自若夏月醉後坐水池中又年餘左脇傍生一軟塊如餅二年後軟塊為疽本人見膿血淋漓而脉洪數有力又嘔逆食少遂自以人參膏入竹瀝飲之又十餘斤百餘竿而安今八十歲強健如舊此病兩以老年氣血弱專服人參竹瀝而愈若與內托十宣恐未能若是之安全也　婁全善治一男子腫瘍嘔諸藥不止用獨參湯一服嘔即愈

薛新甫治一人腹癰焮痛煩躁作嘔脉實河間云瘡瘍者火之屬須分內外以治其本若脉沉實者先當疎其內以絕其源又云嘔噦心煩脉沉而實腫硬木閉或皮肉不變邪氣在內宜用內疎黃連湯治之遂用前湯通利二三行諸證悉去更以連翹消毒散而愈　一人患臂毒焮痛作嘔服托裏消毒藥愈甚以

涼膈散二劑頓退更以四物湯加芩連四劑而消
新甫又治一人年踰四十患發背已潰忽嘔而瘡痛
胃脉弦緊彼以爲餘毒內攻東垣云嘔吐無時手足
厥冷臟腑之虛也丹溪云潰後發嘔不食者濕氣侵
於內也又云膿出而反痛此爲虛也今胃脉弦緊木
乘土位其虛明矣欲以六君子湯用酒炒芍藥砂仁
藿香治之彼自服護心散嘔愈甚復邀治仍用前藥
更以補氣血藥兩月而愈大抵濕氣內侵或感穢氣
而作嘔者必喜溫而脉弱熱毒內攻而作嘔者必喜
涼而脉數必須辨認明白

橘半胃苓湯　治癰疽嘔吐不下食不知味

橘紅　半夏薑製各壹錢　蒼术米泔浸炒
白术炒　厚朴薑製　甘草炙
茯苓　人參　澤瀉
茅根各貳錢　薑汁數匙
水貳鍾煎壹鍾入薑汁煎一二沸作十餘次飲之
薛氏曰前證七惡中之五惡也用此方後胃氣將
醒宜用六君子湯兼服之亦有煩躁飲冷不食脉
沉實而嘔者恐不可用此宜內踈黃連湯方見腫瘍
加減托裏消毒散　治瘡瘍欲嘔作嘔或外搽內服

寒凉或痛甚或感寒邪穢氣而嘔皆胃氣虛也去白芷連翹金銀花加參朮藿香方見腫瘍內托條

托裏健中湯　治瘡瘍元氣素虛或因凉藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等證

人參　白朮　茯苓各貳錢
半夏　炮薑各壹錢　炙甘草伍分
黃芪壹錢伍分　肉桂叁分

右薑棗水煎服

托裏益中湯　治中氣虛弱飲食少思或瘡不消散或潰而不斂

人參　白朮　陳皮
半夏　茯苓　炮薑各壹錢
木香　炙甘草各伍分

右薑棗水煎服

托裏抑青湯　治脾土虛弱肝木所侮以致飲食少思或胸膈不利等證

人參　白朮　茯苓
半夏各壹錢　芍藥　柴胡
甘草各伍分　陳皮壹錢

右薑棗水煎服

托裏清中湯　治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參　白术　陳皮
茯苓各壹錢　半夏捌分　桔梗柒分
甘草伍分

右薑棗水煎服

托裏益黃湯　治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或嘔吐泄瀉等證

人參　白术　陳皮
茯苓　半夏各壹錢　炮薑
丁香　炙甘草各伍分

右薑棗水煎服

托裏越鞠湯　治六欝所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參　白术各貳錢　陳皮
半夏各壹錢　山梔　川芎
香附米　蒼术各柒分　炙甘艸伍分

右薑棗水煎服

人參理中湯　治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或胸膈虛痞飲食不入

白术　人參　乾薑

甘草炙各等分　右薑棗水煎服

○痛

夫瘡瘍之證候不同寒熱虛實皆能爲痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳没可以止痛殊不知因病制宜自有活法故因熱而痛者以寒涼之劑折其熱則痛自止也因寒而痛者以温熱之藥熨其寒則痛自除也因風而痛者除其風因濕而痛者除其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者引之陰陽不和者調之經絡滯澁者利之憂愁者遠志酒飲之虛寒而痛者乳香没藥止之大抵癰疽不可不痛不可大痛若大痛悶亂者危　薛新甫云瘡瘍之作由六淫七情所傷其痛也因氣血凝滯所致假如熱毒在内便祕而作痛者内踈黄連湯導之熱毒熾盛焮腫而作痛者黄連解毒散治之不應仙方活命飲解之瘀血凝滯而作痛者乳香定痛散和之作膿而痛者托裏消毒散排之膿脹而痛者針之膿潰而痛者補之若因氣虛而痛四君加歸芪血虛而痛四物加參芪腎虛而痛六味地黄丸口乾作渴小便頻數者加減八味丸此皆止痛之法也

托裏消毒散加減法　若高腫焮痛熱毒也加黃連
漫腫微痛氣虛也去金銀花連翹加參朮　腫赤
作痛血凝滯也加乳香沒藥如不應暫用仙方活
命飲　膿出反痛氣血虛也去金銀花連翹白芷
加參芪歸地　漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也
去三味加人參白朮如不應加薑桂更不應急加
附子
癰疽膿血大泄敗臭痛甚宜用黃芪人參湯
黃芪人參湯
人參　蒼朮米泔浸炒　白朮炒
陳皮　麥門冬去心　當歸酒拌
神麯炒　甘艸炙　五味子杵各壹錢
黃芪炙貳錢　黃蘗炒　升麻各肆分
作一劑水貳鍾薑棗片棗貳枚煎捌分食遠服
〔辟〕按前證七惡中之二惡也宜此方治之亦有潰
後虛而發熱或作痛少寐尤効若痛少止大便不
實黃蘗麥門冬可不用蓋恐寒中也凡瘡膿潰之
後若脉洪大則難治自利者不治
癰疽大痛不止宜用加味解毒湯
加味解毒湯

黃芪鹽水拌炒　黃連炒　黃芩炒

黃檗炒　連翹　當歸酒拌各柒分

甘艸炙　白芍藥　梔子仁炒各壹錢

作一劑水貳鍾煎捌分服之藥下痛即止

按此方若脉洪大按之有力者用此解之其功甚捷亦有便秘脉實而痛者宜用內疎黃連湯下之若潰而反痛者宜用內補黃芪湯補之

內補黃芪湯

黃芪鹽水拌炒貳錢　熟地黃酒拌　人參

茯苓　甘艸炙各伍分　芍藥炒

川芎　官桂　遠志去心炒

當歸酒拌各捌分　麥門冬去心伍分

作一劑水壹鍾半薑叁片棗貳枚煎陸分食遠服

當歸和血散　治瘡瘍未發出內痛不可忍及治婦人產前產後腹痛

當歸貳錢　乳香半錢　沒藥壹錢半

白芍藥叁錢

右為細末每服壹錢水壹中盞煎柒分和滓溫服日二婦人酒煎瘡既發不須用瘡痒者加人參木香婦人服之加赤芍藥

迴瘡金銀花散　治發瘍痛甚色變紫黑者

金銀花連枝葉俱用剉研貳兩　黃芪肆兩

甘草壹兩

右㕮咀用酒壹升同入壺瓶內閉口重湯煮三兩時辰取出去滓頓服之一方無黃芪

郭氏定痛托裏散　治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣充實先用踈利後服此藥

粟殼去蒂炒貳兩　當歸　白芍藥

川芎各半兩　乳香　沒藥

桂各叁錢

右㕮咀每服伍錢水煎

乳香止痛散　治一切瘡腫疼痛不止

粟殼陸兩製　白芷叁兩　甘艸炙

陳皮各壹兩半　乳香　沒藥各壹兩

丁香半兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞半煎

乳香黃芪散　治一切惡瘡癰疽發背疔瘡疼痛不可忍者或未成者速散已成者速潰敗膿不假刀砭其惡肉自下及治打撲傷損筋骨疼痛

黃芪去蘆　當歸酒洗　川芎

麻黃去根節　甘草生用　芍藥
人參去蘆　粟殼各壹兩蜜炒　乳香另研
沒藥各伍錢另研　陳皮壹兩
右爲細末每服叁錢水壹盞煎至柒分去柤温服
如瘡在上食後在下食前服之
人參內托散　治瘡瘍潰膿而作痛者
人參　黃芪　當歸
川芎　厚朴　防風
桔梗　白芷　官桂
紫草　木香　甘艸
右入糯米壹撮水煎服
乳香丸　治發背及一切疽瘡潰爛痛不可忍
乳香別研　沒藥別研　羌活
五靈脂　獨活各叁錢　川芎
當歸　直葉豆粉　交趾桂
川白芷　白膠香各半兩
右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸細嚼薄
荷湯送下手足損痛不能起者加草烏用木瓜鹽
湯送下
乳香定痛散　治一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香　沒藥各伍錢　滑石
寒水石各壹兩　氷片壹錢
右為細末擦患處痛即止　敷藥中加南星半夏
能止痛更加苞麻仁尤佳

豆豉餅　治瘡瘍腫痛硬而不潰及潰而不斂并一
切頑瘡惡瘡用江西豆豉餅為末唾津和作餅子
如錢大厚如叅文置患處以艾壯於餅上灸之乾
則易之如背瘡用漱口水調作餅覆患處以艾鋪
餅上灸之如未成者即消已成者亦殺其大毒如
有不効氣血虛敗也

乳香膏　治諸瘡痛久不瘥
乳香壹兩別研　食鹽　松脂
杏仁去皮尖研各壹兩半　生地黃取汁叅合　白羊腎脂半斤
黃蠟叅兩
右先熬脂令沸下杏仁地黃汁蠟
煎候臘熔盡入香鹽松枝煎以柳箪攪令勻稀稠
得所磁盒盛　瘡上日三度

又乳香膏
木鱉子去殼細剉　當歸各壹兩　柳枝貳捌寸寸剉同以清
油肆兩煎令黑色次用後　乳香　沒藥各半兩
白膠香明淨者肆兩同研細入油煎化用綿子濾之

右煉藥鐵銚令極淨再傾前藥油蠟在內候溫入黃丹壹兩半以兩柳枝攪極得所再上火煎不住手攪候油沸起住攪注在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水中出火毒搜成劑收之

戴院使云有不傳藥時大痛傳即不痛有不傳藥不痛傳之則痛蓋寒熱風濕并憂怒等氣積而內攻則痛不禁藥拔出之故不痛也死血陰毒在中愈伏愈深愈不覺痛藥發之於外故反痛也

○出血

薛瘡瘍出血因五臟之氣虧損虛火動而錯經妄行也當求其經審其因而治之若肝熱而血妄行者四物炒梔丹皮芩术肝虛而不能藏血者六味地黃丸心虛而不能主血者四物炒連丹皮芩术脾虛熱而不能統血者四君炒梔丹皮若脾經鬱結川歸脾湯加五味子脾肺氣虛用補中益氣加五味子氣血俱虛用十全大補陰火動用六味丸加五味子大凡失血過多見煩熱發渴等證勿論其脉急用獨參湯以補氣經云血生於氣苟非參芪歸术甘溫等劑以生心肝之血決不能愈若發熱脉大者不治凡患血症皆當以犀角地黃湯為主　翰林屠漸山年四十患

濕毒瘡疾誤用輕粉之劑虧損元氣久不能愈一日將晡之際診之肝脉怒洪數而有力余曰何肝脉之如此侵晨瘡出黯血三四碗體倦自汗雖甚可畏所喜血黯而脉靜余曰此輕粉之熱血受其毒而妄行輕粉之毒亦得以泄邪氣去而真氣虛也當急用獨參湯主之余重其爲人體恤甚篤但惑於他言不果致邪氣連綿不已惜哉　一人背瘡出血煩躁作渴脉洪大按之如無此血脫發躁用當歸補血湯二劑少愈又以八珍加黃芪山梔數劑全愈　一婦人潰後吐鮮血三椀許余用獨參湯而血止用四君熟地芎歸而瘡愈此血脫補氣陽生陰長之理也若用寒血降火沉陰之劑脾土生氣復傷不惟血不歸源而死無疑矣　一老婦手大指患疔爲人針破出鮮血手背俱腫半體皆痛神思昏憒五日矣用活命飲始知痛在手瘡勢雖惡不宜大攻再用大補劑又各一劑外用隔蒜灸喜此手背赤腫而出毒水又各一劑赤腫漸潰又用托裏藥而痊　南儀部賀朝卿陞山西少參別時余見其唇鼻青黑且時搔背問其故曰有一小瘡耳余與視之果疽也此脾胃敗壞爲不治之證余素與善悲其途次不便殯斂遂托其僚友張

東沙董強留之勉與大補但出紫血虛極也或謂毒熾不能為膿乃服攻毒藥一鍾以致嘔逆脈脫果卒於南都　僉憲張碧崖腰患疽醉而入房脈洪數兩尺更大余辭不治將發舟其子强留頃間吐臭血五六椀余意此腎經虛火而血妄行血必從齒縫出將合肉桂等補腎制火之藥各用礶別煎熟聽用血止拭齒視之果然遂合一鍾冷服之熱渴頓止少頃溫服一鍾脈細欲脫氣息奄奄得藥則脈少復良久仍脫其子疑內有膿欲刺之余曰必無乃以鵝翎管紙內果如余言次日脈脫脚寒至膝腹內如氷急用六君加薑附腹始溫膿始潰瘡口將完彼因侍者皆愛妾又患小便不通此陰已虧而思色以降其精精內敗不出而然耳用加減八味丸料加參芪白术一劑小便雖愈瘡口不斂而沒

東垣聖愈湯　治諸惡瘡血出不止以寒水石細末摻之立止或瘡時間作黑色不可潰也藥力去盡却紅和如血出多而心煩不安不得眠睡此亡血也此湯主之

熟地黃　生地黃各叁錢　當歸身壹錢半　川芎貳錢　黃芪伍分　人參叁分

右㕮咀都作一服水壹盞半煎至壹盞去滓稍熱服無時按此方參芪與歸地輕重懸殊必有訛也

濟生犀角地黃湯　治胃火血熱妄行吐衄或大便下血者

犀角鎊末　生地黃　赤芍藥　牡丹皮各壹錢半　升麻　黃芩炒各壹錢

右水煎熟入犀角末服

若因怒而致加山梔柴胡若脾氣虛而不能攝用歸脾湯若肝脾火動而妄行用加味逍遙散若脾氣虛而不能統用補中益氣湯加炮黑乾薑若血虛有火而妄行用四物加炮薑若腎經虛火而血妄行用六味丸料不應急加肉桂以引虛火歸源

獨參湯　治一切失血或膿水出多血氣俱虛惡寒發熱作渴煩躁蓋血生於氣故血脫補氣陽生陰長之理也用人參貳兩棗拾枚薑拾片水煎徐徐服

托裏消毒散加減法　膿多帶赤血虛也去金銀花連翹白芷三味加歸地參朮如不應暫用八珍湯加牡丹皮　忿怒晡熱而出血肝火血虛也去三味加牡丹皮炒黑山梔熟地如不應暫用八珍湯

送六味丸　面青脇脹而出血肝氣虛而不能藏血也去三味加山茱山藥五味子如不應兼六味丸　食少體倦而出血脾氣虛而不能攝血也去三味加參朮歸地兼鬱怒少寐更加遠志酸棗仁茯神龍眼肉如不應暫用歸脾湯

○瘡僵肉

梅治背瘡肉長疾皮不及裹見風即成殭以寒水石燒研爲細末傅瘡上再用銅綠細末上之肉即不作殭矣

○瘡攣急牽陰入腹

ETH