

雜病篇

寒_下暑濕燥火

東醫寶鑑

卷三
上
下

東醫寶鑑雜病篇卷之三上

東醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也。熱傷寒汗不解，脈沉者，蒼朮白虎湯主之。吐汗下後口乾舌

燥，脈洪，大人參白虎湯主之。凡得病五六日

而渴欲飲水不能多者，不當與之。何者以腹中熱

尚少不能消故也。至七八日大渴欲飲水，惟當少

與之，常令不足，勿極意也。言能飲一斗，只與五升

若腹滿小便不利，若喘若噦者，不可與之。若小渴

咽乾者，少少嚥潤之，令胃氣和則愈。熱。渴欲飲

水，水入即吐，名曰水逆。五苓散主之。厥陰病

渴欲飲水者，少少與之，愈。人。熱在表則不渴，熱

入裏則渴耗奪津液而然也然有渴必有煩者腎
主水熱深則水竭而渴肝木挾心火以生煩故厥
陰六七日飲水少而小便少者謂之消渴渴欲水
爲欲愈者傳經已盡也脉浮而渴屬太陽宜白虎
湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬
少陰宜猪苓湯凡渴欲飲水常令不足爲善
經云若還不飲非其治強飲須教別病生鬻。渴
欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒也翀。渴
陰盛隔陽之症口燥渴而漱水不
嚥蓄血之證亦漱水不欲嚥凡

五苓散

治太陽證內裏煩渴而小便不利澤瀉二錢
半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分右

爲末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服。傷
寒汗後亡津但渴欲飲水者邪在裡也然上焦虛
躁或飲水不散而反吐出爲水逆證或水雖多而
小便不利者皆裡熱未實不能消水故耳五苓散

的藥也

竹葉石膏湯

治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渴并差後虛煩等證石膏四兩人參二錢

麥門冬一錢半夏一錢甘草七分右剉作一貼入

竹葉七片粳米百粒水煎入姜汁二匙服

傷寒潮熱

潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日發指時而發者謂之潮熱若日三五發

者是謂發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者乃爲潮熱也陽明之爲病胃家熱也胃實則

譫語。潮熱者似潮水之有信一日一發謂之

潮必日晡而作陽明旺於未中故耳諸承氣湯選

用下或潮於寅卯者屬少陽或於巳午者屬太陽

爲邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之。吐下後

不大便潮熱若劇則不識人循衣摸

床微喘直視脉弦者生脉濇者死

傷寒發狂

發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌乘衣

而走踰垣上屋不食不臥非大吐下不止表裏俱

熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂

言譫語宜辰砂五苓散呶。如狂者但睡中忽起

行錯言妄語非若發狂莫能制也呶。陽毒發狂

宜陽毒升麻湯陽毒梔子湯。發狂宜用妙

香丸炒觀三白飲活龍散破棺湯水漬法火劫法

。喜忘如狂蓄血證也。凡發狂見陽證

陽脉者順見陰證陰脉舌捲囊縮者死

三白飲

治傷寒熱病熱極狂走雞子青一箇白蜜一大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

活龍散

治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗研取汁入姜汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和

徐徐灌盡漸次涼快若熱熾則

加片腦尤妙名曰地龍水

破棺湯

治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事人屎乾者燒存性水漬飲汁一二盞卽甦或

細研如麩新汲水調下三

錢亦可俗名野人乾水靛

水漬法

見上陽毒下

火劫法

治發狂炭火一盆置病人之前將醋一碗急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

黃水喫面亦可

傷寒譫語鄭聲

實則譫語虛則鄭聲譫語者爲亂語無次第數數更端也鄭聲者爲鄭重

頻煩也只將一句舊言重疊頻言之也。陽明病胃實則譫語。大小便利手足冷脉微細者必鄭聲宜用白通湯大便和小便赤手足溫脉洪數者必譫語宜用調胃承氣湯。譫語有實有

虛實則可下虛不可爲實者胃實有燥屎可下之
虛者腸胃自利也難治。傷寒大熱呻吟錯語
不得眠黃連解毒湯主之。晝則明了夜則譫語
如見鬼乃婦人熱入血室證也。傷寒發熱譫

語宜柴胡
連翹湯

黃連解毒湯

治傷寒大熱煩燥不得眠或差後飲酒
復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔

子各一錢二分半右
剉作一貼水煎服

柴胡連翹湯

治傷寒發熱譫語呻吟睡臥不得柴胡
黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蒌仁梔子仁

連翹黃連黃柏甘草各八分右
剉作一貼入姜三片水煎服

傷寒結胸

傷寒若脈浮緊下之必結胸。病發於
陽而反下之熱入因作結胸。傷寒素

未解醫反下之隔內拒痛手不可近一云心下滿而硬痛此爲結胃宜大陷胃湯神。若按心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實脉沉實有力爲大結胃急以大陷胃湯加枳殼桔梗下之反加煩燥者死醫。小結胃者正在心下按之則痛脉浮滑宜小陷胃湯醫。寒實結胃無熱證者宜三物白散小陷胃湯醫。熱實結胃及寒熱結胃活人書不拘寒熱但用陷胃湯不差用枳實理中丸應手而愈綱。但結胃無大熱者此爲水結在胃脇但頭汗出名曰水結胃小半夏湯加茯苓主之飭。熱實結胃宜用大陷胃丸綱結胃宜用灸法熨法未經下而胃滿非結胃也只以小柴胡合小陷胃加枳殼桔梗

一服如神醫

大陷胃湯

治大結胃大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分右剉分二貼每取一貼先煎大黃至六

分納硝再煎一二沸去滓納甘遂末攪服得快利止後服𩇛

小陷胃湯

治小結胃半夏製五錢黃連二錢半夏大者四分之一右剉作一貼水二盞先煎

瓜萋至一盞乃入分半夏黃連煎至半去滓溫服未利再服利下黃涎便安𩇛。一方加枳實黃芩桔梗尤效𩇛。瓜萋惟剉其殼勿剉其子剉其子者非也𩇛

三物白散

治寒實結胃桔梗貝母各三錢巴豆去皮心熬研如脂二錢右爲末和物白湯和服

半錢弱人減半或吐或利不利進熱粥一碗利不止進冷粥一碗𩇛

大陷胃湯

治熱實結胃大黃五錢葶藶子炒杏仁炒各三錢芒硝二錢半甘遂二錢右爲末蜜

丸彈子大每大丸水一盞煎六分溫服未利再服𩇛

灸法

詳見
胃部

熨法

詳見
胃部

傷寒藏結

病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胃也何為藏結答曰如

結胃狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈細小沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治。病人胃中素有痞連在臍傍引入小腹入陰筋者此名藏結死。歌曰飲食如常時下利更加舌上白胎時連臍痛引陰筋者藏結元來死不醫。狀如結胃飲食如故時時下利而舌上白胎。病時素有痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡加生姜以和表。灸關元以回陽解陰結危哉。藏結與結胃相似皆下後邪氣入裏與陽相結結在胃者為結

胃與陰相結結在藏者爲藏結惟其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或單寒不熱其人反靜飲食

如常時時下利舌上白胎脇助臍腹引入陰筋俱痛者丹田有熱胃中有寒所以難治

傷寒痞氣

病發於陰而反下之因作痞。傷寒嘔而發熱者若心下滿而不痛此爲痞半夏瀉心

湯主之胃虛氣逆者亦主之。心下痞硬按之

濡其脉關上浮者三黃瀉心湯主之凡結胃與痞

關脉須沉若關脉浮者宜此湯。心下痞而復

惡寒汗出者附子瀉心湯主之。後下利日數

十行穀不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃結

熱乃胃中虛客氣上逆故也甘草瀉心湯主之

。汗解後胃不和心下痞硬脇下有水氣腹中雷

鳴下利者生姜瀉心湯主之。太陽病外證未

除而數下之遂下利不止心下痞硬表裏不解桂

枝人參湯主之。痞氣通用桔梗枳殼湯

半夏瀉心湯

半夏製二錢黃芩人參甘草各一錢半乾姜一錢黃連五分右剉作一貼入姜

三片棗二枚

水煎服影

三黃瀉心湯

大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分

溫再

服影

附子瀉心湯

大黃黃連黃芩各二錢剉附子炮一錢別煮作汁右取白沸湯一盞入二味漬

之良久去滓納附

子汁分溫再服影

甘草瀉心湯

甘草二錢黃芩干姜各一錢半半夏製人參各一錢黃連五分右剉作一貼入

大棗三枚

水煎服影

生薑瀉心湯

生薑半夏各二錢人參干姜各一錢半黃連甘草各一錢黃芩五分右剉作一

貼入棗三枚

水煎服

桂枝人參湯

桂枝另剉甘草炙各一錢八分白朮人參干姜各一錢半右剉作一貼水二盞

煎至一盞入桂枝煮取

七分去滓溫服日二劑

傷寒筋惕肉瞤

動氣在左而發汗則筋惕肉瞤。傷寒筋惕身瞤發汗太過所致也古人以

真武湯主之然真武湯能止其汗而不能定其瞤瞤者動也蓋汗多則傷血血虛無以榮筋筋愈急而四體百骸俱爲之瞤動宜以四物湯去地黃加人參半夏茯苓甘草作劑以五靈脂爲佐入生姜烏梅煎服自有神效此專主生血生血乃所以收汗也

傷寒除中證

厥而下利反能食者曰除中不治。○厥而利反能食曰除中其死也可立待之。○厥

○邪在表則能食也邪在裏則不能食今傷寒厥深下利脉遲當不能食而反能食者名曰除中中之胃氣既除豈可再服。○厥利當不能食今反能食恐為除中試食以索餅發熱者除中也不發熱者非除中知胃氣尚在必愈也。○

傷寒血證

大陽病六七日表證因在脉微而沉反不結胃其人如狂者以熱在下焦小腹當滿小便

自利者下血乃愈抵當湯主之。○太陽證身黃發狂小腹硬滿自利者血證諦也宜抵當湯。○傷寒小腹滿應小便不利今反利者為血也當下之宜抵當丸。○太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者自愈但小腹急結者宜攻之宜桃仁承氣湯。○勿忌發汗者為無脉或脉微故也。

若脉浮緊身疼惡寒發熱則汗之可也宜麻黃湯
桂枝湯助吐○若脉微不可汗則犀角地黃湯主
之防餽門○少陰病強發汗血出九竅是名下
厥上竭不治神○太陽病脉浮緊發熱無汗而
者自愈也神○傷寒頭痛發熱口乾口鼻血出午
後昏沉耳聾脇痛俗名下血汗病也犀角地黃湯
合小柴胡湯主之醫

抵當湯

治一切瘀血結胃譫語漱水等證水蛭炒虫
炒去足翅桃仁雷尖各十枚大黃蒸三錢

右剉作一貼

水煎服臥

抵當丸

治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證
但小腹滿而尿利者宜用此緩以下之水蛭

蠶虫各七個桃仁六箇大黃三錢右爲末蜜和分
作二丸水一盞煎一丸至七分頓服未效再服胡

桃仁承氣湯

治血結膀胱小腹結急便黑譫語漱水宜此攻之大黃三錢桂心芒硝各二錢

甘草二錢桃仁畱尖十枚右剉作一貼水煎入芒硝溫服以瘀血盡下為度

傷寒自利

傷寒陰證身痛脈沉大便自利或嘔或咳宜玄武湯坊見○傷寒陽証身熱脈數煩渴引

飲大便利宜柴苓湯研○益元散

佳勅覲○太陰證自利宜理中湯研

柴苓湯

治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉一錢三分白朮猪苓赤茯苓各七分半半夏

七分黃芩人參甘草各六分桂心三分

右剉作一貼入姜三片水煎溫服

傷寒胃腹痛

傷寒腹痛中腕痛太陰也臍腹痛少陰也小腹痛厥陰也

○心胃硬痛手不可近為結胃若未經下者非結胃也乃邪氣填塞胃中

只以小柴胡加枳梗治之如未效小柴胡合小陷

胃加枳桔一服如神鬻○若心脹滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔鬻○若小腹硬小便利則爲蓄血之證桃仁承氣湯下之若小便不利則爲尿澁之證五苓散利之若小腹遶臍硬痛小便澀大便秘實者有燥屎也大承氣湯下之鬻

傷寒吐蛔

傷寒有吐蛔者雖有大熱忌下涼藥犯之必死蓋胃中有寒則蛔不安其所而上隔大齒

之兆也急用理中湯坊見○加烏梅二箇紅椒十粒煎服待蛔定却以小柴胡湯退熱鬻○傷寒吐蛔者手足冷胃虛空也鬻

陰陽交證

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食病名爲何岐伯曰病

名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨

肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且無熱論曰汗出而脉尚躁盛者死狂言者是失志失志者死。發汗後脉躁疾狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣不可分別此死證也。

壞證

傷寒病未退重感寒變爲溫虐重感風寒爲風溫再感濕熱變爲溫毒重感疫氣變爲瘟疫又太陽病經汗吐下溫鍼不解及過經不解皆名壞證或醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久而不差視其犯何逆以治之表證多知母麻黃湯半表者小柴胡湯餘熱不解者參胡芍藥湯危急者奪命散諸藥不效者鱉甲散

知母麻黃湯

治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守
言語錯謬或潮熱頰赤寒熱如瘧皆由

汗下不盡毒留心胞間所致也知母三錢麻黃赤芍藥黃芩桂心甘草炙各一錢右剉作一貼水煎

服微汗即愈服一
本桂心代桂枝服一

參胡芍藥湯

治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩不能安臥不思飲食大便不快小便黃

赤此為壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩知母麥門冬各一錢枳殼八分甘草三分右剉作

一貼入姜三片水煎服服一

奪命散

治傷寒壞證昏沉垂死或陰陽二證不明過經不解及或因誤服藥困重垂死一切危急

之證好人參一兩剉作一服水二升於銀石器內煎至一升去滓以新水沉冷一服而盡汗自鼻榮

上出涓涓如水是藥之效也一名獨參湯研

驚甲散

治壞證諸藥不效驚甲二錢犀角前胡黃芩生地黃各一錢枳殼八分烏梅二箇右剉作

一貼水煎服

百合證

大病後未平復失於調理餘證在陽醫反下之

無復經絡故謂之百合傷寒其證常點點然欲食不能食欲臥不能臥欲行不能行或有聞食臭或時如寒無寒如熱無熱只苦小便赤諸藥不能治藥入口即吐利如有神靈身形雖似和其脉微數每尿時輒頭痛者六十日乃愈若尿時頭不痛漸然者四十日愈若尿時快然但頭眩者二十日愈宜用桃氏柴胡百合湯百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯百合滑石散百

合洗方翮。百合者百脉合病也。治以百合爲主者以其能和合百脉也。賦。

陶氏柴胡百合湯

治百合病及勞復等證。鱉甲醋煮二錢。柴胡百合知母生地黃陳皮。

人參黃芩甘草各一錢。右剉作一貼。入姜三片。棗二枚。水煎服。賦。

百合知母湯

治汗後百合證。百合七枚。知母一兩。右先將百合水浸一宿。當白沫出去其水。

更以井水二盞煎至一盞。去滓。又將井水二盞另煎知母。取一盞。去滓。二汁和勻。同煎。取一盞。半分。

溫再服。

百合滑石代赭湯

治下後百合證。百合七枚。滑石三兩。代赭石一兩。右煎如上法。服。賦。

百合雞子湯

治吐後百合病。百合七枚。雞子黃一箇。右先將百合水浸一宿。當白沫出去其

水更以井水二升煎取一盞
去渣納雞子黃攪勻溫服神

百合地黃湯

治不經汗吐下百合證百合七枚生地黃汁一升右先煎百合如上法乃納地

黃汁煎取一升五分

二服大便出如漆黑神

百合滑石散

治百合病變寒熱者百合一兩滑石三兩右爲末每三錢白湯下日三服神

百合洗方

治百合病一月不差變成渴者百合一升水一升漬一宿洗一身口宜淡食神

過經不解

傷寒六日傳經一遍七日當解而再傳至於十三日以上不愈謂之故經不解由汗下失

宜邪氣留連故也或從輕再汗再下宜參胡芍藥湯小柴胡湯調之神。見餘熱不退皆宜小柴胡

湯主之神

勞復食復證

勞者動也動非一種有內外血氣之異若見外證則爲復病非爲勞也如再感風寒

是以復者其病如初也傷寒新差津液未復血氣尚虛或梳洗言動太早或思爲太過則成勞復蓋勞則生熱熱氣承虛還入經絡未免再服謂之勞復宜小柴胡湯麥門冬湯和之熱氣浮者梔鼓枳實鼠屎豉湯。食復者傷寒新差胃氣尚弱若恣食飲不能尅化依前發熱若用補藥則胃熱益增治須清熱消食輕者胃中微滿損穀自愈重者必須吐下宜梔鼓枳黃湯胃痞者生姜瀉心湯。見飲酒復劇者宜黃連解毒湯方。凡食復宜七味葱白散勞復虛者益氣養神湯。凡復證先病七日出汗兩解今復舉亦必七日而解先病十四日出汗而解今復舉亦必十四日而解雖三四次復舉亦必三四次戰汗而解但勞復證久不愈恐成勞瘵。

麥門冬湯

治勞復氣欲絕能起死回生麥門冬二錢甘草炙三錢粳米一合右水二盞先煎粳

米令熟去米入二藥及棗二枚青竹葉十片煎至一盞溫服加人參尤妙

梔豉枳實湯

治勞復發熱梔子枳實各二錢香豉五錢右剉水煎服微汗之差

鼠屎豉湯

治同上梔子七箇雄鼠屎七枚枳殼一枚炒右剉水一盞半入葱白二寸香豉二十

粒同煎至一盞分二服勿令病人知

梔豉枳黃湯

治食復發熱梔子枳殼柴胡各一錢香豉五錢大黃三錢右剉水煎服腹脹加

厚朴傷肉加山渣傷麪飯加神曲

七味葱白湯

治勞復食復葱白連根三莖乾葛麥門冬熟地黃各三錢香豉半合生姜切一

合右剉以甘爛水四升煎之
三分去二分去滓分服

人活

益氣養神湯

治勞復宜養氣血人參當歸白芍藥酒炒麥門冬知母梔子炒各一錢白茯苓

前胡各七分陳皮五分升麻生甘草各三分右剉作一貼入棗二枚水煎服翻

傷寒遺證

帝曰熱病以愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食者故有所二也帝曰治遺

奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也內。遺為遺熱內經註曰如胃之在人也所為遺者大小便不禁也常見病差後善飲食而大小便不禁故知之恬。當與食復參看

陰陽易證

傷寒病新差陰陽未和因入房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏結腰勝連腹內二名

爲陰陽易也其男子病新差婦人與之交得病名曰陰易
日陽易婦人病新差男子與之交得病名曰陰易
若二男二女並不相易所以呼爲易者以陰陽相
感動其毒着於人如換易然其病之狀身熱衝胃
頭重不能舉眼中生火四肢拘急小腹絞痛手足
拳卽死者病若小腹裏急熱上衝胸頭重不能舉
百節皆上經脉緩若血氣虛骨髓干便恍恍翁翁
氣力專少着床不能動搖起止須人或牽引歲月
方死焮陰陽宜燒裋散赤衣散猥鼠糞湯青竹茹
湯竹皮湯干姜湯囊縮痛氣欲絕宜竹皮逍遙散
呶女勞復者不因易而自病復也治亦相同但多
增寒發熱虛弱者人參逍遙散呶陰陽易病見舌
吐出者必死 ○顧子獻病傷寒新差華佗診脉
曰尙虛未服陽氣不足勿爲勞事餘勞尙可女勞
卽死死當吐舌數寸其妻聞病差從百里來省之
住數宿果爲勞事遂吐舌數寸而死焮 ○有婦人

病傷寒賊來不能走其賊六七日入姦之皆得婦人病而死此陰陽易也

燒裨散

治陰陽易取近陰處裙襠一片方圓四五寸燒存性溫水調服一錢日三小便卽利陰頭

微腫卽愈男女互用之呶○又方人手足指

爪甲二十片燒灰末米飲調下其効亦同呶

赤衣散

治陰陽易最効取室女月經布近陰處燒存性末米飲調下呶

猴鼠糞湯

治男子陰易病韭白根一把猴鼠屎十四箇右以水二升煮取半升去滓溫服取微

汗未汗再服猴鼠雄鼠

也糞兩頭尖者是也鱗

青竹茹湯

治勞復乃陰陽病瓜蒌根五錢青竹茹二錢右剉作一貼水煎服呶○一名瓜竹湯

治法
服法

竹皮湯

治陰陽易及勞復病刮取青竹皮一升水三升煎取一升分二服○一名竹茹湯

乾薑湯

治陰陽易病速當汗之滿四日不可療干姜三錢剉水煎服得汗出手足伸即愈得效○

一方干姜爲末一兩溫湯

調服覆衣取汗得解

竹皮逍遙散

治勞復及易病青竹皮剉臛入生地黃人參知母黃連滑石萆白柴胡犀角甘

草各一錢右剉作一貼入姜三片棗二枚煎臨服入燒裋襠末一錢半調服微汗之未汗再服

人參逍遙散

治女勞復虛弱者人參當歸各二錢柴胡一錢半白朮白芍藥白茯苓各一錢

右剉作一貼

水煎服

熱入血室證

婦人傷寒與男子無異惟熱入血室及妊娠傷寒則不同也

室卽衝脉血海也婦人傷寒發熱經水適來適斷
晝則明了夜則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無
犯胃氣及上二焦必自愈活人書云小柴胡湯加
生地黃主之犯胃氣謂下之犯上二焦爲發汗也
辨○婦人傷寒寒熱如虐晝寧夜躁如見鬼狀此
爲熱入血室不實滿者小柴胡湯加牡丹皮大實
滿者桃仁承氣湯主之蠅○熱入血室其血必結
而不行小柴胡湯加牡丹皮桃仁或小柴胡合四
物湯主之牛黃膏亦主之方門婦人傷寒發
熱經水適來經行盡則熱隨血散不治自愈始熱
除而脉遲身涼胃脇下滿按之痛者謂之血結胃
當刺期門穴各隨其實而瀉之宜服桂枝紅花湯

門

血結胃

或問熱入血室何爲而成結胃也予曰邪氣
傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水

適來適斷邪氣乘虛而入血室血爲邪迫上入肝
經肝受邪則謔語而見鬼復人臆中則血結于胃
也何以言之婦人平居水當養于水血當養于肝
方未受孕則下行之以爲月水既妊則中畜之以
養胎及已產則上壅之以爲乳汁皆此血也今邪
氣蓄血併歸肝經聚于臆中結于乳下故手觸之
則痛非湯劑可及故當刺期門也軼

桂枝紅花湯

治熱入血室及血結曾桂枝芍藥甘草
各一錢半紅花一錢右剉作一貼入姜

四片棗二枚水煎
服汗出而解

傷寒無脉爲欲汗

傷寒兩手無脉曰雙伏一手無脉曰單服。若病人寒熱而厥面色不澤

昏昧兩手忽無脉或一手無脉者必是有正汗也
如天之欲雨六合昏昧多用綿衣裹手足令溫煖

急服五味子湯時必有大汗而解矣。傷寒病六七日來別無刑尅證忽昏迷不省靜或無此欲作正汗如久旱將雨之兆喘促無脉者加味生脉散陰躁無脉者迴陽反本湯下利脉不至白通加猪膽汁湯。坊。脉結者炙甘草湯。勸。寒熱鬱閉者兩手俱無脉亦是好汗相通汗出自愈宜麻黃附子細辛湯。現。加人參五味子以汗出脉續出則生服藥而仍前無汗脉不至者死。臥。

五味子湯

治傷寒喘促脉伏而厥五味子二錢人參麥門冬杏仁陳皮各二錢右剉作一貼入

姜五片棗二枚水煎服

一名加味生脉散

人

差後昏沉

傷寒差後或十數日或二十日終不惺惺常昏沉似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作

鬼崇或作風疾多般治不差或朝夕潮熱往來頰赤或有寒熱似虐都是發汗不盡餘毒在心胞間

所致知母麻黃湯主之。方觀劉陶氏導赤各半湯極妙。凡傷寒後無寒熱，襍證但漸變神昏不語，或睡中獨語一二句，目赤唇焦，舌乾不飲，水稀粥與之，則燕不與，則不思，心下無痞，腹中不滿，大小便如常，形貌如醉人，此熱傳于少陰心經也。心火熏肺，所以神昏，名曰越經證，宜陶氏導赤各半湯。凡陶氏導赤各半湯，治差後昏沉，黃芩黃連梔子知母錢甘草五分，右剉作一貼，入薑一片，棗二枚，燈心一握，煎入生芩汁三匙服。凡一名瀉心導赤散。

餘熱不退

傷寒餘熱不退，通宜用小柴胡湯調之。尿赤澁者，柴苓湯。凡吐汗下三法之後，別無

異證者，涼膈散。凡方規。凡發熱之後，熱不解，脈辰砂益元散最妙。凡方規。凡發熱之後，熱不解，脈

尚浮者白虎湯加蒼朮再解之坊見傷寒後虛熱
不已白虎湯加蒼朮人參一服如神汗止身涼此
通神之法也如此則汗下後熱不退不問有汗無
汗均宜白虎加蒼朮人參解之最妙。傷寒後
六經餘熱不退宜加
減涼膈散方觀歎門

狐惑證

虫證也如狐聽水猶豫不決之義其候四肢沉
默默欲眠目不得閉惡聞食臭舌白齒晦面目

乍赤乍白乍黑變異無常此因大病後腸胃空虛
三虫求食食人五臟蝕食其喉則爲惑其聲啞蝕
其肚則爲狐其咽乾殺人甚急當看上唇有瘡虫
蝕其藏下唇有瘡虫蝕其肛蝕上部者三黃瀉心
湯主之坊見蝕下部者苦參湯熏洗之蝕肛門者
生艾汁調雄黃末燒烟熏之通用黃連犀角湯治

或桃仁湯雄
黃銳散賦

黃連犀角湯

治狐惑黃連犀角烏梅木香桃仁各一錢右剉作一貼水煎服空心翻

治惑桃仁湯

治同上桃仁槐子碎艾葉各二錢右剉作一貼姜三片棗二枚水煎空心服

雄黃銳散

治下部惑瘡雄黃青箱子苦參黃連各二錢桃仁一錢右爲末以生艾汁和如棗核

大綿裹納

下部

傷寒差後雜

傷寒差後虛煩不得眠宜酸棗仁湯烏梅湯。差後不食宜參苓白朮散凝神散

見所離。差後有熱狂言宜辰砂五苓散辰砂益元散。差後虛煩欲吐宜竹葉石膏湯。方規吐

酸棗仁湯

治傷寒後虛煩不得眠酸棗仁炒二錢麥門冬知母各一錢半茯苓川芎各一錢干

姜甘草炙各二分半右剉作一服水煎服

烏梅湯

治傷寒後虛煩不得眠心中懊懣柴胡二錢
梔子炒黃芩甘草炙各一錢烏梅肉二個右

剉作一貼入薑三片

豉五十粒同煎服

辰砂五苓散

治傷寒發熱狂言譫語及差後熱不退
虛煩等證澤瀉赤茯苓猪苓白朮各二

錢半肉桂辰砂各五分右

細末每二錢沸湯調服

辰砂益元散

治傷寒熱不退狂言譫語滑石六兩甘
草辰砂各一兩右細末每二錢井水調

下日
三服

傷寒治法

張仲景傷寒論載三百九十七法一百一十
三方惜乎其書一變于王叔和之撰次再變

于成無己之詮註傳之愈久而愈失其真也
帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰

已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已。陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之則愈下之則死此陰陽指表裏而言之也。桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡。辨。傷寒五法者汗吐下溫解也各有不同汗有大汗發表微汗解肌之異下有急下少與微和參而已。汗吐下三法毫釐不可差誤在表宜汗在裏宜下在胸宜吐在半表半裏宜和解表裏俱見隨證滲泄。傷寒之病太陽屬膀胱非發汗則不愈必用麻黃之類蓋其性能通陽氣却外寒也。陽明屬胃非通泄則不愈須用大黃芒硝以利之。少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗佐以黃芩則能解矣。太陽屬脾性惡寒濕非干姜白朮則不能燥少陰屬腎性畏寒燥非附子不能溫厥陰屬肝藏血養筋非溫中之藥不能潤。太陽陽明大承氣少陽陽明小承氣正陽陽明調胃承氣

是三陽已入于臟者泄之也太陽桂枝湯少陽麻
黃附子細辛湯厥陰當歸四逆湯是三陽未入于
臟者汗之也越。傷寒三日可汗三日後可下
此大略言之耳凡病人有虛實邪氣有淺深豈可
拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脈浮者
猶宜發汗日數雖少有裡證而脈沉者即宜下之
此活法也。九味姜活湯發三時之表。六
神通解散理晚發之邪香蘇散六神湯參蘇飲發
表調中葛梗湯解肌湯小柴胡和解半表大柴胡
三承氣攻熱邪傳裏理中湯四逆湯散寒中陰經
柴胡湯益元散治泄瀉身熱。傷寒
宜用湯以盪滌邪熱不宜用丸藥也。軼

傷寒欲解

傷寒三日脈數而微身溫和者此為欲解也
脈浮而解者濺然汗出也脈浮而解者必能

食也脈不浮而解必大汗出也。六七日脈至
皆大煩而口噤不能言躁擾者必欲解也。必

當先煩乃有汗而解何以知之脉浮故知汗出解也。○若浮平和其人大煩日重臉內際黃者皆欲解也。○脉浮數而微身溫和者欲解也。○凡病反能飲水者爲欲愈。○問曰脉病欲知愈未愈何以別之答曰寸口關上天中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不調者此熱爲陰陽和平雖劇當愈。○問曰病有戰而汗出因得解者何也答曰脉浮而緊按之反芤此爲本虛當故戰而汗出也其人本虛是以發戰也若浮而數按之不芤此人本不虛弱但出汗不發戰也。○問曰有不戰不汗出而解者何也答曰其脉自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液待陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也。○太陽病無汗而衄者自愈。○問曰凡病何時得何時愈答曰日中得病夜半愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者以陰得陽則解也。○太陽知可解

者爲頭不痛項不强肢節不痛則知表易解也陽明證知可解者爲無發熱惡熱則知裏易解也少陽知可解者寒熱發亂作失其早晚知可解也

傷寒可吐證

傷寒三四日邪氣未傳裡瓜蒂散吐之○六七日胸煩懊懷梔子湯吐之○

可汗不可汗證

傷寒寸口脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節

煩痛當發其汗○傷寒前三日法當汗可用雙解散連進數服必愈○

宜桂枝湯○內經曰體若燔炭汗出而解○

服藥而不得汗當用蒸法陶氏再造散主之○

太陽證非頭痛項强不可發汗○非身熱惡寒不

可汗○非脉浮不可汗○脉微弱或尺脉遲者不

可汗○衄血不可汗汗出則必額上陷脉急緊直

視不能瞬不得眠○諸亡血不可汗汗出則寒慄

視不能瞬不得眠○諸亡血不可汗汗出則寒慄

而振○風溫濕溫並不可汗○虛煩不可汗○臍間左右上下有動氣不可汗○太陽病者咽乾鼻衄小便淋並不可汗○咽喉乾躁者不可汗婦人經來不可汗○當汗不汗則生黃當利小便而不利則亦生黃不當汗而汗則爲蓄血當汗而過多則爲亡陽燔

發汗法

凡發汗欲令手足皆周至熱熱然一時間許益佳不可令如水淋漓耳若病不鮮當重發

汗汗多則亡陽亡陽不得重發汗也○凡發汗腰以上則如常覆之腰以下則厚衣覆之腰以上雖淋漓而腰以下至足微潤則病終不解燔○凡發汗服湯其方雖言曰一二服若病劇不解當促其服可半日間盡一二服連服三劑乃解若汗不出者死病也○凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之周遍爲度若未汗可作熱粥投之粥內加葱白甚妙○凡服藥發汗中病卽止不必盡

劑恐汗太過作亡陽證也吐下亦如之

亡陽證

凡發汗過多泄不止名曰亡陽溫經益元湯主之有陽虛服藥而不得汗名亡陽陶氏再

造散主之兼用蒸法詳觀○太陽證惡寒脉當浮

而緊今反脉浮而遲遲爲亡陽不能作汗其身必

痒桂麻各半湯

主之防規吐

腎氣不足難得汗

大陽病脉淨緊身疼痛宜以汗解之假令尺脉遲者不可發汗何以

知之以榮血不足血少故也小建中湯觀虛加黃

芪服之尺脉有力乃服汗藥纏○一人患傷寒發

汗多驚悸目眩身戰孫曰太陽病經得汗早因太

陽經欲解復作汗腎氣不足故汗不來所以心悸

目眩身戰遂作真武湯三服微汗而解蓋附子白

朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽

惟能乾涸血液爾。○云尺脉遲者榮血不足，不可以汗。以此知腎氣怯而難得汗也。○

促汗夭壽

凡傷寒發汗，須顧其表裡虛實，待其時日。若不循次第，則暫時得安，虧損五臟，以促

壽限，何足貴哉！昔南朝范雲爲陳武帝屬官，適得傷寒，恐不得預九錫之慶，召徐文伯懇求促汗。文伯曰：「便差甚易，只恐二年不復起耳。」雲曰：「朝聞道夕死，可已何待？」二年遂以火燒地鋪桃葉設席，置雲於其上，須臾大汗撲以溫粉，翌日便愈。雲甚喜，文伯曰：「不足喜也。」後二年果卒。○

溫經益元湯

治發汗過多，衛虛亡陽，以致頭眩身慄，筋惕肉瞶，熟地黃、人參、白朮、黃芪、蜜炒。

白芍藥、當歸、生乾地黃、白茯苓、陳皮、甘草、炙各一錢，桂皮、附子、炮各五分。右剉作一貼，入姜三片，棗

二枚，糯米一

撮，水煎服。○

陶氏再造散

治陽虛不得汗名曰亡陽證人參黃芪桂枝附子炮細辛羌活防風川芎甘草

炙各一錢右剉作一貼入煨姜三片棗二枚煎至半入炒芍藥一錢再煎二三沸溫服

可下不可下證

出乃胃乾燥結聚潮熱大便硬小便如

常腹滿而喘或譫語脉沉而滑者裡證也裡證內熱是也內熱屬陽明宜下。大小調胃三承氣必須脉浮頭痛惡風惡寒表證盡罷而反發熱發熱譫語不大便方可用之若脉浮緊下之必結胸若脉緩下之必痞氣難。傷寒後三日法當下平和之藥小柴胡涼膈天水蠶抗合而服之。暄。未退又以大柴胡合承氣下之兩除表裡之熱。○凡轉下之藥與裡證藥參考選用。○脉浮不可下。○脉虛不可下。○惡寒不可下。○嘔吐不可下。○不轉天氣者不可下。○小便清不可下。○非

陽明本病不可下。○非痞滿燥實不可下。
○非脉沉實不可下。○非發狂不可下。
○非發狂不可下。

急下兩證

少陰主腎繫舌本熱氣入臟留於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴宜急

下之非若陽明宜下而可緩也雖然陽明一證發

熱汗多宜急下之以胃汁乾故也
△少陽證口

燥咽乾謂之腎汁乾宜急下之陽明證

發熱汗多謂之胃汁乾亦急下之

脉不鼓繫不可下

一少年傷寒目赤煩渴脉七八至醫欲用承氣湯下之東垣偶來診

之大駭曰幾殺此兒彼以脉數爲熱今脉上至是

極熱也殊不知內經云病有脉從而病反者何也

岐伯曰脉至而從按之不鼓諸陽皆然此陰盛隔

陽於外非熱也取姜附來吾以熱因寒用之法治

之藥未就而病者爪甲已青

遂頓服入兩汗漸出而愈

下後熱不退宜再下

下後熱不退再三下之熱愈盛脉微氣虛力弱不加以法則無

可生之理若輟而不下則邪熱極盛陰氣極衰脉息斷絕必不可救如此之證是下之亦死不下亦死醫者到此殺人活人一彈指間耳。經云三下而熱不退者死後人有三四次加至十數行而生者此乃偶然誤中耳後學切不可以爲法但用解毒湯合涼膈散調之庶不失人命。○汗下後熱不退問有汗無汗宜白虎湯加人參蒼朮解之妙

陰耗陽竭證

裡熱內盛陽厥極甚皆因失下而成此證以致身冷脉微昏憒將死殊不知此

證乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥極甚爲之竭但進涼膈解毒合以服之以養陰退陽脉氣漸生得大汗而愈若未愈解毒合承氣下之次以解毒涼膈天水合而爲一洗滌臟腑則自愈矣。○

可和不可和證

傷寒熱邪半在表半在裡宜小柴胡湯和之婦人口苦咽乾目眩耳聾胃脇滿

或往來寒熱而嘔屬少陽忌吐下宜小柴胡湯和

之翮○小柴胡湯一名和解散若加黑豆一撮煎

名曰火邪湯臥△病者半在表半在裡法當和解

小柴胡合涼膈散妨隗主之嗣○非往來寒熱不

可和△非脇筋急痛不可和

△非胃滿而嘔不可和婁

傷寒凶證

傷寒病唇吻反青四肢多汗肝絕也△形如烟熏搖頭直視心絕也△環口蠶黑柔汗發

黃脾絕也△汗出髮潤喘而不休肝絕也△狂言

直視喪便遺失腎絕也△汗出如油喘促不休水

漿不入形體不

仁命絕也翮

傷寒不治證

脉陰陽俱虛熱不止者死△脉陰陽俱盛大汗出不解者死△少陰病六七日息高

死△少陰病吐利煩燥四逆者死△汗後嘔吐水藥不入口者逆△下利後脈絕手足厥冷晷時脈還手足溫者生脈不還者死△發熱下利至甚厥不止者死△汗下後復發熱脈燥疾下利不止者死△下利厥逆無脈灸之脈不還身不溫反微喘者死△直視譫語或喘滿或下利者死○服麻黃湯二三劑汗不出者死△熱病脈躁盛而不得汗者死△發汗不至足者逆△汗出如珠不流者死△忽昏昧無脈服藥後汗解則生若無汗則脈不至者死△七八日以上發大熱難治△作寒脈乍踈乍數者不治△脈代者不治△口乾舌黑不治△口張目陷不治△尋衣摸空者逆△厥陰證唇青舌捲耳聾囊縮不治△陰陽易過六七日不治△大發濕家則成瘧熱而瘧難治△發風濕中濕汗並發燥濕汗必謔語不治

傷寒十勸 李時珍所撰

傷寒頭痛身熱 不可

此藥 太陰病頭不

痛身不熱少陰病一熱而無 頭痛厥陰病有

傷寒當直以毒氣不可益益 邪氣在經絡中當隨證

使毒氣流藏 多致殺人 加

傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥 傷寒不思飲食自

之理如理中元之類不可 服若熱氣增重或至不救 加

傷寒腹痛亦有熱證不可輕服溫煖藥 傷寒腹

方痛甚者加大黃則意可見也惟身冷厥逆腹痛方是陰證當消息之辨

傷寒自利當看陰陽證不可例服溫煖及止瀉藥自利

惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰外其餘身熱下利者皆是陽症不可用熱藥

傷寒胃脇痛及腹痛不可妄用艾炙傷寒胸脇痛屬少陽腹脹痛屬

太陰切不可便用艾炙多致殺人辨

傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證傷寒有陰厥有

陽厥當子細分辨不可例用熱藥辨

傷寒病已在裏卽不可用藥發汗傷寒須看表裡若一例發汗則邪氣

未除真氣先涸
死者多矣。煇

傷寒水爲欲愈不可令病人恣飲過度

病人發渴當與之水以有

熱氣然不可過多
常令不足爲善。煇

傷寒病初差不可過飽及飲酒食羊肉行房事

病方愈飲

食過飽病卽再來爲之食復勞動太早
病卽再來謂之勞復犯房室者必死。煇

傷寒戒忌

傷寒新差後但少吃糜粥常令稍飢不得
飽食反此則復。不得早起不得梳頭洗

面不得多言不得勞心費力反此則復。差後百
日內氣體未復犯房室者死。忌食羊雞狗肉肥

魚油膩猪骨汁及鹹藏鮮脯
油餅麵等物病則再發。煇

中寒證

仲景論傷寒疾未及手中寒先哲治胃太寒而

口中未有議其異同者夫傷寒有即病有不即病

必大發熱病邪循經而入以漸而深中寒則倉卒

感受其病即發而暴一身受邪難分經絡無熱可

發溫補自解此氣太虛也不急治則死矣。中

寒者寒邪真中三陰卒然昏不知人口禁四肢強

直拘急疼痛若不急治死在朝夕先用熱酒姜汁

各半盞灌服次用回陽救急湯。見附子理中湯

術附湯回陽湯。中寒雖燥熱煩渴可煎附子

理中湯浸水中冷服之不可熱服。冷極唇青

厥逆無脉陰囊縮者急用葱熨法或吳茱萸熨法

防見并艾炙臍中與氣海關元各三五十壯而服

不出手足不溫者死。中寒則口噤四肢強直

卒然暈

倒

倒

附子理中湯

治中寒口噤身強直附子炮人參白朮
乾薑炮甘草炙各一錢右剉作一貼水

煎服法。一方加吳茱萸肉桂當歸陳皮

厚朴各等分煎服亦名附子理中湯翻

朮附湯

治中寒白朮三錢甘草炙一錢半附子炮一
錢右剉作一貼入姜十片煎水調蘇合丸三

丸服之

廻陽湯

治中寒益知仁青皮各二錢川烏生附子生
各一錢乾姜炮五分右剉作一貼入姜七片

棗二枚水

煎服

寒厥暴亡

一婦人病傷寒暴亡脈絕有一道人見之
曰是寒厥爾不死也令人速掘地作坑以

薪炭燒之埃極煖施薦覆坑與病人卧
其上厚被覆之少頃大汗沾衣即甦

葱熨法

治中寒身冷脉微面青黑葱白連根切小麥

極熱絹包之互熨臍下冷

則用水拌濕更炒熨之

感寒及四時傷寒

寒温不節將理失宜乍煖脫衣甚熱

凌晨朝起呼吸冷氣久晴暴煖忽變陰寒久雨積
寒致生陰濕如此之候皆爲邪厲侵傷肌膚入于
腠理使人身體沉重肢節痠痛項背拘急頭目不
清鼻塞聲重淚出氣壅胃膈凝滯飲食不入凡此
之證若不便行解利伏留經絡傳變無已。尋
常感冒有表證宜姜活冲和湯防風冲和湯芎芷
香蘇散。劫見寒毒入裏吐利者霍香正氣挾食停
痰人參養胃湯。劫時令感冒宜升麻葛根湯。
大抵感冒古人不敢輕發表者正猶麻黃能開腠
理用或不得其宜則導泄真氣因而致虛變生他

證此藥乃平和之劑。馱鬱蟻止能溫中解表而已。不敢妄擾也。痲。雜病與傷寒相類者極多。凡有感冒輕證不可便認爲傷寒而妄治之。其或可者蓋亦因其不敢放肆多用和解平和之藥散之爾。研。凡感冒風寒通謂之四時傷寒。宜冲和散正氣散參蘇飲。仁坊沃雪湯。交加散。十味芎蘇散。助。魏對金飲。子防觀。

姜活冲和湯

治春夏秋感冒風寒發熱惡寒頭痛項強或無汗或有汗以代桂枝麻黃青龍

各半湯治太陽經表熱之神藥也。研。此藥非獨治四時風寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜病亦有神也。坊見。一名九味姜活湯。

防風冲和湯

治春夏秋感冒風寒頭痛身熱自汗惡寒脉浮緩姜活防風各一錢半白朮川

芎白芷生地黃黃芩各一錢細辛甘草各五分
右剉入薑三蒸三煎服。一名加減冲和湯

冲和散

治四時感冒風寒蒼朮四錢荆芥二錢甘草一錢右剉作一貼水煎服

沃雪湯

利解四時傷寒以此溫和表裏通順陰陽蒼朮三錢厚朴一錢半川芎當歸防風白芍藥

陳皮葛根甘草各七分

右剉作一貼水煎服

升麻葛根湯

治溫病及時令感冒葛根二錢白芍藥升麻甘草各一錢右剉作一貼薑二蒸

二煎

服

交加散

五積散性溫敗毒散性涼凡人遇些少感冒取兩藥對半合和煎服則邪氣自散矣

外感挾內傷證

外感無內傷用仲景法研△傷寒挾內傷者十居八九蓋邪之所湊其氣必虛

只用補中益氣湯出入加減氣虛甚者少加附子
以行參芪之功方規納傷○傷寒丹溪用補中益
氣湯海藏用九味姜活湯皆是和解之意不使真
氣散失也綱○丹溪海藏諸賢治傷寒皆以補養
兼發散之法此乃風雨寒濕不得虛邪不能獨傷
人之旨也俗醫謂傷寒無補法不分虛實一例汗
下而致天橫實醫門之罪人也綱○傷寒一證頭
痛身熱惡寒微渴澀然汗出沉困身痛脚痠脉浮
虛無力名曰勞力感冒不可悞作正傷寒大發汗
宜加味益氣湯翻○外感挾內傷宜陶氏補中益
氣湯十味

和鮮散

陶氏補中益氣湯

治內傷氣血外感風寒頭痛身熱
惡寒自汗沉困無力人參生地黃

黃芪當歸川芎柴胡陳皮姜活白朮防風各七分
細辛甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚

葱白二莖水煎服如元氣不足加升麻三分

十味和解散

治外感內傷頭痛身熱白朮四錢桔梗二錢當歸陳皮枳殼防風白芍藥厚朴

人參甘草各五分右剉作一貼

入薑三片葱白三莖水煎服

加味益氣散

治勞力感寒證姜活一錢半人參黃芪防風柴胡各一錢白朮陳皮當歸各七

分甘草五分升麻黃栢酒炒各二分右剉作一

貼入薑三片水煎熱甚加酒炒黃芩三分翻

外感內傷虛證宜補

一婦人年七十患傷寒發熱惡寒諸醫以藥發散旬日不効飲

食漸少昏沉不省口不能言目不能開咽喉有微氣有欲絕之候六脉虛微若無以人參濃煎湯徐徐灌之連用頓甦又歷十四年而卒夫人參迴元氣于無何有之鄉果有起死迴生之功醫說載一

人傷寒成壞證只服人參湯
鼻梁出汗而愈與此同翻

孕婦傷寒

孕婦傷寒宜用芎蘇散黃龍湯柴胡枳殼湯
單胎散臥。傷寒熱病宜護胎并底泥及青

黛伏龍肝并水調塗臍腹上

乾則再濕塗庶免傷胎翻

芎蘇散

治孕婦傷寒頭痛寒熱咳嗽黃芩前胡麥門
冬各一錢川芎陳皮白芍藥白朮各八分紫

蘇葉六分乾葛五分甘草三分

右剉作一貼入姜蔥煎服臥

黃龍湯

治孕婦傷寒發熱及產後發熱熱入血室等
證卽小柴胡湯去半夏也與四味涼血地黃

湯合用

尤好臥

柴胡枳殼湯

治孕婦傷寒發熱口乾腹滿便閉譫語
或發癰大青黧黧生地黄石膏各一

錢半柴胡一錢枳殼黃芩梔子知母麥門冬乾葛各五分甘草二分升麻四分右剉水煎服

單胎散

治孕婦傷寒發大熱或發痘疹恐傷胎藏嫩卷荷葉一兩焙蛤粉五錢右爲末每服二錢

蜜水調

下門

痼冷

痼冷者謂痼久而冷也痼者固也冷者寒之甚也

臟腑之中停寒不散謂之沉寒積冷不解謂之痼冷宜附子理中湯坊見四柱散坊觀衝寒散加減白通湯靈砂金液丹至聖來復丹代灸塗臍

膏加味

理中湯

衝寒散

治痼冷腹痛泄瀉飲食減少香附子陳皮草果各一錢半縮砂白薑肉豆蔻各七分藿香

白茯苓木通吳茱萸各三分右爲末每二錢

溫酒或薑湯調下右剉作一貼水煎服

加減白通湯

治沉寒痼冷臍腹冷痛大便自利足脛寒而逆附子炮二錢乾薑炮肉桂草豆

薤煨半夏人參白朮甘草炙各一錢右剉作一貼

入薑五片葱白五莖水煎服仍炙氣海三里穴

靈砂

治諸虛痼冷厥逆如神水銀四兩硫黃一兩右同入鉄銚內炒成砂子有烟焰起以醋灑之研

細入水火鼎赤石脂封口鹽泥固濟炭二十斤煨

經宿取出細研糯米糊和丸麻子大每五七丸以

至十五丸空心以人參大棗湯下

忌食猪羊血菜豆粉冷滑之物

金液丹

治久寒痼冷及吐利日久身冷脉微硫黃十兩研細飛過盛磁盒內以赤石脂泯縫外以

鹽泥固濟先掘地坑埋小罐子盛水令滿安盒子

在上用泥固濟訖慢火養七日七夜候足加頂火

一斤煨取出放冷研為細末右藥末一兩用蒸餅

一兩湯浸去水蜜和丸梧子大每三十九多至百

丸溫米飲下
空心服

至聖來復丹

治痲冷心腹冷痛臟腑虛滑及霍亂吐瀉脈微欲絕又治榮衛不交養心腎不

升降上實下虛氣塞痰厥一切危急之證但有胃氣無不獲安此藥配類二氣均調陰陽可冷可熱可緩可急功效殊勝硫黃硝石各一兩爲細末入銚內以微火慢炒用柳木篦不住手攪令陰陽氣相入再研極細名曰二氣砂乃入水飛五靈脂陳皮青皮末各二兩次入太陰玄精石末一兩和勻醋糊和丸豌豆大空心米飲下三十九或五十九

加味理中湯

治痲冷積寒附子炮人參白朮乾姜炒

煨鐵甕城八角杜先生方也一名正一丹

作一貼入薑三片又棗二枚水煎服

代炙塗臍膏

治痼冷臍腹痛附子馬藺子蛇床子吳茱萸肉桂木香右細末用白麩一匙薑

汁調成膏攤紙上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其力可代炙百壯癩

傷寒有五種

有中風有濕温有傷寒有熱病有温病皆以脉理推之○中風之脉陽浮而滑陰瀼

而弱○濕温之脉陽瀼而弱陰小而急○傷寒之脉陰陽俱盛而緊瀼○熱病之脉陰陽俱浮浮之

而滑沉之散澁○温病之脉行在諸經不知何經之動也隨其經所在而取之

傷寒十六名

一曰傷寒二曰傷風三曰傷寒見風四曰傷風見寒五曰風濕六曰中濕七日風温

八曰濕温九曰温毒十日中暍十一曰熱病十二曰温病十三日晚發十四日瘧病十五曰温虐十

六曰疫癘○濕病有五種乃風濕濕温寒濕中濕濕痺也温病有五種乃春温風温温疫温瘧

溫毒也。入。詳見。溫。綱。

傷寒相類四證

一日痰飲。二日虛煩。三日脚氣。四日食積。詳見內傷。

傷寒賦

傷寒為病。反復變遷。賴先師究詳之遺旨。成後學診治之良詮。太陰則頭痛身熱。春

強陽明則目疼鼻乾不眠。少陽脇痛耳聾寒

熱嘔而口為之苦。太陰腹滿便實。尺寸沉而津

不到咽。少陰舌乾口燥。厥陰煩滿囊縮。一

二日可發表而散。三四日宜和解而痊。五六

日便實方可議下。七八日不解又復再傳。日

傳二經病名兩感。經傳六日應無一全。太陽

無汗麻黃為最。太陽有汗桂枝可先。小柴胡

為少陽之要領。大柴胡行陽明之秘堅。至三

陰則難拘定法。或可溫而或可下。宜且如陽證

數變以曲盡生意。或可方而或可圓。且如下之

早者乃為結胃 陰證下之早者因成痞氣○發
狂為血蓄于內又大便之極實 發黃乃熱積于
中兼小便之不利○微喘緣表之未解喘滿而不
惡寒者當下而痊○微煩為陽之相勝煩極而反
發厥者乃陰所致○狐惑蓋緣失汗虫蝕臟及蝕
肛 虺厥却緣多飢虫攻咽及攻胃○渴乃煩多
斑為熱熾○陽明內實則為寒熱往來 太陽
中風因作剛柔二瘕○衄血雖為欲解動陰血者
有厥竭之憂 厥利雖若尋常反能食者有除中
之忌○厥有二端 治非一類○陰厥脉沉而細
初緣利過 陽厥脉滑而沉始因便秘○治陽則
芒硝大黃 治陰則附子薑桂○死生係反掌之
間 脉藥可 因知 風温汗不休當用漢防已 胃
折肱而治 痞利不止宜服禹餘糧○併病
歸于一經邪不傳今表解疾愈 戰汗分為四證
陽勝陰今熱退身涼○咳逆者羌活附子 腹痛

者桂枝大黃○微虛相搏則為短氣 勞食再復
乃成內傷○陽明背惡寒而唇口燥懸知白虎為
最 少陽身體痛而筋肉惕乃聞真武至強○欲
要發黃先出頭汗 始因火迫終至亡陽○渴欲
飲水水入即吐者五苓散 燥 况乃大青龍兼理
欲漱水水入不下者犀角湯 風寒 小承
氣正蠲潮熱○不得眠而煩燥甚雞子入於黃連
但有熱而嘔噦頻薑汁加於竹葉○二七瓜蒂
散吐傷寒中脘痰涎 三物桃花湯理少陰下利
膿血○厚朴半夏治腹脹為偏宜 葱白麻黃理
頭痛為至截○調溫毒可用黑膏 散赤癍當行
紫雪○吐血者須煎黃連藥皮 咽痛者通用猪
膚甘桔○三物白雖云頗峻散結胃寒實中 加以
焦 十棗湯固非泛常治痞滿痛連兩脇 加以
大熱錯語呻吟乾嘔者黃連解毒 脉遲熱多寒
少血弱者黃芪建中○汗之過多動悸而惕 下

之先時懊懷在胃○旋覆代赭理心病而噫不息

桂枝各半瘵身痒而汗不通○勞復身熱湯名

猴鼠糞 腸垢臍熱藥用白頭翁○疫癘者春夏

秋冬各有分用須十全九證 百合者行往坐卧

皆不定號為常謂多眠身猶灼熱風温可用萎蕤

百脉一宗 不眠心蘊虛煩斂汗必須酸

聚○手足攣搐當用牛蒡根 咳嗽生痰宜行金

沸草○不可汗本有數種動氣與風濕脉虛 不

可下自非一端動氣與陽浮在表○濕證不可汗

傷 霍亂多緣熱搐○温病發於春夏須要柴葛

以解肌 奔豚挾逐寒 蓋聞乍寒微熱名似瘧

邪多用桂苓為可保 下利白胎不可醫○口燥咽

臍痛引陰名臍結 肉瞶筋惕發動氣汗以致

乾鮮少陰下莫可緩 脈弦者名曰負 傷寒與

羸○陽明與少陽合病 自汗有風温濕温若

熱病將痊食多者號曰遺○自汗有風温濕温若

亡陽則木附可用 身痛有表證裏證若陰毒則

四逆尤遲○脾弱者大便難而小便數治用大黃

枳殼 協熱者小便澀而大便利須用黃連當歸

○嘔吐有寒有熱寒則當溫熱當以解 譎語有

虛有實實則可下虛不可為○陽毒則狂斑煩亂

以大青升麻可迴困篤 陰毒則唇青厥逆以正

陽甘草或拯顛危○發厥時胃煩尤甚此遷氣絕

而精神散 大汗後身熱猶盛此陰陽交而魂魄

離 嗟夫 生死之關 陰陽是主○陽脉見於陰經

許○土衰木旺則為賊能無剋制之災 水升火

降則為和會見歡欣之舉 緣傷寒臟變之不常

非雜病徑 是用 潛篤心神 洞窺臟腑○推惻

直而可取 隱之心以濟乎今 拯疲瘵之

疾以遵乎古○庶幾可登仲

景之堂不負乎諄諄之語

單方

凡二
十種

石膏

主傷寒熱病汗後脉洪大頭痛口燥
大渴取石膏碎一兩水煎服之

硫黃

治傷寒陰證身冷脉微手足厥而躁
硫黃五錢為末艾湯調服即時安卧汗出而愈

柴胡

療傷寒第一解肌除煩
熱剉一兩水煎服之

葛根

傷寒初患頭痛身熱葛根剉一兩水
煎服○生葛取汗飲一升亦效

麻黃

療傷寒解肌發汗為第一去第取五
錢水煎服之

百合

傷寒陰毒煮百合
濃汁服一升良

竹瀝

主傷寒勞復竹瀝小
煎數數飲之取汗

梔子

治傷寒熱病勞復梔子十枚碎水煎服微汗

皂莢

傷寒昏迷不省人事皂莢末以紙撚燒烟入鼻有嚏可治無則不治肺氣上絕也可治者隨用

皂莢半夏生白礬共錢半爲末薑汁調服探吐痰去卽甦翻

牡鼠糞

專主勞復入葱豉水煎服

葱白

傷寒初覺頭痛身熱便服葱豉湯葱白一握豉一合生薑五片水煎溫服取汗時疫亦此

生梨

治感寒初覺連鬚葱白投熱酒中飲之取差

葱酒

主傷寒熱盛取食之

荊芥

主傷寒頭痛取穗一兩濃煎服之

紫蘇葉

治感傷風寒濃煎湯飲之取汗差鞣

忍冬藤

治同上濃煎湯溫服取汗鞣

薄荷

療傷寒陰陽毒取葉煮汁溫服取汗良鞣

菜豆粥

治傷寒熱病煩渴煮作粥常服之

人屎

卽野人乾糞也主傷寒發熱發狂溫水漬取汁飲之鞣

婦人月水

解女勞復及陰經熱取月經衣溫水漬水汁飲之鞣

鍼灸法

傷寒初得一二日頭痛寒熱宜灸臣闕上腕中腕各五十壯

骨補陷谷

入關大刺針喘關

合谷攢竹

傷寒汗不出取合谷

泚坎爓復溜印瀉商丘腕骨陽谷俠谿厲兌勞宮
風池魚除經渠內庭又十二經榮穴皆可刺翺○
傷寒汗多不止取內庭合谷復溜翺臑○傷寒頭
病太陽證刺完骨陽明證刺合谷衝陽少陽證刺
京骨陽池丘墟風府風池蠡○傷寒結胃先使人
心蔽骨下正痛處在畔揉之以毫鍼刺在畔支溝
穴次刺左間使次名日雙開刺次左行間穴刺左
邊結胃立效右亦依上法刺之慢慢呼吸停鍼立
愈翺○傷寒胃痛取期門大陵翺○傷寒脇痛取
支溝陽陵泉翺○傷寒陰證腹痛灸足小指外側
上紋尖灸三壯男左女右翺○又法陰證已極藥
餌無功速灸臍中三百壯又灸氣海關元穴二三
百壯以手足溫暖爲效轉○又法陰證已極玉莖
縮入速令人捉定急將艾九菘豆大放在陰莖口
上灸三壯其莖卽出翺○傷寒手足厥冷取大都
臑一○傷寒六脉俱無取復溜翺之獻合谷中寒

死瘕者腰折瘕
瘕齒噤齧也

暑

暑者相火行令也

夏至日後病熱為暑暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心向

給之經其為證煩則喘喝靜則多言身熱而煩心大渴引飲頭疼自汗倦怠少氣或下血發黃生癍甚者火熱制金不能平木搖擗不省人事矣

傷寒傳變為溫為暑

凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫

暑當與汗皆出勿止

脈法

傷暑脈虛○脈虛身熱得之傷暑脈仲難氣○暑傷于氣所以脈虛弦細花逆體狀無餘

之脉陽弱陰虛微遲似芤旺○暑脉弦細芤遲何也蓋寒傷形熱傷氣氣傷則氣消而脉虛弱所以弦細芤遲皆虛脉也軀○暑脉虛而微弱或浮大而散或隱不見夫微弱隱伏皆虛類也軀○中暑與熱病相似但熱病脉盛中暑脉虛以此辨之恬

暑病形證

暑病身熱自汗口乾面垢而已臥○傷暑之證面垢自汗身熱背寒煩悶大渴倦怠少氣

毛聳惡寒或頭疼或霍亂或四肢厥冷但身體無痛暈○中暑之證六脉沉伏冷汗自出悶絕而昏不知人矣暈○太陽中湯者暑病也發熱惡寒身重頭痛其脉弦細芤遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷少有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫鍼則發熱甚數下之則淋甚神○何故灑然毛聳蓋熱則諸毛乳開故洒然惡寒口開前板齒燥者齒乃骨之精靈燥者骨熱也鍼藥不能

治當灸大
顛穴

中暑救急

夏月在道中中熱膈死者急扶在陰涼處取
途中熱塵土積死人心又積臍上作窩令人

尿其中即活旺○中暑悶倒急扶在陰涼處切不

可與冷水以布巾衣物蘸熱湯熨臍中及氣海續

以熱湯淋布上令煖微臍復即漸醒如倉卒無湯

掬道上熱土積於臍上冷則易之旺○凡覺中暑

急嚼生薑一大塊冷水送下如已迷悶嚼大蒜一

大瓣冷水送下不能嚼水研灌之或人尿半灌碗

或車輪土五錢冷水調澄清飲之胡○中暑發昏

以新汲水滴兩乳以扇之重者地漿灌之即扇醒

若與冷水飲即死顛○中暑昏悶痰壅不省至聖

來復丹麩覘為末并水調下胡○中暑不省皂莢

燒甘草炒為末每二錢溫水調胡○中暑神氣昏

驚悸妄言辰砂益元散麩覘并水調下二錢胡○

中暍中熱之辨

仲景傷寒論中一證曰中暍卽中熱也
脈虛而微弱煩渴引飲體熱自汗宜清

暑益氣湯等補益之劑

一證曰熱病卽中暑也

脈洪而緊盛頭痛身熱口燥心煩宜白虎湯等清

涼之劑

○靜而得之爲中暑中暑者陰證當發
散也或避暑于深堂穴屢得之其證必頭痛惡寒

身形拘急肢節疼痛而煩肌膚大熱無汗爲房

室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜蒼朮白

虎湯

○動而得之爲中熱中熱者陽證爲熱傷元氣

也若行人或農夫子日中勞役得之其證必苦頭

痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大

泄無氣以動乃爲天熱外傷肺氣宜人

參白虎湯竹葉石膏湯

○

夏暑宜補氣

人與天地同一橐籥子月一陽生寅月二
陽生巳月六陽生陽盡出于上此氣之浮

也人之腹屬地氣于此時浮于肌表散于皮毛腹中之陽虛矣世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷看其誤甚矣火令之時流金爍石何陰冷之有孫真人製生脉散令人夏月服之非虛而何疎○宜生脉散清氣飲參薈飲黃芪湯黃芪人參湯清暑益氣湯十味香薷飲

生脉散

麥門冬二錢人參五味子各一錢水煎夏月代熟水飲之或加黃芪甘草各一錢或加黃

栝二分服之則令人氣力通出生用呶○火熾之極金伏之際寒水絕體于斯時也故急救之以生脉散除其濕熱肺欲收心苦緩皆酸以收之心火盛則甘以瀉之故人參之甘佐以五味子之酸孫真人曰夏月常服五味子以補五臟氣是也麥門冬之微苦寒能滋水之源而清肅肺氣微加黃栝之苦寒以滋水之流除兩足之痿弱也疎○人參麥門冬五味子生脉脉者元氣也疎○

清氣飲

治發熱汗大泄無氣力脉虛細而遲此暑傷元氣也白朮一錢二分人參黃芪麥門冬白

芍藥陳皮白茯苓各一錢知母香薷各七分黃連炒甘草各五分黃柏三分右剉入薑三片煎服

○一名清暑

益元湯

驅暑清熱壯元氣免霍亂吐利等疾白朮一

參需飲

錢半人參一錢二分麥門冬白芍藥白茯苓

各一錢知母炒陳皮香薷各七分甘草炙五分黃芩炒三分五味子十粒右剉入薑三片煎服

○一名却暑

清健湯

黃芪湯

治中暍脉虛弱人參白朮白茯苓甘草黃芪白芍藥各一錢右剉入薑三片水煎服

黃芪人參湯

治暑月精神不足兩脚痿軟煩熱嘔噦自汗頭痛皆熱傷肺氣也即補中益氣

湯助饑加蒼朮一錢神麴五分
黃栢三分五味子十五粒也

清暑益氣湯

治長夏濕熱蒸人四肢困倦精神短少
懶以動作身熱煩渴小便黃而數大便

溏而頻或泄或痢不思飲食氣促自汗蒼朮一錢
半黃芪升麻各一錢人參白朮陳皮神麴澤瀉各
五分酒黃栢當歸青皮麥門冬乾葛甘草各三分
五味子九粒右剉作一貼水煎服○此藥參朮
黃芪升麻甘草麥門冬當歸五味子黃栢乾葛是
清暑補氣也蒼朮神麴陳皮青皮澤瀉理脾也○
十味香薷飲消暑和胃補氣香薷一錢半厚朴白扁
豆人參白朮白茯苓黃芪木瓜甘草各
七分右剉作一貼水煎服或為末
每二錢熱湯或冷水任調下

暑有冒暑中暑傷暑三證

其腹痛水瀉者胃與大腸受
之惡心嘔吐者胃口有痰飲

暑風

此冒暑也宜用黃連香薷散清暑六和湯消暑十
全飲解暑三白散。其身熱頭疼燥亂不寧者或
身如針刺者此為熱傷在內分此傷暑也宜用人
參白虎湯小柴胡湯紅麩。其咳嗽發寒熱盜
汗不止脉數者熱在肺經此中暑也
宜用清肺生脉飲白虎湯益元散研
中暑復傷風搖擗不省人事者宜先服蘇合香元
麝覷候其蘇省乃與他藥麩。暑風暑厥者但以
手足搖擗為風手足逆冷為厥並宜二香散或人
參羌活散枋親合香薷散服之覷。夏月感寒者
乃取涼之過也或納涼于涼亭水閣風寒以傷其
外又食冰雪生冷瓜果以傷其內其證頭疼身痛
發熱惡寒或胃腹痛嘔吐泄瀉宜藿香正氣散助
醃去白朮代蒼朮加羌活若感暑風痰塞喘急六
和湯倍半夏加
羌活川芎鑿

二香散

治感冒暑風身熱頭疼或泄瀉嘔吐香附子

香薷各二錢紫蘇陳皮蒼朮各一錢厚朴白扁豆甘草各五分右剉作一貼入生薑三片木瓜二片葱白二莖水煎服○凡暑月傷風傷寒悉以此藥解表

發散蠶

暑熱煩渴

身熱自汗煩渴引飲卽中暍也宜人參白虎湯竹葉石膏湯麩醃見益元散玉露散黃連

香薷散清肺生脉飲桂苓甘露飲通苓散濯熱散醍醐湯春澤湯

益元散

治中暑身熱吐瀉腸澀下痢赤白癰閉盪胃中積聚寒熱宣積氣通九竅六腑生津液去

留結消蓄水止渴除煩大養脾腎之氣解百藥酒食邪毒滑石六兩甘草炙一兩右細末每三錢溫蜜水調服欲冷飲者并水調下○一名六一散一名天水散一名神白散暍○因寒吐瀉反胃加

乾薑五錢名曰溫六丸○濕熱泄瀉加紅麴五錢
名曰清六丸俱以陳米飲作丸梧子大白湯吞下

五七十

粒呷

玉露散

治暑渴寒水石滑石石膏天花粉各一兩
甘草五錢右爲細末每三錢井水調下

黃連香薷散

治中暑熱渴香薷三錢厚朴一錢半黃
連七分半右剉作一貼入酒少許水煎

沉冷服○一名

黃連香薷飲

清肺生脉飲

治暑傷肺咳喘煩渴氣促黃芪二錢當
歸生地黃人參麥門冬各一錢五味子

十粒右剉

水煎服

通苓散

治傷暑煩渴泄瀉尿澁卽四苓散加木通車
前子茵陳瞿麥等分各一錢右剉入燈心麥

門冬各二十
個水煎服

桂苓清露飲

治伏暑煩渴引飲滑石二兩茯苓澤瀉
石膏寒水石甘草各一兩白朮猪苓肉

桂各五錢右為末每

二錢薑湯調下

濯熱散

治暑熱煩渴及霍亂後渴最妙白礬五倍子
烏梅肉甘草各一兩右為末入白麩四兩杵

勻每二錢新汲水調下

甌一名龍鬚散研

醍醐湯

解暑熱止煩渴烏梅肉另末一斤草菓一兩
縮砂白檀香各五錢煉蜜五斤右細末入蜜

微沸攪白磁器

盛冷水調服

春澤湯

治暑熱燥渴引飲無度或水入即
吐乃五苓散去桂代人參也

暑病吐瀉

暑毒入腸胃致腹痛惡心嘔吐泄瀉宜香薷散六和湯消暑十全飲解暑三白散香薷湯

香朴飲子縮脾飲

大順散桂苓元

六和湯

治暑傷心脾嘔吐泄瀉或霍亂轉筋及浮腫癰痢香薷厚朴各一錢半赤茯苓藿香白扁

豆木瓜各一錢縮砂半夏杏仁人參甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服○加麩炒

黃連一錢名曰

清暑六和湯

消暑十全飲

治傷暑吐瀉香薷一錢半白扁豆厚朴紫蘇葉白朮赤茯苓藿香木瓜白檀香

各一錢甘草五分右

剉作一貼水煎服

解暑三白散

治暑熱引飲過多致吐瀉澤瀉白茯苓白朮各二錢右剉作一貼入薑三片燈

心二十莖
水煎服

香薷飲

治暑病吐瀉香薷二錢白扁豆厚朴赤茯苓各一錢半甘草五分右剉作一貼水煎服或

爲末湯點二錢服他暑藥皆不及此
此櫃○一方無茯苓有神效

香朴飲子

治傷暑吐瀉煩亂香薷一錢半厚朴白扁豆澤瀉赤茯苓陳皮木瓜半夏人參紫蘇

葉烏梅肉各七分甘草五分右剉作一貼入薑三片棗二枚煎服

大順散

治暑月煩渴引飲過多胃脾停冷濕作吐瀉甘草剉長一寸二兩乾薑杏仁肉桂各四錢

先將甘草以白沙同炒黃熟次入薑同炒令熟次入杏仁同炒黃用篩下去沙淨乃入桂爲末每二

錢水煎溫服如煩燥井花水調下

桂苓元

治暑月傷冷濕吐瀉桂心赤茯苓右等分爲末煉蜜和勻每一兩作八九井水化下一丸

旗

縮脾飲

治暑月內傷生冷腹痛吐瀉縮砂研一錢半草果烏梅肉香薷甘草各一錢白扁豆乾葛

各七分右剉作一貼

入薑五片水煎服

伏暑證

伏暑之證背寒面垢少有勞身卽熱口開前板齒燥小便已灑灑然毛聳翕○伏暑者卽

冒暑久而藏伏三焦腸胃之間變出寒熱往來霍

亂吐瀉瘧痢煩渴或腹痛下血宜酒蒸黃連元消

暑元桂苓甘露散臥○每于

夏月復發者爲伏暑也臥

酒蒸黃連元

治伏暑嘔渴惡心及年深暑毒不差者黃連四兩清酒之合浸之蒸乾以酒盡

為度右為末麩糊為丸梧子大每三十九熱酒吞
下以胃膈涼不渴為驗一名小黃龍丸

消暑元

治伏暑氣欲絕半夏八兩赤茯苓生甘草各
四兩右以醋二升半煮半夏醋盡熬乾右為

末以薑汁糊和丸梧子大每服
五十九熟水吞下藥下即甦

桂苓甘露飲

治伏暑引飲泄利滑石一兩石膏寒水
石澤瀉乾葛白朮赤茯苓甘草各五錢

人參桂皮藿香各二錢半木香一錢
二分半右為末每二錢白湯調下

注夏病

人有遇春末夏初頭痛脚弱食少體熱世俗謂
之注夏病屬陰虛元氣不足宜補中益氣湯去

升柴加黃栢白芍藥麥門冬五味子有痰加天
南星半夏研宜服生脉散及參歸益元湯

夏暑將理法

衛生歌曰四時惟夏難將攝伏陰在內腹
冷滑補腎湯藥不可無食飲稍冷休哺啜

心肝腎衰何所禁特忌踈泄通精氣寢處惟宜謹
密間默靜志慮和心意水漿菜茹不宜人必到秋
來成瘧痢○凡盛暑衝熱切不可冷水洗手面
大損人目恬○夏一季是人脫精神之時心旺腎
衰腎化爲水至秋始凝及冬乃堅是故猶慎房事
因養精神恬○三伏之時大熱傷氣養生家于此
時猶慎之若縱酒恣色則令人內腎腐爛而死臥
○人之心包絡與胃口相應胃氣稍虛或因饑冒
暑則暑毒自口鼻而入凝之于耳頰達之于心旬
如響應聲過暑以還急漱口而勿嚥可也○虛
人及老人中暑迷厥不省宜竹葉石膏湯勦醒加
附子冷服之翻○太倉公辟瘟丹暑濕之月燒之
能辟邪散氣

方觀瘟疫

暑熱通治藥

治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補
真氣爲要研○夏月多食冷物過飲茶水

水漿致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑藥多用溫脾消食治濕利小便之藥須要識此意研○病暑者多無身痛間有痛者或為燥浴水濕相搏耳聾○暑病通用香薷散清暑中和散萬病無憂散

香薷散

治傷中一切暑病或霍亂吐瀉或昏塞欲絕香薷三錢厚朴白扁豆各一錢半右剉作一

貼入酒少許水煎去滓沉冷服之翻

清暑中和散

治中暑傷暑諸證霜降後勿用香薷二錢豬苓澤瀉滑石草果各一兩半黃連

酒炒厚朴木通車前子炒枳殼縮砂各一兩白木赤茯苓陳皮各七錢茵香五錢白扁豆四錢木香甘草各三錢右細末每二錢冷水調下或剉兩水煎服亦佳

萬病無憂散

專治夏月霍亂吐瀉似瘧非瘧似痢非痢不伏水土等證常服可防瘧痢香薷

白扁豆各二兩草果黃連滑石澤瀉各一兩二錢
枳殼木通厚朴陳皮赤茯苓車前子猪苓縮砂各
八錢白朮茴香各五錢六分木香甘草各二錢半
右細末每二錢滾湯調服或清茶調下忌米飲

單方

凡五種

石膏

天氣暑熱時得病以石膏爲主
治碎一兩煑取汁服卽差

香薷

主一切暑病及霍亂吐瀉
煑取汁服之生服亦佳

大蓼

卽荳蔻也治熱渴心悶煮濃汁
飲之○夏月暈死亦灌之

甜瓜

暑月食之不中暑
氣少食之佳

馬通

臘月馬糞乾者煎湯
飲之治一切暑病

東醫寶鑑雜病篇卷三下

東醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚奉 教撰

濕

濕乃水氣

濕卽水也東南窪下風雨襲虛山澤蒸氣人多中濕濕在經則日晡發熱鼻塞在關節則

一身盡痛在臟腑則清濁混而大便濡泄小便反澁腹或脹滿濕熱搏則遍身黃如熏色凡水氣有毒能爲風濕疼脾水腫面黃腹大初自皮膚脚手入漸至六腑令人大小便澁至五臟漸漸加至忽攻心便死韃。江湖間露氣成瘴兩山校水中氣瘴一冷一熱相激成病瘴俱是濕能與人作寒熱消燂骨肉南土尤甚大略皆瘴類也韃

霧露之氣為瘴

南方土地卑濕依山則觸嵐氣近水則受濕氣。東南兩廣山峻水惡地濕。

漚熱如春秋時月外感霧毒寒熱胃滿不食此瘴毒從口鼻入也宜平胃散防飢升麻蒼木湯神木

散。南方地煖故太陰之時草木不黃落伏蟄不閉藏雜毒因煖而生故嶺南從仲春訖仲夏行

青草瘴從季夏訖孟冬行黃茅瘴其治法與傷寒無異惟能別其表裏不妄汗下為好。輿

升麻蒼木湯

治嶺南春秋之月感山嵐瘴霧毒氣發寒熱胃滿不食蒼木一錢半半夏一錢

厚朴陳皮枳實桔梗川芎木通升麻柴胡各七分黃連黃芩木香甘草各五分左右剉作一貼入薑五

片水煎服

神木散

治中霧露山嵐瘴氣頭疼項強蒼木三錢川芎白芷細辛藁本羌活甘草各一錢右剉作

一貼入薑三片葱
白二莖水煎服

脉法

傷濕之脉細濡。濕熱之脉緩大。或澁或
細或濡或緩是皆中濕可得而斷。脉浮而緩
濕在表也。脉沉而緩濕在裏也。脉弦而緩或
緩而浮皆風濕相搏也。身痛脉沉為中濕。脉
浮為風濕。
人活

濕氣侵人不覺

風寒暑暴傷人便覺濕氣熏襲人多不
覺其自外而入者長夏鬱熱山澤蒸氣

胃兩行濕汗透沾衣多腰脚腫痛其自內得者生
冷酒麩滯脾生濕鬱熱多肚腹腫脹西北人多內
濕東南人多外濕。人居戴履受濕最多行住
坐臥實熏染於冥冥之中滯而為喘嗽漬而為嘔
吐滲而為泄瀉溢而為浮腫濕痰熱則發黃濕遍
體則重着濕入關節則一身盡痛濕聚痰涎則昏

不知人

霧露清濁之邪中人

寸口陰脈緊者霧露濁邪中於下焦少陰之分名曰渾陰氣為慄令

人足脛逆冷便尿妄出或腹痛下利宜理中湯四逆湯

於上焦太陽之分名曰緊陽中霧露之氣也令人發熱頭痛項強頸攣腰痛脛痠宜九味薑活湯藿

香正氣散方見。陰陽脈俱緊者上下二焦俱中邪也必吐利後脈不緊手足溫則愈若脈陰陽俱

緊口中氣出唇口乾燥蹇卧足冷鼻涕出舌上胎滑勿妄治也

火熱生濕潤秋涼則萬物乾燥夫熱而怫鬱則生濕也

因濕生痰故用二陳湯方見加酒芩羌活防風去

風行濕蓋風能勝濕也切。凡病濕者多自熱生

濕本土氣火熱能生濕土故夏熱則萬物濕

潤秋涼則萬物乾燥夫熱而怫鬱則生濕也

因濕生痰故用二陳湯方見加酒芩羌活防風去風行濕蓋風能勝濕也切。凡病濕者多自熱生

而熱氣多為兼病。濕病本不自生，因於火熱，佛鬱水液不能宣通，停滯而生水濕也。六七月之間，濕令大行，燥金受濕，熱之邪絕，寒水生化之源，源絕則腎虧痿厥之病，大作腰以下痿軟癱瘓，不能動行，步不正，兩足欹側，清燥湯主之。方見正傳

濕病類傷寒

中濕風濕濕溫皆類傷寒。中濕之由風雨襲虛山澤蒸氣濕流關節，一身盡痛，風濕

者其人先中濕，又傷風，故謂之風濕。其中濕因風濕之氣，中人為病，發熱與溫病相類，故曰濕溫也。難經曰：濕溫之脈陽浮而弱，陰小而急。

濕病有七

有中濕、風濕、寒濕、濕痺、濕熱、濕溫、酒濕。又有破傷濕。

中濕

面色浮澤，是為中濕。中濕之脈沉而微，緩濕喜歸脾，流於關節中之多，使人腹膜脹倦怠，四肢

肢關節疼痛而煩惑一身重着久則浮腫喘滿昏
不知人挾風則眩暈嘔噦挾寒則攣拳掣痛癱△
外中濕者或感山嵐瘴氣或被雨濕蒸氣或遠行
涉水或久卧濕地而得△內中濕者因生冷過多
或厚味醇酒停滯脾虛不能運化而得△中濕
宜勝濕湯除濕湯加味木附湯白木酒或五苓散

加羌活川芎

蒼木

寒方門

勝濕湯

治坐卧濕地或雨露所襲身重脚弱大便泄
瀉白木三錢人參乾薑白芍藥附子炮桂枝

白茯苓甘草各七分半右剉作

一貼入薑五棗二水煎服精

除濕湯

治中濕滿身重着蒼木厚朴半夏各一錢半
藿香陳皮各七分半甘草五分右剉作一貼

人薑七片棗二

枚水煎服嫩

加味木附湯

治中濕諸證附子炮二錢白木赤茯苓甘草炒各二錢半右剉作一貼入薑七

棗二水煎服日再纔見身痺三服後則當如胃狀勿怪蓋木附並行皮中逐水氣故爾

白朮酒

治中濕口禁不省白朮一兩剉作一貼以酒二盞煎至一盞頓服惡酒則水煎服

風濕

太陽經感風濕相搏其骨節煩疼者濕氣也濕則關節不利故痛其掣而不能屈伸者風也汗出身

寒脉沉微短氣小便清而不利者寒閉也惡風者表虛也或微腫者陽氣不行也宜甘草附子湯

附湯白朮附子湯麻杏薤甘湯

勝則衛虛汗出短氣惡風不欲去衣濕勝則小便

不利或身微腫宜防已黃芪湯羌附湯除濕羌活

湯

陰雨不止醫云可發汗汗之而病不愈者何也

曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在故不愈也

若治濕風者發其汗但微微白欲汗出者風濕俱去也門人。風濕相搏骨節煩疼掣痛近之則痛劇

甘草附子湯

治風濕桂枝四錢 甘草附子炮白朮各一錢 右剉作一貼 水煎服微汗即解門人

朮附湯

治同上白朮三錢 附子二錢 甘草一錢 右剉作一貼 入薑三棗一水煎服門人

白朮附子湯

治風濕身煩疼不能轉側白朮三錢 附子炮甘草炙各一錢 右剉作一貼 入薑

七棗二水煎服門人

麻杏薏苳湯

治風濕身疼不能轉側日晡加劇麻黃薏苳仁各二錢 杏仁甘草各一錢 右剉

作一貼水煎服門人

防已黃芪湯

治風濕身重痛自汗防已黃芪各三錢白朮二錢甘草一錢半右剉作一貼入

薑三片棗一枚水煎服

羌附湯

治風濕相搏肢體掣痛浮腫羌活附子炮白朮甘草各一錢半右剉入薑五水煎服

除濕羌活湯

治風濕相搏一身盡痛蒼朮藁本各二錢羌活一錢半防風升麻柴胡各一錢

右剉作一貼水煎服

一名除風濕羌活湯

寒濕

凡濕以尿赤有渴爲熱濕以尿清不渴爲寒濕

○寒濕交攻身體冷痛宜滲濕湯加劑除濕湯生

附除濕湯治濕中和湯五積散

○腰下冷重或痛是爲腎着宜用腎着湯

滲濕湯

治寒濕所傷身體重着如坐水中小便澀大便利赤茯苓乾薑炮各二錢蒼朮白朮甘草

各一錢橘紅丁香各五分右剉作一貼入薑三棗
二水煎服焮。一方蒼朮半夏麴各二錢厚朴藿

香陳皮白朮白茯苓各一錢
甘草五分劑法服法如上

加劑除濕湯

治傷濕身重腰痛四肢微冷嘔逆溏泄
赤茯苓乾薑各二錢蒼朮白朮甘草各

一錢橘紅桂皮厚朴各五分右剉
作一貼入薑三棗二水煎服搗

生附除濕湯

治寒濕蒼朮二錢附子生白朮厚朴木
瓜甘草各一錢右剉作一貼入薑十片

水煎服搗

治濕中和湯

治寒濕蒼朮炒二錢白朮陳皮赤茯苓
厚朴乾薑炮甘草炙各一錢右剉作一

貼入薑三片燈心
一撮水煎服搗

蒼朮復煎散

治寒濕相合肢體皆痛行步無力蒼朮四兩羌活一錢柴胡藁本白朮澤瀉升

麻各五分黃柏三分紅花一分右剉先以水三盞煎蒼朮至二盞入諸藥復煎至一盞去滓空心熱

服。一名蒼

朮復煎湯

濕痺

詳見風門

濕熱

六氣之中濕熱為病十居八九。內經曰因於濕首如裹濕熱不攘大筋繆短小筋弛長繆短為拘弛長為痿。大筋受熱則縮而短小筋得濕則引而長縮短故拘攣而不伸引長故痿弱而無力。內經。濕者土濁之氣首為諸陽之會其位高其氣清其體虛故聰明得以係焉濕氣熏蒸清道不適沉重而不爽利似乎有物以蒙冒之失而不治濕鬱為熱熱留不去熱傷血不能養筋故大筋為

拘攣濕傷筋不能束骨故小筋為痿弱也。研。濕

勝筋痿熱勝筋縮實者三花神祐丸。方。靦虛者宜

清燥湯。方。見。足。部。有氣如火從脚起下入腹此

二妙丸加味二妙丸。方。足。靦。單。蒼。木。丸。軀。首。如。裹

單蒼木膏最妙。方。內。傷。濕。病。腹。中。和。能。飲。食。病。在

頭中寒濕故鼻寒納藥鼻中則愈。瓜蒂末吹鼻中

出黃

水。研

單蒼木丸

常服除濕壯筋骨明目蒼木一斤米泔浸

一宿並焙乾為末神麴糊和丸菜豆大白湯下七

十九或加白茯苓六兩尤好。或為末每二錢

心鹽湯或酒調下亦得。研

二妙丸

治濕熱蒼木黃栢等分為末滴水為丸服之。研

濕温

濕温者兩脛逆冷胃腹滿多汗頭痛妄言其人嘗傷於濕因而中暑暑濕相搏則發濕温其脉陽濡

而弱陰小而急治在太陽不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此

死者醫殺之蒼朮白虎湯主之方見寒門。一人季夏得病胃項多汗兩足逆冷譫語予診之其脉

關前濡關後數是濕温蓋先傷暑後受濕也先用參白虎湯次服蒼朮白虎湯足漸温汗漸止三

日而愈軀。一人病遍身汗兩足冷至膝下腹滿不省人事六脉皆小弱而急孫曰此病傷暑陽微

厥也用五苓散白虎湯而愈凡陰病脛冷則臂亦冷此則脛冷而臂不冷所以知是陽微厥也孫。

濕温宜苓朮湯茯苓白朮湯。濕温與中暑同但身涼不渴耳婦。

苓朮湯

治胃暑遭雨暑濕鬱發四肢不仁半身不遂或入浴暈倒口眼喎斜手足不仁皆濕温類

也赤茯苓白朮乾薑澤瀉桂心
各一錢右剉作一貼水煎服

茯苓白朮湯

治濕溫赤茯苓蒼朮白朮乾薑桂心
甘草各一錢右剉作一貼水煎服

酒濕

酒濕之為病亦能作痺證口眼喎斜半身不遂渾
似中風重強語澁當瀉濕毒不可作風病治之而

汗也宜服
蒼橘湯

蒼橘湯

治酒濕蒼朮二錢陳皮一錢半赤芍藥赤茯苓
各一錢黃柏威靈仙羌活甘草各五分右

剉作一貼
水煎服

破傷濕

破傷入水濕口噤身強直牡蠣煨為粉
付瘡口仍取末二錢甘草湯調服

濕多身痛暑無身痛

暑病多無身痛蓋傷氣而不傷形
故也

難以轉側風濕之痛一身盡痛。地之濕氣感則害人皮肉筋脉蓋濕傷形形傷故痛納。濕流關節則一身盡痛。風濕相搏則骨節煩疼。濕則關節不利故痛其掣而不能屈伸者風也。

濕有內外之殊

濕有自外者有自內出者東南地多陰雨露霧濕從外入多自下起為重腿

脚氣之疾治當汗散久則宜踈通滲泄西北地高多食生冷濕麩乳酪飲酒濕氣內鬱為鼓脹浮腫之類宜通利二便。

濕病治法及通治藥

濕家治法大槩宜發微汗及利小便使上下分消其濕是其治也。

○治濕不利小便非其治也。○濕上甚而熱治以苦溫佐以甘草以汗為故而止平胃散。葛輩宜微汗用防已黃芪。○濕在中下宜利小

小便此淡滲治濕也五苓散主之。通小便爲上益脾順氣次之。子蒼木爲快宜用生附湯。二陳湯加桑白皮爲主上焦濕加羌活川芎蒼木中焦濕加猪苓茯苓澤瀉下焦濕加防已木通滑石熱則上加黃芩中加黃連下加黃栢。通

生附湯

治傷濕諸證又治寒濕蒼木杜仲各一錢半附子生牛膝厚朴乾薑白朮赤茯苓甘草各

七分右剉作一貼入

薑三棗二水煎服

滲濕湯

治一切濕證蒼木白朮赤茯苓各一錢半陳皮澤瀉猪苓各一錢香附子川芎縮砂厚朴

各七分甘草三分右剉作一貼入薑三片燈心一撮水煎服

濕病禁汗下及灸

凡濕病忌不得以火攻并轉利之若濕家下之則額上汗出微喘小便不

利者死下利不止者亦死。治濕不得猛發汗及灼艾灸之。濕病誤下則爲喘噦。誤汗則發

瘥而死。濕家不可汗。汗之則發瘥。發瘥者斃。又不可下。下之則額汗曾滿。微喘而噦。小便淋閉。

難以有

也。難也。

濕病大汗則成瘥

太陽病發汗太多因致瘥。濕家大發汗亦作瘥。蓋汗太多則亡陽不能養

筋。故筋脈緊急而成瘥。其證身熱足冷。頸項強急。惡寒時頭熱面赤。目赤。獨頭面搖。卒口噤。背反張。

者是也。亦名破傷風。

詳見風門。

單方

凡十

五種

蒼朮

治濕上下部皆可用研。○上焦濕用蒼朮其功甚烈。○能治山嵐瘴氣。○或湯或散或酒

浸常服最妙。○兩朮皆可服。

澤瀉

除濕之聖藥也。其功長於行水也。五苓散以澤瀉為君。其功可知。○

芎藭

能去卑濕風氣。或末服或煎服。皆可治上部濕。尤佳。○

防已

能治濕風口而喎斜木。通同功。剉煎服之。佳。○

藁本

辟霧露與木香同。霧露之氣治上部風濕。最佳。煎服之。○

茯苓

淡能利竅。甘以助陽氣。除濕之聖藥也。仙方有服餌之法。修製久服為佳。○

龜肉

除濕及瘴氣。作臠常服之。佳。○

鱉肉

主濕痺者熟取肉和五味作羹食之韃
○凡濕病宜食猪肉螺鱉之屬是也韃

木灰

主濕痺又治腰脚濕氣可煎服凡服或生食並佳韃

酒

辟霧露之氣。昔有三人晨行觸霧一人健一人病一人死健者飲酒病者食粥死者空腹蓋酒能

禦霧露辟邪氣故也韃

猪肝

勝濕可煮食之昔閔叔留寓常食猪肝蓋爲濕疾也韃

薏苡

去濕輕身勝瘴氣作末煮粥常服之昔馬援南征多載之卽此也韃

豺皮

主冷濕痺熟之以纏病上或裹軟脚良韃

土猪

主濕病取肉煮食又用皮坐卧其上最去濕痺韃

桑枝茶

去濕氣常服最好又與赤小豆同煮作粥常食尤佳

鍼法

濕病禁艾灸惟濕痺及濕熱脚氣痿證宜施鍼以通經絡之氣為佳

燥

燥因血少

內經曰諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥。火熱勝則金衰而風生緣風能勝濕能耗液

而為燥陽實陰虛則風熱勝于水濕而為燥也蓋肝主筋而風氣自甚又燥熱加之則筋太燥也燥金主於收斂其脉緊澁故為病勁強緊急而口噤也夫燥之為病血液衰少不能榮養百骸故也

脉法

傷燥脉濇。或浮而弦或芤而虛

燥者肺金之病

燥者肺金之本燥金受熱化以成燥澁由風能勝濕熱能耗液而成燥也燥於

外則皮膚皴揭癢痒燥於中則精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則便尿結閉宜當歸承氣湯

勝則津液涸竭故皮膚乾燥

燥宜養血

經曰燥者潤之養血之謂也積液固能生氣積氣亦能生液宜服瓊玉膏

方見身形。皮

膚皴揭拆裂血出大痛或皮膚癢痒爪甲浮起枯乾皆火爍肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎合生脉散加天門冬天花粉黃栢知母酒紅花生甘草之類嗽。榮衛枯涸濕劑所以潤之二門冬人參北五味子枸杞子同爲生脉之劑二黃元亦好

疎。燥病宜服瓊脂膏天門冬膏地仙煎生血潤膚飲。防風通氣散

能清熱潤燥

方見

當歸承氣湯

治燥之上藥也當歸大黃各二錢芒硝七分甘草五分右剉作一貼水煎入芒

稍攪化
服之類

瓊脂膏

治燥病生地黃二十斤搗取汁去渣白蜜二斤煎沸去沫鹿角膠酥油各二斤生薑二兩

搗取汁右先以慢火熬地黃汁數沸綿濾取淨汁又煎二十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎候如

錫磁器收貯每服

一二匙溫酒下傳

天門冬膏

治燥病天門冬生去心搗絞取汁濾去滓砂銅熬成膏酒服一二匙傳

地仙煎

治同上山藥一斤杵細杏仁一升研細生牛乳一升右同攪勻絞取汁盛磁瓶重湯煮一

口酒服
二匙傳

生血潤膚飲

治燥證皮膚折裂手足爪甲枯燥搔之屑起血出痛楚天門冬一錢半生地黃

熟地黃麥門冬當歸黃芪各一錢酒片苓瓜蒌仁
桃仁泥各五分升麻二分酒紅花一分五味子九
粒右剉作一
貼水煎服

單方

種凡四

山藥

生者治皮膚乾燥以此潤之
蒸食之或研煮粥服之

牛酪

作粥常服
最妙

天麥門冬

俱治燥病煎服或
作丸久服佳

生熟地黃

皆生血酒液作煎
作丸久服爲妙

火

火有君相之二

五行各一其性惟火有二曰君火人火也相火天火也火內陰而外陽主乎動

者也以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物故恒於動人有此生亦恒於動其所以恒於動者皆相火之所為也鍊○君火者乃真心小腸之氣所為也相火者乃心包絡三焦之氣所為也

火為元氣之賊

火能消物凡燦金虧土旺木涸水者皆火相也研○火之為病其害甚大其變

甚速其勢甚彰其死甚暴人身有二火曰君火猶人火也曰相火猶龍火也在氣交之中多動少靜凡動皆屬火化動之極也病則死矣○相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則死○又有臟腑厥陽之火根於五志之內六慾七情

激之其火隨起大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀則火起於肺心爲君主自焚則死矣火者元氣穀氣真氣之賊也火者元

脉法

火脉洪數虛則浮脉實數者右實熱浮而洪數爲虛火。脉沉而實大爲實火。洪數見於左寸爲心火。見於右寸爲肺火。見於左關爲肝心。見於右關爲脾火。見於兩尺爲腎經命門之火。男子兩尺洪大者必遺精陰火盛也。軀骨蒸勞熱脉數而虛熱而澁小必損其軀加汗加咳非藥可治。虛火浮數實火沉大隨其所見細數爲害。

辨五臟熱證

身熱有五而其狀各異

肝熱

肝熱者按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱也寅卯間尤甚其證四肢滿悶便難轉筋多怒多驚筋

痿不能起於床宜瀉青

丸方 觀柴胡飲子 疎

心熱

心熱者微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛之下則熱少加力按之則全不熱是熱

在血脉也日中太甚其證煩心心痛掌中熱

宜啗宜導赤散方 觀黃連瀉心湯方 東神部

脾熱

脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨亦不熱不輕不重在輕手重手之間此熱在肌肉遇夜尤甚其

證必怠惰嗜卧四肢不收無氣以動實熱則用瀉

黃散方 觀調胃承氣湯方 觀虛熱則用人參黃芪

散方 觀補中益

氣湯方 觀方 傷

肺熱

肺熱者輕手乃得微按全無管管然見于皮毛上日西尤甚乃皮毛之熱也其證必見喘咳洒淅寒

熱輕者宜瀉白散方 觀人參地骨

皮散重者白虎湯方 觀涼膈散方 疎

腎熱

腎熱者輕按之不熱重按至骨其熱蒸手如火如炙其證骨蘇蘇然如虫蝕其骨用熱不任亦不能

起于床滋腎丸方見六味地黃丸主之方親虛勞

柴胡飲子

治肝熱柴胡黃芩人參當歸赤芍藥大黃甘草各一錢右剉作一貼入薑三片水煎

服之

人參地骨皮散

治肺熱人參地骨皮柴胡生地黃黃芪各一錢半知母石膏各一錢赤茯苓

苓五分右剉作一貼入薑三煎服又治臟中積冷榮中熱脉按不足舉有餘乃陽有餘陰不足也

手按辨熱深淺

以手捫摸有三法輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也

按至筋骨之分則熱蒸手極甚輕摸之則不熱是熱在筋骨間也

不熱不輕不重按之則熱是熱在筋骨之上皮毛
 血脉之下乃熱在肌肉也以三黃丸通治之疎△
 輕手按之則熱甚重手按之不甚熱此熱在肌表
 宜清之重手按之熱甚而烙手輕手按之不甚熱
 此熱在肌肉之內宜發之衄

審臟腑熱之部分

內經曰心熱病者顏先赤顙脾熱病者鼻先赤肝熱病者左頰先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤△心居膈背心熱則胃熱肺熱則背熱△肝胆居脇肝熱則當脇亦熱△腎居腰腎熱則腰亦熱△胃居臍上故胃熱則臍以上亦熱△腸居臍下故腸熱臍

下亦熱

熱

火熱有實有虛

能食而熱口舌乾燥大便難者實熱也
 以辛苦大寒之劑下之瀉熱補陰脈洪

盛而有力者是已。燠△不能食而熱自汗氣短者
虛熱也。以甘寒之劑瀉熱補氣。脈虛弱無力者是
已。燠△五臟陰也。所主皆有形骨肉筋血皮毛是
也。此五臟皆陰。足陰足而熱。反勝之。是為實熱。若
骨痿肉燥。筋緩血枯。皮聚毛落者。陰不足而有熱
疾。是虛熱也。燠△脈實數者。實熱也。燠△實火內
外皆熱。口渴。晝日夜潮熱。大小便閉。熱在表。宜羌活
冲和湯。方見熱入裏宜調胃承氣湯。方見燥渴者
宜白虎湯。方見虛火潮熱有間口燥不渴。宜人
參地骨皮散。方見或補中益氣湯加芍藥黃柏。以
○實火可瀉。黃連解毒湯之類。
虛火可補。參朮生甘草之類。燠

熱有晝夜之分

晝熱則行陽。二十五度宜柴胡飲子。賁
上夜熱則行陰。二十五度宜四順清涼

飲。海○平旦發熱。熱在行陽之分。肺氣主之。故用
白虎湯。以瀉氣中之火。日晡潮熱。熱在行陰之分。

腎氣主之故用地骨皮散以瀉血中之火。夜則靜晝發熱者熱在氣分小柴胡湯加梔子黃連知母地骨皮晝則靜夜則發熱者熱在血分四物湯加知母黃栢黃連梔子柴胡牡丹皮翻。晝夜俱發熱熱在氣血之分四物湯合小柴胡湯加黃連梔子翻。氣分實熱白虎湯血分實熱四順清涼飲氣分虛熱清心連子飲方。瀉血分虛熱滋陰降火湯方。凡病晝病在氣夜病在血晝發少而夜發多者是大陽膀胱血中浮熱微有氣也有時而發有時而止知邪氣不在表不在裏知在經絡中也夜發多者是邪氣下陷之深嘗從熱入血室而論之宜瀉血湯退熱湯鍊

四順清涼飲

治血熱大黃蒸當歸赤芍藥甘草炙各一錢二分半右剉作一貼入薄荷十葉

水煎服方。一名清涼飲子方。

地骨皮散

治血熱及陽毒火熾渾身壯熱石膏二錢柴胡黃芩知母生地黃各一錢羌活麻黃

各七分半地骨皮赤茯苓各五分右剉作一貼入薑三片水煎服

瀉血湯

治夜間發熱生地黃酒洗柴胡各一錢熟地黃蒲黃丹參當歸酒洗防已酒洗羌活甘草

炙各七分桃仁泥三分右剉作一貼水煎服

退熱湯

治表中虛熱遇夜則甚黃芪一錢參分柴胡一錢生甘草黃連酒炒黃芩赤芍藥地骨皮

生地黃蒼朮各七分當歸身升麻各五分右剉作一貼水煎服

火有上中下三焦之異

熱在上焦者因咳為肺痿熱在中焦者為堅諸大便秘熱在下焦

者為尿血淋閉。上焦有熱則目赤腫頭項腫痛口舌生瘡。中焦有熱則胃膈煩躁飲食不美。

下焦有熱小便赤澀大便秘結。五臟俱熱。乃三焦熱也。即生癰癤瘡癩及五般痔疾。暈。

上焦熱

宜用涼膈散。方見龍腦飲子。抑青丸。清心湯。黃芩湯。清金丸。朱砂涼膈丸。九味清心丸。黃連清

膈丸。上清元清金降火丹。子芩散。

既濟解毒湯。疔親加減涼膈散。

龍腦飲子

治咽喉腫痛眼赤口瘡心煩鼻衄梔子微炒一兩二錢甘草蜜炙六錢石膏四錢瓜

萸根縮砂各二錢藿香葉二錢四分

右為末每二錢或三錢蜜水調下海

抑青丸

伐心經之火兼治酒熱黃連酒炒或薑汁炒右為末粥丸白湯吞下二十九丸。一名

黃連

丸

清心湯

治上焦積熱甘草一錢七分連翹梔子大黃酒蒸落荷黃芩黃連各七分朴硝五分右剉

作一貼入竹葉七片蜜少許
同煎至半入硝去滓溫服研

黃芩湯

治心肺蘊熱口瘡咽痛小便淋濁澤瀉梔子
黃芩麥門冬木通生地黃黃連甘草右剉作

一貼入薑五
片水煎服研

清金丸

治肺火片芩酒炒爲末粥丸白湯
下二三十丸海一名與點丸海

朱砂涼膈丸

治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟捨上
黃連梔子各一兩人參赤茯苓各五錢

朱砂三錢龍腦五分右爲末蜜丸
梧子大熟水下五七丸日三服疎

九味清心元

治心胃毒熱蒲黃二兩半犀角二兩黃
芩一兩半牛黃一兩二錢羚羊角麝香

龍腦各一兩石雄黃八錢金箔一千二百箔內四
百箔爲衣右爲末蜜丸兩作三十九金箔爲衣每

用一丸熟
水化下

黃連清膈丸

治心肺間熱麥門冬一兩黃連五錢鼠尾黃芩三錢右爲末蜜丸棗豆大溫水

下二三

十九九

上清元

治上焦風熱薄荷葉一斤縮砂四兩黃芩防風桔梗甘草各二兩右爲末蜜和兩作二十

丸每用一丸

含化嚥下

清金降火丹

治心肺虛熱天門冬麥門冬蓮實各一兩五味子五錢砂糖五兩龍腦三分右

爲末蜜和兩作二

十九含化嚥下

子芩散

涼心肺解勞熱黃芪一兩白芍藥黃芩人參白茯苓麥門冬桔梗生地黃各五錢右麤末

先用竹葉一握小麥七十粒薑三片水三盞煎至一盞半入藥末三錢再煎至七分去滓溫服調。

一方剉取一兩竹葉一握小麥

七十粒薑三片同水煎服調

加減涼膈散

退六經之熱又治熱在上焦連翹二錢甘草一錢半梔子黃芩桔梗薄荷竹葉

各五分右剉作一貼水煎服調。涼膈散去大黃

芒硝加桔梗倍甘草或加防風同爲舟楫之劑浮

而上之治胃膈中與六經之熱以手足少陽之氣

俱下膈絡胃中三焦之氣同相火遊付於身之表

膈與六經乃至高之分此藥浮載亦至高之劑故

能於無形之中隨高而走去胃膈中及六經熱也

錫。一名

桔梗湯錫

中焦熱

宜調胃承氣湯方見洗心散四順清涼飲方見上當歸龍薈丸方觀桃仁承氣陽方白朮除

濕湯既濟
清神散

洗心散

治中焦有熱頭目昏重咽喉腫痛口舌生瘡
五心煩熱便尿秘澁麻黃當歸大黃荆芥穗

赤芍藥甘草各一錢白木五分右
剉作一貼入薄荷七葉水煎服

白木除濕湯

治中焦有熱午後發熱尿黃沉困及汗
後發熱白木一錢三分生地黃地骨皮

澤瀉知母各一錢赤茯苓人參柴胡
甘草各八分右剉作一貼水煎服

既濟清神散

治中焦熱清上實下枯梗黃芩赤茯苓
川芎梔子當歸羌活白木各一錢知母

薄荷甘草各五分右剉作
一貼煎水調蜜一匙服

下焦熱

宜用大承氣湯寒方立效散八正散妨五苓
散寒方防風當歸飲子黃柏丸回金丸佐金丸

立效散

治下焦結熱小便赤黃淋瀝瞿麥四錢梔子炒二錢甘草一錢右剉作一貼入連根葱白

七箇生薑七片燈心

五十莖同煎服

五苓散

治腎氣內虛邪熱流入於腎經尺脉洪大小便頻澀赤濁而痛宜以瞿麥燈心煎湯調五

苓散滲泄其熱則勿

藥有喜方直見寒門

防風當歸飲子

瀉心肝火補脾腎陰治風熱燥熱濕熱補虛之良劑也滑石三錢柴胡人

參赤茯苓甘草各一錢大黃當歸赤芍藥防風各

五分右剉作一服入薑三片水煎服。大黃瀉

陽明之濕熱從大便出滑石降三焦之妄火從小

便出黃芩以涼膈防風以清頭目人參甘草以補

氣當歸芍藥以補血無半

味辛香燥熱之謬藥也

黃栢丸

去腎經火燥下焦濕及陰火氣從臍下起者黃栢一味炒褐色爲末水丸服之空心服。

一名大補丸

回金丸

伐肝火黃連六兩吳茱萸一兩右爲末蒸餅和丸梧子大空心白湯下三五十九丸。一

名黃連丸

佐金丸

佐肺金以伐肝木之火片芩六兩吳茱萸一兩右末蒸餅丸服如上法。

通治三焦火

宜用三黃湯三黃丸方見三補丸加味金花丸清心丸大金丸黃連解毒湯。

防風通聖散
寒方
門見清火湯

三補丸

去三焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃栢各等分右爲末蒸餅和丸梧子大空心白湯下五

七十
九冊

加味金花丸

瀉三焦火止嗽化痰清頭目黃連黃栢黃芩並酒炒梔子各一兩大黃煨人參

半夏桔梗各五錢右爲末滴水爲丸梧子大茶清下三十九脇

清心丸

治三焦熱黃栢生二兩天門冬麥門冬各一兩黃連五錢龍腦一錢右爲末蜜丸梧子大

臨卧薄荷湯吞
下一二十九丸

大金花丸

治三焦火熱黃連黃栢黃芩大黃各等分右爲末水丸小豆大溫水下二三十九丸

○去大黃加梔子名曰梔子金花丸又名旣濟解毒丸疔

清火湯

治三焦熱大黃酒蒸一錢半桔梗玄參各一錢二分連翹梔子炒芒硝片芩酒炒黃連酒

炒貝母天花粉獨活前胡柴胡赤茯苓枳殼各一錢薄荷羌活川芎各八分防風六分甘草四分右

判分作二貼

水煎服

積熱

臟腑積熱頰赤煩渴口舌生瘡五心煩躁便尿秘澁或溫壯連滯致生瘡癩癰疽。欲去積熱三

黃湯元第一藥耳凡熱皆出於心熱甚則能傷血

熱出於心洗心散坊見所不可闕熱能傷血四順

清涼飲坊見又不可無也若酒後之麪飯後之酒

最易生熱又當防於未然。積熱宜用三黃湯

三黃元加減三黃元坊見清涼隔

散紫雪紅雪通中散妙香丸

三黃元

治三焦積熱大黃煨黃芩黃連各等分右爲末蜜丸梧子大熟水下三五十九空心曠

三黃湯

治同上以三黃元材每取錢半判作一貼水煎服

涼膈散

治積熱煩躁口舌生瘡目赤頭昏腸胃燥澀便尿秘結連翹二錢大黃芒硝甘草各一錢

薄荷黃芩梔子各五分右剉作一貼入青竹葉七片蜜少許同煎至半入硝去滓服煑

紫雪

治一切積熱口舌生瘡狂易叫走內外煩熱不解及野道熱毒黃金十兩寒水石石膏各四兩

八錢玄參一兩六錢犀角羚羊角各一兩甘草八錢升麻六錢沉香木香丁香各五錢以水五升先

煮黃金及二石至三升入諸藥再煎至一升去滓入芒硝三兩二錢慢火煎以柳枝不住手攪候欲

凝入磁盆中更下朱砂麝香末各三錢急攪不住凝冷凝成紫雪每取一錢細細嚙之或以井水調

錢一

紅雪通中散

治積熱除毒熱開三焦利五臟口瘡重舌喉閉腸癰等證朴硝八兩蘇木六錢

黃芩升麻羚羊角各三錢赤芍藥人參檳榔枳殼
竹葉木香甘草各二錢梔子葛根木通桑白皮藍
葉大青各一錢半朱砂一錢麝香五分右除朴硝
朱砂麝香外細剉以水二升五合同煎至九合濾
去滓煎沸下朴硝以柳枝不住手攪候凝次下朱
砂麝香末盛磁器中經宿卽成每取一二錢新汲
水調下

妙香丸

治積熱潮熱解五毒朱砂九錢牛黃龍腦膩
粉麝香各三錢巴豆三十二箇去皮心膜炒

去油熟研金箔九片右合研勻煉黃蠟六錢八白
沙蜜少許和勻兩作三十九丸每用一丸米飲或涼
水吞下取轉下一切惡毒涎如要藥速行以鍼刺
一眼子冷水浸少時服其效更速也。此疎決腸
胃制伏木火
之劑也

骨蒸熱

蒸病有五。一曰骨蒸，其根在腎。二曰脉蒸，其根在心。三曰皮蒸，其根在肺。四曰外蒸，其根在脾。

五曰內蒸，其根在五臟。六腑蒸病皆因陰氣不足，血氣不榮，骨蒸枯竭而得之。腎主骨，以其先從骨。

熱，故曰骨蒸。凡嗜慾無節，勞傷過度，真水

枯竭，陰火上炎而發，蒸蒸之燥熱。古方名曰蒸病。

其證咳嗽發熱，咯血吐痰，白濁白淫，遺精盜汗，精

神恍惚，日漸羸，漸成勞劇，癰。肺蒸鼻乾，大

腸蒸，右鼻孔痛。皮蒸，舌白唾血。膚蒸，昏昧嗜

卧。氣蒸，鼻乾喘促，氣熱。心蒸，舌乾。小腸蒸

下唇焦。血蒸，髮焦。脉蒸，唾白浪，語脉緩急不

調。脾蒸，唇焦。胃蒸，舌下痛。肉蒸，食無味而

嘔煩燥不安。肝蒸，眼黑。膽蒸，眼白失色。筋

蒸，爪甲焦。三焦蒸，乍熱乍寒。腎蒸，兩耳焦。

膀胱蒸，右耳焦。腦蒸，頭眩熱悶。髓蒸，髓枯骨

中熱。骨蒸，齒黑，腰痛，足逆冷。臀蒸，肢細，跖腫。

臟腑皆熱 胞蒸小便黃赤俱宜五蒸湯五蒸丸

麥煎散地骨皮散驚甲飲補天九逍遙散婦規地

仙散團魚散。骨蒸發熱積病最多先服荆蓬煎

積聚後服清骨散暗合妙理。婦人骨蒸四

物湯加地骨皮牡丹皮煎服牡丹皮瀉包絡火地

骨皮去腎火。骨蒸用柴前梅連散人參清肌散

。氣血虛甚發熱成勞補天九加骨蒸藥佐之

知母黃栢地骨皮麥門冬秦艽青蒿鱉甲石膏竹

葉烏梅之類是也

傳正

骨蒸不治證

骨蒸之極聲嘎咽痛面鰲脉躁直視汗出

珠。其或骨間有熱以至四肢緩弱不

舉此則骨委欲斯疾之有瘳也艱哉

五蒸湯

治骨蒸潮熱脉數口乾煩躁石膏二錢生地黃乾葛各一錢半人參知母黃芩赤茯苓各

一錢甘草生五分右剉作一貼入竹葉
七片粳米一合小麥二合同煎服

五蒸丸

治同上青蒿童便浸地骨皮生地黃石膏各
一兩當歸七錢胡黃連五錢鱉甲一片右爲

末蜜丸梧子大每七

十九小麥煎湯下

麥煎散

治骨黃瘦口臭肌熱盜汗赤茯苓當歸乾漆
鱉甲醋炙常山大黃煨柴胡白朮生地黃石

膏各一兩甘草半兩右麤末每

服三錢小麥五十粒同煎服

地骨皮散

治骨蒸潮熱地骨皮秦艽柴胡枳殼知母
當歸鱉甲醋炙各一錢川芎甘草各五分

右剉作一貼入桃柳枝各七分薑三片

烏梅一箇同煎服。一名鱉甲飲

補天丸

治陰虛骨蒸發熱羸瘦紫河車洗淨以布絞
乾用補腎丸虛覲藥末擣細焙乾再研爲末

酒煮米糊和丸梧子大每服七八十九夏加五味子研

地仙散

治骨蒸肌熱一切虛煩地骨皮四錢防風一錢人參甘草薄荷各一錢右剉作一貼入竹

葉五片薑三片水煎服。一方有麥門冬一錢烏梅一箇無薄荷。人年四十以下患勞怯且不

必補只先退潮熱調理可愈此方退熱如神

團魚散

治骨蒸潮熱咳嗽貝母前胡知母杏仁柴胡各等分團魚二箇鱸右藥同團魚煮熟熟提

起去頭取肉連汁食之却將前藥焙乾爲末就用團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥爲丸梧子大煎

黃芪湯虧覲吞下病安仍服黃芪益損湯虧覲調理

清骨散

初覺五心煩熱欲成勞療骨蒸如神生地黃柴胡各二錢熟地黃人參防風各一錢薄荷

七分秦艽赤茯苓胡黃連各五分右剉作一貼水煎服

柴前梅連散

治骨蒸勞熱久而不痊三服除根柴胡前胡烏梅胡黃連各二錢右剉作一貼

取童尿二盞猪胆一枚猪脊髓一條韭白半錢煎至一盞去滓服此劫劑也胃虛量用之

人參清肌散

治虛勞骨蒸潮熱無汗人參白朮白茯苓赤芍藥當歸柴胡葛根半夏麴各一

錢甘草五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服。一方有黃芩

五心熱

五心煩熱者是火鬱於地中也四肢者脾土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故也火鬱

則發之是也。凡男女四肢熱肌熱筋熱骨髓中熱如燎捫之烙手此熱伏土中由血虛而得或過食冷物抑遏陽氣於脾土之中火鬱則發之宜升陽散火湯火鬱湯。虛損手心脚心發熱不

可當加減小柴胡湯主之。鑿。兩手大熱如火是為骨厥。錕。五心之熱小兒傷食證也。大人亦

然

升陽散火湯

治火鬱及五心煩熱升麻乾葛羌活獨活白芍藥人參各一錢柴胡甘草各六

分防風五分甘草生四分右剉作一貼水煎服。一名柴胡升麻湯。

火鬱湯

治同上羌活升麻乾葛白芍藥人參柴胡甘草各一錢防風五分右剉作一貼入葱白三

寸水煎服。

加減小柴胡湯

治手足心熱不可當本方加香附黃連前胡水煎服。

一方

治手足心熱神妙梔子香附蒼朮白芷半夏麴川芎各等分右末神麴丸服。

潮熱

潮熱者有時而熱不失其時寒熱者寒已而熱在繼而發至於發熱則無時而熱也

為內傷為虛潮熱無時為外感為實

熱者熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯

以瀉氣中之火。日晡潮熱者熱在行陰之分腎

氣主之故用地骨皮飲地骨皮散也以瀉血中之

火。無汗潮熱宜補中益氣湯方見。血虛有汗潮

熱宜人參養榮湯方見。血虛無汗潮熱宜茯苓

補心湯方見。氣血兩虛無汗潮熱宜茯苓補心

湯。氣血兩虛有汗潮熱宜加減逍遙散。血虛

夜分潮熱宜四物二連湯。參蘇飲大解潮熱將

欲成勞痰咳喘

熱最效見寒門醫鑒

加減逍遙散

治子午潮熱逍遙散本方婦人加吳黃連麥門冬地骨皮黃芩秦艸木通車前

子各等分右剉入燈
心一撮同煎服鑿

四物二連湯

治夜分潮熱四物湯本方加黃連
吳黃連各等分右剉同煎服鑿

虛煩

心虛則煩心又肝腎脾虛亦煩心經曰夏脉者心
也不及則令人煩心又云脾虛肝虛腎虛皆令人

體重煩寃是知煩多生于虛也蓋金攻肝虛土攻
腎虛木攻脾虛而爲煩也綱。虛煩者心曾煩擾

而不寧也內經曰陰虛則內熱今之虛煩多是陰

虛生內熱所致虛勞之人腎虛心旺反傷寒吐下

後霍亂吐瀉後津液枯竭多有虛煩之證鑿。獨

熱者虛煩也與傷寒相似但頭身不痛脉不緊數

爲異宜竹葉石膏湯方。虛勞白利手足

冷宜用既濟湯方。虛煩宜橘皮湯人參竹葉湯

淡竹

茹湯

既濟湯

治霍亂後虛煩自利手足冷即竹葉石膏湯去石膏加炮附子二錢也門人

橘皮湯

治虛煩橘皮三錢青竹茹甘草各一錢人參三分右剉作一貼入薑三棗二煎服恬

人參竹葉湯

治虛煩石膏麥門冬各一錢半夏一錢人參甘草各五分竹葉七片右剉作一

貼入薑五片粳米一撮同煎服研

淡竹茹湯

治心虛煩悶麥門冬小麥各二錢半夏一錢半人參白茯苓各一錢甘草五分右剉

作一貼入薑五片棗二枚青竹茹一塊煎服細

上升之氣屬火

病人自言冷氣從下而上者非真冷氣也此上升之氣自肝而出中挾相火自

下而上其熱為甚自覺其冷者此火極似水積熱之甚也陽亢陰微故見此證冷生氣者出于高陽

生之謬言也。研。氣從左邊起者肝火也。氣從臍下起者陰火也。氣從脚下起入腹如火者乃虛之極也。蓋火起于九泉之下，十不救一。研。凡氣有餘，便有火不足者，是氣虛。研。氣從左邊起，宜回金丸。方見當歸龍薈丸。方見氣從臍下起，宜黃柏丸。方見坎離丸。方見氣從脚下起，宜用四物湯加黃柏、知母、並鹽炒，或滋陰降火湯。方見外丹附子末，津調，晉涌泉穴，引下其熱。研。

惡熱惡寒

惡熱非熱，明是虛證。惡寒非寒，明是熱證。研。經曰：陰虛則發熱，夫陽在外為陰之衛，陰

在內為陽之守，精神外馳，嗜慾無節，陰氣耗散，陽無所附，遂致浮散于肌表之間，而惡熱當作。陰虛治之，細。經曰：惡寒戰慄，皆屬于熱原病。式曰：病熱而反覺自冷，實非寒也。古人遇戰慄之證，有以大承氣下燥糞而愈者，明是熱證耳。細。惡寒者，雖當炎月，若遇風霜重綿在身，自覺凜凜戰慄，惡

寒之甚也。綱。痼冷之病，豈非身惡寒而口喜熱之病耶？殊不知濕氣積中，抑遏陽氣，不得外泄，身必惡寒。劉河間曰：火極似水，故見此證也。宜吐，出痰涎，赤小豆、苦參爲末，薑水調服，探吐之。後用川芎、南星、蒼朮、酒芩爲末，神麴糊丸服。陽虛惡寒，四君子湯，氣弱減茯苓倍，加黃芪、桂枝，或加附子少許。陰虛惡寒，發熱二陳湯合四物湯，加知母、黃柏、地骨皮、呶。

陰虛惡熱

一人脚自踝以下覺常熱，冬不可加綿于上，常誇稟質壯，不怕冷。予曰：此足三陰之

虛宜早斷慾事，以補養陰血，庶乎可免。彼笑而不答。年近五十，患痰而死。

積熱惡寒

一婦人身冷惡寒，六月重裘猶覺寒泄泄，不止。脉如橫繩，有力。予以涼布熨心，以新汲水淋之。其人呼叫殺人，猶不止。連灌三四十桶，大戰汗出昏困，一二日而所苦皆除。漢華佗北齊

徐文伯亦治痼寒人候冬寒月以冷水發之此其法也

亡血致惡寒發熱

病人脈微而澁者其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛

熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裡胃中發熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲澁故知血亡也

陽虛外寒陽盛外熱

黃帝問曰陽虛生外寒柰何岐伯曰陽受氣于上焦以溫皮膚分肉

之間今寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留于外故寒慄。帝曰陽盛生外熱柰何岐伯曰上焦不通利則皮膚致密腠理閉塞交府不通衛氣不得泄越故外熱

陰虛內熱陰盛內寒

黃帝問曰陰虛生內熱柰何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛

上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏膈中故內熱黃帝曰陰盛生內寒柰何岐伯曰厥氣上逆寒

氣積于胃中而不瀉不瀉則溫氣去寒氣留則血凝澁凝則脈不通其脈盛大以濇故中寒綱

辨陽虛陰虛二證

陽虛陰虛二證丹溪辨之明矣何則晝夜發熱晝重夜輕口中無味陽虛

之證也午後發熱夜半則止口中有味陰虛之證也陽全陰半陽得以兼陰陰不得以兼陽自然之

理也陽虛之證責在胃陰虛之證責在腎蓋飢飽傷胃則陽氣虛矣房勞傷腎則陰血虛矣古人以

飲食男女為切要厥有旨哉以藥論之甘溫則能補陽氣苦寒則能補陰血如以四君子補氣四物

補血是也若氣血兩虛但以甘溫之劑以補其氣氣旺則能生血也若只血虛而氣不虛則忌用甘

溫之劑以補氣氣旺則陰血愈消矣故陽虛之與
 陰虛甘藥之與苦藥不可不慎也虧。氣虛熱升
 陽以散之四君子湯補中益氣湯益胃升陽湯並
 內。血虛熱滋陰以降之四物湯加芩連梔子或
 滋陰降火湯坎離丸。氣血俱虛熱升陽滋陰兼
 用十全大補湯人參養榮湯加知母黃柏並見虛

門。血虛發熱宜
 當歸補血湯疎

當歸補血湯

治肌熱大渴目赤面紅其脈洪大而虛
 重按全無經曰血虛發熱是也證似白

虎惟脈不長實為辨耳誤服白虎湯必死宜用此
 黃芪五錢當歸二錢右剉作一貼空心水煎服疎

。一名歸

芪湯人

飲酒發熱

飲酒發熱黃連解毒湯加葛根主之方見寒
 景。因酒發熱用青黛瓜萸仁為末入薑汁仲

陰虛內熱陰盛內寒

黃帝問曰陰虛生內熱柰何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛

上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏膈中故內熱

○黃帝曰陰盛生內寒柰何岐伯曰厥氣上逆寒

氣積于胃中而不瀉不瀉則溫氣去寒氣留則

血凝澁凝則脈不通其脈盛大以濇故中寒綱

辨陽虛陰虛二證

陽虛陰虛二證丹溪辨之明矣何則晝夜發熱晝重夜輕口中無味陽虛

之證也午後發熱夜半則止口中有味陰虛之證

也陽全陰半陽得以兼陰陰不得以兼陽自然之

理也陽虛之證責在胃陰虛之證責在腎蓋飢飽

傷胃則陽氣虛矣房勞傷腎則陰血虛矣古人以

飲食男女爲切要厥有旨哉以藥論之甘溫則能

補陽氣苦寒則能補陰血如以四君子補氣四物

補血是也若氣血兩虛但以甘溫之劑以補其氣

氣旺則能生血也若只血虛而氣不虛則忌用甘

溫之劑以補氣氣旺則陰血愈消矣故陽虛之與
 陰虛甘藥之與苦藥不可不慎也虧。氣虛熱升
 陽以散之四君子湯補中益氣湯益胃升陽湯
 內。血虛熱滋陰以降之四物湯加芩連梔子或
 滋陰降火湯坎離丸。氣血俱虛熱升陽滋陰兼
 用十全大補湯人參養榮湯加知母黃柏並見虛
 門。血虛發熱宜
 當歸補血湯煉

當歸補血湯

治肌熱大渴目赤面紅其脈洪大而虛
 重按全無經曰血虛發熱是也證似白

虎惟脈不長實為辨耳誤服白虎湯必死宜用此
 黃芪五錢當歸二錢右剉作一貼空心水煎服煉

。一名歸

芪湯人

飲酒發熱

飲酒發熱黃連解毒湯加葛根主之方見寒
 景。因酒發熱用青黛瓜蒌仁為末入薑汁

每日服數匙三日而安。研。酒熱內鬱而惡寒者黃芪一兩葛根五錢水煎服大汗而愈。凡發熱人極忌飲酒。飲酒人發熱者難治。不飲酒人因酒發熱者亦難治。

滯血發熱

其人脈澁必有漱水之證必有嘔惡痰涎之證必有兩脚厥冷之證亦有小腹結急之證

或唾紅或鼻衄宜以柴胡黃芩佐以川芎白芷桃仁五靈脂更加大黃濃蜜使滯血一通黑物流利則熱不復佐矣。

陰虛火動

凡發熱咳嗽吐痰咯血午後至夜發熱面赤唇紅小便赤澁便是陰虛火動也。

盜汗咳嗽痰盛咯唾血氣力困怠形容消瘦腰痛脚痿遺精夢泄皆陰虛火動之證也。陰虛火動宜滋陰降火湯清離滋坎湯後服滋陰清火膏。六味地黃丸。方觀愈後用坎離既濟丸乃收。

功保後之藥也。凡△四物湯加知母、黃栢、並鹽水炒，是降火補陰之妙劑。甚者加龜板、研△陰火動。宜滋陰降火湯、清離滋坎湯、清肺滋陰散、陰虛生內熱湯、補陰瀉火湯、補陰丸、六味地黃丸、虧覲坎離膏、先坎離丸、後坎離丸、既濟丸。

滋陰降火湯

治陰虛火動、睡中盜汗、午後發熱、咳嗽痰盛、咯唾血、飲食少思、肌肉消瘦、將成

勞瘵。白芍藥一錢三分、當歸一錢二分、熟地黃麥門冬、白朮各一錢、生地黃酒炒八分、陳皮七分、知母、黃栢並鹽水炒、甘草炙五分、右剉作一貼，入薑三片、棗二枚、水煎服。翻

清離滋坎湯

治陰陽火動、潮熱盜汗、痰喘、心荒、熟地黃生乾地黃、天門冬、麥門冬、當歸、白芍

藥、山茱萸、山藥、白茯苓、白朮各七分、牡丹皮、澤瀉、黃栢、知母並蜜水炒、甘草炙各五分、右剉作一貼。

水煎空
心服

清肺滋陰散

治酒色傷肺久成陰虛火動咽喉生瘡失聲痰嗽喘急煩熱不睡少食生地黃

一錢半白芍藥八分川芎白朮炒陳皮黃栢蜜炒
知母貝母麥門冬地骨皮各五分白茯苓款冬花
紫苑遠志各四分五味子酸棗仁各三分黃連炒
甘草炙各二分右剉作一貼入薑三片水煎調竹
瀝五匙
溫服

陰虛生內熱湯

治陰虛煩熱火動等證當歸川芎蒼朮陳皮各八分白朮麥門冬沙參各

七分白芍藥梔子天花粉各六分玄參五分黃栢
三分甘草二分右剉作一貼入薑三片水煎服久

服去川芎冬月
加破故紙門入

補陰瀉火湯

治陰虛火動潮熱盜汗痰嗽咯血脈沉數肌肉消瘦白芍藥當歸白朮各一錢

三分川芎熟地黃知母蜜炒天門冬各一錢黃柏蜜炒陳皮各七分生地黃酒洗甘草炙各五分乾

薑炒紫色三分右剉作一貼入薑三片水煎服

○一方無白朮名補陰散朮雖云在血從血在氣從氣其實不可與腎經藥同用王節齋以白朮入補陰內用恐高明者亦未及悟也宜去之

補陰丸

治陰虛火動凡人陰常不足陽常有餘故常補其陰使陰與陽齊則無病矣故補陰之藥

自少至老不可缺也熟地五兩黃栢鹽酒炒炒褐色知母酒炒龜板酥炙各三兩瑣陽酥炙枸杞子

白芍藥酒炒天門冬各二兩五味子一兩乾薑炒紫色四錢冬寒加至六錢右爲末煉蜜入猪脊髓

三條和勻丸如梧子每取八九十九丸空心鹽湯或溫酒吞下

坎离膏

治陰虛火動潮熱盜汗咯唾血欲成勞瘵疾黃栢知母各四兩生地黃熟地黃天門冬麥

門冬各二兩杏仁七錢胡桃仁蜂蜜各四兩右剉

先將黃栢知母以童便三椀水三椀側栢葉一把

煎至三四椀去滓又將天門冬生熟地黃入汁汁

內添水二椀煎汁去滓再搗爛如泥另用水一二

椀煎熬絞取汁入前汁將杏仁胡桃仁用水搗爛

濾汁再搗再濾至無滓同蜜入前汁內火熬成膏

人水內去火毒服三五匙以側

栢葉湯調空心服忌銅鐵器鹽

先坎离丸

治虛火動遺精盜汗潮熱痰嗽黃栢知母等分用童便浸九蒸九晒九露為末以地

黃煎膏和九梧子大每五七十九空

鹽或溫酒下脾弱者山藥糊和丸

後坎离丸

治同上四物湯四味各二兩加知母四兩黃栢八兩用鹽水人乳蜜水清酒浸黃栢

各二兩知母各浸一兩過一宿取出知栢日晒夜
露三晝夜入四物同爲末蜜丸梧子大空心鹽湯
下八九十九冬則溫酒下此藥取天一
生水地二生火之意能升水降火

坎離既濟丸

治陰虛火動勞損之疾當歸酒洗六兩
熟地黃生地黃酒洗天門冬麥門冬山

茱萸牛膝酒洗各四兩白芍藥酒洗五味子山藥
龜板酥炙各三兩知母酒浸二兩鹽水浸二兩黃
栢酒洗二兩蜜水炒三兩鹽水炒三兩川芎一兩
右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下五六十丸

陰虛火動者難治

近世陰虛火動之疾十無一活何
也蓋其始也飲食如舊起居如常

惟痰嗽一二聲自謂無恙諱疾忌醫滅身無悟及
蔓日久倒卧於床而堅冰已至不可復救余云意
揆之方疾之始必致謹於三事而後可三者維何
一要遇明醫二要肯服藥三要守禁戒三者缺一

不可治

也

制火有方

儒者立教曰正心收心養心皆所以防此火之妄動也又醫者立教曰恬澹虛無精神內

守亦所以遏此火之動於妄也。澹。火不妄動動由於心靜之一字其心中之水乎。神靜則心

火自降慾斷則

腎水自升

退熱有法

退熱之法全在清心必用麥門冬燈心草白朮茯苓蓋心者一身之主宰而萬事之本根

萬令從心心不清則妄動而熱不退然熱能傷血

血滯則氣鬱而熱愈不退退熱之法又在調血法

用川芎當歸若夫陽浮于外則當斂以降之法用

參苓白朮散防齶薑棗煎服。凡熱皆出于心

心血不可不清麥門冬不可缺也以燈心草爲引

下。凡壯熱煩躁用柴胡黃芩大黃解利之其

熱不退宜用黃芩川芎甘草烏梅作劑又黃連生
地黃赤茯苓入燈心一捻煎服其效甚速蓋川芎

生地黃皆能調血心血一調其熱自退

縮。駱降吉曰風火既熾當滋腎水疎

臟腑瀉火藥

君火者心火也可以濕伏可以水滅黃連
之屬可以制之相火者龍火也不可以水

滅惟從其性而伏之黃柏之屬可以降之研。上

焦熱用梔子片芩。中焦熱用黃連芍藥。下焦

熱用黃柏大黃。黃連瀉心火黃芩瀉肺火白

芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火黃連佐之知母瀉腎之

火。木通瀉小腸火條芩瀉大腸火柴胡瀉胆火

黃連佐之石膏瀉胃火黃柏瀉膀胱火。主治

各經熱藥肝氣柴胡血黃芩。心氣麥門冬血黃

連。脾氣白芍藥血大黃。肺氣石膏血梔子。

腎氣玄參血黃柏。胆氣連翹血柴胡。胃氣葛

根血大黃。大腸氣連翹血大黃。小腸氣赤茯苓

苓血木通。膀胱氣滑石血黃柏。包絡氣麥
門冬血牡丹皮。三焦氣連翹血地骨皮。

通治火熱藥法

除熱瀉火非甘寒不可也。有大熱脈洪
大服苦寒劑而熱不退者加石膏。燥。

火妄動夏月用益元散。勸。鎮。墜之妙。心。虛熱
用荆芥薄荷梔子黃芩若實熱用大黃芒硝。燥。
實火可瀉黃連解毒湯之類。虛火可補參朮生甘
草之類。心。火盛者不可湊用寒涼必兼溫散。心
。火急盛者必緩之生甘草兼瀉兼緩參朮亦可
。火盛顛狂人壯氣實者可用正治水水之類
飲之人虛者飲以生薑湯若投水水正致立死。心
。補陰則火自降炒黃柏生地黃之類。心。膀胱
有火邪并下焦有濕熱用防己草龍胆黃柏知母
之類。心。黃連黃芩白芍藥柴胡知母此皆苦寒
之味能瀉五臟有餘之火耳若內傷勞倦爲陽虛
之病以甘溫之劑除之如參芪甘草之屬若相火

熾盛日漸煎熬爲血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極爲陽強之病以鹹冷之劑拆之如大黃朴硝之屬若腎水受傷真陰失守爲陰虛之病以附朮之主制之如生地黃玄參之屬若命門火衰爲陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾薑之屬若腎虛食冷鬱遏陽氣爲火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬

○火熱通治宜防風通聖散黃連解毒湯

防風通聖散

此方治熱風燥三者之總劑也蓋風本于熱熱極則風生燥生于風風動則燥

至其實一源流也此方能兼之其用防風麻黃薄荷荆芥使熱邪從玄府出也梔子滑石使熱邪從小便出也大黃朴硝使熱邪從大便出也其餘黃芩散肺火連翹散心火石膏散胃火芍藥散脾火川芎當歸和血潤燥白朮甘草補脾和中桔梗開膈可謂善于處方也

方見心門

黃連解毒湯

通治火熱及大熱煩燥及三焦實火本方藥加連翹柴胡赤芍藥各一錢右

判水煎服

單方

凡四十五種有單石膏丸玉液丸清金丸荆黃湯柔金丸山梔丸甘豆湯

石膏

除三焦火熱及胃熱身熱煩渴石膏四兩甘草二錢半研如粉水服二錢日再亦治骨蒸熱。

蒸病五日內蒸所以言內者其根在五臟六腑之中也骨肉自消食飲無味皮燥無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起宜服此藥以體涼為度。專治胃火及食積痰火煨為末醋糊丸如菉豆米飲

下三十九名曰單石膏丸一名玉液丸

地黃

治骨蒸熱取汁每服一二合以體涼為度或取汁投白粥攪勻空心服

采胡

治熱勞骨節煩疼判
取三錢水煎服之

荷

治骨蒸熱勞煮取汁服或生搗汁
飲之又取汁熬為膏和眾藥

知母

治有汗骨蒸又瀉腎火
水煮飲之或作丸服

芩

主熱毒骨蒸取片芩酒炒服
門冬膏為丸服名曰清金丸
條子能瀉大腸

之火煎服丸
服並佳

蓮

治一切熱血熱酒熱判
盛磁碗熏湯煮取清汁

女黃

蕩滌實熱血熱及臟腑
癰大黃一兩荆芥四兩
又風熱生瘡

青蒿

主骨蒸熱勞為最水者
服之或作丸服並佳

地骨皮

善解骨蒸肌熱能涼血涼骨
剉取三錢水煎服日二三湯

桑椹

治小腸熱及熱生瘡癩取黑椹搗取汁入
瓦器熬成膏入煉蜜攪勻每服二三匙研

黃柏

主五臟腸胃中結熱又瀉腎火
及膀胱火作丸或煎服並佳韮

竹葉

除煩熱水煎飲之△竹瀝能
療胃中大熱煩悶取飲之韮

梔子

主積熱心躁又瀉三焦火水煎飲之△又取仁
炒黑爲末麩糊和丸服名曰柔金丸若蜜和爲

丸名曰山梔丸又
能去心胸煩熱門入

牡蠣

去煩熱取肉作膾
和姜醋食之韮

蜆肉

去暴熱下熱氣
和姜醋生食韮

蛇肉

除煩解熱毒
服如上法

田螺

去腹中結熱
煮食飲汁佳

鼃

解勞熱及熱毒
煮食飲汁佳
此水中蛙也

鱉

除骨蒸及骨節間勞
取肉作臠和五味
其之又甲炙黃爲末
酒服二錢

鮮薑

胃中熱結生取
薑醋食之

烏梅

除骨蒸去煩熱
水煎作茶飲

藕

解熱毒除煩熱
蒸食生食並佳

梨

除渴熱止心煩
可常食之
△風熱心煩
取梨三枚砂糖半
兩水煎服不俱時

爾猴桃

解煩去實熱取雞和它作煎常食之

脂油

下熱毒甚良麻油三合雞子二枚芒硝三錢攪服之少時即下

黑苳

去一切熱毒煩渴大小便秘澀黑豆二合甘草二錢生薑七片水煎服名曰甘豆湯

菜荳

壓熱可煮食之作粥良△菜豆粉除熱毒

甜瓜

除煩熱去皮食後吃之

西瓜

清心利小腸熱可常啖之

冬瓜

除積熱解毒熱止煩燥作羹可食之或擣取汁服之

菘菜

除胃中煩熱去邪熱作羹及葶藶食並得

苦菜

主熱中痰作
茹可常食

葺

去暴熱可作
茹食之

水

去伏熱作蠶菹
食生食並佳

蜜

若覺熱氣不和新汲水
和蜜漿一碗即安

白鵝

解五臟熱煮汁
飲之食其肉

白鴨

除煩熱消毒熱和葱
豉煮汁飲食其肉

人屎

主骨蒸熱取乾者燒黑納水中
澄清飲之小升以差為度

人尿

小便降火極速△陰虛火動蒸熱如燎諸藥不
効取童子小便乘熱服之或和竹瀝薑汁食

雞子

心胸煩熱生吞雞子清一枚熱毒發
雞子白三顆和蜜一合頓服卽差

牛乳

解熱毒除胃中熱生飲
之良烏牛乳尤佳

猪肚

主骨蒸熱勞蒸熟食之
猪胆亦好和之服之

獺肉

主骨蒸熱勞煮爛經露一宿明朝
和醋醬食之卽差

鼠肉

上骨蒸勞極四肢羸瘦或水
煮或燒食之勿令病人知

鍼灸法

骨蒸勞熱取膏肓三里
脫者灸崔氏四花穴無有不安

取魄戶
泉三壯或五壯立安
骨蒸熱板齒乾燥取大

足冷如水灸陽輔
身熱如火

東醫寶鑑雜病篇卷三下終