

聖濟總錄纂要

八

聖濟總錄纂要

卷之八

程世佐燧四

程量入上慎

新安

較

程志治齊先

程 瑀石紐

吐血門

其間吐血三吞絲脈吐血不止

吐血統論

論曰。吐血病有三種。一則緣心肺蘊熱。血得熱則妄行。下

流入胃。胃受之則滿悶。氣道賁衝。故令吐血。二則虛勞之
人。心肺內傷。悲怒氣逆。肝不得藏血。乘虛而出。因怒氣逆
甚則嘔血。三者緣酒食過飽。胃間不安。或強吐之。氣脉賁
亂。損傷胃心。血隨食出。此名傷胃。

黃芪散 治吐血

綿黃芪 白芨 白斂 黃明膠粉炒 共末。空心飲

下二錢。

綠雲散 全前

百合 人參 側柏葉 阿膠粉炒 共末。空心飲下

二錢。

神效鹿角散 治吐血咯血

鹿角膠

川柏

炒五錢

杏仁

二十一枚 去皮尖

共研入白麩。

水下二錢。

阿膠散 治咯血吐血

阿膠

白芨

白芷

白斂

川柏

蜜炙 一兩

共末。飲下

二錢。

藕汁茯苓散 治吐血不止

生藕汁

白茯苓

懷生地

炒黑蒲黃

等分

以三味

共末調藕汁下二錢。

補肺煮肺散 治吐血咯血等

杏仁

一百二十枚去雙仁皮尖研極爛

百合

四兩

葱白

三莖

熟糯米

三合

共和勻用猪肺一具去筋管膜全煮熟蜜湯下。

異攻散 治吐血不差

人參

一兩

研極細五更時打雞子清和服二三錢。

黃藥子散 治吐血

黃藥子

防已

等分

共末用小麥湯下一錢吐甚者一

服減二服止。

黃藥子
未詳

艾灰散 治吐血

艾葉 燒灰存性為末。新汲水。空心下二錢。

竹葉芍藥湯 治吐血衄血。大小便出血。

淡竹葉 六合 赤芍 兩 甘草 炙一兩 阿膠 三兩 川歸 兩半

水煎五錢。溫服日二。

地黃藕汁飲 治心肺熱極。喘悶吐血。

生地汁 生藕汁 生薑汁 小薊根汁 生牛蒡子

汁 生白蜜 等分 共和勻。徐呷數口。

地黃飲 治吐血不止

懷生地

一兩
取汁

鹿角膠

一兩
炙

童便五合煎沸入汁末十

數沸分三服。

吐血不止

論曰。藏真高于肺。而主氣。藏真通于心。而主血。藏真散于肝。而藏血。是三者。或因憂愁思慮。與夫恚怒氣逆傷之。則氣亂而血妄行。下入于胃。胃受之則脹滿。其氣貫衝于上。故吐血不止也。

白金散

治吐血。肺元受損。

上白麩

石菖蒲

一兩

共末。空心水下二錢。暑毒氣。薑

汁蜜水下。

白歛湯 治吐血咯血不止

白歛三兩

阿膠炒二兩

用酒水合煎三錢。去滓入生地

汁半合。沸服。

生犀桔梗散 治吐血似鵝鴨肝。晝夜不止。

生犀角

生桔梗一兩

共末。空心溫酒下二錢。晚下一

錢。

補肺百花煎 治吐血不止。兼咳嗽。

生地汁

生藕汁一升

生薑汁半升

乾青柿

五枚研作糊

黃牛乳

升半

胡桃肉

十枚

大棗

二十枚研

好白酒一升。全

上數味煎如餳。入後藥。

黃明膠

炙研五錢

杏仁

去皮尖研三兩

秦艽

五錢研末

全上合煎

減半。入蜜四兩。養成煎。空心用糯米飲。下一二匙。日

三服。酒下亦可。

阿膠湯 治吐血不止

阿膠

炒研

熟艾

三兩

白芍

四兩

地榆

四兩

小薊根

五兩

水煎五錢

上馬驥湯 治心肺蘊熱。恚怒氣逆。便血妄行。日夜不止。

土馬駿
和名須
喜字計

土馬駿焙二兩 人參 白茯苓 秦艽 炙甘草 枳實

炒 麩 懷生地酒洗 柴胡一兩 水煎五錢。空心溫服。日二。

嘔血 吐再唾血 舌上出血 汗血

嘔血

論曰。憂愁思慮則傷心。恚怒氣逆。上而不下。則傷肝。蓋心

主血。肝藏血。二臟俱受傷。則血溢妄行。流散不止。氣逆則

嘔吐而出血也。

三汁飲 治吐血嘔血衄血等

麥冬汁 生地汁 生藕汁 熟冷水 各一 白藥一兩

白藥
未詳

和勻溫服一二鍾以差為度。

生地黄湯 治憂愁恚怒嘔吐出血煩悶少氣胸中痛。

懷生地

半斤

阿膠

粉炒研

炙甘草

兩半

用大棗水煎五

錢空心溫服日二。

荆芥穗飲 治嘔血不止。

荆芥穗

山枝仁

片苓

蒲黃

一兩

水煎五錢空心

溫服晚再服以差為度。

唾血

論曰邪熱薰于肺則損肺恚怒氣逆傷于肝則損肝肺肝

傷動。故令人唾血。如唾中有若紅縷者。屬肺臟。如脇下先苦痛。而後唾鮮血者。屬肝經。俱可折而治之。

紫苑散 治肺氣內傷。邪熱薰積。欬唾有血。

紫苑 川歸 川芎 附子 欵冬 五味子 白朮

桂心 生地 甘草 細辛 側柏葉 杏仁 去皮尖炒研

貝母 一兩 共末。入蜜少許。和滾湯。空心下二錢。晚再下。

蒲黃散 治唾血不止。

蒲黃 一兩 生 研羅細末。用冷水和三錢。空心下日二。

舌上出血

論曰。心主血。在竅為舌。若心臟蘊熱。血得熱而妄行。或溢于心之竅。故有舌上出血之症。甚者出如涌泉。

升麻湯 治心臟有熱。舌上出血。勢如涌泉。

升麻 茜根 小薊根 兩半 熟艾 一把 凝水石 三兩

水煎三錢。去滓入生地汁半合。再沸服。日二。

阿膠散 治舌上出血不止。

阿膠 粉炒 研末 黃芪 蜜炙 蒲黃 新者 一兩 共末。用生地汁。空

心下二錢。

熟艾葉湯 治心臟熱。舌上出血。及一切失血。

熟艾葉

用糯米全炒

松黃

側柏葉

炙一兩

水煎三錢空

心溫服。日二。

汗血

論曰。內經云。臟經通于心。血脉之氣行焉。又曰。肝藏血。故人臥血歸于肝。然血雖藏于肝。而妄則行之。若肝心二臟俱傷于邪。則血隨心液為汗而出。是為汗血也。

人參湯

治肝心二臟傷邪。汗血。

人參

赤芍

白朮

甘草

桂心

川歸

淡竹

茹

川芎

子芩

水煎三錢空。心溫服。日二。

神白散 治血汗從膚腠中出。

人中白 用瓦上炙乾研成末。入麝香末少許和勻。空

心酒下二錢。

如聖散 治汗血不止。

郁李仁 去皮尖研爛。用梨取汁。下一錢。日二。

竹茹湯 治吐血。汗血。尿血。

竹茹 人參 白芍 生地 甘草 川歸 桔梗 炒

川芎 桂心 兩一

水煎三錢空心溫服。以差為度。

鼻衄 衄不止 大衄 衄鱗

鼻衄

論曰。脾移熱于肝。則為驚衄。是木剋土也。蓋脾土熱氣。移于肝木。則神魂驚恐。而血行不由其道。夫肺主氣。開竅于鼻。血隨氣上。今血既妄行。故于鼻出而為衄也。

生地藕節湯 治邪熱上攻。鼻衄。

懷生地 生藕節一兩 水煎五錢。空心溫服。以差為度。

蒲黃散 治鼻衄。

蒲黃 櫻櫚燒灰存性 川歸 阿膠 亂髮灰 柏子仁

燒研一錢

共末。用藕節汁。空心下二錢。如肺損傷吐血

生地汁下。腸風下血。樗根皮湯下。女人赤白帶。

艾葉湯下。日二服。

貼背膏 治上焦肺壅熱。鼻衄。

京三稜 大者一枚 溼紙包煨熟。乘熱爛搗。用醋煮糊。貼背

上第三椎骨。

貼鼻方 同前

鹿角膠 用沸湯浸軟。一薄片。貼鼻均上差。

紫耳方 治肺壅熱。鼻衄。

玄胡索 爲末。綿包紮耳內。左衄扎右。右衄紮左。左右

俱衄。兩耳俱紮。不止。衄衄。

吹鼻方 同前

石榴花 取百葉者 入陰乾爲末。用少許吹鼻中。卽差。

葱白汁 同前

葱白汁 以汁入酒少許。點二三匙。滴入鼻中愈。

衄不止

論曰。榮衛之行。常與胃氣相隨。則氣與血未嘗一刻相離。蓋肝藏血。肺主氣。榮衛和平。則氣血調順。若人臟腑有熱。

熱乘血氣。血性得熱。流溢妄行。夫肺開竅于鼻。故其發為
 鼻衄。衄不止者。臟虛血盛故也。內經又云。脾移熱于肝。則
 為驚衄。蓋脾土也。肝木也。今脾移熱于肝。則木不能制土
 明矣。肝藏血。其神魂。故為驚衄之病。
 髮灰散 治衄不止。

亂髮灰

錢一

人中白

炙研五分

麝香

研一字

共研。用少許吹鼻中。立愈。

車前子散 治衄血不止。欲死者。

車前子

牛耳內垢

等分

車前子散 治衄血不止。欲死者。

大用車前子為末。與垢同研。和成挺子。塞耳中差。

柳枝散 同前

柳枝 寒食日收者一兩

人參 一分

共末。空心溫水下二錢。日二。

人參蓮心散 治血衄不止。

人參 一分

蓮子心 一分

共末。空心溫水下二錢。以差為度。

玉粉散 治鼻衄日夜不止。頭痛心煩。

石羔 研

牡蠣 童便

共研極細。溫水下二錢。日二。

二花散 同前

酸石榴花

黃蜀葵花 一兩

共末。水煎二錢。溫服日二。

栗灰散 治衄不止。

生粟

取獨顆或中心者七枚連皮燒灰末

入麝少許研勻。酒下三錢。日

法紙散

治衄血不止。

衄血時

以紙接血。將紙焙乾燒灰。溫水和服。但不可

與病人知。

燈心散

同前

燈心

一兩 飛過 爲末

丹砂

一錢

共末。空心飲下二錢。頃再服

大蒜貼足

治衄血不止。諸藥無效者。

大蒜

去皮 苗

研爛。用帛攤錢大。左竅出。貼左足心。右竅

出。貼右足心。兩鼻並出。二足並貼。血止急洗去。

通神散 治衄不止。心神悶亂。頭旋欲倒。

亂髮燒灰 伏龍肝

一兩

共末。用溫水空心下二錢。頃再服。

茅花湯 治血衄不止。

茆花 用水煎濃汁二碗。分二服。如無花以根代之。

大衄

論曰。大衄者。口耳皆出血是也。蓋血爲榮。而藏于肝。氣爲衛。而生于肺。肺開竅于鼻。三者相爲流通。若熱氣乘血。熱

盛則氣血妄行。與衛氣錯溢于上竅。故鼻衄不已而口耳皆出血也。是名大衄。

南天竺飲 治血妄行。九竅皆出。服藥不止者。

南天竺草 生瞿麥者 是一大把 山枝 三十枚 生薑 一兩 燈心 一把

炙甘草 五錢 大棗肉 五枚 用水一大碗煎減半。空心服。

苦參湯 治大衄。口耳皆出血不止。

苦參 川連 一兩 山枝 七枚 大黃 微炒 兩半

水煎五錢。去滓入生地汁服。

阿膠湯 治大衄不止。

阿膠

粉炒研
一兩

蒲黃

五錢

水煎三錢。去滓入生地汁服。急帛繫兩乳。

白龍骨散

治大衄不止。

白龍骨

煨

為末。用少許吹鼻中。立止。

生地飲

治大衄出血。血上心胸。氣急勞熱。

懷生地

四兩

子芩

赤芍藥

青竹茹

三兩

蒲黃

三合

地骨皮

五兩

水煎五錢。空心溫服。晚再服。以差為度。

衄鱗

汗血

論曰。內經謂。膽移熱于腦。則酸頰鼻淵。傳為衄鱗。瞑目。夫

血得熱則涌溢。得寒則凝泣。若膽受胃熱。循脉而上。乃移熱于腦。蓋陽絡溢則血妄行。在鼻為衄。在汗空為蟻。蟻者皆熱厥血溢之過也。今之治衄蟻者。專于治血。不知血之行留。氣為之本。猶海水朝夕兩潮。乃陰陽之氣使然也。明夫經絡順逆。則血與氣俱流通。而無妄行之患矣。

青竹茹湯 治熱盛所致衄血汗血。

青竹茹 子芩 懷生地二兩 白芍藥 麥門冬

蒲黃一兩 水煎五錢。空心溫服。以差為度。

地黃散 治血汗不止。

懷生地 阿膠炒研三兩 蒲黃二兩

共末。空心飲下二錢。日二。

刺薊湯 治熱氣上行。衄血汗血。

刺薊

紫蘇

二兩

川連

犀角

懷生地

一兩

水煎五錢。溫服。

獨聖湯 治血熱妄行。或衄或鱗。

子芩

用酒浸微炒。水煎七錢。空心溫服。立差。

脚氣門

風毒脚氣

脚氣痺攣

脚氣疼痛不仁

脚氣統論

論曰。風毒中人。隨處悉能爲病。偏著于脚何耶。蓋五臟經絡。心肺起于手十指。肝腎脾起于足十指。地之蒸溼毒氣。足先受之。久而不差。漸至四肢腹背頭項。古人所謂微時不覺。痼滯乃知。所以謂之脚氣。其症不一。或見食嘔吐。憎聞食臭。或腹痛下利。或二便秘塞不通。或胸中忪悸。不欲見明。或精神昏憤。或善忘語錯。或壯熱頭疼。或身體冷痛。或時覺轉筋。或小腹不仁。或髀腿頑痺。或縱緩不隨。或腫或不腫。或百節攣急。凡是之症。皆脚氣候也。治法固多。唯

孫思邈云。不得大補。亦不得大瀉。故須湯劑爲治法之最。學者宜加意焉。

風毒脚氣

論曰。內經謂。暑勝則地熱。風勝則地動。溼勝則地泥。寒勝則地裂。寒暑風溼之氣。皆本乎地。人或履之。所以毒亦易中于足也。因病從脚起。故謂之脚氣。况五臟流注。脾與腎肝之經絡。皆起足指。故有風毒脚氣之病。其症或見食嘔吐。或腹痛下利。或便溲不通。或胸中驚悸。不欲見明。或言語錯忘。或頭痛壯熱。或身體冷疼。轉筋脛腫。痛痺緩縱。其

狀不一。治不可緩。稍緩氣上入腹。或腫或不腫。胸中逆滿。上氣肩息者死。不旋踵。寬者數日必死。不可不急治也。但看心下急。氣喘不停。或自汗數出。或乍寒乍熱。其脉促短而數。嘔吐不止者死。故不可緩也。

木瓜虎骨丸 風毒脚氣。疼痛少力。筋脉拘急。行步艱難。

木瓜 虎脛骨 沒藥 當歸 麒麟竭 骨碎補

木香 自然銅醋淬七次 敗龜板 楓香 安息重湯酒蒸

桂心 甜瓜子一兩 地龍二兩 乳香五錢全沒藥麟竭研入木瓜內用黑

豆一斗水洗安木
瓜子中蒸爛研膏

共末膏丸。入酒少許。丸梧子大。木瓜湯下三十九。

大續命湯 脚氣痺攣不隨。風毒攻四肢。壯熱如火。頭項

攣急。氣冲胸中。

當歸 人參 防風 麻黃去根節 石膏二兩 芎藭

杏仁炒微黃 赤芍 黃芩 炙甘草 桂一兩

薑水煎四錢。

越婢湯 風毒脚痺攣。行步不遂。

麻黃 石膏四兩 白朮二兩 附子 炙甘草一兩

薑水煎四錢。

木香散 脚氣緩弱。大肉頑痺。肢節疼痛。

木香三兩 牛膝 草薺 羚羊角 陳皮 杏仁 獨活

丹參 杜仲 秦艽 桂一兩 車前五錢

薑水煎三錢。日三。

犀角丸 風毒脚氣。上冲散入四肢。虛腫無力。

犀角二兩 白木 檳榔 人參 川芎 赤茯苓 羌活

木香 防風 石斛 牛膝一兩

六 蜜丸。梧子大。酒下二十九。日二。

五柔丸 腎虛冷。腎風或頭風。兼風毒脚氣。

大黃 一斤蒸三次

前胡 二兩半

白芍

半夏

菴蓉

葶藶 紙炒

赤茯苓

細辛

當歸 四兩

蜜九梧子大。飲下五七丸。日二。以利為度。

蘆根湯 風毒脚氣昏煩壯熱頭疼嘔吐口乾。

蘆根 生兩半

赤茯苓

葛根

知母

淡竹葉

麥冬 三分

炙甘草 五錢

水煎五錢。日二。

淋瀝方 風毒脚氣腰膝痛痺腫。行履不得。皮膚如小虫

行。

羊桃

蒟蒻

蒺藜

蒼耳

海桐皮

柴胡

白茯苓

柳木蠹末

水紅花

一兩

水五斗煎二斗。去滓淋洗。慎避風冷。

淋洗方

風毒脚氣。腰膝痛痺腫。行步不得。皮膚如蟲行。

水菘

附子

露蜂房

茵芋

二兩

川椒

一兩

葫蘆

四兩

水五斗。煎取汁三斗。避風淋洗。

脚氣痺攣

論曰。脚氣痺攣者。寒氣多也。寒搏於筋脉。結而為病。則筋急不能轉側。行步艱難。甚則不可屈伸也。

肉蓯蓉丸

風溼脚氣。客搏筋脉。痺攣不仁。

菴蓉 牛膝 天麻 黃芪 何首烏 木瓜 各十兩 酒五斤

浸一日曬 狗脊 續斷 草薺 三兩

共末。用木瓜三枚剗空。入青鹽一兩。閉口飯上蒸研

膏。入上件和丸。如乾加酒糊。丸梧子大。鹽湯酒任下

三十丸。

秦朮湯 脚氣行步痺攣。

秦朮 枳殼 白朮 丹參 羌活 人參 柴胡

陳皮 紫蘇 薏仁 桑皮 兩半 防風 石斛

大麻仁 炙甘草 兩二 水煎五錢。日二。

石南丸 脚氣攣痺。去風溼。活血脉。益元氣。

石南 白朮 牛膝同上酒浸 天麻 防風 枸杞

黃芪二兩 鹿茸 白桂兩半

其末。用木瓜一枚。去皮瓢。蒸爛。搗膏入糊。丸梧子大。

酒下三五十丸。

大腹湯 脚氣痺攣。寒搏筋脉。不能轉側。

大腹四枚 防已 青皮 木通 羌活 紫蘓 草薺

川芎 地骨 訶勒皮五兩 木香五錢 五加皮二兩酒浸炙

薑棗。水煎三錢。日二。

脚氣疼痛不仁

論曰。脚氣疼痛。皮膚不仁者。蓋人之氣血。得溫則流通。遇寒溼則凝澁。今脚氣之疾。緣風寒溫毒。客於氣血。榮衛虛弱。不能宣通。故有脚氣疼痛。痲痺之症。

牛膝丸 下經氣弱。風溼毒氣。與氣血相搏。皮膚不仁。足痛不能履地。上攻眼目。迎風流淚。

牛膝

山萸

防風

羌活

烏頭

川芎

地龍

炒

檳榔

一兩

共末

酒糊丸

梧子大

鹽湯下

二十九

丸

整痛膏

脚氣腫痛。行履無力。及打撲傷折痛。

烏頭生

乾薑生

五靈脂生一兩

浮麥炒黑一分

共末用醋一鍾入藥三錢熬成膏攤紙上傳患處又以麩醋炒熱裹熨痛處如患脚氣先燒熟砧將藥在砧上脚心熨之引脚中氣消腫止痛。

敗龜散

脚氣及筋骨疼痛

敗龜醋炙

白芥子研

芸苔子研

木別子去殼研

自

然銅醋淬七次五錢

地龍炒

硫黃一兩

諸日共末用末與麩醋和貼

牛膝丹參酒方

脚氣入冬即苦脚痲弱或筋骨疼不能

屈伸。皮膚癢痺不仁。手脚指節腫滿悶。或四肢腫。腰

脛直。

牛膝 丹參 薏仁 生地八兩 白朮 生薑 五加

皮五兩 側子 赤茯苓 草薺 防風四兩 獨活 石斛

茵芋葉 人參 天雄 石南葉炙 川芎三兩

細辛 升麻二兩 磁石醋淬七次一斤 桂三兩 白酒五斗浸服

柴胡湯 風寒溼毒脚氣痛。皮膚不仁。緩弱癢痺。足脛腫

滿。心下急。大便澁。

柴胡 猪苓 紫蘇兩半 防已 陳皮 郁仁炒

大麻仁

炒一兩

桑皮

二兩半

水煎五錢。日二。

脚氣上氣

脚氣腫滿

脚氣心腹脹滿

脚氣冲心煩滿

脚氣上氣

定當作足

論曰。風溼毒氣之中人。多從下起。定先受之。故名脚氣。毒氣循經上入於肺。則氣道奔迫。升降不順。故令上氣喘滿。桑白皮湯。脚氣面目腫。上氣眠臥不得。氣欲絕。

桑皮

炙二兩

陳皮

一兩

葶藶

炒研二兩

其末。水煎薑棗湯。入末三錢。再沸溫服。頃又服。當利。

木香一二行。腫氣下卽差。三五日服一次。

大腹湯。脚氣脹滿。

大腹四枚

連皮百枚杏仁三七枚

童便。水煎三錢。日二。

枳實散。脚氣上氣。

枳實兩

炒二白朮

赤茯苓兩桂兩

共末。酒下二錢。日二。

烏豆湯。洗脚氣上氣。擡肩喘。冲心痛。

烏豆。水五斗。煮汁二斗半。入甕中浸足。令人從膝上

向下淋洗百遍。病者不過再洗差。服後丸。

加減木香丸 洗脚後服。

木香 白芍 枳殼 大黃炒二兩 檳榔四枚 桂五錢

其末。蜜丸。梧子大。酒下十五丸。日二漸加至三十丸。

大便利為度。

杏仁煎方 脚氣乘肺。土氣喘促。

杏仁炒 百合一分水二升令研細 生苈 麻黃 射干五錢

其末。入百合汁中。煎一升。去滓。日服二合。此藥不得

大熱久停。惟旋合。

木香檳榔丸 脚氣冲心。煩悶上氣喘滿。

木香

三分

檳榔

五錢

葱水煎三錢。去滓下紫雪二錢。薑

汁中合童便一合。

紫雪治脚氣最妙方在虛勞門

淋洗豌豆湯

脚氣擡肩喘。

豌豆

二分

葱白

十根

川椒

三分

水五斗煮半。令人從膝

上淋洗下百遍。患極者洗三次效。

脚氣腫滿

論曰。脚氣風溼毒氣。客搏腎經。腎者胃之關也。關門不利。則聚水而生病。水性就下。故令腎氣不化。小便不利。溼寒之氣。下注足脛。腫脹不消。故謂之脚氣腫滿。

赤茯苓湯 脚氣上攻。身體腫滿。小便赤澀。

赤茯苓 防已 桑皮 陳皮兩半 旋復錢五 杏仁

麻黃去根節 白朮 紫蘇兩一

水煮黑豆汁鍾半。煎藥五錢。薑半分。

旋復花湯 脚氣腫滿。上冲心胸。煩悶氣急。

旋復 犀角兩一 前胡 杏仁 桑皮 紫蘇

赤茯苓兩半 薑水煎三錢。

大豆湯 脚氣足脛附腫。上氣徧身。痰脹風引。

大豆合半炒香 附子兩三 枳殼 澤瀉 陳皮兩四 炙甘

草 赤茯苓 防風二兩 水煎黑豆取汁煎藥三錢日

三。若腫痛止去大豆澤瀉。

脚氣心腹脹滿

論曰。風毒之中人也。必先中脚。久而不差。徧及四肢。其氣
滯溢。則腹脅脹滿。小便不利。氣喘息高者。其病為重也。

訶梨勒丸 治脚氣疼痛發熱腫悶。上攻心腹。脹滿吐逆。

訶勒皮 木香 防已 大腹連皮煨 紫蘓一兩 白芍

杉木節 羌活 沉香五錢 水煎五錢日二。

羚羊角丸 脚氣心腹妨悶。兩脅虛脹。不思食。漸覺心滿。

氣隔不通。

木香

防風

升麻

二兩

大麻仁

赤茯苓

三兩

旋復

羚羊角

茯神

二兩

獨活

二兩半

大腹

七枚連皮

附子。共末。蜜丸。梧子大。酒下。四十九。日一服。

如腹內先

冷加附子

二兩

大腸秘澀。加大黃

炒兩半

氣滯。加檳

柳

二兩

心胸膈熱。加麥冬

三兩

筋急掣痛。加牛膝

二兩

皮膚風痒。心下妨悶。加枳殼

炒兩半

臍氣羸弱。加黃

芪

三兩

前胡飲。脚氣攻心。腹脹滿。嘔吐不下食。

前胡 生薑 羚羊角 半夏 大黃炒 赤茯苓五錢

枳殼三分 水煎五錢。去滓下朴硝一錢。

松節湯 脚氣入腹。心腹脹急。煩躁腫痛。

松節炒黃 桑皮 紫蘇兩 炙甘草五錢 檳榔三分

水煎三錢。入燈心生薑童便。日二。

脚氣衝心

論曰。脚氣衝心之狀。令人胸膈滿悶。上氣喘急。甚者嘔吐是也。蓋風溼毒氣。初從足起。縱而不治。上入于腹。小腹痛痺不仁。毒氣上冲。是謂腎水尅心火。故名脚氣冲心。孫思

魏云。凡小覺病候有異。即須大怖畏。决意急治之。不可槩以腫爲候。亦有不腫者。正謂此也。

吳茱萸湯 脚氣冲心。煩悶腹脹。氣急欲死。

吳茱萸 木瓜 檳榔二兩

水煎五錢。入竹葉一把。以快利爲度。

獨活湯 脚氣冲心。

獨活 犀角 石斛 側子 川芎 防風 當歸

防已 炙甘草二兩 丹參 白芍三兩 赤茯苓四兩 桂兩半

薑水煎五錢。日三。凡服一二劑後。隔五日一服。若覺

服當
作腹

服內氣散。兩脅有力。行動無妨。宜常服香豆酒

香豆酒方 同前

香豆一升 酒三升。浸。隨量頻飲。覺利多即止。

吳茱萸檳榔湯 脚氣毒氣攻心。欲死者。

吳茱萸炒四升 檳榔七枚 木瓜 陳皮一兩 厚朴二兩

竹葉。水煎三錢。

木瓜湯 脚氣風溼毒氣。攻心煩悶。手足脉絕。

木瓜 吳茱萸等分 水煎三錢。頃又服。

犀角湯 脚氣若風熱輕。但毒氣入胃。唯心胸煩熱。索水

灑胸面。乾嘔好吐。氣欲斷絕者。

犀角 木香 人參 羚羊 竹茹 沉香 射干

麥冬 赤茯苓二兩 雞舌香 麝香一兩 另研 石膏三兩

水煎四錢。去滓入麝末五分。再沸服。頃又服。覺眼明

心悟是效。若嘔逆不下食。加半夏二兩。生薑一兩。陳

皮兩半。

木香湯 脚氣攻心。悶絕欲死。

木香 檳榔一兩 赤茯苓 都仁 牛膝 大黃炒 吳

萸 桂三兩 水煎。剉皮木通汁。入藥三錢服。如重又服

風氣作

木香湯又方脚風毒攻心。悶亂狂躁。口乾氣欲絕。或秘澀。

青木香 生黑豆皮二兩 大黃炒 紅雪一兩即紫雪

水煎五錢。入紅雪三錢。分二服。頃再服。當下燥糞。

烏頭湯 風毒脚氣攻心。心悶倒仆。失音不語。困甚者。

烏頭一升水四升煎汁二升 甜竹葉一把 桑皮三兩 大腹七枚

用豆汁浸藥一日。次早煎分二服。頃再服。已死者幹

開口灌之。愈。及灸脚心七壯。男左女右。

麻仁湯 脚氣冲心。上氣二便澀。小腹急痛。

大麻仁微炒 赤小豆半升

水七升煎二升半。分三服。過二日又一劑。

朴硝湯 脚氣攻心悶絕。

朴硝 白芍 柴胡 旋復 紫蘓錢五 大腹 桑白

皮灸三分 檳榔二枚 生薑一兩

作三貼。水煎去滓。入朴硝二錢。分二服。

礬石湯 脚氣冲心。

白礬一兩 漿水一斗五升。煎浸脚良。

九味木香丸 脚氣冲心。胸膈煩滿。喘急嘔吐。

木香 訶勒 枳殼 桂二兩 白芍 柴胡兩半 厚朴

薑汁

炒 檳榔 二兩半

大黃 炒三兩

共末。蜜丸。梧子大。酒下二三十丸。

脚氣語言蹇澁

乾溼脚氣

脚氣變成水腫

脚氣語言蹇澁

論曰。風毒脚氣。語言蹇澁者。脾腎氣虛。風溼中其經絡也。腎之經。循喉嚨。挾舌本。脾之經。挾咽連舌本。散舌下。二經為風溼所中。故令舌本強硬。語言蹇澁也。

大入風湯 脚氣上攻心脾。語言蹇澁。

當歸 大豆 三兩 白芍 烏頭 黃芩 遠志 獨活

五味 防風 川芎 麻黃 人參 秦艽 乾薑

甘草 杏仁 石斛 白朮 升麻 紫苑 黃芪

桂二兩 酒水煎三錢。

桂心湯 風毒脚氣。癢痺不仁。語言蹇澁。

桂心三分 麻黃 當歸一兩 防風 升麻 犀角

檳榔二兩 黃芩 赤茯苓兩半 棗水煎三錢。

乾溼脚氣

論曰。脚氣有乾溼之異者。蓋陰陽所以分也。在臟為陰。在腑為陽。然皆由風溼毒氣。乘虛而入。其症大同小異。故乾

脚氣之狀。血脉痞澁。皮膚癢痺。脛細痠疼。食減體瘦。臟腑秘滯。上冲煩悶。溼脚氣之狀。脚先腫滿。或下注生瘡。肌汗流下。兩脚疼。上攻心腹。咳嗽喘急。面浮膝腫。見食嘔吐。四根湯。年深十九種乾溼脚氣。

桑麻根節心 松木根節心 栢木根節心 杉木根

節心 並細剉炒 黑各一兩 肉苳蓉 酒浸 二兩 五靈脂 石龍芮 炒 一

兩 天雄 泡裂去皮 臍二兩 紫檀香 地龍 炒 木香 各一兩

麝香 五錢 乳香 沒藥 一兩 共末。木瓜酒下二錢。日三。

立應湯 乾溼脚氣冲注四肢。

大腹煨 木香 防已 紫蘇 白芍 羌活

訶勒皮 木瓜 杉木節 沉香一兩 水煎五錢日二。

四斤丸 乾溼脚氣。差後常發。令永不發。

牛膝 木瓜 菴蓉 天麻一斤 酒五升浸一日。晒乾

為末。用浸酒熬膏。丸梧子大。酒下三十丸。

杉木節湯 乾脚氣。頭痛。腰脚痠疼。心躁渴悶。汗出氣喘。

杉木節一升 橘葉一升 大腹七枚連皮 童便三升

同煮取半。分二服。如一服快利便止。唐柳宗元。乾脚氣夜半痞絕。左脅有塊。如大石且死困。天寒不知人。

三日家人皆號哭。榮陽鄭洵美傳此方服之。半食間氣通立愈。

防已湯 乾脚氣脚膝腫滿。

防已 猪苓 郁仁 檳榔三分 木通 枳殼

紫蘇五錢 赤茯 炙甘草一兩 薑水煎四錢。

海桐皮散 溼脚氣及腎臟風下注滿脚瘡疼痛膿水出。

海桐皮 草烏鹽炒 地龍炒 蒺藜炒一兩

共末酒下二錢日二。

脚氣變成水腫

脚氣變成水腫

論曰。昔人論脚氣。謂脾受陽毒。即熱癰。腎受陰溼。即寒痺。是知脚氣之病。脾腎得之為多。今變成水腫者。亦緣脾腎俱虛乏。蓋腎虛則不能行水。脾虛則不能制水。故水氣散溢。滲于皮膚。流于四肢。所以通身腫也。

葶藶丸 脚氣成水腫。上氣氣急咳嗽。二便苦澁。所服利

水藥。反利大便。小便反澁。

葶藶

三兩

防己

炙甘草

一兩

杏仁

貝母

一兩半

為末。棗肉丸。梧子大。大棗桑皮粳米飲下。三十九。小

便未快。加十丸。

檳榔散 脚氣浮腫。漸變成水。心腹脹滿。二便不通。氣急

喘息。

白檳榔五枚 大腹皮七枚 木香一兩 大腹細剉二味

為末。用童便一鍾煎大腹一枚。香末二錢。去滓入檳

榔末三錢。再沸服日二。

猪苓湯 脚氣兼水氣。膈氣。通身腫滿。氣急。小便不通。坐

臥不得。

猪苓 防己 赤茯苓三分 木香 郁仁 澤瀉二兩

桑皮五兩 大腹七枚 水煎五錢服。下小便立効。日

脚氣大小便不通

江東嶺南瘴毒脚氣

脚氣雜治膏藥淋瀝

脚氣大小便不通

論曰。脚氣二便不通者。中風溼之氣搏于脚膝。上攻胸腹。脅肋填滿。榮衛痞膈。三焦之氣升而不降。所以傳導變化。皆不能出。而二便不通。蓋腎氣化則二便利。脚膝者腎之候。今脚氣上攻。則腎氣不得化。腎氣不化。致二便不通也。桑白皮湯。男女風毒脚氣。及徧身拘急刺痛。二便赤澀。不思食。嘔逆或寒熱。

桑皮 木通 青皮 紫蘇 羌活一兩 荆穗

藁香子根 木瓜 獨活 枳殼二兩 大腹大者三枚

薑葱水煎三錢日二。

攢榔湯 脚氣腫滿坐臥不得上氣冲心二便秘澀。

攢榔七枚 木香 郁仁二兩 桑皮炙 木通三兩

水煎三錢去滓入牽牛末一錢二便利氣快為度。

江東嶺南瘴毒脚氣

論曰。內經謂南方者其地下水土弱霧露之所聚也。江東嶺南大率如此。春夏之交山水蒸鬱風溼毒氣為甚。足或

感之。遂成瘴毒脚氣。其候脚先屈弱。漸至痺疼。膝脛微腫。小腹不仁。頭痛煩心。痰壅吐逆。時作寒熱。便澀不通。甚者控心而勢迫。治不可緩。支法存。所以留意經方。編善斯術者。豈非江左嶺表。此疾得之為多歟。

犀角湯 江東脚氣。小欲動作。漸覺心悶。脚脛痠疼。煩熱不止。

犀角 木香 前胡一兩 竹茹三兩 麥冬兩半

大腹皮三枚 全用 用水煎五錢

羚羊角湯 江東脚氣盛發。上冲脾胃。胸膈妨悶。意氣不

暢。口乾。目不知人。

羚羊

犀角

兩半

木香

升麻

旋復

兩一

麥冬

大腹

五枚

枳殼

前胡

兩一

水煎五錢。快利為度。

旋復花飲

乍處嶺南。未伏水土。食飲不宜。兼卑溼脚氣

發動。時復心悶。面目脚膝浮腫。氣乏唇口青黑。胸膈

煩熱。見食吐嘔。心腹妨痛。冷氣結聚。如有此疾。急服。

旋復

前胡

郁仁

兩一

半夏

赤茯

兩二

大腹

五枚全

吳萸

三分

薑水煎五錢。日二。要疎利。加檳榔末。

犀角湯

脚氣之疾。先起嶺南。稍來江東。皆由卑溼得之。

或微覺疼痺。或二脛腫滿。行起痺弱。或上入腹不仁。或時作冷熱。皆其候也。若先覺此症。食嘔不下。氣上逆者。宜急服。

犀角

旋復

一兩

赤茯苓

陳皮

兩半

紫蘇

半握

薑棗水煎五錢。豆一合。

獨活酒

嶺南脚氣發動。地氣鬱蒸。熱毒風盛。脾肺常有

風熱。

獨活

生地

三兩

海桐皮

二兩

惡實根

生

桂

一兩

黑豆皮

生

大麻仁

炒一升

生白酒三斗浸。頻服。

脚氣雜治膏藥淋瀝等

論曰。脚氣症候不一。隨症用藥。備載于前。然有一方兼治數症者。有膏酒淋傳者。皆昔經驗。用之多効。今復詳類于後。

木瓜丸 脚氣諸疾。

木瓜

四枚

乳香

二兩

甘菊

一兩

青鹽

一錢

將瓜去瓢子。

入末封固。蒸研丸。梧子大。酒下五十丸。日三。汗香爲驗。并膝脚等疾皆治。

桑葉煎 脚氣曾用諸方。苦脚弱宜服。

白桑木 用生桑樞者採軟枝切一石

水一石煎五斗。又加水五斗。

煎去滓。慢煎成膏。約二升即止收貯。頻含化一匙。服

七日覺四肢通暢。頻頻洩氣。已後兩脚或腫勿怪。乃

是得藥力病差之候。

牛膝酒 脚氣極冷。着厚衣蓋覆。不覺煖。

牛膝 生地 斤半 紙包泥裹。又用紙包泥固乾。灰火養

半日。次以火燒一伏時。取出漬酒服。

蒜酒 初覺似有脚氣。宜服。

蒜 二升切炒 桃仁 一升去皮尖炒 豆 一升炒香 酒一斗浸服。

石斛酒 脚氣痺弱。筋骨疼痛。

石斛

四兩

人參

丹參

川芎

杜仲

白朮

黃芪

五味子

防風

陳皮

甘草

白茯苓

乾薑

山藥

當歸

桂

二兩

牛膝

三兩

酒五斗

浸服

菝葜酒

脚氣屈弱積年。腰脊攣痺。及腹內堅結。

菝葜

五斗水石半煮七斗

麴

十斤用上汁二斗浸二日

白糯米

一石淘

蒸攤入汁麴。拌勻內甕中常法。取酒服。

脚氣發心膈悶。宜此方。

取新磚

二塊

中心鑿孔。如毬子大。勿令透過。將火燒紅。

用醋撥之。便入川椒于孔內。以物蓋看溫暖。以脚踏磚上立愈。

麻黃裹足方 久蘊風熱足多冷麻。隱痛難行。夜常轉筋。如風所吹。皆脚氣之症。

麻黃 二斤 炒

令極熱以帛包貯。裹二足。勿透氣。良久脚

上有汗。候麻黃温不用。却着棉襪。無令風吹。如此數次。永除病本。

芥子膏

風溼脚氣。腫痛無力。

白芥子

蓖麻

木別

芸苔子

白膠香

一兩

胡桃五枚 搗千杵成膏。如彈子大。塗患處。

黑豆煎 脚氣

黑豆五升 桑皮五兩水三升 同豆煮汁 羌活 蒺藜 吳萸

海桐皮五錢 共末。入汁煎膏。酒下。

感神效
共本入指筋骨深不

藥豆
正代
桑文
五兩水三代
黃部
藥藥
吳其

黑豆煎

聖濟總錄纂要卷八終