







HARVARD-YENCHING LIBRARY  
HARVARD UNIVERSITY  
2 DIVINITY AVENUE

*Toan from Countryway Lib*

OCT 31 1999

赤水玄珠第二卷目錄

暑門 注夏 解休

濕門

燥門

寒門 中寒 惡寒



赤水玄珠第二卷

新安生生子孫一奎著輯

暑門

明暑篇

五運六化篇曰相火之化暑主於夏夏之為言大也與午同意炎暑乃行有中有胃有傷有暑風乃二之亦也

四一曰以於暑汗煩則喘渴靜則多言體若燔炭汗出而散先夏至日發者為病溫後夏至日發

暑暑當與汗皆出勿止  
伍身熱得之傷暑

曰傷暑得之為正邪火自病也當惡臭其病  
身熱而煩心痛其脉浮大而散

古曰靜而得之為中暑動而得之為中熱中暑  
者陰症中熱者陽症

不坦曰暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深  
堂大厦得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身  
形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗為房

室之陰寒所逼使周身陽氣不得伸越多以大  
順散熱藥主之是也若行人農夫於日中勞役  
得之者名曰中熱其病必苦頭痛發燥熱惡熱  
門之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動  
為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯涼劑主之  
厚曰按此論中暑即仲景所謂中暍是也  
作暑熱分之可見有陰陽二症受病不同

凡受病有陰寒所逼使周身陽氣不得伸越  
順散主之者為中暑蓋當暑月名之猶冬

亦為傷寒也但中熱治例雖云用蒼朮白  
 而一處清暑益氣之法况大順散一方是  
 然東垣施用諒不如此必有若  
 發揮晬者惜乎無傳故使後人  
 不詳後所論矧中暑証亦有於勞役  
 動者中熱証亦有於避暑靜而得之者大  
 抵人元氣虛實不同故所受亦異為治豈得  
 一變法哉

陳無擇曰暑熱喜歸心心中之使人噎悶昏不知  
 人入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則  
 喘痿臂入腎則消渴凡中暈者死治之切不  
 得用冷惟宜溫養得冷則死道途中無湯即以  
 執上藥中仍以熱溺沃之既可見矣凡覺中  
 且宜薑一大塊水送下如已迷悶嚼大些  
 大送下如不能嚼水研灌之立醒  
 之注清心利小便甚好若自汗甚者不可起  
 宜曰虎湯清解之次分表裡治之如在表  
 宜惡寒雙解散加香薷及二香散香薷飲之



有傷者三者有輕重之分虛實之辨或腹痛

此二一暑也可用黃連香薷飲清暑益氣湯

蓋苦暑熱香薷消暑水或身熱頭疼躁亂

不寧如針刺者此為熱傷在分肉也當

以解表一鹿湯加柴胡氣虛者加人參或咳嗽

多寒熱益汗出不止脉數者熱在肺經用清肺

湯或胡天水散之類急治則可遲則不救火乘

土此為中暑凡治病須要明白辨別慎勿滾

同施治春秋間亦或有之切莫執一隨病處方

為妙

按傷暑與傷寒身皆發熱不可不辨明施

蓋寒傷形熱傷氣傷寒則外惡寒而脉

經曰脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷

暑傷暑則不惡寒而脉虛為異也故

胡湯渴加知母石膏或人參白虎湯

益氣湯

人參白虎湯 治暑熱發渴脉虛

人參半一錢 知母 二錢 石膏 五錢 甘草 一錢  
粳米 一合 水煎服

### 竹葉石膏湯

石膏 一兩半 夏 二錢半 甘草 一兩 人參 二錢  
五錢 竹葉 十片

每服一兩 生姜三片 水煎服

十味香薷飲 治伏暑身倦神昏頭重

香薷 一兩 人參 陳皮 白朮 茯苓

黃耆 木瓜 厚朴 白扁豆 甘草

每服一兩 水煎服

一方無參 芪 陳皮 加紫蘓 藿香 檀香 各等分 名消暑十全飲 除暑渴霍亂吐瀉

元散 治熱而煩悶小便赤澀

滑石 六兩 甘草 一兩

右為末 每服二錢或三錢 冷水調下 燈心湯亦可 熱盛加辰砂 欲發汗用葱白湯調

### 五苓散

白朮 茯苓 豬苓 各半 澤瀉 二兩 桂 一兩

右末每服二三錢熱湯調下

加辰砂名辰砂五苓散

治暑渴止吐瀉

草果

烏梅肉

甘草

各四兩

兩

乾葛

各二兩

每錢水煎冷服

散治暑伏熱引飲過多脾胃受濕水谷

一分氣逆霍亂嘔吐

草

乾姜

杏仁

去皮

桂

右先將甘草用白砂炒黃次入姜却下杏仁

以不作聲為度篩去砂入桂為末每服二三

錢水煎服如煩躁并花水調服以沸湯

點

米復丹

治伏暑泄瀉身熱脉弱

同

攪

結

砂

子

不可

微炒

用

太陰玄精石

研

石

青皮

五

靈脂

去

沙

陳皮

各

二兩

右為末好醋糊為丸菘豆大空心米飲下二

三十九

大黃龍丸 中暑昏暈身熱惡寒頭痛或徃來寒熱煩渴吐瀉

船上硫黃

硝石各一兩 雄黃

滑石

白礬錢各五 寒食麵四兩

右為末滴水丸如梧子大每服五丸至七丸漸加至四十九

劉宗厚曰此藥通利三焦分理陰陽溫胃開結治揮霍變亂神志昏憤元氣下陷者甚捷然病因實火溫熱者勿用

子和桂苓甘露飲 伏暑發渴脉虛

桂

人參

藿香各半兩

茯苓

白朮

甘艸

葛根

澤瀉

石膏

寒水石各兩

木香一錢

為末白湯調三錢

三明桂苓甘露飲

茯苓

澤瀉各一兩

石膏

寒水石各二兩

滑石四兩 白朮

桂

猪苓各半兩

為末溫湯調下二三錢

生肌散

人參

五味子

麥門冬 各二錢

水煎服

一方加黃芪甘草

却暑散

治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐瀉痢煩渴

荷葉面垢

赤茯苓

甘草 性酪寒食麴

生姜 各一斤

右為末每服二錢白湯下

治傷暑喝霍亂腹痛煩躁脉沉微或

草果 仁三附子

陳皮 酪一甘草 五錢

每服一兩水煎入姜冷服

黃連解毒湯

方在火門

二氣丹

伏暑傷冷二氣交錯中脘痞悶或頭

惡心並治

硝石

硫黃 各等分

右為末銀器內文武火炒令色再碾

用粳米煮糊為丸如桐子大每服四十

汲水下

香薷丸 大人小兒傷暑伏熱燥渴脅悶頭昏  
眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不  
思飲食或發霍亂吐利傳筋並治

香薷去根木瓜

紫蘇

薑洗

茯苓去心甘草

檀香

丁香各二錢

右為末煉蜜和丸鷄頭子大每服一丸至三

丸細嚼溫湯下或新汲水化下

春澤湯 伏暑發熱煩渴引飲小便不利

寒陰陽不分疑似之間最宜服此

澤瀉三錢猪苓

茯苓

白朮各一錢

桂心 柴胡各一人參

麥門冬各一

渴甚去桂加五味子黃連各二錢

香朴飲子 大人小兒伏暑吐瀉虛煩嘔亂

人參 烏梅肉

茯苓

甘草

紫蘓 澤瀉

香薷

半夏

白扁豆 木瓜

厚朴姜制各

姜三片棗一枚水煎服

清暑六和湯 心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔

吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胃脘痞滿頭目  
痛肢體浮腫嗜卧倦怠小便赤澁并傷寒陰  
不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏

砂仁

半夏泡

杏仁去皮尖人參

藿香

扁豆

香薷

赤茯苓

厚朴

姜制木瓜

銘

甘草炙五分

姜五片棗一枚水煎服

消暑十全散

伏暑胃氣不和心腹滿痛

香薷

扁豆

厚朴姜制甘草炙

紫蘓

白朮

茯苓

藿香

木瓜

檀香各一錢

姜三片水煎服

黃龍丸

和劑方治伏暑發熱嘔吐惡心

黃連

淨三十兩

好酒五升煮乾研為細末麪糊丸

梧子大每服五十九白湯下

枇杷葉散

治暑毒攻心衄血嘔血或吐瀉作嘔

香薷

二錢

厚朴

姜炒

甘草

錢半

麥門冬

木瓜

茅根

錢各一

枇杷葉

陳皮

丁香各半錢

每服三五錢姜水煎服

注夏

子和曰痿之作也皆五月六月七月之時干者少陰君火之位未者濕土庚金伏火之地申者少陽相火之分故痿發此三月之內為熱也故病痿之人其脉浮大

丹溪云注夏屬陰虛元氣不足補中益氣以去熱升加炒黃柏挾痰者加南星

東垣曰刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣也痿論曰有所遠行勞倦逢大熱而為痿也陽氣內伐內伐則熱舍於腎者水藏也今水不能勝火則骨枯而髓虛足不任身然為痿故下經曰骨痿者生於大熱也此濕熱成痿今人骨之無力故治痿獨取於陽明時當長夏是熱大勝蒸而熾人感之多四肢困倦精神少懶於動作胸滿氣促肢節沉疼或氣高而熱熱而煩心下膨痞小便黃而數大便溼而燥

痢出黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食  
自汗躰重或汗少者血先病而氣不病也其脉  
中得洪緩若濕氣相搏必加以遲病雖互換  
少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之  
內經曰陽氣者衛外而為固也熱則氣泄今暑  
邪干衛故身熱自汗以黃芪甘溫補之為君人  
參陳皮當歸甘草甘微溫補中益氣為臣蒼朮  
白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根苦甘平善解  
肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿

通甘辛青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食  
之故以黃栢苦寒借甘味瀉熱補水虛  
源以人參五味子麥門冬酸甘微寒  
傷於庚金為佐名曰清暑益氣湯

汗少減五人參 澤瀉

神麴 陳皮 各五 甘草 炙

黃栢 酒浸 麥冬 歸身 各三分

蒼朮 銛一 五味子 粒九 青皮 三分半

服水二大盞煎至一盞去渣食遠溫服

少臨時斟酌此病皆由飲食勞倦傷  
脾胃乘天暑而病佳也但藥中犯澤瀉猪  
苓茯苓灯心通草木通淡味滲利小便之類  
皆從時令之旺氣以泄脾胃之客邪而補金  
水之不及也此正方已是從權而立之若其  
時病濕熱脾旺之症或小便已數腎肝不受  
邪者誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損其  
兩目也復立變症加減法於後 如心火乘  
脾乃血受火邪而不融非發陽氣伏於地中

地者人之脾也必用當歸和血少

益真陰 如脾胃不足之證須少

中受陽明陰引經之藥也使行陽

加神效靈驗陽行春令生萬物之根

非加柴胡使諸經左轉生發陰陽之

升之和氣也 如脾虛緣心火亢

土也其次肺氣受熱為熱所傷志

芪甘草次之參次之三若言海

藥也脾始虛肺氣先絕故用黃芪之

益皮毛之氣而閉腠理不令  
也上喘氣短懶語須用人參以補之  
脾須用炙甘草以瀉火熱而補胃脾中  
甘草最少恐滿也若脾胃之急痛并  
虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多  
者緩之咳甚者去人參如口乾嗝  
葛如脾胃既虛不能升浮為陰火傷  
發之氣榮血大虧榮氣伏於地中陰火  
日漸煎熬血氣虧少且心包與心主血

心無所養致使心亂而煩病名曰冤冤者

感而煩悶不安也是由清氣不升濁氣不

清濁相干亂於胸中使周身血氣逆行而

云後下上者引而去之故當加辛溫甘

劑生陽陽生而陰長也已有甘溫三味

或曰甘溫何能生血又非血藥也曰仲

之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血

更當歸和血又宜少加黃柏以救腎水

蓋甘寒瀉熱火火減則心氣得平而安也如

火亂猶不能止少加黃連以去之蓋將補腎  
亦使腎水旺而心火自降扶持地中陽氣也  
如氣浮心亂則以硃砂安神丸鎮固之煩一  
戒勿再服以防瀉陽氣之反陷也如心下痞  
亦少加黃連氣亂於胸為清濁相干故以陳  
皮理之能助陽氣之升而散滯氣又助諸甘  
辛為用故長夏濕土客邪火旺可從權加蒼  
朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕氣大  
勝主食不消化故食減不知穀味加炒麩以

消之復加五味子麥門冬人參瀉火蓋一  
助秋損也此三伏中長夏正旺之

脾胃虛弱隨時為病隨病制方 夫理

上焦之氣不足遇夏天氣熱甚損傷之氣怠惰者

卧四肢不收精神不足兩脚痿軟

高之後陽氣將旺復熱如火乃陰明

故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛

溜火而視物眩無所見小便頻數

腕當心而痛兩脇痛或急縮臍下

急甚則如刀刺腹難舒伸胸中悶塞時濕嘔噦或  
有痰嗽口沃白沫舌強腰背腹皆痛或時作會  
不下或食入即飽全不思食自汗不止  
在皮毛之上皆天氣之熱助本病也  
肺氣為熱所乘而作當先助元氣治虛言之不  
黃芪人參湯主之

黃芪一錢如自汗過

人參

白朮各五分

陳皮

甘草

當歸

黃栢以救源

麥冬各二分

神麴炒三分

五味子九粒

升麻六分

蒼朮五分無

右俱作一服水二盞煎至一盞

稍熟食遠或空心服之忌酒濕麵大料物之類

及過食冷物○如心下痞悶加黃連二分○如

胃脘當心痛減太寒藥加草豆蔻仁五分○如

脇下痛或縮急加柴胡二分○如頭痛目中溜

火加黃連二分○如頭目不清利上

壅上熱加蔓荊子三分藁本二分細辛一分川

芎三分生地黃二分○如氣短精神少或夢寐

間困乏無力加五味子九粒○如大便澀滯隔

二卷

一二日不見者致食少食不下血少血中伏火  
而不得潤也加當歸身生地黃各五桃仁三個  
麻子仁五研泥○如大便通行所加之藥勿再服  
○如大便又不快利勿用別藥必加大黃張五  
○如不利者非血結血秘而不通是熱則生風  
其病人必顯風症單血藥不可復加止常服人  
參黃芪湯藥只用羌活五錢防風五錢二味以  
吐以水四盞煎至一盞吞查空心服之大便必  
大走也一服便止○如胸中氣滯加青皮橘紅

倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣  
不當瀉之○如氣滯太甚或補藥太過或心下  
有憂鬱之事更加木香二分或砂仁二分或白  
豆蔻仁二分與正藥同煎服○如腹痛不惡寒  
者加白芍藥五分黃芩二分減五味子  
夫脾胃虛弱至六七月間河漲霖雨諸物皆潤人  
汗沾衣身重短氣甚則四肢痿軟行步不正脚軟  
眼黑欲倒者此腎水與膀胱俱竭之狀也當急救  
之滋肺氣以補水之上源又使廣大腸不受邪熱

不令汗大泄也汗泄甚則亡津液亡津液則七神  
無所依經云津液相成神乃自生津者庚大腸所  
主三伏之義為庚金受囚也若亡津液汗大泄濕  
令亢盛則清肅之氣亡燥金受囚風木無可以制  
故風濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制  
是也孫思邈曰五月常服五味子是瀉丙火補庚  
金大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於巳癸  
腎水已絕於午今更逢濕旺助熱為邪西方北方  
之氣清絕矣聖人立法夏月宜補者補天元之真

氣非補熱火也令人夏食寒是也為熱傷元氣以  
人參夏門冬五味子生脉脉者元氣也人參之甘  
補元氣瀉熱火也夏門冬之苦寒補水之源而清  
肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金  
也當此之時無病之人亦或有二症况虛損脾胃  
有膏疾之人遇此天暑將理失所違時伐化必困  
之無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨乏無力  
其形如夢寐朦朧如烟霧中不知身所有也必大  
汗泄若風犯汗眼皮膚必搐項筋皮枯毛焦身體

重肢節時有煩疼或一身盡疼或渴或不渴或  
小何黃澁此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛  
口鼻氣短氣促身心煩亂有不樂生之意情思慘  
侵此陰勝陽之極也病甚則傳腎肝為痿厥厥者  
一肢如在火中者為熱厥四肢寒冷者為寒厥寒  
心則腹中有寒熱厥腹中有熱為脾主四肢故也  
石肌肉濡瀆痺而不仁傳為肉痿證、中皆有肺  
用藥之人當以此調之氣上衝胸皆厥證也痿  
四肢痿軟而無力也其心煩寃不止  
心神撩亂者是也

者氣逆也甚則大逆故曰厥逆其厥痿多相須  
一在前已立黃芪人參五味子麥門冬湯中每加  
白茯苓二分澤瀉四分猪苓白朮各乙如小便快  
一黃澁者只加澤瀉二分與二朮上下分消其  
澁一行步不正脚膝痿弱兩足軟側已中痿和者  
加酒洗黃栢知母五分或令兩足湧出力氣如  
汗夫泄者津脫也急止之加五味子五粒炒黃栢  
五分炒知母三分不令妨其食當以意斟酌若妨  
食則止候食進再服取三里氣街以三稜針出血

汗不止不減者於三里穴下三寸上廉穴出血  
 酒溫麵 夫痿者濕熱乘於腎肝也當急去之  
 不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動  
 心煩冤而不止也若身重或氣不短小便如常及  
 濕熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子  
 澤瀉猪苓茯苓黃柏知母蒼朮白朮之藥只依本  
 病中證候加減常服藥亦須用酒黃柏二分或三  
 七月之間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱  
 已合而刑庚大腸故用寒涼以救之燥金受濕熱

之邪絕寒水生化之源人絕則腎虧痿厥之病大  
 作腰已下痿軟癱瘓不能動矣步行不正兩足軟  
 側以清燥湯主之

黃芪半錢 黃連 蒼朮 白朮 各一錢

陳皮 澤瀉各五 五味子九 人參

白茯苓 升麻各三 當歸二錢 柴胡

麥冬 生地 神麴炒 猪苓

黃柏酒製 甘草炙 各各

每服半兩水二盞煎至一盞稍熱空心服

丹溪治宋某勞傷發熱當作注夏治之

黃栢炒 升麻各三 黃芪 人參

木通 白芍各五 白朮一錢半 陳皮

甘草各二分

婦人患注夏手足痠軟而熱

白朮 黃栢炒 白芍 陳皮

當歸各一錢 蒼朮 甘草各五分

解音亦

生生子曰平人氣象論篇云尺脉緩瀋謂之解

王注曰尺者陰部也腹腎主之解之證懶倦困

緩為熱中瀋為無血故解也

弱寒不甚寒熱不甚熱惡見人見人心惕然或

熱多而汗出肢體百骸散解痿弱而不能任持少

氣而不欲言左右停不可以名其狀故謂之解

注夏之証殆相似亦虛類也其治大生脉湯足以

一之加木瓜苡仁 停音能困弱也

生脉湯 治注夏躰倦嗜卧百凡懶動動則喘

乏方出

日枸杞子

北五味子

研碎貯瓶內滾水泡封口少刻取服之可泡  
三次每服六錢久服為妙

濕門

明濕篇

生生子曰六氣之中濕為四之氣土之所司脾為  
之主五運六化篇曰土之化曰濕曰雨主於長  
夏長夏謂六月也土生於火長在夏中既長而  
旺土潤溽暑濕化行也蓋燥則土生乾則土死  
泉出地中濕化信矣經曰地氣上為雲天氣  
為雨雨出地氣雲出天氣則土雨之化見也  
曰濕勝則濡洩人每夏月洩瀉多以胃苓湯

元散五苓散取効者實治濕令之勝也

生生子曰內經云諸濕腫滿皆屬脾土濕勝則  
瀉地之濕氣感則害人皮肉筋脉又曰因  
首如裹蓋首者諸陽之會至高至清若濕  
蒸而沉重似有物以蒙之也失而不治則  
熱、傷血不能養筋故大筋綆短而為拘  
傷筋不能束骨故小筋弛長而為萎弱矣濕  
為邪有自內得者有自外得者陰雨濕地皆  
可因飲食湯飲醱酪皆內所因有濕寒者有

熱者丹溪曰六氣之中濕執火為病十居八九濕  
在上宜微汗之不欲大汗濕在下宜利小便此  
淡滲治濕也濕雖有內外二因然治法大抵要  
實脾土為主緣脾惡濕苟脾土不燥則失其健  
運之常病易乘之內濕多則泄瀉生痰流於經  
絡肢節則腫痛外濕多則跗腫而肌肉濡潰原  
病式曰諸瘰強直積飲痞膈中滿霍亂吐下躄  
重跗腫肉如泥按之不起皆屬於濕是以蒼白  
二木為必用之藥加入二陳湯用之如濕在肌

表及上焦加羌活防風之類取風能勝濕之意  
如下焦腰足跗腫及泄瀉輕者加入五苓散重  
者加羌活防風升麻以升提之此無上妙法也  
真孫曰濕為土氣火熱能生濕土故夏熱則萬  
物濕潤秋涼則萬物乾燥濕病本不自生因熱  
而怫鬱不能宣行水道故停滯而生濕也况脾  
土脆弱之人易為感冒豈必待不流而後為濕  
哉人只知風寒之威嚴不知暑濕之炎烈感  
於冥之中也病式云諸瘧強直積飲等症

屬於濕或腑腫躄寒而有水氣裏必小便赤少  
不通或渴是蓄熱入裏極深非病寒也大抵治  
法宜實脾清熱利小便為上故治濕不利小便  
非其治也宜桂苓甘露木香葶藶木通治之守  
真師曰葶藶木香散下神芎丸此藥下水濕消  
腫脹利小便理脾胃無出乎此也腹脹脚腫其  
者舟車丸下之濕熱內鬱發黃茵陳湯下之  
佐以防已黃芪一身盡腫痛或無汗是濕流  
節邪氣在表宜五苓散加官桂蒼朮微汗之不

可大汗若自出汗多熱燥津液內竭小水不利  
切勿利之重損津液也宜防風白木甘草湯主  
之其濕症有二濕熱症多濕寒症少當以脉症  
明辨之如脉滑數小便赤澀引飲為濕熱症若  
小便自利清白大便瀉利身疼自汗為濕寒  
治之宜五苓散加生附子蒼朮木瓜主之  
金匱防已黃芪湯 治風濕脉浮身重汗出惡風  
或疼

防已 黃芪 甘草 白朮

各一兩 炙五錢 七錢

右每服一兩入姜棗煎 喘者加麻黃胃氣  
不和加芍藥氣上衝加桂枝下有寒加細辛  
按濕勝身重陽微中風則汗出惡風故用黃  
芪炙甘草實表防已白朮勝濕也

桂枝附子湯 治風濕相搏身體痛煩不能轉側  
不嘔不渴脉浮虛而澹者此湯主之

桂枝 八錢 生薑 六錢 附子 三錢 炙甘草 四錢

右作二次入棗煎服小便自利者去桂加白  
朮湯主之服後其人如冒狀乃藥加使然也

勿怪

附子湯 治風濕相搏骨節痛煩掣痛不得

近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不  
衣或身微腫痛者

白朮各四兩附子三錢桂八錢

煎服 金匱方減桂枝加生姜大棗名白

附子湯

小湯 治濕勝身煩痛

桂枝四錢甘草炙二錢杏仁二十五枚

水煎取微汗 金匱減桂朮加薏苡

名麻黃薏苡杏仁甘草湯 治濕勝身疼日

劇者

加味五苓散 治濕勝身疼小便不利身重

白朮方加薏苡活此乃太陽滲利之劑治風濕

虛之藥也

五積散 治外感風寒冒寒濕身軀重痛

藏云麻黃桂芍甘草即麻黃桂枝各半湯也

蒼朮甘草陳皮厚朴即平胃散也枳殼桔梗陳

皮茯苓半夏即桔梗半夏等湯也又川芎當歸  
治血蕪乾姜厚朴散氣此數藥相合為解表溫  
中泄濕之劑去痰消痞調經之方雖為內寒外  
感表裏之分之所製實非仲景表裡麻黃桂枝  
姜附之的方也至於積冷嘔泄時疫項背拘急  
加菝白豆豉厥逆加吳茱萸寒熱欬逆加棗婦  
人難產加醋始知用之非一途也惟知活法者  
其擇之 此方一兩加生姜五片水煎入射香  
再煎二沸治中濕而致癱瘓與中風相似二服

方滲濕湯 治寒濕所傷身重腰冷如坐水中  
小便或澁大便溏瀉皆坐卧濕地或陰雨所襲  
之也 蒼朮 白朮 甘草各一

乾姜 茯苓各二 陳皮 丁香各半  
每服四錢入棗煎服

五苓散 濕熱勝發熱黃疸

陳蒿一兩 五苓散錢五 水煎服

反濕 治濕熱內甚心腹脹滿小便不利大  
泄

紅半一兩 木香一錢 滑石六兩 檳榔三錢

西猪苓 澤瀉 白朮

甘草二錢

每服七錢入姜水煎服

治濕熱內外餘熱水腫腹脹小便

二便瀉

茯苓 猪苓 白朮各一

木香五分 澤瀉 木通 甘草

桂枝各五 滑石三兩

右為細末每服三五錢白湯調下

劉河間曰若小便不得通利而反轉泄者乃濕

熱痞悶極深而攻之不開是融反為注泄此正

氣已衰而多難救慎不可與攻也然當滋其化

源

表垣清燥湯 表裡有濕熱痿厥癱瘓不能行走

或足踝膝上皆腫痛口乾瀉痢方在注夏

吐劑

芩蒂散 治中寒濕頭痛面黃鼻塞煩而脉大

瓜蒂一味為末以少許吹入鼻中黃水自出  
按濕盛致痰液番膈上肩背重痛麻痺者宜此  
吐之

攻下之劑

宣明三花神祐丸 治一切水濕腫病大腹實脹  
喘滿

舟車丸

大黃 二兩 甘遂

大戟

芫花

青皮

陳皮 各一兩

牽牛

木香 各半兩

為末滴水丸如梧子大每服六七十丸白湯

清川散

大黃 煨

郁李仁 各二兩 甘遂 一兩 芒硝 半兩

牽牛 頭末 四兩

右為末姜湯調下空心臨卧隨症加減服

導水丸

濕熱內鬱胸膈痞滿嘔衄口舌生瘡咽

喉不利牙疳齒蝕口臭或遍身生濕瘡乾疥睡

語咬牙驚惕怔忡大小便滯澁風熱酒毒蘊熱

尋症

大黃

黃芩各二

牽牛頭末

滑石各四

為末水丸如梧子大每服五十丸白湯下臨

時隨症加減

除濕丹 諸濕相搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊

急津液凝澁便溺不利

檳榔

甘遂

威靈仙

赤芍

澤瀉

葶藶

杏仁各二

沒藥各一

牽牛五錢

大戟兩

炒三

咄木皮四兩

右為末糊丸梧子大每服五七十九丸溫水下

劉宗厚曰按此出太陽例藥諸濕鬱滯於表

重痛沉著非此不能除但中病即止虛弱者

慎

東垣海金沙散 脾濕太過遍身腫滿喘不得卧

及腹脹如鼓

牽牛

微炒一兩半

甘遂

五錢

白木

一兩

海金沙

三錢

右為末每服二錢煎逆流水調下得利止後

服

聖靈丹

脾肺有濕喘滿腫盛小便赤澁

苦苧麻炒四兩

漢防已

木香

茯苓寒 鱉龜 龜鱉

木通

人參

各二錢半

右為末棗肉為丸梧子大每服三十丸桑白

皮湯下

續隨子丸

肺經有濕通身虛腫滿悶不快或逆

或喘

人參

防已

赤茯苓

煨如上

檳榔

木香

各五錢

苧麻

炒四兩

續隨子

一兩

海金沙

半兩

為末棗肉丸梧子大每三十丸棗皮湯下

64 VOLS in 8 VOLS

\$35.00

