

T 7970/2240(8)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

神農本草經疏卷之十

草部下品之上

總六十二種今疏其要者一十六種

附子

半夏

大黃

葶藶

桔梗

草蒿

旋復花

藜蘆

射干

常山

甘遂

白欬

白及

大戟

貫衆

哈佛大學哈佛藥宗
圖書館珍藏印

羊躑躅

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣
溫中金瘡破癥堅積聚血痲寒溼踈躄拘攣膝
痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍
亂轉筋下痢赤白墜肌骨強陰又墮胎為百藥
長冬月採為附子春採為烏頭忌豉汁得蜀椒
食鹽可引之下

行地膽為之使惡蜈蚣畏防風
黑豆甘草黃耆人參童便犀角

疏○附子全稟地中火土燥烈之氣而兼得

步

乎天之熱氣故其氣味皆大辛大熱微兼甘
苦而有火毒氣厚味薄陽中之陰降多升少
浮中沉無所不至入手厥陰命門手少陽三
焦兼入足少陰太陰經其性走而不守得甘
草則性緩得肉桂則補命門本經主風寒欬
逆邪氣寒溼踈躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能
行步以此諸病皆由風寒溼三邪客之所致
也邪客上焦則欬逆邪客下焦則成踈躄拘

二
攣膝痛脚疼冷弱不能行步此藥性大熱而
善走故亦善除風寒溼三邪三邪祛則諸證
自瘳矣癥堅積聚血瘀皆血分虛寒凝而不
行所成血得熱則行故能療之其主金瘡亦
謂金瘡爲風寒所鬱擊血瘀不活之證而非
血流不止之金瘡也別錄又主嘔昏風寒脚
氣冷弱心腹冷痛及脾虛寒者爲霍亂
客下焦肝腎之分爲轉筋備諸補氣藥則溫

中補血藥則強陰堅肌骨火能消物氣性熱
極入血善行故善墜胎爲百藥長引參朮黃
耆茯苓則溫煖脾胃除脾溼祛腎寒補下焦
陽虛佐之以桂則除臟腑沉寒三焦厥逆溼
淫腹痛胃寒虵動氣虛經閉補陽虛散虛壅
亦可入足太陽少陰故治督脉爲病脊強而
厥督脉夾脊而上並足太陽膀胱經膀胱者
腎之府故主之也天雄烏頭側子本是同生

第其形質有異老嫩或殊大熱大毒則未始有別也

主治參互

附子得生乾薑桂枝主傷寒直中陰經溫中散寒而能出汗 佐人參兼肉桂五味子則補命門相火不足回陽有神 得人參肉桂治元氣虛人暴寒之氣入腹腹痛作泄完穀不化小水不禁佐白朮爲除寒溼之聖藥

得黃耆人參炙甘草白芍藥橘皮五味子主癰疽潰後去膿血過多以致飲食不進惡心欲嘔飲食不化不生肌肉亦主久漏冷瘡 得人參白芍藥炙甘草砂仁橘皮主小兒慢驚加蓮肉白藕豆則治吐瀉不止 得木桂 牛膝木瓜橘皮主寒疝痛極立止 得木木瓜石斛草薺薏苡仁橘皮茯苓治風溼麻痺腫痛脚氣之無熱證者輒驗 得人參橘皮

記趙香

主以病嘔噦反胃虛而無熱者良 經曰腎
苦燥急食辛以潤之附子同肉桂之辛入八
味丸以潤腎燥陽虛無熱證者宜之

簡談

附子既稟地二之火氣兼得乎天之熱氣以
生是陰陽湊合無非火熱為性氣味皆然毒
可知已論其性質之所能乃是退陰寒益陽
火兼除寒溼之要藥引補氣血藥入命門益

相火之上劑若非陰寒寒溼陽虛氣弱之病
而誤用之於陰虛內熱血液衰少傷寒溫病
熱病陽厥等證靡不立斃謹列其害如左醫
師司命宜詳玩而深鑒之亦生人之大幸也
傷寒陽厥其外證雖與陰厥相類而其內實
不相侔何者陽厥之病若係傷寒溫疫其先
必發熱頭疼口渴其後雖頭不疼而表熱已
除然必面赤顴紅二便不利小水必赤或短

少是其候也此當下之病也產後血虛角弓反張病名曰瘈瘲者勁也是去血過多陰氣暴虛陰虛生內熱熱則生風故外兼現乎風證其實乃陰血不足無以榮養於筋所致足厥陰肝家大虛之候此宜益陰補血清熱則愈也故凡病人一見內熱口乾咽乾口渴渴欲引飲咳嗽多痰煩躁五心煩熱骨蒸勞熱惡寒陰虛內熱外寒虛火上攻齒痛脾陰不

足以致飲食無味小便黃赤短澀及不利大便不通或燥結腹內覺熱悶喜飲冷漿及鮮果畏火及日光兼畏人聲木聲虛陽易興夢洩不止產後發熱產後血行不止及惡瘡臭穢小產增寒壯熱中暑厥暈陰虛頭暈中暑暴泄利下如火赤白滯下小兒中暑傷食作泄小便短赤口渴思飲血虛腹痛按之即止火炎欲嘔外類反胃而惡熱焦煩得寒暫止

中熱腹中絞痛中暑霍亂吐瀉或乾霍亂或
 久瘧寒熱並盛或赤白濁赤白淋尿血便血
 血崩吐衄齒衄舌上出血目昏神短耳鳴盜
 汗汗血多汗惡熱老人精絕陽痿少年縱慾
 傷精以致陰精不守精滑腦漏婦人血枯無
 子血枯經閉腎虛小便餘瀝血虛大便燥結
 陰虛口苦舌乾心經有熱夢寐紛紜下部溼
 熱行履重滯溼熱痿痺溼熱作泄溼熱腳氣

小兒急驚內熱痘瘡乾焦黑陷痘瘡火閉不
 出痘瘡皮薄嬌紅痘瘡因熱咬牙痘瘡挾熱
 下利痘瘡餘毒生癰中風殭仆不語中風口
 眼歪邪中風語言蹇澀中風半身不遂中風
 痰多神昏一切癰疽未潰金瘡失血發瘕血
 虛頭痛偏頭風痛上來內外男婦小兒共七
 十餘症病屬陰虛及諸火熱無關陽弱亦非
 陰寒法所均忌倘誤犯之輕變爲重重者必

歿枉害人命此藥居多臨證施治宜謹審之
 世徒見其投之陽虛之候肺腎本無熱證者
 服之有起歿之殊功而不知其用之陰虛如
 上諸病亦復下咽莫救故特深著其害以表
 其非嘗試輕用之藥也業醫君子可不慎諸
 半夏味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒寒熱心
 下堅下氣咽喉腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗
 消心腹胸膈痰熱滿結咳嗽上氣心下急痛堅

痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生

令人吐熱令人下用之湯洗令滑盡射干為之使惡毛落

畏雄黃生薑乾姜秦皮鼈甲反烏頭忌羊血海藻館糖

疏○半夏得土金之氣兼得乎天之燥氣故
 其味辛平苦溫火金相搏則辛而有毒潔古
 謂味辛苦性溫氣味俱薄沉而降好古謂其
 辛厚苦輕陽中陰也入足太陰陽明少陽亦
 入手少陰經柴胡為之使辛溫善散故主傷

寒邪在表裏之間往來寒熱苦善下泄邪在胸中則心下堅胸脹欬逆邪在上焦則頭眩邪在少陰則咽喉腫痛別錄亦謂其消心腹胸膈痰熱滿結欬逆上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆亦皆邪在上焦胸中之所致故悉主之也中焦者足太陰之所治也有溼有熱清濁不分則腸鳴溼熱勝則自汗入足太陰故并主之辛能散結故消癰腫脾家溼熱則面

色痿黃實脾分水燥溼則前證俱除面目凹而滑澤矣辛溫有毒故墮胎也

主治參互

張仲景傷寒論小結胸痛正在心下按之則痛脉浮而滑者小陷胸湯王之半夏半升黃連一兩栝樓實大者一箇水六升先煮栝樓至三升去滓內二味煮取二升分三服又治少陰咽痛生瘡不能言語聲不出者苦酒

湯主之半夏七枚打碎雞子一枚頭開一竅
 去黃納苦酒令小滿入半夏在內以環子坐
 於炭火上煎三沸去滓置盃中時時嚥之極
 驗未瘥更作 金匱要略治支飲作嘔嘔家
 本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似
 嘔不嘔似噦不噦心下憤憤並宜小半夏湯
 用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一
 升五合分溫服 又治嘔噦眩悸穀不得下

半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三
 兩切以水七升煎一升半分溫服之 又心
 下悸忪半夏麻黃丸半夏麻黃等分爲末蜜
 丸小豆大每服三十九日三 又嘔吐反胃
 大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升水
 一斗二升和揚之一百二十遍煮取三升半
 溫服一升日再服亦治膈間支飲 又張仲
 景方治黃疸喘滿小便自利不可除熱者用

半夏半斤生薑半斤水七升煮一升五合分
再服有一人氣結而厥心下暖以此少許入
口其人遂活 潔古活法機要方風痰頭暈
嘔逆目眩面青黃色脉弦者水煮金花丸用
生半夏生天南星寒水石煨各一兩天麻半
兩雄黃二錢小麥麩三兩爲末水和成餅水
煮浮起漉出搗丸梧子大每服五十九薑湯
下極効亦治風痰咳嗽二便不通風痰頭痛

又治風痰喘逆兀兀欲吐眩暈欲倒半夏
一兩雄黃三錢爲末薑汁浸蒸餅丸梧子大
每服三十九薑湯下巴吐者加檳榔 又治
溼痰咳嗽面黃體重嗜臥兼食不消脉緩者
白朮丸用半夏南星各一兩白朮一兩半爲
末薄糊丸梧子大每服五十九薑湯下 又
治氣痰咳嗽面白氣促洒淅惡寒愁憂不樂
脉澹者玉粉丸用半夏南星各一兩官桂半

兩爲末糊丸梧子大每服五十九薑湯下
和劑局方治停痰留飲胸膈滿悶氣短惡心
飲食不下或吐痰水茯苓半夏湯用半夏泡
五兩茯苓三兩每服四錢薑七片水一鍾半
煎七分甚捷徑 又搜風化痰安神定志利
頭目辰砂化痰丸用半夏麴三兩天南星炮
一兩辰砂枯礬各半兩爲末薑汁打糊丸梧
子大每服三十九食後薑湯下 又治風痰

喘急千縉湯用半夏湯洗七箇甘草炙皂菰
炒各寸許薑三片水一盞煎七分溫服 又
治停痰冷飲嘔逆橘皮半夏湯用半夏水煮
熟陳橘皮各半兩每服四錢生薑七片水二
盞煎一盞溫服 又治胃寒噦逆停痰留飲
藿香半夏湯用半夏湯泡炒黃二兩藿香一
兩丁皮半兩每服四錢水一盞薑七片煎服
又治伏暑引飲脾胃不和消暑丸用半夏

醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤為末薑汁
 麵糊丸梧子大每服五十九熱湯下 又治
 中焦痰涎利咽清頭目進飲食半夏泡七次
 四兩枯礬一兩為末薑汁打糊或煮棗肉和
 丸梧子大每薑湯下十五丸寒痰加丁香五
 錢熱痰加寒水石煨四兩名玉液丸 御藥
 院方治膈壅風痰半夏半斤酸漿浸一宿溫
 湯洗五十遍去惡氣日乾為末漿水搜作餅

日乾再研為末每五兩入生龍腦一錢以漿
 水濃脚和丸雞頭子大紗袋盛避風處陰乾
 每服一丸好茶或薄荷湯嚼下 葉氏方治
 風痰溼痰青壺丸半夏一斤天南星八兩各
 湯泡晒乾為末薑汁和作餅焙乾入神麩半
 兩白朮末四兩枳實末二兩薑汁麵糊丸梧
 子大每服五十九薑湯下 作三仙丸能化
 痰利氣 斗門方消痰開胃去胸膈壅滯用

半夏洗泡焙乾為末自然薑汁和作餅溼紙
 裹煨香以熟水二盞同餅二錢入鹽五分煎
 一盞服之大壓痰毒及酒食傷極驗 機要
 又治結痰不出語音不清年久者亦宜玉粉
 丸半夏半兩桂心一字草烏半字為末薑汁
 浸蒸餅丸芡實大每服一九夜臥含嚥 活
 幼口議治小兒痰吐或風壅所致或咳嗽發
 熱飲食即嘔半夏泡七次半兩丁香一錢以

半夏末水和包丁香用麵重包煨熟去麵為
 末生薑自然汁和丸麻子大每服二三十丸
 陳皮湯下 肘後方治冒寒霍亂腹脹用半
 夏桂枝等分為末水服方寸匕 又治產後
 暈絕半夏末冷水和丸大豆大納鼻中即愈
 此扁鵲法也 永類鈴方打撲瘀痕水調半
 夏末塗一宿即沒 魏元君方卒歿不寤用
 半夏末吹鼻中即活 子母秘錄治五絕急

病一曰自縊二曰牆壓三曰溺水四曰魘魅
五日產乳並以半夏末納大豆一丸入鼻中
心溫者一日可活也 劉長春經驗方治吹
奶腫痛半夏一箇煨研酒服立驗一方以末
隨左右嚙鼻効 篋中方治蝎螫螫人用半
夏末水調塗之立止

簡誤

半夏辛溫性燥而有毒雖能祛溼分水實脾

開寒溼痰氣鬱結痰而其所大忌者乃在陰
虛血少津液不足諸病故古人立三禁謂血
家渴家汗家也故凡一切吐血衄血咯血齒
衄舌上出血金瘡產後失血過多尿血便血
腎水真陰不足發渴中暑發渴陽虛自汗陰
虛盜汗內熱煩躁出汗諸證皆所當禁者也
然三禁之外應忌者尚多茲更詳列於後凡
咳嗽由於陰虛火空上炎燂肺喉痒因而發

嗽內熱煎熬津液凝結爲痰所致而不由於寒溼病本乎肺而不本乎脾嘔吐由於火衝胃熱而不由於寒溼痰壅飲食不化由於脾陰不足而不由於因溼脾慢嘔噦眩悸穀不得下由於胃氣虛弱見食厭惡而不由於寒溼邪所干霍亂腹脹由於脾虛邪熱客中焦而不由於寒溼飲食停滯咽痛由於陰虛腎水不足則水涸而陽無所附故火空上炎而發咽痛而不由於傷寒少陰病邪熱不解氣喘由於氣虛而不由於風寒所鬱頭痛由於血虛而不由於痰厥小兒吐痰由於傷熱而不由於脾胃不寐由於心經血少而不由於病後膽虛自汗由於表虛腠理不固而不由於溼熱內容自勝如上諸證法所同禁其所最易誤而難明者世醫類以其能去痰凡見痰嗽莫不先投之殊不知咳嗽吐痰寒熱骨

蒸類皆陰虛肺熱津液不足之候誤服此藥
愈損津液則肺家愈燥陰氣愈虛濃痰愈結
必致聲啞而歿若合參朮禍不旋踵蓋以其
本脾胃家藥而非肺腎藥也寒溼痰飲作嗽
屬胃病者固宜然亦百之一二其陰虛火熾
煎熬真陰津液化為結痰以致喉痒發咳者
往往而是故凡痰中帶血口渴咽乾陰虛咳
嗽者大忌之又有似中風痰壅失音偏枯拘

攣及二便閉澀血虛瘦痛於法並忌犯之過
多則非藥可救吉凶貿理悔不可追責在司
命謹諸戒諸

大黃味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破
癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利
水穀調中化食安和五藏平胃下氣除痰實腸

間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老

血留結

黃芩為之使無所畏

疏○大黃稟地之陰氣獨厚得乎天之寒氣亦深故其味至苦其氣大寒而無毒入足陽明太陰厥陰并入手陽明經氣味俱厚味厚則發泄故其性猛利善下泄推陳致新無所阻礙所至蕩平有戡定禍亂之功故號將軍味厚則入陰分血者陰也故主下瘀血血閉寒熱癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃通利水穀其曰調中化食安和五藏者槩指臟腑積滯既去則實邪散而中自調臟自和也別錄又云平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒熱女子因寒血凝閉而作脹少腹痛因於血閉及諸老血留結皆由通利開導之力所致也總之此藥乃除實熱燥結下有形積滯之要品隨經隨證以爲佐使則奏功殊疾矣

主治參互

大黃君枳實厚朴為小承氣湯治傷寒熱病邪結中焦 治傷寒病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也大黃黃連瀉心湯主之大黃二兩黃連一兩以麻沸湯二升漬之須臾絞汁分作二次溫服 潔古用以瀉諸實熱不通及瀉心下痞滿由於實皆本仲景法也 亦治滯下赤白初起壯實之人可回枳殼檳榔當歸甘草滑石作丸投之

是迎而奪之之法也然不可過劑過劑則傷胃氣 同城及白斂炒陳小粉沒藥乳香醋蜜調傅作癰腫圍藥 凡實熱溼痰為病以錦紋大黃酒蒸八兩入前胡八兩橘紅四兩外另以青礞石二兩同煅硝二兩入砂罐固濟煨紅研末二兩右各取末以水發為丸梧子大每常服一二十丸小病五六丸緩病七八十丸急病一百二十丸溫水吞下即臥

勿動候藥逐上焦痰滯次日先下糟粕次下
 痰涎未下再服惟妊娠水泄忌之 仲景金
 匱玉函方云凡人食已即吐此胸中有火也
 大黃一兩甘草炙二錢五分水一碗煮半升
 溫服此真方滾痰丸也治一切因痰發為怪
 證若入霞天膏為丸更妙 西大黃拌蜜及
 竹瀝丸蒸丸晒粉糊為丸如麻子大薄荷湯
 各三錢治中上二焦有熱痰因發偏頭風諸

藥不効目將損者有殊功又治中焦脾胃溼
 熱下流客腎以致飽後夜臥即夢遺臨臥以
 升麻陳皮湯吞三四錢溼熱去即止

簡誤

經曰實則瀉之大黃氣味大苦大寒性稟直
 遂長於下通故為瀉傷寒溫病熱病實熱熱
 結中下二焦二便不通及溼熱膠痰滯於中
 下二焦之要藥祛邪止暴有撥亂反正之殊

功第其峻利之性猛烈之氣長驅直搗一往
不返如武王伐紂前徒倒戈血流漂杵雖應
天順人救民水火然亦不免於未盡善之議
矣故凡血閉由於血枯而不由於熱積寒熱
由於陰虛而不由於瘀血癥瘕由於脾虛胃
弱而不由於積滯停畱便閉由於血少腸燥
而不由於熱結不通心腹脹滿由於脾虛中
氣不運而不由於飲食停滯女子少腹痛由

於厥陰血虛而不由於經阻老血瘀結滯下
初起卽屬胃虛當以補養胃氣清消溼熱爲
本而不可以妄加推蕩瘧病傷於暑氣而不
由於山嵐溼熱吐衄血由於陰虛火起於下
炎鑠乎上血熱妄行溢出上竅而不由於血
分實熱腰脚風氣由於下元先虛溼熱下流
因茲致病而不專由於風溼外侵骨蒸積熱
本於陰精不足而非實熱所致偏墜由於腎

虛溼邪乘虛客之而成而不由於溼熱實邪所犯乳癰腫毒由於肝家氣逆鬱抑不舒以致勞氣不從逆於肉裏乃生癰腫而不本於膏粱之變足生火疔血分積熱所發法咸忌之以其損傷胃氣故也故傷寒家調胃承氣湯中用甘草以和之正謂是也輕發誤投多致危殆戒之戒之

葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痹痺利小腹久服令人虛得酒良

疏○葶藶稟陰金之氣以生故其味辛苦大寒無毒氣薄味厚陽中陰也爲手太陰經正藥故仲景瀉肺湯用之亦入手陽明足太陽經肺屬金主皮毛膀胱屬水藏津液肺氣壅塞則膀胱與焉譬之上竅閉則下竅不通下

竅不通則水溼泛溢為喘滿為腫脹為積聚
種種之病生矣辛能散苦能泄大寒沉陰能
下行逐水故能療本經所主諸病十劑云泄
可去閉葶藶之屬是矣至苦極寒有瀉無補
暫用尚能損真久服寧不令人虛也

主治參五

趙長佑

金匱方肺癰喘急不得臥葶藶大棗瀉肺湯
記
上之葶藶炒黃搗末蜜丸彈子大每用大棗

趙香珍

二十枚水三升煎取二升入葶藶一九更煎

取一升頓服亦主支飲不得息 外臺秘要

通記 身腫滿苦葶藶炒四兩為末棗肉和丸梧

子大每服十五丸桑白皮湯下日三大効

千金方腹脹積聚葶藶子一升熬以酒五升

浸七日日服三合 篋中方痰飲咳嗽含奇

丸用葶藶子一兩紙襯炒令黑知母貝母各

一兩棗肉半兩砂糖一兩半和丸彈子大每

以新綿裹一丸含之嚥津甚者不過三丸

簡誤

葶藶瀉肺利小便治腫滿之要藥然味苦大寒走而不守不利於脾胃虛弱及真陰不足之人凡腫滿由於脾虛不能制水水氣泛溢小便不通由於膀胱虛無氣以化者法所咸忌犯之則輕病重重必危慎之近世甜苦二種據本經云辛苦則甜者非矣總之療體皆

以行水泄閉為用多服久服咸不宜耳

桔梗味辛苦微溫有小毒主胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒

疏○桔梗本經味辛氣微溫別錄加苦云有小毒神農醫和岐伯雷公咸曰無毒而復加甘觀其所主諸病應是辛苦甘平微溫無毒入手太陰少陰兼入足陽明胃經味厚氣輕

陰中之陽升也傷寒邪結胸脇則痛如刀刺
邪在中焦則腹滿及腸鳴幽幽辛散升發苦
洩甘和則邪解而氣和諸證自退矣其主驚
恐悸氣者心脾氣血不足則現此證諸補心
藥中藉其升上之力以爲舟楫勝載之用此
佐使之職也別錄利五臟腸胃補血氣者蓋
指邪解則臟腑腸胃自和和則血氣自生也
除寒熱風痺溫中療喉咽痛下蠱毒者皆散

邪解毒通利之功也消穀者以其升載陽氣
使居中焦而不下陷則脾中陽氣長浮而穀
食自消矣甄權用以治下痢及去肺熱氣促
者升散熱邪之故也日華子用以除邪辟瘟
肺癰排膿潔古用以利竅除肺部風熱清利
頭目咽嗑胸膈滯氣及痛除鼻塞者入肺開
發和解之功也好古以其色白故爲肺部引
經與甘草同行爲舟楫之劑諸藥有此一味

不能下沉也

主治參互

朱肱活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼
取其通肺利膈下氣也 張仲景傷寒論治
傷寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中散
邪消穀破積也又治肺癰唾膿用桔梗甘草
取其苦辛清肺甘溫瀉火又能排膿血補內
漏也其治少陰證二三日咽痛亦用桔梗甘

草取其苦辛散邪甘平除熱合而用之能調
寒熱也後人易名甘桔湯通治咽喉口舌諸
病 南陽活人書治傷寒腹脹陰陽不和者
桔梗半夏湯主之桔梗半夏陳皮各三錢薑
五片煎服 簡要濟衆方治痰嗽喘急桔梗
一兩半爲末用童子小便半升煎四合去滓
溫服 仲景金匱玉函方治肺癰咳嗽胸滿
振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐

膿如粳米粥者桔梗一兩甘草二兩水三升
 煮一升分溫再服朝暮吐膿血則瘥 千金
 方治喉痺毒氣桔梗二兩水三升煮一升頓
 服 仲景傷寒論少陰證二三日咽痛者可
 與甘草湯不瘥者與甘桔湯主之桔梗一兩
 甘草二兩水三升煮一升分服又可治口舌
 生瘡 永類鈴方治齒鑿腫痛桔梗薏苡仁
 等分爲末服 經驗方治骨槽記風牙齦腫痛

者桔梗爲末棗瓢和丸皂子大綿裹咬之仍
 以荆芥湯漱之 衛生易簡方治牙疳臭爛
 桔梗苗香等分燒研傅之 普濟方治鼻衄
 桔梗爲末水服方寸七日四服一方加生犀
 角屑 古今錄驗方治中蠱下血如雞肝晝
 夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或鼻破將
 死者苦梗爲末以酒服方寸七日三服不能
 下藥以物拘口灌之心中當煩須臾自定七

日止當食猪肝肺以補之一方加犀角等分
聖惠方治妊娠中惡心腹疼痛桔梗一兩
生薑三片煎溫服 張文仲備急方治小兒
客忤死不能言桔梗燒研三錢米湯服之仍
吞麝香豆許

簡誤

桔梗之性屬陽而升凡病氣逆上升不得下
降及邪在下焦者勿用凡攻補下焦藥中勿

入雷公云凡使用木梗真似桔梗只是
之腥澀不堪為異

草蒿味苦寒無毒主疥瘡痂痒惡瘡殺蟲留熱
在骨節間明目一名青蒿

疏○草蒿青蒿也稟天地芬芳之氣以生故
其味苦其氣寒而芬芳其性無毒疥瘡痂痒
惡瘡皆由於血熱所致留熱在骨節間者是
熱伏於陰分也肝胃無熱則目明苦能泄熱

苦能殺蟲寒能退熱熱去則血分平和陰氣日長前證自除故悉主之也諸苦寒藥多與胃氣不宜惟青蒿之氣芬芳可人香氣先入脾故獨宜於血虛有熱之人以其不犯胃氣故爾是以薺勞虛熱非此不除矣

主治參互

青蒿得鼈甲地黃牛膝枸杞麥門冬五味子除一切產後虛熱寒熱淹延不解亦治一切

虛勞寒熱陰虛五心煩熱腎水真陰不足以致骨蒸勞熱此爲要藥 陶隱居謂其生接傳金瘡大止血生肉止疼痛以帛裹之 陳藏器謂其主鬼氣尸疰伏雷婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗 日華子謂其能補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮髮黑不老心痛熱黃主搗汁服 百一方治蜂螫人嚼青蒿傅瘡上卽瘥 斗門方治

男婦勞瘦用青蒿細剉水三升童便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如梧子大每空心及臨臥溫酒吞二十九 靈苑方
 治虛勞寒熱肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時採之去枝梗以童便浸三日曬乾為末每服二錢烏梅一箇煎湯服 崔元亮
 海上方治骨蒸鬼氣用童便五大斗澄清青蒿五斗八九月採帶子者最好細判相和納

大釜中以猛火煎取三大斗去滓漑釜令淨再以微火煎可二大斗入猪膽一枚同煎一大斗半去火待冷以磁器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟為末以煎和搗干杵為丸空腹粥飲下二十九漸增至三十九止 十便良方治骨蒸煩熱用青蒿一握猪膽汁一枚杏仁四十個去皮尖炒以童溺一大盞煎五分空心溫服 聖惠總錄治虛勞盜汗煩

熱口乾用青蒿一斤取汁熬膏入沙參末麥冬末各一兩同熬至可丸丸如梧子大每食後米飲服二十九名青蒿煎肘後方治瘡疾寒熱用青蒿一握水二升搗汁服之仁存方治溫瘧痰盛但熱不寒用青蒿二兩童便浸焙黃丹半兩為末每服二錢白湯調下衛生易簡方治鼻衄青蒿搗汁服之并塞鼻中極驗永類鈴方治酒痔便血青蒿用

葉不用莖用莖不用葉為末血從糞前冷水調糞後溫酒調服濟急方治牙齒腫痛青蒿一握煎漱之聖惠方治耳中出膿青蒿為末綿裹納耳中

簡誤

產後氣虛內寒作瀉及飲食停滯泄瀉者勿用凡產後脾胃薄弱忌與當歸地黃同用旋覆花味鹹甘溫微溫冷利有小毒主結氣脇

下滿驚悸除水去五藏間寒熱補中下氣消胸
上痰結唾如膠漆心脇痰水膀胱留飲風氣溼
痺皮間死肌目中眵眦利大腸通血脉益色澤
一名金沸草五月采花日乾

疏○旋覆花別錄甄權日華子寇宗奭皆無
毒宗奭又加苦白辛而曰冷利其稟冬之氣而
生者乎故其味首係之以鹹潤下作鹹鹹能
軟堅別錄加甘甘能緩中微溫溫能通行故

主結氣脇下水瀕心脾伏飲則病驚悸飲消
復常矣除水去五臟間寒熱及消胸上痰
唾如膠漆心脇痰水膀胱留飲風氣溼痺皮
間死肌目中眵眦利大腸者皆軟堅冷利潤
下消痰飲除水之功也其曰補中下氣者以
甘能緩中鹹能潤下故也通血脉益色澤者
蓋指飲消則脾健健則能運行脾裹血又說
血故也

主治參互

仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有
 七物旋覆代赭湯成無已曰鞭則氣堅旋覆
 之鹹以軟痞堅也 金匱要略治半產漏下
 虛寒相搏其脉弦花旋覆花湯用旋覆花三
 兩葱十四莖新絳少許水三升煮一升頓服
 胡洽治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花丸
 總微論治小兒看癩自看毛眼睫因癩退不

生用野油花即旋覆花赤箭即天麻苗防風
 等分爲末洗淨以油調塗之

簡誤

丹溪謂爲走散之藥病人涉虛者不宜多服
 冷利大腸虛寒人禁用

藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸
 癖頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉
 痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯

疏○藜蘆稟火金之氣以生故其味辛氣寒
別錄苦微寒有毒入手太陰足陽明經本經
主蠱毒欬逆及別錄療噦逆喉痺不通者皆
取其宣壅導滯之力苦為涌劑故能使邪氣
痰熱胸膈部分之病悉皆吐出也辛能散結
故主鼻中息肉苦能泄熱殺蟲故主洩痢腸
澀頭瘍疥癩殺諸蟲毒也瘡瘍皆溼熱所生
溼熱不去則肌肉潰爛苦寒能瀉溼熱則

刀惡瘡爛瘡外肌皆愈也味至苦入口即吐
故不入湯

主治參互

經驗方諸風痰飲藜蘆十分鬱金一分為末
每以一字溫漿水一盞和服探吐 簡要濟
眾方中風不省牙關緊急者藜蘆一兩去苗
濃煎防風湯洗焙乾切片炒為末每服半錢
小兒減半溫水調灌吐出風涎效 聖惠方

諸風頭痛以藜蘆一莖日乾研末入麝香少許吹鼻 保命集久瘧痰多不食欲吐不吐藜蘆末半錢溫漿水調下探吐

簡誤

藜蘆辛苦有大毒服一七則令人胸中煩悶吐逆不止凡胸中有痰飲或中蠱毒惡氣者止可借其上涌宣吐之力獲効一時設病非關是者切勿沾唇徒令人悶亂吐逆不止虧

損津液也

射干味苦平微溫有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣久服令人虛

疏○射干稟金氣而兼火火金相搏則辛而有毒故本經謂其味苦平有毒平亦辛也別錄微溫保昇微寒二說一義並無異云潔古

云味苦陽中陰也入手少陽少陰厥陰經苦能下洩故善降兼辛故善散故主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣胸中邪逆既降且散益以微寒故主食飲大熱別錄又主老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣甄權主疰氣消瘀血主女人月閉日華子主消痰破癥結胸膈滿腹脹氣喘咳癖寇宗奭主肺氣喉痺爲佳潔古主胃中癰瘡皆此意也

丹溪主行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷又治足厥陰溼氣下流因疲勞而發爲便毒悉取其洩熱散結之力耳故古方治喉痺咽痛爲要藥

主治參互

仲景金匱方治欬逆上氣喉中作水雞聲射干麻黃湯 入鼈甲煎丸治瘧母 袖珍方治咽喉腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令

焦去滓每噙棗許卽瘥 醫方大成治喉痺
 不通用扁竹新根插汁嚥之大腸動卽解或
 醋研汁噙引涎出亦妙 便民方亦治喉痺
 不通用紫蝴蝶根一錢黃芩生甘草桔梗各
 五分爲末水調頓服立愈名奪命散 永類
 鈴方治乳癰初腫用扁竹根如僵蚕者同萱
 草根爲末蜜調敷之神效 孫真人千金方
 治喉痺有烏嬰膏

趙

簡誤

射干雖能降手少陽厥陰相火洩熱散結消
 腫痛然無益陰之性故別錄云久服令人虛
 凡脾胃薄弱臟寒氣血虛人病無實熱者禁
 用

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發溫
 瘧鬼毒胸中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒

惡寒鼠瘦

畏玉札
忌菘菜

疏○常山稟天地陰寒之氣以生故其味苦寒別錄桐君益之以辛宜其有毒也苦泄辛散故善逐飲陰寒祛熱故善破瘴癘入口即吐其性暴悍又可知已本經主傷寒寒熱宜作主山嵐瘴氣^太熱發為溫瘧鬼毒胸中痰結古方治瘧多用蓋以嶺南西粵鬼方咸多山嵐瘴癘之氣所感邪氣充於榮衛皮膚之間欲去皮膚毛孔中瘴氣根本非常山不可

以其性能祛逐老痰積飲善散山嵐瘴癘之邪故也

主治參互

治山嵐瘴氣作瘧^記百藥不効秘方常山四兩

趙香玲

砂仁四兩檳榔二兩米醋浸入瓷器中二宿取出各炒燥為末雞子清和丸如菉豆大五更新汲水向東吞三五錢一服可止九月已後宜以酒吞 劉長春經驗方治瘴瘧寒熱

用常山一寸草果一枚熱酒一盞浸一宿五
更向東飲之蓋臥酒醒即愈 肘後方治三
十年老瘧及積年久瘧常山黃連各一兩酒
三升漬一宿以瓦釜煮取一升半發日早服
五合發時再服熱當吐冷當利無不瘥者

簡誤

常山陰毒之草也其性暴悍雖能破瘴癘逐
積飲然善損真氣故瘧非由於瘴氣及老痰

積飲所致者勿用經曰夏傷於暑秋必瘧瘧
又曰邪之所湊其氣必虛暑邪乘虛客於五
臟六腑十二經瘧亦因之而發內經載之詳
矣王好古分條立方殊得仲景遺意此皆瘧
之對病正藥也並不得妄用常山虛人真氣
變為危證戒之戒之清暑養胃健脾消痰乃
治瘧之正法稍久則當分氣血施補助靡不
愈者又安所事常山乎

甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹痛面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿瓜蒂為之使惡遠志反甘

草

疏○甘遂稟天地陰寒之氣以生故其味苦其氣寒而有毒亦陰草也水屬陰各從其類故善逐水其主大腹者即世所謂水蠱也又主疝瘕腹滿面目浮腫及留飲利水道穀道

下五水散膀胱留熱皮中痞氣腫滿者謂諸病皆從水溼所生水去飲消溼除是拔其本也潔古謂其味苦性寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結之處乃泄水之聖藥水結胸非此不能除故仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用其性之惡可槩見已其根皮赤肉白作連珠實重者良

主治參互

入陷胸湯治傷寒水結胸有神 聖濟總錄
治膜外水氣甘遂末大麥麩各半兩水和作
餅燒熟食之取利 肘後方治身面洪腫甘
遂末二錢以雄猪腰子一枚分作七片入末
在內溼紙包煨令熟每日服一片至四五服
當覺腹鳴小便利是其効也 張仲景金匱
玉函方治心下留飲堅滿脉伏其人欲自利
反快甘遂半夏湯用甘遂大者三枚半夏十
二枚以水一升煮半升入芍藥五枚水二升
煮半升去滓以蜜半升同煎至八合頓服之
筆峰雜興方治小便轉脬甘遂末一錢猪
苓湯調下立通 秘方治體氣甘遂末一錢
同猪肉煮食於野地中掘一坑令患人至彼
處向上風站立以甘草末唾調入臍內須臾
腹中作響取利下黑汁亟從上風奔回可絕
不絕再作一服仍前用之

簡誤

甘遂性陰毒雖善下水除溼然能耗損真氣
虧竭津液元氣虛人除傷寒水結胸不得不
用外其餘水腫鼓脹類多脾陰不足土虛不
能制水以致水氣泛濫卽劉河間云諸溼腫
滿屬脾土法應補脾實土兼利小便不此之
圖而反用甘遂下之是重虛其虛也水既蹙
去復腫必矣必察病屬溼熱有飲有水而

元氣尚壯之人乃可一施耳不然禍不旋踵
矣戒之戒之慎之慎之

白欵味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣
止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫
痛下赤白殺火毒

反烏頭

疏○白欵得金氣故味苦平平應作辛別錄
兼甘其氣微寒無毒苦則泄辛則散甘則緩
寒則除熱故主癰腫疽瘡散結止痛蓋以癰

疽皆由榮氣不從逆於肉裏所致女子陰中
腫痛亦由血分有熱之故火毒傷肌肉卽血
分有熱目中赤亦血熱爲病散結涼血除熱
則上來諸苦蔑不濟矣其治小兒驚癇溫瘧
及婦人下赤白則雖云驚癇屬風熱溫瘧由
於暑赤白淋屬溼熱或可通用然病各有因
藥各有主以類推之恐非其任矣尚俟後哲
詳之總之爲疔腫癰疽家要藥乃確論也

主治參互

白歛得白及紅藥子加硃砂雄黃乳沒腦麝
爲傅癰疽止痛散毒之上藥 肘後方治發
背初起水調白歛末傅之 聖惠方治疔瘡
初起同上 陶隱居治一切癰腫白歛赤小
豆茜草爲末雞子白調塗之又方白歛二分
藜蘆一分爲末酒和貼之日三上 御藥院
方治面鼻酒皸白歛白石脂杏仁各半兩爲

湯灼

末雞子調塗日一洗 肘後方治面生粉刺
 白歛二分杏仁半分雞屎白一分為末蜜和
 水拭面 談野翁治凍耳成瘡白歛黃檗
 等分為末生油調搽 外臺方治湯火灼爛
 白歛末傅之 聖惠方治鐵刺諸哽及竹木
 哽在咽中白歛半夏泡等分為末酒服半錢
 日二服又治刺在肉中方同上 千金方治
 風痺筋急腫痛屈轉異常處白歛二分熟附

藥錄

子一分為末每酒服半刀圭日二服以身中
 熱行為候十日便覺忌猪肉冷水 瑞竹堂
 方治諸瘡不歛口白歛赤歛黃檗各三錢炒
 研輕粉一錢用葱白漿水洗淨傅之

簡誤

癰疽已潰不宜服

白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷
 陰成肌胃中邪氣賊風鬼擊痲緩不收除白癬

本草經疏卷十

綠君亭

疥蟲

紫石英為之使惡理石畏李核杏仁反烏頭

疏○白及本經味苦平別錄加辛微寒李當
之大寒日華子加甘東垣亦微寒謂其性瀆
陽中之陰收也辛為金味收為金氣其為得
季秋之氣而兼金水之性者哉宜乎入肺理
傷有奇効矣苦能洩熱辛能散結癰疽皆由
榮氣不從逆於肉裏所生敗疽傷陰死肌皆
熱壅血瘀所致故悉主之也胃中邪氣者即
邪熱也賊風鬼擊疝緩不收皆血分有熱溼
熱傷陰之所生也入血分以洩熱散結逐腐
則諸證靡不瘳矣

主治參互

白及性瀆破散中有收斂蓋去腐逐瘀以生
新之藥也得白斂紅藥子加腦麝乳沒治一
切癰疽腫毒止痛散結排膿有神 一味為
細末米飲調三錢服治損肺吐血有奇効

趙長傳

經驗方治鼻衄不止津調白及末塗山根上
仍以水服一錢立止 記 袖珍方治疔瘡腫毒
白及末半錢以水澄之去水攤於厚紙上貼
之 永類鈴方治打跌骨折酒調白及末二
錢服其功不減於自然銅古銖錢也 濟急
方治手足皸裂白及末水調塞之勿犯水
趙真人方治湯火傷灼白及末油調傅之

簡誤

聖香玲

癰疽已潰不宜同苦寒藥服

大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腫
滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭
痛發汗利大小腸 反甘草畏菖蒲蘆草鼠糞

疏○大戟稟天地陰毒之氣以生故味苦寒
而有小毒甄權潔古兼辛別錄兼甘應是辛
多非辛則無毒矣苦寒故善下走而入腎肝
辛則橫走無所不到矣潔古又謂瀉肺損真

氣其主下蠱毒者以蠱毒必熱必辛辛則散走臟腑故假其辛寒以搜其辛熱是以毒攻毒也苦寒下洩故能逐諸有餘之水溼熱及留飲在中下二焦則為腹滿急痛或成積聚苦辛甘寒故散頸腋癰腫利大小便瀉毒藥通月水陰草苦辛有毒故又註墮胎也天行黃病非元氣實者勿用經曰邪之所湊其氣必虛中風之人其虛必矣本經末又謂其主中

墮胎

風皮膚疼痛吐逆者非也焉有虛病而可施苦寒有毒下泄之藥哉是重虛其虛也

主治參互

大戟入玉樞丹紫金錠則解蠱毒熱毒癰疽疔腫及蛇蟲諸毒內服外敷取利為度百祥丸治痘瘡變黑乾陷不發寒而大便閉結者用大戟一兩棗三枚水一碗同煮曝乾去大戟以棗肉焙丸服從三分服至五分以利

延 月 光緒 八年 三月 二十 八日 頭 天 到 永 壁 趙 瑞 伯 趙 長 佑 趙 香 珍 年 二 十 四 歲

為度 三因方控涎丹治痰涎留胸膈上
下變為諸病或頸項胸背腰脇手足膝髀隱
痛不可忍筋骨牽引釣痛走易及皮膚麻痺
似乎癱瘓不可誤作風氣風毒及瘡疽施治
又治頭痛不可舉或睡中流涎或欬唾喘息
或痰迷心竅並宜此藥數服痰涎自失諸疾
尋愈紫大戟白甘遂白芥子微炒各一兩為
末薑汁打麩糊丸梧子大每服七丸或二十

丸以津液嚥下若取利則服五六丸

金方中風發熱大戟苦參各四兩白酢漿一

斗煮熟洗之寒乃止 生生方記牙齒搖痛大

戟咬於痛處良

簡誤

大戟陰寒善走而下洩潔古謂其損真氣故
凡水腫不由於受溼停水而由於脾虛土堅
則水清土虛則水泛濫實脾則能制水此必

然之數也今不補脾而復用疎洩追逐之藥是重虛其虛也宜詳辨而深戒之惟畱飲伏飲停滯中焦及元氣壯實人患水溼乃可一暫施耳

貫眾味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花療惡瘡令人洩赤小豆為之使

○貫眾味苦而又微寒止應云有小毒以

其苦寒故主腹中邪熱氣諸毒三蟲皆由溼熱所生苦寒除溼熱則三蟲自死矣苦以洩之亦兼有散之之義故破癥瘕苦寒能除風熱故止頭風金瘡出血後必發熱洩熱散結則金瘡自止

主治參互

貫眾一味為細末水調一錢七治鼻衄有效疫氣發時以此藥置水中令人飲此水則

不傳染

簡誤

病人虛寒無實熱者禁用

芝竹

羊躑躅味辛溫有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒

疏○羊躑躅毒藥也然性能祛風寒溼故可以治惡痺痺者風寒溼所成也然非元氣未虛脾胃尚實之人不可用凡用此等毒藥亦

須雜以安胃和氣血藥同用

簡誤

躑躅性發散氣血虛人忌之不可近眼



