

## Mathematik für Anwender I

### Vorlesung 23


Man gibt seine Kinder auf die Schule, daß sie still werden, auf die Hochschule, daß sie laut werden.

---

Jean Paul (1763-1825)

Die Lösungsmenge eines homogenen linearen Gleichungssystems in  $n$  Variablen über einem Körper  $K$  ist ein Untervektorraum des  $K^n$ . Häufig wird dieser Lösungsraum durch die Menge aller „Linearkombinationen“ von endlich vielen (besonders einfachen) Lösungen beschrieben. In dieser Vorlesung entwickeln wir die dazu notwendigen Begriffe.

### Erzeugendensysteme



Die von zwei Vektoren  $v_1$  und  $v_2$  erzeugte Ebene besteht aus allen Linearkombinationen  $u = xv_1 + yv_2$ .

**DEFINITION 23.1.** Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum. Es sei  $v_1, \dots, v_n$  eine Familie von Vektoren in  $V$ . Dann heißt der Vektor

$$s_1v_1 + s_2v_2 + \dots + s_nv_n \text{ mit } s_i \in K$$

eine *Linearkombination* dieser Vektoren (zum *Koeffiziententupel*  $(s_1, \dots, s_n)$ ).

Zwei unterschiedliche Koeffiziententupel können denselben Vektor definieren.

**DEFINITION 23.2.** Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum. Dann heißt eine Familie  $v_i \in V$ ,  $i \in I$ , ein *Erzeugendensystem* von  $V$ , wenn man jeden

Vektor  $v \in V$  als<sup>1</sup>

$$v = \sum_{j \in J} s_j v_j$$

mit einer endlichen Teilfamilie  $J \subseteq I$  und mit  $s_j \in K$  darstellen kann.

Im  $K^n$  bilden die Standardvektoren  $e_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , ein Erzeugendensystem. Im Polynomring  $K[X]$  bilden die Potenzen  $X^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , ein (unendliches) Erzeugendensystem.

DEFINITION 23.3. Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum. Zu einer Familie  $v_i$ ,  $i \in I$ , setzt man

$$\langle v_i, i \in I \rangle = \left\{ \sum_{i \in J} s_i v_i \mid s_i \in K, J \subseteq I \text{ endliche Teilmenge} \right\}$$

und nennt dies den von der Familie *erzeugten* oder *aufgespannten Untervektorraum*.

Der von der leeren Menge erzeugte Untervektorraum ist der Nullraum.<sup>2</sup> Dieser wird ebenso von der 0 erzeugt. Zu einem einzigen Vektor  $v$  besteht der aufgespannte Raum aus  $Kv = \{sv \mid s \in K\}$ . Bei  $v \neq 0$  ist dies eine *Gerade*, was wir im Rahmen der Dimensionstheorie noch präzisieren werden. Bei zwei Vektoren  $v$  und  $w$  hängt die „Gestalt“ des aufgespannten Raumes davon ab, wie die beiden Vektoren sich zueinander verhalten. Wenn sie beide auf einer Geraden liegen, d.h. wenn  $w = sv$  gilt, so ist  $w$  überflüssig und der von den beiden Vektoren erzeugte Untervektorraum stimmt mit dem von  $v$  erzeugten Untervektorraum überein. Wenn dies nicht der Fall ist (und  $v$  und  $w$  nicht 0 sind), so erzeugen die beiden Vektoren eine „Ebene“.

Wir fassen einige einfache Eigenschaften für Erzeugendensysteme und Unterräume zusammen.

LEMMA 23.4. *Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum. Dann gelten folgende Aussagen.*

- (1) *Zu einer Familie  $v_i$ ,  $i \in I$ , von Elementen in  $V$  ist der erzeugte Untervektorraum ein Untervektorraum<sup>3</sup> von  $V$ .*
- (2) *Die Familie  $v_i$ ,  $i \in I$ , ist genau dann ein Erzeugendensystem von  $V$ , wenn*

$$\langle v_i, i \in I \rangle = V$$

*ist.*

<sup>1</sup>Es bedeutet keinen Verständnisverlust, wenn man hier nur endliche Familien betrachtet. Das Summenzeichen über eine endliche Indexmenge bedeutet einfach, dass alle Elemente der Familie aufzusummieren sind.

<sup>2</sup>Dies kann man als Definition nehmen oder aber aus der Definition ableiten, wenn man die Konvention berücksichtigt, dass die leere Summe gleich 0 ist.

<sup>3</sup>In der Bezeichnung „erzeugter Untervektorraum“ wurde diese Eigenschaft schon vorweg genommen.

*Beweis.* Siehe Aufgabe 23.3. □

### Lineare Unabhängigkeit

DEFINITION 23.5. Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum. Dann heißt eine Familie von Vektoren  $v_i$ ,  $i \in I$ , (mit einer beliebigen endlichen Indexmenge  $I$ ) *linear unabhängig*, wenn eine Gleichung

$$\sum_{i \in I} s_i v_i = 0 \text{ mit } s_i \in K$$

nur bei  $s_i = 0$  für alle  $i$  möglich ist.

Wenn eine Familie nicht linear unabhängig ist, so nennt man sie *linear abhängig*. Man nennt übrigens eine Linearkombination  $\sum_{i \in I} s_i v_i = 0$  eine *Darstellung des Nullvektors*. Sie heißt die *triviale Darstellung*, wenn alle Koeffizienten  $s_i$  gleich 0 sind, andernfalls, wenn also mindestens ein Koeffizient nicht 0 ist, spricht man von einer *nichttrivialen Darstellung der Null*. Eine Familie von Vektoren ist genau dann linear unabhängig, wenn man mit ihnen nur auf die triviale Art den Nullvektor darstellen kann. Dies ist auch äquivalent dazu, dass man keinen Vektor aus der Familie als Linearkombination der anderen ausdrücken kann.

BEISPIEL 23.6. Die Standardvektoren im  $K^n$  sind linear unabhängig. Eine Darstellung

$$\sum_{i=1}^n s_i e_i = 0$$

bedeutet ja einfach

$$s_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + s_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

woraus sich aus der  $i$ -ten Zeile direkt  $s_i = 0$  ergibt.

BEISPIEL 23.7. Die drei Vektoren

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

sind linear abhängig. Es ist nämlich

$$4 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

eine nichttriviale Darstellung des Nullvektors.

LEMMA 23.8. Sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und  $v_i, i \in I$ , eine Familie von Vektoren in  $V$ . Dann gelten folgende Aussagen.

- (1) Wenn die Familie linear unabhängig ist, so ist auch zu jeder Teilmenge  $J \subseteq I$  die Familie  $v_i, i \in J$ , linear unabhängig.
- (2) Die leere Familie ist linear unabhängig.
- (3) Wenn die Familie den Nullvektor enthält, so ist sie nicht linear unabhängig.
- (4) Wenn in der Familie ein Vektor mehrfach vorkommt, so ist sie nicht linear unabhängig.
- (5) Ein einzelner Vektor  $v$  ist genau dann linear unabhängig, wenn  $v \neq 0$  ist.
- (6) Zwei Vektoren  $v$  und  $u$  sind genau dann linear unabhängig, wenn weder  $u$  ein skalares Vielfaches von  $v$  ist noch umgekehrt.

*Beweis.* Siehe Aufgabe 23.9. □

BEMERKUNG 23.9. Die Vektoren  $v_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \dots, v_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \in K^m$  sind genau dann linear abhängig, wenn das homogene lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = & 0 \\ & \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = & 0 \end{array}$$

eine nichttriviale (d.h. von 0 verschiedene) Lösung besitzt.

## Basen

DEFINITION 23.10. Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum. Dann heißt ein linear unabhängiges Erzeugendensystem  $v_i \in V, i \in I$ , von  $V$  eine *Basis* von  $V$ .

BEISPIEL 23.11. Die Standardvektoren im  $K^n$  bilden eine Basis. Die lineare Unabhängigkeit wurde in Beispiel 23.6 gezeigt. Um zu zeigen, dass auch ein Erzeugendensystem vorliegt, sei

$$v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in K^n$$

ein beliebiger Vektor. Dann ist aber direkt

$$v = \sum_{i=1}^n b_i e_i.$$

Also liegt eine Basis vor, die man die *Standardbasis* des  $K^n$  nennt.

SATZ 23.12. *Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum. Es sei*

$$v_1, \dots, v_n \in V$$

*eine Familie von Vektoren. Dann sind folgende Aussagen äquivalent.*

- (1) *Die Familie ist eine Basis von  $V$ .*
- (2) *Die Familie ist ein minimales Erzeugendensystem, d.h. sobald man einen Vektor  $v_i$  weglässt, liegt kein Erzeugendensystem mehr vor.*
- (3) *Für jeden Vektor  $u \in V$  gibt es genau eine Darstellung*

$$u = s_1v_1 + \dots + s_nv_n.$$

- (4) *Die Familie ist maximal linear unabhängig, d.h. sobald man irgendeinen Vektor dazunimmt, ist die Familie nicht mehr linear unabhängig.*

*Beweis.* Dieser Beweis wurde in der Vorlesung nicht vorgeführt.  $\square$

BEMERKUNG 23.13. Es sei eine Basis  $v_1, \dots, v_n$  eines  $K$ -Vektorraums  $V$  gegeben. Aufgrund von Satz 23.12 (3) bedeutet dies, dass es für jeden Vektor  $u \in V$  eine eindeutig bestimmte Darstellung (eine Linearkombination)

$$u = s_1v_1 + s_2v_2 + \dots + s_nv_n$$

gibt. Die dabei eindeutig bestimmten Elemente  $s_i \in K$  (Skalare) heißen die *Koordinaten* von  $u$  bezüglich der gegebenen Basis. Bei einer gegebenen Basis entsprechen sich also die Vektoren aus  $V$  und die Koordinatentupel  $(s_1, s_2, \dots, s_n) \in K^n$ . Man sagt, dass eine Basis ein *lineares Koordinatensystem* festlegt.<sup>4</sup>

SATZ 23.14. *Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum mit einem endlichen Erzeugendensystem. Dann besitzt  $V$  eine endliche Basis.*

*Beweis.* Es sei  $v_i, i \in I$ , ein Erzeugendensystem von  $V$  mit einer endlichen Indexmenge  $I$ . Wir wollen mit der Charakterisierung aus Satz 23.12 (2) argumentieren. Falls die Familie schon minimal ist, so liegt eine Basis vor. Andernfalls gibt es ein  $k \in I$  derart, dass die um  $v_k$  reduzierte Familie, also  $v_i, i \in I \setminus \{k\}$ , ebenfalls ein Erzeugendensystem ist. In diesem Fall kann man mit der kleineren Indexmenge weiterargumentieren. Mit diesem Verfahren gelangt man letztlich zu einer Teilmenge  $J \subseteq I$  derart, dass  $v_i, i \in J$ , ein minimales Erzeugendensystem, also eine Basis ist.  $\square$

<sup>4</sup>Lineare Koordinaten vermitteln also eine bijektive Beziehung zwischen Punkten und Zahlentupeln. Aufgrund der Linearität ist eine solche Bijektion mit der Addition und der Skalarmultiplikation verträglich. In vielen anderen Kontexten spielen auch nichtlineare (oder krummlinige) Koordinaten eine wichtige Rolle. Auch diese setzen Raumpunkte mit Zahlentupeln in eine bijektive Verbindung. Wichtige nichtlineare Koordinaten sind u.A. Polarkoordinaten, Zylinderkoordinaten und Kugelkoordinaten. Mathematische Probleme können häufig durch eine geeignete Wahl von Koordinaten vereinfacht werden, beispielsweise bei Volumenberechnungen.

## Dimensionstheorie

Ein endlich erzeugter Vektorraum hat im Allgemeinen ganz unterschiedliche Basen. Allerdings ist die Anzahl der Elemente in einer Basis stets konstant und hängt nur vom Vektorraum ab. Diese wichtige Eigenschaft werden wir jetzt formulieren und als Ausgangspunkt für die Definition der Dimension eines Vektorraums nehmen.

**SATZ 23.15.** *Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum mit einem endlichen Erzeugendensystem. Dann besitzen je zwei Basen von  $V$  die gleiche Anzahl von Basisvektoren.*

*Beweis.* Dieser Beweis wurde in der Vorlesung nicht vorgeführt. □

Dieser Satz erlaubt die folgende Definition.

**DEFINITION 23.16.** Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum mit einem endlichen Erzeugendensystem. Dann nennt man die Anzahl der Vektoren in einer Basis von  $V$  die *Dimension* von  $V$ , geschrieben

$$\dim(V).$$

Wenn ein Vektorraum nicht endlich erzeugt ist, so setzt man  $\dim(V) = \infty$ . Der Nullraum  $0$  hat die Dimension  $0$ . Einen eindimensionalen Vektorraum nennt man auch eine *Gerade*, einen zweidimensionalen Vektorraum eine *Ebene*, einen dreidimensionalen Vektorraum einen *Raum* (im engeren Sinn), wobei man andererseits auch jeden Vektorraum einen Raum nennt.

**KOROLLAR 23.17.** *Es sei  $K$  ein Körper und  $n \in \mathbb{N}$ . Dann besitzt der Standardraum  $K^n$  die Dimension  $n$ .*

*Beweis.* Die Standardbasis  $e_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , besteht aus  $n$  Vektoren, also ist die Dimension  $n$ . □

**BEISPIEL 23.18.** Die komplexen Zahlen bilden einen zweidimensionalen reellen Vektorraum, eine Basis ist z.B.  $1$  und  $i$ .

**BEISPIEL 23.19.** Der Polynomring  $R = K[X]$  über einem Körper  $K$  ist kein endlichdimensionaler Vektorraum. Seien  $n$  Polynome  $P_1, \dots, P_n$  fixiert. Es sei  $d$  das Maximum der Grade dieser Polynome. Dann hat auch jede  $K$ -Linearkombination  $\sum_{i=1}^n a_i P_i$  maximal den Grad  $d$ . Insbesondere können Polynome von einem größeren Grad nicht durch  $P_1, \dots, P_n$  dargestellt werden. Es gibt also kein endliches Erzeugendensystem.

**KOROLLAR 23.20.** *Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein endlichdimensionaler  $K$ -Vektorraum. Es sei  $U \subseteq V$  ein Untervektorraum. Dann ist  $U$  ebenfalls endlichdimensional und es gilt*

$$\dim(U) \leq \dim(V).$$

*Beweis.* Dieser Beweis wurde in der Vorlesung nicht vorgeführt. □

KOROLLAR 23.21. *Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein  $K$ -Vektorraum mit endlicher Dimension  $n = \dim(V)$ . Es seien  $n$  Vektoren  $v_1, \dots, v_n$  in  $V$  gegeben. Dann sind folgende Eigenschaften äquivalent.*

- (1)  $v_1, \dots, v_n$  bilden eine Basis von  $V$ .
- (2)  $v_1, \dots, v_n$  bilden ein Erzeugendensystem von  $V$ .
- (3)  $v_1, \dots, v_n$  sind linear unabhängig.

*Beweis.* Siehe Aufgabe 23.17. □

BEISPIEL 23.22. Es sei  $K$  ein Körper. Man kann sich einfach einen Überblick über die Untervektorräume des  $K^n$  verschaffen, als Dimension von Untervektorräumen kommt nach Korollar 23.20 nur  $k$  mit  $0 \leq k \leq n$  in Frage. Bei  $n = 0$  gibt es nur den Nullraum selbst, bei  $n = 1$  gibt es den Nullraum und  $K$  selbst. Bei  $n = 2$  gibt es den Nullraum, die gesamte Ebene  $K^2$ , und die eindimensionalen Geraden durch den Nullpunkt. Jede solche Gerade  $G$  hat die Gestalt

$$G = Kv = \{sv \mid s \in K\}$$

mit einem von 0 verschiedenen Vektor  $v$ . Zwei von 0 verschiedene Vektoren definieren genau dann die gleiche Gerade, wenn sie linear abhängig sind. Bei  $n = 3$  gibt es den Nullraum, den Gesamtraum  $K^3$ , die eindimensionalen Geraden durch den Nullpunkt und die zweidimensionalen Ebenen durch den Nullpunkt.

Der folgende Satz heißt *Basisergänzungssatz*.

SATZ 23.23. *Es sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein endlichdimensionaler  $K$ -Vektorraum der Dimension  $n = \dim_K(V)$ . Es seien*

$$u_1, \dots, u_k$$

*linear unabhängige Vektoren in  $V$ . Dann gibt es Vektoren*

$$u_{k+1}, \dots, u_n$$

*derart, dass*

$$u_1, \dots, u_k, u_{k+1}, \dots, u_n$$

*eine Basis von  $V$  bilden.*

*Beweis.* Dieser Beweis wurde in der Vorlesung nicht vorgeführt. □





## Abbildungsverzeichnis

- Quelle = VectorGenerado.gif , Autor = Benutzer Marianov auf Commons, Lizenz = PD 1
- Erläuterung: Die in diesem Text verwendeten Bilder stammen aus Commons (also von <http://commons.wikimedia.org>) und haben eine Lizenz, die die Verwendung hier erlaubt. Die Bilder werden mit ihren Dateinamen auf Commons angeführt zusammen mit ihrem Autor bzw. Hochlader und der Lizenz. 9
- Lizenzklärung: Diese Seite wurde von Holger Brenner alias Bocardodarapti auf der deutschsprachigen Wikiversity erstellt und unter die Lizenz CC-by-sa 3.0 gestellt. 9