



重雕宋本衛生家寶產科備要叙

產科之有專書始于唐楊師厚之產  
乳集驗方太和中咎殷產寶繼之北宋  
則有李師聖之產育寶慶集沈虞卿  
之衛生產科方南宋則有虞沆之備產  
濟用方陸子正之胎產集驗方今皆

衛叙

不傳寶慶集雖著錄

四庫全書以永樂大典錄出經陳言等  
增刪亦非原本醫書之鮮善本久矣  
產科其尤甚者也衛生家寶產科  
備要八卷宋朱端章輯宋史藝文志  
著于錄明文淵閣書目亦有其書



四庫全書未收阮文達亦未見錢遵王  
讀書敏求記載有宋本于端章仕歷  
則未詳也素端章福建長樂縣人酒  
熙中知江西南康軍寬以愛民廉以  
律已撥設官田于白鹿洞學以贍四  
方末學者著有衛生家寶方六卷

衛生家寶方

二

衛生家寶方一卷衛生家寶湯方二  
卷及此書見宋史藝文志乾隆江  
西通志蓋南宋良吏有心于濟世救  
民者非醫士也卷一八月安產法體  
元子借地法逐月藏衣遊神法本  
之外台秘要禁草禁水催生符法



出聖濟總錄卷二卷三皆採之孫  
真人千金方卷四全錄產育寶慶  
集張世臣累用經効方卷五則采之  
唐江助教劉寶經驗名方者居多卷  
六則全錄備產瀉用方及許叔微本事  
方中胎產諸方卷七則全錄胎產經

懸方卷八則雜採葛氏肘後巢氏病  
源千金外台聖惠萬全小兒集驗嬰  
童寶鑑錢乙張渙諸書保育小兒諸  
法李陸兩集賴此以存虞張之方  
尤為自來著錄所罕見洵乎產科  
之薈萃醫家之指南也予少多疾



病喜讀方書每當衆論荆棘之時  
畧試其技亦嘗奏效婦人小兒望問  
皆窮尤難製劑丙子之歲細君臨  
晚胎死腹中三日不下諸醫束手甲  
申九月冢婦將薨而瘧作瘧發之際  
心痛欲死醫亦無策余細心診問

衛叙

四

博攷方書幸賴此書轉危為安細  
君憇憇付梓爰雕印以廣其傳嗟乎  
秦漢以來醫書經林億孫兆板字未  
必悉合于古然粗每大失也明人一再  
重刊無不妥刪妄改龍襲謬承謬固  
已失之毫釐繆以千里而况庸人



以醫酋為市目不知書迂儒食古不化  
刻舟求劍乎以此治疾是益之危而  
速之死也婦科為醫家九科之一  
產又婦科之一端自朱賓鈔專  
書即有亦鮮善本是編採摭  
宏富持擇精詳所願家置一  
庶幾乎

衡叙

五

編而深求之于保產全嬰之道其  
光緒十三年歲在彊梧大淵獻壯  
月既死霸

誥授榮祿大夫三品頂戴前分巡  
廣東南韶連兵備道兼管水利




太平閩監督加四级歸安陸心源  
書于穰梨館



衛叙

六



衛生家寶產科方目錄

卷一

產圖

入月安產圖

體

聖祖御名

子借地法

禁草法

禁水法

產前將護法

產後將護法

產日

逐月安產藏衣并十三神行遊法

催生符

符貼式

保生圓

當歸圓

當歸建中湯

卷二

孫真人養胎論

徐之才逐月養胎方

烏雌雞湯

補胎湯

艾葉湯

黃連湯



雄雞湯

扶神湯

菊花湯

調中湯

阿膠湯

安中湯

麥門冬湯

柴胡湯

葱白湯

杏仁湯

芍藥湯

葵子湯

半夏湯

豬石湯

參三丹參膏

甘草散

千金圓

蒸大黃圓

產目

滑胎令易產方

卷三

論初妊娠

竹茹湯

人參散

地黃圓

阿膠散

保安散

神妙千金圓

論欲產并產後

琥珀散

催生通靈散

七寶散

牡丹飲子

單方黑神散 芍藥湯

定痛散 四順理中圓

玉露散

卷四

二十一論并增入十八論 郭稽中附方

黑神散 蒲黃黑神散

奪命丹 勝金散

清魂散 見現圓

增損四物湯 調經散

產目 三

七珍散 調中湯

趁痛散 麻仁圓

黑神圓 固經圓

巨勝湯 大巖蜜湯

小續命湯 濟危上丹

論臨月將息

論新生小兒 并小兒方肆道

注唇膏 豆蔻散

蝎梢散 治勦喘



累用經効方

大聖澤蘭散 奪命禡散子

童地榆降血飲子 大安胎飲子

卷五 吳白朮散 滑胎榆白皮方

催生并死胎方 難產方

橫生逆生方 四道

妊娠煩悶胎熱方

妊娠傷墜胎動方

胎動口噤唇青方

產日 四

胎動下血心腹脹方

產後血暈方 四道

產後中風方

產後發狂方 四道

產前傷寒方 四道

卷五

產科雜方

催生如聖散 救生散

果罩胎散 二聖散

薑羌活散

黃金散

薑粉散

香連散

地黃散

香脂散

血竭散

十八論中治產前產後諸疾黑神

散功效

續添產前產後十八論烏金散功效

宣經圓

烏金散

產前所忌藥物

產日

五

卷六

虞氏備產濟用方

妊娠

入月

臨產

產後

產後諸證用藥例

難產逆產橫產 胎衣不下

妊娠食忌

入月借地法

十二月產臥藏衣吉凶圖

產前諸方



川芎散

枳殼湯

蟹爪湯

又方

又方

人參圓

保生圓

五積散

又方

順元散

催生神効聖功散

催生安胎救命散

神効催生丹

催生如聖圓

產後諸方

產日

六

勝金湯

又方

又方

瀆小便方

燒鹽法

百草霜散

又方

黑散子

烏金散

金黃散

麒麟竭散

千金散

地黃散

牡礪散

桃仁散

川芎散

金花散

當歸散

人參散

四神散

香桂散

當歸散

柿湯

荆芥散

陳梅散

難產方十二道

逆產方八道

橫產方六道

胎衣不下方七道

治產前產後痢疾方

產目

七

許學士產科方

滑胎枳殼散 內補圓

木香圓 白朮散

紫蘇飲 下死胎方

琥珀散 佛手散

愈風散 交加散

蒲黃散 護胎方

又方 麻仁蘇子粥

鹿屑湯 治婦人死胎不下方



卷七

胎孕方

人參白朮散

千金半夏茯苓湯

枳殼散

陳逍遙水酒散

檳榔散

治胎不穩方

治姙娠墜傷胎動方

治胎動已死未死方

千金蟹爪湯

又方

產目

八

葱白湯

白朮散

治姙娠傷寒大熱胎不安方

治姙娠傷寒大熱令胎不落方

治姙娠小便卒不通方

又方

產前方

榆皮滑胎散

黑神散

催生桂散

治難產或橫倒胎死方

治難產胎衣不下方  
又方

易產方

下死胎方

治草蓐或產後血暈五絕中風

方

產後方

牛膝湯

當歸建中湯

聖功川芎湯

琥珀黑神散

產日

九

通宣圓

八味黑神散

烏金散

劉寄奴飲

當歸一味散

荆芥一味散

秤槌酒

豆淋紫酒

產婦忽患寒熱方

治產後傷寒惡露不行方

傷寒產後惡露爲熱搏不行宜

服抵當湯桃仁承氣湯

桂心牡礪湯  
增損柴胡湯



人參散

治產後惡露不絕方

治產後洞泄惡物方

治產後下痢赤白膿血方

產後傷食宜服食藥感應圓

治吹妳腫硬方

治吹妳或兒絕妳後乳腫疼方

萬金散

通用四物湯

卷八 追命散

產日

十

卷八

形初保育

小兒初生將護法

擇乳母法

乳母雜忌法

浴兒法

斷臍法

裹臍法

黃連法

甘草法

豬乳法

藏衣法

剃頭法

禳謝法

初生不作聲

初生不喫奶

初生吐不止

初生有懸癰病

初生有重舌

葛氏肘後治卒重舌方

初生着噤

產目

翰林醫差充南康軍駐泊張永校勘

十一

衛生家寶產科方目錄



衛生家寶產科備要卷第一

產圖

八 入月安產圖

凡產於入月一日貼在臥閣內正北

壁上

凡安產藏衣方位並於臥閣內分布

凡逐月安產藏衣禁忌神煞方位並

隨節氣更換候交得次月節即換次

月產圖

產一

凡產訖棄潑穢污不淨之水並隨藏

衣之方所向不拘遠近棄之切忌向

閉肚之方也

八 體子借地法

東借十步

西借十步

南借十步

北借十步

上借十步

下借十步

壁方之中四十餘步安產借地恐有

穢污或有東海神王或有西海神王



或有南海神王或有北海神王或有  
日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅  
招搖舉高十丈天符地軸入地十丈  
令此地空閑產婦某氏安居無所妨  
礙無所畏忌諸神擁護百邪速去急  
急如律令勅

禁草法鋪草及氈褥訖卽呪曰  
鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之  
銅一言得之鐵母子相生俱笈鐵急

急如律令

禁水法欲產時貯水呪曰

南無三寶水

水在井中爲井水

水在河中爲河水

水在器中爲淨水

水在法中爲眞水

自知非眞莫當眞水

以淨持濁

以正治邪

日遊月殺

五士將軍

青龍白虎

朱雀玄武

招搖天狗

軒轅女妖



天吞地吞 懸戶閉肚

六甲禁諱 十二神王

土符伏神 各安所在

不得動靜 不得忌干

若有動靜 若有忌干

施以神呪 當攝汝形

阿佉尼阿毗羅莫多梨娑地梨沙訶

產前將護法

按諸家產論去凡婦人妊娠入月不

產一

三

可沐頭濕冷流于足太陽之經多令

子橫逆不順誠之誠之又切忌飲酒

恐產時心神昏亂臨產之時不可令

傍人喧擾大小倉忙慮致驚動產母

祇可令熟事產婆及穩審謹卓老成

親密三兩人扶持產母初覺腹痛且

宜任意坐臥勉強飲食恐致臨產氣

力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可

按節次漸服滑胎榆白皮散壹貳服



服藥之法切勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難卽凭物而立須臾扶策再行直至腹痛連腰相引作陣痛頻時卽服催生丹壹服更且勉強扶行陣痛轉甚難以行立認是產時將至卽服催生符畢然後安詳上草上草之時切勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須子細體候直待兒

產一

四

逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾斜則兒得順其理自然易產也又有臥產者亦待臥定背平着蓆體不偃曲則子不失其道苟或不能依此節適必致產難縱或幸免必須變生諸疾

產後將護法

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將護勿以產時無他乃縱心



恣意無所不犯時微若秋毫感病  
重於嵩岱且才得分免切忌問是男  
是女看血下多少隨證服壓血運藥  
良久喫粥服四順理中圓方見第  
二卷末便  
令人從心下按至臍腹日伍柴次若  
有疾證卽隨證服藥粥藥相間頻頻  
服餌且閉目而坐背後倚物左右看  
承常令直立兩膝雖時眠睡頻令喚  
覺過一伏時方得上牀亦須立膝高

產一

五

檣牀頭厚鋪衲褥遮圍四向窒塞孔  
隙以禦賊風一臍之內常聞醋煙以  
防運悶一臍之後漸加滋味或以羊  
肉及雌鷄煮取濃汁作糜粥直至百  
晬常服當歸圓當歸建中湯四順理  
中圓日各壹兩服以養藏氣補血脈  
兩臍之後方得食糜爛肉食滿月之  
內尤忌任意飲食觸冒風寒恣情喜  
怒梳頭用力高聲作勞工巧之類及







東

招  
招

辰乙卯

巳天候天狗

丙午

丁未  
吳時豐隆

卯庚

辰二兌  
安產吉  
西狂虎西

辰辛

戌夫入

丑癸子王亥

辰

辰  
辰  
辰

北

豐隆  
豐隆

一

東

七

南

巳  
藏衣吉  
丙午  
天狗

丁未

卯庚

辰三兌  
庚申  
雷公

辰乙卯

辰丙

辰丁

辰戊

丑癸子王亥  
自鹿吉  
夫入  
夫入  
夫入

北

辰庚

辰辛

辰壬  
豐隆  
豐隆  
豐隆

豐隆  
豐隆

東

運鬼六十

藏衣吉

白虎  
庚辰  
庚辰

寅辰卯甲寅

巳招搖雷公

藏衣吉

丙午招搖

雷回

丁午大轉

坎

夫

丑癸子王亥

未咸池天狗

庚申

戌辛酉

具

一產

八

東

吳時

白虎

豐隆

雷公

寅辰卯甲寅

巳藏衣吉

藏衣吉

丙午招搖狂虎

坎

夫

丁未

戌辛酉

丑癸子王亥

庚申

戌辛酉

天狗辰

北

北

南

南

西

天狗辰



北

南

一

九

寅

卯

丑癸子壬亥

戌辛酉庚申

辰乙卯甲寅

未丁午丙巳

天候

夫  
安  
感  
言  
狂

東

豐隆子壬

豐隆子壬

天狗  
藏衣  
吉

招搖  
吳時  
豐隆

北

南

東

天候

夫  
人

白  
虎

丑癸子壬亥

辰乙卯甲寅

未丁午丙巳

藏衣  
吉

狂  
虎  
言

戌辛酉庚申

辰乙卯甲寅

未丁午丙巳

豐隆

豐隆  
子壬  
天狗

豐隆  
子壬

豐隆  
子壬

北

水起隆長和

丑吳時

天候天狗

寅甲寅

吉衣藏狂

東

夫人

寅與天十

卯甲寅

巳雷公白虎

辰乙卯

巳雷公白虎

庚申

丙午大軒時

丁未威池

西

招搖安產吉

一產

十

東

吳時

寅

卯

辰

巳夫人

丙安產吉

丁未

午白虎狂

戌辛酉庚申

天候

招搖

招搖

北

南

南



北

南

天候

辰乙卯甲寅

巳天候

丑癸子壬亥

丙午夫人

大轉明轉

辰十兌

丁未

招塔雷公

戌辛酉

未白虎

庚申

藏交吉

禮星于壬

西

一產

十一

東

長遊歷長扣

天候

辰乙卯甲寅

巳藏衣吉

北

南

招塔雷公

丑癸子壬亥

丁未夫人

庚申

藏交吉

大轉明轉

辰十兌

豐隆

西

豐隆

豐隆

吳時





胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成胎或受妊不能固養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面

產一

黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成蓐勞入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治風虛除痼冷

甘草

炙微赤剉

乾薑

炮剉

桂

去麝皮不見火

石斛

去根

秦椒

去目及閉口者微炒出汗

黃芩

剉尖如錐者

石膏

細研如粉

粳米

大豆黃卷各壹分



當歸半兩

去蘆頭酒浸壹宿剉碎微炒

麻子仁壹兩半

剉碎微炒

右拾貳味為末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓溫酒或棗湯化下嚙亦得

空心食前



當歸圓治產後虛羸及傷血過多虛

竭少氣臍腹俱急痛引腰背面白脫色嗜臥不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒熱頭重目眩不思飲食或勞傷衝任內

產一

西

積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

當歸

去蘆頭酒浸壹宿剉碎微炒

芎藭

洗剉

續斷

洗去根

乾薑

炮

阿膠

剉碎蛤粉炒令泡起篩去蛤粉用

甘草

微炙

各肆兩

白朮

切焙

白芷

去梢

附子

炮烈去皮臍

各叁兩

桂

去麤皮剉

白芍藥

各貳兩



酒浸壹宿

浪乾剉焙

真蒲黃叁兩半

隔紙微炒

吳茱萸叁兩

湯浸米過控乾微炒

右壹拾肆味搗羅為末煉蜜為圓如

梧桐子大每服貳拾圓食前以溫酒

下漸加至伍拾圓

當歸建中湯治婦人一切血氣虛損

及產後勞傷虛羸不足腹中疴痛吸吸

少氣小腹虛急痛引腰背時自汗出不

產一

五

### 思飲食

當歸肆兩

去蘆頭酒浸壹宿切焙

桂叁兩

去皮剉

白芍藥陸兩

剉

甘草貳兩

炙

右為麤散每服叁錢水壹盞半入生

薑伍片棗壹枚擘破同煎至壹盞濾

去滓熱服空心食前產訖直至滿月

每日叁服令人丁壯

如頭痛眼目眩暈加川芎貳兩防風壹兩

衛生家寶產科備要卷第一



衛生家寶產科備要卷第二

孫真人養胎論

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鐘鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誠居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶使清淨生子皆良長壽忠孝

產二

一

仁義聰惠無疾斯蓋文王胎教者也

論曰兒在胎日月未滿陰陽未備腑藏骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

妊娠食羊肝令子多厄

妊娠食山羊肉令子多病

妊娠食驢馬肉延月

妊娠食騾肉產難

妊娠食兔肉犬肉令子無音聲并



缺唇

妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

妊娠食椹并鴨子令子倒出心寒

妊娠食雀肉并豆醬令子滿面多

黧黯黑子

妊娠食雀肉飲酒令子心經情亂

不畏羞恥

妊娠食鼈令子項短

產二

妊娠食冰漿絕胎

妊娠勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御

宜食大麥無食腥辛是謂才正

妊娠一月足厥陰脈養不可針灸其經

足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之

時血行痞澀不爲力事寢必安靜無令

恐畏妊娠一月陰陽新合爲胎寒多爲



痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有  
所下當預安之宜服烏雌雞湯

烏雌雞湯

烏雌雞壹隻

治如食法

茯苓

去黑皮

阿膠

剉碎

各貳兩

芍藥

白者

白朮

去蘆

人參

去蘆

各叁兩

甘草

炙剉

生薑

洗去皮切

各壹兩

吳茱萸壹升

揀去枝梗

麥門冬伍合

湯泡去心  
熬焙乾

產二

三

右拾味以水壹斗貳升煮雞取  
汁陸升去雞下藥煎取叁升內酒叁  
升并膠烱盡取叁升放温每服壹升  
日三次服

若曾傷一月胎者當預服補胎湯

補胎湯

細辛壹兩

高麗者  
去葉

生薑肆兩

洗擦去  
皮切碎

烏梅壹升

搥碎

防風貳兩

去蘆

乾地黄

洗燥剉  
焙乾

白朮

去蘆

各叁兩



大麥

炒

吳茱萸

揀淨

各伍合

右搗味吹咀以水柒升煮取貳升半

分叁服食前服寒多者倍細辛茱萸

若熱多渴者去細辛茱萸加栝樓根

貳兩若有所思去大麥加栝子仁叁

合一方有人參壹兩

娠二月名始膏無食辛燥居必靜

處男子勿勞百節皆痛是為胎始結

娠二月足少陽脈養不可針灸其經

產二

四

足少陽內屬於膽主精二月之時兒精

成於胞裏當謹護驚動也

娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成

有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍

下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱

艾葉湯主之

艾葉湯

食前服

去梗

丹參

洗

艾葉

去梗

丹參

洗

當歸

洗去蘆須

麻黃

節不去

各貳兩



人參去蘆頭切

阿膠剉碎

各叁兩

甘草壹兩炙

生薑陸兩

洗擦去皮切

大棗拾貳枚去核

右玖味咬咀以酒叁升水壹斗煮減

半去滓內膠煎取叁升分叁服一方

用烏雌雞壹隻宿肥者治如食法割

頭取血內叁升酒中相和雞以水壹

斗貳升先煮取汁去雞內藥煎取叁

升內血酒并膠煎取叁升分作叁服

產二

五

若曾傷二月胎者當預服黃連湯

黃連湯

黃連去須

人參去蘆

各壹兩

吳茱萸伍合淨

生薑叁兩

洗擦去皮切

半生地黃伍兩一方用阿膠

右伍味咬咀以酢漿柒升煮取叁升

分肆服日叁夜壹十日一作若頗覺

不安加烏梅壹升加烏梅者不用漿

只用水耳一方用當歸半兩



妊娠三月名始胞當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

妊娠三月手心主脈養不可針灸其經手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便動於經脈腹滿繞臍苦痛或腰背卒

有所下雄雞湯

產二

六

雄雞湯

雄雞壹隻

治如食法

甘草

炙剉

人參

去蘆切片

茯苓

雪白者去皮

阿膠

剉碎

各貳兩

黃芩

尖如錐者

白朮

去蘆

各壹兩

麥門冬伍合

湯浸去心燉焙乾

芍藥肆兩

洗

大棗拾貳枚

去核

生薑壹兩

洗擦去皮

右拾壹味咬咀以水壹斗伍升煮雞



減半出雞內藥煮取半內清酒叁升  
并膠煎取叁升分叁服一日盡之當  
溫臥一方用當歸芎各貳兩不用黃  
芩生薑

若曾傷三月胎者當預服茯神湯

茯神湯

茯神 去木

丹參 洗

龍骨 五色 各壹兩

阿膠 剉碎蛤粉炒  
泡起去粉用

當歸 洗去蘆  
須切焙

甘草 炙剉

產一

七

人參 去蘆 各貳兩 赤小豆貳拾壹粒

大棗貳拾壹枚 去核

右玖味咬咀以酢漿壹斗煮取叁升

分肆服先食服七日後服一劑腰痛

者加桑寄生貳兩 深師有薤白貳  
兩麻子壹升

妊娠四月始受水精以成血脈食宜稻

粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而

行經絡

妊娠四月手少陽脈養不可針灸其經



手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順  
成當靜形體和心志節飲食  
妊娠四月有寒心下慍慍欲嘔育膈滿  
不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下  
苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身  
軀腰背腹痛往來有時胎上迫育心煩  
不得安卒有所下菊花湯

菊花湯

菊花壹握如雞子大麥門冬壹升湯浸去心焙乾

產二

入

麻黃不去節阿膠剉碎各叁兩

甘草炙剉當歸洗去蘆須切焙各貳兩

人參壹兩去蘆頭切生薑伍兩洗擦去皮切碎

半夏肆兩湯浸七次菹一宿大棗拾貳枚去核

右拾味咬咀以水捌升煮減半內清

酒叁升并阿膠煎取叁升分叁服溫

臥當汗以粉粉之護風寒四五日一

方用烏雌雞壹隻煮水煎藥

若曾傷四月胎者當預服調中湯



調中湯

續斷

去根洗 焙乾

芎藭

洗剉

甘草

炙 各壹兩

白朮

去蘆 切焙

柴胡

去蘆洗

厚朴

剉去皮生薑搗碎 罨一宿次日焙乾

枳實

去穰 炒

生李根白皮

洗 各叁兩

白芍藥

雪剉 者剉

生薑

洗去 皮切

各肆兩

當歸壹兩半

洗去 蘆

烏梅壹升

搥碎

右拾貳味咬咀以水壹斗煮取叁升

分肆服日叁夜壹八日後復服一劑

產二

九

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟  
妊娠五月足太陰脈養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大飢無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒



苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛  
寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有  
所下阿膠湯主之

阿膠湯

旋復花貳合

去稜根

阿膠肆兩

剉碎

人參壹兩

去蘆頭切

麥門冬壹升

湯浸去心焙

生薑陸兩

洗繁去皮切

吳茱萸柒合

揀淨湯洗三次焙

黃芩

六如錐者

當歸

洗去蘆須切片子焙

芍藥

雪白者剉

甘草

炙

各貳兩

產二

十

右拾味㕮咀以水玖升煮藥減半內  
清酒叁升并膠微火煎取叁升半分  
肆服日叁夜壹先食服便愈不差再  
服一方用烏雌雞壹隻割取咽血內  
酒中以水煮雞以煎藥減半內酒并  
膠煎取叁升半分肆服

曾傷五月胎者當預服安中湯

安中湯

黃芩壹兩

六如錐者

當歸

洗去蘆須切片焙



芎藭

洗剉

人參

去蘆頭切

乾地黃

洗淨焙乾用

各貳兩

甘草

炙剉

芍藥

雪白者

各參兩

生薑陸兩

洗擦去皮切碎

麥門冬壹升

湯泡去心焙

大麻仁伍合

去殼

五味子伍合

揀去枝梗

大棗參拾伍枚

去核

右拾貳味咬咀以水柒升清酒伍升

煮取參升半分肆服日叁夜壹七日

復服壹劑

產二

十一

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微

勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視

走馬食宜鷲鳥猛獸之肉是謂變腠理

紉筋以養其力以堅背脊

妊娠六月足陽明脈養不可針灸其經

足陽明內屬於胃主其口目六月之時

兒口目皆成調五味食甘美無大飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹

內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如



欲產手足煩疼宜服麥門冬湯

麥門冬湯

麥門冬壹升

湯浸去心

人參

去蘆切片

甘草

炙剉

黃芩各貳兩

乾地黃叁兩

洗焙

阿膠肆兩

剉碎

生薑陸兩

洗擦去皮

大棗拾伍枚

去核

右剉味咬咀以水柒升煮減半內清

酒貳升并膠煎取叁升分叁服中間

進糜粥一方用烏雌雞壹隻煮水以

產二

三

煎藥

若曾傷六月胎者當預服柴胡湯

柴胡湯

柴胡肆兩

去蘆洗焙

芍藥

雪白者一方作紫葳

白朮

去蘆切焙乾

甘草

炙各貳兩

茯苓壹兩

酒浸一宿切碎焙

麥門冬

湯浸去心焙

芎藭

洗

各貳兩

乾地黃伍兩

洗淨焙

生薑陸兩

洗擦去皮切片

大棗叁拾枚

去核

右拾味咬咀以水壹斗煮取叁升分



肆服日叁夜壹中間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服壹劑

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳以密膜理是謂養骨而堅齒  
妊娠七月手太陰脈養不可針灸其經手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲  
妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脈若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強葱白湯主之

產一

三

葱白湯

葱白拾肆莖長三寸麥門冬壹升湯浸去心焙

生薑捌兩洗擦去皮切片甘草炙剉

當歸洗去蘆須切片子焙黃耆搗福蜜塗炙各叁兩

人參壹兩半去蘆切片阿膠肆兩剉碎



黃芩壹兩六如旋復花壹合去枝

半夏壹升湯泡洗七次用生薑製一宿焙乾

右拾壹味㕮咀以水捌升煮減半內

清酒叁升及膠煎取肆升服壹升日

叁夜壹溫臥當汗出若不出者加麻黃

去節貳兩煮服如前法若秋後勿強漬

汗一方以黃雌雞壹隻割咽取血內

酒中煮雞取汁以煎藥

若曾傷七月胎者當預服杏仁湯

產二 高

杏仁湯

杏仁湯浸去皮甘草炙各貳兩

麥門冬湯浸去心焙吳茱萸揀淨湯洗三兩次焙各壹升

鍾乳使煉成者粉九勝生鍾乳乾薑炮烈各貳兩

粳米伍合 紫菀壹兩使茸

五味子叁合去梗

右玖味㕮咀以水捌升煮取叁升半

分肆服日叁夜壹中間進食七日服

壹劑一方用白雞壹隻煮汁煎藥



妊娠八月始受土精以成膚革和心靜  
息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色  
妊娠八月手陽明脈養不可針灸其經  
手陽明內屬於大腸主九竅八月之時  
兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍  
大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛  
乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍  
下寒時時小便白如米汁或青或黃或

產二

五

使寒慄腰背苦冷而痛目眊眊芍藥湯  
主之

### 芍藥湯

生薑

洗淨  
去皮

各肆兩

甘草

炙剉

當歸

去蘆須洗  
切片子焙

白朮

去蘆  
焙

人參

去蘆  
切片

各叁兩

薤白壹升

切洗

厚朴貳兩

去皮生薑搗  
碎罨一宿焙

右捌味咬咀以水伍升清酒肆升合  
煮取叁升分叁服日再夜壹一方用



烏雌雞煮汁以前藥  
若曾傷八月胎者當預服蔡子湯

蔡子湯  
蔡子貳升棘洗淨生薑陸兩洗淨擦去皮切片

芍藥肆兩雪白者剉白朮去蘆切焙乾

柴胡去蘆洗焙各叁兩大棗貳拾枚去核

甘草貳兩炙剉厚朴貳兩去皮生薑搗碎罨一宿焙

右捌味咬咀以水玖升煮取叁升分

叁服日叁十日壹劑一方用烏雌雞

壹隻煮水以前藥

產二 共

娠九月始受石精以成皮毛六腑百

節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待

之是謂養毛髮致才力

娠九月足少陰脈養不可針灸其經

足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時

兒脈續縷皆成無處濕冷無著炙衣

娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上

衝心腰背痛不可轉側短氣半夏湯



半夏湯

半夏

湯泡七次以生薑貳兩卷一宿

麥門冬

湯浸去心焙

各伍兩

當歸

去蘆須洗切片子焙

吳茱萸

揀淨湯泡洗二兩次焙

阿膠

用蛤粉炒

各叁兩

乾薑壹兩

炮烈

大棗拾貳枚

去核

右柴味咬咀以水玖升煮取叁升去

滓內白蜜捌合微火上溫分肆服痢

卽止一方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥

若曾傷九月胎者當預服豬石湯

產二

七

豬石湯

豬石壹具

剝去筋膜洗淨

白朮肆兩

去蘆切焙

茯苓

去黑皮

桑寄生

揀淨

乾薑

炮烈

乾地黄

洗淨

芎藭

洗

各叁兩

麥門冬壹升

湯浸去心焙

大豆叁合

略炒

附子壹枚

中者炮烈去皮臍切

右拾味咬咀以水壹斗煮石令熟去

石內諸藥煎取叁升半分肆服日叁

夜壹十日更壹劑



妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地  
氣於丹田故使關節人神皆備但俟時  
而生

妊娠一月始胚二月始膏三月始胞四  
月形體成五月能動六月筋骨立七月  
毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃二月  
諸神備日滿卽產矣宜服滑胎藥入月  
卽服

養胎臨月服令滑易產丹參膏

產二

大

丹參膏

丹參半斤

洗燉

芎藭

洗焙

當歸

洗去蘆須切焙

各貳兩

蜀椒伍合

炒少時以碗合定出汗若有熟者以大麻人伍合代

右肆味㕮咀以清酒漉濕停一宿以  
成煎猪膏肆升微火煎膏色赤如血  
膏成新布絞去滓每日取如棗許內  
酒中服之不可過服至臨月乃可服

舊用常驗



甘草散令易生母無疾病未生一月日預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺

甘草貳兩

炙剉

大豆黃卷

微炒

乾薑

炮烈  
鑿碎

黃芩

尖如  
錐者

桂心

不見  
火剉

大麥蘖

炒一  
方  
用粳米

吳茱萸

揀去梗湯  
洗參次焙

麻子仁各參兩

壹右剉味為細末每服貳錢酒調服日參服白湯調亦得

產一

五

千金圓主養胎及產難顛倒胞不出服壹圓傷毀不下產餘病汗不出煩滿不止氣逆滿以酒服壹圓良一名保生圓

甘草

炙剉

貝母

去心

秦椒

炒出  
汗

乾薑

炮烈  
鑿碎

桂心

去皮不  
見火

黃芩

尖如  
錐者

石斛

去根

石膏

硬者不  
軟者火斷

粳米

大豆黃卷各陸銖

當歸拾貳銖

洗去蘆須  
切片子焙



麻子參合

右拾貳味爲末煉蜜和圓如彈子大  
每服壹圓日參服用棗湯化下一方

用蒲黃壹兩

蒸大黃圓治妊娠養胎令易產

大黃參拾銖

蒸剉去穢枳實

芎藭

洗剉

白朮

去蘆切

杏仁

湯泡

各拾捌銖芍藥

剉白者

厚朴

剉去皮生薑

乾薑

炮

各拾貳銖

產二

三

吳茱萸壹兩

揀去梗湯泡

右玖味爲末煉蜜圓如梧桐子大空

腹酒下貳拾圓日參服未効加圓數

滑胎令易產方

車前子壹升

水淘洗令淨控

阿膠捌兩

剉碎蛤粉炒

滑石叁兩

右叁味爲細末飲湯調服壹錢日再服如

生月可服之藥利九竅未產不得先服



衛生家寶產科備要卷第三

免乳大故方書浩博自非素習誰能適從危殆之間頗艱應用今採摭諸方論中將護要法及預備經効要用湯藥名曰產科備要務從簡易以救倉卒

論初妊娠

凡女人妊娠若素來虛羸血氣不足體中有風氣心下多痰水者欲有胎喜病阻其狀顏色如常脈理和順但覺肢體

產三

沉重頭目昏眩不思飲食惡聞食氣多噉鹹酸心中憤懣不知患之所在以至三四月已後則大劇吐逆不能勝舉如有此證則宜服療阻病竹茹湯人參散地黃圓

竹茹湯治初有妊娠食嘔逆頭痛顛

倒寒熱四肢不和煩悶

橘皮

去白洗

人參

去蘆切片

白朮

焙切碎

麥門冬

去心

各壹兩



厚朴

去皮以薑汁浸炙

茯苓

去黑皮

各半兩

甘草壹分

炙判

淡竹茹

先刮下臨煎旋入

右為麤末每服肆錢水壹盞半入生薑

淡竹茹各壹塊如栗子大拍破煎

取捌分去滓微溫服

人參散治初妊妊娠惡食嘔逆

人參壹兩

去蘆切片

枳殼叁分

去穰剉碎麩炒微黃

厚朴

削去皮薑汁塗炙

甘草

炙 各半兩

右為麤散每服肆錢水壹盞半入生

產三

二

薑彈子大壹塊拍破同煎至柒分去

滓溫服不拘時候

地黃圓治初懷妊醋心嘔吐腹痛不

能食或吐清水

人參

去蘆切片

乾薑

炮

各壹兩

右為末用生地黃汁和圓如桐子大

每服伍圓米飲下日再服

又妊娠臟氣皆擁關節不利切不宜多

睡食粘硬難化之物亦不須亂服湯藥



大忌針灸惟須數行步定心神不得悲  
憂驚恐負重震動若覺胎臟不安腹  
中微痛心意煩悶四體昏倦宜服安胎  
順氣阿膠散近難月卽服順胎保安散  
千金圓

阿膠散治妊娠不問月數深淺因頓  
仆胎動不安腰腹痛或有所下或胎奔  
上刺心短氣安胎

熟乾地黃貳兩

洗細切  
酒浸焙

產三

三

艾葉

切炒  
黃

當歸

洗切焙  
去蘆須

甘草

炙剉

芍藥

洗剉

阿膠

剉碎以蚌粉拌和銚內炒  
泡起俟冷篩去蚌粉用

芎

洗

各壹兩

黃耆壹兩

若虛羸加此  
壹味蜜炙

右爲麤散每服肆錢水壹盞半煎至  
捌分去滓溫服若育中冷逆氣加生

薑伍片棗伍枚同煎

保安散治妊娠胎氣不安心腹疼痛

胎動安胎極妙



當歸壹兩半

洗切焙去蘆須

各壹兩

人參壹兩

去蘆切

甘草半兩

炙剉

阿膠半兩

剉碎用蚌粉炒泡起卻篩去粉用之

右爲麤散每服叁大錢水壹盞半入

葱白壹莖拍破煎捌分去滓食前溫

服未定再服

神妙千金圓治產前產後一切風冷

血氣等疾產前胎氣不安腰腹多疼四

肢疲倦妊娠臨月預合下每日空心壹

產三

四

服臨產五臟不痛易產蓐中不生諸疾

兼治產後惡血不盡及胎衣不下增寒

壯熱吐逆煩悶皮膚虛腫或血暈狂迷

眼見神鬼能補勻血氣

金釵石斛壹分

別搗爲細末

秦艽

去蘆根洗剉焙

川椒

去子微炒

細辛

去葉剉

防風

去苗剉

貝母

麩炒微黃

熟乾地黃

切酒浸焙

糯米

甘草

炙

各壹兩



當歸

去蘆須洗焙

大麻仁

去殼取仁

黃芩

光如錐者

乾薑

炮剉

大豆蘗

旋以黑豆生芽長貳寸焙乾用

各叁分

石膏半分

軟者火煨

右精擇爲末以煉蜜成劑入木臼中

杵壹千下分爲柒拾貳圓擇除破天

德月德月合日合每服壹圓溫酒化

下產前產後赤白帶下溫酒嚼下產

前後或心痛血氣用薄荷湯嚼下月

產三

五

信不通當歸酒下臨產艱難或三五

日難產及胎衣不下子死腹中橫生

倒產死絕不語但心頭有熱氣用藥

壹圓京棗湯研化灌之下咽立瘥產

後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐壯熱增

寒煩悶月候不調或多或少肢體倦

怠皮膚浮腫產血不止虛勞中風口

噤不語半身不遂產前後赤白痢大

小便祕澁血暈狂語頭痛面色痿黃



漸成勞瘦飲食無味並溫酒化下壹  
圓產前臨月每日壹圓至臨產用當  
歸酒下壹兩圓催生五臟不痛子易生  
論欲產并產後

凡欲生產切不得喧鬧產婦房門常須  
關閉選一年高性和善產婆又選穩審  
恭謹家人壹兩人扶持切不用揮霍致  
令產婦憂恐又忌閑雜外人喪孝穢濁  
之人瞻視若不謹之定是難產兼傷小

產三

六

兒若腹中痛來但令扶行或行不得且  
立候行得更行或痛作陣眼中如火生  
此是兒圓轉卽進琥珀散壹服直至行  
不得卽扶上蓐草務要產婦惜力或心  
中熱悶取白蜜壹匙新汲水調下或未  
解卽喫生鷄子壹枚

琥珀散臨月縮胎催生兼治產後諸疾

川芎壹兩

剉略

當歸壹兩半

去蘆須切焙

右爲末每服叁錢水壹盞酒半盞煎



捌分去滓不計時候服

大凡生產自有時候痛不甚者名曰弄痛宜須強行熟忍宜食軟飯若食飯不得即宜食粥及飲蜜漿勿令飢渴恐產婦無力困乏若經時不產進通靈散壹服若生畢煖少許醋墨與呷以童子小便調七寶散壹服心中自然開爽不住燒磚石以醋沃之直至柒日要令產婦鼻中常聞醋氣宜燒茅香白朮皂莢等

產三

七

物切勿令見穢惡若產訖忽覺心中昏悶或眼花如在舟車中即是血暈急須服牡丹飲子黑神散

催生通靈散

又壹方在下卷產科雜方門

童下小

蛇脫皮壹條全者緊卷以蚯蚓泥裹燒黑近藥處泥些小用不妨

右為末每服壹錢溫酒調下

七寶散初產後勻血和氣補虛壓驚悸

朱砂

研如粉

桂心

去皮不見火剉



乾薑

炮去濕氣

當歸

去蘆須切洗焙

川芎

劉碎略焙

人參

去蘆切片

羚羊角灰

茯苓

劉

右件等分杵研為末若產婦平和三

臍以前直至滿月每日各取壹字以

羌活豆淋酒調下空心服若覺心育

煩熱即減薑桂冷即加之腹痛加當

歸心悶加羚羊角心育虛氣加桂不

下食或惡心加人參虛戰加茯苓以

產三

八

意斟酌日貳夜壹服不飲酒者以童

子小便調卻煖過服之

牡丹飲子療產後血暈悶亂神昏若

口噤即斡開口灌必効

牡丹皮

洗劉

大黃

生用劉碎

芒硝

別研後入

各壹兩

冬瓜子半合

桃仁叁柒箇

湯浸去皮尖

右為麤散每服伍大錢水叁盞煎至

壹盞半去滓入芒硝服之凡欲產先



煎下以備緩急

單方黑神散防暈備急

驢護千不計多少以桑柴火燒以刀刮取黑煤更燒更刮令盡研為末入真麝香少許如纔產了及覺血衝心暈悶取壹錢末以熱酒和童子小便調下

若產後心空但時與琥珀散壹服或煎芍藥湯進之更不用它治常進溫粥勿

產三

九

與熱食如食熱則滯血或三五日內但覺腹中癆痛兒枕未定即進定痛散壹服琥珀散依第三項

芍藥湯治產後虛乏不思飲食四肢

疲倦心腹陣痛補虛治氣

當歸壹兩半

去蘆須洗切焙乾用

人參

洗剉

生薑

去蘆切片

肉桂

去皮不見火剉

生薑

後入

甘草

炙

各壹兩生乾地黃貳兩

洗酒浸焙



又右剉杵爲麤散每服叁大錢水貳盞  
入棗貳枚煎至壹盞去滓放溫服日  
叁服無利返重者無代

定痛散治產後惡血不止腹內熱痛  
不可忍及兒枕未定

當歸

洗去蘆  
須切焙

芍藥

洗

各貳兩

桂心壹兩

或體蒸熱以  
川芎代之

右爲末每服貳錢水酒共壹盞生薑  
壹塊彈子大擘破同煎至陸分去滓

產三

十

溫服之

若產後四肢安和亦不用多喫酒藥緣  
氣虛禁持未得卻多昏眩唯飲童子小  
便無妨勿平身且側臥夜常須壹人看  
承令屈起兩膝臥睡卽須頻喚覺虛羸  
困乏卽空心進理中圓七寶散七日外  
恐喫粥無味或虛乏無力卽爛煮羊肉  
汁黃雌鷄汁作粥未可喫肉亦不可傷  
及喫硬物便成積滯之患常以淨黑豆



壹升炒令煙出以酒伍升澆淋入羌活壹兩槌碎同浸常用此酒下藥或時飲壹盞大辟風邪令諸疾不生

四順理中圓治新產後臟腑虛不思飲

食補養五臟

甘草叁兩

灸到

人參

去蘆切片

白朮

剉焙

乾薑

炮去濕氣

各貳兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服拾伍

小圓至貳拾圓空心溫酒下

產三

七

七寶散依前項

若三日後覺壯熱頭痛此是乳脉行即

進玉露散貳服或大小便秘澁或發寒

熱頭痛四肢如碎此是蓐勞或產後大

渴胎損吹妳咳嗽別生他疾及帶起宿

患亦宜檢尋別方治之月內不宜多語

笑強起離牀行或作針線運動恣食生

硬不避風脫衣洗浴當時雖未覺大損

滿月後或成蓐勞手腳及腰腿酸重冷



痛骨髓間颼颼如風吹縱有名醫卒不能療大都產婦將息須是百日方可平復大忌犯觸因此多致身體強直如角弓反張名曰蓐風遂至不救小可虛羸失於將補便成大患終身悔不及矣戒之戒之

六玉露散治產後乳脉行煩熱或大腸滯澁肢體疼痛涼膈壓熱下乳

茯苓

剉

人參

去蘆切片

產三

三

甘草

炙

各半兩

桔梗

去蘆切焙

白芷

洗剉

川芎

洗剉

各壹兩

川大黃

濕紙畏慢火煨熟剉

當歸

去蘆須切

各壹分

芍藥參分

洗剉

右爲末每服貳平錢水壹盞煎至柒分溫服日叁服若臟腑泄瀉卽除川

大黃

衛生家寶產科備要卷第三



衛生家寶產科備要卷第四  
產育保慶集方余收產論二十一篇議  
論精確無所不究蓋國醫博極方書所  
得之妙惜乎有其說而無其方郭君稽  
中爲時良醫尤長於治產故其切脈用  
藥屢取奇功一日願以所收家方附於諸  
論之末遂編爲一集真濟眾之異書也  
古人謂爲人子而不學醫者爲不孝則  
有方論而不傳於世者其可謂之仁哉

產四

大觀三年九月五日濮陽李師聖述

二十一論并增入十八論

李師聖編論郭稽中附方

第一論曰熱疾胎死腹中者何

荅曰因母患熱疾至六七日以後臟腑  
熱極薰蒸其胎是以致死緣兒死身冷  
不能自出但服黑神散煖其胎須臾胎  
氣溫煖卽自出何以知其胎之已死但  
看產婦舌色青者是其驗黑神散

貳方



黑神散

桂去麤皮不見火 當歸洗去蘆須切焙

芍藥洗剉 甘草炙剉

生乾地黄溫湯洗淨剉焙忌冷水

乾薑宜用炒生薑代之 各壹兩

附子半兩炮去皮臍 雄黑豆貳兩小者是炒焦去皮

右為末每服壹錢七空心溫酒調下

蒲黃黑神散此方十八論云產前產後一切疾皆治之

雄黑豆貳兩小者是炒去皮秤

產四 二

當歸洗去蘆須切焙 芍藥洗剉

甘草炙剉 乾薑炮剉

肉桂去皮剉不見火 生乾地黄溫湯洗剉焙忌冷水

蒲黃銀石器內微炒令赤或以紙襯銚子內炒紙黃為度 各壹兩

右為末每服貳錢空心溫酒調下若

三十已下及生產少婦人不用桂乾

薑入炒生薑紅花代之生薑紅花各

用貳兩經洗者並焙乾

第二論曰胎衣不下者何



荅曰母生子訖血流入衣中衣爲血所  
脹是故不得下治之稍緩脹滿腹中漸  
次上衝心宵疼痛喘急者難治但服奪  
命丹以速去衣中之血血散脈消胎衣  
自下而無所患

奪命丹

附子半兩

炮去皮  
臍切

牡丹皮壹兩

洗剉

乾漆壹分

搗碎炒  
煙盡

右爲末釀醋壹升大黃末壹兩同燉

產四

三

成膏和藥如桐子大溫酒下伍柴圓  
不以時候

又十論云但服蒲黃黑神散逐去衣中  
血卽胎下或帶斷亦同

第三論曰難產者何

荅曰胎側有成形塊呼爲兒枕子欲生  
時枕破與敗血裹其子故難產但服勝  
金散逐其敗血卽自生成若逆生橫生  
並皆主之



勝金散

麝香壹錢

先研為細末

鹽豉壹兩

用舊青布裹了燒令通紅急以乳槌研為末

右為末取秤搥燒紅以酒淬之調下

藥壹錢匕

又十八論云但服蒲黃黑神散解其敗血即自生也或橫生逆生胎衣不下此藥悉治

第四論曰產後血運者何

產四

四

答曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服清魂散自瘥

清魂散

澤蘭葉

揀淨

人參

去蘆

各壹分

荆芥穗壹兩

炒

芎半兩

洗剉

甘草貳錢

炙剉



右爲細末每服壹錢匕熱湯溫酒各  
小半盞調勻急灌之下咽喉卽開眼  
氣定省人事

又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥

第五論曰產後口乾痞悶者何

荅曰產後宮胃大虛血氣未定食麵太

早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上薰

膏中是以口乾煩渴心下痞悶醫者不

識認爲膏膈壅滯以藥下之萬不得一

產四

五

但服見現圓白瘥

見現圓

薑黃片子

者到

荆三稜

煨乘熱斲碎焙乾用

華澄茄

不得用

陳皮

去白

高良薑

剉碎

人參

去蘆切片

蓬莪茂

煨乘熱斲剉焙乾用

右柒味等分爲末用細切蘿蔔慢火

煑令爛研細將汁煑糊元梧桐子大

每服叁拾圓蘿蔔湯下不以時候



又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥

第六論曰產後乍寒乍熱者何

荅曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令血敗不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作瘧疾治之則繆矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹

產四

六

又問二者何以別之

荅曰時有刺痛者敗血也但寒熱無它

證者陰陽不和也

增損四物湯

當歸

洗去土并蘆須切焙

芍藥

洗剉

人參

去蘆切

川芎

洗剉

各壹兩

甘草肆錢

炙

乾薑壹兩

宜用生薑代之

右爲末每服貳錢匕水壹盞生薑伍

片同煎陸分去滓微熱服不以時候



奪命丹見第二論蒲黃黑神散自瘥  
又十八論云但服蒲黃黑神散自瘥

第七論曰產後四肢虛腫者何

荅曰產後敗血乘虛停積於五臟循經

流入於四肢雷淫曰深卻還不得腐壞

如水故令四肢面目浮腫醫人不識便

作水氣治之血氣與水氣不同凡治水

氣多用導水藥極虛之夫產後既虛又

以藥虛之是謂重虛往往因致夭枉但

產四

七

服調經散血行腫消即愈因疑夫丑

調經散

沒藥命研

琥珀研

各壹錢

桂

去麤皮不見火剉

芍藥

赤者洗剉

各壹錢

當歸

去蘆須切

各壹錢

細辛

去葉剉

各壹錢

麝香

研

各半錢

右為末每服半錢匕生薑汁溫酒各

少許調勻服之

又十八論云但服蒲黃黑神散後服轉

又十八論云但服蒲黃黑神散後服轉



藥瀉下惡物自瘥轉藥是黑神圓在第十二論後

第八論曰產後乍見鬼神者何

荅曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣則虛敗血停積上于於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛倒醫工不識呼爲風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加生龍腦壹捻得睡卽安方見第七論

產四

八

又十八論云但服蒲黃黑神散自安

第九論曰產後月內不語者何

荅曰人心有七孔三毛產後血虛氣弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服七珍散卽瘥

七珍散

人參

去蘆切片

石菖蒲

節密者剉

川芎

洗剉焙

熟乾地黃各壹兩



細辛壹錢 去葉 防風 去苗

朱砂 研 各半兩 川芎 洗 各壹兩

右為末每服壹錢薄荷湯調下不以

時候 夏薑性熱 當歸 洗去藍

又十八論云但服蒲黃黑神散便安

第十論曰產後腹痛又瀉痢者何

荅曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿

月飲冷當風則寒邪乘虛進襲留於

盲膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀

所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或

下赤白腹脇臌脹或走痛不定急服調

中湯立愈若醫者以為積滯取之則禍

不旋踵謹之謹之 蘇文誠陳香田

調中湯 黃黑神散

 高良薑 剉炒 當歸 洗去蘆須切焙

桂 去皮不剉 白芍藥 洗剉

附子 炮去皮臍 川芎 洗 各壹兩

甘草半兩 炙剉

去藥得風去苗



右爲龕末每服參錢用水參蓋煎至  
壹盞去滓熱服

又十八論云急服蒲黃黑神散後服

調中湯

第十一論曰產後遍身疼痛者何

荅曰產後百節開張血脉流走遇氣  
弱則經絡肉分之間血多畱滯累日不  
散則骨節不利筋脉引急故腰背不得  
轉側手脚不能動搖身熱頭痛若醫以

產四

十

爲傷寒治之則汗出而筋脉動踢手足  
厥冷變生他病但服趁痛散以嘿除之

趁痛散

牛膝

乾切酒浸壹宿控

當歸

去蘆須

白朮

剉碎

黃耆

密炙

桂

去皮不

獨活

去蘆剉川

生薑

切

各半兩

薤白

洗切

甘草

炙剉

各壹分

右爲龕末每服半兩水伍盞煎至兩



蓋去滓熱服壹盞次壹盞續後再煖服不拘時候

又十八論云但服蒲黃黑神散即愈

第十二論曰產後大便祕澁者何

荅曰產臥水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便祕澁不通也若過五六日腹中悶脹者此有燥糞在臍臑以其乾澁未能出耳宜服麻仁圓以津潤之若誤以為有熱而投之以寒藥則陽消陰

產四

長變動百出性命危矣

麻仁圓

研碎

枳殼

去穰剉麩炒微黃

人參

去蘆切片

大黃

煨剉

各半兩

右為末煉蜜圓桐子大空心溫湯下

又十八論云產後小便出血大便澁痛

者何

荅曰敗血流入大小腸大小腸澁滯致



小便澁寒大便艱難人多不識作五淋治之不愈但服蒲黃黑神散後服黑神圓取下惡物卽安

黑神圓

巴豆

去皮以水貳碗煮盡為度去心膜細研去油

附子

炮去皮片肉桂去皮不見火剉

白乾薑

炮各半兩

右為末麵糊圓如蘿蔔子大每服叁圓至伍圓熱茶下再以熱茶投之卽

產四

三

行前第七論中云轉藥者卽是此方切不可服尋常取積藥

第十三論曰產後血崩者何

荅曰產臥傷耗經脉未得平復而勞役損動致血暴崩下淋瀝不止或因鹹酸不節傷蠹榮衛氣衰血弱亦變崩中

若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固經圓以止

固經圓



艾葉 揀淨剉碎炒黃

赤石脂 去根

補骨脂 略炒香

木賊 去節

各半兩

附子壹枚 炮去皮臍切片

右為末陳米飲和圓桐子大食前溫

酒下貳拾圓米飲亦得如陳米飲難

圓即入雪糕少許搜和即易圓也

又十八論云但服蒲黃黑神散及黑神

圓立瘥

第十四論曰產後腹脹悶滿嘔吐不定

產四

三

者何

荅曰敗血散於脾胃脾受之不能運化

精微而成腹脹胃受之則不得受納水

穀而生吐噎醫者不識若以尋常治脹

止吐藥療之病與藥不相于轉更傷動

正氣疾愈難治但服巨勝湯必瘥

巨勝湯

赤芍藥 洗剉

半夏 湯洗七次切碎

澤蘭葉 洗燉

人參 去蘆切片



陳皮 去白

甘草 炙剉

各壹錢

生薑半兩

右爲麤末用水壹碗同煎至兩盞去

滓微熱分叁服

又十八論云急服蒲黃黑神散次服黑

神圓吐出惡物卽安

第十五論曰產後口鼻黑氣起及鼻衄

者何

荅曰陽明者經脉之海起於鼻交額中

產四

古

還出液口交人中左之右右之左產後

氣消血散榮衛不理散亂入於諸經卻

還不得故令口鼻黑起及變鼻衄此緣

產後虛熱變生此疾其疾不可治名曰

胃絕肺敗遇有此疾急取緋線壹條并

產婦頂心髮兩條繫兩中指上節卽止

無藥可療亦厭禳之一端也

又十八論曰產後口鼻黑氣起者何

荅曰產後敗血入臟腑旣滿衝於頭目



卻還不得口乾舌焦鼻衄黑氣是產後  
熱變作此候不可治也名曰敗肺  
第十六論曰產後喉中氣急喘者何  
荅曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛  
行脉外相隨上下謂之榮衛因產所下  
過多榮血暴竭衛氣無所主獨聚於肺  
中故令喘也此名孤陽絕陰爲難治若  
惡露不快敗血停凝上薰於肺亦令喘  
急如此但服奪命丹血去喘息自止奪

產四

五

命丹方見第二論  
又十八論曰產後喉中氣急喘者何  
荅曰產後敗血過於心轉於喉中此不  
可治也  
第十七論曰產後中風若何  
荅曰產後五七日內強力下牀或壹月  
之內百日之中傷於房室或懷憂發怒  
擾蕩冲和或因灼艾傷動臟腑得病之  
初眼澁口噤肌肉攣搖以漸腰脊筋急



強直者不可治此乃人作非偶爾中風  
所得也

第十八論曰產後心痛者何

荅曰心者血之主人有伏宿寒因產大  
虛寒搏於血血凝不得消散其氣逆上  
衝擊於心之絡脉故心痛但以大巖蜜  
湯治之寒去則血脉溫而經絡通心痛  
自止若誤以為有所傷療之則虛極寒  
益甚矣心絡寒甚傳心之正經則變為

產四

六

真心痛真心痛者朝發夕死夕發朝死  
藥不可輕用如此

### 大巖蜜湯方

熟乾地黄

洗酒浸壹宿焙剉用

當歸

洗去蘆須切焙

吳茱萸

揀去枝梗

獨活

洗蜀中者尤佳

芍藥

洗剉

乾薑

炮剉

甘草

炙剉

桂

去皮不見火剉

小草

遠志

各壹兩

細辛半兩

去葉勿用馬蹄香



右爲麤末每服半兩用水參大盞煎壹盞去滓再入蜜壹匙又同煎參兩沸微熱服食前

第十九論曰產後熱悶氣上轉爲腳氣者何

荅曰產臥血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以着而爲腳氣之疾其狀熱悶掣痲驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也服小續命湯兩參劑必

產四

七

愈若醫者誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增劇

小續命湯

人參去蘆切片

黃芩尖如錐者

桂去麤皮不見火

麻黃去節

防己剉碎

川芎洗剉

芍藥洗

甘草炙

白朮剉 各壹兩 附子壹箇去皮臍

防風壹兩半去苗 生薑伍兩洗去皮切



右爲麤散每服半兩用水參大蓋煎  
至壹盞去滓溫服

第二十論產後汗出多而變痙風者何  
答曰產後血虛肉理不密故多汗因遇  
風邪搏之則變痙風也痙者口噤不開  
背強而直如發痙狀搖頭馬鳴身及折  
須臾十發氣息如絕宜速斡口灌小續  
命湯稍緩卽汗出如雨手拭不及者不  
可治此方不特治產婦凡男女偶中此  
疾急以此藥灌之無不愈也或服它藥  
則不及矣

第二十一論曰產後所下過多虛極生風  
者何

答曰婦人以榮血爲主因產血下太多  
氣無所主唇青肉冷汗出目瞑神昏命  
在須臾此但虛極生風也如此急服濟  
危上丹神良以風藥治之則誤矣

濟危上丹



乳香

以竹葉盛又以竹葉覆上

五苓脂

不夾石者研 硫黃 研如粉

太陰玄精石

研 陳皮 去穢剉碎

桑寄生

剉 阿膠 剉碎同蛤粉炒炮起篩去蛤粉用

卷栢 生用 各壹兩

右將上肆味同研匀石器內微用火炒動勿令焦炒了再研極細後入餘藥末用地黃汁打糊圓桐子大產後溫酒下貳拾圓當歸酒亦得

產四

九

又十八論曰產後血氣逼肺上氣咳嗽多縱睡者何

荅曰產後滿月血脉未通好食熱麵壅結成痰或有氣塊發時衝心心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾背膊痠疼睡夢驚狂體虛無力時有汗出心痛月候不來名曰敗癥腹痛遶臍面色微赤因此不療縱然得較三兩日又發急服黑神散立愈



論臨月將息

凡產婦合要備急湯藥並須預先修合  
題號恐臨時倉卒難致臨月忌勿多飲  
酒卽依產圖方位擇深靜房室八月三日  
卽用借地法於房內北壁薰令香潔

論新生小兒

凡新生小兒急以綿裹指頭拭兒口中  
惡物不爾流入腹中後生諸疾斷臍可  
長參寸臍中若有蟲急撥去恐入腹內

產四

干

綳了取生甘草寸餘搥碎水壹合煎濃  
汁以綿包子點兒口中當吐出惡汁盡  
半合無妨又取細研朱砂末壹字許以  
熟蜜調置兒口中令嘔之去驚邪參日  
湯煎虎頭骨少許豬膽汁少許和湯浴  
兒少驚無瘡令無惡疾每日頻就無風  
明處看兒上腭若有壹點白泡如竹膜  
起處速以指甲刮破更生更去之除灸  
臍帶外則勿加火艾恐成驚癇若有冷



熱夜啼臍瘡不乾變蒸諸疾自別有方  
治之今錄廬江劉寶助教經効小兒名  
方肆道

注唇膏治初生孩兒眾疾療胎風病

朱砂

研細

坯子臙脂各壹錢

白僵蚕柒箇

炒去  
絲背

牛黃半錢

研

蝎梢半箇

右白僵蚕蝎梢用薄荷汁壹合重湯  
煑汁盡爲度焙乾爲細末研入坯子

產四

主

朱砂等生蜜和爲膏逐日頻與孩兒

注唇合自嘔嚙取効

豆蔻散治小兒夏月滑瀉冷痢不已

腹痛瘦瘁食下卽噎

肉豆蔻壹箇用餠餅麵壹塊如杏

大畏豆蔻灰火中煨不住攪轉候

色赤透熟取出剉焙乾

右爲細末每服半大錢柒捌歲至拾

歲者壹錢用溫米飲調下日叁服一



兩日間愈

八 蝎梢散治小兒胎風及百晬孩兒臍風撮口無能救療者先用生腦子壹字填入臍心上用艾炷灸壹柴壯如不覺灸貳柴壯再添腦子大妙候定服蝎梢散  
蝎梢肆拾玖箇用薄荷葉逐箇捲以絲扎定於砂銚中袞轉炒令薄荷乾蘇爲度

白僵蠶肆拾玖箇生薑汁浸炒乾

產四

三

去觜

右貳味爲末入生腦子抄半錢麝香少許研勻用紫色雄鷄肝煎湯調下末半錢許併叁兩服愈

八 治小兒諸般勦喘疾

烏雞卵壹箇

輕粉少許

右將雞卵於尖小壹頭打小穴子入輕粉在內用杖子攪轉令勻坐雞卵



於飯上蒸熟訖將與患者小兒喫只壹枚取効

累用經効方 隆興府學諭張世臣方  
大聖澤蘭散治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙并治胎墮腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐噎

產四

三

咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不止因此成疾及室女經脉不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病兼療五勞七傷虛損等病

澤蘭葉

去根曬乾

石膏

研

各貳兩

生乾地黃壹兩半

剉用溫湯浴過浪乾焙用

桂肉壹兩壹分

剉用不用火



吳茱萸 湯洗七次炒 厚朴 去麁皮剉碎用

白茯苓 去皮焙 卷栢 去根

細辛 去苗葉焙 栢子仁 揀去殼別研細

防風 去苗 桔梗 去蘆

白蕪荑各壹兩 白朮 焙切片

白芷 去稍 丹參 洗剉

乾薑 炮烈 五味子 去枝

藁本 去蘆頭洗 人參 去蘆頭切

川蔞頭 炮去皮臍 川椒 去目及閉口者微炒出汗

產四 雷

黃耆 剉去蘆頭 各叁分 阿膠 剉碎蛤粉炒

白薇 剉 各半兩 當歸 去蘆須洗切

白芍藥 剉 甘草 炙剉

川芎各壹兩叁分

右爲細末每服貳錢空心臨卧熱酒

調下若急疾有患不拘時候

 奪命褐散子 妊娠四五月已上忽然

仆地手足抽掣咽中涎聲衮衮口眼不

開如小兒瘈瘲之狀名曰胎癘



甜葶藶

紙上微炒

芫花

醋炙乾焙燥

各半兩

郁李仁

湯浸去皮

地榆

剉

各壹分

右爲細末每服壹字煎沉香人參鈎藤鈎子防風湯調下如牙噤者用物斡開灌下調藥汁不過壹匙不拘時候沉香但磨藥汁尤妙如醒時只用防風煎湯調四君子湯服蘇合香圓及大聖澤蘭散半月餘其病脫然恐目昏不能視物不必疑慮氣血凝靜

產四

壹

自然光明謹勿服眼藥有三四婦人皆患此證寸口脉伏自關而下脉弦蓋伏者氣不上升弦者有飲在內此必因胎肥流飲不化注入胎宮與血相搏子不安靜故氣不上升乃胎觸心絡遂有胎癰之證先是醫者用安胎養血之藥未効遂以此藥緣此證雖是產前之疾卻當作產後治療迺是血不循經氣不升降氣閉血壅其



狀如癰當導氣而逐其飲氣通飲消  
則血循經入養胎安氣則子安靜矣  
累用經驗

地榆降血飲子治妊娠入月臨草之  
時血出三日而子未下手足不收昏瞶  
如醉不省人事此迺漏血過多血不養  
胎心氣逆上胎氣畱連此名胎乾此藥  
治之神効甚速

蘇子降氣湯壹貼

乃捌味者是

只作壹

產四

五

服加地榆壹錢半洗淨凌門冬拾  
粒去心水壹盞半生薑貳片煎柴  
分去滓入乳香少許透明者鎔開  
取酒溫服不能自飲者扶起灌之  
大安胎飲子治妊娠胎氣不安腹脇  
刺痛經脈適來氣急上喘等疾

當歸

洗去蘆須切片焙乾

乾地黃

剉洗浪乾再焙用

川芎

洗剉

赤芍藥

剉

地榆

剉

各壹兩

阿膠

剉碎蛤粉炒起去粉用



熟艾各半兩 黃芩壹分 剉

右為麤末分作拾伍服每服水貳盞煎至陸分去滓通口服不拘時候

吳白朮散安胎養氣常服十月中胎

氣安定無諸疾苦

白朮 去蘆切 片子焙 人參 去蘆切 片子焙

白茯苓 去黑皮 剉焙 甘草 炙剉

阿膠 剉碎蛤粉炒 泡起去粉用 已上各等分

右為咬咀每服參大錢水壹盞半煎

產四

毛

至柒分去滓温服不拘時候

一滑胎榆白皮為細末每服壹錢空心

白湯調下自入月每日參服合易產

兒生下藥皆塗身上

一催生并死胎不下葶麻子參箇巴豆

肆箇研細入麝香少許貼臍心上須

臍間便下

一難產參兩日不生以蠶種紙半張燒

灰熟水調下 係已出蠶種紙 亦名馬明脫



一治橫生逆生炙產婦右腳小指尖頭  
一如麥大參壯立產即昔當歸煎兩川  
又方蛇退皮燒灰酒調貳錢面東服  
又方鹽塗兒足底急去之之依奇要  
又方車前子末酒服貳錢舉蓋法華  
一姪娠煩悶胎熱睡臥不得并腹中痛  
又難產知母新白者焙乾爲末煉蜜  
圓如小彈子大每服壹圓温酒化下  
一姪娠偶因所觸或墜高傷折致胎動

產四

三

一不安腹中痛不可忍者縮砂不以多  
少和皮炒令熱透去皮爲細末每服  
貳錢熱酒調下胎卽安神効未煎蜜  
一胎動日夜叫呼口噤唇青及下痢不  
止者熟艾壹兩酒伍盞煮肆盞去滓  
再煎至貳盞服口閉者灌之亦治腰  
痛下血聖文熱酒醑歸煎兩東煎  
一胎動及下血心腹脹者當歸貳兩川  
芎壹兩爲麤末水肆盞酒伍盞煎至



伍盞分參服若胎未死卽安已死卽便下

一產後血暈五靈脂炒令煙盡爲細末溫酒調下壹錢童子小便尤佳

又方乾荷葉爲細末每服壹錢溫酒調下

又方生半夏爲末壹大豆許吹鼻中又方紅花或蘇枋木酒水濃煮汁飲一產後中風眼上視四肢搖擗荆芥穗

產四

五

爲末每服貳錢溫酒調下如不飲酒只濃煎湯服

一產後發狂每用大香附子去鬚皮淨爲細末每用貳錢入研極細好辰砂末壹錢以燒通紅秤搥侵好酒調服

一產前傷寒不問陰陽身熱頭疼白朮

貳錢黃芥壹錢龕末水壹盞煎陸分

去滓熱服不計時候



