

校訂
增輯
湯頭歌訣

上海千頃堂書局印行

謙齋

增輯湯頭歌訣序

湯頭歌訣一書有識者譏之余亦譏之然有識者譏之而深惡痛絕之余則譏之而仍復采用之不亦自相刺謬乎則申之曰此非湯頭歌訣之不善不善用之之為不善也余之教人也先之以內難本經使知本也次之以傷寒金匱使知變也次之以諸家之說與以博也終之以諸家醫案與以巧也知本知變既博既巧然後以湯頭歌訣命誦之雖然世難免嗤余為倒行逆施者或以淺易而不屑學者則又申之曰方名之繁藥品之龐縱能終身習之而不能記憶此書借詩之體作記事之珠數語之中方名立藥品具病證彰因病以求方因方而舉药誠有如探囊取物而無苦心搜索之憾矧能誦內難本經傷寒金匱以及諸家之學說醫案則病情洞明用藥不苟隨方而增損其便孰逾此乎若夫以此書為醫學之捷徑朝斯夕斯不復上求精進縱彼熟爛胸肌非余所敢知矣而湯頭歌訣以是窮且濫矣有識者羣起而譏罵之矣不然者此書而果無益也何為若修園之明哲亦作時方經方歌括而不疑乎今歲六月千頃堂主人命錢子季寅以汪氏湯頭歌訣囑余校訂既為去謬正訛復病其方有習用

乃遺略者適嚴子蒼山下榻齋次更倩為增補得百餘方編輯一遵汪氏之舊
蒼山不特以醫學長而復深邃于辭章故所為多可觀。彙訂竟將付梨棗爰述
如此以告世之讀是書者并質有識之士而彰汪氏之功焉甲子八月朔上海
秦之濟伯未書于中醫學會

湯頭歌訣敘

古人治病藥有君臣方有奇偶劑有大小此湯頭所由來也仲景為方書之祖其傷寒論中既曰太陽症少陽症太陰症少陰症矣而又曰麻黃症桂枝症柴胡症承氣症等不以病名病而以藥名病明乎因病施藥以藥合症而後用之豈苟然而已哉今人不辨症候不用湯頭率意任情治無成法是猶制器而廢準繩行陣而棄行列欲以已病却疾不亦難乎蓋古人製方佐使君臣配合恰當從治正治意義深長如金科玉律以為後人楷則惟在善用者神而明之變而通之如淮陰背水之陣諸將疑其不合兵法而不知其正在兵法之中也舊本有湯頭歌訣辭多鄙率義弗該明難稱善本不揣愚瞽重為編輯併以所主病症括入歌中間及古人用藥製方之意某病某湯門分義悉理法兼備體用具全千古心傳端在於此實醫門之正宗活人之穀率也然古方甚多難以盡錄量取使用者得歌二百首正方附方共三百有奇蓋易則易知簡則易從以此提綱挈領苟能觸類旁通可應無窮之變也是在善讀者加之意耳

康熙甲戌夏月休寧八十老人汪昂題

經絡歌訣小敘

古云不熟十二經絡開口動手便錯如審病在某經必用某經之藥以治之庶乎藥病相當成功可必而不然者病源莫辨部分差訛舍此有韋伐彼無過其不貽致邪失正之禍者幾希矣靈樞經脈一篇為證治之綱領奈其文句參差繁複諷誦不易記憶尤難讀者苦之偶閱東垣醫宗起懦書中有經絡歌訣十二首以七言以便誦習良為盡善第其中詞句音韻未盡諧暢不揣愚瞽僭為增潤復加奇經歌訣四首補所未備其經脈所行病症所發下為詳註使攷者無煩鈎索讀者不復聱牙昔曰蠶叢今成坦道適口爽心詎不快歟此醫家必讀之書特為梓之以公同好

康熙三十三年歲次甲戌秋月休寧八十老人汪昂題

湯頭歌訣凡例

一本集諸歌悉按沈約詩韻其中平仄不能盡叶者以限於湯名藥名不可改易也

一古歌四句僅載一方尚欠詳順本集歌不限方方不限句藥味藥引俱令周明病症治法略為兼括或一方而連彙多方或多而歌省併示古人用藥觸類旁通之妙間及加減之法便人取裁

一醫學入門載歌三百首東垣歌二百六十八首皆不分門類每用一方搜尋殆遍本集歌止二百首而方三百有奇分為二十門某病某湯舉目易了方後稍為訓釋推明古人制方本義使用藥者有所依據服藥者得以參稽庶覺省便

一歌後註釋所以暢歌詞之未備頗經錘鍊讀者倘不鄙夷亦可誦習也

一拙著醫方集解綱羅前賢方論卷帙稍繁不便攜帶故特束為歌訣附於本草之末使行旅可以輕賚緩急得以應用也

一是書篇章雖約苟熟讀之可應無窮之變遠勝前人盈尺之書數部有識之

士當不以愚言為狂僭也

訥庵汪昂漫識

醫方湯頭歌訣目錄

補益之劑十首附方七

四君子湯

六君子湯
香砂六君子湯
異功散

黃耆鱉甲散

秦艽鱉甲散

紫苑湯

百合固金湯

小建中湯

黃芪建中湯
味建中湯
八味大建中湯
黃芪五物湯
十四

益氣聰明湯

補肺阿膠散

發表之劑十四首附方八

麻黃湯

桂枝湯各半湯

小青龍湯

葛根湯

桂枝葛根湯

九味羌活湯

十神湯

移尾

麻黃附子細辛湯

人參敗毒散

敗毒散
消風敗毒散

再造散

麻黃人參芍藥湯

神白散

葱豉湯

攻裏之劑七首附方四

升陽益胃湯

秦艽扶羸湯

補肺阿膠散

升陽益胃湯

十四

大承氣湯

小承氣湯三化湯

調胃承氣湯

木香換榔丸

枳實導滯丸

木香導滯丸

溫脾湯減味溫脾湯

蜜煎導法

猪膽汁導法

涌吐之劑

三首附方六

瓜蒂散

三聖散
燒鹽方

參蘆散
烏附尖

危政湯

和解之劑

九首附方五

小柴胡湯

四逆湯

黃連湯

黃芩湯

黃芩芍藥湯
加生姜半夏湯

芍藥甘草湯

逍遙散

八味逍遙散

藿香正氣丸

六合湯

清脾飲

痛瀉要方

表裏之劑

八首附方五

大柴胡湯

柴胡加硝芒湯
桂枝加大黃湯

五積散

熟料五積散

大黃湯

三黃石膏湯

防風通聖散

葛根黃芩黃連方

參蘇飲

芎蘇飲

茵陳丸

大羌活湯

消補之劑 七首附方六

平胃散

平陳散
湯不換

胃苓散
金正氣散
柴平

健脾丸

枳术丸

換

金正氣散

柴平

保和丸 大安丸

枳實消痞丸

鱉甲飲子

葛花解醒湯

參苓白术散

補中益氣湯

調中益氣湯

烏藥順氣湯

越鞠丸

六鬱湯

蘇子降氣湯

四七湯

七氣湯
局方

四磨湯

五磨飲子

代赭旋覆湯

橘皮竹茹湯

金匱橘皮竹茹湯

紺珠正氣天香湯

理血之劑

十三首附方六

丁香柿蒂湯

齊生丁香柿蒂湯
丁香柿蒂竹茹湯

四物湯

八珍湯
胃風湯

十全大補湯

人參養榮湯

歸脾湯

養心湯

當歸四逆湯

四逆吳茱生薑湯

桃仁承氣湯

犀角地黃湯

咳血方

槐花散

秦光白术丸

荅术防風湯
秦光防風劑

秦光荅术湯

小薊飲子

四生丸

復元活血湯

祛風之劑

十二首附方四

小續命湯

大秦艽丸

三生飲

星香飲

易簡星香飲

地黃子飲

獨活湯

順氣勻風散

上中下通用痛風方

獨活寄生湯

三癉湯

消風散

川芎茶調散

青空膏

人參荆芥散

祛寒之劑

十二首附方二

理中湯

附子理中湯

真武湯

四逆湯

白通人尿猪胆汁湯

白通湯

吳茱萸湯

益元湯

回陽急救湯

四神丸

厚朴溫中湯

導氣湯

疝氣方

橘核丸

祛暑之劑

六首附方十

三物香薷飲

黃連香薷飲
十味香薷飲

五物香薷飲

二香散

藿薷散

六味香薷飲

香薷萬湯

香薷萬湯

清暑益氣湯

縮脾飲 大順飲

生脈散

六一散

益元散
碧玉散

雞蘇散

利濕之劑 十三首附方八

五苓散

四苓散

小半夏加茯苓湯

茯苓甘草湯

腎著湯

甘草苓朮湯
黃耆防己湯

舟車丸

疏鑿飲

實脾飲

五皮飲

茵陳蒿湯

柏皮梔子湯

八正散

羌活勝濕湯

羌活濕湯除

大橘皮湯

當歸拈痛湯

潤燥之劑 十三首附方二

炙甘草湯

滋燥養榮丸

活血潤燥生津飲

韭汁牛乳飲

五汁安中飲

潤腸丸

通幽湯

當歸潤腸湯

搜風順氣丸

消渴湯

白茯苓丸

猪苓膏丸湯

地黃飲子

酥蜜膏酒

清燥湯

湯頭歌訣二十七首附方九

黃連解毒湯

三黃石膏湯
梔子金花丸

半夏瀉心湯

人參白虎湯
竹葉石膏湯

升陽散火湯

涼膈散

甘露飲

桂苓甘
露飲

錢乙瀉黃散

瀉白散
加減瀉

龍膽瀉肝湯

當歸龍蒼丸

左金丸

戊己湯連附
六一湯
升麻湯

清震湯

桔梗湯

消斑青黛飲

辛夷散

妙香散

除痰之劑

十首附方五

二陳湯

導痰湯
潤下丸

溫胆湯
二賢散

青州白丸

清氣化痰丸

滌痰湯

順氣消食化痰丸

附子瀉心湯

大黃附子湯

竹葉石膏湯

清心蓮子飲

瀉黃散

瀉青丸

導赤散

清骨散

清咽太平丸

蒼耳散

滾痰丸

金沸草散

局方
草散

金沸

半夏天麻白术湯

常山飲

截瘧七寶飲

收濇之劑

九首附方二

金鎖固精丸

茯菟丹

治濁固本丸

訶子散

桑螵蛸散

真人養藏湯

當歸六黃湯

柏子仁丸

牡蠣散

殺蟲之劑

二首

烏梅丸

化蟲丸

癰瘍之劑

六首附方二

真人活命飲

金銀花酒

蠟礬丸

託裏十補散

託裏溫中湯

託裏定痛湯

散腫潰堅湯

經產之劑

十二首附方二十二

姪娘六合湯

表虛六合湯

表實六合湯

朴實六合湯

風濕六合湯

大黃六合湯

溫六合湯

連附六合湯

熱六合湯

寒六合湯

氣六合湯

風六合湯

膠艾湯

婦人良方膠艾湯

當歸散

當歸散

黑神散

婦人良方

清魂散

羚羊角散

當歸生薑羊肉湯

千金羊肉湯

達生散紫蘇飲

參术飲

牡丹皮散

固經丸

柏子仁丸

使用良方

望梅丸

骨灰固齒牙散 軟脚散 附稀痘神方

一首附方三

藥有湯頭前賢所製某方某藥各有成規雖加減稍有變通而治療難逾正則舊本歌訣頗涉鄙俚時輩師心不遵古法均非盡善先生考方按韻括病搜源辭雅義明言近指遠醫學心傳端在於此讀者審之

醫方湯頭歌訣

休寧汪 昂訥庵編輯 男汪 端其兩較

上海秦之濟伯未重訂
寧海嚴 雲蒼山增輯

補益之劑 十首附方七

四君子湯 局方助陽補氣

補助陽氣

升陽

益胃

中和義參朮茯苓甘草比。人參白朮茯苓各二錢。甘草一錢氣味中和故名君子。益以夏陳半夏陳皮各六錢。名六君子。湯祛痰補氣陽虛餌。二陳除痰。四君補氣。脾弱陽虛宜之。除郤半夏名異功。散錢或加香砂。胃寒使。加木香砂仁行氣溫中。名香砂六君子湯。

升陽益胃

湯東垣升陽益胃

參朮耆黃連半夏草陳皮芩瀉防風羌獨活柴胡白芍棗姜隨。黃耆二兩人參半夏炙甘草各一錢。羌活獨活防風白芍炒各五錢。陳皮四錢。白朮茯苓澤瀉柴胡各三錢。黃連二錢。每服三錢。加薑棗煎。○六君子助陽補脾除痰重用黃耆補氣固胃。柴胡獨除濕升陽。澤瀉茯苓瀉熱降濁。加芍藥和血斂陰少佐黃連以退陰火。按東垣治療首重脾胃而益胃。又以升陽為先。故每用補中上升下滲之藥。此方補中有散。發中有收。脾胃諸方多從此昉也。

黃耆鱉甲

散羅謙甫勞熱

勞熱

地骨皮茺蔚參芩柴半知。地黃芍藥天冬桂甘桔桑皮勞熱宜。治虛勞骨蒸。喘熱咳嗽食

風勞

肺勞

氣極六極之一

少盜汗。黃耆鱉甲天冬各五錢。地骨秦艽茯苓柴胡各三錢。紫苑半夏知母生地白芍桑皮炙甘草各二錢半。人參內桂桔梗各一錢半。每服一兩。加益煎。○鱉甲天冬知芍補水養陰。參耆桂苓甘草同衛助陽。柔桔鴉肺熱。苑夏理痰嗽。光柴地骨退熱升陽為表裏氣血交補之劑。

秦艽鱉甲散 羅謙甫

治風勞。地骨柴胡及青蒿當歸知母烏梅合止嗽除蒸斂汗高。○鱉甲地骨皮青蒿五葉。秦艽當歸知母各五錢。烏梅五箇。治畧同前。汗多倍黃者此方加青蒿烏梅皆斂汗退蒸之義。

秦艽扶羸湯直指

鱉甲柴地骨當歸紫苑偕半夏人參兼炙草。肺勞蒸嗽服之。○治肺痿骨蒸汗體倦。柴胡一錢。秦艽鱉甲地骨當歸人參各錢半。紫苑半夏甘草炙各一錢。加棗薑煎。按黃耆鱉甲散。蓋本此方。除當歸加餘藥。○透肌解熱。柴胡秦艽乾葛為要劑。故骨蒸方中多用之。此方雖表裏交治。而以柴胡為君。

紫苑湯

海藏

中知貝母。參苓五味阿膠偶再加甘桔治肺傷。咳血吐痰勞熱久。治肺傷氣嗽。吐痰吐血肺痿肺癰。柴胡知母貝母阿膠各二錢。人參茯苓甘草桔梗各五分。五味十二粒。一方加蓮肉。○以保肺止嗽為君。故用阿膠五味以清火。化痰為臣。故用知母貝母。佐以參苓甘草扶土。以生金使。以桔梗上浮而利膈。

百合固金

湯趙歲菴

肺傷
咳血

止嗽
散寒

溫
散寒

止嗽

二地黃玄參貝母桔甘藏麥冬芍藥當歸配喘咳痰血肺家傷生地三錢熟地二錢熟
錢半錢母百合當歸白芍甘草各一錢玄參桔梗各八分○火旺則金傷故
以玄參二地助腎滋水麥冬百合保肺安神芍藥當歸平肝養血甘桔貝母
清金化痰皆以甘草培本不欲以苦寒傷生發之氣也

補肺阿膠

散錢氏止嗽生津

馬兜鈴鼠粘甘草杏糯停肺虛火盛人當服順氣生津嗽哽寧。阿膠兩半馬
子炒甘草炙糯米各一兩杏仁七錢○牛蒡利膈滑痰杏仁降氣潤嗽李時珍曰馬兜鈴非取其補肺取其清熱降氣肺自安也其中阿膠糯米乃補肺
之正藥

小建中湯 仲景溫中散寒

芍藥多即桂枝加芍藥湯

再加飴糖名建中桂
薑甘草大棗和更加飴糖補中藏虛勞腹冷服

之瘡

芍藥六兩桂枝生薑各三兩甘草一兩米十二枚

飴糖一升

增入黃耆名亦爾

再加黃耆兩半名黃

耆建中湯金匱若除

飴糖則名黃耆五物湯

不名建中矣

表虛身痛效無過又有建中十四味陰

斑勞損起沉疴

亦有陰症發斑者淡紅隱隱散見肌表此寒伏
於下逼其無根之火薰肺而然若服寒藥立斃

今人用建中者絕不用飴糖何哉

耆建中湯金匱若除

飴糖則名黃耆五物湯

不名建中矣

表虛身痛效無過又有建中十四味陰

斑勞損起沉疴

亦有陰症發斑者淡紅隱隱散見肌表此寒伏
於下逼其無根之火薰肺而然若服寒藥立斃

今人用建中者絕不用飴糖何哉

耆建中湯金匱若除

飴糖則名黃耆五物湯

不名建中矣

表虛身痛效無過又有建中十四味陰

附子麥夏從蓉仔細哦

即十全大補湯加附子麥冬半夏肉蓯蓉名十四味

建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉

建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉

建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉

建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉

建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉

建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉

建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉

建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉

名八味大建

中湯治同

益氣聰明湯 束垣 聰耳明目

耳目聰明

蔓荆升葛參耆黃柏并再加芍藥炙甘草。耳聾目障服之清參耆各五錢。蔓
錢黃柏白芍各二錢。升麻錢半。炙草一錢。每服四錢。人之中氣不足。清陽
不升。則耳目不聰明。蔓荆升葛。升其清氣。參耆甘草補其中氣。而以芍藥平
肝木。黃柏滋腎水也。

發表之劑 十四首附方八

麻黃湯 仲景 寒傷營無汗

中用桂枝杏仁甘草四般施。發熱惡寒頭項痛。傷寒服此汗淋漓。三兩。麻黃去節。
二兩。杏仁七十枚去皮尖。甘草炙一兩。傷寒太陽表症無汗用此發之。麻黃
善發汗。恐其力猛。故以桂枝監之。甘草和之。不令大發也。按桂麻二湯。雖
治太陽症而先正每云皆肺藥。以傷寒必自皮毛入而桂麻又入肺經也。

枝桂湯 仲景 風傷衛有汗

治太陽中風。芍藥甘草薑棗同。桂枝芍藥生姜各三兩。炙草三兩。大棗十二
枚。石膏雞子大生姜三兩。大棗十二枚。太陽無汗。
治太陽中風有汗用此解肌以和營衛。中
猶傷也。仲景論通用。桂麻相合名各半。湯太陽如瘧此為功。熱多寒少如
傷寒論通用。

大青龍湯 仲景 風寒雨解

風寒
雨解

風傷
衛有汗

寒傷
營無汗

桂麻黃杏草石膏薑棗藏。

麻黃六兩桂枝炙草各二兩杏仁四十枚石膏雞子大生姜三兩大棗十二枚

太陽無汗

升陽明
散

太陽無汗
惡風

太陽行水
發汗

兼煩躁。麻黃發表以姜棗佐桂枝解肌。石膏質重瀉火氣輕亦達肌表。義取青龍興而雲升雨降。鬱熱頓除。煩躁而悞服此則逆風寒兩解。此為良治。麻黃湯治寒。桂枝湯此湯險峻。今人罕用。陶節菴曰。而雨解之。此湯險峻。今人罕用。

小青龍湯 仲景太陽行水發汗

治水氣喘咳嘔渴利慰。太陽表症未解。心下有水氣者用之。或喘或咳或嘔或渴或利或短氣或小便秘皆水氣內瀆所致。姜桂麻黃芍藥甘細辛半夏兼五味。乾姜桂枝麻黃芍藥酒炒。炙草細辛各二兩。半夏五味子各半升。○桂枝細辛潤胃行水以止渴嘔亦表裏分消之意。

葛根湯 仲景太陽無汗惡風

內麻黃裏二味加入桂枝湯。桂枝芍藥炙草各二兩。姜三兩。棗十二枚。此桂枝湯也。加葛根四兩。麻黃三兩。輕可去實。因無汗。中風表實故汗不得出。十劑曰有汗。加葛無麻黃。名桂枝加葛根湯。仲景治太陽輕可去實。葛根麻黃之屬是也。有汗加葛無麻黃。湯仲景治太陽。

有汗
惡風

升麻葛根湯 錢氏 錢乙 明升散

再加芍藥甘草是。升麻三錢。葛根芍藥各二錢。炙草一錢。○輕可去實。辛能藥飲陰和血。升麻甘草陽明表邪。陽邪盛則陰氣虛。故加芍藥。亦升陽解毒。故亦治時疫。陽明發熱與頭疼。無汗惡寒均堪倚。不得卧等症。

治時疫與陽斑痘疹已出慎勿使。恐升散重其表也

九味羌活湯張元素解表通劑

羌活防風蒼朮各錢半白

鮮表
通劑

用防風細辛蒼芷與川芎黃芩生地同甘草三陽解表益薑蕙。羌活防風蒼朮各錢半白芷川芎黃芩生地甘草各一錢細辛五分加生姜葱白煎。陰虛氣弱人禁用。加減臨時在變通。

黃桂皮青龍各半等湯用羌活細辛各走一經。祛風散寒為諸路之應兵加黃芩泄氣中之熱。生地泄血中之熱。甘草以調和諸藥然黃芩生地寒滯未可槩施。

用時宜審

神术散

局方

散風寒濕

散風
寒濕

用甘草蒼細辛藁本芎芷羌活。

蒼术二兩。炙草細辛藁本白芷川芎各走一經羌活各一兩。每服四錢。生姜葱白煎。

祛風濕太陰蒼木少陰細辛厥陰少陽用芎。太陽羌活藁本陽明白芷此風

方與九味羌活湯意同。加藁本除黃芩生地防風較羌活湯更穩。風

寒泄瀉總堪嘗太無神木散太無丹溪之師即平胃散加入葛蒲與霍香。陳皮為君

厚朴各一錢。炙草葛蒲霍香二錢。蒼术各半錢半治嵐瘴癰瘍時氣。兩炎草一兩用代仲景麻

黃湯治太陽傷寒無汗。風各二錢。蒼术防

太陽傷風有汗。二木主治。各同特有止汗發汗之異

麻黃附子細辛湯仲景少陰表症

若以白朮易蒼术。太陽有汗此湯良。名白朮湯。用代桂枝湯治

少陰
表症

暑濕時熱

內虛
感寒

陽虛
不能汗

人參敗毒散

活人毒即熱濕也

暑濕熱時行

人參敗毒散

活人毒即熱濕也暑濕熱時行

發表溫經兩法彰。麻黃細辛各二兩附子一枚炮。○麻黃發太陽之經。細辛為腎經。表藥聯屬其間。若非表裏相兼治。少陰反熱曷能康。少陰症脉沉濡。當無熱。今

太陽表症未除。○汗附子溫少陰之經。細辛為腎經。表藥聯屬其間。若非表

茯苓草枳桔柴前羌獨芎薄荷少許姜三片。時行感冒有奇功。人參茯苓枳
前胡羌活獨活川芎各一兩甘草五錢每服二兩。加薄荷生姜煎。○羌活理
太陽遊風獨活理少陰伏風。兼能去濕除痛。川芎柴胡和血升清枳壳前胡
行痰降氣。甘桔參茯清肺強胃。輔正匡邪也。喻嘉言曰。暑濕熱去參名為敗
三氣門中推此方為第一。俗醫減郤人參。曾與他方有別耶。去參名為敗
毒散。加入消風散見治亦同。合消風散名。

再造散

節菴陽虛不能作汗

用參耆甘桂附羌防芎芍參細辛加棗煨姜煎。陽虛無汗法當諳。人參黃耆
白芍酒炒羌活防風桂枝附子炮細辛煨姜大棗煎。○以參耆甘姜桂附大
補其陽。助羌防芎細散寒。發表加芍藥者於陽中飲陰。散中有收也。陶節菴
曰。發熱頭痛惡寒無汗。服汗劑汗不出者。為陽虛不能作汗。名無陽症。庸醫
不識。不論時令。遂以麻黃重剷。刮取其汗。誤人死者多矣。又曰人第知參耆
不能止汗。而不知其能發汗。以在表藥隊中。則助表藥而解散也。

麻黃人參芍藥湯

東垣內虛感寒

桂枝五味麥冬襄歸耆甘草汗兼補。虛人外感服之康。

○麻黃白芍黃耆當歸甘草炙各一錢。人參

一切
風寒

神白散

衛生家寶 一切風寒

麥冬各三分。桂枝五分。五味五粒。○東垣治一人內虛外感大寒而吐血。法仲景麻黃湯加補劑製此方一服而愈。原解曰。麻黃散外寒。桂枝補表虛。黃耆實表益衛。人參益氣固表。麥冬五味保肺氣。甘草補脾。芍藥安太陰。當歸和血養血。

用白芷甘薑葱淡豉與相參。白芷一兩。甘草五錢。淡豉五十粒。一切風寒皆可服。婦人雞犬忌窺探。煎要至誠。肘後單剪恩白豉。豆蔻一握。豉一升。名葱豉湯。用代麻黃湯功不慙。傷寒初覺頭痛身熱便宜服之。可代麻黃湯。攻裏之劑七首附方四

大承氣湯 仲景胃府三焦大熱大實

用芒硝枳實大黃厚朴。大黃四兩酒洗。芒硝三枚。救陰瀉熱。功偏擅急下陽明有數條。大黃治大實。芒硝治大燥。大堅二味治無形氣藥。熱毒傳入陽明胃府。痞滿燥實堅全見雜症。三焦實熱並須以此下之。○胃為水穀之海。土為萬物之母。四旁有病皆能傳入胃。已入胃府則不復傳他經矣。陶節菴曰。傷寒熱邪傳裏須看熱次之。大柴胡又次之。蓋恐硝性燥急故不輕用。

小承氣湯

仲景胃府實滿

朴實黃。大黃四兩。厚朴二兩。姜炒枳實三枚。炒。譙狂痞鞭硬。

上焦強。熱在上焦則滿。在中焦則鞭。胃有燥熱則譙語。不用

胃府實滿

胃府三焦大熱大實

云硝者恐傷益以羌活名三化湯中風閉實可消詳用承氣治二便加羌活下焦真陰也治風中風體實者可偶

多不可輕投

調胃承氣湯 仲景 胃實緩攻

胃實緩攻

硝黃草。大黃酒浸。芒硝各一兩。甘草尖五錢。甘緩微和將胃保。用甘草甘以緩之。微和胃氣勿令大泄。下不用朴實

傷上焦。不用厚朴枳實恐傷上焦氣之氣也。 中焦燥實服之好。

木香換榔 九張子和一切實積

實積緩攻

青陳皮。枳殼柏連稜遂隨。大黃黑丑兼香附。芒硝水丸量服之一切實積能推蕩瀉痢食瘧用咸宜。木香換榔青皮醋炒。陳皮枳殼炒。黃柏酒炒。黃連吳茱萸湯炒。三棱莪朮並醋者各五錢。大黃酒浸一兩。牽牛換榔下氣尤速。氣行則無痞滿後重之患矣。連柏燥瀉清熱利氣寬腸。黑破血硝黃去血中伏熱並為推堅峻品。濕熱積滯去則二便調而三焦通太矣。蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通因通用之意也。

枳實導滯 九東垣 濕熱食積

濕熱食積

首大黃。芩連殼术茯苓勦。澤瀉蒸餅糊丸服。濕熱積滯力能攘。大黃一兩。枳酒炒。黃連酒炒。神麪炒。各五錢。白术土炒。茯苓各三錢。澤瀉二錢。蒸餅糊丸量虛實服。大黃枳實湯熱去積。芩連佐之以清熱。芩瀉佐之以利濕。神麪佐之以消食。又恐苦寒力峻。故加白术補上固中。若還後重兼氣滯。木香導滯丸加換榔。

溫脾湯 千金溫藥攻下

溫藥攻下

便降枯

參附與乾薑。甘草當歸硝大黃。寒熱並行治寒積。臍腹絞結痛非常。人參附芒硝各一兩。大黃五兩。當歸乾姜各三兩。煎服日三本。方除當歸芒硝亦名溫脾湯。治久痢赤白。脾胃冷實不消。○硝黃以蕩其積。姜附以祛其寒。參草當歸以保其血氣。按古人方中多有硝黃柏連與姜茱桂附寒熱並用者。亦有大黃麻黃汗下兼行者。今人罕識其指。姑錄此方。以見治療之妙。不一端也。

蜜煎導法通大便 仲景用蜜熬如飴。捻作挺子。掺

或將猪膽汁灌肛中。用猪胆汁醋和以竹管。擰肛門中。將汁灌入項當大便。名猪膽汁導法。仲景用蜜角末乘熱納穀道中。或掺鹽。

府陽明無熱勿輕攻。胃府無熱而便秘者。為汗多津液不足。不宜用承氣

府。高者因而越六七。○此仲景心法。後人罕知。故錄三方於攻下之末。

涌吐之劑 二首附方。人醫病惟用汗下和。故汗吐下和。乃治療之法。是若丹溪置不用。可見時師以者四法。經曰在上者涌之。其

又治小便不通。亦用吐法也。吐發汗者。朱丹溪曰。吐中就其缺畧。特補涌吐一門。今就其

瓜蒂散

仲景痰食實熱

中赤小豆。甜瓜蒂炒黃。赤豆共為末。

或入藜蘆鬱金湊。張子和去赤豆。加藜蘆防風。一方去赤豆。

散。鵝翎探吐。並治風痰。此吐實熱與風痰。瓜蒂吐實熱。

虛者參蘆散一味勾。加鬱金韭沫。俱名三聖。熟水或蠶水調量虛實服。

虛人痰壅。不得服。瓜蒂者。參蘆代之。或加竹瀝。若吐虛煩危豉湯。仲景危子十四枚。改治傷寒後虛煩劇瘧。烏附尖方透。丹溪治許白雲用瓜蒂。危子苦參。葛蘆。屢功能奏。燒鹽熱湯調服。以指探吐治霍亂宿食。

稀涎 散嚴用和吐中風痰

凡病宜吐。大勝用藥。

吐中
風痰

皂角白礬班。皂角四挺去皮弦炙。白礬一兩為末。每服五分。○白礬酸苦涌時。宜或益藜蘆微吐。開風中痰升人眩。乍當先服此通其關。令微吐。稀涎通。用之。或益藜蘆微吐。開風中痰升人眩。乍當先服此通其關。令微吐。稀涎通。

關散用細辛皂角

角為吹鼻得嚏保生還。卒中者用此吹鼻。有嚏者可治無嚏者為肺氣已絕。

和解之劑 九首附方五

小柴胡湯 仲景半表半裏和解

半表
半裏

和解供半夏人參甘草從。更用黃芩加薑棗。少陽百病此為宗。○柴胡八兩。夏半升。人參三兩。大棗十二枚。治一切往來寒熱。胸滿脇痛。心煩喜嘔。

○膽府清淨。無出無入。經在半表半裏法。宜和解。柴胡升陽達表。黃芩退熱和陰。半夏祛痰散結。參草輔正補中。使邪不得復傳入裏也。

四逆散

仲景陽症熱厥

根

裏用柴胡芍藥枳實甘草須。柴胡芍藥炒。枳實炒。甘草炙等分。此是陽邪成厥逆。陽邪入裏。

陽證
熱厥

溫飲陰泄熱平劑狀。芍藥斂陰枳實泄熱甘草和。

黃連湯 仲景升降陰陽

升
陰
降
陽

太
少
陽
合
謂

不
利
合
謂

內用乾薑半夏人參甘草藏。更用桂枝兼大棗寒熱平調嘔痛忘。黃連炒乾桂枝各三兩人參二兩半夏半升大棗十二枚治胸中有熱而欲嘔胃中同寒而沖痛或丹田有熱胸中有寒者仲景亦用此湯。○按此湯與小柴胡湯皆和解之意但小柴胡湯屬少陽藥此湯屬太陽陽明藥也。

黃芩湯 仲景太陽少陽合病不利

用甘芍井二陽合利棗加烹。治太陽少陽合病下利黃芩三兩芍藥甘草各二兩棗十二枚。○陽邪入裏故以黃芩微其熱甘草大棗此方遂為治痢祖後人加味或更名。利瀉泄也痢滯下也仲景本和其太陰更名黃芩芍藥湯潔古治痢加木香。○治傷寒下利櫟要用此治病柳大黃黃連當歸官桂名芍藥湯。前症炙等分名芍藥兼區此能平單用芍藥與甘草甘草湯仲景散逆止痛能和營。虞天民曰治血虛兼能行氣腹痛者營氣不和逆于內裏以白芍行營氣以甘草和逆氣故治之也。

逍遙散

局方散鬱調經

調
經
鬱

用當歸芍柴芩木草加薑薄。柴胡當歸酒拌白芍酒炒白木土炒茯苓散鬱除蒸功最奇。肝虛則血病歸芍養血平肝木盛則土衰木草和中補土柴胡升陽散熱茯苓利濕寧心生姜暖胃祛痰薄荷消風理血醫貫曰方

解一不切正氣

調和六氣

陽瘧

藿香正氣散局方辟一切不正之氣
則土鬱。土鬱則金鬱。金鬱則水鬱。五行相因。自然之理也。余以一方治木鬱。
而諸鬱皆解。逍遙散是也。調經八味丹梔着。加丹皮梔子名八味
逍遙散治肝傷血少。

大腹蘇甘桔梗芩术朴俱。夏麴白芷加薑棗。感傷外感內蕩嵐瘴並能驅。藿香皮紫
蘇茯苓白芷各三兩。陳皮白术土炒厚朴姜汁炒半夏麴桔梗各二兩。甘草
一兩。每服五錢加姜棗煎。○藿香理氣和中。辟惡止嘔。蘇芷桔梗散寒利膈。
以散表邪。腹朴消滿。陳夏除痰。以疏裏滯。芩术甘草益脾去濕。以輔正氣。正氣通暢。則邪逆自除矣。

六和湯

局方調和六氣

藿朴杏砂呈。半夏木瓜赤茯苓。术參扁豆同甘草。姜棗煎之六氣平。藿香厚
砂仁半夏木瓜赤茯苓白术人參扁豆甘草加姜棗煎能禦風寒暑濕燥火
六氣。故曰六和。○藿朴杏砂理氣化食。參术陳夏補正匡脾。豆瓜祛暑。赤茯火
行水。大抵以助腎健脾為主。脾胃既強。則諸邪不能干矣。或益香薷或蘇葉。傷寒傷暑用須明。
傷寒加蘇葉。傷暑加蘇葉。傷寒傷暑居多。

清脾飲嚴用和陽瘧

用青朴柴芩夏甘芩白术偕。更加草菓姜煎服。熱多陽瘧此方佳。青皮厚朴
黃芩半夏姜製甘草炙。茯苓白术土炒。草菓煨加姜煎。瘧不止加酒炒常山

一錢烏梅二箇。大渴加麥冬知母。○瘧疾一名脾寒。蓋因脾胃受傷者居多。

湯頭歌訣

和解之劑

表裏之劑

七

上海三馬路
千頃堂印行

此方乃加減小柴胡湯。從溫脾諸方而一變也。青柴平肝破滯。朴夏平胃祛痰。芩芩清熱利濕。朮草補脾調中。草葉散太陰積寒。除痰截癥。

痛瀉要方 劉草窗痛瀉

痛瀉

陳皮芍防風白朮煎丸酌。白朮土炒三兩。白芍酒炒四兩。陳皮炒兩半。防風一兩。或煎或丸。久瀉加升麻。補土瀉木理肝脾。陳皮理氣補脾。若作食傷醫便錯。吳上舉曰。傷食腹痛。得瀉便減。吟防芍瀉木益土。若作食傷醫便錯。瀉而痛不減。故責之土敗木賊也。

表裏之劑 八首附方五

大柴胡湯 仲景發表攻

發表
攻裏

用大黃枳實芩夏白芍將煎加姜棗表兼裏妙法。內攻併外攘。柴胡八兩。大黃二兩。枳實四枚。半夏半升。黃芩芍藥各三兩。生姜五兩。大棗十二枚。治陽邪入裏。表症未除。裏症又急者。○柴胡解表。大黃枳實攻裏。黃芩清熱。芍藥斂陰。半夏和胃止嘔。姜棗調和營衛。按本方次方治少陽陽明。後方治太陽陽明為不同。柴胡加芒硝湯。義亦爾。小柴胡湯加芒硝六兩。仲景桂枝湯內加大黃一兩。芍藥三兩。治太陽誤下轉屬太陰大實痛者。

防風通聖 散河間表裏實熱

大黃硝。荆芥麻黃梔芍翹。甘桔芍歸膏滑石。薄荷芩朮力偏饒。表裏交攻。陽熱盛。外科瘍毒總能消。大黃酒蒸。芒硝防風。荆芥麻黃黑梔白芍炒。連翹川草二兩。滑石三兩。加姜葱煎。○荆防麻黃薄荷發汗而散熱。搜風梔子滑石硝。黃利便而降火。行水芩桔石膏清肺瀉熱。川芎歸芍養血補肝。連翹散氣。

表裏
實熱

聚血凝。甘术能補中燥濕。故能汗不傷表。下不傷裏也。

溫裏
發表

五積散局方發表溫裏

治五般積。寒積食積氣麻黃。蒼芷芍歸芎枳桔桂姜甘茯朴。陳皮半夏加姜
蔥。當歸川芎白芍茯苓桔梗各八分。蒼朮白芷厚朴陳皮各六分。枳殼七分。
寒。甘芍和裏止痛。蒼朮平胃。陳夏行痰。芍歸養血。茯苓利水。姜除桂枳陳餘。
芷祛寒濕。枳桔利膈腸。一方統治多病。唯善用者變而通之。
畧炒。三味生用。餘藥微熟。料尤增溫散功。溫中解表祛寒濕。散痞經調用各
充。陶節菴曰。凡陰症陽寒。脉浮沉。
無力均當服之。亦可加附子。

三黄石膏湯

發表清裏

芩柏連梔子麻黃豆豉全薑棗細茶煎熱服。寒因表裏三焦熱盛宣石膏。半黃芩
黃柏黃連各七錢。梔子三十箇。麻黃淡豉各二合。每服一兩。姜三片。棗二枚。
茶一撮。煎熱服。治表裏三焦大熱。譙狂斑衄。身目俱黃。○黃芩瀉上焦。黃連
瀉中焦。黃柏瀉下焦。梔子通瀉三焦之火。以清裏麻黃淡豉散寒發汗而鮮表石膏體重能解肺胃之火。氣輕亦能解肌也。

葛根黃芩黃連湯

仲景太陽陽明鮮表清裏

甘草四般治二陽。治太陽桂枝症。醫誤下之。邪入陽明。協熱下利。脉促。解表
清裏兼和胃。喘汗自利保平康。成無己曰。邪在裏宜見陰脉。促為陽盛。知表
未解也。病有汗出而喘者。為邪氣外甚。今喘

太陽
明鮮表
清裏

清裏
發表

而汗出為裏熱氣逆。與此方散表邪。清裏熱。
○脉數而止曰促。用葛根者。專主陽明之表。

內傷
外感

參蘇飲

元戎內傷外感

內用陳皮枳殼前胡半夏宜乾葛木香甘桔茯。內傷外感此方推。人參紫蘇
姜製乾葛茯苓各七錢半。陳皮枳殼炒。桔梗木香甘草各二錢。每服二錢。
加姜棗煎治外感內傷。發熱頭痛。嘔逆咳嗽痰眩風濁。外感重者。加東去蔥
白。○蘇葛前胡鮮表參芩甘草補中。陳皮木香行氣破滯。半夏枳桔利膈祛痰。
參前若去芍柴入飲號芍蘇治不差。
去人參前胡加川芎柴。香蘇飲方僅陳皮草。感傷內外亦堪施。蘇附炒紫
名芎蘇飲不服參者宜之。香蘇飲局方僅陳皮草。感傷內外亦堪施。蘇附炒紫
陳皮去白一錢。甘草七分。加姜蔥煎。

茵陳丸
外臺汗吐下兼行

用大黃硝。鱉甲常山巴豆邀。杏仁梔豉密丸服。汗吐下兼三法。超時氣毒癘
及瘡疔。一丸兩服量病調。茵陳芒硝鱉甲炙。梔子各二兩。大黃五錢。常山杏
子大。每服一丸。或吐或汗或利。不應再服一丸。不應以熱湯投之。○梔子淡
豉。鱉甲湯也。合常山可以涌吐。合杏仁可以解肌。大黃芒硝承氣湯也可以
蕩熱去實。合茵陳可以利濕退黃。加巴豆大熱以祛藏府積寒。加鱉
甲滋陰以退血分寒熱。此方備汗吐下三法。雖云峻劑。實是佳方。

傷寒
兩感

大羌活湯
傷寒兩感
即九味。已獨知連白木暨。即九味羌活湯。加防已知母獨活黃連。內生散熱。
地川每知母各一兩餘藥各三錢。每服五錢散熱。

培陰表裏和。傷寒兩感差堪慰。雨感傷寒。一日太陽與少陰俱病。二日陽明裏。同時俱病。欲汗則有裏症。欲下則有表症。經曰其兩感于寒者必死。仲景無治法。潔古為製此方。間有生者。○羌獨蒼防細辛以散寒發表。芩連防已知母芍地以清裏培陰。白术甘草以固中和表裏。

消補之劑七首附方六

平胃散局方利瀉散滿

除濕
散滿

是蒼术朴陳皮甘草四般藥。

蒼术泔浸二錢。厚朴姜汁炒。陳皮去白。甘草炙各一錢。姜棗煎除濕散滿驅瘴。嵐調胃諸方從此擴。蒼术燥濕強脾。厚朴散滿平胃。陳皮利氣行痰。甘草和中補土。泄中有補也。

或治或五苓。名胃苓湯。治渴。硝黃麥麯均堪着。

加麥芽神曲消食。或合二陳名平胃。湯煎加薑棗能除痞。又不換金正氣散即是此方加夏苓。半夏。大黃芒硝。蕩積。

保和丸飲食輕傷

飲食
輕傷

神麯與山查。芩夏陳翹菔子加。麯糊為丸。麥芽湯下亦可。方中用麥芽。山查去核三兩。神麯茯苓半夏各一兩。陳皮菔子微炒。連翹各五錢。○山查消肉食。麥芽消穀食。神曲消食解酒。菔子下氣制麯。茯苓滲濕連翹散結。陳夏健脾化痰。此內傷而氣未病者。故但以和平之品消而化之。不必攻補也。

大安丸內加白术。二兩消中兼補効堪誇

健脾丸補脾消食

消食
補脾

補脾

補脾
消痞

瘧母

參术與陳皮。枳實山查麥芽隨麵糊作丸米飲下。消補兼行胃弱宜。白术土炒各二兩。陳皮麥芽炒各一兩。山查兩半。枳實麸炒三兩。○陳枳术丸潔皮枳實理氣化積。山查消肉食曲。麥消殺食人參白术益氣強脾。枳古亦消兼補。白术土炒。枳炒等分。荷葉燒飯上升奇。荷葉包陳米飯煨乾為丸引散補脾。

參苓白术

散補脾

扁豆陳山藥甘蓮砂薏仁數藥利氣強脾。桔梗上浮載藥兼保肺。恐燥藥棗湯調服。人參茯苓白术土炒陳皮山藥甘草炙各一斤。扁豆炒十二兩。蓮肉炒砂仁苡仁炒桔梗各半斤。共為末。每服二錢。棗湯或米飲調下。九東垣補脾消痞。

枳實消痞

丸東垣補脾消痞

四君全麥芽夏麴朴薑連蒸餅糊丸消積滿清熱破結補虛痊。枳實麸炒黃五錢。人參白术土炒。麥芽炒半夏曲厚朴姜汁炒。茯苓各三錢。甘草炙乾姜炒各二錢。○黃連枳實治痞君藥。麥夏姜朴溫胃散滿。參术苓草燥濕補脾。使氣足脾運。痞乃化也。

鱉甲飲子

嚴氏瘧母

治瘧母。久瘧不愈。甘草耆术芍药偶草蕷梔榔厚朴增。烏梅姜棗同煎服。鱉甲醋炙黃耆白术土炒。甘草陳皮川芎白芍酒炒。草蕷麴炒。梔榔厚朴等分。姜三片棗二枚烏梅少許煎。○鱉甲屬陰。入肝退熱散結為君。甘陳耆木助陽。厚朴散滿甘草和中。烏梅酸斂。姜棗和營衛。積。

葛花解醒 湯酒積

解醒

香砂仁二苓參术蔻青陳神曲乾姜兼澤瀉溫中利濕酒傷珍。葛花砂仁豆
香一分茯苓人參白术炒青皮陳皮各四分。神曲炒乾姜豬苓澤瀉各五分。
專治酒積及吐瀉痞塞○砂蔻神曲皆能解酒。青陳木香乾姜行氣溫中葛
花引濕熱從脫肉出。苓瀉引濕熱從小便出。益以參术因其中氣也。

理氣之劑十一首附方八

補中益氣 湯東垣補氣升陽

補氣
升陽

耆木陳升柴參草當歸身黃耆蜜炙錢半人參甘草炙各一錢。白术土炒陳
表虛者升麻用蜜水炒用○東垣曰升柴味薄性陽能引脾胃清氣行於陽
道以資春風之和又引參耆甘草上行充實腠理使衛外為固凡補脾胃之
藥多以升陽補氣名之者此也虛勞內傷功獨擅亦治陽虛外感因虛人感冒不任發散者。
散木香蒼术易歸木調中益氣暢脾神除當歸白术加木香蒼术名調中益氣湯前方加白芍五
味子發中有收效。亦名調中益氣湯俱李東垣方

烏藥順氣湯嚴用和中氣

中氣

芎芷姜橘枳桔及麻黃。殭蠶炙草姜煎服。中氣厥逆此方詳厥逆痰塞口
為中風身冷為中氣中風多痰涎。中氣無痰涎以此為辨。許學生云中氣之
症不可作中風治。喻嘉言曰中風證多挾中氣。烏藥橘紅各二錢。川芎白芷
各二錢。川芎白芷

枳殼桔梗麻黃各一錢。殼去絲嘴炒。炮姜災草各五分。加姜棗煎。○麻梗
芍芷發汗散寒。以順表氣。烏姜陳枳。行氣祛痰。以順裏氣。加殼桑清化消風。
甘草協和諸藥。古云氣順則風散。風邪卒中。當先治標也。

越鞠丸 丹溪六鬱

六鬱

治六般鬱氣血痰火濕食因。此六鬱也。芎蒼香附兼梔麴。氣暢鬱舒痛伸。吳鵠
杏附開氣鬱。蒼木燥濕鬱撫。芎調血鬱。梔子清火鬱。神曲消食鬱。各等分曲
糊為九。又濕鬱加茯苓白芷火鬱加青黛痰鬱加星夏枯萎海石血鬱加桃
仁紅花氣鬱加木香枳榔食鬱。又六鬱湯。蒼芎附甘芩橘半梔砂仁。○此前方加味兼
加麥芽山楂挾寒加吳茱萸。甘草茯苓橘紅半夏梔子砂仁。○此前方加味兼
治痰鬱。看六鬱中之重者為君。餘藥聽加減用之。

蘇子降氣湯局方降氣行痰

降氣
行痰

橘半歸前胡桂朴草姜依。下虛上盛痰嗽喘。亦有加參貴合機。蘇子橘紅半
厚朴姜汁炒各一錢。肉桂炙甘草各五分。加姜煎。一方無桂加沉香。蘇子
前胡橘紅半夏降氣行痰。氣行則痰行也。數藥並能發表。加當歸和血。甘草
緩中下虛上盛故又用官桂引火。歸元如氣虛亦有加入參五味者。

四七湯 三因開鬱化痰

開鬱
化痰

理七情氣。七氣寒熱憂愁喜怒半夏厚朴茯苓蘇半夏姜汁炒五錢厚朴姜
二錢。鬱雖由乎氣亦多扶濕扶疾。故以厚朴半夏薑棗煎之。舒鬱結痰涎
除痰散滿。茯苓蘇葉利濕寬中。濕去痰行。鬱自除矣。薑棗煎之舒鬱結痰涎

嘔痛盡能紓。又有局方名四七湯。參桂夏草妙更殊。人參官桂半夏各一錢。甘草五分。加姜煎。○人參補氣。官桂平肝。姜半夏祛痰。甘草和中。併不

用利氣之藥。湯名四七者。以四味治七情也。

四磨湯。嚴氏七情氣逆。

七情氣逆

亦治七情侵。人參烏藥及枳沉。人參烏藥枳榔沉香等分。○氣逆故以烏濃磨煎服。調逆氣實者枳殼易人參去香。加入木香枳五磨飲子。白酒斟磨服。

治暴怒卒死名氣厥

代顏旋覆湯。仲景痞悶噫氣

用人參半夏甘姜大棗。重以鎮逆鹹軟痞。痞鞭音。愛音氣力能禁。顏石二兩。旋覆甘草各三兩。半夏半升。生姜五兩。棗十二枚。○旋覆之鹹以軟堅。顏石之重以鎮逆。姜夏之辛以散虛痞。參甘大棗之甘。以補胃弱。

糾珠正氣天香散

順氣調經

香附乾薑蘇葉陳烏藥舒鬱兼除痛。氣行血活自經勻。香附八錢。烏藥二錢。陳皮蘇葉各一錢。乾姜五分。每服五六錢。○烏陳入氣分而理氣。香蘇入血分而利氣。乾姜兼入氣血。用半溫以順氣平肝。氣行則血行。經自調而痛自止矣。

橘皮竹茹

湯胃虛呃逆

胃虛呃逆

治嘔。參甘半夏陳皮麥赤茯再加姜棗煎。方由金匱此加闢。金匱方橘皮竹茹各二升。

寒病後
呃

喘

養血
通劑

丁香柿蒂

湯嚴氏病後寒呃

人參一兩。甘草五兩生姜半斤。棗三十枚名橘皮竹茹湯。治噦逆即呃逆。後人加半夏麥冬枇杷葉。呃逆由胃火上冲。肝胆之火助之。肺金之氣不得下降也。竹茹麥冬枇杷葉清肺和胃而降氣。肺金清則肝木自平矣。二陳降痰逆。赤茯瀉心火生姜姜塹家聖藥。久病虛羸故以參甘大棗扶其胃氣。

定喘湯

人參薑。呃逆因寒中氣戧。丁香柿蒂各二錢。人濟生香薷僅二味亦名丁香柿蒂湯。參一錢。生姜五片。加姜煎。竹茹湯。古方單用柿蒂。取其苦溫降氣。濟生加丁或加竹橘用皆良。加竹茹橘紅名丁香柿蒂治同。

白蘿蔔與麻黃款冬半夏白皮桑蘇杏黃芩兼甘草。肺寒膈熱喘哮嘯嘗。白蘿蔔三

黃麻黃半夏姜製款冬各三錢。桑皮蜜炙蘇子各二錢。杏仁黃芩各錢半甘草一錢加姜煎。○麻黃杏仁桑皮甘草散表寒而清肺氣。款冬溫潤白蘿蔔收澁定喘而清金黃芩清熱蘇子降氣半夏燥痰共成散寒疏壅之功。

理血之劑十三首附方六

四物湯局方養血通劑

地芍與歸芍。血家百病此方通。當歸酒洗生地各三錢。白芍二錢。川芎錢半。寒入心腎滋血為臣。芍藥酸寒入肝脾。生血為君。生地甘陰為佐。芍窮辛溫通行血中之氣為使。八珍湯合入四君子。參朮苓草氣血雙

療功獨崇

四君補氣。再加黃耆與肉桂。

加黃耆助陽。補衛。十全大補湯。

補方

加肉桂助火歸元。十全大補湯。

雄補方

之首。十全除却耆地草。

除生地黃。加粟米百粒。

煎之名胃風。客腸胃。食泄完

瘧及癰。

痙牙閑。

人參養榮湯補氣養血

即十全。

湯見前。

除却川芎五味聯。

陳皮遠志加姜棗。肺脾氣血補方先。

即十全大

補湯。

除川芎加五味。

陳皮遠志。

○薛立齋曰。

氣血兩虛。

變生諸症。不問脈病。但服此湯。諸症悉退。

歸脾湯濟生引血歸脾

歸脾引血

補氣養血

用草耆參。歸草茯苓遠志隨酸棗木香龍眼肉。煎加姜棗益心脾。怔忡健忘俱可却。腸風崩漏總能醫。人參白朮土炒。茯神棗仁龍眼肉各二錢。黃耆蜜分。○血不歸脾。則妄行。參耆草朮之甘溫。以補脾志。茯棗仁龍眼之甘溫酸苦。以補心。當歸養血。木香調氣。氣壯則自能攝血矣。

養心湯補血寧心

補心血

用草耆參。二茯芎歸柏子尋。夏麵遠志兼桂味。再加酸棗總寧心。黃耆蜜炙川芎當歸酒洗。半夏曲各一兩。甘草炙一錢。人參柏子仁去油。肉桂五味子。遠志棗仁炒各二錢半。每服五錢。○參耆補心氣。芎歸養心血。二茯柏仁遠志治心熱而寧心。神五味棗仁收心氣之散越。半夏去心之痰涎。甘草補土以培心。子赤桂引藥以達心經。

當歸四逆

湯仲景益血復脉

益血
復脉

膀胱
畜血

吐胃
熱

桂枝芍細辛甘草木通着再加大棗治陰厥。脈細陽虛由血弱。當歸桂枝芍兩。甘草炙木通各二兩。棗甘五枚。○成氏曰。通脈者必先入心補血。當歸之苦以助心血。心苦緩急食酸以收之。芍藥之酸以收心氣。肝苦急食甘以緩之。甘草大棗內有久寒。加薑茱素有久寒者。加吳茱萸二升。生姜半斤。發木通以緩陰血。內附子恐反灼其陰也。

表溫中通脈經。溫經當歸木通通經復脉。不用附子及乾姜。助陽過劑陰反灼。姜附四逆在於回陽。當歸四逆在於益血復脉。故雖內附子恐反灼其陰也。

桃仁承氣湯。仲景膀胱畜血。下焦蓄血發熱故如狂。

五般奇。甘草硝黃併桂枝。桃仁五十枚去皮尖研。大黃四兩。芒硝桂枝。甘草各二兩。○硝黃甘草調胃承氣也。熱甚搏血。故加除故加桂枝。調經解表。未熱結膀胱小腹脹如狂。畜血最相宜。小腹脹而小便不利。知為血畜血中之伏火。生地大寒涼血而滋水。以共平諸經之僭逆也。或益柴芩總成月加些胡黃芩。

犀角地黃湯。胃熱吐血。

芍藥丹。生地兩半。白芍一兩。丹皮血升。胃熱火邪干。斑黃陽毒皆堪治。犀角解胃熱而清心火。芍藥酸寒。和陰血而散肝火。丹皮苦寒。瀉月中之伏火。生地大寒涼血而滋水。以共平諸經之僭逆也。或益柴芩總成月加些胡黃芩。

咳血方 丹溪咳嗽痰血

咳嗽
痰血

中訶子收枯萎海石山梔投青黛蜜丸口噙化咳嗽痰血服之瘳。訶子煨取去油海石大砂梔子炒黑青黛水飛等分蜜丸嗽甚加杏仁○青黛清肝瀉火梔子清肺涼心枯萎潤燥滑痰海石軟堅止嗽訶子斂肺定喘不用血藥者火退而血白止也。

秦艽白朮丸 束垣血痔便祕

血痔
便祕

歸尾桃仁枳實攢地榆澤瀉皂角子糊丸血痔便艱難。太陽燥結故便艱秦仁研地榆各一兩。枳實麩炒澤瀉皂角子燒存性各五錢糊丸。歸尾桃仁以活血秦艽皂子以潤燥枳實泄胃熱澤瀉瀉濕邪地榆以破血止血白朮以燥濕。仍有蒼朮防風劑潤血疏風燥濕安。本方除白朮當歸地榆加蒼朮。木湯除枳實皂角地榆加防風升麻柴胡陳皮。甘黃柏大黃紅花名秦艽除風湯治並同。

槐花散 便血

便血

用治腸風側柏葉黑荆芥枳殼充為末等分米飲下寬腸涼血逐風功。槐花

涼血枳實寬腸
荆芥理血疏風

小蘗飲子 血淋

血淋

藕節蒲黃砂木通滑石生地裏歸草當歸黑梔子淡竹葉等分血淋熱結服

甘草

黑梔子

淡竹葉

煎服

血淋熱結服

之良火出膀胱竹葉青肺涼心滑石瀉熱利竅當歸引血歸經甘草和中調氣

血妄行

損傷
積血

用三般葉側柏艾荷生地協側柏葉艾葉等分生搗如泥煎血熱妄行止衄

惱

側柏生地補陰涼血荷葉散瘀血

大黃

桃仁

紅花

山甲

花粉

破血

潤血

甲

金風

通劑

十二首附方四

復元活血湯

發明損傷積血

柴胡

花粉

當歸

山甲

俱

桃仁

紅花

大黃草

損傷

瘀血

酒煎

祛

風

之

劑

千金

風

通

劑

小續命湯

千金風痙通劑

十二首附方四

通風痙

桂附芍麻黃參芍杏防風黃芩防已兼甘草六經風中此方通治六經中語言蹇澁及剛柔二痙亦治厥陰風瀉防風一錢二分桂枝麻黃人參白芍酒炒杏仁炒研川芎酒洗黃芩酒炒防已甘草炙各八分附子四分姜棗煎防○麻黃杏仁麻黃湯也治寒桂枝芍藥桂枝湯也治風參草補氣芩養血防風治風溼防已治濕溼附子治寒溼黃芩治熱溼故為治風通劑劉宗厚

曰此方無分經絡不辨寒熱虛實雖多亦奚以為
按此方今人罕用然古今風方多從此方損益為治

搜風活血降火

大秦艽湯機要搜風活血降火

羌獨防芎芷辛芩二地黃。石膏歸芍芩甘术。風邪散見可通嘗。治中風風邪
經者秦艽石膏各三兩羌活獨活防風川芎白芷黃芩酒炒生地酒洗熟地
當歸酒洗白芍酒炒茯苓甘草炙白术土炒各一兩細辛五錢每服一兩〇
劉宗厚曰秦艽湯愈風湯雖有補血之藥而行經散風之劑居其大半將何
以養血而益筋骨也。昂按治風有三法解表攻裏行中道也。初中必挾外感
故用風藥解表散寒而用血藥氣藥調裏活血降火也。

三生飲局方卒中痰厥

用烏附星三皆生用木香聽生南星一兩生川烏附子加參對半扶元氣服每
一兩加參一兩加卒中痰迷服此靈。烏附燥熱行經逐寒南星辛烈除痰散風重用
散痰之劑斬關擒王之將宜急用之。凡中風口閉為心絕手撤為脾絕眼合
為肝絕遺尿為腎絕鼻鼾為肺絕吐沫直視髮直頭搖面赤如粧汗縱如珠合
者皆不治若服此湯間有生者星香散亦治卒中體肥不渴邪在經
香二錢行氣為末服易

簡加姜煎服名星香散

地黃飲子河間瘡厥風癱

山茱斛麥味葛蒲遠志茯苓桂附巴戟天少入薄荷姜棗服。熟地山茱肉
石斛麥冬五

味石菖蒲遠志茯苓肉蓯蓉宮桂附子炮

巴戟天等分每服五錢加薄荷少許煎

火歸水中水生木熟地以滋根本之陰桂附從蓉

巴戟以返真元之火山

瘡厥風癰能治之口噤身冷為瘡

火暴甚腎水虛良不能制之故卒倒無知也治宜和藏府通經絡便是治

附能引火歸元火歸水中則木能生水木不生風而風自息矣惟桂

千項堂印行

瘡厥風癰能治之口噤身冷為瘡
水火既交風火自息矣劉河間曰中風非外中之風良由將息矣宜心滋
醫貫曰瘧涎上湧者水不歸元也面赤煩渴者火不歸元也惟桂
附能引火歸元火歸水中則木能生水木不生風而風自息矣惟桂

獨活湯

丹溪癰瘍昏憤

癰瘍

昏憤

中羌獨防芎歸辛桂參夏菖茯神遠志白微草癰瘍音織昏憤力能匡。羌活
防風當歸川芎細辛桂心人參半夏菖蒲茯神遠志白微各五錢甘草炙二
錢半每服一兩加姜棗煎。肝屬風而主筋故癰瘍為肝邪二活防風治風
辛桂溫經半夏除痰芎歸和血活血活則風散也肝移熱於心則昏憤人參補
心氣菖蒲開心竅茯神遠志安心神白微退熱止風風靜火息血活神寧癰
瘍自已矣

順風勻氣散

喝僻偏枯

喝僻

偏枯

木烏沉白芷天麻蘇葉參木瓜甘草青皮合喝僻偏枯口舌瘡口眼喝邪偏
宗氣不能周于一身白术二錢烏藥錢半天麻人參各五分蘇葉白芷木瓜
滯氣參木炎草以補正氣氣勻則風順矣木瓜伸筋能于土中瀉木

上中下通用痛風方

上中下痛風木

上中
下痛

風寒
濕痺

散風
熱

黃柏蒼术天南星桂枝行防已下行及威靈仙上行桃仁紅花龍膽草下行羌芷上

細行
下行
威靈仙
桃仁
紅花
龍膽草
羌芷
上行

川芎上下神曲停痛風濕熱與痰血。上中下通用之聽。黃柏酒炒。

蒼术泔浸各二兩
防已利水。行
錢半曲糊丸名上中下通用痛風方。丹溪○黃柏清熱。蒼术燥濕。龍胆瀉火。

痰四者治濕與熱。桃仁紅花活血去瘀。川芎血中氣藥。南星散風燥積之氣也。所以治風加神曲者。消中焦陳皮。白芷去頭面風。桂枝威靈去臂脛風。四者不兼者加減為治。

獨活寄生湯千金風寒濕痺

羌防辛。芎歸地芍桂苓均杜仲牛膝人參草。冷風頑痺屈能伸。

獨活桑寄生秦艽防風細

辛川芎酒洗當歸酒洗白芍酒炒熟地桂心茯苓若去寄生加耆續。黃耆湯杜仲姜汁炒斷絲。牛膝人參甘草等分。每服四錢。若去寄生加耆續。斷絲湯名三痺古方珍。名三痺湯治風寒濕三痺。論嘉言曰此方用參耆四物一派襲虛成痺者。宜準諸此。

消風散
消風散熱

內羌防荆芎朴參芩陳草并殭蠶蟬蛻藿香入為末茶調或酒行頭痛目昏項背急頑麻癱痙攣服之清。人參防風茯苓川芎羌活殭蠶炒。蟬蛻藿香各二兩。錢茶調下。瘡癬酒下○羌防芎荆治頭目項背之風。殭蠶蟬蛻散咽膈皮膚之風。藿香厚朴去惡散滿。參芩甘橘輔正調中。

川芎茶調散局方頭目風熱

風眼
熱目

風熱
頭濕

婦人
血勞

荆防。辛芷薄荷甘草羌。目昏鼻塞風攻上。正偏頭痛悉平。康薄荷三錢。川芎五錢半細辛一錢。羌活白芷甘草各二錢。為末每服三錢。茶調下。○羌活治太陽頭痛。白芷治陽明頭痛。川芎治少陽厥陰頭痛。細辛治少陰頭痛。防風為風藥。卒徒薄荷荆芥散風熱而清頭目。以風熱攻上。宜于升散。頭項之上。惟風藥可到也。加甘草以緩中。加茶調以清降。方內若加僵蠶。菊花茶調散用亦臧。菊花清頭目。僵蠶去風痰。

青空

膏東垣風濕熱

人參荆芥散
婦寶婦人血風勞

芎草柴芩連羌防升之入頂巔。為末茶調如膏服。正偏頭痛一時蠲。川芎五錢。甘草三錢。黃芩七錢。黃連酒炒。黃連酒炒。羌活防風各一兩。每服三錢。○風寒濕熱上攻頭腦則痛。頭兩旁屬少陽。偏頭痛屬少陽。相火。芩連苦寒。以羌防芎。柴升之則能去濕。熱于高巔之上矣。

祛寒之劑
十二首附方二

熟地防風柴枳芎歸比酸棗鱉羚桂术甘。血風勞作風虛治。血脉空疎乃感久漸成勞。人參荆芥熟地柴胡枳殼棗仁泥。鱉甲童便炎。羚羊角白术各五分。防風甘草炙。當歸川芎桂心各三分。加姜煎。○荆防柴羚以疎風平木地經。參木炙草棗仁以斂汗補虛除煩進食。

理中湯 仲景 寒客 中焦

寒客
中焦

主理中鄉 仲景曰理中
者理中焦 脈沉無力○人參補氣益脾為君。白朮健脾燥濕為臣。甘草和中補土為佐。乾姜溫胃散寒為使。名附子總扶陽。理中湯。

真武湯 仲景

壯腎中陽茯苓木芍附生薑 附子一枚炮白朮二兩炒少陰腹痛有水氣 桂枝白芍炒生姜各三兩
眩瞶惕保安康 中有水氣故心悸頭眩汗多亡陽故肉瞶筋惕瞶音純動貌
斂陰和營以止腹痛 真武 北方水神腎中火足
水乃歸元此方補腎之陽壯火而利水故名

四逆湯 仲景 阴症厥逆

陰證
厥逆
陽

壯腎

中薑附草三陰厥逆太陽沉 附子一枚生用乾姜一兩甘草炙二兩冷或益
服專治三陰厥逆太陽初症脉沉亦用之或益
薑蔥參芍桔通陽復脉力能任。音仁面赤格陽于上也加蔥白通陽痛腹加
人參補氣復脉嘔吐
加生姜以散逆氣

白通加人尿猪膽汁 湯仲景尿音烏去聲小便也俗讀平聲非陰盛格陽
乾姜附子兼蔥白 附子一枚炮乾姜一兩蔥白四莖此白通湯也蔥白熱因
以通陽氣姜附以散陰寒加人尿五合猪胆汁一合

寒用妙義深。陰盛格陽厥無脉。陰寒內甚。格陽於外。故厥逆無脉。純與熱藥寒藥以為引用使。得入陰而回陽也。

吳茱萸湯仲景吐利寒厥

吐利

寒厥

人參棗重用生姜溫胃。好陽明寒嘔。太陽熱少陰下利。厥陰頭痛皆能保。吳萸一升炮人參三兩。生姜六兩。棗十二枚。○姜茱參棗補土散寒。茱萸辛熟能入厥陰治肝氣上逆而致嘔利腹痛。

益元湯活人戴陽煩燥

煩燥

陽厥

艾附與乾姜麥味知連參草將附子泡艾葉乾姜麥冬五味知母黃姜棗蔥煎入童便。冷服內寒外熱名戴陽症。此陰盛格陽之症。面赤身熱不煩而燥。但與白通。加人尿猪胆汁同意。乃熱因寒藥為引用也。按內熱曰煩。為有根之火。外熱曰燥。為無根之火。故但燥不煩。及先燥後煩者。皆不治。

回陽救急湯

節卷曰即四逆湯三陰寒逆

三陰寒厥

用六君桂附乾姜五味羣。附子炮乾姜肉桂人參各五分。白朮茯苓各一錢半。夏陳皮各七分。甘草三分。五味九粒。姜煎加麝三厘或猪膽汁。三陰寒厥見奇勲。姜桂附子祛其陰寒。六君溫補其陽氣。

麝加胆汁者。五味人參以生其脉。加麝香者以通其氣。

熱因寒用也。

四神丸腎虛脾瀉

脾瀉

故紙吳茱萸肉蔻五味四般須大棗百枚姜八兩破故紙四兩酒浸炒吳茱萸一兩鹽水炒肉豆蔻三兩。麵裹煨五味子三兩炒東生姜同煎棗去姜搗棗五更腎瀉火衰扶由命火衰不能生脾土故五更將交陽分陽虛不能健閉而泄瀉不可專責脾胃去濕五味補腎瀉精生姜土亦以防水也。

厚朴溫中湯

虛寒脹滿

亦以

防水也

虛寒脹滿

寒疝

寒濕氣

寒疝痛用導氣湯

寒疝

陳草苓乾姜草蔻木香停煎服加姜治腹痛虛寒脹滿用皆靈。厚朴陳皮各
芩草豆蔻木香各五分乾姜三分加姜煎。○乾姜草蔻半熟以散其寒。陳皮
木香辛溫以調其氣厚朴辛溫以散滿。茯苓甘淡以利濕。甘草甘平以和中。
寒散氣行痛。○自已矣。

寒疝氣方

丹溪寒濕疝氣

川棟茴香與木香。吳茱萸以長流水散寒通氣和小腸。

疝亦名小腸氣。川棟

二錢。吳茱萸一錢。湯泡同煎。

○川棟苦寒入肝舒筋能導小腸膀胱之熱從

小水下行為治疝君藥。茴香煖胃散寒。吳茱萸溫肝燥濕。木香行三焦通氣。

子也再入吳茱萸暖厥陰。疝乃厥陰肝邪。非腎病以肝脈絡陰器也。

長流水煎疝痛釋等分或為

皋腎。○再入吳茱萸暖厥陰。疝乃厥陰肝邪。非腎病以肝脈絡陰器也。

橘核丸 濟生癩疝

癩疝

中川棟桂朴實延胡藻帶昆桃仁二木酒糊合。癩疝痛頑鹽酒吞。橘核川棟
帶昆布桃仁各二兩。桂心厚朴枳實延胡索木通木香各五錢。酒糊為丸。鹽
湯或酒下。橘核木香能入厥陰氣分而行氣。桃仁延胡能入厥陰氣分而
活血。川棟木通能導小腸膀胱之濕。官桂能祛肝腎之寒。能入厥陰氣分而
厚朴枳實行結水而破宿血。昆布藻帶寒行水而鹹軟堅。

祛暑之劑

五首附方十

三物香薷飲局方散暑和脾

豆朴先。香薷辛溫。香散能入肺脾。發越陽氣以治中暑。熱盛口渴心煩。或加芩草名五物。香薷利濕祛暑木瓜宣。加木瓜名六味芩治濕盛。再加參耆與陳木。兼治內傷十味全。六味加參耆陳皮白朮名十味香薷飲。二香散合入香蘇飲。五味香薷飲合香蘇飲。香附紫蘇陳皮飲。蒼朮名二香散治外感內傷。身熱腹脹仍有藿薷湯。香葛湯傳。三物物香薷飲。加葛根名香葛湯。治伏暑吐瀉。三湯東垣補肺生津燥濕清熱。

清暑益氣

參耆當歸麥味青陳皮。麴柏葛根蒼白朮。升麻澤瀉棗姜隨。人參黃耆甘
洗麥冬五味青皮炒。陳皮留白神曲炒。黃柏酒炒。葛根蒼朮白朮土炒升
麻澤瀉加姜棗煎。熱傷氣參耆補氣斂汗。傷脾二木燥濕強脾。火旺則金

當歸養血而和陰。曲草和中而消食。升葛以升清。澤瀉以降濁也。

縮脾飲 温脾消暑

溫脾
消暑

復保肺

清暑
利濕

六

生脉

散保肺復脉
治暑月飲冷受傷之脾胃耳

用清暑氣砂仁草茱烏梅暨甘草葛根扁豆加吐瀉煩渴溫脾胃。
砂仁草茱萸各四兩。扁豆炒研。葛根各二兩。○暑必兼濕。而濕屬脾土。散用砂仁草茱萸利氣溫脾。扁豆解暑滲濕。葛根升陽生津。甘草補土和中。烏梅清熱止渴。

古人治暑多用溫。

如查萬大順散之類。

暑為陰症。此所謂

中暑為陰症。為不足。經曰。脈為貴。先將甘草白砂炒次入乾姜。

姜杏仁炒合肉桂為末。每

天

服二錢。

吳鶴臯曰。此非治暑乃

虛身熱得大順散。杏仁姜桂甘散寒燥濕斯為貴。
次入乾姜杏仁炒合肉桂為末。每

天服二錢。

吳鶴臯曰。此非治暑乃

滑石同甘草解肌行水兼清燥統治表裏及三焦。熱渴暑煩瀉痢保。人參五分。麥冬八分。五味子九粒。○人參大補肺氣。麥冬甘寒潤肺。五味酸收斂肺。並能瀉火生津。益心主脉。肺朝百脉。補肺清心則氣充而復脉。將死脉絕者。服之能令復生。夏月火旺金尤宜服之。

一散清暑利濕。

滑石同甘草解肌行水兼清燥統治表裏及三焦。熱渴暑煩瀉痢保。人參五分。麥冬八分。五味子九粒。○人參大補肺氣。麥冬甘寒潤肺。五味酸收斂肺。並能瀉火生津。益心主脉。肺朝百脉。補肺清心則氣充而復脉。將死脉絕者。服之能令復生。夏月火旺金尤宜服之。

一散清暑利濕。

益元散。碧玉散與雞蘇散。砂黛薄荷加之好。前方加辰砂。名益元散。取其清加薄荷。名雞蘇散。散取其散肺也。

利濕之劑十三首附方八

五苓散 仲景行水總劑

治太陽府。太陽經熱傳入膀胱。膀胱府者用之。白术澤瀉。猪苓。膀胱化氣添官桂。利便消暑煩渴清。甘淡利水。澤瀉。白术炒各十八銖。澤瀉一兩六錢。桂半兩。每服三錢。二苓者。補土所以制水。加官桂者。氣化乃能出也。經除桂名為四苓散。無寒但渴。白膀胱者。州郡之官津液藏焉。氣化則能出矣。除桂名為四苓散。無寒但渴。服之靈。漏勝則氣不得施化。故猪苓湯。仲景除桂與术。加入阿膠滑石停。猪苓澤瀉。阿膠滑石各一兩。○滑石瀉火解肌。最能行水。吳鶴舉曰。以諸藥過燥。故加阿膠以存津液。此為和濕兼瀉熱痘黃。小便閉渴嘔寧。猪苓兼熱勝。

小半夏加茯苓湯 仲景行水消痞

行水散痞有生姜。半夏一升。茯苓三兩。生姜加桂除夏治慄厥。茯苓甘草湯。名彰。加桂枝甘草。除半夏名茯苓甘草湯。仲景治傷寒水氣乘心。厥而心下。腎着湯。金匱濕傷腰腎。慄者先治其水。却治其慄。○火因水而下行。則眩慄止而痞滿消化者矣。

行水
消痞

腰腎

內用乾姜茯苓甘草白朮。傷濕身痛與腰冷。亦名乾姜苓朮湯。乾姜炮
苓各四兩

甘草炙白朮炒各二兩。數藥行水。黃耆防已湯。金除姜茯朮甘姜棗共煎。補土。此濕邪在經而未入府藏者。當此治風水與諸濕。身重汗出服之良。黃耆防已各一兩。白朮七錢半。甘草通行十二經。開竅行水。黃耆生用。達表白朮燥濕強脾。並能止汗。加甘草者益土。所以制水。又以緩防已之峻急也。

舟車

丸河間燥實陽水

燥實

牽牛及大黃。遂戟芫花又木香。青皮橘皮加輕粉。燥實陽水郤相當。口渴面便祕而腫脹者為陽水。黑牽牛四兩炒。大黃二兩酒浸。甘遂麵裹煨。芫花醋炒。大戟麵裹煨。青皮炒。橘紅各一兩。木香五錢。輕粉一錢。水丸。○牽牛大黃

疏鑿

加輕粉以透經絡。然非實症不可以行氣少

飲陽水

陽水

檳榔及商陸。苓皮大腹同椒目。赤豆芫花瀉木通。煎益姜皮陽水服。陸茯苓商

皮大腹皮椒目赤小豆秦艽活澤瀉木通等分。加姜皮棗煎。○芫花散濕上升通瀉。瀉濕下降。苓腹姜皮行水于皮膚。椒豆商陆攻水于腹裏。亦上表裏分消之意。

實脾

飲嚴氏虛寒陰水

陰水

芩术與木瓜。甘草木香大腹加草蔻附姜兼厚朴。虛寒陰水效堪誇。便利不渴而腫

湯頭歌訣

利濕之劑

十九

上海三馬路

脹者為陰水。茯苓白术土炒。木瓜甘草木香大腹子草豆蔻煨。附子炮黑姜厚朴炒。加姜棗煎。○脾虛補以苓木甘草。脾寒溫以蔻附黑姜。脾濕利以茯苓大腹。脾滯導以厚朴木香。又土之不足由於木之有餘。木瓜木香皆能平土。肝瀉木使下不魁土。而脾和則土能制水而脾實矣。經曰瀉勝則地泥實土。正所以制水也。

脾虛
膚腫

濕氣
在表

五皮飲 滋療脾虛膚腫

用五般皮陳茯姜桑大腹奇。陳皮。茯苓皮。姜皮。桑白皮。大腹皮。或用五加皮易桑白皮。脾虛膚腫此方可。脾不能為胃行其津液故水腫半身以上宜汗半身以下宜利小便。此方于瀉水之中仍寓調補之意。皆用皮者水溢皮膚以皮行也。

羌活勝濕湯局方 濕氣在表

羌獨芎甘蔓藁本與防風。濕氣在表頭腰重。痛發汗升陽有異功。風能勝濕升能降。氣升則不與行水滲濕同。濕氣在表宜汗。又風能勝濕故用風藥上升。使濕從汗散。羌活獨活各一錢。川芎甘草。羌藁本防風各五分。蔓荆子三分。如有寒濕加附子防己。若除獨活芎蔓草除濕湯。升麻蒼朮羌活。川芎蔓荆甘草。加升麻蒼朮名。

羌活除濕湯治風濕身痛。

大橘皮湯 水腫泄瀉

治濕熱五苓六一二方綴。陳皮木香梔榔增。能消水腫及瀉泄。用五苓散赤苓一錢。猪

黃疸

茵陳蒿湯

仲景黃疸

芩澤瀉白木桂各五分。用六一散滑石六錢。甘草一錢。加陳皮錢半。木香一錢。柳各三分。每服五錢。加姜煎。○小水併入大腸。致小腸不利而大便泄瀉。二散皆行水瀉熱之藥。加枳柳峻下。陳皮木香理氣以利小便。而實大便也。水腫亦瀉熱為病。故皆治之。

淋血痛

八正散局方淋痛尿血

草薢分清飲

白瀉膏

石菖蒲。甘草梢烏藥益智俱。餘藥等分。或益茯苓鹽煎服。加鹽少許。通心固腎。不專於治下。必二焦通利。水乃下行也。

木通與車前。扁蓄大黃滑石研。甘草梢瞿麥菟梔子。煎加燈草痛淋蠲。一方香治濕熱下注。口渴咽乾。淋痛尿血。小腹急滿。○木通燈草瞿麥降心火。入小腸車前清肺火。入膀胱。梔子瀉三焦鬱火。大黃滑石瀉火利水之捷藥。扁蓄利便通淋。草稍入莖止痛。雖治下焦而

濁精區遺精白濁○草薢能泄厥陰陽明濕熱去濁分清。烏藥疏泄氣而止而止痛。使濕熱去而心腎通則氣化行。縮泉丸益智同烏藥分山藥為糊丸便數需鹽湯下治而淋漓止矣。此以疏泄為禁止者也。

當歸拈痛湯 東垣脚氣瘡瘍

腳氣瘡

羌防升。猪澤茵陳芩葛朋二术苦參知母草。瘡瘍濕熱服皆應。當歸酒洗羌活防風升麻
猪芩澤瀉茵陳黃芩酒炒。葛根蒼朮白朮土炒。苦參知母並酒炒甘草炙。○血升
羌活通關節。防風散留濕苦參黃芩茵陳知母以泄濕熱。當歸以和氣疏
葛助陽而升清。芩瀉瀉濕降濁。參甘二术補正固中。使苦寒不傷胃疏
泄不損氣也。劉宗厚曰。此方東垣本治濕熱脚氣。後人用治諸瘡甚驗。

潤燥之劑

十三首附方二

炙甘草湯 仲景虛勞肺痿

肺痿勞

參姜桂。麥冬生地大麻仁。大棗阿膠加酒服。虛勞肺痿效如神。甘草炙人參生姜桂枝各三兩。阿膠蛤粉砂二兩。生地一斤。麥冬麻仁研各半升。棗十二枚。水酒各半煎。
仲景治傷寒脉結代心動悸及肺痿唾多。干金翼用治虛勞。寶鑑用治肺
遂外臺用治肺痿。○參草麥冬益氣復脉。阿膠生地補血養陰。棗麻潤腎。以緩脾胃。姜桂辛溫以散餘邪。

滋燥養榮湯 血虛風燥

血虛

雨地黃。芩甘歸芍及羌防。羌防風。爪枯膚燥兼風秘。火燥金傷血液亡。當歸酒洗

二錢生地熟地白芍炒黃芩酒炒
秦艽各一錢防風甘草各五分

活血潤燥生津散

丹溪內燥血枯

內燥
血枯

二冬熟地兼桔梗桃仁紅花及歸芍利秘通幽善澤枯熟地當歸白芍各一
錢天冬麥冬桔梗各一錢

韭汁牛乳飲

丹溪反胃噎膈

紅花各五分
桃仁研

反胃
噎膈

反胃滋養榮散瘀潤腸奇五汁安中飲

任侯張姜梨藕三般加入用隨宜牛乳半斤韭菜

汁少許滾湯頓服名韭汁牛乳飲牛乳六分韭汁姜汁藕汁梨汁各一分和
服名五汁安中飲並治噎膈由火盛血枯或有瘀血寒痰阻滯
胃口故食入反出也牛乳潤燥養血為君韭汁藕汁消瘀益胃姜汁溫
胃散瘀梨汁消痰降火聽審症用之或加陳酒亦佳以酒乃米汁也

潤腸丸

東垣風秘血秘

反胃
噎膈

用歸尾羌桃仁麻仁及大黃歸尾羌活大黃各五錢桃仁大麻仁各一兩蜜

破結通幽麻仁滑腸利秘或加茺防皂角子風濕加秦艽防風皂角子燒存性研風秘血
秘善通腸風燥血燥

通幽湯

東垣噎塞便秘

便閉
噎膈

中二地俱桃仁紅花歸草濡升麻升清以降濁清陽中升則陰濁不降故大
便不通生地熟地各五分桃

仁研紅花當歸身甘
草灸升麻各一錢 噎塞便閉此方需有加麻仁大黃者當歸潤腸湯名殊
上藥皆潤

搜風順氣丸 風秘腸風

燥通腸

風秘

腸風

大黃蒸郁李麻仁山藥增防獨車前及枳壳菟絲牛膝山茱仍中風風秘及
氣秘。腸風下血總堪憑。大黃九蒸九膾五兩。大麻仁郁李仁去皮。山藥酒蒸。
獨活枳壳炒各一兩。蜜丸。防獨潤腎搜風枳壳順氣破滯大黃經蒸。菟絲子酒浸防風。
免絲固本益陽。不使過於攻散也。

消渴方 丹溪胃熱消渴

胃熱

消渴

中花粉連藕汁生地汁牛乳研粉連碾末諸汁調服或加姜汁蜜為膏服瀉火生津益
血瘡。黃連寫心火生地滋腎水。藕汁益胃花粉生津。牛乳潤燥益血。

白茯苓丸 腎消

治腎消花粉黃連草薢調二參熟地覆盆子石斛蛇床晚腎要音皮鵝難肚
粉黃連草薢人參玄參熟地黃覆盆子各一兩石斛蛇床子各七錢半雞肫
皮三十具微炒蜜丸石湯下。黃連降心火石斛平胃熱熟地玄參生腎
水。覆盆蛇床固腎精人參補氣花粉生津。茯苓交心腎色黑屬水假之入腎也。

猪腎齊尾

湯十全解毒治腎消

解毒
消腎

消渴
煩燥

氣乏
嘶聲

燥金
受濕熱之邪

參伏神

知芩葛草石膏因磁石天花同黑豆強中消渴此方珍。

下渴之症

長興盛不交

精出名強中緣服邪術熱藥而毒盛也。猪腎一具大豆一升齊尾人參石膏各三兩磁石絲裹伏神知母黃芩葛根甘草花粉各二兩先煮豆腎去滓以藥分三服。○知芩石膏以寫邪火人參甘草以固正氣葛根花粉以生津齊尾黑豆最能解毒磁石猪腎引之入腎也。

地黃飲子

易簡消渴煩燥

參耆草二地二冬枇斛茶澤瀉枳實疏二府燥煩消渴血枯含人參黃耆甘冬生地枇杷葉蜜炙石斛澤瀉枳實炒每服三錢。○參耆甘草以補其氣氣能生水。二地二冬以潤其燥潤能益血石斛平胃。枇杷補氣澤瀉瀉勝胱之火枳實宣大腸之滯使二府清則心肺二藏之氣得以下降而渴自止。

酥蜜膏酒

千金氣乏聲嘶

用飴糖二汁百部及生姜杏棗補脾兼潤肺聲嘶氣憊酒渴嘗

肉杏仁細研酥蜜飴糖棗

百部汁生姜汁共煎一次久加膏溫酒細細煎服之

清燥

湯東垣燥金受濕熱之邪

二术與黃耆參芩連柏草陳皮猪澤升柴五味

麵麥冬歸地瘻方推治肺金受

瘻楚喘促口乾便赤黃耆錢半蒼术炒一錢白米炒陳皮澤瀉各五分人參茯苓升麻各三分當歸酒洗生地麥冬甘草炙神曲炒黃柏酒炒猪苓各二

分柴胡黃連炒各一分五味九粒煎。○肺為辛金主氣大腸為庚金主津燥金受濕熱之邪則寒水生化之源絕而痿躊喘渴諸症作矣。參者芩木陳草補土以生金麥味保金而生水連柏歸地瀉火滋陰。猪澤升柴升清降濁則燥金肅清水出高原而諸病平矣。此方不盡潤藥因有清燥二字故附記於此然東垣所云清燥者蓋指肺與大腸為燥金也。

瀉火之劑二十七首附方九

黃連解毒湯 毒即火熱也三焦實熱

四味黃柏黃芩梔子備等躁狂大熱嘔不眠吐血衄鼻血音女六切班黃均可使。若云三黃石膏湯再加麻黃及淡豉見表裏門此為傷寒溫毒盛三焦表裏相兼治。

梔子金花丸 加大黃黃芩黃柏黃連梔子大黃水炮潤腸瀉熱真堪倚。

附子瀉心湯 仲景傷寒痞滿

傷寒
痞滿

實熱

用三黃寒加熱藥以維陽。芩連各一兩大黃二兩附子一枚痞乃熱邪寒藥治。傷寒痞滿從外之內滿在胸而不在于胃多屬熱之軟關脉浮者大黃黃連瀉心湯仲景誤下虛寒後人罕識其指細辛各二分附子一枚炮金匱陽中有陰宜以溫藥下其寒。後人罕識其指。

半夏瀉心湯 仲景誤下虛寒

胸下虛症

肺胃實熱

肺胃虛熱

火鬱

黃連芩乾姜甘草與人參大棗和之治虛痞法在降陽而和陰。連一兩乾姜身寒而嘔飲食不下非柴胡症凡用瀉心者多偏誤下非傳經熱耶○否而不泰為痞瀉心者必以苦故用芩連散痞者必以辛故用姜夏欲交陰陽通上下者必和其中故用參甘大棗。

白虎湯

仲景肺胃實熱

用石膏知母甘草粳米陪。

石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合亦有加入人參者。

白虎湯名人參白虎湯。

燥煩熱渴舌生胎白虎西方金神此方清肺金而瀉胃火故名然必實熱方症誤投之不可救也按白虎症脈洪大有力類白虎症脉大

而虛以此為辨又當觀小便赤者為內熱白者為內寒也

竹葉石膏湯仲景肺胃虛熱

人參麥冬半夏與竹林甘草生姜兼粳米暑煩熱渴脉虛尋一斤人參三兩甘草炙二兩麥冬一升半夏粳米各半升加姜煎治傷寒解後嘔渴少氣○竹葉石膏之辛寒以散餘熱參甘粳麥之甘平以補虛生津姜夏之辛溫以止嘔

升陽散火湯東垣火鬱

葛升柴羌獨防風參芍儕生羌二草加羌東陽經火鬱發之佳柴胡八錢葛獨活人參白芍各五錢防風二錢半炙甘草三錢生甘草二錢每服五錢加姜棗煎○大發多在肝胆之經以木盛能生火而二經俱挾相火故以柴胡加

涼膈散。肝為君，羌防以發太陽之火。升葛以發陽明之火。加參甘者補土以瀉火。加白芍者瀉肝而益脾。且令散中有補，發中有收也。

膈上實熱

涼膈

散局方。膈上實熱。

硝黃梔子翹黃芩甘草薄荷饒竹葉蜜煎療膈上

葉生竹上

中焦燥實服之

故治上焦。大黃酒浸芒硝甘草各二兩。梔子炒黑。黃芩酒炒薄荷各一兩。消連翹四兩。以推瀉于下使上升下行。而膈自清矣。加甘草生蜜者病在膈。甘以緩之也。

清心蓮子飲局方心火淋渴

虛火淋渴

清心蓮子

飲局方。心火淋渴。

石蓮參地骨柴胡赤茯苓耆草麥冬車前子躁煩消渴及崩淋

石蓮人參柴胡赤茯苓黃芩。補虛火。退熱平肝。黃芩麥冬清熱上焦。赤茯苓車前利濕下部。中以石蓮交其心腎也。

甘露飲局方胃中濕熱

兩地生與茵陳芩枳杷黃芩枳石斛倫。甘草二冬天平胃熱。等分煎。中濕熱口瘡角通治胃。

甘草石斛平脾胃之虛熱。清而兼補。黃芩陳折熱而去濕。枳殼枇杷抑氣而降火。桂苓犀角可加均。加茯苓肉桂名事方。加犀角通治胃。

平胃濕熱

清胃散 東垣胃火牙痛

胃火
牙痛

用升麻黃連當歸生地牡丹全。或益石膏平胃熱。口瘡吐衄。口鼻血及牙宣。齒明之火。升麻升陽。明之清。昂按古人治血多用升麻。然上升之藥。終不可輕施。

瀉黃 散胃熱口瘡

胃火
口瘡

甘草與防風石膏梔子藿香充炒香密酒調和服。胃熱口瘡並見功。防風四
二兩。黑梔子一兩。藿香七錢。石膏五錢。梔子石膏瀉肺胃之火。藿香辟惡調中。甘草補脾瀉熱。重用防風者能發脾中伏火。又能于土中瀉木也。

錢乙瀉黃 散脾胃鬱火

脾胃
鬱火

升防芷。芩夏石斛同甘枳。亦治胃熱及口瘡。大鬱發之斯為美。升麻防風四
升防白芷各半錢。黃芩夏枳殼各一錢。甘草七分。升防白芷以散。胃火芩夏枳殼以清熱開鬱。石斛甘草以平胃調中。

瀉白 散錢乙肺火

肺火

桑皮地骨皮。甘草粳米四般宜。桑白皮地骨皮各一錢。甘草五分。粳米百粒。梗米和中清肺。李時珍曰。參茯知芩皆可入。人參茯苓知母黃芩。聽加名加減瀉白散。肺炎喘嗽此瀉肺諸方之準繩也。

此方施

瀉青丸 錢乙 肝火

肝火

肝火
經

左金

茱連六一丸。肝經火鬱吐吞酸。

黃連六兩。姜汁炒。吳茱萸一兩。鹽湯炮。亦名茱連丸。○肝實則作痛。或嘔酸。心為肝子。故名

肝火

茱連六一丸。肝經火鬱吐吞酸。

黃連六兩。姜汁炒。吳茱萸一兩。鹽湯炮。亦名茱連丸。○肝實則作痛。或嘔酸。心為肝子。故名

龍膽瀉肝

湯局方

肝火 濕熱

酒蒸羌活防風川芎當歸酒洗等分蜜丸竹葉湯下○羌
防引火上升。梔胆大黃抑火下降。芎歸養肝血而潤肝燥。

肝火

當歸龍薈

九宣明肝火

寒過于火池下也

梔芩柴生地車前澤瀉偕。木通甘草當歸合。肝經濕熱力能排。
梔子酒炒。黃芩酒炒。生地酒炒。柴胡車前子澤瀉木通當歸。甘草生用。○龍胆
之火。黃芩梔子瀉肺與三焦之熱以佐之。澤瀉瀉腎經之濕。木通車前瀉小
腸膀胱之濕以佐之。歸地養血補肝。甘草緩中益胃。不令苦寒過于火池下也。

梔芩柴生地車前澤瀉偕。木通甘草當歸合。肝經濕熱力能排。

梔子酒炒。黃芩酒炒。生地酒炒。柴胡車前子澤瀉木通當歸。甘草生用。○龍胆
之火。黃芩梔子瀉肺與三焦之熱以佐之。澤瀉瀉腎經之濕。木通車前瀉小
腸膀胱之濕以佐之。歸地養血補肝。甘草緩中益胃。不令苦寒過于火池下也。

用龍膽梔下行瀉火大黃資。羌防升上芎歸潤。火鬱肝經用此宜。

龍膽草黑梔子大黃

用黃連瀉心清火。使火不越金。則金能制木。而肝平矣。吳茱能入厥陰。行
解鬱。又能引熱下行。故以為反佐。寒者正治。熱者反治。使之相濟。以立功也。
左金者。使肺右之金。得行于左。而平肝也。再加芍藥名戊己。九熱瀉熱。痢服之安。
肝安脾使。連附六一湯。治胃痛。寒因熱用。理一般。黃連六兩。附子一兩。亦反佐也。
木不剋土。連附六一湯。治胃痛。寒因熱用。理一般。黃連六兩。附子一兩。亦反佐也。

心小腸火

骨蒸勞熱

天大頭

導赤散。錢乙心小腸火。

生地與木通。甘草梢竹葉四般攻。口瘻淋痛小腸火。引熱同歸小便中。等分
生地涼心血。竹葉清心氣。木通瀉心火。大入小腸。草梢達腎莖而止痛。

清骨散

骨蒸勞熱

普濟消毒飲。東垣大頭天行

芩連鼠玄參甘桔藍根倍升柴馬勃連翹陳殼蠶薄荷為末咀。黃芩酒炒。黃
錢玄參甘草生用。桔梗。柴胡陳皮去白。各二錢。鼠粘子板藍根或加人參及
馬勃連翹薄荷各一錢。殼蠶升麻各七分。末服。或蜜丸噙化。染者多不效。

大黃虛者加人參。大頭天行力能禦。大頭天行親戚不相訪問。染者多不效。
○原文曰。芩連瀉心肺之熱為君。玄參

陳皮甘草瀉火補肺為臣。連翹薄荷鼠粘藍根殼蠶馬勃散腫消毒定喘為佐。升麻柴胡散陽明少陽二經之陽。桔梗為舟楫不令下行為載。李東垣曰。此邪熱客心肺之間。上攻頭面為腫。以承氣鴻之是為誅伐無過。遂處此方全活甚衆。

清震湯 河間雷頭風

陳皮甘草瀉火補肺為臣。連翹薄荷鼠粘藍根殼蠶馬勃散腫消毒定喘為佐。升麻柴胡散陽明少陽二經之陽。桔梗為舟楫不令下行為載。李東垣曰。此邪熱客心肺之間。上攻頭面為腫。以承氣鴻之是為誅伐無過。遂處此方全活甚衆。

雷頭風

肺欬

吐膿

咯肺血

清咽太平 九肺火咯血

中用防己桑皮貝母桔梗子。甘枳當歸意杏仁。黃耆百合姜煎。此桔梗防己當歸枳殼苡仁桑皮各五分。黃耆肺癰吐膿或咽乾便祕大黃可加使。一方杏仁百合甘草各三分。姜煎。參無枳殼。○黃耆補肺氣。杏仁薏仁桑皮百合補肺清火。桔梗貝母潤肺除痰。甘桔開提氣血。利膈散寒。防己散腫除風。瀉濕清熱。當歸以和其血。枳殼以其氣利。

薄荷苦柿霜甘桔及防風。犀角密丸治膈熱。早間咯血頰常紅。兩頰肺肝之木旺之時。木盛生火。來犯肺金。薄荷十兩。川芎苦柿霜甘草防風犀角各二兩。桔梗三兩。蜜丸。○川芎血中氣藥。散瘀升清。防風血藥之使。搜肝瀉肺。薄荷潤理肺。散熱。清咽除蒸。犀角涼心清肝。苦柿霜生津。甘草緩炎。上之火勢。桔梗載諸藥而上浮。

消斑青黛 欽陶節庵胃熱發斑

發班
胃熱

風熱
鼻淵

肺熱
發癰

妙香散 王荊公驚悸夢遺

蒼耳散

陳無擇 風熱鼻淵

辛夷散

嚴氏肺熱鼻癰

棗煎加一匙醋陽邪裏實此方舊發班雖由胃熱亦諸經之火有以助之青

母生地清腎人犀角石膏清胃火引以柴胡使達肌表使以姜棗以和營衛熱毒入裏亦由胃虛故以人參甘草益胃加醋者酸以收之也

梔連犀知母玄參生地齊石膏柴胡人參甘草便實參去大黃躋去人參姜

甘草便實參去大黃躋去人參姜

裏葉本防風白芷升麻與木通芎細川芎甘草茶調服鼻生瘻肉此方攻經濕熱上蒸于腦入鼻而生瘻內猶濕地得熱而生芝菌也諸藥等分末服三錢○辛夷升麻白芷能引胃中清陽上行頭腦防風葉本能入顛頂燥熱祛風細辛夷散熱通竅川芎散鬱疏肝木通茶清瀉火下行甘草甘平緩其辛散也

中用薄荷辛夷白芷四般和葱茶調服疎肝肺清升濁降鼻淵瘻。蒼耳子炒荷辛夷各五錢白芷一兩末服。凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致濁氣上燦于腦則鼻流濁涕為淵數藥升陽通竅除濁散風故治之也

山藥與參耆甘桔二茯遠志隨少佐辰砂木香麝驚悸鬱結夢中遺。山藥二錢半麝香一錢為末每服二錢酒下。山藥固精參耆補氣遠志二茯清人參黃耆蜜炙茯苓茯神遠志炒各一兩桔梗甘草各三錢辰砂二錢木香

心寧神。桔梗木香疏肝清肺。丹麝鎮心散鬱辟邪。甘草補中協和諸藥。使精氣神相依。邪火自退。不用固澑之藥。為洩遺良劑。以其安神利氣故亦治驚悸鬱結。

結

除痰之劑 十首附方五

二陳湯 局方 一切痰飲

痰飲切

用半夏陳益以茯苓甘草臣。半夏姜製二錢。陳皮去白。茯苓各一錢。甘草五分。加姜煎利氣調中兼去濕。一切痰飲此為珍。陳皮利氣甘草和中。苓夏導痰湯內加星枳頑痰膠固力能馴。加胆星以助半夏加枳實以成衝牆倒璧之功。若加竹茹與枳實湯名溫胆可寧神。二陳湯加名溫胆湯治。潤下丸丹溪僅陳皮草利氣祛痰妙絕倫。陳皮去白八兩。鹽五錢水浸洗甘草二兩蜜炙蒸餅糊丸姜湯下或將陳皮鹽水煮晒同。甘草為末名二賢散不可多服恐損元氣。

滌痰湯 嚴氏中風痰症

中風
痰證

用半夏星甘草橘紅參茯苓竹茹菖蒲兼枳實。痰迷舌強服之醒。治中風痰迷心竅舌強不能言。半夏姜製胆星各二錢半橘紅枳實茯苓各二錢人參菖蒲各一錢竹茹七分甘草五分加姜煎此即導痰湯。加入參扶正菖蒲開痰竹茹清金

青州白丸 風痰驚癲

驚風
瘧疾

星夏并白附川烏俱用生晒露糊丸姜薄引風痰癱瘓小兒驚風水浸生
白附子各二兩川烏去皮臍五錢四味俱生用為末袋盛水擺出粉再擂再
擺以盡為度磁盆盛貯日晒夜露春夏三秋七冬十日糯米糊丸姜湯下
癱瘓酒下驚風薄荷湯下痰之生也由於風寒濕星夏辛溫祛痰燥濕烏附辛熱散寒逐風浸而曝之殺其毒也

順氣行痰

清氣化痰丸

順氣行痰

星夏橘杏枳實桔梗實芩苓姜汁為糊丸氣順火消痰自失半夏姜製胆
紅枳實麸炒杏仁去皮尖桔梗仁去油黃芩酒炒茯苓各一兩姜製糊丸淡
姜湯下○氣能發火火能生痰陳杏降逆氣枳實破滯氣芩桔平熱氣星夏
燥濕氣茯苓行水氣水濕火熱皆生燥之本也故化痰必以清氣為先

順氣消食化痰丸瑞竹堂酒食生痰

青皮星夏菔子蘇攢麥山查葛杏附蒸餅為糊姜汁搏半夏姜製胆星各
皮蘇子沉香水炒萊菔子生姜麥芽炒神曲炒山查炒葛根杏仁去皮尖炒
香附醋炒各一兩姜汁和蒸餅為糊丸○痰由濕生星夏燥濕痰因氣升蘇
卜杏仁降氣痰因氣滯青陳香附導滯生于酒食曲葛解酒查麥消食濕去食消則痰不生氣順則喘滿自止矣

滾痰丸

王隱君頑痰怪病

頑痰
怪病

用青礞石大黃黃芩沉木香百病多因痰作祟頑痰怪症力能匡。青礞石一
一兩同入瓦罐鹽泥固濟煅至石色如金為度大黃酒蒸黃芩酒洗各八兩
沉香五錢為末水丸姜湯下量虛實服○礞石標悍能攻陳積伏匿之痰大

黃蕩熱實以開下行之路。黃芩涼心肺以平上僭之火。
沉香能升降諸氣以導諸藥為使。然非實體不可輕投。

金沸草散

治人咳嗽多痰

咳嗽
多痰

前胡半夏荆甘赤芍因煎加姜棗除痰嗽肺感風寒頭目顰。旋覆花前胡半夏五分荆芥錢半甘草錢三分赤芍芩六分。風熱上壅故生痰作嗽。荆芥發汗散風。前胡旋覆消痰降氣。半夏燥痰散逆。甘草發散緩中。細辛溫經。茯苓利濕用赤者八分而瀉丙丁也。局方金沸草散不用細辛。加入麻黃赤芍均治同。小腸為火。心為丁。兩火心為丙。

半夏天麻白朮湯 東垣痰厥頭痛

參耆橘柏及乾薑。芩瀉麥芽蒼术麴。太陰痰厥頭痛良。半夏麥芽各錢半。白參黃耆陳皮蒼术茯苓澤瀉天麻各五分。乾姜三分。黃柏酒洗二分。痰厥非半夏不能除。風虛非天麻不能定。二朮燥濕益氣。參耆瀉火補中。陳皮調氣升陽。芩瀉熱導水。曲麥化滯助脾。乾姜以瀉中寒。黃柏以瀉在泉少火也。

常山飲局方痰瘡

中知貝取烏梅草葉枳榔聚姜棗酒水煎露之。劫痰截瘡功堪詶。常山燒酒

母貝母草葉煨枳榔各一錢。烏梅二箇。一方加穿山甲。甘草。瘡未發時。面東溫服。○知母治陽明獨勝之熱。草葉治太陰獨勝之寒。二經和則陰陽不致交爭矣。常山吐痰行水。枳榔下氣破積。貝母清火散瘡。烏梅散陰。○陰退熱消。用在發散表邪及堤出陽分之後為宜。

截瘧七寶 欲易簡劫瘞截瘧

截瘧
瘧

常山菓。挾榔朴草青陳夥。水酒合煎露一宵。陽經實瘧服之安。
常山酒炒草葉煨挾榔厚朴青皮陳皮甘草等分水酒各半煎露之發日早晨面東溫服○常山吐瘧佐草入胃

常山以挾榔破積陳皮利氣青皮伐肝厚朴平胃草葉消膏梁之瘞加甘草入胃佐引吐也

收濇之劑 九首附方二

金鎖固精 丸夢遺滑精

精滑遺
夢遺

艾連鬚。龍骨蒺藜牡蠣。連粉為糊丸鹽酒下。濇精秘氣滑遺無。

艾實蒸蓮益鬚沙菟蓮

蒺藜炒各二兩龍骨酥炙牡蠣鹽水煮一日夜假粉各一兩

鹽湯或酒下○艾實固精補脾牡蠣濇精清熱蓮子交通心腎蒺藜補腎益

精龍骨蓮鬚皆固精收脫之品

茯苓丹 局方 遺精消渴

消渴
遺精

療精滑脫。菟苓五味石蓮末酒煮山藥為糊丸亦治強中及消渴。消中者下

長興盛不交精出也。菟絲子十兩酒浸五味子八兩白茯苓石蓮各三兩山藥六兩酒煮為糊丸漏精鹽湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴米飲藥利濕固脾。茯苓甘淡而滲濕補正中能泄腎邪也

治濁固本

丸濕熱精濁

精濁
濕熱

脫寒
肛瀉

便數
健忘
短也

虛寒
脫肛

蓮蓋鬚砂仁連柏二苓俱益智半夏同甘草清熱利濕固兼驅。固本之中兼黃連炒各二兩。砂仁黃柏益智仁半夏姜製茯苓各一兩。猪苓二兩。甘草炙三錢。○精濁多由濕熱與痰。連柏清熱。二苓利濕。半夏除痰。濕熱多由鬱滯。砂智利氣。並能固腎強脾。甘草補土和中。蓮鬚則濬以止脫也。

訶子散

東垣寒瀉脫肛

用治寒瀉。炮姜粟殼橘紅也。訶子煨七分。炮姜六分。御米殼去蒂蜜炙橘紅陳皮升陽調氣。河間訶子木香訶草連仍用木芍煎湯下。訶子一兩半生半熟。木香五錢。黃連三錢。甘草二錢為末。煎白术白芍湯調服。久瀉以此止之。不止加厚朴二錢。

二者藥異治畧同。亦主脫肛便血者。

桑螵蛸散

寇宗奭便數健忘

治便數。參苓龍骨同龜殼。菖蒲遠志及當歸。補腎寧心健忘覺。桑螵蛸鹽水一錢。茯神龍骨煅。龜板酥炙。菖蒲鹽炒。遠志當歸等分為末。臨臥服二錢。人參茯苓水。便急故以龜板滋之。當歸潤之。菖蒲茯苓遠志並能清心熱而通心腎。使心藏行。則小腸之府寧也。

真人養藏

湯羅謙甫虛寒脫肛久痢

訶粟殼肉桂當歸桂木香。木芍參甘為濬劑。脫肛久痢早煎。當訶子麵裹煨。粟殼去蒂蜜炙三兩六錢。肉荳蔻麪裹煨五錢。當歸白术炒。白芍酒炒。人參各六錢。木香二兩四錢。桂八錢。生甘草一兩八錢。每服四錢。藏寒甚加附子。

一方無當歸。一方有乾姜○脫肛由於虛寒參术甘草以補其虛官桂荳蔻以溫其寒。木香調氣當歸和血芍藥酸以收斂。河子栗殼瀉以止脫。

當歸六黃湯

自汗盜汗

治汗出。醒而汗出曰自汗。者柏苓連生熟地。參白术杜蠟煅麻黃根半夏五味各一兩。麥芽五錢。棗肉九米飲下○心血虛則卧而汗出。柏仁養心寧神。杜蠟麥芽涼心收脫。五味斂汗。半夏燥濕。麻黃根走表能引諸藥至衛分而固腠理。或云此藥太苦寒。胃弱氣虛在所忌。

柏子仁丸

陰虛盜汗

陰虛盜汗

陽虛自汗

陽虛自汗杜蠟散

陽虛自汗

黃耆浮麥麻黃根。杜蠟煅煨。黃耆麻黃根各一錢。浮小麥百粒煎。撲法芎藁牡蠣粉。撲汗法。白术藁本川芎各二錢半。或將龍骨牡蠣研末。合糯米粉兩半為末。袋盛。週身撲之。或將龍骨牡蠣研末。合糯米粉等分。亦可撲汗。等分。亦可撲汗。

殺蟲之劑

二首

烏梅丸 仲景 蟊厥

蟈厥

腸胃
諸蟲

冬名花金
藤忍一銀

一切
癰疽

用細辛桂人參附子椒姜繼黃連黃柏及當歸溫藏安蟈寒厥劑。烏梅三百
細辛桂枝附子炮人參黃柏各六兩黃連一斤乾姜十兩用椒去汙當歸各
四兩治傷寒厥陰症寒厥吐蟈○蟈得酸則伏故用烏梅得苦則安故用連
柏。蟈因寒而動故用附子桂枝散表風程郊清曰名曰安蟈實是安胃故仲景云併主下痢。
桂枝散表風程郊清曰名曰安蟈實是安胃故仲景云併主下痢。

化蟲丸腸胃諸蟲

鶴虱及使君枳榔蕪荑苦棟羣白礬胡粉糊丸服腸胃諸虫絕氣。鶴虱
根東引者胡粉炒各一兩使君子蕪荑各五錢枯礬一錢半麵糊丸亦可
末服。數藥皆殺虫之品單服尚可治之。景平為丸而蟈馬有不死者乎。

癰疽之劑六首防方二

真人活命飲一切癰疽

金銀花防芷歸陳草節加貝母天花兼乳沒穿山角刺酒煎。當歸酒洗陳
皮去白各錢半防風七分白芷甘草節貝母天花粉乳香各一錢沒藥五分
二味另研候藥熟下皂角刺五分穿山甲三大片剉蛤粉炒去粉用好酒煎
服。恣飲盡醉○忍冬甘草散熱解毒癰瘡瘍聖藥花粉貝母清痰降火防風白
芷燥濕排膿當歸和血陳皮行氣乳香托裏護心沒藥散瘀消腫山甲角刺
透經絡而潰堅加行藥勢也酒以行藥勢也未成者散潰後忌服用母差大黃便實
可加使鐵器酸物勿沾牙。

金銀花酒 瘰疽初起

初癰疽
初起

托裏散
托裏散

內寒瘍
內陷瘍

內托止痛
止痛

加甘草。奇瘍惡毒皆能保。金銀花五兩。生者更佳。甘草護膜須用蠟礬丸。
黃蠟二兩。白礬一兩。溶化為丸。酒服十丸。如至百丸。則有力。使毒不攻心。一方加雄黃。名雄礬丸。蛇蛟尤宜服之。二方均是瘍科寶。

托裏十補 散即局方十宜散補裏散表

參耆芍歸桂白芷及防風。甘桔厚朴酒調服。癰瘍脉弱賴之充。
人參黃耆當歸各二錢。川芎桂心白芷防風甘草桔梗厚朴各一錢。熱酒調服。○參耆補氣。當歸和血。甘草解毒。防風發表。厚朴散滿。桂枝桔梗排膿。表裏氣血交治。共成內托之功。

托裏溫中 湯孫彥和寒瘍內陷

姜附羌活木丁沉共四香。陳皮益智兼甘草。寒瘍內陷嘔瀉良。附子炮姜各三錢。木香錢半。羌活錢三錢。木香沉香益智仁。陳皮甘草各二錢。加姜五分。煎治瘍瘍變寒內陷心痞便瀉。嘔呃昏贖。○瘍寒內陷故用姜附溫中助陽。羌活通關節。炙草益脾元。益智丁沉以止呃。進食。羌活木陳皮以散滿除此。孫彥和治王伯祿臂瘍盛夏用此亦捨時從症之變法也。

托裏定痛湯 内托止痛

四物兼當歸地黃乳香沒藥桂心添。再加密炒瞿粟殼。潰瘍虛痛去如拈。瞿粟殼收滯能止諸痛。桂心四物活血托裏充肌乳香能引毒氣外出。不致內攻與沒藥並能消腫止痛。

湯東垣消堅散腫

散腫
消堅

散腫潰堅

湯東垣消堅散腫

知柏連花粉黃芩龍胆宣升柴翹葛兼甘桔歸芍棗昆布全黃芩八錢半知母黃柏酒炒花粉胆草酒炒桔梗昆布各五錢柴胡四錢升麻連翹甘草三錢。每服五六錢先浸後煎○連翹升葛鮮毒升陽甘桔花粉排膿利膈歸芍活血昆布散瘀棗迷破血行氣龍膽知柏芩連大瀉諸經之火也。

經產之劑十二首附方二十二○婦人諸病與男子同

惟行經妊娠則不可以倒治故立經產一門

海藏姪姪六合湯

姪姪傷寒

四物為君妙義長當歸地黃傷寒表虛地骨桂。表虛自汗發熱惡寒頭痛脉浮四物四兩加桂枝地骨皮各七錢。二藥解肌實表名表虛六合湯表實細辛兼麻黃。頭痛身熱無汗脉緊四物四兩加細辛麻黃各五錢二藥溫經發汗名表實六少陽柴胡黃芩入寒熱脇痛心煩喜嘔口苦脈弦為少陽症加柴胡解表黃芩清裏名柴胡六合湯陽明石膏合湯少陽柴胡六合湯。大熱煩渴脉大而長為陽明症加知母藏白虎湯清肺寫胃名石膏六合湯小便不利加芩瀉水名茯苓澤瀉利湯。不眠黃芩梔子良汗下後不得眠加芩梔子黃風濕防風與蒼朮養陰除煩名梔子六合湯兼風兼濕肢節利湯。

煩痛心熱脉浮加防風搜胎動血漏名膠艾。傷寒汗下後胎動漏血加阿膠艾葉益血安胎名膠艾四個。散滿消痞名朴實六合湯脉沉寒厥亦桂附。身治拘急散寒回陽者名附子肉桂。便秘畜血桃仁黃。大黃秘小便赤脉實數或膀胱潤亦有不得已而附加子六合湯。便祕畜血桃仁大黃。膀畜血亦有加桃仁大黃潤

燭通幽者名六合湯。

安胎養血先為主。餘因各症細參詳。後人法此治經水過多過

少別溫涼。溫六合湯加芩术。加黃芩白朮治經水過多黃色黑。後期連附商

加黃連清熱。香附行熱。六合湯加芩术。芩抑陽白朮補脾。脾能統血。

氣名連附。六合湯加芩术。芩抑陽白朮補脾。脾能統血。

過多黃色黑。後期連附商加炮姜附。

子治血虛寒氣。六合湯加陳朴。加陳皮厚朴治氣鬱經阻。

風六合湯加羌活。加秦艽羌活。姜附。

經產通用劑說與時師好審量。

膠艾湯 金匱胎動漏血

胎動

安胎

中四物先阿膠艾葉甘草全。阿膠川芎甘草各二兩。艾葉當歸各三兩。芍藥地黃各四兩。酒水煎。入阿膠烊化服。○四物養血。阿膠補陰。艾葉補陽。婦人良方單膠父。亦名膠父。艾湯。胎動血漏腹痛全。膠父四物加香附。香附用童便鹽水炒。方名婦寶丹。調經專。

當歸散 金匱養血安胎

益婦人妊娠木芍芎歸及子芩。安胎養血宜常服。產後胎前功效深。婦人懷妊臨盆易產。且無後疾。當歸川芎芍藥黃芩各一斤。白朮半斤為末。酒調服。○丹溪曰。黃芩白朮安胎之聖藥。蓋懷妊宜清熱涼血。血不妄行則胎安。黃芩養陰退陽。能除胃熱。白朮補脾亦除胃熱。脾胃健則能化血養胎。自無半產胎動血漏之患也。

黑神散 局方消瘀下胎

下胎
消瘀

中熟地黃歸芍甘草桂炮姜。蒲黃黑豆童便酒。消瘀下胎痛逆忘。瘀血攻衝
胎不下亦由血滯不行。諸藥各四兩。黑豆炒去皮半斤。酒童便合煎。熟地
歸芍潤以濡血。蒲黃黑豆滑以行血。黑姜官桂熱以動血。緩以甘草散。以童
便行。以酒力也。

產後
昏暈

清魂散 嚴氏產後昏暈

用澤蘭葉人參甘草川芎協荆芥理血兼祛風。產中昏暈神魂帖。澤蘭人參
三分川芎五分荆芥一錢酒調下。○川芎澤蘭和血人參甘
草補氣外感風邪荆芥能疏血中之風。肝藏魂故曰清魂。

子癇

羚羊角散 木事方子癇

杏薏仁防獨芎歸又茯神酸棗木香和甘草子癇風中可回春。羚羊角屑一
錢杏仁薏仁防風獨活川芎當歸茯神棗仁炒各五分。木香甘草各二分半。加姜煎治姪
娠中風涎潮僵仆口噤搐掣名子癇。○羚羊平肝火防獨散風邪。棗茯以寧
神芎歸以和血。杏仁木香以利氣。苡仁甘草以調脾。

當歸生姜羊肉湯

金匱等勞

等勞

當歸三兩生姜產後腹痛蓐勞。因產後發熱自汗身痛名蓐勞。腹亦有加入
五兩。羊肉一斤。當歸茯神棗仁炒各三兩。甘草一錢。水煎服。瘀血未去新血未生也。
參耆者氣能生血。羊肉辛熱用氣血之屬以補氣血當歸引入千金四物
甘桂姜 千金羊肉湯。芍歸芍地甘草乾姜肉桂加羊肉煎。

易產

達生
丹溪達小羊也取其易生易產

妊娠轉胞

血瘕

紫蘇大腹皮參术甘陳歸芍隨再加葱葉黃羊腦孕婦臨盆先服之。大腹皮
蘇人參土炒陳皮當歸酒洗各一錢甘草炭二錢青葱五葉黃楊腦七個煎
○歸芍以益其血參术以補其氣陳腹蘇葱以陳其壅不虛不滯產自無難
矣若將川芎易白朮名紫蘇飲子嚴子懸宜胎氣不和上衝心腹名子懸。

妊娠轉胞參术飲丹溪妊娠轉胞

轉胞者氣血不足或痰飲阻塞胎為胞通
壓在一邊故脣下急痛而小便或數或閑芎芍當歸熟地黃炙草陳皮留兼
半夏氣升胎舉自如常此即八珍湯除茯苓加陳皮半夏以除痰加姜煎

牡丹皮散婦人良方經多血瘕

延胡索歸尾桂心赤芍藥牛膝棗米酒水煎氣行瘀散血瘕削瘀血凝聚則
胡索歸尾桂心各三分赤芍牛膝棗米各六分三棱四分酒水各半煎桂
心丹皮赤芍牛膝以行其血三後我遂歸尾延胡兼行血中氣滯氣中血滯
則結者散矣

經多崩漏

固精丸婦人良方經多崩漏

用龜板君黃柏樗皮香附羣黃芩芍藥酒丸服漏下崩中色黑殷治經多不
者屬熱龜板炭四兩黃柏酒炒芍藥酒炒各二兩樗皮炒香附童便浸炒各
雨半黃芩酒炒二兩酒丸陰虛不能制胞絡之火故經多龜板芍藥滋陰

經產之病

湯頭歌訣

三十二

上海三馬路

血少
經閉

柏子仁丸

良方 血少經閉

壯水黃芩清上焦。黃柏清下焦。
香附辛以散鬱。樗皮濡以收脫。

生津
止渴

望梅丸

訥卷 生津止渴

固齒

骨灰固齒

牙散 固齒

遠行
健足

軟脚散

遠行 健足

中芎芷防細辛四味碾如霜。輕撒鞋中行遠道。足無篋疮汗皆香。防風白芷
芎細辛各二錢半為末。行遠路者撒少許。於鞋內步後輕便不生篋疮。足汗皆香。

熟地黃牛膝續斷澤蘭芳。卷柏加之通血脉。經枯血少腎肝匡。
柏子仁去油。牛膝酒浸卷柏各五錢。熟地一兩。續斷澤蘭各三兩。蜜丸米飲下。○經曰心氣不得下降。則月事不來。柏子仁安神養心。熟地續斷牛膝補肝益腎。澤蘭卷柏活血通經。
附使用雜方

用鹽梅肉蘇葉薄荷與柏霜。茶末麥冬糖共搗。旅行貴服勝瓊漿。
鹽梅肉四心薄荷葉去梗。柏霜細茶各一兩。紫蘇葉去梗五錢。為極細末。白霜糖四兩。共搗為丸。鷄豆大。旅行帶之。每含一丸。生津止渴。加麥一兩尤妙。
軟脚散

十神湯

局方時行感冒
此方是表第五頁神木散前移此

裏葛升麻陳草芎蘇白芷加麻黃赤芍兼香附

附時邪瘟感冒效堪諭。葛根升麻陳皮

甘草川芎紫蘇白芷麻黃赤芍香附等分加葱姜煎治風寒兩感頭痛發熱無汗惡寒咳嗽鼻塞○芎麻升葛蘇子香附卒香利氣發表散寒加芍藥者飲陰氣於發汗之中加甘草者和陽氣於疏利之隊也吳經曰此方用升麻乾葛能解陽明瘟疫時氣若太陽惡寒發熱用之則引邪入陽明傳變發班矣慎之

湯頭歌訣後

附小兒稀痘方

稀痘神功米以丹三種荳粉草細末竹筒裝臘月廁中浸洗淨風乾配入梅花良絲瓜藤絲煎湯服一年一次三年光。用赤小豆黑豆綠豆粉草皆各一兩細末溶蠟封固浸臘月廁中一月取出洗浸風乾每藥一兩配臘月梅花片三錢以雪中花片落地者不落人手以針刺取更妙如急用入紙套中畧烘即乾兒大者服一錢小者五分以霜後綠瓜藤上小藤絲煎湯空腹服忌葷腥十二日解出黑糞為驗每年服一次二次可稀三次永不出矣又方蜜調忍冬末顧驩不住服之效亦強金銀花為末糖調不住服之更有玄參兔絲子。婁江王蜜丸如彈空心嘗白酒調化日二次共為細末蜜丸彈子大白湯調下每日二次或加犀角生地黃。又方加生地麥冬四錢犀角二兩此皆驗過稀痘法為力簡易免倉皇。

經絡歌訣

休寧汪 昂訥菴輯著

男汪 端其兩較

上海秦之濟伯未重訂
寧海嚴 雲蒼山增輯

十二經脈歌

增潤古本
加註詳釋

手太陰肺 脉中焦 起下絡大腸 肺與大腸相表裏 胃口行胃之上腕 上膈屬肺從肺系
即喉管 橫從腋下膚肉紫 脾下對腋處名膚音榮 前于心與心包脉 主之前少陰心 下肘循臂骨上廉 膚盡處為肘以下為臂 遂入寸口上魚際 關前動脈為寸口大指後肉處 大指內側爪甲根少商 商止支絡還從腕後出處為腕接次指 交陽明經腸此經多氣而少血是動穴 臂骨盡處為魚口際其間穴名 接次指交陽明經大腸此經多氣而少血是動則為喘滿欬 脾主氣 脾主膨脹肺脹缺盆痛 肩下橫骨陷中名缺盆陽明胃經穴 兩手交督音茂為臂厥肺所生病欬上氣喘渴 金不煩心心脉行少陰心主之前 生水煩心上肺胸滿結胸中膚布膚臂之內前廉痛為厥或為掌中熱 掌心勞宮穴屬心包 肩背痛是氣盛有餘 脉絡交于小便數而欠便短 手上肩背小便數而欠便短或汗出 肺主皮毛氣虛亦痛 寒痛溺色變 及子虛 母病少氣不足以報息 肺 手陽明經大腸脉次指內側起商陽 本經循指上廉出合谷俗名虎口穴 兩骨 兩指岐骨 間兩筋中間行 手背外側兩筋 循臂入肘外行膚外 廉肩鶯音隅肩端兩骨前廉柱骨 傍上出膀胱經之天柱 膀胱經之天柱會此六陽經皆會于大椎故經文云上出于柱骨之會上入缺盆內 肩下橫絡 會于督脉之大椎會此六陽經皆會于大椎故經文云上出于柱骨之會上入缺盆內 肩下橫絡

肺下膈屬大腸。相為表裏支從缺盆上入頸。斜貫兩頰下齒當挾口人中。鼻下溝交左右上挾鼻孔盡迎香。本經穴交足陽明此經血盛氣亦盛。是動齒痛頭亦腫。是主津液病所生。大腸主津目黃內熱口乾無津。大腸主津孰音求鼻。喉動水鹹鼻血。喉痛在肩前膿大指次指痛不用。不隨人用皆經脈所過

足陽明胃脉。鼻頰起根下循鼻外入上齒環唇挾口交承浆。下唇中頤後大迎頰車裏。頤下為頤領下為頤耳下耳前髮際至額顱。支循喉嚨缺盆入下膈屬胃絡脾宮。相為表裏直者下乳挾脣中。支者起胃口循腹裏下行直合氣街。逢脚氣遂由髀關。抵俠下膝膕。扶膝兩筋為膕一曰膝蓋循脛下。外廉足跗。足面中指通支從中指入大指厲兑之穴經盡矣。太陰此經多氣復多血。振寒呻欠。呻吟面顏黑病至惡見火與人而熱甚。忌聞木聲。心惕惕。陽明土惡木也閉戶塞牖欲獨處甚則登高而棄衣而走貴。奔輪響腹脹。脉循腹裏水火相激而作聲為肝厥。足經狂瘧溫淫及汗出。陽明法多汗乾鯀口渴井唇。音輪唇傷脉頭腫喉瘻。循頭腹水腫上不脢乳。膚窓乳中乳根制水皆本經乳間穴。膝膕股伏兔。膝上六寸肉起處骨外足跗上皆痛。氣盛熱在身以前。陽明行身之前有餘消穀善溺黃甚不足。身以前皆寒。胃中寒而腹脹壅。太陰脾脉。起足大指循指內側白肉。

際過核骨後孤揚骨張景岳曰非

內踝前股旁

上肺

足音善足肚也一作蹠音短

經中二字通用

表裏

根也然

經中二字通用

本舌

根也散舌下

循脛膝股裏股內前廉入腹中屬脾絡胃

相為

上膈通

俠咽連舌

上本舌

根也散舌下

支者從胃上膈注心宮此經血少而氣壯是動即病舌本強聲

上

食則嘔出胃脘痛

心中善噫

噫即

而腹脹

得後與氣

大便快

然衰

病脾

身重

脾主

不能動

搖瘕

泄瘕積水

閉及黃疸

濕煩

心心痛

即胃

食難消

食不

強立股膝內多腫

脾主

四肢不

能卧因胃不和手少陰心

脉

起心經

下膈直絡

小腸承

表裏

支者挾咽繫目系

直者從心系上肺

腎下腋循膕後廉出

太陰肺

心主

心之後行

行二脉

下肘循

臂內後抵掌後銳骨之端

尖骨少冲穴

交手太陽

此經少血而多氣

是動咽乾

少陰火脉

火即咽

心痛應目

黃脇痛

出脇

渴欲飲臂膕內

廉痛掌熱蒸

脈俠咽心痛應目

黃脇痛

出脇

渴欲飲臂膕內

廉痛掌熱蒸

手太陽經小腸脉

小指之端起少澤

本經

循手側

上腕

臂骨盡

出踝中

掌側腕

為上臂骨

下出肘內側兩筋之間

膕外

後廉出肩解

脊傍為背

上

而繞肩胛

肩下成交肩之上入缺盆

肩下橫

直絡心

中循嗌咽

下膈抵胃屬小腸

小腸與

片骨脣上

中至本經

支者別頰復上頸

音拙

目下抵鼻至

于目內皆內絡顧交足太陽接嗌痛領腫

循頸

頭難回不可

以顧肩似拔兮膕似折

出肩 耳聾目黃腫頰間。入耳至是所生病為主液。小腸主液。頸領肩膚肘臂廉痛。此

經少氣而多血。

足太陽經膀胱脉。目內眞上額交顴支者從顴入耳上角直者從顴絡腦間還出下項循肩膀。肩後之筋各一寸五分去脊各一寸五分抵腰循脊旋奇傍行十二俞等穴為脊絡腎正屬膀胱府。相為表裏一支貫臀入膍傳。從腰脊下中行行上中下髎等穴入膍委中穴膝外曲處為膍一支從膊別貫胛膂肉挾脊去脊各三寸行附脾樞股為脾分魄戶膏肓等穴循髀外為脾合膍行與前入膍者合貫膍肚出踝脛傍循京骨。本經穴足外側赤白肉際小指外側至陰穴全。足少陰經交足少陰此經少氣而多血。頭痛脊痛腰如折目似脫兮項似拔膍如結兮膍如裂。痔脉入瘡太陰狂癲疾並生。有利太陽經經軀竅太陽經氣不能循經下。行上沖于膍而為軀竅。目黃而淚出頤項皆腰尻切。膍腨病若動時痛皆徹。以上病皆經脈所過

足腎經脉屬少陰斜從小指趨足心。湧泉穴出于然骨一作谷足內循內踝入跟足後上腨膍內廉尋上股內後廉直貫脊會于督脈長強穴屬腎下絡膀胱深相為直者從腎貫肝膈入肺挾舌本循喉嚨支者從肺絡心上注于胸膻中交手厥陰心經此經多氣而少血是動病飢不欲食腹內飢而咳唾有血。脉入肺故咳腎主唾腎損故見血。

喝喝喘。腎氣上奔。氣屬腎。心懸。脈絡心水。坐起輒陰虛不寧。善恐惕。如人將捕之。恐志咽腫。舌乾兼口熱。少陰火上氣。腎水溢而為腫。心痛或心煩。脉絡黃疸。腎水乘脾。痘。腸澼。腎移熱于脾胃。大腸或痢或便血。及瘻骨厥。則上厥脊股後廉之內痛。嗜卧少陰病。足下不足。但欲寐。

下熱痛功

手厥陰經心主標。心色下膈絡三焦。心包與三焦為表裏。起自胸中。支者出脇下液三寸循臑內。迢太陰肺少陰心中間走。入肘下臂兩筋起。橫紋陷中行掌心勞宮。從中指出。中沖穴。支從小指次指交。小指內之次指交三焦經。是經少氣原多血。是動則病手心熱。肘臂挛急。液下腫甚。則支滿在胸腑。是主脉所生病者。心主掌熱心煩心痛掣。皆經脉痛掣所過。

手少陽經三焦脉。起手小指次指間。關沖穴。循腕表手出臂外之兩骨天井貫肘循臑外上肩。交出足少陽胆之後。入缺盆布膻中。傳中間散絡心包而下膈。循屬三焦。表裏聯。三焦與心色為表裏。支從膻中缺盆出。上項出耳上角。巅以屈下頰而至頤。支從耳後入耳中。緣出走耳前。過胆經客交兩頰。至目鏡。皆角胆經連。足少陽是經。少血多氣。耳聾嗌腫及喉痺。少陽氣所生病。氣分三焦。心火汗出多蒸。

為頰脣痛及目锐眥。耳後肩膚肘臂外皆痛發及小次指。小指次

指不用

足少陽脈膽之經。起于兩目锐眥邊上抵頭角下耳後循頸行手少陽前至

肩卻出少陽後入缺盆中支者分耳後入耳中耳前走支別锐眥下大迎。

胃經穴在

領前一寸三分動脈陷中合手少陽抵于頸下加頰車下頸連復合缺盆下胸貫膈絡肝

屬胆表裏繁。相為表裏循腸裏向氣街出。

俠臍四寸動脈繞毛際入髀厭橫即髀樞直者

從缺盆下腋循胸季脇過章門。

筋骨下為季脇即肝經章門穴

陽明之關出膝外廉外輔骨即膝下兩傍高骨緣下抵絕骨出外踝。

外踝以上為絕骨少陽行身側故每言外循跗

足入小次指間。支者別跗入大指循指歧骨出其端。

足大指本節後為歧骨交肝經

而少血是動口苦。

胆汁上溢善太息木氣不舒

心脇痛疼轉側難足熱反熱面塵體無澤。

太鬱不頭痛領痛锐皆痛缺盆腫痛亦腫脇馬刀俠脰頸脰生。

少陽瘡瘍堅而不潰汗出

少陽振寒多瘧疾。

少陽居半表半裏故相火

皆經脉所過

足厥陰肝脈所終大指之端毛際叢起大循足跗上廉上內踝。

中封穴出太陰後

脾脉入膚中內循股陰入毛中繞陰器上抵小腹俠胃通屬肝絡膽相為

表裏上貫

脇布于脇肋循喉嚨之上入顙頰咽頤本篇後連目系出顎會督項巔逢脈會于巔百支者後從目系出行頰裏交環唇支者從肝別貫膈上主于肺乃交會穴宮交于是經血多而氣少腰痛俛仰難為工不可婦少腹腫男癆疝脉抵小腹肺宮宮也溢乾脉絡喉嚨脫色面塵蒙木胸滿嘔逆及飧泄木魁狐疝遺尿肝或閉癃肝

奇經八脈 訂廢補輯

任脉起于中極底脾下四寸穴名中極任脉起于其下二陰之交會陰之穴任由會陰而行腹背出會陰而行背會陰而行腹背出會陰而行背以上毛際循腹裏行中上于關元脾下三寸穴名至咽上行胸中至咽喉上循面入目是絡于承泣衝脉起氣街並少陰脉腎伏於上行胸中至而上以上並出素問骨空論考衝為五藏六府海為海五藏六府所稟氣上滲諸陽經灌諸精土出從下衝上取茲義故名亦有並腎下衝者注少陰絡氣街出陰股內廉入膍中膝後曲處伏行骭骨內踝際下滲三陰肝脾腎灌諸絡以溫肌肉至跗指循足面下湧泉入足大指督脉起小腹骨中央入繫連孔女人陰連溺孔之端即竅漏穴二陰之交名篡至後別繞臂與巨陽絡太絡少陰比與膀胱腎二脉相合上股內後貫脊屬腎行上同太陽起日內皆上額交巔絡腦間下項循肩膊仍俠脊抵腰絡腎此督脈並太循男莖陰莖下篡亦與女子

類又從少腹貫臍中。央貫心入喉頤及唇。唇環上繫目下中央際此為並任此督脈並

任脉而亦同衝。

脈大抵三脉同一本。

衝任督三脉皆起于會陰之

靈素言之每

錯綜五音五味爲衝脉任脉皆起于胸中上循背裏是又言衝任行背故

者謂之任亦謂之督今人大率以行身背者爲督行身前者爲任從中起者爲

衝然考任督二經所行穴道一在身前一在身後而衝脉居中則無穴道似當

以此說督病少腹上衝心痛不得前後二便衝疝攻此督脉爲病其在女子爲

不孕。衝爲血海任主胞胎溢乾咽喉遺溺及痔瘻。

絡陰器合纂間此督任病男疝七疝女

瘕帶婦人之疝即衝病裏急氣逆冲血

不足故息氣有餘故逆此段出素問骨空論督者督領諸經之脉也衝者其氣

上衝也任者女子

得之以任養也

蹠陰蹠乃少陰腎之別脉起于然骨之下照海穴

足內踝大骨至內踝

直上陰股入陰間上循胸入缺盆過出人迎前旁動脈入頸

內目皆睛明穴合于

太陽陽蹠和陽蹠脉始于膀胱經之中脉穴足此皆靈素說奇經。

任脉衝脉督脈陽蹠陰維陰維謂之奇經八脉

帶及二維未說破帶脉約束一身如帶陽維陰維脈

帶脉陽蹠陰維謂之奇經八脉

一身之脉內經俱未言其行度

醫方湯頭歌訣續編序

汪氏湯頭歌訣風行久矣初學醫者每手置一編熟誦而心記之予少秉庭訓亦復如是然竊怪病情萬變豈可執成方以為治縱熟讀亦奚用哉遂廢置不理迨臨症以來覺一病必有主方一方必有主藥古人造方多自經驗而得君臣佐使法度森嚴故每診一病若先有一方存乎胸中再參已見隨症增損心有持循雖不中病亦不遠矣不善用古方者一味盲從方無出入動輒誤人刻舟求劍膠柱鼓瑟此豈湯頭歌訣之過哉且湯頭歌訣不過將古方編類以便於誦讀已耳要賴明理之人隨症而化裁之設於熟讀之後不思上探靈素傷寒之金外臺輒目名為醫欺世漁利此固非湯頭歌訣之誤人也故湯頭歌訣由來已久至汪氏所編始稱善本惜其時溫病治法尚未闡明祇以治傷寒方法治之故歌訣溫病方除白虎承氣可通用外其餘實未詳備且要方習用者疎漏亦多如六味湯失笑散虎潛黑錫輩均未採入迨臨症時又不免苦憶緣不揣鄙陋選近時常用之古今要方九十四首附方共一百三十八則分門別類一仍汪氏惟增小兒一門其中方解較詳方歌平仄較調雖無關於大體弗敢簡也輯既成名之曰醫方湯頭歌訣續編以餉海內同志時

中華民國甲子重陽寧海嚴雲蒼山序於滬上客次

醫方湯頭歌訣續集目錄

補益之劑

獨參湯 龜鹿二仙膠

保元湯 還少丹

金匱腎氣丸

濟生腎氣丸
氏六味丸

錢八仙

長壽丸

知柏八味丸

杞菊地黃丸

參麥地黃丸

左歸

右歸飲

玉屏風散

七

當歸補血湯

風散

寶美歸丹

天王補心丹

虎潛丸

河車大造丸

斑龍丸

發表之劑

銀翹散

桑菊飲

防風解毒湯

竹葉柳蒡湯

華蓋散

三拗湯

攻裏之劑

芍藥湯

通導氣湯

香連丸

白頭翁湯

更衣丸

脾約丸

和解之劑

何人飲

追瘧飲
四獸飲

休瘧飲

木誠煎

奔豚湯

達原飲

理氣之劑

蘇合香丸

辰草薤白湯

丹參飲

百合湯
金鈴子散

理血之劑

黃土湯

赤豆當歸散

瘋狗咬毒湯

黑地黃丸

祛風之劑

資壽解語湯 小活絡丹大活絡丹

馬膏生桑桂酒方

祛寒之劑

參附湯耆附湯
本附湯

天台烏藥散 黑錫丹 半硫丸金液丹

漿水飲 來復丹

利濕之劑

五淋散

三仁湯

甘露消毒丹

鷄鳴散

中滿分消湯中滿分消丸

二妙丸

丸三妙丸

潤燥之劑

沙參麥冬飲

清燥救肺湯 瓊玉膏

增液承氣湯陶氏黃龍湯

黃連阿膠湯

駐車丸

通闕丸大補陰丸

瀉火之劑

紫雪丹 至寶丹 萬氏牛黃丸

玉女煎 清瘟敗毒散

化斑湯 神犀

丹

除痰之劑

三子養親湯芩飲 外臺

指迷茯苓丸

太乙玉樞丹

小陷胸湯

大陷胸丸

十棗湯

控涎丹
瘞大棗湯

千金草莖湯

芩桂木甘湯

金水六君煎

神水丸

收濁之劑

桃花湯

歲喜丸

濟生烏梅丸

封髓丹

殺蟲之劑

集效丸

稚情丸

經產之劑

交加散

天仙藤散

白术散

竹葉湯

紫苑良方

失笑散

獨聖散

如聖

湯

升陽舉經湯

生化湯

猪蹄湯

保胎無憂散

泰山磐石飲

安胎飲子

神造丸
金湯千

抵當丸

幼科之劑

小兒萬病回春丹

抱龍丸

琥珀抱龍丸
牛黃抱龍丸

肥兒丸

驗方肥兒丸

八珍糕

保赤

丹

癰瘍之劑

醒消丸

小金丹

梅花點舌丹

保安萬靈丹

外科蟾酥丸

一粒珠

六神丸

卷之三

一千頃堂發行

醫方湯頭歌訣續編

寧海嚴 雲蒼山編輯

補益之劑十二首附方九

元氣補

大補
精髓

氣虛補
溫補

獨參

湯傷寒大全
專補元氣
血暈及吐血脈
脫者均可救活

功擅得嘉名

參者參也功與天地並立為三故名參
血脫脈微可返生人亦可代

婦人血崩

專任力方宏

柯韵伯曰世之用參者或以些少始試之或加他味鹽制之其
者用此方救陰以挽陽即血脫益氣陽生陰長之理若陽氣暴脫四肢厥逆
宜用四逆湯輩若用此湯反連其危故古人多用於大汗下大失血之後義
矣

一味人參濃取汁

人參價昂即高麗參潞黨參亦可代病重者每服一兩或二兩濃煎取汁應知

龜鹿二仙膠

準繩方
大補精髓

最守真補人三寶氣精神

李士材曰人有三寶精神精氣神生生之本也

人參枸

杞和龜鹿益壽延年寶可珍

鹿角十斤龜板十斤枸杞二十兩人參十五兩

錢空心下○經云精不足者補之以味鹿得天地之陽氣最全善通督脈足

於精者故能多深而壽龜得天地之陰氣最厚善通任脈足於氣者故能伏

息而壽二物氣血之屬又得造化之微異類有情竹破竹補之法也人參清

食氣之壯大所以補氣中之怯枸杞滋不足之真陰所以養心神之液一陰

一陽無偏勝之憂入氣入血有和平之美由是精生而氣旺氣旺而神昌庶幾龜鹿之年故曰二仙也

保元

湯李東垣

補益總偏溫桂草參芪四味存男婦虛勞幼科痘

勞弱虛損元氣不足

痘家陽虛頂陷漿清皮薄發癰難灌難敵而神昌庶幾龜鹿之年故曰二仙也

持剛

三氣妙難言

黃耆三錢人參二錢甘草一錢肉桂春夏三分秋冬七八分水煎服○三

兄嚴禮望脩五校

溫腎
補脾

祖治
方腎

氣者腎氣，胃氣肺氣也。腎為先天真元之氣，胃為後天水穀之氣，肺為口鼻呼吸之氣。人參補肺氣，甘草祐胃氣，內桂黃耆溫運腎氣，人身三氣治而真元壯，故云保元也。李東垣重脾胃甚，喜用之，以其得和煦之氣，更以東魏桂巖用以治痘，扶元托榮，神功。

還少溫腎補脾

溫調脾胃寒菜淮苓地杜牛餐從容楮實茜巴拘遠志菖蒲

味棗丸

山茱萸淮山藥茯苓熟地杜仲牛膝菟絲子柏實小茴香巴戟天拘杞子大，每服三錢，淡鹽湯下。一日兩服。功用同八味丸，火未大虛者更覺於宜。專治脾胃俱虛，飲食無味，面少精神，腰膝無力。健忘，怔忡，少年陽萎等症。此固腎補脾溫藥也。苟真大虛者，斷非此方可以。

俾功且緩之品，反有減食增嘔致泄之虞也。

金匱腎氣湯

張長沙

治腎虛熟地淮藥及山萸丹皮苓澤加附桂引火歸原

熱下趨濟生丸

腎氣

加入車牛膝二便通調，腫脹除錢氏六味丸去附桂，專治

陰虛火有餘六味再加五味參八仙

長壽丸加五味子參冬

都氣丸翠加五味子，治相殊更有

知柏八味丸

柏菊丸

與杞菊地黃歸芍地黃參參丸各分逐熟地八兩，山萸四兩，補血三兩，補脾滲濕丹皮三兩，涼肝和血，澤瀉三兩，泄腎濕熱，肉桂一兩，以溫肝腫腹，瘀多等症。濟生加車前牛膝治脾胃陽虛不能行水，小便不利，腰重腳腫，先天陰虛，名六味丸加五味子，麥冬治虛損勞熱，斂肺止咳，名八仙長壽丸。

可浪投六味丸加知柏各二兩，名如柏八味丸，治陰虛，能滋補腎陰，納氣歸元，然皆能斂邪，須審症的確，不加參，六味丸金水不足，肺腎並虧，服之有効，更有單加肉桂名肉桂丸，治老人大目疾，津肝明目，加歸芍名歸芍地黃丸，治肝腎真陰不足，加參，六味丸加附子名附子七味丸，有於都氣丸中，加附子或肉桂者，有

肝補汗補命歸飲右歸丸。耳聾左慈丸於六味丸中加慈石柴胡治水虧大升耳鳴目眩有名黑地黃丸即蒼朮熟地五味干姜治脾胃不足腸紅久痔房室虛損諸方皆於八味丸中化出各臻其妙用者審之

右歸飲

張景岳方

溫補腎命附桂淮山藥枸杞子山萸肉杜仲熟

桂辛熱加麥冬龜板之甘潤為左歸飲

○二方脫胎於八味

丸者服去附子肉桂之辛熱加麥冬龜板之甘潤為左歸飲

○二方脫胎於八味

丸者服去附子肉桂之辛熱加麥冬龜板之甘潤為左歸飲

○二方脫胎於八味

當歸補血

湯李東垣

血虛身熱遺泄口燥盜汗者服

左歸飲

有奇功歸少耆多力最雄

○黃耆一兩當歸二錢

更有耆防同白朮

○黃耆一兩當歸二錢

黃耆防風白朮各等分

為末酒調服之

生陰長之理且黃耆輕清走表俾血虛發熱鬱於皮毛而不解者仍從微汗

○氣重於養血以無形能生有形即陽

以黃耆乃氣虛脾弱之人感邪自汗不禁發表者

○氣虛則熱而汗出者當歸補血之功

泄之而愈至玉屏風散之用黃耆乃氣虛脾弱之人感邪自汗不禁發表者

自除即經所謂邪之所湊其氣必虛安內然後可以攘外也

○氣虛則熱而汗出者當歸補血之功

○氣虛則熱而汗出者當歸補血之功

○氣虛則熱而汗出者當歸補血之功

○氣虛則熱而汗出者當歸補血之功

七寶美髯丹

補益肝腎

丹邵應節

別名止汗玉屏風

○散補血湯方

○以黃耆五倍當歸補

○當歸補血湯方

精血虛

○何首烏大者赤白各一斤去皮切片黑豆拌九蒸九晒

○白茯苓乳拌牛膝酒浸當歸酒洗杞子酒浸菟絲子酒浸蒸各半斤補骨脂黑芝

○菟絲子酒浸蒸各半斤補骨脂黑芝

寧心
益智

丹 志公

言

柏棗仁二冬生地與歸身三參桔梗砂味遠志茯苓

共養神或以菖蒲更五味勞心思慮過耗真

經鄧天王憫其勞錫以此方酸

棗仁當歸各一兩生地四兩柏子仁天麥門冬各一兩遠志五錢五味子一

兩茯苓人參丹參元參桔梗各五錢煉蜜丸每服一丸燈心棗湯送下○主

治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等症陳修園曰小篆心字篆文只是一倒火耳火不欲炎上故以生地黃補水使水上交於心以元參丹參二冬鴻火使大下交於腎又佐參茯以和心氣當歸

生心血二仁以安心神遠志以宣其滯五味以收其散更假桔梗之浮為向導心得所養有何健忘諸病之有哉易五味加

菖蒲者嫌五味酸收以菖蒲通心氣於腎也

腳癆

虎潛丸丹溪

脚癆是神方虎脰膝陳地鎖陽龜板薑歸知柏芍再加羊肉搗

九嘗

黃柏龜板各四兩知母熟地各二兩牛膝三兩五錢芍藥一兩五錢瑣

丸嘗

陽虎骨當歸各一兩陳皮七錢乾薑五錢共末煮羊肉搗為丸桐子大

每服

五六十丸淡鹽湯下○凡癆症責之肺腎陰虧因母子均病故經云五

臟因肺熱葉焦發為癆雙方用黃柏清陰中之火

燉骨間之濕且苦能堅腎為治癆要藥故以為君虎骨去風毒健筋骨為臣然高原之水不下母虛而

子亦虛肝藏之血不歸子病而母愈病知母清肺源歸芍養肝血使歸於腎

龜稟天地之陰獨厚茹而不吐使之坐鎮北方更以熟地牛膝瑣陽羊肉羣

隊補水之品使精血交補若陳皮者疎血行氣俾諸藥行而不滯各遂其功

其為筋骨壯盛力如虎也必矣道經云虎向水中生以斯為潛之義焉故命之曰虎潛丸又有加入參黃耆杜仲菟絲子茯苓破故紙山藥枸杞去羊肉

河車大造丸

吳球方

膝從蓉二地天冬杜柏從五味瑣陽歸杞子真元虛弱

此方宗熟地二兩生地一兩五錢天門冬七錢當歸七錢杞子一兩五錢牛

膝七錢五味子七錢淡從蓉七錢黃柏七錢鹽水炒瑣陽七錢杜仲

加味虎潛丸壯元氣滋腎水服法同

大真元補

咳風溫

初溫
起邪

補益
元陽

一兩其為末用河車一具法製為丸每服三錢開水下。此王晉三加減異球方也大謂天地造為造物言此方之妙奪天地造化之功故名紫河車乃父母精血結成包裹小兒以長養成人者用以為君佐以生熟地歸身牛膝杜仲從容枸杞之補精血天冬五味之補肺斂肺黃柏之清相火。增陽之溫腎命始不寒不熱補陰補陽諸法具備力量宏深少年虛勞損怯老人精血衰弱服之立見奇功誠補劑中之大方也。

班龍丸

補益

元陽

用鹿膠霜苓柏菟絲熟地苗等分為丸酒化服玉龍闢下補元陽。鹿角霜八兩鹿角膠八兩菟絲子八兩補骨脂四兩柏子仁八兩熟地八兩茯苓四兩將膠溶化量入無灰酒糊為丸每服六七十丸。○乾寧記云鹿與遊龍相戲必生異角故得稱龍鹿有文故稱班用其角為方故名班龍鹿為純陽之獸角生巔頂血肉有情之品霜能升陽膠能補血佐以菟絲子助腎之陽熟地黃補腎之陰柏仁養心而悅脾茯苓淡參而不寒較勝八味丸之草木無靈者多矣方出醫統。

發表之劑

五首附方一

銀翹散

吳鞠通方
溫邪初起

主上焦醫竹葉荆牛薄荷頭甘桔蘆根涼解法

風溫初感

此方宜

連翹二兩

銀花一兩桔梗六錢薄荷六錢竹葉四錢甘草五錢荆芥四錢淡豆豉五錢牛蒡子六錢共杵為散每服六錢鮮蘆根湯煎一

即服。款加杏貝渴花粉熱甚梔芩次第施。咳者加杏仁貝母以利肺化痰渴加花粉以清胃養津變通之妙在醫者之隨症化裁耳○此方為溫邪初起之準繩用荆政薄荷走表冀邪從汗泄且豆為腎穀能發越少陰陳伏之邪再以竹葉連翹上浮以清心肺銀花甘草以解毒蘆根

以清胃透熱牛蒡桔梗開肺利氣微表清裡邪熱自除矣。

桑菊飲

吳鞠通方
溫寒嗽

中桔梗翹杏仁甘草薄荷飴蘆根為引輕清劑熱盛陽明

加石膏

桑菊二錢五分菊花一錢杏仁二錢連翹一錢五分桔梗二錢甘草八分蘆根二錢陽明熱盛口渴者加石膏知母○此辛甘化風辛涼

風
痧
疹

小兒
痧

華
散
風
寒
喘

微苦之方也。桑葉菊花。洩風宣肺熱。甘桔杏仁。解毒利咽喉。泄肺降氣。連翹清心。薄荷疎風。蘆根清胃。經云上焦如羽。非輕不舉。此方恰得其旨。夫溫熱治法。自古未備。皆用治傷寒法。以治溫病。劫波傷津。誤人多矣。幸自清李。喻嘉言出。始論及之。葉天士暢發之。吳鞠通氏著溫病條辨。以彰明之。法始大備。厥功非淺。然以三焦立論。未免臆說。深背六經經旨。但其治法。究無異議也。

防風解毒

湯繆仲濤

荆蕡荷

大力石膏竹葉和甘桔連翹知木枳

風溫痧疹

肺經多

防風荆芥薄荷走表疏風甘草桔梗牛蒡解毒開肺

竹葉連翹清上焦之浮火。石膏知母清胃熱以養陰。木通枳壳導心火由小腸尿道而泄。無論大人小兒。初起總是風溫時氣。引動肺胃伏毒而發。服之皆

効。○按此方防風究係辛溫。恐寒甚者。宜之。否則不如易蟬衣淡豆豉發表為佳。可再加銀花以解毒。杏仁以利肺。蘆根以透熱。余每如此出入。殊稱得手。且石膏亦不宜早用。熱盛者宜之。夫痧症變端百出。而尤以小兒正痧為更速。其大要總以顧津液為急務。顧死方可矣。

竹葉柳蒡

湯繆仲濤

乾葛知蟬衣荆芥薄荷

司石膏粳米參白朮

初起風痧

○此可施。竹葉。西河柳。葛根。牛蒡子。知母。蟬衣。荆芥。薄荷。石膏。粳米。玄參。甘草。

腮赤。噁心乾嘔。耳尻發冷。形寒發熱。頰似傷寒。急宜避風寒。戒葷腥。用藥以表之。使皮膚通暢。腠理開豁。而疹癰易出也。方用石膏知母元參麥冬。清脾胃。瀉火之中。即寓救陰之義。竹葉蟬衣荆芥。西河柳。薄荷。泄肺之風熱。能透發痧疹。葛根清陽明肌表。甘草粳米調和胃氣。乃從竹葉石膏湯變化而來。

○按初起熱不甚者。不宜用石膏。恐過涼毒滯不透也。口不渴。而舌有苔者。不宜用麥冬。知母。防其滋膩而邪遏肺胃也。

華蓋散

中和致寒

芩淡滲利濕

再加甘草

麻黃杏橘紅桑皮芩草紫蘇供

麻黃紫蘇泄肺以驅風寒。杏仁橘紅理肺化痰。桑皮瀉肺止哮。

茯苓淡滲利濕

黃桑皮之峻

三拗湯

風寒表裏用麻甘杏表散風寒力最雄。麻黃

仁杏仁

湯表芍藥治風寒實物
當起下導赤痢湯治赤痢氣初甚
久痢白翁治頭白已治連

甘草即麻黃湯去桂枝之入營較麻黃湯症輕者冬日宜之用麻黃攘外甘草安中杏仁利肺故名三拗攻裏之劑三首附方三

芍藥湯 漆古

芩連與錦紋桂甘檳木及歸身

芍藥三錢黃芩黃連當歸各八分肉桂三分甘草檳榔木

香各五分水煎服。病不減加大黃○此方立法以行血則便膿自愈調氣則後重自除用歸芍以調血。香榔以理氣芩連芩濕而清熱甘草調中而和藥法或加大黃是通滯法同余又以此湯濕重者加厚朴陳皮藿香煨姜熱甚者加銀屑以利氣治法同。余又以此湯濕重者加厚朴陳皮藿香煨姜熱甚者加銀屑花炭炒赤芍挾食者加焦楂炭腹痛者加青皮寒熱者加炒荆防再加枳實導滯丸三錢或四錢以推蕩積滯便得暢行。病下及痛重自除余百試百驗故並誌之願同志勿以余炫奇而忽之。

香連丸

直指赤白痢治痢習為常初起宜通勿遽嘗黃連二十兩以茱萸十兩水浸

一宿同炒去茱萸再用木香四

兩八錢共研末醋糊丸每服二三錢空心米湯下○治久痢之偏熱者初起宜通不可遽服以黃連之苦以除濕且藉其苦以堅大便之滑况又得木香之行氣止痛溫脾和胃以為佐再用茱萸炒以溫之醋丸以飲別有白頭翁

仲景

可恃

秦皮連柏苦寒方

白頭翁黃柏黃連秦皮各三兩

煎服○治厥

熱痢

白頭翁黃柏黃連秦皮各三兩

煎服○治厥

熱

門重滯而難出故後重膾血口渴君以白頭翁寒而苦辛投以秦皮寒

而苦澑寒能勝熱苦能燥濕辛以散火之鬱澑以收下重之利也佐黃連清

上焦之火則渴可止使黃柏澑下焦之

腸魄門重滯而難出故後重膾血口渴君以白頭翁寒而苦辛投以秦皮寒

而苦澑寒能勝熱苦能燥濕辛以散火之鬱澑以收下重之利也佐黃連清

更衣丸

枯便秘

利便治津乾蘆薈砂滴酒丸

研細滴酒和丸每服二錢好酒

送下○津液枯燥不能濡潤大腸水大不交大便秘結名更衣者以古人入

廁必更衣也用硃砂色赤為大體重象金味甘歸土性寒類水能輸坎以填

腎則病自除然一派苦寒非實火莫用

湯津枯便衣

更衣丸

枯便秘

利便治津乾蘆薈砂滴酒丸

研細滴酒和丸每服二錢好酒

送下○津液枯燥不能濡潤大腸水大不交大便秘結名更衣者以古人入

廁必更衣也用硃砂色赤為大體重象金味甘歸土性寒類水能輸坎以填

脾約丸治熟熱便難

虛瘡

離生水以濟火。是腎家之心藥也。配以蘆薈黑色通腎。苦味入心。游潤之質可轉濡腎燥。大寒之性能下開胃闢。此陰中之陰。洵為腎家主劑。合以為丸。水火既濟而脾約。丸治燥便得暢行矣。脾約丸治燥別行麻杏芍。大黃枳樸蜜和團。白芍火麻仁杏仁五錢。蒸大黃十兩。煉蜜丸。如桐子大。湯送二十九。以利為度。○陳脩園曰。物之多脂者可以潤燥。故以麻仁為君。杏仁為臣。破結者必以苦。故以大黃之苦寒。芍藥之苦平為佐。行氣者必順氣。故以枳實順氣而除痞。

和解之劑

三首附方四

何人飲

張景岳

治久虛瘡參首歸陳蠶棗約。

何首烏人參當歸陳皮煨蠶紅棗水煎八分。於發前二三時溫服。

氣血俱虛。久瘡不止可服。

追瘡飲。青陳柴半歸首烏甘草正未弱。

青皮陳皮柴胡半夏

當歸首烏甘草。○凡血氣未衰。因屢散而瘡不止者。用此截之。甚驗。

若名休瘡飲。脾元虛參木歸烏甘草酌。

人參

君補中兼收須量度。

草葉烏梅人參茯苓白朮陳皮製夏姜棗。治久瘡脾虛老虛弱。而瘡不止。俱宜用此為化暴善後之第一方也。

四獸飲。梟梅入六

生姜以溫胃。烏梅以斂氣。此方補

更截實瘡木賊煎。青朴夏榔蒼朮着。

木賊草青

中兼收。非體虛久瘡。切勿輕試。

皮厚朴半夏擣榔蒼朮。凡瘡疾形實氣強。多濕多瘡者。宜此截之大効。

○按

景岳治實瘡者。每以木賊治虛瘡者。不離首烏當歸。蓋木賊疎肝透邪。歸烏

游肝養血。肝與胆相為表。其意豈離乎少陽哉。

奔豚湯

仲景

腹

治腎中邪氣上衝胸腹痛。佳芩芍甘草半生蠶乾葛

腎氣病

李根加

甘草芍藥川芎黃芩當歸各二兩半夏生蠶各四兩生葛根五兩甘李根白皮一升

○奔豚者。如江豚以臂憤起而上攻故名。治驚恐而

初癰
起疫

臟腑中惡客忤小兒

胸癰三方頻症

得心動氣敗氣結熱聚故其聚散靡常發則為熱退則為寒陰陽相搏則腹痛君以芍藥甘草真安中氣臣以半夏生姜開其結氣當歸川芎入血以和心氣黃芩生葛李根白皮性大寒以折其衝逆之氣雜以生葛者寓桔梗降之必先辨之之理再按奔豚氣有三犯肺之奔豚屬心大犯心之奔豚屬腎寒膀胱下悸欲作奔豚屬水邪証自分透治亦各異

達原飲

吳又可

厚朴與常山

草葉檳榔共滌痰更用黃芩知母入菖蒲青草

不容刪

黃芩青皮各一錢五分甘草厚朴草果菖蒲各一錢知母檳榔常山各二錢清水煎發前熱服溫覆取微汗○治時疫邪氣初犯膜原及

疫癰壯熱多汗而渴者膜原即上焦膈膜通於少陽肌腠故亦能往來寒熱用常山草葉檳榔厚朴化痰達邪快氣截瘧黃芩知母和陰清熱菖蒲青皮開疫下氣甘草以調和諸藥然按此方偏於香燥化濁必濕盛熱微脘悶苔白者方合若初起有表仍以清涼解之總之瘟疫治法與溫熱相埒也

理氣之劑

三首附方二

蘇合香丸

局方 藏府中惡小兒客忤

麝息香木丁薰陸氣同芳犀水白术沉香附衣用

硃砂

中惡嘔嘔

蘇合香安息香各二兩犀角水片香附木香薰陸香白术沉香

井水生姜湯溫酒皆可化下每服一丸蘇合香與安息香相須並能內通臟府透竅開閉龍腦與麝香相須能芳香辟穀走竅經絡犀角入心沉香留脾以轉輸各藏又以硃砂色赤性寒入心以反佐竅心安神斯諸香徹上徹下十二經絡三百六十五竅無所不通則氣氣厥疾閉戶喉中惡一切不正之邪無所不祛矣

承襲薤白

湯仲景 胸膈

治胸膈益以白酒溫肺氣

枯萎一枚薤白半斤白酒七升加夏加樸枳桂

枝

加枳實厚朴桂枝名枳實薤白桂枝湯

治胸膈病

變不同治法

皆三方
心胃作痛
治方

黃土湯治便血後便散當血歸豆
便血便血便便

稍異瓜萎薤白湯治肺脾喘息咳嗽胸背痛短氣君以薤白滑利通陽臣以桔梗實潤下通陰佐以白酒熟穀之氣上行藥性助其通經活絡而俾自開若轉結中焦而為心痛徹背者但加半夏一味和胃而通陰陽名桔梗薤白半夏湯若結於胸膈更加逆氣上搶於心非但氣急陽微而陰氣并上逆矣須以枳實厚朴先破其陰氣去白酒之醇加桂枝

之辛助薤白

枳實薤白桂枝湯

丹參飲

心胃諸痛

裡用檀砂

丹參一兩檀香砂仁各一錢水一杯半煎七分

心胃諸疾效驗賒百合

湯

熱藥不效者

中烏藥佐

百合一兩烏藥

錢水二杯煎七分

專除鬱氣不須誇聖惠更有金

鈴子散

火痛或止身熱足冷

酒下延胡均可嘉

金鈴子延胡索各等分研末以清酒調服三錢陳修園口

金鈴子引心包相火下行從小腸膀胱而出元胡索和一身上下諸痛○夫古人治痛醫用通法或調氣和血或調血和氣結者散之寒者溫之以上三方皆治心胃諸

痛服熱藥而不効者雖寥寥數味配合法或調氣和血或調血和氣結者散之寒者溫之以上三方皆治心胃諸痛服熱藥而不効者雖寥寥數味配合法或調氣和血或調血和氣結者散之寒者溫之以上三方皆治心胃諸

理血之劑

三首附方一

黃土湯

全瘧便後血

將遠血醫膠芩地木附甘隨

甘草黃芩熟附子乾地黃阿膠白朮各三兩生心黃土半斤煎

服更知赤豆當歸散

金瘧亦小豆三升浸令芽爆乾當歸十

近血服之效亦

分共杵散漿水服日三次治便前血

奇先便後血謂血在胃去肛門遠故名遠血古之所謂陰結即今之所謂便

血也先血後便謂血在腸去肛門近故名近血即古之所謂陽辭為痔令

之所謂藏毒腸風下血也一用黃土湯以治陰結之血從清也

從溫也一用赤小豆當歸散以治藏毒之血從清也

黑地黃丸

久痔便血

用地黃還同蒼术味乾薑

蒼术熟地各八兩五味子四兩干姜春秋五錢秋夏三錢多時

便血脾虛陷燥濕陰兩擅長

是方妙在蒼术干姜與地黃同用使姜术不

燥地黃不滋地宜重用佐以五味益腎助地

狗瀉癲

中脾緩舌不語
強

口眼
至斜

黃以欬血干姜少用佐蒼朮以溫血使脾氣旺而中土升健腎陰滋而固攝有權清升渴降血自歸經便血久痔自愈矣喻嘉言甚贊此方之妙治去血過多脾胃陰陽兩虛而黃神倦者若濕熱盛而風秘燥秘尚兼溫燥滯氣也。

癲狗咬毒

湯

象山

無妙方毒傳迅速有難當

毒重者即鼈毒輕者或十餘日念餘日月餘日不等狂叫煩燥

而桃仁地鱉大黃共蜜酒濃煎連滓嘗生上錦紋三錢桃仁七粒去皮尖打死研細末加白蜜三錢陳酒一碗煎至七分連滓服之如不能飲酒者用水對和小人減半孕婦不忍空心服此藥後別設糞桶一只以驗大小便大便必有惡物如魚腸豬肝色者小便如蘇木汁者如此數次後藥力盡大小便如常不拘劑數要大小便無惡物為度不可中止恐留餘毒為患以至復發如服藥後而大小便無惡物者非癲狗咬也愈後並不禁忌○此方即仲景下瘀血湯也癲狗咬者從無良方一經毒發狂躁而鼈厥狀至慘枉死多矣寧波象山縣有牛為癲狗所咬發狂而死破其腹有血塊如斗如升大者數枚而動時有一儒知醫恩得其旨悟仲景有言其人如狂者血證歸也可知牛之被癲狗咬而狂者亦瘀血為患也故用仲景此方試之百發百中誠仙方歟且斷不可服斑毛等藥以毒助毒自誤生命再徇咬後禁聞鑼鼓聲

祛風之劑

三首附方一

資壽解語湯

中風脾緩舌強不語

用羌專需竹瀝佐生薑防風桂附羚羊角酸棗麻甘

十味詳

羌活五分防風附子羚羊棗仁天麻各一錢肉桂八分甘草炙五分水二杯煎八分入竹瀝五錢生姜汁二錢調服喻嘉言治腎氣不禁

舌本加狗杞首烏天冬菊花石菖蒲元參○舌通於脾肺氣本虛外風中之脾脈緩縱舌強不語用姜防以祛外風羚羊天麻以熄內風附子肉桂以溫經竹瀝生姜以化痰再用棗仁以寧心甘草以和中立方面面周到

馬膏生桑桂酒方

內經眼歪斜

馬項油脂白酒裏再以桑灰桂枝和歪斜口眼

中風
不仁

三方
分三種
自汗

中風良

馬項繫上脂生，枝炒灰桂枝，白酒即酒之初釀白色者。春三月陽氣清明，風之中人不能深入，乃中於陽明之絡中，於左頰則筋縱。

口歪於右，中於右頰則筋縱，口歪左無邪者，筋急有邪者，筋緩皮膚頑痺，法用生桑灰填急頰邊之坎陷中，務使高下厚薄相平，然後以馬膏放灰上熨之，令桑性入絡，馬膏舒筋潤痺，緩頰邊以桑鈎鉤之外，用桂枝研末，白酒調敷之，和其榮衛，通其血絡，日飲美酒，啖美炙肉，不飲酒者，勉强飲之，助胃之氣上升於絡也，再以輕手三拊之。○按此病春夏之交時有患者，予用此方治驗三人，故錄之。馬膏不易得，可用羊膏或猪膏代之。

小活絡丹

聖濟中
風不仁

芎二烏地龍乳沒胆星俱中風手足皆麻木，痰濕流連一

服區

川烏草烏胆星各六兩，鮮地龍洗焙乾，乳香沒藥各

服馬三兩三錢研末為丸，重六分，蠟護每服一粒，好酒下。

大活絡丹多益

惡風大症

此方需

於小活絡中加藥四十四味，為大活絡服法同。小活絡治中風手足不仁，日久不愈，經絡中有痰濕死血，腿臂間忽有一二點痛者，宜之。然藥係卒熱走竄，血虛者禁服。

風癱瘓瘡瘍疾厥陰疽流注等症，徐洄溪曰：補瘻惡風，熟毒瘀血，入於經絡，非此方不能透達。凡治肢體大症，必備之藥也。

祛寒之劑

六首附方三

參附湯

腎陽虛汗

療汗自流

人參一兩，熟附片五錢水煎服。

腎陽脫汗 此方求衛陽不固，須耆附

湯黃芪

一兩

鬱遏脾陽

木附湯

白朮一兩，熟附五錢○喻嘉言曰：腎中之鬱而自汗，則用木附衛外之陽不固，而自汗，則用參附湯，脾中之陽遇

捨三方為治，三方之用大矣。然著附可以治虛風，木附可以治寒濕，參附所以壯元神，三者亦交相為用。若用所當用，功效若神，誠足為貴也。

天台烏藥

散李東垣

木茴香川棟檳榔巴豆薑，再用青皮為細末一錢，酒下。

寒疝

院痛

痛癰嘗

天台烏藥木香茴香青皮良姜各五錢。橘橘二枚苦桔子十枚。同研細末。每服一二錢。溫酒送下。○方義。

鎮納
陽浮
虛冷

黑錫丹

局方
腎虛陽浮
鎮納

能鎮腎寒硫黃入錫結成團

胡蘆故紙茴沉木桂附金鈴

肉蔻丸

黑錫硫黃各三兩。同炒結成圓。研至無聲為度。再用胡蘆巴沉香附

酒煮

搗糊為丸。如梧子大。以布袋擦令光瑩。每服四十丸。姜湯下。○治脾元

久冷上實下虛

胸中痰飲或上攻頭目及奔豚上氣。兩脇脹脹。并陰陽氣不升降

五種水氣上攻

或卒暴中風。痰潮上隔等症。○此方以火熱之硫黃和

黑錫所結成之砂子為君

諸純陽香燥之藥為臣。以金鈴子苦寒一味為反

佐沉香引入至陰之分為使

凡陰火逆衝。真陽暴脫。氣

喘痰鳴之急症

用以鎮固其陽。則坎離可交於項刻。

半硫丸

黑錫硫黃各半兩。茴香破故紙肉蔻金鈴子去核。木香各一兩。研末

虛冷便祕

半夏與硫黃

虛冷下元便祕嘗

倭硫黃與生半夏各等分研細末。生薑汁為丸。服一錢。

金液丹中硫

一味

真傳硫黃十兩置瓦罐中。用赤石脂研細。蒸餅丸。梧子大。每服二十粒。密慢大煉七日夜取出研極細。蒸餅丸。梧子大。每服二十粒。

丸空心

來飲下

沉寒厥逆亦興陽

半夏辛以散之。硫黃溫以運之。○金液丹治虛寒。

吐利陽虛損怯

氣冷厥逆

脈微自汗小便不禁等症

霍亂

立轉陽

半夏高良薑皆用

醋炒各二錢半。薑炭肉桂炒甘草熟附子各五錢研為細末。每服三五錢。漿水二盞煎至一盞。去滓冷服。重者三四服

效取漿水法

掘陰地作坎深約三尺。見黃土以新汲水沃入。攪混澄清取用

醫通作秫米和麵釀

成為漿水。不如地漿為佳。○夏日貪涼飲冷致上吐下瀉

瀉陽氣暴脫陰氣拒隔反喜涼畏熱脈伏肢冷為外陽內陰與大順散冷香

飲子同意故用桂附二薑半夏辛熱以破陰凝甘草以扶中地漿水甘寒清

中用地漿乾薑附桂與良薑再加甘草同薑夏吐瀉身涼

張潔古

霍亂陽虛

立轉陽半夏高良薑

皆用醋炒各二錢半

薑炭肉桂炒甘草熟附子各五錢

研為細末。每服三五錢

漿水二盞煎至一盞

去滓冷服。重者三四服

暑以反佐。消認清

上盛下虛
外熱裡寒

來復丹

局方

上盛下
虛裏寒外熱

用玄精石、硝石、硫黃、橘紅、耆青皮、靈脂復元陽。

上盛

太陰玄精石、舶上硫黃各一兩，橘紅、青皮、五靈脂澄去砂炒令外熱，及暑月吐瀉陽氣欲脫，脈伏肢厥，煩燥欲坐卧水中者，故用玄精石乃鹽滷至陰之精，硫黃乃純陽石大之精，寒熱相配，陰陽互濟，硝石助硫黃，橘紅、青皮者納氣必先利氣以為肝膽之向導，而一陽自來復矣。

利濕之劑

六首附方二

五淋

五淋

用草梔仁歸芍茯苓亦其珍

赤芩三錢，赤芍山梔各二錢，當歸甘草各一錢四分，加灯芯草煎服。

五淋散

局方

用草梔仁歸芍茯苓亦其珍

赤芩三錢，赤芍山梔各二錢，當歸甘草各一錢四分，加灯芯草煎服。

氣化原由陰以育，調行水道妙通神。
勞氣血五淋皆宜此湯加減，淋症多由下焦陰虛，膀胱氣化不清，熱大內迫，宣化失司，或由瘀精濕熱內阻之故，故用山梔仁以瀉三焦浮火，歸芍以滋肝腎之陰，甘草瀉大和中，茯苓淡滲濕熱，石淋以此湯煎送髮灰滑石石首魚頭內石研末膏淋，合草薢分清飲，氣淋加荆芥香附，麥芽不愈再加升麻，或用吐法，勞淋合補中益氣湯，血淋加

牛膝鬚金桃仁。

入麝香少許。

溫湯

吳鞠通

溫湯

三仁

湯

溫湯

吳鞠通

杏蔻薏苡仁朴夏白通滑竹倫。水用甘瀉揚百遍，溫湯初起。

法堪遵。杏仁五錢，飛滑石六錢，白通草白蔻仁竹葉厚朴各二錢，米仁六錢，路氣分醞釀成溫，尚未化熱，脈無定體，証始惡寒，後但熱不寒，汗出胸痞，苔白或黃渴不引飲，方用蔻仁朴夏白通滑竹倫，以辛開中焦之溫，米仁滑通以淡滲。

濕溫時疫

脚氣

則勢孤矣。總之濕溫治法，濕重者偏於燥，濕熱重者偏於清熱，表重骨楚者，加以風藥以風能勝濕也。皆宜此方加減，至其入裡化熱與治溫病無異。故治濕溫知乎此，無餘縕矣。

甘露消毒丹

溫時疫

蔻藿香因陳滑石木通苔芩翹貝母射干薄暑疫濕溫為

末嘗滑石飛十五兩

綿茵陳十一兩淡黃芩十兩石菖蒲六兩川貝木通各

五兩藿香射干連翹薄荷白芷葛根各四兩各藥生晒研末每開水調服三錢日二次或以神龜糊丸如彈子大開水化服亦可○長夏之時暑熱下逼地濕上蒸人在氣交口鼻吸受乃成濕溫疫癥之病而為發熱倦怠胸悶腹脹肢痠咽腫斑疹身黃頤腫口渴溺赤便秘吐瀉瘡痢淋濁瘡瘍等症但看病人舌白或厚膩或乾黃者是邪尚在氣分悉以此丹治之並主水土不服一名普濟解疫丹

鷄鳴散

準繩

是絕奇方蘇葉茱萸桔梗薑瓜橘檳榔前冷服腫浮腳氣效彰

彰大碗慢火煎至一碗半傾出再入水兩碗煎至一小碗兩汁相和安置床頭次日五更分三次冷服之冬月稍溫亦可服藥至天明當下黑糞水即是肾家所感寒濕之毒氣也至早飯須遲吃使藥力作效此方並無禁忌不應再服○陳修園曰寒濕之氣著於下焦而不去故用生薑吳茱萸以祛寒橘紅檳榔以除濕然祛寒除濕之藥頗多皆以氣勝加以紫蘇為血中之氣藥辛香撲鼻更助其氣氣盛則行速取著者行之之義也又佐以木瓜之酸桔梗之苦經云酸苦涌洩為陰俾寒濕之氣得大氣之藥從微汗而解之解之而不能盡者更從大便以洩之戰則必勝之意也其服於鷄鳴時奈何一取其空腹則藥力專行一取其陽盛則陽藥得氣也其必冷服奈何以濕為陰邪以陰從陰濕為一家先誘之而後攻之也

分消湯治

中滿分消湯

李東垣

樸烏歸荳麻夏草升胡香薑草參耆澤連柏

利濕之劑

上海三馬路

中滿

芩青益智需

川烏乾姜生姜畢澄茄黃連人參當歸澤瀉青皮麻黃柴胡各升麻各三分食前熱服或以有表症加麻黃血虛夜熱加當歸黃耆陽氣下降便尿赤瀉加升麻柴胡脾胃虛寒飲食不消去黃柏加澄茄益智青皮否則諸味

不用丸治熱張

芩青益智需二分吳茱萸草莖厚朴黃耆黃柏各五分益智木香半夏茯苓升麻各三分食前熱服或以有表症加麻黃血虛夜熱加當歸黃耆陽氣下降便尿赤瀉加升麻柴胡脾胃虛寒飲食不消去黃柏加澄茄益智青皮否則諸味不用丸治熱張

分消丸治熱

芩青益智需二分吳茱萸草莖厚朴黃耆黃柏各五分益智木香半夏茯苓升麻各三分食前熱服或以有表症加麻黃血虛夜熱加當歸黃耆陽氣下降便尿赤瀉加升麻柴胡脾胃虛寒飲食不消去黃柏加澄茄益智青皮否則諸味不用丸治熱張

丸治熱張

芩青益智需二分吳茱萸草莖厚朴黃耆黃柏各五分益智木香半夏茯苓升麻各三分食前熱服或以有表症加麻黃血虛夜熱加當歸黃耆陽氣下降便尿赤瀉加升麻柴胡脾胃虛寒飲食不消去黃柏加澄茄益智青皮否則諸味不用丸治熱張

潤燥之劑

六首附方三

傷肺

沙參麥冬飲

吳鞠通

甘桑玉豆天花共合方

沙參三錢玉竹二錢生甘草一錢冬桑葉生扁豆天

花粉各一錢半麥冬三錢久咳者加地骨皮三錢

秋燥耗傷肺胃液苔光乾咳嗽此堪嘗

便是火故

滋火燥

阿膠湯治陰傷少熱駐車

乾咳

能耗傷肺胃之陰。而現口乾喉燥舌絳。肺氣鬱則乾咳。或有痰而調黃膽痛。法用麥冬玉竹清養肺胃之陰以滋燥甘草以瀉火和平扁豆甘平醒脾和胃兼清殘暑。花粉專清胃熱以生津解渴。桑葉以清金止咳再用沙參一
味甘苦微寒。味淡質輕清肺火養肺陰妙不可言。若用人參甘溫大補元氣外感鼻塞苔膩寒熱者止服用者審之。

清燥救肺

滋燥清火

參草杷石膏膠杏麥芝麻經霜收下乾桑葉解鬱滋

乾效可誇。桑葉三錢石膏二錢半阿膠八分人參七分麥冬一錢二分黑芝
麻一錢甘草一錢枇杷葉一片去毛炙瘦多加貝母血枯加生地

○喻氏宗繆仲淳甘涼滋潤之法以治諸氣憤鬱諸痿喘嘔之症名曰清燥
實以阿膠芝麻以滋水用上通水生之源而金始不孤名曰救肺實以石膏
甘麥清大養胃培生金之土而金始有根西方虛則東方實矣故以二叶肺
肺兩治以主之又以人參甘溫補氣氣有餘便是火故杏仁佐之苦以降氣
氣降火亦降而治節有權氣行則不鬱諸痿喘嘔

自除矣此方較前方為重可酌燥邪淺深用之

瓊玉膏

乾咳

中生地黃參苓白蜜煉膏

膏生地黃四斤茯苓十二兩人參六兩白蜜二斤先將鮮生地搗

汁去渣入蜜煉稠再將參苓為末和入磁罐封水煮半日白湯化服。肺枯乾咳虛勞症全求相滋效倍。章有相
生之妙故用生地以補腎即是滋肺白蜜甘涼性潤潤能去燥人參補肺氣
然防其壅氣故反佐茯苓淡以滲之且又能使生地白蜜補而不滯是以知
此方之妙古人用方無呆補法如腎氣丸之用三補三瀉也此方朱丹溪加入沉香琥珀五錢自云奇妙。

黃連阿膠湯仲景方

鷄子黃芩藥黃芩合自良

黃連四兩黃芩芍藥各一兩
阿膠三兩鷄子黃二枚先煎
冲鷄子黃攪令相得服之更有駐車

金方歸茯用連膠薑炭痢陰傷黃連六
阿膠各三兩乾姜二兩共為末醋煮阿膠烊入藥末為丸如梧子大每服三
十九米飲下日三次○凡屬陰虛發熱下痢日久腹脹及休息痢宜之

久病
傷陰

通關丸治瘧症
大陰水火炎熱補丸

增液湯治熱秘
黃湯治熱便祕
正虛裡實

若創症初起係暑濕熱實邪所發宜與導滯此方切莫沾唇○黃連阿膠湯治血少火旺之劑熱症久延燶及真陰故心煩難寐方中以黃芩直折心火佐芍藥收斂神明鷄子黃東離宮火色入通於心可以補心中之血用生者攏和取潤下之義也驢皮東北方之水色入通於腎可補坎宮之精濟水內合於心而性急趨下俾交合心腎滋陰和陽水升火降陰平陽秘精神乃治

滋腎通關丸

桂柏口黃柏酒炒一兩知母酒炒一兩上肉桂一錢為末蜜丸桐子大每服三錢

溺瘡不渴下丹溪方前地龜豬髓合之宜

焦醫治下焦濕熱小便點滴不通以致腹痛作喘

大補陰丸除肉桂

方除肉桂丹溪方前地龜豬髓合之宜

黃柏四兩知母四兩熟地六兩敗龜板六兩猪脊髓酒蒸打爛為丸治腎水虧損虛火上炎咳嗽出血肺痿骨蒸盜汗呃逆耳鳴耳聾每服三錢淡鹽湯下○通關丸按難經闕格論云關則不得小便口不渴而小便不通乃下焦寒腎與膀胱陰虛受熱閉塞其流故以黃柏苦燥既能清熱又能堅陰知母甘寒用以滋陰又以清熱少佐肉桂寒因熱用俾助腎命之火蒸動膀胱之水溫以行之也○大補陰丸陳修園曰知柏寒能勝熱苦能降火苦者必燥故用猪脊髓以潤之熟地以滋之此治陰虛發熱之恆法也然除熱只用涼藥尤非探源之治方中以龜板為主是介以潛陽法丹溪此方較六味地黃丸為佳

佳

增液湯吳鞠通溫

中參地冬

元參一兩麥冬連鮮鳥或入潤腸通首烏一錢細生地各八錢

兩黃龍湯陶氏裡

實正虛用大承氣甘桔參歸妙不同

大黃三錢芒硝二錢厚朴一錢半枳實甘草各一錢當歸一錢半

三錢人參錢半生姜五片紅棗一枚清水煎將成加桔梗一撮○攻下而用三承氣大法也人人知之設溫耗陰陰液不能濡潤大腸以致秘結則非三承氣之苦寒瀉實者所宜矣故吳氏用增水行舟之法以參地麥冬皆甘潤養液也設病久虛極熱甚裏實拒按以致循衣撮空此時下之則防脫補之則愈實進退兩難坐以待斃陶氏特想此攻補兼施之法用大承氣原方加參歸甘棗以鼓舞胃氣濡養血液加桔梗開天氣於地道再反佐生姜辛方

以動之得逐黃龍興雲致雨
之功而竇悠然從大腸下矣。

瀉火之劑

七首

煩熱
發狂

譴詰
神昏

萬氏牛黃丸治神昏迷安宮牛黃丸

紫雪丹

局方 煩
熱發狂

犀羚砂朴硝

硝磁寒水滑和膏丁沉木麝升麻草更用赤

金法亦超

犀角羚羊珠砂朴硝硝石磁石寒水石滑石膏丁杏沉香木香

內外煩熱不解

狂易叫走發斑發黃口瘡脚氣瘡毒蟲毒藥及小兒驚癇

徐酒溪曰

邪大毒火穿經入臟無藥可治此能消解其效如神按此方以芳

香開竊竅心安神

瀉火散結燒風解毒養液理

氣配合得宜面面周到所以神奇誠大方也

硃砂麝息香

雄黃犀角與牛黃金銀二箔兼龍腦琥珀

還同玳瑁良

生烏犀角生琦瑁琥珀鏡面硃砂雄黃各一兩西牛黃五錢麝

如梧子大蠟護臨服剖用

人參湯化下二丸至四丸產後童便入姜汁化服

○王晉三曰

此治心藏神昏從表透裏之方也黃犀琦珀以有靈之物內通

心竊殊雄二箔以重墜之品安鎮心神佐以腦麝安息搜剔幽

隱諸竊東垣

云水雄牛麝入骨髓透肌膚

桔子言金箔雄黃合餌為地仙若與丹砂同

用為聖金餌之可以飛昇故熟入心包絡舌絳神昏者以此

丹砂入寒涼湯藥中用之能祛陰起陽立瘥神明有非他藥可及

萬氏牛黃丸

邪入心包神識昏迷退熱清心力更宏

最精芩連梔子麝砂

并萬氏牛黃清心丸用真犀黃

山梔六錢川麝金四錢辰砂三錢

法製為丸乾重三分半蠟護每服輕者一丸重者二三丸小兒半丸

角真珠水牛麝香

退熱清心力更宏

此方力較萬方為勝然普通多用萬氏

名安宮牛黃丸

包絡邪在裡矣草木之香僅能達表不能透裡必藉牛黃幽香物性乃能內

透包絡與神明相合然尤在佐使之品

配合咸宜以芩連山梔瀉心火麝金

較萬氏勝為養胃液清胃

時行瘟疫

溫邪發斑

譜語

玉女煎

張景岳液清胃

中地膝兼石膏知母麥冬全

生石膏五錢熟地三錢麥冬二錢知母牛膝各一錢。王孟英曰陳修園力闡此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷

半陰虛胃火牙疼效去膝地生溫熱痊

火熾盛之齒痛頗有捷

效若治溫熱病地黃宜生牛膝宜

火熾盛之齒痛頗有捷

清瘡敗毒飲

余師愚時行瘡疫

地連芩丹石梔甘竹葉尋犀角玄翹知芍桔

瘡邪濕毒

亦滋陰

生石膏小劑八錢至一兩二錢小生地烏犀角小劑各二錢至四錢。

川連梔子桔梗黃芩知母赤芍玄參連翹甘草丹皮鮮竹葉小劑各

化斑湯

吳鞠通

用石膏元梗米甘知犀母存

石膏一兩知母四錢甘草三錢元參三錢犀角二錢。

白梗米

或

入銀丹大青地

或加鮮生地銀花丹皮大青葉更妙。

血分則發斑

石膏知甘梗米白虎湯也。

清血分之熱玄參以滋腎藏之液或又加丹皮以助犀角

熟黃葛蒸肌表大青銀花以瀉心胃熱毒為治斑要方。至治參則條辨另以銀翹散去豆豉加生地丹皮大青葉倍元參主之。

神犀丹

譜語發斑

內用犀金汁參蒲芩地羣散粉銀翹藍紫草溫邪暑疫

溫熱經緯

通心氣辰砂鎮心神合之牛黃相使之妙是丸調入犀角羚羊金汁甘草人中黃連翹薄荷等湯劑中以治溫邪內陷包絡神昏者屢建奇功。

冬二錢知母牛膝各一錢。此方之謬然用治陰虛胃火熾盛之齒痛頗有捷

三養湯治火嗽。外茯苓液為痰。停脾飲。伏苓液為痰。停脾飲。伏苓液為痰。停脾飲。伏苓液為痰。停脾飲。伏苓液為痰。

有奇動。烏牛角尖石菖蒲黃芩各六兩懷生地銀花各一斤金汁連翹各十
重三錢涼開水化服日服二丸小兒減半○溫熱暑疫諸病邪不即解耗液
傷營。遂傳內陷瘧厥昏狂謳語發斑等症。但看病人舌色乾光或紫絳或圓
硬或黑苔皆以此丹治之。兼治痘瘡毒重夾帶紫斑危症方中以清營解毒而養液透斑。

除痰之劑

八首附方七

三子養親

韓愈

痰火方。芥蘇萊菔共煎湯。

紫蘇子菜菔子白芥子各等分研

便是火氣盛上湧故喘疾老人氣實痰盛喘滿懶食者宜之。芥子除痰
疾蘇子行氣菔子消食然皆墜氣豁痰之藥氣行則火降而痰消。

外臺別

有茯苓飲參术陳薑枳實嘗。

茯苓人參白术各三兩枳實二兩橘皮二兩半生薑四兩○胸中有停痰自吐宿水不能食者

係脾虛不能運化精微津液泛而為痰故用參术以健脾陳皮以燥濕

茯苓以利濕枳實下氣消痰生薑溫中化痰因脾虛者每多奏效耳。

指迷茯苓丸

停痰

最精風化芒硝枳半升。

風化硝二錢五分製半夏二兩。茯苓一兩枳殼五錢其為末生薑汁

糊丸梧子大每服薑湯下三十丸。臂痛難移脾氣阻停痰伏飲有令名。

陽之別陽盛陰虛則水氣凝而為痰陰盛陽虛則水氣溢而為飲此方殆兼兩者而合治之半夏燥濕茯苓滲濕風硝軟堅枳殼利氣別於二陳之甘緩遠於礞石之峻悍乃

攻中之

平創歟

紫金錠

法痰

磣

用麝硃雄慈戟十金五倍同。

麝香硃砂雄黃大戟干金太乙玉

樞名又別

別名太乙

祛痰逐穢及驚風。

妙治諸病霍亂疫癘瘍氣喉風五絕

驚忤顛狂及諸中毒。諸瘡疽蛇犬蟲傷內服外敷功難禪迷沟神丹也。每服

輕者一粒重者一錢涼開水調下外敷陳酒或醋磨孕婦忌之又不可與甘

三結胸
三方輕重
選用

草藥同進也

小陷胸湯

仲景治連夏裏。

黃連一兩半夏寬胸開結滌痰固。

治表未解而醫反下之邪熱結

於胸心下按之痛脈浮滑較大陷胸症為重故以黃連滌熱半夏導飲括薑潤燥。

柔誤下之胃虛而陽氣內陷邪熱水氣相結以至心上至少腹鞕痛不可近。

用硝黃甘遂軟堅瀉積利水之藥一瀉而腹自柔軟矣。

大陷胸丸加杏蘆大陷胸湯中項強柔症病能休。

其結

十棗湯

仲景攻中遂戰花。

甘遂大戟芫花各等分。大棗十枚煎去鬚陳莖以遂戰之瀉肺利水為佐。慮其峻以甘緩之十枚大棗制之能使心及膀胱之飲從二便而出為丸則性更緩每服一錢。

控涎丹三方即妙用遂戰斧。甘遂大戟白芥子等分為末糊丸臨卧薑湯下七八丸治應丸。引釣痛走易不定故用大戟泄臟腑水濕甘遂行經隧水濕芥子散皮裏膜外痰氣草薑大棗湯支飲亦可嘉。

葦莖隧下

故以大棗緩之○痰飲留伏胸膈非用此三方逐之不可奈令人視為畏遂相戒不用其實除真癟虛寒外是痰飲而何一不可服耶。

金方

生苡仁灰瓣桃仁四味隣。葦莖二斤米仁灰瓣各半斤桃仁五十粒

吐咳肺

千金葦莖湯

金方

肺瘡涼營清氣自生津。

肺瘡由氣血混一營衛不分濕熱邪結於肺而

解氣分之熱結桃仁泄血分之熱結朱仁利濕清結熱之源灰瓣排痰開結

熱之路再服當吐如膿者藥力行而瘡潰也○葦莖即蘆根灰瓣或用冬灰

瘡瘍濕濁涼營清氣自生津。

肺癰

皮或
絲瓜絡

芩桂湯治痰飲。氣痛定痰飲。水主六金。君腎成水。水神術。許傅飲治停飲。少陰虛利。寒屬者。

陽虛帶濁

芩桂木甘湯

仲景方。湯飲和劑。

痰飲嘗和之溫藥四般良。

桂枝溫肺。白朮健脾。茯苓滲飲。炙草和中。斯合飲為陰邪。

溫藥和之意。為治療飲平妥之方。雪羹定痛。定痛化痰熱。海蜇茅薺共合方。

兩煎服。○羹食物之味調和也。雪喻其淡而無奇。有清涼內沁之妙。茅薺味甘海蜇味鹹。性皆寒而滑利能除痰熱。消積滯并肝經熱厥。少腹攻衝作痛。諸藥不效者。用以泄熱止痛。捷如影響。○茅薺即地栗。海蜇又名牀魚。消積血用頭化痰熱。卽用皮。

金水六君

前張景岳。腎水成痰。

用二陳再加熟地與歸身。

茯苓半夏各二兩。甘草一兩。陳皮一兩。五錢熟地三兩。全

當歸二兩。共研末。棗湯送下。每服三錢。別稱神术丸。○許傳飲。蒼朮大棗芝蔴停飲珍。

蒼朮一斤。芝蔴五錢。清水二杯。研細取漿。大棗十五枚。煮熟去核。先將蒼朮焙研末。後以芝蔴漿及棗肉。和勻杵丸。如梧子大。每服五十丸。忌食桃李雀鵠。○金水六君。煎治肺腎虛寒。水泛為痰。然真屬虛寒者。非姜附細辛不可。切莫用熟地歸身。以助陰靈。為患者審之。○神术丸。治停飲成癖。久則嘔吐酸水。吐已停飲復作。方義頗簡。當用蒼朮燥溫為君。大棗健脾為臣。脂麻滑痰為佐。

收瀉之劑

四首

桃花湯

張長沙。

用石脂宜梗米乾薑共用之。

赤石脂一斤。干姜一兩。梗米一升。虛甚者加人參。

少陰利。

亦可加入明其並無熱滯。與白

頭翁萬根芩連等湯殊也。

少陰利。

亦可加入明其並無熱滯。與白

咸喜丸

陽虛帶濁。

治血海寒。夢遺帶濁服之安。茯苓煮。晒和黃蠟。每日空心嚼一

便血

遺精

丸。白茯苓去皮四兩切塊用猪苓二錢五分入於磁器內者二十餘沸去滑嘴滿口生津徐徐嚥服以小便清利為效忌米醋尤忌氣怒動情○治元陽虛僨精滑白濁遺尿及婦人血海久冷白淫白帶等症○王晉三曰抱朴子云茯苓千萬歲其上生小木狀似蓮花名威芝今以名方者須擇雲茯苓之年深質結者製以猪苓導之下出前陰蠟淡歸陽不能入陰須用黃蠟性味緩濶有續絕補體之功專調斷喪之陽分理潰亂之精故治元陽虛僨而為遺濁帶下者若治肺虛痰火久咳茯苓不必結而猪苓亦不必用矣

濟生烏梅丸治便血**與殼蠶共末為丸好醋參****殼蠶一兩炒烏梅肉一兩半共為**

丸。空心便血淋漓頗難治醋吞惟有此方堪者此方始合故用殼蠶稟金水之精其體堅白其味辛鹹金能平木水能涵木且殼蠶因風而殼用以驅腸間之風烏梅酸澀能斂肺氣且稟木氣最全以其花於冬而實於夏也故能入肝止血用醋吞者以厚烏梅之力并以散瘀此方腸風最宜便血久者亦可服

封髓丹夢遺失精**治遺泄干砂仁黃柏草和丸****砂仁一兩黃柏三錢炙甘草七錢淡鹽湯送下二三錢****大封**

大固春常在巧奪先天服自安趙羽皇曰經云腎者主水受五臟六腑之精蓋腎為樞藏多虛少實因肝木為子偏喜疏洩母氣厥陰之火一動精即隨之外溢况肝又藏魂神魄不攝宜其夜卧思交而精洩矣方用黃柏為君以之味性苦寒苦能堅腎腎職得堅則陰水不虧其之溢寒能清肅秋令一至則龍大不至於奮揚水大交攝精有不安其位者予佐以甘草以甘能緩急善能入腎腎之所惡在燥而潤之者惟辛砂仁通三焦達津液能納五臟六腑之精而歸於腎腎家之氣納腎中之髓自藏矣

殺蟲之劑**一首附方一**

集效丸下蟲雄病劑
溫殺蟲穩

子腫

子氣

調血和

集效丸三因

薑附與橘薑蕪葛鶴木杏當

大黃製兩半。鶴虱炒橘柳訶子
皮蕪葛妙木香乾薑炮熟附子

各七錢五分蜜丸食前雄賓丸內白藥
烏梅湯下婦人醋湯下雄賓丸內白藥
分食遠服。○集效丸乃溫下殺蟲之方。
較化蟲丸為峻。非蟲積挾寒者勿服。
○雄賓丸用雄黃之辛毒。橘柳之苦降。

白藥之酸涩皆殺蟲也。
之品較集效丸為穩。

經產之劑

十二首附方四

交加散

婦人大全
調和氣血

用薑地搗二汁交拌各自炒

鮮生地八錢搗汁。生薑四錢
打汁。先以地黃汁炒生薑澤

生薑汁炒地黃澤各焙乾
研末每服三錢。溫酒調下。薑不辛散地不寒。產後伏熱此為寶。

治婦人陰虛或虛寒虛熱。前產後各病皆可服之。此方製法甚妙。俾薑地混為一家。
無抵觸之弊。開後學製方無限法門。又症治準繩。以當歸荆芥同用。亦名交
加散。治產後不省人事。癥瘕。頭暈。口吐痰涎亦妙。

天仙藤散

陳景初
子氣

治子氣。香附陳甘烏藥繼再入木瓜蘇葉薑足浮喘悶此

方貴。天仙藤即青木香藤微炒。香附烏藥陳皮炙甘草各等分。加紫蘇三葉。

黃水。病名子氣。非水也。○天仙藤苦溫疎氣活血。鮮血中之風氣。香附烏藥
陳皮辛溫以行鬱氣。紫蘇生薑之溫辛。以疏表氣。甘草之甘緩以和正氣。加
木瓜以除濕熱利筋骨。調榮衛也。

白术散

全生
子腫

中用四皮。薑陳苓腹五般奇。白术一錢。陳皮茯苓皮薑皮

腹皮各五分為末。未飲下。或丸。或丸瀉傷脾土。虛不能治水所致。五六個月

子煩

崩止漏
失笑散治腹痛
散治血瘀
獨散兒枕
治聖痛

子嗽

竹葉湯子

能治子煩人參知麥茯苓存更加竹瀝黃芩入胆怯悶煩自斷根。

麥冬錢半黃芩一錢茯苓二錢人參五分淡竹葉十片有痰加竹瀝○受胎四五個月相火用事或盛夏君火大行俱能乘肺以致煩躁胎動不安故用竹葉清心止煩黃芩清熱安胎麥冬滋肺養液茯苓淡滲寧心人參扶正補虛然亦有停痰積飲滯於胸膈以致煩躁者則非此方所宜

紫苑湯

良方

子嗽方治子嗽天甘冬桔杏桑貝更加蜂蜜竹茹煎孕婦咳嗽送此

為最

紫苑天冬各一錢桔梗五分炙甘草桑皮杏仁各三分竹茹二分入蜜煎服○子嗽由於火邪乘金當以清火潤肺為務桔梗桑皮之涼川瀉

之天冬竹茹之寒以清之紫苑矣草之溫杏仁白蜜之澤

以潤之也然咳嗽所因甚多非此種病不宜服此種方

失笑

散局方

蒲黃及五靈

蒲黃五靈脂等分生研每服三錢酒或醋煎服量平痛止積無停

治產後惡露不

行

瘀血上衝包絡下阻

中悶而作痛難忍

山楂二兩便糖入

兩童便砂糖調服名獨聖散功同

更守經

治兒枕痛○失笑散

吳於宣曰五靈脂甘溫走肝生用則破血佐酒煎以行其力庶可直扶厥陰之滯而有

推陳致新之功

甘不傷脾辛能散寒則疼痛急寒發熱昏暎胸膈滿悶等症悉除直可一笑置之矣○獨聖散獨用山楂一味不惟消食健脾功能破瘀

止兒枕痛更益以砂糖之甘溫中而兼逐惡

血童便之鹹入胞而不涼下相得而功益偉

如聖湯

散崩止烏梅棲炭薑三般皆煅漏崩艮

棲櫻烏梅各一兩乾薑兩半並燒黑為末烏梅湯下升陽

舉經勞傷崩漏

崩漏方靈梔芍加入補中益氣湯嘗補中益氣湯加白芍以和營黑

名升陽舉經勞傷脾弱氣虛以致崩漏身熱自汗短氣倦怠憊食故以補

中益氣以升舉之也○如聖散以泄能止血故用棲櫻酸能收斂故用烏梅

多有之○此方即治水腫五皮飲以桑皮易白术用以扶脾土而退防之水不致泛溢也

溫能守中，故用乾薑黑

能止血，故並煅用也。

湯生化
通湯猪癥
後可蹄

安胎
保生產

安胎
保產

生化湯

傳青主方

酒童便各半煎服。此方能通滯和榮，補虛消癆。治產後兒枕骨痛及惡露不行，血塊腹痛等症。倘因乳少，猪蹄湯用通草同煎亦妙方。猪蹄一隻，木通一兩，煮食。猪蹄鹹能潤下，通草淡能通竅，故通乳皆通乳之藥。通草用白通草亦可。○生化湯江浙世風為產後必服之劑。其實有素體血虛之人，產後而血更虛，血虛生內熱，豈可再服炮薑以燥之。桃仁以破之乎？設惡露已行，亦宜去桃仁。

保產無憂

胎保產催生安

奇莫浪譏。製川朴醋炒新艾各七分，酒炒當歸炒川芎各一錢半。生黃芪、荆芥各五分，炒枳殼六分。酒白芍二錢。冬月一錢，生薑三片，水煎服。○此方懷孕七個月，即宜預服。七個月服一劑，八個月服二劑，九個月服三劑，十個月亦服三劑，均空心溫服。臨產自無危險。倘未服或致胎動不安，勢欲小產，及臨盆難產，橫生倒產，見死腹中，命在須臾者，急煎與服。立見轉危為安。產後禁服。誠神方也。人或譏其藥輕，錯雜。製方實寓深意，非可輕議也。

泰山磐石

胎保產安

八珍全去茯苓加耆苓，斷聯再益砂仁及糯米。婦人胎動可安產。人參一錢，黃芩、當歸、川斷、黃芩各一錢，熟地、川芎各一錢。酒炒白芍八分，土炒白术二錢，炒甘草、砂仁各五分，糯米一撮。有熟者倍黃芩減砂仁。胃弱者加砂仁減黃芩。○婦人有孕後，每隔三、五日進一服，至四五月後，方保無慮。凡氣血兩虛，或肥而不實，或瘦而血熱，或肝脾素虧，倦怠少食，致墮胎者，服之均效。方義以八珍本屬雙補氣血之品，去茯苓以其淡滲性涼，胎所忌也。加芪苓砂糯續斷，則更周密矣。惟胎孕諸方，除古方外，分兩均輕。

蓄血
胎壅氣

所以然者恐分兩重。則陰胎壅氣以致胎肥難產也。

抵當丸仲景

共為末。煉蜜共分四丸。每煎服一丸。不下再服。蓄血胞宮少腹痛。破堅非此莫相當。屬真氣運行而不入。非草木桃仁承氣輩所能治。故必以靈動嗜血之蟲為之向導。飛者走陰絡。潛者走陽絡。引領桃仁攻血。大黃下熱。破無情之血結。誠至當不易之方。毋懼藥之險也。

用桃仁黃水蛭蟲共合方

水蛭。豬油熬黑二十個。蟲蟲去翅足二十五個。大黃酒浸三兩。四味

小預防

安胎飲子

驗方 預防小產

每早連湯服一次。○小產由於房勞傷損足三陰腎傷則精氣不固。肝傷則血熱妄行。脾傷則胎元自墮。蓮肉清君相之火而能固澀。真氣苧麻利小便而通子戶。清淫慾之疾。熟糯米補益脾陰能實陽明空竅。使胎氣不動。則胎盤自安。以五穀菜實為方。誠王道之劑也。如小產之因於虛者。須加補益。

神造湯十斗中須解爪阿膠生草保安全。解爪一升。生甘草二尺。阿膠三兩。右

煮至二升。濾去滓。後入阿膠令烊。頓服。若人因胎死腹中而昏者。灌入即活。○蟹爪尖專下死胎。甘草真安中氣。不使戶氣上乘。阿膠滑利前陰水與

幼科之劑

五首附方三

小兒百病

回春丹小兒萬病回春

廣東驗方

用附雄黃水麝羌防蛇蝎蟲硯貝竺黃天胆共犀黃

蠶草鈎藤良製白附雄黃水片麝香羌活防風蛇含石全蝎砂川貝天竺

蠶殼封固。每匣五粒。服法。週歲內將此丹化開一粒。搽乳頭。令兒吮之。一二

歲每服二粒。三四歲三粒。十餘歲五粒。鈎藤薄荷湯任下。○治小兒萬病。

三抱龍丸取病輕用重情酌

金鑑兒治虛脾亢九治肥疳積者實者

抱龍丸

切與有醫所不識人所未經者但服此丹無不立故如急慢驚風發搐瘧癆傷寒邪熱癲癇彌頻燥疾喘氣急五癥發厥尤見靈奇此方以驅寒化痰清熱熄風通竅安神等藥雜合而成方苟非重症亦不必試服余究嫌藥猛而雜也

衛生寶鑑

星麝竺雄黃

加入辰砂療熱嘗

胆星雄黃麝香辰砂天竺黃法製丸如黃豆大金箔

為衣薄荷湯下每服一丸琥珀抱龍丸育嬰淮山天竺黃珠砂金箔檀香法製丸如豌豆大每服一二丸百日內半粒酌用引湯下

星草枳芩淮參竺箔硃香

琥珀南星人參甘草枳殼枳實茯苓

珀麝僵牛黃胆星辰砂全蝎赤芩天竺黃腰黃琥珀麝香僵蚕

法製為丸每重四分金箔為衣服一二丸鈎藤湯下

選擇急驚風發保平康三方皆能化痰通竅熄風安神○按第一方藥味較少只安神通竅滻痰而無祛風之品似痰熱內阻神昏將欲動風之候宜之第二方內有人參淮山甘草亦無祛風之藥方最平和當係小兒質虛感邪不重者可服第三方最峻痰迷心竅手足搐搦譸語狂亂非特小兒急驚即大人溫邪

化熱癲狂神昏等症亦可服之

明眼二方馮

肥兒丸

金鑑

用木參甘麥釉薑芩查二連更合史君研細末為丸兒服自安

然人參二錢半土炒白朮胡黃連各五錢赤芩三錢黃連二錢使君子肉三

糊為丸如黍米大每服二三十丸米飲下驗方肥兒別用內金朴芩木青陳豆麥聯檳榔蟾蟲連

查合砂仁加入積消瘡厚朴雞內金茯苓各四兩陳皮青皮各二兩五穀蟲砂仁胡黃連各三兩炒白朮六兩炒麥門冬炒扁豆

乾蟾灸十一只六神油十二兩共研末煉蜜

為丸每丸重二錢五分每服一丸未飲下忌油膩麪食生冷○肥兒丸共有

五方惟此二方為最佳故並錄之皆能殺蟲退熱治小兒脾虛疳積面

黃體瘦頭髮枯短肚腹脹大一切積滯體虛者用前方體實者用後方

上海三馬路

補虛健脾

痰涎壅滯

陽癰

陰疽

八珍糕

補虛健脾

與小兒宜參苓陳豆苡依淮藥黃連橘梗米健脾益胃又何

疑。黨參三兩白朮二兩陳皮一兩五錢茯苓淮藥蓮肉米仁扁豆芡實各六
兩橘梗米梗米各五升共磨細末用白糖十兩和勻印糕○治小兒脾胃薄
弱飲食不化形瘦色萎腹膨便溏久服健脾開胃充長氣血百病患除大人
虛者亦可服○夫小兒天性喜食為父母者每投伊所好生冷糖果雜進以
致輕者疳積瘦大等症重者夭折所謂愛之反害之也設將此肥兒八珍糕
預先藏貯遇兒索食時即授與之不但可以充飢且有益乎身體領育兒者
其母河漢斯言

保赤丹

壅滯

中巴豆霜硃砂神袖胆星膏

小兒急慢驚風發每服三丸自不

妨

巴豆霜

三錢胆星一兩

神袖

一兩五錢硃砂

一兩共為末

用神袖打糊為

衣○治小兒急慢驚風

癇症疳疾寒熱

鴻濤痰涎壅

帶腹痛

胃呆大便

便臭並治大

人痰熱

積聚痰飲氣急

等症每服二三粒開

水化服○此丹下痰化滯開竅安神不損臟腑不傷元氣小兒服之實有起

死回生

之效

癰瘍之劑

七首

醒消丸

局方

乳沒麝雄黃乳香沒藥麝香雄黃

法製為丸如菔子大

專為大癰紅腫

膏當每服三錢

陳酒化醉眠

取汗是良方

專治一切大癰

紅腫

火癰

黃易雄黃

名西同

小金丹

全生集

專主治陰疽癰瘍烏龍靈乳儲墨炭膠香歸沒藥橫痃流注

乳巖除

木鱉麝香草烏地龍乳香墨炭白膠香歸身沒藥

法丸如艾賓大

一切流注

痰核癰瘍乳巖

橫痃貼骨疽善癰頭等每服一丸陳酒

同

送下醉蓋取汗如流注將潰及潰久者
以十九作五日服完以杜流注不定

疔瘡
發背

風鶴陰疽

疔瘡
乳癰
發背

癰疽
發背

梅花點舌

丹全生集

此良方

沉香乳香麝香水片硼砂破大珠子珠砂腰黃牛黃沒藥熊胆草鹽初起服之可消每服一丸以葱白色裹打碎陳酒送下醉蓋取汗其丸如菉豆大金泊為衣

萬靈疽

丹正宗

歸木與三烏草荆防芎活俱天斛雄麻全蝎共陰疽鶴

膝濕痺須當歸茅术川烏草鳥何首烏細辛甘草荆芥防風川芎羌活天
丸三等以備年歲老壯病勢緩急取用。珠砂為衣○治癰疽疔毒對口發頭
風寒濕痺濕痰流注附骨陰疽鶴膝風及左癰右瘻口眼歪斜半身不遂氣
血凝滯半身走痛。破傷風等無不應效每服一丸用葱豉湯或溫酒空心調
服。服後以稀粥助令作汗避風寒忌生冷戒房室孕婦忌用○按此方卒散
溫經順稱峻厲宜於疽而不宜於癰亦惟未破可服

蟾酥丸

正宗

用麝蠅牛乳沒硃雄輕粉傅銅綠二礬寒水石疔瘡發背乳癰

瘳蟾酥麝香蠅牛乳香沒藥珠砂雄黃輕粉銅綠胆礬枯礬寒水石法丸
瘳豆大治療疔瘡發背臍疽乳癰附骨臂腿等疽一切惡症不痛麻木或嘔
吐病重者必多昏憚此藥服之不起發者即發不痛者即痛消未成潰已成
功難諱述每服三丸用葱白五寸患者自嚼嚙吐於手心男左女右包藥在
內用無灰熱酒一茶鐘送下被蓋取汗甚者再進一服

一粒珠

癰疽

中犀甲冰珍珠能癰疽發背無名毒酒化一丸力自

勝

犀黃穿山甲水片珍珠砂雄黃麝香用人乳為丸每丸重四分外用蠟

燬封固○專治一切無名腫毒癰疽發背等症每服一丸用人乳化開陳

用三香水片硼珠硃二黃沒藥熊掌蠅血竭一丸酒化

下醉蓋取汗如流注將潰及潰久者

者

痘喉

酒中服睡卧避風兼治小兒驚風減半用鈎藤橘紅泡
湯化服此丹藥味貴重峻厲凡外科要症必須用之

六神丸

雷氏

治癰喉痧每服十九粒可誇珠粉腰黃冰片麝牛黃還魂蟾酥

加珍珠粉腰黃冰片麝香牛黃蟾酥法製為丸如芥子大百草霜爲衣○治

加時邪疫癰瘍唯病癰喉風喉癰雙單乳蛾諸症茶湯不能進者每用十粒治水化開涂徐嚥下無不立效重者再進一服並治療瘡對口癰疽發背。腸

癰腹疽乳癰乳岩一切無名腫毒等症皆效按此方藥峻而貴非疫癰實熱症勢重險者不可姑試令人每逢喉痛即云六神丸不知謾人幾許矣