

卷五

心胃痛附膈痛心痞 虛煩 躁鬱 驚 恐
健忘 悸病 饪祿 喜笑不休 怒 善大息
悲 胃痛胃痺 痰飲 關格 喘膈 呃逆附噫

金匱啟鑰 第五冊

濂江黃朝坊妙山輯著

明萬曆丙子人

濂江黃朝坊妙山輯著

心胃痛論附膈痛心瘡

夫心與胃病原非一轍。因胃痛處在心下。故有當心而痛之名。豈心痛卽胃痛乎。歷代方論將二者混敘於一門。誤自此始矣。獨不思心之臟君火也。是神靈之棲舍。屬手少陰之正經邪。不得而侵傷其受傷者。乃手心主包絡也。如包絡引邪入於心之正經臟而痛者。則謂之真心痛。必手足冷至節。爪甲青。且發夕死。夕發旦死。多不可治。第亦包絡受邪。亦有故也。心統性情。始由忧惕慮思慮則傷神。神傷則

心虛矣。虛則邪得以乘虛而干之。故手心主包絡受其邪而痛也。心主諸陽。又主血。若有邪侵。則陽氣鬱伏。故過於熱者痛。或陽氣不及。而邪乘之者亦痛。此陽氣受邪擾而痛也。若血因邪注在絡而不行者。固痛。節血因邪勝而虛者亦痛。此又血受邪凝而痛也。雖方論有九種心痛。不無汜濫其名。而學者亦難適從。今約言之。不外虛寢二証而已矣。如腎爲中州。經云腸胃爲市。又云陽明多血多氣。胃之中。腥羶五味。無所不納。如市蜃無所不羅也。是水穀之海。爲三陽之總司。五臟六腑十二經脈。皆受氣於此。是以足之六經。自下而上。凡胃壯則氣行而無滯。弱則着而成病。雖素有冲和之氣。變至偏寒偏熱。

因之水穀不消發渴氣滯或因外邪與正氣相搏爲病者也。凡諸
痛手可按者爲虛拒按者爲實。如心痛有熱厥者身熱足寒痛甚則
煩燥不安額自汗出知其爲熱也。其脈浮大而洪宜清中湯當灸大
谿。崑崙二穴謂表裏俱瀉之是爲熱病汗不出引熱下行矣。表汗通
身而出者愈也。灸畢服金鈴子散則愈。痛止服枳朮丸去其餘邪也。
有大寢心中痛者因有氣而食卒然發痛大便或秘久而滿悶心胸
高起按之愈痛不能飲食急以黃芩丸利之利后以藁本湯去其邪
也有寒厥心痛者手足厥逆而通身冷汗出便溺清利或大便利氣
微力弱此無陽而陰寒痛危證也。卽以附子理中湯或朮附湯溫之。

自痊。如因外感而痛者。脈浮弦緊。證惡風寒。宜藿香正氣散。五積散。
加薑慾之類。外吸涼風。內食冷物。寒氣客於腸胃之間。卒然而痛者。
宜二陳湯。加草菴、乾薑、吳茱萸。或扶陽助胃湯可也。痰積作痛。星半
安中湯。或海蛤丸。有寢積者。脈必浮滑。氣口緊盛。按之痛。宜木香枳
榔丸。或厚朴丸。有腎氣逆上攻衝。以致心胃痛。用生韭研汁。和五苓
散爲丸。茵香湯。下因怒而痛者。用二陳湯。加香附、青皮。或加黃連、死
血。作痛脈必微。作時飲湯下。或作呃。壯人桃仁承氣湯。虛人當歸活
血湯。凡痛嘔逆者。非中寒證。諸藥不納者。就吐法治之。以鵝翎探吐。
下盡痰積。自愈亦良法也。虫痛。面上白斑。唇紅能食。或食卽痛。或痛
下盡。痰積。自愈亦良法也。

後伊能食夢中涎出此亦有生治何術也凡虫加牛肝虫頭
下難治上半月虫頭向上易治先以雞肉汁及糖蜜引之旋用集效
丸體虛可用溫臟丸內傷發熱不食胃中作痛補中益氣湯加草豆
柏熱痛加橘子寒痛加附子氣攻刺而痛宜加味七氣湯或正氣天
香散膈痛與心痛不同心痛則在歧骨陷處本非心痛乃心支別絡
痛耳膈痛則痛橫滿胸間者也凡膈痛多因積冷與瘀而成宜四七
湯加廣香肉桂或膈脾湯加木香五膈寬中散亦良方也痛而氣上
急者宜蘇子降氣湯去前胡加廣香如數痰涎壅盛而痛者宜小半
下茯苓湯加枳實一錢間進半碗丸益以膈上停寒中有伏飲見辛

熱則消。不若附子理中湯更美。有用十全大補湯愈者。乃取生血益陰。以水濟火之義。是又一道也。心癇亦痰飲所致。俗名飲癇。有胃口熱。食易消。故瘥素問謂之食癇。亦類消中。俗呼肚癇。痰氣宜小半夏茯苓湯加只寃一錢。胃中熱。二陳湯加黃連一錢。或四苓散加辰砂。若膈上寒痰伏飲。熱藥一進。則寒痰消化。是薑附之屬不可少也。至君簡便良方。亦可爲醫人一助。如心脾痛。用荔枝核爲末。每服一錢。熟醋調下。必應一方。劉寄奴末六錢。元胡末四錢。薑汁熱酒調服。最效。又方。水磨烏藥汁。盞半。用陳皮一片。蘇葉二皮。濃煎。一服神效。又有用小蒜以醋煮頓服。再不發。食療方。治冷痛。用胡椒二十一粒。擂。

一方諸藥不效。但用皂角以微火燒烟甫盡。卽研爲末。燒酒調七八分。或一錢。其效如神。學者記之。有時一方亦可療苦疾矣。

証治歌附膈痛心瘡

心爲君王少邪侵。惟有心包絡受蠹。包絡引邪心臟入。四肢青冷痛。
名眞死期旦夕醫難救。任是富家空有參。邪客心包成痛苦。虛偏毒
穰寢不同。足寒身熱爲熱厥。痛甚生煩額汗淋。湯進清中脈洪大。
大谿穴可灸及崑崙穴。灸完須用金鎗子散。欲去餘邪只丸。陳若有
大寢心中痛。便閑煮黃丸。橐本湯因寒証溺清大便利。附子理中湯

水附湯似甘霖風寒五積散開解或進藿香正氣散口吸涼風食

散

冷物吳萸加入二陳湯中乾薑草菓均宜用或進扶陽助胃湯亦同

痰積宜投丸海蛤星半安中湯可尋脈來浮滑氣口緊按之而痛寔

積真木香枳榔丸堪採用厚朴湯投亦比倫腎氣上攻心胃痛五苓

韭汁丸和勻因怒而痛二陳美加香附青皮黃連作鄰死血爲恙飲

或呃虛人當歸活血湯壯桃仁承氣湯凡嘔諸藥不能納去痰探吐

用鵝翎面白唇紅驗虫痛糖雞先食引虫升引後還投丸集效體虛

溫羸丸不須詢發熱內傷胃口痛補中益氣湯加草蔻奏奇勳熟加

梔子寒加附子此法心裁出古人痛苦攻刺宜加味七氣正氣天香

散服。曰。回功心痛。原在此。臂附絡。要分明。膈痛。不同心痛處。
積痰與治痛。橫胸四七湯中加肉桂。木香併入任磨礲。搗脾湯內木
香。湊五膈。竟中散氣復春。氣上急攻蘇子降。氣湯去前胡加木香。任
調勻。痰凝小半。下茯苓。好只寢。加之賊可擒。間道半硫丸化飲。不如
附子理中神。十全大補湯如病火。以水平生血陰。此義極深。又一道
莫將古法不明申。狀如消食心癟病。又謂肚癟。俗說紛。小半。下茯苓
湯。枳桔桂。胃熱黃。連入二陳辰砂。或入四苓散。膈上寒痰。伏飲倫。薑
附不投難奏效。斯時莫執寒涼遵。心脾痛用荔枝核。一錢醋下。自安
寧。六錢劉寄奴元祐四錢。調宜熟酒薑汁。勻烏藥水磨蘇葉二。皮陳

皮一片同煎斟一方。小蒜煮醋。頓服。自瘡病不臨。冷痛明椒廿二粒。調宜熟酒服。清醇良薑。又與枳榔等米飲下。瘡無採薪。諸藥不靈。用皂角燒烟。甫盡細研融。宜用七八分爲度。燒酒調當福白臻。

脈

脈多見於右關。陰弦爲痛。微急爲痛。微大爲心脾引背痛。短數爲痛。濇爲痛。大約久病。洪大數屬火熱。滑大屬痰。右手蹇者。痰積。沉滑者。有宿食。弦遲者。寒積。沉細而遲者可治。堅大而寢。浮大而長。滑而利。數而緊。皆難治。心痛者。手足俱青。至節者不治。痛甚者。脈必伏。蓋氣爲邪暑。則脈道不平。然於死穴中。則安有更之大亥者之良。七言。

之脈不可概認爲虛。遽用補藥，辨之之法，惟察其形色聲音，問其新久，再細心診之，百不失一。

方

當歸活血湯

生地、當歸、川芎、赤芍、紅花、紫草、黃芩

黃連、大黃

清中湯 治火痛

黃連、梔子炒各陳皮、茯苓各不
二不法夏七薑湯泡七
草蔻仁、半搗一不
金匱要略 卷五 心胃篇

右薑三几水煎食前服

金鈴子散 治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子 元胡索

右爲末每服三錢酒調下

枳朮丸 消痞除痰健脾進食

白朮二兩
土蒼一兩

枳實一兩
麪炒

右爲末與陳米用荷葉包煨乾爲丸痞悶加陳皮氣滯加木香傷

食加麥芽神麴

藁本湯 治大寢心痛大便已利宜以此散其餘痛也

扶陽助胃湯

附子炮去皮

豆蔻 益智仁

揀參 羌草

官桂 白芍

乾薑

炮各一小

陳皮 吳茱萸

白朮各五分

右薑三片棗二枚水煎溫服

尾半安中湯 治痰積作痛

南星

決夏

各不半俱
薑水炒

滑石

香附

只壳麪
炒

青皮

醋
炒

廣香

蒼朮

米泔浸
一宿炒

砂仁

山梔

黑
炒

茯苓

橘紅

各一分

羌草

五分

右薑三片水煎食前服如氣攻痛者去南星滑石加厚朴元胡各
一錢痰甚加白螺螄壳燒灰一錢

海蛤丸 治痰飲心痛

海蛤燒爲灰研細過數日出火毒用之

瓜蔞仁帶穰

右以海蛤入瓜蔞仁搗研和勻乾燥得宜爲丸每服五十丸
木香枳榔丸 疏導三焦寬利胸膈破瘀逐飲快氣消食

枳榔 廣香 枳壳炒

杏仁去皮尖炒

青皮去穰各一兩

半夏 皂角去白醋炒 郁李仁去皮各二兩

右爲細末別以皂角四兩用漿水一碗搗揉敷膏更入熟蜜少許

厚朴丸 主翻胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾

厚朴

川椒

去目微炒

川烏頭

炮去皮臍各一兩五分

紫苑

去土苗

菖蒲

茯苓

吳茱萸

湯洗

白芍

去皮弦炙各二兩

柴胡

去苗

官桂

人參

乾薑炒

桔梗

黃連

各二兩

巴豆霜

三分不

右爲細末入巴豆霜炒勻、煉蜜丸梧子大每服三丸漸次加至五七丸以利爲度食後生薑湯下又治處暑以後秋多間下痢大效春夏加黃連二兩秋冬再加厚朴二兩如治風於春秋所加黃連厚朴外加菖蒲茯苓各一兩半如治風病不愈者依春

秋加人參菖蒲莢苧各一兩半，如心之積加菖蒲白茯苓爲君。
如肝之積加柴胡川椒爲輔。如脾之積加吳萸乾薑爲輔。秋冬
久瀉不止加黃連茯苓。

集效丸 治因臟腑虛弱多食甘肥致蛔蟲動作心腹絞痛發則種
聚往來上下病有休止腹中煩熱口吐涎沫是蛔蟲咬宜服此
藥若積年不瘥服之亦愈又治下部有虫生痔瘡痛

木香

鴉虱

桃榔

調子

麪裹煨去核

燕羹炒

附子

皮臍煨去

乾薑

各七分

大黃

一兩半

烏梅

十四個去核

右爲細末煉蜜爲丸梧子大每服三四十丸食前用陳皮湯下婦

溫臟丸 治諸虫積，逐而復生者，多由臟氣虛寒，宜溫健脾胃，以杜其源。

人參

隨宜用無亦可

白朮

米泔浸炒

當歸

各四兩去

白芍

酒炒

茯苓

川椒

去舍口炒出汗

榧子

去壳去

使君子

去壳去

枳榔

各二兩

乾薑

炮

吳萸

湯泡一宿炒各一兩

右爲末，神麃糊丸，梧子大，每服五七十丸，或百丸，饑時白湯下。如臟寒者，加附子一二兩；臟熱者，加黃連一二兩。
加味七氣湯 治七情鬱結，心腹或因氣而痛。

蓬朮

青皮

香附

以米醋炒

元胡

薑黃

一草蔻仁

八分

三移

炮七分

桂心

益智仁

七分

陳皮

八分

薑香

七分

炙草

四分

右水煎食前服。死血胃脘作痛加桃仁紅花各一錢。

正氣天香散 治九氣

烏藥

二兩

香附

八兩

陳皮

紫蘇葉

乾薑

各一分

兩

右爲細末。每服一錢七分。鹽湯調服。

膈脾湯

麻油

四兩

良薑

十五兩

茴香

炒七兩半

甘草

十一兩

右沙蜜一斤。同良薑少爲細末。每服一錢。不拘時。白湯點服。

小半夏茯苓湯 治卒嘔心下痞膈間有水眩悸

半夏 生薑 茯苓

五膈寬中散 治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿停

痰氣逆遂成五膈並治一切冷氣

白豆蔻

去皮二兩

炙草

五不

廣香

三不

厚朴

去皮一斤

砂仁

丁香

青皮

去白一兩

廣皮

去白各四兩

香附

去毛一斤

右爲末每服二錢，薑三片，鹽少許，不拘時沸湯點服。

補中益氣湯

見發熱

十全大補湯

見發熱

半硫丸

桃仁承氣湯

芩黃丸

見脢痛

蘇子降氣湯

見厥暴

五苓散

感附子理中湯

見惡寒

四苓散 酸藿香正氣散

見中食

四七湯

二陳湯

均見咳嗽

尤附湯

見頭痛

五積散

見寒惡



一人忽心口處大痛、不能忍、脈洪大而數、以清中湯一劑而愈、
一人冒氣痛、不甚其苦、脈浮緊、以五積散加慈白生薑煎服愈、
一人心冒氣痛、以正氣天香散服之、痛減、后以六君子加香附炮
薑益智仁草豆蔻全愈、

家兄柳村素本中寒、更病氣痛、發不勝其苦、每欲令人扛之而走、
先君屢治而效、多是補脾胃氣之藥、余幼不知醫、先君沒後、每

歲一發，厲治未在醫者及予頗知醫病，發則痛橫胸脰滿右乳下，或走左乳下，當心亦痛。乃知心胃痛而兼膈痛也。切其脈，暑大而緩，知其虛寒無疑。況膈痛多有寒痰，伏飲熱藥一進，寒痰自退。經曰：寒淫於內，治以辛熱。因製溫胃扶陽湯，以附子炮薑、益智仁、紅豆蔻一劑見減，數劑而愈。越一二年又間發，以附子理中加桂枝羌活，或蘇葉一劑，卽以溫胃扶陽湯數劑即愈。未見有昔年之苦也。

虛煩論

陳無擇云。虛煩身不覺。頭目昏眩。口乾嗌燥。不渴清清。不寐皆虛煩也。保命集云。起卧不安。睡不穩。謂之煩。宜梔子豆豉湯。竹葉石膏湯。活人云。但獨熱者虛煩也。諸虛煩熱與傷寒相似。但不惡寒。身不疼。故知非傷寒也。不可發汗。頭不痛。脈不緊數。故知非裏寢也。不可下。當與竹葉湯。若嘔而不喜食者。與陳皮湯一劑。不愈。再與三因淡竹茹湯。東垣硃砂安神丸。素問帝曰。有病身熱。汗出煩滿不解者厥也。解此爲何病。歧伯曰。汗出而身熱者風也。汗出而煩滿不解者厥也。病名曰風厥。帝曰。願卒聞之。歧伯曰。巨陽主氣。故先受邪。少陰與其

爲表裏也。得熱則上從之，從之則厥也。帝曰：治之柰何？歧伯曰：表裏刺之，飲之服湯。如仲景用麥門湯之類。丹溪治一女子，脈沉口渴，手心熱，知熱不在表也。用妙香丸下之。若虛勞虛煩，不得眠，酸棗仁湯。然心虛則煩，肝腎脾虛亦煩。大凡津液出多，五內枯燥，八珍湯加竹葉酸棗仁麥冬。榮血不足，陽盛陰微，而煩者，人參生地麥冬地骨皮白芍竹茹之屬。或人參養榮湯。下硃砂安神丸。腎水下竭，心火上炎，而煩者，竹葉石膏湯。下滋腎丸。病後虛煩，有飲者，溫胆湯。無飲者，遠志湯。產痘滯下後虛煩，爲血液耗散，心神不安，危矣。宜速進獨參湯。煩而小便不利，五苓散。心中蘊熱而煩，清心蓮子飲。灼舌者，

拘執以貽誤也

証治歌

起卧不安睡不穩。身不覺熱謂虛煩。宜用梔子豆豉湯治。或用竹葉石膏湯。安諸虛煩熱傷寒似。但身不痛不惡寒。寃非傷寒不可汗。寃非裏寢下存參。竹葉石膏湯可進。嘔與陳皮一劑康。不愈三因淡竹茹湯。東垣硃砂安神丸亦妙方。身熱汗出心煩清。此名風熱治宜詳。

仲景麥門冬湯主治。丹溪裏藥下妙香。丸虛勞虛煩酸棗仁湯。進肝腎脾虛八珍湯。散更加酸棗仁麥冬。與竹葉管教身體誦安康。陽盛陰微養榮湯。妙人參生地麥冬地骨白芍竹茹良。更吞硃砂安神丸。

善欲下方時莫自忙。腎水下竭火上熾。竹葉石膏湯滋腎丸將病後虛煩兼渴飲溫胆湯投仔細看。無飲遠志湯旋進。產痘滯后獨參湯小便不利五苓散蘊熱清心蓮子飲嘗。

方

陳皮湯

陳皮一兩半
去白 炙甘草五
不 人參二分
五分 竹茹五
不

右剉如麻豆大。每服五錢。生薑三片。棗一枚。水煎服。

淡竹茹湯

麥冬去

小麥各二

炙甘草一

人參一

半夏

鹽汁洗七
次二兩

右剉散每服四錢生薑七丸棗三枚淡竹茹一團如指大水煎食

前服

遠志湯

遠志

黑豆甘草同煮去骨

黃芪

當歸酒

麥冬

去心五

棗仁

炒研

石斛

名一
兩

人參

茯神

去木各七分

甘草

五分

右加竹茹知母水煎食遠服

妙香丸

巴豆

三百一十五粒去皮
心膜炒熟研如麵

牛黃

膩粉

射香

龍膽

各三
兩

辰砂
飛九

金箔九
凡

右研細入黃蠟六兩、白蜜三兩、拌勻爲丸。每兩作三十丸，如治潮熱積熱，傷寒結胸，發黃狂走，躁熱口乾，面赤，大小便不通。煎大黃炙甘草湯下一丸。毒痢下血，煎黃連湯調膩粉少許，如患酒毒食毒，采毒氣毒，風痰伏痞，吐逆等，用膩粉龍腦米飲下。中毒吐血，悶亂煩燥欲死，用白湯下一丸。小兒百病驚癇，急慢驚風，用龍腦膩粉湯下，乘豆大。凡諸積食，熱睡，卧不寧，驚哭漏利，用金銀薄荷湯下。如大人婦人，因病傷寒，時疾陰陽氣交結，伏毒氣，胃中喘，嘔，眼赤，朝熱不定，可服一丸，或分作三七下。

人參養榮湯 治肺脾氣虛、榮血不足、驚悸健忘、寢汗發熱、食少無味、身倦飢瘦、色枯氣短、毛髮脫落、小便赤澁。亦治發汗過多、身振脈搖、筋惕肉瞤。

人參 白朮 黃芪蜜炙 炙甘草 厥皮 桂心 當歸酒拌一两
熟地黃 五味子炒杵 茶荳七分 遠志五分 白芍六分 生地半

右加薑棗煎服

溫胆湯

竹茹 半夏 枳實 陳皮 茶荳

甘草

右加薑棗煎服

硃砂安神丸

滋腎丸

均見
發熱

竹葉石膏湯

見咳嗽

清心蓮子飲

見口

五苓散

見感冒

八珍湯

見潮熱

酸棗仁湯

棗仁

人參

麥冬

竹茹

龍眼肉

水煎服

竹葉湯

竹葉

防風

黃芩

寸冬

茯苓

水煎服

躁論

經云諸躁狂越皆屬於火。又曰陰盛發躁名曰陰躁。欲坐井中宜以熟藥治之何也。陳無已曰雖躁欲坐井中但欲水不得入口是也。東坦云陰躁之極欲坐井中陽已先亡醫猶不悟復指爲熱重以寒藥投之其死也何疑焉。況寒涼之劑入腹周身之火得水則升走矣。豈治病者哉。是非霹靂煎附子理中湯四逆湯之類則斷不可然辨証下方法又在醫者臨時之洞察也。

証治歌

諸躁狂越皆屬火。陰盛發躁陰燥名此皆經所謂燥病。陰燥身欲坐

井中。陽已先亡。宜熟藥。醫猶不悞以寃詳。授以寒涼藥卽斃。反謂修短天數終。此宜霧靈煎急進。理中四逆亦回春。

方

霧靈煎

附子

炮一
枝

右入蟬茶同研水煎熟再入蜜半匙令服

四逆湯

見惡寒

附子理中湯

見惡寒

鬱論

帝曰。五運之氣亦復歲乎。歧伯曰。鬱極乃發。待時而作也。帝曰。鬱之甚者。治之奈何。歧伯曰。木鬱達之。火鬱發之。土鬱奪之。金鬱泄之。水鬱折之。又曰。調其氣。過者折之。以其畏也。所謂泄之。王大璞曰。木鬱達之。謂吐之。令其調達。火鬱發之。謂汗之。令其疏散。土鬱奪之。謂下之。令無壅碍。金鬱泄之。謂滲泄解表。利小便也。水鬱折之。謂抑之。制其衝逆也。王安道曰。木鬱達之五句。治鬱之法也。調其氣一句。治鬱之餘法也。過者折之三句。調氣之餘法也。丹溪言。鬱有六氣。血濕熱痰食也。氣鬱者。胸脇痛脈沉而濇。宜香附蒼朮撫芎。濕鬱週身走痛。

或關節痛遇陰寒則發其脈沉細宜蒼朮川芎白芷芩芩熟鬱目督小便赤其脈沉數宜山梔青黛香附蒼朮撫芎瘀鬱動則喘寸口脈沉滑宜海石香附南星瓜萎仁血鬱四肢無力能食便紅其脈芤宜桃仁紅花青黛川芎香附食鬱曖酸腹滿不能食右關脈緊甚宜香附蒼朮山楂神麴砂仁上諸鬱藥春加防風夏加苦參秋加杏仁冬加吳茱萸然皆所以治實邪凡初鬱未致內傷而尙寔者可用若逆氣既散或積久成癟者不知培養而仍加消伐則愈虛愈鬱其與鷺鷥腳上割股者何以異知此者其惟景岳乎大凡情之傷人莫如怒思憂之爲最如怒鬱之治若係暴怒傷肝氣逆未解而爲長制或客

痛者宜解。用肝煎。若怒氣因而動火。以致煩熱。腸漏。腹滿或動血者。宜化肝煎。怒后氣逆。既散。肝脾受傷。而致倦怠。食少者。宜五味異功散。歸脾湯。陰陽平補。五福飲以調養之。思鬱之治。初有鬱結未開。宜和胃飲加減主之。或沉香降氣散。凡婦人思鬱不解。致傷衝任之源。而血氣日虧。漸致經脈不調。或短少。漸閉者。宜八味逍遙散。柴芍六味丸。此醫負以一方治五鬱之意也。後服逍遙飲亦妙。思意不遂。以致遺精帶濁。及經脈錯亂。病在心肺不攝。宜秘元煎。在肝腎不固。宜固陰煎。若儒生蹇危。思結腸胃。及勞役任怨。心脾受傷。以致怔忡健忘。倦怠。食少。漸至羸瘦。或爲嘔吐。膈噯等証。宜歸脾湯。七福飲。心膈氣。

有不順而微見疼痛。則砂仁。白蔻。丁香之類亦可加之。若憂鬱之治。
初鬱未開。而胸膈痞滿者。宜二陳湯。平胃散。或神香散。鬱久傷脾。而
吞酸嘔惡。宜溫胃飲。或神香散。兼傷脾胃。因倦怔忡。神倦食少。宜歸
脾湯。若傷心脾。以致氣血日消。飲食日減。肌肉日削者。宜七福飲。甚
者大補元煎。是知治鬱之道。宜辨先後。虛寢而治之。則寢者解散之。
虛者補暢之。亦何至損傷其不足。增益其有餘。而受殺人之咎哉。

証治歌

病名鬱。証最難言。木鬱達之通暢然。火鬱發之升舉善。土遭鬱奪下。
攻先水。腫鬱結須知折。金鬱泄之滲利傳。氣鬱脈並胸協痛。苦鬱香

附有司專身疼節扁濱侵鬪沉細脈來陰雨忌者尤甚並白芷茯苓

芩湊合效追仙目督溺赤熱熬鬪脈數而沉顯著

海石南

星瓜

姜

香附聯血鬪

便紅能進食脈芤無力四肢牽桃仁青黛川芎

附

紅花散血色新

鮮。啜酸腹滿鬪因食脈緊右關食阻咽蒼朮山楂神曲炒更宜香附

砂仁煎論治諸鬪方誠妙加法因時識變遷春防夏苦秋宜杏冬益

吳萸邪不沾但是久初須辨別免教悞殺入黃泉氣逆解肝

前

初怒

好動火動血化肝煎氣逆已消肺損異功五福歸脾填思凝初鬪

氣難解和胃飲沉香降氣痊婦人恩鬪傷衝任經脈失調閉不宣八

味逍遙

散相柴杏

六味丸

逍遙飲仍服自安然憶思不遂成崩濁經

脈無常藥孰賢

病原心肺秘元煎

好肝腎不固固陰煎儒生勞役成

羸瘦怔忡健忘病勢炎

嘔吐更兼生膈噫

湯用歸脾湯七福飲全心

膈不順微疼痛

白蔻砂仁丁香可添

憂鬱未開胸痞滿神香平胃二

陳兼

鬱久傷脾溫胃飲或用神香戴二天

兼傷肺歸脾主傷及心

肺七福妍皆是甚傷何藥治

大補元煎壽可延總之治鬱分虛實補

虛解寢是眞詮

脈

鬱脈多冗大。在上則見於寸。在中見於關。正下見於尺。

結或潛滑伯仁云血食積瘀飲一有流滯其間脈必因之而見宜求其神所謂神者、胃氣也。

方

典直遼陽
吳仲榮胡

逍遙飲 治婦人思鬱過度、致傷心脾衝任之源、血氣日枯漸至經脈不調者。

熟地三
當歸 紗仁各二
陳皮八分 遠志三分

芍藥 紫神 灰草各一
不

沉香降氣散 治胸腹脹滿、氣鬱不暢等証

沉香二分
砂仁七分
香附去毛鹽水炒六兩
甘草半牛
生

右爲末。每服二錢。入鹽少許。沸湯調下。

異功散

二陳湯

見咳

大補元煎

溫胃飲

惡寒

平胃散

見中食

五福飲

八逍遙散

寒熱
脾虛

七福飲

見口

神香散

見傷食

和胃飲

見傷暑

秘元煎

固陰煎

見消癆

解肝煎

中氣

化肝煎

六味丸

柴芍六味

七節六味丸加柴芍

均見發熱

一人因母死憂鬱成病。胸膈脹滿。醫以爲內寒。用熟地白朮炮薑肉桂等藥。脹愈甚而吐血不勝惶惶。余切其左關長弦硬。手右寸洪滑有力。服加味逍遙散加香附數劑。脹平血止。但左寸見微洪。左關見軟。繼以加味歸脾湯十餘劑全愈。

一人飲食後與人結罵。胸腹脹滿。兩寸脈濶不暢。而右關沉滑。知其氣與食均鬱也。以和胃飲加神麴麥芽。重加香附十餘劑。愈一八咳嗽吐血。久不愈。體瘦身弱。詢其病源。始醋心吐酸水。繼吐臭水。而咳嗽吐血。胸膈脹滿。先服表散。後以歸脾養營之類。不效。切其脈沉細而數。左關按至骨弦硬。右寸沉洪。知其是鬱也。益木鬱則酸。鬱久則酸變爲臭。吐血咳嗽。亦隨氣逆而然也。問其故。果云因子媳不順。憂愁不快耳。爰用八味逍遙散。更加香附。又加黃連吳茱萸。每劑黃連用四分。噙服數十劑。伊果服八十劑而病始愈。後進八仙長壽丹。肉起體強而康。

驚論

驚者何。因觸於外事而動其心。心動則神搖也。恐者何。因感於外事而內歛其志。志歛則精却也。故內經謂驚則心無所依。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。恐則精却。却則上焦閉。閉則無氣還。無氣還則下焦脹。故氣不行矣。所以治驚當安其神。恐則當定其志。何言之。蓋心爲離火。內陰而外陽。腎爲坎水。內陽而外陰。內者是主。外者是用。又主內者五神。外用者五氣。是故心以神爲主。陽爲用。腎以志爲主。陰爲用。陽則氣也。火也。陰則精也。水也。及乎水火旣濟全者。陰精上奉。以安其神。陽氣下降以定其志。不然。則神搖不安於內。陽氣散於外。

志藏於中陰精走於下所以驚者必先安其神然後散亂之氣可斂氣斂則陽道行焉恐者必先定其志然後走失之精可固精固則陰道用焉黃帝問曰足陽明之脈病惡人與火聞木音則陽然而驚鐘鼓不爲動聞木音而動何也歧伯曰陽明者胃脈也胃者土也聞木音而驚者土惡木也東垣云六脈俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜氣汗以甘辛溫微苦峻補其血熟地生地柴胡升麻白芍丹皮川芎黃芪之類以補之以防血溢上竭鎮墜之劑謂丹砂之類三因云五飲停蓄閉於中院最使人驚駭五飲易主之心旦直去獨存其一

不祥遂致心驚胆懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸証或短氣悸之或
復自汗者並溫胆湯主之。隱則以人參代竹茹若驚悸眠多異夢隨
卽驚覺者宜溫胆湯加棗仁蓮肉各一錢以金銀煎下十四丸或
鎮心丹。遠志丸酒調妙香散琥珀養心丹定志丸卧而多驚厥真珠
母丸獨活湯羌活勝濕湯治卧而多驚悸多驚澀者邪在少陽厥陰
也加柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦風寒二經合病非風藥行
經不可也。丹溪曰病自驚而得者則神出於舍舍空得液則成痰矣。
血氣入舍則痰拒其神不得歸焉。宜壽星丸或控涎丹加辰砂遠志
主之東垣云外物驚宜鎮平以黃連安神丸蜜佗僧研細末茶湯調

一錢下之。又治驚氣入心包絡不能語者。蓋驚則氣散。故以重劑墜之。熟鬱有痰。寒水石散氣鬱有痰。加味四七湯。虛而有痰。十味溫胆湯。養心湯。景岳云。驚有二証。有因病而驚。因驚而病。如東方色青。入通於肝。病發驚駭。及傷寒陽明証。聞木音則惕然而驚之類。若因驚而病者。如驚則氣亂。而心無所倚之類。此必於風見奪氣而得之。宜養心神。培肝胆。扶元氣爲主。雖有二者之辨。然主氣强者不易驚。而自驚者必肝膽之不足。故雖有客邪。亦當知先本後標之義。又如驚則氣亂。恐則氣下。驚恐雖若同類。不知恐之傷人尤甚。何也。蓋驚出於暫而暫者。即可復。恐積於斬而斬者不可復。更宜

知則陰痿。日消月縮。不亡不已。怔忡之病。心胸築築。振動惶惶。無時
得寧者是也。古無是名。在類經則曰。胃之大絡。名曰虛里。出於左乳。
下垂動應衣。宗氣泄也。仲景則有動氣上下左右之辨。云諸動氣皆
不可汗下也。凡此者皆怔忡之類。而究非怔忡。此証惟陰虛勞損之
人乃有之。蓋陰虛於下。則宗氣無根。氣不歸源。所以在上。則浮撼於
胸臆。在下。則振動於臍旁。患此者宜節慾。節勞。治此者宜養氣。養精。
誤認爲痰火。而妄施清利。則速危矣。凡治法雖有心脾肝腎之分。然
陽統乎陰。心本乎腎。所以上不寧者。未有不由乎下。心氣虛者。未有
不因乎精。亦以精氣互根之宜也。然或宜先氣而後精。或宜先精而

後氣或兼熱者之宜清。兼寒者之宜緩。又當因其病情而酌用之。故心肝血氣本虛。或爲驚恐。或爲怔忡。或偶以大驚猝恐。而致神志昏亂者。俱宜七福飲。甚者大補元煎之類。水虧真陰不足。而怔忡不已者。左歸飲。火虧真陽不足。而怔忡者。右歸飲。三陰精血虧損。陰中之陽不足。而爲怔忡驚恐者。大營煎。或理陰煎。若水虧火盛。煩躁熱渴。而驚悸不寧者。二陰煎。或加減一陰煎。若思慮過度。耗傷心血。而爲怔忡驚悸者。逍遙飲。或益營湯。若寒停蓄心下。而怔忡者。蠶羌湯。心血虛血少。神志不寧。而驚悸者。養心湯。或十四友丸。或寧志丸。心血不足。升火不升。血熱多驚者。朱砂安神丸。心神虛怯。改善康交水。自人。

飲子甚者硃砂消痰丸。風熱生痰上乘心膈而驚悸者。簡要濟眾方。若因驚失志不寧者。寧志膏。或遠志丸。若大恐大懼以致損傷心脾。腎氣而神消精却。飲食日減者。必用七福飲。大營煎。大補元煎之類。

証治歌

觸外動心病曰驚。感外歎志恐之名。心神無主驚之狀。戰慄畏捕恐之形。治恐須先定其志。治驚必首安其神。六脈虛驚且熱。此爲氣盛血亡人。先須鎮墜丹砂。主次以辛溫補血功。生熟二地柴升芍丹皮黃芪及撫芎。五飲停蓄五飲湯。治觸事易驚。溫胆湯。乘異夢驚覺。

神不定溫胆湯加蓮肉及棗仁。金銀湯下十四友或用遠志丸或鎮

心丹

妙香散

琥珀養心善遠志定志建奇勳。卧多驚魘真珠母丸獨

活湯羌活勝瀝

亦相因若淋照方加澤湯加柴治邪入厥陰痰拒心

神不歸舍控涎丹進或壽星外驚須用黃連安神丸

鎮茶送佗參治失聲熱鬱有痰寒水石散氣鬱有痰四七湯攻虛而有痰養心主亦

須擇用十味溫胆湯

更有心胸築築振此証由來號怔忡治法景岳詳分別因病施方要酌斟心脾氣血原虛損或因猝恐致神昏此宜

卽進七福飲大補元須酌重輕真陰不足左歸飲真陽不足右歸靈

吾或三陰精血損大營煎進或理陰水虧火盛二陰善加或一陰亦

可通思慮傷血逍遙飲寒停心下薑丸。安心虛血少十日有效。

志丸養心湯最得中。肝火不清血不足。硃砂安神丸可行。微兼痰火

以入物。定志丸多痰四七保長生。痰迷溫胆茯苓飲甚者硃砂消痰

攻風熱生痰須

簡要

濟眾

方

因驚失志以遠

志丸

志膏

恐懼損傷

心脾腎七福大補或大營驚病治方聊備輯。晉教精此保天君。

方

琥珀壽星丸

天南星

一斤掘坑深二尺用炭五斤置於坑內燒紅取出炭掃

淨用好酒一斤澆之

將南星趁熱下坑內用盆急蓋訖

經一宿取出

琥珀四兩

硃砂一兩研飛以

再焙乾爲末

琥珀另研硃砂一半爲衣

右和勻猪心三箇取心中蓄血生薑汁攪令稠粘將心血和入藥
末麴糊丸如梧子大每服五十丸人參湯下日三服

五飲湯 治五飲最效

旋覆花 人參 陳皮去白

枳實 白朮 茯苓 厚朴曹

製

半夏裹 澤瀉 朱芩

前胡 桂心 白芍 炙草各等分

右每一兩分四服薑十片水煎溫服因酒成飲加葛根葛花砂仁

平補鎮心丹

棗仁炒二不半

車前子

白茯苓去皮

麥冬去心

五味子

茯神

去肉桂各一兩

龍齒

熟地

天王去

三七去

心甘

夜山藥
畫州數名
一兩牛

人參

硃砂
各五分

右煉蜜丸如梧子大每服三十丸空心米湯溫酒任下

遠志丸 治因事有所大驚夢寐不祥心志恐怯

遠志

去心薑
汁浸各一

石菖蒲

各五分

茯神木

去皮去根各一

茯苓

人參各一

龍齒

各二

琥珀養心丹

右爲末煉蜜丸如梧子大辰砂爲衣每服臨卧熟水下七十九丸

琥珀

另研

龍齒

炒另研
一兩

遠志

黑豆甘草
同煎去骨各一

石菖蒲

茯神

人參

棗仁

炒各五分

當歸

生地

各七分

黃連

三分

柏子仁五分不

硃砂另研三分不

牛黃另研一分不

右爲細末將半黃硃砂琥珀龍齒研極細以猪心血丸如黍米大

金箔爲衣每服五十丸燈心湯下

定志丸

菖蒲炒

遠志去心各二兩

茯神

人參各三兩

右爲末煉蜜丸如梧子大硃砂爲衣每服五十丸米湯下一方去
茯神名開心散服二錢七分不拘時服

寧志丸

人參

茯神去皮

白茯苓

皮

去

柏子仁

遠志

去心酒浸

凝仁酒浸

當歸 琥珀各半

石菖蒲

硃砂另研

乳香各半

右爲細末煉蜜丸梧子大每服三十丸棗湯下

真珠母丸

珠母

研細七分
小五分

當歸

熟地各一兩半

人參

棗仁

柏子仁

犀角

各一兩

茯苓

各一兩

沉香

龍齒各一兩

獨活湯

獨活

羌活

人參

前胡

細辛

半夏

五味子

沙參

白茯苓

棗仁

炒

甘草

各一兩

右爲細末煉蜜丸梧子大辰砂爲衣金銀薄荷湯下午後卧服時

右爲粗末每服四錢薑三片烏梅半個水煎不拘時服

寒水石散

寒水石

滑石水飛各

生甘草

二分

右爲末每服一錢熱則新汲水寒則薑棗湯下加龍胆草尤佳
加味四七湯

生夏

薑製二
不半

厚朴

薑汁
炒

茯苓

去皮各
一小半

紫蘇葉

枝神去
皮

各一
不半

遠志去
石菖蒲

甘草

名不
半

右薑三片茱一枚水煎不拘時服

人參

棗仁

砂砂

滿乳香

一兩

滴乳香

一小

右爲末，煉蜜丸，彈子大，每服十九丸，薄荷湯下。

八物定志丸

人參

一兩半

硃砂

不

石菖蒲

茯神

遠志

製各一兩

麥冬

去心五小

白朮

不

牛黃

二小

另研

右爲細末，煉蜜丸梧子大，硃砂爲衣，每服五十丸，米飲下。

益榮湯

人參

一

白芍

棗仁

柏子仁

各五分

當歸

黃芪

遠志

甘草

木香

各三分

各一

紫石英

五分

遠志

甘草

木香

各三分

右薑三錢一枚水煎服

茯苓飲子

陳皮 半夏 茯苓 茯神 紫冬各一不半 沉香 甘草各五分

右薑五錢水煎服

簡易濟眾方

白石英 珠砂等分

右爲末、每服五分、金銀湯下。

蠶丸湯

右裏三枚水煎服。

大營煎

當歸五
熟地七
枸杞二
炙草二
川牛膝半
杜仲二
肉桂二
不

右水煎食。遠服寒滯在經。氣血不能流通。筋骨疼痛之甚者。必加附子一二錢。方效。帶濁腹痛。加故紙一錢。炒用。氣虛。加人參。自尤。中氣虛寒。嘔惡。加炒乾薑一二錢。

黃連安神丸

硃砂一
水飛
黃連半牛
酒炒
梟草分
生地
當歸各一

右細末蒸餅爲丸。

礞砂消痰丸

治痰迷心竅。驚悸怔忡。

胆心

五分

礞砂

二分半研

射香

一分另研

細末臨卧薑湯下一

礞砂安神丸

加減一陰煎

二陰煎均見發熱

七福飲

見口

溫胆湯

見虛煩

左歸飲

見消癰

大補元煎

理陰煎

右歸丸

均見惡寒

控涎丹

見臂痛

妙香散

見吐血

羌活勝濕湯

見鼻瘡

十四友丸

眩運

逍遙飲

見鬱

十味溫胆湯

見瘡

恐論

恐之一病與驚相類而實別。自來著述家亦各分詳。惟仲景先生合怔忡而並歸之驚類。論証制治非不詳也。然卒不免混淆者觀之。尚顯自昧。若覽之則渾成一証。豈無悞哉。因不避瑣贅之誚。從而別白之。夫所謂恐者。自有所知。而如人將捕之狀也。彼其坐卧必須伴侶。晦夜必用燈光。無燈光則懼之甚。無人伴則恐之深。正不等於驚之感觸而然也已。况尋厥病由。亦迥別焉。雖統之曰臟腑恐。而有四端之異。其一曰腎經云。在臟爲腎。在志爲恐。又云精氣併於腎則恐。是也。其二曰肝經云。肝藏血。血不足則恐。戴人曰。胆者敢也。驚怕則

胆傷矣。益肝胆寢則怒而勇敢。肝胆虛則善怒而不敢也。其三曰胃經云。胃爲恐是也。其四曰心經云。心忧惕思慮則傷神。神傷則恐懼自生也。噫証既別而發源亦殊。則論証制治斷不可一統之於驚也。明甚。嘗考丹溪治周本心恐懼不寧。兩耳後亦見火光炎上。口乾而不欲食。以人參白朮當歸身爲君。陳皮爲佐。加鹽炒黃柏。炙元參。各少許。煎服自愈。經云。恐傷腎。此用鹽炒黃柏。炙元參。引參歸入補腎。足少陰絡也。由此推之。或發於肝膽。或發於胃。發於心。皆可因類相求矣。而總不離乎虛者近是。觀之本事云。治恐以人參散。安神散。補

祖方。半易通。卷三。之二。其四。丁巳。

賢列哉試從驚與怔忡參之可矣

証治歌

恐病原來有似驚。其中細別不相同。發源臟腑端分四大體。因虛要辨明。治貴補導。多酌意。叫溪治恐是金鍼。人參歸朮爲君藥。佐以玄參及黃柏陳皮。盜制柏參何以故。只緣病發腎虛人。茯神補胆人參散。虛胆之人照最工。由此因門推類治。晉教戰恐一時平。

方

人參散 治胆虛多畏、頭目不利

人參 枳壳 五味子 桂心 甘菊花 茯神 山茱萸

枸杞各七分

柏子仁

熟地各一兩

每服二錢溫酒下

茯神散 治胆虛冷、目眩頭痛、心神恐畏、

茯神一兩

遠志 防風

細辛 白朮

前胡 人參 桂心

熟地

甘菊花各七分

只壳五分

右爲末每服三錢薑三片水煎溫服

補膽防風湯 治胆虛目暗喉痛、夢見被人鬪訟恐懼、

防風一兩

人參七分

細辛

川芎

甘草

茯苓

獨活

前胡各八分

每服四錢棗二枚煎服

健忘論

黃帝曰。人之善忘者。何氣使然。岐伯曰。上氣不足。下氣有餘。腸胃蹇而心虛。虛則營衛留於下。久之不以時上。故善忘也。腎盛怒而不止。則傷志。志傷則善忘。血併於下。氣併於上。亂而善忘。治之者當各從其所由而施之。如思慮過度。病在心脾。宜歸脾湯。有痰加竹瀝。有因精神短少者。人參養榮湯。小定志丸。寧志膏。有因痰迷心竅者。導痰湯。下壽星丸。或加味蒺藜湯。上虛下盛者。補心藥中加升舉之劑。心火不降。腎水不升。神志不安。事多健忘。宜朱雀丸。孔聖枕中丹。常服令人聰明而有素。多善忘者。則菖蒲丸。聖惠之類主之。

金匱要略
卷五
三
証治歌

氣賦人生有濁清。得氣之清知覺明。知覺昏者稟濁氣。此自有生
界。成明者能憶久遠事。昏者目前事輒空身擾乎外。神必散。心粉於
內。命難存。久忘而已。中無主。紛擾健忘須保衰。雖云藥是寧心物。
而如存心養性。主人翁。今謂健忘因病起。思慮過度歸脾湯。君若是
有痰加竹瀝。精神短少須養榮。湯定志有膏偕。小定志。丸健忘藥。內
是良臣。因痰迷緩導痰妙。加味茯苓湯。或壽星。丸上虛下盛宜升舉。
心腎不交朱雀丸。因乳聖枕中丹最妙。服之能使蠹還靈。素多善忘。

方

菖蒲丸 治多忘

菖蒲一
分 茯苓 人參各五
分 遠志七
分

右爲末酒服方寸七日三夜一五日效

聖惠丸

菖蒲 遠志各一
細末戊子日服方寸七、開心不忘、

朱雀丸 治心腎不交、心神不定、事多健忘、

沉香 玄
灰神二
細末蜜丸、每服三十丸、食後參湯下、

加味茯苓湯 治痰迷心竅、多忘失事、

半夏湯 炙皮 白茯苓 益智仁 香附 人參各一

焰

分

五

分

不

炙甘草 生薑烏梅煎食遠服

孔聖枕中丹 治讀書善忘久服令人聰明

蕤板酥 龍骨研末入雞腹煮一宿 遠志 茄精九節等分酒調服

焰

分

一宿

分

九

定志丸 治目不能遠視能近視者

菖蒲二兩 入參 茶芩一兩 遠志

兩

一

兩

右密丸硃砂爲衣、張子和方無菖蒲加茯神柏子仁、酸棗仁、亦名

定志丸酒糊丸暮湯下安神定驚

琥珀壽星丸見驚

歸脾湯見寒熱

人參養榮湯見潮

寧志膏見

尊美易上品

悸病論

悸者怔忡之統名也。其証本無所驚而心自動，儼如物跳之不定。恍如槌擊之有聲，且按之有物，拒之不停。此則所謂怔忡也要其發病之由，不越二者。一曰虛，二曰飲氣。虛者由陽氣內虛，心下空虛，火氣內動而爲之悸也。而血虛者亦然。其停飲者，水停心下，心爲火而畏水。水既內停，心因不安而爲之悸也。抑有汗吐下後，正氣內虛而悸者。亦有邪氣交擊而悸者。丹溪云：怔忡大概屬血虛與痰。有慮便動者屬虛。時作時止者，痰因火動。瘦人多是血虛，肥人多是痰飲。故凡真覺心跳者，治宜四物安神之類。金匱云：食少飲多，水停心下，甚者

則悸微者短氣又云心下悸半夏麻黃丸主之或用溫胆湯或導痰
湯加炒棗仁下壽星丸及茯苓飲子茯苓甘草湯薑朮湯五苓散之
類火盛加黃連脈結代而悸矣甘草湯久思所愛虛耗真血遂成怔
忡養榮湯或感風寒暑濕閉塞諸經而怔忡者各見本門或有陰火
上衝怔忡不已甚者火炎於上或頭暈眼花或齒落髮脫或手指如
許長大或見異物或腹中作聲此陰火爲患也治宜滋陰抑火湯心
不寧者加養心之劑服降藥不效加附子從前或入參芪亦可有失
志者所求不遂或過誤自咎嗟嘆不已若有所失宜溫胆湯去竹茹

者心中常有所歎愛處暗地倚門後見人驚避似失志狀此卑憊之病以血不足故耳宜人參養榮湯脾胃不足者神谷嘉禾散加當歸黃芪各五分此治悸之大畧也

証治歌

悸者無驚心自動惕惕築築卽怔忡其源不外虛與飲血虛痰飲亦須分亦有汗吐而後悸亦有邪氣交擊成因慮而動虛可識時作時止痰火明心跳四物安神主痰水停心溫胆君或用麻黃九茯苓飲或導痰湯加棗仁或用茯苓甘草或薑朮湯或用五苓或壽星火盛加入黃連善脈結代悸甘草湯宗思耗真血養營進火炎抑火湯有

奇功不效更宜加附子參芪亦可類相從因求不遂如有失溫胆去竹茹加柏參更下定志丸以定志仍佐酒調神妙香工痞塞不食

心常歎愛處暗地或倚門見人則驚血不足人參養榮湯可憑脾胃不足何以治神谷嘉禾散最靈汗吐下後宜培養風寒暑濕各門錄

方

半夏麻黃丸

半夏

麻黃

等分

右蜜和丸小豆大每服三丸白湯下

茯苓甘草湯

茯苓 桂枝

桂枝 生薑

甘草

右水煎不拘時服

茯苓飲子

赤茯苓皮去

半夏 薤水炒

茯神木去

麥冬 心去

陳皮 去白名

不半

梔榔

沉香

甘草 炙各一小

右薑三片水煎服

滋陰抑火湯

當歸

白芍根

生地

川芎

黃連

知母

熟地

各一分

肉桂

甘草

各五分

若身如飛揚心跳不安加紫石英人參

各五分

不半

各五分

右水煎入童便半盞食前服

炙甘草湯 治傷寒脈結代心動悸及肺痿咳唾多心中溫溫液液
者寶鑑用治呃逆。

炙甘草

四兩

生薑

三兩

桂枝

一兩

人參

阿膠二兩 蛤粉炒

生地黃

一斤

麥冬

去心一斤

麻仁

半斤

大棗

十一枚

右每服五錢水酒各半煎內阿膠烊化服

神穀嘉禾散

白茯苓皮

去皮一錢 砂仁

炒

苡仁

炒去毛葛

枇杷葉

去毛葛汁炒

人參

各一

白芷炒二桑皮炒

兵部炒

白豆蔻炒

青皮上

卷之二

王味子五不

沉香

木仁

丁罕

寰石

石斛酒
炒

隨風子

半下

舊汁搗和作餅炙黃

大腹子炒

木香

各七分

炙甘草
兩半

陳皮去白

神麃
炒各二分半

右每服三錢薑三片棗二枚水煎溫服五嚥入乾柿一枚膈氣吐
逆入薤白三十粒五枚

四物湯見惡寒

導痰湯見頭痛

五苓散見感冒

安神丸見發熱

定志丸見健忘

神砂妙香散見耳

溫胆湯見虛煩

人參養榮湯見潮熱

壽星丸

羌荳湯見驚

金匱要略

卷五

心經

醫雜論

餽雜之病。何爲而作也。蓋五臟各有所屬。各司其令。一或交戰。則被刑者受病。而爲所迫者。尤受病於先焉。內經云。腎家被損。心懸懸若飢。抑以水不生肝木。木不生心火。致心火之孤陽無附。不安其處。遂爲禍於肺金。而肝中龍雷發動。躍然而右。以刑肺金。反而下之。挾心孤陽之火。熬煎中土。夫一土也。以無生之木。剋之。又以無主之火。熬之。雖靜象也。不能不動。如春土之發生矣。土卽動。則晦火光明。心被鬱矣。火鬱則炎。安得不動而爲餽雜乎。是故水搖動中土。故中土擾擾不寧。而爲嘈雜。每發如飢之狀。恒求食以自救。苟得食而遂止。止

而復作。莫遽使安。此其病狀而病根可探矣。爲尋厥由。總緣土虛不能以勝木。故擾擾也。治宜補土。以止水泛而伐木邪。治痰飲以通經脈。若不以補爲君。務徒攻其不及。久必變爲反胃。爲渴。爲痞滿。爲眩運等病矣。故脈洪大者。肝火多。二陳湯加薑汁。炒山梔黃連主之。脈滑大者。必痰多。二陳湯加南星瓜蔓黃芩黃柏梔仁主之。肥人嘈雜。二陳湯少加川芎蒼朮白朮炒梔仁主之。身倦怠者。六君子湯加川芎蒼朮白朮薑汁炒梔仁主之。或有因用消炎藥過多。飢不能食者。飲食之時。勿與以食。只服三聖丸。心下嘈雜者。導飲丸。最妙良方。

云嘈雜一証或作或止其爲病也腹中空虛似飢非飢似辣非辣似痛非痛胸膈懊惱莫可名狀或得食而暫止或食已而復作或兼惡食而漸見冒脫作痛此蓋有火餧有痰餧有酸水浸心而餧大抵食已卽飢或雖食不飽者火也似飢非飢不喜食者痰也酸水浸心戚戚膨脹食少無味此脾氣虛寒水谷不化也有誤用消伐等藥以致脾胃虧損血少嘈雜此宜專養脾胃如脾虛微火多痰者宜和中湯或三聖丸或尤連丸若中焦多火兼痰而餧雜者宜軟石膏丸若宿食留飲而餧雜者宜麴丸丸若三焦火盛濕痰氣滯宜三補丸加牛夏苓丸香附之類若脾胃虛寒餧雜必多吞酸或兼惡食此皆脾虛

不能運化。不得妄用寒涼等藥。若多痰飲。或兼嘔惡者。服宜二陳湯。或二朮二陳湯。若寒痰停蓄。胸膈脹滿。少食。宜和胃二陳煎。和胃飲。或溫胃飲。或六君子湯。若脾腎陰分虛寒。水泛爲飲。作酸餽雜者。宣理陰煎。或金水六君煎。是故經曰。腎虛者。心恒懸。若飢。金水理陰之類。蓋所以補腎也。前言先補脾土。何爲哉。亦曰。腎虛則水泛。補土以止水流。所以資補乎腎也。參矣。治本之意。盍於此求之。

証治歌

肺受火傷木難平。木挾火熱將土刑。以致中土常擾擾。故爲嘈雜如飢形。得食便止已復作。病分炎火兩相侵。食已卽飢爲有火。脈共火。

盛宜二陳湯加入梔子與薑汁或用三聖丸亦靈。飢不欲食煥創病
二陳加梔仁黃柏瓜萎黃芩南星肥人更加芍二白尤身倦大君加
梔子更加薑汁梔仁善水浸心脾主四君加黃連陳芍和薑汁服之
卽許保安寧懸懸飢若宜三聖或施導飲尤有奇功更詳景岳論治
法痰火虛寒別最明脾虛微火尤連丸進或投三聖或和中中焦多
火兼餽雜軟石膏丸效最神宿食留飲宜麴尤火盛三焦三補因脾
胃虛寒二陳二尤寒痰停蓄宜六君二陳和胃兼溫胃任是痰凝一
掃空水泛理陰或金水定從死處更回生

方

三聖丸

白朮四兩

陳皮一兩

黃連炒五兩

細末神麩糊丸薑湯下

導飲丸

茱萸三不

茯苓

蒼朮一兩

黃連五不

獨活七分

神麩和丸服

二朮二陳湯

薺朮

白朮

陳皮

半夏

茯苓

分一

炙甘草

五分

右菖三瓦秦二枚水煎服虛寒者加人參煨薺痰飲加南星倍半
夏宿食加神麩砂仁

三聖丸

右爲末生薑另煮神麃糊丸薑湯下

軟石膏丸

石膏

煅

半夏
製南星

炒香附

枝仁

炒各等分

右爲末米粥丸梧子大每服五十九薑湯下

朮連丸

白朮

炒四兩

黃連

薑汁炒一兩

右爲末神麃糊丸黍米大每服百餘丸薑湯下

金水六君煎 治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛血氣不足外受

風寒咳嗽嘔惡多痰喘急等証神效

當歸

二分 熟地

五分 陳皮

小半 半下

二分 茯苓

一分 秋草

右生薑煎食遠溫服如大便不寔而多濕者去當歸加山藥如痰盛氣滯胸膈不快者加白芥子七八分如陰寒盛而嗽不愈者

加細辛五七分如兼表邪寒熱者加柴胡一二錢

和胃二陳湯 治胃生痰惡心嘔吐胸膈滿悶嗳氣

干薑 砂仁 陳皮 半夏 荀苓 甘草

四君子湯

見疊髮

三補丸

見發熱

二陳湯

六君子湯

均見咳嗽

和中湯

見中

和胃飲

見傷寒

溫胃飲

均見惡寒

理陰煎

喜笑不休論

喜笑皆屬心火。經曰：心藏神。神有餘，則笑不休。又云：在臟爲心，在聲爲笑。在志爲喜。又云：精氣並於心，則喜。又云：火太過爲赫曦。赫曦之紀，其病笑狂妄。又云：少陰所至，爲喜笑者是也。戴人治一人，以滄鹽成塊者，三兩餘用，火燒令通赤，放冷研細，以河水一大碗煎至五六沸，放溫，三次啜之，以針通於喉中，吐出熱痰五升，次服降火之劑，火至苦解毒是也。若笑不休，口流涎，用黃連解毒湯加半下竹葉竹瀝薑汁。薛氏云：其人唇口赤色者可治。青黑者死。若腎水虧涸，不勝心火，而喜笑不休者，用六味地黃湯。肝火熾盛，能生心火，而喜笑不休。

者用柴胡清肝散或八味逍遙散餘兼別証各從其証而叅治之
証治歌

喜笑原來心所生。不休心臟有餘神。較人治以滄鹽煩河水煮湯。壯
最工。吐後即將降火劑。取其解毒有殊功。抑有不休口涎沫。黃連解
加半夏竹瀝薑汁乘。昏亦可治舌黑死。腎水虧涸火炎心。治用地黃
湯六味。肝火盛熾柴胡清。肝散八味逍遙亦妙劑。餘兼別治細推尋。

方

黃連解毒湯

六味地黃湯

均見發熱

柴胡清肝散

見耳

八味逍遙散

見寒熱往來

怒論

怒屬肝膽。經云在臟爲肝。在志爲怒。又云肝藏血。血有餘則怒。又云胆爲怒是也。丹溪治怒方。香附六兩甘草一兩和勻。白湯調服。五大法以悲勝之。或用藥益肺金以平肝木。此取相生相剋之道。隔一隔二之治法也。甚宜詳之。

証治歌

怒屬肝經。血有餘。丹溪治法可精思。和勻香附兼甘草。滾白湯調服。自如。大法以悲相勝。恒平肝益肺。藥調施。相生相剋須斟酌。甚怒難舒也。自舒。

金匱要略

卷五

pp

善大息論

運氣而善大息。皆屬燥邪傷胆。經云。陽明在泉。燥淫所勝。病善大息。又云。陽明之勝。大息嘔苦。又云。少陰司天。地氣燥烈。淒愴而促至。脇痛。善大息是也。黃帝曰。人之大息者。何氣使然。歧伯曰。思憂則心急。心系急則氣道約。約則不利。故大息以出之。此其治也。宜補手厥陰。及足少陽。而酌以利氣之藥。宜無不效焉。

誑治歌

大息何來屬燥邪。抑因運歲起客噬。胆經被損因嘔泣。憂思傷心亦動呕。此病發時何以治。陰陽手足補無差。氣還酌利詳施藥。証的方。

工怎不瘥

方

半下湯 治胆腑寢熱。精神恍惚。寒濕瀉泄。或煩汗憎風。晝大烏。

半下一不
五分

黃芩 遠志

各一
不

生地二
分

秫米一
合

棗仁

炒三
不
千薑
一分

右長流水煎服

悲屬肺經云在臟爲肺在志爲悲又云精氣併於肺則憇仲景云婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之張子和云悲哭者肺之聲淚者肺之液也若六脈弦緊者先以溫湯浸其身取汗次以涼膈散以清其內熱薛氏云若肝火炎熾反侮肺金金木相擊故悲哭有聲宜用六君子加山梔柴胡以補脾清肝六味丸以壯水生木此法殊爲至當

証治歌

悲泣由來屬肺經精氣併肺發悲聲婦人臟燥喜悲哭甘麥大棗湯

投仲景云肺液肺聲六脈緊溫湯取汗涼隔清子和治法專於此薛氏療悲用六君更入梔柴補脾土再將六味丸壯元陰益因肝火炎傷肺金木相刑此治工

方

甘麥大棗湯

甘草

三兩

小麥

一升

大棗

十枚

右水煎溫分三服

涼膈散見發熱

六君子湯見咳嗽

六味丸見發熱

胸痛論

經云。南風生於夏。病在心俞。及胸脇。又云。仲夏喜病胸脇。此則胸連
脇病。則屬心也。肝虛則胸痛引背。不得轉側。喜大息。又云。脣脈如弦。
其氣不寔而微。此謂不及。令人胸痛引背。下則兩脇脹滿。此肝虛而
脈証見於脊者如此。宜補肝湯。金匱云。肝中寒者。兩脅不舉。舌本燥。
喜大息。胸中痛。不得轉側。食則吐而出汗。且肝著寒。其人常欲暗其
胸上。先未苦時。但欲飲熱。旋覆花湯主之。素問曰。陽明所謂胸痛短
氣者。水氣在臟腑也。水者陰氣也。陰氣在中故痛。輕者五苓散主之。
杜工部治胸脇痛。徹背心腹痞滿。氣不得通。作痰飲治之。用桔梗丸。門

斗方治胸膈壅滯去痰開胃用半下丸此皆因証變通厯厯有驗者也。如或因外感風寒內傷生冷身熱無汗項背拘急胸滿惡食則以五積散主之。因酒食生痰胸膈膨悶宜順氣消食化痰丸。若胸中不利按之則痛宜小陷胸湯。七情氣鬱宜四七湯。更有陰陽壅滯氣不宣通故胸悶而痛宜木香順氣湯又有六鬱胸膈澀痛吞酸嘔吐則用越鞠丸。胸腹積滯痞滿結痛大便不通木香枳榔丸或因心下有痰飲可用桂苓甘朮湯。邪入少陽寒熱往來胸脇痞痛是少陽脈下脇循胸宜小柴胡湯。手厥陰脈起自胸中包絡有熱則胸痛及胸中有熱而欲吐者葛黃丸主之。如心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中

腎脾

寒氣上冲皮起出見頭足上下痛而不忍觸近者大建中湯之客
胸中陽氣不振冷痛喜按宜附子理中湯加廣香砂仁藿香如中氣
下陷清氣不升濁氣不降故真寒胸中而作痛宜補中益氣湯加厚
朴 告夫心下滿而不痛爲痞心下滿而痛爲胸痺蓋胸中者心肺
之分故喘息而咳嗽諸陽受氣於胸中轉行於首喻嘉言曰胸中如
離照當空曠然無外設地氣上則窒塞有加是知胸痺者陰氣上逆
之候也可以脈息辨之如寸口脈沉而遲關上小緊數可用桔梗薤
白白酒湯甚則用附子乾薑以消其陰參觀金匱治胸痺法氣舉而
短治以茯苓甘草杏仁湯或橘枳生薑湯主之胸痺而氣或急可用

薏苡仁湯。支飲胸瀉者枳朴大黃湯。若胸痺不得卧心痛徹背。栝薑薤白半下湯。胸痺心中痞留氣結胸下搶心。枳實薤白桂枝湯。或人參湯亦可用也。上所云栝薑丸最能蕩滌胸中垢膩。世醫不知胸痺爲何病。習用草蔻木香訶子山稜神曲麥芽等藥愈散胸陽良可哂也。

証治歌

附胸痺

疼痛何由病在胸。肝虛故痛補肝湯。肝寒舌燥皆難舉。吐汗飲熱旋覆花湯。逢水氣礙停胸亦痛。五苓散主有殊功。病由痰飲痛連背。心腹痞滿氣難通。瓜蔞爲丸能速進。米泔飲下病旋鬆。一方半夏爲。

痰當順氣法宜消食化痰壅。胸中不利按之痛。小陷胸湯用不憎。七情氣鬱湯四七陰陽氣滯不宣通。木香順氣湯難棄積滯。木香板榔
善厥躬因鬱吞酸胸滿脹丸投越鞠法非庸。痰壅心下脹而痛。茯苓桂枝白朮甘草湯可從邪入少陽寒復熱。小柴胡進保無凶。心包絡脈自胸起。証欲吐兮夾熱烘。药不符証病莫解。煮黃丸進白清衷。痛
膈難食氣寒逆。皮起寒沖頭足蹠。上下痛疼難觸近。湯投大建中法
非空。胸陽不旺喜揉按。附子理中砂仁蔻香同氣。陷補中益氣好。宜
加厚朴始寬容。消而不痛乃名痞。消若痛兮胸痺分。心肺胸中乃分。

屬諸陽受氣於胸中。曠然無外如離照。窒塞皆由地氣衝撓以脈憑治不妄。沉遲寸口不相蒙。小而緊數見閑上。可進括蔞薤白白酒醴。病甚何方可解釋。薑附消陰效絕倫。莫嫌辛熱猶疑用。致令陰寒氣上攻。金匱有方調氣短。茯苓甘草杏仁充。或投橘只生薑湯好。薏苡石湯活不窮。胸痺不眠心徹背。括蔞薤白半夏酌盈鍾。心中痞滿氣留結枳寃薤白桂枝湯免忡。或進人參湯合法。若調支飲枳朴大黃。達上云括蔞連皮妙。或煎或丸皆可宗。胸痺庸醫曾不識。習用木香草蔻神麴麥芽山稜。胸陽耗散愈加病。殊令人譏孟浪翁。

脈

胸痛脈多見於寸口微細沉遲寸兼關尺胸陽不起兼真陽不足洪大而數。寔熱之候滑而數痰飲停塞右關沉滯或大而不暢皆飲食有傷左關寸口浮緊兼屬外感。

方

木香順氣湯 治濁氣在上則脹滿兩脇刺痛脈弦而細

廣香

蒼朮

草豆蔻

麴裹煨各三分

厚朴

薑汁炒四分

青皮

益智仁

陳皮

澤瀉

白茯苓去皮

半下

乾薑

吳茱萸

湯泡各三分

當歸

升麻

柴胡各一

右水煎食前溫服忌食生冷硬物

橘枳生薑湯

橘皮一斤

枳寃三兩

生薑半斤

右水煎溫服

枳朴大黃湯

厚朴一兩

大黃六兩

枳寃四枚

右水煎溫服

人參湯

白朮 人參 乾薑 甘草各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服

小陷胸湯 治傷寒誤下小結胸 卫石丸似之 胸痛脣青舌淡

熱塞胸

黃連一兩

半夏半斤

桔梗一枚
大者一枝

右水煎分溫服

桔梗薤白白酒湯 治胸痹喘息咳唾胸背痛短氣

桔梗一枚

薤白三兩

白酒四升

右水煎分溫再服

桔梗薤白半夏湯 治胸痺不得卧 心痛徹背

桔梗一枚

薤白三兩

半夏八兩

白酒一斗

右同煎至四升溫服一升日三服

枳實薤白桂枝湯 治胸渾氣結在胸胸滿脇下逆搶心

枳實四枚

厚朴四兩

薤白八兩

桂枝一兩

栝蔞一枚搗

右先以水煮厚朴枳實至半去滓納諸藥煮數沸溫分三服

旋覆花湯

旋覆花

半夏

吳茱萸官桂

乾薑

枳榔

人參

當歸

白朮

炒甘草

各五

棗皮

右㕮咀每服一兩煎引水煎服

茯苓甘草杏仁湯

茯苓

三兩

杏仁

五兩

甘草

一兩

右以水一斗煮取五升溫服一升日三服

桂苓甘朮湯 治心下有痰飲胸脇支滿目眩

茯苓

四兩

白朮

三兩

桂枝

三兩

甘草

二兩

門斗方 治胸膈壅滯去痰開胃

半夏

洗

右爲末取生薑自然汁和丸彈子大益半分煎取半盞溫服

補肝湯

煮黃丸

均見脇

五積散

大建中湯

附子理中湯

均見脇

順氣消食化瘀丸

慧苡仁湯

四七湯見咳嗽

五苓散

見感冒

越鞠丸

見齒

小柴胡湯

見潮熱

補中益氣湯

見發熱

木香槟榔丸

見心胃

丹溪治一人。膈有一点相引痛。吸氣皮覺急。用滑石一兩。桃仁五錢。枳壳炒一兩。黃連炒五錢。炙甘草五錢。爲細末。以蘿蔔汁煎熟飲之。一日服五六次。

又治一人。因喫熱補藥。又妄自學吐納。以致氣亂血熱。嗽血消瘦。遂與行倒倉法。今嗽血消瘦已除。因喫炒豆米。膈間有点氣梗痛。似有一條系垂映在腰。與小腹亦痛。大半偏在左脅。此肝部。

有活血行木盡也。用清石一兩，黃丹三錢，桃核一枚，黃連五錢。
生甘草二錢，紅花一錢，柴胡五錢，桃仁二兩爲末。每服一錢半。
以蘿葡汁煎沸服之。



一人新正飲酒過傷。忽胸痛不大甚。初以正氣天香散加乾葛砂
不效。因思胸至高也。非枳榔不能調此高上之氣。以六君子
湯加枳榔枯梗砂仁括壅。一劑見鬆。二劑見減。後未病而愈。
一人因胸痛。忽不知人。予視其脈沉遲。而小口更甚。知其胸痙攣。
也。以附子理中湯服之愈。

瓜萎丸

大瓜萎

去穰取子連皮炒熟研

和丸梧子大每服五十丸米飲下

半夏丸

半夏一兩

枳榔

雄黃各三錢

右爲末薑汁浸蒸餅爲丸梧子大每服三十九薑湯下

局方桔梗湯

桔梗

枝仁

黃芩

薄荷

竹葉

連翹

甘草

右水煎服

痰與飲同類而寔異。痰稠飲稀也。嘗考內經祇有積飲之証。無痰証之名。而其名自仲景始。何內經不重痰而忽之也。蓋以痰之爲病。必有所以致之者。雖有風熱濕與氣寒之分。而究其發端。必因有病而生。非病之因痰而致也。類經之不言痰。正以痰非病之本。而爲病之標耳。其本惟何。則在脾腎。經曰。飲入於胃。游溢精氣。上輸於肺。肺氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。安有所謂痰哉。惟脾氣不足。飲食不能運化。則停積凝滯。積久則如溝渠壅遏。淹久則倒流逝上。汚觸臭穢。無所不行。是痰之生。皆起於脾之濕。濕

動則爲痰而究未有不由於下原之火衰者。假令火旺則土燥。白能制水。有何痰之病哉。惟其火衰不能生土。使土不制水。陽不勝陰。水反侵其土。遂泛而爲痰矣。是痰之本。悉歸脾胃。然推而廣之。五臟又各有痰。凡濕在肝經。謂之風痰。脈弦面青。四肢澀悶。便溺秘澁。心多燥怒。是宜川芎防風丸主之。濕在心經。謂之熱痰。脈洪面赤。煩熱心痛。唇口乾燥。多喜笑。是宜小柴胡湯加半夏主之。濕在脾經。謂之濕痰。脈緩面黃。肢體沉重。嗜卧不收。腹脹而食不消。是宜白朮丸主之。濕在肺經。謂之氣痰。脈澁面白。氣上喘促。洒淅寒熱。悲愁不樂。是宜玉粉丸。或局方桔梗湯主之。濕在腎經。謂之寒痰。脈沉面色黧黑。小

是故痰雖分出五臟而總不離乎濕。主濕者脾也。是歸源則仍在於脾。治法則當視其脾之虛與未虛而斟酌之矣。使非大虛但去其濕滯而痰自清。宜二陳湯。若結鬱怒傷脾因而生痰。宜四七湯。若木來剋土。脾虛失其健運以致生痰。則用柴芍六君子湯。或爲飲食所致。則神麴麥芽有必用也。然亦不可過度。皆脾氣虛寒。其証必食減。神倦。或兼嘔惡痞悶。宜六君子加附子炮薑。或附子理中湯。加法夏茯苓。又有蹲坐處率吐痰涎滿地。其痰不甚稠粘。祇是沫多。此乃氣虛不能攝也。不可用利藥。亦宜六君子。加益智仁以攝之。然痰之化雖

在於脾而痰之本。寔在於腎。故有陰血不足。陰火上逆。肺受火侮。不得清肅下行。由是津液不生。血而凝濁生痰。此當以潤劑調也。輕用金水六君煎。重用左歸丸。或陰煎加白朮陳皮枸杞之類。以滋其陰。使上逆之火得返其宅。而息焉。而痰自清矣。若投以二陳。立見其殆。有腎虛不能納氣歸源。則水液妄行。其痰涎起自膀胱衝而上。此痰隨氣上。非八味右歸等丸。不能有濟。至如飲証。亦非一端。有飲後水流在脣。咳唾飲痛。謂之懸飲。宜小冒丹飲。水流行歸於四肢。當汗出而不汗出。身體痛重。謂之溢飲。當發其汗。小青龍湯主之。咳逆倚息短氣。不得卧。其形如腫。謂之支飲。又云。嘔家本渴。今反不渴。心下

金匱云。其人常盛。今渴。走腸間。流澼有聲。謂之痰飲。當以溫藥相
之。是治飲亦當溫養爲本。原氣曰強。則飲自消。若專從事於攻擊而
不知固本。則惑矣。

証治歌

癥原與飲不同傳。飲獨清稀痰濁稠。痰飲何經因起壅。只因脾腎濕
浮浮。推之五臟皆留濕。留濕生痰要細籌。心經痰濕面紅赤。唇燥心
疼色少憂。古製小柴胡。湯可服須加半夏。病隨休風痰肝主。面青悶
便秘。川芎防風湯可投。脾主濕痰脹嗜卧。面白黃白尤宜求。氣痰肺

病面面白喘熱寒憂玉粉丸修或用局方桔梗湯主細心擇用免人尤寒痰面黑腎經病驚恐足寒急痛澳薑桂丸投正合病理中椒入是嘉猷痰雖五臟濕生起不越腎脾濕積留脾主濕兮痰蕩動亦分虛寔有緣由脾非虛甚二陳好挾鬱生痰四七優木尅土衰君子六柴胡加入把肝疏停傷飲食痰因動神麴麥芽加乃麻減食大虛神倦怠六君薑附火無愁理中附夏雲苓入投卽安康不待謀依此治之無不效何須參酌費心惆坐隨地處吐痰滿需進六君益智收痰雖脾化本由腎陰火上逆肺受痏治法別無他妙巧投宜潤劑自無漫液生痰濁水尤泛金水六君煎輕止流重用左歸丸合病理陰加

丸陳皮瘳。腎難納氣不歸海。八味右歸丸。第一籌飲亦條分非一轍。飲而脇下水波浮。咳連引痛名懸飲。小胃丹投解悶。飲水流歸手足。汗無或有體疼痛。名稱溢飲汗宜發。用小青龍飲可搜。嘔必渴多反不渴。卧難息短狀如浮腫。病名支飲何方進。小半夏湯功可收通法桂苓甘朮湯妙。或投五飲湯樂悠悠。

脈

凡痰脈多滑。然緩屬濕痰。滯屬氣痰。洪屬熱痰。沉屬寒痰。浮弦屬風痰。

方

川芎防風丸 治一切風痰及痰熱上攻、頭痛惡心、項背拘急、目眩、旋運心恆煩悶、手足無力、骨節疼痛、言語蹇澁、口眼瞤動、痰涎壅塞、昏憒健忘、虛煩少睡。

防風洗

川芎

天麻酒浸一宿

炙甘草各二兩

硃砂

研五分水飛

右爲末蜜丸以硃砂爲衣每服一丸荆芥湯化服酒嚼下亦可

白朮丸 治濕痰咳嗽

南星

半夏各一兩俱湯洗

白朮一兩半

右爲細末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服五七十丸食後生薑湯下

薑桂丸 治寒痰咳嗽

右爲細末、蒸餅爲丸梧子大、每服三五十丸、食後生薑湯下、痰而能食、大承氣湯下之痰不能食、厚朴湯主之。

小黃丸 治熱痰咳嗽

白芷 半夏 黃芩 各一
兩

右爲末、薑汁浸蒸餅爲丸梧子大、每服五七十丸、食後生薑湯下、理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停、嘔吐少食、大便不寔、咳嗽痰涎此屬中氣虛弱不能統涎歸源也。

人參 白朮炒 乾薑 炮 炙甘草 白茯苓 半夏 薑
藥 煎分

右爲末水丸梧子大每服四五十丸白湯下

小胃丹

芫花

好醋拌勻過一宿於瓦器內不甘遂濕麪裹長流水

甘遂

浸半月煑晒乾

大戟

各半手攬炒令微黑不可過燒
長流水煮二時
晒乾各五分

大黃

濕紙裹煨勿令焦焙乾以酒潤炒熟焙乾一兩半

黃柏

炒二分

右爲末以白朮膏糊丸梧子大卧時津液吞下或白酒湯送下取
膈上熱積濕痰以意消息之欲利空心服一方加木香枳榔各
五錢

五飲湯 治五飲極效

旋覆花

人参

陳皮

去白

枳實

白朮

茯苓

厚朴

薑

半夏湯
洗

澤瀉 猪苓

前胡 桂心

白芍

參草分

右一兩分四服薑十片水煎溫服因酒成飲者加葛根葛花砂仁

小半夏湯 治一切痰飲

半夏
一斤 製 生薑
入兩

桂苓甘此湯
見胸

二陳湯 柴芍六君子湯卽

六君子湯
即柴

左歸丸
均見咳嗽

胡椒理中丸

附子理中湯

理陰煎

右歸丸

小青龍湯
均見惡寒

小柴胡湯
見潮熱

八味丸

見發熱

玉粉丸
見咽喉

局吉更湯
見胸痛

一人素有痰疾。因途受風寒。忽口吐痰涎。凡時滿地。脈浮。以理中化痰丸加附子防風細辛畧平。繼進藿附六君子湯。加益智仁。二劑愈。

一人素中寒。忽發舊病。冒中痛。而吐痰咳嗽。用胡椒理中湯。加附子香附益智仁。數劑諸証悉平。

一人吐痰咳嗽不已。脈浮而緊。用金沸草散愈。

一人善飲嗜食。清晨氣逆痰多。乃飲食停胃之故。以順氣消食化痰丸數劑愈。

準繩曰。格則吐逆。上竅五臟陰極自地而升。是行陽道。乃東方之氣。金石之變。上壅是也。極則陽道不行。反閉於上。故令人吐逆。是地之氣不能上行。逆而下降。反行陰道。故氣壅塞而不入。而氣口之脈大四倍於人迎。此清氣反行濁道也。故曰格。黜則不便。下竅六腑陽極自天而降。是行陰道。乃西方之氣。膏粱之物。下泄是也。極則陰道不行。反閉於下。故不得小便是天之氣。不得下通也。逆而上行。反行陽道。故血脉凝滯而不通。而人迎之脈大四倍於氣口。此濁氣反行清道也。故曰閉。或問閉格之病因何如。曰內經以臟腑陰陽之病。診見

於外則在人迎氣口謂人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛以上爲格陽寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛以上爲閼陰此以陽盛爲格陽陰盛爲閼陰則以閼格分爲二脈不知陰關則陽格陽閼則陰格故脈經有云閼之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚際爲外關內格此陰乘之脈也其註外閼內格謂陽外閼而陰內格也其爲病內寒吐食閼以后陰之動也脈當見一寸而沉過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆內關外格此陽乘之脈也其註內關外格謂陰內關而陽外格其爲病內熱而大小便閉此以陽盛則

陰陽格。陰勝則陽關。陽格兼在尺寸二部。言之不同。以人迎氣口言之人。迎脈盛四倍。曰格陽。氣口脈大四倍。爲關陰。然此關格二字。乃言其病証治法。非言脈也。亦何必繁引而曲喻乎。世多妄以小便不通爲格。太便不通爲關。泛指在下陰陽二竅爲言。噫。抑何愚哉。抑思關格之名義。格者拒格其外入者不得納。關者閉塞其內出者不得泄。豈不明且悉乎。而醫歧子云。陰陽易位。病名關格。胸膈以上。陽氣常在。則熱爲主病。身半以下。陰氣常在。則寒爲主病。塞反胸中。舌上有白脂。而水漿不下。故曰格。格則吐逆。熱在丹田。小便不通。故曰閉。閉則不得小便。胸中有寒。以熱藥治之。丹田有熱。以寒藥治之。

若胸中寒熱兼有。以主客之法治之。主本熱而客寒。治主當緩。治客當急。此言關格二証則未錯。寒熱爲主。則又大泥。然關格何法以治之。丹溪云。必用吐。提其氣之橫格。不必在出痰也。又云有痰。二陳湯吐之。吐中便有降。中氣不運者。補氣药升降。此蓋窃其治小便之法而治關証。蹈世俗之弊而不悟。悲夫。稽趙氏治滴水不下。竊仲景治少陰厥逆。乾嘔無脈。白通加人尿猪胆汁湯。此証幸脈沉伏。作格陽。沿設脈不沉伏。空虛不附骨。亦可竊此方乎。然則關格果何法以治之。總以脈辨之。凡兩寸口脈如革洪大異常。按之有力。予曾診過果天數倍。不得誤認爲火。有吐或有小便不利。即是關格。須當審其陰。

陽切關尺一卻兼以左右尺參之。左右寸上脈洪大有力而關尺沉小。右尺亦沉弱。即是陽虛。可用八味丸。或右歸丸。如或關尺皆浮大空虛不附骨。左尺亦空虛。即是陰虛。可用六味地黃丸。或左歸丸。若陰陽平虛。十全大補湯。此關格一定之法也。

証治歌

不通小便謂之關。嘔吐不寧格証。難關格上危。下亦急。法宜憑脈細推勘。人迎六腑陽能察。氣口究陰五臟間。氣口脈來至四倍。元陰無主名陰關。所謂關陰者人迎四倍脈來大。病名陽格思宜三。所謂陽陽關於陰格於氣口八迎均四倍。數而且大甚至四倍。名稱關格可詳觀。病逢關格每常

異病有由生慾縱貪治法欲求方對証陰陽二字細推參陰虛六味地黃好。左歸丸進是金丹。陽弱多寒丸八味右歸丸進用心採氣虛血弱禁偏勝大補十全非等閒。醫者遇斯脈與証務期細究莫狂談。

脈

左寸脈大四倍是關病右寸脈大四倍是格証左右均大四倍名關格。

方

白通人尿加猪胆汁湯 治少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔而煩服此湯後脈暴出者死微續者生

腹痛者眞陰不足也去慾加芍藥二兩以斂陰嘔者加生薑二兩以散逆咽痛者加桔梗一兩以利咽、利止脈不出者加入參二兩以助陽

六味地黃丸

八味丸 十全大補湯

均見發熱

一陳湯

左歸丸

均見咳

右歸丸

見惡寒

關格一証最易忽畧。予有孫女病忽大小便不通不思飲食切其脈而寸洪大有力而異常。予以爲火結心肺致有大小便塞。

之証進加減一陰煎未效。或謂病重藥輕。子曰非也。此必關格之病。药不對証故也。細思關尺微小而緩。乃知陽虛無疑。進八味地黃湯。凡時間果大小便俱通。而思飲食。噫。古人真不余欺也。愈知醫者。凡遇便閉嘔吐。而寸口脈獨洪大異常。切莫作火証治而貽誤也。

○ 嘘膈論

嘔膈與反胃。証雖畧同。而病寔迥異。嘔者。飢欲得食。但嘔塞阻逆於咽喉。胸膈之間。在胃口之上。未曾入胃。卽帶痰涎而出。此丹溪所以謂其血液衰耗。胃脘乾槁。其槁在上。近咽之下。水飲可行。食物難入。入亦不多。名之曰嘔。其稿在下。與胃相近。食雖可入。難盡入胃。良久復出。名之曰膈。惟男子及年高者有之。婦女少壯則無。蓋男子以陽爲主。陽有餘而陰常不足。老人天真竭絕。只有孤陽。女子以陰爲主。血盈充溢。少壯氣盛血強。故無此疾。反胃則無分於男婦老少。莫不有之。嘔膈之吐與反胃亦不同。反胃者每食必吐。止吐原物有食則

吐盡。嘔膈。或食或痰。或白涎酸水。或多或少。或初病微吐。久之屢作。或吐出糟粕。非痰。非食。非血。若醬汁然者。此嘔膈之吐。與反胃有不同也。原其病之作也。或六淫七氣飲食房勞。剝喪其陰所致。以予觀之。則因於酒者獨多。夫酒雖養陰而寢陽也。醉多亂性。以致大怒傷氣者有之。况酒易動陽。醉後入房者。亦復不少。不寧惟是。人有素知廉恥者。一至於醉。則如狂如痴。與人少婦幼女。糊言手舞。恬不以爲耻。甚至縱淫敗度。盡喪真陰而不顧。莫非酒之所貽疾乎。屢見善飲而病噎膈者。十有八九。噎食一証。在內經原無多語。惟曰三陽結。謂之膈。三陽者。大腸小腸膀胱是也。結乃熱結也。大陽主津。小腸主液。

大腸結則津涸。小腸結則精燥。膀胱爲州都之官。津液藏焉。膀胱結則津液竭。歷觀古之名醫。均以爲熱。劉河間治噎食。用承氣二黃湯。張子和以三陽之結。盡論爲熱。丹溪大闢局方之非。而以香薷偏取助。獨景岳以爲寒。而屬陰。蓋以命門無火。氣不化精。所以凝結於下。而治節不行。更以天人之理証之。以天人之所同賴者。惟此陽氣而已。故經曰。天氣清靜光明者也。又曰。陽氣者。若天與日。失其所。則折壽而不彰。故天運常以日光明。由此言之。則六合清和。上此太陽爲之用。故陽氣盛。則溫煖光明。而萬物咸亨。非清和平。陰氣盛。則風羣晦冥。而升沉閉塞。非不清和平。且春夏萬物之盛。非陽盛之化乎。

秋冬萬物之衰。非陽衰之兆乎。人之所賴以生者。亦惟此陽耳。此論初閱之下。未嘗不加欽服。細揣之。此論以之論平人。全賴陽以生。則得矣。以之論三陽之結。則未可。信以爲是也。及觀其所論治條。大便閉甚。必用大黃一語。陰結者。何反用此寒涼以推蕩乎。人謂其前後之矛盾。予則謂其驅人於陷阱之中。尙幸開一面之網者。正此語也。今夫醫道。本以生人爲懷。著書立說。無非欲爲後人之章程。起萬世之沉疴。雖罪我責我。予亦不能辭。而忍緘口以貽慮。夫所謂陰結者。在雜証有之。而在噎膈而結者。緣津竭液枯而致。今反以爲陰結者。之人。或無識見。看書而泥者。執此陰結之說。則附子硫黃大熱等藥。

無一不至。抑思壯火食氣，謂充養急，愈燒則陰愈耗而益甚，亡可憐。
足而待。不幾驅人於陷阱之中乎。此陰結之一語所貽誤也。或遵其
論治，結甚而用大黃，則燥去而結開，繼進潤養，或可挽回於萬一。所
謂開一面之網者在此。夫結甚用大黃一語，但理以精而可遵，药以
平而合宜，而以此病謂之陰結，則非也。即以爲陽結，而以大承氣施
之於精竭者，恐亦太峻而傷陰。不思註本陰虛生熱，惟有玉燭散及
當歸潤腸丸，蕩熱滋陰之平劑可也。以故治下焦之閉結，其責在腎。
腎主津液，而腎之化氣主乎二陰。治腎者，宜從滋潤上焦之噎膈，其
責在脾。脾主潤化，而脾之大絡布於胸膈，况血生於至陰，至陰者脾

也。治脾者宜從扶養。然亦有病之初起。體未甚虛者。亦有虫膈血膈。痰盛而莫止者。或有火熱而上逆者。豈可屏置而不講。如因火逆衝上。食不得入。其脈洪大。有力而數。宜滋陰清膈散。加枇杷葉二錢。蘆根一兩。或痰飲阻塞。而脈結澀者。二陳湯。入竹瀝薑汁。痰多飲食纔下便爲痰涎裹住。不得下者。初起體甚未虛者。以控涎丹控其痰涎。自製滌痰丸。如氣有不順。上焦多滯而脹滿。以二陳湯加厚朴。如壅塞喉間。似屬氣壅。用香砂寬中湯。如服耗氣之藥過多。中氣不運。而致者。當補氣。宜補氣運脾湯。如有虫在胃中。耗散津液。致咽燥飲食不下。則宜剪紅丸。有蓄血在膈。致食不下。亦用代抵當丸。畏其太峻。

首有不出者。則宜橘皮飲。大便燥閉。結如羊屎者。可用玉燭散。當歸潤腸湯。或人參利膈與通幽湯。恐利多傷陰。反加乾渴不者。生薑汁煎爲上乘。總之。主治之藥。脾胃之外。無別法。脾虛宜四君子湯。五君子煎。以溫養之。氣血兩虛。莫若十全大補湯。陰陽平補。王道之聖药。陰虛。可用左歸飲。大補元煎。加入乳白蜜。猪脂。龜膠等潤藥。以滋潤之。陰虛而兼陽弱者。則宜八味丸。右歸丸。宜加肉蓯蓉。龜鹿膠。人乳。白蜜。豬脂之屬。但桂附不可重用。不過微加一錢。使陽生陰長之意。而金無畏火之乘。腎有生水之漸。氣清血和。則脾氣運而飲食下矣。

龍溪歌

噎膈之病自何成。六淫傷敗七氣侵房勞飲食傷酒後縱欲敗度喪
真陰食難飲易病爲噎。食久吐翻膈証名。証別陰陽分二結。虫痰血
火要分明。陰結玉燭散當歸潤腸丸。蕩熱滋陰証可平。脈大有力爲
火逆。滋陰清膈散堪憑。蘆根加入枇杷葉。一服病除體復寧。滻結脈
來痰飲阻。二陳爲主是章程。更加竹瀝兼薑汁。此法遵之效最神。體
甚未虛控延舟進。白製滲痰丸。亦相因。若氣不順二陳湯善。加入厚
朴脹滿鬆喉間壅塞似氣壅急用香砂以寬中。湯或因耗氣須補氣。

恐多血利。愈加竭。不若生薑汁。煎養榮人參利膈通幽劑。王燭病初。

亦可行。病久脈虛重。效本藥餌。妄用禍不輕。摠之脾弱四君子煎用。

五君功莫京氣血而虛何药妙。十全大補自豐盈。陰虛需以左歸飲。

大補元煎更助營。人乳猪脂及白蜜。龜膠等藥可兼陳。陽虧八味丸。

右歸丸妙桂附微加要酌斟。龜鹿二膠猪白脂更宜加入肉蔻蓉。

脈

寸口脈緊而芤。緊則爲寒。芤則爲虛。虛寒相搏。脈爲陰結而遲其人。即墮沉細散亂不成條。沉浮均有中按獨無必死。更添面黃或純白。

者皆惡候也。凡年高患此者多不治。以血虛氣敗故也。屎如羊糞者不治。大腸無血也。吐痰如鱗沫不治。脾敗故也。腹痛如刀割不治。營虛之極。血竭於中也。

方

滋陰清膈飲 治陰火土衝。胃火太盛。食不能入。脈洪濶者。

當歸

白芍
煨

黃柏
鹽水
炒

黃連
各半
小

黃芩
生地黃

山梔

各一

甘草
三分

右水二鐘。煎至七分。入童便竹瀝及酒各半。蓋食前服。

香砂寬中湯 治氣滯胸痞噎塞。或胃寒作痛者。

青皮 柴榔 半夏

茯苓

各一

厚朴

薑汁製

甘草

三分

右生薑三片。入蜜一匙。食前服。

補氣運脾湯 治中氣不運噎塞。

人參二

分

白朮三

分

橘紅

茯苓

各一

分

砂仁入

分

黃芪

一小

炙甘草

四分

有痰加半

錢

食遠溫服

加薑棗煎

玉燭散

治經閉腹痛。體瘦善飢。取不雜。四時和氣。所以謂之玉燭也。

生地

三兩

歸尾

三兩均酒洗

赤芍

二兩酒炒

川芎

一兩半

大黃

酒炒二兩

金匱要略

芒硝

一兩

共蜜丸白湯下

人參利膈丸

治胸中不利。大便結燥。痰嗽喘滿。脾胃壅滯。推陳致

新治膈氣之聖藥。

木香

枳榔

各七分

人參

當歸酒洗

藿香

甘草

枳實炒

黃芩

大黃

酒蒸熟

厚朴

薑汁各二兩

右爲細末。滴水爲丸。梧子大。每服三五十丸。食後白湯米飲下。

自製條痰丸

半下

桔梗

皂角

火炙研末
弦子

元明粉

白茯苓

只壳

右等分爲丸。白湯下。

滋血潤腸湯 治血枯及死血在腸飲食不下大便燥結

當歸

酒洗三錢

白芍

煨一錢

生地

各一分三分

紅花

酒洗三錢

桃仁

去皮尖炒一錢

大黃

酒煨一錢

只壳

麪炒各一錢

右水煎入韭菜汁半盞食前服。

生薑汁煎 治噎食不下

生薑汁

白蜜

牛酥

各五兩

人參

百合

各二兩

右入銅錢內以慢火熬膏每用一二匙用人參百合湯下。

橘皮湯 治痰火嘈雜心懸如飢。

陳皮

生薑

當歸活血潤膈湯

煎紅丸

代抵當丸

均見反胃

四君子湯

見蠶

十全大補湯

八味丸

均見發熱

二陳湯

見陔

通幽湯

見傷燥

左歸飲

消癰症延丹脣痛

五君子煎

大補元煎

右歸丸

均見惡寒

余壯歲嘗病難飲食。亦有痰涎。幸食入不嘔。雖非噎膈。亦近似也。予初以香砂六君子。及四七湯。木香順氣湯。均不效。飲食入口。阻塞良久。不下。一入胃。則不復嘔。他醫云。將成噎。用大半下湯。至進參。自思年壯。食入不嘔。非噎病也。且知氣從右邊逆上。自審其脈。亦如常。但右寸有不順暢。是肺氣不降。反上逆也。進旋

穀代藥湯以玉輝代參一瓣見鼻二瓣全愈后以六君子及丸
味丸扶養數劑而安

當歸潤腸丸 治腸胃有伏火大便秘滯全不思食等症

大黃 煙 當歸 酒浸羌活 桃仁研 火麻仁去壳只實

炒

右等分煉蜜爲丸白湯下

嘔逆論

附曉

今之稱嘔逆者古無是名。其在內經則謂之嘔然東坦海藏。俱以嘔屬乾嘔陳無擇則又以嘔爲欬逆。諸家所論皆有不同。惟成無己許學士固以嘔爲嘔逆。因其嘔嘔連聲而以嘔逆名之。是成許二家之論於義亦安。深得內經之意旨。觀內經治嘔以草刺鼻嚏。嚏而已。無息而疾迎引之立已。大驚之亦可已。按此三法。主治嘔逆之法。以故呃逆以紙撚刺鼻便嚏。嚏則立止。或閉口鼻氣使之無息亦立止。或作盜賊大驚駭之亦已。此嘔本嘔逆。無待辨也。察其病源。咳逆則根於肺。呃逆則發於胃。蓋胃爲水谷之海。腎與爲閥。閑閉不利。則氣逆。

而上胃以包容水谷性喜愛寒寒谷相搏則爲噦故岐伯曰谷入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新谷氣俱還入於胃新故相亂眞邪相攻氣併相逆復出於胃故爲嘔考古人治法則悉以虛寒爲言惟丹溪引內經之言曰諸逆衝上皆屬於火病人見此似爲死証然亦有寔者不可不知也其致呃之由摶緣氣逆氣逆於下則衝於上無氣則無呃無陽亦無呃亦有陽微而陰氣上逆亦爲呃是以胃火盛宜用安胃飲有氣逆而致呃且兼脹滿者宜二陳湯加烏藥或因食慳而生。

寒相搏

乾季

者膈間有痰水宜二陳湯或導痰湯加竹瀝薑汁亦有瘀血而呃者丹溪治超越陳氏用桃仁承氣湯是也有吐利後胃虛熱者橘皮竹茹湯若吐利之後胃虛寒者理中湯加附子丁香柿蒂有下焦虛寒者其肝腎生氣之原不能暢達凡虛弱之人多見呃逆正以元陽無力易爲抑遏而然此呃逆之本多在腎中可用歸氣飲或理陰煎加附子丁香或大病之後或虛羸之極誤投攻伐至脾損腎傷陰寒於下逼陽於上而致呃逆者此最危之候而歸氣理陰猶恐不及可用參附湯吞八味丸或右歸丸四味回陽飲其庶幾乎又又有噫氣者觀內經所謂噫者卽今世所謂嗳氣也靈樞云足太陽是動病腹脹

善噫。又云寒氣客於胃，厥逆從下上散復出於胃，故爲噫。仲景謂上受中焦氣未和不能消，是故能噫。而衝出上焦。又云上焦不歸者，噫而酢酸。不歸不至也。上焦之氣不至其部則物不能傳化。故噫而吞酸。由是觀之，噫者是火土之氣鬱而不得發，故噫而出。五氣論有云：以心爲噫。王作解註：心爲噫之義。相火炎上，烟隨焰出，如痰閉膈間，中氣不得伸而噯者，亦土氣內鬱也。有痞而作噫者，仲景以旋覆代赭湯主之。若心下蓄積痞悶，或痛多噫氣，如敗卵。本事方只壳散主之。胃中有寔火，膈上有稠痰，故成噯氣。宜二陳湯加香附、枝仁、黃連、蘇子、前胡、青黛、瓜蔞仁。或作丸或煎湯服之，亦可。此丹溪之治法，有如斯也。

詎治歌

呃逆卽經所謂噦。治詳寒熱血虛分。胃火盛送非虛候。治宜安胃飲。
相攻氣逆。呃生兼脹滿。二陳烏藥加相因。食滯二陳加白芥。山楂烏
藥亦和同。水寒相搏何藥。都宜投以小青龍。寒甚加附子。尖須炒
羌活附子亦堪并。堅痞悸憎痰居膈。二陳湯進導痰通。或停瘀血呃
無息。宜用桃仁承氣沖吐。瀉後生胃虛。熟湯投橘皮竹茹。奏成功。胃
虛寒甚。理中善加附子。香柿蒂從腎中。虛弱歸氣飲。加附子香入理。
陰陰寒逼陽。虛羸極相火上冲。何藥攻。參附湯吞丸八味。右歸四味
回陽效如神。更考燮氣卽噫氣。根係寒邪客胃中。相火上炎土氣齎。

痰閉膈間氣不伸。旋覆代赭湯能治。醫師須要細心論。亦有噫氣如
敗卵。只壳散主之。莫他營。寔火胃炎痰滯膈。二陳加入青黛梔仁蘇子
瓜蔞香附並前胡黃連和入。自通靈。

脈

脈小甚爲呃逆。肺脈散大。不治。呃逆聲相連屬寔。可治半時。呃逆一
聲難治死在旦夕。

方

安胃飲 治胃火上冲。呃逆不止。

陳皮 山楂 麥芽 木通 淨渴 黃芩 石斛

代赭旋覆湯

治傷寒發汗。若吐若下解后。心下鞶痛。隱氣不除。

旋覆花

郎金沸
草花

代赭石

人參

甘草

半下

生薑

大棗

橘皮竹茹湯 治久病虛弱。呃逆不已。亦治吐利后胃虛呃逆。

陳皮

竹茹

法夏

赤苓

麥冬

枇杷葉

甘草

人參

黃水煎溫服

簡便方

呃逆灸炎直骨穴。婦人垂盡乳頭切。男子乳庫

下也

一指間三壯

卽痊真秘訣

男左女右

開元七壯試多驗。又方紙撚刺鼻嚙尤捷。

小青龍湯

理中湯

歸氣飲

右歸丸

均見惡寒

理陰煎

見惡寒導痰湯

均見頭痛

二陳湯

見咳

八味丸

見發熱

四味回陽飲

見寒

參附湯

見中氣

只壳煮散

見咳嗽

桃仁承氣湯

見脇寒

氣

只壳煮散

見咳嗽

一人呃逆連聲不絕用便方均不效。診其脈洪滑有力。以安胃飲加石膏愈。

一人在熱天病滯下。惛仆在地。予以大劑薑附湯二劑。救其脫病。稍穩。忽發呃逆。其聲微而長。半時方逆。見臍下動而氣逆作呃。

知其陽陰虛也。以頂上肉桂進八味丸兼進六味田陽飲加

上桂而愈。

羌活附子湯 治呢逆

羌活

附子

木香

茴香

炒各五分

乾薑

炮一兩

右爲細末。每服二錢。水煎熱服。

本事枳壳散 治心下痞悶作痛氣如敗卵

枳壳

白朮

各五分

香附

一兩

枳榔

二分

右爲細末。每服二錢。米飲調下。

金匱啟鑰卷五

金匱啟鑰

卷五

既逆

終