



産育全書 外篇



ヤ 9
1179
5





醇生菴產育全書外篇卷六

近江八幡 水原義博濟卿父著

門人

越後芝田 長谷川誠誠之

較訂

肥前佐嘉 北島常美維禎

產後須知 附除毒術并圖
易衣術并圖

夫產育ノ疾疚ニ非ルハ前譬已ニ詳ニ之ヲ言リ然
ルニ其分娩ニ得ルノ後婦軀頓ニ虛乏ス天稟壯實前
後故ナキ者モ必ス肌膚ノ潤澤ヲ亡ヒ及ヒ自汗盜汗
行歩无力固ヨリ精神衰損ス况ヤ素稟賦虛弱薄乏ノ

醇生菴產育全書外篇卷六
一
醇生菴藏板



婦ニ於テヲヤ、且夕之ヲ譬ルニ、鱗屬ノ孕メル者ハ、肥
 豐ニシテ油膩多ク、已ニ分出ニ至レハ、枯瘦シテ、味殊
 ニ薄キカ如キ也、以テ一時頓虛衰弱スルヲ、自知スル
 ニ足レリ、是故ニ其護養差戾スレバ、亦其害損甚大ナ
 リ、陳自明曰、犯時微如秋毫、成患重如山岳、可不恐哉、ト、
 世俗往往、其度量ヲ不知、或ハ陋習頑固シテ、強テ跪坐
 セシメ、睡ヲ防ナドノ嚴責スルアリ、或ハ疎懶放縱ニ
 ノ由テ百般ノ變患ヲ招、不可救ノ大病ヲ致スアリ、互
 ク中和保護スベシ

保產心法云、兒纔離腹、此時身雖輕爽、但氣血兩虧、在

強壯者猶當調養、何況虛弱乎

女科切要云、夫產後氣血大損、即易產力壯者、尚有感
 病、為終身之患、產母不可恃健、不行保重勞碌、以損其
 營、多食以傷其胃、外感六淫之邪、內受七情之氣、為患

莫測

凡纔ニ産シ了レバ、乃チ褥ニ倚リ、枕ヲ高フシ、右ニ側
 卧シ、目ヲ閉チ、神ヲ安ンジ、或ハ冷水ヲ以テ、黑神散一
 匕ヲ服セシムベシ、慎テ直ニ起步動搖シテ、蓐ヲ易ヘ、
 或ハ椅ニ坐セシムルヲ勿レ、往往因之テ、血暈崩漏ヲ
 致スアリ、慎マガルベケンヤ、又生兒ノ男女ヲ問答ス

ルヲ勿レ、生兒ヲ沐浴スルヲ視セシムルヲ勿レ、或ハ
 雙兒ヲ産ムガ如キハ、後ニ生ル、ヲバ、佯テ胞衣ト稱
 シ、其胞衣ハ轉ゾ、血塊ト佯リ、必ス實ヲ告ルヲ勿レ、凡
 此等ノ類ハ、産母殊ニ心ヲ勞シ、意ヲ惱メ、慙ヲ含ム
 アレバ、或ハ昏暈發狂等ノ患ヲ起シ、モ亦不可測、只能
 傍人ハ謹慎メ、言笑憂悵ニ節戒ナルベシ
 千金方云、兒始落地、與新汲井水五咽、忌与煖湯物
 百一選方云、凡婦人産後、急飲新汲水數口、惡露或胞
 衣即下、永无血暈之虞、世人但以産後怕生水為言、惑
 矣、初産後不可不服、既定一兩日、却忌生水也

張氏医通云、産後諸禁、一禁卧、盖初産血氣未定、遷卧
 則惡血上升、故分娩之後、須高卧仰倚、切不可即卧、三
 朝始可稍去其壜、尚互高枕、七日後如無他病、方可安
 枕、多有半月後、未能貼席者、云云
 子玄子云、凡産婦分娩後、切不可起步、又切不可用産椅、
 當倚蓐、高枕、而右側卧、則新産後、可以无不虞之憂矣

論産

除蓐術、産後易蓐スルヲ尋常易産ノモノニハ、其害亦
 无ケレ、氏艱産後ハ衰憊甚シク、及ヒ天稟虚乏ノ者ノ
 如キハ、之ガ為ニ、身軀ヲ動揺シ、以テ暈ヲ發スルヲ有、


又動搖ヲ恐レ其マ、ニ指置^キヌレバ、瘀血淋漓、不堪臭穢シテ、困悶スルアリ、是ヲ以テ吾門ニ定則アリ、産ノ艱易ニ不拘、婉ニ臨マバ、次下圖ノ如ク、舛薦ノ下、ニ於テ、席ヲメナリニ敷キ、預メ薦ヲ除去ルノ備トナス、己ニ産ミ了ラバ、医先ツ衣裾ヲ掲ゲ、婦ノ上部ニ向ヒテ、腹上ニ跨リ、腰ヲ屈メ、婦ノ両手ニテ、医ノ頸後ヘ、トリツカセ、医両手ニテ、婦背後ヲ拘^カエナガラ、少シ上邊ヘ進メ置キ、医更ニ婦ノ下部ヘ面シ、彼ノ先^キニ鋪キアル席ノ下ヘ、両足ヲ入レ、両手ハ婦ノ腰臀ヲカ、エ上ゲ、外人ニ端ヲ取り、舛ト共ニ除^キ去シメ、ソノマ、安

卧セシメテ好シ、若貴閨ニ在テ、腹上ニ跨ルヲ憚ルニ於テハ、婦ヲシテ両膝ヲ豎テ、膝ヲ豎ルハ、側卧ニ便ナラシムルカ爲ナリ左ニ向テ側卧セシメ、圖ノ如ク、医両手ニテ婦臀ヲ抱エ、少シ左ヘ引寄せ引上ゲ、人ヲシテ舛ヲ除カシム、己ニ除子ラバ、更ニ右ニ轉側シ、安卧セシムベシ、
易衣術 服ヲ更ルハ、婦ヲ右側卧セシメ、其左手ヨリ、衣袖ヲ脱シ、一偏ヲ著セ更ヘ、其脱シタル服ト、更フベキ服ノ一偏トヲ、婦背後ヨリ、右脇下ヘ押コミ、緩カニ左ヘト轉身セシメ、更ニ右偏ヲ著セ更フ、如此スレバ、身ヲ不動搖メ、容易ク更衣スルヲ得、コレ婦ノ虚乏ノ者ニハ、如此更衣ナリ


除毒第一圖



同第二圖



易衣之圖



產後早夕身ヲ浴シ、髪ヲ梳ルヲ禁ス、若コレヲ犯セ
 バ、内気血ヲ損傷シ、外腠理ヲ虚鬆シテ、外邪、瘀血ト相
 搏チ、闕然大熱、譫語發狂、或ハ發斑シ、痙病ヲ發スルニ
 至ル、戒慎セガルベケンヤ、吾儕産婦ニ遇フ毎ニ、懇ニ
 此理ヲ諭シ、不覺難起之窟へ陥入シメガルヲ要セヨ、
 若夫壯實ノ婦、娩後他ノ故ナキモノ、如キハ、六七日
 ノ後、巾ヲ熱湯ニ漬シ、絞リテ、汚穢ヲ拭去シムベシ、半
 月ノ後、気血漸ク復セバ、天朗気清ノ時ヲ占シ、午牌前
 後ニ、輕道洗浴セシメテ佳ナリ、ソノ法、閑靜无風ノ所
 ニ於テ、ハ巾ヲ安ジ、米泔若クハ千里水ヲ燠シ、寒温度

ニ適ハシ、ハ快沐浴セシメ、浴後衣ヲ被ヒ、片時風寒ヲ
 避ケ、安卧セシム、但艱産婦ノ如キ、他故ナキ者ト雖、此
 例ニ非ルナリ

婦人良方、産後門云、梳頭洗足、以百日為度
 古今医統云、産婦七日内不可洗、七日外、方可溫水洗、
 医方大成、産後論云、冷水洗濯、當時未覺大損、滿月之
 後、致病百端、或成産後諸疾
 保産心法云、産後梳頭濯足、恐血氣攻下、脫衣洗浴、易
 受風寒、又云、産後十餘日内、切不可嫌血汚、邊起洗拭、
 見風犯者、多致血崩、為害不小、况産時去血已多、筋脈

空疏風寒易襲少有不謹便成癰痺為終身之患矣
 子玄子云產後十四五日當忌浴蓋新產惡露未及血
 氣又虛而浴則腠理大開虛邪必襲至與瘀血熱氣相
 搏則其生禍害決非淺淺也矣又云產後八日當厚被
 覆下身以熱湯濡巾盡拭去其汚痕畢後又脫上躰別
 拭之則身得清潔功与浴同而賊風无所乘襲矣論產
 子啓云余數見平穩產婦早浴忽發熱氣息短促遂致
 危斃者甚多不可不懼也產論
 後ハ一時頓虛脾胃薄弱ナレハ生冷粘硬膏梁油膩
 ノ品消一堪ガル物一切ニ禁忌スベシ若シ之ヲ犯

ス片ハ一腹痛或ハ下利不止等ノ險証ヲ釀シ假令
 平淡ノ食品モ斟酌宜キニ過ハシメ過飽ナラシムル
 勿レ又其禁嚴ニスルヨリシテ反テ不食ヲ媒スル
 アリ親切用意スベシ邦俗新産ノ後ニ必ス糯米羹
 ヲ餐セシムルガ如キモソノ嗜ム所ナレバ仍可ナラ
 ン歟若夫不嗜ヲ強テ食セシムル片ハ鞏硬難化ノ品
 當ニ患ヲ生ズベキノミ
 保産心法云產後飲食調理粥時喫粥飯時喫飯云云
 其餘者忌生冷煎炒堅硬等物
 劣齊先生曰邦俗新産婦与糯米羹為例雖性忌者必

強喫之云調血脈充腸胃俗呼腸餅此蓋近俗臆見非有所
 原者也人或引謝在杭糯米作酒之外產婦互食之之
 語為證者誤也夫糯米性重滯難消新產脾胃薄弱者
 最非所宜也香月牛山啓益婦人壽艸云按諸本艸不
 載糯米利產婦本邦典故書亦不見此事蓋國俗訛傳
 耳但脾胃健強氣血充盛者或莫其害若脾胃虛損氣
 血微弱者強与之則泥滯胸膈惡心嘔吐必發血暈意
 古方尊勞方中間有用糯米者五雜俎云互產婦者亦
 唯用治尊勞者爾此言可從焉且穀品方土異性凡釀
 酒必如如本土杭能造醇醪邦產糯米性稠粘優他可



知也如如粢糕鞫硬難化乎本艸云粢糕最難尅化損
 脾縮小便堅大便婦人良方產後將護云若未滿月不
 互恣食粘硬之物可見非產婦所宜也又如俗啖棘鬣
 魚羹海鰻炙非徽俗與雞魚吳俗與蠶粥之類則應无
 大害互循各所土習但要勿過喫焉
 產後三月內ハ房慾裁縫紡織勞動ヲ戒ムベシ夕トヒ
 當時害ヲ見ザルモ終ニ疾病ノ起原ヲナサン慎マズ
 ンバアルベカラズ
 保產心法云生産百日之後氣旺血足方可交合常見
 患人未滿月交合者不惟婦成大病即夫亦大損

女科切要云、大凡產後不可食物過多、恐成積滯、若未
滿月、不可強起離牀、不宜多言、喜笑及驚恐、憂惶悲思、
惱怒、不宜久坐久立、及作針工、恐滿月之後、即成尋勞、
併油膩魚肉之類、皆不可犯、凡產後百日之外、方可交
合、不爾百病滋長、慎之、凡婦人患風氣、臍下虛冷、莫不
由早行房之故也

劣齊先生曰、凡產後二三月、須戒執裁縫紡織事、則致
血氣上聚、眼目不爽、當時輕忽、不早治之、動多成終身
患者焉、石天基保產心法云、產母節勞、人人盡知、至動
針線、小覺勞煩、以為无妨、殊不知未老眼目昏花、或

流酸、之哉、此說可從、其他寫字力作、亦易損眼、宜
節之為妙

子女子云、凡產後三日、必用折衝飲、而无拘諸外症、与虛
實焉、惡露未尽、則百患立生、危斃可待也、ト、凡ソ產後ハ、
氣血俱ニ虚セリ、假令滯瘀アルモ、破血ノ劑、過用スル
トアルベカラズ、况ヤ天、性虚弱ナ人、及ヒ產後崩血ス
ル類ニ於テヲヤ、一意提來シテ、峻補セントスルモ、仍
不及ントヲ懼ル、奚ゾ破血ノミヲ議ソ可トセンヤ、盖
補瀉ノ虚實ニ於ル、此レ治療最大關鑰、一モ機發ヲ誤
レバ、災患逐テ至ル、諺ニ云、毫釐之差、千里之謬ト、仔細

斟酌注意セザルベケンヤ丹溪心法ニ産後以大補氣
血為主雖有雜症以末治之ト亦秉衡ノ言ニ非ズ
凡婦人胎前疫痢及ヒ他ノ痼癖アルモノ分娩スレバ
忽チ差ルガ如キモノアリ寔ハ愈タルニハ非ズ三四
日ノ後再ビ發スルナリ由テ輕忽ナルベカラズコレ
ハ内氣轉動ニ因テ姑ク間歇セシナリ知ズンバアル
ベカラズ

産後諸證

凡婦人産後偶内外雜病或ハ天行疫痢火毒壅盛等ノ
證ヲ申シモノ治方一二男子ト差別ナシ宜ク諸家方

論ヲ照シテ治ヲ施スヘシ但驅逐攻撃ノ劑少ク意ヲ用
テ斟酌スルヲ要ス其崩漏血暈瘧病轉胞寒戰兒枕痛
ノ類ニ至テハ固ヨリ産後ノ病ニ係ル治療ノ法最モ
別ニ講セズンハアルベカラズ

千金方云夫婦人之別有方者以其胎妊生産崩傷之
異故也是以婦人之病比之男子十倍難療若是四時
節氣為病虛實冷熱為患者故与丈夫同也惟懷胎妊
而挾病者避其毒藥耳
活人書云婦人傷寒皆可於男子兼中選用豈必調血
而後行湯耶

產後暴二脫血崩ル、ガ如キモノ、コレヲ崩漏ト云、又

崩血凡云古へ之ヲ崩ト云素問陰陽別論或ハ大血靈樞五禁篇或

ハ崩中病源候論或ハ血崩千金方ト云、ソノ因、盖一ナラズ、或

ハ天稟虛弱ノ婦、及ヒ他ノ痼疾アルモノ、或ハ産前時

時漏血スルモノ、或ハ小産後、或ハ娩後、強テ胞衣ヲ下

スモノ、或ハ娩後直ニ起步シ、或ハ嘔吐欬逆ニ由テ、血

ヲ動ス等、往往コノ患アリ、又臨産陣疼、時ヲ移サズ、速

ニ娩スルモノモ、亦マ、此証アリ、凡コノ症ノ發スル

ヤ、ソノ初、周身經脈、鼓動甚シク、胸腹ノ動悸、波濤ノ如

シ、昏眩、頭痛、上冲耳鳴、寸口ノ脈、浮數ヲ見ス、盖産後此

症多シ、ト云、崩血ヨリ急ナルハナク、又崩血ヨリ難キ

ハナシ、之ヲ治スル、早カラザレバ、死生掌ヲ反サシ、

豈ニ用意セザルベケンヤ

又産後他ノ故ナク、卒然トメ、死スルモノアリ、之ヲ檢

フルニ、大血崩脱ニ因ルモノ多シ、能能視別スヘシ

又經閉數月、惱怒皺眉ノ事アルニ、因テ、忽然崩血スル

コトアリ、又年五十前後、已ニ斷經セントスル婦ニ、コノ

症アリ、凡テ縛帶術ヲ施シ、隨症ノ治ヲ施スベシ、家門

遇崩縛帶ノ術ニ於テハ、三十年來、之ヲ歷試スルニ、舊

來世医用ル所ノ術トハ、其効大ニ優レリ、因テ構意ノ

產後全書外篇 卷六 十三 尊生卷反

起ル所ヲ記メ、亦吾徒ノ進奨ニ充ツ

淡海國蒲生郡増田村、増田紋二ハ、予カ友ニシテ、粗医
事ヲ知レリ、其妻妊娠五閱月、流産シテ、胞衣不下、因テ
自ラ桂枝茯苓丸料ヲ製シ、與ルヲ三日、忽然トノ崩中
シ、漏血便器ニ溢ル、遂ニ卒倒人事ヲ知ズ、急ニ人ヲ走
セテ、予カ診ヲ乞ヘリ、日既ニ黄昏、幸ヒニ家ニ在リ、直
ニ往看ル、主人迎ヘ謝シテ曰、即今君ガ玉趾ヲ辱ス、然
レモ、事已ニ迫レリ、恐ラクハ手ヲ下スニ處ナカラシ
ト、予舊友ノ好アルヲ以テ、強之ヲ診スルニ、崩血未ダ
止ズ、自體已ニ冰冷ニシ、脈動有ルガ如ク、无キガ如ク、

隱隱トシテ指下ニ應ジ、呼吸僅ニ存ス、因テ師傳ノ過崩
術ヲ施スニ、惡露旁射シテ、毫モ効ナシ、コ、ニ於テ、一
策ヲ搆ヘ、陰門左右ノ肉皮ヲ聚合シ、綿絮ヲ用テ、厚ク
陰戸ヲ覆ヒ、犢鼻褌ヲ以テ、緊ク之ヲ縛シ、以テ脫血ヲ
禦ギ、大劑ノ芍、飯膠、艾湯加參、附烏賊骨ヲ與フ、時ニ隣
邑ノ山本左内、及ヒ今村、謙意竝ビ至ル、其ニ診シテ曰、
命ナル哉、吁、命ナルカナ、得テ救フベカラズト、束手黙
然タリ、余カ曰、証候甚危険ナレモ、藥ヲ与レバ咽ニ下
ル、豈徒ニ手ヲ束ヌベケンヤ、其坐ラニシテ斃ルヲ待ン
ヨリハ、寧口藥ヲ含テ亡ルニ如カズ、且ツ或ハ生ヲ萬

一、二回ス、有ント、曲頭管ヲ以テ、頻頻ニ前劑ヲ灌ク
 ニ、皆咽ニ下ルヲ得、然レ、凡衆猶顧ミズ、主人モ亦其
 死ヲ甘ジ、已ニ葬儀ヲ謀ルニ至ル、而メ余ハ固ク前言
 ヲ執テ、一意ニ藥ヲ進メタリ、主人予ニ戲テ云、君若此
 ヲ救賜ハ、謝スルニ百金ヲ以テセント、余仍不顧、前
 劑ヲ主張シ、天明ニ至ル頃、更ニ診視スルニ、病婦眼ヲ
 開ケリ、脈スルニ少シクカヲ得タリ、余ソノ疾苦何如
 ト問フニ、答テ曰、初メ腹痛シ、小便セント欲シテ、既ニ
 溺器ニ臨ム、其後イカナルカ不覺知、今恰モ夢寐ノ新
 ニ覺テ、ナリトシト、衆其言ヲ聞キ、愕然トノ驚キ、余ガ

カヲ殛シ、鬼籍ニ列ルヲ脱セシムルヲ歎美ス、余戲
 レテ主人ニ謂フ、病婦既ニ命ヲ保ツヲ得タリ、請フ
 速ニ金ヲ受ケント、主人曰、吾カ前言ハ、所謂夢中ノ妄
 言ノミト、余笑テ去ル、後白紬一端、杜康三斤ヲ携來テ、
 再生ノ恩ヲ謝ス、實ニ文化丙子ノ九月ナリ、コレ余ガ
 過崩術新搆ノ權輿ニシテ、爾後コノ術ヲ用テ、崩漏必
 死ノ症ヲ救フ、數十人ニ及ベリ
 病源候論云、忽然暴下、謂之崩中。
 丹臺玉案云、崩者如土之崩、源泉逆流而不禁、乃血熱
 而兼氣虛、不能收攝也

證治要訣云、血大至曰崩中、瘀而腹痛、血通而痛止、崩而腹痛、血住則痛止

片倉元周云、孕婦已產、則蒸蒸身熱、胸中築動、呼吸短息、澀然汗出、猶平人勞動奔走、呼吸不接也、此際特可懼者、脫血一證也、若發此證、則必致率亡矣、預防之法、互用冷水一小盞、點黑神散一匙、以与之、血熱得清冷、而胸中開豁、浮散之陽、飯源而神氣清快、實免產後暴血之神丹也、不知者以為寒涼傷胃也、然分娩用力甚、五內擾亂、身熱如燬、投之以一盞冷水者、如久旱霖霖、自入胃中之際、化為溫湯、故无有後患、然不可再

与之、冷水澁血、勝于諸藥、故婦人月信過多時、飲

一盞、則須臾血自止、可以證也、雖然易產如達者、互斟酌矣

一種臨蓐崩血ノ症アリ、甚ダ手段ノイルモノ也、予曾テ一人ヲ治ス、京師姉小路、兩替町裝潢匠某ノ妻、臨盆漏血不止、坐婆其變有ニ、トヲ懼レ、人ヲ走ラシテ余ニ乞フ、余其家ニ抵ル頃、續テ船曳尚綱モ亦來會ス、脈ヲ診スルニ、手足厥冷、脈縷ノ如シ、人門ニハ、兒頭半出テ、瘀血旁射ス、止ルニ由ナシ、因テ真武加參大劑ヲ与ヘ、尚綱ト相謀テ云、危險カクノ如シ、然ルニ兒娩セザレ

バ、過崩ヲ施スニ由ナシ、手ヲ袖ニシ、其斃ヲ守ニヨリ
ハ、シカジ早ク兒ヲ脱メ、後ノ防禦ヲナサンニハト、乃
チ過崩縛帶ノ支度ヲナシ、尚綱子ニ兒ヲ引出サシメ、
娩出後、隨テ急ニ産門ヲ塞ギ、緊シク縛帶セシメ、頻ニ
前方ヲ與ヘシニ、翌日ニ到リ、厥漸ク回り、後保護月ヲ
閱、平ニ復スルヲ得タリ、此等ノ危急ニ至テハ、方術
救護、十分其短キニ適ハザレバ、生ヲ保タシムルヲ難
カルベシ、吾徒竭心珍重セヨ

過崩術先ツ婦人ヲシテ、右側臥セシメ、其鎮帶ヲ小腹
へ覆シ、半幅ノ綿布尺許ヲ以テ、圖ノ如ク、鎮帶へ

引透シ、前腹ト背後ニ、ワナヲ設ケ、敗絮ニテ、厚ク陰門
ヲ覆ヒ、コノ時、陰門ヲ兩邊ヨリ聚合シ、ソノ上ヨリ綿
ヲアテル也、綿ヲ陰中へハ、必ス入ルヲナカレ
更ニ圖ノ如ク、犢鼻褌様ノ綿布ヲ以テ、前腹ノワナヨ
リ、背後ノワナへ懸ケ、又背後ヨリ前腹へ懸ケ、前後數
回、強ク之ヲ引シメ、以テ崩血ヲ遏防ス、内治ハ膠艾四
物湯加烏賊骨烏賊骨代、
枯礬亦佳ノ類、揆用スヘシ、凡テ脫血症
ニハ、必ス熱湯ノ類ヲ与フベカラズ、藥汁ナドモ清冷
ナルヲ善トス、散葉亦冷水ニテ調下ス、一法、崩血不止
ニ冷水ヲ巾ニ浸シ、腹上ヲ頻ニ蘸ス、甚タ良ト、コレモ
亦佳ナラン、一試スヘシ

產前金鑑外編 卷六

十七

淳生堂藏版

蓬翁全書外編
卷六

三六

淳生堂藏版

遇崩縛帶術圖

同上對面



蓬翁全書外編
卷六

淳生堂藏版

產前全書外篇
卷六

同上後面
之圖



養生全書
卷六



產前全書外篇
卷六

養生全書
卷六

產後全書 卷之六

產後忽于神昏卒倒スルモノ之ヲ血暈ト云蓋シ血氣
擾亂ノ際卒然ト昏暈スルニ因テ名ツク而メソノ因
一ナラズ或ハ積聚留飲ノ宿癖アル婦ノ臨産ニ強テ
粥飯ヲ食或ハ催生ノ藥除難ノ符頻ニ服用セシムル
ニ因テ終ニ胃中ニ貯蓄シテ心下鞭滿胃中懊懣噯氣
吞酸宿癖コレガ為ニ擊動セラレ鬱冒昏悶人事ヲ省
ガルノ症ヲ致スナリ此レハ速ニ咽喉ヲ探テ一吐ス
ベシ主方ハ半夏瀉心加茯苓香砂平胃散ノ類撰用ス
ベシ又婉後意ヲ用ルコト多ク及ヒ起歩ヲ縱ニシ之ガ
為ニ血氣力搖瘀血虛ニ乘メ心下ニ上衝シ耳鳴氣逆

醉生齋藏版

心下硬滿神昏口噤卒倒人事ヲ省セガルモノアリ此
症急ニ面部ニ冷水ヲ噴洒ギ禁暈術ヲ施スベシ主方
聖惠牛膝散桂枝茯苓丸加大黃獨行散ノ類撰用スヘ
シ醒省ノ後聲爽ナル者ハ慮ルニ足ラズ若シ色低微
又ハ短促ナルハ須臾ニ復發スベシ輕視シ措クコト勿
レ又新産後太血崩脱スルニ因テ暈ヲ發スル者有リ
此症多クハ頭ヲ低レ昏悶煩躁面色唇口血色ナク其
名ヲ呼フニ答フト雖尚神思朦昧音喑神无夕手足厥
冷脈微絶セント欲ス尤モ恐ルベキノ症ナリ其虛煩
劇シキモノハ多ハ不治也之ヲ救ノ法先ツ禁暈術ヲ

產後全書 卷之六

二十 醉生齋藏版

以テ横卧セシメ、他ノ人ニ、不容穴ヲ緊按セシメ、急ニ
過崩ノ縛帶ヲ施スナリ。過崩術ノ條 藥劑ハ、膠艾四物
湯加參附烏賊骨、四逆加參ノ類、擇用フベシ、甚シキハ
大劑獨參、兼用清涼、歛血散、抽刀散ノ類、冷水ニテ調下
ヌヘシ、洎夫藍毛亦佳ナリ、又分娩、偶盛夏炎天ノ時ニ
方リテ、熱氣蒸逼、氣血上逆シ、或ハ調護大過ニ因テ、氣
血壅滯シ、或ハ胞衣下ラズ、之カ為ニ狐疑憂思シテ、發
暈スルモノアリ、如上說、氣血亂動ノ、昏暈スル方術
ヲ照メ、治メ處スベシ、黑神散ヲ井花水ニ調服スルモ
亦善シ、胞衣不下ノ如キハ、暈ヨク醒ルヲ待テ之

ヲ下スベシ。法胞衣條 是崩血ノ禍アラシムヲ恐テ也。
下ニ詳也

凡血暈ノ一症ハ、産後ノ大患、動モスレバ、不起ニ至レ
バナリ、假令ソノ分娩ハ、平易ナルモ、此症ヲ來ラシム
計リ知ベカラズ、敢テ等閑ナルベカラズ、况ヤ難産、屢
憊ノ者ニ於ルヲヤ、千萬保護セズニバアルベカラズ、
又産シ訖テ、遽ニ呼吸促迫、煩躁ヲナスアリ、コレ虛氣
擾亂スル也、大抵、十一一生ナシ、

劣齊先生曰、血暈者、産後之一大患也、蓋因卒暴血崩、
神氣虛脫、而發昏暈也、輕則少刻醒、重則必致不救焉、
新産最可懼者、特在此一症矣、若夫生後動身、擾起血

氣而發昏眩或時遇盛夏亢炎蒸逼氣逆運胃或調護太過氣因鬱窒或飲食停蓄氣血阻隔以致暈厥等者雖昏悶則同要之一時之變無足深慮者理氣定暈澆水涌吐自可治之也至如真血暈則命在瞬息焉速行補陰回陽藥而可也以其陰血脫泄陽氣竭絕故也故補血湯加附子附子瀉心湯四逆加人參湯參附湯等互擇用也然而槩以為勞心用力下淋稀少敗血上撞者處以逐瘀豁氣劑否則為積聚為水飲挫之涌之斃而後已夫產已就枕褥鎮神安睡則氣血因穩自無暴崩患故發暈眩矣而俗間使之起坐倚凳緊縛纏帶

產前全書外編卷六

西生春病狀

如適遇此症愈益正跪緊縛之務為之助長習而不察豈不謬乎子玄先生有所見于此其治產婦必祛帶卧褥以豫防崩暈其見卓矣但其論血暈概為因起步動腸胃穀氣上逼者止載禁術而不識藥治言未嘗及血脫是則千慮一失乎如其胞衣不下而發暈為難治者何也蓋胞衣之下也本借下淤送出之勢耳今息胞而發暈則其蓄淤先下焉則取胞亦難退崩亦難其難也非因胞與暈也不出于血脫一途耳又其雖不起而發暈者非血熱盛而搏也何則起步擾血固其所也苟安卧鎮心而猶然者非崩中氣虛而何耶獨張景岳論

產前全書外編卷六

三五

醫學三書卷反

產前金書外篇 卷六
氣脫一症曰產時血既大行則血去氣亦去多致昏暈
不省微虛者少頃而甦大虛者脫竭即死速用入參一
二兩急煎濃湯徐徐灌之但得下咽而可救活若少遲
延則无及矣可謂有識哉但其以血暈為惡露上攻氣
脫為別症者蓋眩一血字終作此說耳殊不知血暈之
目但謂其方裏血擾起之際而發昏沈者而非謂惡血
上衝而發此症者也猶血渴血風血勞血厥血喘血嘔
等類也非逐血開氣香竄化痰之劑所宜焉他如血眩
血迷血悶血昏亦血暈異稱耳如婁氏解金匱新產鬱
冒以為血暈以其亡血故定為血暈者亦似焉或曰經

云急則治其標血暈急症今舍標治本何其迂也曰否
語不云乎其本亂而未治者否矣此症之發也本由血
虛如夫猴胆鹿角麝灰礪礮韭汁醋灰類徒取一時之
快而已非收全効者也又曰產後忌用人參古既有此
論或待七日或待十五日今新產輒大用之能得无失
乎曰此說未必然夫真元頓虛之際能回元氣於無何
有之鄉者舍此將何之用景岳亦既辨之又有產事極
易倉皇之際神散昏暈者是亦不可不知焉若夫巢源
所謂觸犯日遊反支諸所禁忌則令血氣不調理而致
運也須預以法術防之固迂誕不可從矣嗚呼血暈者

產前金書外篇 卷六

產前金書外篇 卷六

死生之所係請更熟思之

香川太冲云有產後欲益氣力頻頻強喫粥食以致食滯不化而鬱冒者此非脫血虛之証即是滯食之所為也倘以脫血故錯用補藥則益窒遂成大塞不至危亡者鮮矣唯輕取吐則倏然而醒矣

行餘
醫言

原南陽云產後直ニ發暈スルハ乳汁ニサハラヌモノ多シ二三發スルハ乳汁必ス通セズ又二三四日ヲ經テ血暈スルハ甚仕惡シ必ス乳汁不通血熱モ日數ヲ經ガレバ肥立ヌモノナリ

醫事
小言

禁暈術產婦ノ右邊側卧スベキ方へ睡褥ニ帖許重子

圖ノ如ク産婦ニ面シテ坐シ右手ヲ以テ婦ノ兩不容穴ヲ緊按シ左手ニテ婦ノ右膝ヲ豎テシメ直チニ左手ヲ婦ノ右肩ヘカケ徐徐ニ側卧セシムベシ尋テ婦ノ兩足ヲ少シク伸シ左右組合シテ股間ヲ聚合スベシ凡ソ禁暈ノ術ハ終始不容穴ヲ鎮按シテ須臾モ弛緩スルヲ无レ

一法前ノ如ク婦ノ右邊ニ睡褥ヲ重子医斜ニ婦ノ右邊ニ就キ尻ヲ撐カシテ躰ヲ産婦ニ傍ヘ右手ヲ以テ婦ノ兩不容穴ヲ緊按シ左手ヲ婦ノ背後ヨリ左肩ヘカケ医ノ胸ト婦ノ胸ヲアハセ手前ヘマキコム意持

コテ抱持シ、少シ引アゲナガラニ、婦ノ臀尻ヲシテ、足
 踵ヲ、ハツサシメ、而シテ、医ノ左手ニテ、シカト抱ヘツ
 ツ、徐徐緩緩ニ横卧ナサシムベシ、婦已ニ褥上ニ卧ス
 ルノ後、医腰ヲ張テ、左足ヲ後ヘ引キ、更ニ右足モ引キ
 去ベシ、右手ハ始終不退ニ、不容宥ヲ緊按シ、暈全ク定
 ルマデハ、須臾モ緩慢ナルベカラズ、若シ医手勞ニ禁
 ヘザル片ハ、他ヲシテ代ラシメテ可ナリ、以上禁暈術
 二道、予ガ新ニ設クル所ナリ、夫レ血暈ヲ救フニ、心下
 ヲ緊按シ、以テ右側卧セシムルヲ、子女子卓越ノ見ヨ
 リ出テ、言ハ、未發ノ良法也ト云ト雖、其術ノ用ニ到ツ

テハ、迂ヲシテ且行ヒ難ク、生硬ノ徒ハ、輒スク施ス
 所ハズ、因テ予最モ簡易捷徑ノ法ヲ設ケテ、暴卒ノ際、
 医ニ非ザルモ、亦施シ用ルニ任ヘシメント欲スルナ
 リ

產育全書外篇
 卷六

產育全書外篇
卷六

禁暈術第一圖



西醫
生醫
藥片

圖二 同



產育全書外篇
卷六

二十六

西醫
生醫
藥片

產育全書外篇
卷六

西生醫館
片版

圖二第同



一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...

產育全書外篇
卷六

二十七

西生醫館
片版

分娩後、卒ニ寒戰咬牙ヲ患ル者アリ、是一時血亡ニ因
テ、神氣萎縮スルガ故ナリ、急ニ救術ヲ施シ、陽氣ヲシ
テ外達セシメバ、戰慄立ニ定ルナリ、世医動モスレバ、
其戰慄ヲ見テ、參附温補ノ劑ヲ与フ、誤リナリ、此証寒
定レバ、必ス發熱煩渴汗出瘧狀ノ似シ、其寒甚シキ者
ハ、熱モ亦甚シク、寒少者ハ、熱モ亦微ナリ、當芍加桂湯
或ハ柴桂湯ノ類ニテ、微微發汗セシムル、益佳ナリ、コ
ノ症、半產破胎ノ後ナドニ殊ニ多シ、大抵一二發ノ者
ハ、畏ル、ニ足ラズ、若隨胎後、シバク發ル者ハ、變シ
テ瘧病トナリ、終ニ難治ニ至ルコトアリ、知ズンバアル

醉生齋藏版

ヘカヲ

救寒戰咬牙術、先ツ衣被ヲ以テ、病婦ヲ覆ヒ、手巾ヲ沸
湯ニ浸シ、以テ髮中百會ノ穴ヲ蒸シ、温ム、手巾冷レバ
幾回モ、トリカエノ温ムベシ、劃然トシテ、寒戰止ム
モノナリ、蓋シ頭腦ハ、真氣ノ發源、諸陽ノ輻湊ナルガ
故ニ、之ヲ蒸熨シテ、其陽氣ヲ助ケ、其萎縮ヲ舒暢セシ
ムル所ハ、衛氣外達シテ、戰慄頓ニ止ム也
産後忽チ狂亂シテ、錯言妄語、或ハ談笑不絶、鬼物アル
カ如ク、神思不安モノ、多クハ癥瘕アルノ人、偶惱怒羞
辱ノ事アリテ、臨産腹内擾亂、以テ宿癖ヲ動シ、瘀血ト

相併セテ、衝逆スルニ因テ、コノ症ヲナスナリ、主方ハ
白龍散、三黃加辰砂ノ類、撰用スベシ、鎮神諸藥兼用ス
ルモ亦佳ナリ

夫瘧病ハ、産後気血未ダ調ハザルニ、早ク洗浴シ、或ハ
強テ勞動シ、外邪塵ヲ襲ヒ、筋絡之ガ為ニ、急牽シテ成
ル所也、畢竟破傷風モ同症ナリ、是ヲ以テ彼ノ私ニ草
藥ヲ以テ、胎ヲ墮シ、其醜迹ヲ匿サント欲ルモノ、往往
此患ニ罹リ、終ニ不救ヲ致ス也、尤モ恐ルベキノ甚シ
キナリ、其証ノ發セントスル時、胸肋乳邊變急シ、漸ク
ニ口領齒齦ニ及ビ、肩背強直、角弓反張、腹硬滿シ、竟ニ

舌ヲ牽縮スルニ至ル、此ニ到テ、手術ヲ用フト雖、全効
ヲ奏スルコト不能、只其初ヲ救フヲ要トスト知ベシ、先
手術ヲ以テ、病者ヲ屈俛セシメ、反張ノ勢ヲ挫キ、而メ
桃核承氣湯加荆芥、或ハ荆烏圓ノ類ヲ与フベシ、此證
ニ荆芥意外ノ効ヲ奏スルモノナリ、憶知シテ套用ス
ベシ、又背後膏肓邊ヲ刺メ、瀉血スベシ、効アリ、コノ症
古書多ク癩ト混淆シ、其別不分明、然ルニ今之ヲ實事
ニ檢スルニ、其別甚タ著明ナリ、蓋シ瘧也者、其初精神
昏セズ、但口傍耳前、少シク變急シ、或ハ医脈ヲ診スル
ニ掣肘搐搦ノ意ヲ覺エ、或ハ其舌ヲ見ント言ヘバ、口

ヲ開ントスルニ、已ニ牙關緊急シテ、開ク一能ハズ、ヤ
ガテ半時ヲ經ザルニ、項背拘急、角弓反張ス、癩ハ卒然
トメ、人事不省、直視躁煩、反張強直、口噤齟齒ス、且ツ癩
ハ胎前ニ多ク、瘕ハ産後ニ局ル、是其別ナリ

産航云、李挺曰、産後一月内、不可脱衣洗浴、強起離床、
太早、以致外感、身強角弓反張、名曰瘳風、此即瘳也、瘳
之初發、腮項強而能言、漸牙關不開、不能飲食、終必角
弓反張、翼録術而不錄方、其方輕者、葛根湯、重者大承
氣湯類、率非汗下、則不能治、牙關緊急不吞下者、以術
開之、若不得開、則以曲頭管灌之

救瘳術、其仰卧スルモノハ、医婦ノ左肩端ニ著キ、圖ノ
如ク、斜ニ婦ノ下部ニ向ヒ、左膝ヲ豎テ、右手ヲ婦ノ項
後左邊ヨリサシ入レ、右ノ缺盆端ヲ按住シ、手膊ヲ換
ル意ニテ、臂骨ヲ婦ノ枕骨ニ撐シ、力ヲ極メテ、婦ヲ前
へ屈俛セシメ、此時医ノ左手、婦ノ帯ヲ捉へ、按ス意ヲ
帯ビ、右手ノ勢ヒヲ助ク、既ニ屈俛セバ、男帯ヤウノ物
ヲ用テ、婦ノ膝下ヨリ、項へ懸ケ、シカト括リ、反張セサ
ラシムルヤウニシ、後、藥劑ヲ與フ
其坐シタル者ハ、医婦ノ右邊ニ面シテ立チ、圖ノ如ク
右手ヲ婦ノ背後ヨリ、左ノ缺盆下へ入レ、左手ハ右ノ

產科全書外篇 卷六

醉生齋藏版

缺盆前下ニアテ、右ノ臂ニカヲ入レ、枕骨ヲ緊按シ
テ、腰ヲバ沈メナガラニ前へ磨折セシム、若更ニ劇シ
キ者ハ、医腰ヲ沈メ、右膝ヲツキサマニ、一勢、氣ヲ入レ
テ、屈撓セシム

又法、医婦ノ左邊ニ就キ、右手ヲ婦ノ項ヨリ、右ノ缺盆
端へアテ、左手ハ婦ノ帯ヲ握リ、右手ニカヲ入レテ、屈
撓セシムルモ亦好

又法、医婦ノ背後ニ就キ、婦ノ兩腋下ヨリ、医ノ両手ヲ
入レ、婦ノ両肩ヨリ項へ回シ十指相义シ、以テ枕骨ヲ
拘挽セシムルモ亦妙ナリ

救癰術第一圖




產科全書外篇 卷六

三十一

醉生齋藏版

同上 縛帶 圖



三十一

救痙 第二 圖



婦人生產前後溺ヲ得ザル者古人之ヲ轉胞ト云產前
 コレヲ患ル者ハ胎漸ニ重墜シテ尿道ヲ塞ク故ニ安
 胎手術ヲ以テ胎ヲ舉提スレバ即通ス已詳產前諸証中產後
 之ヲ患ル如キハ臨產腹内擾乱ノ際尿管コレガ為ニ
 常度ヲ失ヘル者ナリ互ク洩閉術主之ベシ若小腹緊
 滿推按ニ堪ガルモノハ導水管ヲ用テ之ヲ導ク藥劑
 ハ午車腎氣ノ類ヲ用テ下元ノ守ヲ輔クベシ

劣齊先生曰轉胞之目肇于金匱要略盖以其胞系了
 矣故起斯名耳是固係女人一家之疾而非通于丈夫
 而子之者耳然而說者依其有不得溺之証以胞為膀

籍或稱胞轉終為通于男女之病矣殊不

知古所謂胞者皆女人子宮之謂而謂膀胱者甚罕焉
 內經史子所言可以見也今視世患此症者率皆婦人
 生產前後或孕胎重墜併延子臟逼膀胱下口通溺之
 處或分身後子戶腫脹墜下梗尿道因之小水不利者
 而已是皆子宮失其常位轉延易地終為此證者而非
 膀胱部位受病而致此也其所謂了矣亦唯言其失經
 常者而非交糾纏蓋之謂也故如吾門洩閉手法則自
 腹外用手抱起其墜下子宮而復故位則畜溺隨手而
 通泄又有外傳熨散方間亦有驗者可見非膀胱繫系

之所關也。古人處之以腎氣丸者，蓋其轉戾也。原為下元失守之所致焉。所以溫補宣通劑主之也。但此証多急劇者，而服藥却難立見效焉。故專擇外導手法之有捷驗者，治之為妙。若夫藥之不立見效，則愈服愈脹，徒重其疾患，殆類惡醉而強酒者，不為不多矣。是吾門之所以不務內治而主外法也。若果關膀胱繫系之病，則豈外按手法所能及乎。胞之為子宮者，可以知也。且古書所謂者，若素問曰：女子胞，名曰奇恒之府。又曰：月華不來者，胞脈閉也。又曰：胞移熱於膀胱，則癰瀝血。又曰：是胞精子不足也。又曰：脾胞膀胱，靈樞曰：

胞則夢洩便。又曰：石瘕生於胞中。又曰：衝脈任脈皆起於胞中。脈經曰：肥人脈細，胞有寒，故令少子。莊子曰：胞有重閭。漢書曰：同胞之徒。呂覽因注曰：視其胞裏。詩箋曰：母之胞胎之類，皆正謂子宮者也。但雖經中一二有指膀胱者，竟非胞字本義也。說文註胞字曰：兒生囊也。蓋古義也。解者以為胎衣者，誤也。按兒生囊者，兒所生之包囊，即謂子宮也。凡包物者，謂之胞。胞衣眼胞之類皆然。子宮即包容兒胎之處，故謂之胞也。如以膀胱為胞者，亦假借此義者爾。說文別注脬字曰：膀胱也。可見古胞脬二字，義有各別也。或曰胞之為子

宮已聞其說，但說文云：臍膀胱也。而臍胞字本通用，且
嵇康與山濤絕交書曰：每常小便而忍不起，令胞中略
轉乃起耳。由是觀之，以胞為膀胱者，亦未必為謬乎。曰
是則轉胞之所以為係女人一家之疾也。夫謂膀胱為
胞者，古書亦非不言焉。素問曰：暴癱筋綆，隨分而痛，魄
汗不盡，胞氣不足，治在經俞。又曰：胞痺者，少腹膀胱按
之內痛。靈樞曰：膀胱之胞，薄以懦。史記曰：風痺客臍，難
於大小溲溺赤之類，皆以為膀胱者也。而特以腎氣丸
條胞，斷為女人子宮者，既載之於婦人篇中，且曰：婦人
一家之疾，而非通于丈夫之名也。若果

疾，則何不載之於第十三篇中，而特載之
於婦人篇中乎。但以其生產前後，各有此証，故不載之
於妊娠與產後篇，而載之於雜病篇者，可以見也。如陳
言、朱震亨徒以為妊娠胎滿，逼胞所致者，端為有身之
病矣。殊不知此証少於胎妊，而多於新產，蓋僻論而已。
後世方書，命丈夫溺閉，亦謂之轉胞者，即指膀胱轉戾
者，而與古所謂轉胞，名同實異。後之說者，眩不得溺之
証，而以胞為膀胱之訛也。甚則至曰：轉胞，元是男子之
病，而婦人亦同稱耳。疑應是仲景本論已脫，而今唯遺
婦人門中一論也。一本堂行
餘醫言又曰：胞系以下九字，恐後

人攬入之言可謂蛇足矣高橋篤之、醫學救弊論嗚呼何妄之太

甚哉或又曰內經史子所謂胞宜以為子宮矣獨在金

匱則宜以為膀胱矣也夫書各有一書言吾子何太固

陋耶曰吁子何讀書之浮哉夫金匱中既有妊娠腹中

痛為胞阻及歷年血寒積結胞門等語果如子之言則

胞阻胞門亦當為溺囊也吁子何讀書之浮哉客唯而

退

婦人虛憊シテ坐スルヲ能ハザルモノハ先ツ

仰臥セシメテ醫其右邊ニ就キ右手ヲ以テ婦人橫骨

上ニ任脈ヨリ少ク左ノ部ヲ探リ得テ之

ヲ以テナソノ上ヘ疊子膀胱膨脹ノ部ヲ絞ル

意ニテカヲ加テ徐カニ推轉スベシ其部位少シモ乖

ハ徒ラニ痛楚セシムルノミテ効些モナシ由テ產

婦ニ訊テ應ズルトナラバ婦ノ心ニ小波ノ通ズルヲオボユル也其處ヲ

不失ノ強ク絞ル意ナリ其竅應手則快ク射出ス處ヲ

失ヘハ唯皮上痛楚ノミニテ何ノ詮モ無し心得ベシ

一回ニテ洩未出尽ハ二回三回ニモ絞去ナリ

又法尋常正産ノ後尿閉スル者或ハ又未ダ衰憊ニ至

ザルモノ如キハ圖ノ如ク婦人宙腰ニナリ股ヲ開

キ尿管ニ臨ミ醫ハ婦背後ニ就キ兩膝頭ヲ婦ノ腰眼

邊ニ推シアテ、両手ヲ婦ノ左右腋下ヨリ、前腹ヘマワ
シ、前法ノ如ク、臍下横骨上ノ穴ヲ按提ス

又法、婦側卧シタルマ、ニテ、舊綿衣ノ類ヲ陰門ニア
テ、医ハ婦背後ニ居、膝頭ヲ婦ノ八膠邊ニアテ、肘ヲ聳

カシ、前腹ニ臨テ、双手ニテ、亦前法ノ如ク絞去ルモ好
シ、スベテ尿閉ハ、腹部膨脹甚シキモノナレバ、イヅレ

ニモ、術ヲ施スニ當テハ、疼ミヲ覺ユルモノナリ、サレ
ル窾ニ中レバ、小洩快ク通ズルナレバ、其疼ミハ堪忍

ブモノナリ
又法、河内ノ婦ヲ用ルニ便ナラズ、及ビ虚脱殊ニ甚シ

ク、石ハ導水管ヲ用ルヲ、至極切當トス、ソ

ノ法、婦人ヲシテ仰卧シ、股ヲ開カシメ、医婦、右邊ニ坐シ、

子ニ導水管ヲ執リ、油ヲ管梢ニヌリ、左手ノ指頭ニ

テ、尿管ヲ左右ヘ展開キ、尿道口ヲ發露シ、徐徐ニ導水

管ヲ進メ、既ニ膀胱中ニ達シヌレバ、小水ハ忽チ通泄

スルナリ、若シ管ヲ進ムルニ支障シテ、進ミ難キハ、管
梢ヲ微微ニ左右ヘ動搖シ進ムレバ、進入スト云フナ
シ、凡此術、洩閉ニ優ルコト四アリ、一ニ患者痛苦无ク、二
ニ短捷ニ効ヲ取、三ニ患者ノ努力ヲ假ラズ、四ニ元氣
ヲ暴脱スルノ虞リ无シ、是故ニ虚極ノ証ニ在テ、最モ

要術トス、互ク當ニ產科者流、此是器ヲ常ニ備ヘテ以テ急卒ノ用ニ充ツベシ、但婦女ツノ醜態ヲ發露スルヲ忌憚ル者ニ於テハ、洩閉術ニ從スヲ能トス

洩閉術

第一圖



同第二圖



尿管因テ守リヲ失ヒ終ニコノ証ヲ致ス者ナリ本ト
尿管閉ト機ヲ同フセリ彼ハ閉塞此ハ遺泄ヲ異リトス
ルノミ主方ハ午車腎氣ノ類ヲ与フ

産後大便閉結スルモノ其常ナリ蓋シ血液已ニ虚ス
ルト乳汁ヲ醸ストニ因テ然リ當ニ家方潤腸丸ヲ与
テ微利ヲ取ベシ若日久不通ハ終ニハ燥屎トナリ由
テ大ニ苦ムコアリ

金匱要畧云新産婦人有三病一者病瘕二者病鬱冒
三者大便難云云亡津液胃燥故大便難

產後下利甚夕恐ルベシ、コノ症脾胃虛弱ノ人、飲食ヲ
 謹マズ、生冷堅硬ノ物ナド食スルニ因テ、ナス所ナリ、
 當ニソノ飲食ヲ問テ、食禁ヲ嚴ニシ、用藜香砂六君子
 湯、或ハ桂枝人参加茯苓芍藥湯、或ハ理中湯、真武湯ノ
 類ヲ換用スベシ、藥食保護、十全十ラザレバ、終ニ虛敗
 シテ救ハザルニ至ルベシ、又ク心ヲ用フベキ所也
 凡臨産ニ強テ努カシ、由テ娩後ニ子宮脱出不斂、ア
 述ニ術ヲ用テ之ヲ收メ復セシメヨ、又胞膜ノ餘リ、
 陰戸ニ夾窄シテ、一端ヲ見ハスモノアリ、然レモ其質
 白ク、
 白ト同ジカラズ、コレ辨ヲ俟ズ、
 知ル

ナ
 ルモノアリ、コノ症、陰肉破傷シテ、脱シタルニモアラ
 腸ノ脱シタルニモアラズシテ、コレ陰裏自ラ一
 種ノ努肉ヲ生シタルナリ、畢竟ハ瘤贅ノ如キモノナ
 リ、藥線ニテ緊紮シ斷シテヨシ、漸漸ニ黒ク腐リテ去
 ルナリ
 收子宮脱術 患婦ヲシテ、仰卧、側卧、其便互ニ從ヒ、其兩
 脚ヲ屈シ、膝頭ヲ左右ヘ開カシメ、先ツ蘿蔔乾葉、或ハ
 六味薰洗ノ煎汁ヲ、綿布ニ浸シテ、以テ其宮脱ヲ蒸
 シ澤シ、而シテ右手拇指ト、他ノ四指ト、又、其突出セル子

宮口ノ兩旁ニ著ケ、シカト持テ、陰戸中へ推シ送り收
 メ、食中ニ指頭ニテ、深ク推入レ、更ニ杏仁ヲ研リ、泥ノ
 如クシ、小雞蛋ノ大サホド、絹ニ包シテ、陰戸中へ深ク
 入レ、兩脚ヲ伸シ、身ヲ反ル意ニナサシムレバ、陰戸シ
 マリテ納リ易シ

文化甲戌、江州蒲生郡、金剛寺村、農家ノ婦、五六年來、腹
 中塊ヲ結ブ、其大廿七八月ノ胎ノ如シ、漸漸產門ニ壓
 テ、行歩ヲ妨クルニ至ル、一日偶力息至リ、恰モ臨
 産ノ如シ、三四日壓迫逾、甚シク、終ニ尿道ヲ閉塞シ、小
 便不能出、且チ小腹滿痛、衆醫百治无驗、因テ相議シ

尿道ヲ疏通スベシト、因テ一醫ヲ招ク、醫未至ニ、忽然
 一物ヲ免下ス、之ニ由テ、崩血甚シク、昏暈ノ候
 アリ、畜水モ亦隨テ通ジ、腹中頓ニ空虚ス、醫既ニ至ル
 比、症候大ニ懸隔セリ、醫云フ、コレ予カ治スル所ニ非
 ス、急ニ水原氏ヲ迎テ、治ヲ乞フベシト、予請ニ應シ、往
 テ診ス、崩血甚シク、昏暈人ヲ知ラズ、就テ檢スレバ、陰
 門一物ヲ垂下ス、頭大ニメ、根ハ細シ、正ニ酒壘ヲ掛ル
 カ如シ、ソノ頭ハ紫黑色ニメ、根ハ淡紅色ナリ、試ニ
 其細キ處ヲ撮シ見ルニ、動脈指頭ニ應ズ、乃チ針ヲ以

テ紫黒ノ部ヲ刺スニ痛ヲ覺ズ微シク淡紅ノ處ニ觸ルレバ忽チ疼ヲオボユ先ツ禁暈術ヲ施シ膠艾四物湯加人參ヲ与テ其急ヲ救ヒ明日再診ヲ約シ去ル一医コノ奇狀ヲ聞キ自ラ到テ診セント請フアリ乃チ診セシムルニ其言ニ曰此物速ニ截斷セサレバ腐爛終ニ腹中ニ及ンデ死セシ即今コレヲ截ツト雖其生預メ期レカタシ若シ親戚懇ニ請ハバ我レ粉骨シテ治セン耳ト病家肯テ不乞予明日往テ其事ヲ聞家人ヲ呼テ謂テ曰今コレヲ刀割セハ恐クハ復崩血昏

ノ痛ヲ請フ因テ軟革一條ヲ以テ細部ヲ其痛ヲ更ニ麻線ニテ其ガ外表ヲ緊紮スコレ恐レテ也些ノ疼ミヲ覺エズサテ翌日ニナレバ大部頗ル怒脹セリ復ビ緊紮シテ三日ニ至リ漸ク腐爛ス臭穢鼻ヲ撲ツ試ミニ爪破スルニ外面ノ黒瘀片片褪落シテ質半バヲ減ジタリ爾後緊紮スルゴトニ縮小シテ既ニ筋ノ大サニ至リ又予思ヘラタ褪落シ盡ルノ際恐ラクハ變アレント乃チ家人ニ語テ云若シ斷除セバ速ニ爲ニ余ニ告知セヨト而シテ明日午時ヲ過レバ信ナシ予恠ミ往テ之ヲ看ル病婦出テ厨下ニ坐セリ

謂之曰前夜臥寐人間斷去之褥上二安放入亦何之苦
狀モナレト因テ探宮シテ其斷痕ヲ覓ルニ陰内最深
處ニ小孔一分許ノモノ纔ニ指頭ニ觸ルノミニシ
テ其餘ハ空濶常ノ物ノ如シ調理スル一三十餘日ニ
シテ五六年ノ沈痾平愈セリ此症奇而奇ナル者ナ
リ

劣齋先生曰說文云媿女出病也即後所謂陰挺是也

書或謂之下脫病源候論曰陰脫千金方曰陰痔證治準繩又因

其形似而謂之陰茄瘡瘍全書曰陰蕈全曰脫花症便方曰

張氏曰茄子疾女科準繩曰陰繭瘡瘍全書曰茄

並謂由產時努軀陰肉脫出者也又曰腸

疝核見王叔和脈經紅茄紫茄見壽世保元角見本艸

目人魄下云角者有物如角古名陰挺是也陰翻見綱目附方澤蘭翻花

瘡見瘡瘍全書子儀見簡明醫彙俱言前陰挺突証子

玄子產論稱腸脫者盖亦指此耳俱其以腸脫宮脫分

為二症者謬矣古時呼盤腸堆腸者大金良方云堆腸生人名盤腸產

乃謂子宮下垂也此亦雖因臨產用力所致自与陰挺

不同如李氏醫學入門云盤腸者小腸先出張氏醫通

云人之二腸俱有脂膜連絡間有生成無膜連絡者則

產時其腸隨兒而下謂之盤腸產直為大小腸下脫者

