


18167

~~11~~

200

Collection
of
the
...

1167





BA 1167
JOANNIS DV BOYS,

Pharmacopœi Parisiensis

METHODVS

Miscendi & conficiendi Medicamenta,

*Diligenter recognita, & à multis, quibus antea
scatebat mendis, repurgata.*

Novæ huic editioni accessit

HISPALENSIVM

PHARMACOPOLIORVM

Recognitio,

AUCTORE,

D. SIMONE È TOVAR,

Hispalensi Medico.



HAGÆ-COMITIS.

Ex Officina THEODORI MAIRE.

CIDCCXL.



Clarissimo & Excellentissimo

V I R O

D. I S A A C O

V A N D A M M E,

Medicinæ Doctōri ut expertissi-
mo sic foelicissimo,

Domino suo plurimum colendo.

A Vctorem hunc, me-
dicorum literatissi-
me, à te oblatum &
ob multijugas utilissimi ope-
ris laudes non mediocriter
commendatum tibi, ita uti

(:::) 2 fas

fas erat, restituo: sed repurgatum à multis mendis, quibus scatebat, infælicium & inficetorum typothetarum incuria ante annos aliquot Parisiis editus. Num autè jam ex officina mea omnibus numeris absolutus renascatur, tuum esto judicium, qui mihi unus instar omnium. Quocirca eum tuis potissimum auspiciis denuo publicádum censui, tuo unius præsidio adversus invidorum & obtreptatorum malignas voces satis tutum fore arbitratus: ea enim

DEDICATORIA.

enim flores gratia, insignibus
 tuis meritis quæsitæ, quod ju-
 stos disciplinarum passus fie-
 ri gradus, non cruda adhuc
 studia ad Medicinã propule-
 ris, sed Græce pariter ac La-
 tine apprime doctus, omni-
 bus Philosophiæ partibus fi-
 deliter perceptis, tũ demum
 rite atq; ordine ad artis Me-
 dicæ sacra accesseris, ut ne-
 mo ab eo, quod tuo semel
 comprobatum iudicio ste-
 tit, temere dissentire au-
 deat. Quo fretus supersedebō
 hic varias hujus Scripti lau-
 des

des quasi toto horreo reme-
tiri, ne videar te velle doce-
re, quas à te tantum accepi
virtutes, & in me competat
tritum illud *υδαϊκας ἰς Αἰθίωας*, &
sus minervam, aut populo,
meo testimonio, obtrufum
eam, quod tua auctoritate
nixū, tam tenui tibicine non
eget. Talibus enim libris Cu-
rione non opus est, & præ-
terea hoc tibi debebit avidus
Lector, quod ad primam
paginam non lassus perve-
niet.

T. E. *Observantiss.*

THEODOR. MAIRE.



P R Æ F A T I



Si complures viri doctrina, ingenio & iudicio excellentes, præclaris artem medicam præceptis illustrarunt; nullus adhuc tamen (quod illorum pace dixerim) extitisse mihi quidem videtur, qui veram miscendi medicamenta methodum exacte tradiderit. Nam alii partem hanc prorsus intactam præterierunt; alii parce attigerunt; alii valde obscuram & incertam reliquerunt; alii in infinitas eam controversias adduxerunt. Atque inde adeo fit, ut quæ scriptis aut omnino non mandata est aut certe ambi-

guè ea quisque pro animi utatur sententia, & proprio plerumque feratur iudicio. Immo (quod longe est deterius) imperiti medicamenta conficiendi adolentes, dum artis rudimenta discunt, seque in iis exercent, dominis interdum absentibus, ipsi præceptore destituti, interdum quoque præceptorum institutis, & dominorum vestigiis insistere recusantes, multos & graves errores committunt. Quæ cum ego incommoda, pro meo in omnes rei medicamentariæ studiosos animo, serio apud me frequenter expenderem, & pro publico jam vitæ meæ instituto, nonnulla domi meæ simplicia, quibus ad composita opus est, accurate medicamenta præpararem, forte ita usu venit, ut, qui me opus facientem observarunt (neque ii
vul-

vulgaris certe auctoritatis homines, neque segniter in re medica versati) obnixè me rogarent, si quid ea in re possem, meam ut communi omnium utilitati operam non denegarem. Ego vero, quanquam id initio, mei probe conscius ingenii, constanter mihi abnuerem, improbis tamen multorum precibus defatigatus, tandem parui, & pro meis viribus rem cæpi aggredi, ab iis scilicet auspiciatus, quæ externo admoventur corpori. Quorum quidem usus, ut minus videri potest periculosus, ita perdifficilis tamen eorum composito singularem periti Pharmacopæi industriam requiri. Sunt autem ea, Cerata, Emplastra, Unguenta, Olea: quæ & si multas & varias sortiuntur formulas, singula tamen suo explicabimus ordine, quanta id

poterimus facilitate. Neque enim ea inter se tam ratione & materia differunt, quam consistentia, hoc est, soliditate, mollitie & liquiditate. Nam quæ recipiunt Cerata, ea quoque Emplastra & Vnguenta admittunt. Nunc igitur ad eorum descriptiones accedamus.





DE CERATIS ET EMPLASTRIS.

CERATUM *a* est medicamentum aggregatum ex stirpium partibus, metallicis, mineralibus, terra & animalium partibus, cum cera, ad formam solidam. Proportio autem Cerati est, *b* ut pro unciis tribus olei, ponatur ceræ semuncia, specierum vero drachmæ duæ vel tres. Si liquidius vis habere Ceratum, quarta pars ceræ est ponenda: si solidus, tertia: *c* si ad formam Emplastri, secunda: differtque ab Emplastro tantum mollitie, quia minus ceræ recipit, quam Emplastrum,

A 3 no-

a Ceratum quid. *b* Cera & olei vera proportio ad Ceratum conficiendum. *c* Emplastrum quid.

6 D E C E R A T I S
nomenque habet à cera. Emplastrum
vero medicamentum esse dicemus ag-
gregatum ex *a* metallicis, mineralibus,
terra & animalium partibus simul mix-
tis, durum valde, & solidum, quia
plus ceræ recipit. Nam in Emplastri
compositione ponitur ceræ uncia una
dimidia, olei drachmæ sex, si nulla
alia ingrediantur, sive hyeme, sive
æstate. Atque hæc quidem satis sit ad-
monuisse de quantitate ceræ, & olei.
Nunc dicendum est in genere, quæ sit
illorum materia, & quomodo in Ce-
ratis, Emplastris & Unguentis ap-
ponatur: deinde modum conficiendi,
seu miscendi præscribemus.

Cerata,

*a Cera & olei vera proportio ad Emplastrum confi-
ciendum.*

	Stirpium partibus, ut	Mucaginibus, quæ ex radicibus & feminibus conficiuntur: Gummi generibus, ut lacrymis omnibus, liquoribus concretis & non con- cretis, unctuosis, & a- quosis, radicibus, cor- ticibus, herbis, flori- bus, feminibus & con- similibus.
Cera- ta, Em- plastra, unguē- ta cōfi- ciun- tur. Ex	Metalli- cis, Mi- neralibus, & Terra, ut	Lithargyrio utroque, Cerusa, Sādaracha ve- terū, Cinnabari, ære u- sto, æruginis specie- bus, flore æris, plūbo, pompholyge, bolo ar- mena & consimilibus.
	Anima- lium par- tibus, ut	Cera, ladano, axungiiis omnibus, oesypo, bu- tyro, Seborum generi- bus, melle, moscho, ambra, zibetta, glu- tine piscium, stercore omni, osse Sepiæ, cra- nio humano, mumia.

Mucagines coctæ adduntur in Emplastris post nutritionem & perfectam coctionem lithargyrij paulatim affundendo, sicque coquuntur ad ipsarum consumptionem, ut videre licebit infra in Emplastris diachyla magni & parvi. In quibusdam unguentis, postquam cera est cum oleis, axungijs, adipibus liquata, & ab igne deposita, frige facta, semper spatula movendo injiciuntur: ut in unguento resumptivo, & in omnibus unguentis, quæ quotidie à medicis præscribuntur.

Gummi, quæ sunt parteis Stirpium, ut lacrymæ, liquores concreti & non concreti, quædam spatio sex horarum super cineribus calidis macerantur, proprio & convenienti liquore, (sæpissime in aceto forti, vel vino, ut paulatim solvantur) deinde igne lento, ad humidi non radicalis consumptionem continua agitatione coquuntur, cocta & consumpta humiditate cum terebinthina (si ea addenda veniat) conjunguntur,

guntur, in Ceratis, Emplastris & Unguentis permiscentur, prius tamen cera, axungia, sepo, medullis &c. liquefactis & refrigeratis, ut

Ammoniacum, Opopanax,

Galbanum, Asa fœtida,

Sagapenum, Bdelliũ, si molle sit.

Gummi alia genera, Thus utrumque, Mirra, Maltiche, Lacca, Hædera, Sarcocolla, Juniperinum, Belzoi, Euphorbium vetus, Aloë, separatim in pulverem tenuissimum reducuntur, ordineque sub finem injiciuntur.

Gummi alia calore modico cum oleis separatim vel simul cum axungiiis, adipibus, sepis & butyro, ut & Terebinthina, Resina utraque, Colophonia, pice utraque, spatula semper du-cendo, solvuntur, & in initio, aliquando in medio, aliquando in fine ponuntur, ut in Emplastro gratia Dei & in unguento Basilico minori & in Emplastro pro stomacho.

Gummi alia dissolvuntur calore me-

diocri cum humore convenienti, ut opium cum pauca aqua rosacea, in unguento rosato Mesuæ, (si requiratur) tragacanthum, arabicum, in unguento resumptivo, hypocistis, acacia (si admittantur) omnia ante infusionem, vel asperisionem pulverum, Ceratis, & Unguentis induntur.

Radices, cortices, herbæ, flores, aliæque stirpium partes, aliquando recentes, aliquando siccæ necessariæ sunt. Recentes omnes à corde interno separatim insciduntur, & pistillo ligneo in mortario lapideo contunduntur, quæ ubi contusæ fuerint, igne lento una in vino (ut in Cerato Joannis de Vigo, in unguento Neapolitano) aut in oleis (ut in unguento Agrippæ) aut in axungis & adipibus (ut in unguento populeo) infunduntur, & continua agitatione coquantur, ut infra videre licebit: scilicet quæ vino maceratae sunt, ad medias: deinde colantur. Colata vero cum cera, oleis, axungis, & adipibus

bus ad humidi peremptionem eodem igne coquuntur, & in Ceratis, Emplastris Vnguentisq; primum locum obtinent. Quæ vero in oleis, axungiiis & adipibus infunduntur, igne levi, spatula semper ducendo, ne urantur, coquuntur, donec nihil humidi remaneat: deinde linteolo rudi extorquendo, transcolantur, & quod siccum est, abjicitur: & hæc in Emplastris & Vnguentis etiam primum locum habent. Radices, cortices, herbæ, flores sicci, secundum suam substantiam ordine, vel per se, in pulverem tenuissimum reducuntur, & ultimo ordine in Ceratis, Emplastris, & Vnguentis permiscentur.

Metalla vel Mineralia separatim super porphyrio molula porphyrica, liquore convenienti asperso, ducuntur, eousq; dum in pulverem reducta sint: ut Cerusa, Lithargyrium utrumque. Alii in mortario æreo Cerusam, Lithargyrium utrumq; lavando tractant

(ut in modo miscendi dicemus) quæ deinde cum oleis folis , aut axungiiis & adipibus igne lento, spatula assidue ducendo, aliquot horis nutriuntur, & coquantur, cocta secundum in Emplastris & unguentis obtinent locum, & aliquando primum, scilicet cum est magna eorum quantitas.

Metalla ut Sandaracha veterum, Cinnabaris, æs ustum, Pompholygis genera &c. pulverata, cum in Emplastris & Unguentis quantitate parva ponuntur, debent poni cum cera liquata est cum oleo, vel cum axungiiis & adipibus jam refrigeratis, ut videre licebit, in Emplastro contra rupturam, & unguento diapomphylicos.

Alia extinguuntur, & cum massa Emplastri, vel unguenti refrigerata est, in fine ponuntur, ut argentum vivum, &c.

Animalium parteis, liquantur ordine, quædam per se, aut cum oleis, ut Cera, Ladanum, calore moderato, &

sunt

sunt in quibusdam Ceratis & Emplastris præcipuum corpus, ut in Emplaistro pro matrice. Quædam separatim, vel una aliquando cum oleis liquantur calore modico, nivis ac grandinis modo, ut axungia & adipēs omnes, oesypus, butyrum, seporum genera & mel, quæ in Ceratis & Emplastris ponuntur, postquam cera erit liquefacta, vel cum Lithargyrium decoctum est in modum unguenti. In unguentis vero primum obtinent locum dempta oesyppo, quæ in fine Cerati, Emplastris & Unguentis semper poni debet. Aliæ vero cum liquoribus minime unctuosiss in mortario dissolvuntur, ut moschus, ambra (quamvis tamen facile calore modico liquari potest) zibetta, gluten piscium, stercus omne, & in Ceratis, Emplastris & Unguentis initio quidem ut gluten piscium, stercus omne, in fine vero moschus, ambra, zibetta admiscuntur, sed raro nisi à Medicis præscribantur.

Hæc-

Haëtenus breviter liquationes, dissolutiones, coëctiones, & triturationes quæ conveniunt ad Ceratorum, Emplastrorum, Unguentorum & Oleorum confecturam expedivimus. Reliquum est ut ordine, illorum conficiendorum, methodum præscribamus.





SECTIO PRIMA.

CAPVT I.

*Ceratum de Santalis Mesuæ, distinctio-
ne XI. de Vnguentis & Emplastris V suale.*

Textus verus Mesuæ.

a Rosas rubras exun- guatas accipe.	℥. 4 rosarum ℥ xij.
b Spodium Arabicum intellige, quia compo- sitio est Arabica, de- betque hoc loco lavari propter acrimoniam ab igne contractam. Nam ut ait Galenus, qua- eruntur, acria sunt: huiusmodi autem a- cria huic loco non con- veniunt, cum ad frigi- dos affectus hoc cera- tum accommodetur.	Santalorum rubeo- rum. ℥ x. Santali albi. Santali citrini ana. ℥ vj. Boli Armenicæ ℥ vij. b Spodii ℥ iiij. Caphuræ ℥ ij. c Cera

c Ceram ponticam naturaliter albam cape, sed ejus loco alba nostra factitia utimur.

*c Ceræ albæ ℥ iiij.
℥ vj.*

d Oleum rosatum immaturum authoris descriptionis, accipe.

d Olei rosati ℥. j.

Conficiatur & administretur. Sunt qui lavant oleum, & ceram prius, & postea permiscunt cum aliis, & est melius.

S C H O L I A.

S Antala omnia frustratim divisa simul in mortario contundes, aquam rosaccam (ne subtilior pars effluat) aspergendo: cumque fere, vel omnino erunt pulverisata, rosas addes, ut simul cum reliquo pulvere santalorum perfecte tundantur: deinde tenuissimo cribro transmittes, nec non servabis, donec bolum armenicam & spodium in pulverem redegeris separatim tenuissime ut alcooch. Deinde cum aliis pulveribus, ante paratis, paulatim permiscabis, & ad usum servabis. Postea ceram contractam in lebere cum oleo, cineribus calidis

calidis aut balneo mariæ liquabis : deinde ubi erit liquata & oleo commixta , aqua rosacea lavabis ter aut quater , semper abjiciendo aquam , & aliam innovando (quanquam re vera , si ceram albam bene depuratam & recentem habeamus , oleumque recens , non est opus ablutione) deinde igne lento siccabis ne humiditas ex lotionem remanens , rancorem & putredinem , temporis intercapedine , cause-tur. Postea finito frigescere , & pulveres prædictos , quos ad usum servaveris , im-misce : demum caphuram in mortario cum pistillo calido paululo aquæ rosacæ solutam (quam alii cum paucis oleo terebinthinæ liquant , quod minime fieri debet , cum terebinthina pro scopo compositionis videatur calidior) totumque probe commixtum , ad usum reconde.

V I R E S E X M E S V A.

Ad sedandum inflammationes & apostemata dura , calida & super calefactiones , quæ sunt in stomacho & hepate , maxime prodest.

C A P V T I I.

Ceratum nobilissimæ operationis Ioannis de Vigo 2. capit. libr. 5. qui intituletur de morbo gallico confirmato, cum ulcerationibus. Usuale.

Textus de Vigo verus ponderibus duplicatis.

- | | |
|---|--|
| <p>a Oleum chama-
meli, anethinum,
de lilio, de croco,
Mesue descripti-
onis accipe.</p> | <p>℥. a Olei chamæmeli.
Olei anethi.</p> |
| <p>b Oleum de spi-
ca per sublima-
tionē factum, nō-
nulli capiunt. A-
lii de spica nardi
compositum.</p> | <p>b Olei de spica.
Olei de lilio. ana. ℥ iiij.
Olei de croco. ℥ ij.</p> |
| <p>c Alii lib. ij.</p> | <p>c Pinguedinis porcine.
℥. j.</p> |
| <p>d Euphorbium
recens magis con-
venit intentioni
ratione calidita-
tis.</p> | <p>Pinguedinis vitulinæ.
℥. j.
d Euphorbii. ℥ x.</p> |

e Thu-

e *Thus masculinum cape.* e *Thuris.* ℥ x x.

Olei laurini. ℥ iiij.

Ranas viventes. Nu. xij.

Pinguedinis viperæ. ℥ v.

Lumbricorum lotorum
in vino. ℥ viij.

Succi radicis Ebuli.

f *Inule radicis
succum accipe.*

f *Inulæ.* ana. ℥ iiij.

Schœnantii.

g *Arabica.*

g *Stœchados.*

h *Matricariam
cum floribus in-
tellige.*

b *Matricariæ.* ana. M. ij.

Vini odoriferi. ℥. iiij.

Bulliant omnia simul
usque ad consumptio-
nẽm vini, deinde colen-
tur, cui colaturæ addan-
tur.

i *Litha-*

i Lithargyrium *i Lithargyrij auri.* . ij.
lotum accipe. ℥ viij.

Terebinthinæ claræ.
 ℥ iiij.

Et cum cera alba sufficienti ad ignem fiat Ceratum ad modum Sparadrapii, addendo in fine cocturæ,

Styracis liquidæ. ℥ iiij.

Deinde ab igne auferatur, baculo agitando, donec tepidum fuerit, postmodum addentur,

Argenti vivi extincti
 cum saliva. ℥ viij.

Iterum agitando baculo, donec argentum vivum optime incorporetur.

S C H O L I A.

Debent lumbrici terrena exinaniri faece, & aqua fontana ter aut quater semper abjiciendo aquã, & aliam innovãdo, ieviter abluui, ut quicquid terræ illis adhæserit, auferatur: debent quoque illo vino, quod hanc compositionem ingreditur, macerari, cumque his & eodem vino ranæ adhuc vivæ incoqui ad tertiæ partis consumptionem Tunc Matricariam quoque incisam injicies, deinde Schænanthum incisum ac parum contusum, & Stœcadem ad semilibræ coquendo consumptionem, ut ex quatuor primis libris duæ tantum remaneant. Postea permittes omnia simul ita macerari, donec decoctum penitus refrigeratum sit: deinde colabis per pannum cannabinum rudem, velociter extorquendo, servabisq; quoad tandé lithargyrium a nutriatur, agitando baculo, vel spatula lignea, duodecim horarum spatio in lebete amplo cum Oleo chamæmelino, anethino, de lilio, croco & axungiiis procinis, vitulinis & viperinis. Alii postquã lithargyrium spissitudinem unguen-

a Lithargyrii vera nutritio ad Cerata, Emplastra & unguenta consicienda.

unguenti cum oleis adeptum sit , tunc a-
 xungias paulatim omnes addunt, iterumq;
 cum lithargyro ad mellis crassitiem co-
 quunt. Omnibusque his post nutritionem
 peractam mixtis, fiat decoctio lenta, do-
 nec lithargyrium spissitudinem unguenti
 acquirat, nec fundo vasis adhæreat, quod
 quidem veræ mixtionis indicium erit
 (quæ vulgo incorporatio appellatur) in-
 quod lithargyrium ita paratum, & deco-
 ctum, semilibram prædictæ decoctionis
 infundes, ab igne illud auferendo, ne re-
 pentino novarum rerum contactu effluat
 & elabatur: posteaque iterum igni forti
 ad coquendum appones, donec prima in-
 jectâ humiditas tota absumatur: sæpiusq;
 idem factitabis, reliquas partes prædictæ
 decoctionis paulatim injiciendo, donec
 universa humiditas consumatur: ita ut
 unaquæq; decoctionis infusio, non exce-
 dat semilibram. Statim his peractis, succos
 ebuli & inulæ campanæ minime defæ-
 catos in lithargyrium ita paratum, infun-
 des. Tunc igne adaucto lithargyrium per-
 fectius ad sacchari rosati formam conco-
 ques, vel ad consumptionem dictorum
 succorum, alias non asservaretur sine pu-
 tredine. Posthæc ab igne sepones, & quam-
 primum ceram minutim incisam (si desi-
 deretur)

deretur) conjicies, qualiquata, totum refrigerare permittes. Deinde Thus, Euphorbium semotim in modum alcooch pulverisatum desuper insperges. Demum argentum vivum prius defæcatum agitatione & maceratione in aceto albo facta; postmodum trànscolatione duplici vel triplici facta, per pãnum densum vel corium comprimendo, ut quicquid terrei vel plũbei inest, auferatur, extinctumq; cum saliva humana una cum terebinthina, Styrace liquida, oleo laurino, & de spica commixtum & incorporatum, conjicies ac subiges, magdalconesq; finges. Cæterum, antequam hanc aggrediatur Pharmacopola emplastri compositionem, debet diligenter animadvertere, ut olea pellucida habeat, pariterque pinguedines unum diem vetustate non excedentes: alii vetustissimas pinguedines accipiunt pro scopo compositionis. Præterea modus ab authore scriptus, minime approbãdus mihi videtur, cum vult axungias seu pinguedines, Thus, Euphorbium cum cæteris aliis simul concoqui. Nam si ita fieret, totum medicamentum coctione corrumperetur. Quædam enim longiori, alia breviori coctione indigent. Quare consulem secundum modum à nobis descriptum

ptum potius faciendum esse, quam secundum alium modum ab authore descriptum.

Ping. porcinæ.

Ping. vituli.

Ping. viperæ.]

Hæ autem duæ primæ & pinguedines sumi ex animalibus vigente autumno debent, cum per hoc tempus animalia sint graciliora & præcipue circa renes. Sed viperina, finiente vere, nondum tamen æstate inchoata, & maxime circa zirbum, *b* id est, circa intestina. Debentque quoque in hunc modum præparari. In largiori aquæ *c* frigidissimæ copia, tunicis exemptis, convenit pinguedines confricari, deinde firmiter expressas siccare, subindeque alia recenti aqua lavari & exsiccare, ut prius: hæcque ablutio debet ter aut quater repeti, semper abjiciendo aquam & aliam innovando, donec ultima aqua conspiciatur sincera & nitida. Deinde eas oportebit in minutissimas partes dividere, & vase duplici liquefacere, spatula lignea aliquoties agitando: reliquas colo transfundere in aquam, donec frigescant: quibus refrigeratis, aqua lente
& gut-

a Quo tempore accipienda sunt Pinguedines, axungia & adipex ex animalibus. *b* Zirbus quid. *c* Pinguedinum seu axungiarum & adipum præparatio.

& guttatim injicienda, & in idem vas alia infundenda, ut leviter iterum eluantur, unde manu cōprimi debēt, quo facilius fæculentum virus pessum eat. Posthæc in pilam spongia nitida madefactā transfundantur, ubi coire cæperint, residētes in imo fordes eximantur. Cæterū alii sine aqua eliquant, & absque duplici vase, ut magis durent, eo quod ilarum humiditas superflua liquefactione ista magis tollitur, quam si in duplici vase liquefcerent. ^a Eliquatas vero, & ita paratas fictili optime clauso, loco frigidissimo reponunt: alii in ædibus siccis, & editis plane humoris expertibus, cum foliis lauri aridis sive juglādīs involucro, sive in nova charta condunt. Sic etiam cæteræ pinguedines, & axungia sunt parandæ & reponendæ. Sunt autem permulti qui in harum præparatione & ablutione, salem in aquam conjiciunt, postea iterum in alia aqua sine sale abluunt, idque faciunt, ut mutetur odor axungiarum & adipum, ac insipidæ remaneant. Nonnulli, dum eas recondūt, iterum aliquid salis aut sacchari (secundum auctoritatem luminaris majoris, in descriptione unguenti pectoralis) admiscēt, ne putrescant aut rancidæ fiant. Porro autem si quis quærat possitne ali-

B

quod

^a *Pingued. con axung. & adipum, reposita.*

quod discrimen reperiri inter *a* pinguedinem, & adipem, paucis respondebimus dicentes: *b* pinguedinem liquidiorē esse, quæ si semel dissolvatur, non facile, ubi liquata vel dissoluta fuerit, concrefcit ac cogitur. Fit autem à sanguinis parte magis oleosa, estque maxime particeps igneæ & aëreæ substantiæ, & aquæ minime. Dum enim liquefcit nullum crepitum edit, & in locis calidis animalium quæ utrinque dentata sunt, & cornibus carent, ut in hominibus, suibus, canibus, ursis, & ejusdem generis pluribus gignitur. *c* Adeps vero crassior est, magisque terrestris substantiæ: nam si calore dissolvatur, vel fundatur, statim concrefcit, celerrimeque coit, ac conglaciatur, multumque apparet pinguedine durior: & dum liquefcit, crepitat. *d* Gignitur autem maxime in partibus minus calidis, & in animalibus, quibus cornua insunt, & dentes in superiori mandibula deficiunt: cujusmodi habentur boves, capræ, cervi, & arietes, & hujusmodi plura. Sed (ut verum fateamur) in quacunque parte gignatur pinguedo, & adeps, à frigiditate coalescere videtur. Hæc autem

a Pinguedo seu axungia quid.

b Pinguedinis seu axungie origo.

c Adeps quid.

d Adipis origo.

tem nomina sæpissime apud probatos auctores confunduntur.

RANAS VIVENTES.] Quas Ranas intelligat non exponit author. Sunt enim varii generis ranæ: sed rubetætamen videntur accipiendæ, cum Galenus, lib. 7. de composit. medicam. secund. gen. capit. 12. & reliqui medici in acopis parandis eas potius elegerint. Sed si non habeantur majores ranæ, quas ipse Galenus rubetas vocat: quæ in paludibus & aquis scrobibus degunt, accipiendæ sunt. Et licet quæ in scutetis, sepibus & rubis degunt, videantur rejiciendæ, quia lethiferæ sunt & venenatæ, secundum Dioscoridis mentem: quia tamen agitur hic de medicamento externo, non interno, nihil prohibet secundum Galeni mentem eas eligere.

LITHARGYRI AVRI.] Lithargyrium nostrum usitatum probatur foliatum, colore aureum, debetque à plumbo & scoria purgari, antequam aliquod emplastrum ingrediatur. Quod facile præstare poteris, si subtilissime in mortario, pistillo friando ipsum contundas, deinde aquam desuper infundas, & tunc quod fæculentum erit, cum aqua in aliquod vas conjicias: denique id quod in mortario re-

manet alia aqua infusa, eaque vehementissime agitata, cumque turbulenta exstiterit, cum præcedenti in idem vas refuderis, idque toties factitaveris, donec videas plumbum solum & fœces in mortario subsidere, omnemque subtiliorem substantiam, cum aqua assumptam esse, quam quiescere permittes, quousque subsidere videas lithargyrium, ac tum demum aquam guttatim effuderis & pulverem lithargyrii in fundo subsidentem acciperis, eumque paulatim & pedetentim super marmore duxeris, donec ita lævigatum sentias, ut si eum manibus & digitis tractes, aut linguæ imponas, nullam prorsus asperitatem percipias. Atque ita parato lithargyro trito, uti poteris in Emplastris & Unguentis. Galenus de composit. medicament. per genera in lotione lithargyrii, lavat illud secundum scopum & effectum necessarium: videlicet si scopus sit desiccare, & non mordicare, licet illud cum aqua fontana æstate, diebus canicularibus lavare: si vero vis desiccare & mordicare, cum vino aut aceto: aliquando cum aqua maris Galenus id lavat. Sic autem & cætera metalla, aut mineralia, quæ in Emplastris & Unguentis apponuntur, ante usum debent lavati in liquore proprio

secun-

secundum scopum compositionis, & lævigari. Sunt qui aliam rationem habent lithargyrii preparandi. Sed hæc mihi facilius & usitatus videtur. Quod si plura expetas ad lithargyrii præparationem, lege Mesuen lib. Servitoris.

Cæterum notabit Pharmacopola cum simpliciter in descriptionibus Emplastro- rum, & Unguentorum legit lithargyrium, aureum esse intelligendum, non quod fiat ex auro, sed quia auri colorem referat. Quid autem sit, & de generibus & illius electione, & ustione iusfra dicemus: in Sectione 2. de unguentis capit. 2.

*VIRES A QVIBVSDAM MEDI-
cis descripta cum paratur sine Mercurio.*

Emollit in cætera non sine magna digerendi vi cum manifesto calore pustulas sæpe movendo.

VIRES CVM MERCVRIO.

Easdem vires habet: præterea malignam qualitatem in morbis oppugnat & fugat ob mercurium.

B 3 C A P V T

a Lithargyrium cum simpliciter invenitur scriptum quid.

C A P V T I I I.

*Ceratum Oesypi ex Philagrio, repertum XI.
distinctione apud Mesuen de Unguentis,
& Emplastris. Vsuale.*

Textus Mesuæ veri pars media :

℥. Croci. ʒ ij. β.

Bdellii.

Mastiches.

Ammoniacy.

Aloes.

a Styracis liquidæ.
ana ʒ iij. β.

b Ceræ citrinæ. ℥ .β.

Terebinthinæ. ʒ vj.

Medullæ cruris vaccæ.

Adipis

a *Alii ana drach.
iij. legunt.*

b *Ceram citri-
nam & acrimo-
nia carentem hoc
loco intellige, qua-
lis est cera alba
pontica sponte
producta cujus
loco nostra alba
factitia utendū.*

Adipis anseris. ana ℥
vij. β.

c Si deficiat Oe-
sypus axungiam
gallina sumere
debemus. Galeno
autore.

d Oleum nardi-
num intellige il-
lud quod Mesues
descripsit: Et per
quantum sufficit
intellige quantum
satis erit ad mag-
daleones forman-
dos.

c Oesypi humidæ. ℥ ix.

d Olei nardini quan-
tum suff.

Bdellium, ammoniacum, & aloë dissolvantur in aqua infusionis fœnug. & chamæmeli, & cum cæteris fiat unguentum, & post Phitagrimum addiderunt.

Expressionis scyllæ.

℥ j. β.

Olibani. ℥. β.

Sepi vitulini. ℥ vij. β.


Et in alio.

e Hoc est cera
unc. iiij. sem.

Ceræ $\frac{11}{16}$. β. *e* minus
quarta.

Et est conveniens.

S C H O L I A.


 Esypum, sepum, adipem, & medullam in lebete ad dissolvendum igni lento appones, spatula lignea semper agitando : mox ceram concisam : quibus omnibus liquatis solutisque, & ab igne depositis, & refrigeratis, accipe ammoniacum dissolutum in semiuncia aquæ infusionis scœnug. non contusi & chamæmeli, & uncia una & semisse succi scyllæ. Decoque ad humoris consumptionem, deinde illud ammoniacum sic paratum cum terebinthina, & styrace liquida misceatur, qua optimè mixta & incorporata, projice in lebetem cum prædictis celeriter spatula lignea movendo. Posthæc bdellium tenuissime pulverisatum injice, si siccum sit : si vero molle fuerit? cum ammoniaco in pauca quantitate infusionis scœnugr. & chamæmeli (perinde ut ante in ammoniaco) solvatur. Paulo post olibanum, mastichen, aloen, separatim in pulverem tenuissimum redacta, & croci demum pulverem conjice : totumque conjunctum & probe mixtum in magdaleones cum oleo nardino efformabis. Quod si hæc massa non

i. abeat

habeat consistentiam cerati duri, & videatur mollior quàm par sit, liquabis ℥ iiij. β. ceræ: quam liquatam cum prædicta massa conjunges ac subiges.

In hoc cavendum est ne fœnuigr. nimium maceretur infusione: nam si diu infunderetur nullam infusionem haberes, sed potius mucaginem: ob id diligenter animadvertat Pharmacopœus, modicam ut faciat infusionem: quamquam tamen si alius esset liquor in quo dissolvi possent quæ dissolvenda præcipit author, melius esset mucaginem fœnuigr. extrahere ad scopum emplastri consequendum.

M E D U L L Æ C R U R I S V A C C Æ.]

Colligenda sunt *a* Ossa recentia cruris vaccæ in fine æstatis & plenilunio, ne eis sanguinis aliqua insit superfluitas: quamquam alii neglecto collectionis tempore, genus, ætatem, colorem, magis observant: plurimum enim interesse, quo cælo qua regione nata, aut educata: sit ne item vetula, juvenca, an adulta: quo itidem sit colore (nam ex eo temperaturam licet conjicere) fulvo scilicet, nigro, an albo existant. Sunt autem ossa frangenda ad medullam habendam (potest etiam extrahi

B 5 medulla

a Ossa crurum vaccæ quæ tempore sunt colligenda ad medullas extrahendas.

medulla *a* ex spina, quæ durior & sicciore est, quam alia) quam purgabis à sanguine superfluo (si adsit) & in aqua frigida, & limpida, ter aut quater lavabis, aquam semper mutando Deinde ponatur in fictili sine aqua sub dio ut liquefiat, vel in vase duplici aut cineribus calidis: & quod liquatum erit, sensim linteolo transcolando effundatur in vas aliud, & optime cooperiatur, & usui servetur, in loco temperate frigido. Sicque omnes aliæ medullæ præparandæ & reponendæ.

Cæterum (ut verum fatear) recentibus præparatis utendum est potius, quam diu conservatis, propter rancorem.

A D I P I S A N S E R I S .] *b* Satis copiose diximus in præcedenti capite, de origine, extractione, præparatione adipis. Differt autem adeps, à sepo ceu sevo, ratione majoris, aut minoris. Nam adeps in mediocribus animalibus sumitur: Sepum in sicciorebus. Axungia ceu pinguedo in humidioribus.

O E S Y P I H U M I D Æ .] *c* Oesyphus lanarum ovium succidarum est pinguedo. Diosc. cap. 7. lib. 2. Modus autem eam præ-

a Medullarum extractio, liquatio & repositio.

b Adeps, Sepum, axungia ceu pinguedo quomodo differant.

c Oesyphus humida quid.

præparandi talis est. Lanæ succidæ ut ab ovibus, & arietibus, sumuntur è collo, fœminibus, & femoribus ovium. *a* Harum accipe libras circiter 60. vel quavis satis magna quantitate : & ferventi aqua octo horarum spatio macera, agitando, & commiscendo, spatula vel baculo rudi : deinde fac fervere, donec omnem suam pinguedinem in aquam deposuerint. *b* Deinde lanam fortiter expressam à decoctione remove : Tunc aquam pinguem & forditie lanarum imbutam ex alto infundito in aliud vas, multoties iterando donec spumescat : tum spumam subito subsidere, & aquæ innatantem pinguedinem collige, iterumque lana in aqua exagitetur donec rursus spumescat, tum spumam ceu pingued. colligito : illudque tandiu facito, donec aqua amplius non spumescat, semper colligendo spumam, ceu pinguedinem, collectam vero in aqua pura tandiu lavato, & manibus agitato, donec perluceat & linguæ admota nihil mordax habeat, sed *c* parum astringat. Quibus peractis pinguedinem in fictili denso, loco frigido, ad usum reponito. Sed hæc omnia

B 6

f.eri

a Oesopi conficienda modus. *b* Oesopi ablutio. *c* Oesopi abluta serum reductionis & coactio.

fieri debent fervido & æstuante sole. Servitor, a & Præpositus in præparando addunt parum aquæ marinæ, ut aqua magis spumescat.

V I R E S A M E S V E D E N V N T I A T Æ.

Ad dolorem splenis, stomachi, & hepatis & duritiem in eis, & dolorem matricum, & apostemata, in eis linitum exterius, vel etiam super positum in lana exceptum, valet ad durities, & nodositates quæ sunt in juncturis.

C A P V T I V.

Ceratum Galeni infrigidans lib. 10. meth. cap. 9. lib. 1. de Simpl. medicament. facultate capit. 5. & lib. 5. de Sanitate tuenda quod scribitur à Mesue in xi. distinctione de Unguentis & Emplastris V suale.

Textus verus Mesuæ.

a Ceram intelligit author Ponticam naturaliter albam, quæ sine acrimonia est, v. l. Cyrenaicam artificio dealbatam & acrimonia spoliatam.

a ℥. Cereæ albæ. ʒj.

b Oletum

a Cœspus quo tempore debet fieri & a' l'ij.

b Oleum rosatum crudum seu immaturum ac omphacinum intellige radixq; olei rosati, multoties lavetur antequam rosas recipiat, sitq; oleum crudum.

c Per quantum sufficit, Mesues intelligit quantum suscipere potest aquam ad refrigerium.

d Acetum naturaliter album accipe non autem distillatum.

b Olei rosati. ℥ iiij.

Et sit radix olei oleum omphacinū aquæ fontium claræ & proprie vehementis frigoris e quātum sufficit. Oleum multoties & bene lavetur, lavationibus pluribus & quo magis elaboratur in lavando, fit exce lentius. Ultimo vero conquassetur cum *d* aceto albo claro & pauco.

S C H O L I A.

IN diplomate ceram frustratim divisam, una cum oleo rosato, facto ex olivis immaturis, & rosis minime expensis, aqua frigidissima pluribus vicibus antequam rosas recipiat loto (quoniam pacto lavari debeat lege infra in Sectione 3. capite 3.) lique-

liquefac, ut unum corpus sumant. Totum liquatum refrigerare permittite in vase aquæ frigidissimæ pleno: refrigeratum in mortario marmoreo, cum aquæ fontanæ, paulatim affusæ, tanta copia, quam in secundum molitur, ac subigitur, admittere potest, tere & agita: in fine vero parum raceti albi & clari ad $\frac{3}{4}$ β . admisce: eoque ceater parato utere, ne vetustate calorem acquirat. Attendant autem Pharmacopœi, cum hoc ceratum ægrotis apponunt, ne id supra corpus dimittant tandiu donec calefiat: (ut docet Galenus lib. 11. meth. nisi aliter imperetur à Medicis, propter causas certas) sed continuo mutant: quod pauci hoc tempore advertunt.

V I R E S A M E S V E S C R I P T Æ.

Valet ad febres acutas, & sodam calidam pulsativam.

C A P V T V.

Emplastrum diachylon parvum Mesuæ, xi. distinctione de Unguentis & Emplastris Vsuale.

Mesuæ textus verus.

a Lithargyrium aureum ac preparatum secundum seipsum intellige.

a \mathcal{V} . Lithargyrii. $\frac{3}{4}$ ν .

b Oleum

*b Oleum oli-
varum insul-
sum accipe sus-
ficiuntque unc.
xi. pro quantita-
te lithargyrii, ut
sapissime exper-
tus sum, tamen
Galenus vult
tantum, olei ad-
hiberi videlicet,
lib. i. pro lib.
se. Lithargyrii.
c Per radicem
maluæ, altheæ
radicē intellige.*

*b Olei veteris clari. ℥. j.
Mucag. psyllii. ℥. iiij.
Mucag. hyoscyami. ℥. β.
Mucag. lini feminis.
Mucag. e radicis maluæ.
ana. ℥. ij.*

Cujus operatio est si-
cut operatio alterius. hoc
est qui antecedit, in lib.
Mesuæ.

S C H O L I A.

SIc emplastrum conficies. Ac-
cipe lithargyrium tritum, & præ-
paratum, ut in præcedenti em-
plastro Ioannis de Vigo docui-
mus, misce cum oleo prædicto in vase æ-
reo, agitando spatio xij. horarum ad mi-
nus; deinde igni lento exponatur, eouf-
que dum coctione perveniat ad mellis
crassitiem, & fundo vasis non adhæreat:
hoc enim signum est incorporationis.
Tunc

Tunc ab igne auferes, & mucaginum prædictarum, seminum & radicum, separatim factarum, & coctarum, simul mixtarum, partem aliquam, nempe ℥ iij. in lithargyrium injicies, ac quam celerrime spatula agitabis, quousque subsideant: iterumque igni expones, donec ea injecta mucaginum quantitas consumpta videatur: deinde ut prius, reliquum mucaginum conjicies, ab igne agitando: postea ad decentem consistentiam concoques, donec bullare & subsidere lithargyrium conspicias, quod signum est perfectæ concoctionis: deinde refrigerescere permittes. Demum ℥ .duarum magdaleones conficies, & loco convenienti reservabis. Quamquam tamen nonnullis videretur ad usum & scopum dicti emplastri emollientis, si tota mucago non absorbeatur coctione: nihilominus ne manente mucagine humidius reddatur emplastrum, & putredini obnoxium, ideo voluit author integram earum consumptionem. Addit Galenus lib. i. secundum genera. initio emplastri aliquid aquæ claræ cum lithargyrio, antequam coquatur: vultque emplastra alba fieri in loco claro, aperto, soleque radiante: nam aër obscurus reddit emplastrum nigrum, sed

luci-

lucidus & clarus maxime juvat ad albedinem : proportio autem aquæ & olei par erit , hoc est , si sint lithargyrij ζ vj. olei ζ ix. totidem aquæ erunt sumendæ.

Mucag. psyllij.

Mucag. hyoscyamj.

Mucag. linj.

Mucag. radicis maluæ.]

Mucagines ut conficias, sic est operandum. * Semina omnia exquisite eliges, separatimque ponderabis, ac leviter conteres dempto semine psyllij, lini, & fœnugr. quæ nunquam conteri debent, nisi à medicis præscribantur, quia absque contritione mucaginem viscosum etiam cumulate reddût: radices vero omnes electas & à terra repurgatas minutim conscindes ac in mortario lapideo cum pistillo ligneo ad invicem conteres, per seque in fictilibus vasis spatio duorum vel trium dierum super ignem lentum aut potius super cineres calidos in quantitate sufficiente aquæ tepidæ macerari permittes, aliquando tamen spatula lignea movendo ne fictilibus inter macerandum & coquendum adhæreant, sumendo videlicet pro una libra seminum aut radicum, aquæ tepidæ libras iiij. (non desunt

a Mucaginum ab omnibus seminibus & radicibus vera extractio.

defunt tamen qui mucagines quo sint magis viscosæ, libram unam & semissem feminum aut radicum sumant } deinde maceratione facta si tibi fortasse haud satis viscosæ & coctæ videantur, adhuc eodem igne coquendas relinques donec perfectam coctionem fuerint assequutæ. *a* Signum autem perfectæ & absolutæ coctionis erit, cum aqua in feminibus & radicibus ipsis macerata non amplius aquæ, sed viscositatis illius, ut albuminis ovi retinuerit, aut paulo plus: quinetiam si prædictæ macerationis pars frigido marmori velut in declivi imposita lente & crasse defluat, tum veræ & perfectæ coctionis earum indicia habebis: deinde coctione peracta intorquendo per se exprimi debent, quibus postea cum volueris tuto poteris uti. Ad mucaginem autem in hoc emplastro conficiendam, volui quantitatem feminum, radicum, & aquæ describere, ne tironibus aut in arte parum versatis erroris occasionem præberem: sumenda autem erit uncia una feminis psyllii, ad uncias quatuor aquæ vel ad summum sex; feminis hioscyami ℥. iij. aquæ ℥ j β. feminis lini & radicis maluæ sylvestris ana

a Mucaginum maceratarum aut coctarum veterum indicium

ana ℥ β. aquæ vero ℥ iiij. Alij mucagini-
 bus factis ex feminibus fœnugræci, lini,
 radicibus malvæ agrestis, seu ibisci muca-
 gines in hoc parando emplastro utuntur,
 sed id fit propter diversitates morborum.
 Verum hæc nostra descriptio, quæ in usu
 quotidiano est, recipit mucaginem factam
 ex femine psyllij: sed in mucagine psyllij
 conficienda, minime semen contundi de-
 bet, ut paulo ante dictum est, cum medulla
 sit calida, & cortex frigidus, unde calidam,
 & frigidam sortitur facultatem ac quali-
 tatem secundum Mesuæ mentem. Itaque
 cum in hoc non desideretur calefaciendi,
 sed tantum molliendi cum levi refrigera-
 tione facultas, conteri minime debet, ne-
 que diu multo calore macerari, nec forti-
 ter exprimi, ne substantia calida foras ex-
 trahatur.

Cæterum in hoc emplastro conficiendo
 cavendum, ne ignis vehementior fiat ini-
 tio coctionis lithargyrij, ne compositio
 nigrescat adustione: sed ignis augeri debet
 pro industrii pharmacopœi sententia, ubi
 prima peracta est concoctio. Hoc præterea
 notandum, a semen psyllij intelligendum
 ubi simpliciter psyllium legitur sine aliqua
 additione.

V I R E S

a Psyllium, cum simpliciter scribitur quid.

VIRE S A M E S V E P R O B A T Æ.

Tumores calidos digerit & maturat.

C A P V T V I.

*Emplastrum diachylon magnum expertum,
Mesuæ in x i. distinctione de unguentis
& emplastris Vsuale.*

Vera Mesuæ descriptio.

a Lithargy-
rium aureum
author intel-
ligit: sed Ga-
lenus secun-
dum varias
intentiones hoc
vel aliud eli-
git.

b Oleum cha-
mæmelinum
irinum, &
anethinum ex
mesuæ descri-
ptione acci-
piendum.

a ℥. Lithargyrii mundi
triti & cribellati ℥ xij.

b Olei Irini.

Olei Chamæmelini.

Olei Anethini. ana. ℥ viij.

Mucag. seminis lini.

Mucag. ficuum Ping.

Mucag. passularum.

Mucag.

S E C T I O I.

45

Mucag. feminis fœnugræci.

Succi ireos radicis.

Succi Scyllæ.

Glutinis alchannæ.

Oesyphi humidæ. ana. ℥ xij.

Terebinthinæ. ℥ iij.

Resinæ pini.

Ceræ Citrinæ. ana. ℥ ij.

Conficiatur sicut diximus, hoc est, tali modo quo usi sumus præcedenti, istud conficiatur.

S C O L I A.

DEbet lithargyrium præparari, ut in prædictis emplastris monuimus. Nam cum præparatum ac coctum cum oleis fuerit, in id paulatim mucagines conjicies feminis lini,

ni, foenugræci, ficuum, & passularum separatim & arte factus: quibus concoctis & cum lithargyrio consumptis, statim succum ireos & Scyllæ injicies & ad horum consumptionem decoques. Posthæc gluten Alchannæ dissolutum, eo quo præscribemus modo, immittes: quod cum primum coctum & consumptum fuerit, cera minutim incisa injicienda erit, quæ postquam liquata fuerit, resinam pini confractam addes: qua liquata totum ab igne depones, & statim Terebinthinam, paulo post œsypum admiscebis, ex eaque massa frigida magdaleones ad usum conficies.

Mucag. ficuum Ping.

Mucag. passularum.]

Ficus & passulæ raras mucagines faciunt: sed quia earum decoctio, inspissata, ad formam syrei, hoc est, sapæ, mucaginis consistentiam obtinens, vim habet emolliendi, secundum scopum emplastri, ideo cum mucaginibus & succis lentis voluit author remisceri.

Succi scyllæ.]

Scylla debet a eligi sufficientis magnitudinis, non admodum magnæ, & enormis, bene habita, & nutrita, alba, & recenter ex terra desumpta, cum caulis & folia exacte

arue-

a Scylla electio ac collectio.

aruerint. Mesues illam cæteris præfert de Simpl. lib. 2. cap. 6. quæ *a* est saporis dulcis, acris, & amari, squammis depurgata, in loco libero prope alias educata. Cum igitur triplices ei saporibus assignet Mesues, vult illam triplici constare substãtia, aërea scilicet, terrestri, & ignea: ab aërea dulcē, à terrestri propter adustionem amarã, ab ignea, quæ maxime in superficie est, acrem qualitatem habere, ex illa autem succus in hunc modum extrahitur.

Scyllam, *b* qualem jam descripsimus electam accipe, eamque cultello ligneo, vel eburneo, corticibus purgatam, & incisam, in mortario lapideo, pistillo ligneo fortiter contere, non ferreo, ut annotat Sylvius in illius præparatione: ubi optime contusa fuerit, in vase fictili clausa argillaque circumlita, in clibano modice calido, spatio sex horarum reponatur, ut maxime caleat: posthæc in forti panno calido exprimatur. Verum non desunt qui ad succi scyllæ præparationem diversis modis utuntur. At hæc ratio à nobis præscripta, cæteris facilior ac præstantior existit. Ex unica autem succus supererit, qui ad hanc confectiõnem sufficiet.

Glu-

a In scylla tres saporibus.
extractis.

b Succus scyllæ

Glutinis alchannæ.]

Conficitur a gluten alchannæ sic. Accipe alchannam, seu Icthyocollam, hoc est, cetacei ventrem, candidam, natione ponticam, subasperam, minime scabram, & quæ celerrime liquefcit (hæc Dioscorid. lib.3. capit.86.) eamque b in minutissimas partes divide, & in novo fictili repone, & desuper aquam claram infunde donec vas impleatur pro ratione ictyocollæ, diuque calide macerari finito ante coctionem, nam non aliter dissolveretur, deinde igni lento coquatur eousque dum in cremorem abierit, & cum refrigeratum fuerit, ad similitudinem pultis conspicietur.

Animadvertite porro Mesuen in hoc emplastro resinam pini expetere, & eam intelligere, quæ è pino sponte fluit, quæ quidem apud Præpositum rafa appellatur. Probatum autem ponderosissima & picosissima, verum de his c resinarum differentiis, satis abunde in sequenti capite dicitur. Præterea maxime observandum cum mucagines injicientur, tum enim lithargyrus ab igne auferri debet, quod maxime

notan-

a Gluten al-hanna seu Icthyocolla quid. b Glutinis alchanna seu Icthyocolla dissolutio. c Per rasam intellige non collam, neque carpinatam, sed rasam ab arbo-re ubi paulatim è larymatione concrevit.

notandum, ne repentino novarum rerum
contactu exundet.

V I R E S A M E S V E N O T A T Æ.

Ad resolvendum & ad maturationem,
omnis duritiei, & inflationis expertum.

C A P V T V I I.

*Emplastrum Gratia dei, Præpositi in 6.
particula lib. 2. Vsuale.*

Verus Præpositi textus.

℥. Tercebinthinæ. ℥. β.

Resinæ, ℥. j.

a Ceram na-
turaliter al-
bam intelligit
author, que
sine acrimo-
nia est vel Ce-
renaicam ar-
tificio dealba-
tam, & acri-
monia spolia-
tam.

a Ceræ albæ. ℥ iiiij.

Mastiches. ℥ j.

Foliorum verbenæ.

Foliorum betonicæ.

Foliorum pimpinellæ.

ana. M. j.

C

b vi-

b Vinum rubrum odoratissimum intellige, ratio infra in modo conficiendi dicetur.

Herbæ pistentur, & in *b* vino forti bulliant usque ad consumptionem tertiæ partis: colentur, & inde substantia herbarum abjiciatur, & cera, resina, & mastiche cum colatura ponantur, necnon bulliant agitando, donec optime incorporentur: tunc deponantur ab igne, & addatur terebinthina totumque agitetur cum spatula, & fiat emplastrum.

S C H O L I A.

V Irides herbæ præscriptæ & præcipue earum summates, loco temporeque convenienti, legi debent, nec lavari: deinde incidi, & in mortario lapideo, pistillo ligneo contundi. Posthæc in vino rubro quam optimo & odorifero (eo quod vulneribus & ulceribus magis convenit, quo Hippocrates in lib. de vulneribus & fracturis frequen-

quenter utitur, & Galenus in lib. secund. gen. in coctione herbarum emplastra ingredientium) quantitate a sufficiente ad partis tertiæ consumptionem decoqui: quæ cum decoctæ fuerint, parumper infundi permittite, ut tota facultas cum vino, in quo decoctæ fuerint, remaneat. Deinde adhuc calidæ colentur, massaque herbarum abjiciatur. In colatum ceram minutim incisam adjicies, & una cum decoctione concoques igne lento, spatula assidue movendo, ad humidi vel colati consumptionem: qua humiditate exhausta, resinam coactam, ut liqueat cito addes: qualiquata, & ab igne semota, terebinthinam, ut dissolvatur, admiscebis, cumque omnino tepuerit, & refrigeratum fuerit, mastichen quam tenuissime pulverisatam desuper insperges, manibus tractando. Hac enim methodo fortior erit ipsius emplastri operatio, neque coctione corrumpetur, cum ordo simplicium decoctionis diligenter observatus fuerit: quod Præpositus non advertit. Proinde maximo ingenio, summaque industria uti debemus in hujus emplastri confectione, ut veram & legitimam inveniamus methodum. Hic etenim modus à Præposito confusus

C 2 fus

a Per quantitatem sufficientem intelligo lib. 4.

sus (pace tanti viri dixerim) nobis videtur. Vult siquidem ceram, mastichen, resinam, terebinthinam omnesque herbas sine distinctione poni & ordinis nota, quod sane absurdum videtur. Novit profecto Præpositus terebinthinam, resinam, & mastichen nullam penitus sustinere decoctionem propter essentiæ tenuitatem: ceram vero majorem propter suæ substantiæ crassitiem. Quare quantum in nobis situm fuit, voluimus verum conficiendi modum hic describere, ne medicamentum ita coctum corrumpatur, & illius operationis proprietas minuatur.

Resinæ.]

Resina, *a* ex veterum Theophrasti & Plinii opinione, est humor qui sponte profluit è terebintho arbore, vel è pino, piceoque, vel ex abiete. *b* Resina autem, quæ è terebintho profluit, duplex est. Una, quæ sponte provenit, & solis calore condensatur, eaque vera est resina, à nobisque pharmacopeis colophonina vera appellatur, *c* Probatur autem odoratissima, lucida, non torrida, neque *d* diluta, friabilis & calculorum expers: eaque sumenda

a Resina vera quid. *b* Resina qua è terebintho fluit duplex. *c* Resina vera electio. *d* Resina simpliciter quid.

menda est, ubi simpliciter legitur, *a* Altera vero quæ similiter sponte effluit è terebintho, & undiquaque spargitur, quam sol non attingit: eaque vera terebinthina dicitur. *b* Laudatur alba, vel cœrulea, per lucida, odore terebinthinam referens, colore vitreo. *c* Cumque simpliciter terebinthina apud authores scribitur, ea est fumenda. Cæterum resina illa, quæ ad nos quotidie defertur ex abietibus, pinis, piceisque arboribus liquida provenit, quæ maxime decoquitur, & à Præposito rafa nominatur, nihilque differt a colophonia nostra desiccata: cum solum differant terebinthina, resina, & colophonia usitata ratione decoctionis: quia diversis modis & arte coquuntur. *d* Quod si deficiat vera resina, terebinthinam veram à terebintho arbore petitam, lariceam, vel lentiscinam accipere possumus. De quarum coctura lege Dioscoridem capit. 75. lib. 1. & Galenum lib. 8. de simpl. medicament. facultatibus, pariter Plinium lib. 7. capit. 3. & alios, qui de simplicibus scripserunt. Ad hæc quamvis terebinthus, picea, pinus,

C 3 abies,

a Terebinthina vera quid. *b* Terebinthina vera electio. *c* Terebinthina simpliciter quid. *d* Terebinthina, resina, & colophonia, usitata solum ratione coctionis differunt.

abies, & aliæ quædam arbores, resinas quæque omnes, cum pingues liquidasve, tum etiam ficas atque exoletas (suo tamen unamquaque ordine & successu) proferrant: tamen in pinguium seu liquidarum genere, ea præcipua esse videtur, quæ colophonia appellatur, ac aliæ quæcunque illi similes: quæ æstate, & autumno leguntur. Inter siccarum exoletarumque vero genera, ea in primis habetur, quæ Galeno pitynon physema vocatur, quæ quod in ipsa arboris germinatione exudet, ea ratione exoleta provenit: qua de re vide Matheol. epist. lib. 1. ubi agit de resinis. Cæterum, quia colophoniam modo in ficcis, modo in liquidis resinis numeravimus: id ut sane intelligat lector, hæc mea est sententia. Ea quæ à pharmacopeis vera colophonia dicitur, sicca nimirum & durapriusquam solis calore excocta induruerit, liquida sive pinguis, proprie etiam colophonia appellatur.

Ceræ Albæ.]

Hoc in loco ceram naturaliter albam, & ponticam, acrimonia carentem intelligit Præpositus: vel illam quæ ex novis favis separatur, vel quæ præ foribus aut præ spiraculis alveariorum reperitur artificio dealbata & acrimonia spoliata, & ab
apiariis,

apiariis, & aliis quibusdam modernis authoribus cera virginea appellatur. *a* Ab antiquis vero propolis dicitur ea. Probatum autem propolis antiquorum flava, odore styracem referens & in vehementi ariditate mollis, & mastiches in modum ductilis. *b* Quam si habere non possumus, utendum erit illa nostra factitia alba, quæ pluribus lotionibus præparata est, *c* & quæ acrimoniam à melle contractam deperdidit, ut Galeno placeat lib. 2, simpl. capit. 15. Tandem vero inquirendum erit, utrum propolis idem sit, quod cera virginea alba: quod equidem non puto. *d* Abluitur autem propolis antiquorum, seu cera virginea modernorum secundum Galenum loco prius citato, hunc in modum. Primum modice calefactam ceram in aquam purissimam modice calidam infundito: deinde conterito, tundito, frangito, manibusque impense subigito, deinde ceram refrigerato, cum priori aqua effusa rursus calefacito, & in aliam aquam calidam atque sinceram injicito, rursusque diutissime contundito, donec acrem qualitatem suam in aqua deposuerit, quod gustu cognosces,

C 4

gnosces,

a Cera virginea modernorum quid. *b* Propolis antiquorum quid. *c* Propolis antiquorum electio.
d Cera acris ablutio.

gnosces. Mox vero & tertio, & quarto sæpius idem faciendum, donec aqua ex abluta cera qualitatem mordacem recipiat: ac ita ceram ad usum paratam habebis. In hoc autem medicamine, ac in cæteris quæ vulnera solidant, glutinant, & repurgant, inflammationesque leniunt omnis mordacitatis expers, & quæ ex acrimonia & melle conficiatur, cera est utendum, teste Galeno 4. simpl. cap. 5. Idcirco eo modo in hoc lavanda est, resina, pix, & oleum (si desiderantur) ut si aliquid in iis mordacitatis sit, auferatur, & præcipue in emplastris, ceratis, & unguentis, quæ habent facultatem solidandi & glutinandi.

VIRES A QVIBVSDAM
Medicis notata.

Vulnera solidat, glutinat, & repurgat,
inflammationesque solidat.

C A P V T V I I I.

Emplastrum de Ianua, ceu Betonica Præpositi ex vj. particula secundi lib. V suale.

Vera Præpositi descriptio.

- a *Ceram albam naturaliter, crudam & Ponticam Præpositus intelligit.* ℥. Succi Betonicæ.
 Succi plantaginis.
 Succi appii. ana. ℥. j.
- b *Terebinthinam totam hoc loco accipiendam nonnulli putant: sed quia ad vulnera capitis & nervorum potissimum adhibetur, pura è terebintho & sine lotione usurpari debet, ut nihil ejus virtutis & substantiæ desperat.* a Ceræ.
 Picis.
 Resinæ.
 b Terebinthinæ. ana. ℥. β.
- Fiat Emplastrum.

S C H O L I A.

ET si nullam formam, aut methodum, in hoc conficiendo emplastro Præpositus præscripserit: tamen quo hodie sæpissime præparetur modo, secundum omnes fere omnium Pharmacopeos, indicabo. Accipiunt betonicæ, plantaginis, singulorum æquale pondus, apii vero non ad cæterorum proportionem, verum cætera pondere superat omnia. Tundunt deinde cum cera incisa, pice, resina confracta, & terebinthina, in lebetem injiciunt ut simul coquantur, donec nulla supersit humiditas, vel donec herbæ coctione aruerint: quæ cocta dum maxime calent, torquendo exprimunt, & inde magdaleones formant. Hicque modus hodie fere ab omnibus Pharmacopeis approbatur. Qui modus à vero mihi videtur recedere, sed cur ita parant, hæc illorum ratio. Volunt resinam, picem, & terebinthinam colorem viridem retinere, ideo magis expetunt vires quorundam simplicium deperdi, quam ipsum colorem viridem, quod quidem absurdum nō esset, consuleremque ita componi, si modo vis
picis,

picis, resinæ, & terebinthinæ non deperderetur: ac si etiam legitima proportio herbarum ad lib. j. succi acciperetur. Quapropter ne pharmacopola ignoret confectio- nis hujusce emplastri methodū veram, volui verum modum hic præscribere.

Accipe foliorum *a* betonicæ recentium, loco & tempore collectorum, eam quan- titatem ex qua possis succi libram unam habere: In mortario lapideo pistillo lig- neo tunde: deinde fortiter succum intor- quendo extrahe: similiter facies de plan- tagine, & apio, succum singulorum ex- primendo. Quorum succorum non defec- tatorum accipies singulorum librā unam secundum authoris descriptionem, ceram- que minutim concisam cum succis in le- betem conjicies, & igne lento concoques ad humiditatis *b* consumptionem, dum ex tri- bus libris, una remaneat. Tunc picem, & resinam contractam, injicies, & concoques ad alteram humiditatis peremptionem, deinde colabis, ut si aliquid fuerit arenositatis in pice, & resina, auferatur: postea terebin- thinam dissolve, omnia simul spatula lig- nea movendo. Deinde massam finge ex

C 6 qua

a Vera hujusce emplastri conficiendi methodus.
b Ad humiditatis consumptionem ad tertiam partem intellige.

qua frigefacta magdaleones ad usum formabis. Sed objiciet quispiam hoc emplastrum peccare in colore. quid tum postea, modo vis simplicium tota remaneat in medicamento, & coctione non corrumpatur? in hoc enim non est necessarius color viridis, sed detergendi & desiccandi facultas. Igitur quicumque parare vult emplastrum, nullo modo curare debet quo colore sit, dummodo vires obtineat quas Galenus lib. de compos. medicament. secundum genera vult ipsum obtinere. Cæterum notandum si methodum à nobis præscriptam sequaris, terebinthinæ dosim aliqua ex parte minuendam esse, quod cerati potius quam emplastri formam & consistentiam retineat, sufficientique tantum $\frac{z}{ij}$. si autem veterem conficiendi methodum pharmacopæorum more retinendam putes, terebinthinæ proculdubio dosim nulla ratione erit minuenda quod nimirum coctione crasset. Ad hæc præterea notabis alias valentiores formas à Vigone describi, sub nomine de betonica capite de ulceribus capitis, quæ magis merentur dici de betonica quam præsens emplastrum.

Picis.]

Nicolaus Præpositus hujusce compositionis scriptor, diversam facit picem, à resina eam describendo punctis intermediis, quod maxime notandum est. Idem cum simpliciter picem, & resinam describit, non denotat quam picem, aut quam resinam sumere debeamus cum à diversis arboribus colligantur. Tamen multi Pharmacopolæ in explicatione textus Præpositi, resinam & picem accipiunt pro simplici uno : quod tamen fieri non potest, cum separatim & punctis intermediis præscribantur. Ut igitur his satisfaciamus : qui volunt hanc compositionem aggredi ex descriptione Præpositi, dicam quid sentiam. Sumenda est pix liquida & resina vera. Quid autem sit resina vera, satis superiori capite à nobis explicatum fuit. Nunc quid sit pix liquida breviter dicam & quid de ea apud probatos authores legerim expediam à quibus tamé hoc unum oratum velim, ut si quid à me perperam dictum audiant æquo, & benevolo animo ferant. * Imprimis itaque notabimus, ubi Præpositus simpliciter & sine additione picem describit, liquidam intelligere, crudam, mollem, tractabilemque, artificio

nullo

* Pix simpliciter apud Præpositum quid.

nullo paratam : de qua separatim meminir Galenus lib. 2. de composit. medicament. secundum genera capit. 20. de viridi emplastro Andromachi differens his verbis: liquida tamen diutius perdurat sicuti colophonia thus redolens, quæ nonnullis sola vocatur colophonia, odoratu suavitatem quandam referens, sicut abietina, & colore mediocri prædita : *b* illam dico intelligendam esse, vel quæ sponte ex liquoribus pinguisimis pini piceæque congregatur alba, quæ à Dioscoride lib. 1. cap. 78. pix liquida dicitur, probaturque splendens, sincera, levis : quibus verbis subscribit Præpositus lib. 2. capit. 9. sui dispensarii, ubi de medicinis agit analogis, his verbis, Pix quando simpliciter ponitur in unguentis maturativis & mundificativis, debet poni pix liquida, & in Unguentis cicatrizativis pix sicca (ut etiam testatur Galenus 8. simplicium capit. 50. ubi de pice) quæ est colophonia cocta sive frixa : ut placet Galeno lib. 3. de compositione medicamentorum secundum genera, ubi de medicamentis nervorum agit : qui de Colophonia cocta, sive frixa inter siccas resinas peculiariter scripsit, sic inquit : omnium vero *a* siccissima est, quam nonnulli frixam,

a Pix liquida est. *b* Pinea resina tres species.

frixam, alii colophoniam vocant. Præterea non est ignorandum, resinarum esse tres species, quæ è pinoveniunt, inter se differentes: quarum duæ è caudice manant, tertia vero è nucibus, quas Græci *σποβίλους* vocant. E caudice manantium, una quidem est præstantissima, liquida, mollis, albaque, arboris ramentorum, foliorum, omnisque immunditiei expers, & (ut Galenus inquit) thuris redolens, & ubique sincera, Colophonia proprie appellata: ac ea est de qua inter liquidas meminit Dioscorides. Altera quam Galenus appellat pitynon physema fœdida & retorrída est. Quid autem sit pix liquida miror ipsum Præpositum non explicare cum sæpissime in suis confectionibus de pice liquida mentionem faciat. Quare equidem censerent in hoc emplastro (cum quid sit pix liquida Præpositi & maxime apud me incertum sit) ejus loco resinam pini (quod nos gummi appellamus) accipiendam esse, cum ipsa accommodata sit maxime ad maturandum quod præcipue in hoc emplastro requiritur. Demum autem sint Pharmacopæi solliciti resinam & picem lavare in hoc, antequam aggrediantur, minime enim, nisi prius laventur,

iii.

a. *Picis liquida succedanea in hoc emplastro*

in hac compositione ingredi debent, & præcipue in emplastris, quæ glutinant & solidant, propter illarum acrimoniam & mordacitatem. Quamvis Galenus in libris secundum genera dum compositiones emplastrorum & unguentorum describit, facientium ad ulcera, & vulnera cujuscumque speciei, neque picis, neque resinæ, ablutionis meminit, hæc de pice. Picis autem genera monstrat Theophrastus, lib. 9, capit. 2. Plinius lib. 14, capit. 20. & lib. 16, capit. 12. ac sequenti. Columella lib. 12, capitibus 22. 23. 24.

VIRES A MEDICIS DICTATÆ.

Mundificat, & maturat apostemata.

C A P V T I X.

Emplastrum divinum Præpositi ex vj. particula secundi libri V suale.

Verus textus Præpositi.

℥. Galbani. ℥ j. ℥ ij.

Ammoniacy. ℥ iij. ℥ iij.

a Lithar-

Opponacis. ℥ j.

a Lithargy-
rium aureum
sume.

a Lithargyrii. ℥ j. ℞.

b Ceram ci-
trinam acci-
pe.

b Ceræ novæ. ℥ viij.

Olei olivarum. ℥ j. ℞.

Olibani. ℥ j. ℥ j.

Mirrhæ. ℥ j. ℥ ij.

Viridis æris. ℥ j.

Bdellii. ℥ ij.

Aristolochiæ longæ. ℥ j.

Mastiches. ℥ j.

Aymentis. ℥ iiij.

Misce omnia, ut decet.

S C H O L I A.

Ractetur Lithargyrus optime lævigatus, & agitetur una cum oleo olivarum spatio xij. horarum, ut nutriatur, coquaturque lento igne spatula lignea semper ducendo ad mellis spissitudinem: deinde ceram minutim incisam ut liquecat immitte: ea liquata, & ab igne deposita, galbanum à fordibus, & paleis mundatum, in aceto fortissimo ad penetrationem & concoctionem (quia tale emplastrum adhibetur ad resolvenda apostemata frigida, & mollicandas durities) quantitate *a* sufficienti calide imbues, vel nutries, ut placide solvantur: pariter ammoniacum, opopanaxem, separatim, & calide ut galbanum: quæ imbuta, soluta, ac ad humidum non radicalis consumptionem, lentoque igne cocta, per se singula colentur, ac ponderentur seorsim, & cum terebinthina optime incorporentur: denique in lithargyrium, prius paratum modiceque calidum injicies: his cummixtis arida simplicia, singu-

a Per quantitatem sufficientem intellige duplum vel triplum.

singulari opera collecta, & tenuissime singula separatim lævigata, cribrata, ac ponderata, ordine medicamento ita parato immiscebis, ut magnetem ductum super porphyrio molula ex porphyrio, paucō aceto, vel vino asperito, ne pulvisculus evolet, & ut melius ducatur; paulo post aristolochiam, postea olibanum, mirram, bdellium si siccum sit; si vero molle, infundatur ut galbanum & consimilia: ultimo mastichen injicies, denique viride æris: hac enim methodo emplastrum artificiose confectum habebis. Sunt qui viride æris, postquam lithargyrus coctus est, injiciunt, rursusque coquunt ut rubedinem acquirat emplastrum.

Galbani

Amoniaci

Opopanacis.]

Quonam pacto imbuatur ac solvatur galbanum, ac cætera alia gummi genera, quæ dissolvi possunt, aperte docuimus initio hujusce capituli: hacque methodo alia gummi genera, galbano similia, solvuntur & præparantur: ut ammoniacum, opopanax, sagapenum, assa fœtida, bdellium si molle sit, & similia quæ pulverisari nequeunt. Et hæc omnium gummi generum est vera solutio ac præparatio: fitque

in

in omnibus medicamentis quæ per os sumuntur, vel quæ exterius admoventur: nisi forsan author denotet, quo humore maccrari & dissolvi debeant. Et quamvis hæc sit tanquam regula generalis, apudque omnes unguentarios universalis: scilicet, ut hæc gummi genera dissolvantur in aceto aut vino; tamen suaderem illi, qui aliquam compositionem aggreditur, primum ut exacte perpendat, ad quos affectus compositio ceu medicamentum adaptetur, ut in liquoribus propriis illa gummi genera dissolvat.

Olei olivarum.]

Antiquum oleum propter scopum emplastri facti ad resolvendos humores frigidos, nam quo vetustius est oleum, eo majorem vim habet digerendi: & sunt addendæ adhuc $\frac{3}{4}$ ix. pro quantitate lithargyri, nam est regula generalis, pro quamque libra lithargyri ponitur olei lib. j. β . & id fit, ne lithargyrus propter nimiam vel parvam olei quantitatem decoquendo utatur.

Viride æris.]

Id Græcis dicitur $\iota\delta\varsigma \xi\upsilon\varsigma\iota\delta\varsigma$ Arabibus zinniar, Latinis viride æris, vel ærugo rasilis: Plerique tamen florem æris, & æruginem,
sine

sine aliquo discrimine inepte usurpant, & frequenter unū *a* alterius loco indifferenter sumunt. Flos æris autem fit, ut sæpissime probavi, cum æs in fornace liquatur, & in vas præparatum *b* diffunditur, antequam plane concreverit, & frigidæ inspersione, dum adhuc calet, vapor elevatur, qui laminæ ferreæ, vel plumbeæ adhærens, quæ orificio vasis imponitur, facile à frigore coalescit: & veterum & neotericorum verus est flos æris. *c* Sed viride æris vel ærugo rasilis deraditur quidem ab æris laminibus impositis vasis, in quibus concrevit, vaporibus aceti fortissimi, & vinaceorum non recentium & acescentium. *d* Materia ergo unde flos æris fit, est æs liquatum unde vapor excitatur *e* Materia autem æruginis est acetum acerrimum & vinacea acescentia. Quin & color manifeste discrimen arguit. Optimus enim flos æris *f* est friabilis, attritu flavescens, brevis, ponderosus, modice splendens. *g* Ærugo quia colore est viridis, res viride nuncupatur. Quod si quis aliter existimet, verendum est, ne à Pessulanis mulieribus ridiculus habeatur: quas in eo conficiendo

sedu-

a Quorundam lapsus.

b Flos æris verus quid.

c Viride æris aut ærugo rasilis quid. *d* Floris æris materia. *e* Æruginis materia. *f* Floris æris electio.

g Ærugo.

fedulas, & maxima industria utentes vidimus: ibique experti fumus, cum abraaderetur, acre quiddam inde repente nares ferire, propeque sternutamenta excitare. Quæ diximus, an vera sint, potestis apud Dioscoridem *a* legere, lib. 5. capit. 48. & 51. qui prædicta narrat. Præterea notandum erit, duo æruginis esse genera. *b* Una quippe est nativa, seu fossilis: quæ in metallis Cypriis, lapidibus nonnihil æris habentibus quibus ærugo efflorescat, gignitur. Hæc quidem pauca, vera & optima est. Altera factitia, *c* quæ triplex est: scilicet rasilis, quæ fit ut supra diximus: secunda vermicularis, seu scolecia quæ iterum duplex. Fossilis & factitia. Fossilis, quæ optima & per *d* se rafa ab lapide ærario est: de qua consule Plinium lib. 34. capit. 12. Factitia & tertia, quæ fit ex puerorum urina, cum mortario & pistillo Cyprii æris, qua aurifices ad conglutinandum aurum utuntur: estque *e* chryfocolla, ut vult Plinius, lib. 33. capit. 5. & hanc sub nomine chryfocollæ complectitur. De quibus generibus lege Dioscorid. lib. 5. capit. 52. & quomodo conficiantur: lege
Pli-

a *Æruginis* duo genera. *b* *Viride* atis verum quid. *c* *Æruginis* factitia tria genera. *d* *Ærugo* scolecia duplex. *e* *Chryso* olla.

Plinium lib. & capit. prius citato. Præstat autem ærugo fossilis, seu nativa; si inveniatur: cujus defectu *a* primum genus factitiæ rasilis sumitur, quæ à recentioribus falso flos æris dicitur: & pro illo usurpatur.

Aymentis.]

Vide an sit legendum pro sagimine vitri quod aymentum dulce nonnulli vocant vel pro magnete, cum videtur sagimen vitri potius accommodatum quam magnes, nisi magnetis pulverem commiscere velit *b* author ad spicula extrahenda è vulneribus. Est autem magnes secundum Dioscorid. capit. 105. lib. 5. lapis optimus qui ferrum facile trahit, colore ad cæru eum vergente, densus, nec admodum gravis. *c* Plinius capite 16. lib. 36. vult Sideritum eum dici, quia ferrum attrahit, quod Græcis sideros appellatur: & Heraclium, vel ab Hercule, vel Heraclea civitate. Magnetem vero nuncupari ajunt ab inventore magno. Quidam pastor cum armenta in Ida monte pasceret, videretque baculum cuspide *d* ferrata minutim, quo

a *Æruginis vera loco quid.* *b* *Magnes secundum Dioscoridem quid.* *c* *Magnes secundum Plinium inde nomen sumpsit.* *d* *Magnes secundum Nicandrum & Anthonium Iodoicum Olisipponensem medicum, unde.*

quo humum tetigerat, avelli non posse, & hærere solo sibi crepidas cerneret, quas ferreis claviculis compactas gerebat, rei novitate commotus, subesse lapides offendit, qui ferrum retinerent. Auctor Nicander, Plinius & Anthonius Lodoicus medicus Olisipponensis lib.2. de occultis proprietatibus, capit.1. ubi de magnete. Magnetis natura est, ut una parte septentrionem versus dirigatur: eaque parte maxime ferrum attrahit: altera vero in partem australem, ceu meridionalem aspicit, ferrumque abigit, & respuit. Unde manifestus error Plinii arguitur, qui in *a* Æthiopia Theamedem lapidem reperiri ait, qui ferrum abigat, & respuat, cû sit magnetis altera pars, quæ versus meridiem vergit, ut probe notavit Reymundus Lullius opusculo de magnete, & rota perpetui motus: quod opusculum, nondum in lucem editum est, sed in manibus nostris servatur. *b* Quinque genera magnetum constituit Plinius, Æthiopicum: magnesiacum: tertium, in Echio Bœotiæ: quartum circa Alexandrinam troadem: quintum, in magnesia Asiæ. Differentia prima, an sit mas, vel scœmina, proxima in colore. Magnetis tria genera

a Æthiopia.
Plinium.

b Magnetis genera secundum

genera facit & Cardanus lib. 7. qui inscribitur de lapidibus. Primum ferruginem appellat, quod parte quæ septentrionalem aspicit, ferrum attrahat : altera qua ad meridiem spectat, ferrum expellit. Isque verus est noster magnes. Secundum creagineum quasi carnè dūcentē: experimēto est, quod labiis hæret. Aliud non abfimile à secundo, quo solo sine acie vel gladio, citra aliquem sensum, quasvis corporis parteis penetrare possis, statimque vulnus concinnare, nec aliquid sanguinis effluet: quod se expertum testatur Cardanus, tum in se ipso, tum in familiaribus. Antipathiam cum alio in magnete admirari licet, qui si alio ungetur ferrum minime attrahit: vires tamen recipit, si hircino sanguine tingatur. Quod si plura expectas, lege Serap. lib. aggregat: capit. Agerabuantes sive Almagritos: ubi reddit rationem, quare naves incolarum hujus loci sint ligneis, non autem ferreis claviculis compactæ, propter magnetis frequentiam. Garcias ab orto Proregis Indiæ medicus lib. de aromatum & simplicium medicamentorum aliquot, apud Indos nascentium historia, ait fabulolum esse, naves quæ Calicut commeant, clavis ferreis non compingi, ob scopulorum è magnete fre-

D

quen-

a *Magnetis tria genera secundum Cardanum.*

quentiam, à quo scilicet attraherentur, & raperentur, si ferreis clavis fabricatæ essent: dicitque plures reperiri naves, clavis confixas ferreis, quam ligneis. Verum quidem in meldinis insulis naves ligneis clavis esse extractas: id autem ob ferri penuriam potius, fieri putat, quam quod à magnete sibi metuant. Hæc de magnete.

V I R E S A M E D I C I S P R O B A T Æ.

Mollificat durities & resolvit ea quæ sunt resolvenda: & est apostematibus frigidis aptum.

C A P V T X.

Emplastrum Ceroma ceu Ceroneum, Nicolai Alexandrini, capit. 286. Usuale.

Textus verus Alexandrini.

a Picem nava-
lem nonnulli vo-
lunt, qua navium
fabricatores na-
ves suas recen-
ter fabricatas il-
linunt. Puto ta-
men eam esse

℥. a Picis,

b Cere. ana. ʒ vij.

Sigapeni. ʒ vij.

Ammoniaci.

sumen-

sumendam qua
ex navibus ve-
tustis deraditur
jam permixtam
marinae aquae: ex
qua medicamen-
tosam vim &
astrictoriam c n.
traxit, ut scopo
& intetioni ma-
gis sit coveniens.

b Ceram sume
citrinam non lo-
tam, ut quae vim
habeat conco-
quendi mediocri-
ter, resolvendi,
medicamentosa-
que sit magis
quam lota.

c Thus mascu-
lum est acci-
piendum.

d Oppopa-
nax, & Galba-
num omiffa fue-
runt in narra-
tione simplicium
à bibliopola.

Terebinthinæ.

Colophonix.

Crocii. ana. ʒ iiij.

Aloes.

c Thuris.

Mirrhæ. ana. ʒ iiij.

Styracis calamit.

Mastiches.

d Oppopanacis.

Galbani.

Aluminis.

Fœnigræci. ana. ʒ ij.

e Confitæ.

Bdellii. ana. ʒ j.

Lithargyrii. ʒ. β.

D z

c Per

e Percon-
fitam in-
tellige fœ-
cem styra-
cis liqui-
dam, quæ
est thus In-
daorū quod
etiam plu-
rimi cozū
cozumbrū
caucanum
& Thy-
miana ap-
pellant.

S E C T I O I.

Confice sic Lithargyrium
in subtilissimum pulverem
redactū cum oleo sufficien-
ter decoque : deinde picem
adde : qua liquefacta ceram
adde, post cujus liquatio-
nem gummi colata, nempe
ammoniacum, terebinthinā,
sagapenum, oppopanacem,
galbanum, confitam, & sty-
racem calamitem injice, &
spatula bene commisce :
deinde colophonix, masti-
ches, olibani & bdellii pul-
verem : sic aluminis, myrrhæ,
fœnigræci pulverem immit-
te, & spatula optime com-
misce. Cave autem ne supra-
dictæ species continuatim,
sed quodam intervallo com-
petenti immittantur : cum
autem coctū fuerit, in aquam
infunde, & inde magdaleo-
nes factas usui reserva.

S C H O-

S C O L I A.

HÆC vero methodus descripta ab Alexandrino non tam videtur artificiosa, facilis, & usu probata quam quæ sequitur. Ceram in frustula concisam, ut liquefeat, igni levi appone: qua liquata mox picem colatam, & colophoniam contractam injice, movendo spatula lignea, & cum cera ab igne deposita fuerit, gummi quæ pulverisari nequeunt, ut sagapenum, ammoniacum, galbanum, & bdellium (si molle sit, si vero aridum, aut siccū, ponatur post mirram) in vino, vel aceto fortissimo per se imbuta & soluta, & separatim cocta (ut in præcedenti capite docuimus) cum terebinthina, confita, & styrace incorporentur: quæ incorporata, cum præcedentibus liquatis ac modice calidis commisce, desuper cum omnino tepuerit, cætera simplicia optime & seorsim lævigata, trita, ac cribata, ut lithargyrium (vult Alexandrinus illam prius cum oleo coqui) fænugrecum, alumen, mirram, olibanum, mastichen, aloen, insperge, ac cum spatula lignea velociter agitando conjunge. Paulo post

D 3 crocum

crocum juxta artem lævigatum exactissime dicta spatula tractando commisce. Quibus omnibus diligenter commixtis super marmore manibus oleo laurino perunctis magdaleones formentur. In hoc emplastro conficiendo maxime cavendum est, ne prædicti pulveres aridorum in emplastro calido adhibeantur ne, in grumos abeant. Cæterum Alexandrinus simpliciter & sine ulla additione, scribit picem. Pix autem hoc in loco navalis sumi debet, aut ejus loco nostra nigra factitia. Quamvis in capite 8. monuerimus, cum reperietur scriptum picis simpliciter, & sine ulla additione, liquidam esse intelligendam. Verum cum hoc diximus, solum eam in compositionibus Præpositi usurpandam intelligas, & præcipue in emplastris & unguentis, quæ ad maturandum & mundificandum valent. Proinde admonitos Pharmacopeos cupio, Præpositum hoc emplastrum præscribere, & in simplicibus cum Alexandrino convenire, in ponderibus vero minime ut supputavit: hæc Alexandrini descriptio pondere simplici constat: Præpositus pondus triplicat, in quibusdam tamen parum. Præterea in methodo conficiendi Alexandrinus de croco nullam mentionem facit, quamvis

in sua descriptione scripsit : Quare qui hanc compositionem aggredi volet non secundum Alexandrini modum componat sed secundum nostrum à nobis descriptum.

V I R E S A B A L E X A N D R I N O

notate.

Optimum ad scapularum dolorem & pectoris. Confert hepatis & splenis phlegmonis. Anasarca, asciten, & tympanitidem curat : dolorem ilii, & tormina intestinorum placat : renum, & vesicæ distemperantias, lumborum, pectoris, sæpius superimpositum emendat : inflammationibus & doloribus matricis subvenit : Arthriticis, Ischiadicis, & podagricis medetur. Typice febrientibus, stomacho inductum subvenit, & morsibus rabiosi canis, & serpentium ictibus appositum auxiliatur.

C A P V T X I.

Emplastrum Oxycroceum Myrepsi: Sectione x. de emplastris num. 14. Vsuale.

Myrepsi textus verus.

- a Zopissa, est \mathcal{Z} . Croci.
 resina secundū myrepsum
 sect. 3. de unguentis num.
 52. cum manibus derasa
 à vetustissimis
 navibus quam plurimi apochyma, vel hypochyma appellant, hodie tamen ejus loco picem nostram factitiam usurpamus, sed ut verum fatear in hac compositione nava-
- a Zopissæ.
 Colophonix.
 b Cerae. Singul. \mathcal{Z} ij.
 Terebinthinæ.
 Galbani.
 Ammoniacy.
 Thuris.
 Myrthæ.
 Mastiches. Singul. \mathcal{Z} β .
 \mathcal{Z} j. β .

lem illam supradictam intelligere oportet.

b Ceram citrinam non lotam accipe.

c Eliquata legendum.

Galbanum & Ammoniacum aliquantulum cōtusa conjice in modicum acetum per totam noctem & c fervefacta per saccum ex tenui linteo factum colato coquantur iterum donec pars aceti consumatur. Dein dissolutam zopissam & colatam injicito, adjecta cera: ac dissolvens omnia, simul adijce colophoniam: & deinceps terebinthinam: post mastichē, myrrhā & thus: deinde funde super marmor & croco in pulverem trito insperso ipsam subigito.

S C H O L I A.

IN vas aliquod ceram divisam ad liquandum injectam levi igni appones, qua liquata zopissam, à fordibus purgatam, & colatam una cum colophonia pariter ut liquecant immittes: quibus liquatis ab igneque amotis, & parum refrigeratis galbanum & ammoniacum arte, seorsinque dissoluta, & ad humidam consumptionem cocta (hoc est ut absorbeat humidum à vino vel ab aceto contractum, non autem naturale humidum, ita ut ariditatem immodicam assequantur) & cum terebinthina incorporata, præcedentibus immiscebis: quibus commixtis thus, mastichen & myrrham, separatim tenuissimeque pulverisata desuper caute insperges. Ultimo vero crocū quam tenuissime pulverisatum assidue movendo spatula lignea, conjunges, ac subiges. Tunc cum omnis materia in unum conjuncta & probe subacta fuerit manibus, oleo quod nervos confortat, unctis magdaleones formabis.

V I R E S A M Y R E P S O
descriptæ.

Ad contusa ossa, nervos, ac dolores, &
 ad omnem contulum locum confert.

C A P V T X I I.

*Emplastrum de Cerusa Præpositi ex x x.
 particula secundi libri ubi agitur de unguen-
 tis: & appellat illud unguentum de Ceru-
 sa coctum V suale.*

Vera Præpositi descriptio.

a Legendū a ℥. Olei communis. ℥. ij.
 (ut exper-
 tus sum) Ceruse Subtiliss. ℥. j.
 unc. vj. vel
 i x. si ma-
 gis album-
 vis conficere.

Coquantur lento igne,
 donec sit coctum. Et sunt
 aromatarii maxime in Gal-
 lia, qui faciunt præsens un-
 guentum ad modum em-
 plastri: & vocatur empla-
 strum de Cerusa.

D 6 SCHO-

S C H O L I A.

Confice sic Cerusa super porphyrium ducta & cribrata, in lebete satis amplo, spatula lignea assidue agitando diu nutriatur una cum oleo, deinde igne lento & brevi coquantur, videlicet claro aëre & radiante sole, quousque à tumore subsideat nec manibus adhæreat, seu donec marmor, vel frigidissimæ aquæ infusa portiuncula idoneam habere consistentiam videatur. Tunc refrigerare permittes, & magdaleones nive albidiores ad usum efficies.

Tamen ajunt nonnulli ut emplasticum fiat, nec manus coinquinet, coqui debere diutius: itaque secundum eos non videtur esse dosis olei exuperans. Nam plurimum olei coquendo absorbitur: sed quia decoctione nigrescere potest emplastrum, illorum secretum est ad albedinem servandum, cum decenti coctione, & eadem dosi olei, miscere nonnihil cerusæ dilutæ, vel aliquid ceræ albæ circa finem coctionis. Re vera dum modo proportio olei & cerusæ à nobis præscripta apponatur, & lento igne coquatur, facile sine ceræ & cerusæ addi-

additione (ut sæpissime expertus sum) potest confici : albumque maxime redditur : si vero plus olei, quam par sit addatur, tunc coctio longa erit : longa autem coctione nigrescit, nisi aliquid ceræ vel cerusæ commisceatur. Meminit emplastri de cerusa Galenus lib. 1. secundum genera cap. 14. quod ex cerusa, lithargyrio & resina fit, oleo omphanino, & cera.

Olei communis.]

In hoc magis convenit oleum rosatum, factum ex olivis & rosis immaturis ponere, quam commune, quia frigidius commune : tum quia emplastrum videtur prodesse malis complexionibus calidis factis à caliditate solis, vel quavis ratione, & etiam fricatione, seu excoaratione cum calefactione mala. Ut igitur his morbis potentissime conferat, oleum rosatum immaturum, loco communis, accipiamus : videlicet Mesuæ descriptionis, vel Præpositi.

Cerusæ albæ.]

Omnis cerusa, antequam emplastra, unguenta, collyria, & hujusmodi compositiones ingrediatur, debet abluï, ut mediocriter desiccet, & astringat sine aliqua mordicatione, in liquore proprio. Ejusq; lotio talis est. Accipe cerusæ albæ plumbariæ
fria-

friabilis, ^a & quæ fit Rhodi, & Corinthi, vel in Puteolis Italicæ regionis, quæ Gallis (ceruse de Venize) dicitur, quantitatem sufficientem, eam friando in aqua communi, vel rosacea, vel secundum affectum cui inservire debet: sed in hoc præstat aqua rosacea, tum propter frigiditatem, tum propter gratiam odoris: in mortario marmoreo pistillo ligneo diutissime tere: deinde aquam paulatim effunde, aliquot horis friando, ac agitando: agitatum quiescere permitte. Ubi in fundo mortarii cerusa quieverit, & sedata omnino fuerit, abjiciatur aqua: rursusque aliam aquam novam immitte, ut prius agendo: sæpeque id factitabis, abjiciendo aquam & aliam innovando, quousque aqua ultima injecta agitataq; cum prædicta cerusa, nitida, clara, omnisque sordis expers appareat, quam ejicies. Tum cerusam paulatim super porphyrio cum molula accuratissime levigabis, & levigatam desiccabis: iterumque postquam siccata fuerit, in eodem mortario rursus teres, de qua trita pastillos cum aqua rosacea finges. Alii cum aceto acri pastillos formant, & in sole siccant. Hactenus de cerusa: de illius autem confectura lege Dioscoridem lib. 5. cap. 63. vel Me-

fuen

^a Cerusa electio & lotio.

fuen in lib. Servit. Quid sit lege infra in
2. sect. cap. 1.

V I R E S E X M E S V E D E S V M P T Æ.

Malis complexionibus calidis factis à
caliditate solis convenit, fricationi seu
excoriationi cum calefactione mala valet.

C A P V T X I I I.

*Emplastrum Triapharmacum Mesuæ ex
distinctione x 1. de unguentis & empla-
stris Vsuale.*

Vera Mesuæ descriptio.

a Lithargyrium
aureum vel ar-
genteum si su-
mas nihil inter-
est: tamen au-
reum praestat.

b Olei lib. i.
se. legendum pro
quantitate li-
thargyrii ut ex-
pertus sum.

a ℥. Lithargyrii triti
sicut alcooch. Par. j.

Aceti vini fortissimi.
Par. j.

b Olei antiqui. Par. ij.

Coquantur cum faci-
litate usque dum fiat ejus
spissitudo, & admini-
stretur.

S C H O-

S C H O L I A.

Lectum, præparatum & elaboratum (ut in præcedentibus emplastris docuimus) accipiatur lithargyrium, una cum oleo spatio xij. horarū nutriatur, lentoque igne semper spatula lignea movendo coquatur, donec crassescat: quo cocto statim aceti mediam partem paulatim affundēdo in id injicies, videlicet extra ignem ne (ut superius docuimus) recentium rerum contactu exundet. Rursusque igni lithargyrium appones, & ad aceti consumptionem concoques: quo consumpto, alteram partem aceti, quæ restat, eodem modo injicies paulatim lithargyrio ab igne remoto. Deinde ad decentem concoctionem percoques, videlicet ad electarii formam, vel quousque fundo vasis non adhæreat, & digitos tractando non coinquinet, quod sane perfectæ coctionis signum est: coctum autem & in hunc modum paratum ad usum repones. Unum hic ab omnibus diligenter notandum venit, lithargyrium nempe quod hoc emplastrum ingreditur, debere aqua rosacea lavari sine aliquo dubio, &
loco

loco veteris olei, rosaceum immaturum fumendum, quia pares vires & facultates sortitum, ut emplastrum de cerusa. Cum itaque hæc duo pares habeant effectus, & unum alterius loco fumatur, non erit alienum in hoc simplicia præparare, quemadmodum in emplastro de cerusa paravimus. Christophorus de Honestis in expositione hujus emplastri eadem distinctione xj. sic inquit. Emplastrum de cerusa quibuscunque malis complectionibus calidis factis à caliditate solis &c. convenit. Pari-ter istud Tripharmacum confert ulceribus quibus conjungitur mala complexio calida &c. Quare si sic emplastrum omnibus depositionibus confert, quibus unguentum de cerusa coctum, & si etiam in eo lavetur cerusa in aqua rosacea, & loco olei communis oleum rosatum immaturum fumatur, cur in isto lithargyrium eodem & simili modo non parabitur, cur etiam oleum antiquum in rosaceum immaturum non transmutabitur? Præterea notandum apud Galenum cap. 3. lib. 1. secundum genera hujusce emplastri varias esse conficiendi formas pro intentione varia, & scopi differentia. Interdum cum veteri & communi oleo; interdum oleo communi & aceto, ad duplam lithargyrii por-

portionem : variat etiam apud eundem concoctionis modus, & quantitas. Ex iisdem materialibus crudis fit unguentum quod nutritum Chirurghi vocant, ad inflammationes & erysipelata commodum.

VIRES EX MESVE DESUMPTÆ.

Easdem quas vires habet emplastrum de cerusa, facitque carnem nasci in vulneribus consolidans ea.

C A P V T X I V.

Emplastrum palmeum seu diachalcitbeos Mesuæ ex distinctione x i. de unguentis, & emplastris Vsuale.

Verus Mesuæ textus.

a Oleum commune seu olivarum insulsum vetusque accipe.

a ℥. Olei veteris.
℔. iiij.

b Axungiam suillam non saltam sed vetustissimam dixit author ad differentiam pinguedinis.

b Axungię veteris sine sale. ℔. ij.

Differunt autem Pinguedo & axungia : nam pinguedo dicitur (sain doux) axungia vero (vieil oing) nūcupatur, ut Galen. placet lib. 1. secundum genera.

c Lithargyrium aureum sume.

d Vitriolum Romanum seu album accipe.

c Lithargyrii triti sicut alcooch. libr. iij.

d Vitrioli. ℥ iij.

Conficiatur sic. Oleum & axungia mittantur in stagnato supra ignem, & liquefiat. Deinde addatur lithargyrium, & vitriolum, & ducantur continue cum tribus ramis palmæ, & accipe unum ramum palmarū minutim incisum, & intromittatur, & tandiu bulliat super ignem lentum factum de lignis siccis, donec inflammetur, & redeat ad suum statum, & inspissetur, & densitatem habeat.

S C H O L I A.

IN lebete amplo lithargyrium præparatum & oleum, horarum xij. spatio, ut simul nutriantur, impones. Postea igni lento, & levi, ne nigrescat aut uratur, ad crassitiem concoques. Tum pinguedinem injicies, perpetuo & sine mora, spatula palmea, aut phœnicea eadem die abscissa, quo pharmacum conficietur, alioqui prius excisa succum amittit, vel illius loco radice cannæ, vel saligno ramo, vel quercino, vel mespillino aut ejus arboris ramulo quæ astringendi vim modicam habeat. Quibus ad perfectam concoctionem decoctis, ab igneque depositis, & parum refrigeratis, vitriolum romanum seu album, pulverisatum, ut liquefeat, injicies: quo liquato & omnibus refrigeratis magdaleones finge.

Alii liquore convenienti vitriolum dissolvunt, & in lithargyrio cocto & extra ignem admoto paulatim affundunt, & ut mucagines coquunt: deinde ab igne deponunt, & eo tepesfacto magdaleones ad usum constituunt. Animadvertendum erit inter

inter coquendum ut humiditas naturalis spatulæ in lithargyrio remaneat & omnino cum eo consumatur. Itaque dum diutius coquetur lithargyrium videbisque extremitatem spatulæ deficcari, illa pars sicca præscindi debet ad humidum usque, ut nova spatula movendo novus succus reddatur in lithargyrio, idque sæpius repetendum erit, donec multis ejectis taleolis, spatula pro brevitate inutilis derelinquatur, & succum humoremque spatulæ sæpius renovatæ lithargyrium retineat. Permulti istud medicamentum componunt, scilicet ex lithargyrii lib. iij. Olei veteris & axungiaæ porcinaæ æquis partibus, Vitrioli ζ iij. Alii vero sine oleo lithargyrium æqua cum porci axungia portione, & vitrioli ζ iij. perficiunt. Verum (ut quod verissimū, est notum sit) prima descriptio cæteris omnibus antecellit (sive à Mesue sive à Galeno sit literis tradita) & in officinis magis est usitata quia certa videtur proportio olei & axungiaæ ad nutriendum, & coquendū lithargyrium, ut expertifumus.

Vitrioli.]

Quid de eo apud probatos authores cum antiquos, tum recentiores, legerimus, qua poterimus facilitate explicabimus.

Vitrio-

Vitriolum *a* nihil aliud est quam atramentum futorium. Dicitur autem atramentum futorium ipsum vitriolum, quod olim eo coria sua tingebant futores, & alii opifices qui corio utuntur : sed quia acre est, & facile corrodit calceamenta, à futoribus atramentum aliud excogitatum est, quo coria tingunt nempe ex ferro. *b* Sed apud veteres atramentum futorium intelligere debemus, vitriolum metallicum : illud scilicet, quod nihil aliud est quam aqua congelata, & assumpta natura æris, diversam *c* habens naturam lapidis cui adhæret. Plinius lib. 34. cap. 12. Chalcantum, id est, vitriolum, & atramentum futorium dividit in nativum seu fossile, & factitium. Nativum triplex est, unum quod fit scobe cavato : secundum quod fit in saxorum catinis : tertium *d* quod fit salis modo, flagrantissimo sole admistis dulcibus aquis cogente. Et est factitium, quod in Hispania ex puteis stagnisve fit, habentibus id genus aquæ: hæc Plinius. Serapius capite de Zed. sic ait. Vidi in mineris tres venas

venas

a Vitriolum & atramentum futorium idem. *b* Atramentum futorium secundum veteres vitriolum appellatur. *c* Vitriolum metallicum seu atramentum futorium quid. *d* Vitrioli seu chalcanti vel atramenti secundum Plinium divisio.

venas extensas; unam super aliam *a* per longum spatium, & vena inferior erat Zed nigrum, id est, marchasita, vel pyrites: quod si in aceto dissolvitur in nigrum colorem vergit, & ab Avicenna lib. 2. cap. de atramento, vocatur atramentum album, quia non dissolutum videtur albi coloris esse. *b* Et secunda quæ erat supra eam, colcotar dicitur, id est chalcitis. *c* Et terra quæ superior est, Zed viride, id est vitriolum vel calchantum, dicitque has tres species ad invicem diversificari, in subtilitate, & grossitudine, quoniam ex his fit grossius zed nigrum: colcotar, seu calcitis, inter hæc duo medium tenet. Hæc Serapius.

Galenus lib. 9. simpl. medicam. *d* una cum Serapio convenit, sicque his verbis differit. Domus ingens cujus introitus erat ipsum metallum, in quo conspexi quasdam in longissimum porrectas veluti zonas, alias super alias, num. tres. Infima erat ipsius Soreos, super quam erat altera Chalciteos, suprema Mifeos. Et lib. 4. de composit. medicam. per genera. Misi, Sory, ut didicistis, Chalcitidi genere cognata

a Atramentorum secundum Serapium divisio. *b* Atramentum album quid secundum Avicennam. *c* Colcotar & Chalcitis idem secundum Serapium. *d* Atramentorum secundum Galenum divisio.

gnata sunt, ex una, ut ita dicā, radice producta: tenuius tamen apparet Misy, crassius Sory. Chalcitis mediam utriusque facultatem habet. Igitur hi duo auctores aperte ostendunt hæc tria sponte in visceribus terræ fieri ac inveniri, non autem ullo artificis ingenio. Nunc quid Sory, Chalcitis, & Misy dicamus.

^a Sory inquit Dioscorides lib. 5. cap. 78. veteres existimarunt Melantheriam esse aberrantes: siquidem sui generis est Sory ei non ^b ab simile: præfertque Ægypticum, quod frianti nigrius apparet, in multa dehiscens foramina, subpingue, astringens, & olfactu, devorationeque magnum virus olens, ita ut stomachus in vomitiones effundatur: in humore non liquefit. Memini me vidisse Sory verum, coloris ex nigro rubei, sed diluti, exteriori superficie sublutum, & albicans ut fere appareat chalcitidem prius extitisse, sapore acerbo, ut est chalcitis vera, sed minus astringente & leviori quam melantheriam & misy minuique friabile, chalcitide excepta.

Chalcitis secundum ^c Marcellum virgilium lib. 5. capit. 63. est lapis unde æs coquitur: nam hoc vocabulo generali multæ

^a Sory antiquorum quid. ^b Soreos electio. ^c Chalcitis secundum M. Virgilium.

multæ res significantur, ut una est lapis ærarius, id est marchasita seu pyrites. *a* Altera est significatio chalcitidis, qua significat chalcitin vel trichitin, id est, alumen capillare, & ærarium, quod in pyritem concrefcit, hinc aliquoties *b* alumen schiston dicitur. Ultima significatio chalcitidis est species chalchanti (id est flos quasi æris) atramenti sutorii, seu vitrioli: hæc vero chalcitidis, species chalcanthi. Duplex hæc, nativa & factitia. Nativa rursus est duplex Cypria & Babilonica: de Cypria lege Plinium, lib. 37. cap. 11. & Dioscoridem lib. 5. cap. 75. De Babilonica vide Serapium capit. de Zed. Factitia est quæ fit ex chalcantho veteri, quod in filamenta transit, attestante Galeno, qui chalcanthum paulatim in chalcitin transire scribit. Probatur *c* chalcitis primi generis secundum Dioscoridem eodem lib. & capit. citato. Similis enim æris friabilis, nec lapidosa, nec inveterata intercurfantibusque oblongis venis splendentibusque promptissime liquefcit. *d* Misy est gleba ex humore coagulato, substantia, sapore, & viribus, ut chalcitis. Nam ut prædiximus,

E

sory

a Chalcitidū nomen multa significat. *b* Alumen capillare seu schiston vel pluma est species chalcitidis.

c Chalcitidū nativæ primæ generis electio. *d* Misy quid.

Yory, chalcitis, & misy ex una radice quasi producuntur, & genere cognata sunt. Duo autem apud quosdam *a* sunt genera. Unum nativum, quod sponte gignitur, & præcipue in fodinis Goisclariæ ærariis: alterum *b* factitium, quod fit cum chalcantum est mutatum in chalcitin. Plinius lib. 34. capit. 12. fieri è lapide concretum natura discretumque dicit, & optimum in officinis Cypriorum. *c* Præstat nativum natione Cyprium, quod auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet ægreque liquefcit, ut testatur Dioscorides lib. 5. cap. 76. Tandem misy verum, & ego sum testis oculatus, est coloris lutei, sed subviridis, facile friabile, punctis luteis sublucentibus, saporis chalcitidis veræ sed minus acris.

d Melantheria secundum Sylvaticum, est clavorum veterum ferreorum rasura. Alii dicunt esse fugiam de ferro. Dioscorides lib. 5. cap. 77. triplicem facit originem. *e* Unam quidem quæ in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo concrefcit. Alia vero in summa faciæ supra-

a Misy secundum quosdam duplex. *b* Misy factitium secundum Plinium quid. *c* Mises secundum Dioscoridem electio. *d* Melantheria secundum Sylvaticum quid. *e* Melantheria triplex secundum Dioscoridem.

supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam invenitur in Sicilia & aliis quibusdam regionibus fossilis quædam. *a* Laudatur secundum Dioscorid. quæ sulphuris colorem trahit, levis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit, tingiturque illa secundum diversas terras in quibus gignitur. Dicamus itaque Sory, Chalcitin, Myfi, & Melanteriam esse species chalcanthi & per chalcanthum, intelligamus omnes species chalcanthi. Nam aquæ, quæ habent succum hujus vel illius speciei chalcanthi eundem ferme habent saporem eandemque naturam, differuntque tantum secundum magis & minus. Immo tantum est consortium inter quatuor species chalcanthi, ut facile ex una specie corrupta generetur altera. Præterea omnia hæc genera esse falsis species dicemus, adeo ut cum plures sint falsis species & differentiæ, pariter etiam plures species chalcanthi distinguuntur adinvicem.

Haftenus de vitriolo & generibus ex veterum opinione: nunc de opinione recentium, quæ magis arridet, dicamus.

Vitriolum, *b* quod ut plurimum ab antiquis

a Melant. electio.
sententia consideratio.

b Vitriolum ex Neotericorum



tiquis atramentum dicitur, nunc tripliciter consideratur. Etenim vitriolum simpliciter, aut vitriolum Romanum nihil aliud est quam coppa rosa. Vitriolum autem quod vocabant Cyprium, est proprie illud cœruleum quod nunc effoditur in Germania: quod quiddam de natura æris participat. Nam levi artificio ex illo æs extrahitur, ob id chalcantum appellatur, Gallis vitriol d'Alemaigne. Atramentum autem nigrum nunc reperitur in Liguria, & est quodammodo ferrugineum, id est naturam ferri sapiens & ex illo ferrum per artificio mutatur in æs, quod nihil aliud est quam colcotar. Atramenta hæc omnia, seu vitriola, sunt quædam mediæ dispositionis inter alumina & sulphura, ex utrifque enim participant, sicuti alumina constituuntur inter sales & vitriola.

VIRES A MESVE DICTATÆ.

Ad vulnera ubi est sanguis, & apostemata pestilentia, & exituras, & adustionem, & compressionem & attractionem valget.

C A P V T X V.

Emplastrum contra rupturam seu de pelle arietina Præpositi ex vj. particula lib. 2.

Vera Præpositi descriptio.

a Picem illam navalem quam fabricatores navium ex vetustis navibus deradunt accipe, aut ejus loco illam qua calcearii in compingendis calceis utuntur.

b Lithargyrium aureum sume.

c Ceram novam hoc loco intelligere licet recens expressam, que adhuc mellis odorem retinet, & sic flavescit, ut ad rubrum accedat. Dixit vero rubeam, ad differentiam alba que Galeno libris secundū genera (ubi docet confect. emplastro- rum) Pontica dicitur,

a ℥. Picis navalis.

Aloes. ana. ℥. iij.

b Lithargyrii.

c Ceræ rubæ.

Colophonix.

Galbani.

Ammoniacy. ana.

℥. ij.

Visci quercini.

℥. vj.

Gypsi utri.

E 3

empr.

extreme alba & naturaliter talis,

d Aristolochia utriusque radices.

e Thus masculinum quod nos olibanum vocamus sume.

f Ysculi sunt terrestres vermes qui in vitio austero lavari debent & olibano modice calido desiccari, prius tamen lotionibus pluribus in aqua lavari ut à terra separentur.

g Gallas non perforatas virides & firmas intellige: eo quod acerbiores sunt perforatis.

*h Utriusque consolidæ radices accipe: hoc in loco Prepositus non determinat liquorem in quo debeat pel-
lis arietina deco-*

d Utriusque aristolochiæ. ana. ℥ iiij.

Myrrhæ.

e Thuris. ana. ℥ vj.

Terebinthinæ. ℥ ij.

f Ysculi.

g Gallatum.

h Utriusq; consolidæ.

Boli armeniæ. ana. ℥ iiij.

Sanguinis humani. ℥. j.

Confice sic. Primo ponatur viscus quercinus, & dimittatur bullire in aqua decoctionis pellis arietinæ sicut removetur ab ariete, quæ

qui:

*qui : vide
infra in no-
stra metho-
do.*

debet decoqui per diem & noctem , postea deponatur ab igne, & ponatur terebinthina, lithargyrium & colophonia , postea mastiche & thus, ysculi, myrrha, galbanum, & ammoniacum, paulo post consolida major & minor, gypsus, & bolus armena. Postea super ignem ponatur, & ponatur sanguis humanus, consequenter aristolochia longa, & rotunda, & ad ultimum aloe, & semper agitari debet sine intermissione fortiter cū spatula. Signum decoctionis est quando digitis non adhæret: postea ponatur super marmor unctum oleo violato & manibus malaxetur postea teratur iterum assidue per duos vel tres dies, deinde usui reserva.

S C H O L I A.

Ntequam methodum hujusce emplastri aggrediamur notandum erit quantitatem picis, ceræ, & colophonix, tum & gummi dissoluta, & cocta, viscum & bitumen pel-
lis, quæ omnia corpus emplastri hujus faciunt, minime sufficere ad emplastri consistentiam, & crassitiem, quam ligationem appellamus, nisi pondus ceræ & terebinthinæ augeatur: vel si illorum pondus nolis augere addenda est lib. j. aut $\frac{3}{4}$ ix. olei convenientis effectui emplastri: vel olei loco poteris addere lib. β . vel $\frac{3}{4}$ ix. ad summum unguenti Comitissæ, quod maxime mihi videtur ad hujus unguenti naturam & proprietatem accedere. Quod si neque pondus prædictorum augeamus aut nihil olei, vel unguenti addamus, successu temporis emplastrum nullam consistentiam aut corpus habebit, sed potius formam pulveris, ut multoties expertus sum. Quare consulere in hac sequenti methode componeretur, valde enim emplastica & methodica est.

Integram arietis pellem, statim ubi ipsa
ab

ab ariete divellitur, accipere convenit, eamque in minutissimas partes dividere, & in lib. circiter 200. aquæ pluvialis & aceti, diutissime coquere, donec maneat tantum pili. Tunc totum decoctum calidum intorqueatur & exprimatur. ^a Expressionis ipsius quantitas sufficiens refrigerata in gelatinæ, aut bituminis modum condensata (quod erit signum perfectæ coctionis, & dissolutionis ad pulverem congregandos & incorporandos) accipiat, in quo dissolve viscum quercinum præparatum, quo dissoluto totum igni levî appones, & statim ceram minutim concissam, ut liquefiat, conjicies: deinde picem frustulatim divisam pariter, ut liquefiat, impones. His omnibus liquatis, & ab igne depositis, & parum refrigeratis, lib. ℥. vel ad summum ℥. ix. unguenti Comitissæ commiscebis, ad ligationem. Paulo post galbanum, & ammoniacum seorsim vino austero dissolutum (vult Guido in aceto dissolvi) & coctum, una cum terebinthina incorporatum, spatula tamen movendo, conjunges (modus autem solu-

E 5 tionis

^a Guido addit lib. ꝑ. tanquam præmateriali decoctioni ipsius pili arietis: quoniam Præpositus in methode faciendi vult omnia dissolvi in toto cremore decoctionis pili arietina cujus recepta varia est ista.

tionis ac coctionis, satis à nobis hac Sect. cap. 9. explicatus fuit) desuper simplicia arida separatim & tenuissime pulverifata & cribrata ordine & hac methodo sequenti insperges, ut lithargyrium præparatum, gypsum, bolum armenam cum aqua rosacea vel plantagine lotam, aristolochiam & utramque consolidam, ysculos præparatos, sanguinem humanum optime collectum. Ultimo vero myrrham, thus, colophoniam, & aloen: agitabisque simul omnia sine ulla intermissione cum spatula eousque dum sint subacta & mixta omnia. Insuper spatio unius diei, ut exactior fiat incorporatio & permixtio, in mortario cum pistillo mediocriter calido massam tractabis. Peracta autem agitatione & tractatione, manibus oleo violaceo unctis, super marmore oleo eodem uncto, magdaleones formabis, quos ad usum servabis.

Colophonix.]

Colophonix pro resinarum ratione, ex quibus conficitur variæ sunt species, unde alia candida, alia mollis, crudaque est, à pineo vel piceo caudice manans, & olei colorem referens. Pinguis, quæ vera est colophonia, olim ad nos ex colophone Ionix urbe, unde uomen sumpsit, deferre-
batur.

batur. Alia sicca, cocta sive fricta, lucida quæ nihil aliud est, quam fex distillatæ terebinthinæ, aut terebinthina arte in hunc modum cocta, videlicet ex partibus duabus terebinthinæ, cum parte una aquæ pluvialis, quæ a hodie in officinis nostris colophonia cognominata est. Sed quia vera desideratur, ejus inopia priore *b* utimur, quæ probatur lucida, levis, odorata, calculorum expers. Si plura desideras, poteris supra hac sectione prima cap. 8. legere, ubi agitur de pice.

[Visci quercini.]

c Viscus per se non est arbor, sed in arboribus vivit, præcipue in quercu, sudorque arboris dicitur. Gignitur quoque in malo, piro, & plerisque aliis arboribus: quinetiam in quorundam fructuum radicibus. Fitque pluribus ac diversis modis, verum præstantissimus secundum Dioscoridem lib. 3. capit 87. est qui è granis in quercu *d* nascentibus extrahitur, & probatur recens, intus porraceus, extra fulvus, sine cortice, levissimus, qui nihil asperi furfurosi que conceperit, & ille sumendus est, in omnibus compositio-

E 6

tio-

a Colophonia saltitia paranda ratio. *b* Colophonia saltitia electio. *c* Viscus quercinus quid, & in quibus arboribus gignitur. *d* Visci quercini electio.

tionibus, quæ immodicam virtutem habent astringendi.

Gypsi usti.]

a Lutetiana urbs nostra maxime gypso abundat, ibique commode, & frequenter nativum seu crudum eruitur, deinde coctum ad ædificia *b* fabricanda expetitur. Albertus magnus vult quasi extremitatem lapidis specularis esse: alii genus lapidis similis nitro habentis venas latas esse. Res admodum cognata est calci non tamen ita est *c* calidum, differtque à calce: nam calx restincta humore aliquo non oleaginoso, acquirit calorem, gypsum vero restinctum non accenditur, neque calet. Est autem gypsum duplex. Unum quod dicitur asini speculum, *d* squamosum, & lucidum: aliud concretum non squamosum, neque lucidum, *e* Præstantissimum est recens, lucidum, non diu asservatum, post coctionem aquæ immistum ægre lapidescit ac coit. Uritur autem sic.

f Gypsum lucidum squamosum & integrum accipito, & in crucibolo fusorioque furno ubi sint carbones accenti circumcirca imposito, ignem continuando eoulque

a Gypsi consideratio. *b* Gypsum secundum Albertum magnum quid. *c* Gypsum & Calx quomodo differant. *d* Gypsi duo genera. *e* Gypsi uelutio secundum Dioscoridem. *f* Gypsi usti.

eouſque dum per album nivis modo deveniat, læve, ac friabile, & ſi digitis moveatur in pollinem abeat : hoc enim modo ad uſum dictum id accipiendum. Haſtenus de Gypſo. Plura Plinius lib. 36. capit. 24. & Georgius Agricola lib. 5. foſſilium genera multa annumerat.

Sanguinis humani.]

Præpoſitus in hoc emplaſtro *a* ſanguinem humanum requirit, qui ſententia plurimorum eligi debet ab homine, qui à vigefimo quinto anno ad trigefimum accedat, qui uxorem non duxerit, nec rem cum ulla habuerit, nec obnoxius ſit morbis, qui in lætitia vixerit abſque ebrietate, ſeque exercuerit in equorum agitatione, aut in pila palmaria (ſi talem reperire poſſis) non autem ex homine ruſſo, ut plurimi ſentiunt, cum temperamento iſ ſit magis bilioſo, & melancholico : talis enim ſanguis minime idoneus eſt facileque putreſcit. Quid vero ſi nullo pacto talis poſſit reperiri, nec ab homine ruſſo & temperato, ut ſufficiat ad compositionem ? *b* Cenſerem ubi ſanguis deſit, ſuillum ſumendum Galeni authoritate lib. 10. Simpl. cap. 1. ubi
de

a Sanguis humanus à quibus hominibus accipitur.
b Sanguinis humani loco quid ſumendum, & Galen.
& Aſcen. ſententia.

de sanguine dicit, sanguinem intelligendum esse animalis secundum naturam se habentis, alterius vero sanguinem humore aliquo mixtum esse, qui quovis tempore facile ad manum haberi potest: cum etiam ex Galeno lib. 10. Simpl. cap. 2. maxime temperie sit humano similis. Probatque Galenus eos qui sanguinis humani loco in morbis suillum commendant. Cujus sententiæ Avicenna libro secundo tractatu 2. cap. 610. astipulatur, dicens, in omni re sanguinem *a* humanum & suillum similem esse. Alii autem recentiores medici bovillum fibrosum ad astringtionis scopum potius assumunt quod re vera melior propter astringtionem sit. Hactenus de sanguine humano. Nunc ad illius collectionem accedamus. Accipiatur sanguis humanus ex homine boni habitus, beneque temperati, & medius fluens, quia tenuior est: in olla fictili bene cocta & plumbata in qua quieverit & incocta fuerit aliquot horis aqua pura, & sincera, ut odor terrestris deperdatur, vel si mavis vase vitreo excipiat & linteolo raro contegatur, solique, eousque dum siccum sit, exponatur.

V I R E S

a Sanguinis humani loco quid sumendum secundum recentiores. *b* Sanguinis humani electio, & desiccatio.

V I R E S A M E D I C I S P R Æ -
s c r i p t a .

Solenne est ad enterocœlem , & intesti-
norum ramicem & ad herniam.

C A P V T X V I .

Emplastrum de granis Lauri, ex distinct. xj.
Mesuae de unguentis & emplastris V suale.

Vera Mesuae descriptio quadruplicata
ponderibus.

℥. Olibani.

Mastiches.

Myrrhæ. ana. ℥ iiij.

a Grana lauri ex- a Granorum lauri.
corticata sume. ℥ viij.

Cyperi.

b Costi amari ra-
dices intellige.

b Costi. ana. ℥ ij.

Mellis

Mellis quantum sufficit, hoc est, tantum quantum pulveres possunt suspicere & re vera videntur pro quantitate specierum unc. vj. sufficere, si debitam formam & emplasticam habere velimus.

Mellis colati quantum sufficit ad aggregandum: & extendatur in panno, & calidum superponatur, ubi oportet. Si autem triplicatur in eo cyperú, & ponatur de stercore caprarum, aut vaccarum sicco, ad pondus omnium, invenitur mirabile ad hydrophisin.

S C H O L I A.

Per angustissimum cribrum hæc omnia electa, secundum veram illorum electionem, in tenuissimum pulverem separatim tundito, & cribrato, deinde cum sufficiente quantitate mellis optimi crudi non autem cocti (quia mel nunquam in emplasticis & ceratis coqui debet propter tenacitatem) sed modice calidi excipiantur: decemto olivano mastiche & myrra, quæ cum
 massa

massa tota frigida fuerit simul permisceantur : & magdaleones ad usum formentur.

Verum in conficiendo hoc aggregato caveat myropola simplicia ista scilicet myrrham , mastichen, & olibanum melle calido inspergere , & conjungere , ne in grumos abeat.

Stercoris caprarum aut vaccarum.]

a Caprarum sylvestrium, juvenum pilulas recenteis, cum herbas pabulantur, tempore veris excipe , & in paropside munda linteolo cooperta ad siccandum soli expone : desiccatae necessitati serventur. Sic humidum & recens stercus vaccinum , cum vaccæ depascuntur herbas , vere (propter mollificationem & resolutionem) accipito & in disco terreo , linteolo cooperto, sub dio exponito , quousque arefactum sit : arefactum ad usum condito.

VIRES A MESVE PROBATÆ.

Ad dolores à frigiditate & ventositate factos , & proprie ad dolores ventris , & stomachi, & renum, & matricû, & vesicæ, & aliorum viscerum maxime confert.

C A P V T

a Caprini & vaccini stercoreis collecto.

C A P V T X V I I.

Emplastrum de mucaginibus authoris incerti quod Fuschius xvj. Sectione de emplastris inseruit, & Prepositus vj. particula secundi libri V suale.

Verus illorum textus.

- a Semen lini ad mucaginem faciendam minime contundi debet, pariter & semen fœnugraci.
- b Alii conficiunt mucaginem ex semine althea loco rad.
- c Cordus tantum ponit ana unc. iij.
- d Oleum de lilio chamamel, & anethinum Mesua descriptionis accipe.
- ℥. Mucag. a feminis lini.
- Mucag. b radicum altheæ.
- Mucag. feminis fœnugraci.
- Mucag. mediani corticis ulmi. ana. c ℥ iij. β.
- d Oleorum liliacei. Chamæmelini.

c Ceram

Anethini. ana. ℥j. β.

Ammoniacy.

Galbani.

Opopanacy.

Sagapeni. ana. ℥. β.

Crocij. ℥ ii.

e Ceræ novæ. ℔. j.
℥ viij.

Terebinthinæ. ℥ ij.

Fiat emplastrum.

S C H O L I A.

VT superiori hujusce Sectionis cap. 5. docuimus portionem radicum, seminum, aquæ, ad infusionem, ut ab his mucagines extrahantur, simili modo quantitas mucaginum huic emplastro præscripta extrahi debet; deinde extractæ una cum oleo liliaceo

ceo, chamæmelino, anethino, & cera frustatim secta & cum oleis liquata ad eorum fere consumptionem incoqui, spatula lignea inter coquendum, ne urantur, celerime agitari debent : quantitate autem consumpta, totumque ab igne semotum, fortiter agitetur, donec omnino intepidetur. Tunc quatuor gummi genera decocto chamæmeli, meliloti aut aceto vel vino per se soluta, coctaque, non ad naturalis humidi, sed ad decocti vel aceti, aut vini peremptionem, & cum quantitate terebinthinæ hic descripta incorporentur. Demum crocum optime pulverisatum absque ulla mistione (quia aliquando solent Pharmacopolæ tyrones amigdalas decorticatas ad colorandum & ad pondus augendum ponere) in medicamine ita parato adjunges, magdaleonesque ad usum effinges. Alii cum magdaleones effingunt, super marmore crocum aspergunt, quod minime approbo.

*VIRES A MEDICIS QVIBVSDAM
notate.*

Maturat apostemata, & mollit durities, partim resolvit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum & sanat Phlegmonas.

C A P V T X V I I I.

Emplastrum de minio, Ioannis de Vigo, quod lib. 5. practicæ compendiosæ, qui intitulatur de additione auxiliorum multorum facientium sub nomine unguenti ponit V suale.

Verus Ioannis de Vigo textus.

a Oleum rosatum factum ex olivis & rosi immaturis Mesuae descriptionis, intellige. Sunt qui loco unc. iij. lib. j. se. assumunt, sed male, ratione dosis mineralium.

b Oleum myrtinum simplex Mesuae descriptionis accipe.

c Sepum castratum ex ove mascula sume.

d Pinguedinem porcinam dixit ad dif-

a ℥. Olei rosati.

b Olei myrtini.

*Vnguenti populei.
ana. ℥. iij.*

*Pinguedinis gallinae.
℥. ij.*

c Sepi castrati.

Sepi vaccini. añ. ℥. vj.

d Pinguedinis porcinæ. ℥. vj.

ferentiam

*ferentiam axungia
que salua est & an-
tiqua quam gallice
(viel oing) dicimus:
& legendum est unc.
x. loco unc. vij.*

*c Lithargyrium u-
trumque prepara-
tum cape.*

*f Cerusam lotam
intellige.*

*g Legendum est te-
rebinthina unc. iij.*

*h Ceram albam
nullam licet addi,
quia cera additur ad
ligationem vel em-
plastr. vel cerati, non
autem ut vis habe-
atur: sed ut exper-
tus sum, satis em-
plastica est hac com-
positio sine cera.*

*e Vtriusque lithargy-
rii. ana. ℥ iij.*

f Cerusæ. ℥ iij.

Minii. ℥ iij.

Bulliant omnia si-
mul baculo agitando
lento igne donec ac-
quirant colorem ni-
grum, quo facto ignē
fortificando, iterum
bulliant per dimidiū
horæ: deinde addatur.

*g Terebinthinæ cla-
ris. ℥ x.*

*b Ceræ albæ quan-
tum sufficit.*

Et iterum bulliando
fiat ceratum molle.

S C H O L I A.

Summa diligentia separatim utrumque lithargyrium, cerula & minium ducantur supra porphyrium quousq; optimam lævigationem, quemadmodum superioribus emplastris docuimus, adepta sint, interdum molula movendo, liquoreque compositioni convenienti asperso, ut facillime in tenuissimum pulverem abeant. Liquor autem aqua rosacea erit. Deinde optime lævigata, una cum oleo rosaceo, myrtino, spatula lignea ad nutritionem in lebetes amplo tractentur & super prunas leves indefinenter spatula agitando coquantur, donec parum concrevant, & in compagem abeant. Mox pinguedinem porci & gallinæ injicies & percoques, eousque dum coctio sit in formam cerati & nigrescere videatur. Tunc sepum castratum, & vaccinum confractum simul ut liquecant impones. Quibus liquatis & ab igne depositis, paulopost terebinthinam permiscebis, hisque omnibus simul mixtis, manibus tractando, & versando magdaleones forbabis. Insuper si ceram in hoc emplastro

plastro placet addere, ea quamvis non sit opus, poteris frustatim incisam addere, postquam mineralia abierint in compagem, aut ad mellis crassitiem.

Minii.]

Diversa apud authores omnes de Minio est opinio. Nos quid sentiant, hic narrabimus. Alii idem cum cinnabari esse volunt. Dioscorides cap. 69. lib. 5. diversum quid à cinnabari esse vult, his verbis: Hallucinantur qui Cinnabarim Minio eandem esse existimant, verum nullas illorum adfert differentias, nisi ratione loci, nec eorum naturam explicat, dicit enim minium *a* in Hispaniis ex quodam lapide argenteæ arenæ permixto temperari solere, alioqui non dignosci: fornacibus vero in florentissimum & flagrantissimum colorem permutari: in metallis strangulantem halitum eructare, ob idque incolas faciem vesicis obvelare, ne eo halitu infestentur: eoque pictores uti ad sumptuosa parietum ornamenta. *b* Cinnabarim vero ex Ægypto deferri, & magno constare, atque hætenus inveniri, ut versicoloribus pictorum lineis satisfaciatur, & hinc quosdam existimasse, sanguinem esse draconis vimque

a Minium secundum Dioscoridem quid, *b* Cinnabaris secundum quosdam quid.

vimque habere eandem cum hæmatite lapillo : hæc Dioscorides. *a* Quid vero sit Cinnabaris, non explicat : unde variæ authorum sententiæ . Plinius lib. 33. cap. 7. & Solinus cap. 38. ajunt esse sanguinem draconis, elisi elephantorum morientium pondere, permixto utriusq; animalis sanguine. Totam historiam lege, apud Plinium cap. 12. lib. 8. qui nimirum in argentariis vult metallis inveniri, diversisque modis alterari. Sed quia Theophrastus, & multi alii viri graves, Cinnabarim cum minio confundunt, de his simul dicemus : & primum de *b* minio factitio, cujus sunt tres species. Prima fiebat ex arena quadam rubea & splendente, in Cilbianis agris prope ephesum, quam emolliabant, & abluabant & cinnabarim conficiebant, cujus rei author fuit Callias Atheniensis, qui coquens arenam illam, & existimans se ex ea aurum posse conficere, minium confecit : & hæc species cinnabaris est, miniumque *c* artificiale antiquorum. Altera species fiebat ex plumbo adusto, & vocabatur minium secundarium, eo quod secundum locum præstantiorem obtineret.

F

ret.

a Cinnabaris secundum Plinium & Solinum quod.
b Minii factitii tria genera. Minii factitii primum genus.
c Minii factitii secundum genus.

ret. *a* Tertia cinnabaris; seu minii species antiquorum erat, quam conficiebant ex illo lapide, qui vocatur anthrax (id est) carbunculus: qui lapis subrubri coloris est, in speciem ferri, & ex hoc lapide, (teste Vitruvio cap.8. lib,7. de architectura) crebræ lacrymæ argenti vivi emanant, quæ à fossoribus statim colliguntur; & dum coquitur maximam copiam argenti vivi emittit: quod argentum ubi extraxerunt lapidem iterum coquunt, & ex eo *b* Cinnabarim conficiunt. Triplex ergo antiquis Cinnabaris artificiosa erat. Una *c* ex arena rubra, alia ex plumbo usto, tertia ex anthrace lapide. Apud nos vero, duplex tantum est. Una, quæ fit ex longa coctione, artificio chimistarum, argenti vivi, & sulphuris: & Cinnabæris vel Cinnabrium apud nos pharmacopæos dicitur. Alterum minium in nostris officinis reperitur quod fit ex cerusa exusta, & nihil aliud est quam vera sandyx antiquorum cujus meminisse *d* videtur Plinius cap.6. lib.35. naturalis historiæ, & si Virgilius egloga 4. herbam esse putaverit hoc versu, Sponte sua sandyx pascentes vestiet agnos

a Minii fossitii tertium genus. *b* Cinnabaris secundum antiquos triplex. *c* Cinnabaris secundum neotericos duplex. *d* Sandyx antiquorum quid.

agnos. Et hæc quidem de Cinnabari arte facta, quæ à Plinio, & Vitruvio minium appellatur. *a* Theophrasto vero, tria sunt naturalis minii genera. Unum fossile, durum, lapideum, ex fodinis argenti effossum quod in usu habetur, & officinis Cinnabaris fossilis dicitur. *b* Secundum sagittis decutiebatur ex altissimis, & inaccessis rupibus, quod nobis ignotum est. Tertium erat *c* cinis coloratus, qui in eisdem fodinis reperiebatur, & de hoc genere Cinnabaris loquuti sunt Græci, Dioscoride excepto. Unde Galenus lib. 9. de Simpl. medicament. facult. cap. 39. Cinnabaris modice acrem facultatem obtinet: habet vero astrictionis quippiam, & est metallicum quiddam, ideoque erodit. Dignoscitur autem cinnabaris vera à factitia & artificiali hoc modo. Accipe laminam ferream, ignitam, & super ipsam pone cinnabarim: deinde cum incanduerit, refrigerare per mitte: si colorem retinuerit, vera est & nativa, si nigrescat, factitia & artificialis. Et (ut verum fatear) minium verum colore, & pondere, cinnabarim factitiam refert, quamquam nonnihil ea lucidius & lividius fit: ut videatur artem

F 2

natūra

a Minii nativi tria genera. Primum genus. *b* Secundum genus. *c* Tertium genus.

natura imitata: estque id minium sapore acerbo & astringente. Quantum vero ad cinnabarium Dioscoridis spectat, Matheolus in Dioscoridem capite de cinnabari, & Fallopius tractatu de metallis seu fossilibus, aliique recentiores, non vulgaris authoritatis viri volunt, sanguinem draconis esse cinnabarium Dioscoridis. Estque gummi colore & substantia sanguini simile, quod non aliunde, quam ex Africa defertur, nec inde copiosum, pictoribus expetitur, ut intento ejus colore, purpureas rubentesque concinnent umbras: quod viribus hæmatitæ lapillo omninò responderet. Nam (ut experientia docet) vi astringendi pollet, & majore quidem, quam hæmatites. Quod si plura requiras, lege Matheolum in Dioscoridem loco supra citato.

VIRE S A M E D I C I S P R O B A T Æ.

Valet ad ulcera mala & antiqua, quod probatum fuit & expertum à Ioanne de Vigo.

C A P V T X I X.

*Emplastrum Apostolicum ex vj. particula
secundi libri Præpositi V suale.*

Textus verus.

a Lithargyrum aureum accipe. Pro unc. Alexandrinus capit drach.

b Ceram rubeam, illam scilicet que tedit in rubedinem, accipe: non autem rubeam factitiam.

c Pro propoli cera citrina duplo pondere bene mellita magis eligenda venit: nam rubea non longe abest à propoli.

d Lapidem calamitarem illum fossilium lapidosum, quæ Albertus Magnus lapidem demonis ap-

a ℥. Lithargyrii.
3. vj.

b Cereæ ruberæ.

Colophonix. ana.
3 ij.

c Propoleos.

Visci quercini. ana
3 j.

Ammoniacy.

d Lapidis calamitaris. ana. 3 vj.

Mastiches.

*pellat, lotumque hoc
loco intellige.*

Olibani. ana ℥. β.

Mumiæ.

Terebinthinæ.

Bdellii.

Galbani.

Mirr hæ.

*e Chalcosēcaume-
nos, est as ustum,
vide infra.*

e Chalcosēcaumenu.

Sarrocollæ.

*f Lepis chalcu est
squamma æris: scili-
cet squamma illa æ-
ris, que à Dioscori-
de helitis, hoc est,
clavaris nominatur:
quam hoc in loco in-
telligi vide infra vi-
delicet in hoc capite.*

f Lepidos chalcu.

Dictamni.

Aristolochiæ rotundæ.

Præssii viridis.

Opopanacis. ana ℥iij.

Confice sic. Gal-
banum, Ammoniacū

& opponax aliquantulum trita, ponantur in vino, ita ut bene cooperiantur per noctem, & mane bulliant, donec liquefiant, & per *g* cassiam colentur, & iterum bulliant usque ad consumptionem *b*. Deinde lithargyrium subtilissime pulverisatum cum sufficienti *i* oleo in caldario diltemperetur, & super ignem ponatur, & cum spatula semper agitando tamdiu bulliat, donec super lapidem positum in modum ceræ, vel melleis inspissetur, & statim addatur cera. Et ea prius apponenda sunt, quæ magis humida, vel viscosa. Liquefacta cera, addatur colophonia, postea mastix & olibanum. deinde po-

g Per cassiam
cribrum intelli-
ge.

h Videlicet
vini.

i Oleum vetus
magis convenit
quam recens pro
scopo empla-
stri.

S E C T I O I.

natur myrrha, & factō intervallo ponatur bdellium, deinde viscus quercinus, & liquefacto visco ponatur terebinthina, & ea liquefacta, ponatur caldarium in terra, & tunc gummi in ipso paulatim ponantur, non cum impetu quia exundarent è stagnato: & iterum super ignem ponantur cum spatula agitando, & aliquantulum bullire dimittantur. Postea addatur sarcocola, & consequenter lapis calaminaris: & factō intervallo flos æris, & lepis chalcu, posthæc chalcofecaumenon semper spatula agitando, donec rubere aliquantulum incipiat: ad ultimum dictamnus, & aristolochia rotunda super infundatur. Signū decoctionis est, quando pars fusa in aqua frigida, moderate fit dura,

ra, & digitis malaxata non adhærescit: demum fundatur in aqua frigida, & aqua extractum manibus exprimendo ita tractetur, ut tota aqua exeat, & unctis manibus oleo laurino, magdalcones formentur, & usui reserventur.

S C O L I A.

Lithargyrium *a* tenuissime levigatum cum sufficiente olei veteris quantitate nutriatur, & coquatur, perpetuo spatula lignea agitando donec ad crassitiem, & consistentiam mellis deveniat, in quod ita coctum, nec ab igne semotum, viscum quercinum injice, parvaque mora interposita florem æris seu viride æs; (alii in fine mixtionis ponunt sed melius initio) paulo post ceram minutissime confractam, ut liquefiat, injice, deinde vas ab igne deponere, mox colophoniam, propolim, aut ejus loco succedaneum commisce, dein ammoniacum, galbanum, & opopanacem

F 5 arte

a Per sufficientem olei quantitatē unc. iij. intellige.

arte soluta, & ad humidi fere consumptionem cocta, simulque cum terebinthina incorporata addantur, optimeque misceantur: desuper chalcofecaumenum, lepis chalcu, & lapis calaminaris super porphyrio seorsim tenuissimeque lævigata inspergantur: statim aristolochiam rotundam pulverisatam, cribratam, & dictamnium immisce: postremo myrrham, olibanum mastichen & bdellium, si siccum sit, exacte pulverisabis: si vero molle, ut gummi genera dissolves, & cæteris admiscebis. Ultimo pulverem mummiæ & sarcocollæ. Ex quibus omnibus simul mixtis & incorporatis magdaleones finges ad usum super marmore oleo laurino inuncto, & manibus eodem oleo perunctis. In hoc vero animadvertendum lithargyrium non debere ad perfectam coctionem decoqui, propter quantitatem pulverum simplicium, qui ingrediuntur: nam si justam & legitimam concoctionem adeptum sit emplastrum, nimis siccum & aridum esset.

Chalcofecaumenos.]

Dictio est græca, latinis & pharmaco-
pæis, æs ustum dicitur. *Æs a* autem ustum
nihil aliud est quam cadaver æris. Nam si
ad

a Æs ustum quid.

ad ignem iterum ponatur, non liquatur amplius, nec alia patitur, quæ æs pati solet, antequam comburatur. Est autem duplex, *a* duplicique fit ratione. Vnum quidem rubicundum, quod Venetiis afferitur, non nobis copiosum, nec frequens in officinis nostris habetur, quod si digitis atteratur tingit ipsos, ac si esset cinnabaris: tale est, quod *b* Præpositus in hoc emplastro conficiendo intelligit. Quod hoc pacto fit. Accipe quantitatem insufficientem æris & in minutas partes divide: quæ ponantur in fictili cocto absque operculo, constituaturque in furno fulorio, undique carbonibus accensis circumdetur, semper ignem continuando, donec æs rubicundum sit, postquam refrixerit, digitisque sit friabile, & contactu, ut cinnabaris, inficiat. Alterum vero officinis frequens nigrum est nihilque ad cinnabaris colorem accedens, *c* fitque secundum Servitorem hac methodo. Accipe limaturæ æris quantum volueris: adde sulphuris, & salis ana ℥ ij. quæ simul permixta ponantur in vase fictili non cocto. adverte tamen vas satis amplum fumendum esse, ut ad dimidium

F 6

dium

a *Æris*usti duo genera. *b* *Æs*ustum verum, modus conficiendi verus non usitatus. *c* *Æs*ustum modus conficiendi ex Servatore usitatus.

dium tantum repleatur, quo libere spiritus spatari possint, diligenterque luto vel argilla obturetur, & circumliniatur, ne spiritus evanescant: sicque vas præparatum fusoriæ fornaci imponatur, & spatio unius diei, vel donec fœtile sit perfecte coctum dimittatur (quod adustionis signum erit) sed, ut sæpissime sum expertus, sine sale & sulphure potest æs uri. Nam si sulphur & sal secundum Servitorem addamus facile ut priori modo uritur, sed magis nigrum redditur. Tandem antequam ad usum appetur, lotionem quadam parari debet, quæ similis sit lotioni squammæ æris, de qua statim dicemus. Cæterum animadvertendum ante ustionem & dum à terra deductum, & separatum est æs, licet remaneat purum, non tamen ita purum & sincerum, quin aliquid adhuc excrementi retineat, sed coctione excrementum illud deperditur. Materiaque est multorum simplicium à natura & arte factorum, qualia sunt ipsum æs ustum, spodia, diversæ cadmiæ & pompholiges, flos æris, squamma æris, ærugo rasilis, seu viride æs, ærugo scoletia, calcitidis genera circiter septem, diaphryges, alumen schiston. Tria genera Plinius facit lib. 24. cap. 2. sic inquit

2. *Æs quorundam simplicium vera materia.*

inquiens. Unum candidum, argenteo ni-
 tori quam *a* proxime accedens, in quo mi-
 stura illa prævaluit: alterum in quo fulva
 natura, tertium in quo æqualis omnium
 temperies fuit. Præter hæc est æs, cujus
 ratio reddi non potest, suo colore pretio-
 sum ad jocinoris colorem vergens, quod
 hepatizon Plinius eodem libro appellat.
 De æro usto & non usto hæc sufficient:
 nunc ad squammam æris accedamus.

[Lepidos chalcu.]

b Latinis squamma, vel battitura æris
 nominatur. Est autem superficialis pars
 & summa æris, combusta. Quæ fit duo-
 bus modis. Uno *c* dum æs ignitum
 malleolorum ictibus decutitur: id enim
 quod ex ære ipso erumpit, & ab incude in
 terram cadit squamma vel battitura æris
 est. Altero, dum æs ignitum extinguitur
 in aqua, qua extinctione fit, ut squamma
 concidat in aquam, & cum resederit in va-
 sis fundo, squamma *d* appellatur. Dioscori-
 des lib. 5. pariter duas æris squammæ facit
 species, de quibus his verbis differit. Proba-
 tissima æris squāma est, quæ in cypriis æris
 excutitur ex clavis cyprio ære confectis,
 crassa,

a *Æris tria genera secundum Plinium.*
ma aru quid. *c* *Squamma æris duplex.*
ma æris secundum Dioscoridem duplex.

b *Squam-*
ma æris duplex.

crassa, & helitis, id est, clavaris, proprie dicta, alia quæ ex vulgari ære candido conficitur, tenuis, infirma, quam nos reprobamus. De his duabus scripsit Galenus lib.9. de Simpl. *a* medicament. facultatibus. Et Paulus ægineta lib.70. & Ætius lib.2. Legitima autem, quam nos hoc in loco intelligere, debemus, illa est, quæ helitis appellatur quæ probatur crassa, rufa, præsertim *b* si aceti respersu æruginem contrahat: quæ sane ante usum, propter mordicationem, & vim erodentem, hoc pacto lavari debet. Superficiales partes æris siccas quantitate sufficiente accipito, easque optime tere, tritas figulinæ paropsidi impone, deinde super prunas leves apponantur, ut aliquantulum torreantur, ærea rudicula movendo ad viscidum attenuandum (nam Galeni sententia metalla omnia habent aliquam visciditatem) torrefactas, ter aut quater in mortario marmoreo, pistillo ligneo tractando, cum aceto acerrimo ablue, abjiciendo, & innovando tamen quacumque vice acetum: dejecto aceto, sicari permitte, & ut siccentur, ista præparatio diebus calidis, seu canicularibus fieri debet, siccatae iterum vino albo odori-

a Squamma aris electio. *b* Squammæ aris lotio
vera.

odorifero bis aut ter, ut prius laventur, & sub dio desiccentur: desiccatae ter, aut quater, rursus aqua rosacea, ut removeatur sapor aceti, & vini colluantur, colutae sole arefiant. Ita arefactae, & ablutae omnem vim erodentem ^a amittunt, sicque in eis pura remanet caliditas. Dioscorides lib. 5. cap. 49. squammam hac methodo abluit, siccae squammæ æris quantitatem quam lubet, in mortario, vel alio vase collocabis, aquam pluvialem nitidam desuper infundendo manu diu agitabis, & confricabis, deinde hanc impositam aquam fæculentam, & sordidam abjicies, aliamque puram affundes, manu ut prius fricando, ut si quæ fæces & sordes ex priori lotionem remanserint, hac secunda depurgentur, & cum aqua abjiciantur. Tunc videbis, an squamma sit omnibus fordibus repurgata, quod si non satis tibi videatur, quo superius modo, lotiones reiterabis peractis lotionibus, manibus squammam æris comprimes, ut ab aqua depuretur, quæ si pura sit, squammam optime lotam esse credito deinde illam vase quodam linteo cooperito, ne aliquæ sordes incidant, ad desiccandum expones & ad usum repones. Plinius inquit squammam abluendam esse ut abluitur

^a Squamma æris lotio ex Dioscorides.

luitur cadmia. Tamen consulo, si quis eam velit abluere, ut abluat secundum primum modum à nobis descriptum qui parum evariat à modo tradito à Galeno, propter rationem quam supra diximus quia per hujusmodi lotionem amittit vim erodentem, & remanet pura caliditas: sed si abluatur ea ratione quam docet Dioscorides, & Plinius, nullo modo vis erodens ab ea auferetur: lavantque eam ut solummodo fordes abjiciantur. *a* Cæterum id notandum erit cum abluatur, sæpissime oriuntur duo genera. Unum, quod vocatur flos squammæ, quæ pars est tenuior squammæ. Alterum vero, quod residet in fundo vasis, sedimentum squammæ dicitur, quæ est pars crassior. Hactenus de squamma æris ea enim sunt quæ ab authoribus accepimus.

[Prassii viridis.]

Quamvis ex authoris sententia in hujus emplastri componendi methodo, pro prassio viridi sumendum videatur viride æs (ut nos pharmacopœi semper interpretari solemus) si quis tamen pro animi arbitrio prassium pro marrubio legere velit, non longe recedet à scopo confectionis: quia ad vulnera maligna & curatu difficilia

a Squamma æris abluta duo genera.

cilia usurpatur, quem admodum & marrubium eandem vim habere dicitur secundum Galenum lib. sec. gen.

V I R E S A D O C T I S S I M I S
notata, & præcipue ab Alexandrino.

Auxiliatur cervicis dolori: & scrophulas læpius usurpatum maturat, rumpit, & cicatrizat, ut indicium cicatricis non appareat. Aliquando etiam diaphoresim faciendo tales collectiones sine eruptione sanat. Apostemata in pectore, seu in pulmone, in stomacho aut in hepate, in diaphragmate, vel sub costis nata, assidue inductum maturat, & rumpit, tumores & durities splenis solvit. Et adhuc plura facit si perquiras Alexand. lib. de composit. medicament secundum locæ cap. 285.

C A P V T X X.

Emplastrum pro stomacho, incerti auctoris, in officinis tamen vsuale quod Præpositus in additione particule vj. lib. 2. inseruit.

Verus Præpositi textus.

a Rosas exunguatas intellige.

a ℥. Rosarum rubearum.
ʒj.

b Ab-

b *Absinthum com-
mune & siccum ac-
cipe.*

c *Mentham nostram
vulgarem siccam ac-
cipe & per manipu-
lum hoc in loco unc.
sem. intellige.*

d *Spicam indicam
sume.*

e *Ladanum purum
& molle intellige,
nam Galenus lib. se-
cundum genera cum
loquutus est de lada-
no, de molli semper
intellexit.*

f *Ceram flavam
cape.*

b *Absinthii.*

c *Menthæ. ana M. j.*

d *Spicæ.*

Cinnamomi.

Ligni aloes. ana ℥. β.

Galangæ.

*Calami aromatici.
ana ℥ ij.*

Cariophyllorum.

Macis. ana ℥ j.

Mastiches. ℥ j. β.

*Styracis Calamites.
℥ ij.*

e *Ladani puri.*

f *Ceræ. ana ℥ vij.*

g *Oleum*

Terebinthinæ. ℥ j.

Pulverifanda pulverifentur, deinde irrorentur cum vino cotoneorū & in mortario conterantur: & fiat cerarum cum

g Oleum de spica nardi,
& myrtillorum Præpositi descript.
& legēdum est. ana
unc. j.

g Olei de spica nardi.

Olei myrtillorum. ana. ℥ iij.

In mortario calido cum pistillo calido.

S C H O L I A.

L Adanum purum in minutissimas partes divisum cum oleis de spica nardi & myrtillorum igne maxime lento liquabis, postea ceram in partes contractam injicies: qua liquata ab igne removebis, tum terebinthinam infundes, & deinde styracem mollefactum conjunges. Sic autem styracem mollem reddes: in mortario modice calido,

a. Stryacis mollitio.

do, pistillo pariter calido styracem tractabis, vino aut succo cotoneorum modice paulatim asperso donec mollescat. Quibus ita paratis pulveres simplicium præscriptorum simul, vel per se pulverilatorum ex artis præscripto projicies. Demû totam massam in mortario modice calido & pistillo calido diligenter tractabis, ita ut nullum ab altero lecerni possit. Sicque emplastrum arte quam maxime elaboratum habebis. Notandum tamen simplicia dum teruntur, vino, & cotoneorum succo madefacienda, & aspergenda esse ne subtilior pars tenues vanescat in auras. Quod si, istud emplastrum in forma solida conficere velimus ℥ ij. ceræ addendæ erunt, aut dosis oleorum minuenda, & olei de spica nardi & myrtillorum ana ℥ j. affundenda. Si vero in forma cerati liquidi, vel unguenti, authoris descriptio erit imitanda. Sed ut verum fateamur in nostris officinis in emplastrum formam conficimus, & habetur paratum.

VIRES A MEDICIS DESIGNATAE.

Efficax ad temperiem ventriculi frigidam & humidam, aëre præsertim frigido quod

quod vitium sæpissime apud quasdam re-
giones & cœli & intemperantis ingluviei
ratione late serpit.

C A P V T X X I.

*Emplastrum de meliloto Mesuæ ex distin-
ctiōe xj. de unguentis & emplastris
Vsuale.*

Mesuæ vera descriptio.

*a Mellioti summitates
intellige.*

a ℥. Melioti. ℥ vj.

Florū chamæmeli.

Seminis fœnugræ-
ci.

*b Grana lauri excor-
ticata sume.*

b Granorum lauri.

Radicum altheæ.

*c Absinthium vulga-
re accipe, vel illud de-
scriptum à Mesuæ.*

*c Absinthii. ana
℥ iij.*

d Per

Seminis apii.

d Per cordumenum
semen carvi accipe.
Fuschius, Cordus, &
Sylvius loco cordume-
ni, cardamomum ha-
bent.

d Cordumeni.

Ireos.

Cyperi.

e Ammeos.

Spicæ nardi.

f Per cassiam ligneam
nostrum vulgare cin-
namomum intellige :
legendumque est ana
drachm. ij. sec. loco
drach. j. sem.

f Cass. lignæ. ana
ʒj. β.

g Sampfuchi. ʒ iij.

g Per sampfuchum
majoranam intelligit
author.

Ammoniacy. ʒ x.

Styracis calamitæ.

Bdellii. ana ʒ v.

Terebinthinæ.

ʒj. β.

h Ceram

Ficum pinguium.
num. xij.

h Ceram flavam acci-
cipe, alias unc. vj.

i Oleum de Sampsu-
cho & de spica nardi
Mesuae descript. intelli-
ge & per quantum suf-
ficit accipe ana unc.
sem. alii ana unc. j. po-
nunt.

k Aquæ decoctionis fœ-
nugraci chamameli &
meliloti videlicet unc.
xij. secundum autho-
ris intentionem, cum
dicit quantum sufficit.
In aliis descriptionibus
non legitur aquæ deco-
ctionis fœnug. chame-
meli & meliloti quod
sufficit ad infundendū,
sed in oleis infundi &
macerari materialia
volunt: non est tamen
id meo iudicio præter
rem.

Sepi Caprini.

Resinæ. ana $\frac{z}{ij}$. β .

b Ceræ. $\frac{z}{v}$.

i Olei samsuchini.

Olei de Spica quan-
tum sufficit.

k Aquæ decoctio-
nis fœnugraci.

Chamæmeli.

Meliloti quantum
sufficit.

Ad infundendū
infusione diligenti:
misceantur & con-
ficiantur.

SCHO-

S C H O L I A.

Imprimis necessarium (ut singula quam optime in hoc emplastro præparentur) quædam simplicia, emplastrum ingredientia, triturare & contundere, unumquodque suo ordine convenit. Nam minutim cyperus secandus & obiter contundendus, deinde radices althææ mediocriter siccæ ac incisæ, fœnugræcum, iris & cassia lignea leviter, quater, aut quinquies pistillo tundenda, tum spica nardi in tenuissimas partes incisa addenda, deinde baccæ lauri & semina omnia, folia & flores, ut absinthium, sampuchum, melilotum, chamæmelum : paulopost styrax. alii radices althææ & fœnugræcum separatim cum decoctione ^a sufficienti fœnugr. chamæmeli, & melliloti infundunt ut ex eis mucaginem habeant deinde mucaginibus extractis cum ficibus tuis conjungunt : pariter styracem cum pauca decoctione prædicta molliunt & postquam gummi gene-
ra

^a Per sufficientem decoctionem duplum aut triplum sic intelligendum est : si sint v. drachma mollis bdellii. & drachi x. ammoniaci. iiij. aut vj. decoctionis prædicta, aut acetij uncia sunt necessaria.

ra soluta sint, cum cera & sepo conjuncta & incorporata compositioni addunt) quæ omnia simplicia acurate trita & per cribrum transmissa servabis, donec cætera sint præparata. Deinde ammoniacum & bdellium (si molle sit) separatim infundes in quantitate sufficienti decoctionis prædictæ (si vero siccum sit bdellium) in pulverem redigendum. erit suoque ordine, nempe post styracem imponendum. Alii in aceto fortissimo ad duplum vel triplum, ut commode solvantur, imbuunt, & ad humidi consumptionem lento igne coquant. Alii ammoniacum cum prædictis simplicibus in pulverem redigunt, quod facillime potest pulverisari, ut experientia nos docuit, verum præstat dissolutio quam triturationis. Quibus solutis & coctis terebinthina admisceatur, tum hæc gummi separatim, ut pulvis prædictus, servantur. Postea ficus minutim incisæ in mortario lapideo cum pistillo ligneo terantur paulatim adjecta pauca decoctione fœnugr. chamæmeli & meliloti intertundendum, deinde super cribrum inversum & angustum cochleari averso transcolentur ad partemque, ut supradicta, servantur, donec simplicium omnium præparatorum commixtionem facias. Alii ficus in substantia

cum prædictis simplicibus tundunt quod re vera alienum est à vera methodo. His itaque sic paratis massam emplastri in hunc modum conficies.

Ceram frustatim igne lento, baculo movendo liquabis: qua liquata sepum caprium pariter divisum injicies, paulopost resinam pulverifatam, quibus eliquatis, ab igneque semotis & parum refrigeratis gummi prius præparatorum una cum styrace & pulpa ficuum conjunges, movendo ut prius baculo: ad ultimum vero pulveres jam paratos addes: demum cum omnia optime commixta & incorporata fuerint, totam massam pones in mortario cum pistillo modice calido, spatio duarum horarum contundes ut conveniens omnium fiat mixtio, vel ut facilius permisceantur, addendo oleum nardinum & sampsuchinum. Deinde magdaleones formabis.

Cavendum tamen in hoc parando ne plus olei quam par sit ponatur alioqui tenerum ac molle esset emplastrum. Præterea si quis in hoc mucagines ex femine fœnugræci, radicibus althææ, pro eorum substantia usurpare velit, diligenter advertat ne coctæ & transcolatæ pondus excedât simplicium ex quibus fiunt quod itidem in ficibus observandum si ex eis mucagines

Magines conficia, quod sane ut diximus est præter artem manuariam: rursus dosis aquæ decoctionis chamæmeli & melliloti, à nobis in margine descriptionis hujusce emplastri scripta, sufficere videtur ad macerandæa quæ macerari debent, sive ad dissolutionem gummi, sive ad mucagines extrahendas: si vero velit pharmacopœus tantum dissolutionem gummi, minuenda erit dosis decoctionis prædictæ, sufficientiq; ana ʒ x. Quare diligenter perpendat antequam hoc emplastrum aggrediatur utrum malit substantiam totam quorundam simplicium, vel mucaginosum liquorem.

VIRES A MESVE DESCRIPTÆ.

Mollificat emplastrum de meliloto omnem duritiem, quæ est in stomacho, & hepate, & splene & cæteris visceribus.

C A P V T XXII.

*Emplastrum pro matrice authoris incerti ,
quod à Præposito in fine vj. particulæ ad-
ditionis lib. 2. describitur V suale.*

Præpositi, veri textus, quarta pars.

℥. Radicis bistortæ.
℥ iij. .

Ligni aloes.

Santali moschatelini.

*a In aliis codi-
cibus nux mo-
schata omitti-
tur.*

a Nucis moschatae.

Berberis.

Antheræ. ana ℥ ij.

Cinnamomi.

Cariophyllorum.

Schœnanthi.

Florum Chamæmeli,
ana ℥ j.

b *Thu musculū seu
olibanum intellige.*

b Thuris.

c *Aliptam & d
Galliam moschatam
intelligit Prepositus
illas confectiōnes quas
in suo libro descri-
psit, & quas etiam
trochiscos de alipta
& de gallia moscha-
ta appellat.*

Mastiches.

c *Aliptæ moschatæ.*

d *Galliæ moschatæ.*

Styracis calamitæ.

e *Styracis rubei in
aliis legitur ana
drach. vj.*

e Styracis rubei. ana
gra. xv.

f *In alio legitur
scrū, jī. gran. v.*

Moschi. f gra. vij. β.

Ceræ Citrinæ.

℥ iiij. β.

g *Ladantum molle
ut monet Galenus
accipe.*

Terebinthinæ. ℥ j. β.

g *Ladani puri. ℥ .j.*

h *Picem illam quam
hac Sect. 1. cap. 10.
monuimus accipere,
intellige.*

b *Picis navalis. ℥ ix.*

Fiat Emplastrum.

G 3 S C H O -

S C H O L I A.

Cera confraeta, & ladanum divi-
 sum, cum unciis duabus olei con-
 venientis compositioni (oleum
 vero nullum capit hæc descriptio,
 quale autem debeat sumi, dubitari pos-
 set; nam si agatur de suffocatione matri-
 cis, oleum gagatis aut ruthæ sumi potest,
 sin quæstio est de frigiditate & humiditate
 matricis corrigenda, nardinum magistrale,
 aut chamæmelinum sufficere potest) igne
 lento, spatula lignea agitando liquentur:
 liquatis, nec ab igne depositis, picem a na-
 valem colatam, ut lique scat impone, mox
 cum ab igne deposueris, terebinthinam,
 & styracem calamitam cum oleo dicto so-
 lutam: cum vero hæc omnia optime li-
 quata & commixta fuerint, & aliquid ca-
 loris deposuerint, reliquorum simplicium
 pulveres arte præparatos in hæc insperges,
 simulque commiscebis, ut radicem bistor-
 tæ, fantalum, lignum aloes, schœnanthum,
 chamæmelum, antheram, berberim, cario-
 phylla, cinnamomum, nucem, galliam &
 aliptam moschatam, styracem rubeam,
 statim pulverem tenuissimum mastiches,
 & oli-

a. Picem colatam, videlicet à sordibus desecratam.

& olibani, celerrime movendo, addes : paulopost moschum, liquore minime unctuosissimo dissolutum, conjunges : cumque omnia fuerint optime commixta & subacta, totam massam in amplū mortarium metallicum, modice calidum, mitte, & probe pistillo ferreo mediocriter calido tundito, ac tractato, donec perfecte in unum coeant : demum magdaleones ad usum fingito.

Notandum tamen erit, multos pharmacopolas esse, qui alia utantur methodo, quam & si adhuc nō observaverimus, eam tamen non improbamus : hæc autem talis est. Ceram igne lento liquant, deinde picem navalem percolatam addunt, postea ab igne deponunt, & terebinthinam infundunt, statim pulveres simplicium ordine commiscent : deinde cum omnino hæc refrixerint, pulverem thuris & mastiches projiciunt, spatula semper ducendo, unamque massam conficiunt, quam servant, donec ladanum sit liquefactum, ut facilius tota massa prædicta cum ladano misceatur. Sic autem ladanum molle & liquidum reddunt. Ladanum frustatim incidunt, & in mortarium satis calidum projiciunt, ac pistillo satis calido cotundunt, & parum olei convenientis composi-

sitioni affundunt, deinde magdaleones ad
 ūm conformant.

Cæterum (verum si fateri licet) vix hæc
 omnia possunt commisceri, nisi aliquid
 olei compositioni convenientis addatur,
 ut multoties sumus experti quare quanti-
 tatem à nobis descriptam retinendam esse
 existimamus.

*V I R E S A M E D I C I S P R O -
 b a t t e .*

Uteri imbecillitatem firmat, prociden-
 tiam reprimi, muliebribusque viciis ex
 nimia humorum copia optime succurrit,
 & locorum immoderatos motus sistit.





D E

V N G V E N T I S

S E C T I O II.

H A C T E N V S Ceratorum, & Emplastrorum in officinis nostris passim prostantium, simulque illorum materiam ceu subiectum, necnon componendi methodum, qua potuimus diligentia, & sedulitate pertractavimus. Reliquum est ut de unguentis breviter percurramus: quorum subiectum non aliud est quam ceratorum & emplastrorum ut antea his verbis explicuimus. Neque enim inter se tam eorum ratione differunt, quæ ipsa ingrediuntur, quam consistentia:

G s

nam

nam quæ ingrediuntur cerata, etiam in emplastris & unguentis admittuntur. His itaque sic definitis & constitutis ad unguentorum conficiendorum methodum accedentes, ab unguenti primum definitione exordiemur. Est autem *a* unguentum, mollis quædam confectio, ex stirpium partibus, metallicis, mineralibus, terra, & animalium partibus, mediæ inter cerata & linimenta consistentiæ, quæ omnia præparantur & miscentur ad unguentum conficiendum, eadem methodo, quæ prius à nobis descripta est in ceratis & emplastris. Fit autem *b* unguentum duplici modo, videlicet cum igne, & sine igne, cum igne, ut omnia unguenta, & consimilia quæ multa simplicia, ut ceram lithargyrium, axungiam recipiunt: sine igne, sola nutritione & subtractione, ut nutritum seu tripharmacum. Differtque *c* unguentum à linimento, quia in unguento

CON-

a Unguentum quid. *b* Unguentum duplex. *c* Unguentum & linimenti differentia.

conficiendo ponitur olei uncia una, pulverum ℥j. ad summum ℥j. ꝑ. ceræ ℥ij. vel ℥iij. Tamen hodie componentis arbitrio relinquitur dosis ceræ, & à medicis sic (ceræ quantum sufficit) scribitur: dum modo fervetur consistentia corporis crassioris in unguento, liquidioris in linimento. Linimentum enim est mollius unguento & componitur ex his, quæ unguenti compositionem ingrediuntur cum minori cera, vel incrassantium portione, vel absque speciebus. Proportio linimenti est, ut pro olei uncia una, ponatur ceræ ℥j. Alii sextam partem unciae ponunt: & cum aliquid siccum miscetur, de cera non nihil detrahitur, sed sæpissime conficitur cum cera & oleo, sine pulverum commixtura. Demum, ut nunc, quæ antea diximus, dilucidius intelligantur, singulatim unguenta à nobis Pharmacopœis usitata, & cognita, explicanda suscipiemus.

G . 6

C V P V E

C A P V T I.

*Unguentum album auctore Rhasi cap. 130.
lib. 1. divisionum.*

Rhasis verus textus.

- | | |
|--|--|
| a <i>Cerufam lotam intel-
lige.</i> | a \mathcal{Z} . <i>Cerufæ albæ.</i> |
| b <i>Oleum rosatum im-
maturum accipe.</i> | b <i>Olei rosati.</i> |
| c <i>Ceram ponticam na-
turaliter albam author
intelligit, que sine acri-
monia est.</i> | c <i>Ceræ albæ.</i>

Fiat unguentum. |

S C H O L I A.

Rhasis eo in loco nullum pondus simplicium prædictorum scribit, nec tamen vult aliud unguentum, quam aliis usitatum, describere, sed pondera libera artificibus reliquit qui artem norunt. Quantitas autem simplicium à Præposito vera definitur, in additione lib. 2. particula xx. ex illius præscriptio in officinis nostris paratur, usuique est.

est apud omnes. Talis autem *a* est ejus descriptio quarta parte. ℥. olei rosati ℥ ix. cerusæ albæ ℥ iij. ceræ albæ ℥ ij. Con-
fice sic. Manu fricetur super cribro tenuis-
simo cerusa, ut transmittatur: transmissa
in mortario metallico spatio aliquot ho-
rarum friando lævigetur, ut magis reduca-
tur in pollinem. Deinde superinfunde ce-
ram liquatam in balneo Mariæ cum oleo
rosaceo: Tum ducantur hæc atque agi-
tentur (dum calent) celerrime, pistillo fer-
reo, quousque omnia sint probe com-
mixta. Et hoc modo unguentum erit pa-
ratum: quod ad usus necessarios recon-
des.

Alii alio methodo utuntur, nam ultra
descriptionem prædictam, ovorum albu-
mina, alii lithargyrium, alii mucaginem
tragacanthi, alii camphoram secundum
morbum addunt.

Cerusæ.]

Plurimi cerusam definiunt esse ærugi-
nem aut cinerem plumbi. *b* Tamen, ut
inquit Dioscorides lib. 5. cap 63. Cerusa
nihil aliud est, quam plumbum nigrum
acerrimi aceti halitu liquatum & increassa-
tum & post in mola tritum, de quoque
cri-

a Vera descriptio ipsius unguenti ponderibus restituitur.

b Cerusa secundum Dioscoridem quid.

cribratum & in tenuissimum pulverem resolutum. Modum autem conficiendi lege apud eundem Dioscorid. lib. & capit. citato. De lotione, electione, & repositione satis aperte in prima Sectione hujus libri capite 12. diximus. De viribus & facultatibus, cōsule Serapionem lib. aggreg. cap. affidhegi & Avicennam lib. 2. capite de cerusa. Plinium quoque lib. 34. cap. 18. & lib. 35. cap 6.

VIRE S A M E D I C I S N O T A T Æ.

Adversus ulcera, scabiem & adustionem pollet.

C A P V T II.

Unguentum Tripbarmacum seu nutritum ex xj. distinctione Mesuæ de unguentis & emplastris V suale.

Vera Mesuæ descriptio.

a Lithargyrium aureum lotum accipe : alii non lotum accipiunt.

a ℥. Lithargyrii triti sicut alcohol. P. j.

b Olei.

b Olei rosati non completi, partesque duas intellige.

& funde super ipsum, nunc

c Aceti rosati partem semissem cape. Alii partem unam vel duas hoc fit secundum defensionem inflammationis.

b Oleum.

nunc

Nonnulli secundum Galeni mentem vinum loco aceti super affundunt, quibus intentio est digerendi cum aliqua astrictione: alii aquam vel solatri vel rosarum aut fontis loco aceti aut vini affundunt quibus est scopus simpliciter refrigerare sine ulla penetratione.

c Acetum.

Et terantur & adæquentur & proprie quantum sufficit.

S C H O L I A.

Melus neque olei neque aceti quantitatem definit cum his verbis utitur funde desuper nunc oleum, nunc acetum &c. Existimo Mesuem quantitatem olei & aceti reliquisse arbitrio artificis, pro ratione usus unguenti; nam quia hoc unguentum sæpissime

pissime usurpatur ad defensionem inflammationum quæ aliquando leves, aliquando vehementiores sunt: tamen hoc non impedit, quo minus illud unguentum in nostris officinis præparatum habeamus. Cujus descriptio talis est, ponderibus definita. ζ . Lithargyrii aurei coloris tritæ & loti ^a (secundum scopum) P. j. olei rosati immaturi P. ij. aceti rosati P. β Confice sic. Lithargyrium tritum & lotum in mortarium plumbeum conjice, illudque cum quadam parte olei pistillo plumbeo agita & tracta, quousque lithargyrium justam crassitiem consequutum sis: tunc paulatim aceti portionem aliquam infunde, & ut prius tracta, donec acetum sit cum lithargyro & oleo commixtum: de novo residuum aceti & olei affunde subagitando, videlicet nunc acetum, nunc oleum, donec totum acetum & oleum lithargyrium imbiberit, & unguenti formam adeptum fuerit. Deinde fictili pixide ad usum serva.

Caveat tamen, Pharmacopola, illud cum volet præparare, initio multum olei & aceti super lithargyrium affundere, ne submergatur: nam cum submergitur nunquam

^a Per Part. j. lib. j. vel unc. j. vel drach. j. vel scrup. j. intellige, vel aliud quodlibet pondus.

quam consistentiam unguenti *a* adipiscitur, nec incorporati potest. Et ideo nutritum vocatur ex conficiendi methodo (quia est lithargyrii quædam nutritio) sitque sollicitus hoc unguentum subagitare spatio unius diei si quam optimum & probe ligatum velit habere.

Lithargyrii auri.]

Lithargyrium, & auri vel argenti spuma, idem sunt. Satis copiose diximus de illius lotionem in Sectione prima capit. 2. Nunc de materia, variis generibus & extinctione (si in aliquo loco extinctio desideratur) dicendum venit. Lithargyrium non effoditur, nec reperitur naturale, sed paratur ex multiplici materia opportuna, quæ non unica ab authoribus proponitur. Videlicet, unam esse ajunt arenam plumbarem, aliam argentum, aliam plumbum, alteram aurum, alii unicam esse materiam, quod est plumbum, alii galenam esse materiam lithargyrii, tamen pro diversitate materiæ diversa acquirunt nomina. Sed antequam ultra progrediamur illud definiamus. *b* Est autem lithargyrium, secundum quosdam spuma argenti continens adhuc aliquid argenti, vel plumbum exustum

a Unguenti denominatio. *b* De Lithargyrio variae opiniones.

ustum cum auro vel argento, cuius est usus nobis frequens in unguentis & emplastris. *a* Sed ut verum fateamur. Materia lithargyrii est plumbum exustum cum argento, vel cum auro in catinis, in quibus concrevit & colliquatum est argentum vel aurum, non autem ex argento vel *b* ex auro, tanquam materia, sed colorem argenti vel auri referens. Tres species facit Dioscorides lib. 5. cap. 62. Plinius pariter lib. 33. cap. 6. Una, quam molybditim vocamus, altera argyritis, & chrysitis: Tertia plumbago ceu molybditi dicitur. Fit autem prima species, quam molybditim appellamus ex arena in fornacibus *c* confiata, cum perfecte igni incanduerit. Argyritis ex argento fit. *d* Chrysitis ex auro, non quod sit ex argento, vel ex auro, sed quia argenti vel auri colorem refert. *e* Plumbago ceu molybdena fit ex laminis plumbeis, hodie apud nos Pharmacopæos usitata. Præstantissima omnium est Chrysitis, quæ fulvo colore splendet. Quod si plura requiris, lege Georgium Agricolum lib. 9. de natura fossilium. Si quis

a Lithargyrii vera materia. *b* Lithargyrii secundum Diosc. & Plinium tres species. *c* Molybditis quid. *d* Argyritu & Chrysitis quid. *e* Plumbago ceu molybdena quid.

quis vero lithargyrio extincto egeat, sic extinguat. *a* Accipe lithargyrium, & frange minutim ad quantitatem nucis, & in crucibolo fusorioque furno ut ignetur, & in modum prunæ ardentis rubeat, expone. Deinde extrahe, illudque in aceto, aut vino fortissimo, aut liquore morbo convenienti extingue: hocque ter aut quater iterabis innovando acetum aut vinum, aut liquorem convenientissimum, sicque lithargyrium extinctum ad usum habebis, si requiratur.

*VIRES A MESVE ET A QVIBVS-
dam Neotericis descriptæ.*

Facit nasci carnem in ulceribus & consolidat eam. Ad Phlegmonas & erysipelata potissimum admoventur, habetque vim reprimendi & desiccandi.

a Lithargyri extinctio.

C A P V T III.

*Vnguentum aureum Mesuæ ex xj. distinct.
de unguentis & emplastris V suale.*

Mesuæ vera descriptio.

℥. Ceræ citrinæ. ʒvj.

*a Oleum oli-
varum, vetus
& maturum
accipe, in alio
lib. ij. se. ha-
betur, sed pro-
lus lib. ij.*

a Olei boni. ʒij.

Terebinthinæ. ʒij.

Resinæ.

Colophonix. ana ʒj. β.

Olibani.

Mastiches. ana ʒj.

Croci. ʒj.

SCHO-

S C H O L I A.

IN vase ceram frustatim divisam, una cum quadam olei portione igni levi ad liquandum expones: qua liquata, resinam, & colophoniam confractã injicies ut simul fundantur. Tum ab igne sepone, & statim terebinthinam infunde: quibus quam optime refrigeratis, olibanum & mastichem per se pulverisata immisce, spatula lignea ducendo. Postremo crocum cum reliqua portione conjunctum, vel si mavis dissolutum conjunges. His omnibus commixtis usui reserva: animadvertendum tamen, plures Pharmacopœos illud conficere absque olibano, mastiche & croco ob nimios sumptus. De simplicibus nihil dicemus cum in Sect. prima abunde ea tractaverimus.

VIRES A MESVE PROBATÆ.

Curat, & solidat plagas & est sanum & expertum. †

C A P V T IV.

Unguentum basilicon minus Mesuæ ex distinctione xj. de unguentis & emplastris Usuale.

Verus textus Mesuæ.

℞. Resinæ.

a Picem nigram intellige.

a Picis.

b Ceram citrinam accipe.

b Ceræ.

ana.

c Oleum olivarum vetus & maturum cape.

c Olei quantum sufficit.

S C H O L I A.

Pondera simplicium omisit Mesues, pariter Fuchsius & Præpositus, quam quidem descriptionem ex Mesue desumpserunt. Tandem ut experientia docuimus, ponderum certus numerus à nobis restitutus fuit, ut ex sequentibus descriptionibus videre

dere licebit. ℥. resinæ, picis nigræ, ceræ
citrinæ ana ℥ ij. β olei veteris olivarum
maturi ℥. j. β. si durior ℥. j.

Alii recipiunt resinæ picis ana ℥ ij. ce-
ræ citrinæ ℥ iiij. olei veteris olivarum
maturi ℥. j. β. vel ij. Utraque dosis
optima. Confice sic. Maturum & vetus
oleum in lebete amplo simul cum cera in
frusta divisa igne lento, spatula lignea
ducendo liquefac: qua liquata resinam &
picem percolatam contractamq; impone,
ut liquefiant, quibus liquatis & refrigera-
tis reconde.

VIRES A MESVE SCRIPTÆ.

Conveniens est in principio ulcerum
nervosorum, & est virtute sua mino-
ris calefactionis, abstersionis & conso-
lidationis quam magnum, immediate di-
ctum.

C A P V T V.

Unguentum Ægyptiacum magnum seu de melle, xj. distinctione de unguentis & emplastris Mesuæ Vsuale.

Mesuæ verus textus.

a *Flos æris à nobis satis in prima Sectione cap. 9. explicatus fuit, sed quia caremus dicto flore, viride æs sumendum erit.*

b *Per aureum intellige drach. j. sem. hoc in loco atque etiam apud omnes arabes. Tamen exacte inquirere oportet quantum aurei pondus, drachma pondus exuperet, & videtur tantum exuperare scrup. se.*

a ℥. Floris æris
b Aur. v.

Mellis Aur. xiiij.

Aceti fortis Aur.
viij.

Coque super ignē donec inspissetur: & sunt qui addūt ei.

Olibani masculi triti. Aur. ij. ℥.

SCHO-

S C H O L I A.

IGne lento mel cum aceto & flore æris aut viridi ære pulverisato (quod inter pulverisandum paucò aceto aspergi debet, ne feriat nares) ad aceti consumptionem coquatur. His omnibus coctis & omnino refrigeratis, olibanum probe pulverisatum immisce, semper spatula lignea agitando, ut melius commisceatur : Vas autem in quo mel & flos æris vel viride æs, & acetum coquuntur fictile esse debet, ne augeatur in alio vase acrimonia floris æris vel viridis æris & aceti : reponaturque in fictili optime obtuso. Mesues unguentum Ægyptiacum magnum vocavit, non ad differentiam parvi, sed dixit magnum propter magnas vires, quas possidet.

VIRES A MESVE PROBATE.

Confert ad vulnera antiqua, & fistulas, quæ indigent mundificatione.

*Vnguentum populeon Myrepsi ex Sectione 3.
de vnguentis, cap. vel. num. 45. Vsuale.*

Vera Myrepsi descriptio.

℥. Oculorum in sū-
mo arboris populi
quando floret ap-
parentium. ℥. j. β.

Foliorum papaveris
nigri.

a Folia rubia tene-
riora, coliculos, quos
à prima germina-
tione, & in summa
sui parte profert, in-
zellige.

b Pro vermiculari,
sempervivum mi-
nus cum albis flori-
bus, linguam non
mordicans, sume.

Foliorú mandragoræ.

a Foliorum rubiæ.

Foliorum hyosciam.

Foliorum solani.

b Vermicularis.

Lactucæ foliorum.

c *Per sempervivum, intellige secundum majus, Myrsus eodem cap. vel. numero.*

c Sempervivi.

Foliorum violæ.

Cymbali foliorum nominati Cortali, nascentis in figulinis & muris.

d *Alii legunt Sing. unc. j. se. alii Sing. unc. ij. quod melius præcipue si addantur axungie lib. ij. uti plerumque fieri solet: tandem videtur dosis ista foliorum & germinum que fit per unc. præter morem præscripta esse.*

d Singulorum. ℥. β.

Adipis suilli recentis expertis salis.

Paratur autem in hunc modum. Accipiuntur herbæ, & cum adipe in mortario tunduntur, fiuntque veluti fermentum, & sinuntur sub ea forma diebus octo. Deinde gladiolo inciduntur in tenues partes, inque lebetem conjiciuntur

& lento igne bulliant
cum

*e Videtur ista ad-
ditio vini esse præ-
ter scopum unguen-
ti: quod ad refri-
gerationem tantum
adhibetur. Itaque
mallem cum aceto
coquere.*

e Vini boni. ℥. j.

Donec totum assump-
tum fuerit. Postea per
linteum tenue colan-
tur, & reponuntur in
vasculo.

S C C O L I A.

Undantur per se oculi populi &
folia violarum incisa in morta-
rio lapideo cum pistillo ligneo,
& una cum axungia præparata
posita intra vas fictile coopertum, loco
modice calido recondantur (sicuti reconduntur
conservæ oleorum) donec cætera
sint collecta ac præparata, hoc est, duos aut
tres menses, vel eousque dum cæteræ her-
bæ sint in vigore: oculi *a* enim populi,
& violarum folia primo statim ver:,
nempe mense Martio erumpunt. Alia au-
tem Mayo vel Junio mense vigent. Has
ubi

a Oculorum populi, vera collectio.

ubi per temporis occasionem collegeris, incisas per se in mortario prius dicto cum pistillo optime contunde, & cum prædicta fermentatione seu commixtione oculorum populi commisce, desuper affundédo aceti optimi lib.j. & iterum loco tepido spatio octo dierum reconde, quibus elapsis totum in cineribus calidis aut vase duplici coquatur, donec omnis humiditas evanuerit. Signum autem coctionis tale erit. Accipias aliquid de decocto cum spatula lignea, vel baculo, & injiciatur in carbonés accensos, si strepitum nullum emittit coctum erit, si vero emittit non fatis erit. Tunc ab igne sepone & calidè lintecolo tenui & forti probe exprimendo percola, & in frigidari finito, deinde in vase optime obturato in usum serva.

Notandum Myrepsum tantum octo dierum spatio in infusione unguentum istud detinere: re vera id fieri minime potest ob diversitatem temporis, quo herbæ colliguntur. nam aliæ veris initio, aliæ æstate proveniunt. Præterea plurimi sunt qui folia bardanæ huic unguento addunt, Myrepsus vero omisit: idcirco censerem addendam esse bardanam ad quantitatem prædictorum germinum.

Adipis suilli.]

In hac Myrepsi compositione, deest pondus adipis, forsan bibliopolæ negligentia. Quare censerem, ut sæpissime expertus sum, pro quantitate herbarū lib. 'ij. adipis in hoc addēdas esse: quamvis Fuchsius dicat ℥. j. sufficere. De adipis autem collectione præparatione, & repositione, supra Sect. prima c. 2. fatis diximus.

V I R E S A M Y R E P S O D E S I -
gnata.

Somnum conciliat, febrientibus ac dolentibus caput propter calorem, inunctum temporibus prodest. Febricitantibus palmæ manuum, ac plantæ pedum, & pulsus inunguntur. Irrigandum autem cum oleo rosaceo aut violaceo.

C A P V T VII.

*Vnguentum de Althea Myrepsi ex Sect. 3.
de unguentis, num. 49. V suale.*

Verus Myrepsi textus.

a Per Maluam syl-
vestrem, altheam
intellige.

a ℥. Radicis maluæ
Sylvestris. ℥. j.

b Scyllæ

Seminis lini.

Fœnugræci. Singul.

℥. β.

b Scyllæ. ℥ iij.

b Scyllæ magnæ, neque enormis laminas accipe, prius cultello eburneo, vel aliquo ligneo, incisas.

c Aquam fontanam accipe.

Radices bene contusæ conjiciantur in

c Aquæ. lib. iij. ℥.

Deinde dies tres in ea maceratæ ebulliant, donec succi crassitudinem acquirant, & per linteum tenue colentur. Post accipitur succi hujus ℥. j. & injiciantur ei.

d Olei. ℥. ij.

d Oleum vetus insulsus accipe: nota tamen Præpositum lib. j. se. olei tantum capere.

& rursus bulliant donec succus absumptus fuerit. Deinde adjiciantur.

H 4

e Ceram

c Ceram citrinam e Ceræ. ꝑb. β.
acepe.

Terebinthinæ.

Galbani.

Gummi hederæ aut
ejus

f Fuchsius. Sing. ꝑ succi. Singul. ꝑ j.
drach. j. caput.

Postremum impona-
tur

g Colophonia &
resina ana unc. iij.
hoc in loco intellige.

g Colophonia bene
trita &

Resina alba pura.

Concussa agitataq;
probe, ut in lebete eli-
quentur, ab igne re-
moveto, & justo tem-
pore, ut refrigerentur,
conquassato & vase
recondito.

SCHO-

S C H O L I A.

R Adices maluæ sylvestris. & scyllæ
 laminæ frusta, per se divisæ : se-
 men itidem lini, & fœnugræc.
 separatim singula in vasis ficti-
 libus diversis, coopertis cum lib. v. β.
 aut v). ad summum aquæ maxime calidæ
 (pro æquali portione radicū & seminum).
 spatio trium dierum macerentur (quan-
 quam alii trium, aut sex horarum tantum
 spatio id faciunt) infusione autem peracta,
 iisdem vasis concoqui debent, separatim,
 igne lento, spatula semper movendo, do-
 nec aqua, infusionis causa inposita, con-
 sumpta sit, & supersint mucaginis colatæ
 Singul. ℥ iij. deinde torquendo omnia
 seorsim exprimere debes: expressum cum
 oleo prædicto eodem igne coquatur, lin-
 teo agitando ad ℥. β. fore consumptio-
 nem mucaginis expressæ. Mox ceram, mi-
 nutim cōfractam, ut liquefiat, injicies: quæ
 ubi liquata erit, ab igne sepones & friges-
 cere permittes: quæ ubi refrixerint, gal-
 banum dissolutum (cujus dissolutionis
 require modum supra Sect prima) & cum
 terebinthina incorporatum admiscebis:

desuper pulverem quam tenuissimum, gummi hederæ, colophonix & resinæ adjicies (alii post ceram liquatam colophoniam & resinam addunt, ut una liquentur, & melius.) Quæ omnia commixta & optime incorporata in vase ad usum recondito.

In hoc unguento parando plura sunt notatu digna : imprimis Myrepsum pondera colophonix & resinæ omisisse. Sed Fuchsius de componendis medicament. Sect. 15. de unguentis, & Præpositus particula 20. lib. 2. pondus restituerunt, scilicet singulorum \bar{z} iij. Præterea cum Myrepsus, & alii qui hoc unguentum à Myrepsio desumpserunt, tres tantum libras aquæ determinarunt ad infusionem & decoctionem radicum & seminum (licet in aliquibus Præpositi libris. vij. libræ legantur) maxime meo quidem judicio falluntur hi, cum totæ radices, & semina sint in pondere duarum librarum & trium unciarum, sunt tantum uncix decem & semis aquæ pro uno quoque simplici, quæ non sufficiunt, cum tribus diebus continuis igne lento macerari debeant ante decoctionem : quæ aquæ proportio tum infusionis tum coctionis tanto spatio posset consumi, & radices & semina aduri de-

fectu

fectu humoris. Unde (salvo meliori iudicio) si hoc unguentum voluerint Pharmacopœi conficere, ut author præscribit, legendum erit, aquæ lib. viij. aut novem secundum regulam Servitoris. Sed quia in dictis simplicibus est humiditas satis multa, ut quæ portionis alicujus aquæ vices supplere possit, nõ tam exacte juxta regulam Servitoris quinque lib. cum semisse aut sex ad summum contenti esse poterunt, si perfectam velint habere mucaginem, ne radices & semina urantur infundendo & coquendo. Nam ea regula cum sit universalis, modificatione tamen aliqua conscribi potest, pro ratione corporum coquendorum, quæ quantitas aquæ melior & certior sit ad seminum & radicum mucagines extrahendas: id quod maxime à peritorum artificum, & probatorum authorum iudicio dependet. Rursus notandum, Myrepsum quærere solum lib. j. mucaginum coctarum ad crassitiem: coctæ vero, vult, ut consumantur cum oleo prædicto. Re vera facile libra una mucaginum potest cum libris duabus olei coqui, sed quantitas, radicum & seminum hoc loco descripta, mihi videtur excedere ad libram mucaginum conficiendam. Nam est regula generalis apud omnes

Pharmacopœos, autoritate Servitoris & Præpositi, ad mucagines conficiendas, ut pro libra una aquæ, sumamus ℥ iij. ad summum ℥ iiij. radicum vel feminum.

VIRE A MYREPSO NOTATÆ.

Ad nervorum intercissionem, lateris dolores, omnemque incontinentiam, & duritiem nervorum, atque resolutionem utile est.

CAPUT VIII.

Unguentum Agrippæ Myrepsi ex Sect. 3. de unguentis, num. 43. V suale.

Veræ Myrepsi descriptionis pars media.

a Eryoniæ radicem hoc loco sume.

a ℥. Byroniæ. ℥. β.

b Scyllæ laminas albas, cultello eburneo divisas, accipe.

Radicis althææ sylvest.

c Iridis illirica radices recentes accipe: vel illarum loco nostrates sume.

b Scyllæ, Singul. ℥. ij. β.

c Iridis. ʒ. vj.

d Ebulæ

Radiciſ filicis.

d *Ebuli radices intel-
lige.*

e *Tribuli marini ra-
dicum medullam ca-
pe.*

f *Oleum olivarum
antiquum & matu-
rum accipe.*

g *Permulti cere unc.
j. drac. j. legunt : alii
unc. ij. & melius, ra-
tione doſis olei. Multi
ceram albam hoc loco
ſumunt, ſed præſtat
citrina ratione calidi-
tatis.*

d *Ebuli.*

e *Tribuli marini.
Singul. ℥. β.*

Tuſa hæc imponan-
tur in

f *Olei. ℥. β.*

Et ſubigantur ſimul
ac reponantur in vaſe
tribus diebus : dein
injiciantur in lebe-
tem, & bulliant, ſub-
actaque jam probe
colentur, ſiccaque
abjiciantur, liqui-
dum autem in lebe-
tem conjiciantur, &

g *Ceræ puræ. ℥. iij.*

Sic paratum recon-
de in vaſe.

SCHO-

S C H O L I A.

Recentes omnes radices tempore & loco legantur, terque aut quater abluantur, semper aquam mutando, sine doneque munda abstergantur, & in minutissimas partes incidantur, deinde omnes per se in mortario lapideo pistillo ligneo tundantur perfecte, fictilique plumbato stricti orificii una cum oleo, spatio trium dierum, aut (ut alii) octo, ut melius & efficacius macerentur, super cineres calidos constituentur, & vas diligenter cooperiatur, interdum tamen spatula agitari debent, ut melius imbuantur, deinde maceratione peracta coquantur ad humidi consumptionem, vel donec tota humiditas radicum sit consumpta, & oleum, dum cum radicibus coquitur, totam vim radicum imbiberit. Mox dum calet, percoletur, & radice siccae projiciantur. Liquidum oleum rursus super ignem levem apponatur: statim cera concisa ad liquandum injiciatur: qua liquata refrigerare finito, agitando, refrigeratum ad usum in pixide servato.

Circa hoc unguentum notandum Alexan-

Xandrinum lib. de compositione medicamentorum secundum loca capit. 995. & Præpositum lib. 2. particula xx. non convenite in simplicibus, neque in ponderibus, illorumque descriptiones ab hac Myrepsi maxime differre. Usualis tamen & vera descriptio est Myrepsi, quia primus eam usurpavit & descripsit. Quantum autem ad simplicia loco radicis althææ, ponunt alii (& melius) radicem cucumeris asinini, quæ purgatrix est, & ideo facit, ut multi medici præscribant ad hydropicos.

a Quantum ad doses sic variant: nam alii bryoniæ lib. ij. radicis cucumeris asinini lib. j. scyllæ ℥. vj. iridis ℥. iij. radicis flicis, radicis ebuli & tribuli marini ana ℥. ij. olei olivarum maturi & antiqui lib. iij. cere ℥. xv. Quod vero spectat ad confecturæ rationem, videtur descriptio Myrepsi deficere in quantitate olei pro quantitate simplicium, & similiter in ceræ, pro quantitate olei. Itaque addendum mihi videtur oleum in majori quantitate & similiter cera pro ratione olei. Et quia in hoc Myrepsi, ad coctionem radicum tantæ quantitatis, & earundem macerationem, non posset esse adhuc sufficiens quan-

a Præpositi vera descriptio, mihi frequens & usualis.

quantitas olei , non erit præter rem aliquid liquoris permiscere, vini scilicet, vel aquæ ne uratur oleum. Vinum tamen in hoc præstat.

VIRES A MYREPSO SCRIPTÆ.

Ad hydropicos , lienosos & ventre dolentes (his enim absterforium fit) utile.

C A P V T IX.

Unguentum rosatum Mesuæ ex xj. distinctione de unguentis & emplastris, interdum Vsuale.

Textus Mesuæ verus.

a *Quamvis diximus a* *axungiam sumi pro veteri & salita pinguedine porci, hic tamen recentem intelligere oportet que vulgo (sain doux) dicitur: & per quantum volueris, lib. v. ij. intel- liget.*

a Axung. porcinae recentis quantitate quam volueris.

Et lavetur in aqua calida novies, & tantundem cum aqua frigida, la-

b Rosæ

uatione ultima :
deinde terantur
cum ea ,

*b Rosas albas permul-
ti accipiunt : & per
quantum ipsa est, vi-
delicet, ex pinguedine,
hoc est, lib. viij.*

*b Rosarum rubea-
rum recentium,
quantum ipsa est.*

Et dimittantur mar-
cescere per dies
septem : deinde
coquantur cum
facilitate & co-
lentur. Et iterum
tantumdem rosa-
rum teratur & di-
mittatur per alios
septē dies & fun-
de super ea ,

*c Per partem dimi-
diam lib. iiij. accipe.*

*d Oleum amigda-
linum sine igne factum
accipe : sufficit lib. se.
si vis unguentum fa-
cere ut experientia do-
cti sumus,*

*c Succi rosarum cir-
citer Partem sem.*

*d Olei amigdalini.
Part. vj.*

Et iterum coquā-
tur

tur cum facilitate, usque ad succi consumptionem deinde reponatur & administretur: & quandoque disrumpitur in aqua rosata parum opii, & projicitur in decoctione, & est mirabile, ubi oportet, & proprie quando vigiliæ adsunt.

S C H O L I A.

VT docuimus antea Sect. prima cap.2. accipe axungiaë porci recentis & à membranis exacte purgataë lib. viij. quam probe in vase fictili plumbato, lati orificii, semper spatula lignea tractando, novies aqua calente lavabis, donec frigescat axungia, aquam semper cum frigida erit, ejiciendo, & aliam calidam assumendo, & toties postea aqua frigida tractando lavabis, semper innovando aquam: deinde cum optime lota erit, in alio fictili stricti orificii axungia reponatur: una cum lib. viij. rosarum rubearum prius in mortario lapideo vel marmoreo cum pistillo ligneo tusarum, diligenterque fictile cooperiatur, & igni

& igni lento, nempe cineribus calidis, aut diplomati, per modum infusionis, diebus septem appones, & concoques, ut sit quasi non coctio, sed potius maceratio, & humidi superflui consumptio, radicalis vero humidi rosarum reservatio. His peractis totum extorquendo calide coletur, & colaturæ tantundem rosarum rubearum recentium, ut prius contusarum, in vase prædicto cooperto una cum succi rosarum lib. iij. spatio septem dierum cineribus calidis, aut diplomate, ut omnia simul macerentur & tota rosarum humiditas, & succosa substantia in axungiam abeat, iterum repones & ut prius concoques. Tum axungiam colabis, & siccis rosis abjectis refrigerari permittes, & diligenter axungiam ita paratam vase nitido cooperto ad usum servabis.

Nostrium vulgus, dempto oleo amigdarum & opio, istud unguentum conficit. At si quærat quis, quare oleum & opium prætermittamus, dicemus. Oleum magis liquidum unguentū reddere, ob magnam olei copiam, nam si addere volumus secundum authoris intentionem, re vera sufficiunt ad hoc unguentum parandum ℥vj. ut in margine videre erit. Opium vero potest ex præscripto medici, & non usualiter

liter, admisceri, ad errores vitandos, dissolutum cum pauca aqua rosacea.

V I R E S A M E S V E D E N U N -
tiate.

Sedativum inflammationum, & erysipelatis, & ignis Perfici: & confert sodæ calidæ, & inflammationi stomachi & hepatis.

C A P V T X.

Vnguentum Inulatum ex xx. particula Præpositi Vsuale.

Verus Præpositi textus.

℥. Radicis Inulæ
campanæ coctæ
cum aceto & pi-
statae ut decet.

℥ β.

a Axungia vetus &
salita hoc loco sumen-
da, ratione caliditatis
& virtutis desiccati-
væ. In alio unc. j. sem.

b Oleum commune
vetus & maturum
olivæ sume, &
loco, unc. j. se. legen-
dum unc. ij.

a Axungie porci.
℥ j.

b Olci communis.
℥ j. β.

c Ceræ

c Ceram citrinam intellige.

c Ceræ novæ.

d Argentum vivum extinctum, & à plumbo separatum accipe: modum autem separandi & incorporandi, vide infra ubi agitur de argento vivo: rerum loco argenti vivi hic nonnulli tantumde sulphuris addunt, ubi sola intentio est resiccandi & asserendi.

d Argenti vivi extincti.

Terebinthinæ lotæ,
ana ℥ j.

Salis cōmunis pulverisati. ℥ ij.

Incorporetur ut decet.

S C H O L I A.

R Adices inulæ tempore & loco collectæ in aqua clara laventur, donec omnes sordes deposuerint: deinde linteolo mundo & rudi detergantur, frustulatimque incidantur: & in tistili cum aceti lib. iij. secundum communem usum coquantur: quia tamen acriorem quandam qualitatem acetum cum radicibus coctum acquirere potest, & absumere inulæ, coquendo, quandam virtutis portionem, melior videtur prima coctio, & veluti cruditatis effractio.

si fiat

fi fiat cum aquæ media parte: perficienda vero sub finem cum aceti reliqua portione, donec totus liquor absumptus & coctæ radices sint. Postea refrigerescere permittite super cribrum raram, ut siquid superfit aquæ & aceti effluat: ubi refrigeratæ erunt, in mortario lapideo pistillo ligneo (non autem æreo, nec metallico propter aceti vim, alias enim longe diversam qualitatem acquireret) contundes: tandem dicto raro cribro, manu vel spatula cõprimens lignea, transcolabis & colatum cum axungia porcina in fictili lati orificii concoques igne lento, spatula semper inter coquendum agitando, donec pars superflua liquoris in auras abeat: & continuo salem optime pulverisatum & cribratum commiscebis, paulo post ceram cum oleo liquatam conjunges (alii coram cum oleo liquant, qua liquata radices colatas & ad humidi superflui consumptionem, coctas una cum axungia, & prædicta cera jungunt, desuper salem optime pulverisatum inspergunt.) Tunc totum ab igne sepones, & ubi omnia bene commixta optimeque refrigerata erunt, argentum vivum cum hominis jejuni saliva probe incorporatum & cum terebinthina involutum permiscebis, prius tamen aceto macera-

cera-

ceratum, diligenter frequenterque agita-
 tum in *a* mortario marmoreo cum pistillo
 ligneo spatio unius horæ vel donec ace-
 tum sordes crassas argenti vivi imbiberit:
 tunc acetum istud dejiciatur & aliud cla-
 rum ac nitidum imponatur, agiteturque
 ut prius, hæcque agitatio seu maceratio
 ter aut quater repetetur semper innovando
 acetum pro quacumque vice: agitatione
 auté facta si aliquid in eo terræ aut plum-
 bi aut stanni sit, id ut auferatur transco-
 lari debet per alutam comprimendo. Sic-
 que paratum ad usum unguentum habebis
 fictilique reservabis. Cæterum notandum
 erit authorem petere terebinthinā lotam.
 Sane ego habeo ex doctrina medicorum
 integram meliorem esse, ut quæ, cum
 amarorem & caliditatem retineat, per-
 meabilior sit, & majoris virtutis ad pene-
 trandum & desiccandum.

Argenti vivi.]

b Chymistæ argentum vivum mercu-
 rium vocant: alii hydrargyrum, alii præ-
 cipitatum: alii matrem metallorum &
 mineralium: alii cinnabarim. Verum ar-
 gentum *c* vivum nihil aliud est, quam
 aqua viscosa in visceribus terræ, substantiæ
 subtilis,

a Argenti vivi depuratio, secundum scopum com-
 positio *is*. *b* Argenti vivi varia nomina. *c* Ar-
 gentum vivum quid, varia opiniones.

subtilis, terræ albæ temperati caloris virtute exquisitè permista, perque minima, quousque humidum fuerit temperatum à sicco, & siccum ab humido æqualiter. *a* Alii per se inveniri in argenti fodinarum tectis stillatim concretum asserunt. Est autem duplex. Nativum scilicet, & artificiale. Nativum sui coloris sine excoctione, quod tale reperitur intra metalla, in lacubus, in quos è fibris effluxit. Artificiale ex minio, sive ex vena minii cõficitur, seu coquitur, ad eum modum quem Dioscorides tradit lib. 5. capit. 70. & Plinius lib. 33. capit. 6. & 8. Quod si plura requiris, lege eosdem auctores, & pariter Lodoicum Cælium lib. 26. cap. 30. Fuchsiu lib. 9. de Simpl. medicament. facultatibus Sect. 3. cap. 32. Notandum tamen erit argentum vivum, dum est liquidum, crudum & vivum appellari: dum est mortificatum, in quibusdam officinis concrematum dici, & à nobis sublimatum. *b* Efficitur etiam à nobis præcipitatum cum aqua forti, coctione, ad evaporationem ipsius aquæ videlicet ex P. iij. argenti vivi & aquæ fortis P. j. quod in officinis nostris argentum vivum rubeum

a Argenti vivi duo genera. *b* Per officinam
b. c loco intellige locum ubi metalla preparantur.

tubeum vocatur. *a* Extinguitur seu incorporatur sic. Accipe argenti vivi quantum volueris, & mortario metallico impone, & diutissime pistillo ferreo agita cum pauca hominis jejuni temperati saliya, vel cum pauca axungia porcina, ursina, oleo terebinthinæ, juniperi, butyro recenti, sulphure vivo & cocto pulverisato, styrace liquida, castoreo liquido, terebinthina, & cum pluribus aliis simplicibus pro diversis medicandi scopis, donec nullæ scintillæ appareant. Sicque extinctum vel dissolutum commiscere poteris, scilicet in omnibus unguentis aut emplastris, cum refrigerata fuerint, Sed antequam extinguatur, debet eligi. Eligitur autem & probatur nativum seu fossile à plumbo depuratum cujus depuratio talis erit: *b* Accipe alutam fortem & satis amplam pro quantitate argenti vivi, & in eam argentum vivum include: inclusum & alutam optime ligatam manu stringe & comprime in aliquo vase, statimque videbis argentum vivum ab aluta exire, & plumbum si adsit remanere in aluta.

I

VIRES

a Argenti vivi extinctio, seu incorporatio. *b* Argenti vivi antequam extinguatur transcolatio.

VIRE S A QVIBVSDAM MEDI-
cis notate.

Ad omnimodam scabiem carnis ex humore melancholico factam, & falsa putrefacta pituita admodum utile.

C A P V T XI.

Vnguentum diapomphyligos Alexandrini ex lib. de composit. medicament. secundum loca, capit. 103 S. Vsuale.

Alexandrini veri textus pars media.

a Oleum rosarum immaturum descriptum ab Alexandrino accipe, & loco unc. iij. olei legendum est unc. ix. vel unc. x.

b Ceram albam crudam, & lotam intelligit author: sed ejus loco nostram albam faciliam usurpamus.

c Per uvam lupinam, intellige solanum hortense, &

a ℥. Olei rosati.

b Ceræ albæ. ana
℥ iij.

c Succus fructus
uvæ lupini quod
sufficit.

per quantum sufficit
unc. iiij.

d Per psimmythum
cerusam lotam cum a-
qua rosarum intelligit :
modum autem lavan-
di require supra prima
Sect. capit. 12.

e Pompholyx vel spo-
dium videlicet Craco-
rum : sed prestat in hac
compositione pompho-
lyx quam spodium ,
quia magis subtilis mi-
nusque sordida quam
spodium : quid autem
sit pompholyx & spo-
dium & quomodo dif-
ferant, lege infra ubi
agetur de pompholyge.

f Per olibanum purum
thus masculum accipe.

d Psimmythii. ℥ j.

e Pompholygos vel
spodii.

Plumbi usti & loti.

f Olibani puri.
ana ℥. β.

In oleo ceram-
lento igne liquefac,
& ab igne subductis
specierū pulverem
adde, & in marmo-
rea pila diutius cō-
misce, sæpius su-
pra scriptum succū
superfundendo, cū-
que per quinq; aut
sex horas ad solem
cū pistillo subacta
fuerint, in loco fri-
gido coaguletur : si
quid succi superna-

taverit abjiciatur: & linteo inductum locis vulneratis impone.

S C H O L I A.

Succi à maturis baccis solani extrahe quantitatem sufficientem, videlicet ℥ iij. (quanquam tamen nonnulli existimant ab immaturis extrahendum tanquam à magis astringentibus & refringerantibus, quod ego aliter puto) & cum oleo rosaceo in lebetè igni lentò excoq; ad succi consumptionem, spatula assidue movendo (sunt autem qui succum addendum putant, ut eo nutriatur calide cerusa & reliqua simplicia dempto olibano) deinde ceram frustulatim divisam in prædicto oleo, ut liquecat injicito: qua liquata lebetem ab igne sepones & spodium, plumbum, & cerusam separatim tritam & lævigatam, semper spatha agitando ut probe commisceantur conjicies: quibus optime commixtis & omnino refrigeratis pulverem tenuissimum olibani insperges, & subiges, eoque dum omnia sint optime mixta & confusa, ita ut unum ab altero discerni minime possit: hac enim methodo unguentum secundum artem habebis factum.

Animad-

Animadvertemus autē in hoc unguento quantitatem olei non sufficere ad perfectam omnium consistentiam, & unguenti formam, nisi ultra authoris descriptionem addantur olei ℥ vj. quod ego certe facio, dum illud paro, eo quod nimis siccum & durum esset, nisi tantum olei adderetur, aut aliquid de cera detraheretur. Pariter notabimus Alexandrinum non præscribere pondus succi vuzæ lupinæ cum dicit quod sufficit, sufficiunt tamē pro quantitate olei ℥ iiij. Idem Præpositus xx. particula lib. 2. illud unguentum describit, consentitque cum Alexandrino in simplicibus, sed in ponderibus minime, quaritque Alexandrinus ceram simpliciter, Præpositus vero ceram lotam, quæ sane lavari debet propter acrimoniam à melle contractam, huic unguento minime convenientem. Galenus Tract. 20. ad Glauconem, capite de curatione cancri, seu cancrofi ulceris, unguentum istud describit ab eo Alexandrini maxime diversum.

Plumbi usti & loti.]

a Plumbum corpus est metallicum, lividum, terreum, ponderosum, modice particeps albedinis. Nec reperitur in fo-

I 3

dnis

dinis purum plumbum, cujuscunque sit coloris. *a* Quod excoquitur triplex, scilicet. Nigrum, quod verum est plumbum: Cinerum, quod Fallopius lib. de metal. seu de fossi, cap. 22. *b* Marchesitan liberiorum vel impressorum vocat: quod nihil aliud esse videtur quam stybium. Candidum, quod est stannum, & antiquorum *c* plumbum album. Avicenna 2. Canone, cap. 2. duas tantum species definit. Plinius antiquis duplex esse ait (cum ipse tria genera ponat.) *d* Nigrum & Cinerium. Nigrum fit ex lapide pyrite coloris argentei: nam pyrites ille argentei coloris argentum continet & æs: aliquando solum æs, aliquando argentum solum, aliquando utrumque simul, aliquando argentum & plumbum nigrum aliquando plura metalla, aliquando omnino sterilis reperitur pyrites. *e* Cinereum vero distat à nigro & candido plumbo colore: estque quasi sui generis metallum, quod Græci, tum Latini scriptores ignorasse videntur. Quod candidum vere est plumbum, improprie à vulgaribus plumbum nigrum appellatur.

Can-

a Plumbi tres species. *b* Plumbum album antiquorum quid. *c* Plumbi secundum Avicennam duas species. *d* Plumbi nigri origo. *e* Plumbi cinerei origo.

Candidum *a* vero plumbum stannum illis dicitur. Tamen non sunt eadem ut hætenus voluerunt stannum & plumbum candidum. Nam stannum ex terra effoditur & in mineris invenitur in frusta divisum, testis Serapio lib. aggregat. cap. Femezeg. *b* Sed plumbum nostrum candidum ex galena in quibusdam locis constat ut plumbum nigrum. Et ut vult Plinius lib. 34. cap. 16. coquitur ex lapillis nigris candore varietatis, qui lapides nigri nonnullis locis magni reperiuntur: interdum vero ut arena, scribitq; in Britannia, item in Gallitia provenire, cum in Gallitia minime fiat nigrum. Sed de plumbo & illius generibus & origine satis, si plura requiris consule Galenum lib. 9. Simplic. medicament. Et Plinium lib. 34. cap. 16. 17. 18. Dioscoridem lib. 5. cap. 47. & 48. Georgium Agricolam & Fallopium. Nunc de ejus præparatione est nobis dicendum, quæ fit duobus modis: ustione & lotionem. *c* Uritur autem secundum Dioscoridem lib. 5. cap. 56. hoc modo. Super tenuissimas plumbi laminas fictili novo inditas, sulphur inspergito: additisque

I 4

rursus

a Stannum & plumbum candidum inter se differunt. Stanni origo. *b* Plumbi candidi origo. *c* Plumbi ustio secundum Diosc. & Servitorem.

rurfus aliis laminis, interjecto semper sulphure, donec vas expleveris succendito: flagrans autem jam plumbum ferrea rude versato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilque è plumbo non uisum hæserit: tum demum obstructis naribus extrahito: alioquin fumus plumbi maxime noxius sentitur. Sic Dioscoridis & Serapionis sententia plumbum uritur, sed huiusmodi ustio difficilis admodum nobis videtur propter damnum, quodque cinerem nigrum reddit, & depravat colorem unguenti si observare volueris. Ila sequens ustio quæ fit absque sulphure, perfacilis est, minimeque nocua. *a* Vas fictile non vitreatum (ne inter urendum quid adhæreat) accipito, & furno fusorio, ubi sint carbones accensi, appone: idque fictile carbonibus ardentibus undique circunda, in eoque quantum plumbi volueris impone, & liqua: quod illico fiet. Prius tamen bis aut ter in aceto fortissimo plumbum extingatur, quæ extinctio similis est extinctioni lapidis calaminaris, & tutiæ Græcorum: de qua vide infra in unguento desiccativo. Liquato plumbo ignis augetur & ferrea spatula semper agitetur, paulatim à lateribus vasis spumam ejiciendo, quousque totum in spumam deve-

a. Plumbi ustio perfacilis.

nerit , nihilque è plumbo uſto adhæſerit . Spumam autem illam , quæ veluti cinis , & re vera cinis eſt , in dicto furno , ignem augendo , circumcirca concoques , donec colorem retineat album citrinitati permixtum . Hac enim methodo non nocet , nec nigrum erit . At quia Alexandrinus plumbum uſtum & lotum requirit , ſic præparatum lavari debet , quamvis in eo mordacitas aut acrimonia nulla ſit . Sed eſt intentio Alexandrini fortaffe ipſum lavare , ut tenuius ſit , & ſic facilius permeet poros cutis , dum parte alicui applicatur , vel ut nova qualitas per abluſionem addatur , aut auferatur , vel ut corroſiva & acris vis in eo arte acquiſita tollatur . Scio autem (ut prædixi) non eſſe acre neque corroſivum , nec edit effectum calidum aut ſiccum ante uſtionem , ſed ex ſententiâ Galeni potius frigefacit & humectat . Quod ſi vero volueris ipſum lavare hoc modo lavabis . *a* Accipe cinerem plumbi tali modo , ut jam diximus factum , & illum in mortario marmoreo deſuper parum aquæ celeſtis vel roſarum affundendo aliquot horis piſtillo ligneo , vel ſpatula ligneâ agitato , donec aqua ſit ſœculenta vel turbida , quam dejicies in quoddam

I 5

ſictile,

a Plumbi uſti , lotio .

fiatile, & aliam aquam iterum affundes, & ut prius tractabis ac movebis, semper aquam turbidam & fœculentam dejiciendo in suprascriptum fiatile usui futuram, & aliam in mortarium itidem infundendo atque hæc toties repetes, donec pars subtilior plumbi usti assumpta sit cum prædicta aqua effusa, : crassior autem pars, quæ residet in fundo mortarii rejiciatur tanquam plumbi sit excrementum nulliusque efficaciam. Tunc totam partem subtiliorem plumbi usti, quæ cum aqua assumpta fuerat quiescere permitte, quousque ea clara & sincera videatur, & plumbum ustum in fundo fiatilis residere, quod subito siccabis : siccatum ad usum servabis. Alii hac lavandi utuntur ratione. Pulverem plumbi usti in mortario infusa aqua agitant, donec ea aqua plane sit turbida, quam tum residere & clarescere permittunt, & tunc demum ejiciunt, nec in alio vase conservant : idque sæpius iterant, dum aqua non amplius turbetur, sed profus clara & indefœcata appareat. Tunc denique quod in fundo mortarii residet, id ad usum reponunt. Qua ex lotione ego quidem judico subtiliorem plumbi partem à crassiore exacte separari non esse : nec id sedimentum autho-

ris menti respondere : neque pro facultate huic unguento adscripta, satis deficcare. Cum igitur à medicis præscribetur plumbum lotum sic priori non lavabis, mutando tamen liquorem pro scopo compositionis, & intentioni medici.

Pompholygos vel spodii.]

a Pompholyx, Tutia Arabibus dicta.

Vera autem Pompholyx cinis est metallicus, levissimus, qui ex æris, vel Cadmiæ favilla in summitate fornacum, aut parietibus, vel etiam domunculorum, extra farinæ modo dispergitur, quod seplasis Nil album vocatur, & à Germanis Nili pinguis : estque is cinis candidus & usque adeo levis, ut in auras evolare possit. Alii volunt quid *b* album esse (quasi bullam seu ampullam, unde nomen apud Græcos fortitur) purum pingue, ac leve: quod colligitur & fit in summitate fornacum, differtque secundum diversitatem metallorum, & ratione locorum in quibus colligitur : ut si in oris fornacum, tum Cadmia capnitis : si à lateribus & summis *c* cameris est pompholyx : pars quæ in summitate dependet pompholyx etiam dicitur:

I 6

pars

a Pompholyx vera quid. capnitis, & spodii origo. differentia.

b Pompholygis, cadmia
c Pompholygis & spodii

pars vero quæ parietibus & pavementis adhæret spodium appellatur (ut sæpissime in hac urbe, vico divi Martini, & in pluribus locis observavimus in fornacibus, ubi æs conflatur) differtque pompholyx sola specie, candore, vel levitate, non genere, à spodio. Si quidem spodium magis nigrescit, & ponderosum pilisque plenum est, tanquam excrementis collectis ab ærariarum officinarum, & fornacum pavementis. Materia autem pompholygis & spodii est æs, vel lapis calaminatis, qui Arabice climia: & Græce cadmia dicitur. Probatum autem pompholyx Cypria, quæ superfusa *a* aceto halitum æris præstat, colore aliquantulum piceo, sapore cœni, horrido, & statim si fraudem non est experta flagranti imposita carboni infervescit, & cæruleum *b* colorem contrahit. Cujus secundum Dioscoridem lib. 5. cap. 46. duo fuerunt genera. Unum ad æris colorem vergens, subpingue: Alterum candidum & maxime leve. Candida enim fit pompholyx, quoties in perficiendo ære fabri præstantius facere volentes detritam cadmiam cumulatus inspergunt: namque levissima favilla, quæ defertur, in pompho-

a Pompholygis electa. *b* Pompholygis genera duo secundum Dioscor.

pholygem coit. Hæc Dioscorides, lib. & capit. citato.

VIREŒ AB ALEXANDRINO
desumptæ.

Ad exsiccanda Erysipelata, vulnera for-
dida, & ad sananda tybiarum ulcera alio-
rumque loco concava, vel dissipata replet,
refrigerat & cicatrizat.

C A P V T X I I.

Vnguentum Apostolorum Avicennæ libr. ʒ.
Summa prima tractat. xij. de unguentis
& emplastris V suale.

Verus Avicennæ textus.

a Terebinthinam il-
lam que è terebintho
fluit sponte, quam sol
non attingit, sume.

b Ceram albam na-
turaliter & ponticam
author intelligit sed ejus
loco nostram albam
factitiam usurpamus.

c Resinam illem que
sponte fluit è terebin-

a ʒ. Terebinthinæ.

b Ceræ albæ.

c Resinæ. Omnium.
ana ʒ xiiij.

Opponacis &

Floris æris. Ambo-
rum. ana ʒij.

the

tho, & solis calore condensatur, hoc in loco sume, ac in omnibus compositionibus ubi resina requiritur.

d Per aristolochiam longam radices, intellege.

e Bdellium molle accipe.

f Lithargyrium aureum sume.

g Acetum vini dixit author, ad differentiam aceti compositi ex ficibus, & aliis fructibus, ut docet Columella lib. de re rustica, ita tamen sit acetum vini, ut nihil redoleat vini, alias non esset, tum verum: quia acetum est vinum mortuum.

h Oleum olivarum maturum & insulsum accipe, sufficiuntque ætate sive hyeme lib.

ij.

d Ammoniaci.

Pondus. ʒ xiiij.

Aristolochiæ longæ
&

Thuris maculi. Am-
borum. ana ʒ vj.

Mirr hæ &

Galbani. Ambo-
rum. ana ʒ iij.

e Bdellii. Pondus.
ʒ vj.

f Lithargyrii. Pon-
dus. ʒ ix.

Infundatur bdelliū
in g aceto vini &
decoquantur in
æstate cum

b Olei. ℥ .ij.

& in hyeme cum

℥ . iij.

S C H O -

S C H O L I A.

Nithargyrium (ut antea in Em-
 plastris diximus) electum, tri-
 tum, & præparatum, in lebete
 cum $\frac{z}{3}$ ij. olei prædicti, spatio
 quinque horarum, aut sex nutriatur: de-
 inde igni lento ad mellis crassitiem, vel ad
 unguenti mediocriter duri formam co-
 quatur, spatula semper agitando, ne in va-
 sis fundo subsideat, subsidendoque uratur:
 quod ubi coctum, & ab igne depositum
 fuerit, ceram in minutissimas partes divi-
 sam, & in reliqua parte olei liquatam, una
 cum resina contracta calide affundes &
 refrigerare permittes: ubi hæc refrixerint,
 ammoniacum, galbanum, opopanaxem
 bdellium (si molle sit, si vero siccum, in
 pulverem tenuissimum rediges, & in nu-
 mero pulverum collocabis) arte soluta,
 & cocta in aceto aut vino, ut superioribus
 emplastris & unguentis solvendi & co-
 quendi modum docuimus & cum tere-
 binthina incorporata immiscebis. His ita-
 que optime commixtis, & omnino refri-
 geratis, pulveres tenuissime per se tritos,
 ut aristolochiæ longæ, myrrhæ, thuris per-
 miscebis, semper spatula agitando. Hoc
 itaque

itaque modo paratum habebis unguen-
tum, addendo pulverem tenuissimum flo-
ris æris.

V I R E S A B A V I C E N N A
descriptæ.

Lætificans cum facilitate fistulas diffi-
les, scrophulas parvas, nec est aliquid simi-
le ei, & mundificat vulnera ex carne mor-
tua & pus, & consolidat.

C A P V T X I I I.

*Unguentum desiccativum rubeum ex xx. par-
ticula secundi libri Præpositi V suale.*

Præpositi vera descriptio.

a Lapidem calaminarem
illum, quam cadmiam lapi-
dosam appellamus, extinctū
& lotum sume.

b Terram sigillatam illam,
quam sacerdotes Diana si-
gnabant i.agine Diane in
cujus tutela erat, vel illam
terram, quam caprino san-

a ℥ Lapidis
calaminaris.

b Terræ sigilla-
tæ. ana ℥iiii.

guine miscebant, hoc loco sume, sed quia vera ad nos non defertur, bolum armenam ejus loco usurpamus.

c Lithargyrium lotum accipe.

d Cerusam lotam cape.

e Ceram albam naturaliter & ponticam hoc loco intelligit author, sed ejus loco albam factitiam usurpamus, & loco unc. v. legendum unc. iiij.

f g Oleum rosatum rude, crudum ac immaturum, & violatum à Mesue descriptum accipe.

c Lithargyrii auri.

d Cerusæ. ana ℥ iiij.

Camphoræ. ℥ j.

e Ceræ. ℥ v.

f Olei rosati.

g Olei violati. ana ℥ vj.

Fiat unguentū.

S C H O L I A.



Ceram frustatim divisam, una cum oleis, lento igne, ut solvatur, cacabo impones (melius, si solveretur, cum solo rosato crudo, desiccationis causa) in quam solutam, ab igne depositam, & refrigeratam, projice tenuissimum pulverem simplicium per se pulverifatorum, ut lithargyrii, cerusæ, lapidis calaminaris, terræ sigillatæ (aut fac-

fuccedanei ejus) spatula lignea semper movendo. Paulopost camphoram una cum paucis oleo rosato crudo vel cum pauca aqua rosacea dissolutam. Sunt qui in hoc unguento conficiendo levi igne lithargyrium, & cerusam, una cum oleis ad syrupi mediocriter cocti consistentiã spatula ducendo decoquunt: deinde ceram contractam in lithargyrio cocto solvunt, & ubi omnia fere frigida sunt, pulveres reliquorum simplicium admiscunt: post camphoram arte solutam addunt. Uterque modus optimus; sed prior officinis nostris & usitator est, & certior.

Cæterum notandum erit desiccativum rubeum (licet rubeum in titulo describatur) nisi loco terræ sigillatæ, bolus armenia admisceretur, vere rubeum esse non posse.

Lapidis calaminaris.]

a Lapis calaminaris arabice dicitur Climia, & Græce cadmia tamen vulgo eadem sunt nomina: diciturque noster lapis verus calaminaris cadmia lapidosa, vel æraria, quia artifices eo utuntur ad componendum æs luteum, quod orichalcum appellamus (vulgo lethon) quamvis plures sint cadmiæ *b* species. Cadmia *c* autem duplex
nativa,

a Lapis calaminaris quid. *b* Cadmia duplex.

c Cadmia nativa duplex.

nativa, & factitia. Nativa iterum duplex. Una quæ reperitur in montibus, & rivulis, necnon aliquando in torrentibus: & plures Irem gemmam esse existimant, quæ à quibusdam cristalli radix dicitur. Altera in fodinis metallorum reperitur, fossilis, & lapidosa metalli experts, & Pharmacopolis lapis *a* verus calaminaris nuncupatur, qui admodum durus, sublutei coloris, & accensus luteum edens colorem: sine eo orichalcum confici non potest, isque hoc loco est sumendus. Estque *b* ille lapis bicolor, quem Albertus Magnus lapidem dæmonis appellat. *c* Factitiæ autem cadmiæ quinque sunt species. Prima Botryitis, quæ duplex: una quasi acinosa, & racemosa (quæ à Sylvio fornacaria vocatur) in summa fornace ærariorum affixa densa, modice gravis, in levitatem tamen magis inclinans, colore spodii, & quæ fracta cinerulenta, & æruginosa apparet. Altera botryitis species quæ fit casu in carbonibus arte & hasta ferrea, & hanc cadmiam Alexandrinā plurimi appellant. *d* Secunda onychitis, quæ ut vult Dioscorides lib. 5. cap. 46. à veteribus metal-

lis

a Lapidis calaminaris, vel cadmia lapidosa, electio.
b Cadmia factitia, species quinque. *c* Botryitis species cadmia factitia duplex. *d* Onychitis species cadmia factitia quid.

lis effoditur onychitæ lapidi similis. Tertia à Dioscoride loco citato placodes dicitur, id est crustosa; nam plurimis *a* crustis, & quibusdam quasi zonis cincta est, & ob id zonitis etiam appellatur: quam Arabes tutiam finissimam nominant: nobisque pharmacopœis ea est frequens. *b* Quarta ab eodem Dioscoride loco dicto ostracitis nominatur, gracilis & magna ex parte nigra, sed quæ testaceam faciem habet & terram amplexa est improbatur candida: quam Arabes tutiam crassam appellant: nobisque etiam frequens hæc & usitata est. *c* Quinta capnitis vocatur, id est furnaria, quæ ferme spodium sive pompholix, sive nil est, repetiturque in oris furnacum, & in summis fornacibus. Itaque his explicatis parva videtur esse differentia inter illas species cadmiarum factitiarum. Immo unum & idem sunt, & ex eadem materia, iisdemque viribus, fossilis cadmiâ lapidosa, pompholix, & spodium: possunt tamen discerni propter diversa loca, in quibus fiunt. Quomodo autem conficiantur species cadmiæ factitiæ, lege Dioscoridem lib. 5. capit. 46. Præterea etiam de

a Placodes species cadmia factitia quid. b Ostracitis species cadmia factitia quid. c Capnitis species cadmia factitia quid.

de illarum differentiis lege Georgium Agricolam & Cardanum & Fallopium quoque lib. de metallis, seu fossilibus cap. 12. & Christophorum Encelium Salveldensem lib. 1. cap. 21. 22. 23. de varietate, & natura corporum metallicorum, lapidum & gemmarum: & alios qui de re metallica scripserunt. Et quia aliquando lotum quærit lapidem calaminarem author: sane antequam lavetur, extingui debet: sicque eum extingues. Accipe lapidem calaminarem (hoc est, cadmiam illam lapidosam & ærariam) qui expers metalli, saporis & alieni, igne manan, & qui fuliginem edit luteam vel æream, in farinam tritus, aceto subactus & in sole siccatus coit in lapidem: eumque frustatim frange fractum ac divisum vasculo fictili, quali utuntur aurarii ad liquandum aurum impone, & vasculum in furno fusorio, ubi sint carbones accensi, appone & illic mitte, donec rubescat lapis: tunc ab igne aufer vasculum, & lapidem ignitum in acetum fortissimum projice, ut extinguatur: quo extincto acetum abjice: abjecto aceto rursus lapidem vasculo infunde: rursusque suprascripto furno appone, ut ignetur: ignitum ab igne depone, & iterum

in

a Lapidis calaminaris, extinctio.

in acetum fortissimum, ut prius conjice, ut extingatur: eo extincto acetum ejice, eo ejecto, rursus lapidem (ut prius) in supradicto vasculo ignique supradicto appone, donec candeat: & cum canduerit ab igne sepone, & statim illum in aquam dulcem, vel pluvialem projice ut extinguatur. Extinctione facta aquam abjicies ad vices tertias semper abjiciendo aquam in qua extinctus fuerit & aliam pro quacumque vice iterando. Dioscorides lib. & cap. prius citato, illum qui ad emplastra præparatur, igniri sive accendi, extingui, & lavari jubet, in vino Aminæo, sed qui ad psorica medicamenta præparatur, in aceto fortissimo. Omnis autem talis, aut alia accedens præparatio, eo scopo fit, ut magis siccat, terreamque aut metallicam substantiam deponat, visque desiccativa major acquiratur. Alii secundum diversitates ægritudinum in liquore proprio illum extinguunt. Quare si quis egeat cadmia extincta, consulerem eam extinguere secundum morbum & locum affectum patientis. Sicque extinctus, lavatur ut plumbum (cujus lotionem perquire in præcedenti capite) permutando pro quacumque vice aquam dulcem vel liquorem illi idoneum. Similiter quoque tutia Græcorum extinguitur & lavatur.

V I R E S A Q V I B V S D A M
Medicis descriptæ.

Ad scabiem humidam ex pituita putri
& falsa solenne : eam enim exiecat &
pruritus compescit magisque siccaret &
stringeret si ex solo oleo rosato ompha-
cino, & non addito oleo violaceo.

C A P V T XIV.

Vnguentum martiarum magnum Myrepsi
ex Sectione 3. de Vnguentis numero 46.
Vsuale.

Vera Myrepsi descriptio ponderibus
duplicatis.

a Ceram naturaliter
albam sume, qualis est
Pontica, sed ejus loco
fœlitiã usurpamus.

b Oleum antiquum
maturum olivarum ac-
cipe.

c Rosmarinum cum
floribus cape.

a ℥. Ceræ albæ.
℥. ij.

b Olei communis.
℥. viij.

c Rosmarini.

Foliorum lauri.

Singul. ℥ viij.

d Ta-

- d Tamaricis summi- d Tamaricis. ℥ vj.*
tates intellige : alii loco
tamaricis , amaraci le- e Ruthæ. ℥ viiij.
gunt.
e Ruthæ folia tenuiora f Ebuli.
sunt accipienda , alii
loco unc. viiij. habent g Sabinæ.
unc. vij.
f Ebuli folia accipe. Balsamitæ. Ocy-
Latini codices legunt es- mi.
brii, pro majorana.
g Sabine partes tener- Salviæ. Polii.
rimas accipe.
Calaminthæ. Ar-
temisiæ.
h Inula radicès accipe. b Helenii.
i Betonicæ folia cape. i Betonicæ.
Brancæ ursinæ.
k Per spargulam , ap- k Spargulæ.
parinam intellige.
l Per herbam venti, l Herbæ venti.
anemonem sylvestrem
sume.
m Agrimonie folia ac- Pimpinellæ.
cipe. m Agrimonie.
n Ab-

n Absinthii summitates intellige.

o Per herbam sancti Petri, herbam paralisidis accipe: alii verba scum odoratum accipiunt.

p Costi herba loco, Prepositus legit herbam sancta Maria que est secundum Ruellium metha sarracenicam, vel ageratum Matheoli.

q Sambuci foliorum loco, alii cymarum sambuci.

r Sempervivi majoris, alii herbam crassulam quod est telephium legunt Gallice (orpm.)

s Quinquenervia a Preposito omittitur, & per quinquenerviam, plantaginem majorem vel minorem hoc loco accipe.

t Per quinque folium, vulgare nostrum vel tormentillam intellige.

n Absinthii.

o Herbæ sancti Petri. Sing. ℥iiij. β.

p Costi herbæ.

q Sambuci foliorum.

Sempervivi minoris.

Herbæ millefoliæ.

r Sempervivi majoris.

Chamedryos.

s Quinquenerviæ.

Centaurii. Fragariæ.

t Quinque folii. Singul. ℥iiij. β.

u Per maluam sylve.
strem altheam vel ebis-
cum accipe.

x Cumini semen. ac-
cipe.

y Fœnigraci semen, su-
me, & per exagia no-
vem unc. j. se. vel
drach. xij. intellige.

z Butyrum recens sine
sale sume Prepositus
unc. j. drach. ij. cap. 9.

* Per mentham, sar-
racenicam intellige.

a Rubia loco, alii papa-
veris rubri legunt, quod
non probo.

b Per Cardiob tanum
herbam cardiacam su-
me: Prepositus cardum-
celli capit, quod expli-
cant & dicunt esse car-
duum benedictum.

c Per matrissylvam, au-
thor caprifolium intel-
ligit.

d Per herbam moscha-
tam. primam geranii
speciē odoratam accipe.

u Maluæ Sylvest.
rad.

x Cumini.

Myrrhæ. Singul.
ʒ ij.

y Fœnigraci.
Exag. ix.

z Butyri. ʒ j β.

Seminis urticæ.
Violarum.

Papaveris albi.

* Menthæ.

a rubiæ. Men-
thæ agrestis,

Lapathi. Politrichi

b Cardiobotani.

c Matrissylvæ.

d Herbæ moschatę.

e Cha-

e Chamæmeli flores o-
mittit Præpositus.

e Florum chamæ-
meli.

Scolopendrii.

f Crispulam Barbari
oculum bovis interpræ-
tantur: quare hoc loco
bupthalmum Græco-
rum & latinorum ac-
cipe: alii cotulam non
fœtidam accipiunt.

f Crispulæ.

g Per herbam camphu-
ratam, abrotanum quo
hodie passim pro scemi-
na nos omnes utimur su-
me.

g Herbx camphu-
ratæ.

h Styracem calamitem
accipe.

h Styracis.

i Axungie hæ omnes
accipiende sunt recen-
tes & non rancide ne-
que fœtide.

Medullæ ossium
cervi. Singul.
Exag. iiij.

i Axung. ursinæ.

k Thus masculinum vel
olibanum sume.

Galinæ &

Anseris.

l Olei nardini Præposi-
tus legit unc. ij. videli-
cet Myrepsi descriptio-

Mastichés. Sin-
gul. ℥ j.

k Thuris. ℥. β.

l Olei nardini.

℥ ij. β.

vis, aut Alexandrini nulla enim penitus differentia est inter oleum nardinum Alexan. & oleū nardinum Myrepsi scriptum Sectionis 16. num. 31. sed quia videtur jam multa quantitas olei cōmunis si 2. uncia addantur, dosi videbitur ad unguenti consistētiam minus cōmoda. Itaque videtur oleū nardinum ad solum odorem conciliandum in pauca quantitate permixtum

Herbas tritas impone vino bono die uno: altero autem die aufer è vino herbas, & contunde, conjicitoque in alterum vinum bonum, & illic finito diebus septem. Octavo autem die accipe has cum vino, & decoque, donec dimidium ejus absumatur, dein injice oleum, & de novo decoquito, quoad totum vinum consumatur. Posthæc amoveto ab igne, & colato, atque oleum rursus in lebetem conjice: & ubi parum lento igne fuerit exalfactum, injice styracem, postea butyrum, & adipem, oleum nardinum, masticem, thus, postremo omnium ceram, omnibusque lento igne dissolutis, aufer tandem ab igne, *secun-*

*secundum
authoris
mentem.*

& recondito in vase ac
utere.

S C H O L I A.

Herbæ recentes omnes, scilicet calidæ, & odoriferæ ut salvia, polium, calamentum, arthemisia, absinthium, & cæteræ aliæ similes, postquam floruerint, vel in flore, vel post deperditum florem colligantur: quæ vero frigidæ & humidæ, ut duæ species sempervivi, quinquenervia, & aliæ similes, cum justam magnitudinem assequutæ fuerint, legantur: & à caulibus purgentur. Calidas & odoriferas separatim à frigidis & humidis minutissime incides, ac probe contundes, postea eas omnes fictili stricti orificii cum ℥. xiiij. vini odoriferi spatio octo dierum ad infundendum, una cum radicibus incisis & tuis, althææ & fœnugræci semine non contuso, cineribus calidis appones, vase tamen obturato. Alii per se aliquot horis infundunt althæam & fœnugræcum ad mucaginem conficiendam: confecta autem mucagine, & postquam cera est liquata, refrigerataque cum

oleo conjungunt. Peracta autem infusione in lebetē ad mediæ partis vini consumptionem, igne lento decoques. Deinde oleum commune antiquum prædictum adjicies, & denuo omnia simul eodem lento igne concoques, donec totum vinum & aqueus humor herbarum in vaporem resolvatur. Tunc linteolo aspero calide transcolantur herbas valde extorquendo, ut nihil olei remaneat in herbis; colaturæ vero statim ceram confractam, ut liquefiat injicies; qua liquata butyrum, ursi, galinæ, & anseris axungias adjicies; his omnibus liquatis, ab igne lebetem sepones, & medullam cervi impones, mox styracem calamitem cum paucō oleo nardino solutam addes & commiscebis, interdū tamen spatula lignea agitando: quibus optime commixtis & omnino refrigeratis, pulverem tenuissimum myrrhæ & thuris desuper insperges: denique reliquum nardini olei infundes, & vase unguentario usui reservabis.

Cæterum notandum erit, Myrepsum Sect. 3. de unguentis num. 3. 4. 5. tres habere descriptiones præter istam usualem: Paulum Æginetam lib. 7. capit. 8. & Ætium lib. 12. capit. 44. maxime diversas in simplicibus & ponderibus. Præterea Ale-

xandrinus lib. de compositione medicamentorum secundum loca capit. 993. hanc habet usualem descriptionem convenitque in simplicibus, in ponderibus vero minime, & ultra descriptionem hanc Myrepsi addit marathrum, nec axungiam anseris habet. Præpositus vero particula xx. lib. 2. herbam retrahit adjicit, & maturellam (quæ describitur à nonnullis pro morella) præter descriptionem hanc: & anseris axungiam prætermittit, variatque in ponderibus quorundam simplicium. Fuchsius quoque, qui hoc unguentum usuale describit, diversæ est opinionis in quorundam ponderibus. Rursus animadvertendum est, Myrepsum in ponderibus uti Exagio. Exagium autem apud Græcos est pondus iiij. ℥. Proinde in omnibus compositionibus Græcorum ubi reperietur scriptum exagium ℥. iiij. intellige. De simplicibus nihil dicemus: cum Dioscorides, Plinius, Fuchsius, abunde de his tractarunt. Si quis plura scire cupiat legat authores supra scriptos.

K A

V I R E S

a. *Exagium Græcorum quid,*

VIRE S A MYREPSO NOTATÆ.

Confert ad refrigerationem capitis, pectoris, stomachi, lienis, jecoris, aliosque dolores à frigiditate natos, & lienem induratum. Præcipue vero ad hydropicos, & lincosos expertum est.

C A P V T XV.

*Unguentum resumptivum ex xx. particula
secundi libri Præpositi Usuale.*

Verus Præpositi textus.

a Per quarti:
unum, unc. iij.
intellige.

℥. Axungia porci re-
centis 4 quart. j.

Axung. Gallinacæ.

Axung. anseris.

b Oleum viola-
tum & chama-
melum & ane-
thinum à Mesue
descriptum accipe.

Axung. anatis. ana ℥ ij.

OEsypi humidæ. ℥. β.

b Olei violati.

c Ceram

Olei chamæmelini.

Olei anethini. ana $\frac{z}{3}$ ij.Butyri recentis. $\frac{H}{6}$. j.

*c Ceram natura-
liter albam &
ponticam intellige,
sed ejus loco al-
bam nostram fa-
ctitiam usurpa-
tous.*

c Ceræ albæ. $\frac{z}{3}$ vj.

Mucag. tragacanthi.

Mucag. seminis coto-
neorum.

Mucag. seminis lini.

Mucag. radicis bis-
maluæ.Mucag. gummi arabi-
ci. ana $\frac{z}{3}$. β.Misce fiat unguen-
tum.

K 5 SCHO-

S C H O L I A.

Eram contractam una cum oleis in diplomate ad liquandum appones : statim butyrum cum axungis ut solvantur, in ceram liquatam injicies: demum oesypum, lignea spatula movendo: quibus dissolutis, & a diplomate sepositis & refrigeratis, mucagines radicum bismaluxæ, feminum lini, feminum cotoneorum, tragacanthi, & gummi arabici arte, probe, & separatim extractas, in mortario lapideo cum pistillo ligneo celeriter agitando, una cum supradictis paratis conjunges, donec formam habeat unguenti. Alii mucagines factas consumunt cum oleis, quod minime fieri debet. Omnibus itaque mixtis & junctis, optimeque incorporatis unguentum ad usum servabis.

Hoc unum hic est notandum, unguentum istud recens, quam vetus efficacius esse: quia si diu servatur vetustate luteum colorem, & rancorem, tum calorem acquirit, ob axungix in ipsum ingredientis, nisi diligenter absumatur lenta & longa coctione humidum excrementitium

muca-

mucaginum abluanturque axungia & olea, tum etiam nisi asservatur in pixide marmorea, in loco neque rancido neque calido: hoc vero potius ad temperandum & mediocriter refrigerandum comparatur: unde (salvo meliori iudicio) ubi usus illius requiritur recens componi debet nec asservari: licet id à multis pharmacopœis non observetur. Præterea notandum, Fuchsum lib. 2. de compositione medicament. Sect. 15. illud describere: sed in simplicibus quidem convenire, in ponderibus maxime variare, oleumque chamæmeli & anethi prætermittere propter caliditatem.

Axung. Porci, Galinæ &c.]

De tempore collectionis, de electione, præparatione, repositione, & differentiis ipsarum axungiarum, pinguedinum, & adipum, pariter de extractione mucag. satis aperte diximus hoc lib. Sect. 1. de ceratis & emplastris cap. 1. & 2.

V I R E S A Q V I B V S D A M
Medicis designata.

Dolores pectoris, & tussim mitigat, digerit, sputum faciliat, & pleuritidem resolvit.

C A P V T X V I.

*Unguentum citrinum in antidotario Nicolai in fine lib. Mesuæ scriptum, & à Myrepsō Sect. 3. de unguentis num. 42. re-
pertum V suale,*

Verus illorum textus.

a Plurimi codices legunt unc. ij. pro drach. ij.

a ℥. Boracis. ʒ ij.

Camphoræ. ʒ j.

Coralli albi. ʒ. β.

b Myrepsus habet drach. ij.

b Amianti dulcis. ʒ j.

Vmbilici marini.

Tragacanthi albi.

Amyli.

Christalli.

Antali. Dentali.

Olibani.

c Alii

Nitri. ana ℥ iij.

Marmoris albi. ℥ ij.

Gersæ serpentariæ. ℥ j.

Cerussæ communis.

℥ ℥ vj.

℥ *Alii codices unc.
j. legunt loco
unc. vj.*

Tere tragacanth. & umbilicos marinos in mortario marmoreo cū pistillo ferreo in simul, cætera sigillatim in eodem mortatio terantur, & cum panno subtili albo cribrentur, & cum

*d Myrepsus nul-
lum pondus axun-
gia porcine deter-
minat, ac sepum
caprinum & a-
xungiam gallina-
ceam in descriptio-
ne sua omisit.*

d Axungia porcina no-
vella albiss. ℥ j. β.

Sepi pecorini vel capri-
ni. ℥ j. β.

Axungia gallinacæ.
℥ j.

Con-

Confice sic. Caldarium plenum aqua super ignem bulliat, & caca-
 bus cum axungis in caldario pen-
 deat in ipsa aqua, & de ipso calo-
 re aquæ liquefiant axungiæ, & li-
 quefactæ per subtilem pannum al-
 bum colentur in catinum, & mox
 totus pulvis apponatur præter
 camphuram & boracem; cum
 spatula semper agitando, ut omniû
 bona fiat incorporatio. Hoc fa-
 cto in uno citro cavato vel duo-
 bus mittatur, & ponatur, cû spa-
 tula, semper agitando, bulliant,
 & cum incipit bullire, iterum in
 caldario ponatur, & cum spatula
 semper agitando, pulvis camphu-
 ræ & boracis, donec incipiat fri-
 gere agitetur semper, & cum in-
 frigidatum fuerit recondatur. Et
 nota, quod in lib. j. pulveris de-
 bent poni lib. viij. axungiæ.

Myrepsus loco jam citato sic
 conficit. Terantur in mortario
 cum

cum adipe iullo, & in cavato citri carmen adipe dissoluto, & sine ut coquantur ebullitione una in cavitate citri: postea accipiantur species supradictæ, tenuiter tritæ, & injiciantur in cavitatem citri cum adipe, & subacta probe reponere in vase, atque dato.

S C H O L I A.

IN mortario ex porphyrio, tum pistillo ex eodem porphyrio facto, corallum album, umbilicum marinum, cristallum, antalem, dentalem, & album marmor in minutissimas partes comminue; deinde seorsim super porphyrio molula è porphyrio succo limonum irrorato, ne quod tenuissimum est evanescat, ducantur, donec nulla prorsus asperitas sentiatur lingua admota, quod perfectæ levigationis verum est indicium: hæc ubi levigata fuerint, cætera simplicia ut cerusam, amiantum, boracem, nitrum, amyllum, tragaçanthum, gersam serpentariam, thus masculum, per se in pollinem rediges: redacta cum prædicto pul-

pulvere, prius parato, in eodem mortario porphyrio pistillo ligneo paulatim ducendo commiscebis: commixta omnia conservabis, quoad cætera sint præparata. Tunc axungias omnes optime collectas, & præparatas, in diplomate liquatas, coctalque una cum duobus aut tribus malis citreis in frustra divisis, non excorticatis (si odorem cum deterfione requiras) ad citreorum succi totius consumptionem (quia in his vis mundificandi) deinde per pannum lineum colatas, & refrigeratas pedetentim super pulveres prædictos semper pistillo ligneo ducendo affundes: desuper camphoram arte solutam conjunges ac commiscebis, donec omnia sint quam optime mixta, & tota mixtio & compositio agitatione instar nivis splendeat, quam fictili nitido diligenter servabis.

Circa hoc unguentum plura notare debemus: imprimis, istud non posse diu in suo statu servari propter rancorem & calorem, quem successu temporis acquireret. Quare (salvo meliori judicio) monemus pulverem per se in vase vitreo diligenter servandum & axungias præparatas in alio fictili reponendas, & cum usus erit necessarius modo sequenti componatur. Accipe pulveris prædicti ℥ vj. & axungia ℥
vj. que

vj. quæ dolis convenit cum ea, quæ scripta est apud Mesuen in antidotario Nicolai, nempe pro lib. viij. axungiaë, sumatur lib. j. pulveris. Satius tamen esset admiscere duplicatum pondus pulverum, ut fiat unguentum spissius & melius cohærens. Præterea observa Myrepsum omisisse axungiam gallinaceam, & sepum caprinum, & pondus axungiaë porcinaë, restitutaque fuisse ut in hac descriptione videre licebit. Cæterum & Alexandrinum unum describere tum ponderibus, tum simplicibus ab hoc maxime diversum satis constat.

Boracis.]

a A Græcis Chryfocolla, Latinis aurigluten dicitur. Arabice Tincar. Est autem duplex, Nativa & Factitia. Nativa in fibris & venis gignitur, aut plerumque arenæ similis reperitur, aut *b* materiaë metallicæ adhæret, atque inde abrasa cujusdam arenæ similitudinem gerit, & cum aqua lavatur, pulveri similis subsidet. *c* Factitia triplex, Una ex dura natura fit, tingiturque lutea herba, ob idque herbacea dicta. Alia, qua aurifices ad conglutinandum aurum utuntur, fit ex puerorum

a Chryfocolla duplex. *b* Chryfocolla nativa variæ species. *c* Chryfocolla factitia species tres.

rum urina : cujus conficiendæ modum perquitas apud Dioscoridem lib. 2. cap. 74. de urina hancque idem Dioscorides lib. 5. cap. 52. inter æruginem enumerat, vocatque æruginem scoleciam. Plinius Santernam nominat. Ultima, quæ fit ex nitro fossili. Plinius lib. 33. cap. 5. a Chryfocollam nativam esse ait humorem in puteos per venam auri defluentem crassescente limo rigoribus hybernis usque in duritiem pumicis. Serapius lib. aggregat. capit. Tincar. Chryfocollam in ripis maris nativam inveniri dicit, & esse ex speciebus falis, calidam & siccam in quarto gradu. Sane ad nos allata fuit Chryfocolla è Portugalia, proveniens (ut conjicio) in ripis maris, lutulenta fordida, admodum crassa & unctuosa, facile in aquam liquefcens, si in loco humido reconderetur, quam puto nostram esse chryfocollam usuaalem, si recte purgata esset. Platearius ait esse gummi cujusdã arboris nascentis in transmarinis partibus, quod in æstate fluit, & extractione caloris condensatur & induratur. Quid sit autem chryfocolla, ut plane intelligatur, dicamus autoritate Plinii lib. & cap. citato. b Nihil aliud est quam
vena

a Chryfocolla nativa quid, varia sententia.

b Chryfocolla propria quid.

vena putris, quæ pauca admodum in nostris officinis reperitur. *a* Probatum autem quæ è fodinis ærariis accipitur: proxime, quæ in argentariis fodinis invenitur: etiam & in plûbariis reperitur; vilior auraria. Unde, ut ingenue fateamur, dicemus authoritate Matheoli commentario lib. 5. Dioscorid. cap. 64. Chrysocollam varium sibi colorem vendicare, pro metallorum, in quibus foditur, ratione. Quæ enim in plumbeis accipitur, nigricat; quæ in argenteis albicat: & quæ in aureis, pallefcit. Deficiente vera, uti debemus nostra usuali quæ venetiis defertur, quæque etiam alba arte admodum sit. Memini me vidisse chrysocollam veram antiquorum, quam diligentissime Dominus Nicolaus Rassius lutetianus, vir quidam chirurgiæ peritissimus, & in simplicibus examinandis sagacissimus (ut & plura alia simplicia notatu digna) servabat, *b* colore subviridem, perlaminas separatam, crusta intermedia, habentemque notas à Dioscoride lib. & capit. prius citato distinctas,

Amianti.]

c Dioscorides lib. 5. cap. 113. amiantum
ait

a Chrysocolla electiones varia: *b* Chrysocolla vere electio. *c* De Amianto lapida varia opinionones.

ait esse lapidem, & in cypro nasci, scisso alumini similem. Plinius lib. 36. cap. 19. inquit Amiantum similem alumini, nihilque igni deperdere. Matheus Sylvaticus vult esse vitrum coctum, vel testas ovorum, ex quibus pulli à nido eruperunt. Theophrastus lib. 3. plantarum capit. 17. nomen arboris constituit. Alexandrinus lib. de compositione medicamentorum, secundum loca cap. 1009. confirmat opinionem Dioscoridis, & Plinii; & c. 1039. dicit se vidisse in unguento citrino gypsum coctum. Tandem verus Amiantus (ut conijcere possumus) *a* autoritate Dioscoridis, & Plinii, est similis alumini scisso, ex albo viridis, qui in fila deducitur utrinque lapide duro septus, saponem olente, qui in ignem projectus non uritur, ut nec alumen nostrum plumosum. Igitur, haud *b* dubie credendum est alumen nostrum plumeum vulgare, alteram esse speciem Amianti, cum parum differat ab Amianto lapide. Et quia locuti sumus de Amianto lapide: qui est alumini scisso similis dicamus quid sit verum alumen scyssum. *c* Est autem alumen verum scyssum,

a Amiantus verus quid, & electio. *b* Alumen plumosum nostrum, non est alumen scyssite Dioscor. Sed potest sub 2. specie amianti referri.

sum, a quod in fila deducitur, coloris subviridis, & nitentis, gustu valde astringens ad ignem liquabile.

Umbilici Marini.]

b Umbilicus marinus est lapis seu gemma coloris interdum rubei, aut candidi, in littore maris inventus: quibusdam umbilicus veneris dicitur, eo quod refert umbilicum puellæ formosæ rotundum, & quasi humani umbilici figuram. Hæc Chrystophorus Encelius Salveldensis medicus lib. 3. cap. 8. de Origine, varietate & natura corporum, lapidum, & gemmarum.

Christalli.]

c Secundum Albertum magnum, est lapis, qui aliquando fit à frigore, aliquando autem ex nive, sicut sæpe se expertum dicit. Qua in re Plinius Alberto consentit lib. 7. capit. 2. Gelu vehementiore concrefcit, nec alibi reperitur, quam ubi maxime hybernæ nives rigent, glaciemque esse certum est, quia impatiens est caloris. Mittit illud Oriens, India, Asia, Cyprus, juga Alpum. Julius Solinus improbat in polyhistore suo. capit. 20. Crystallum meram esse glaciem. Etenim si aqua concreta esset gelu
nec,

a Alumen scyffum, vel plumbeum verum quid.
b Umbilicus marinus quid; & unde nomen accepit. c De Crystallo va. ia sententia.

nec, Alabanda Asiæ, nec Cyprus insula, hanc materiam procreant, quibus regionibus incitatissimus calor est: immo etiam igni: vel solis fervore statim liqueſceret. Alii effodi ajunt ex marmorum saxorumque canalibus ac veru & aratro excitari, & ad torrentes deferri, reperiri que in venis tam metallicis quam propriis in multis regionibus. Diodorus lib. 3. antiquorum gestorum cap. de Indis, ait, esse *a* lapidem ex aqua pura ortum. & congelatum non quidem frigore, sed divini caloris vi, quam duritiem servat variosque suscipit colores. Proinde quid sit, & quo loco inveniat, in hoc Diodoro assentimur, fieri ex purissimo humore lapidescente in visceribus terræ, & concreſcere, ac tandem tractu temporis, pluviarumque impetu, quæ in præruptis montium universam deradunt terram, apparere. *b* Præstantissimum autem est album, aquæ clarissimæ modo perlucens.

Antalii.]

c Antalium est testaceum quoddam marinum, fistulæ modo longum, & concavum, foris strictum longitudine digiti parvi, cujus effigiem Matheolus inter bucina

cina

a Crisallum verum quid. *b* Crisalli electio.

c Antalium quid.

cina in lib. 2. cap. 4. Dioscoridis depinxit, ut videre licebit.

Dentali.]

a Dentalium est parva concha marina dentalem rimam habens, & à recentioribus dentalium appellatur, quod cum dentibus maxime caninis similitudinem habeat. Cæterum notabimus, hæc duo simplicia non esse lapides (ut plurimi volunt) sed potius è concharum genere. De his fatis Plinius lib. 9. cap. 36. de purpuris & buccinis.

Nitri.]

b Nitrum vel litrum ab Arabibus baurachi dicitur. Est autem nitrû res cognata sali, & veluti species salis. Hinc sal lucidum, sal Alexandrinû, sal Anderene, sal nitrum, unû & idem sunt. *c* Nitrum duplex. Nativum & Factitium. Nativum fit ex terra nitrofa, aqua perfusa & sole siccata, *d* Nec id aliorum fossilium modo cæditur, aut li-gone à montibus effoditur, aut ex terraneo specu excavatur, aut ex solitudine in campis concretum legitur. *e* Probatum nativum nitrum leve, colore purpureo, aut candido, in foramina dehiscens, quasi quid spon-

a Dentalium quid. *b* Niti varia appellationes.
c Nitri duo genera. *d* Nitrum nativum quid.
e Nitri nativi electio.

spongiosum, salsum, mordax, quale ex Brumis affertur. *a* Factitii nitri plura sunt genera. Unum ex nili aquis, nitrariis infusis, & quadraginta diebus exsiccatis fit : ut testatur Plinius lib. 31. cap. 10. De aliis generibus lege eundem Plinium eodem lib. & cap. Et Galenum lib. 2. de Simpl. medicament. facultatibus cap. 20. Ac de nitro hæc sufficiant. Nunc ad aphronitrum accedamus. *b* Aphronitri duo sunt genera. *c* Unum quod ex speluncarum cameris, stiriarum instar concretum pendet. Id quia in se terram nullam, vel gravitatem, aut crassitiem habet, optimum à Galeno & album appellatur. *d* Alterum est quod liquidum adhuc excidens in terram defertur. Id ob admixtam sibi terram grave est, terreamque crassitiem habet : ob id nigrius & deterius existit. *e* Plinius unum duntaxat facit, idque esse scribit, quod in speluncis, & antris mollibus distillans colligitur. Id, quia spumæ concretæ simile est, conjunctis duabus vocibus aphronitrum nominarunt : ut illud à spuma nitri, quæ non ita compacta & concreta est, sed aspectu triticæ farinæ similis :

a Nitri factitii genera plura. *b* Aphronitri genera duo. *c* Aphronitri primum genus. *d* Aphronitri secundum genus. *e* De Aphronitro Plinii apud lio.

lis : nam separatis nominibus spumam nitri Græci *αἰσφορίτης* dicunt. Alii, ut sal & spuma salis se habent adinvicem, ita volunt nitrum & spumam nitri, adinvicem se habere. Estque salis ad nitrum, & contra nitri ad salem eadem ratio. Item spumæ salis ad spumam nitri magna cognatio. *a* Cæterum spuma nitri, aphronitrum, flos petrae, vel parietis quod halinitrum dicitur (vulgo salpetrae) est res levissima, glebosa, friabilis, spumosa, mordens, coloris pœne *b* purpurei & hæc optima. Verum secundum Galenum lib.9. de simplicium medicament. facultatibus, spuma nitri, & aphronitrum in hoc differunt, quod spuma nitri aspectu triticeæ farinae similis sit : hoc est, laxa, dissoluta & candida : aphronitrum autem farinae speciem non habeat, neque ita dissolutum, aut laxum, sed concretum, coactum, & compactum sit : ut hinc pateat spumam nitri consistentia, quam aphronitrum, tenuiorem esse. Halinitrum autem colligitur ex parietibus, & rupibus vetustissimis, atque ut lixivium transcolatur, & igne concoquitur ex arbitrio artificis : coque utimur ad conficiendum pulverem tor-

L men-

a Halinitrum quid, & electio. *b* Spuma nitri & aphronitri differentia. *c* Nitri veri, spuma nitri & aphronitri, succedaneum.

mentorū & bombardarū . c Sed quia ad manū nitrum , aut aphronitrum , vel nitri spumam , habere non possumus , illorum loco vulgari nostro halinitro utimur , sed præparato , ut solet quotidie ab artificibus præparari .

Gerisæ Serpentariæ .]

a Est Cerusa . Per hanc autem cerusam intelligamus eam , factam ex radicibus dracontis minoris , vel ex radicibus ari , tamen radices ari non præstant secundum mentem Gal . lib . ii . simpl . med . ubi ita scribit . Arum terrena essentia constat , sed calida : proinde extergendi vim possidet , verum non valentem , sicut dracontium . Mesues sententiam confirmat Galeni in suis simplicibus capite de luf : b aitque luf crispum quod est dracontia minor , magis abstersivum quam planum . Igitur auctoritate Galeni & Mesuæ radices dracontis minoris potius hoc loco accipiendæ sunt , quàm ari radices : quæ conficiuntur in hunc modum . Radices dracontis minoris (quæ folio constat hederaceo , magno , candidis notis insigni , caule recto , bicubitali , versicolore , maculis resperso purpureis , ita ut anguen plane referat , baculi crassitudine , fructu

a Gerisæ serpentaria quid . b Dracontis minoris electis .

fructu summo in caule racematim cohe-
 rente: quam hodie nonnulli pharmaco-
 pœi male *a* majorem draconteam appel-
 lant, ut videre erit apud Dioscor. lib. 2.
 cap. 161.) hujus inquam dracontæ radices
 sufficienti quantitate tempore veris lectas,
 videlicet Julio, vel Augusto, secundum
 mentem Arnaldi de Villa nova, à terra
 lutoque mundabis, easque *b* depurabis &
 ad solem desiccabis ad humidi radicalis
 consumptionem. Desiccatae subtilissime
 in mortario marmoreo cum pistillo ligneo
 terantur, & in fictili vitreato ponantur:
 desuper aquæ rosaceæ quantitatem suffi-
 cientem affunde (nempe si sint ℥ xij. ra-
 dicū, aquæ lib. j. ℞.) intractādo leviter spa-
 tula lignea, ut imbuantur & commiscean-
 tur. Tum linteolo cooperiantur, ne pul-
 vis extraneus incidat: & soli exponantur
 ut siccētur, spatulaq; aliquoties moveātur.
 At ubi jam totum optime siccatum fuerit,
 tantumdem desuper aquæ rosarum iterum
 affundes, agitando ut supra: vasque coo-
 peries & soli denuo ad siccandum appo-
 nes. Deinde ubi totum rursus siccatum
 erit, adhuc tantumdem aquæ rosarum su-

L 2

per

a Quorundam pharmacopœorum opinio reprobata.
b Gersam serpentariam conficiendi modus.

per impones, ducendo ut prius spatula lignea, ac vas cooperi, & ad solem siccato. Hancque præparationem adhuc semel vel bis repetes, semper in sole siccando. Denique siccata[m] farinam pauco vino albo, & odorifero, aut succo citreorum immerge, & trochiscos effinge, quos in vase vitreo stricti orificii, ut facilius tegantur, ad usum repone. Alii cerusam vel gersam è radicibus draconteis, ut amyllum ex frumento conficiunt, uterque modus optimus, sed prior efficacissimus.

V I R E S E X A N T I D O T A R I O

Nicolai.

Pulchram reddit faciem, lentigines de facie tollit, nigredinem à sole inductam delet, & pustulas in quacumque parte corporis ortas falsi phelgmatis, mirabiliter reprimat & aufert: cicatricem in corpore subtiliat, leprosi faciem si ex eo unguatur multum emundat: rubori oculorum, pruritu, & pallori, & erysipelati conducit.

C A P U T XVII.

*Vnguentum ad scabiem expertum incerto au-
tore interdum Vsuale.*

Vera descriptio in codice manu
scripto reperta.

℥. Butyri recentis sine
sale.

Axungia porcinæ recentē.

Succi fumarie non de-
purati.

a Per sulphur
commune fa-
licitium intelli-
ge.

Sulphuris ʒ communis.
ana ʒ j.

Misce fiat Vnguentum.

S C H O L I A.

AXungiam porci collectam &
præparatam, secundum modum
à nobis præscriptum in empla-
stris, una cum butyro recenti in
mortario plumbeo pistillo pariter plum-

beo friandò contundes. Deinde sulphuris pulverem tenuissimum desuper insperges, semper pistillo ducendo, ut commisceantur: quibus rite mixtis, guttatim succum fumarix affundes, pistillo agitando ut prius, donec pars succi probe imbuta fuerit, hæcque agitatio repetetur quotiescumque succum alium immiscebis. Quantitate vero præscripta succi pedetentim injecta & omnino imbuta, spatio duarum horarum iterum totum, ut rite succus permisceatur, & ab eis non separetur subagitabis, sicque præparatum ad usum servabis.

[Sulphuris communis.]

a Sulphur Ghibur, vel Albusac Arabice dicitur. Aristoteles, Sect. 24. ultimo problemate ait antiquos vocavisse sulphur, sacrum: atque is idem sulphur appellat pabulum ignis subterranei. Est autem sulphur de genere metallorum mediorum secundum Fallopium lib. de medicatis aquis, atque fossilibus cap. 8. & secundum Christophorum Encelium Salveldensem Medicum lib. de Origine varietate, & natura corporum metallicorum, lapidum & gemmarum. *b* Sulphur, terra est, actione caloris exacte in essentiam sulphuream

com-

a Sulphuris varia nomina secundum Arabes & secundum Aristotelem. *b* Sulphur quid variæ opinioniones.

commutata aquosis terrestribus, & igneis trāseuntibus: vel pinguedo terræ in minera terræ per temperatam decoctionē inspissata, quousq; sit indurata, & sicca facta. Alii id generari ex purissima siccitate terræ, in qua omnibus modis prædominetur ignis, ajunt & quasi esse vaporem calidum, & siccum. *a* Tamen ut verum fateamur, sulphur est vera pinguedo terræ, in minera terræ per temperatam decoctionem inspissata; &c, ut satis doctè Fallopius & Christophorus Encelius lib. & cap. prius citatis docuerunt. Chymistæ principium, & patrem metallorum, & partem lapidis philosophorum esse dicunt. *b* Duplex autem sulphur. *c* Fossile seu Nativum, & Factitium. Fossile, effoditur in quibusdam paludibus & montibus Islandiæ & Græcis, ἄπυρον dicitur (id est) ignem non expertum vel quasi sine igne: à Latinis & Pharmacopœis. Vivum appellatur, quod ex vena sua sine aliqua coctura accipiatur, vel quod nondum liquefactum, & in frustula fufum sit. Matheolus in Comment. lib. 5. cap. 83. Dioscorides, ait effodi *d* aperto undique cælo, non autem

L 4

in

a Sulphur proprie quid. *b* Sulphuris generatio.
c Sulphuris nativi effusio. *d* Matheolâ opinio.

in cuniculis & subterraneis specubus .
a Probatum nativum seu fossile, & quod
 apyron vocamus, secundum Dioscoridem
 lib. & cap. citato, nitidulū ac fulguris mo-
 do splendidum, perlucens, minime lapi-
 dosum, quodque sit effossum: factitium,
 quod arte paratur perfectum, ignemque
 expertum. *b* Fit autem diversis modis.
 Nam aut ex aquis coquitur, aut ex gleba
 effossa, & in vasis coctis perficitur igni. De
 aliis modis conficiendi, lege Dioscoridem
 lib. & cap. citato. Fallopiū eodem lib.
 & cap. dicto. Christophorum Encelium
 lib. 1. cap. 2. de Origine, varietate & na-
 tura corporum metallicorum, &c. *c* Lau-
 datur factitium, extinctum, sive mortuum
 ita; quo enim virentius, quo magis oleo-
 sum & pingue, eo melius. Et hæc sunt,
 quæ novi & legi de sulphure: quod si plura
 voles, require apud Georgium Agricola in
 fine, lib. 3. fossilium. Plinium lib. 35.
 capit. 15. Avicennam lib. 2. capit. de Sul-
 phure.

V I R E S A B E O D E M A V T H O R E

manu scripto.

Scabiei & morpheæ, quod vulgus (mal
 de saint Main) appellant, maxime confert.

C A P V T

*a Sulphuris nativi electio. b Sulphuris factitii con-
 ficiendi variis modi. c Sulphuris factitii electio.*

C A P V T XVIII.

Vnguentum comitissi descriptum à Guillelmo Varignano. in tract. 16. cap. 4. de retentione menstruorum & oris matricis & excucatione ejus V suale.

Varignane textus verus.

℞. Corticum medianorum castanearum.

a Myrtillorum semen sume.

Glandium corticum medianorum.

b Per caudam caballinam, equinam intellige.

Arboris Gladium corticum medianorum.

c Gallas non perforatas, virides, & firmas intellige: eo quod acerbiores sunt perforatis.

a Myrtillorum.

b Caudæ Caballinæ.

d Cortices fabarum parvarum & nigrarum accipe.

c Gallarum.

d Corticum fabarum.

L s

e Or-

e Ozimorum vel arillo-
rum uva-
rum maturorum
cape, qui acini di-
cuntur, quia tunc
maturefcente uva
ficciores fiunt.

f Sorba immatu-
ra ad humidi con-
sumptionem sicca-
ta accipe.

g Mespila im-
matura, non au-
tem siccata cape:
ut nonnulli volunt
nam tantum ab-
est, ut siccati pos-
sint, ut putrescant
& maturefcant
magis.

h Per ana author
intelligit partes æ-
quales, videlicet,
unc. j. se.

i Ceram citrinam
accipe & per quã-
tumvis unc. viij.
se. intellige secundũ
exigentiam confe-
ctiois unguenti.

e Ozimorum vel aril-
lorum uvarum.

f Sorbellarum Sic-
carum.

g Mespilorum.

Radicum chelidoniæ.

Foliorum pruni sylve-
stris h ana.

Terantur grosse, & co-
quantur in

Aquæ plantaginis.
℥. viij.

perfecte, & colentur

. ergo i ceram
quantumvis.

dissolve cum

Oleo myrtino.

k Cum aqua prædicta, hoc est, prædicta decoctione.

l Castanearum cortices medianos accipe.

m Glandium, & arboris ejus cortices medianos sume.

n Gallas virides & non perforatas accipe.

o Per P. j. unc. j. intellige.

p Post ozimorum, alias arillorum, sequitur sorba & mespila & ommissa fuerunt à bibliopola, idcirco apponenda sunt unc. se. que faciunt P. se.

q Trochiscos de carabe, Varignana descriptionis scilicet, si reperiantur in suo antidotario, si vero non, trochiscos illos de carabe

& lavetur novies cum aqua prædicta, semper innovando quacunque vice, postea

℥. Corticum prædictarum / castanearum.

m Glandium, & arboris ejus.

n Gallarum. ana o P. j.

Cineris ossium cruris bovis.

Seminis myrtillorum.

Ozimorum alias arillorum, ana P. ℞.

p Terantur & fiat pulvis tenuissimus.

℥. ergo istius pulveris. P. ij.

q Trochisc: de Cara-

à Mesue descriptos. Et per P. se. vel P. j. unc. se. vel unc. j. intellige.

¶ Oleum mastichinum varignane descriptionis si in suo antidotario reperitur, si vero non invenitur scriptum, istud Mesues accipe, & per quod suffi. unc. iiii, intellige.

Nihilominus tamen si astringentius recuperetur intentione & scopo unguenti feliciter usurpare poterimus.

be. P. β. alias Par. j.

Misceantur, & cum prædicta cera & oleo myrtino, lotis, addito eis

¶ Oleum mastichinum non lotum quod sufficit.

S C H O L I A.

ANtequam ad methodum conficiendi hoc unguentum deveniamus, quid author velit intelligere, videamus. Cum dicit. Recipe ergo istius pulveris P. ij. Trochiscorum de Carabe P. β. alias P. j. &c. sic (ut mea fert opinio) intelligere debemus. Si Pharmacopœus nolit totam compositionem facere, sed partem aliquam, accipiat pro partibus duabus istius pulveris, trochisc. de carabe P. β. vel unam, ceræ lotæ novies

novies cum prædicta decoctione Par. vj. olei myrtillorum loti novies cum prædicta decoctione Par. xvj olei mastichini non loti P. ij. Sed si totum velit componere, assumat Par. j. β . vel tres trochiscorum de carabe, olei mastichini ζ iiij. cum prædictis ante paratis, reliquendo textū illum \mathcal{Z} . istius pulveris Par. ij. &c. Præterea satis nobis apparet, pondus & dosim simplicium, decoctionem ingredientium, ommissa fuisse: quare autem Varignana omiserit, ignoramus, & pariter dosim. ceræ, & olei: nisi forsan (salvo meliori iudicio) quia sunt menstruorum fluxus, aliis quam aliis vehementiores, aut parciores, unde aliis magis quam aliis, major, aut parciior requiritur astrictio; ea de causa dicemus præstantius esse ut qui hoc unguento voluerit uti, præscribat simplicia omnia pondera pro ratione fluxus menstrui, vel erratum traductori aut Typographo attribueamus. Tamen ne desit nobis hoc unguentum necessitatis tempore, propter pondera simplicium ommissa, consuevimus in nostris officinis hoc transcriptum à Præposito unguentum præparare, definitis, & determinatis ponderibus cujus descriptio talis est.

Præpositi vera descriptio.

℥. Corticum medianorum
castanearum.

Corticum medianorum ar-
boris Glandium, &
Glandium.

Myrtillorum.

Caudæ equinæ.

*a Inter cau-
dam equi-
nam & cor-
tices fabarū
Præpositus o-
misit gallas,
& addenda
sunt.*

a Corticum fabarum.

Acinorum uvarum.

Sorborum siccorum imma-
turosum,

Mespilorum immaturorū.

Radicum chelidonæ.

Foliorum prunorum sylve-
strium. ana ℥ j. ℞.

Teran-

S E C T I O II. 255
Terantur grosso modo &
coquantur in

Aquæ plantag. ℥. viij.

usque ad consumptionem
medietatis, & tunc

℥. Ceræ novæ. ℥. viij. β.

Olei myrtillorum. ℥. ij. β.

Misce & lava oleum &
ceram cum superscripta de-
coctione novies, semper
renovando aquam: & cum
hoc factum fuerit.

℥. Corticum castanearū.

Glandium.

Corticum medianorum ar-
boris Glandium.

Gallarum. ana unc. j.

Cineris ossium cruris bovis
b *Alia*

Myrtillorum.

Acinorum uvarum.

Sorborum siccorum.

ana ℥. β.

Trochiscorum de Carabe.

℥ ij.

b *Alii legunt unc. j. β sed si valentius, astringentius expectemus, legendum erit unc. ij. se. vel iij.*

Pulverisentur subtiliter, pulverisanda, & cum prædictis cera & oleo lotis cū supra dicta decoctione fiat unguentum. Hic finitur textus Præpositi: nunc accedamus ad veram methodum conficiendi.

Unguenti hujus conficiendi vera methodus.

Recentia simplicia, secundum naturam, quam in se habent (nam alia aliis citius vel tardius recuperantur) tempore & loco collecta, crassiuscule in mortario æreo, cum pistillo ferreo, ordine trita in lib. viij. aquæ plantaginis, ad mediæ partis consum-

sumptionem coquantur : ut cortex medianus arboris quercini, acini uvarum, radix chelidoniæ, mespila, sorba, cauda equina, semen myrtillorum, pruni sylvestris folia, cortices fabarum, mediani glandium, castanearum cortices, & gallæ: quæ omnia ubi recte cocta erunt, duarum horarum spatio in infusione permittes : signum autem perfecte coctionis, & infusionis tale est. Accipe gladium maxime nitidum & politum ex ferro factum, immitte in decoctum : a si cum extrahis sit lividius, & nigrescens cum adhæsione difficulter eluibili, tum concoctio, & infusio perfecta & peracta, quam infusionem mediocriter calidam velociter extorquendo colabis, & colaturam in novem partes divides : postea ceram minutatim incisam, una cum oleo myrtino in diplomate liquatam, & adhuc calentem lavabis cum prima parte colaturæ calidæ, agitando ac versando donec totum refrigeretur : deinde vase duplici liquabis, & refrigerare permittes aquam, quam subsidentem ex lotionem dejicies : eâ ejecta ceram iterum eodem vase, eodemque igne liquabis : & cum secunda parte decocti calidi lavabis, tractando ut prius, donec frigescat : & aquam

ut

a Decoctionis hujusce ungenti signum.

ut antea dejicies: sicque septies etiam iterabis, donec nulla pars prædictæ colaturæ supersit: postremo totum probe ablutum in diplomate liquabis, & pulverem tenuissimum ossium cruris bovis duriter agitando immiscebis: paulo post pulveres sequentium pertenues & in pollinem redactos, ordine, ut corticum mediorum arboris quercini, & mediorum corticum glandium, corticum mediorum castanearum, gallarum, sorborum, mespilorum, seminum myrtillorum, acinorum uvarum, insperges: desuper trochiscos de carabe celeriter & diu agitando conjunges, & subiiges: subactaque omnia simul & complexa ad consistentiæ spissitudinem servabis ad usum. In hoc animadvertendum Varignanam in pulvere hujusce unguenti sorba & mespila omisisse, & Præpositum in eodem pulvere mespila, & gallas in decoctione, quas addere oportet post caudam equinam, cum decoctionem parare volueris, & mespila addere convenit cum pulvere dicti unguenti. Præterea Varignanam in suo textu scribere. Et lavetur novies cum aqua prædicta semper innovando quacumque vice, &c. Revera melius (pace aliorum dixerim) ac præstantius esset hoc unguentum, si non ejiceretur decoctum

coctum, sed potius cum eo misceretur: quod certe fieri non potest, si in promptu egeamus: si vero conservare velimus, nequimus quia brevi temporis spatio ob decoctionem corrumpetur, & rancidum redderetur. Cæterum fieri non potest hoc unguentum nisi mense septembri, vel octobri, propter multa simplicia, quæ tantum his duobus mensibus in suo statu reperiuntur. Caveat porro pharmacopœus ne in grumos abeat hoc unguentum cum volet simplicia probe trita miscere: & si forte fortuna abeat in grumos, sic restituere poteris. Accipe setaceum & pedetentim unguentum grumatum super dictum setaceum spatula lignea fricando transcola, donec totum sit transcolatum. Hoc namque pacto restitutum erit, nec ulli grumi apparebunt.

Cineris ossium cruris bovis.]

a Ossa in cineres redigenda, aptius interlunio colligi debere videntur: quod nimirum lunæ incrementum aut decrementum, corporis totius partes imitentur. Nec vero dubium est quin interlunio solidæ omnes partes quam plenilunio, longe sint sicciores. *b* In cinerem autem hac me-

a Quo tempore sunt colligenda ossa cruris bovis ad cineres faciendos. *b* Ossium cruris bovis ustio.

methodo ossa convertes. Vas figulinum accipito, & ossa recentia, contracta, carne carentia, cruris bovis, in dicto vase imposito, vasque furno fusorio circumcirca carbonibus accensis adaptetur & illic dimittatur, semper ignem continuando eoque dum dicta ossa alba appareant absque ulla nigredine & friabilia digitis sentiantur, quod vere signum adustionis est: sic adusta diligentissime ad usum illa servabis. Sicque cætera ossa animalium ad cinerem faciendum debent eligi & aduri.

Olei myrtillorum.]

Scilicet ℥. ij. β. Alii mastichinum & myrtinum æquis partibus sumunt. Magna est contentio inter nos pharmaco-
pœos, cum hoc unguentum parare volumus, quale oleum myrtinum debeamus accipere, compositum, an simplex, cum de eo nihil determinet Varignana, neque in suis tractatibus aliquam olei myrtini descriptionem assignarit. Quidam sentiunt, & affirmant accipiendum esse oleum compositum myrtinum, ex descriptione Alexandrini, quod Præpositus in suo dispensario scripsit: sed (pace dixerim) perperam: nam oleum myrtinum compositum Alexandrini continet crocum, quod maxime menses educit: quod certe est præ-
ter

ter scopum : nam ad sistenda menstrua unguentum componitur : ergo myrtinum oleum compositum à Nicolao Alexandrino & Præposito minime conferet: nam poros & meatus reseraret & aperiret & non astringeret . ratione croci : sed sua se tuentur ratione dicentes : unguentum omnino astrictivum esse , nec simplicia astringentia , quæ in unguento ponuntur, posse operari, & ad partes deferri, sine aliquo vehiculo & deferente : & hac ratione oleum myrtinum compositum usurpant, ut crocus sit pro vehiculo, & vim aliorum sua subtilitate deferat, & ad agendum excitet. Tamen (salvo eorum judicio) existimo , ut Luminare majus sect. 10. de cêratis & unguëtis testatur, simplex oleum à Mesue descriptum 12. distinctione de oleis sumendum, cum scilicet non sit opus dilatatione meatuum , sed omnimoda astrictione . Nihilominus medicorum ratiocinantium esto ea de re judicium.

V I R E S A D O C T O R I B V S

Medicis notata.

Incœptum abortum prohibet: hæmorrhoidas sistit, ac laxatos lumbos conciliat.

C A P V T XIX.

*Vnguentum mundificativum de apio autbo-
re incerto: interdum V suale, & mihi fre-
quens.*

Verus textus in codice manu scripto
reperitur.

℞. Absinthii nostri vulgaris
foliorum.

Foliorum solani hortensis.

Foliorum portulacæ sativæ,

Caprifolii. Mille folii.

Poligonii maris.

Sempervivi minoris cum al-
bis florib.

Foliorum plātaginis majoris.

Radiciis rubiæ majoris.

Semper vivi majoris.

Foliorum betonicæ.

Foliorum verbenæ.

ana M. iij.

Foliorum apii. M. v.

Foliorum pimpinelle.

Florum hyperici.

Foliorum Galiopsis. id
est, urticæ fœtid.

a Per rostrum
porcinum, den-
tem leonis vel ca-
ninam herbam à
quibusdam ca-
put monachi di-
ctam, sume.

b Simphytum
petraum, Dio-
scoridis scilicet,
quodque habet
folia thimi, &
origano tenui si-
milia, intellige.

Centaurei minoris sum-
mitatum.

Foliorum pilosellæ.

Foliorum chelidonix.

ana M. j. ß.

Foliorú a rostri porcini.

Foliorum b simphyt pet-
træi. ana M. ij.

*c Simphytum
majus illud
quod aliqui
pecton vocant
cape.*

S E C T I O II.

Radice c simphyti majoris. ℥. v.

Pistentur herbæ & radices & bulliant una cum

Succi peti. ℥. ij. &

Olei communis veteris.
℥. ix.

ad consumptionem humiditatis herbarum & succi, tunc colentur colaturæ adde

Ceræ citrinæ. ℥. ij.

Sepi Caprini.

Resinæ puræ. ana ℥ xij.

Terebinthinæ communis.
℥ ix.

Misce fiat unguentum.

S C H O L I A.

Secundum veram collectionem, nempe cum tempus opportunum erit, herbæ recentes legantur, & nitidæ mensuratæque incidantur ordine, & in mortario lapideo vehementissime tundantur. Deinde in fictili stricti oris bene cooperto, cum quantitate olei prædicta, & succi peti, spatio unius diei, ut infundantur, igne lento fovebis. Infusione peracta eodẽ igne ad totius humidæ aquei herbarum, & succi peti consumptionem coques: quo humido consumpto, panno cannabino maxime rudi calide totũ velociter extorquebis: colatum igni prædicto unã cum cerã confracta & sepo caprimo, ut liquecant, appones: paulopost resinam pariter divisam, spatula ducendo. His liquatis, & ab igne depositis terebinthinam addes. Hoc itaque modo mundificativum de apio arte erit paratum, quod ad usum servabis. Augusto & septembri mense confici debet, eo quod hoc tempore herbæ maxime vigent.

In hoc maxime notandum chaos esse apud nos pharmacopœos, & tantam diversitatem ad mundificativum de apio

M

con-

conficiendum . Nam plurimi sunt qui ex aloe , mirrha , sarcocolla , terebinthina & melle rosato conficiunt . Alii ex terebinthina , & melle rosato : alii unguento Ægyptiaco , & apostolorum utuntur pro mundificativo . Sed (ut verum fatear) nullum mundificativum debemus tenere paratum , pararique debet secundum exigentiam morbi , simplex vel compositum . Nam in dies magis minusve morbus mundificatione indiget . Igitur censerem mundificativum componi , cum à medicis & chirurgis indicitur , pro ratione morbi .

V I R E S A Q V I B V S D A M
probatae.

Ad ulcera emundanda maxime prodest.

C A P V T XX.

*Unguentum Neapolitanum maxime expertum
authore incerto : Interdum V suale.*

Vera descriptio in codice manuscripto
reperita.

℞ . Radicis althææ.

Radicis ireos nostratis.

Radicis

Radicis inulæ campanæ.

Radicis bryoniæ.

Radicis lapathii acuti.

ana ℥ iij.

Foliorum salviæ.

Rosmarini. ana M. j. β.

Fumariæ.

Scabiosæ cum toto. ana. M. ij.

Incidantur radices minutim & cotundantur, herbæ simili modo, & omnia in

Vini albi odoriferi. ℥. iij.

Aquæ fontis. ℥. j. β.

spatio sex dierum, infundantur, bulliantque una cum

Butyri recent. sine sale. ℥ iiij.

S E C T I O II.

Axung. porcinae veteris non
fœtidæ. ℥. j.

Olei communis veteris.
℥ iiij.

ad consumptionem vini &
aquæ, exprimantur & infri-
gidentur, addendo

Theriaces veteris. ℥ j. β.

Mithridatii veteris. ℥. j.

Sulphuris vivi. ℥ ij.

Argenti vivi extincti cum te-
rebinthina. ℥ vj.

His omnibus additis, diu-
que agitatis in mortario to-
tum ad usum reconde.

S C H O L I A.

IN prædicto vino albo & aqua, radices omnes tempore convenienti lectas, & à sordibus repurgatas, minutim incisas, ordine, in mortario lapideo, pistillo ligneo, multum contundito: pariter fumariam, scabiosam, salviam, & rosmarinum: tum hæc omnia ubi contusa per se erunt, sex dierum spatio in fictili stricti orificii obturato, infusioni adaptentur, igne levi & tardo ut melior omnium fiat infusio, & penetratio (melius tamen vinum igne, ne acescat, nō calefcere.) Septimo autem die eodem igne coquantur, ad mediæ partis consumptionem spatula movendo. Ubi cocta fuerint, & dum adhuc calent linteolo aspero in aliud vas contorqueantur & exprimantur: in colaturam adhuc calidam oleum, butyrum, axungiam porcinam, ut liquefiant, injicies, & ad alteram humidi partem concoques: coctis refrigeratisque, theriacam & mitridatium immiscebis, perpetuo spatula movendo: paulopost tenuissimum pulverem sulphuris, denique argentum vivum (prius tamen à sordibus

defæcatum & tranſcolatum vide ſupra hac Sect. capit. 10. in mortario cum terebinthina extinctum & optime incorporatum cum aliis ſubiges & permiſcebis: hocque totum, ubi probe ſpatio unius diei agitatum fuerit, in pixide terrea ſervabis. Hyberno autem tempore conficiatur propter radices.

V I R E S A Q V I B V S D A M
Medicis Probate.

Eaſdem enim facultates obtinet ut emplaſtrum de vigo cum mercurio ſupra ſcriptum.

C A P V T XXI.

Unguentum Aregum Myrepsi ex Sect. 3. num. 48. Uſuale.

Textus Myrepsi verus:

a Rosmarini ſummitates emergentes cum florum eruptione intellige:

b Per Sampſuchum, majoranam cape:

c Iridis Illirica radices re-

a ℥. Rosmarini.

b Sampſuchi.

c Iridis.

centes sume, si secundum Myrepsi intentionem parare velis, ita quoque radices jari in medio autumnii collectas, si secundum mentem

Prepositi: nam legit radices jari.

d Serpilli & ruthæ folia sume.

e Radicis malvæ agrestis loco, legit Prepositus radiceis sciscidis (quod plures interpretatur cucumeris asinini)

& per quartam, drach. j. Grana xv. intellige.

f Salviæ & Sabinæ folia accipe.

g Pulicariæ majoris & minoris, & radiceis brioniæ, inter sabinam & laureolam Prepositus capit.

h Calamintham montanam sume.

i Foliorum sciscidis, inter calamintham & mastichen Prepositus sumit.

k Thus masculinum vel olibanum accipe.

d Serpilli.

Ruthæ.

e Radicis malvæ agrestis. Singul. ℥ij. ʒij. & quartā partē.

Foliorum lauri.

f Salviæ.

Sabinæ. Singul. ℥j. β.

g Laureolæ. ℥iiij. β.

h Calaminthæ. ℥iiij.

i Mastiches.

k Thuris. Singul. ʒiiij.

Pyrethri.

I Euphorbium media aetatis accipe, quia scopus unguenti est calefacere.

m Per Exagia iiii. se. drach. vj. cape: quid autem sit exagium Graecum vide supra cap. 14. in hac sect. 2.

n Oleum moschaeellinum videtur esse apud quosdam oleum muscellinum, quod plurimi interpretantur de been, quod ego non puto. Et per exagium. j. & sem. drach. ij. cape.

o Per oleum sanctae Barbare, istud oleum quemadmodum Myrepsus descripsit accipe, si vice petrolei excipere vis.

p Oleum laurinum per expressionem intellige, non autem nostrum vulgare, quod conficitur ex axunguis porcinis, foliis, baccisq; lauri simul tritis, & coctis, cujus olei per expressionem facti, meminit Dioscorides & Myrepsus, ut perfectior sit compositio & calidior intentionis.

I Euphorbii.
Singular. ℥. β.

Zinziberis.

Piperis communis.

Singular. m Exag.
iii. β.

n Olei moschati. Exag. j. β.

Petrolei aut pro eo o olei sanctae Barbare.
℥. β.

Adipis ursini.

p Olei laurini
Singular. ℥. j. β.

q Butyri, an recens, an vetus sit intelligendum, nemo explicat, si tamen permeandi & porros subeundi materiam requiras, item & digerendi pro scopo unguenti, videtur eligendum vetus, quemadmodum & Galenus oleum vetus ad easdem intentiones præferre solet.

r Oleum olivarum vetus accipe.

f Ceram naturaliter albam ponticam accipe, & per quartam partem, libra, unc. iij. accipe.

q Butyri. ℥. ij.

r Olei communis. ℥. ij. ℞.

f Cerae albæ puræ. ℥. ℞. & quartā partē.

Herbæ unacū radicibus projiciantur in vinū die uno : altero vero die eximantur, & in mortario probe tūdantur : dein in oleum injiciantur & illic diebus septem permittantur. Postea probe decoquantur & colentur, rursusq; bulliant, atque

M s im-

S E C T I O II.

imponantur butyrum, adipēs,
 & cera, omnibusque liquatis
 injicito sanctæ Barbaræ oleū,
 moschatum, & laurinū: dein
 imposito Thus, zinziber,
 piper pyrethrum probe trita.
 Omniaq; simul bene in mor-
 tario subacta tollantur & in
 vase recondantur.

S C H O L I A.

Fertili tecto radices malvæ sylve-
 stris & iridis per se minutim in-
 cisas, ac probe in mortario lapi-
 deo cum pistillo ligneo tufas im-
 pone: desuper separatim quæ sequuntur in
 idem mortarium velociter trita conjice,
 ut rutham, laureolam, fabinam, salviam,
 lauri, sampsychi, & calaminthæ folia, ser-
 pillū, & summitates rosmarini: spatioque
 octo dierum una cum vini rubri ℥. viij.
 ad macerandum appone. Nonnulli tepi-
 dum aut calidum esse liquorem infusionis
 volunt: tamen melius vinum non inca-
 lescere igne ne accescat: nam per se ignem
 sine calore satis retinet, & exprimit, &
 fer-

fervorem excitat. Sequenti vero die ad mediæ partis consumptionem igne lento concoque, spatula aliquoties ducendo. Deinde oleum commune prædictum in decocto adjicies (alii oleum, butyrum, una cum adipe ursino, & vino, coquunt) rursusque omnia coques donec totum vinum evaporatum, & aqueus humor herbarum in vaporem resolutus fuerit, ut prius spatula inter coquendum movendo. Postea probe per saccum cannabinum torquendo calide exprimes. Expressioni vero butyrum, & ursinum adipem, ut liquentur, addes. His liquatis iterum igni lento expressionem mixtam cum butyro & adipe ursino appones, statimque ceram divisam ut liquefiat injicies: liquatam, ab igne depones: mox oleum laurinum, moschatum seu moschelimum, & petroleum commiscebis, celeriter subinde movendo, quousque omnia rite frigescant. Ubi omnia refrigerata fuerint, pulveres tenuissimos radicū pirethri, zinziberis & piperis insperges, desuper thuris, & mastiches pulverem sepatatim, factum, permiscebis: ultimo euphorbium, quam tenuissime pulverisatū, addes. Totum subactum ad usum recondes. Maxime autem in hoc parando unguento notandum nullam descriptionem

nos debere accipere, præter istam, quæ à Myropso descripta est: nam is & primus illam descripsit, & dosis simplicium optimam habet proportionem, respectu aliorum qui hanc descripserunt. Præpositus quoque hanc describit, & radices jari, loco radicum iridis, radices sciscidis & folia, loco radicum malæ sylvestris, usurpat: bryoniam præterea & utramque pulicariam, ultra hanc Myrepsi, adjungit: atque ingredientium pondera ex dimidio contrahit: quorum fere nullum respondet ponderi à Myrepto descripto. Rursus simplicia Præpositus in oleo absque vino infundit, proclivi quidem lapsu, attamen non negligendo. Itaque id unguentum componentes falli nolumus.

VIRE S DESIGNATÆ A

Myrepto.

Ad omnem dolorem stomachi & ventris. ad uterina mulierum mala, distentiones, quartanas, comitiales, spinæ dolores, & renum valet. In quartana ante invasionem utiliter eo spina & scapulæ inunguntur.

C A P V T X X I I .

Vnguentum de Tutbia, quod oculorum affectibus confert, auctore incerto, mihi frequens & Vsuale.

Vera descriptio manu scripta.

a Per pompholygem, quintam speciem cadmia Dioscoridis (quæ crispintis dicitur) lota nqne intellige . Modum autē lavandi vide supra in ista sect. ca. 11. ubi agitur de plumbo, nam ut lavatur plumbum, sic cadmia & pompholix lavantur.

b. Per Trochiscos albos, illos quos descripsit Rhasis accipe.

a ℥ . Pompholygis lotæ. ʒvj.

Stibii crudi usti & loti. ʒj.

Sacchari candi. ʒ . β .

b Trochiscorum alb. ʒ ij.

Butyri recentis sine sale loti. ʒvj.

Misce fiat unguentum cū lapide calaminari.

S C H O -

S C H O L I A.

Confice sic: Sumito lib. β . lapidis calaminaris, eamque in quatuor parteis divide, ita ut pars una non excedat aliam. *a* Prima autem pars igni incandescat: ignita in \mathbb{H} . j. aquæ rosarum, in qua prius coxeris foliorum ruthæ nostræ hortensis \mathbb{Z} . β . & foliorum foeniculi \mathbb{Z} j. extingatur. Tunc illa prima lapidis pars abjiciatur. Deinde altera pars in eodem igne ardescat, & in prædicta aqua rosæa restingatur, & restincta deijciatur: Rursus aliæ duæ partes, quæ restant ut prius singulatim incendantur, & in aqua supradicta extinguantur & ejiciantur. Tunc aqua per lineum pannum nitidum coletur: ac in eadem aqua, butyrum pluribus ante vicibus aqua communis elotum, (aquam illam communem semper abjiciendo) longa agitatione penitus commisceatur: quod fiet, si aqua sensim butyro instilletur, non autem affundatur: alioqui enim vix unquam incorporantur: dein pompholigem & stibium

a Ignem carbonum prius accensurum alique fumo. antequam lapidem calaminarem recipiat accipe.

stibium optime lævigata (ut in superioribus emplastris & unguentis lævigationis modum docuimus) butyro, ita cum dicta aqua rosacea incorporato, inspergas: de super saccharum candum rite pulverifatam, & albos trochiscos in pollinem reductos adjice. Omnia denique commixta ac subacta, scilicet in mortario plumbeo cum pistillo ex eadem materia facto, ad usum in pixide figulina vitreata servato.

Adde $\bar{3}$. i. β . olei amygdalarum dulcium sine igne & recens facti, pluribusque vicibus cum æquis partibus aquæ rosacæ & scœniculi loti semper inter lavandum abjiciendo aquam proquacumque vice.

Stibii crudi usti & loti.]

a Stibium, stimmi, antimonium, unum & idem significant. *b* Est autem stibium secundum Plinium lib. 33. capit. 6. lapis spumæ candidæ & nitentis, non tamen translucentis. Brassavolus vult esse plumbum: Alii lapidem plumbarium referre, magis tamen quam plumbum nitet, aut radiat, & magis friabile, manusque tingens. Alii marchestam librariorum vel impressorum. Mathæus Sylvaticus lib. pan-

a Stibii varia appellationes. *b* Stibium propria quid; Stibium quid; varia sententia.

pandectarum cap. 24. ait esse venam terræ similem plumbo. Serapius lib: aggregat. cap. aitrud. idem cum Sylvatico sentit. Alii metallum esse asserunt eo quod eliquatur ut alia metalla, & quia facile cum ipsis metallis commiscetur. Ex his variis sententiis, Plinii sententiam sequamur. Nam stibium est de genere fossilium quæ sapiunt naturam, & metalli & lapidis. Quatenus enim liquatur ut metalla, sapit naturam metallorum; quatenus autem friabile, est revera de genere lapidis & metalli. *a* Duo ejus genera reperiuntur: mas & fœmina. Mas horridior scabriorque, & minus ponderosus minusque radians: Fœmina contra nitet, friabilis, fissurisque non globis dehiscens. Quæ discrimina possunt optime demonstrari in fodinis Germaniæ ubi maxime abundat, ut à quodam amico Germano doctissimo accepi se utrumque fodisse. *b* Præstat autem stibium fœmineum, splendidissimum, nitidum, in contractu crustosum, terræ & calculorum expers. Raro hodie fossile in nostris officinis habetur: excoctum vero seu eliquatum habemus. Uritur & lavatur in hoc unguento ad sulphureas & acres partes tollendas: vel propter acredinem à sulphure

a Stibii duo genera. *b* Stibii optimi electio.

phure contractam : ne oculis noceat : quæ
ustio & lotio talis esse debet. *a* Quanti-
tatem quam voles stibii accipito, & in
pollinem tenuissimum reducito : deinde
in fictile amplum non plumbatum, con-
jicito : tum demum carbonibus accensis ad
calcinandum caute exponito, quoad cor-
puscula illa, quæ *b* emicant, splendorem
suum amiserint, vaporque sulphuris om-
nis cessaverit, foetorque obsoleverit, inter-
dum tamen spatula ærea movendo. Sti-
bium autem in calcem conversum subal-
bicantis cineris faciem contrahet. Tunc
℥.iiij. istius calcis in pollinem rediges &
in vini albi veteris ℥.ij. in fictili cooperto
trium horarum spatio macerabis : & infu-
sione peracta vinum evaporabis paulatim
super cineres calidos ad stibii siccationem,
siccatum itidem in ℥.ij. lactis mulieris
pariter macerabis, & lac super cineres cali-
dos consumes. Consumpto lacte & stibio
siccato, aliud lac affundes, & iterum sti-
bium macerabis, eodē igne, ad lactis con-
sumptionem, consumpto lacte desicca-
tum stibium novies vel decies in æquis
partibus stillatitiæ aquæ rosarum & fœni-
culi,

a Stibii ustio & lotio secundum hujus unguenti sco-
pum. *b* Per caute intelligendum, ut ignis parvus
& admodum exiguus sit cum calcinatur.

culi, semper abjiciendo aquam, & aliam stillatitiam innovando in mortario lapideo ablues, Atque hoc modo stibium ustum & ablutum & siccatum reconde, tuteque ad oculorum affectus utere. Dioscorides lib. 5. capit. 59. alium torrendi & exurendi modum docet. Plinius quoque loco supra citato aliam methodum torrendi exhibet: hos tu modos poteris diligenter observare si nostra non sufficiat præparatio.

Cæterum hujus unguenti nulla est authoritas, sed experientia multa & bona.

V I R E S A Q V I B V S D A M

Medicis. probata.

Maxime ad oculorum affectiones & ad hebetudinem confert, fluxiones & inflammationes sistit.






D. E.

O L E I S.

S E C T I O II.


 Vandoquidem superiori sectione unguenta universa, quæ passim in officinis habentur in usu, qua fieri potuit diligentia & brevitate à nobis explicata sunt: nunc ordine ad oleorum conficiendorum methodum accedendum: quorum subiectum & materia eadem est cum materia unguentorum & emplastrorum, cū ex quacunque re habeatur oleum, sive simplex, sive compositum. Simplex aliquando sponte, ut petroleum: aliquando per expressionem sine aliqua additione, ut ex simplicibus quæ succum

cum habent oleaginosum, quemadmodum ex tritis olivis maturis, vel immaturis, quod maxime & proprie oleum à Sylvio appellatur: item ex nucibus, amigdalibus, seminibus, & consimilibus, ab eodem Sylvio oleum abusive nuncupatur. Compositum vero aliquando per infusionem in oleo communi, vel in alio, in sole, vel igne lento coctum cum expressione fit: ut rosatum, violatum, chamæmelinum, anethinum & similia. Aliquando per resolutionem coctione & expressione, sine ulla additione, ut oleum ovorum, de frumento. Aliquando per artem chymisticam, hoc est, per ascensum, vel descensum, ut oleum de cera, butyro, axungibus, lignis, seminibus, & consimilibus. De quibus omnibus nobis est agendum, dempto oleo communi, seu maxime proprio, quod omnibus notum est. De aliis igitur quantum rei scopus & ratio exiget dicemus.

DE OLEORVM GENERE
secundo quod à Sylvio oleum
abusive appellatur.

C A P V T I .

*Oleum Amygdalarum dulcium à Mesue
descriptum xij. distinctione de oleis Vsuale.*

Verus Mesuæ textus.

℥. Ex amygdalis mun-
datis ab utroque cortice
a quantitatē quam vo-
lueris.

a Per quantita-
tem quam vo-
lueris, intellige
lib. j. vel ij. vel
ij). ut res postu-
labit.

b Per Pastones,
intelligit, ut ha-
beant formam
pastillorum.

c Per zaynari-
um, torcular in-
telligit, vulgo,
(presses.)

Et tere contritione
ultima, & fac b pastones
ex eis, & dimitte in lo-
co calido per spatium
circiter horarum quin-
que, deinde iterum tere,
& pone in c zaynario, &
stringantur, & exprimā-
tur & emanabit oleum.

d Per

Si autem in vase duplici circiter per horæ spatium coxeris, deinde expresseris in zaynario, emanabit abundantius. At si amygdalis tritis sacculos impleveris, & sub cinere calido, aut arena calida inter pannos sepelias, & postea expresseris, abundabit oleum. Modus *d* operationis alius est. Malaxentur in *e* tina, sicut pasta malaxatur, & sit domus in qua malaxantur, calida, & fundatur desuper aquæ calidæ parum, & stet *f* pila declivis ubi emanat oleum: & dum sic expresseris abundabit. Zaynarii autem planta inferior sit habens concavitatem &

d Per modum operationis, confectionē manuarum intellige.

e Per tinam, vasculum aliquod intellige.

f Per pilam intellige mortarium vel tale quid.

g. Per emuncto-
rium, intellige
epistolium vul-
go (gouillet.)

g. emunctorium in parte decliviori, & in inferiori parte sit globus juxta formam capacitatis concavitatis, ut sigillet omni hora ambitu vacui. Hic ergo erit modus formæ ejus.

S C H O L I A .



Mygdalarum *a* dulcium, quæ recentes sint, amplæ, dulces, nec rancidæ, à cute membranosa expurgatarum lib. j. vel ij. vel iij. accipe: eas in mortario lapideo nitido, pistillo ligneo contritione ultima contunde (alii in mortario æreo illas cotundunt) deinde panno aspero cānabino involue & in zaynari, id est, torculari ad exprimendum inter moras vel paulatim imposito: ne si subito & violéter comprimas, oleum sit turbidum & fœculentum: hoc namque modo oleum pellucidum, admodumque dulce habebis: quo recenti & non antiquato ad internas & externas corporis partes

a Amygdalarum dulcium electio.

tes uti poteris quia vetustate ob aeris intemperiem incalescit.

Amygdalis Mundatis à utroque.]

a Purgantur amygdalæ, ut purius fiat oleum à cute membranosa sic. Torreantur & deficcantur in amplo fictili, aut in sartagine cum quadam quantitate sulfuris mundi igne lento, manu versando atque agitando, donec cortex scindatur & rumpatur calore: deinde cribrare oportet, ut à sulfure purgentur: tum in sacco ex linteo novo & aspero confricare, & confricando à cortice mundabuntur. Alii habent aquam puram frigidam in fictili mūdo, & in ea amygdalas dulces spatio sex horarum ad macerandum imponunt, quas postea facile manu denudant: ubi denudatæ fuerint inter duo linteamina spatio trium aut quatuor horarum desiccari permittunt: postea oleum in modum prædictum conficiunt. Uterque modus optimus, sed prior altero excellentior. Cæterum minime dubium esse debet, hoc genus olei in quotidiano usu esse, necnon ab omnibus medicis quotidie præscribi. Necessarium ergo erit amygdalas diligenter præparare, ne propriam & insitam qualitatem deperdant: quæ (authoritate Mesuæ eadem distinct.

a Amygdalarum purgatio seu decorticatio.

stinct. Præpositi lib. 2. particula 13. Fuschii lib. 2. sect. 14. Matheoli lib. 1. cap. 33. in Dioscoridem) posset facile immutari. Si igitur amygdalæ calefiant, in oleo extrahendo, vel in aqua calida, dispositionē contrahet oleum, quæ levi momento, vel temporis successu, calorem illi possit conciliare, aut ranciditatem; cum temperatum esse debeat: tantumque abest ut tum leniret, cum partes potius, quibus apponeretur, calefaceret. Quare (salvo meliori iudicio) præstantius & expeditius erit methodo, à nobis præscripta, illas parare, deinde oleum conficere: quæ ratio facilis est & excellentior, quam quæ à Mesue & aliis describitur: illaque adeo quotidie in officinis usurpatur.

VIRE A MESVE DESCRIPTÆ.

A speritatem lenit gutturis, & pulmonis, & partium omnium exteriorum, & omnes durities, & siccitates membrorum, & juncturarum, & confert heceticis & impinguat, & augmentat sperma. Et injectum confert ardori vulvæ & vesicæ.

*Oleum de Amygdalis amaris eadem distinct.
à Mesue scriptum Vsuale.*

Verus Mesuæ textus.

Et modus compositionis ejus est, sicut diximus de oleo de amygdalis dulcibus.

S C H O L I A.

Eodem modo amygdalas¹ amaras, quo usi sumus in dulcibus, depellabis, eademq; methodo post decorticationem earum oleum extrahes.

VIRES A MESVE DICTATÆ.

Est aperitivum oppilationum, carminativum ventositatum, & resolutivum, & confert dolori aurium & surditati, & sibilo. Lenit asperitates, & delet panum faciei, & confert doloribus nervorum, & duritiem eorum lenit.

C A P V T II.

Oleum de granis sesami ex Mesuæ xij. distinct. de oleis V suale.

Verus Mesuæ textus.

a Per modum compositionis, artem manna-riam intellige.

a Et modus compositionis ejus est, sicut olei de amygdalis, præterquam quod oportet ut grana sesami prius excorticentur.

b Per modum operationis, decorticationē granorum sesami intellige.

Et *b* modus operationis ejus est. Mundetur sesamus ab omnibus immunditiis: deinde roretur super ipsum aqua cum sale pauco, & confricetur manibus, iterumque roretur, donec madefiat: postea expandatur ut exciccetur: deinde affetur affatione modica, & po-

Granorum sesami excorticatione secundum Mesuem.

natur in facculo panni
aspero: & fricetur mul-
tum donec excorticetur;
deinde mundetur à cor-
ticibus & molatur cum
molis, & fiat *c* alrachi-
ne: & de cætero traha-
tur oleum, sicut de amyg-
dalis. Et quandoque tra-
hitur oleum præter quod
excorticetur: & ejus ope-
ratio est, ut affetur primo
sesamus, deinde molatur,
& fiat alrachine, & ex-
trahatur oleum, sicut di-
ximus.

S C H O L I A.

IN mortario lapideo, pistillo
digneo, granorum sesami lib. ij. à
cortice extrahere, prius purgatas,
& panno canabino, & rudi, sine
ulla calefactione, vel affatione, torculari
exprime, usuique recens exponito.

Purgatur autem semen sesami hoc mo-
do.

do. In α pelui, aqua frigida & nitida, sesamum macerabis ad mollitiem & humectationem corticis: deinde aquam projicies, & semen panno, aut sacco ex canabe rudi, aspero, & denso (ne semen egrediatur) agitabis & contrectabis, donec cortex à pulpa separetur: deinde aquæ frigidissimæ & nitidæ quantitatem accipies, ad seminis proportionem, ut pro lib. ij: seminis lib. vj. aquæ sumes, & semen sic confricatum, in eam aquam, una cum cortice projicies, simul miscendo, ac spatula lignea aliquoties tractando: deinde aliquo temporis spatio quiescere permittes: tunc videbis seminis cortices supernatare, & pulpam in fundum descendere: quam pulpam diligenter colliges, prius tamen aqua cum corticibus abjecta, & inter lintheola paulatim desiccabis in sole. Deniq; (ut superius dictum fuit de amygd.) oleum conficies. Cæterum notandum erit, semen sesami, methodo superius scripta, mundari, vel decorticari posse, sine sale: tunc etiam ubi erit decorticatum, facile oleum extrahitur sine assatione, aut torrefactione, in quantitate sufficiente: videlicet pro duabus libris sesami decorticati $\frac{3}{4}$ vj. vel vij. olei extrahuntur.

N 3

Quare

a Granorum sesami, vera excorticatio.

Quare qui volunt hoc semen præparare ad oleum conficiendum, caveant ne Mesuen imitentur: nam oleum, quod secundum modum Mesuæ extrahetur, erit rufum, rancidum, adustionem rodolens, cum debeat esse dulce, candidum, nec posset ad quartam operationem olei rosati, quam Mesues describit, pervenire.

VIRE S A M E S V E D E S I G N A T Æ.

Impinguat, & addit in spermate, & lenit durities & asperitates, & clarificat vocem, & lenit guttur, & est materia aliorum oleorum multorum.

D E O L E O R V M G E N E R E
 tertio, quæ à Sylvio composita nuncupantur, fiuntque per expressionem, ac infusionem, facultatemque recipiunt
 variam ex incoctis variis
 simplicibus.

C A P V T I I I.

Oleum rosaceum completum Mesuæ, distinctione xij. de oleis Vsuale.

Mesuæ descriptio vera.

℥. Folia rosarum rubearum,
 a Per

recentium, contufarū,
a quantitatē fufficien-
tem,

& fepelias in oleo
quod modo laviti, &
reconde in vafe vitreo,
& obtura orificium e-
jus, & exponas folei per
dies feptem deinde co-
que in vafe duplici per
horas tres, deinde fac
permutationem folio-
rum rofarum, & utere
aliis recentibus, & di-
mitte per alios dies vij.
Deinde exerce deco-
ctionem in eo ficut fe-
cifti prius & fac denuo
permutationem folio-
rum rofarum, & pro-
jice fuper illud,

Aquæ infusionis ro-
farum quā tradidimus

a Per quantita-
tem fufficientem
lib. iij. intellige
poffumus tandem
lib. j. vel ij. vel iij.
accipere pro animi
arbitrio.

b Sicut quantitas olei, intelligit Mesues tantundem aque infusionis rosarum, quantum olei ponendum, quantitas autem dicetur infra in methodo conficiendi.

b sicut quantitas olei, & stringe orificium vasis, & dimitte in sole per dies xl. deinde excola & iterum expone soli, & dimitte e tempore extenso.

c Per tempus extensum longum intellige.

S C H O L I A .

A Nequam ad methodum olei rosati deveniamus, notandum imprimis Mesuem certum olei ac rosarum pondus non definire, quatuorque hujus olei componendi formas descripsisse: quarum prima omnibus officinis usitata, à nobisque Pharmacopœis, oleum rosatum maturum & completum appellatur: cujus descriptionem, restitutam suis certis ponderibus, infra proxime produximus. Tres quæ super sunt, à Mesue descriptæ, minime in usum veniunt.

Vera.

Vera olei, ros. completi & maturi Mesuæ,
usualis, descriptio, ponderibus certis
definita.

a *Alii oleum sesa-*
minum, recens
factum, loco com-
munis, ponunt, &
pro animi arbitrio
quantitatem ac-
cipiunt.

b *Rosas completas,*
eas intellige, que
nodos suos expli-
carunt.

c *Per vas duplex,*
intellige id genus
vasis quod veteres
Greci diploma di-
xere, quod ex duo-
bus vasibus consti-
tuatur quorum u-
num ferventem
aquam, alterum
res coquendas con-
tineat.

a ℥. Olei olivarum
veteris & maturi lo-
ti. ℥. x.

℔ Rosarum rubearum
recentium comple-
tarum. ℥. iiij.

Confice sic. Rosæ in
mortario lapideo; pi-
stillo ligneo, contundā-
tur optime: mox ficti-
li, arête obturato, soli
diebus septē, ad infun-
dendum, una cum oleo
prius loto, pluribus loti-
onibus, cū aqua fontiuū
nitida ac depurata, ex-
ponito. Deinde in e va-
se duplici (vas ubi cō-

d Per aquam infusionis rosarum, illam scilicet quam Mesues in dist. vj. descripsit, ubi agitur de syrupis, intellige: præterea tantum aquæ infusionis rosarum, ac olei jubet ponere: sed re vera quarta pars ipsius infusionis sufficit. Alii succum rosarum, loco aquæ infusionis accipiunt, quod maxime laudo.

Alii nullam infusionem, neque ullum succum ponunt, quod mihi minus probatur. Videtur autem infusionis quantitas, à Mesue descripta, major esse quam decet: nam si tota quantitas apponeretur, vix calore

tinetur infusio cooperatum esse debet) ad humidi rosarum consumptionem coquito. Post coctionem torquendo exprimito: rosas expressas projicito: & tot novas ac recentes, modo prædicto tusas, in oleum colatum, eodem vase bene obturato, immitte, ac rursus per dies septē insolari permitte. Posthæc ut prius eodē vase duplici prædicto, ad humidi peremptionē coquito, deinde torquendo calide fortiter exprimito: rosas abjice, & alias totidem recentes tunde, & in oleum colatum impone una cum

Aquæ d infusionis rosarum
solis

*solis consumere-
tur: praterea ni-
mium coquen-
do, oleum in-
calesceret, aut
alienum odorem
acquireret.*

rosarum. ℥. ij. β.

Eodemque vase quam optime obturato soli ad macerandum, dierum quadraginta spatio exponere: denique in diploma- te, vel cineribus calidis coquantur, donec tota humiditas rosarum, vel succus deperdatur: de- mum torquendo veloci- ter colentur: colatum re- ctum reconde.

Nicolaus Alexandrinus capit. 740. unum certis ponderibus definitum scribit, quod nos ompha- cinum viride, seu cru- dum, immaturum, accer- bumque appellamus, of- ficinisque nostris frequens. & usuale, cujus descriptio- talis.

Olei rosarum incompleti & immaturi vera Alexandrini descriptio, eodem capite prius citato reperta: V sualis.

a *Oleum omotribeos, oleum crudum, ex immaturis drupis expressum, intellige.*

b *Rosas recentes exungulatas neque expansas auctor intelligit.*

c *In apricum, id est, ad solem.*

a ℥. Olei omotribeos abluti: ℥. iiij.

b Rosarum. ℥. j.

Rosæ exungulatæ, in mortario diutissime tritæ, cum oleo, in vase vitreo condantur & ad solem per octo dies exponantur: nono autem die colentur, & ejectis prioribus, totidem novellæ contritæ immittantur: iterumq; octo diebus vas in c apricum proponatur: circa nonum diem diligenter colentur, & eidem oleo aliæ ejusdem ponderis immittantur: &

vas

vas fortiter obturatum, diebus quadraginta soli exhibeatur: Transactis vero constitutis diebus in temperato loco usui reservetur.

S C H O L I A.

a. Simplex oleum dicitur illud, quod fit ex unica infusione & coctione rosarum: tamen Nicolaus, quale oleum, an maturum aut immaturum: pariter quas rosas, an expansas aut non expansas debeamus accipere non explicat: sed videtur secundum scopum olei ab ipso descriptum, immaturum oleum & rosas minime expansas accipendas esse.

Fiat ea methodo qua usi sumus in rosato cōpleto. Legitur in antidotario, Nicolai Mesue conjuncto, aliud quod nos oleum rosatum & simplex appellamus, quodque etiam hodie multum est in usu apud nos pharmacopœos, videlicet avaritiæ causa, propterea quod non tanti laboris & artificii est, nec tantorum sumptuum: unica enim infusione, & coctione perficitur: cujus descriptio vera talis est.

Olei:

Olei rosati simplicis descriptio, in antido-
tario Nicolai Meluæ conjuncto
reperta V fualis.

a *Oleum olivaru-
rum immaturum
accipe.*

b *Rosas que non-
dum sunt expan-
se, exungulatas
sumito.*

℥. In duabus libris a
olei communis, & ad
nostram doctrinā ablu-
ti ℥. j. & mediam b
rosarum viridium ali-
quantulum contusarū.

Ponatur in olla, in
caldario pleno aqua su-
spenso, & tam diu bul-
liat quousque ad ter-
tiam partē veniat, quod
demum albo panno li-
ni immissum torculari
exprimatur & liquor
reservetur.

S C H O L I A.

Perfecte & vehementissime rosæ exungulatæ, recentes tundantur in mortario lapideo cum pistillo ligneo: deinde cum oleo communi abluto, fistili bene obturato, in diplomate ad humidi consumptionem coquantur: re vera satius esset eas prius in dicto oleo infundi, spatioque quadraginta dierum soli exponi, antequam decoquantur. Post cœctionem albo lini vel cannabino panno involvantur, & torculari exprimantur. Expressum optime lectum reservetur. Alii istud componunt cum oleo maturo, & rosis exungulatis maturis & expansis: & cum à medicis præscribitur oleum rosatum simpl. maturum, istud exhibetur.

Olei olivarum veteris maturi aut maturi loti.]

* Elige olei candidi, dulcis, perlucidi, odorati, modice calidi: aut immaturi, recentis, viridis, seu crudi, emphacini, & accibi, quantitatem *b* sufficientem: in ampulâ

a Olei olivarum maturi seu immaturi electio.

b Oleum commune olivarum maturum seu immaturum lavandi modus.

pula vitrea forti, & satis ampla in fundo & orificio superiori foramen habente, foramine utroque obturato aquæ fontis calidæ & olei semiplena, satis violenter agitata semi horæ spatio. Deinde quiescere permittite, unius horæ momento, donec videas oleum aquæ supernatare, & aquam in fundo ampullæ subsidere: quam hac methodo separabis, videlicet foramen inferius aperiendo, quo tanquam exiguo canali effluet: & ubi tota aqua effluerit, diligenter foramen obtrudere oportet, ne oleum effluat. Deinde per superius orificium aquam calidam fontanam super oleum infundes, & obturato orificio agita & quiescere, ut antea, permittite: post, simili modo aquam ab oleo segregat: id semel atque iterum repetendo factita, sicq; oleum lotum habebis, ad oleum rosatum completum, incompletum, simplex, vel aliud oleum quod lotionem requirit. Eo quoq; pacto oleum & cera simul lavantur in ceratis, emplastris, & unguentis, quando usus postulat.

VIRES OLEI ROSATI COM-
pleti ex Mesue.

Est confortativum & resolutivum convenienter, lenitivum, & sedativum.

VIRESS

*VIRES OLEI ROSATI INCOM-
pleti ex Nicolao Alexandrino.*

Virtutem habet frigidam & stipticam, & ideo ad dolores capitis ex febre, seu ex ardore solis, optimum est. Ardores autem & dolores, quos ventriculus, biliosis humoribus plenus, sua vétositate, in loco aut in parte capitis progignit, cum *a* amineæ aceti quarta parte, capiti & fronti illitum, arceat. Tormina & dolores in stomacho, seu intestinis, ex acredine acerrimæ cholerae illatos cum mastiches ℥.ij. & sufficienti cera in ipso solutis, locis inunctum ipsis, quamprimum emendat. Ad erysipelata utile est, quibus in superficie non apparent, & ad alia hujusmodi multa.

*VIRES OLEI ROSATI SIMPLI-
cis, ex antidotario Nicolai Mesue conjuncto.*

Virtutem habet frigidam & stipticam: & ideo ad dolores capitis ex febre, seu ex calore solis, optimum est, ardores auté & calores quos stomachus plenus sua ventositate in toto, seu in parte capitis progignit aufert, &c. Easdem enim vires obtinet, quæ-
admo-

a Per amineam uvam ruberrimam, in uerbis nascentem intellige.

admodum incompletum ab Alexandrino descriptum. Igitur si easdem vires obtineat ut oleum incompletum, ab Alexandrino scriptum exungulatæ in hoc conficiendo esse debent rosæ: cum Nicolaus Mesuæ conjunctus nihil in suo antidotario determinarit. Cumque etiam Alexandrinus exungulatas quærat ad illud componendum.

C A P V T IV.

*Oleum violatum Mesuæ distinctione de oleis
Vsuale.*

Vera Mesuæ descriptio.

*a Per operationem,
manuariam
confectionem
intellige.*

Et modus *a* operationis est sicut olei rosati, excepto quod debet fieri cum oleo viridi, aut amygdalino, aut sesamino. cum illis modis operationum quos diximus.

SCHO-

S C H O L I A.

℞. Flores violarum martiales, quæcumque sunt ex primis, quas non deprehendit calor virtutem resolvens, aut pluvia dissipans, recentes, ℥.ij.

Olei immaturi seu omphacini olivarum loti. ℥. v.

Aquæ infusionis violarum recentium. ℥. j. ℥. iij.

Confice eo modo quo sumus usi in rosato.

V I R E S E X M E S V Æ

desumptæ.

Oleum violatum inflammationes sedat, ubicumque sint, & lenit asperitates etiam pectoris, & pulmonis, & sedat apostemata calida, & pleuresin.

C V P V T

C A P V T V .

*Oleum de Cotoneis Mesuæ xij. distinctio-
ne de oleis Vsuale.*

Verus Mesuæ textus.

Accipe carniū cotoneo-
rum tritorū,

Cum cortice suo, quibus
medietas accidit matu-
rationis.

Succi eorum. ana

a In hoc
Partem su-
me pro lib. j.

a. Partes æquales.

Et lege ana
lib. se. Alii
nullum suc-
cum impo-
nunt.

Olei ex olivis incompletis,
b quantum sufficit.

b Per quan-
tum sufficit
lib. j. Et
unc. ij. ac-
cipe.

Et pone in vase vitreo per
dies quindecim ad solem,
deinde coque in vase dupli-
ci per horas quatuor: post
illud fiat permutatio coto-
neorum,

ncorum, & succi eorum: fiat sicut diximus bis, vel ter; deinde cola & reconde.

S C H O L I A.

Cotonea *a* poma, lanugine detersa, rotunda & odorata, pœne immatura, aridisque locis nata, ad hunc usum, laudat *b* Plinius: quæ cum corticibus ad infusionem, & succum parandum, in scobem tenuem, cum llima lignea: radere oportet: deinde in panno cannabino, rudi, celeriter torquendo, ut emanet succus exprime. Expressum, & pariter scobem tenuem non expressam, quantitate idonea, una cum olei quantitate præscripta, xv. dierum spatio ad maceranda, in fictili cooperto, ad solem expose. Macerata, in diplomate, ad succi, humidique consumptionem, decoquatur. Decoctione facta, torquendo colentur: & colaturæ succus recens, ac recentia cotonea, ut prius præparata, dicto fictili cooperto immittantur, & rursus totidem diebus infolentur, & eodem igne supradicto ad

a Cotoneum pro scepso olei electio.

b Succus co-

ad humidi peremptionem coquantur. Post
coctionem & colationē, alia cotonea, at-
que succus expressus, colaturæ injiciantur,
& superiori doctrina insolentur & co-
quantur: Idem, si præstantius vis habere
oleum, bis aut ter dicto modo repetes.
Postremo colatum repones: eritque con-
stans & certa ejus facultas.

V I R E S A M E S V E

notate.

Stomachum & membra nutrientia con-
fortat, & nervos quibus accidit laxitas, &
prohibet multitudinem sudoris.

C A P V T V I .

*Oleum Irinum Mesuæ xij. distinet. de
oleis Vsuale.*

Verus Mesuæ textus.

a Per radicem
ejus, iréos intelli-
ge, & per quanti-
tatem aliquam
lib. j. sume.

b Per duplum,
lib. ij. cape.

Accipe a radicem ejus
quantitatem aliquam
& florum ejus b du-
plum &

c Per

c Per quod suffi-
cit, lib. .j. sem. unc.
iiij. sem. accipe.

Aquæ decoctionis ra-
dicum ejus *c* quod suf-
ficit.

& infunde super ea.

d Oleum oliva-
rum lotum cape,
& per quantum
oportet lib. vij. se.
accipe: alii lib. v.
accipiunt.

e Per folia lilio-
rum folia iridis
purpurea intellige.

Oleum sesaminum, aut
de *d* olivis maturis, quã-
tum oportet.

Et decoque in dupli-
ci vase: deinde permuta
radices & folia *e* lilio-
rum, & fac diximus ut
de oleo rosato.

S C H O L I A .

R Adices recentes, tempore & loco
collectas, minutissime incisas, ac
velociter in lapideo mortario cū
pistillo tufas, una cum floribus
recentibus mediocriter tufis, in oleo sesa-
mino, fictili cooperto impone (aut oleum
commune olivarum, dulce, insulsum ac
maturum accipe) spatioque vij. dierum
calide macerabis: deinde in diplomate ad
humi-

humidi radicum & florum consumptionem coquantur: denique calide torquendo vehemenser exprimantur. Tunc tantundem radicum & florum simili modo tusorum, in expressione colata, eodem vase obturato, immitte, ac rursus, in solari per dies septem dimitte. Posthæc, ut prius, prædicto igne, ad humidi consumptionem percoquito, deinde extorquendo calide comprimitq; radicesque, una cum floribus siccis, abjicito; & tantundem recentes contunde, & in oleum colatum impone, una cum aquæ decoctionis radicum quantitate, prædicta, eodemque fictili cooperto, soli, ad macerandû, dierum septem spatio, expone. Peracta maceratione, igni levi, hoc est, in diplomate, vel cineribus calidis, percoque, ut tota radicum humiditas florum, & aqua decoctionis radicum, consumatur. Humiditate consumpta cannabinò panno calide oleum transeoletur, colatum vero, optime coopertum, ad usum conservetur.

Cæterum, neminem latere debet, Alexandrinum cap. 718. hoc describere & pariter Myrepsum numer. 30. variantque ab isto. Dioscorides lib. 1. cap. 55. pretiosissimum habet, sed nobis factu ob ingredientium inopiam impossibile. Præterea

notabimus ad decoctionē & prædictam faciendam radicum ireos $\bar{\zeta}$. xij. cum aquæ fontanæ ℥. iij. β. sufficere ; totumque ad medias coquere licet , aut paulo plus. Atque hæc ideo monui , ut nihil tyrunculi temere agant.

V I R E S A M E S V E

scripta.

Abstersivum, resolutivum , & maturativum & sedativum dolorum frigidorum, & subtiliativum, & maturativum materiarum quæ sunt in pectore & pulmone, & confert doloribus hepatis, & splenis, & calefacit ea. Et confert doloribus juncturarum : & lenit durities earum, & apostemata dura & scrophulas. Et confert dolori & frigiditati matricis juvamento manifesto. Et confert spasmo , & distillatur in aurem , & confert dolori, & fœtori narium.

O

C A P V T

à Vera proportio aqua , & radicum ad decoctionem prædictam faciendam.

C A P V T II.

*Oleum de absinthio auctore incerto mihi
Vsuale.*

℥. Olei olivarum maturi loti.
℔. ij. ℞.

Cimarum a absinthii Pontici.
℔. j.

℔ Succi ejus. ℥ vij. ℞.

Confice eadem methodo qua usi fuimus in oleo rosato completo.

*V I R E S A Q V I B V S D A M
Doctoribus dictatae.*

Frigida membra roborat, & calefacit, & praesertim ventriculum: appetentiam excitat, obstructions aperit, & morbis omnibus obstructionum, a causa frigida occurrit: vermes interficit, ac educit, si unguentis vel emplastris apponatur.

C A P V T

a *Alii absinthii unc. iij. sumunt.* b *Alii succi ejus unc. iij. ponunt. sed melior dosis nostra.*

CAPUT VIII.

*Oleum anethinum. Mesuæ distinctione xij.
de Oleis. V. suale.*

Verus Mesuæ textus.

Modus *a* operationis ejus est sicut
olei de chamæmælo.

S C H O L I A.

℥. Florum vel *b* summitatum anethi recentium. ℥. ij.

Olei olivatum completi & loti.
℥. v.

Aquæ decoctionis summitatum
anethi. ℥. j. ℥. iij.

Confice veluti rosaceum completum, hoc est, pari methodo.

O 2 Ad

a Per modum operationis manuariam confectionem intellige. *b* Summitates anethi uno die siccatas Paulus assumit.

Ad decoctionem autem prædictam
faciendam, apponendæ sunt florum
anethi ℥ iiij. aquæ vero ℥ .j. ꝑ. fiat
decoctio ad ℥ iiij. consumptionem.

V I R E S A M E S U E P R O B A T Æ.

Oleum anethinum est sedativum dolo-
rum, resolutivum, provocativum sudoris:
quare confert rigori febris, injunctum in
spina & membris nervosis: provocat som-
num, & confert dolori capitis, & resolvit
apostemata & durities.

C A P V T IX.

*Oleum chamæmelinum Mesuæ xij. distin-
ctione de oleis V suale.*

Verus Mesuæ textus.

Et modus ^a operationis ejus est sicut
olei rosati, præterquam quod oportet, ut
fiat cum oleo de olivis completo, aut oleo
sesamino, cum illis modis præparationum,
quos diximus.

S C H O-

^a Per modum operationis manuariam intellige con-
fectionem.

S C H O L I A.

℞. *a* Florum recentium chamæ-
meli. lib. iiij.

Olei olivarum completi loti. lib. x.

Aquæ decoctionis florum chamæ-
meli. lib. ij. ℥.

Eo namque modo quo usi sumus in
rosato completo istud conficias.

Decoctio autem florum chamæ-
meli sic parari debet, nempe cum ℥ viij.
florum chamæmeli & aquæ lib. iiij. ad
lib. ℥. absorptionem.

V I R E S A M E S V E

probata.

Est resolutivum, sedativum doloris: &
est in eo prohibitio cursuum materierum
propter stipticitatem ejus modicam: &
confortat nervos, & confert doloribus
eorum & nervosorum omnium.

O 3 C A P V T

a Flores chamæmeli absque albo per naturalem diem
siccatos, Paulus sumit.

C A P V T X.

Oleum de lilio simplex Mesue xij. distinctione de oleis Vsuale.

Verus textus Mesuæ.

Et modus compositionis ejus est, sicut olei Chamæmelini, præterquã quod oportet ut citrinitas eorum tota abjiciatur.

S C H O L I A.

℥. Florum liliorum alborum inter medio illo croceo dempto. lib. ij.

Olei olivarum completi loti. lib. v.

Aquæ decoctionis liliorum recentium. lib. j. ℥ iiij.

Eo modo quo paravimus rosatum completum, istud conficiatur.

Paretur autem decoctum prædictum cum ℥ iiij. florum liliorum & lib. j.

& lib. j. β . aquæ fontanæ claræ ad per-
emptionem ζ iij.

V I R E S A M E S V E D I C T A T Æ.

Confert dolori pectoris, & est sedati-
vum dolorum quæ fiunt à frigiditate: &
confert dolori matricis & frigiditati ejus.
& calefacit renes & vesicam, & confert
colicæ.

C A P V T XI.

*Oleum de Cheiri Mesuæ xij. distinctione
de oleis; interdum Vsuale.*

Verus textus Mesuæ.

Et fit sicut oleum de chamæmælo.

S C H O L I A.

\mathcal{L} . Florum leucorii lutei. ζ vj.

Olei olivarum completi loti.
lib. j. ζ iij.

O 4 Aquæ

Aquæ decoctionis florum cheiri.

℥ iij. ℥ vj.

Præpara ut oleum rosatum completum. Paretur autem aqua decoctionis cum ℥ iij. florum cheiri & aquæ ℥ vij. ad mediæ partis peremptionem, vel ad ℥ iij.

VIRE S A MESUE DISTINCTÆ.

Est autem oleum de cheiri resolutivum, sedativum dolorum qui sunt in nervis & juncturis, pectore, renibus, & vesica.

C A P V T XXII.

*Oleum mastichinum Mesuæ xij. distinctio-
ne de oleis Vsuale.*

Textus Mesuæ verus.

a Oleum rosatum
immaturum, Me-
sue descriptionis,
accipe.

Accipe olei a rosati.
℥ xij.

Mastiches. ℥ iij.

b Per

b *Pervinum bonum, rubeum & austerum intellige & unc. viij. acci-*

b *Vini boni. ℥ viij. in alio ℥ iiij.*

c *Decoque sicut primum ad vini consumptionem.*

tionem & ad decoctionem mastiches, tamen non sunt satis. Itaque malleum legere unc. viij. ut monet Mesues quam quatuor ne uratur oleum. Potest tamen mastiche dissolvi in oleo absque vino, si liceret ita parare.

c *Decoque sicut primum dixit Mesues, quia est secunda descriptio ab illo scripta, reperitur autem eadem distinctione alia descriptio minime usualis qua prima dicitur.*

SCHOLIA.

I*N vase æreo vel fictili mastichen electam crassiuscule pulverifatā, una cum oleo rosato, & vino rubro austero (propter astrictionem & confortationem) ad coquendum in diplomate pone, spatula movendo, donec vinum sit omnino consumptum: quo consumpto oleum tranfcoletur, & usui servetur. Notandum Præpositum 13. particula lib. 2. eas duas à Mesuæ descriptas recon-*

tere: alteram præterea Alexandrini ex caps
 35. desumptam. Myrepsus duas etiam
 descriptiones assignat. Sect. 16. numer. 38.
 & 39. omnes ab aliis invicem differentes,
 simplicibus & ponderibus, & maxime ab
 ista, quæ in usu quotidiano est ex Mesuæ
 descriptione.

V I R E S A M E S V E

dilatata.

Confortat stomachum, nervos, hepar
 & juncturas, & lenit apostemata dura, &
 sedat dolores.

C A P V T XIII.

*Oleum myrtium simplex Mesuæ xij. di-
 stinétione de oleis Vsuale.*

Verus textus Mesuæ.

Et fit sicut oleum de cotoneis.

S C H O L I A.

Mesues quomodo hoc oleum confici debeat non exprimit: idque non sine magna confusione. Nam plurimi sunt, qui pro arbitrio illud componunt (ignorantes certas simplicium doses à Mesue intellectas) aliquando ex foliis, aliquando ex baccis myrthi, olei omphacini, & vini odoriferi æquis partibus: quæ ad vini evaporationem coquunt: deinde colant & recondunt: aliquando ex baccarum myrthi lib. ℞. vini odoriferi & olei omphacini ana ℥. j. ℥. ij. in modum prioris conficiunt. Myrepsus & Aëtius componunt ex myrthi foliorum viridium ℥. ij. Actuarius ex eorundem ℥. j. olei omphacini sextario Italico, & vini odoriferi astringentis, sextarii Italici quarta parte incoctorum. Matheolus Comment. in lib. j. Dioscorid. cap. 37. sic componit. Sumit fructuum myrthi ℥. j. foliorum ejus recentium ℥. x. vini nigri astringentis lib. ij. olei omphacini lib. v. Deinde contusas baccas ac folia oleo excipit ac vase vitreo vel stanneo re-

ponit, tectoque vasis ore, in balneo calentis aquæ immergit, & post tres dies extrahit, ac percolatam rursus infusionem ut prius repetit. Sed in summa ego Mesuæ ritum in usum revoco, quod sane maxime confert ad unguentum comitissæ Varrignanæ, ut testatur luminare majus: sic inquit: Olei myrtillorum descriptionem docet dominus Mesues in tractatu de oleis, &c. quod revera ad unguentum prædictum conficiendam, præparatum debemus tenere, & secundum istum modum, infra scriptum componere, quæ est vera Mesuæ descriptio, quæque similima est descriptioni olei de cotoneis.

℞. Olei ex olivis immaturis loti.
lib. ij. ℞.

℞ Myrthi extremitatum tenerrimarum. lib. j.

℞ Myrthi Baccarum express.
℥ vij. ℞.

Con-

a Pro myrthi extremitatibus tenerrimis, plurimi folia usurpant: alii baccas. b Per myrthi baccarum, expressionem, succum intellige, aut ejus loco vinum rubrum austerum accipe, si deficiant myrthi baccæ.

Confice sic. Baccarum myrthi recentium quantitas sufficiens ad succum parandum accipiatur. Deinde mortario lapideo maxime contundatur : postea in panno cannabino rudi ad extorquendum, ut succus emanet, apponatur : quem succum expressum in vase terreo, stricti orificii, tecto, una cum quantitate olei prædictæ, & summitatibus a tenerrimis myrthi, videlicet baccis, velociter eodem mortario & pistillo contusis, ad infundendum spatium xv. dierum, sub dio, aut calide repones: exactis diebus infusionis, in duplici vase simul ad humiditatis peremptionem decoques: deinde per pannum supradictum celeriter calideque torquendo colabis: in colatura rursus tantundem succi myrthi, baccar. tusar. in vase prædicto cooperto, soli vel calide, spatium xv. dierum, ut infundantur repones: post infusionem eodem igne, modo prædicto, decoques, calideque percolabis: colatum recondes. Præstantius erit si adhuc semel renoventur baccæ, & succus, parique modo coquantur.

V I R E S E X M E S V E
probatae.

Stomachum & cor confortat & nervos.

OLEUM

a Succo è Baccis myrthi extractio.

Oleum myrthinum compositum Alexandrinè
in libro de composit. med. secundum loca
cap. 733. & Præpositi 14. particula
lib. 2. interdum Vsuale.

Alexandrini & Præpositi, veri textus,
 pars media.

a *Oleum, olivaru-
 rum immaturum
 lotum accipe: quia
 scopus est astringe-
 re, & per sextarios
 ij. semis olei, Ro-
 manos intellige, qui
 juxta sententiam
 Pauli & aliorum
 Grecorum un, xlv
 pendunt.*

b *Vinum, rubrum
 astringens & odo-
 riferum, pro scopo
 olei: & per sexta-
 rium sem. unc. X.
 sume, secundum
 eundem Paulum:
 quomodo autem*

a ℥. Olei. Sext. ij. β.

b Vini. Sext. β.

Myrthi tenerrimæ fo-
 liorum. lib. j.

Croci orientalis.

c Oenantes. ana ℥. v.

Mastiches. d ℥. iiij.

Conficitur sic. Fo-
 lia myrthi tenerrimæ
 in pila sine intermissio-
 ne tundantur, & in vi-
 no nocte ac die infun-

disse-

differant sextarius Romanus medicinalis olei, vini, aqua, vel aceti, & mellis, lege in suo istius capituli.

C. Oenanthe, est labrusca vitis, cum floret, fructus Dioscorides lib. 1. cap. 46. & lib. 5. cap. 11. Non autem oenanthe herba illa quam filipedulam nos vocamus, a Dioscoride lib. 3. cap. 118. scripta.

Prepositus loco oenantes mentham legit: mala est ejus lectio, quia mentha non debet accipi sed potius oenanthe, ut monet Alexandrinus author compositionis. d Omisit Alexandrinus ana & legendum mastiches acatie ana drach. iij.

S C H O L I A.



N mortario lapideo, pistillo ligneo, folia myrthi recentia, & oenanthē seorsim fortiter cotundantur, & in vase terreo, cooperto, una cum vino austero, calide spatio unius.

unius diei infundantur. Altero vero die, oleo supermisso, in diplomate ad vini cōsumptionem coquantur: deinde velociter, calide extorquendo colentur. In parva autem parte colaturæ, videlicet $\frac{3}{4}$. j. eodem igne, spatula ducendo, mastichem dissolve, soluta, cum reliqua parte colaturæ commisceatur. Paulopost acatiam in partes divisam, ac cum pauco vino rubro astringente, igne levi, ad linimenti formam solutam, conjungo: ubi ea dissoluta fuerit, totum infrigidatum, spatula movendo croci pulverem tenuissimum commisce: denique omnia probe commixta in vase obturato usui reserventur. *a* Interea notandum erit, Alexandrinum & Præpositum in hac olei descriptione uti sextario. *b* Nam per sextarium, Romanum intelligere oportet & etiam in omnibus Græcorum compositionibus secundum Pauli & aliorum Græcorum mentem. *c* Preterea sextarium Romanum olei, differre à sextario Romano vini aquæ, vel aceti & mellis, maxime certum est. Nam sextarius olei $\frac{3}{4}$. xvij. pendet, vini, aquæ vel aceti, $\frac{3}{4}$. xx. mellis $\frac{3}{4}$. xxvij. Cæte-

a Sextarius Romanus medicinalis olei quid. b Sextarius Romanus medicinalis vini vel aquæ quid. c Sextarius Romanus medicinalis mellis quid.

Cæterum in quibusdam Græcorum compositis. Oleorum in sextario sententiã Pauli sequimur, quia dosis vini & olei, videtur convenire simplicibus quæ olea ingrediuntur: quamquam sextarius aliud quid nolet apud Arabes, ut infra cap. 17. docebimus.

V I R E S A B A L E X A N D R I N O
probata.

• Virtutem habet stipticam & xeranticam, & ideo putridos humores capitis & dolorem emendat, cum mastiches, boli, & farinæ volatilis ana ℥. j. mixtum, & fronti impositum, superciliarum & oculorum dolorem arcet, & lippitudinem in eis ex rheumatismo fieri non permittit, cum camphoræ ℥ ij. trahacanth. ℥ j. mamillis inunctum, æstivos sudores male olentes dispellit, easque, decenter distetas, pristino decori reddit: diaphoreticos sudores & celiacos fluxus super stomachum & totum ventrem inunctum, pulvere œnanthes & acatiæ super sparso, astringit.

C A P V T

• Per xeranticam intellige excicantem.

C A P V T X I V.

*Oleum rutbaceum Mesuæ xij. distinctione
de oleis maxime Vsuale.*

Vera Mesuæ descriptio.

*a Per modum operationis confectio-
nem manuariam
intellige.*

*b Rutham alii ac-
cipiunt recentem;
alii siccata, &
id fit., secundum
genera morborum.*

*c Oleum immaturarum oliva-
rum capit Sylvius,
sed videtur corre-
ctio ista Sylvii non
recipienda quia cū
intentio & scopus
olei sit penetrare
& digerere, tenui-
tate substantia o-
leum maturum &
potius vetus con-*

*Et modus a operatio-
nis ejus est sicut olei
myrtini.*

S C H O L I A.

*℥. Tenuiorum b ru-
thæ foliorum parum
siccatorum propter
succum excremen-
tosum. lib. j.*

Succi ejusdem. ℥vij. β.

*c Olei ex olivis com-
pletis loti. lib. ij. β.*

*Pari methodo con-
ficiēs, quemadmodum*

venit, quod habet vim digerendi & penetrandi. paravimus oleum myrtinum simplex.

Maxime autem notandum, Mesuem hoc oleum parare sicut oleum myrtinum: nam oleum myrtinum fit sicut oleum de cotoneis: in oleo tamen cotoneorum, Mesues capit oleum immaturum seu omphacinum, quod maxime requiritur propter astrictionem. Sed hoc rutaceum, vim oppositam habet: nam aperit & calefacit. Quod vero à Mesue dicitur, & modus operationis ejus est sicut myrtini simplicis, de conficiendi modo intelligendum est, non autem de immaturi seu omphacini olei sumptione: quia est adversus olei rutacei intentionem. Quocirca intelligamus, dum hoc parare volumus, oleum immaturum & vetus seu completum accipiendum esse.

VIRE S A MESVE PROBATÆ.

Renes & vesicam & matricem calefacit. & confert doloribus eorum & dolori laterum.

Oleum rutbaceum seu Peganinum Alexandrini capit. 725. raro Vsuale.

Veri Alexandrini textus pars media.

a *Oleum olivarum maturum accipe.* ℥. a *Olei.* lib. ij.
 $\frac{3}{3}$ xj.

b *Folia ruthe inter duos pannos ab humiditate aliena & rore exsiccata, non à proprio humido, sume. Prepositus autem ultra lb. j, addit unc. iiij.* b *Ruthæ foliorum.* lib. j.

c *Per sampsuchum, majoranam intellige.* c *Sampsuchi.*

d *Per cuminum semen sume: habetque Prepositus ultra unc. iiij. drach. ij.* d *Cumini ana* ℥ iiij.

Herbas & cuminum, seorsim tusa, in oleo dies quinque macerata, in vase duplici coque, exprime & reconde.

S C H O L I A .

Folia ruthæ & folia sampſuchi, recentia, ſeorſim, in mortario lapideo, piſtillo ligneo tundantur, & in fictili cooperto, una cum cumino craſſiuſcule tuſo, & oleo, calide, ſpatio quinque dierum ad macerandum conjiciantur. Sexto vero die in diplomate, ad humidi herbarum conſumptionem, coquantur. Cocta panno cannabino velociſſime torculari exprimantur, expreſſio ad uſum recondatur. Præſtaret, ſi inter coquendū adderetur lib. j. ſucci foliorum ruthæ, quod re vera addo; alii vinum. Meſue in xij. diſtinctione de oleis unum deſcribit, maxime ab iſto diverſum, & apud nos omnes uſuale, ſimplexque appellatur: cujus compoſitio à nobis ſupra ſcripta fuit. Lumen apotecariorum aliud habet diſtinctione xj. de oleis, maxime ab iſto Alexandrini variū. Attendat igitur Pharmacopœus, nullum aliud componere, præter iſtud ſupra à Meſue ſcriptum.

VIREB AB ALEXANDRINO
denuntiata.

Singulariter prodest ad genuum & in-
guinum dolorem, & ad podagram. Con-
ducit etiam ad capitis & præcordiorum
dolorem, ex sicco & calido ortum. Fal-
sum hoc tamen videtur, cum materialia
olei sint calida: itaque videat lector: an
aliquid hic sit mendum.

C A P I T U M XV.

*Oleum de majorana, seu de samsucbo: Me-
sue xij. distinctione de oleis, raro
Vsuale.*

Verus textus Mesuæ,

Et fit sicut oleum de myrto.

S C H O L I A.

℥. Foliorum recentium tenuio-
rum majoranæ. ℥. β.

Succi ejusdem.

℥ iij. ℥ vj.

a Olenna

a *Oleum olivarum, incompletum aliquando accipimus, & id fit secundum intentiones medicorum, sed communis recepta legere debet completum, ne incerti hærant pharmacopœi.*

a *Olei olivarum completi & loti. ℥. j. ʒ. iij.*

Ut oleum myrtinum simplex, ter aut quater mutatis foliis tenerimis, antequam succus addatur, conficito.

V I R E S A M E S V E

descripte.

Confert doloti capitis & confortat & calefacit nervos; & confortat stomachum.

C A P V T XVI.

Oleum moschelinum Alexandrini in lib. de compositione medicamentorum secundum loca capit. 71. V suale.

Veri Alexandrini textus, pars media.

a *Oleum commune olivarum dulce in sulsum & ve-*

℥. a *Olei pumici. ℥. iij,*

tus accipe: loco pu- *b* *Aquæ. Sext. j.*
mici.

b *Aque loco, plu-* *Folii.*
rimum vinum gene-
rosum assumant: *Spicæ nardi.*
sed si vinum su- *c* *Costi.*
matum aromati-
corum fiet penetra-
tio, vel illorum vis *Mastiches. ana ℥. j. ℞.*
coctione augetur, *d* *Styracis.*
itaq; diligenter ob-
serva utrum le- *Croci.*
gendum sit cum *Myrræ troglodyticæ.*
authore, aqua sex- *Cassia.*
tarium unū, quod *e* *Xilocinnami.*
non puto. Per sex- *ana ℥. vj.*
tarium autem, ro-
manum sume: qui, *Cariophyllorum,*
secundum mentem *Carpobalsami.*
Pauli, ponderat *Bdellii. ana ℥. ℞.*
unc. xx. taleque
pondus hoc loco
convenit.

c *Costi, amari ra-*
dices in:ellige, quia
vero costo caremus.
Galenus ammo-
niacum, vel he-
lennii radicem sup-

poni jubet . Ma-
theolus comment.

f Mosch.

3 iij.

capit. 15. lib. 1.
Diosc. & alii re-
centiores angeli-
cam pro costo sup-
ponunt.

d Styracem, cala-
mitam intellige.

e Xilocinnamo ca-
remus, sed ejus loco
cinnamionum no-
strum usurpamus:
Prepositus omisit
ipsum.

f Moschi, memini
me legisse apud
quosdam antido-
tarios, & precipue
apud Arnaldum
de villa nova, mo-
schi unc. j. sem.
quod absurdum vi-
detur, nisi forsitan
quadruplicata est
recepta.

Nucis indicæ. num. ij.

Folium, crocum,
myrrham, xilocassiam,
carpobalsamum, bdel-
lium, contusa, & in
aqua biduo infusa, cū
oleo coque usque ad
consumptionē, & post
infrigidationem unius
diei, gnaviter cola, de-
inde cariphylorum,
spicæ, costi, nucis, sub-
tilissimum pulverem,
decoctioni adde; & in
parte olei, styracē, ma-
stichen, moschū, con-
tusa, immitte: iterum-
que modicnm bulli, &
infrigidatum, diligenter
reconde, usuique re-
serva.

S C H O L I A .

CAssia lignea, & xilocinnamum, carcarpobalsamum, folium, myrrha, bdellium seorsim crassiuscule trita, in aqua, una cum oleo, spatio duorum dierum in vase fictili obturato, calide macerentur: peracta maceratione igni levi, aut in diplomate, ad aquæ evaporationem coquantur: deinde quæ restant simplicia, dense, separatimque *b* trita, ut costus, caryophylli, spica incisa, & nuces indicæ rapa serratili contritæ, decoctioni prædictæ addantur, & ad ejus, que superest, aquæ consumptionem coquantur & parum infrigidentur. Deinde per pannum lineum fortiter torquendo colentur, in parte colaturæ, igne levi, aut vase duplici mastichen liquabis: qua liquata styracem & moschum, sejuncte, cum paucio vino modice calido dissolves & cum mastiche conjunges. *c* Desuper crocum pulverisatum, mox reliquum colaturæ pedetentim

a Xilocinnamum in methodo consiendi Alexandrinus omisit. *b* Melius si extraheretur oleum per expressionem e nucibus Indici: idque oleo confecto adderetur: salvo tamen meliori judicio. *c* Reclius esset crocum dissolvi cum suo dissolvente, quam pulverisari: nam dissolutum efficacius esset oleum.

tentim versando his permiscebis, & ad usum servabis.

Cæterum notabis ad infusionem eorum quæ hoc oleum ingrediuntur, quæ omnia aromatica sunt, optimum & generosum vinum assumendum, loco aquæ, plurimos arbitrari; quamvis omnes qui hanc confectionem descripserunt, aquam assument: quod profecto (pace aliorum dixerim) nobis non probatur. Hoc enim oleum ad frigidos affectus componitur, quibus vinum maxime conducit, & calefacit, tum in aromatum coctione vim citius illorum attrahit quam aqua, ideoque ad oleum conficiendum, vinum excellentius & præstantius quam aqua. Tamen non est ea intentio authoris.

VIREB AB ALEXANDRINO
notata.

Optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum ventriculi, ad dolorem lateris foris inunctum, & intro cum zinziberis galangæ diagredii ℥.j. a propinatum summe opitulatur. Stranguriosis, & concis, & ad omne nervorum vitium illitum optime facit. Miscetur medicaminibus,

P 2 epithe-

2 *Hæc videtur lectio Alexandrini non recipienda.*

epithematibus, & emplastris, quæ ad stomachi & renum affectiones asciscuntur.

C A P V T XVII.

Oleum Nardinum simplex Mesuæ, xij. distinet. à oleis Vsuale.

Verus Mesuæ textus.

a *Per spicam aromaticam, nardum indicam intellige.*

℥. a Spicæ aromaticæ. ℥ iij.

b *Vinum, rubrum odoriferum, accipe.*

b Vini & aquæ. ana ℥ ij. β.

c *Loco olei sesamini, oleum amigd. dulcium, recens factum, usurpamus secundum Mesuæ: nam sepius pro eo illud non raro substituit dum ait. Sesamini olei, vel dulcis, hoc est, amigdalini recenter & sine igne facti.*

c Olei sesamini. ℥. β.

Decoquantur in vase duplici, lento igne, quasi per horas quatuor, & frequenter moveatur.

SCHO.

S C H O L I A.

SPICA quam minutissime incidatur, spatioque horarum quatuor, vase fictili cooperto, una cum oleo, vino, & aqua calida, mace- retur. Alii spatio unius diei, spicam, vinum & aquam, absque oleo, macerant: quod fieri minime debet, quia infusio tepida & calida debet semper esse: igitur si tanto macerentur tempore, calide in vino & aqua, magna fiet consumptio, ita ut parum supersit ad decoquendum cum oleo: exhalabitque vis spicæ, si coquatur sine oleo. Macerata igitur, ut dixi, omnia simul ad consumptionem vini & aquæ vase duplici aut cineribus calidis, coquantur: deinde per pannum canabinū extorquendo transcolentur: colata ad usum serva.

VIRES A MESVE DESCRIPTÆ.

Oleum nardinum, est oleum benedictum multorum juvamentorum, & proprie ad omnes ægritudines frigiditatis, & ventositatis, & proprie nervorum, stomachi, & hepatis, & splenis, renum, & vesicæ, & matricis: & confert dolori aurium vento-

fo, & dolori capitis, & hemicrania, secundum omnem modum administrationis ejus : etiam facto ex eo caput-purgio, purgat caput, & colorem efficit bonum, & corporis odorem.

Oleum nardinum compositum Alexandrini in lib. de composit. medicamentorum secundum loca capit. 711. interdum Usuale : quod ille, inventum fuisse à Vindiciano medico, profitetur.

Veri Alexandrini textus pars media.

- | | | | | | |
|---|--|----|---|-------------------|------------------|
| a | Oleum Hispanicum, olivarum, maturum, ab Hispania allatum, intellige. | ℥. | a | Olei Hispanici. | ℥. iiij. ʒ j. β. |
| | | | | Aspalti. | |
| b | Semen nigelle Romane, accipe : nam aromatica est, alia quasi venenum est, & caput tentat, quae apud nos inter segetes deprehenditur. | | | Myrrhae. | |
| | | | b | Nigellae viridis. | |
| c | Spicam, indicam accipe. | | c | Spicae. | ana ʒ iiij. |
| | | | | Xylobalsami. | |
| | | | | Caryophyllorum. | |
| | | | | | d Ari- |

d *Aristolochia*, radices, longe accipe.

e *Inule*, radices, accipe.

f *Alexandrinus* in margine istius compositionis sic ait.

Cassanum legit *Simon lanuensis* : & *Haliabas* lib. 2.

Cassanum ponit pro *seseli* : lib. vero 10 pro *Keisim* quod plurimi interpretantur esse *ligusticum* : alii pro *cassano*, *panis porcini* radices hoc loco sumunt.

g *Cardamomum*, majus accipe, non autem granum paradisi ut multi faciunt.

h *Nuces myristicas*, *moschatas* intellige.

i Per *styracem*, *calamitã* intellige.

Cyper.

Schœnanthos.

d *Aristolochiæ*.

e *Inule campanæ*, ana ℥j. β.

Balsami.

Cinnamomi.

Calami aromatici, *Folii*.

Carpobalsami.

f *Calami*.

g *Cardamomi*, ana ℥j.

h *Nucis myristicæ*.

i *Styracis*.

k Per costum, radices costi amari accipe.

k Costi.

l Cassiæ fistulæ.

l Per cassiam fistulam, intellige ligneam cassiam veram, quæ est cassia fistula grecorum: *Syrinx* vocata.

Labdani.

m Phu.

m Per phu, radices valerianæ accipe.

n Asari.

n Radices asari sume.

o Amaraci.

o Per amaracum, intellige *sampsuchum*: & *putopotius* legendum esse tamarici, quam *amarici*, ut *Prepositus* legit.

Mastiches.

p Fascis gallici.

p Per fascem Gallicum, spicam celticam intellige.

q Sami.

Prepositus fascis Gallici loco capit *fraxinum*.

r Myrti.

f Syriacæ. ana ʒ ij.

q Per samum, samiam terram accipe, & loco sami

Confice sic. *Aspaltum*, *myrrham inulam*, *phu*, *asarum*, *carpobalsamum*, *myrtum*, *xilobalsamum*, & *sampsuchum*, particulatim tu-

Prepo-

Præpositus baccas juniperi capit.

*x Myrti folia acci-
pe. Præpositus loco
myrti sumit men-
tham.*

*¶ Per syriacam, in-
tellige maluam.*

*Luminare majus,
pro syriaca, capit
flores hyperici.*

sa, & in aquæ sextario uno, die ac nocte infusa, oleo admisce, & tamdiu coque, donec aqua consumatur, non tamen usquequaque, ne oleum exardescat: cumque refrigeratum fuerit, die eodem accuratissime cola, & species injice: deinde cyperum schœnanthum, aristolochiam, cassamum, fascem gallicum, cardamomum, folium, nigellam, calamum, cassiam fistulam, samū, seorsim contusa, & in vini semi sextario, diebus tribus infusa, ubi decoxeris, eodem modo effervefacito, oleoq; bene colato, species extermina: tertioque

¶ Semi hemina nō sufficit ad spicam, carioph. cinnamomum, nuces myrist. & costum infundendum; proinde licet heminam integram accipere, ut simplicia cōctione vinumque possit centrum prædictorum penetrare.

die spicam, cariophilos, cinnamomum, nuces myristicas, costum, trita in vini optimi semi hemina, per biduum infunde, t & superiori documento ad vini consumptionem coque, & non colatum ab igne depone, & in partē ipsius olei labdanum, mastichem, styracem, contusa cum balsami medicamine, admisce, & ad leves prunas aliquantulū bulli, spatula assidue agitando: ab igne depositum, in ampulla, brevi foramine prædita conde, diligenterque obtura, ne suavissimus odor exspiret.

S C H O L I A.

S Implicia diligenter electa, crasseiuscule in mortario pistillo ferreo, seorsim terantur, ut cyperus, cassiamum, aristolochia, calamus, cassia lignea, schœnanthos, fascis *a* gallica, cardamomum, nigella, folium & samum: tusa in vini rubri odoriferi Sextario dimidio, una cum oleo spatio trium dierum super cineres calidos vase probe obtuso infundantur; secundo die infusionis adde desuper sequentia separatim denseque trita ut costum, spicam, cariophilla, cinnamomum, nuces myristicas, cum *b* Hemina una vini rubri odoriferi; quæ omnia rursus spatio duorum dierum, calide mæceranda vasi cooperto imponantur: tertio vero die macerationis, quæ subsequuntur particulatim crasseque trita ut inulam, xilobalsamum, phu, asarum, asphaltum (satius & rectius esset si asphaltum cum paucore

P 6

a Per sextarium, à Saladino videlicet descriptum intellige, quæ ponderat unc. xxx. taleque pondus maxime ad supradicta infundenda convenit. *b* Per heminam, sive videlicet descriptam à Saladino, quæ ponderat unc. xv. intellige, & quia etiam videtur pondus ipsius hemina ad simplicia mæceranda sufficere,

quore non oleaginato infra scripto dissolveretur) carpobalsamum, syriacam, myrtum, samptuchum, vel tamariscum & mirram (præstantius esset mirram dissolvi in eodem liquore quo asphaltus fuit dissolutus, vel in pulverem redigi tenuissimum, & dissolutam vel pulverisatam cum oleo cocto ac colato, una cum ladano, styrace, mastiche, & balsamo admisceri) calide vasi ad infundendum, spatio unius diei in aquæ clarissima Sextario uno conjiciantur : deinde finitis diebus macerationis, nempe quarto die, hoc modo coquantur. Superponatur capitellum vitreatum rostratum cum suo recipiente, fictili in quo simplicia sunt macerata, luteturque diligentissime circumcirca, luto forti, ne spiritus in auras abeant, & in diplomate, vel in cineribus adaptetur, subterque ignis accensorum carbonum construatur, ut vapor fere totus aquei & vini humoris, fictili impositus, in summitatem capitelli ascendat, qui statim in recipientem descendet & cum omnino descenderit (quod plane dignoscetur quando vapores non amplius ascendent in capitellum, nihilque in recipientem descendet : vel fere vinum & aqua, quæ author postulat misceri oleo & simplicibus, tota in recipienti contineantur : quod

fere

fere pondus trium librarum æquabit) tunc capitellum à fictili & à recipienti delute-
 tur, & vapor totus in recipienti contentus,
 in fictile infundatur, & ut prius eadem me-
 thodo ad distillandum adaptetur (semper
 tamen fictile cum capitello, una cum re-
 cipienti lutando) hæcque distillatio plu-
 ribus vicibus repeti debet, semper aquam
 extractam in vas prædictum affundendo,
 & toties pari forma distillando, donec
 ℥. β. aut ad summum ℥. ix. remaneant,
 ad aliqua scilicet, quæ cum oleo conser-
 vari debent, dissolvenda. Tunc fictile à
 diplomate vel à cineribus extrahatur, eo
 extracto oleum & simplicia in eo conten-
 ta, per pannum canabinum, non mediocri-
 ter rarum, velociter extorquendo, colentur:
 in parte autem olei colaturæ, dissolve, in
 vase duplici, ladanum, mox styracem &
 mastichen segregatim cum aqua extracta
 & conservata pariter solves: omnibus
 dissolutis & à diplomate depositis, residuū
 colaturæ una cum balsamo, aut ejus succe-
 daneo admisceatur. His itaque diligenter
 commixtis, vase stricti orificii cooperto,
 ne jucundissimus odor evanescat, conda-
 tur.

Alii alia utuntur methodo, videlicet
 simplicia primæ infusionis mediocriter
 trita,

trita, una cum olei & vini quantitate ab authore scripta tempore dicto calide infundunt: deinde in diplomate ad humidiperemptionem coquunt, humiditate perempta colant: colaturæ simplicia secundæ macerationis parum contrita una cum vini quantitate requisita ut supra tempore designato macerant & ad humidum usque decoquunt, consumpto humido iterum colant, & colaturæ simplicia ultimæ infusionis crasse tusa, una cum aquæ quantitate descripta tempore determinato superiori documento infundunt & ad humidiconsumptionem coquunt, & rursus percolât. In parte autem colaturæ ladanum & mastichen liquant, liquatis & ab igne depositis balsamum addunt, desuper partem reliquam colaturæ spatula lignea movendo conjungunt: uterque modus optimus, sed prior efficacissimus quamvis in officinis raro usitatus sit. Cæterum in hoc notare debemus Alexandrinum & præpositum in methodo conficiendi syriacam omisisse: rursus Præpositum maxime in simplicibus variare, & à methodo Alexandrini. Quare ea quæ sunt observanda in hoc conficiendo tyrunculus observet.

Et in aquæ sextario uno.

Et

Et in vini semisextario.

Trita vini optimi semihemina.]

a Sextarius æquivalet Heminis duabus : sed in his explicandis magna est controversia : propterea quod aliquando pondere definiuntur : aliquando mensura : pondere quidem ut cum pro varietate eorum quæ excipiuntur & continentur, quorum quædam graviora sunt, quædam leviora. *b* Nam hemina ponderat unc. ix. si de oleo agitur. Hemina aquæ vini & aceti unc. x. vel potius ut nos experti sumus excedit unc. xij. mellis $\text{℥} . j.$ vel potius $\text{℥} j.$ semis, si libra medica usurpetur *c* quæ continet unc. xij. ut decet. Mensura autem definiuntur, ut cum Galeno explicanti andromachi oleum ricinum Cotilas sive Heminas unc. mensuralibus ix. constare probabile est, ut sex cotilæ sint unc. quatuor & quinquaginta, quod idem est cum libris mensuralibus Romanis quatuor & dimidia. Eadem ratio Sextarii quia est duplicata Hemina, ut quod de uno horum dictum sit, de altero intelligatur. Si Hemina mensuralis acciperetur, non essent distinguendæ Hem. olci, aquæ, vini, & mellis, sed tantum in-
geren-

a Sextarii & Hemina explicatio varia. *b* Hemina spectata pondere. *c* Hemina spectata mensura.

gerendum quantum capacitate vasis contineretur, at plerique authores ponderant non contenti mensuralibus. *a* Tamen ut aperte intelligatur sextarius vini, aquæ, aceti, olei & mellis, secundum Saladini mentem æqualis accipitur penditque unc. xxx. ubi pondus intelligit librarum duarum semis quodcumque sit quod ponderetur: alii autem limatius ista definiunt, ut res aliæ, aliis sunt graviores aut leviores: ut Avicennas unc. xxiiij. aquæ, vini, & Saceti extario *b* contineri, olei vero unc. xij. videntur autem potius legendæ unc. xviiij. quia satis constat ut sæpe experti sumus, pondus mellis, pondus olei ex dimidio exuperare, & aquam olei pondus ex tertia *c* parte excedere: atque oleum esse levius melle & aqua. Itaque valde observare oportet *d* quid solitus sit author per Heminas intelligere, an ne scilicet pondus majus aut minus requirat, pro varietate eorum quæ in medicamentis desiderantur: ut si olei Heminam nominet, an ne intelligat unc. ix. si vero aquæ, vini, vel aceti Heminam quia gravior est, an ne unc. xij. quod tamen plerique non distinguunt,

a Maxime usitata Hemina & sextarii acceptio.

b Avicenna opi. i. de pondere olei aqua & mellis.

c Eiusdem restitutus locus. *d* Conclusio disputationum.

gunt, quia habent rationem capacitatis. Dioscorides Galenus & Paulus sic Hemina in liquidorum ponderibus & mensuris definiunt. Hemina vini, aceti & aquæ, unc. x. pendet: olei unc. ix. mellis unc. xij. Paulus capit unc. xij. semis. Sed communis sententia est, quæ prius descripta, ut Hemina significet unc. xv. id est, libram unam medicam, cum quarta parte. Sed hæc quæstio valde ardua, quæ instituitur de ponderibus & mensuris. Plura autem leges apud Agricola, Paulum, Galenum & alios qui de hac re controversa scripserunt.

VIRES AB ALEXANDRINO
probata.

Virtus ejus calefactoria & relaxatoria est. Inunctum cephalalgicis & hemicranicis prodest, doloré aurium, cum pipere trito, veteranum aufert, paralyticis & tremulis summum remedium est, arthriticis & podagricis inunctum, furiosos dolores mitigat: antidotis & electuariis, ad lapidem renum & vesicæ confectis admixtū, non vulgariter opitulatur: matricis dolores, suffocationes, & tumores, pessariis adhibitum sedat. ^a Stranguriam & dysuriam,

^a Cathetera est instrumentum in quo imponuntur injectiones enematum: vulgo (Seringue)

furiam cum tertia parte succi ocymi per catheterem clysterizatum, absque moræ solvit, & ad multa alia facit.

C A P V T X V I I I .

Oleum de castoreo simplex Præpositi, in xiiij. particula de oleis V suale.

Verus Præpositi textus.

Decoquatur ℥j. castorei in ℥. j. a olei usque ad consumptionem tertiæ partis, & conserve- tur oleum cum pulvere castorei.

a *Oleum oli-
varum ma-
turum acci-
pe.*

S C H O L I A .

Estium castorei Pontici à tuni- cis purgatorum a naturalibus, li- quorem recentē, intus cerosum, odore gravi virus redolentem, gustu acri mordentem, accipito, & oleo communi dissolvito: dissolutum in diplo- mate

a *Castorei electio.*

mate cum ℥. ij. vini albi odoriferi ad vini consumptionem decoque, coctum usui seruetur.

In hoc maxime notandum, Præpositum decoctionem castorei facere cum oleo, sine aliquo liquore, ad tertiæ partis olei consumptionem: quod re vera nunquam fieri poterit hac methodo: nam si oleum infinitis diebus in igne remaneret, nec gutta quidem illius consumeretur, ut satis nobis operantibus notum est: sed potius adureretur, nec aliquam virtutem retineret. Quare, ut suppleatur quod ad hujus olei præparationem, consuevimus ℥. ij. vini albi addere oportet ut vinum quod subtile est, faciat liquorem castorei oleum penetrare coquendo. Præterea maxime cavendum, ne hoc oleum transelemus immo castorem, cum oleo seruari oportet etsi recens non sit.

V I R E S A Q V I B V S D A M
Medicis præscriptæ.

Valet ad omnes nervorum & cerebri offensas frigidâs, sanat rigores acerrimos, & frigora febrium sedat, si spinæ dorsi illitum apponatur.

Oleum

*Oleum de Castoreo compositum ex luminari
majori Sect. xj. tractatu de oleis magistra-
libus V suale.*

Textus verus Luminaris.

℥. Castorei.

Styracis calamitæ.

Galbani. Euphorbii.

Cassia lignæ.

Croci. Oppopanacis.

Carpobalsami.

Spicæ nardi.

*a Alii ana, drach.
iij. legunt, & me-
lius.*

Costi. *a ana ʒ ij.*

Cyperii. Schœnanrhi.

*b Brathin, Serapius
in capite de juni-
pero dicit esse sabi-
nam.*

Piperis longi.

b Bratheos.

c *Legendum est* Pyrethri.

ana drach. ij. sem.

ut multi alii codices legunt.

d *Oleum olivarum, maturum*

accipe: alii loco lib.

iiij. lib. iij. capiunt

e *Legendum est*

vini albi unc. Xij.

que sufficiunt: ad

omnia aromata co-

quenda cum oleo:

vel ad summum

lib. j. sem.

Pipetis nigri. *c ana ʒ ij.*

d *Olei olivarum.*

℥. iiij.

e *Vini albi & boni.*

℥. ij.

Bulliant omnia simul ad consumptionē vini deinde exprime & reservetur.

S C H O L I A.



Rassiuscule omnia simplicia electa (dempto galbano, oppopanax & euphorbio) ordine & per se terantur: videlicet, quæ teri debent, terantur: ut costum &c. quæ vero incidendi, incidantur ut spica nardi, schœnantum, die uno in magna parte vini albi prædicti, una cum oleo super cineres calidos, vase bene oburato, macerentur. Secundo

cundo die in vase duplici ad vini evaporationem coquantur : postea exprimendo colentur : colaturæ galbanum oppopanaxem, & euphorbium, in reliqua portione vini supradicti per se liquata, colata, & ad humidi consumptionem lento igne cocta, spatula movendo permisce, demum omnia probe commixta & conjuncta reconde.

Cæterum notabis, quod si recens sit castoreum, illius liquorem liquidum & ferosum esse debere, quem cum gummi generibus dissolutis, colatis, & coctis paulatim admiscebis, ut facilius cum dicto oleo commisceri possit. Quod si castoreum sit siccum, contundes, & cum oleo cocto, & colato, recondes. Alii pulverem castorei prædictum, oleo cocto, in fundo vasis recondunt, una cum styrace pulverisato, ut vis castorei, & styracis, in oleo remaneat; quod maxime laudo.

V I R E S E X L V M I N A R I
majorè desumpta.

Valet in omnibus ægritudinibus, & confert tremori, & tetano, & doloribus nervorum & juncturarum: & alii paralyfi & spasmo mederi affirmant.

CAPVT XIX.

*Oleum costinum Mesuæ in xij. distinct.
de oleis V suale.*

Textus Mesuæ verus.

a Radices costi, \mathcal{Z} . a Costi amari.
intellige, & quia \mathcal{Z} ij.

vero costo care-
mus, Avicenna \mathcal{Z} j.

ponit medietatem
radicis de pyretro.
Syl. radices inula,
aut galangam ma-
jorem sumendam
esse docet.

b Per cassiam, li-
gneam author in-
telligit.

c Per quantum
sufficit, unc. ix. vel
ad summum unc.
xij.

d Olei sesamini
loco, si deficiat, dul-
ce, hoc est, ex amig-

dalis dulcibus substituendum erit & legendum e-
lib. ij. loco lib. iij.

Extremitatum samp-
suci. \mathcal{Z} viij.

Vini odoriferi c quan-
tum sufficit ad in-
fundendū noctibus
duabus.

d Olei sesami. \mathbb{L} . iij.

Decoquantur sicu
oleum nardinum hori-
sex.

SCHO-

S C H O L I A.

R Adix costi, & cassia lignea simul probe conquassentur & in vino odorifero una cum extremitatibus sampfuci viridis, crasse contusis, fictili novo, cooperto, spatio horarum quatuor, ad summum sex, ad infundendum, super cineres calidos imponantur. Alii spatio unius diei simplicia infundunt, una cum oleo fesamino aut ejus succedaneo: & in diplomate, omnia, ad humiditatis consumptionem, coquunt: ubi cocta fuerint, calide exprimendo, transcolant. Colatum vero oleum, ad usum reservant.

VIRE A *MESVE* *DESCRIPTÆ.*

Nervos & lacertos calefacit, & aperit oppilationes eorum, & confortat omnia membra nervosa, & confert stomacho, & hepati, & confortat capillos, & prohibet canitiem, & facit colorem, & odorem corporis bonum.

C A P V T XX.

*Oleum de euphorbio Mesuæ xij. distinet.
de oleis Vsuale.*

Textus verus Mesuæ.

a Euphorbium recens, si reperiatur accipe, si vero deficiat, vetus. ℥ . a Euphorbii. ℥ β.

b Oleum de cheiri Mesuæ scilicet. Galenus oliviarum & maturum capit. b Olei de cheiri. ℥ v.

c Per tantumdem, unc. v. intellige. Vini odoriferi c tantumdem.

Decoque usque ad vini consumptionem, & utere.

S C H O L I A.

Recens euphorbium accipito: si autem recenti careamus, veteris dupla, vel tripla esse debet proportio. Illud in tenuissimum pulverem reducito: sed inter pulverisandum paucis vino aspergito, ne nares feriat. Pulverisatum una cum oleo, vinoque rubro, lento

lento igne, vase duplici, spatula movendo, ad consumptionem vini prædicti decoquito. Coctum nec colatum ad usum reconde.

Maxime hic notandum Galenum in fine lib. 2. pharm, pro vario scopo oleum de euphorbio parare. Sic enim inquit, si euphorbium invalidum sit, & vel si vetus est, ut bimum, & jam pallidum, aut flavum, ℥. vj. si sensus in auribus, vel parte alia est acerrimus, minus, semiunciam vel ℥. iij. si obtusus, validi euphorbii ℥. β. vel ℥. v. præsertim si affectus est contumax, ut alopecia, licet apponere. Quocirca diligenter attendat Pharmacopœus electionem veram euphorbii, antequam istud oleum conficiat, ut possit hanc compositionem recte parare. Cæterum notabimus Galenum lib. 2. de composit. medicament. secundum loca, oleum commune maturum ad lib. j. capere in quantitate prædicta euphorbii, illudque minuere aut augere pro scopo vario.

VIRE S A M E S V E N O T A T Æ.

Ad ægitudines nervorum, frigidas, & dolores eorum, & juncturarum, & dolores hepatis

a Per invalidum recens & album intellige.

hepatis & splenis valet : & fit caput purgium ex eo ad sodam, hemicraniam & lethargiam.

CAPUT XXI.

Oleum de piperibus ex Mesuæ xij. distinct. de oleis cum additione, raro V suale.

Verus textus Mesuæ.

℞. Trium piperum.

a Legendum trium piperum ana drac. ij.

a ana ℥ iij.

b Chebulatorum.

b Ex his quatuor myrobalanorum generibus, cortices semendi sunt.

Bellyricorum, & Emblicorum,

Indorum. ana ℥ v.

Radicum apii.

Fœniculi. ana ℥ iij. β.

Sagapeni. Oppopanaxacis.

℞ 2

C H 10

c Hyoschyami loco, *c* Hyoscyami albi. ana
legendum est am-
moniaci secundum
3 ij. β.

d Turbith albi boni.
3 xij.

Zinziberis. 3 iiij.

Caulisrecentis.

e Hasech humidi.

Foliorum ruthæ humi-
dæ. *f* ana quantum
de singulis manu ca-
pi potest.

Decoquantur omnia
prima contritione ea-
rum cum

Aquæ. *g* ℥. xxiiij.

usque ad tertiam par-
tem: deinde colentur
& projiciantur super

f Per ana quan-
ca

d Turbith, legen-
dam est drach. ij.
loco drach. xij.

e Hasech humidi,
thimi viridis sum-
mitates intellige.

f Per ana quan-

tum de singulis manu capi potest, intellige manipulum unum quod refero ad unc. j.

g Legendum est aque lib. xij. loco lib. xxiiij.

h Oleum de cherva, oloum factum ex semine cataputiae majoris accipe, & per Heminas ij. olei, à Saladino scriptas, intellige, quae ponderant unc. xxx. vel lib. ij. se. medicas.

i T. pia loco, legendū est cassia lignea.

k Per cordumenum, semen carvi agreste, intellige.

l Per expressionem alchafeh succum vel decoctum thimi colatum, & per

Sextaria ij. lib. vij. sem. medicas intellige : hic quarta pars Sextarii unius (quae sunt unc. vij. semis) sufficit.

b Olei de cherva. Hem. ij.

& coquantur usque ad consumptionem aquae: & sunt ex hominibus qui addunt in eo.

Ireos. ʒvj.

i Tapfia. ʒij.

Anisi.

k Cordumeni. ana ʒj. β.

Calami aromatici. ʒij. β.

Spicae indae. ʒj.

l Expressionis alchafeh. Sext. ij.

administretur ut oportet.

S C H O L I A.

R Adices recentes apii , fœniculi prius à corde interno purgatæ , incisæ , ac tritæ , quatuor genera myrobalanorum, turpetum, anisi semen, hyosciamus, cordumenum, caules recentes, rutha, thymum, seorsim crassiuscule trita, in aqua prædicta, spatio duorum dierum calide infundantur vase bene obturato, interdum spatula movendo. Tertio die spicam incisam, ireos radicem, calamum aromaticum, cassiam ligneam, ziber, species piperis, omnia particulatim obiter trita desuper injicies, spatioque unius diei macerari permittes: peracto infusionis & macerationis tempore, ad medias vel ad tertias, lento igne continua agitatione concoques (alii vase duplici coquunt) tum panno lineo rudi transcolabis fortiter exprimendo. Colatum una cum oleo de cherva, aut illius loco amigdalorum amararum, vel irino, & expressione thymi, ad humidi consumptionem, eodem igne semper agitando decoques: postea transcolabis, & refrigerari permittes: quo omnino refrigerato, gummi genera, ut sagapenum, ammoniacum (si liceat

ceat addi) oppopanacem, seorsim arte soluta (ut Sect. 1. & 2. satis copiose modum solvendi docuimus) & ad humidi non radicalis consumptionem cocta, paulatim spatula agitando, in oleo colato dissolves, & simul miscebis, atque usui servabis.

Alii hac sequenti methodo componunt.

In aqua prædicta radices apij, fœniculi, incisas, quatuor genera myrobalanorum, turpetum, piperilque species, gummi genera, ziber separatim trita, caules recentes, rutham & thymum, in mortario lapideo, pistillo ligneo, tusa, igne lento, ad tertias concoquunt, spatula ducendo, deinde fortiter torquendo exprimunt. Expressura una cum oleo de cherva, aut ejus succedaneo, ad humidi peremptionem, simili igne, prædicto, spatula ducendo percoquunt, & sine aliorum additione ab aliis authoribus conjuncta, ad usum recondunt. Cæterum ut verum fatear, primus modus à nobis descriptus excellentior est, quam altera methodus. Volunt alii omnia ordine concoqui ad tertias, non distinguendo, an sint aliqua simplicia, quæ dissolvi debeant, & servari cum oleo, ut sunt gummi genera: id quod diligenter in nostra methodo nobis usitata observabimus. Deinde nemo miretur, si aquæ quantitatem præscriptam

ab authore non observem, cum loco xxiiiij. aquæ librarum, duodecim tantum assumo, & loco sextariorum trium expressionis thymi, quæ lib. vij. ß. valent, uncias septem & semissem assumo. Hæc enim quantitas aquæ, & expressionis, idonea est ad omnia simplicia infundenda materanda, & coquenda. * Nam omnia sunt calida, sicca, & tenuia. Quocirca verendum, si decoquantur in tanta aquæ quantitate ne substantia, ac illorum facultas evanescat. Nam ut docet Mesues, oportet ut gradatio sit in decoctione, plus vel minus commensurando calorem, & proportionando illum substantiis rerum debilibus, vel fortibus. Præterea omnia quorum virtus facile resolvitur, aut quæ sunt debilis texture, aut virtutem habent positam in superficie, debili coctione egent. Ea ratione illa, quæ hoc oleum ingrediuntur, debilis texture sunt, virtutemque habent in superficie positam: ergo debili coctione egent. Quantitas igitur aquæ à Mesue præscripta minuenda. Atque hæc sunt in hoc oleo notanda. Adde etiam consuetudinem, quam observavimus in proportionibus aquæ ad simplicia in decoctionibus: nempe ad unam partem simplicium, tres vel quatuor aquæ

* Per tenuia, tenuis essentia, intelligatis.

aquæ partes : quam proportionem in nostra methodo observavimus. Præterea id notare quoque convenit : si in omnibus compositionibus Arabum reperiatur Sextarius , Sextarium Italicum licet accipere, Rursus si hemina inveniatur, italica vel ægyptiaca sumenda erit.

V I R E S A M E S V E
dictata.

Expertum ad ægritudines nervorum frigidas, sicut paralyſim, spasmus, torturam, tremorem & mollificationem : & confert ad epilepsiam, & veram ischiaticam, & dolorem juncturarum, & dorsi, & colicam : & aperit oppilationes, & confert matrici juvamentum manifestum, & calefacit eam & confert humiditati ejus, & confert dolori ani à frigiditate, & dolori renum, & vesicæ, & frangit lapidem.

C A P V T X X I I .

Oleum de mentha incerto auctore, tamen mihi frequens & vsuale.

Vera descriptio manu scripta.

℥. Menthæ crispæ sativæ & viridis.

℔. ℞.

℞ 5

a Va-

a *Valerius cordus*
 id vult parari cū
 oleo omphacino, eo-
 dē modo quo myr-
 tinū simplex, aut
 ruthaceum Me-
 sua.

a Olei olivarum com-
 pleti & loti.

℥. j. ℥ iij.

Succi menthæ.

℥ iij. ℥ vj.

Conficiatur ut oleum
 de majorana, ter, aut
 quater mutatis foliis,
 antequam succus adda-
 tur.

V I R E S A D O C T O R I E V S
Medicis probata.

Optimum ventriculo est: nam ventri-
 culum imbecillum ac frigidum calefacit
 ac roborat, nausæ succurrit, & vomitum
 sedat, concoctionem adjuvat, appetentiam
 inducit, durities, & abscessus, qui in ven-
 triculo fiunt, solvit.

CAPVT XXIII.

Oleum lumbricorum terrestrium incerto auctore frequens & Vsuale.

Vera descriptio in quodam libro reperta.

a Olei olivarum, multi pondus duplicant.

b Vini quantitas hac, re vera non sufficit, si perfecte decoctionem vermium vis parare: & loco unc. viij. legendum lib. j. sequia si coqueretur usque ad consumptionem tanta quantitas vini, ureretur oleum.

℥. Vermium terræ.
℥. ij.

a Olei olivarum maturi & loti. ℥. iiij.

b Vini nigri & generosi. ℥. viij.

Bulliant omnia simul & fiat oleum, deinde percoletur.

SCHOLIA.

A Terra separentur lumbrici & laventur diligenter in aqua fontana pluribus lotionibus, donec à terra sint immunes, semper tamen aquam pro quacumque lotionè innovando. Peracta lotionè, in vase coopto, una cum vini nigri generosi lib. j. β . & oleo prædicto, vase duplici, ad vini fere peremptionem, coquantur: dein per pannum iudem canabinum colentur: colatum ad usus necessarios recondatur. Petrus Montagnana in antidotario suo capite 6. de oleis unum habet minime varium.

VIRES A MEDICIS PROBATÆ.

Nervos infrigidatos confortat, & utile est ad dolores juncturarum.

CAPUT XXIV.

Oleum de croco Mesuæ xij. distinctione de oleis interdum V suale.

Verus Mesuæ textus.

℥. Croci.

℥ j.

a Per

Myrrhæ puræ. ℥ iiij.

a Per cordumeni, a Cordumeni. ℥ ix.

carui semen agre- Calami aromatici.

ste, intellige. Syl- ℥ viij.

vius loco cordu- Infundantur medici-

meni, cardamo- næ in

b Aceti quantita- b Aceto.

tem, Mesues non

desinit, & ponende

sunt unc. viij. ad

summum unc. x.

diebus quinque, præ-

ter cordumenum : die

sexto projiciatur super

ea cordumenum & di-

mittatur die uno, dein-

de fundatur super ea

c Olei. ℥ . j . ℞ .

& coquatur lento igne

usque ad aceti consum-

ptionem : & sunt qui

loco aceti, vinum po-

nunt.

S C H O L I A.

IN fiētili cooperto calamum aromaticum crasse tusum; a crocum integrum, & myrrham confractam, una aceti ℥ viij. vel ℥ x. diebus quinque calide infundes; sexto die desuper cordumenum mediocriter tusum projicies, & adhuc spatio unius diei omnia macerari permittes: maceratis & infusis oleum olivarum immaturum lotumque affundes, & lento igne ad aceti consumptionem, spatula movendo, concoques: cocta per pannum rudem colabis: colatum reconde & utere.

Avicenna 5. canone Summa 1. tract. 10. unum describit. Alexandrinus cap. 732. alterum habet, qui minime cum Mesue convenit.

V I R E S A M E S V E
probata.

Confert doloribus nervorum & confortat eos, & lenit duritiem eorum, & confert spasmus, & dolori matricis, & colicam efficit bonum.

C A P V T

a Savius esset crocum dissolvi, cum suo dissolvente quam integrum tenere, ut major sit vis olei.

CAPVT XXV.

*Oleum de capparikus incerto authore Vsuale
& frequens.*

Verus textus in quodam libro repertus.

a Asplenium, Scolopendriam intellige Dioscoridus, quã barbara vice ceterach vocant.

b Acetum album, vel rubrum, nihil interest quale hoc loco accipiatur.

c Oleum alii maturum vel immaturum accipiunt, dummodo sit tenue, participet ex utriusque excessu, nihil interest. Tamen hoc unum cõsiderare oportet, si velimus, lienem corroborare, immaturum accipe-

℥. Corticum radicum capparum, ℥ j.

Corticum tamarisci.

Seminis agni casti.

a Asplenii.

Cyperii. ana ℥ ij.

Ruthæ. ℥ j.

b Aceti.

Vini albi clari odori.

ana ℥ ij.

c Olei maturi olivarum. ℥ j.

re convenit, cum astringētia hic magis competant, si vero tumorem lienis scyrrhosum emollire contendamus, maturum esse debet. Hoc autem oleum precipue ad lienis vitia accommodatur.

Coquantur in duplici vase ad aceti & vini consumptionem.

S C H O L I A.

R Adices cyperi minutissime incidantur, & in mortario æreo una cum corticibus cappatum & tamarisci obiter tundantur: tufæ fictili novo cooperto injiciantur. Desuper semen agni casti contusum, folia ruthæ, tamarisci & scolopendriæ separatim in mortario lapideo contusa imponantur: mox acetum & vinum una cum oleo desuper affunde, & spatio xv. dierum insola. peracto die infusionis, in diplomate, vel in cineribus, ad vini & aceti consumptionem, concoque: statim cola, colatum usui reserva.

Animadvertite plures esse hujusce olei descriptiones apud Musam Brassavolum ab ista differentes. Nam aliæ recipiunt corticem radicis capparis, scolopendriam, tamariscum, absintium, oleum commune & ace-

& acetum. Aliæ radicem corticis capparis, scolopendriam, tamariscum, iridis radicem, radices cyclaminis, galangam, oleum & acetum. Aliæ corticem radicis capparum, & iridis radices, agnum castum, tamariscum, oleum, & vinum. Idcirco parva mihi videtur differentia, & video omnes pro animi arbitrio istud oleum parare. Tamen quamvis reperiantur multæ descriptiones diversæ, ista præscripta mihi videtur usitata & longa experientia celebrata.

*VIRES A MEDICIS QVIBVS-
dam probata.*

Confert duritie, oppilationi, & dolori splenis ac omni ejus ægritudine.

Verus Mesuæ textus.

a *Scorpiones vivos & terrestres accipe.*

b *Per quantitatem eorum magnitudinem eorum intellige.*

℞ . a Scorpiones circiter xx. vel plus vel minus, secundum b quantitatem eorum, & pone in vase vitreo, & funde super eos olei amig-

dalarum amarum.

℞. ij. &

c In sole, scilicet, vigente, diebus canicularibus.

stringe caput vasis, & dimitte *c* in sole diebus xxx. deinde cola & utere.

S C H O L I A .

TErrestres ac vivos scorpiones secundum eorum magnitudines, hoc est, si magni, crassi, & plurimum facti sint, viginti: si vero parvi, quadraginta quinque, vel, ad summum l. accipe, & vase vitreo, cooperto, ipsos una cum quantitate olei amigdalorum amararum prædicta, soli, diebus canicularibus, spatio xxx. dierum ad macerandum appone. Melius si antequam soli apponantur igne levi bullirent tribus vel iiij. ebullitionibus, quamvis non sit scopus authoris scorpiones decoqui, sed tantum macerari. Exactis diebus macerationis oleo minime colato reconde, & utere.

*Oleum de Scorpionibus compositum Mesuæ
xij. distinct. de oleis frequens & Usuale.*

Verus Mesuæ textus.

a *Aristolochia, radices recentes accipe.*

℥. a *Aristolochiæ rotundæ.*

b *Gentiana, radices recentes intellige.*

b *Gentianæ. Cyperi.*

Corticum radicis caparis. ana ℥. j. funde super ea

c *Oleum olivarum antiquum capit Manardus, & per Kist vinum olei, intellige lib. j. se.*

c *Olei amigdalaram amarum. Kist. j.*

Et pone in sole xx. diebus deinde projice super ea ex

d *Scorpiones vivos, terrestres, magnos, crassos & plurimum farctos intellige.*

d *Scorpionibus à x. usque ad xv.*

*& iterum stringe orificium vasis & dimitte
in*

in sole per dies xx. deinde coletur & reponatur.

S C H O L I A.

RAdices cyperi, minutissime incisæ, aristolochia, gentiana & cortices capparum scorsim in mortario obiter conquassentur, & una cum oleo amygdalino amaro, vase vitreo obturato reponantur, spatioque viginti dierum insolentur. Peracta infusione scorpiones vivi & ut supra diximus electi xv. num. desuper projiciantur & iterum tantumdem insolentur. Tempore macerationis peracto totum coletur, & recondatur. Cæterum libenti animo ad simplicia infundenda aliquid liquoris, huic oleo cõvenientis, concederem addere, penetrationis causa, nisi à Medicis doctissimis absurdum, & præter artem videretur. Scio etenim oleum solum non posse virtutem crassam harum prædictarũ rerum, quæ sita est in centro, penetrare, absque liquore: quamvis forsitan à Medicis dicentur simplicia omnia hãc cõpositionem ingredientia, satis subtilẽm & penetrantẽm habere substantiam. Quapropter consulo
omnibus

omnibus pharmacopœos qui hoc oleū parare volunt, Medicos peritissimos qui confectionem manuariam, norunt consulere, an aliquid liquoris sit addendum ad harum dictatum rerum penetrationem. Sed si non ab eis cōcedatur, consulo, ut antequam secunda vice simplicia insolentur, bulliant duabus ebullitionibus : vel omnia recentia capiat, ut oleum virtutem prædictarum rerum acquirere possit. Animadvertite quoque plures reperiri descriptiones: unam apud Joannem Anglicum, in capite de lapide renum : aliam apud Rhasim in lib. divisionum capit. medicinarum urinæ : aliam apud Matheolum Senensem comment. in præfat. lib. 5. Dioscoridis, omnes minime usuales. Proinde necessarium est utrumque oleum à Mesue hic descriptum paratum habere : quia utrumque usui convenit.

*VIRE PRÆDICTORVM OLEORVM
à Mesue designata.*

Lapidem in renibus & vesica fragit, & expellit eum, & proprie in renibus & fœmore, & supra collum vesicæ inunctum, & injectum per virgam, expellit enim eum.

Primum, quod est simplex, plus attinet frigiditati ratione scorpionum, sed secundum, plus attinet caliditati, ratione aromatum, & utrumque est aperitivum, easdem facultates simillimas habens.

C A P V T XXVII.

*Oleum Sambacinum auctore incerto frequens
& Vsuale.*

Verus textus in quodam libro repertus.

Fit etiam oleum ex floribus Iasmini, quod Sambacinum Arabes vocant, chamæmelo aut cheirino visibus proximum.

S C H O L I A.

℥. Florum Iasmini seu sambuci.

℔. ℔.

Olei olivarum completi loti.

℔. j. ℥. iiij.

Aquæ

Aquæ infusionis seu fervefactionis
prædictorum florum. ℥ iij. ʒ vij.

Conficiatur ut rosatum completū.
Paretur autem infusionis aqua, cum
℥ ij. florum jasmini recentis & aquæ
ʒ vij. ad mediæ partis consumptionem
vel ad ℥ iij.

VIRES AB IP SO AVTHORE
incerto.

Chamæmelino aut cheirino viribus pro-
ximum.

C A P V T XXVIII.

Oleum hypericonis incerti auctoris usitatum.

Verus textus usitatus.

℥. Summitatum seu comarum hy-
perici jamiam mātūrescētis. ℥. ij.

Olei olivarum completi antiqui &
loti. ℥. ij. β.

Aquæ infusionis florū
prædictorum, aut
ejus loco a succi eo-
rum. ℥ viij. β.

a Mesues tantū-
dem succi vel in-
fusionis ut olei af-
fundit.

Paretur ad normam
rosati completi. Pare-
tur autem aqua infu-
sionis cum ℥ iiij. florū
prædictorum & aquæ
℥ x. β. fiatque deco-
ctio ad ℥ iiij. consum-
ptionem.

VIREΣ A DOCTORIBVS
probata.

Est resolutivum, sedativum dolorum
qui fiunt in nervis, in juncturis, & pectore,
renibus, & vesica.

C A P V T XXIX.

Oleum vulpinum Mesuæ xiij. distinēt. de
oleis V suale.

Verus Mesuæ textus.

℥. Vulpem integram, cujus interiora
sint evulsa. a Aqua

*a Aqua marina loco, aquam sal-
sam accipe, quid
autem sit aqua
salsa vide in fine
istius cap. Et per
kist unum ex Se-
rap. lib. 7. in con-
fect. electuarii de
cytonis authorita-
te Gal. si est Rom.
est lib. 1. sem. Ex
doctrina Græcorum
est Kadus: tamen
parva dosis ad
vulpem exentera-
tam coquendam
videtur esse, nisi
statim nova fiat
aque dulcis suffu-
sio una cum aliis
simplicibus. Quod
ad me attinet soleo
primo aque fon-
tium & marine
ana li. vj. appone-
re, deinde ut vul-
pes commixtis sim-
plicibus coquatur,*

& pone in vase, & in-
funde super ipsam

Aquæ fontium &

a Aquæ marinæ. ana
Kist. j.

b Olei antiqui clari.
Kist. ij. ß.

Decoque igne lento
cum

Salis. ℥ iij.

usq; ad aquæ consum-
ptionem, deinde pone
in vase, & projice su-
per ipsam

Herbæ anethi &

c Halasech. ana ℥b. j.

Et funde super ea

R

ad

ad consumptionem & dissolutionem artuum super addo aquæ dulcis lib. viij. quamvis Mesues quantitatem non determinarit.

b Per oleum antiquum, clarum, & salsum sume, &

per kist ij. se. olei lib. iij. unc. ix. intellige quia omnes qui hoc oleum à Mesue transcripserunt in suis dispensariis Kist, ij. se. ita explicant, que explicatio videtur cōvenire cum ista à Saladino descripta.

c Per halasech, summitates thymi intellige. Alii organum explicant Bertrutius cap. de hyssopo Sect. 2. Tract. 4. capit. hyssopum. Alii Tribulum marinum. d Aquæ dulcis quantitatem author non specificat nec declarat: apponenda sunt autem lib. viij.

d Aquæ dulcis in qua coctæ fuerunt ex iisdem herbis. ana M. j.

Decoque sicut prius usq; ad aquæ consumptionem: & administretur.

S C H O L I A.

Vulpem integram mediæ ætatis, pinguem, venatu longaque inlectatione defatigatam (quia tunc oleum fiet digerentius) recenterque occisam cujus interiora sint evulsa accipito, & minutissime conscindito,

to, ut ab ossibus medulla diffiliat: & in quantitate olei & salis communis prædicta, fictili novo & amplo ponito: desuper aquæ marinæ & fontanæ lib. xij. injicito. Melius si leviter vel ad medias in aqua decoctionis herbarum, fontana & marina absque oleo coquatur vulpes, ne oleum nitvia coctione uratur, cum vis ipsius vulpis facilius eliciatur coctione aquarum quàm oleorum. Coctæ ad medias, oleum addatur & ad reliquum humiditatis coquatur igne lento: consumpta fere aqua, alterius item aquæ dulcis, in qua anethi & thymi singulorum M. j. incocti fuerint, & citicer lib. viij. affundito, simulque cum lib. j. thymi summitatum & lib. j. summitatum anethi ad hujus aquæ peremptionem & artuum dissolutionem, vel ut ipsius pinguedo ac caro injus colliquata abierint, & omnia sint liquefacta, præter ossa, recoquito: deinde velociter extorquendo calide exprimito: expressum ad usum recondito.

Aquæ fontium & aquæ marinæ.]

In hac urbe lutetiana non reperitur aqua marina, nec ad manum haberi potest, neque etiam in quibusdam locis. Igitur ii, qui prope mare non habitant,

R 2

ejus

2 Anethi & thymi summitates acciper

ejus loco muriam sumunt. *a* Muriaë autem varia est acceptio & significatio apud authores: accipitur enim alias pro liquamine piscium conditorum, ut apud Simonem Januensem, qui dicit falsum esse liquorem piscium exenteratorum quo pro falsamento multi utuntur. Cui subscribere videntur Dioscorides lib. 2. cap. 31. & Constantinus lib. 2. capite ultimo: qui liquamen piscium conditorum Garon vocant: quod pro muria nonnulli esse volunt. Alia vero species muriaë ab Arabibus describitur, quæ liquor est resudans ex farina hordei, dum panis conficitur, ut testatur Azaranius, scribente Simone Januensi. Præter hæc duo muriaë genera, alterum est, quod fit ex liquamine carnis sale conditaë, & pro muria verius accipitur: quod nonnulli Pharmacopœi inepte pro aqua marina sumendum putant: nam liquamen illud acre est, foetidum & corruptibile, & si plurimum coquatur rubrificandi vim acquirit. *b* Igitur ejus loco aquam accipimus cum sale ad spissitudinem muriaë coctam, quæ potius eligi debet, ut quæ astringens sit pro scopo olei præsentis, cum

a De muria varia sententia. *b* Aqua marina, & morsa loco quid.

cum in muria aliter parata, sit potius vis
evocandi foras, quam astringendi.

VIRES A MESVE
dictata.

Oleum vulpinum est medicamen no-
bile, ultimum ad arthriticam, & poda-
gram & dolorem renum & dorsi.

CAPVT XXX.

*Oleum nenupharinum Mesuæ xij. distin-
ctiōne de oleis V suale.*

Verus Mesuæ textus.

Et fit sicut oleum violatum.

SCHOLIA.

℞. Florum nenupharis viridium,
dempto intermedio illo croceo,
& illo viridi folio superiori & su-
perjecto, contusorum. ℥. ij.

R 3

Aquæ

Aquæ decoctionis prædictorum
florum. ℥. j. ℥. iij.

Olei olivarum immaturi loti. ℥. v.

Confice sic reponantur in vase terreo, bene cocto & facias pro ut de oleo rosato & violato tibi dictum fuit, & provideas de depositione ad solem, & de decoctione in vase duplici, & de permutatione florum, & de additione infusionis.

Decoctio autem florum nenupharis sic parari debet: nempe cum florum nenupharis ℥. iij. & aquæ fontanæ ℥. j. β. ad ℥. iij. absorptionem.

V I R E S A M E S V E

distillata.

Oleum de nenuphare in virtutibus convenit quasi cum oleo de papavere: tamen non est tantæ stupefactionis, nec est somni provocativum, sed alterativum.

D E G E N E R E O L E O R V M

Q V A R T O.

Quæ fiunt tribus modis. Unum, ubi materia coctione in spiritus resolvitur & expri-

exprimitur, ut oleum ex vitellis ovorum. Aliud, ubi materia in spiritus pariter resolvitur, & in recipiente condensantur: ut oleum terebinthinæ, & multa alia oleorum genera. Tertium, cum calcinata materia & in modum salis reducta super porphyrio aut marmore vel linteolo contenta, in loco frigido dissolvitur: ut olea ex quibusdam mineralibus calcinatis. Unde vulgare proverbium, habes sal, ergo oleum. De quibus oleis & salibus chymisticis plura dicerem, cum methodus illorum satis mihi nota sit, si in usu quotidiano essent; de his tamen alio brevi compendiolo spero me dicturum, si superi in spatium temporis vitam producere concedant.

C A P V T XXXI.

Oleum de ovis Mesuæ xij. distinctione de oleis, V suale.

Vetus Mesuæ textus.

a Elixatorium, hoc est, coëtorum in aqua.

Accipe vitella ovorum
a elixatorium circi-
ter. xxx.

R 4


b Per

*b Per sartagine[m]
lapideam, figuli-
nam accipe.*

*c Lignea spatula
magis prestatquam
ferrea, propter ni-
gredinam.*

Et comminue ea ma-
nibus, & pone in
b sartagine lapidea
& frige super ignē,
movendo cum *c* li-
gneo aut ferreo co-
cleari, donec rube-
scant, & resolvatur
ab eis oleum. Et tūc
exprime ea cum co-
cleari, & manabit
abundantius.

S C H O L I A.

 **V**a recentia gallinacea accipian-
tur, quæ in aqua calida probe
igni indurare facies, non autem
in cineribus calidis (ut efficacius
efficiatur oleum) illaque manu decortica-
bis, & album auferes, vitellosque illorum
manu vel spatula lignea confrictos, sarta-
gine figulina, flagrantissimo igni apposita,
rursus spatula lignea (non autem ferrea
propter nigredinem) assidue celeriterque
undiquaque agitando, eousque dum assi
vel

vel tosti sint, vel in chylum æquabilem pervenerint. Tunc subito & sine mora linteo rudi calido involue, & torculari immitte: quod statim expresseris oleum, flavum emanabit, quod repones ad usum. Hoc ita extractum, quia crassum & maxime terrestre est, potest subtilius fieri (nisi scopus authoris varietur) si cucurbita aut retorta, in quam oleum imponitur, bene cum recipiente lutata & obturata (ne spiritus in auras effluant) cum aqua vitæ & sale fusili (ad fæces retinendas) ita ut eadem aquæ & salis fusilis quantitas sit, in arena vas ad distillandum apponatur. Apposito vasi pro animi arbitrio ignem subdito, & continuato donec totū oleum distillatum sit. Revera si spectemus scopum istius olei, rectificatio hæc minime fieri debet, sed potius absque rectificatione uti debemus.

V I R E S A M E S V E
probata.

Cutim mundificat & impetiginem, & serpiginem, & alios morbos cutis curat: & facit nasci capillos, & confert fistulis & ulceribus malis.

CAPVT XXXII.

*Oleum de terebinthina simplex ex thesauro
Euonymi V suale.*

Verus Euonymi textus.

a Per quantum videbitur intellige lib. j. vel sem. vel unc. iiij. pro capacitate vasis.


b Cineris è ligno duro aut forti dixit, ne eleuetur distillando terebinthina. Reuera nihil cum terebinthina est addendum ut sum expertus, capitque unc. iiij. prædicti cineris, videlicet, pro lib. j. terebinthina.

Accipe terebinthinæ claræ a quantum videbitur.

b Cineris è ligno duro aut forti. \bar{z} iiij.

Et in retorta fornaci accõmoda, A principio fiat ignis lentus ad humiditatis dissolutionem postea augeatur ignis ad olei distillationem.

S C H O L I A.

 Leum terebinthinæ fieri potest a arte chymistica, in cucurbita vitrea cum capitello rostrato, vel in retorta; ita ut utrumvis vas terebinthina sit semiplenum, absque arena, aut cinere è ligno duro, & optime obturatum cum recipiente amplissimo ut spiritus libere spatari possint (alioquin vas rumperetur) cucurbita vel retorta terebinthinam continens, vasi arena pleno imponatur, & super furnum quadratum adaptetur ut distilletur. Tum ignem medio-crem facito, & continuato donec ex lib. j. terebinthinæ ℥. iij. olei clari ac albi habueris. Tunc ignem parum augebis, continuando quousque tibi sint ℥. ij. olei sub-ruhi, aureique coloris, ac lucidi. Præterea rursus ignem augebis, dum rursus iterum ℥. ij. β. olei rubri croceique coloris & clari effluant.

Hac enim methodo tria genera olei terebinthinæ arte & industria facta habebis: Tandem hoc unum operando erit notan-

R 6

dum

a Per artem chymisticam, distillatoriam vel distillandi intelligendam chymistici distillatores dicuntur.

dum, ut pro quacunque ignis auctione recipiens permutetur ad olea diversa è terebinthina recipienda, quæ diligentissime in vitreis vasis obturatis fervabis, & cum opus fuerit uteris.

V I R E S E X E V O N Y M O.

Simplicia vulnera intra xxiiiij. horas sanat : valet ad nervos contractos à frigiditate: Accipiendo ℥.j. cum vino urinam movet, & omnes dissolvit corporis nervositates. Punctiones lateris curat: mirabiliter febribus pestilentibus confert eodem pondere per os accipiendo & unguendo stomachi orificium digestionem movet.

HÆc sunt (candide Lector) quæ tribus hæc sectionibus tuum in usum comprehensa, crebro amicorum suasu & rogatu impulsu, in lucem tandem emisimus. Fructum vero laboris nostri ad eos uberrimum spero perventurum qui rei medicamentariz serio addicti, præcepta & consilia nostra insequentur. Nos si quid ad publicam utilitatem contulerimus id singulare Dei Optimi maximi beneficium esse agnoscimus. Interim dum tu qualescumque has ingenii nostri primitias explorabis, nos ad alia studia, non minus his utilia, animum & calamus paramus. Vale.

F I N I S.

I N D E X



I N D E X
M E D I C A M E N T O R U M
C O M P O S I T O R U M ,

*Quæ hoc libro describuntur, per Sectiones
distinctus.*

Sectionis primæ capita.

C eratum de santalis. Mesue. <i>Caput 1.</i> <i>pag. 15</i>	
Ceratum, Ioannis de Vigo. <i>cap. 2.</i>	18
Ceratum oesypi ex Phyllagrio. <i>cap. 3.</i>	30
Ceratum infrigidans Gal. <i>cap. 4.</i>	36
Emplastrum diachil. parvum. Mesue. <i>cap. 5.</i>	38
Emplast. diachil. magnum. Mesue. <i>cap. 6.</i>	44
Emplast. gratia dei. N. Prepositi. <i>cap. 7.</i>	49
Emplast. de janua. N. Prepositi. <i>cap. 8.</i>	57
Emplast. divinum. N. Prepositi. <i>cap. 9.</i>	64
Emplast. ceroma. N. Alexandrini. <i>cap. 10.</i>	74
Emplast. oxicroceum. N. Myrepsi. <i>cap. 11.</i>	80
Emplast. de cerusa. N. Prepositi. <i>cap. 12.</i>	83
Emplast. tripharmacum. Mesue. <i>cap. 13.</i>	87
Emplast. palmeum. Mesue. <i>cap. 14.</i>	90
Emplast. contra rupturam. N. Prepos. <i>cap. 15.</i>	
	Emplast.

INDEX MEDIC. COMP.

<i>Emplast. de baccis lauri. Mesue. cap. 16.</i>	111
<i>Emplast. de mucaginibus. Fuschii. cap. 17.</i>	114
<i>Emplast. de minio. Io. de Vigo cap. 18.</i>	117
<i>Emplast. apostolicum. N. Prepos. cap. 19.</i>	125
<i>Emplast. pro stomacho. N. Prepos. cap. 20.</i>	137
<i>Emplast. de meliloto. Mesue. cap. 21.</i>	141
<i>Emplast. pro matrice. Nicolai Prepositi. cap. 22.</i>	

148.

Sectionis secundæ capita.

V <i>nguentum album. Rhasis. Cap. 1.</i>	156
<i>Vng. iripharicum. Mesue. cap. 2.</i>	158
<i>Vng. aureum. Mesue. cap. 3.</i>	164
<i>Vng. basilicon minus. Mesue. cap. 4.</i>	166
<i>Vng. egyptiacum magnum, seu de melle. Mesue. cap. 5.</i>	168
<i>Vng. populeon. N. Myrepsi. cap. 6.</i>	170
<i>Vng. de althea. N. Myrepsi. cap. 7.</i>	174
<i>Vng. Agrippe. N. Myrepsi cap. 8.</i>	180
<i>Vng. rosatum. Mesue cap. 9.</i>	184
<i>Vng. inularum. N. Prepositi, cap. 10.</i>	188
<i>Vng. diapompho. N. Alexand. cap. 11.</i>	194
<i>Vng. Apostolorum. Avicenne. cap. 12.</i>	205
<i>Vng. desiccativum rub. N. Prepositi. cap. 13.</i>	208
<i>Vng. mariatum magnū, N. Preposit. cap. 14.</i>	215
<i>Vng. resumptivum. N. Prepositi. cap. 15.</i>	224
<i>Vng. citrinum, ex antidotario Nicolai, Mesue con- juncto. cap. 16.</i>	228
<i>Vng.</i>	

INDEX MEDIC. COMP.

<i>Vng. ad scabiem, incerto authore. cap. 17.</i>	245
<i>Vng. Commitisse. Varignane. cap. 18.</i>	249. & 254
<i>Vng. mundificativum de apio, incerto authore. cap. 19.</i>	262
<i>Vng. neapolitanum, incerto authore. cap. 20.</i>	266
<i>Vng. Aregon. N. Myrepsi. cap. 21.</i>	270
<i>Vng. de ruthia. incerto authore. cap. 22.</i>	277

Sectionis tertiæ capita.

O <i>Lei amigdalorum, dua descriptiones. Mesue.</i>	
<i>Cap. 1.</i>	285. & 290
<i>Oleum de granis sesami. Mesue. cap. 2.</i>	291
<i>Olei rosati, tres descriptiones. N. Alexand. & Mesue. cap. 3.</i>	294. 300. & 302
<i>Oleum violatum. Mesue. cap. 4.</i>	306
<i>Oleum de cotoneis. Mesue. cap. 5.</i>	308
<i>Oleum irinum. Mesue. cap. 6.</i>	310
<i>Oleum de absinthio incerto authore. cap. 7.</i>	314
<i>Oleum anethinum. Mesue. cap. 8.</i>	315
<i>Oleum chamæmesinum. Mesue. cap. 9.</i>	316
<i>Oleum de lilio simplex. Mesue. cap. 10.</i>	318
<i>Oleum de cheiri. Mesue. cap. 11.</i>	319
<i>Oleum mastichinum. Mesue. cap. 12.</i>	320
<i>Olei myrtini dua descriptiones. N. Alexandrini & Mesue. cap. 13.</i>	322. & 324
<i>Olei ruthacei dua descriptiones. N. Alexandrini & Mesue. cap. 14.</i>	330
	<i>Oleum</i>

INDEX MEDIC. COMP.

<i>Oleum de majorana. Mesua. cap. 15.</i>	334
<i>Oleum moschelimum, N. Alexand. cap. 16.</i>	335
<i>Olei nardini duæ descriptiones, Nicolai Alexandri- ni, & Mesua cap. 17.</i>	340. & 342.
<i>Olei de castoreo duæ descriptiones ex Præposito, & Luminari majore. cap. 18.</i>	354. & 356.
<i>Oleum costinum. Mesua. cap. 19.</i>	359
<i>Oleum de euphorbio. Mesua. cap. 20.</i>	361
<i>Oleum de piperibus. Mesua. cap. 21.</i>	363
<i>Oleum de mentha incerto authore. cap. 22.</i>	369
<i>Oleum lumbricorum incerto authore. cap. 23.</i>	371
<i>Oleum de croco, Mesua. cap. 24.</i>	372
<i>Oleum de capparibus incerto authore. cap. 25.</i>	375
<i>Olei de scorpionibus duæ descriptiones, Mesua. cap. 26.</i>	379
<i>Oleum sambacinum incerto authore. cap. 27.</i>	382
<i>Oleum hypericonis incerto authore. cap. 28.</i>	383
<i>Oleum vulpinam. Mesua. cap. 29.</i>	384
<i>Oleum nenupharinum. Mesua. cap. 30.</i>	389
<i>Oleum de ovis. Mesua. cap. 31.</i>	397
<i>Oleum de terebinthina ex thesauro Eudonymi. cap. 32.</i>	400



INDEX RERVM,

*Quæ hoc Opere continentur quæque
notatu digna passim occurrunt.*

A.

A Cetum duplex.	Pag. 204
Adeps quid,	26
Adipis & axung. præparatio, & repositio.	
25. & 26	
Adipes & axung. quo tempore ex anima-	
libus sumendæ sunt.	24
Adipis & axung. origo.	26
Æs quorundam simplicium materia.	132
Æs ustum quid.	130
Æris usti veri electio.	ibid.
Æris usti duo genera.	131
Æris usti modus conficiendi ex Servitore.	
ibid.	
Æris usti modus conficiendi verus.	ibid.
Æris nativi tria genera secundum Pli-	
nium.	133
Ærugo.	69
	Ærugo

I N D E X

Ærugo rasilis.	ibid.
Ærugo scoletia duplex.	70
Æruginis duo genera.	ibid.
Æruginis factitiæ tria genera.	ibid.
Æruginis materia.	69
Æruginis succedaneum.	71
Æthiopia.	ibid.
Alipta moschata quid.	149
Alrachina quid.	292
Alumen capillare seu scyston vel plumæ, species chalcitis.	97
Alumen plumosum nostrum, non est scis- sile Dioscorid.	236
Aluminis plumosi vel scysti electio, & quid.	ibid.
Amaracus quid.	344
Amigdal. electio.	287
Amigdalarum ex corticatio.	288
Amianthi electio, & quid variæ opinio- nes.	236
Aminæa uva quid.	305
Ammoniacy infusio, coctio dissolutio, & colatura.	64
Anatalium quid.	238
Aphronitri duo genera.	240
De Aphronitro Plinii opinio.	ibid.
Aphronitri succedaneum.	241. & 242
Apricum quid.	300
Aqua marina vix in quibusdam locis re- peritur.	

peritur. 388

Aquæ marinæ loco quid. 385. & 386.

Argentum vivum quid. 191

De Argento vivo variæ opiniones. 192

Argenti vivi depuratio secundum scopum
unguenti inulati. 191

Argenti vivi extinctio seu incorporatio.

193

Argenti vivi transcolatio. ibid.

Argenti vivi varia nomina. 191

Argenti vivi duo genera. 192

Argyritis quid. 162

Asplenum. 375

Ars chimistica quid. 395

Atramentum seu vitriolum quid. 94

Atramentum sutorium appellatio, secun-
dum veteres. ibid.

Atramentum album secundum Avicen-
nam quid. 95

Atramenti sutorii, vel chalcanti divisio,
secundum Plinium. 94

Atramentorum divisio, secundum Gale-
num. 95

Atramentorum divisio secundum Serap.
94. & 95.

Avicennæ de pondere olei, aquæ, vini, &
mellis opinio. 352

Aurei pondus quid. 168

Axungię & pinguedinis differentia.
90. & 91. Brathin

I N D E X

B.

Brathin quid. 356

C.

Cadmia duplex.	210
Cadmiaë factitiæ species quinque.	211
Cadmiaë lapidosæ electio, & quid.	ibid.
Cadmiaë nativæ duplex.	210
Cadmiaë capnitis origo.	203. & 212
Caprini stercoris collectio, & electio.	113
Cassami variæ appellationes.	343
Cassia fistula quid in oleo nardino com- posito.	344
Cassia lignea quid in emplast. de meli- loto.	142
Cassia, quid in methodo conficiendi em- plast. Apostolici Præpositi.	127
Castorem quid.	354
Castorei electio.	ibidem.
Cathetera quid.	353
Cauda cabalina quid.	249
Cera rubea quid in emplast. contra ruptu- ram.	101
Cera virginea modernorum quid.	54. 55
Ceræ acris ablutio.	ibidem.
Ceræ albæ qualis in cerato de santalis.	16
Ceræ	

R E R V M.

Ceræ albæ veræ succedaneum.	17
Ceræ citrinæ, qualis in cerato oesypi Philagri.	30
Ceræ proportio ad empl.conficiendum.	6
Ceratum quid.	7
Ceratorum materia.	ibid.
Cerula quid secundum Dioscorid.	157
Cerusæ ablutio & electio.	85.86
Chalcitis, & colcotar idem secundum Scrapium.	95
Chalcitis quid secundum Marcellum Virgil.	96
Chalcitidis electio.	97
Chalcitidis nomen multa significat.	97
Chalcanti seu atramenti futorii divisio, secundum Plinium.	94
Chaluce caumenos quid.	126.127.128
Chrysitis quid.	162
Chryfocolla.	70
Chryfocolla duplex.	233
Chryfocolla nativa quid variæ sent.	234
Chryfocolla proprie quid.	234. & 135
Chryfocollæ veræ electio.	135
Chryfocollæ nativæ species variæ.	233
Chryfocollæ factitiæ tres species.	233
Chryfocollæ, electiones variæ.	235
Cinnabar quid secundum Plinium & Solinum.	121
Cinnabar quid, secundum quosdam.	120
	Cinna-

I N D E X

Cinnabaris triplex secundum Antiquos.	122
Cinnabaris duplex secundum Neotericos.	ibid.
Cinnabarim veram, à falsa modus cognoscendi.	123
Colcotar, & chalcitis, idem.	95
Colophonix factitiæ electio.	107
Colophonix factitiæ parandæ ratio.	ibid.
Colophonix veræ electio.	ibid.
Constita rubea quid, & variæ appellationes.	75, & 76
Cordumenum quid.	142
Costi radicis succedaneum secundum Gal. & Neotericos.	336. & 337
Costi radicis succedaneum secundum Avicennam & Sylvium.	359
Cotoneorum electio, in oleo de cotoneis.	309.
Cristalus verus, quid.	238.
Cristali electio.	ibidem.
Cristali variæ sententiæ:	137

D.

Dentalis quid.	139
Diploma quid.	296. & 297
Dracontæ radicis minoris electio.	242

R E R V M.

E.

Emunctorium quid.	287
Emplastrum quid.	5
Emplastrorum materia.	6
Exagium Græcorum pondus, quid.	223
& 272.	

F.

Fascis gallica quid.	344
Flos æris quid.	69
Flos æris succedaneum.	ibidem.
Flos æris electio.	ibid.
Floris æris materia.	ibid.

G.

Galbani infusio, dissolutio coctio & colatura.	9. & 67
Gallia moschata quid.	149
Garon, quid secundum Dioscorid. & secundum Constantium Constantinum.	388
Gerfa serpentaria, quid.	242
Gerfæ serpentariæ faciendi modus.	245
Gluten alchanna quid.	48
Glutinis alchannæ dissolutio, & coctio.	
ibid.	Gypsi

I N D E X

Gypsi consideratio, & quid secundum Albertum Magnum.	108
Gypsi, & calcis, differentia.	ibid.
Gypsi duo genera.	ibid.
Gypsi electio secundum Dioscor.	ibid.
Gypsi ustio.	ibid.

H.

Halasech, vel hasech, seu halachasech, quid.	364
Halinitrum quid.	241
Halinitri electio.	ibid.
Hemina spectata mensura.	391
Hemina spectata pondere.	ibid.
Heminæ, & sextarii, explicatio varia.	ibid.
Heminæ maxime usitata & sextarii acceptio.	352

I.

Ithyocolla quid.	48
------------------	----

K.

Kist olei in oleo vulpino quid.	385
Kist aquæ in oleo vulpino quid.	ibid.

Lapis

R E R V M.

L.

Lapis calaminaris.	211
Lapidis calaminaris, electio.	ibid.
Lapidiscalaminaris extinctio.	213
Lapidis calaminaris præparatio, ad oculorum affectus.	277
Lepidos chalcu quid.	126
Lini feminis præparatio, ad mucaginem faciendam.	114
Linimentum quid.	155
Lythargyrium simpliciter quid.	29
Lythargyrii vera materia.	162
Lythargyrii variæ appellationes.	161
Lythargyrii secundum Dioscorid. & Plin. tres species.	162
Lythargyrii lotio.	27. & 28
Lythargyrii nutritio ad cerata, emplast. & unguenta conficienda.	21
Lythargyrii extinctio.	163

M.

Magnes quid secundum Diosc.	71
Magnes secundum Plinium unde nomen sumpsit.	ibid.
Magnes secundum Nicandrum & Anth.	
Lod. Olyssipponesem medicum unde.	ibid.

S

Magne-

I N D E X

Magnetis secundum Cardanum tria genera.	73
Magnetis secundum Plinium quinque genera.	72
Magnum, quid, in titulo unguenti ægyptiaci.	168
Malva sylvestris, quid.	174
Manipulus in aridis, quid.	365
Marchesita librariorum vel impressorum quid.	198
Medullarum extractio, liquatio, & repositio.	34
Melanteria quid secundum Sylvaticum.	98
Melanteria triplex secundum Diosc. ibid.	
Melanteriæ electio.	99
Minium quid secundum Diosco.	120
Minii nativi tria genera.	123
Minii factitii tria genera.	121
Misy proprie quid.	97
Misy duplex.	98
Misy factitium quid secundum Plinium. ibid.	
Miseos electio secundum Diosco.	ibid.
Molybdena quid.	162
Molybditis quid.	ibid.
Mucagines quonam pacto in emplast. & unguentis injiciendæ sunt.	39
Mucaginum maceratum, & coctarum	verum

R E R V M.

verum indicium.	42
Mucaginum à radicibus & seminibus, vera extractio.	41
de Muria variæ sententiæ.	388
Muria quid secundum Diosco. Simonem Januensem, & Constantium Constantinum.	ibid.
Muria Arabum quid secundum Azararium scribente Simone Ianuensi.	ibid.
Muriæ tria genera.	ibid.
Muriæ loco quid.	ibid.
Myrri succi extractio.	325

N.

Nitrum nativum quid, & electio.	239
Nitri factitii genera plura.	ibid.
Nitri variæ appellationes.	ibid.
Nitri succedaneum.	240
Nux myristica quid.	343

O.

Oculorum populi collectio vera.	172
Oenanthes quid in oleo myrtino composito.	326. & seq.
Oesypus humida quid.	34
Oesypus quo tempore fieri debet.	35
Oesypi conficiendæ modus.	ibid.

I N D E X

Oesyphi ablutio.	ibid.
Oesyphi abluti verum indicium, & repositio.	ibid.
Oesyphi succedaneum.	31
Oleum abusive quale.	283. & seq.
Oleum dulce quid secundum Mesuen.	340
Oleum maxime proprie quale.	283. & seq.
Oleum omotribeos quid.	300
Oleum utrumvis, lavandi modus.	303.
& seq.	
Olei olivarum maturi & immaturi electio.	
ibid.	
Olei proportio ad ceratum & emplastr. conficiendum.	5
Olei sesamini succedaneum.	340
Oppopanacis infusio, dissolutio, coctio & colatura.	9.67
Ossa cruris bovis quo tempore colligenda ad cineres faciendos.	259
Ossa cruris bovis & vaccæ quo tempore colligenda ad medullam extrahendam.	
33	
Ossium cruris bovis, & aliorum animalium ustio.	259. & seq.

P.

Pars quid.	160. & 308
Pastones quid.	285
	Phu

R E R V M.

Phu quid.	344
Pila quid , in methodo conficiendi ol. amigd. dulcium.	286
Pineæ resinæ tres species.	62
Pinguedo quid.	26
Pinguedinis origo.	ibid.
Pinguedines quo tempore ex animalibus accipiendæ sunt.	24
Pinguedinū præparatio & repositio.	ibid.
Pix navalis quid.	74. & 101
Pix liquida quid secundū Gal. & Diosc.	62
Pix simpliciter quid.	ibid.
Picis liquidæ electio.	ibid.
Picis liquidæ succedaneum in emplast. de Iana.	63
Plumbago quid.	162
Plumbum antiquōrum quid.	198
Plumbum quid.	197
Plumbi tres species quod excoquitur.	198
Plumbi duæ species ab antiquis, secundum Plinium.	ibid.
Plumbi nigri origo.	ibid.
Plumbi cineri origo.	ibid.
Plumbi candidi & stanni differentia.	199
Plumbi candidi origo.	ibid.
Plumbi ustio secundum Servitorem.	ibid.
Plumbi ustio perfacilis.	200
Plumbi lotio.	201
Pompholix vera quid.	203. & 277

I N D E X

Pompholigis origo.	203
Pompholigis electio.	204
Pompholigis & spodii differentia.	203
Pompholigis duo genera.	204
Propolis antiquorum quid, & electio.	55
Propolis ablutio.	ibid.
Propolis veræ, succedaneum.	ibid.
Psimmythium quid.	195
Psylum simpliciter quid.	43
Psylli seminis præparatio, ad mucag. faciendam.	ibid.
Pulverum proportio ad ceratum, & ad emplast. conficiendum.	5. & seq.

R.

Ranarum viventium electio.	27
Resina quæ è terebintino fluit duplex.	52
Resina vera, quid.	ibid.
Resina rasa, quid.	48
Resina simpliciter, quid.	52
Resinæ veræ, electio.	ibid.
Resinarum liquidarum, & alidarum differentia.	53.54.61.63.103

S.

Sampfuchum quid.	143. & 270
Samum quid.	344
Sandix antiquorum quid.	122
	Sanguis

R E R V M

Sanguis humanus à quibus colligitur. 109
 Sanguinis humani electio, & desiccatio.
 110
 Sanguinis humani loco quid secundum
 Galen. Avicenn. & recentiores. ibid.
 Scylla tres sapes habet. 47
 Scyllæ collectio, & electio. 46
 Scyllæ succi extractio. 47
 Serapini infusio, dissolutio, coctio, & co-
 latura.
 Sesami seminis decorticatio secundum
 Mesuen. 291
 Sesami decorticatio vera. 293
 Sextarius simpliciter apud Græcos qualis.
 326
 Sextarii & heminæ explicatio varia. 351
 Sextarii & heminæ maxime usitata acce-
 ptio. 352
 Sextarii Rom. olei, vini, aquæ, & mel-
 lis differentia. 327
 Sory antiquorum quid. 96
 Soreos electio. ibid.
 Spodium in compositionibus Arabū qua-
 le. 15
 Spodii Græcorum origo. 203
 Spodii Græcorum & pompholigis diffe-
 rentia. ibid. & 204
 Spumæ nitri & aphronitri differentia. 241
 Spumæ nitri succedaneum. ibid.

I N D E X

Squamma æris duplex secundum Diosco- rid.	133
Squamma æris quid.	ibid.
Squammæ æris electio.	134
Squammæ æris lotio ex Diosco.	135
Squammæ æris lotio vera.	134
Squammæ æris lotæ duplex.	136
Stanni origo.	199
Stanni & plumbi differentia.	ibid.
Stercoris caprarum, & vaccarum collectio, & electio.	113
Stybiium quid, variæ sententiæ.	279
Stybiium proprie, quid.	ibid.
Stybii variæ appellationes.	279. & seq.
Stybii duo genera.	280
Stybii electio, & ustio secundum scopum unguenti de tuthia.	280. & 281
Styracis calamitæ mollitio.	138
Succi cotoneorum extractio.	309
Succi è baccis myrti succedaneum, in oleo myrtino composito.	324
Sulphur quid, variæ opinioniones.	246
Sulphur proprie, quid.	247
Sulphuris duo genera.	ibid.
Sulphuris nativi effodiatio.	ibid.
Sulphuris nativi electio.	248
Sulphuris factitii conficiendi, varii modi, 248	
Sulphuris factitii electio.	ibid.
	Sul-

R E R V M.

Sulphuris varia nomina.	246
Syriaca quid.	344. & seq.

T.

Terebinthina simpliciter, quid.	53
Terebinthina vera, quid.	ibid.
Terebinthinæ veræ electio.	ibid.
Terebinthinæ, resinæ, & colophoninæ usitate differentia.	ibid.
Terræ sigillatæ loco, quid.	208
Tina quid.	286

V.

Vaccini stercoris collectio & electio.	113
Vas duplex, quid.	297
Violarum electio.	307
Viride æs quid.	69
Viride æris, aut ærugo rasilis, idem. & seq.	69.
Viscus quercinus quid, & à quibus arbo- ribus gignitur.	107
Visci quercini, electio.	ibid.
Vitriolum, seu atramentum sutorium, idem.	94
Vitriolum metallicum, seu atramentum sutorium quid.	ibid.
Vitrioli, seu chalcanti, vel atramenti su- torii	S 5

INDEX RERUM.

torii divisio , secundum Plinium. <i>ibid.</i>	
Vitrioli consideratio , ex Neotericorum sententia.	99. & 100
Umbilicus marinus quid, & unde nomen sumpsit.	237
Unguentum quid.	154
Unguentum duplex.	<i>ibid.</i>
Unguenti , & linimenti differentia.	<i>ibid.</i>
Unguentorum materia.	<i>ibid.</i>
Uva lupina quid.	194

X.

Xeranterica.	329
Xilocinnami succedaneum.	336. & 337

Y.

Ysculus quid.	102
Ysculorum præparatio, in emplastr. contra rupturam.	<i>ibid.</i>

Z.

Zaynarium quid.	286
Zirbus quid.	24
Zopissa quid.	80



F I N I S.

HISPALENSIVM
PHARMACO-
POLIORVM,
RECOGNITIO.

A^t

D. SIMONE TV TOVAR

Hispalensi Medico auspicata.



HAGÆ-COMITIS,
Ex Officina THEODORI MAIRE.

CIO IOCL.

THE

WELLS FARGO BANK

INCORPORATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Capital and Surplus

One Million Dollars



WELLS FARGO BANK
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA



LIBER PRIMVS

DE PONDERV M AB
antiquis medicis usitatorum restitutio-
ne, ac eorum quibus Pharmacopolæ, ac
præsertim Hispani utuntur, emenda-
tione.

Ad studiosum Lectorem.

PRÆFATIO.

Ex compluribus, qui non-
nunquam simul curan-
di occurrunt, affectibus,
qui nam potissimam ac primam
curam operamque postulet, arti-
ficiofa medendi methodus dispi-
cere nos docet, siquidē nullo præ-
cipue urgente, nec causæ rationem
(2 habent-

P R Æ F A T I O

habente, & ab eo sine quo alii curari non poterunt incipiendâ curationem monet. Multi autē sunt morbi quibus Pharmacopolia nostra laborare deprehenduntur: sed longe omnium gravissimus, veterimus, & sine quo alii curari non possunt, est intolerabilis error circa pondera quibus nostri utuntur Pharmacopœi, ut itaq; tanto vitio subveniamus, de ipsis ponderibus sedulo ac serio agere, & quicquid circa ea nobis visum est annotatione dignū hic asserre opportunissimū esse censebam. Id vero duobus cōplexi sumus capitibus,

* Ex Gal. lib. 3. Method. c. 9.

AD LECTOREM.

in primo de ponderum & mensu-
 rarum, ab antiquis medicis usita-
 torum, restitutione agimus, &
 quomodo antiquæ Romanorū mē-
 suræ, usui medico maxime deser-
 vientes, facile & ad amissim fa-
 bricari possint. In altero vero
 Hispanorum ac Romanorū pon-
 derū differentiā docemus: Hispano-
 rumque Pharmacopolarū abu-
 sum & errorē in suis ponderibus,
 & quemadmodum ea emendari
 oporteat, ostendimus. Quod vero
 hic Mathematicis nonnullis de-
 monstrationibus usus sim, licet
 illis exactissime ponderū ac men-
):(3 sura-

surarum rationes exponantur & usus aperiantur, vere quidem cum a Galeno asseverare possim minime lubenter id fecisse. Siquidem perinde ac ille timere debeam, ne medicorum pars multa ob ejusmodi demōstrationes nostra scripta aversetur. Quippe cum æque ac ille suo ævo, in nostra quoque ætate expertus sim paucissimos ex medicis esse, qui alterius, quem in aliis à medicina disciplinis versatum esse cognoverint, consuetudine delectentur.

LIBER

singula antiquorum mensurae continebant: tam juxta Romanorum, quam Hispanici marci ponderum rationem.



Ex Romanis antiquis ponderibus.

Ex Hispanico marco.

Cochleari parvo, quorum 24 constituebant Cyathum,
 Cheme Fannii, quod est duplum Cochlearis,
 Mystro minori, à Romanis dicto ligula vel Cochleari, quod est triplum chemes aut sextuplum Cochlearis minoris,
 Vncia Rmanorum mensurali, cujus proportio ad cyathum est subsecquibipartiens tertias,
 Cyatho, qui est quadruplus Mystri minoris, & continebat unciam mensuralem unam cum duabus unius unciae tertiis,
 Hemina Romanorum, quae continebat decem uncias mensurales, & erat sexcupla cyathi,
 Libra mensurali, quae duodecim unciis mensuralibus constat,
 Sextario, qui est duplus hemina seu duodecuplus cyathi, & viginti mensuralibus unciis constat,
 Congio, qui est sextuplus sextarii & decem libris mensuralibus constat,
 Urna, quae est quadrupla congii, & quadraginta lib. mensuralibus constabat,
 Amphora, quae erat dupla urnae, & octoginta lib. mensurales capiebat,

pendet

Script. 1. gr. 9 $\frac{1}{2}$

Script. 2. gr. 18 $\frac{3}{4}$

Script. 3. gr. 8.

Drachmas 6.
 script. 2.

Vnicam unam,
 drach. 3. gr. 8.

Vncias. 8. drach. 2.
 script. 2.

Vncias decem

Vnc. 16. drach. 5.
 script. 1.

Vncias. 100. seu
 lib. 8. unc. 4.

Vnc. 400. seu
 lib. 33. unc. 4.

Vnc. 800. seu
 lib. 66. unc. 8.

Script. 1. gr. majore 9

Sbript. 2. gr. 18.

Script. 8. gr. 6.

Octavas. 6. cum $\frac{1}{2}$
 unius octavae.

Vnciam. 1. octa. 5.

Vnc. 8. drach. 2.

Vnc. 9. drach. 7 $\frac{1}{2}$
 vel uncias. 9 $\frac{1}{2}$
 unius unciae.

Vnc. 16. drach. 4.

Vncias. 99.


Vncias. 396.

Vncias. 792.

Olei contentum in

Date	Description
1850	...
1851	...
1852	...
1853	...
1854	...
1855	...
1856	...
1857	...
1858	...
1859	...
1860	...
1861	...
1862	...
1863	...
1864	...

Main body of handwritten text on the right side of the page, likely providing details or commentary related to the table entries.





LIBER PRIMVS,
 HISPALENSIVM
 PHARMACOPOLIORVM,
 RECOGOGNITIO.



CAPVT I.

Examē veræ atque exactæ proportionis ponderum Hispanicorum, ad pondera quibus olim Romani utebantur. Et modus quō antiquæ Romanorum mensuræ facile fabricari & instaurari possint.



AMPHORA apud Romanos tantundem ^a capiebat, quantum vas cubica figura factum, cujus capacitas in longum latum & altum

pede Romano constaret: nimirum, vas
 A a quod-

^a Amphora Romana.

quoddam quadratū sex quadratis superficiebus constans : quod ex quinque tabulis quadratis fieret, quarum singulæ in interiori superficie unicum Romanum pedem quadratum æquarent. Cujusmodi vas olim Romani ipsi *quadrantal* *a* appellabant, forma tantum ab amphora diversum, quum alioqui utriusque eadem esset capacitas. Veram autem pedis Romani longitudinē *b* posteritatis memoriæ tradidit insignis vir Ioannes Agricola in suo doctissimo, de ponderibus ac mēsuris, opere: quam adhuc extare asserit Romæ in hortis Angeli Colocii ac aliis in locis. Estque eadem quam alii etiam docti ac antiquitatum studiosi viri in nonnullis Romanorum ædificiorum columnis repertam secum servant. Qualem nobis communicavit egregius, ac doctissimus Doctor Lucianus è Negron in alma hujus Hispalensis civitatis ecclesia Canonicus. cuius nos dimidiū hic ad marginem appinximus, octo intersectum divisionibus, quibus digiti ipsius pedis Romani indicantur. Siquidem totus pes in sexdecim digitos

a Quadrantal. b Pedis Romani longitudo.

tos distribuitur. Nos autem hujusce pedis *a* Romani longitudinis adminiculo, veram ponderum Romanorum, ad nostra pondera, rationem, in eum qui sequitur modum examinavimus. Cum amphora *b* seu quadrantalis apud Romanos octo congios caperet; ex geometrica doctrina colligimus, dimidio pedis Romani in cubum reducto, fieri vas ejusdem cum congio *c* capacitatis. ut enim ex Euclidis doctrina constat: similia omnia solida parallelepipeda, inter se sunt in triplicata ratione homologorum laterum, unde cubi ad cubum proportio erit, sicut lateris unius ad latus alterius proportio triplicata. Triplicatam autem rationem seu *d* proportionem eam dicunt mathematici, quæ fit aliquo numero eubice in se ducto. Quoniam itaque ratio quadrantalis *e* ad congium, est, ut octo ad unum, ratio quidem lateris quadrantalis, ad latus congi, erit ut radix cubica octo, ad radicem cubicam unius: sed radix cubica octo est duo, & radix cubica unius est similiter unum. igitur ratio lateris quadrantalis, ad latus congi, erit, ut duo ad unum. Quo circa quantum latus quadrantalis pede constet Romano, latus congi dimidio pede

A a 2

Roma-

a Pedis Romani distributio. *b* Amphora Romana.

c Congium. *d* Proportio triplicata. *e* Quadrantalus ad congium proportio.

Romano constabit. quippequum ratio unius ad dimidium, sit veluti duorum ad unum. Atque juxta hanc rationem nos ipsum congium compingi curavimus, ex quinque ligneis tabulis ex actissime dolutis ac exquisitissime compactis, quarum singulae in externa ipsius vasis superficie, dimidium pedem Romanum quadratum obtinerent. Hunc autem nobis ad amussim concinnavit Peregrina frater ex societate Iesu, fabrilis antea artis adprime compos. Porro hoc ita paratum vas, oleo optimo primo implevimus; moxque sublato oleo, ipsum vas, cum se a tantum olei proportione quam tabellae ipsae combiberant, in altera, exquisitissimae librae lance, imponentes: in altera vero lance tantumdem ponderis opponentes, quoad in aequilibrio utraque lanx permaneret, neutraque praeponderaret: pondus ipsius vasis vacui percipimus. Quod Hispani usitato vocabulo taram, *a* sive ataram, dicunt. Deinde ipsum vas oleo rursus ex actissime plenum in altera librae praefatae lance imposuimus: in altera vero lance ipsius vasis vacui, taram servatam substituentes, tantum ei minutissimae arenae addidimus, quantum utriusque lancis aequi librium exigere conspeximus.

Quibus

a Tara sive Atara Hispanorum.

Quibus admissim peractis, semoto ipso olei pleno vase ab altera lance, ex altera vero similiter ipsius vacui vasis sublata, quam diximus, tara: reliqua nobis dumtaxat fuit ea arenæ moles, quæ olei pondus quod ipsum vas continebat æquaret: nempe, olei pondus quod olim apud Romanos congium capiebat. *a* Quoniam vero congius apud Romanos duodecim heminas continebat: *b* hemina autem apud eosdem (ut latissime ostendit Agricola) ex decem unciis mensuralibus constabat, atque ita congius ipse centum viginti uncias mensurales capiebat: consequitur, arenæ, illa in lance relictæ molem, æquaturam id olei pondus, quod olim apud Romanos mensurabant centum viginti uncias, seu libræ decem mensurales. Siquidem singulæ libræ tam mensurales *c* quam ponderales ex duodecim unciis apud Romanos constiterunt. Sed ex *d* Galeni observationibus habemus notam in oleo proportionem ponderis libræ mensuralis Romanorum *e*, ad eorundem libræ ponderalem: nempe, sesquiquintam, qualis est duodecim ad decem, seu sex ad quinque. Igitur

A a 3

arena

a Congius Romanus. *b* Hemina Romana. *c* Libra mensuralis & ponderalis Romana. *d* Lib. de comp. medic. per gen. 5. c. 6. & lib. 6. c. 8. *e* In oleo proportio ponderis libræ mensuralis Romana ad ponderalem.

arena illa nobis in lance relicta pendet centum uncias libræ ponderalis Romanorum: videlicet, libras ponderales octo, & uncias quatuor, seu trientem. quippe centum viginti ad centum se habent in sesquiquinta proportione. Atqui antequam hanc arenæ molem nostris Hispanicis ponderibus examinarem, eam in duas partes pondere æquali in ipsis libræ lancibus exactissime divisimus: ut in alterutra libræ lance, dimidia ejus arenæ moles relicta, quinquaginta Romanorum uncias ponderales penderet, & rursus abjecto altero ejus dimidio, dimidium reliquum iterum in alias duas ponderis æqualis portiones in ipsis libræ lancibus similiter partiti sumus. Atque ita nobis in alterutra libræ lance relicta fuit arenæ moles quæ ponderales Romanorum uncias viginti quinque penderet. Exinde relicta in altera libræ lance hujusmodi arenæ mole, quæ viginti quinque Romanorum uncias ponderales penderet: in altera lance tot uncias & uncia partes ex *a* Hispanicis ponderibus, in nostro vulgariter dicto marco contentis, apposuimus, quot sat esse conspeximus ut utraque lanx ad æquilibrium redigeretur, neque una alteri præpenderet. Atque hoc pacto comperimus viginti quinque Ro-

manorum ponderales unicas pendere ex nostri Hispanici marci ponderibus uncias viginti quatuor cum sex unice octavis. Quibus quadruplatis, fient uncie nonaginta novem. Atque ita reperta fuit exquisitissima ratio ponderum Romanorum, ad nostra Hispanica pondera. Siquidem oleum quod olim apud Romanos pendebat centum uncias eorundem ponderales (quantum nimirum unus eorum congius continebat) repertum est à nobis, ex præmissis observationibus, ponderare nonaginta novem uncias ex nostro Hispanico marco. Atque ita pondera nostra differre à ponderibus

A a 4

ribus

a Si verum est quod Andreas Lacuna afferit unciam unam Hispanicam continere Romanam nostri temporis unciam unam & scripturam unum : major sane fuit olim Romana uncia, quam est hodie apud Romanos in usu gran: duo de viginti cum duabus undecimis unius grani. unde ex arithmetica ratione constabit graviora fuisse olim apud Romanos pondera, quam nunc sint, trigesima prima fere parte. nempe uncia 31. Romanorum antiquæ penderent Romanorum nostri temporis uncias 32. fere, vel præcisius 31. $\frac{141}{144}$ centum autem Romanorum antiqua uncia, penderent ex illis quibus Romani nunc utuntur, 103. $\frac{31}{98}$ quod vulgo dici solet, 3. $\frac{31}{98}$ per cento. Nos tamen ejusmodi Lacuna observationibus parum quidem fidei adhibemus ob ejus arithmetica imperitiam. Quam ille satù aperte prædidit, cum inde Venetam unciam sesquidrachma minorem esse quam Romanam colligat, quod medicinalem libram Venetam pendere observaverit Romanam libra uncias decem, cum dimidia. Cum potius ex arithmetica ratione inde consequatur unciam unam venetam drach. 7. Romana uncia pendere.

ribus quibus olim Romani utebantur, centesima fere parte : quod Hispanorum vulgo dici solet, uno por ciento. Dicimus autem fere, quoniam re vera per centesimam partem differrent, si centum unciaë nostri Hispanici marci, ponderarent centum & unam unicas Romanorum ponderū. Quoniam vero nonaginta novem unciaë nostri Hispanici marci, pendent centum uncias Romanorum ponderum : sane si exactam hujus proportionis præcisionem requiras, reperies se habere pondera nostra ad Romanorum pondera in ratione sesquingentesima nona : hoc est, Romanorum pondera superari à nostris ponderibus per unã nonagesimam nonam partem ipsorū Romanorum ponderum. Siquidem moles illa arenæ præfata, pendens uncias nostrates nonaginta novem, ponderabat ex Romanorum ponderibus uncias centum : nempe : totidem uncias Romanorum ponderales, & præterea unciam eorundem unã, quæ est nonagesima nona pars unciarum nonaginta novem. Atque hoc proportionis genus appellare solet Hispanorum vulgus, uno y un noventa y nueve avos por ciento, vel (quod idem est) $\frac{100}{99}$ por 100. Hanc autem eandem rationem nos quoque examinare possemus, si arenæ molem,

quæ

quæ oleo in congio contento æqui ponderabat, ac proinde centum Romanorum uncias pendebat, citra illam arenæ in quatuor partes distributionem, cum nostris Hispanicis ponderibus per stateram ponderantes, ejus pondus in nostro Hispanico marco perciperemus. Quoniam vero exactiora & magis præcisa redduntur pōdera, quo minora sunt: iccirco integram illam centum ponderalium Romanorum unciarum molem cum nostris Hispanicis ponderibus conferre nolimus, sed potius quartam ejus partem.

Porro eadem mathematica doctrina, qua cōgium ex lateris ejus proportione ad amphoræ seu quadrantalis latus construere docuimus, nota similiter reddetur minima illa antiquorum mensura. quæ cochlear parvum *a* dicebatur. sit videlicet: Quum amphora *b* contineat octo congios, & congius *c* sextarios sex, sextarius *d* autem duodecim *e* cyathos, quorum singuli continebant viginti quatuor cochlearia parva, juxta ponderum distributionem à Fannio consideratam: manifestum est amphoram apud Romanos continuisse

A a 5 e julmo-

a Cochlear parvum

b Amphora.

c Congium.

d Sextarius.

e Cyathus.

ejusmodi *a* cochlearia 1 3 8 2 4. Quumque eadem demonstratione quam antea ex Euclidis elementis attulimus, ratio amphoræ ad cochlear sit triplicata suorum laterum : proportio quidem lateris amphoræ ad latus cochlearis parvi, erit ut radicis cubicæ numeri 1 3 8 2 4. ad radicem cubicam unius. quippe quum amphora se habeat ad cochlear, ut numerus 1 3 8 2 4. ad unum. Sed radix cubica 1 3 8 2 4. est viginti quatuor, & radix cubica unius est unum. ergo latus amphoræ ad latus cochlearis se habebit ut vigintiquatuor ad unum. Quo circa cochlearis latus erit vigesima quarta pars lateris amphoræ. Similiter autem reperietur, latus cochlearis parvi esse duodecima pars dimetientis congii. Quoniam congius *b* continet in se cochlearia 1 7 2 8. cuius radix cubica est duodecim. *a* Si itaque assumatur vigesima quarta pars longitudinis pedis Romani (quanta est longitudo lateris amphoræ, vel (quod idem est) duodecima pars

a Intelligimus hic cochlearia illa parva, quorum viginti quatuor constituunt juxta Fannii sententiam cyathum. alioquin enim quarta cyathi pars (ut diligentissimus advertit Agricola) à Romanis dicebatur cochlear, & alio nomine ligula : quæ à Fannio ac aliis dicebatur Mysterium minus. *b* Congius quod cochlearia continet.

pars ejus dimidii (quanta est longitudo lateris congii) & in quadratum redigatur. atque, eo modo quo in congio itadidimus, vas quoddam cubicum construatur, cujus singulæ ex quinque internis superficiebus præfato quadrato omnino æquentur: profiliet vas eandem obtinens mensurâ quam olim apud Romanos habebat cochlear. Ex eadem quoque mathematica doctrina construi poterit vas aliud continens octo cochlearia, quod tertiam quidem cyathi partem continebit. si enim longitudo lateris cochlearis duplicetur: atq; hujusmodi dupla lateris cochlearis longitudo in quadratum reducatur: vas quidem cubicum, cujus quinque internæ superficies ei quadrato æquales fuerint, continebit octo cochlearia. Siquidem ejus ratio ad ipsum cochlear, erit ut cubus numeri duo (qui est octo) ad cubum unius, qui similiter est unum. Demum juxta eandem quoque doctrinam, ex congii lateris notitia construi poterit vas aliud sesquiheminam continens: ex quo etiam tum hemina ipsa tum libra mensuralis Romanorum multo minori negotio construi posset, quam sine ejusmodi vase. Quum enim congius a contineat duodecim heminas, continebit quidem octo sesqui heminas. unde ratio

congi ad sesquiheminam, erit ut octo ad unum. Ac proinde ratio lateris congi ad latus sesquiheminæ, erit ut radicis cubicæ octo (quæ est duo) ad radicem cubicam unius, quæ est unum. Quacirca si dimidium dimetientis congi quadretur: & ex hujusmodi quadrato vas cubicum, eo modo quo in reliquis tradidimus, construat: ejusmodi vas sesquihemiam æquabit. Quantum autem momenti sint omnia vasa à nobis juxta mathematicam doctrinam reperta, ut ex eorum minoribus reliqua etiam majora nota reddantur, facile quidem intelliget, quisquis ex amphoræ tantum per pedem Romanum repertæ, notitia, reliqua omnia minora vasa conficere studuerit. Ipsa enim experientia doctus apertissime comperiet difficillimum, ne impossibile dicam, fore, id ipsum assequi. Qui enim quæso liquor in amphora contentus in duas portiones, ea qua oportet præcisione, distribui poterit, ut juxta hujus dimidiati liquoris quantitatem urna conficiatur? Quod si hoc saltem summo assequatur labore, quali præcisione liquor in urna contentus in alias duas æquales partes dividetur, atque hujusmodi dimidium in alias rursus duas æquales partes diducetur, ut tandem congius evadat?

Sed

Sed demus jam omnes has difficultates improbo cujuspiam labore vinci posse, ac exquisitum nobis proferri posse, confice jam o bone, quisquis is fueris, sextarium ex sexta congiiportione: atque ex hujus duodecima distributione, cyathum: & demum cochlear parvum ex hujus vigesima quarta portione. Nemo sane cordatus ac non vanus homo, qui specimen ejus rei tentaverit, se id perficere posse affirmare audebit. Quod si omnia ea, quæ nos construere docuimus, mensuralia vasa sibi aliquis parata habeat, haud multo ille negotio reliqua quoque conficiet. Id vero nequaquam debita præcisione fieri poterit, si liquores in singulis compertis mensuralibus vasis contentos, in aliquas, aliis mensuris correspondentes portiones, dividantur. Quemadmodum alii omnes facere docent. Sed si minora ex majoribus quærere oporteat, in singulis compertorum mensuralium vasorum, contenti unius alicujus liquoris pondus erit capiendum: atque ex ejus proportione ad pondus ipsius liquoris, quem proxime minora quantitate vasa capere conveniat, eadem construui poterunt. Ut si ex sesquihemina construenda sit hemina, vel libra mensuralis: implebitur ipsa sesquihemina liquore aliquo.

quo. Atque hujusmodi liquor in ipsa sequihemia contentus erit exacte ponderandus. ut si liquor is fuerit oleum, talis quidem liquor pendebit, juxta olei pondus à nobis in congio observatum, duodecim uncias cum tribus unius unciae octavis. deinde duæ ejus ponderis tertiæ assumentur, quæ in proposito olei exemplo erunt octo cum unius unciae quarta: & tot uncias ex nostris Hispanicis ponderibus ponderabit (ut ex ipsa arithmetica ratione constat) oleum quod capiet hemina. Unde si in vas aliquod figulinum, quod aliquantulum plus olei capere possit quam præfatum olei pondus unciarum octo cum unciae quarta, infundantur ipsæ olei unciae octo cum quarta unciae parte: & ex ejusdem vasis ore tantum auferatur ut exacte ipsas tantum octo olei uncias ac quartam unciae contineat: tale quidem vas erit hemina *a* Romana. Quod si à præfatis duodecim unciis ac tribus unciae octavis subtrahatur quinta pars, nempe, unciae duæ cum $\frac{1}{4} \frac{2}{8}$ unius unciae, seu (quod idem est) unciae duæ & octavæ tres cum quatuor unius octavæ quintis: relinquentur unciae novem, cum novem unciae unius decimis, hoc est, unciae decem minus decima unciae parte, seu (quod idem est) unciae novem,

a Hemina Romana.

octavæ septem, cum a una quinta octavæ parte. & tantum ex b arithmetica ratione ponderabit ex nostris Hispanicis ponderibus oleum quod capiet libra mensuralis Romanorum. Quo circa ad tanti olei mensuram, redigi facile, eo quo in hemina tradidimus modo, poterit vas aliquod figulinum, ex alia ve simili materia, quod libræ Romanorum mensurali æquabitur. Hujusmodi enim vas duodecim uncias cujuslibet liquoris continebit earum quibus Romani liquores omnes mensurare solebant. Quod si liquor in hujusmodi vase mensuratus esset oleum, ponderaret ex Galeni observatione uncias ponderales Romanorum decem; Quum tamen ex nostris Hispanicis ponderibus penderet (ut jam advertimus) tantum uncias novē, octavas septem, cum una quinta octavæ parte. Cujus differentię causa ea ipsa differentia est quam superius inter Romana

a Est autem quinta octava pars grana quindecim quorum septuaginta quinque constituunt octavam.
 b Cum enim hemina Romanorum contineret decem uncias mensurales, sesquihemina, quidem, constaret ex quindecim mensuralibus uncis, quarum quinta pars sunt uncia tres, inde sublata quinta parte unciarum quindecim mensuralium, ab iisdem quindecim uncis mensuralibus contentis in sesquihemina, relinquentur uncia duodecim mensurales, nempe, libra Romanorum mensuralis.

mana pondera ac nostra examinavimus. Quum enim ostensum sit Romanorum pondera à nostris superari ponderibus per nonagesimam nonam ipsorum Romanorum ponderum partem: seu, (quod idem est) per centesimam partem ponderum Hispanicorum : ex arithmetica ratione constat decem Romanorum uncias ponderales superari à nostris decem ponderibus unciis per $\frac{10}{99}$ unciaë ipsius Romanæ, seu (quod idem est) per decimam partem unciaë unius Hispanicæ. Ac propterea oleum, vel aliud quodcunque, quod ex ponderibus Romanis ponderaret uncias decem, ponderare debere ex nostris Hispanicis ponderibus uncias novem cum novem decimis unciaë partibus. Porro comperta Romanorum libra mensurali, facillimo negotio eorundem uncia mensuralis fabricari poterit. Cum enim uncia sit duodecima pars libræ: & oleum quod capit libra mensuralis Romanorum pendat (ut ostensum est) ex nostri Hispanici marci ponderibus uncias novem, octavas septem, cum una quinta octavaë parte, & gravis quindecim, quorum septuaginta quinque octavam complent: sane oleum quod capiet uncia, pendet ex nostris ponderibus, octavas sex cum tribus unius octa-

væ quintis, videlicet, cum granis 45 ex iis quorum 75 constituunt octavam. tanta etenim est duodecima pars unciarum novem & octavarum, septem cum una quinta octavæ. Atque ita si ad tanti olei capacitatem concinnetur vas aliquod, tale quidem vas erit Romanorum uncia mensuralis. Similiter ex heminæ cognitione notus quoque reddetur cyathus. Quum enim cyathus sit sexta pars heminæ, & oleum quod capit hemina, repertum sit pendere ex nostris ponderibus uncias octo cum unciæ unius quarta: sane oleum quod capiet cyathus, pendet ex nostro marco unciam unam cum octavis tribus, quæ sunt sexta pars unciarum & drachmarum duarum. Unde si concinnetur vas aliquod, quod præcise contineat oleum pendens ex nostro Hispanico marco unciam unam cum tribus octavis, ejusmodi vas erit antiquorum cyathus. At enim ex minoribus vasis compertis, multo etiam facilius majora vasa confici poterunt. Ut si duplum liquoris quod Fannii capit cochlearium, in vas figulinum vel simile infundatur, facillime, ut in hemina tradidimus, fiet vas illud quod ab antiquis cheme dicebatur, juxta Fannii sententiam. Quanquam alii aliter ejus mensuram defini-

finirent : sin sextuplum cochlearis , fiet
 Mystrum minus, à medicis magis usurpa-
 tum : quod juxta Fannium , Nicandri in-
 terpretem , & Græcum auctorem de pon-
 deribus & mensuris, erat cyathi pars quar-
 ta, à Romanisque dicebatur ligula vel
 cochlear : licet alii paulo majorem men-
 suram huic minori mystro adscribebant.
 Quod si quadruplum assumatur ejusmodi
 mystri, vel triplum, ejus vasis, quod in se
 octo cochlearia continet, à nobis antea
 mathematica doctrina reperti, cyathus ip-
 se exactissime confici eodem modo pote-
 rit, quo in præcedentibus vasis docuimus.
 Atque ex cyatho similiter reliqua majora
 vascula ad heminam usque confici facil-
 limo negotio poterunt. Porro non modo
 præfatæ illæ commoditates subsequuntur
 ex mensuralibus vasis à nobis mathema-
 tica doctrina repertis, quibus reliqua om-
 nia antiquorum vasa exacte ac facile con-
 fici possent : Sed & in eorum singulis no-
 stra quoq; pondera cum antiquorum pon-
 deribus, perinde ac in congio prius expo-
 suitus, examinari poterunt. Immo in ses-
 quihemina quidem in reliquis inferiori-
 bus mensuris, facilius id commodiusque
 fiet. In quibus nihil opus erit arenam cum
 oleo ad æquilibrium ponderare, nec ipsa
 arenæ

arenæ pondera dimidiare, veluti in con-
 gio docuimus, ut ejus tandem pondus in
 minori quantitate majoris præcisionis gra-
 tia examinetur; quum harum mensurarum
 singularum pondera satis ad examē ipsum
 parva sint, ac præcisissime earum ponde-
 ra capi possint. Quod ut manifestus red-
 datur, examē ipsum in sesquihemina facie-
 mus. Quum itaque Romana hemina con-
 tineat uncias mensurales decem, sesquihe-
 mina continebit quindecim ex iisdem mē-
 suralibus unciis. Et quoniam ex Galeni
 observationibus oleum, quod capiebant
 duodecim unciæ mēsurales Romanorum,
 pendebat decem uncias eorundem ponde-
 rales: juxta eandem proportionem oleum
 quod capiet sesquihemina, quindecim
 mensuralibus unciis constans, pendebit
 duodecim uncias cum dimidia mensurales
 ipsorum Romanorum. Quo circa si ses-
 quihemina, oleo optimo plena, in altera li-
 bræ lance imponatur, & in altera ejusdem
 libræ lance substituatur ipsius sesquihemi-
 næ vacuæ tara, eodem modo sumpta quò
 antea congi vacui taram percipere do-
 cuimus: atque in eandem lancem in qua
 præfata tara fuerit constituta, tot ex nostro
 Hispanico marco unciæ unciarumq; par-
 tes impositæ fuerint, quot sat esse anim-
 adver-

adverterimus, ut ad æquilibrium utraque
lanx reddatur: manifestum erit quod si
uncia illæ & earum partes, quas ex nostro
Hispanico marco ponderabat oleum quod
sesquihemina capiebat, fuerint duode-
cim cum dimidia, nostra quidem pondera
à Romanis nihil omnino variabunt: sin in
minori extitissent numero, majora: in ma-
jori vero, minora necessario forent. Re-
vera tamen juxta nostram observationem,
reperientur unciaë duodecim cum tribus
unciaë octavis, seu drachmis. Siquidem
ratio unciarum duodecim cum dimidia, ad
uncias duodecim cum tribus unciaë octa-
vis, est susquinonagesima nona: qualem
comperimus, in congii examine, esse ra-
tionem ponderum nostrorum ad Roma-
norum pondera. Denique compertis ac
instauratis antiquis Romanorum mensu-
ris, communis quidem liquidorum om-
nium mensura quali antiqui utebantur
nostro ævo officinis desiderata, & à mul-
tis doctis medicis jamdiu expetita, in u-
sum revocari à quolibet posset: ut liquo-
res omnes unica mensura metirentur, ve-
luti antiquitus fieri solebat: & non variis,
pro vulgari Pharmacopœorum nostri
temporis more, unicum in eis pondus con-
stituentium, cui diversa in singulis men-
sura

fura correspondet. Quoniam vero & Galenus quoque antiquorum diligentiam in designandis libris ac unciis ponderalibus aut mensuralibus desideravit, nec eam tamen supplere est ausus: licet enim aliquando expresserit libram & unciam ponderales vel mensurales, sæpius tamen id prætermisit: idcirco nos hic, Pharmacopœorum in hisce liquorum mensuris usum in universum damnare non audentes: eis tantum consulimus, ut ubicunque in suis compositionibus liquoresprehenderint præscriptos unciis aut libris mensuralibus, eosdem mensuralibus iis unciis aut libris metiantur, quas hic construere docuimus. Et similiter quoque si liquores ipsi designati fuerint aliqua ex antiquorum mensuris, quibus illi eos metiri solebant (ut hemina, aut cyatho, & similibus) eadem in illis mensura utantur, paratas omnes habentes, eo qui à nobis hic docetur modo. Atqui in eis compositionibus in quibus liquores libræ aut uncix nomine tantum præscripti fuerint, citra mensuralis aut ponderalis notationem, interim in eis, ponderalibus libris & unciis (ut hætenus solebant) utantur, dum ab aliis doctis viris aliter de hoc statuendum fore decernatur.

CA-

CAPVT II.

De Hispanorum Ponderum differentia ad Romanorum pondera. Deque Hispanorum Pharmacopolarum abusu & errore in suis ponderibus. Et quomodo facile emendari illa possint.

EX iis quæ in præcedenti capite tradita sunt, facillimum quidem erit singulorum nostratium ponderum differentiam, à sibi collatis Romanis ponderibus animadvertere. Quum enim observatum à nobis sit, pondera nostra excedere Romanorum pondera per unam nonagesimam nonam partem; juxta hanc ipsam rationem ponderalis libra Romanorum, quæ uncias duodecim constabat, pendet ex nostri Hispanici marci ponderibus, uncias undecim cum viginti duabus partibus, quarum viginti quinque constituunt unciam, quas arithmetici his notis designant, $\frac{22}{7}$. Et hæc uncia partes, constituunt octavæ uncia septem cum vigesima quinta octavæ partes: quæ vigesima quinta octavæ pars, est grana duo; cum viginti duabus vigesimis quintis unius

unius grani, si octava uncia pars ex granis septuaginta duobus constituatur, veluti ab antiquis constituebatur: quamquam ab Hispanis nunc in auri ponderibus septuaginta quinque grana in octava uncia numerentur, ut inferius trademus. Continebat itaque ponderalis Romanorum libra ex nostri Hispanici marci ponderibus uncias undecim, octavas septem, grana duo cum $\frac{2}{5}$, unius grani. Uncia autem Romanorum pendebat ex nostris Hispanicis ponderibus octavas uncia septem, cum viginti tribus partibus, quarum viginti quinque complent unam octavam, nempe, octavas uncia septem, scriptula (hoc est tertias octavae) duo, & grana duo de viginti, cum sex vigesimis quintis unius grani. At enim si vice versa in Romanorum ponderibus animadvertantur pondera nostra, sane cum nostrorum ponderum nonaginta novem sint antiquorum ponderum centum, sesquibes quidem noster, seu unus marcus & dimidius, ex duodecim unciis nostris constans, qui antiquorum librae medicinali respondet (estque nostrae librae vulgaris sexdecim uncia- rum dodrans) ponderabit ex Romanorum ponderibus, uncias duodecim, cum partibus quatuor, quarum triginta tres uni-

cam

cam Romanam unciam complent, seu uncias duodecim, cum partibus triginta duabus, quarum triginta tres constituunt unam Romanam drachmam: quæ triginta duæ trigesima tertiæ unius drachmæ, sunt scriptula duo & grana viginti-unum cum novem unius grani undecimis. Uncia autem nostri beslis seu marci pendeat ex ipsorum Romanorum ponderibus unciam unam cum nonagesima nona unius unciae parte, seu unciam unam, grana quinque cum novem undecimis unius grani. Quum itaque nostri Hispanici marci pondera, à Romanorum ponderibus nonagesima nona tantum parte variant, ut sesquimarcus, seu sesquibes noster minori adhuc quantitate, quam unica drachma libram Romanam excedat: uncia autem nostra, Romanorum unciam, minori etiam quantitate quam grani sex: atque medici fere omnes antiqui Romanorum ponderibus usi sint, quæ Romani ipsi, nationibus omnibus quibus præerant, ad communes usus impertierant: nullo sane incommodo medici ac Pharmacopolæ ponderibus nostri vulgaris marci, perinde ac Romanis, uti in medicina poterunt. Quanto vero incommodo ac detestando errore iis utantur ponderibus, quæ in medicinali illa libra continen-

tinentur, quæ ad usum tantum officinarum Hispanicarum concinnata est, adeo manifestum est, ut nunquam satis admirari possimus tot ac tam doctos medicos, quibus Hispania, nostro præsertim ævo, abundarit, hunc errorem in locis, quibus medicinam faciebant, minime advertisse, aut suis in scriptis notasse. Quamquam enim incommodum, quod in medicamentorum dosi ex ponderibus apud officinas usitatis resultat, ipsi assequi nequirent, quod ejus causam percipere non possent, ignorantes quam varia esset Romanorum ponderum, ab antiquis medicis usitatorum, proportio ad illa, in officinis Hispanicis usurpata pondera (quam nos inferius manifestabimus) nihilominus aliud multo majus incommodum illos saltem subterfugere non debuit, quod nimirum ex perversa ponderum, illius medicæ libræ, distributione, mirabile dictu (ne potius miserabile ac ploratu dignum dicam) pleræque ex antiquis medicamentorum compositionibus in officinis usitatis sint perversè compositæ, minime servata medicamentorum proportione, quæ ipsis compositionibus per suos auctores præscripta esset. Quæ omnia ut dilucidius cognoscantur ipsam officinarum libram ac ejus ponderum rationem

examinabimus. Hæc illorum libra ex
 duodecim unciis, perinde ac antiquorum
 libra, constat. At ipsæ duodecim ejus un-
 ciæ minores sunt quam sesquibes vulgaris
 (puta, duodecim unciæ marci vulgaris
 Hispanici) sex octavis unciæ ipsius marci
 vulgaris: quoniam unaquæque ex illis
 medicinalis libræ unciis, minor est quam
 uncia marci vulgaris dimidio unius octa-
 væ unciæ ipsius vulgaris, marci: quod
 octavæ dimidium, Hispani appellant a-
 darne, estque minimum ipsius vulgaris
 marci pondus. Porro illam medicæ libræ
 unciam in novem drachmas dividunt, &
 singulas drachmas in tria scriptula, ac tan-
 dem singula scriptula in grana viginti: ut
 una medicinalis uncia constet novem
 drachmis, seu scriptulis viginti septem, vel
 granis quingentis ac quadraginta. Quibus
 ita constitutis, manifestissime jam apparet,
 quod prius advertimus, medicinarum do-
 ses, ab antiquis præscriptas, minime cum
 hisce officinarum ponderibus servari pos-
 se: sed multo minore quantitate nunc
 propinari quam ab antiquis definiebantur.
 Siquidem medicamentum, cujus do-
 sis præscripta erat ab antiquis unius unciæ
 pondere, nunc Pharmacopolarum unciæ
 pondere exhibitum, minori sumitur quan-
 titate

titate quam olim propinabatur unius fere drachmæ seu octavæ dimidio, nempe, scriptulo uno, granis sex, cum sex grani undecimis, quibus Pharmacopolarum Hispanorum uncia minor est quam antiquorum uncia. cum enim uncia nostri vulgaris marci pendat, ut dictum est, ex Romanis ponderibus unciam unam, grana quinque, cum novem undecimis, vel (quod idem est) scriptula vigintiquatuor, cum octo treagesimis tertiis unius scriptuli: & uncia Pharmacopolarum nostrorum pendat ex nostri marci vulgaris ponderibus quindecim medias octavas, vulgo dictas adarmes: sane uncia Pharmacopœorum Hispanorum pendet ex Romanis ponderibus scriptula viginti duo, cum octo unius scriptuli undecimis, videlicet, drachmas septem, scriptulum unum, grana septemdecim, cum quinque unius grani undecimis. superatur itaque uncia Pharmacopolarum nostrorum ab uncia antiqua, per scriptulum unum, grana sex, cum sex undecimis grani unius. In eo vero medicamento cujus dosis ab antiquis præfinita erat pondere unius drachmæ, magis adhuc peccant qui illud exhibent Pharmacopolarum sibi respondententi drachma: cum enim hæc sexaginta grana pendat ex iis

quæ in octava marci vulgaris numerantur septuaginta duo : atque octava ipsa marci vulgaris pendat ex Romanis ponderibus scriptula tria, cum una scriptuli trigesima tertia, nempe, scriptula tria cum octo undecimis unius grani (siquidem scriptula ipsa tria cum octo unius grani undecimis sunt octava pars scriptulorum viginti quatuor, granorum quinque, cum novem undecimis, quot docuimus antea habere unciam nostri marci vulgaris ex Romanorum ponderibus) sane drachma ipsa Pharmacopœorum, pendet ex Romanorum ponderibus, scriptula duo, cum quinquaginta duabus scriptuli nonagesimis nonis, vel (quod idem est) scriptula duo, grana duodecim cum viginti grani trigessimis tertiis. Quod etiam inde constabit, quod scriptula hæc duo, cum granis duodecim & viginti trigessimis tertiis unius grani, sunt nona pars scriptulorum 23. gr. $17 \frac{5}{11}$, quot ostendimus continere ex Romanis ponderibus unciam Pharmacopœorum Hispanicorum. Drachma autem ipsorum Pharmacopœorum, est suæ unciam pars nona. Quo circa ipsorum drachma, minor erit quam antiquorum drachma granis undecim, cum tredecim trigessimis tertiis unius grani. Atque ita
 medi-

medicamentum, cuius dosis sit unica drachma, exhibitum pondere drachmæ Hispanicorum Pharmacopolarum, datur minori dosi, quam ab antiquis erit præscripta, per dimidium fere scriptuli ipsorum antiquorum. Quod si medicamenti dosis per scriptula esset definienda, pro singulis quatuor fere granis, exhiberetur ejusmodi medicamentum minori pondere quam antiquitus erat præscriptum. Siquidem scriptulum unum Hispanicorum Pharmacopœorum, continet ex antiquis ponderibus grana viginti, cum viginti nonagesimis nonis unius grani, quanta est tertia pars scriptulorum duorum cum granis duodecim & viginti trigesimis tertiis unius grani, quæ continere ostendimus ex antiquis ponderibus drachmam ipsorum Pharmacopœorum. At enim licet non parvi sit momenti hic error in medicamentorum dosibus à nobis animadversus, multo tamen magis detestandus est ille, qui in medicamentorum compositionibus cum hisce Pharmacopœorum ponderibus committitur, depravatis per eadem simplicium medicamentorum illas ingredientium proportionibus: nisi forsan simplicia ipsa, compositum constituentia, uno aliquo dumtaxat ponderis genere. (ut libra,

vel uncia, aut drachma) numerentur, vel saltem libra ac uncia, vel drachma ac scriptulo. Ut subsequenti exemplo perspicuum fiet: sit medicamentum aliquod, ab antiquis compositum, in quo quatuor sint simplicia, quatuor diversis ponderū generibus numerata: ut puta, primum unius unciæ pondere, alterum unius drachmæ, tertium unius scriptuli, & quartum unius grani. Quoniam (ut dilucide à Georgio Agricola probatum, ac ab omnibus bonarum artium cultoribus receptum adeo est, ut nulla ulterius indigeat probatione) apud antiquos tam Græcos quam Romanos, ac etiam Arabes medicos, constabat uncia drachmis octo, drachma scriptulis tribus, & scriptulum granis viginti quatuor:

a Quod Arabes similiter ac Græci & Latini scriptulum, quod Garme aut Karmet appellabant, in grana viginti quatuor dividerint, inde evidenter constat, quod illud eodem modo quo Græci ipsi & Latini in duos distribuunt obolos ab eū Onolassat appellatos: & Onolassat in Danich unum cum dimidio, nempe, sesqui lupinum: Danich autem seu lupinum in duas siliquas, Kirath ab eū nuncupatas: & siliquam in duo areola, que vocant Kestuf: & areolum tandem in duo grana. Quæ omnia simul collecta efficiunt summam viginti quatuor granorum. Porro Danich hic cum Georgio Agricola juxta Cleopatrom & Arabes sub triplum scriptuli constituimus, quamquam Fannius & alii illud scriptuli subquadruplum faciant.

tuor: manifestum est, quod ex præfatis illis quatuor simplicibus, pondus quidem secundi erit octava pars primi: pondus vero tertii, tertia pars secundi, primi autem pars vigesima quarta: & demum pondus quarti, vigesima quarta tertii, septuagesima secunda, secundi, & quingentesima septuagesima sexta simplicis prioris. Quod si hujusmodi medicamentum à nostris Pharmacopœis suis concinetur ponderibus: quum apud eos (ut antea exposuimus) uncia drachmis novem constet, vel scriptulis viginti septem, aut granis quingentis quadraginta: in proposito illo composito, pondus quidem simplicis secundi, erit nona pars simplicis prioris: pondus vero tertii, erit secundi tertia, prioris vero vigesima septima: & pondus tandem quarti, erit tertii vigesima, at secundi sexagesima, prioris autem quingentesima. Vides jam Pharmacopola amice quam belle tuum medicamentum composueris, in quo omnium ferme simplicium inter se proportionnes, ab eis, quas eidem antiquus ille tuæ compositionis auctor præscripserit, mutatae sint ac diversæ. Sed dicet hic noster Pharmacopœus se auctorem, ac etiam auctores suos habere quos sequatur: Nicolaum illum Salernitanum, Saladinum, & suum

etiam Mesuem. Sed quod de Mesue tradunt, eum nusquam unciam in octo drachmas divisisse, quin & in suis medicamentorum descriptionibus sæpius octo drachmarum & quatuor drachmarum meminisse (ut in hiera diacoloquintidos, in Tryphera persica, sytupo violaceo, syrupo de jujubis, & aliis) quod minime faceret si unciam octo drachmis constare credidisset, dicturus potius loco drachmarum octo unciam unam : & pro drachmis quatuor semunciam sive unciam semissem: tantum quidem abest ut id pro eis faciat, ut etiam magis, hoc eodem ipsorum argumento, convincantur. Similiter enim ostendi potest, minime potuisse Mesuæum, unciam in novem drachmas distributam opinari: quum passim in eisdem ipsius descriptionibus videamus scriptas drachmas novem, & drachmas duo de viginti, & drachmas quatuor & semissem: ut in descriptione emplastri Arabici, & emplastri relati ad Andromachum, & in oleo de croco, & in sua ipsius hiera, ac multis aliis ipsius compositorum descriptionibus. Quum autem indiscriminatim ipse in suis descriptionibus interdum numero drachmarum octo, interdum novem utatur: verisimilius censendum foret per numerum drachmarum octo,

octo, unciam intellexisse, quam drachmarum novem. Quum enim reliqui omnes Arabes, de ponderibus scribentes, unciam in octo drachmas diviserint, illam sacrum, has vero drachmas nominantes, neque ipse aliquid contra hanc omnium Arabum distributionem animadverterit: nullus cordatus homo suspiciari debet novam aliam unciæ in novem drachmas distributionem allaturum illum in suis compositionibus, citra ullam sui novi dogmatis rationem aut saltem expositionem, quam in aliquo ex suis scriptis adduceret. At veto ipsum minime quidem potuisse ejusmodi unciæ in novem drachmas divisionem intelligere, jam in sua descriptione medicamenti hamech apertius ostendemus. In qua ita scribit: Myrobalanorum chebulorum, & nigrorum, reubarbariana uncias duas. Agarici, coloquintid, Polypodii, ana drachmas duo de viginti. Si igitur per drachmas duo de viginti, intelligeret uncias duas: cur non dixit, Myrobalanorum chebulorum, & nigrorum, reubarbari, agarici, coloquintid, Polypodii ana uncias duas?, vel saltem: Myrobalanorum chebulorum, & nigrorum, reubarbari, ana uncias duas, agarici, coloquintid. Polypodii ana uncias duas, vel

tantundem? Quod autem sæpius in ejus, ut & in aliorum auctorum plerisque descriptionibus, bis ac etiam pluries in una & eadem descriptione idem ponderum numerus reperiatur, manifestissimum est. Quo circa potius quidem, eodem Pharmacopolarum arguménto, credendum erit, Mesuem, ex octo drachmis, unciam, cum reliquis omnibus Arabibus ac antiquis constituere, quam ex novem, à nullo antè eum unquam excogitatam. Neque etiam aliquid movere eos deberet, quod ille in suis descriptionibus interdum dicat unciam unam, interdum vero drachmas octo, pro uncia una. Ita enim etiam de libra dubitare possent, an apud eundem ex duodecim unciis constitueretur. Siquidem de ea, idem quod de uncia objicitur, afferri posset: ut in descriptione confectionis testicularum vulpis ipsius Mesuæ; ubi inquit: succi Buglossæ libras duas, succi pomorum dulcium uncias duodecim, zuchari libras tres. Et in descriptione syrupi de portulaca, scribit: succi Endiviæ libras quatuor, feminis portulacæ uncias duodecim. Quod vero Saladinum etiam pro se afferunt, pudet nos sane eos tantæ levitatis fugillare, quos non puduit ab antiquorum præscriptis desciscere, ac trivialis illius auctoris judi-

judicio *a* subscribere: qui, eodem modo quo illi, alius sibi similis, Nicolai (inquam) Salernitæ, auctoritate deceptus, eum sequi voluit in illa ponderum varietate quam in conterminis civitatibus annotarat: dicens, viginti grana tritici continere unum scriptulum: & unam unciam continere novem drachmas, secundum Salernitanos, at secundum Paduanos, octo, secundum Neopolitanos vero, decem: sed quod *b* communiter tenetur, constare unciam ex drachmis novem. Quod quidem nulla alia ratione aut auctoritate nixus scribit, quam quod ita in illo Nicolai sui Salernitæ libro scriptum viderit. At jam ipsam tanti Nicolai auctoritatem expendamus. Quem ducem ipse Saladinus, ac cum illo Pharmacopolæ sibi eligere potius voluerunt quam reliquos omnium nationum scriptores tam antiquiores quam recētiore. Quatuor reperitur antidotariorum libri, Nicolai nomine inscripti: duo Græci, quorum unus est Nicolai illius vetustioris Alexandrini, qui Latine versus est à Nicolao.

B b 6 Rhe-

a Sylvius in sua methodo med. compo. inquit de servitore quod nos hic de Saladino dicimus. At re vera non servitor, sed Saladinus fuit n qui Salernitanos sequutus est in uncia in drachmas novem, & scriptuli in viginti grana distributione. b Similiter deceptus est in hoc Alexander benedictus barbarasui temporis ignorastia dultus.

Rhegino: alter vero Nicolai Myrepsi Alexandrini quoque nuncupati, quem vertit Leonardus Fuchsius. Duo autem Latini: quorum unus est Nicolai Salernitani, qui cum Mesuæ codicibus magnis impressus circumfertur: alter vero Nicolai præpositi, qui cæterorum novissimus existit. Ex his quatuor libris, tres tantum suos proprios auctores habuere, nempe: Alexandrinum vetustiorum, Myrepticum, & præpositum. Quorum recentiores licet à vetustiori plerasque ex suis antidotorum descriptionibus mutuarint, multa tamen in iisdem immutarunt ac de suo addiderunt. At liber ille Nicolai Salernitani titulo inscriptus nullum proprium auctorem habuit. Est enim is liber Nicolai Alexandrini vetustioris fragmentum quoddam, ab ipsis Salernitanis medicis transcriptum, ex eo tempore, quo eorum schola magnum sibi nomen arrogaverat in barbara illa iluvie qua tota Europa opprimebatur, omnesque bonæ litteræ obsoletæ jacebant. Quum enim ejus scholæ medici, reliquis adeo peritiores existimarentur, ut aliis leges in medicina dare valerent, regimen suum Salernitanum, pro ruenda sanitate, composuere, & hunc antidotorum librum, ad curandos morbos deservientem, concin-

cinnarunt, minime quidem ausi novas medicamentorum compositiones prosti- tuere, sed ex Nicolai vetustioris antido- tario, eas, quas sibi usui magis fore arbitra- rentur, seligentes, & in summam, ac veluti compendium redigentes, quæ ipse Nico- laus, tam in proæmio sui operis, quam ini- tiis cujusque suarum compositionum de- scriptionis, ad earum usus explicãdos scri- pserat, librum illum edidit. In quo ni- hil de suo addidit: quin potius eo quo diximus modo ediderant: atque etiam nonnullas compositiones, quæ sibi in ma- gna quantitate descriptæ visæ sunt, discer- pentes, earum aliquotas partes transcri- psere, sed adeo sinistre, ut plerasque omnes ob arithmeticæ imperitiã defædaverint, nescientes, simplicium medicamentorum, compositionem ingredientium partes, ex- cipere proportione et respondentes quam ex integra ipsa compositione assumere studebant. Ut tutius multo sit eas, immo omnes, quascunque in libello illo transcri- pserunt, ex ipso vero Alexandrino aucto- re, quam ex illa eorum farragine repete- re: & quoniam in illo multa impressionis vitia deprehenduntur, illas cum aliis ea- rum similibus conferre, quæ in aliis My- repsi & Præpositi antidotariis reperientur.

Ita

Ita enim errata, si quæ fuerint, corrigere facilius erit. Sed ut ad ipsum, à Salernitanis compilatum antidotarium convertamur, etsi in iis quæ Salernitani ipsi ab Alexandrino Nicolao transcripserunt religose se habuere: nihil fere immutantes, aut de suo addentes, præterquam unam aut alteram descriptionem ex alterius Nicolai Myrepsi antidotario mutuatam: in ipsius tamen antidotarii calce brevem de ponderibus tractatum, ab ipsis compositum infelicibus auspiciis addiderunt. Quippe quum ex eo perniciosus ille ad Pharmacopolas error emanarit, in divisione unciæ in drachmas novem, ac scriptuli in grana viginti. Quem quidem tractatum ipsi de suo addiderunt, ponderum distributionem medicis ac Pharmacopolis præscribentes, eo modo, quo in ipsorum patria, Salerno, vulgo recepta erant. Quum enim pleræque Italiæ civitates varie pondera ipsa ac præsertim unciam partiretur, unaquæque suis propriis usibus consulens: consultius eis visum fuit, si juxta suæ ipsorum patriæ rationem pondera in medicina statuerent. Neque vero, ob mathe-
seos imperitiam, incommoda à nobis exposita, in medicamentorum antiquis compositionibus, circa simplicium, eas ingre-

dien-

dientium, proportiones ipsi percipere poterant. In quo licet venia aliqua eorum ignorantia condigna videatur: nostri sane temporis Pharmacopœi ac medici, adhuc idem peccantes, nulla omnino venia digni censendi. Quum aureis hisce temporibus omnes fere bonæ artes, ac inter eas mathematicæ disciplinæ, ad pristinum suum nitorem restitutæ sint: Atque in eo etiam magis culpandi videntur, quod ob unum hunc tantum chimericum Nicolaum (quid enim sic appellare non liceat eum qui numquam fuit, nisi nomine tenuis, ab ipsis Salernitanis confictus, mutuato ab eo Nicolao nomine à quo etiam fuit descriptus) ab aliis tribus veris Nicolais, immo à tota antiquitate, desciscere maluerint. Quod enim Græci illi Nicolai ne per somnium illam unciæ divisionem in novem drachmas cogitarint, nullus, sanæ mentis, dubitare potest. Quum potius de minore ipsius unciæ in partes distributione suspicari aliquis illis temporibus in aliquo scriptore posset: ut si eam in septem partes divisam significaret, nomen drachmæ improprie pro denario usurpans. Præpositus vero Nicolaus aliorum novissimus, tametsi barbarus, prudentius tamen de ipsis ponderibus agit, ita

de uncia scribens: uncia est pondus drachmarum octo, ut tenet modus communis: in diversis tamen regionibus variatur. Carmina autem quæ ibidem citat, quibus unciam novem drachmis constare, & scriptulum viginti granis ait, ex aliorum opinione recitat. Et ne nos aliquis forte prolixæ ac importunæ loquacitatis accuset, quod in hoc expugnando Pharmacopolarum errore adeo simus expatiati, is intelligat à nobis id de industria factum, egerime ferentibus, nullas unquam tantorum virorum admonitiones, quotquot de his scripsere, sufficere posse, ut hic detestandus error ab officinis exterminaretur. Ut enim Fernelium, Fuchsum, Bernardum Dessenium, Rondeletium, ac innumera- biles alios doctissimos medicos omittamus: unum eis Jacobum Sylvium ob- jiciam, quem omnes fere Pharmacopœi tanquam alterum Mesuem, ac merito qui- dem, venerantur, qui serio fatis ac pruden- ter hujusce erroris admonet, ita *a* in- quiens: Ne Nicolao Salernitæ credas, uncia drachmas novem tribuenti, nulla veterum auctoritate. Cui & *b* Servitor nescio quis scriptor triobolaris subscribit.

Hosque

a Lib. suo method. comp. med. *b* Salodinum vo-
luit & debuit intelligere, ut antea advertimus.

Hosque duces magna, nostrorum Pharmacopœorum natio sequitur, nulla ratione alia, quam quod ab illis est hoc scriptū, nulla aut ratione, aut scriptorum veterum auctoritate se tuentibus. Ex omnibus vero Pharmacopœorum nationibus nulli minor veniæ locus relictus quidem videtur, quam nostris Hispanis Pharmacopœis, qui ob unius e mentiti Nicolai auctoritatem, non modo contra antiquos omnes ac ex recentioribus peritiores medicos, sed & contra suæ cuiusque patriæ publicos ponderum usus, suis illis detestandis ponderibus abuti velint. Quum contra Salsitaniani illi sui Nicolai auctores, ea tantum ratione ne aliter sui medici quam suæ patriæ vulgus pondera tractarent, ab antiquorum ponderum partitionibus variare maluerint. In quo nostri quidem Pharmacopolæ peccatum adhuc peccato addere deprehenduntur, non modo in ponderum distributione, sed & in cuiusque illorum quantitate à vulgi communi usu deviantes. Quum tamen idem Hispanorum vulgus illorum tum (ut jam ostendimus), quantitatem, tum etiam distributionem, ab antiquis veluti per manus traditas, perpetuo conservasse videatur. Quod enim antiqui drachmam nominabant, Hispani ipsi

ipsi vulgo octavam dictitant, unciam in octo dictas octavas, perinde ac antiqui in octo drachmas, distribuentes: & octavam rursus in duas æquales partes dividentes, eas dicunt adarmes, qui sesqui scrupulo antiquorum respondet, estque (ut antea diximus) minimum in Hispanico marco pondus. Quo circa quanto satius ac commodius fuisset iisdem Hispanici marci ponderibus ipsos medicos ac Pharmacopolas, eodem prorsus pacto quo vulgus, uti, evidentissimum jam omnibus fore minime dubitamus. Quoniam vero minoribus adhuc quam quæ in marco reperiuntur ponderibus ipsi medici ac Pharmacopolæ indigent, nempe, scriptulis ac granis: animadvertendum hic erit duobus granorum generibus uti hisce nostris temporibus Hispanos negotiatores ac aurifices. Argentarii enim fabri, vulgaris marci ponderibus dumtaxat contenti, ad inferius minusve pondus quam adarme minime descendunt: Sed ex præfatis aurificibus ac negotiatoribus, alii (ut in universo Lusitanæ regno, ac in aliis plerisque Hispaniæ provinciis) eandem quam antiqui, octavæ seu drachmæ, in grana septuaginta duo, distributionem retinent: quæ quidem vera antiquorum in grana partitio à medicis ac

Phar-

Pharmacopœis jugiter servanda erit : ita enim tertia eorum granorum pars, puta, grana viginti quatuor, scriptulum unum, eodem prorsus modo quo antiquorum grana, constituunt. Porro hæc ipsa grana, quorum septuaginta duo octavam nostri marci complent, sunt eadem, quæ ab Hispanis Pharmacopolis hæctenus in usum habentur. Minime enim in eorum pondere errant, nisi in eo quod cum quatuor & viginti ex hisce granis in scriptulo contineantur, & septuaginta duo in drachma perinde ac in octava marci : ipsi, Nicolai auctoritate decepti, eorum viginti dumtaxat in scriptulo, sexaginta autem in drachma numerant. Alii vero Hispanicorum negotiarorum & aurificum, ac præsertim in nostra hac Hispalensi civitate, octavam ipsam, in grana septuaginta quinque partiuntur. Quod autem ipsi in hujusmodi octavæ distributione à veterum ac aliarum Hispaniæ nationum communi usu recedant, non abs re quidem nec citra suorum usuum rationem ab eis factum est, pro conservanda ac commode tractanda illa altera marci distributione, qua illum (postquam Hispani occidentales indias possederunt) in quinquaginta pondo distinxere, quæ suo proprio nomine vulgo nuncupant

cupant Pefos aut Castellanos, Quum enim ex hac marci distributione fingulæ unciaë pendant Pefos vulgo eorum dictos, aut Castellanos sex cum una quarta ipsius pōdo seu Castellani : si oëtava feptuaginta duo grana, uncia vero quingenta feptuaginta sex, eo modo quo antiquitus, contineret : morofa admodū in minutias partitio fingulis Pondo seu Pefis contiageret : nempe, granorum nonaginta duorum, cum quatuor vigefimis quintis unius grani. Quæ quidem minutiarum prolixitas, maxime ipsius pondo seu castellani numerationes impediret, ac negociationes ipfas interturbaret : præfertim cum pondo ipfum seu castellanum, in alias etiam minores partes dividi opus foret. Ac proinde, haud injuria, aliam oëtavæ ac unciaë in grana distributionem, hujufce marci in pondo quinquaginta partitioni defervientem, contingi oportuit : qua oëtava in feptuaginta quinque, uncia vero in fexcenta grana dividerentur, minoribus aliquantulum ipsis granis constitutis quam olim fuerint. Quomodo in fingulis pondo seu castellanis nonaginta fex grana numerant : & pondo ipfum in oëto pattes distribuentes, quas vocant tomines, fingulis tominibus duodecim grana tribuunt. Vnde etiam

con-

constabit hujusmodi Hispanorum tomin, licet ex granis duodecim constituatur, minus quidem esse quam dimidium scriptuli medicorum. Quoniam ex granis illis constitutum est, quorum septuaginta quinque continentur in octava: grana vero medicorum, quorum viginti quatuor scriptulum constituunt, debent eorum esse quorum septuaginta duo ipsam octavam complent.



In subjunctis Tabellis Romano-
rum ponderum ad Hispanica,
& rursus Hispanicorum ad Ro-
mana pondera certa traditur ra-
tio. Vnde aliarum quoque na-
tionum ponderum ab ipsa Ro-
mana ratio poterit æstimari. Ex-
ponitur etiam antiquarum apud
Romanos mensurarum ex Hi-
spanicis ponderibus capacitas:
ut si singularum nationum usi-
tatae mensurae cum his confe-
rantur, proportio quam inter
se mutuo habuerint, explorari
facile possit.

T A B E L L.



LIBER SECVNDVS,

DE

*MEDICAMENTORVM
expurgantium tritura, ac multi-
plici in illa Pharmacopœo-
rum errore.*

DE T E C T V M jam & emenda-
tum priorem Pharmacopœorū
nostrorum errorē in eorum pon-
derum ratione & usu, alter jam
sefe æque perniciosus ac communis notan-
dus corrigendusque subsequitur, circa ex-
purgantium Pharmacorum, & præcipue
Scammonii, in compositis medicamen-
tis triturationis. Quam omnes fere Hi-
spani Pharmacopœi, crassissima oscittāia,
perpetuo crassam esse volunt. Quumque
opinionem hanc, in illorum animis inve-
teratam, tanquam inviolabilem legem tue-
antur, non minus convenire existimo in
hoc

hoc extirpando errore, quam in ponderum antiquorum restitutione, immorari. His enim, maximis à Pharmacopoliolorum foro abusibus exclusis, parvo admodum negotio reliqua omnia convincentur: nimiaque in hisce convellendis prolixitas, aliorum, quæ tractanda restant, brevitare compensabitur. Quod itaque illi omnes, communis præcepti nomine observant, hujusmodi nimirum est: in compositis omnibus medicamentis nulla expurgantia pharmaca, uno aut altero excepto, esse tenuiter terenda: Sed in electariis alia crasso modo, alia vero mediocriter: in pillulis autem omnia crassius jugiter terenda. Atque cum singulos è nostris Pharmacopœis in hac Pharmacopoliolorum recognitione examinarem, ut quid unusquisque in medicamentorum tritura crassum aut mediocre judicaret, facta similitudine, cum re aliqua naturali, proferret: tantam inter eos comperimus varietatem, ut nullus fere cum alio sentiret. Videres unum ad dimidium cicer id referre, quod sibi videbatur crassum: alium id ipsum ad granum orizæ: quosdam ad milium, alios ad sesamium semen. Atque juxta hæc easdem differentias variè ipsa expurgantia medicamenta terebant: in hoc tantum omnes con-

convenientes quod minime essent subtiliter terenda. Quam quidem opinionem adeo firmis credunt innixam esse fundamentis, ut quodvis aliud medicinæ theorema potius corruere ac labefactari posse credant. Primum autem ac potissimum eorum fundamentum est Galeni illa famosa auctoritas lib. 4. de san. tu. Ubi in hunc modum scribit Galenus: Hæc omnia simul tundenda cribrandaque sunt tenui cribro. Quippe ejusmodi medicamenta in totum corporis habitum maxime digeruntur. Veluti è diverso crassiora in ventre hærent, ut quæ angusta venarum oscula subire nequeant. Quam ob rem etiam medicamentum, quod Diospoliticon vocant, cujus in hoc libro antea mentionem feci, crassius facere soleo, quoties dejicere alvum per id studeo. Quidam vero id non intelligens, cum tenuissimum minutissimumque instar pollinis fecisset, ut alvo dejiciendæ nihil contulit, sed urinam plane multam movit: mecum rem communicavit, mirans ac sciscitans ejus eventus veram causam: ipse enim arbitrari se ajebat, hominis intemperantiam (nam ita appellabat) ejus quod inciderat causam esse. Ut vero propriam causam didicit esse compositionis rationem, post-

modum aliter composuit meliore successu. At hujus quidem præcepti in omnium medicamentorum compositione meminisse expedit. Alterum vero fundamentum quo suam opinionem maxime fulciri credunt nostri Pharmacopœi, est à Mesuæ auctoritas in Canonibus universali-
 bus ubi præfatam Galen. auctoritatē citat, in hunc modum scribens : Triturationis necessitas est triplex : aut ut miscibilium in unum melior fiat sigillatio, aut ut medicinis aliqua proprietas acquiratur, vel ut in eis aliqua malitia reprimatur. Exemplum primi, est triturationis theriacæ & aliarum medicinarum. Exemplum secundi : inquit Gelenus, institi ultime triturando & pulverizando cuminum, & cum esset natura solutivum, factum est urinæ provocativum. Ego dico quod aliquando aliquod acutorū, solutionem facientium, ultimo pulverizatum acquirit proprietatem post illud ut fiat magis penetrans, & repat ad alias partes in quas non poterat prius, & provocet per illas. Demum hoc idem præceptum ab omnibus fere scriptoribus, quotquot Pharmacopœas tradidere, observari credunt Pharmacopœi : quorum auctoritates plenis buccis sonare non cessant, & præsertim Jacobi Silvii.

In cuius verba cum plerisque eorum jurare intelligamus, quæ ex ejus scriptis pro eis magis facere videbuntur, hic afferre non pigebit. Is itaque in *a* sua methodo de componendis medicamentis, ita inquit: Sic Scammonium tenuissime terunt, si medicamentis corpus pervadentibus miscent, crassius autem si catapotiiis aut aliis, quæ diu in ventriculo manere volunt. Similiter in sua Pharmac. *b* in hunc modum scribit: Scammonium exacte terendum, nisi cum in catapotia venit. Tunc enim crassius tritum diutius in ventriculo manet, potentiusque agit: & infra: Quædam crassius terenda, quæ in ventre diutius morari volumus, nec promte vaporum ora subire: sic purgantia medicamenta crassius teruntur, ut in ventrem, partem minus principem, & evacuationi expositissimam, ex corpore reliquo trahant, non autem ad partes principes tota ferantur, easque offendant, cum ad has facultate aut saltem vapore ferri, vel (quod plurimum fit) portione paucissima sufficiat. Crassius etiam teruntur, quorum virtutem multa tritura dissipari metuimus. Sic scammonium vim purgatricem multa tritura perdit. Et inferius: sic scammonium, colocynthis, & alia valen-

ter purgantia, nunc crassius, cum illud in pillulas, hæc in trochiscos transit; nunc tenuius ob dictas prius rationes: thabarbarum tamen fere tenuius teritur, ut colocynthis tenuissime, cum mox & citra aliam per trochiscos trituram sumenda. Scammonium quoque crassius teritur, si coquendum est cum aliis, aut diu ante usum feruari debet medicamentum: idque ne vis ejus coctione per ignem aut longam fermentationem exhalet. Sed ut tum Galeni, tum Mesuæ, ac Silvii aliorumque auctorum qui recte de his sensere, probe percipiatur mens, illud hic exponere conveniet, quod nostris Pharmacopœis omnis in hac re erroris causa extitit: nempe, quid in proposita quæstione trituræ nomine intelligatur, & quid in ea crassum aut tenue vel mediocre statui oporteat. Quum tamen ipsi nihil magis sibi notum credant, nec frequentius in ore habeant. Trituræ seu contusionis voces bifariam apud auctores accipi solent, Aut enim in latiori ac fusiori significato usurpantur, pro qualibet unius vel plurium rerum in partes comminatione, sive illæ plures vel pauciores sint, seu exiguæ vel majusculæ & Aut strictiori ac peculiari, pro ea in minimas partes comminatione, qua res in pulverem redi-

redi-

rediguntur. In priori quidem significatio-
 ne ad id extenduntur, quod peculiari vo-
 ce contractio, vel conquassatio, aut con-
 cissio, & ab aliquibus etiam proprie con-
 tussio appellatur. Quomodo res in paucio-
 ra ac majora frustra, pro cujusque generis
 quantitate, contractæ considerantur, quam
 ut sub pulverum nomine comprehendere
 possint. Cujusmodi contritionem à Gale-
 no præcipi perpetuo comperies in medica-
 mentis ore assumendis, ubicumque res
 ipsæ contusæ sint in aliquo liquore deco-
 quendæ, & tali decocto abjectis facibus
 uti oportuerit. Atque hujus generis com-
 minutionem vocibus significat *a* κρήνην
 ἀδρομερῶς, quod est, in crassas partes con-
 tundere: vel *b* κρήνην καὶ σίτην παχυτέραν
 κρηκίνην, quod est, contundere & cribrare
 crassiore cribro. Hunc etiam contritionis
 modum designavit, ubi filicis radices con-
 tundere *c* præcipiens in Andromachi ar-
 teriacis, modo *d* inquit quod εἰς πεδιώκλι-
 να κρητέμενται καὶ κρητρίονται: hoc est,

C c 3 in

a Vi lib. 7. de comp. phar. sec. lo. cap. 2. in arteria-
 ca delictigibili ad omnes internas affectiones, & lib. 8.
 cap. 2. ubi secum dam affert Andromachi compositio-
 nem ex Iampono Pelusiota ad stomachicos. *b* Vi
 lib. 9. de comp. Phar. se. lo. cap. 4. in eclegmate coli-
 ci neltareo facienti pleuritico & dyspnoico. *c* Lib. 7.
 de Pharma. comp. sec. dac. cap. 2. *d* Post princi-
 pium ipsius cap. 2.

in frustra trium digitorum magnitudinis conciduntur & confringuntur : a modo quod καλατέμνονται εἰς δακτυλιαῖα μήκη, καὶ καλατέμνοντες θράνομεν, id est, conciduntur in frustra digitalis longitudinis, & concisæ confringuntur. In altera vero significatiōne, trituræ aut contusionis voce, id significatur, quod à medicis ac Pharmacopœis peculiariter pulvis appellari solet : & quæ hoc modo contrita sũnt, in pulverem redacta esse dicuntur, vel (ut Plinius loquitur) in farinam trita. Sæpius enim ejusmodi pulvis à Galeno & aliis auctoribus nominatur farina. Quamquam propius loquendo leguminum tantum pulvis dicatur farina; ut combustarum rerum pulvis (²juxta b Galeni sententiam) cinis. Atque hunc trituræ modum designare solet Galenus vocibus πρίθειν καὶ σήθειν, quod est, tere & cribrare, & interdum una tantum vo-

CC

a Eodem cap. 2. prope finem. Vbi δακτυλιαῖα μήκη vertimus cum Plin. Digitalis longitudinis, potius quam cum Cornario, Digitalis magnitudinis : quoniam verbo μήκη proprie longitudo significatur. Atque ut hæc frustulorum radice filicis mensura cum ea quam in arteriaca priori adduxerat conveniret, necessarium intelligere oportet hanc quidem juxta digiti unius longitudinem, illam vero juxta trium digitorum transversorum latitudinem esse accipiendam. Ita enim una ab altera parum differt. b Lib. 6. de comp. Phar. se. lo. cap. primo.

ce τρίβειν, id est, terere: sed sæpius duabus simul vocibus κόπτειν καὶ σίθειν, videlicet, tundere & cribare. Perpetuoque hujusmodi trituræ vel contusionis genere uti illum comperies in omnibus cōpositis medicamentis ore assumendis, ubicumque res siccæ, quæ tundendæ proponuntur, tota sua substantia compositionem ipsam ingredi debeant. Porro quum in omni contritione tres ordines seu modi considerentur: ut alia crassius, alia tenuius, alia vero medio modo trita dicantur, juxta majorem minoremve aut mediocrem rei terendæ comminutionem: planum quidem est, hos ipsos ordines intra alterutrius trituræ generis limites contentos esse debere: ut quod crassum in eo contusionis genere dici mereatur, quo proprie conquassatio significatur, ab eo multum differat quod crassum similiter vocetur in altero contusionis genere, quod pulveres designat. Quicquid enim in ea tritura quæ res in pulverem rediguntur crassum dici potest, ut pulveris non excedat fines, consentaneum fuerit: nimirum ne in crassiora fragmenta confringatur, quam quæ pulveris vel farinæ nomen mereantur. Quumque pulveres aut farina quantumcunque crasse trita dicantur, minime furfures ipsos

fua crassitudine exuperent : ita statuen-
 di erunt tres illi ordines in hoc triturae ge-
 nere quo res in pulverem rediguntur, ut
 quod in eo crassius tritum dicatur, in fru-
 stula furfuribus minora, aut saltem minu-
 tos furfures non excedentia, sit contusum.
 Quod etiam a Aetii auctoritate confirma-
 ri potest, qui ellebori ramenta, quæ ψα-
 λιςδὴ appellat, fieri præcipit illius festucis
 ad furfurum magnitudinem forcipe con-
 cisit. Quod vero ejusmodi ellebori com-
 minutioni non conveniat triturae nomen
 in sua illa propria significatione qua pro
 pulveribus usurpatur, ex proprio ψαλιςδὴ
 significato aperte constat : quod latine so-
 nat ramentum, & expressius b forcipe
 concisum seu resecatum : Quod triturae
 quadrat significato fusiori, quod ad con-
 fusionem & concisionem extenditur, un-
 de manifeste constat ex Aetii sententia id
 quod proprie pulvis seu farina dici debeat,
 quantumvis crassius consideretur, & ab
 auctoribus confici præcipiatur, in minora
 fragmenta comminui debere quam sint
 furfures, crassiores saltem illi qui Græce
 πίτροα dicuntur. Et quoniam pulveres fa-
 rinæ aptissime comparantur : quemadmo-
 dum in hac tres differentias connumera-

vit

a *Teer. 1. ser. 13. cap. 131.* b ἀπὸ τῆς ψαλιζῶ.

vit Galenus *a* in ling. Hip. explan. in-
 quiens : omnis moliti grani mediocri ma-
 gnitudine fragmentum *ἄλφιται* vocari, ma-
 jora, *κείμενα*, minora autem *ἄλωρα* : ita
 hisce tribus farinis, aut farinae partibus cor-
 respondentes illi res trituræ ordines sta-
 tuendi sunt : vel crassior pulvis *κείμενον*
 æquet, nempe, farinam crassius molitam,
 seu crassiora farinae frustula quæ mola pro-
 be contrita non sunt, vel etiam crassiorem
 farinae partem quæ per cribrum laxiora ha-
 bens foramina decussa est, quæque nondū
 ab omni furfure excreta est, sed minutos
 etiam furfures in se continet (qualis ea est
 quæ Hispanis dicitur harina baça vel ace-
 mite gruẽño) aut ad summum furfures
 ipsos minutos, qui hac in civitate dicun-
 tur moyvelo. Quod enim per vocem sim-
 plicem *κείμενον* non possint intelligi furfu-
 res crassiores, immo neque farina crassissi-
 ma & quæ crassiores contineat furfures,
 constat ex ipso Galeno, *b* eodem loco as-
 ferente hujusmodi crassissimas farinas vo-
 cari ab Hip. non simpliciter *κείμενα*, sed
κείμενα ἄλφιτα ἄωρα. Tenuior vero ei farinae
 parti comparatur, quam Galenus citato
 loco *ἄλωρα* vocat, alibi autem *ἄλωρα*
ἀκραιβῶς καθαροῦ, quod est, farina exacte

a In voce *ἄλφιται*. *b* In voce *κείμενα*.

depurata vel purissima: è qua panem ab eo dictum καθαρότετον, id est, purissimum, vel σιλιγίνιτω, id est, filigineum fieri a præcipit: & est tenuissima farinæ pars per densissimum cribrum, vel (ut b Plinii verbo utar) excussorium pollinari-um transmissa, à Græcis etiam dicta γύ-
 εις & παιπαλή, à latinis vero tritici flos, singulari nomine c pollen. Mediocris ve-
 ro, seu mediocriter tritus pulvis, ei fari-
 næ parti comparetur, quæ à Galeno eo-
 dem loco ἀλφιτω vocatur, & similæ seu
 similagini, Latinis dictæ, correspondere vi-
 detur, Hispanis autem peculiari voce
 appellatur Rollon. Poterunt autem ii-
 dem tres prænotati pulverum ordines, sen-
 su in hunc modum determinari: ut dica-
 mus crassos pulveres oculis posse discerni,
 mediocres vero digitis cōtrectatos depre-
 hendi: tenues autem vix dentibus perci-
 pi. His ita constitutis operæ pretium fue-
 rit videre quo trituræ significato interpre-
 tari consentaneum sit Mesuem, Sylvium,
 & cæteros omnes auctores. Quicumque
 medi-

a Lib. pri. de alim. fac. cap. 2. ut &
 auctor libri de ren. affect. dig. & med. cap. 6.

b Lib. 18. cap. 11. c Pollen proprie in-
 tritico flos vero in filigine: juxta Plinium
 lib. 18. cap. 10.

medicamenta expurgantia in compositionibus crassius conteri præcipiunt. Sane cum compositiones omnes in quibus expurgantia medicamenta ingrediuntur (quales sunt electaria, pillulæ, aut etiam trochisci) ex pulveribus confici dicant ipsi Pharmacopœi, usque eo, ut sicca omnia collecta, aut seorsim servata ad ipsorum electuariorum, pillularum, vel trochiscorum compositionem, polvoras proprio ac peculiari Hispanorum nomine à nostris medicis ac Pharmacopœis appellentur, quoniam re vera pulveres sunt & pulverum formam obtinere debent: Nemo jam non intelliget trituræ significatum; quo medicamenta omnia sicca in compositiones admissa in pulverem rediguntur, proprie quidem accipi debere, & non quatenus ad contusionem vel concisionem extenditur. Itaque tres illæ excogitatæ differentiæ, quibus unam trituram crassam dicimus, aliam tenuem, aliam mediocrem, ineptissime quidem hic afferentur, si eo modo quo in contractione vel concisione propriè dicta decernantur, & non pro ut pulverum ratio exigit, usurpentur. Atque ita eos qui ex hisce pulveribus crassissime tusi aut contriti dicentur, minime quidem ad furfurum magnitudi-

nem (ut ex Aetii & Galeni doctrina comprobatum habemus) accedere , vel saltem minutos furfures non excedere debere. Ex quibus jam manifeste constat quam turpis ac improbandus error sit , is quo hæctenus ducti nostri Pharmacopœi scammonium & alia ex purgantia medicamenta suas compositiones ingredientia , quæ ab auctoribus crasso modo teri præcipiuntur , ad grani sesamini , vel milii , orizæve , aut etiam dimidiati ciceris magnitudinem confringebant. Qui etiam eo magis ridendus , vel potius deplorandus erit , quo absurdior est ratio qua sese illi in hoc tueri credebant : dicentes ita eis constitutum esse per quendam Pharmacopœum , qui superioribus diebus hujus civitatis Pharmacopolia recognoverat. At qui ex eis doctiores videri volunt , alium etiam , si diis placet , huic tanto auctori comitem adjuñgebant , a Paulum (inquam) qui aliquando ellebori radices ad sesami magnitudinem contusas assumendas præcipiat. Quod si placet , cur non etiam sua medicamenta conterunt ad lathyridis grani magnitudinem , quoniam idem b illa integra devorare præcipit : quasi vero eadem omnino sit habenda tritu-

ræ ratio in simplici uno medicamento per se assumendo, quæ in eo quod pluribus constat simplicibus: & non potius diversissima. In hoc igitur propositæ disputationis vertitur cardo, an scammonium ac reliqua expurgantia medicamenta, quæ in pulverem trita composita medicamenta ingrediuntur, crassius intra pulverum metas terenda sint, an tenuius: idque an de omnibus expurgantibus & in omnibus compositis medicamentis statuendum sit, an aliter. Pro cuius controversiæ vera decisione nihil æque facere videtur, atque ipsius trituræ usuum animadversio: & juxta illos, eisdem trituræ modos determinare. Nam si rem aliquam terendam ducimus, ut ex ejus tritura utilitas aliqua (verbi gratia) malignitatis cujuscumque correctio, oriatur: planum quidem erit eum trituræ modum quo maxime ejusmodi malignitatis correctio effici possit, magis eidem rei fore convenientem. Vnus igitur seu scopos trituræ omnes percurrerimus: atque eos exponentes, quæstionem ipsam simul decidemus. Tres quidem à Mesue ac reliquis Mesuem sequentis medicis considerantur scopi: primus,

a In cann. universal. loco ante citato, dicitur

mus, ut medicamenta simul misceri exactius possint. Secundus, ut facultatem novam acquirant. Et in hoc etiam complectitur Mesues eum trituræ usum qui ratione loci seu partis affectæ consideratur: quem aliqui in hac ejus divisione desiderari contendunt: cujus tamen maximam rationem Galenus habuit. Tertius, ut malefica eorum vis mitigetur ac tollatur. Quibus etiam quartum addere poteris, ut medicamentum, ore sumptum, à nativo ventriculi calore in actum (ut dici solet) melius deducatur. Omnibus igitur medicamentis, in quibus hæc omnia unico triturationis modo obtineri possint, nulli dubium erit quin is ipse triturationis modus conveniat. In eis vero medicamentis, in quibus alius ex præfatis trituræ scopis unum trituræ modum, utpote tenuiorem, alius vero alium, ut crassiorem, exoptulet: manifestum etiam est, juxta medicorum doctrinam, ac rationi ipsi consentaneum, ut majoris momenti scopi major semper habeatur ratio, minori non neglecto: quod si omnino differentes fuerint, etiam neglecto minoris momenti scopo, ad eum qui majus emolumentum promittat, magisque ad propositum nobis finem facturus videatur, erit dumtaxat respicien-

spiciendum. Vt si nobis opus sit medica-
 menta aliqua simul macerare, quorum
 pars substantiæ tenuioris ac superficialiæ
 sit facultatis, pars vero alia substantiam
 crassam & magis in profundo sitam sit for-
 tita: lane ratione medicamentorum sub-
 stantiæ tenuioris, brevi admodum macera-
 tionis mora opus erit, ut verbi gratia ho-
 rarum duodecim: ratione autem medica-
 mentorum crassæ substantiæ, multo lon-
 giori mora, nempe trium vel etiam plu-
 rium dierum. At in eo casu juxta pruden-
 tium medicorum præcepta, tot in mace-
 ratione ponentur dies, quot ea, quæ cras-
 sioris fuerint substantiæ, postulaverint.
 Et ne à proposito negotio recedam, quum
 Galeni & aliorum qui illum sequuti sunt,
 medicorum doctrinam, ad stomachi af-
 fectus medicamenta crassiuscule trita, ad
 jecoris tenuia, ad renum vero passio-
 nes tenuiora conveniant. Si affectus no-
 bis in tribus propositis membris curan-
 dus offeratur: necessarium quidem erit
 medicamenta tenuius conterere. Quip-
 pe quum licet hoc modo lævigata non
 adeo propinquioribus membris condu-
 cant (quia non tantum in illis immorari
 possunt quantum opus esse conjicimus)
 si tamen crassius trita propinarentur, nulla
ex

ex parte distantioribus membris juvarent, ut pote ad illa minime pertingentia. Videamus igitur quis trituræ modus unicuique ex præfatis trituræ scopis magis conveniat, & quis ex his potior sit ac majoris momenti. Sane quanti momenti sit tritura juvare medicamenta, ut melius à ventriculi calore in actum reducantur, & quantum ad illorum, quam vocant, actuationem conducat tenuior ipsorum lævigatio, manifestius est quam ut probatione ulla indigeat. Similiter haud parvi momenti est ille trituræ scopus quo malignorum medicamentorum vim maleficam corrigere conamur. Hæc autem correctio duobus modis intelligi potest: nempe, vel in medicamento per se solo exhibendo, de quo non est hic propositum agere: vel si illud cum aliis commistum esset assumendum. Et hoc rursus bifariam fieri potest: nempe, si per solam proprii medicamenti trituram ejus malitia mitigetur corrigaturve abunde, aut si intercedente ipsa tritura commisceatur medicamentum malignum, cum aliis quæ ejus malignitatem corrigere possint. Prioris correctionis exemplum attulit Mesues. in colocynthide, admonens eam tenuius tritam meliorem reddi, plusque è sua maligni-

lignitate amittere. Neque aliquod usquam malignum medicamentum consuluit aliquis terendum crasse, ut malefica ejus vis corrigeretur, præterquam unus Serapio, qui turbit ac scammonium, ut & ipsam colocynthidem, contra reliquos omnes auctores, non esse exactius terenda admonet, falsa illa sua imaginatione deceptus, quod lævissime trita, stomachi villis adhærent. Quum potius eademmet causa ne stomachi villis adhæreat, terendam tenuissime ipsam colocynthidem præcipiat Mesues, citans in eo ipsum Serapionis filium: ut non immerito quis suspicari possit mendam fortasse aliquam esse in Serapionis codice. Alterius autem correctionis modus quo medicamenti malitia aliorum benigniorum medicamentorum mistura emendatur, cum ab ipsa mistione pendeat, idem trituræ modus, quem mistioni magis convenire ostendero, eisdem similiter conducet. Novam etiam in aliquo medicamento facultatem acquirere, ubi opus fuerit, magni est momenti. Sed neque hoc est semper necessarium, neque in omnibus medicamentis id ex trituræ varietate assequi possumus. In diospolitico quidem, thabarbaro, ac nonnullis aliis id observatur, quod crassiuscule trita expurgan-

gantem tantum, aut magis expurgantem: tenuiter vero lævigata minus expurgantem: aut diureticam tantum facultatem obtineant. Quod autem hoc minime contingat in plerisque expurgantibus medicamentis, immo in nullo ex malignis ac valenter expurgantibus: nulli non constabit, si singula ipsorum valide expurgantium medicamentorum percurramus. Primo enim colocynthidem melius ac innocentius expurgandi causa mollissime terere ab omnibus medicis jubemur, nemo autem eam quamvis tenuissime lævigatam urinas movere hætenus annotavit. Elleborus vero tantum ab est ut crassius tritus magis expurget quam tenuiter lævigatus, quod contrarium omnino ab antiquis auctoribus observatum reperitur, nempe, quo tenuius tritum fuerit eo validius expurgare. Idque a *Ætius* prudenter insinuat, exhibens de ejus ramentis ad fursurum magnitudinem concisis, drachmas duas & semis, de pulvillo vero ejusdem drachmam tantum unam & obolos duos. Idem quoque ex *b* Paulo colligitur qui ellebori radices ad sesami magnitudinem dissectas in potu exhibet, nam in tenuissimum redactæ pollinem virium efficacia

stran-

a *Tetr. 1. ser. 3. cap. 131.* b *Lib. 7. cap. 10.*

strangulationes parere admonet. De lathyride similiter manifeste constat ex eodem a Paulo, ejus grana quo tenuius contrita propinentur, eo valentius purgare. Ita enim de his scribit: lathyrides bilem purgant sicut veratrum & scammonium. Offerens igitur, septem octove & usque ad quindecim, Robustis sane & qui liberaliori indigent purgatione manducare præcipe: imbecillioribus & malo præditis stomacho integras ipsas devorare. De scammonio quoque nemo usquam animadvertit neque experimento unquam compertum est expurgantem ejus facultatem ex tenui lævigatione diureticam reddi. Immo ipse Pharmacopœorum dux Nicolaus, in pillulis sine quibus, præcipit bene tritum & cum succo fœniculi per pannum expressum admisceri, Turbit etiam lævissime terunt *b* multi in compositionibus, & *c* Serapio illud in magnis antidotis (qualia sunt quæ fermentationem perfectam recipiunt) tenuissime terendum tradit,

a Lib. 7. cap. 4. *b* Antonius Musa in exam. pil. aggreg. omnes in seis pulveres subtilissimos fore admonet: & de turbit ac colocynthide speciatim asserit in pulverem subtilissimum esse redigenda. Fernelius quoque lib. sua metho. 7. in diaphanico turbitum tenuissime tritum inspergit. *c* Tract. de simplic. cap. 330. de turbit.

trahit, & similiter ubicumque viscidam pituitam purgare oporteat. Neque id ut inepte dictum in eo redarguitur: sed ratio causæ, quam ille ejus effectus attulit, improbat: quod, nimirum, tenuius tritum pituitæ adhæreat. Quod autem eodem loco dixerit, quod si exhibendum esset in medicinis laxativis, cribretur cum cribro rato, ut sit in eo aliqua grossities ne adhæreat villis stomachi: hujusmodi erratum in plerisque omnibus valentius expurgantibus medicamentis (ut jam advertimus) notabitur. Ita enim de colocynthide *a* dixerat, quod non multum teratur, ne adhæreat intestinis & ulceret ea: & de *b* scammonio, quod non debet multum teri ne adhæreat stomacho & noceat ei multum. Nec vero ille in hoc deceptus est, quod lævissime trita cathartica medicamenta minus expurgare existimaret. Quin potius quod ita magis juxta ejus sententiam expurgarent, aperte ex iis colligitur quæ ipse de *c* aloë scripsit, quod (nimirum) si subtiliter teratur adhæret villis stomachi, & hoc modo plus purgat. Porro verum hoc esse in universum, ac non solum de medicamentis præfatis, sed & de quibuslibet aliis valenter expurgantibus statui

a Cap. 282. *b* Cap. 303. *c* Cap. 201.

statui posse, non modo ex subtili eorum lævigatione vim suam per aluum purgandi non amittere, sed eo magis aut saltem violentius expurgatura quo tenuius trita fuerint, ratione ipsa convinci videtur. Quippequum ut facilius est impleri potu quam cibo, sic quanto tenuius lævigata aut etiam liquidiora fuerint medicamenta, tanto melius ac perfectius (ut loqui solent) actuentur, cæleriusque in corpus rapiantur, & latius sese diffundant, angustosque partium meatus penetrent: quas ita citius quidem ac vehementius afficiunt. Unde si hoc modo lævigata propinentur sola expurgantia maligna, magis quidem eorum vaporibus atque etiam aliqua tenuioris eorum substantiæ portione partes principes ferientur ac vellcabuntur: evenietque ut ex majori horum impetu & efficientia cumulatiùs succi alliciantur ac trahantur, majorque inde, aut si in aliquibus non major, violentior saltem ex nimia eorum commotione, consequatur purgatio. Unde non injuria suspectum esse debet quod Ioubertus in sua Pharmaceutica, communi Pharmacopolarum ac vulgarium medicorum errore ductus, scripsit, trituram crassiorẽ omnibus fere cathartice convenire, quippe-

quum

quum tardius meant vehementius agant. Atque sapientius ille quidem *a* lib. suorum paradoxorum dixerat, tenuiorem trituram multū conferre ad actionem medicamentorum tum faciliorem, tum evidentiore. Minus vero ferendum quod Ferdinandus *b* Mena dixit, quod quanto in majores partes effractum fuerit purgans medicamentum, tanto sælicius tractionem suam in ventriculum perficiet: dummodo nō præpediat quam vocant actuacionem. At verius quidem dixerat *c* Antonius musa, de Pharmacopœorum dubio prudenter statuens, an scammonium pillulis ingredi debeat in tenuissimum pulverem vel in crassum redactum: Quod si quis scammonium in pulverem redactum, & nulli cōpositioni mistum, sed vel ex vino vel jure infunderet, gravia forte symptomata pateretur. At cum in pillulas conformatur, multa commista habet, & in tota compositione non est amplius pulvis, sed crassius quoddam corpus. Et cum ventriculi calore eliquatur, in pulverē non educitur, sed in substantiam quandam liquidam. Atque ita doctissimus medicus *d* Ioannes Fernelius, asserere non dubitavit pillularum drachmam unam liquore

a Lib. 1. parad. 1. *b* In suis comment. in Gal lib. quos quibus & quando purg. oport. *c* In examine pil. sine unibus. Lib. 4. meth. cap. 14.

quore solutam non minus purgaturã quam duriorum duas & *a* Andernacus quidẽ suis scriptis cavet, ne scammonium ex jure aliquo, aut in catapotia redactum, cum jusculis præbeatur. Sic enim perniciem potius quam sanitatem ad ferre solet. Quod ille ex *b* Amato accepisse videtur, qui scammonium aut pillulas, juribus eliquatas, in potu exhiberi magnis obsecrationibus vetat. quippe quũ inde multis mors subsequatur. Idq; non modo experimento comprobare, sed & *c* Actuarii auctoritate confirmare nititur, qui in hunc modum scripserat: scammonium vero non censeo juribus inferendum, quod experientia compertum est, id cũ ipsis conciliari non posse. In quo tamen advertendũ videtur non esse Actuarii mentem scammonium in aliquo humore exceptum nunquã simpliciter propinandũ esse: cum ipse *d* antea ubi de scammonio seorsim egisset, ita scriberet: datur per se ex melle vel ptisanæ cremore, quibus clam volumus hanc potionem præbere; sed illud tantum voluisse, quod in juribus, quorum illic meminit, exceptum non assumeretur, quoniam cum illis minime conciliari comperisset. Attamen utcumq; explicetur Actuarius,

a Lib. de medic. vet. & nova. comm. 2. dial. 5. *b* In suis comm. in Diosc. lib. 4. cap. de scammonio. *c* Lib. de medic. compos. *d* Eodem libro.

rius, ex Fernelii quidem, & aliorum quos citavimus, sententia manifestum fit scammonium per se, liquore aliquo exceptum vel solutum, magis quidem aut saltem violentius purgaturum, quam in catapotiiis exhibitum. Id quod etiam unumquemque periculum facientem experientia ipsa comprobaturum cum præfatis auctoribus arbitramur. Quod vero de reliquis valenter expurgantibus sit idem sentiendum: ut ratione eadem convincitur, ita experimento quoque perinde ac in scammonio eventurum minime dubitamus. Quod si aliquis contra Fernelii & aliorum doctissimorum hominum sententiam contendat, medicamenta nulla, tenuius, lævigata magis expurgare quam crassiuscule trita, atque maligna illa medicamenta ex nimia eorum lævigatione facilius in ventriculo actuationem vocatam suscipientia, indeque celerius in corporis partes rapta & penitus earum meatus subeuntia, humores potius commovere quam vacuare etiam si contrarium in plerisque ipsa attestetur experientia, & in paucissimis illud quidem contingat: nihilominus id ipsum tanquam verum eis in omnibus etiam concedemus, utpote assertioni nostræ nihil officiens; dummodo nobis, id quod neutiquam in-

ficiari

ficiari poterunt, concedant, illa eadem medicamenta, quæ sua nimia ac violenta tractatione humores commoverunt & non vacuarunt, eos quidem per urinas nunquam vacuasse: atque in illa maxima humorum agitatione, ubicunque contigerit, multo minus quidem per vesicam quam per aluum successuram vacuationem. Sed ut eo unde digressus sum revertar, quamquam in aliquibus medicamentis magni momenti sit ad diversas facultates exercendas eorum tritura crassior aut tenuior: id tamen in omnibus non contingit. Quod vero dixit Galenus de diospolitici tritura agens, ejusmodi præcepti in omnium medicamentorum compositione meminisse, expedire: id quidem nihil nobis adversatur, ut nostri credunt Pharmacopœi. Si quidem non vult illic Galenus pro præcepto universali censeretur (ut ipsi inepte interpretantur) quod medicamenta quæcunque crassius trita aluum ducant, tenuius trita urinam moveant. Neque enim de diacalaminthæ medicamento, de quo tunc agebat, & cujus gratia diospolitici meminuit, aliquid tale protulit. Sed illud dumtaxat pro præcepto universali observari commendat, quod proxime præcedentibus verbis admonuerat, tenuius trita in-

totum corporis habitum maxime digeri :
 è diverso autem crassius trita, in ventre hæ-
 rere, ut quæ tenues venas ac corporis me-
 tus subire nequeant. Atque hinc fieri ut
 medicamentum diospoliticon crassius tri-
 tum deiciat aluum, minutissime vero læ-
 vigatum urinas moveat. Et similiter quæ-
 cunque medicamenta duplici sint faculta-
 te prædita, tum aluum solvente tum uri-
 nas ciente, si in subtilem pollinem redi-
 gantur, cum in ventriculo moram non fa-
 ciant, pervadentia corpus, per urinas, men-
 ses, aut sudores, potius quam per seces-
 sum, excrementa detrudant. Atque hic
 est verus Galeni in præfato loco sensus.
 Non quod ille tam absurdam unquam sen-
 tentiam somniaverit, quæcumque per
 aluum dejectoriam facultatem habeant, te-
 nujus contrita eam amittere ac diureticam
 acquirere. Quum potius in valide expur-
 gantibus medicamentis dejectoria eorum
 vis per tenuissimam trituram non modo
 non deperdatur, sed validior multo (ut
 abunde jam ostensum est) reddatur : ex
 reliquis vero expurgantibus paucissima ad-
 modum sint, in quibus hoc contingere
 possit. Adeo autem hujuscemodi faculta-
 tum transmutationem parvi pendit Gale-
 nus in expurgantibus omnibus medica-
 mentis,

mentis, ut vel in hiera ipsa ab Andromacho ad stomachicos composita, præcipiat
 & lib. 8. de comp. Pharm. fec. loc. omnia
 ex quibus componitur, nempe, junci odo-
 rati flores, xylabolsamum, mastichem,
 crocum, nardum indicam, asarum, cin-
 namomum, & aloem, ὀμῆ λεάνιας, id est,
 simul lævigata reponi: non contentus di-
 cere τρίψας, quod proprie significat trita,
 ut ἰβ λεάνιας tenuiter trita. Tametsi Cor-
 narius haud satis apte in hoc, ut nec in
 multis aliis hujus libri locis, trita tantum
 verterit. Ex quibus jam evidentissimè
 constat in expurgantibus medicamentis
 non tanti momenti esse illum trituræ sco-
 pum, quo novam aliquam facultatem me-
 dicamento acquiri proponitur, quam alio-
 rum, cujusque non sit major ratio habenda.
 Quod idem quoque de ea trituræ in-
 dicatione, quæ à parte affecta aut loco

D d 2

desu-

a Cap. 2. b λεάνια enim vel λειάνια, ut ἰβ
 λειών, correspondet verbo latino lauo seu lavigo.
 Quod ut proprie significat idem quod complano seu
 pulio, ita etiam designat idem quod tenuiter tero.
 Atque ita quando vocibus λεάνια vel λειάνια aut
 λειών exprimitur id quod designat molo aut tero,
 oportebit accipere eam nolituram aut trituram, te-
 nuem, qualem exprimit verbum lavigo. Ut voces illæ
 Græcæ id ipsum significent quod λειοτρίβειο, seu
 λειοτρίβειον.

defumitur, similiter intelligetur. Reliquum jam est ut de eo trituræ scopo agam, quo medicamenta melius commiscere studemus. Quod quidem reliquis omnibus scopis præferri debere, ac tenuissimam omnium trituram exposcere, sic ostendam. Compositorum medicamentorum triplex est genus. Unum, in quo, quæ à medicis fermentatio dicitur, spectatur, nimirum, mutua facultatum simplicium medicamentorum, compositum ingredientium, actio & passio à philosophis appellata, eo usque procedens, quoad alia tertia ex omnibus in ipso composito conficitur facultas. Cujusmodi medicamentum est vere mistum arte factum: qualia sunt antidota illa magna à veteribus composita: theriaca, Mytridatium, aurea Alexandria, & alia similia: sic & electaria dicta, & aliæ quæcunque compositiones, in quibus vel liquida tantum, vel liquida cum siccis arte ac caloris ope convenienter permiscentur. Alterum est eorum, quæ etsi ita commode misceri nequeant ut perfectam fermentationem, quam exigunt perfecte mixta, consequantur, arte tamen ita componuntur ut diutius servata, mixtionis rationem adumbrent, & quodammodo fermentationem aliquam recipiant:

quæ

quæ etsi non sit illa vera actio & passio facultatum medicamentorum simplicium, ipsum compositum constituentium, quæ ex iisdem, licet diversa potentibus, una tamen facultas confurgat, ut dixit *a* Mesues: nihilominus potentiorum medicamentorum vires, quadamtenus aliorum eis admistorum consortio ac concursione, perfringuntur. De qua fermentatione intelligebat *b* Fernelius, quum monuit pillularum misturam initio molliusculam esse debere, ut simplicium concursione, fermentatio proba fieret. Hujus etenim generis medicamenta sunt ea, quæ in officinis pillularum forma vel alia simili parantur. Tertium autem compositorum medicamentorum genus est eorum, in quibus nulla prorsus fermentatio spectatur: cujus generis sunt pulveres omnes ex rebus siccis constantes; citra ullam rei alicujus humidæ misturam. Quod itaque in compositis omnibus medicamentis, quæ vere mista sunt, ac exactam fermentationem suscipiunt, potissima sit habenda ratio hujus scopi, quo medicamenta melius commiscere intendimus, & quod ut exactius misceantur medicamenta, in exquisitum levorem trita esse oporteat, ex ipsa

D d 3 mistio-

a In suis cannon. universal. *b* Lib. 4. meth. cap. 5.

mistionis natura ac ratione constat. Potissimum enim in mistione propositum est, ut omnia simplicia quæ commiscantur, in unitatem coeant (ut inquit *a* Actuarius) quo maxime se invicem afficiant, & tandem ex mutua illorum actione & passione una in composito (ut dixi) facultas emergat. Et siquidem mistio nihil aliud (ut nos docuit *b* Aristoteles) quam mistilium alteratorum unio. Sed quo subtilius in lævissimum pulverem comminuta illa fuerint, cum partibus suis minimis se mutuo contingant, promptius & valentius id efficiant. Igitur nihil æque ejusmodi mistioni conducere valebit, atque ipsa siccorum simplicium in mollissimum pulverem lævigatio: nec contra aliud magis eidem obstabit, quam illorum crassior tritura. Atque ita dixerat *c* Galenus nihil per totum cum alio posse commisceri, nisi prius in partes exiguas fuerit comminutum. Quoniam vero ab omnibus receptum est, perfectam fermentationem electariis inesse, ac vere mista, per artem facta, dici illa posse: necessario jam consequitur, medicamenta sicca, illa ingredientia, quæ in pulverem

a Lib. de medic. compos. prope initium. *b* Lib. 1. de gener. & cor. cap. ultimo. *c* Lib. 12. de usu part. cap. 3.

verem redigere ipsorum mandant auctores, terenda cuncta esse lævissime. Id quod etiam testatur Nicolaus ille Alexandrinus vetustior, cujus personam induit apud Pharmacopœos Salernitanus Nicolaus, in proemio sui antidotarii ita scribens: pulveris autem cribratio duobus modis fieri debet. Nam in electariis subtilissime cribari debet: in aliis vero medicinis crassius, maxime in laxativis. Unde in hoc saltem culpa se excusare nostri Pharmacopœi nequeunt, quod contra sui Nicolai oraculum in electariis medicamenta, expurgantia crasso modo terant. Quod vero similiter sint subtiliter terendi pulveres in secundo compositorum genere, quæ licet vere mista dici nequeant, aliquam tamen fermentationem suscipiunt, ut pillulæ, si ejusmodi compositiones ingredientur expurgantia aliqua medicamenta ex malignis ac valide purgantibus, inde etiam evincitur, quod ex lævi trituratione, juxta ejus tertium scopum à Mese commendatum, malitia expurgantium haud parum subducitur ac aboletur. Deinde ut illorum malitia, aliorum sibi adjunctorum freno, compescatur: Necessarium omnino est, ut omnes eorum particulæ cum aliorum patticulis quam minutissime

fieri possit divisis, se invicem contingant (perinde ac dixi necessarium esse in vera mixtione) ut eorū malefica vis à benigniorum miscella ac cōsortio, comprimatur, & promptius in agendo ac patiēdo cuncta veluti fermententur. Quī enim quæso in scāmōnio vel turbit, quod in pillulis, post earum cōpositionis annū, majus milio aut sesamo reperitur, tale omnino quale servatur in pixide, correctio aliqua aut represso eorum malignæ facultatis sperari poterit. Quum ut hoc fieri possit, oporteat omnia sibi ad ipsorū malitiam cōpescendam cōmixta eo usq; permisceri ac confundi, dum ex mutua eorū qualitātū actione, substantiarum quædā sit æquabilitas & æquabilis omnium unitas. Verum enim vero quamquam expurgantia illa maligna, pillulas ingredientia, correctā antea fuissent, ut si scāmōnium in cytonio malo coctum prius esset: ne tunc quidē crassa illa tritura quæ inter pulverum terminos continetur, eis conveniret. Tantū abest, ut monstrosa illa, expurgantium medicamentorum contusio, à nostris Pharmacopœis in pillulis usitata ferri ullo modo possit. Quis enim ex eiusmodi tritura eam nō pertimescet in medicamentis purgandis anomaliam, quā Hippocrates & Galenus Cane pejus & Angue

(uti

(ut dicitur) vitandum semper docuerunt. Deinde nisi pillularum massa pro singulis dosibus conficiatur, quo ingenio aut arte consequi poterit, quin in una dosi plurimū, in alia vero parum aut nihil validi expurgantis ingrediatur. Quod quantum incommodum sit nemo non videt. Atq; idcirco medicamenta talia, si non tenuissime lævigata, saltem adeo tenuiter trita esse oportebit, ut æqualiter omnia cōmisceri possint, nec in una dosi plus reperiatur ex aliquo præfatorū, valide expurgantium, quam in alia. Ejusmodi autem trituram nō modo in scāmonio correcto, sed & in non correcto, ac aliis etiam valide expurgantibus concedimus, ne nimium morosi, nonnullis viris doctis hoc ita decernentibus, videamus. Quod si pillulæ aut alia quæcunq; secundi generis cōposita medicamenta, quæ ad expurgandū in forma solida solent exhiberi, ex benignioribus sint composita medicamentis, citra maligni alicujus medicamenti misturam: tunc quidem quæ inter ea adeo tenui ac superficiaria sint prædita substātia, ut ex nimia tritura eorum vires exolui ac dissipari posse timeamus, hac tantum ratione non esse subtiliter læviganda censere: non autem ea quæ vulgo dici solēt, ut ex majori in ventriculo mora foelicior succe-

dat purgatio. Quippe forma solida, qua exhibentur talia pharmaca vicem crassissimæ trituræ gerit; majorque ex hoc modo exhibitio medicamento, mora in stomacho sperari potest, quam si crasse tritum & jure aliquo exceptum in potu propinetur. Atque ita aperte constat nihil omnino in hujusmodi medicamentis compositis impedire tenuissimam trituram eorum quæ haud omnino superficiariam sortita sint substantiam: tenuem vero eorum, quorum substantia adeo lævissimam trituram non sustineat. Immo etiam vel in his maxime procurari debere, ut quantum eorum substantiæ natura permittat, tenuior sit triturata, ut melius quoad id fieri possit omnia simul misceantur, atque ita eam fermentationem consequi valeant, quam ipsius compositionis modus suscipere queat. Cui etiam adde Galeni auctoritatem, cui uni contra omnium aliter sententium turbam abunde satis ponderis esse debet. Is enim in

a Vi lib. 7. de comp. Phar. sec. lo. c. 5. in catapotio concoctorio ex libro Pergonæ ad tussim & destillationem, præcipiens res ejus compositionis siccas λεῖπας, i. laxatas excipere. & in catapotio alio ad omnem tussim & fluxionem & abscessus internos ex Apollonio, ubi sicca quoque λεῖπαι, quod similiter laxata significat, aqua excipere jubet. Quibus in locis, ut & in aliis multis Janus Cornar. λεῖπας & λεῖπαι minus quidem proprie (ut jam advertimus) vertit trata.

in suis de composit. Pharmacor. lib. ubi catapotiorum & similium compositionum meminit, sicca omnia, ex quibus componuntur, tenuiter lævigare mandat. At enim si medicamenta componenda, in pulverum forma servanda sint, quale esse dixi tertium compositorum medicamentorum genus: tunc omnia crassiuscule terenda existimarem, ubi ad ventriculi aut partium ei vicinarum curandos aliquos affectus, eadem exhibere opus fuerit: quoniam hoc modo trita, majorem in ventriculo moram facientia, foelicius ac plenius actiones suas absolvent: ut è diverso si affectus curandus fuerit in aliquo ex remotioribus à ventriculo membris, tenuius erunt juxta Galeni præceptum læviganda. Demum si ex valentioribus illis ac malignioribus catharticis aliquod solum per se in pulveres redactum propinare conveniat, crassius quidem tritum exhibendum censerem: nec modo id crasse tritum, sed in forma solidiori commodius multo exhibebitur. Ita enim & innocentius purgabit, & majorem moram in ventriculo faciens à remotioribus partibus succos expurgandos trahet. Nam quemadmodum composita medicamenta in pillularum aut alia solida forma exhibita, ob majorem quam fa-

ciunt in ventriculo, moram ex remotioribus corporis partibus succos trahent, quam si liquidiori alia forma sint assumpta: ita & eadē similiter ratione maligna expurgantia simplicia, quia quo crassius fuerint trita eo majorem in ventriculo morā contrahent, ipsius quidem moræ ratione è remotioribus partibus humores elicient. Quanquam alioqui non tanta copia eos trahent atque evacuabunt, quam si eadem tenuius contrita exhiberentur. Vt enim antea à me ostensum est, ejusmodi valenter expurgantia medicamenta efficacius quidem trahunt & evacuant, tenuiter comminuta, quam crassius tusa aut integra devorata. Nec vero alicui dissonum aut à ratione alienum videatur, quod hujusmodi medicamenta in solidiori forma vel crassiori trituratione exhibita, à remotioribus partibus, sed minus, trahant & evacuent humores, quam si liquidiori propinentur forma, vel tenuius lævigata: Quum fere idem in igne eveniat, qui panes quos moderatus existens in furno exacte tam interius quam exterius concoquit: nimium contra accensus, illos inflammans, exterius adurit, interius vero percoquit: & similiter carniū in veru externas quidem partes exurit, intimas autem crudas relinquit. Quoniam
itaque

itaq; medicamentum valenter expurgans, tenuiter tritum, atque in jure aliquo dilutū, melius ventriculi calore elaboratur, quam solidiori forma devoratum, & iccirco magis ad suas opere exprimendas facultates suscitatur ac promoveretur, & perfectius (ut dici solet) actuatur : suis quidem integris viribus potentius redditū, tanquam solutis habenis, tum substātia ejus tenui in corpus pervadente, tum vaporibus largius ex ventriculo transmissis, humores cunctos valenter ad ipsum ventriculum a intestina convehit, & partes circumvicinas vellicās humores quoscunq; obvios confertim deturbat, simulq; cum illis educitur, antequam ad remotiora permanere possit. Quippe quum liquidius existens, facilius à natura, ejus violentiam ac furorem averfata, succisq; ab eo attractis irritata, cum iisdem per alvum detrudatur. Atq; hoc sane modo & cum hisce à me præfinitis limitibus ac cautiunculis intelligendos credo omnes bonos auctores, quicunq; expurgantia Pharmaca, crasso modo trita, exhibenda scripserūt. Et Silvium, quum scammonium in catapotiiis esse crassius terendū præcipit, vel amice interpretandum, ut in multis aliis suis scriptis interpretari oportuit : vel ejus opinionem uti falsā, ac rationi & doctiorū auctoritatibus

bus repugnantem rejiciendam. Quæ tamen amice explicari poterit, si dicamus per crassius intelligere minus subtile, quam in reliquis compositionibus: vel si scammonium in ipsis catapotis esset in succo aliquo solvendum, ut fit in pillulis sine quibus & de fumaria: aut cum ipsum scammonium est incoquendum, uti sese interpretatus est ipse in iis quæ antea ex illo citavi. Quo etiã modo intelligit Ioubertus in sua Pharmac. in annotation. in elect. è succo rosar. Nico. ita inquit: porro crassiuscule tritum esse volunt scammonium. Quod admitto si fuerit coquendum, aut calidissimo syrupo permiscendum, quo dissolvatur exacte. Alias tenuissime pulverari debet, ut exactius permisceatur. Nec lævigatio exacta nocet, ubi coctionem ferre non debet. Qui enim scribunt hoc crasso modo teri debere, supponunt esse coquendum cytonio malo, vel aliter. Sed qui hanc opinionem tueri student, rursus mihi objicient, tum ex Mesue, tum ex aliorum doctissimorum medicorum sententia, non omnia medicamenta uniformiter terenda: sed quæ ex illis vim in substantia tenui ac superficiali sitam fortiuntur, crassiuscule & minus accurate terenda esse: ut flores & aromata, quorum nimis attenuatorum

vis facile disperditur ; quæ autem vim & facultatem in substantia crassa positam obtinent , tenuissime & in exquisitum lævorem terenda . Atque ex expurgantibus medicamentis nonnulla vim superficialiam habere , quæ magnam trituram minime ferant : ex quibus unum est scammonium , cuius præcipue causa quæstio hæc orta est . Nam de illo scribens *a* Mesues , ita ait : & ipsum de trituratione modicum sustinet , qua propter oportet ut in ejus contritione non nimium insistatur . Et de tritura in univ ersum agens , ita *b* scribit : sunt quædam quorum virtus cito tollitur : ut sunt debilis texturæ : & hujusmodi non multa indigent trituratione : sicut scammonia Antiochena bona , verum in grossa expedit ut plus in triturando insistas . Omnia enim quanto plus vel minus sunt grossa vel subtilia , tanto plus vel minus opera triturationis indigent . Similiter autem Avicenna multam scammonii trituram videtur damnare , ita *c* scribens : & ex medicinis sunt quædam quarum virtus propter contritionem destruitur , sicut scammonia . Quare oportet ut ultima facilitate

a Cap. proprio de scammonia. *b* In canonibus universalibus. capit. de tritura. *c* Lib. tritura 1. cap. 5.

cilitate conteratur, ne ex contritione caliditas eam consequatur, corrumpens ejus virtutem. Præterea, quum non modo juxta Mesuæ, sed & juxta Galeni præceptum, nobis quoque receptum, in illo de diospolitico exemplo, ea medicamenta quæ in corpus altius penetrare studeamus, in tenuissimum pollinem terere oporteat: contra vero negligentius, quæ moram in ventriculo aut ei vicinioribus partibus facere velimus: Atq; ex expurgantibus medicamentis quædam etiam sint quæ ex nimia lævigatione expurgandi facultatem, quam crassiuscule trita possidebant, amittant, aliamque novam per urinas movendi acquirant: ut in Rhabarbaro concessi: Quo nam pacto ego hic omnia tenuissime terenda esse cōtendo? Pro quibus objectionibus dissolvendis, animadvertendum est, quod alii etiam ante me tradidere, duos esse terendi medicamenta modos: alterum quo medicamenta aliqua valido pistilli ictu tundi oporteat, alia vero clementer friare conveniat ducto per mortarium molliter pistillo. Alterum, quo rursus alia medicamenta diutius, ut pote, trituram longam sustinentia: alia vero parum diu, ut pote eam brevem exigentia, teri oporteat. Animadvertendum etiam quod ex medicamentis

alia

alia sunt quæ ut in subtilissimū pulverem cōminui possint, tum valenter tum diutius teri exoptulant; alia contra, quæ nec longiorem, nec validam trituram sustinentia, parum diu ac clementer friare expediat, etiam si in tenuissimum pollinem redigenda forent. Alia quæ longiuiculam trituram sustinentia, validum tamen pistilli ictum non ferunt: & è diverso alia quæ pistilli ictum ferentia, longam tamen trituræ motam minime sustineant. Quamquam vero medicamenta ea quæ validā & longiorem trituram, aut alterutrum non sustinent, si contra trituræ suæ substantiæ cōgruentem nodum, citra ullam artis cautionem, mollissime lævigentur, quam plurimum ex substantia ipsorum tenui & suis viribus attrittant. Nihilominus falsissimū est quod nonnulli credunt aliquod posse dari medicamentum, quod neutiquam mollissime lævigari possit, quin contra substantiæ suæ exigentiam teratur: unde si ejusmodi medicamentum lævigetur in tenuissimū pulverem, necessario ejus tenuem substantiam difflari vel vires deperdi. Ita enim natura cōstitutū est, jugiter hæc inter se adeo consentire, ut nullum sit medicamentum quod validam ac longam triturā exposcat, quin ut in levissimum pulverem redigatur, eadem

dem valida ac longa tritura indigeat : & contra nullum ex his quæ nec validam nec longam trituram ferunt , quin clementi pistilli plaga, ac brevi trituræ mora, in lævissimum pulverem reddi possit. Quod ex ipsa rerum natura ac constitutione manifesto consequitur. Quæcunque enim validam ac longam trituram sustinent, eadem sua natura substantiam crassam, densam & duram, aut lentam, lignosam, nervosam, aut membranosam, lapidosam, aut metallicam fortiri necesse est. Hæc autem eadem rebus omnibus conveniunt fractu contumacibus, & quæ longam ac validam trituram exoptulant, ut tenuissime lævigari possint, quippe quæ vires suas validas in profundo sitas ac ægre solubiles obtineant. Similiter quæcunque neque longam, nec validam ferunt trituram, necessarium est substantia constare tenui, rara, friabilique, & quod vires imbecillas ac superficiarias obtineant : hæc autem eadem etiam conveniunt ac consentiunt cum iis quæ clementer tantum ac parum diu trita, facile in mollissimum pulverem lævigari queant. Porro id ipsum quoque ut ab omnibus receptum, ac ipsa rerum notione confirmatum asserit a Galenus, inquiens :
tenujum

a *Lib. de simpl. med. fac. cap. 11.*

tenujum esse partium ea dici quæ facile in tenues partes comminuuntur: solidarum, crassarumque partium, quæ contra: tum dura, viscosaque, ægre ac difficulter, aut non omnino, in tenues comminui posse: fragilia vero, & quæ citra viscositatem mollia sunt, prompte in tenues solvi. Neque vero inficior, medicamenta multa reperiri, quibus aliquantulum longiori aut minus clementi tritura, quam eorum substantiæ modus exigat, comminutis, facilius ac promptius eorum, vel substantia tenuis diffletur ac evolet, vel vis ac facultas exhaletur ac pereat, quam in aliis, eundem trituræ modum exposcentibus, contingere posset. Immo etiam esse quæ tametsi convenienti suæ ipsorum substantiæ modo lævigentur: tamen adeo tenui, exolubili ac facile inflammabili substantia sunt prædita, ut nisi maxima diligentia ac arte terantur, non parum ex illorum substantia ac viribus evanescat & resolvatur. His ita expositis, facillimum jam erit proposita argumenta diluere. Quod enim dicunt medicamenta nonnulla esse, quæ substantiam tenuem ac superficiariam tortita, crassiuscule & minus accurate teri conveniat, quoniam nimis attenuatorum vis facile ac prompte disperditur: partim quidem concedo,

cedo, ac partim nego. Cedo libenter, & assero etiam, verissimum esse quod multa sint tenui ac superficiali substantia prædita, quæ nec longam nec validam trituram sustineant; sed quod inde consequatur ea crassiuscule fore perpetuo terenda, quoniam eorum nimis attenuatorum vis facile disperditur, id vero nego. Sed quæ sunt substantia tenui prædita, per se sola exhibita aut in pulveribus cum aliis commista, crassiuscule aut minus accurate terenda censentur optime. At in compositionibus iis, in quibus, vel vera mistio contingit, vel aliqua fermentatio expectatur, subtilissime & omnia lævigari rationibus à me antea traditis omnino necessarium est. Neque timendum ne eorum nimis attenuatorum vis facile disperdatur, quoniam quantuncumq; tenui ac inflammabili substantia sint prædita, si juxta artis præcepta terantur, impossibile est ex eorum tenui tritura vires suas perdi. Quod Galeni præceptum universale sit observandū, quo in ventriculi aut ei vicinarum partium affectibus crassius, ut in remotiorum ab eo partium curatione, tenuius sint terenda
 medi-

a Præter nonnulla ex validis ex purgantibus, & potissimum scammonium, quæ in pillulis & aliis compositionibus in quibus vera mistio non contingit, minus subtiliter terenda conceditur.

medicamenta, ego quoque assero & commendo: neque aliquid ei contradico cum in electariis aut pillulis omnia lævissime teri præcipio. Pillularum enim massa, & electaria etiam ipsa, si ad solidam formam reducantur, ut in bolo devorētur, majorem moram in ventriculo faciunt, quamvis omnia simplicia, ex quibus composita fuerint, sint mollissime lævigata, quam quivis pulveres perse exhibiti. Quod autem de scāmonio expressis verbis scribit Mesues, de trituratione modicum sustinere: & ego de Rhabarbaro concedo, tenuissime lævigatum urinas movere, crassius vero tritumper ventrem expurgare. Hæc quidem tenuius cribrata nullum omnino negotium mihi faceissent. Si enim Mesues per verba illa à me citata sentire voluit scammonium nullo modo subtiliter lævigari posse, citra ejus virium dissolutionem ac jacturam: falsum id esse ex his quæ jam demonstravi apparet: atque jure optimo in eo à Manardo reprehenditur. Sin potius nihil ille tale intelligit, nisi tantum scammonium longam trituram non ferre (ut ipse se ipsum apertissime declarat, cum subdit: quare oportet ut in ejus contritione non nimium insistatur) vel quod confusionem quæ violenta manuum pulsione

ne fiat non sustineat (ut Ioannes Costæus & alii docti viri interpretantur) argumentum sane ipsum evanidum, non autem scammonium, relinquatur. Adde quod Mesues ipse hoc de scammonio Antiocheno & optimo dixerat, non autem de crasso ac deteriori, quale id omne est quod ad nos nunc affertur, de quo ita dixerat: verum in grossa scammonia, expedit ut plus in triturando insistas. Quod autem dixit Avicenna destrui virtutem scammonii propter contritionem: ex eius verbis statim subiectis constat, per contritionem intelligere validam illam in triturando pistilli plagam: quam cum scammonium non sustinet, friari illud clementer oportet. Et hoc est quod ille dixit: ut ultima facilitate conteratur, ne ex contritione caliditas illud consequatur. Quod vero de Rhabarbaro concedo crassiuscule tritum per ventrem evacuare, tenuius vero, urinas movere: hoc quidem non est facultatem quam habet amittere, ac aliam novam acquirere. Siquidem una ac eadem facultas eius est humores sibi cognatos expurgandi. Quos aut per alvum, aut per vesicam cum urinis juxta ejus trituræ modum pellit: Deinde cum urinas illud movere dicimus tenuiter lævigatum, intelligendum est, si illud solum aut

cum

cum aliis in pulverem redactum in potu præberetur: at in electariis cum aliis simplicibus medicamentis mutuo unitum, ac solidiori forma propinatum, cum in ventriculo moram faciat, perinde ac si per se crasse tritum exhiberetur, per alium magis quam per vesicam quocunque modo tritum evacuabit. Ut igitur me tandem recipiam, ac sententiam nostram in summam colligam, pro universali præcepto statuendum censeo, in omnibus medicamentis perfectam fermentationem recipientibus, perpetuo omnia trituram exigentia quam tenuissime læviganda: in reliquis vero, si ex eorum genere sint quæ fermentationem aliquam tamen non perfectam admittant, similiter omnia tenuissime terenda: præter ea quæ substantiam adeo tenuem ac exolubilem obtinuerint, ut tantam triturationem citra suarum vitium jacturam sustinere nequeant: hæc enim haud ita lævissime, nisi quantum eorum substantiæ natura permittat, erunt tenuiter terenda. Expurgantia quoque, horum compositionem ingredientia, poterunt similiter haud omnino exquisitè lævigari. Sin nulla omnino fermentatio in eis sperari possit, cujusmodi sunt pulveres: tunc habita ratione loci aut partis affectæ,

juxta

juxta Galeni præceptum, ad stomachi affectus crassius, ad alios vero eo tenuius quo longius ab stomacho distiterint, erunt ipsi pulveres terendi. Quanquam ubi in illis expurgantia aliqua fuerint, de quibus hic potissimum agitur, si benigna illa sint nihil omnino incōmodabis si juxta Galeni mentem etiam ad stomachi affectus tenuius terantur: nisi in quibus ob facultatem diureticam, quam simul cum solutiva obtinuerint, timeatur, ne humor per urinarum vias deducatur. Ut in Rhabarbaro. Hæc enim crassiuscule teri oportebit. Similiter si expurgantia ipsa maligna fuerint, ex quorum violentia, immodica expurgatio timeatur, crassius erunt terenda in pulvere, una tantum dosi exhibendo: In pulvere autem pluribus dosibus propinando, ea inter crassum & tenue mediocritate erunt terenda, ut æqualiter omnia misceri possint, neque plus ex eis in una dosi quam in alia reperiri possit. Neque aliquid ab hoc præcepto deterrere nos debet formido illa à Pharmacopolis jam diu concepta, quod ea quæ sunt tenui ac superficialia vel facile inflammabili substantia prædita medicamēta, subtilissime trita prompte dissidentur, & evanescant ac vim amittant. Quum id arte præveniri possit: dummodo eam Pharmaco-

copola, ut tenetur, exercere, ac sibi tradita præcepta omnia ad hujusmodi incommoda vitanda, observare studeat. Neque vero ad hoc tantum, sed ad ipsum trituræ opus peragendum, quamplurima extant præcepta. Qualia sunt in Rhabarbari tritura amygdalam aliquam aut cucurbitæ semen prius in mortario tundi: spicam, galangam, calamum aromaticum, cubebas, cassiam, schenanthum, asarum, dictamnium, scammonium, ut & aloëm, colocynthidem, euphorbium, turbith, elleborum, & esulam, ac alia multa tam tenuis quam mediocris & crassæ substantiæ, olei rosacei guttula una vel altera commodissime teri. Sic Ambram & moscum vel aqua rosacea solvi, vel cum aliis sibi adjunctis pulveribus friari. Et similiter camphoram vel liquore aliquo quod proposito magis usui sit solvi, vel cum pulveribus aliis quibus permisceri præcipitur comminui: ut & castoreum & spicam. Ne autem tenuior medicamenti substantia pistilli plaga aut motione è mortario evolet, ac in auras evanescat, aut saltem ut id quam minimum sit, omni arte procurabit Pharmacopœus. Quam sane artem diligentissime exactissimeque nobis Critonis nomine tradidit Galenus *lib. de*

antidotis. Sin vero in aliquo ex hujusmodi valenter expurgantibus medicamentis, in quibus maxime timetur ejusmodi difflatio ac exolutio, Pharmacopœlæ ars aut diligentia non fuerit tanta, quin aliqua substantiæ aut virium ipsius medicamenti jactura contingat: eam parvi faciendam censemus, præ usu atque emolumento quod mollissima tritura, exactæ medicamentorum mistioni, affert: nimirum ut mutuo ipsa uniantur, Quæ etiam ratione similiter Galeno parum curæ fuit, si ex tenuissima tritura medicamentorum, theriacam ingredientium, substantiæ eorum tenuis pars aliqua diffunderet. Adde quod in hisce, valenter expurgantibus, id quod diffluit ac exhalatur, dummodo perpauca sit (ut eveniet, nisi omnino iners ac negligens sit Pharmacopœus) quodam modo correctionis vicem habet, siquidem cum eadem eorum tenuioris substantiæ ac virium etiam aliquantula jactura, plurimum etiam ipsorum violentiæ ac effrenis facultatis infringitur: ut in scammonio, turbit, colocynthide, & similibus, tenuissima tritura sit eorum malignitatis veluti frenum & quædam castigatio. Atque si hoc malitiei medicamentorum frenum, aliquantula eorum substantiæ

tia ac virium jactura, non ferunt Pharmacopœi: cur scammonii castigationem recipiunt, quæ fit ex ejus in citonio coctura. Quum manifestissimum sit hoc modo correctum multo minus expurgare. Adde quod: quantulumcumque esset damnûm istud, levissimo tamen impendio, convenienti nimirum dosis medicamento ipsius additiuncula, refarciri posset. Quid enim quæso intererit, si ex massa pillularum, cujus justa idoneaque humori proposito expurgando quantitas esset drachma una, pōdere drachmæ unius & granorum quinque aut decem tibi exhibeatur? nonne multo plus ex cōpositorum dosibus, apud auctores præscriptis, imminuere hætenus medici omnes quicumq; eas Hispanorum Pharmacopolarum drachmis expēsas propinabant? quas iis quæ Romanis, Græcis, Latinisque omnibus, atque adeo Arabibus auctoribus usurpabantur, dimidio fere scriptulo leviores esse jam deprehendimus & convicimus. Ex quo fit ut quamquam ipsis medicamentorum dosibus nihil deinceps addatur ultra pondus id quod eis auctores præscripsere, si juxta vulgatis nostri marci pondera determinantur (ut determinanda ac ponderanda omnia esse medicamenta abunde ostendisse videmur) multo quidem

100 HISP. PHAR. RECOG. LIB. II.
majoris momenti erit quod in ejusmodi
ponderum variatione usurpatis hactenus
dosibus accrescet, quam quod ex scammo-
nii aut alicujus ejusmodi simplicis medica-
menti; exquisitissima lavigatione in medi-
camentorum compositorum viribus dete-
ri imminuique possit. Atque hæc de me-
dicamentorum expurgantium tritura dif-
ferenda censebam.





LIBER TERTIVS,

DE

MEDICAMENTORVM COMPOSITORVM

EXAMINE.

CAPVT I.

De Syruporum animadversione.



VVM nostri instituti non sit, ut jam præfati sumus, Pharmacopœjam hic integram tradere, nisi viam tantum ad eam substernere, errores quibus in hac Pharmacopœliorum recognitione irretitos esse Pharmacopœolas nostros comperimus, animadvertentes: Explofis duobus illis qui Pharmacopœos omnes non solum hujus civitatis, sed & universæ Hispaniæ male habebant: reliquum jam erit ut ad particula-

Ec 3 res,

res, & in singulis compositis in officinis nostris asservari solitis, commissos, descendamus. Neque vero omnes percurremus, satius esse judicantes in multis continuare, quam omnia ad vivum ressecantes simul cum zizania triticum eradicare. Neque, etiam consilium hic nostrum est compositiones ipsas in trutinam revocare, atq; earum descriptiones ita reformare, ut (quod in multis opus esse ducimus) interdum aliquid in eis immutare audeamus (quum tamen id maxime nobis in animo sit facere in nostra Pharmacopœja, nunquam satis laudantes Fernelii in hoc iudicium ac libertatem) sed ipsas singulorum medicamentorum descriptiones religiose tractantes, ubi dumtaxat libraviorum forte interpretumve culpa errata aliqua in eis deprehenderimus, ab aliis etiam annotata, à suorum auctorum mente minime, quoad fieri possit, deviantes, emendare conabimur: & quod in eis obscurum, vel à nostris Pharmacopœis sinistre intellectum videbitur, exponemus. Quæ per ipsorum classes aliorum more examinantes, à syrupis qui primo sese offerunt exordiemur. Illud vero de eis in universum animadversione maxime dignum censemus, quod in omnibus officinis, eos palato potius, quam morbo-

rum auxilio, paratos offendimus: idq; neque in scitia, neq; avaritia nostrorum Pharmacopœorum factum. Causantur enim omnes. Hispalésium ægrorum delicias, qui usque adeo sunt delicati, ut nisi syrupus visui & gustui sit gratus, & nihil præter saccharum depuratum referat, eum gustare nõ solum recusent, sed hac una ratione quod syrupus sapiat herbarum succos, aut aliquid aliud quo constet, damnent Pharmacopolam illum, & eo relicto alium quærât: eumq; magnis encomiis extollant qui gratiora paret medicamenta: nihil profus de eorum utilitate nisi de gustu tantum, curantes. Quanquam autem populus ipse tam insignium medicorum, quales hæc civitas alit, admonitionibus, brevi ut speramus, resipiscens, quæ vere laude digna fuerint laudabit: nihilominus nostros Pharmacopœos exhortamur ne deinceps tempus in populari aura captanda potius, quã in arte probe perdiscenda ac exercenda insumant: atque syropos omnes ex arte parantes, nihil eorum quæ in illorum descriptionibus cõtinentur prætermittant, siye insipidos, siye amaros, siye etiam horridos gustui futuros intelligãt. Quoniam vero serapia permulta, ut & complures aliæ cõpositorum medicamêtorum species ex decoctionibus pa-

rantur: nobis quidem primo propositum fuit de ipsis decoctionibus latius agere, multaque in eis animadvertere, quæ à nullo alio doceri existimabamus. Quorum præcipuum illud erat quod in multiplicatione aut diminutione singularum decoctionum nemo usquam quoniam pacto in eis servari deberet proportio, vere exponeret. Sed cum in libellum postea incidissem quendam Hispanica lingua à quodam Ludovico de Oviedo Matritensi Pharmacopœo, conscriptum: in quo vere quidem de ipsis proportionibus in decoctionibus observandis tradebatur: sententiam nostram de his latius differendi mutare, auctoremque illum, virum sane in sua arte satis peritum, nostris Pharmacopœis commendare, constituimus, ut juxta ejus præscripta omnes suas decoctiones parent. Utque manifeste intelligant veram esse proportionum in decoctionibus servandarum doctrinam, quam vir ille insequitur, ut nimirum in omni decoctione minori aut majori copia à Pharmacopœo quam à suo auctore paranda, ea jugiter liquoris quantitas sit injicienda, è qua æqualis inter coquendum absumat quantitas, ei, quam in sua decoctione consumi auctor præceperit, & præterea expetita juris decocti
 quan-

quantitas superfit: Nos id sequenti exemplo exponemus. Sit proposita aliqua decoctio ab aliquo auctore, in qua libræ duæ radicum in libris octo aquæ ad dimidias coquantur. Cujus tantum dimidium libeat conficere. Hoc Pharmacopœi omnes juxta suum vulgatum morem ita faciunt, ut libra una radicum in libris quatuor aquæ incoquatur ad dimidias. Atque hoc modo servatam esse credunt proportionem præfate integræ decoctionis ad ejus dimidium. In quo tamen non parum falluntur. Cum proportio illa quam ipsi servare credunt non modo non servetur, sed neque servari debeat. Qui enim dimidium alicujus propositi decocti conficere statuit, illud quidem in quantitate tantum, non autem in facultate, aut viribus dimidiatum esse vult: ita ut decoctum ipsum dimidiatum quod in libris duabus remansit, eadem omnino polleat facultate, quæ in libris totidem juris integri decocti continereur. Ut autem hoc contingat, necessarium est ut eodem igne tantundem temporis consumatur in dimidiata decoctione quantum in integra. Unde etiam consequetur tantundem aquæ consumi debere in dimidiata decoctione quantum in integra. Quoniam itaque in proposita hic integra.

decoctione libras quatuor aquæ consumptas esse dicimus, in ejus autem dimidio, duæ tantum juxta vulgatum Pharmacopolarum morem, consummuntur (incoquuntur enim libræ quatuor aquæ ad dimidias), manifestum jam est dimidiatam istam decoctionem minime æquali facultate pollere posse, qua proposita ipsa integra decoctio, nisi multo minori. Ex quibus evidentissimum fit, quod licet eadem proportio quæ fuerit integri decocti ad ejus partem, sit servanda in medicamentis ipsam integram coctionem subeuntibus, ad medicamenta quæ ejus partem ingrediuntur, id tamen in liquore, in quo ipsa medicamēta incoquuntur, minime servari posse. Ut in proposito exemplo: quum integræ decoctionis jus libris constet quatuor, ad quas redactæ sunt libræ octo aquæ in libris duabus radicum incoctæ: si ejus juris decocti dimidiū conficere velimus, nempe, libras duas, accipietur quidem dimidium radicum ex quibus integra decoctio cōstabat, & erit libra una radicū, cujus proportio ad libras duas quæ integram decoctionem ingrediuntur est eadem quæ librarum duarum dimidiati juris decocti, ad libras quatuor integri juris decocti. Ex aqua vero minime accipiendum erit dimidium librarum octo, ex quibus

inte-

integra decoctio cōfecta est, nisi libræ sex, ut consumptis libris quatuor (quot in integro decocto consumptæ esse dicuntur) relinquuntur libræ duæ pro dimidiato decocto quæsito. Quomodo in ipsa aqua servatur proportio arithmetica inter integrum decoctum & ejus partem. Siquidem eadem quantitate excedunt libræ octo (ex quibus conficitur integra decoctio) libras quatuor quæ supersunt in integro decocto : qua in ejus dimidio libræ sex excedunt libras duas quæ supersunt in dimidiato decocto. Quod vero proportio hæc arithmetica similiter sit in liquoribus aliarum omnium decoctionum servanda, quæ in majori quantitate à Pharmacopœo, quam à suis auctoribus parentur, eodem quo attulimus exemplo manifestum fiet : Si enim præfatam decoctionem libeat Pharmacopœo duplare, juxta vulgatum morè accipiet libras quatuor radicum & in libris sexdecim aquæ incoquet ad dimidas. Quomodo consumeretur in ea decoctione libræ octo aquæ : Quum in proposito simplici decocto quatuor tantum consumptæ essent. Quare licet proportio geometrica sit quidem octo (quantitatis aquæ simplici auctoris decocto injectæ) ad quatuor (quantitatem juris ipsius simplicis decocti) sicut sexdecim (quantita-

tis scilicet aquæ duplata decoctioni injectæ) ad octo (videlicet, quantitatem juris dupli decocti) cum facultas in utroque decocto maxime varietur ex multo majori mora coctionis duplata decocti quam simplicis: proportio quidem arithmetica erit hic potius quærenda, in qua aqua duplata decoctioni injicienda eadem duplata decoctione superesse debet, qua in proposita simplici decoctione aqua in ea injecta ipsius superabat jus, quod peracta ejus coctione remansit. Hoc autem fiet, si pro duplata decoctione accipiantur libræ duodecim aquæ. Ita enim consumptis ex eis libris quatuor, relinquentur octo. Quod erit duplum propositæ decoctionis. Atque in ea totidem libræ aquæ infumentur quot in ipso decocto simplici. Atque ita ex servata in eis proportione arithmetica, fiet ut eodem temporis spatio utraque conficiatur decoctio, cumque ambo in igne æquali fiant, necessario eadem & æquali omnino pollebunt facultate.

In Syrupum è succo citrii.

Syrupus ex acido citrii parandus erit juxta Mesuæ doctrinam in eum qui subsequitur modum : accipe *a* succi malorum citriorum acidi, libras duodecim. Coquantur in vase fictili vitreato igni prunarum lento ad tertiæ partis consumptionem : deinde residere sinatur dum clarescat. Tum id quod tenue est *b* sponte sua colo laneo transmittatur. Inde ejus succi clari libris septem affundatur sacchari albi expurgati & in julepum percocti libræ quinque. Et coquantur ad syrapi crassitudinem : aut si æstas fuerit, in sole dimittatur, donec ejus aquositas consumatur, quo incorruptus servari possit.

In Syrupum capillorum Veneris.

Cum variz syrapi adianti seu capilli veneris descriptiones in officinis reperiantur

a Succus is debet esse ex acida parte mali citrii probe maturi extractus, per linteam solum manibus, non autem torcularis ope expressus, ne lentus aut viscidus sed purus evadat. b Sine expressione.

periantur. Ex omnibus eam selegimus, quæ à Plateario mutuari solet, verum in eum qui sequitur modum correctam. Accipe capilli veneris recentis & modice contusi, libram unam. Cui affundantur aquæ calidæ, libræ tres. Et in eadem aqua maceretur horis duodecim. Quibus transactis, levissime coquatur dum semel ferveat. Deinde in jure expresso, atque adhuc calente, maceretur per totidem similiter horas alia quoque libra capilli veneris recentis & contusi: atque lento igne iterum semel ferveat. Et tandem juri, cum expressione colato, addantur sacchari albi libræ tres. Et percoquantur in syrupum.

In Syrupum de Papavere.

Syrupus de papavere Mesuæ non debet sparari juxta formulam quæ in ejus reperitur codicibus: in qua duplex notatur error, unus librariorum, à multis jam castigatus, qui sacchari & penidiorum ana uncias quatuor legunt, non autem ana drachmas quatuor, ut depravate in Mesuæ codicibus legebatur. Alter vero qui ipsius videtur esse auctoris, à nemine (quod sciamus) hætenus animadversus: imo quæ plerisque;
post

post illum sequutos deprehendimus: dimidium sacchari, & penidiorum pondus, aut etiam minus, papaveris decocto, immiscentes: Galeni auctoritate, cum Mesue fortassis deceptos, qui in suo a diacodio, mellis dimidiam mensuram, papaveris juri admiscendam præcipit. Quam quidem Galeni sententiam ipsos non esse assequutos cuilibet evidentissimum fiet, qui diversorum liquorum mensuras, cum eorundem ponderibus comparaverit. A multis enim doctis ac diligentibus viris certissimo experimento comprobatum est, vinum, aquã & alios similes liquores graviores esse oleo in sesquinona proportione, mel autem vino & reliquis similibus in proportione sesquialtera. Vnde si, juxta Galeni præscriptum, papaveris juri dimidia mellis mensura convenienter admisceatur, sane si papaveris decoctum libram unam cum dimidia ponderaverit, mel ei immiscendum, ut dimidiam decocti mensurã compleat, oportebit ponderare uncias tredecim cum dimidie: atq; si decocti pondus fuerit librarum duarum, mellis pondus libræ unius cum dimidia fore conveniet. Quoniam vero ad consistentiã decocto acquirendam parum admo-

a Lib. 7. de compos. medic. sec. lo. cap. 2. in consensione ex capitibus papaveris Galeni.

admodum interest inter mel & saccharum seu penidia, necessarium esse consequitur, papaveris decocto, si libras duas ponderaverit, uncias duodeviginti sacchari & penidiorum esse adjungendas. Atque ita Syrupus papaveris Mesuæ ex *a* Galeno in suo diacodio in hunc modum castigabitur: Recipe capitum papaveris albi & nigri semine turgentium *b* maturorum & nondum aridorum ana uncias septem & semissem. Contusa macerentur in libris quatuor aquæ pluvialis per diem naturalem, aut longiori etiam tempore, si duriora & sicciora fuerint. Deinde coquantur donec flaccescant, adeo ut eorum succus exprimi possit: quod fere fiet, si ad dimidias fuerint percocta. Et expressum jus cum sacchari albi clare facti & penidiorum ana unciis octo percoquatur in Syrupum.

In Syrupum è mentha.

SYrupum è mentha causantur Pharmascopei ob nimiam menthæ siccæ & rosarum copiam, aut succorum inopiam in
eius

a Locò ante citato ex lib. 7. de compos. medic. sec. 10. cap. 2. *b* Nimirum, in siccitate & humiditate medicriter se habentium. *c* Diutius autem coqui supervacuum censet Galenus.

ejus compositione à Mesue præscriptorum, rite parari non posse. Unde quidam succos augendos, alii vero mentham & rosas minuendas censent. At nos contra, ut alii etiam docti viri, nullis nec herbarum nec succorum quantitibus ex iis quæ in Mesuæ descriptione continentur immutatis, illum ex arte in eum qui sequitur modum parari posse ac debere censemus. Accipe succorum expurgatorum cydoniorum acido dulcium, cydoniorum dulcium, granatorum acido dulcium, granatorum acidorum, & granatorum dulcium, ana libram unam & dimidiam. In his succis permixtis & calentibus immittantur foliorum menthæ non nimium, sed mediocriter, siccæ, ruptorum aut contusorum, uncia novem. Et macerentur horis duodecim super cineres calidos, vel in loco alio tepido. Deinde igni admota in vase duplici leniter coquantur, ut semel tantum ferveant. Protinusque per telam lineam fortiter torquendo colentur. Atque in jure expresso adhuc calente macerentur rursus horis viginti quatuor foliorum menthæ, similiter mediocriter siccæ aut passæ, non autem atidæ, & modo prædicto confractorum, albæ uncia novem: foliorum rosarum rubrarum siccarum uncia

ciæ duæ. Post hæc, ut prius, eodem vase duplici prædicto coquantur lento igne ad medias. Colentur cum expressione. Expresso, adde sacchari rubri libras duas. Percoquantur in syrupum. Qui in fine aromatizetur cum drachmis duabus galliæ muschataë, stillatio rosarum liquore solutæ, & diligenter immistæ.

In Syrupum Absynthii.

PRiorem serapii de absynthio apud Mesuem descriptionem, quæ magis est in usu, nostris quoque officinis commendamus: hac tamen animadversione, ut in ea legendum est, absynthii libram semissem: quod & in antiquioribus Mesuæ codicibus legitur, & à plerisque omnibus recipitur: non autem libras duas, ut recentiores habent codices: & ut absynthium sit ponticum, quod vulgo dulce appellari solet, & non aliud: utque mellis loco substituatursaccharum rubrum: Quod in calidioribus regionibus, qualis hæc nostra est, magis convenit.

In Syrupum de tussilagine.

CUM syrupus de tussilagine nulli certo auctori adscribatur, & varie in officinis paratur: nos sequentem ejus descriptionem magis probamus: Accipe tussilaginis recentis manipulos sex. Capilli veneris manipulos duos. Hyssopi manipulum unum. Passularum uncias quatuor. Glycyrrhizæ uncias duas. Maccientur omnia in libris octo aquæ per horas viginti quatuor. Deinde coquantur dum ad quinque libras redeant. Colato juri addantur sacchari rubri libræ tres, mellis libræ duæ. Et fiat syrupus.

In Syrupos fumarizæ endiviæ & cycborizæ compositos.

IN compositis syrupis fumarizæ Mesuæ, intubi seu endiviæ Gentilis, è cycchoreo Nicolai, tantam varietatem ac confusio-nem comperimus, ut merito ab eorum usu deterreri medicus debeat. Quoniam vero institutum nostrum in hoc tractatu non est, novas aliquas medicamentorum descri-

descriptions afferre ; ei qui simplicibus serapiis, qui ex ipsarum herbarum succis fieri solent, contentus non sit, consulere-mus, ut ex omnibus præfatorum syrupo-rum quæ circumferuntur descriptionibus, eas deligat quas Ioannes Fernelius in sua methodo affert.

In Syrupum de quinque radicibus.

CUM syrupus ex quinque radicibus varie in officinis, incerto etiam au-ctore parari soleat: consultius nobis visum fuit, sequentem nostris officinis præscri-bere. Accipe corticem radicem apii hor-tensis, fœniculi, petroselini, rusei, & aspa-ragi ana uncias quatuor. Corticem radi-cum capparis & eryngii ana uncias duas. Seminum anisi, fœniculi, & petroselini, ana unciam semis. Coquantur secundum artem in libris decem aquæ, donec ad sex libras redigantur. Tunc demittantur ab igne donec tepuerit decoctum. Fiantur manibus, & colentur. Colaturæ addendæ sacchari rubri libræ quinque. Et fiet sy-rupus.

Prætermisimus autem acetum, quod alii adicere hic solent, quoniam mulieri-bus,

bus, pueris, & aliis etiam maxime ad-
fari solet. Et quod ubi aceto opus fuerit,
facillimum sit syrupi acetosi convenien-
tem portionem ei addere.

In Syrupum ex artemisia.

Laborantibus menses suppressione fæ-
minis, frequentius opitulari conveniet.
Id quod syrupo ex Artemisia plerumque
præstari solet. Qui tamen adeo varie &
confuse describitur, ut operæ precium nos
facturos existimemus, si illo prætermisso
hunc alium proponamus. Accipe arte-
misie manipulos duos. Corticum radi-
cum eringii, petroselini, helenii, valeriana-
e, asparagi, fœniculi, ana unciam cimi-
diam. Radicum rubie, pronie, cyperi,
ana quartam uncie. Pulegii, organi, ca-
laminthes, nepite, melissophylli, sabinæ,
sampsuchi, hyssopi, prassii, chamedrios,
chamepityos, pimpinellæ, hyperici, par-
thenii, betonicæ, centaureæ minoris, ana
manipulum unum. Baccarum juniperi, ca-
lami aromatici, seminis anisi, petroselini,
api hortensis, fœniculi, ocimi, dauci,
rutæ, nigellæ, ana drachmas tres. Contu-
sa maceretur horis viginti quatuor in aquæ
libris

libris decem. Coquatur ad dimidias. Tunc deponantur ab igne, donec aqua tepuerit. Fricentur manibus, & colentur. Colaturæ adde sacchari rubri libras quinque. Percoquantur in syrupum; qui aromatizetur cinnamomi uncia una, & spicæ drachmis tribus.

C A P V T I I.

De Electariorum ac Pillularum examine.

IN expurgantium compositorum recognitione, quorum auctores Scammonium in illis incoqui mandabant, non minorem nostrorum Pharmacopœorum errorem, circa Scammonii coctionem, quam circa ejusdem trituram offendimus. Nemo enim illorum est, qui scammonium in compositis medicamentis incoquere audeat, licet à suis auctoribus in eis coqui præcipiatur. Sed semper postremo loco illud admiscet in electariis, nonnulli postquam ab igne semota, tepida adhuc extiterint, plerique vero postquam omninò infrixerint. In quo sôcordia magis quam ratione abducti à suo imperatore Mesue discedere voluere: Silvii & aliorum doctorum viro-
rum auctoritate territi, qui eos erroris, quæ
scam-

scammonii coctio admittere nonnunquam solet, admonentes, in majorem nunquam illud incoquendi errorem induxere. Ita enim scripserat *a* Sylvius: Scammonium, si calorem sentit, in grumos coagulatur: quare fit ut interdum in una dosi alicujus medicamento plurimum sit scammonium, in alia minimum: sicque inæquale est medicamentum. Ob id ad finē injicitur. Iouberthus quoq; idem in sua *b* Pharmacopœja fensisse videtur: dum in compositione electarii è succo rotarum à Nicolao descripta ita adnotat: Scammonium in se facile coit & grumosum remanet: Atq; si dissolvatur, quiescens aliquot dies fundum petit & separatur. At enim si diligentius scripta horū ipsorum auctorum expendantur, reperientur illi quidem nihil minus quā scammonii cocturam damnare: tantumq; velle Pharmacopœos admonere, ne quid erroris in ejus coctione admittant: multa q; diligētia ac arte opus esse, ne in grumos vertatur. Quod enim Sylvius scammonii cocturam probet, ipse aperte testatur, dicens parum ante citata verba: Scammonium, si crudum est, crassius tritū, in media coctione miscēdum. Et alibi etiam inquit: Scammonium quoq; crassius teritur, si coquēdum est cum aliis.

a Lib. Pharmac. 2. *b* Classe 2. de cathartici.

aliis. At Ioubertus Scammonium in electario è succo rosarū Nicolai non incoquit : quia ipse Nicolaus illud illic non coquit. At in præfata in illum annotatione modum quo exacte illud illic permisceri debeat docet, statim post verba, superius à nobis citata, ita præcipiens : Ergo seorsim dissolvendum succo rosarum, cui bene permiscebitur. Deinde syrupum coctum ad electarii consistentiam illi seorsim affundere calidum oportet, & exacte misceri. Atque in illis ejusdem electarii annotationibus, de Scammonii tritura agens, illud crassiuscule teri concedit, ubi sit incoquendum. Sed in electario rosaceo Mesuæ, ut & in electario è psyllio illud cum Mesue incoquit. Et in suis annotationibus in electario rosaceo Mesuæ, ubi in ejus descriptione jubet Mesues illum cum aliis incoqui, sic inquit : Ergo Scammonium sustinet æqualem aliis decoctionem. An non vult simul coquendum, tamen omnia ? & certe Scammonium melius sic corrigitur. Neque verum est non pati illud coctionem : quum ea ratione præparetur intra cytonium : Et Mesues capite de Scammonio, id varie coquendo præparet, & reddat innoxium. Sed quid opus est alios ipsi Pharmacopœis auctores,

res quam ipsum Mesuem eis oboculos ponere. Is enim ut recte advertit Ioubertus, omnes fere Scammonii noxas ejus coctione emendare docet, capite proprio Scammonii scribens: & dico quod decoctio est generalis præparatio ejus, auferens plura ex ejus nocumentis. Quin quod ipse expressis verbis illud incoquere præcipit in ipsis compositionibus: ut in suo electario rosaceo, & electario è pŷllio. Quemadmodum autem in ipsius Scammonii tritura ostendimus, posse in lævissimum pollinem redigi, & nihilominus integris suis viribus permanere: ita & in ejus coctione cuncta ea incommoda, quæ præfati auctores advertunt, arte præcaveri poterunt. Atque hanc artem æquius multo fuerit Pharmacopœos ediscere & exercere (ut Scammonium in omnibus compositionibus, in quibus earum auctores illud coqui mandant, incoquant) quam incommoda quæ ob suam negligētiam artisq; ignorationem in ejus coctura accidunt, causari, quominus aucterum præscripta observentur. Poterit autem non multo sane negotio id consequi, si Scammonium incoquendum optimū semper eligatur, idq; a minus

F f . acurate

a *Alioquin enim subtilius lavigari oportebit, si optimum non fuerit.*

acurate tritum primo in parte sufficiente decocti aut succi in quo incoquendum est, antequam mel aut saccharum ei injiciatur, exacte dissolvatur, tepido existenti ipso jure aut etiam frigido. Deinde reliquum decoctum aut succum, ex saccharo aut melle, ad syrupi mediocrem consistentiam percoctum, calidum sensim affundatur ipsi Scammonio, dissoluto in suo vase: probeque exagitetur, ut Scammonium ipsum per totum jus aut syrupum exacte commisceatur. Posteaque igni lento redditum, spatula jugiter agitatum, leniter, quantum opus fuerit decoquatur. Quippe intensum ac vehementem ignem non sustinet. Et hoc est, quod dixerat Mesues: & oportet ut fiat ejus decoctio cum facilitate. Impetuositas enim in decoctione aditei malitiam. Atque ita ostensum satis relinquitur Scammonium recte ac ex arte coqui posse.

In Electarium Catholicum.

TAM varia est electarii Catholici apud Pharmacopœorum scripteres descriptio, & in officinis compositio, ut quam nos magis probamus hic referre cogamur: nempe

nempe quam plerique ex Salernitanorum Nicolao eligunt, sed meliori ordine concinnatam. Accipe polypodii modice recentis uncias tres. Seminum anisi unciam unam. Confracta ut decet coquantur in libris quinque aquæ, primo polypodium, postea anisa (ut ex arte fieri solet) dum ad duas redeant. Colentur, & exprimentur. Expressi maxima pars, additis sacchari clarificati libris duabus, percoquatur moderato igne ad syrapi crassitudinem. Cui ab igne substracto adjiciantur pulpæ casiæ, pulpæ tamarindorum, minima reliqui colati parte solutorum & color excretorum, ana uncia duæ. Quæ probe permixta rursus coquantur levissime igne lento. Dum syrupus spissitudinem, quam prius habebat, nanciscatur. Quam ubi attigerit, ab igne exempto, & ad teporem perducto, insperge sequentia: a foliorum senæ mundatorum & tenuissime tritorum uncias duas, Rhabarbari electi, polypodii, & florum violarum siccarum, ana unciam unam. Glycyrrhizæ rasæ, penidiarum, sacchari candi, ana drachmam

F f 2 unam.

a Et hoc in omnibus aliis compositionibus observandum ducimus, ut semper pro folliculis senæ folia ejus substituamur in nostris officinis: quoniam qui ad eas perveniunt valde exsiccati & carie consumpti sere sunt omnes.

unam, quatuor seminum frigidorum maiorum & à cortice mundatorum; ana & drachmam semissem. Quatuor feminibus cultro incisus, & per cribum transmissis, vel cum penidiis exacte subactis, & lævigatis; reliquis autem in tenuem pulverem redactis: misceantur omnia probe lignea rudicula, ab initio ad finem usque agitando, dum ubique substantiarum quædam sit æquabilitas. Cavebitur autem semper, tum in hoc, tum in cæteris omnibus electariis, ferri, aut æris, consimilive noxii metalli usus.

In Electarium è prunis.

COMPOSITIONEM hanc primus descripsit *b* Nicolaus Alexandrinus vetustior, à quo reliqui mutuarunt. Sed in codice Lati-

a Legimus in integra hujus electarii descriptione, ut legerunt Salernitani: quatuor seminum frigidorum unciam unam: quoniam hæc lectio magis congruit cum descriptione electarii catholici Nicolai Alexandrini vetustioris: non autem ana unciam unam, ut habet Nicolaus Præpositus & alii eum sequenti. *b* Cap. 227.

Latino Alexandrini vetustioris in priori violarum dosi mendose legitur drachma una, pro eo quod inferius in eadem violarum dosi legitur uncia semis. Et in utraque legendum esse unciam dimidiam constat ex *a* Nicolao Myrepfico. Quem etiam sequitur Nicolaus præpositus. Quorum lectionem magis probamus, quam Salernitanorum, qui in suo Nicolao habent, violarum unciam unam & semissem. Pruna vero nostris Pharmacopolis damascena cum primis eligenda commendamus: veluti à præfatis auctoribus præceptum est, cum eadem apud nos reperiantur: aut saltem horum loco ea substituunt, quæ vulgo appellantur *b* Caragoçana. Quod vero per viridia intelligenda sint recentia optime matura, manifestius jam est Pharmacopolis, quam ut admonitione sit opus. Siquidem *c* viridia dicuntur, ut excludantur sicca tantum, non autem matura.

a *Señ. 1. antid. 88.*

b *Alias, Caragoci.*

c *Parinde ac in electario è psyllis, dicit Mes. violu virides, pro recentibus.*

In Confectionem Hamech.

Confectio medicaminis Hamech, quam priori loco proponit Mesues, etsi receptissima sit in plerisque omnibus officinis: si propositum nobis esset hoc in opere liberum iudicium de medicamentorum compositionibus ferre, ex nostris officinis exterminaretur: utpote paratu difficilis, & citra ullam artem concinnata. Difficultatem ostendunt tot parandi modi, quot apud nostros Pharmacopolas reperimus. Vix enim à duobus eodem modo eam audivimus parati. Quod autem in medicina dixerat Hippocrates esse difficile iudicium, exposuit Galenus ex variis in ea sectis intelligi. Atechnia vero, qua compositio hæc à viris doctis notatur, est multiplex. Nam præter impeditam, tot simplicium, in sero, per quinque dies macerationem multis obnoxiam periculis: simul in eo, & infunduntur, & postea concoquuntur medicamenta multa, quorum alia crassa, alia vero tenui prædita substantia, varia infusionis tempo-
ra

ra & varios coctionis modos exposcunt. Quibus adde quod ut pruna numero 60. & uncia fere triginta duæ aliorum simplicium, macerari possint diebus quinque, & deinde unicam recipere ebullitionem: oportebit eis, præter libram unam succi fumaris, quam in ea infusione jubet Mesues immittere, seri libras undecim aut etiam amplius affunderet: ut nos certissimo experimento comprobavimus. Quidquid alii à Pharmacopolis, quos ea de re consulere, delusi, nullo specimine dato, seri minus ad hanc infusionem sat esse affirmant. Ut si semel tantum ebullire ipsa infusio deberet, veluti præcipit Mesues, oporteret plus quam septem libras ipsius decocti superesse. At enim hanc decoctionem mandat Mesues, additis ei casia tamarindis & manna, cum libra tantum una & dimidia sacchari, ad mellis consistentiam percoquere. Quam quidem antequam obtineat, quis quæso non intelliget vires, tam infusionis, quam casis, mannae, & tamarindorum, evanidas prorsus fore.

Quoniam vero in officinis nihilominus nostris usitatissima hæc est confectio: modum quo saltem minus inconcinne, & juxta auctoris mentem, parari possit, pro-

ponemus: *a* Accipe corticum Myrobalanorum citrearum uncias quatuor: cepularum, & indarum seu nigrarum, epithymi, ana uncias duas: agarici, pulpæ interioris colocynthidis, radicum polypodii quercini recentis, ana uncias duas drachmas duas: Rhabbarbari, comarum absynthii (Pontici scilicet) thymi, foliorum fenæ, ana unciam unam: florum violarum recentium unciã unam drachmas septem: feminum anisi, fœniculi, rosarum rubrarum, ana drachmas sex. Pruna sicca dulcia

a Quamquam integram nos hic auctoris descriptionem adduximus, consultius tamen censemus ejus dimidium tantum singulis vicibus conficere. Ita enim omnium medicamentorum macerandorum dimidio sat essent feri libra quinque cum dimidia, & fumaris libra semis. Quibus percoltis dum decoctum ipsum ad libras duas cum doctante redeat, minus multo ex eo consumeretur quam in integra descriptione fieri oportet, in qua libra sex cum dimidia insumuntur: cum hic libra tres tantum cum quadrate consumantur. Atque ita magis ex arte factum decoctum efficiatur quidem & potentius redderetur. Quumque in integra descriptione necessarium sit contra ipsam artem ex ipsa decoctione plus justo insumere, ne major ejus quantitas superesset quam que syrupo conficiendo sufficeret: in ejus quidem dimidio si humoris in decoctione consumpti quantitas dimidia tantum fuerit ejus que in integra decoctione consumitur precipitur, decocti jus reliquum & validius erit, & serapis conficiendo sufficeret. Neque vero servari hic oportet proportio illa arithmetica quam in aliis ex arte factis decoctionibus observari volumus. Quippe quum in integra descriptione decoctio ipsa sit contra artem instituta.

cia enucleataque numero sexaginta. Uvarum passarum detractis acinis uncias sex. Colocynthis & alia quæ incidi possunt minutim forcipe incisa, reliqua vero contusa, omnia macerentur simul in libris *a* undecim feri caprini (à quo etiam recocta fuerit detrata) & succi fumarie depurati libra una, in vase vitreato *b* oblongo & angusti oris, bene obturato, per dies quinque, quotidie agitata, & igni aliquantulum *c* calfacta in duplici vase. Exactis quinque diebus igni lento ferveant, dum ad quinque libras cum dimidia redeant. Fricentur, & valide exprimendo colentur. In colaturæ *d* minima portione, dissolvantur Scammonii uncia una & dimidia: mannæ uncia duæ: pulpæ cassiæ uncia quatuor: pulpæ tamarindorum uncia quinque: singula seorsim. Reliquo vero colato juri adde sacchari clarificati

E e 5 uncias

a Vel non plus quam duodecim. *b* Ita enim praefinita feri copia rebus infusis sufficiet. *c* Ex Galen. lib. 7. de com. medic. sœ. lo. cap. 4. ubi præcipit macerari psyllium in aqua calida coniectum, colligunt nonnulli, in omnibus infusionibus observandum ut perpetuo fiant in liquore calido. At enim tepidum saltem debere esse liquorem in quo medicamenta fuerint maceranda, vel tepido loco asservandam, aut etiam interdum insolandum, rationi consonum videtur, ut blandi caloris beneficio adjunctum medicamentorum vim promptius exorbeat, *d* Uncia octo saponum-jas eruat est.

uncias viginti duas. Et percoque ad mellis crassitudinem. Quam ubi obtinuerit, ab igne amoveatur. Et calidum sensim admisceatur Scammonio dissoluto in suo vase, subinde agitando quousque exacte omnia permisceantur. Deinde igni lento tamdiu exagitando bulliant, donec decoctum ipsum priorem quam obtinebat consistentiam, aut etiam paulo crassiores, nanciscatur. Mox ei prius servatam mannam, paucos expressi decocti solutam, adijunge: cum qua rursus in ipso moderato igne leniter coquatur quousque ad ipsam mellis compagem redeat. Et postea cremor cassiæ & tamarindorum, prius quam paucissimo præfati decocti extractus & seorsim servatus, addatur. Cum quibus similiter percoquetur ad præfatam usque mellis spissitudinem. Et tandem semoto ab igne, & tepido existenti, inspergè sequentia in tenuem pulverem redacta: Rhabbarbari unciam unam, drachmas tres: myrobalanorum citrearum, cepularum, indarum, ana unciam dimidiam: Belericarum, emblicarum, seminum fumaris, ana drachmas tres: anisi, spicæ nardi, ana drachmas duas. Permisceantur omnia probe, lignea rudicula continenter agitando.

In Electarium Diaphænicum.

Descriptionem Diaphænici quam affert Mesues, cum sequentibus animadversionibus probamus. Primo ut dactili sumantur ex maturis solidiores & recentiores: qui ex Africa convehi solent: quidquid alii viri docti Mesuem græcisare cogentes, interpretentur vocem cheyron fulvum, ac si esset vox græca *χιγγου*. Cum potius per cheyron, regionem seu oppidum intelligendum sit: ex quo dactilos, ut & tamarindos optimos, censebat Mesues advehi. Nam quod per dactilos cheyron, non possit ipse intelligere fulvos, quales sunt immaturi, constat ex eodem Mesue in elegmate de pinis, in quo accipiendos esse dactilos cheyron docet. Cum enim elegma hoc testetur ipse conferre ad tussim antiquam, & sputum glutinosum, & asthma, manifestum est minime ei convenire dactilos immaturos. Secundo quod, tamen si parum intersit dactilos ipsos ponderare ante vel post macerationem, si ex arte utrumque fiat, & dactili pingues, ut oportet, & non exsiccati & carie confecti, assumentur: Nihilominus cum Mesues ipse,

cujus descriptionem sequimur, expressis verbis videatur præcipere post macerationem esse ponderandos: fatius esse ducimus cum sequi. Postremo cum varii varie mellis quantitatem in hoc electario determinent: quod eam Mesues hic non præfinit; nos eis potius subscribemus, qui nec dactylorum nec amygdalarum causa, quæ hoc electarium ingrediuntur, mellis pondus in eo augendum minuendumve censent: penidia autem mellis vicem supplere ajunt. Quoniam itaque reliqua, quæ hic pulverum nomine ingrediuntur pendent drachmas septuaginta duas, quæ uncias novem constituunt: hæ autem pro convenienti electarii consistentia libras tres mellis exigunt: si ex libris tribus subducantur uncia sex & drachmæ duæ, quod est pondus penidiorum hic ingredientium, relinquentur uncia novem & viginti, cum tribus uncia quadrantibus. Unde mellis quantitas quæ huic electario injicienda venit, erit librarum duarum cum dimidia fere. Erit itaque hujus electarii descriptio talis: Accipe carnis dactylorum *a* optimorum, maturorum, *b* mundatorum, contuso-

a Quales sunt molles humidæ & pingues, & minime inveteratæ. *b* A membranis, pelliculis, ac fibris expurgatorum.

tusotum, ac in *a* aceto per triduum mace-
 ratorum, & tandem cribro ex cretorum^a,
 uncias duodecim cum dimidia. Penidio-
 rum hordeatorum recentium uncias sex,
 drachmas duas. Amygdalarum dulcium,
 tuniculis cultro detractis, uncias tres drach-
 mas sex. Contusis, subactis, & permistis
 omnibus, adde mellis optimi despumati
 libras duas & semissem. *b* Paulum co-
 quantur. Ac deinde refrigerenti medica-
 mento insperge sequentia probe lævigata:
 turbit optimi uncias quatuor, drachmas
 tres: Scammonii unciam unam & semis-
 sem: zinziberis, piperis longi, foliorum
 Rutæ siccorum, cinnamomi (hoc est can-
 nelæ optimæ) macis, ligni aloës, seminum
 anisi, foeniculi, Dauci, *c* galangæ, ana-
 drachmas duas & semissem. Permiscen-
 tur omnia probe, lignea spatula continue
 & diligenter commovendo.

In Electarium ex Psyllio.

Multi, quos minime damnamus, hoc
 electarium componunt ex descri-
 ptione Montagnanæ. Quoniam vero apud
 nostra-

a Optimo, non acerrimo. *b* Tandem, nimirum,
 dum acetum in dactylorum pulpa imbibitur. absue-
 ritus, *c* Minoris scilicet.

nostrates Pharmacopœos descriptio Mesuæ in usu est, de ea hic tantum agemus. Ac primum quod hic animadvertendum ducimus, est circa Scammonium, quod quamquam à Mesue hic præscribatur in pomo coctum, nos tamen id potius crudum cum aliis viris doctis subrogandum censemus, quod illud incoquendum hic cum aliis præcipiat auctor. Deinde quod semina pŷyllii integra & nullo modo fracta maceranda hic sunt. Quod vero nonnulli dubitant de Rhabarbaro, utrum illud, vel potius trochisci ex Rhabarbaro, sint in hac compositione à Mesue collocati. Nos minime dubitamus, eum trochiscos de Rhabarbaro intelligere. At magis dubitamus quid pro spodio, & berberi in eorum trochiscis, qui hanc etiam compositionem subeunt, sit substituendum, cum eis careamus. In qua tamen dubitatione eis magis assentimur, qui spodii loco in omnibus compositionibus, ore assumendis, rosas commendant, in medicamentis vero exterius admovendis (si ab Arabibus vel eorum sectatoribus fuerint præscripta) ebur adustum substituunt : pro berberi autem non oxyacanthæ, vulgo dictæ, è spino demajuelo, nisi potius fruticis crispini vocati fructum.

fructum & accipiunt. Demum licet in Me-
suzæ codicibus legatur asari uncias quatuor:
nos cum Brasavola ac aliis legendum po-
tius credimus, drachmas quatuor.

In Electarium de succo rosarum.

Electarii de succo rosarum in officinis
usitati sub nomine Nicolai, legitimus
auctor est *b* Nicolaus Alexandrinus vetu-
stior. A quo reliqui Nicolai illud tran-
scripsere. Cujus parandi modum, quem
affert Joubertus in sua Pharmacopœja,
quod is nobis artem præ cæteris observare
videatur, hic subjicere non pigebit. Quam-
quam in pondere Scammonii, in quo à
Nicolao recedere voluit, ei astipulandum
minime censemus. Accipe succi rosarum
rubeorum ex arte depurati libram unam
uncias quatuor. In cujus parva portione
dissolvatur seorsim *c* Scammonii optimi
uncia una & semis. Reliquus autem suc-
cus, cum sachari albi libra una & unciis
quatuor, coquatur lento igne ad consisten-
tiam electarii crassioris. Tuncque ab igne
remo-

a Quem Dodonæus credit esse oxyacantham Galeni,
differentem ab oxyacantha Dioscoridis, & oxyacan-
thæ ipsius Gal. *b* Cap. 309. *c* Vel Scammonii
preparatis, nempe, per se collis.

femotum & calidum adhuc existens, sensim Scammonio seorsim in suo vase dissoluto immittatur: ac subinde agitentur quousque exacte permisceantur. Sub finem vero, tepido jam existenti insperge sequentia in tenuem pulverem redacta: trium sandalorum ana drachmas sex, rosarum rubrarum (loco Spodii) drachmas sex, caphuræ scrupulum semis. Et commisceantur omnia probe.

Caphuram in hoc electario, ut & in omnibus aliis medicamentis ore assumendis, non omnino rejiciendam censemus: ut nonnulli viri docti volunt, nos vera caphura carere putantes. Quod si ita esset, libenter illis subscriberemus. Sed cum ipsissima Arabum caphura ad nos ex India asportetur, non est quod contra auctorum, quos sequi profitemur, mentem, eam in suis descriptionibus omittamus: eam (inquam) quæ ab India affertur, rudis & igne non experta, nec sublimata. Quoniam vero caphuræ odor infestus maxime aliquibus esse solet, ingratasque reddit confectiones, aliorum odoratorum in eis suaveolentiam enervans, dosim ejus in medicamentis ore assumendis minuere non recusavimus cum nonnullis viris doctis. Sed ita ut in electariis dimidium, in pul-

veribus vero quartam partem dosis ejus in auctorum descriptionibus repertæ retineamus.

In Benediētam.

QUAMVIS nomine auspicato videatur electarium hoc sese cōmendare : Nos tamen de ejus bonō omine maxime dubitare cogunt tum formularū ejus apud auctores varietas, tum etiam simplicium hic ingredientium difficultas & adulteratio. Varietatem à prioribus ejus auctorebus exorsam testari videtur Nicolaus Myrepsa quatuor ejus descriptiones ^a afferens : à quibus Salernitani suam in suo Nicolao colligentes, aliam etiam variā adducunt. Quam novissimus Nicolaus Præpositus mutuatus, nihilominus in esula ab eis dissentit, ab hoc electario illā rejiciens : & pro eo quod Salernitani habent, se. lini spermatis, petroselini : inquit: Selini spermatis. Difficultatem & adulterium in simplicibus arguant dissidia atque lites inter juniores quod sit verum turbith, quæ vera

^a *Sect. 1. antid. 447. 507. 508. & 509.*

ra a esula, an veris hermodactylis careamus: ut interim amomum & cardamomum omittamus, quoniam etiam si vera desiderentur, non multum referat eorum antibalomenis uti. Quibus de causis nihil mirum est, cur etiam juniores Pharmacopœarum scriptores adeo inter se in hoc medicamento variant, ut vix unus cum alio consentire videatur: aliis Salernitanorum, aliis Præpositi descriptionem secutis: aliis vero neutra descriptione contentis, pro suo arbitrio simplicia quædam immutantibus, & circa doses etiam variantibus. Sed ex omnibus quas ipsi afferunt hujus electarii formulis, eam nostris Pharmacopœis magis commendandam censeamus, quam avertit Joannes Fernelius libro suæ methodi septimo. In qua ille esulam, perinde ac Præpositus & plerique etiam doctiorum auctorum, rejicit. Quos nos etiam imitari vel ea ratione oporteret, quod quæ in communi usu est nostratarum officinarum, nihil aliud sit, quam tithymalli characiæ radix. Ex reliquis vero simplicibus aliqua omisit, alia eorum loco substituens.

a Recte Mattheus opinatur Arabum Alsebram seu Scebram minus, esse qua officinæ dicitur Esula minor, & à Diosc. dicitur Tithymalus cyparissus: Alsebram vero majus, esse plantam à Græcâ dictam ptyusam.

stituens. Quibus pro sua singulari prudentia & integerrimo iudicio, cōmodius reddit medicamentum, ut ore etiam tuto assumi possit. Ejus autem formula talis est. Recipe turbith drachmas decem. Diacridii, hermodactilorum, *a* rosarum rubeatum drachmas quinque. Caryophylorum, zinziberis, radicum saxifragæ, seminis apii, salis gemmei *b* galangæ, macis, çarui, fœniculi, acinorum asparagi, & rusci, seminis milii solis, quatuor feminum frigidorum majorum, glycyrrhizæ, ana drachmam unam. Mellis optimi despumati libram unam & semis. Conficiantur ex arte.

In Hieram Logadii.

Hiera logadii in officinis usitata desumpta est à *c* Nicolao Alexandrino vetustiori. Cujus compositionis decimam partem transcribere Salernitani in suo ficto Nicolao. Idque, ob arithmeticæ imperitiæ non minus depravate quam in multis aliis compositionibus, quarum descriptiones non integras quidem, sed aliquotam earum partem decerpere eis libuit.

a Exunguum. b Minori scilicet. c Cap. 110.

buit. Errata autem, quæ in descriptione hac deprehendimus sunt: primum in dosi euphorbii, polii, & coccognidii; ubi pro decima parte drachmarum septemdecim, quæ in Nicolao Alexandrino reperiuntur, habent ipsi drachmam unam & semis grana sex: cum, numerando juxta eorum supputationem, pro singulis drachmis grana sexaginta, deberent dicere, drachmam unam & semis grana duodecim. Re vera tamen numerando pro singulis drachmis grana septuaginta duo, sunt drachma una & semis grana quatuordecim cum duabus quintis. Similiter in dosi absynthii & mirrhæ dicunt, ana drachmam unam & grana duodecim, pro decima parte drachmarum duodecim, numerantes suo more in singulis drachmis grana sexaginta: cum numerando grana septuaginta duo (ut debent numerari) dicendum sit potius, ana drachmam unam grana quatuordecim cum duabus quintis. Sed in dosi aloës & cæterorum usque ad prassinum majus extat mendum, substitutis scrupulo uno & granis quatuordecim, pro decima parte drachmarum undecim. Ut habetur in Nicolao Alexandrino. In quo tamen nos cum aliis credimus legisse eos, & bene quidem (ut inferius dicemus) non drachmas undecim,

sed

sed drachmas novem : & erratum hic non esse eorum, nisi potius librariorum, qui pro eo quod illi scripserunt, ana scrupulos duos & grana quatuordecim, habent scrupulum unum & grana quatuordecim. Sed nihilominus quoniam eo modo numerantur in singulis drachmis grana sexaginta, cum potius deberent numerari septuaginta duo : dicendum illis erat, ana scrupulos duos, grana sexdecim, cum quatuor quintis. Et demum in dosi quoque ellebori albi & nigri, peccant suo more, substituentes grana sex pro decima parte unius drachmæ, cum potius decima drachmæ pars sit grana septem cum una quinta. At enim quoniam hæc Salernitanorum descriptio, eo quo exposuimus modo castigata, ob minutas granorum in suas partes divisiones difficilem ac tædiosam reddit hanc cõpositionem: idcirco nos non deeimam descriptionis Nicolai partem, ut illi, nisi sextam tantum mutuantes, faciliorem multo in eum qui sequitur modum proponimus. Accipe trochiscorum alhandal (pro colocyinthidis interioris) polipodii quercini, ana drachmas tres scrupulum unum. Euphorbii, polii montani, & coccognidii, ana drachmas duas scrupulos duos & semis.

a Hoc est, seminum thymelea.

mis. Comarum absynthii (Pontici scilicet)
 myrrhæ, ana drachmas duas. Comarum
 a centaurii, agarici, ammoniaci, thymia-
 matis (videlicet optimi & selecti) folii,
 scillæ affæ, spicæ nardi, diacrydii, ana
 drachmam unam scrupulos duos. Aloes,
 corymborum seu capitulorum thymi, cal-
 siæ lignæ (id est, cannellæ) comarum
 chamædryos, Ammoniaci (loco bdellii)
 foliorum marrubii, ana b drachmam unam
 & semis. Cinamomi (nempe, cannellæ
 optimæ) oppoponacis, castorei, radicum
 aristolochiæ longæ, (aut si desit rotunda)
 piperis albi, piperis longi, & piperis ni-
 gri, croci, sagapeni, seminum c petroseli-
 lini, ana scrupulos duos & semissem. Cor-
 ticum

a Minoris sequitur. b Drachma una cum di-
 midia est sexta pars draclimarum novem, ut legen-
 dum cum alii viri docti censemur in Nicolao Ale-
 xandrino, non autem d. a. hmas undecim, ut in vul-
 gatis ejus codicibus habetur: idque eadem conje-
 ctura ducti qua illos ad id credendum movit, quod
 nimirum in hac compositione auctor à majoribus
 ponderibus exordiens semper minuendo progreditur.
 Cui etiam adde quod in Græcis numeris facilis foret
 lapsus ab ἐνέκα ad ἐνδέκα.

c Macedonici scilicet. Cujus magna copia apud
 nos reperitur.

ticum radicum a ellebori albi & nigri ana-
 scrupulum semis. Mellis optimi despuma-
 ti quod sufficiat: sufficient vero libræ duæ
 fere. Gummi vino odoro solvuntur: cri-
 brantur: melle subiguntur. Alia tenuissi-
 me

a Ellebori albi magna copia est in multis Hispania lo-
 cū. Niger autem legitimus, ut à Diosc. describitur,
 minime in Hispania cū Pyreneos montes reperitur.
 Quoniam vero Galen. utriusque eandem facultatem
 tribuit lib. 6. de med. simpli. fac. de utroque simul
 agens: & nihil referre dicit albo an nigro uti. lib.
 de comp. Phar. sec. lo. 1. cap. 2. licebit hoc quidem
 electario ellebori nigri loco album substitui. Quod si
 ex Italia, vel etiam propius ex Pyrenei montibus,
 ubi maxime abundat, elleborus niger afferatur, Phar-
 macopolarum nostrorum diligentiam laudabimus. Ut
 contra eorum ignaviam atque ignorantiam damna-
 mus, qui hactenus pro veratro nigro, clematidis alte-
 rius, herbariorum vulgo dicta flammula, & Hisp. la
 yerva mormenta vel mormera, radice utebantur.
 Quam tamen illa æque ad manum sunt due alia plan-
 ta, quæ ut elleboro co-generes, ita à multis ellebori
 nigri loco, veri ac legitimi penuria vel etiam igno-
 ratione, usurpari solent. Nempe, una quam Dodo-
 naus non recte contendit esse buxibthalmum, & veri-
 similius Matthiol. existimat esse consiliginem Colu-
 mella & Plinii, aut saltim pseudo elleborum, alii
 vero helleborisem, alii sesamoidem minorem. Pena
 vero & Lobel levisissima quidem conjectura elleborum
 ferulaceum Theophrasti esse credunt. Altera vero
 quæ Hisp. appellatur ab aliquibus harnovel, & ab
 aliis la yerva del lobado: atque à Dodona & multis
 aliis inter ellebori nigri species censetur: ab aliis vero
 helleboraster & consiligo esse putatur. Quibus qui-
 dam plantis aliorum exemplo, minorique culpa, legi-
 rimi ellebori nigri defectu, uti possent.

144 HISP. PHAR. RECOG.
meteruntur, unaquæque ex arte. Cribra-
ta autem mistaque omnia paulatim melli
ferme frigido miscentur exacte.

*In Pulveres seu species Hieræ simplicis
Galeni.*

EX omnibus descriptionibus Hieræ,
v quas diversis in locis affert Galenus,
à nobis selecta ut nostris Pharmacopœis
proponeretur, quam ipse libro secundo de
b comp. Phar. sec. lo. adducit. Cujus pul-
veres, in eum qui sequitur modum, para-
buntur. Aloes optimæ drachmæ nonagin-
ta, cinnamomi (videlicet, optimæ cane-
læ) ligni aloes (loco xylobalsami) radi-
cum asari, spicæ nardi, Mastiches albæ &
optimæ, ana drachmæ sex. Croci optimi
drachmæ quinque. Tenuissime trita & cri-
brata misceantur.

In

a Lib. 7. method. cap. 11. & lib. 6. de san. tu.
cap. 10. & lib. de sang. mis. cap. 18. & lib. 2. de
comp. Phar. sec. lo. cap. 1. & lib. 8. ejusdem cap. 2.
& 3. b Cap. primo.

De Massæ Pillularum conformatione.

SEVERIUS fortassis, quam par erat, hæctenus in nostros Pharmacopolas animadversum fuisse judicabunt illi, qui palpum eis obtrudere sunt soliti: & nos culpandos potius existimabunt, quod tam nude eorum errores detegerimus, nihilque in eis laude dignum toto hoc opere sit commendatum. In quorum gratiam (omnibus enim debitores sumus) libet modo illorum usum laudare, qui pillularum offas seu magdalias, quas earum auctores aqua vel succis lentore ullo carentibus comprehendere præcipiunt, non usquequaque ex illorum præcepto parant: sed ab aliis perdoctis viris admoniti, & experientia edocti, ejusmodi liquores aut succos, melli cômistos, proxime ad syrupi crassitudinem, & interdum etiam ad crassiorem consistentiam percoquunt, quo ipsarum pillularum magdalias excipiunt ac conformant. Quamquam vero contra hoc alii argutule objicere contendant, ex mellis aut sacchari additione pillularum quantitatem acrescere, viresque imminui: Re vera tamen ut omnia pillularum simplicia in massam

juncta aptius cohæreant, nec tempore ex
 siccata massula dehiscat, simpliciumque
 experiret facultas, humorem postulant
 lentum & glutinosum, quo conformentur.
 Atque recte quidem docti quidam viri,
 auctores ipsos, qui ejusmodi pillularum
 massas, præfatis liquoribus aut succis, len-
 teris expertibus, formandas imperatunt,
 amice interpretantur, in usum præsentem
 eas pillulas componi: secusque præceptu-
 ros si diutius illæ essent asservandæ. Quo-
 niam vero & in hoc gravius etiam pec-
 care contingeret, si in omnibus, & minus
 caute quam par est, hæc mellis aut saccha-
 ri, cum tenuibus liquoribus aut succis, mi-
 stura fieret: ubi & quomodo hoc facien-
 dum sit exponere non pigebit. Si enim
 pleraque, in pillularum compositione in-
 gredientia simplicia, fuerint lachrymæ, vel
 gummi, aut succi lenti & glutinosi (ut sa-
 gapenum, ammoniacum, tragacanthum,
 gummi arabicum, & aloës etiam ac Scam-
 monium si dissolvenda sint) nihil sane
 opus erit, mel aut saccharum eis immif-
 cere liquoribus aut succis tenuibus, quibus
 auctores ea excipere imperaverint. Siqui-
 dem, quovis liquore ea cum reliquis cogi
 satis poterunt. Cujusmodi pillulæ sunt
 anastichinæ, è fumaria, ex hermodactylis
 majo-

majores, sine quibus, & aliæ similes. In aliis vero (cujusmodi sunt pillulæ Rhabbari, aureæ, coccia, fætida, & artetica) recte quidē additur succo puro ab auctore præscripto mellis pars tertia. Et percoquantur ad tertiæ ipsius succi partis consumptionem. Ex quo assumetur quod satis sit ad excipiendos omnes pulveres, & ut ad consistentiam, pillulis idoneam, redigantur.

In Pillulas Mastichinas.

Pillulæ mastichinæ, quæ in officinis parari solent, sunt ex *a* Petri Aponensis, Conciliatoris dicti, descriptione. Nos tamen nostris officinis parandam potius ducimus, quæ à *b* Fernelio adducitur in eum qui sequitur modum: Recipe mastiches uncias duas. Aloës optimæ uncias quatuor. Agarici trochiscati, pulveris hieræ simplicis, ana unciam unam & semis. Cum vino optimo cogantur in massam.

G g 2

In

a Quas affert ipse in suis additionibus in Mesuem, tr. de agritud. memb. nutr. cap. de indig. stoma. in fine. & similiter Franciscus de pede Mont. in suis additionibus in Mesara. de agritud. stoma. cap. 12. & 31. in fine. *b* Lib. suæ meth. 7.

In Pillulas Aureas.

HARUM pillularum auctor primus est ex Pharmacopœarum scriptoribus *a* Nicolaus Alexandrinus. Cujus dimidiam formulam transcripsit *b* Nicolaus Myrepus, addens in ea tantum hieræ picræ drachmam unam. Salernitati vero ejusdem Nicolai vetustioris formulam similiter dimidiantes, hieram picram myrepsi omisere: sed mastiches drachmam unam Nicolaus Præpositus ipsorum Salernitanorum, quos sequutus est, descriptionem substituit: præterquam quod in mastiches pondere dimidiam addit drachmam. Quocirca cum non multum referat mastiches hic pondus addere aut minuere: utramvis descriptionem, vel Salernitanorum, vel Præpositi recte teneri posse censemus. Quod si quis eorum optionem desideret, Præpositi quidem formulam magis probaremus, quoniam ex majori mastiches dosi magis correctum & benignius redditur ipsum medicamentum.

*In**a* Cap. 807.*b* Sect. 32. cap. 97.

In Pillulas è Nitro.

Pillularum è nitro auctor est *a* Alexander Trallianus. Quas Nicolaus quoque Alexandrinus vetustior *b* affert sub nomine pillularum Alexandrinarum. Nec in aliquo ab Alexandro variat, quam in totius compositionis pondere, ejus descriptionis quartam partem mutuans; & quod Alexander dicit comeos, scribit ille ameos. Sed *c* Mesues has etiam pillulas ex ipso Alexandro referens, loco ameos seu comeos, subdit *d* gummi: & nitri (quod appellat baurach) dosim dimidiam: euphorbii vero dosis, quartam tantum partem assumit. At enim cum tria ex præcipuis medicamentis quibus hæc cōstant pillulæ apud nos desiderentur: nimirum, elleborus, nitrum & bdellium: non immerito de eis ambigi posset utrum nostris officinis sint admittendæ, an potius ab eis rejiciendæ. Verum cum nonnullos ex doctioribus nostrorum medicorum eis libenter uti intelgamus, earum formulam hic proponen-

Gg 3 tes,

a Lib. 1. cap. 21. *b* Cap. 796. *c* Tractat. de agitud. capiti. *c.* de epilep. *d* Brassavolus non inepte convehat librariorum culpa. legi in Mesue, gummi, pro ammi.

tes, succedanea eorum quæ desiderantur
 subiciemus. Accipe Aloes optimæ, diacrydii (pro Scammonio) trochiscorum
 Alhandal (pro colocynthide) Ammoni-
 aci optimi (loco bdellii) ammeos, ni-
 tri veri (aut ejus loco salis gemmei) cor-
 ticum radicum *a* ellebori albi præparata-
 rum (loco ellebori nigri) ana drachmam
 unam. Euphorbii drachmas duas. Succo
 brassicæ, quantum sufficiat excipiendis pul-
 veribus in catapotiorum massam. Porro
 nos harum pillularum loco potius quidem
 reciperemus, quas adducit *b* Brasavolus
 ex *c* Galeno, à Nicolao Leonicensi de
 sex rebus vocatas: quæ recipiunt: aloen,
 Scammonii, colocynthidis, Agarici, Bde-
 lli, gummi arabici, singulorum partes
 æquales.

C A P U T III.

De Medicamentis exterius admoventis.

VLtimo jam nobis expendenda relin-
 quuntur medicamenta, quæ exterius
 adhibentur: nempe, olea unguenta, &
 empla-

a Aut radicum pseudoellebori nigri, vel elleborina.

b In suo examine catap. in exam. pil. Alexan.

c Libr. 5. method. cap. 14.

emplastra. Ac principio quidem non possumus non damnare nostrorum Pharmacopolarum socordiam, qui cum facillimo negotio sibi comparare possent omphacinum oleum, in omnes qui in officinis frequentissime occurrunt usus: ejus succedaneis uti non erubescunt, perinde ac si ex ultima India asportandæ illis essent olivæ immaturæ. Pudeat itaque posthac Hispanensem Pharmacopœum aliud quam verum omphacinum oleum, in suis officinis habere, ut quæ ex eo paranda sint olea ex arte concinentur. Desinantque jam nobis obtrudere ex *a* Galeno Hispanum oleum pro omphacino posse usurpari. Cum *b* eodem teste astringens esset illud, quod ex Iberia, Galeni ævo asportabatur, Hispanicum dictum: & hac ratione loco omphacini illud substitui posse dixerat Galenus, ut & oleum, cui teneri olivarum furculi contusi, essent commisti. Quo circa cum oleum nostrum nullam omnino præse ferat adstrictionem, Galeni ipsius judicio minime pro omphacino usurpari de-

G g 4

bet.

a Lib. 11. method. cap. 16. & lib. 12. ejusdem cap. 3. lib. item 2. de compos. med. per gen. cap. 13. & alius in locis. *b* Lib. de simpli. medic. fac. 6. cap. de oleo, & lib. 1. de comp. medic. per gen. cap. 4. & 12. & lib. ejusdem 3. cap. 2. & lib. 8. meth. cap. 2. & lib. ejusdem. 11. cap. 16. & lib. 12. cap. 3. & lib. 13. c. 15.

bet. Alium etiam non miuus communem in nostris officinis deprehendimus errorem, circa olei genera, quæ impressione parari solent: ut interim olea, quæ expressione parantur omittamus: quæ omnia plerique è nostris Pharmacopolis ab aromatosopolis rancida & adulterata emere solent. At olei, ea, quæ impressione facta dicuntur, genera, nullus fere est ex nostris Pharmacopœis, cui, juxta auctorum præscripta, parentur: nisi ea potius quæ incompleta vocata ex simplici rerum maceratione, utcumque à mulierculis confici solent. Nec vero hac in parte, ut in syruporum cõpositione ab arte recessisse causari possunt, ob ægrorum delicatos gustus; sed ut operam & sumptus fugiant, una dumtaxat maceratione, & decoctione contenti, olei genera in suis officinis prostituunt, quæ nihil præter commune oleum colore, odore, & sapore etiam referunt. Eos itaque obtestamur, ne ab arte, ac auctorum præscripto in hujusmodi oleorum compositionibus recedant: & quod labori & expensis minime parcentes, ea non ex suis inscriptionibus cognoscenda, sed naribus potius disjudicanda conficiant: ut singula naribus admota, simplicium ex quibus conficiuntur, vim ac naturam odore referen-

ferentia, qualia sint, ac dici debeant, dignosci queat.

In Oleum Rosaceum.

EO hominum socordia & avaricia progressa est, ut vel ad salutem, omnium humanarum rerum preciosissimam non jam quæratum tantum quod præstantius ad eam conservandam aut recuperandam esse possit, sed quod facilius minorique artificio ac sumptu possit parari: magisque Pharmacopœorum rei quam ægrotorum utilitati, consulere urgeamur. Unde quum Pharmacopœi ipsi nobis in omnibus potestatem optionemque non faciant meliora eligendi: ex iisque unum sit oleum rosaceum, quod omnes quotquot novimus Pharmacopœi numquam clamare cessant minime posse juxta Mesuæ normam parari, quin impensis pretium plus etiam quam duplo excedatur: aliud eis proponemus, quod minori & sumptu & artificio parari possit: ea tamen lege ut profusus ipsi suum illud simplex oleum, quod à Salsernitanorum Nicolao mutuântur, deserant ac abdicent. In quo ipsi à vero Alexandrino Nicolao, à quo illud suum an-

tidotarium præscribere, æque ac à vera & convenienti methodo compositionis hujus olei variarunt. Quod vero nos eis olei permittimus, erit hujusmodi: pro rosato completo: Accipe rosarum rubrarum recentium, *a* completarum & contusarum, libras quatuor. Succi rosarum libras duas. Macerentur in olei olivarum maturi aqua nitida sæpius loti, libris decem, in vitreato vase diligenter obturato. Et diebus septem insolentur. Deinde in vase duplici horis tribus leniter coquantur. Post coctionem torquendo exprimantur: expressisque foliis abjectis, tot novæ ac recentes, similiter tusæ, in oleum colatum eodem vase immittantur. Quæ rursus, diligenter occluso vase, soli ad macerandum dierum quadraginta spatio exponantur. Et postremo in duplici vase modice coquantur, *b* quoad succus absumatur. Ac tandem torquendo valide exprimantur. Colatum tectum recondatur. Pro rosato vero incompleto, seu immaturo: Accipe foliorum rosarum rubrarum, recentium, incompletarum, videlicet, nondum explicatarum, & diu tritarum, libram unam. In olei omotri-

beos,

a Quæ folia sua explicare. *b* Quod si non omnino absumptum esse succum reperiatur, colatum ipsum, oleum sub sole diu detinebitur, donec totus succus evanuerit. Neque prius in usum recondatur.

beos, seu omphacini, salisque expertis, vel sæpius aqua nitida loti, libris tribus, & succi rosarum libra semis, in vase vitreato, diligenter occluso, diebus septem soli exponantur. Deinde leniter in duplici vase tribus horis coquantur. Et exprimantur. Expressis abjectis, totidem similiter rosæ novæ ac recentes, in abjectarum locum, itidem cōtusæ, substituuntur. Et optime obturando, diebus quadraginta insolentur. Ultimoque, simili prorsus modo & diligentia, ut in oleo rosato completo dictum est, coquantur: exprimantur: & in usum, ubi totus in eo succus fuerit absumptus, recondantur.

In Oleum Chamæmelinum.

Eodem modo quo rosatum parare docuimus, confici hoc & cætera similia poterunt, atque iisdem etiam servatis florum & olei ponderibus: Nisi quod tres hic fient permutationes non duæ tantum, ut in oleo rosaceo: Et quod loco succi, quæ in oleo rosaceo præscripsimus, hic chamomilæ florum decoctio adjiciatur. At illud hic annotatione dignū videtur, quod

nonnulli ex *a* Paulo & *b* Arctuario colligunt, flores chamæmeli, abjectis ejus foliolis albis, esse hic assumendos, aliter multo accipiendum, quam ipsi intelligunt. Neque enim hi auctores foliola illa alba damnant, sed tantum tempus quo ipsi chamæmeli flores sint legendi indicant, quando (nimirum) foliola illa alba ab ipsis florum capitulis decidua fuerint. Tunc enim flores ipsi sunt in sua perfecta maturitate ac proprio etiam semine perfecto prægnantes.

In Oleum Absynthii.

Oleum absynthii, quoniam ab incerto auctore, ob idque varie, paratur: quomodo apud omnes nostros Pharmacopœos confici debeat proponemus: Accipe olei olivatum, maturi, loti libras duas & semis. Cimæmarum seu summitatum absynthii pontici libram unam. Decocti ejus uncias sex. Confice eadem methodo, qua usi fuimus in oleo rosato completo, sed cum tribus permutationibus, ut in oleo chamæmelino advertimus.

In

a Lib. 7, cap. 20. *b* Lib. 6, meth. cap. 10.

In Oleum Vulpinum.

Vulpinum oleum, licet juxta Mesuæ descriptionem Pharmacopœi omnes conficere profitentur: tamen varie admodum concinnant. Quum enim quantitas aquæ & olei, in quo vulpem incoqui mandat Mesues, adeo parva sit, ut neutiquam illa rite & ad artum (ut oportet) dissolutionem percoqui in ea possit: in hoc necessario ab eo variantes, etiam vulpem ipsam aliter parare & incoquere, quam Mesues præscripserit, non verentur. Quomodo igitur juxta Mesuæ, quoad fieri possit, menté, ac ex arte parari hoc possit oleum, hic nostris Pharmacopœis proponemus: vulpes mediæ ætatis, & pinguis, venatu longaque insectatione defatigata, recens mactata, exenterata, ac minutim, una cum pelle, concisa, contractis etiam ossibus, coquatur in aquæ fontanæ & marinæ, seu saltæ, ana libris sex, quoad libræ quatuor supersint. Deinde adde olei veteris clari libras quinque, Salis uncias tres. Comarum thimi, & anethi, ana libram unam.

Per-

a Per vindemiam uvis nutrita.

Percoquantur lento igne usque ad aquæ consumptionem, & artuum dissolutionem. Tum ei affundantur decocti, parati ex aqua dulci (in qua decoxerint ad tertias, thimi, & anethi, ana manipulus unus) circiter libræ octo. Recoquantur, donec, aqua prorsus consumpta, vulpis partes exacte separatæ sint, & omnia sint colliguata præter ossa. Et tandem velociter extorquendo; dum adhuc calet, exprimatur. Expressumque ad usum servetur.

In Vnguentum Album.

Non erubescimus nos hic adeo triviale unguentum in examen afferre, quum nostros Pharmacopœos non pudeat illud ex oleo communi parare: levissima excusatione se tuentes, quod cum rosaceo oleo paratum minime reddatur album. At ne nos morosos in omnibus causeatur, illis condonemus, ne illud oleo rosaceo omphacino conficiant, ut ex arte parari deberet: sed rosaceo saltem completo concinent. Ita enim & minori expensa parabitur, & minus ex albedine remittet.

In Unguentum Diapompholygos.

Unguentum hoc nomine unguenti de tuthia parant omnes nostri Pharmacopœi, juxta *a* Guidonis descriptionem. In qua tamen cum æqualibus portionibus præscribantur oleum rosaceum & cera: nimis durum evaderet ipsum unguentum, ac magis cerotum quam unguentum dici mereretur. Quocirca loco ejus quod in Guidonis formula dicitur, olei rosacei & ceræ albæ ana uncias quinque: substituere oportebit: olei rosacei uncias septem, ceræ albæ uncias tres.

In Emplastrum contra rupturam.

EX variis hujus emplastri descriptionibus, quas varii auctores adducunt, duæ illæ quas *b* Guido affert à plerisque junio-

a Tract. 2. di. 1. cap. 5. de apostem. cancroso. & tract. 7. doc. 1. cap. 6. de medic. cicatrizentibus.

b Primam tract. 6. doc. 2. cap. 7. Secundam vero tract. 7. doc. 2. cap. 7. & in chirurgiæ parva, disc. 22. cap. ultime.

juniorum auctorum, qui dispensaria scripsere, præferri solent. Ex quibus unam construit Joubertus in sua Pharmacopœja, quam nos quidem minime damnamus. Sed quoniam propositum nostrum hic est auctorum descriptiones minime variare, nisi ubi tantum cum componendi arte pugnent quæ ab ipsis præcepta fuerint: priorem illam hujus emplastri formulam, quæ à Guidone affertur, & in usu magis recepta est, hic proponemus, in conduntaxat correctam, in quo ars ipsa castigationem in ea desiderat: nempe, quo hujus emplastri consistentia & (ut appellant) ligatio emendetur. Siquidem experimento compertum est, & à plerisque doctis viris animadversum, ob ceræ vel olei defectum, aut picis & terebenthinæ parvam dosim, nimis friabile hoc evadere emplastrum, neque bene extendi, & parti ut oportet adhærescere posse. Ejus itaque formula hujusmodi erit: Accipe glutinis à pelle arietina, vel potius agnina, expressi libram semissem. Picis navalis, & colophonix ana uncias quinque. Terebenthinæ uncias septem. Boliarmeniæ, sanguinis draconis, gypsi, turis, sarcocolæ, aloës, pissasphalti (loco mumix veræ) radicum ari-

aristolochiæ, centaurii *a* minoris, radicum consolidæ majoris & minoris, fumach, berberis, nucum cupressi, gallarum, *b* sidii seu malicorii, vermium terrestrium, ana uncias duas. Glutinis piscium, visci quercini, ana unciam unam & semis. Litar-gyrii aurei, ammoniaci, opoponacis, galbani, bdellii veri (aut loco ejus sagapeni) mastiches, *c* sanguinis humani (aut loco ejus suilli) *d* exsiccati & in pulverem redacti, ana unciam unam.

Pellem arietinam junioris animalis cum tota lana fuccida recens excoriatam accipere convenit : eamque in minutissimas partes secare. Et in aquæ pluvialis & aceti quantitate sufficienti diutissime coquere, donec penitus dissoluta & colliquata fuerit. Tum totum decoctum calidum intorqueatur, & colo trajiciatur. Expressum vero rursus igni lento redditum tandiu coquatur, donec pene tota aqua evanescente

in

a In codice Guidonis legitur depravate, librariorum culpa, centaurea utriusque, consolidæ, &c. cum legendum illic potius sit, centaurea, utriusque consolidæ, &c. per utraque consolidam intelligendo majorem & minorem : ut ex altera hujus emplar stri formula aperte constat, quam ipse affert locu à me antea citatis ex tract. 7. & chirurgia parva.
b Sidium, Barbaris psidia, officinus cortex granati, lar. malicorum. *c* Hominis sani *d* In furno modice calido.

in gelatinæ modum condensatum fuerit, & liquidioris glutinis aut bituminis consistentiam acquisierit. Atque in ejusmodi glutinis tepidi libra semisse liquantur igni quoque lento glutem piscium & viscum quercinum præparatum. Quibus addantur *a* lumbrici separatim ex vino cocti & cribro transmissi. Seorsim item gummi ammoniacum, oppponax, galbanum, & sagapenum, à sordibus mundata, & non nihil tusa in aceto acerrimo per *b* noctem macerentur. Deinde lento igni exposita rude agitentur, dum liquecant. Liquata, colata, & *c* parum ad lentorem percocta cum præfatis glutinibus jungantur. Hisque exacte permistis addantur *d* pix, colophonia, & terebenthina simul, postquam seorsim lento igni liquata & colata fuerint, omniaque eodem igne spatula jugiter

a Alii lumbricos terrestres primo lotionibus pluribus in aqua, deinde in vino lavant, & cribano modice calido desiccant. Nos vero cum lumbesto & aliis, eos ex vino coctos cribro trajici satius ducimus: tum ut pulverum quantitas sit minor, tum etiam quoniam hoc modo parati commodiores sunt ad emplastri consistentiam. At enim postquam cribro rejecta fuerint, oportebit eos cribano modice calido exsiccari, ne ex nimio eorum humore situm contrahat emplastrum & corruptioni obnoxium reddatur. *b* Vel spatii horarum sex, super cineribus calidis. *c* Igni lentis ea jugiter movendo, dum acetum exhalarit. *d* Modice calida existentia.

giter ducantur dum non nihil spissata exacte uniantur. Quibus deinde indantur, pulveres litargyri præparati, gypsi, & boli armenici aqua rosacea vel plantaginis loti. Hisque probe mistis & tepidis tantum, inspergantur tenuissime pulverizata, pissasphaltum, sarcocolla, mastix, sanguis draconis, aloës, & tus. Atque omnia ad lentum igné multum agitata strenue commisceantur. Et ultimo igne substracto, & reliqua in tenuissimum similiter pulverem redacta, eis addantur. Tandemque cunctis simul cum spatula assidue agitata diu subigantur, ut exactior fiat omnium permistio, & quæ dici solet, incorporatio. Fiatque pasta: quæ supra marmor oleo lentiscino vel myrtino inunctum, & manibus similiter inunctis, diu multumque maceretur, ut emplastrum magis reddatur viscidum.

In Emplastra Diachylon magnum & parvum.

PAucissimi sunt ex nostris Pharmacopœis, qui hæc emplastra rite, & juxta Mesuæ

a Omnia, quæ teri possunt in hoc emplastro in pulverem tenuissimum lavigari oportet.

Mesuae descriptionem concinnent. Siquidem plerique illorum mucagines oleo incoquunt, vel potius comburunt: exinde vero in ipso oleo lithargyrium coquunt, Qui vero ex eis peritiores putantur, partem quandam mucaginum oleo incoquunt, & reliquam postea eorum partem in oleo & lithargyrio consumunt. Quum nullatenus recte atque ex arte confici haec emplastra queant, nisi in lithargyrio cum oleo prius praeparato & cocto mucagines totae absumantur. Quomodo autem haec fieri oporteat, cum late exposuerit Joannes Du Boys egregius sane apud Parisienses Pharmacopoeus, supervacaneum censemus hic referre. Atque hunc nos auctorem nostris Pharmacopoeis commendamus, ut in reliquorum etiam, quae exterius adhibentur, medicamentorum compositionis methodo, sibi consulendum ac imitandum proponant. Quippe quem caeteris, qui de hoc argumento scripsere, exactius illam tradidisse, & feliciter absoluisse arbitremur. Nos vero interim huic Pharmacopoli nostratium recognitioni finem imponemus: hoc uno operae studiique nostri expetito ac postulato a lectoribus pretio, ut quodcunque erit quod praestiterimus aequi bonique consulatur.

Quod si id eis probatum inrellexerimus,
Pharmacopœjam, quam suis omnibus nu-
meris completam paramus, ipsis commu-
nicare non gravabimur.

F I N I S.





INDEX RERVM.

LIBER PRIMVS.

Examen vere atque exacta proportionis ponderum Hispanicorum, ad pondera quibus olim Romani utebantur. Et modus quo antique Romanorum mensura facile fabricari & instaurari possint.

Cap. 1. Pag. 1

De Hispanorum Ponderum differentia ad Romanorum pondera. Deque Hispanorum Pharmacopolarum abusu & errore in suis ponderibus. Et quomodo facile emendari illa possint. Cap. 2.

Pag. 22

LIBER SECVNDVS.

De Medicamentorum expurgantium tritura, ac multiplici in illa Pharmacopœorū errore. Pag. 47

LIBER TERTIVS.

De Syruporū animadversione. Cap. 1. Pag. 101

In Syrupum è succo citrii. Cap. 1. 109

In Syrupum capillorum Veneris. Cap. 1. ibid.

In Syrupum de Papavere. Cap. 1. 110

In Syrupum è mentha. Cap. 1. 112

In Syrupum Absynthii. Cap. 1. 114

In Syrupum de tussitagine. Cap. 1. 115

*In Syrupos fumarie endivie & cychorii composi-
tos.* Cap. 1. ibid.

I N D E X R E R V M.

<i>In Syrupum de quinque radicibus.</i> Cap. 1.	116
<i>In Syrupum ex artimisia.</i> Cap. 1.	117
<i>De Electariorū ac Pillularū examine.</i> Cap. 2.	118
<i>In Electarium Catholicum.</i> Cap. 2.	122
<i>In Electarium è prunis.</i> Cap. 2.	124
<i>In Confectionem Hamech.</i> Cap. 2.	126
<i>In Electarium Diaphenicon.</i> Cap. 2.	131
<i>In Electarium ex Pſyllio.</i> Cap. 2.	133
<i>In Electarium de succo rosarum.</i> Cap. 2.	135
<i>In Benedictam.</i> Cap. 2.	137
<i>In Hieram Logadii.</i> Cap. 2.	139
<i>In Pulveres seu species Hiera simplicis Galeni.</i> Cap. 2.	144
<i>De Massæ Pillularum conformatione.</i> Cap. 2.	145
<i>In Pillulas Mastichinas.</i> Cap. 2.	147
<i>In Pillulas Aureas.</i> Cap. 2.	148
<i>In Pillulas è Nitro.</i> Cap. 2.	149
<i>De Medicamentis exterius admovendis.</i> Cap. 3.	150
<i>In Oleum Rosaceum.</i> Cap. 3.	153
<i>In Oleum Chamamelinum.</i> Cap. 3.	154
<i>In Oleum Absynthii.</i> Cap. 3.	156
<i>In Oleum Vulpinum.</i> Cap. 3.	157
<i>In Vnguentum Album.</i> Cap. 3.	158
<i>In Vnguentum Diapompholygos.</i> Cap. 3.	159
<i>In Emplastrum contra rupturam.</i> Cap. 3.	ibid.
<i>In Emplastra Diachylon magnum & parvum.</i> Cap. 3.	163



F I N I S.

Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a name, located at the top of the page. The text is written in dark ink on aged, yellowish paper. The characters are highly stylized and difficult to decipher, but appear to be a personal name or signature.

V. Morejon, t. III,

p. 358.

