外科集成

十七

漢書門
類
號 一二七五
函 二
架 七
冊 五〇

内閣文庫
和書 類
號 四五〇二七
冊 五〇
二六四函
架 一
一九六
二
(七十才)

内閣文庫
番號 和 45027
冊數 50 (17)
函號 196 50

醫學圖書

大學東校典籍局之印

日本政府圖書

内閣文庫

外科集成卷之十七目録

黴瘡第十七

黴瘡原委論
黴瘡形症辨論
黴瘡脉候論
黴瘡輕重論
黴瘡治法總論
便毒證治論

修淨舍活板

国立公文書館
National Archives of Japan

楊梅疳瘡證治論
隂陽楊梅瘡證治論
翻花楊梅瘡證治論
楊梅漏證治論
楊梅疔證治論
楊梅痘子證治論
楊梅圈瘡證治論
楊梅癬瘡證治論
結毒證治論

修澤舎活板

国立公文書館
National Archives of Japan

外科集成卷之十七

官醫瘍科　栗崎道樞正弘編輯

黴瘡第十七

黴瘡原委論

黴瘡一症古未言及究其根源始于午會之末起自嶺南之地至使蔓延通國流禍甚廣今當未會之初人稟度薄天厲時行交媾間精氣相傳深一感其毒酷烈匪常入髓淪肌流經走絡或中於陰或中於陽或伏於內或見於外或攻藏府或巡孔竅有始終只在一經者有越

經血傳者有間經而傳者有毒損方經者形症多端而治法各異是證也不獨交媾相傳稟薄之人或入市登圊或與患者接談偶中毒氣不拘老幼或即病或不即病而偏痛遍身或不作痛而傳於內室或內室無恙而移患於子女甥孫者故備述受病根源施治本末庶法落前人未發之祕全書●或問云黴蒼為患何自而防乎余曰嶺南之地卑溼而暖霜雪少加蟄蟲不蟄諸凡汚穢蓄積於地遇一陽來復溼毒與瘴氣相蒸物感之則黴爛易毀人感之則瘡瘍易侵叟逢客火交熾重虛之人即冒此疾故殆謂之陽徽瘡云以致蔓延傳染所以苑家有縣過之說皆繇氣運所使

因濁而致也（同上）●或問黴瘡為氣運所使有云等瘡何也余曰廣瘡者與痘相類痘瘡古所無有始上於北其氣自北而南漢時所謂之胡痘繇先天之所中無論男女貴賤遇歲火流行發脈流蚤若黴瘡有古小無有始起於南其氣自南而北於時謂之廣瘡跡有天之所感不同老幼愚智元稟虛壯有觸黴而染胡痘廣瘡以地命名孰非氣運之所使乎（同上）●或問其瘡傳染不已何也余曰昔人染此毒親戚不同居飲食不同器置身靜室以俟愈故尊孫疾庶遭來世齊人妄沈匪花柳淫娶忽於避忌一把有毒之妓為火交熾真元弱者毒氣乘虛而襲初不知覺或傳於妻妾或

修澤舍活板

傳於姣童上世僻宥方書可正故有傳染不已之意同上●或問老幼之人不近妓女突染此瘡竟有結毒者何也余曰不獨交媾鬪精或中穢者毒氣熏蒸而成或祖父遺毒相傳此又非形接之比也同上●或問有人與患者同寢共食不傳染者何也余曰此係先天之氣充固邪氣無間而入所以有終身爲妓半世作風流客者竟無此恙同上●或問交媾偶中毒氣有輕重否余曰毒隨神轉走絡流經壯者氣行則已怯者則著而爲患同上●或問諸痛痒瘡瘍皆屬心火何心經獨擬於後耶余曰此毒止起脾肺下起腎肝心通陽主陰邪不總先於諸經傳變而心始受邪故有生瘡于不爲痛楚或元陽虛怯直中少陰者發作遂痛仝上●或問廣瘡何如曰此肝腎二經濕熱或色慾太過腎經虛損感邪穢之氣而成或因下疳蘊毒纏綿不已而作準繩●楊梅瘡有以其形似楊梅又名時瘡因時氣乖變邪氣湊襲又名棉花瘡自期綿久難絕有此三者之稱總由濕熱邪火之化（正宗）●大都此證必由淫毒傳染而生蓋此淫穢之毒由精泄之後氣從精道乘虛直透命門以灌衝脉所以外而皮毛內而骨髓凡衝脉所到之處則無處不到此其爲害最潑最惡設初起時去毒不淨或治失其宜而隨至敗爛須命者蓋不少矣或至二三十年之後猶然發爲

瘡毒或至爛頭或至爛鼻或四肢腦陰之處臭爛不可敗拾或遺毒兒女或患終身其惡如此靜而思之則有見此惡道而不爲戒心知避者其患亦甚矣故凡治之之法最當知要切不可不慎也亦有不因淫毒傳染偶中淫熱而患者此不過在皮毛肌肉之間宜去濕熱自當全愈無足慮也

景岳●楊梅瘡古方不載亦無病者近時起于嶺表傳及四方蓋嶺表風土卑炎嵐瘴熏蒸飲啖辛熱男女淫猥溼熱之邪積蓄既深發爲毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人病之其類有數種治之則一也其證多屬厥陰陽明二經兼乎他經邪之所在則先發出如兼少陰太陰則發于咽喉兼太陽少陽則發于頭耳之類蓋相火寄于厥陰肌肉屬于陽明故也（本綱）

●楊梅瘡一名廣東瘡一名黴瘡此瘡皆臟腑之積毒脾家之濕熱其起也有三因男子與生瘡婦人交感熏其毒氣而生或體虛氣弱偶生瘡之人穢氣入于腸胃而生或先患瘡之人在于客厠去後其毒氣尚浮于客厠之中不知偶北其毒氣熏入孔中漸至藏府又嬰兒患此者皆父母胎中之毒也（全書）

黴瘡形症辨論

夫梅瘡言形也黴瘡言湿也久亦●或問此證有謂楊梅瘡有謂棉花瘡有謂破爛瘡名狀不一者何也余曰毒之相感者一氣也臟之見證者各異也如痘瘡有紅紫白瘡如荳如蘇如蚕子如土蛛如茱萸葡萄或移毒眼目肘膝形證多端大約似荳者多聚故名曰痘瘡如黴瘡有赤遊紫癜如瘋如疹如砂仁如棉花如鼓釘如爛柿如楊梅或結毒破爛非毅名狀不一大約似楊梅者多半故名曰梅騷痘癩梅瘡皆以形命名所以不一也今僣●毒中腎經始生下疳繼而骨痛瘡標耳內陰囊頭頂背脊形如爛柿名曰陽黴瘡甚則毒傷陰陽二竅傳於心発大

修澤舎活板

瘡上下左右相對攣痛連心移於肝眉髪脱落眼昏多淚或癀爪甲毒伏本經作偏正頭痛甚則目盲耳閉或生翳不壽久則毒發聚穿　毒中肝經先發後毒嗣作筋疼瘡標耳項脇肋形如砂仁俗以砂仁瘡名之甚則筋攣不起傳於脾四肢發塊痛楚淡蛀爛腿膝移於心生瘡如癋痛痒交作毒伏本經大筋微疼久則毒發爇項兩膝　毒中脾經瘡標髮際口吻或堆肛門形如鼓釘俗以廣痘名之甚則毒伏藏內傳於腎骨痛顲烈發塊百會委中湧泉等穴移於肺肌膚生癬如花色紅紫褪過即成白瘢毒伏本經發斑如丹久則毒結腸胃　毒中肺經瘡標腋下胸膛面頰形如花朶俗以棉花瘡名之甚則毒聚咽嗌傳於肝作筋疼過月郭空或天陰申酉時分作疼移於腎作腎臓風痛痒交作毒伏　本經生赤白癜久則毒結聚臆臂膊　毒中心經瘡標肩臂兩手紫黑酷似楊梅俗以楊梅瘡名之甚則毒及眸子傳於肺發喉癬漸蝕鼻梁多作痰唾移於脾生鵝掌風癬手足起止不隨毒伏本經十指流瘋久則毒攻舌本結毒小腸全書●楊梅瘡一名翻花瘡肉反於外狀如幾色有如綿花故又名綿花瘡此則邪毒盛細小者名廣豆或如赤根膿窠此則邪毒淺準繩●楊梅瘡因治與癩大同但各俗呼名不一有呼楊梅爲天疱者有呼楊梅爲大麻風者

以上推之或如楊梅狀紅虛爛痒痛屬心多在乳脇形如鼓釘黄豆者屬脾多生滿面謂之大風疸形如綿花屬肺多生毛髮形如紫葡萄按之緊痛者屬肝腎多叢生脈臂及筋骨之處形如魚疱内多白水按之不緊者謂之天疱瘡乃此類之輕者如發於巔頂口鼻穀道邊者屬陽明及少陽太陽如發於足脛陰莖脇肋者屬肝腎及太陰大抵上先見者氣分受病上躰必多下先見者血分受病下躰必多上下俱見者氣血俱病入門

●楊梅瘡一名廣瘡因毒出自嶺南一名時瘡以時氣乖變邪氣湊襲之故一名綿花瘡因其纏綿不已也一名翻花楊梅因窠竝破爛肉反突於外如黄蠟色一名天疱瘡因其夾産而生白疱也有形如赤豆嵌於肉内堅硬如鐵名楊梅痘有形如風疹作痒名楊梅疹先起紅暈後發斑點者名楊梅斑色紅作痒其圈大小不一二三相套因食穢毒之物入大腸而發名楊梅圏其名形雖異總不出氣化精化二因金鑒

●楊梅瘡或在頭頂中或在肋下或糞門邊先起有雄有雌雄者大如白果遍身生五六十或百枚分顆不成片雌者小如豆瓣遍身連片膿汁淋漓深能累人全書

●楊梅瘡者因形相似而名之也凡氣受之而得者堅實凸起又名綿花瘡若血受之而得者其形扁搨而潰又名菓子瘡皆類其像而俗呼之北方

名曰天泡瘡雖名異而實同矣全●楊梅瘡或先患下疳或未患橫痃然後始發此瘡將萌手掌心隱々當見紅點月上

徵瘡脈候論

或問毒傳藏府切脈可知否余曰脈者氣血之道路氣清脈和氣濁脈滯若有毒者其脈必沉如毒聚肝經者左關脈必沉遲寅卯時胗之或遲或結不復流利者其毒深重餘藏倣此非若他毒以洪大滑數爲準及是者證必難治全書

黴瘡輕重論

楊梅瘡初起無頭疼筋骨不作痛小水無澀淋瘡乾細者輕已生頭面稀少口角無瘡項下胸背雖多穀道無可初生發下疳次生魚口復作筋骨疼痛瘡發非祥瘡起紅紫堅硬手足多生形如湯潑泡生害非輕淺正宗●此證氣化傳染者輕精化慾染者重故氣化乃脾肺受毒其患先從上部見之皮膚作痒筋骨不疼其形小而且乾精化乃肝腎受毒其患先從下部見之筋骨多疼小水澀淋其形大而且硬同上

黴瘡治法總論

夫黴瘡爲患正氣不虛則邪毒不入如肝氣虛邪毒乘之則發橫痃或成魚口甚則筋疼瘡形如砂仁腎氣虛邪毒乘之則生下疳或爲蛀梗甚則骨痛瘡形如爛柿肺氣虛邪毒乘之則毒聚於上不爲筋疼必生瘡如花脾氣虛邪毒乘之則毒流四肢不作骨痛少生瘡如卵痘心氣虛邪毒乘之則發一大瘡形如楊梅左右相對而作楚有一經獨虛而邪氣獨盛者有兩經三經同虛而齊病者有見於外而滿身生瘡者有伏於內而遍體骨痛者有以出入無常而隱見不一也當詳究脉理按其毒氣有無輕重應發表則當發表應攻裏則當攻裏則應疎利則當疎利

修澤舍活板

應溫補則當溫補應凉解則當凉解勿令虛實顛倒致元神恭病重而藥輕者徂無近効病輕而藥重者必生他變所以治此症者須標本兼治不可偏施以攻邪補元爲主全書●楊梅瘡者皆因風流所致間有侵染緇犯而得者百無一二治之不得其法不但一身爲害而且殃及妻兒甚有乏嗣悔之莫及然所治之法各有不同有遏抑其毒而不令其出者有重用行藥而行去其毒者有用外發之劑而發出其毒者有用解托之劑而敗去其毒者四者之中惟升發解托可用若過於劫內收將來必致結毒若重用行藥必致大傷元氣予有一方藥止數味即非行托更覺和平且無論新舊不二十劑痂收全功不獨永除後患更且無殘生育但恐收功之後視爲容易又復恣情縱慾是誰之過歟相勸患者全愈之後當痛攻前非力行善事免神鬼之鑑臨保父毋之遺軆繫妻兒之遺毒培子孫之福壽所待不更多乎大全●凡患陽黴瘡頭面及不便處者先熏後點藥五日即好內服化毒藥點亦無妨不服藥者忌之全書●楊梅瘡治法初起先濕淋次傳筋骨作疼後發其瘡亦宜攻利生此外無痛瘡內無筋骨作痛時氣所感者微散之瘡從交媾不潔乃生下疳小水澀滯不通當行導利上部作痒瘡多消風清熱下部作疼痒甚瀉濕爲先紅紫毒盛瘡高

凉血解毒淡白毒輕瘠薄攻補兼行手足及遍沾搞鵝掌風生柏葉二凡煎湯薰洗即炙頭髮眉盈脫油風何須就神應養真丹早服豨蘇胱霜尺楊花癬片及癬風癬宜服換肌丸劫應不同歸正痊●凡患黴瘡先宜食毒物以發之後服通聖散之類須用土茯苓對症服毒勢既殺八珍十全大補湯之類以補氣血必守禁忌方獲全愈若不忌輕發及冷水致後筋骨疼痛結成風塊或一二年或數年方發其狀堅硬肉色平淡或痛或痒多結於骨節頭面喉鼻之間經絡交會之處已破則膿水淋漓甚可畏也輕則發廣癬亦名千層癬多生手心足底重登不已又有餘毒亦名氣毒

筋骨疼痛來去不定亦名濕毒筋骨痛酸乍作有止宜隨其淺深治之先服消風敗毒後服補劑瘡勢盛及結毒深者必用熏藥後服通聖散以泄火毒後服八珍湯大補湯之類弱者不宜熏恐不能勝火氣也準繩●天泡瘡屬元氣不足邪氣所乘亦有傳染而患受症在肝腎二經故多在下體發起有先筋骨痛而後患者有先患而後痛者初起脉浮數邪在脾肺經也先用荊防敗毒散解散之脉弦數邪在肝膽經也先用龍膽瀉肝湯清解之脉沈數邪在臓腑也先用內疎黃連湯通導之後用換肌消毒散爲主愈後再無筋骨疼痛之患若雅凸亦作痛熱毒熾盛也恋徹作痛毒

肅殺也瘡色白而不結痂陽氣虛也瘡色赤而不結痂陰血虛也搔痒脉虛浮血不能相榮也搔痒脉浮數血不能相榮也脊背間或頭間作痒膀胱陰虛也陰器間或股內痒肝經血虛也陰囊作痒重墜肝經陰虛濕熱也小便頻數短少色赤肝經陰虛也小便頻數色白短少脾肺氣虛也面目發痒或搔變赤外邪相搏也眉間痒或毛落肝膽血燥也飲食少思口乾飲湯胃氣虛也飲食難化大便不實脾氣虛也侵晨或夜間泄瀉脾腎虛也若治失其法有蝕傷眼目腐爛王整拳攣肢體者但用九味蘆薈丸以清肝火六味丸以生腎水蠲痹解毒飲以養血祛邪亦有可愈者若俁用輕粉等劑反爲難治　捏畢●凡有腫硬或作痛或用蒜灸及敷神異膏內服補藥並茯[illegible]苓・湯梅瘡托起飯服防風通聖散一貼去麻黃用硝黃以去內毒待胃氣用定痛以一貼去硝黃用麻黃發汗以去外毒以後用加減通聖散丸多服此方內通臟腑外發經絡爲督尾要藥輕者服此一劑更加搽洗足矣重者十貼後宜服化毒散三日期用吹藥三日瘡兜痂欲脫落再服化毒散三日後量用防風通聖散加減上部多者兼服敗毒散加荊芥鈎藤下部多者兼服龍膽瀉肝湯從身半腫起遍身生瘡面上尤多者樺皮散作燥者搜風順氣丸以調理斷根消毒頑癬者皂根丸筋

骨瘤者皂刺丸換骨丸成瘺者象牙丸腫塊者仙遺粮丸通用加味苦參丸大楓丸蠟凡丸單苦參酒消毒補虛仙遺粮湯加鈎藤或補氣養營湯胡麻散補虛氣虛者單人參湯補中益氣湯血虛者四物湯加山梔鈎藤金銀花甘草節或腎氣丸四聖不老丹氣血俱虛者八物湯八味丸單仙遺粮丸外貼大乙膏白蠟膏入門●廣瘡治法凡其初起而元陽未傷毒亦未甚宜速用清利藥從小便利去其毒惟換肌消毒散爲第一其次則五加皮飲亦妙或兼火邪者宜祕方仙遺糧湯或稟氣多弱者宜花苓膏凡此諸藥或十日或半月甚者一月無不見效

凡生瘡毒者宜服槐花蕊至二三升則毒從小便泄去可免終身之患真神方也

此瘡初起時多有先下疳次便毒而後瘡出是爲一套若便毒勢甚腫痛熱秘而元氣素強者即方用會膿散或生蠣散先去其毒之大勢而後用前方藥亦要着極

此瘡或久而不愈或元氣素弱或因剋伐致虛但見有正不勝邪之勢則當酌其輕重或以純補元氣爲主凡脾胃陰陽氣血皆宜隨證用方但使氣血得復則邪毒無害最忌見不真而孰兩端則終歸無益亦是要着

瘡生頭面或遍身不便處欲其速愈但用熏藥則二三日可以脫落真神妙者也但此惟治標之法耳

瘡毒久蓄發爲瘋毒亦名楊梅

瘡漏或蝕筋或腐骨潰爛不收最鳴惡候近來於法惟五寶丹爲最妙及徐東皋楊梅瘡漏方或秘傳水銀膏先擇用之[illegible]無●楊梅瘡氣化傳染者毒在皮膚未經入裏宜服萬靈丹先荅發汗解散皮膚之毒精化欲染者留在骨髓未透肌膚宜服九龍丹通利大小二便以爲骨中之毒甚者二服皆可行散之後體實者升麻解毒湯體弱者歸靈內托散服至筋骨不疼瘡根淡白內毒已解方用點藥輕者半年重則一載始方得愈如患者不遵此法欲其速愈妄用熏條擦藥哈吸等法往往致後患者多矣患者熟思之[illegible]●楊梅瘡氣化者毒在表未經入裏稍有萌動宜急服透骨搜風散元氣實者楊梅一劑散开之精化者毒在裏深伏骨髓未透肌膚宜服九龍丹以瀉骨中之毒降下毒物以土潑瀝之至筋骨不疼瘡色淡白內毒已解再用金蟾脫殼酒一精掃除毒以絶其源如梅毒初發服表藥時恐上攻頭面宜預服護面散或瘡勢已發於面愈後班痕不退宜翠雲散點之以滅痕跡若梅瘡潰爛時腮穢浸淫成片派痛者以鵝黄散撒之及翻花楊梅小以本方加雄黄末香油調敷之外有蘆薈丸於發瘡時令侍從人服之可免傳染若患者不遵正法醫治欲求速效強服輕粉水銀白粉霜劫藥等類以致餘毒含藏骨髓復爲倒發結毒輕則累及妻

子甚則腐爛損形不可不慎金鑒●楊梅瘡治療須別凡自致者重傳染者輕自致有淫慾太妄以致陰虛先見及欲口忿味三焦皆熱精竭血枯遺滯濁經血成也傳染者中氣不足外染猶輕然患此者切不可用毒物熏之亦不可用寒藥過之並求速効須用煎藥解毒補益托散外用煎藥洗浴仍以青藥搽貼拔毒出外方無後患太全●治楊嚴瘡者切不可苟圖財帛賄用輕粉等藥隱之梅瘡一服輕粉如油入麪毒人筋髓而莫能解也不但終身骨中疼痛結毒潰爛上至五官鼻顱下至玉莖元首蟲蝕無存噫輕粉之爲害可勝道哉患此瘡者亦不可畏人物議而求速效醫者當盡發其毒使之外出務使永無遺患太全●廣筆記云有以水銀番硇搓擦醫楊梅瘡致令患者三日間舌爛齒脫喉潰穢氣滿室世出腐肉如豬肝色二便不通湯水不入腹脹幾死證已危急矣醫斯證者須以手按病人之腹不痛者知難服未堅毒未及心其毒尚淺速治可救法用鉛二觔分百餘塊加大劑甘桔湯料銀花甘草各四兩水三十碗煎濃汁先服三四碗徐洗舌上任其自流洗灌一個時辰其舌閉可轉動口內可即漱淨隨令飲汁數盡將前渣再煎連煎剩汁總和一處須[illegible]流濯手足次且二便出黑水無數始安然後用吹口藥及內服敗毒內托之劑而痊同

●總之揚梅瘡宜發不宜遏貴在除根漠求速愈得其虛実月上●揚梅瘡服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成癧連年累月至于終身成癈疾者土萆薢一兩有熱加芩連氣虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶月餘即安発痒●小兒楊梅瘡乃天行時毒亦有傳染而患之或稟賦所得者受症在肝故多起於下部治失其宜多致蝕傷眼目腐頰脊莖拳攣股節初起之時上體多者先用荊防敗毒散下體多者先用龍膽瀉肝湯大便秘者用大連翹飲後用換肌消毒散並蝕傷眼目兼用九味蘆薈丸六味地黃丸股節拳攣無用蠲痺解毒湯若因脾胃虧損而不能

愈者先用異功散後用換肌消毒散若用輕粉之藥多致敗症也立齋●瘡毒塞鼻不通者葫蘆殼燒灰鍾乳石腦下冰片等分爲末吹入鼻内出黄水日三二次三二日即通大減●凡筋骨疼痛先服化毒丸七日外用熨烙法（全書）●凡綿花瘡毒及下疳初感或毒盛經久難愈者速用新槐蕊揀淨不必炒每早午晚食前淸茶呑下三錢服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之患亦無寒涼敗脾之慮此經驗神方也如不能飲卽用滚水鹽湯但不及酒服之效捷也（全大）●或問醫治此患或用湯藥者或用散藥者或用丸藥者皆能獲効有等患者深慮輕粉爲害畏服丸藥草用

煎劑能收全功否余曰審察病機者醫之智也攻邪伐病者藥之能也夫毒有多少形有盛衰治有緩急方有大小藏有高下腑有遠近證有表裏藥有輕重草木之性多爲湯液金石之品俱作丸散故方有七大小緩急奇偶複劑有十宜通補瀉輕重滑澀燥濕方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用凡治病在陰者毋犯其陽病在陽者毋犯其陰犯之者是謂誅伐無過病在於經則治其經病在於絡則治其絡病從氣分則治其氣病從血分則治其血病在於表毋攻其裏病在於裏毋虛其表邪之所在攻必從之受邪爲本見證爲標五虛爲本五邪爲標病屬於實宜治以急實者邪氣勝也邪不速逐則爲害蔓延故治實無遲法病屬於虛宜治以緩虛者精氣奪也治宜有第故治虛無速法亦無巧法虛則補之實則瀉之有是證而用是藥此萬世之常度也如傷寒禁用丸藥恐庸俗假用巴豆丸若用大黄丸則穿矣業有專門工有高下又非槩論也全書

●或問此證有用一二方而愈有不百藥無効者何也余曰一二方而効者多因禀厚薄淺或患者忍心耐性訪醫擇藥調攝得宜所以正氣足而邪自除也若百藥無効者乃中毒之深也又非毒之中深餘受毒之始速求病痊不究標本亂投湯劑以致眞元耗削藥毒蓄積於內遂有變證襍

出往々至於傷生患者醫者俱不覺察故未經藥餌者僅爲終身不瘳之疾誤投藥石者定罹夭橫之患緣是紅紫眩亂便病者暗受其弊也同上●或問治法有用擦手足心者有煎湯熏洗者有藥點者有燈照者或劫或不効而受累者何也余曰用此四法取效一時與庸工用輕粉無異得其時者效或有之失其候者其毒反熾而終身不瘳也同上●或問何爲得時何爲失候余曰盡達於肌表而治之則爲得時毒未透發而妄攻者爲之失候同上●或問有患者服藥而愈精神未復者何也余曰毒未盡化藥勝病耳蓋毒不盡則精神不復非骨節酸痛則瘡色紫黑故變壞便

有所染生前未免有毒倘或性氣躁率屢犯禁忌者遂使一分之毒未除竟能復十分之患不知者反責前藥無效也非倦藥者自廢歟同上●或問初生疳瘡便毒大瘡細子至筋骨疼痛喉痹蝕鼻發塊上下破爛孔竅鵝掌白癜其治同否余曰一感此毒者一氣也然毒之見證者不一也加傷寒疹子從表而傳裏發病痘瘡發處而達外惟此證出入無常伏見不一論其本則一突其末自殊正爲稟有厚薄病有新久工有上下藥有良毒豈可局一定之方而欲愈不一之疾乎同上●或問已上見證據經服藥能指日收功否余曰此皆獨按秘咨得心應手嘗者行熟道者遠近可計

歩而至此如初生下疳腫爛未作骨痛者服藥十三日愈爛去陽物搽藥不效名蛀梗或爲卷心服藥三十五日愈横痃雙生者服藥千三日愈單生便毒作筋疼者服藥十九日愈便毒潰破不斂名爲魚口兼之疳瘡者服藥五六日愈陽物生瘡如楊梅堆滿狀如鼓椎他處不生者名爲獨[illegible]楊梅瘡服藥四十五日愈生瘡形如豉仁内作筋疼者服藥二十五日愈形如爛柿内作骨痛者服藥三十一日愈瘡標發除日吻肛門他處未見者服藥二十一日愈形如大荳多見四皮者服藥二十七日愈胷膛面頰先標形如花朶者服藥二十五日愈上下左右對壘形茄楊梅者服藥三十三日愈筋骨疼痛過天陰日晩痛甚者服藥二十一日愈結毒腿膝肩膊塊未破者服藥三十二日愈塊破年遠者服藥三十七日愈結毒委中湧泉玉莖百會等處未破者服藥三十一日愈已破者服藥三十六日愈十指慘痛爪甲発瘨者服藥二十六日愈喉癬日久爪天白蟣蝕鼻梢服藥二十五日愈毒攣肺道不時吐痰而聲啞者服藥二十七日愈青透肌膚皮體生癬硬癍如錢色紅紫者服藥三十七日愈毒附手足生鵝掌風者服藥四十二日愈毒留肉分蛀爛蔓延者服藥四十五日愈胎毒胎兒屢患瘡癬游風丹腫者服藥三十四日愈生兒無皮不壽者必是父母蓄

毒所稟當胎父母胎氣方見毒之有無輕重然後服藥疎滌餘邪補益正氣庶使後孕子女永無胎毒故徵病必須服餌湯劑不可亂投專生者保之全書

●或問服藥愈疾限日刻期能勿爽信乎余曰製劑療疾不外陰陽五行生成之數合而察之明而驗之者水鏡鑑形不失毫髮故病於杢者司內揣外病在外者司外揣內病之々道無踰此矣非獨是疾諸證皆然夫病爲主藥爲賓賓主相得邪氣迺服邪氣一伏則限期勿爽矣同上

●或問有毒壞死疑肢體瘦怯者醫能復原否余曰能解前藥之毒接經銷鎔其邪重施培植元本耳雖聾而復響眼將瞎而復明鼻將凹而復聳體壯者復壯陽貫者復長大都治此證者不外化毒一法覺化毒之法不外攻邪補元非明經審脉辨證之精毋得妄治故諺曰傷寒痘疹廣瘡瘵瘥怯病不服藥爲上至言也原非有病而不藥望恐醫工之不善也故有此形同上

●或問土伏苓單療此疾竟有餌之不効何也余曰土茯苓味甘氣平主益胃健脾暖筋骨倘過服寒凉損胃毒滯脾經飲食少進者非此不能奏効若毒在他經脾胃健旺者縱多服亦不見功如脾虛泄瀉者服此實有奇驗故曰奇良非虛名也同上

●或問丈夫染此症內室須服敗毒等藥可否余曰上工治未病者毋容邪氣侵也今人未見毒氣無有

淡服敗毒等藥果有毒者則可如無毒者徒使元氣内虚内一虚則外邪易入是無病而求病也譬諸國家蓄兵以禦冦醫家蓄藥以攻疾豈有無警而用兵無病而用藥哉同上●或問生々乳必須礬石配合近世方書鮮有用者又未能辨其眞偽乞明示以便采取何如余曰古人處方自有識見決非杜撰也余按本艸礬石性大熱有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡肌死除膈中熱止消渴益肝下氣閟本艸註礬石煆煉配薑附毛枯爲大露宿丸主寒冷百病又有匈奴露宿丸主心腹積聚食飲不下前賢蘄邵者一時名醫也創置礬石散方晉士大夫習獲異効余家傳此方製度有法用之

有驗但此石難得癸酉春余客武林遍訪藥鋪無有眞者偶得之宦游仕上帶歸約有數十觔視之形似滑石扣之堅剛碎之如漿給余盡購歸依法養火閉覩烝如化灰嘗之有味燒之有氣配合生々乳大有奇功余得此石甚多又熟於煆煉用之有餘或有配藥者又可取用同上●或問生々乳亦有朱汞在內與粉霜輕粉相類余曰朱汞者得礬石而白如雪得硫黃而赤如丹得礬石而潔悍解且藥石各有宜忌之不同相宜者如油珠丸治小兒驚風輕粉雖烈用之有效如奪命丹治疔瘡用之反能斂毒即如砒霜有毒寒痰冷哮非此不效癰疾水瀉服之亦瘳又如蜈蚣全蝎

藥性非良芽兒臍風投之即愈非妙是病因毋妄投也同上●或問金鼎砒石大毒方士多用之何也余曰以毒攻邪也凡癰毒年深月久流膿出水者症屬血氣非金鼎砒佐佗藥不能收功若瘡毒初起服之反能爲害或有悞服輕粉寒凉隱藥結毒被爛衆方不效者服之得效丹經曰水銀不離砒下死信非虛語同上●余拔臟腑感染陰陽律遞配製千于九以爲定法而服藥亦有條約但人之稟性不同有素服藥素不服藥素欲素不欲之殊在患者當請上工酌詳脈氣稟賦藥性時候攻補不失茹護全功尊生者不可不察也同上●楊梅瘡醫用輕粉取朱劫劑五七日即愈蓋水銀性走而不守加以鹽凡升爲輕粉銀朱其性燥烈善逐痰涎涎乃脾之液此物入胃氣歸陽明故涎被劫隨火上升從喉頰齒縫而出故齒即乾痿而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間莫之能出痰涎既去血液耗涸筋失所養榮衛不從變爲筋骨攣痛發爲癰毒疳漏久則生虫爲癬手足皴裂遂成痿痼惟土茯苓氣平味甘而淡爲陽明本藥能健脾胃去風濕脾胃健則營衛從風濕去則筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有搜風解毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服之

亦妙本綱●近有好淫之人多病楊梅毒瘡藥用輕粉愈而復發久則肢體拘攣爲癰漏延綿歲月竟致廢篤惟剉土萆薢三兩或加皂莢牽牛各一錢水六盌煎三盌分三服不數劑多瘥蓋此疾始由毒氣干於陽明而發加以輕粉燥烈久而水衰肝挾相火來凌脾土土屬濕主肌肉濕熱鬱蓄于肌腠故發爲癰癧甚則拘攣內經所謂濕氣害人皮肉筋脉是也土萆薢甘淡而平能去脾濕濕去則營衛從而筋脉柔肌肉實而拘攣癰漏愈矣初病服之不效者火盛而濕未鬱也此藥長于去濕不能去熱病久則熱衰氣耗而濕鬱爲多故也同上●仙遺粮善治久病天疱楊梅瘡痛

内閣文庫

及曾誤服輕粉肢體癈壞筋骨疼痛者能收其毒而袪其風補其虛右一味爲末蜜丸梧子大川椒煎湯吞下五十丸鼻崩眉落筋骨拳者皆效但初起肺熱便秘者勿服入門●小兒梅瘡起於口內延及身層土茯苓末乳汁調服月餘自愈外科發揮

便毒證治論

便毒又名血疝又名便癰無論男女皆可以生發於小腹之下腿根之上摺紋縫中經屬肝腎由強力房勞忍精不泄或慾念不遂以致精搏血留聚於中途壅遏而成或爲暴怒傷肝氣滯血凝而發初如杏核漸如鵝卵堅硬木痛微熱不紅令人寒熱往來潰後所名魚口因生於摺紋縫中其瘡口潰大身立則口合身屈則口必張形如魚口開合之狀故有魚口之名但此毒係忍精不泄怒氣傷肝而成至亦生楊梅而兼有便毒者另詳于楊梅門金鑑●便癰俗云便毒實血疝也生於腿胯小腹之間乃厥陰肝經及衝任督三脈隧道乃精氣出入之路也或入房

修澤舍活板

忍精或思色不遂或當泄不泄敗精凝滯爲瘀腫痛在跨腹之間先用五苓散利去敗精便秘加大黄有寒熱者小柴胡湯加山梔澤瀉後用腎氣丸以補精兼逐瘀血内有濕熱外被寒邪相拒敗瘀不得散治宜清肝火活滑血滲利邪水入門●治騎馬癰便毒左右兩邊俱發或先有疳瘡而發或卒然起核疼痛而發治法同便毒但潰後亦如總要敷涂化毒生肌斂口自効●血疝者狀如黄瓜在小腹兩旁横骨兩端約紋中俗名便癰得之於重感春夏大燠勞於使内氣血流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多或值情慾當泄不泄亦成此疾宜以和血之劑下之張子和●

便毒初起寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎爲作強之官所藏者精與志也男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結爲便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初患切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣孫按前論蓋思想無窮所願不遂者設也此固一說而意猶未究果如此論當僧尼孀婦宮人曠夫多有此患然予目擊商賈中野不潔淫妓便搆此疾或下疳或楊梅者亦由慾火淫熾一

事交合不潔爲淫火所動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以攻毒之藥瀉之何也毒邪非尿不入若復虛胃氣則毒邪下陷治之非兩年累月不愈也建法只宜發汗其次利小便膚腠所感之邪不易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆須也故治之不旬日便可奏功若曾已發汗利小便體厚邪固而不得宜通者乃以破毒活血調氣之劑攻之袪毒氣宜通隨以補劑托之亦不失先後著也至穩●便毒一名騎馬癰此奇經衝任為病而先見於厥陰之分野其經多血又多血疝或先有消瘡而發或卒然起核怒痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜踈利之即散發膿後如常用托裏內補之藥正傳●左爲魚口右爲便毒總者挟血交錯生於兩胯合縫之間結腫是也近之生于小腹之下陰毛之傍結腫名曰橫痃又名外疝是也得之入房忍精強固不洩或慾念已萌停而不遂以致精血走動凝滯結而爲腫治當散滯行瘀通大小二便九龍丹山甲內消散是也七日已後服之根本堅固恐其作膿宜用火針法刺之亦妙已出膿者十全大補湯服之庶易收斂遲則恐生別症難愈正宗●便毒多起於勞役不足或房勞過度精氣損傷之人俗云一石米瘡此言百日發可愈也若大補氣血不旬日而愈何用

后日益搶之收斂在乎血氣之盛衰立消●俗呼爲便毒言於不便處患之故也乃足厥陰肝經及衝任督脉亦屬肝之旁絡也是氣血流通之道路今壅而腫痛此則熱毒所致宜先踈導其滯更用托裏之劑此臨症制宜也卽止●便毒惟交感不潔遠淫毒而患者爲最多每々先起下疳下疳未已便毒繼之此濕熱蘊毒之爲患也凡初起腫痛尚未成膿而元氣尚强者速宜未去其毒惟會膿散或牡蛎散爲次善若已成膿而或針或蝕惟速去其膿隨因證調補便速收口爲善若初起一核其痛微其腫漫者此有二證一以邪淺二以元氣虛弱毒深而然若邪經者只用會通膏加麝香貼之無有不散或降癰散亦可若元氣虛弱而毒深者既不肯散又不早潰愈久必愈甚最爲可良又其潰後多不能收輕則爲瘻重則須命此惟大補元氣方不致害若然膚痛甚膿已將成勢不能消宜用降癰散畱頭圍之則勢可飮痛可解膿可速成而潰也彔缶●常見治此證者緊用大黄之類下之以求內消或其膿成令膿從大便而出鮮有見效痊也人多欲內消者益恐收口之難也若知補養血氣不旬日而收矣何難之有若膿既成豈有可消之理如再用寇伐之劑必致難治振要●魚口便毒橫痃等症用行藥不得內消者用蠶線二條兩縛一頭旁開將針推

分寸半許夾在筋頭內以線扎緊用桐油燈盞內貯之燈艸五根排入油內點著用針蘸油燒紅向患頂重手刺入五六分膿出或血或膿以膏蓋貼即得輕便以後漸愈虛者兼服十全大補湯完口（正宗）●便毒初發用生薑蘸醋磨泥塗之（本綱）●便毒初起極刀挑起令有聲以鉄秤錘摩壓一夜即散（同上）●又方葱白熟布包熨數次乃用傳藥即消（同上）●又方用葱根和蜜搗傅以紙容蓋幷服通氣藥即愈（同上）●又方芫根擂水服以滓傳之得下即消（同上）●又方黃瓜蔞一箇黃連五錢水煎連服效（同上）●便毒腫痛貫衆酒服二錢良廻王●便毒諸瘡一枝箭搗爛塗之即消

若毒大甚者洗淨以生白酒煎服得微汗即愈（同上）●便癰腫痛貝母白芷等分爲末酒調服或酒煎服以滓貼之（同上）●又方鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙朴硝一匙空心溫酒服（同上）●便癰初起用黃蜀葵子十七粒皂角半挺爲末以石灰同醋調塗之（同上）

楊梅疳瘡證治論（楊梅疳瘡因生楊梅瘡後餘毒不盡其毒復作）

在上有鼻內蝕爛至於塌陷破壞面目口鼻准下者則蝕其穀道壞爛或蝕其王莖致于斷落或喪其生也宜珍保之內服消疳湯藥及丸藥再上紅粉霜等藥治之則安（詳方）●楊梅疳瘡生于龜頭之上者多生于[illegible]道王莖上者少生于鼻內者更少皆熱毒之氣也風流子弟何忽生此瘡乎日服食者肥甘所衣者輕煖何傷此熱毒乎蓋得之于嫖妓與有毒之女兩相酣戰而中毒也妓女何毒重如此不過毒感毒耳泄精之時自覺馬口之間如針刺痛此毒氣來犯矣重則生魚口輕則生疳瘡乃楊梅先兆

也當鬪戰之時本難中毒然而鼓勇而鬪內火沸騰及至泄精元氣虧損毒氣即乘虛而入內火與毒氣之火兩相和合而不化故生疳瘡不補虛而惟事敗毒則正亦益虛無異下石未有不滿身生瘡者矣治法內用二生湯外用保身散治之即愈苟或不然變出非常非王莖爛落即鼻柱塌陷破壞面目可畏哉身吉●疳瘡[illegible]名類積蓄甚於前陰經云前陰者宗筋之所主督經脈絡循陰器合纂間又云督間繫於二陰是瘡生於此屬肝督腎三經也其名異而形族生於馬口之下者名下疳生莖之上者名蛀疳莖上生瘡外皮腫脹包裹者名袖口疳疳久而偏潰者名蠟燭疳痛引睾丸陰囊腫墜者名雞膯疳痛而多痒潰而不深形如剝皮爛杏者名瘡疳生馬口旁有孔如棕眼眼內作痒捻之有微膿出者名鏇根疳生楊梅時或誤用熏擦等藥以致腐爛初白者名楊梅疳又有生楊梅時服輕粉水銀打成劑藥以致侵蝕尿管內刺痛者名楊梅內疳諸疳原由有三一由男子慾念萌動淫火猖狂未經發泄以致敗精濁血留滯中途結而爲腫初起必先淋漓溲溺澀痛次流黃濁敗精陽物漸損甚則腫痛腐爛治當疏利肝腎邪火以八正散清肝導滯湯主之一由房術熱藥塗抹玉莖洗搽陰器儌倖不衰久頓不洩以致火鬱結腫初起陽物痒痛堅硬漸

左疕瘡色紫腐爛血水淋漓不時與舉治當戕火解毒以黄連湯蘆薈丸主之一由娼家婦人陰器瘀精濁氣未淨輒與交媾以致淫精傳染梅毒初起皮腫紅亮甚加水晶破流膿水麻痒時發腥痛日增治當解毒以龍膽瀉肝湯主之次服二子消毒散外通用大豆甘艸湯洗之紅腫熱痛以鯉魚膽汁敷之損破腐爛以鳳衣散早螺散珍珠散銀粉散而春胝舟散因證數又惟楊梅瘡與揚梅內疳二評多服五寶散甚效余臺●下疳一證本肝腎湿熱盡也若無外因而病者不過去其湿熱或滋真陰湿熱既潰其瘡自愈無足慮也惟痰偏瘡毒而患者毒有戕發則病有微甚皆宜用百草煎集洗外以螺螄散敷之則輕有自愈若湿熱甚而為腫為痛者宜用芎歸蒺藜煎兼而治之如毒甚者必用萆薢湯方可若感觸淫邪毒自少陰直入精宮者不易愈即治如前法必必見復毒廣瘡發出而後下疳始愈既見瘡毒即當於本證條下求法治之毒毒●夫陰瘡有三等一曰湿陰瘡二曰妒精瘡三曰陰蝕瘡亦曰下疳瘡也湿陰瘡由腎虛風湿相搏邪氣累之瘙痒成瘡侵淫汁出狀如瘡癬妒精瘡因久曠房室思色動慾以致敗損流入莖內初發如栗未腫潰爛作有痛痒妨悶陰蝕瘡因婦人子宮有敗精帶濁或月水未淨與之交合房至後入未洗浴男子腎

虛邪熾滯氣遂令陰莖連睪丸腫痛小便如淋經久潰爛侵蝕肌肉血出不止以成下疳疳久不愈必成楊梅瘡宜服仙遺粮湯復防く寒熱尿澀宜八正散凉熱甚則腫痛脈澀莖中痒痛或出白津宜龍膽瀉肝湯腫潰後八物湯加柴胡梔子知母久服門●下疳日久不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤俗云疳瘡未已便毒復來生也作緊●陰頭腫痛生瘡名為下疳乃督任衝三脈之會其瘡一生則侵毒屬風瘡次第而來先宜升麻葛根湯發出繼服凉血解毒丸肝愈不必服輕粉毒藥週上●臊疳者玉莖有瘡痒且痛赤濼有水盖因交合不洗肝經有濕熱所致肝性王

臊故瘡亦臊因名之宜瀉肝中濕熱外以兒茶付之妙皆主●臊疳生于玉莖之上亦楊梅之先兆也然梅瘡甚毒多得之于妓女龍陽之子倘未交二陣止于妻妾之中得之此自已本有溼熱或加惱怒而強暴動淫火能生瘡內用平肝之劑外用六星丹搽之無不痊也真旨●下疳久不愈者俗呼日臊疳儒門事親●生於陰頭為陰頭癰生於竅只為下疳瘡今但生於陰莖者皆為下疳姑從之併●下疳看法初起不紅不腫雖不舉陽玉莖微損小水自利者輕已成微熱微腫及色光亮小便赤色更兼白濁者平已損肉色紅活然無堅腫小便不疼大便不秘者可初起小便淋

潰大損陽物堅硬作疼腐爛漸開者險已成腐潰內攻傷損玉莖色紫無膿疼如針刺者重（正宗）●下疳瘡屬肝經濕熱下注或陰虛火燥治法腫痛發熱者血虛而有熱也四物湯加柴胡山梔腫痛寒熱者肝經濕熱也小柴胡湯加龍膽草黃連腫痛便澁者濕熱壅滯也龍膽瀉肝湯腫痛潰潰者氣血虛而有火也八物湯加山梔柴胡日晡熱甚者陰血虛而有熱也小柴胡湯加參朮芎歸日晡倦怠者陽氣虛而下陷也補中益氣湯其經久不愈而發寒熱者腎水不能生肝木也用六味丸若筋縮縱或爲痒痛或出白津此筋疝也用龍膽瀉肝湯氣虛者補中益氣湯加炒山梔炒龍膽陰虛火燥者用六味丸莖中痒出白虛用補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋此益肝經陰虛爲本腫痛寒熱等症爲標須用六味丸以生肝血凡脾土虛不能生金水而見一切肝證者當佐以補中益氣湯加麥門冬以滋化源（撮要）●治男子恥瘡或痛有莖之竅或痛在莖之標皆手足太陽不利熱毒下傳入手足厥陰故變紫黑色作蝕瘡毀其莖而成害以子和泄水丸散導濕毒無不愈者若已成瘡先泄其根次從標而治外以葱白黑豆汁渫洗拭乾以黃連木香蜜陀僧乾胭脂之類細末搽之如內潰膿不出以追膿散上之又用子和甘术丸如後發膿疢可用黃連木香胭

瘡等貼之丹心●陰蝕瘡之生也皆由臟中虛怯腎氣衰少風邪入腑毒惡損傷榮衛或與有毒婦人交接不曾洗淨故時痛時痒以漸成數作瘡膿水淋流若不早治命亦難保先用蛇床子地骨皮桑槐枝煎湯溫洗內服清熱消疳解毒湯外用摻藥朱用金絲膏後用紫金膏拔出毒水易能長肉並書●夫陰蝕瘡者即下疳也陰汗臊臭故莖根生疳瘡此處乃肝經所屬之分野宜滲濕瀉肝湯同止●男子陰瘡有二種一者陰蝕作臼膿出一者只生熱瘡熱瘡用黃柏黃芩等分煎湯洗之仍以黃柏黃連末傅之又黃柏煎湯洗之塗以白蜜餅●內外蛀疳身熱小便澀滯宜服小柴胡湯加龍膽草黃連車前子合●●下疳治法初起腫痛發熱小水澀滯肝經濕熱也宜瀉肝滲濕腫痛堅硬微發寒熱口燥咽乾大便秘者通利二便玉莖腫痛小便如淋自汗盜汗時或尿血清心滋腎莖窮作痒時出白漿發熱口乾津液少者益腎清心潰後腫痛小便赤澀日則安靜夜則痛甚滋陰瀉火潰爛不已腫硬又作疼痛日淺穢水不回清肝解毒紅●下疳瘡外治旱螺散玉莖破裂腫痛者鵝管散爛臭成膿者截疳散或用洗藥腎莖上生瘡久不合口者用經布燒灰蜜調塗上即愈有陰毛間生虫作痒者搗桃仁泥塗之濕陰瘡蚌蛤散銅綠散蝸清瘡津調敷[illegible][illegible]

散陰蝕瘡鳳衣散以用●下疳瘡黃檗去粗皮以豬膽汁炙透爲末摻瘡上濟世●蛀竹輕粉龍粉各等分爲末摻之全書●外蛀捍內蛀捍冰片二分輕粉六分射香五分爲細末摻孔內同上●內外蛀疳蘆並一切疳瘡蒼术三錢黃檗二錢蕪荑一錢滑石一錢水服同上●下疳瘡鳳凰衣即抱雞蛋殼內衣不拘多少輕粉片腦各少許爲末敷患處濟世●又方用白凡一兩黃丹八錢熬飛紫色研爲末以溝渠中污水洗過拭乾付上同上●又方用靈天蓋火煆爲末先用黃栢煎湯淨洗後摻藥即愈同上●下疳瘡以大豆甘艸湯漬之洗毒散煎湯浴之磨風膏溫潤之猶象●

又方用孩兒茶末洗淨傳之神効或加胡黃連等分本綱●又方孩兒茶一錢眞珠一分片腦半分爲末傳之同上●又方輕粉末乾摻之即結靨而愈同上●又方爐甘石火煆醋淬五次一兩孩兒茶三錢爲末麻油調傳立愈同上●疳瘡疼痛不能忍者片腦一分官粉煆五錢水銀三分用錫二錢製爲細末摻瘡上濟世●下疳瘡久不愈橡斗子二個合盛黃丹以亂髮纏定燒烟盡爲度同研爲末先以葱白熱漿水洗瘡膿盡次上藥甚者不過三次如神海藏●又方用五倍子末傳之準繩●陰莖頭三五孔小漏瘡出血微膿石用油髮燒作灰存性研細傳之乾則津唾調傳仍

以米飲調髮灰食前服同上●下疳瘡雄黄黄連等分爲末濕者乾摻乾者油調傳先用荊芥射干煎湯洗却傳之妙又用地骨皮末傳之神效同上●陰頭瘡蜜煎甘州傳之安外臺●又方用頭髮用鹽水洗去垢膩淨再用米泔洗過又用屠湯洗曬乾燒灰傅瘡上便結靨同上●又方蒼耳葉爲末傳之同上●玉莖作腫乳香葱白等分搗傳本綱●下部疳瘡五倍子枯凡等分研末先以齏水洗過搽之同上●又方五倍子花椒去子炒各一錢細辛焙三分爲末先以葱湯洗淨搽之一二日生肉也同上●下疳用象皮燒灰和油敷之同上●又方用溪港年久螺螄燒灰傳之同上

●下疳用母猪糞黄泥包煅存性爲末以米泔洗淨搽立效同上●又方先以漿水洗之後搽地骨皮末生肌止痛同上●又方雞卵殼炒研油調傳之同上●陰頭疳蝕雞内金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒爲細末先以米泔水洗瘡乃搽之亦治口疳同上●下部疳瘡生白果杵塗之同上●下部疳瘡橄欖燒存性研末油調敷之或加孩兒茶等分同上●下蝕瘡破細絲燒存性孩兒茶各等分研末以濃茶洗淨擦之三五次效忌生冷房事發物同上●玉莖瘡潰絲瓜連子搗汁和五倍子末頻搽之丹溪

陰陽楊梅瘡證治論

楊梅瘡有陰陽之分古人以陽屬氣虛而感毒陰屬血虛而感毒實爲有見非無晢之語也陽必高突陰必低陷陽必痛陰必痒而其色皆紅也故陽宜用補氣之藥而佐之化毒之味陰宜用補血之藥而輔之消毒之品然後外以末藥調搽豈難速愈乎（奧旨）●夫陰楊梅瘡與陽楊梅瘡大不相同此瘡色紆而不起不破乃血中受風熱之毒又云男子受女人梅瘡之穢氣相感而生治法宜四物湯內加梅瘡土茯苓等藥治之則瘥（啓玄）

翻花楊梅瘡證治論

大抵翻花楊梅瘡者是溼熱之盛表虛而毒根原致今如此宜解毒去溼熱實表補中益氣加土茯苓等類治之戒氣怒忌房事及發物無有不安之者外用點藥及粉霜加神効者之●翻花楊梅亦感淫毒之氣也視其瘡勢若重其毒反輕蓋毒欲盡情出外也古人云是虛熱表虛表虛則有之不可全歸于溼熱也總皆毒氣外發因表虛而反熾誰知因熾而補其表則表實而毒難藏轉易收功也惟是表虛不可再貪色慾不獨傳其毒而害人且虛其虛而自害故必須節飲食戒惱怒而斷房惟斷無意外之虞外用點藥數之自奏功効神矣臭言

楊梅漏證治論

楊梅漏初起似肉泡其人起薄皮膿久揭去直揭至三四十層方能穿破宜服人參茋苓湯毒未穿不用膏藥如已破貼梅漏膏待肉平去

背藥大全

国立公文書館
National Archives of Japan

楊梅痘子證治論

楊梅痘子其形細小亦是淫毒與大者相較其毒尚輕蓋其人氣體壯實感毒不重故瘡亦不惡也急用大化之藥十數劑則毒易散而痘亦易回倘恃强而仍然漁色則氣血雙耗必至輕變爲重矣輕既可以變重安在重而不可以變危乎總之楊梅之瘡毋論輕重必須速治加之絕慾則病去如掃無加世人好色甚多服藥甚倦遂至變生不測也[illegible]●楊梅痘子者是毒氣之微者宜用土茯苓湯加化裏之藥十數劑令毒盡則安宜戒房事不然輕變重重變危不可不慎也切宜珍重之[illegible]●楊梅瘡痘小如指頂遍身者先服敗毒散後用此解皮膚

国立公文書館
National Archives of Japan

風熱不過寸股桂樓皮爲末每服三錢燒酒下日三服（本綱）

楊梅疔證治論

有患楊梅瘡遍身獨有一二個形色黑紫如熏梅痛疼特甚多令遍身瘡不起發此乃楊梅疔也即如痘疔阻遏不能起發行漿無異須用針刺出血服一托裏土茯苓等劑大全

国立公文書館
National Archives of Japan

楊梅圈瘡證治論

楊梅圈瘡是生梅瘡時悞食肝腸大藏等物致令愈後復生此圈瘡是也治宜土茯苓湯加消風敗毒藥再搽之粉霜則愈若不早治然成癬矣 昏蹇

●楊梅圈瘡此楊梅瘡毒已久將要結痂而復犯房事必致作痛生圈此等治法必須大補氣血氣血足而精生精生則臟腑還元而瘡自斂痂矣不可悞認毒已未淨而仍用敗毒之劑也一用敗毒要傷損氣血終無奏功之日矣惟內用大補之藥外用調搽之天瘢易收斂且慶安全也 貝書

楊梅癬瘡證治論

（楊梅癬瘡因生梅瘡時食牛肉或又洗浴當風）並癬或行房事致令渾身腥臭或乾而起白屑或腥水淋漓治分上下多少分氣血受症用消風散入於氣血藥中消息治之外用粉霜搽之妙皆妥 ● 楊梅癬瘡此乃女子感染男子餘毒而生者也或前已生瘡用藥既痊偶食牛肉或洗浴當風抓痒或行房事以致其皮膚毒結不散乃生癬矣或血乾而起白屑或肉痒而流紅水以致淋漓臭穢者有之用蝸牛栢霜散原易奏功然內不服藥以補虛則氣血雙虧外雖即愈必須內外兼治否則日久不痊必生虫蝕及難速痊也[illegible]皆 ● 治梅癬並多年頑癬

修澤舍活板

眞阿膠三錢入桐油四兩熬數沸去阿膠即下研細密陀僧二兩收成膏藥再入乳香沒藥血竭兒茶輕粉各淨末三錢離火和勻攤貼每張加紅昇丹一二分摻上貼之百發百中（大全）

●驗方生大黃白及各等分同研擦之即消肉色如舊又方青菓核磨汁搽上即褪（同上）

結毒證治論

夫結毒者爲瘡毒氣結於四肢百骸孔竅經絡不易散解作痛作腫久則壞破潰爛不已治此症者不外乎攻補攻則毒氣去補則正氣強經曰邪之所湊其氣必虛虛者空也無也譬諸國內虛則人民離散百禍易起人之虛者亦猶是已又曰不能治其虛安問其餘蓋言虛者爲百病之本宜首舉以冠諸症也（全書）

●毒系於肝膽二經者內作筋痛攻走脇肋上至於頭下至於足轉側艱難手不能擧足不能步或頸項發塊或破爛上唇或發他經致生別病當用乙字化毒丸兼用煎劑調理毒結於膀胱並腎經者內作旁痛流注上下起核時痛發塊百會委中湧泉

各穴或陽分腐爛不已或陰囊腫脹作潰或獨脚楊黴瘡或傳他經致生別病當用癸字化毒丸兼用煎劑調理

毒結於腸胃二經者小為小塊肌肉蛀爛蔓延或發大塊破潰腿臁或手足生鵝掌風癬或傳他經致生別病當用己字化毒丸兼用煎劑調理

毒結於大腸肺經者為喉癬多作痰啞久則成天白蟻漸蝕鼻梁低陷或肌膚生癬硬黶如錢色紅紫褐過即成白點或不生癬竟成赤白癜風或傳他經致生別病當服辛字化毒丸兼以煎劑調理

毒結於心小腸經者多注瞳仁必生內障或見或不見或毒攻于本作腫或十指慘痛無時或瘡生遍體內有不易結痂而腐爛不已者或傳他經致生別病當服丁字化毒丸兼以煎劑調理全書

●結毒者熏火收遏瘡毒而沈於骨髓也又有未經熏洗見苗未久服藥不多內毒未盡便用點藥收斂禁遏毒氣者亦能致之發則先發筋骨疼痛日從漸々腫起發無定處隨使可生發在關節中則損筋傷骨縱愈曲直不便發於口鼻則崩梁缺唇齒瘥破形變相染于咽喉者更變聲音發在手足者筋骨行走原來苦楚一生毒遺數代情關一錯觸起百端初起筋骨冷痛々噤脫用酒發汗自愈虛弱者乃歸三朮湯頭疼發破者天麻餅子份吹鼻碧雲散年餘流串筋骨不愈者壬字散虛弱潰爛疼痛不斂

者十全大補湯同土茯苓煎服初起筋骨痛甚者雷火針法已潰腐爛者解毒紫金丹依法施治年遠毒盛者玄武丹兼外搽靈藥年近毒淺者只在百日自然可愈毋得再熏爲禍傷人立笑●正證因生楊梅方熾謬服水銀升煉悍燥劫藥希圖速效瘡疵盡落二時僥倖而愈不知遺害久攻故名結毒倒發其始先從筋骨疼痛隨處結腫皮色如常將爛時色方紫紅腐臭不堪以致腦頂塌陷腮唇鼻梁損壞穿喉蝕目手足拘攣等患終成痼疾初起結腫筋骨疼痛氣實毒盛者宜服化毒散氣衰者猪胰子湯主之若結毒腫魏經年難愈諸法罔効者宜西聖復煎丸主之若結毒攻本口鼻者宜五寶散主之年久臭爛鼻破損壞者宜服結毒紫金丹若天顛頂頭痛如破者內服天麻餅子鼻吸碧雲散若鼻塞不通宜吹通鼻散若結毒攻咽喉潰爛臭蝕者宜服硫黃不二散兼吹結毒靈藥吞人中白散結毒筋骨疼痛朝輕夜重喜熱手按揉者係犯寒涼宜鈴回散主之結毒已爛不斂宜貼解毒紫金丹兼擦結毒靈藥壯實者以解毒爲主虛弱者以兼補爲法以上之證各隨次第加法調治重者一年輕者半年自然可痊矣無復患慎勿妄求速效以自貽誤也余鑒●此瘡結毒發生梅瘡之後或數年三五十年者因毒未發之淨也又有父母座而遺及子孫或

已結之甚毒又甚結之後毒因發毋則筋骨疼痛三而月知則表托解毒之藥再以艾灸之則安瘡毒●搽毋之瘡不生于螵發間人毒氣而生者其毒即發不生于王莖馬口之間也惟螵波而得之必從旺莖胯以毒自此入則瘡亦自此興偏於生下疳即用補德湯大割否服不特痔瘡頭愈加楊毒之瘡亦必不生即生亦甚反斷無結毒之禍無奈世醫不知此方之妙妄用藥餌惟職敗毒不雜用補氣補血之味以致難于收功而風流子弟厭惡生瘡且歸咎醫生丞請收斂體生貪圖厚謝不補兼以祛邪不補血以化毒竟用輕粉之類以收致之毒入骨髓不敢外發一時看淨

乃為可喜于家其謝而無怨言醫生樂勝而生德色苟仍補其氣血而加之暗消之留滯毒汞月而服之則危精既足元氣自旺毒難內攻猶能外泄無加于身既苦于服藥而醫生亦倦于防危彼此相忘竟置之不論不議之夭難知收斂之後不知保守縱慾如故而毒難久留或半年或二三年來何臟腑之虛乃突而外攻矣大約毒結臟府之虛俱是難救之瘡而結于鼻與王莖者尤為難救臭肯●夫楊梅倒發者由初發時悞用水銀等劫藥之所致也夫劫藥者如搽五心搽動脉及吸氣觀燈聞香熏被等法並服輕粉朱砂靈藥等丸如是等治至三四日內則口爛之牲上丙齒

齦月以牙疼口臭腥穢難聞七日滿足即瘡痂盡落則僥倖而安矣孰不究輕粉粉霜靈藥銀硃等類名雖殊皆水銀之升煉者也譬如麥而作種種麵食名雖殊皆麥之所造者也今患者服受此毒含藏於骨髓之中沈潛於關竅之內久之遂匯則發發則筋骨疼痛隨處結腫次則破爛甚則損筋傷骨攤腦崩鼻穿喉蝕目手足拘攣苦楚一生遺害數代情關一錯禍起百端或有云再服再痊更不悟愈劫愈重唯以升加是等治非關患者之不明實由醫者之所貽也若夫以王道之法治之必先審其受病之原觀其發病之所壯實者以解毒為主虛弱衰必兼補為規一切酒症冬有次第宜隨後方調理雖至重者百日自痊永無後患慎勿忘求速効仍取自悞大減

●結毒入巔頂致頭疼脹痛如破有鵝不食艸川芎各一兩青黛二錢為末令患者噙水一口以蘆筒取藥吹左右鼻內取嚏為効內服天麻餅子或用魚鰾蛤粉炒為末每服三錢熱葱酒調服同上

●結毒發於咽腐爛疼痛湯水難入者硫黃一錢靛花一分為細末用涼水一酒鍾調服即止外吹紫粉人中白散或用紅粉塗之甚者內服五寶丹即以五宝丹吹之同上

●結毒在脚底者名曰漏蹄風大全

●凡服結毒靈藥俱以限十二日為準同上

●結毒者結無定位皆由擦瘡服藥不多內毒

未盡以致毒氣鬱遏沈伏骨髓積久外必先從筋骨疼痛漸々腫起発無定處隨便頭生発在關節則損筋傷骨縱愈曲直不便発於口鼻崩梁缺唇雖痊必破相要發於咽喉更變聲音發於手足妨於行動入於巔頂頭痛欲破兩眼腫痛用碧雲散吹鼻中頭自全痛初起仙遺粮湯金蟬蛻甲酒虛弱者芎歸二朮湯年久者五宝丹不斂者十全大補湯加土茯苓煎服毋得再黒為禍傷人也已上●每見其人並未患過梅瘡而有結毒於手足腰胯臂間者必是先患濕熱癰瘡膿毒未經提盡急求收功醫者遂用輕粉鉛粉收斂完功殊不知毒氣斂伏在內久而原瘡之旁起泡疼痛潰爛穿筋蝕骨愈而復發此為濕熱結毒內宜稀花外面須用紅升靈藥提盡毒氣待紅肉長平方可用生肌之法斂口同上●凡患楊梅瘡下疳服藥而愈久後如患後開十數證者勿作他治者結毒證也　一初起狀如瘡子後漸大而軟久則膿潰惡臭難當人不可近四圍紫而中黃白諸此輕粉之結毒也切勿作癰疽治　一初起渾身似急筋骨疼痛肉皆麻木而或有一處如刀錐刺痛皮膚不甚紅腫而紅色深隱內裏此輕粉之結毒也切勿作貼膏藥治　一遍身雲頭疣瘡而骨酸痛或時作痒抓破有白膿流出此輕粉之結毒也切勿作大痳風瘡[illegible]一頭面胸背併四肢

有生硬片狀如牛皮肉痒及痲則起白屑而痲痛此輕粉之結毒也切勿作癬治　一手足掌上常生黃皮痛痒不時狀如鵝掌此輕粉之結毒也切勿作瘋治　一遍身發紅狀如火毒心煩口渴筋骨如癬此輕粉之結毒也切勿作赤遊丹治　一遍身發紫赤紅斑痛痒不禁皆疼如解此輕粉之結毒也切勿作發斑瘾疹治　一腹疼如絞腸痧牽引渾身骨節疼痛不可忍久則便下膿血此輕粉之結毒也切勿作腸胃癰治　一惡心嘔吐吐出白水而無痰四肢不舉飲食不下骨節酸痛此輕粉之結毒也切勿作翻胃膈食證治　一喉瘡作痛忽然腫起週身骨節疼痛遂用針

於腫處剝爛惡血雖去又潰不能完口致爛蝕遍身發或腐汙舌下痛不可忍臭不可聞此輕粉之結毒也切勿作喉痹治　一頭痛或腦痛痛則皮腫耳聾目眩牽引遍身骨節疼痛輕粉之結毒也切勿作頭風腦風治

一渾身不拘顏面腿腳忽生一瘡其瘡內者監頭內流黃水久不潰膿此乃楊梅之母少覓要生本瘡即用梅瘡等藥治之不治則渾身一齊擁出治則費手矣　一父母曾患楊梅下疳而服輕粉兩瘡雖愈已身不發後生嬰兒三五日後或七八日後九竅之傍現出紅點紫斑片々若經三四日後即成小瘡狀如蛇窠啼哭不止二便不通乳不能進身熱如烙服

修澤舍治板

破如磚此父母所遺之結毒也切勿作胎毒咽癖治鳴所服輕粉而中毒非小患也輕則發之於自身損形壞質傷筋穿骨甚則遺毒流傳子孫殘則殘其筋骨盛則夭其壽命如此夭害良可悲也何愚夫之患楊梅而欲其速瘥求請庸醫則暗投輕粉以及水銀升煉靈藥合成細丸與服只圖目前之速愈而不慮日後之毒發也其害人如此可不畏哉嗣後凡患楊梅瘡者斷不可服輕粉並升煉丸丹縱楊梅瘡一時不愈終有好時決不致有結毒之大害萬勿輕聽庸醫簧口欺誑輕試輕粉之速效易愈以致貽害終身也以上十二條皆輕粉之毒切勿悞認他瘡見疑而用別藥治之不對治之不愈反增他劇也如此諸般形證雖異而病原則一惟用五寶丹服之不獨回愈且患亦能解餘蘊之毒而免子孫之遺害也大全

●凡楊梅瘡俱從濕熱邪火化毒血成治之者慣用寒涼清濕熱之藥其毒難解但不思寒則凝結熱則流通日久多成結毒純陰也故用砒硫靈藥治之是以熱攻其寒此治陰結毒之法也有患陰毒梅瘡匪熱邪火未化久而結成陽毒故用水銀升煉粉霜硃砂等凡治之之法同上

●大緊石楊梅結毒等證當指後人濟世主方用五寶丹八寶丹醫富貴人為上法若貧士另有捷徑之法治之擇而用之無不應手同上

●凡楊梅瘡而

結毒證煎劑丸藥內不可少海櫻桃半枝蓮亦不可欠洞上●結毒久爛土茯苓一觔生薑四兩共煎數碗服之不十日而愈其潰處以藥汁調麪糊之漸愈曾有陽物爛完半年不愈服此得生同上●結毒宗根活蝌蚪晒乾各等分米糊為丸每服三錢白湯送下同上

內閣文庫

外科集成卷之十七終

修澤舍活板

国立公文書館
National Archives of Japan