





夫... 胎得安
 則能成長若... 氣虛損者子... 胎為... 所苦則血氣不足
 故不能養胎所以數墮胎也其... 胎者喜... 胎也
 千金... 三箇月數墮胎法灸... 下壹寸... 柴...
 又方

赤小豆為... 酒調... 貳服亦治... 胎數...
 水尚來

刪繁方療... 胎懷胎數落而不結... 或冷或熱百病之源

甘草
 黃耆
 人參
 川芎
 白朮
 地黃
 吳茱萸

一方即...
 刪繁方...

右為朱空心溫酒調一錢忌菘菜桃李雀肉醋物

廣濟濟婦人傷胎方

方或味如法作睡少着睡勿着效鼓醋食之甚良壹月

中須全通作安穩無自身誠文仲備急崔氏延年方圓

經心錄醫家秘傳上風冷在子宮有子常落或始為婦使

患心痛乃成心疾月水都未曾來服之肥悅令人有子方

紫石英 大明冬 五味子 烏頭

卷石 烏賊的骨 雲母 尚餘根

高麗 川椒 桑寄生 石楠葉

澤瀉 杜仲 遠志 旋蓉

桂心 杜仲 人參

有折傷宜服卷石

卷石 鍾乳粉 鹿角膠 紫石英

陽起石 桑螵蛸 禹餘糧 熟地黃

挂心 川牛膝 桑寄生 北五味

蛇床子 牡丹皮 杜仲 川芎

當歸 各二錢

右為朱煉蜜圓如梧桐子大每服參肆十圓空心溫酒

香

補血養神中湯

杜仲湯並治婦人氣血虛弱不能榮

以致懷妊胎不堅固數月而墜

方見十二卷第一類補

○ 妊娠胎不長養方論第二

凡五方

夫妊娠之人有諸病。或疾而後有娠。或有娠時。節適乖理。致生疾病。並令胎動。胎動則氣血虧。氣血虧則胎不長。故須服藥。去其疾病。益其氣血。以扶養胎也。

集務。婦人懷胎不長。方。鯽魚長壹尺者。去腸肚。以水漬。沒肉。益及米。煮令熟。取汁稍稍飲之。當胎所腹上。當汗出。如牛鼻狀。雖有所。胎雖不安者。十餘日。輒壹作此。胎長大。其平安。右令錄驗。胎不長。養胎。白木。

白木

川芎 各四分 川椒 各二分 牡蠣 各二分

右澤味為細末。酒。信。...

服之後不解者。小麥。服之。已後。...

黃芩 白茯苓 甘草 前胡 陳皮 麥冬 川芎

右以咀。每服。錢。水。壹。瓊。薑。參。斤。棗。壹。枚。煎。至。柒。分。去。滓。溫。服。

養胎不長。宜服養胎。

人參

白茯苓

當歸

柴胡

刺薊

厚朴

桑寄生

枳殼

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓食前溫水吞下

調本圓調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷心虛下長

或失於料理傷動胎氣多致損墮常服益血養胎臟

白木

川芎

地黃

當歸去星炒牡蛎煅為粉川芎煅為粉

為末煉蜜為圓如梧子大空心吞下飯後吞之肆拾圓酒

醋湯亦可

補遺川芎白芍藥等分為末或女益湯下常服

安胎和氣用服進食

木散常服養胎氣美飲食

白木

紫蘇

白芷

訶子

陳皮

川芎各三錢甘草一錢

咬咀每服三錢薑三片煎溫服

又方縮砂為末米飲下

妊娠胎動安不得却瀆下方論第三 凡七方

妊娠得病發熱方附

夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損氣血枯竭既不能安胎

致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害胎氣

療胎動不安得瀉在腹母欲死瀉以牛膝湯下之

牛膝去醋水銀二兩

朱砂半兩

在得字

右以水五大瓩煮牛膝可得一半去滓即以蜜和末
及水銀研如膏每服以牛膝汁壹小瓩調下半匙服
治妊娠母因疾症胎不能安可下之 **桂心散**

桂心

瓜樓

牛膝

瞿麥各二兩

當歸 乙兩

右以咀每服錢水壹瓩煎至半分空心去滓服

又方

瞿麥

桂心 略乙

牛膝 二兩

蟹爪 一合

右為細末空心溫酒調壹錢服

又方

牛膝 乙兩

右細搗以無灰酒壹大瓩煎取七分溫二服

又方

取七月七日法麴四兩入一大瓩煎取一瓩二分神效
去滓分溫三服立下

小品療妊娠得病瀕去胎方

麥蘖一升為末和麩二升服之即下神效

文仲療妊娠得病欲去胎方

取雞子一枚以三指撮鹽放雞子中服之立出與阮河

南療產難同千金經心錄同

補遺佛手散服之即安若胎已損即便逐下

妊娠墮胎後血不止方論第四

夫墮胎後復損於經脈經脈既虛故下血不止也下血多
者便效煩悶乃至死矣

治婦人損動下血不止腹痛宜服此方

何膠二兩 艾葉半兩

石以水一大瓊煎至六分去滓溫服空心

治妊娠損動下血不止 甘草二兩 何膠二兩 雞子一個

右細坐以水二大瓊煎至五分一錢三分去滓下雞子及

阿膠候膠消掩冷停無時分溫三服

龍骨 當歸 地黃各八分 艾葉四分炒

地榆 阿膠 芍藥 乾姜各六分

蒲黃五分 牛角鯁炙焦

右為細末食前粥飲調下一二錢

治妊娠墮胎下血不盡苦煩痛欲極時發寒熱狂悶方

今

神效

神效

右以水一大瓊煎至一合取汁六分分三服調鹿角

二錢服日三服瀉更血下古今錄驗同

千金療落胎下血不止方

右以主地黃汁一小瓊調代燭末一錢日三服

治妊娠下血疼痛不止方 亦治小使不禁

右以家雞翎燒灰細研以溫酒調下一二錢如人行三里

再服以効為度

千金療妊娠胎墮下血不止方

丹參二味 十一二兩

右細切以酒五升煮取三升分三服

救急療損胎方

神效

右取朱砂末一錢七生雞子三顆取白和朱砂頓服胎
若死即出如未死即安。

補遺 催生 **神效** 又方香附子末米飲調下

娠娘日月未足欲產方第五 凡四方

集驗 **神效** 治日月未足腹痛如欲產者兼治產難及子煩
知母一味為細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚼下日三服
千金崔氏小品同 一方元如雞桐子大粥飲下十元

神效 治娠娘月數未足而似欲產腹痛者

又方 取蒲黃 **神效** 治下二十九以痛止為度

右三藥

又方 梁上 **神效** 治下二十九以痛止為度

補遺 與本卷第一論第二論數值及胎不 **神效**
內同者可通用

斷產方論第六 凡七方

論曰欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰生然 **神效**
產艱難或生育不已或不正之屬為危為難不 **神效**
欲斷之者故錄驗方以備所用然其方頗眾然多有用水
銀毒虫水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異
驗列具于后

小品方療婦人斷產驗方 千金翼外其要同

故香紙方圓一尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕也

療娠娘散去之并斷產方

枯樓 桂心 各二兩 豉 乙升

古三味切以水四升煮取一升半分服之

又方 附子二枚為末以淳苦酒和塗右足去之太膏

千金斷產方

油煎水銀一日方息空心服如棗大一圓亦斷不損人

廣濟濟胎方

括樓根四兩肉桂五兩 牛膝三兩 瞿麥二兩

右切以水七升煮三升分三服服後如人

行五里又進一服無忌

小兒胎前入效去胎方

粉草

乾薑

人參

川芎

生薑

肉桂

黃芩

黃芩

右八味等分細切以水七升煮取三升分三服忌海藻

於葉生煎

千金欲去胎

大麴五升漬酒一斗煮二沸去滓分五服服

再服其子如糜令母肥盛無疾苦

補遺 太上好生而惡殺夫新產并逐下生胎之事

為之只有德方故不此補遺既有產育累次艱難或經

危險又若無成一產惡慮產母有傷性命特設後方與

服之以稀於受胎亦不斷其產矣

四物湯每服三錢加芩藜子一撮於經行後空心溫服

又方用升麻葛根湯二兩入瞿麥土牛膝括婁根豆豉

各半兩分作八服亦於經行後便服一日二服更加芩

藜子一撮尤妙則孕育頗疎矣

川升麻白芍一兩
葛根二兩
升麻一兩

。妊娠咳嗽方論第七

凡八方

天肺感於寒寒傷於肺則成咳嗽也所以然者肺主氣而
外合皮毛毛竅不密則寒邪乘虛而入故肺受之也五臟
六腑俱受氣於肺以其時氣於其而為嗽也秋則肺受之
冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其喘嗽不已則傳
於肺肺病久不愈則傷於心

治妊娠咳嗽方論第七

冬花散

前胡

桑白皮

白朮

方及用每

五分去滓溫服

治妊娠咳嗽方論第七

天門冬

赤茯苓

計草

右咳嗽用服... 七分去滓不拘

時候服

治妊娠胎氣雍滯咳嗽

馬兜鈴

甘草

貝母

紫蘇

桑白皮

右咳嗽每服四錢水... 煎至七分去滓無時

溫服

麻黃湯治外傷風寒咳嗽不食

麻黃 陳皮 前胡各乙兩半夏

人參 白朮 枳殼 貝母

甘草 各半兩

右咳喘每服四錢葱白五寸薑半分棗三枚水壹盞煎至六分去滓溫服

百合散治妊娠咳嗽心腎不利煩悶不食

川百合 紫苑 麥門冬 苦梗

桑白皮 各乙兩半兩

右咳喘每服四錢水一錢竹茹一分煎至六分去滓入

蜜半匙更煎二三沸不拘時溫服

紫苑湯治妊娠咳嗽不止胎不安 六方出產科

甘草 杏仁 紫苑 桑白皮 乙分

苦梗 二分 天門冬 乙分

右咳喘每服三錢水一錢竹茹一匙煎至七分去滓入

蜜半匙更煎二三沸溫服

療妊娠咳嗽方

以重車燒赤投酒中候冷飲之良

療妊娠傷寒涎多咳嗽

知母 杏仁 天門冬 桑白皮 等分

右咳喘每服三錢水一錢煎至七分去滓服

華蓋散治妊娠喘嗽不止宜服之穩重而有効

補遺杏蘇湯治妊娠傷風身熱有汗惡風病證挾熱服杏

子湯不得者

橘紅 紫蘇葉 杏仁 五味子

蘇葉作四兩

再

半夏湯泡

紫白皮

貝母

白木各一

甘草炙五錢

右剉每四錢置五片煎溫服治咳嗽甚効

旋覆花湯治妊婦傷風感冒寒暑濕氣咳嗽喘滿痰涎壅

盛方見二十二卷產後第四論

散治妊婦肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急

聲重鼻塞頭目眩暈痰氣不利特發寒熱凡有方

蘇飲加杏仁五味子證治同上

凡見第一卷中風門

妊娘吐血衄血方論第八

凡二方

論曰夫妊娘吐血者皆由臟腑所傷為憂思驚怒皆傷臟

腑氣逆吐血吐血而心悶胃滿未欲止心悶甚者死妊娘

病此多墮胎也旬方

所為... 逆下有...

治吐血不止

馬勃用生布擦為末濃米飲調下此方中見

治鼻衄以白茅花濃煎汁服

補遺前七卷第五論衄鼻下補遺諸方通用

妊娘子煩方論第九

凡十方

論曰妊娘苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六月

受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子

煩也產寶云夫妊娘而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則

令心煩也傳痰積飲在心胃之間或衝於心亦令煩也若

熱而煩者但執而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫是則食

氣煩躁不安也大抵妊娘之人既停痰積飲又與熱相搏

氣鬱不舒或煩燥或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂子煩也

竹葉湯治子煩

防風

黃芩

麥門冬

白茯苓

兩

右咬咀每服四錢水一錢竹葉數片煎至七分去香服忌酸物

竹葉湯

出外室秘要與前竹葉湯同內有竹瀝三入無竹

葉指迷同

又一方無黃芩有知母

竹茹湯

療妊娠煩躁或胎不安

淡青竹刮茹

右以水一大升煮取四

升餘分服之為度

麥門冬湯

治妊娠心煩體熱嘔吐逆惡食氣頭眩四肢

情聞

文至有竹瀝三升

外室秘要

要右竹瀝三合無以竹

瀝湯

服沉重百節疼痛多用此

麥門冬

子參

赤芍藥

人參

赤芍藥

陳皮

苦棗

桑寄生

北草

旋復花

生薑

右為粗末每服四錢水一錢薑半分煎至五分去滓

無時溫服

又方

麥門冬

芎藭

黃芩

茯神

甘草

炙乙分

犀角屑

右咬咀每服四錢水一錢生地黃一分淡竹葉五

煎至六分去滓溫服

柴胡散

治妊娠心煩頭目昏重心驚煩悶不思飲食

伏神

一兩

柴胡乙兩半 赤茯苓

人參

橘紅

麥門冬 甘草

右咬咀每服四錢水一錢薑三片煎至七分去滓

人參 治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅熱

乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

家干葛

黃芩

犀角屑 甘草

右咬咀每服三錢水一錢煎至六分去滓溫服

治妊娠子煩口乾不得用

黃連

右為細末每服一錢酒飲之亦效

治妊娠心煩熱不止

葱白

右以水一大碗煎取一錢半去滓溫服

母元 治妊娠因服藥致胎不安有欲墮者

巢氏謂之子煩也

知母

右為細末以棗肉為丸如彈子大每服二丸用煎人

參湯送下。醫者不識此證作虛煩治之損動胎

氣宜矣有識者亦見有藥也產科鄭宗文得於陳

藏器本草拾遺中也用之良驗

補遺麥門冬湯治胎氣本怯心驚膽虛煩悶各曰子煩

麥門冬 夫心 防風

白茯苓 一人參 半兩

咬咀每四錢水一盞薑五片淡竹葉十片煎八分溫服

○妊娠煩躁口乾方論第十 凡四方也

夫足太陰脾之經也。其氣通於口。手少陰心之經其氣通於舌。若妊娠之人。臟腑氣虛。榮衛不理。陰陽隔絕。熱乘於心脾。津液枯少。故令心煩而口乾也。余考此證與子煩大同小異。其方亦可就子煩中通用。一用圓亦可。

川升麻

黃芩

人參

麥門冬

梔子仁

柴胡

茯苓

瓜蒌根

犀角屑各二分

右咬咀。每服四錢水一錢。煎至六分。去滓。溫服。

知母 治妊娠煩躁口乾 麥門冬 知母

知母

麥門冬

瓜蒌根

余詳註

子芩

赤茯苓各二分

右咬咀。每服四錢水一錢。煎至七分。去滓。入竹瀝。一合。更煎二沸。溫服。

葛根散

治婦人妊娠數月。曾冒風。煩躁。口乾。渴。身熱。少食。

少食

葛根野葛

黃芩

人參

黃蘗

黃耆

麥門冬

甘草炙

右每服四錢水一錢。竹茹一塊。如錢大。煎至七分。溫服。無時。

溫服無時

人參黃耆散 治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參

黃耆

家葛根

秦艽

麥門冬略

知母參分

甘草半兩

赤茯苓

吸

①

①

妙本

右咬咀每服肆錢水一瓊薑六片淡竹葉二匙煎

至陸分去滓溫服 補遺入參白朮散 黃耆六一湯皆良

參朮養木香白朮二錢

新刊婦人良方補遺大全卷十三

新刊婦人良方補遺大全卷之十四

妊娠中風方論第一

凡四方

論曰夫四時八方之氣為風也常以冬至之日候一若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名為虛邪也若從物入於虛則中之若風邪之於皮膚入於經絡則不仁若入於筋脈挾寒則攣急喝僻挾溫則弛緩若入於臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛風邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病也妊娠中風若不早治則令墮胎也

治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢強急

防風散

防風

桑寄生

葛根各一兩菊花

虛邪在經作風

聖藥

五

防已

北細辛

秦光

當歸

桂心

茯苓

甘草

羚羊角略半

右為粗末每服四錢水一錢薑三片煎至六分去滓入竹瀝半合溫服

浴姪娘中風口噤語言不得白木酒

白木

一兩半

獨活

一兩

黑豆

一合炒

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤者拗口灌之得汗即愈

治姪娘中風口眼不正手足顛痺

防風

羌活

防已

各一兩

麻黃

去節

黃松木節

壹兩

桂心

荊芥穗

羚羊角

桑寄生

甘草

薏苡仁

各半

右以咀咀每服三錢水一錢生薑半片煎至陸分去滓

治姪娘因感外風如中風狀不省人

熟艾三兩

右以米醋炒令極熟乘熱以絹帛裹熨臍下良久即省

陳總領云余女夫趙汝磐君天台親見王清叔

其嫂氏

補遺治姪婦中風排風湯續命湯參蘇飲加羌活

引風湯防風湯皆可選用方並見第三卷中風類

姪娘風症方論第二九三方

論曰夫姪娘躄虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相

搏發則口噤背強名之曰瘳文云瘳其候冒悶不識人須

更自醒良久復作謂之風瘳亦名子癎亦名子冒甚則反

張

治妊娠中風。用弓反張。口噤語澁。

麻黃去節 防風 獨活各一兩 羚羊角屑

桂心 升麻 酸棗仁炒 甘草

秦艽各半兩 川芎 當歸 杏仁製

右取咀每服四錢水一椀薑四片煎至六分去滓入竹

瀝半合溫服。

治妊娠中風腰背強直時復反張。

防風 葛根 川芎 生乾地黄各一兩

杏仁製 麻黃去節 桂心 獨活

甘草 防已各一兩

右取咀每服四錢水壹椀煎至七分去滓溫服。

小品療妊娠忽倒腹不識人。此症有不可不識者。

名為產病亦名子癰亦名子口。此症發時不可不識者。

者當先作瀝汁次辦湯也。其竹遠不可即辦者當先辦湯。

此二療命符其一種其竹瀝偏療諸症絕起死也。其偏

療妊娠產婦絕死者有效。亦見或州產金瘡發症。亦

驗。○作竹瀝法。見第一卷論。

葛根湯療妊娠臨月因發風奔忽倒腹不識人吐逆眩倒

小醒復發名為子癰。

葛根 具母去心 牡丹皮去心 木防已

防風 當歸 川芎 白茯苓

桂心熬 澤瀉 甘草各二兩 獨活

石膏碎 人參各二兩

右細切以水九升者取三升分二服具母令人易產若未臨月者非麻代之忌海濱涼性寒酥物

補遺治婦人血脈忽然閉塞人角与女張狀如中風名曰子癇亦謂之瓜瘳又名子冒宜於胎前服

羚羊角 獨活 酸棗仁 附子 五加皮 半兩 蘇合香 防風 當歸 川芎 木香 丁香 白芷 蘇合香 二

治妊婦胎動不安風寒外名症通用 治身熱甚無汗

凡妊婦風寒與前第二卷 治身熱甚無汗 治身熱甚無汗 治身熱甚無汗

夫人臟腑調和則血氣流通無邪鬼魅不能干之 胎也 虛損則精神衰弱妖魅鬼魅精符入於臟腑如懷娠故曰鬼

瘳 瘳娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛 雄黃 細研 鬼臼 去毛 莽草 州砂 細研

巴豆 心欸 瀝肝 蜈蚣 蟻 右為細末密元如梧桐子大空心温酒下二元日兩服

後當利如不利加至三元初下清水次下虫如馬尾狀 無數病極者下蛇蟲或如段如雞子或如白膏或如豆

治婦人鬼胎及血氣不可忍方 班猫 去頭鬚足製 延胡索 炒各二錢

跟脚... 作蝦...

右為細末再研如麪以溫酒調下半錢以胎下未度

治婦人虛羸有鬼胎墮塊經候不調

芫花根三兩

右剉炒令黃色為細末每服一錢桃仁煎湯調下當下

惡物

補遺治婦人鬼胎如抱一卵

六葉黃

川芎

赤芍

柴胡

歸身

巴戟

巴戟

芫花醋煮各一兩

為末煉蜜其梧子大每服一錢酒下即出惡物而愈

雄雞傷寒論第四

論曰夫冬時感寒入於經者其病即成初為傷寒輕者

浙浙惡寒發熱發熱惡寒發熱於口乃口中者頭疼身痛

傷寒論卷之四 辨傷寒病後陰陽虛實之脈論 傷寒病後陰陽虛實之脈論 傷寒病後陰陽虛實之脈論

保胎論 傷寒論 傷寒論 傷寒論

保胎論

先候後熱久而不愈則為胎前傷寒無治法

藥宜有避忌不可與尋常婦人同治也

妊娠前腹痛及冷月半或孕或去或前或後胎氣不安

產後血塊不散或亡血過多或心驚不下山加減四物湯

當歸

川芎

白芍

熟乾地黄

右咬咀每服四錢水壹碗半煎至半分取陸分清汁熱

服日四服以知為度 妊娠下血即入艾陸七葉阿膠

末壹錢同煎痰勢甚大散藥不效以肆味各半兩細剉

以水肆碗煎至二碗半大滓分四服食前熱服壹日之

中令盡以知為度平常產乳服至 胎前如虛弱血脈

不調不壹月止。因虛致熱熱服而持口舌乾渴飲飲

水者加括樓根壹兩麥門冬叁分。腹中刺痛惡物不
 下。如惡留歸芍藥各壹分。血崩加地黃蒲黃各壹兩。
 因熱生風加川芎壹分柴胡半兩。身熱脉躁頭昏項強
 加柴胡黃芩各半兩。大便秘結加大黃半兩桃仁壹分
 炒。如大便滑泄加桂心熟附子各壹分發寒熱加乾姜
 牡丹皮芍藥各壹分。嘔者加白朮人參各半兩。腹脹
 加厚朴枳實各壹分。虛煩不得眠加竹葉人參各壹分
 煩躁大渴加知母石膏各半兩。水停心下微吐逆加
 猪苓茯苓防己各壹分。虛寒欲類傷寒加人參柴胡防
 風各叁分。

治

症婦傷寒溫疫時氣先服此以安胎宜...却以治病
 藥用間服

阿膠湯在心上

阿膠

白朮

桑寄生

人參

白茯苓

右等分為細末煮糯米飲調服方寸匕日叁服

症婦傷寒增寒發熱當發其汗

葱白十莖

生薑二兩

右細切以水二錢煮取一錢連服取汗愈

症婦傷寒頭痛壯熱服節煩疼

石膏十二分

前胡六分

知母

枳子仁各四分

黃芩

大青五分

右以咀每服伍錢水壹錢半葱白三寸煎至調分去滓

溫服集驗文仲備急救急同

症婦傷寒或中時行洒浙作寒振慄而悸或加喘者

治

治

蘇木湯

赤芍藥 橘紅 黃芩 黃連

甘草 蘇木等分

右咬咀每服五錢水一錢煎至陸分去滓溫服汗出瘥若胎不安兼服

治

妊婦寒熱頭疼黑黑不飲食臍下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解宜服

柴胡 黃芩 人參 甘草

右咬咀每服五錢水一錢半煎至一中錢去滓溫服

治

妊婦傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛項背拘急口乾躁煩柴胡石膏湯

以上治方

以上治方

治

妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹上氣渴不止飲食不多腰疼身重

枳實 陳皮 麥門冬

右為細末每服二錢水一中錢生薑半分葱白七寸煎

至六分去滓溫服

治

妊婦傷寒頭目旋疼壯熱心躁煩

旋覆花 赤芍藥 甘草 前胡

石膏 白朮 人參 麻黃

黃芩 各三分

右咳吐每服四錢水一錢半。姜半分煎至六分去滓。服

麥門冬湯 治 妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安
人參 治 石膏 各一兩 前胡 黃芩 各二分

家葛根 治 麥門冬 各半兩
右咳吐每服五錢水一錢半生薑四片棗二箇淡竹茹

一分煎至八分去滓溫服
妊婦發斑變為黑色尿血直搗子大青湯 治 聖心名入參散方

升麻 梔子仁 醋一 大青 杏仁
黃芩 各一兩半

右咳吐每服五錢水一錢半葱白二寸煎至一錢去滓
溫服
治 妊婦傷寒五箇月已前常用此方 治 聖心名入參散 治 傷寒雜要

黃芩 治 聖心名入參散 治 傷寒雜要

白朮 八錢
右為細末酒調服方寸匕日二服產後自服

當歸 治 聖心名入參散 治 傷寒雜要

茯苓 白朮 各一兩 白芍藥 一斤

白朮 治 聖心名入參散 治 傷寒雜要

前胡 赤茯苓 川芎 各一兩 甘草

半夏 各半兩

右咬咀每服四錢水一中瓊姜四片淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服

栗胡散 治妊娠熱病骨節煩痛頭疼壯熱若不治熱不止則損胎

柴胡

家葛根

知母

梔子仁

甘草

各半兩

石膏一兩

大青

黃芩

升麻各二分

右咬咀每服四錢水一瓊葱白三寸煎至六分去滓無時熱服

麻黃散 治妊娠五六箇月傷寒頭疼壯熱四肢煩疼

麻黃

桂心

柴胡

赤芍藥各二兩

甘草

半兩

右咬咀每服三錢水一瓊姜三片煎至六分去滓無時溫服

升麻散 治妊娠傷寒頭痛身體壯熱

川升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃各一兩

黃芩

大青

各半兩

石膏一兩

右咬咀每服四錢水一瓊姜半分淡竹葉二七片煎至六分去滓無時溫服

治孕婦傷寒

柴胡

前胡

川芎

當歸

人參

芍藥

粉草

生地黄半分

右為細末每服一錢姜三片棗四箇煎至七分去滓溫服

服後出汗加葱

治孕婦傷寒

白朮

黃芩各等分新瓦上心

右為散每服三錢水一中盞姜三片棗一枚煎至七分
溫服但育頭痛發熱便可喫二三服即瘥唯四肢厥逆
陰證者未可服此方本常州一士人賣此藥醫婦論症
售夫行醫用之如神無入得此方予自得此治疾無有
不効者仍安胎益母子

治妊婦傷寒頭疼腹痛

升麻

黃芩各六分家乾芍

大青

石膏

甘草各三分苦竹葉

一兩並細切

右用水一升半先煮苦竹葉乾薑減一半入諸藥并煮
至六合吳澤溫服

補遺言蘇散治妊婦外感風寒渾身壯熱眼赤頭疼心胃

婦人產後發熱赤邪即安

熟地黃

川芎

白芍藥

白朮

麥門冬六分陳皮

乾芍藥

黃竹葉各一兩

每服錢五片煎白三寸煎溫服

婦人產後

治證同上

○ 妊婦時氣方論第五 九二方

論曰夫四時之間忽有非節之氣如春應暖而反寒夏應
熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反勝非其時而有其
氣而一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者多挾於
表毒也言其時皆行此氣故云此時氣也妊婦遇之重者
致傷胎也

○ 治妊婦時氣五六日不得汗口乾多與冷水

秦光

柴胡各二兩

石膏二兩 赤芍

前胡

甘草

犀角屑

家葛根

川升麻

黃芩各半兩

右咬咀每服四錢水一錢姜半分淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服

高麗參

治妊婦時氣煩熱口乾頭痛

家乾葛

麻黃去節湯去骨一兩 豉一合

白米半合

梔子仁二錢 葱白一握

右細切以水一大瓊煎至一瓊三分去滓無時分溫三服汗出為効

消熱散

治妊婦時氣六七日熱甚大小便不利最宜

川芒消一兩細研

葵子二兩

右如神效

散

赤茯苓湯

皆可用此

非麻葛根湯

內川白芍

妊婦熱病方論卷六

九方

論曰夫冬時感寒其病自傷之藏於肌骨身至乃發壯熱又為暑病即熱病也此寒氣蘊積發即為病若妊婦遇之多致所胎也

經云熱病與中暑相似但熱病者脈成帶中暑者脈虛治妊婦熱病壯熱頭痛嘔吐不止不食心虛煩悶

之參心方五竹茹

家葛根一兩

麥門冬去心乙兩半

知母二兩

右咬咀每服四錢水一或連根葱白三寸煎至七分去滓溫服。

胎欲落 治妊娠熱病班出黑色小便如血氣急欲絕。

施子仁 升麻 石膏 生乾地黄

黃芩 大青 各乙兩

右咬咀每服半兩葱白七寸豉四十九粒水一或煎藥五分去滓無時溫服救急有杏仁無地黃石膏。

大黃散 治妊娠熱病陰赤目熱入腹中大小便秘澀苦

川大黃 微炒 石膏 各乙兩 知母 前胡

赤茯苓 施子仁 甘草 黃芩 各半兩

右咬咀每服半兩水一大匙煎取一分煎至五分去滓無時溫服。

又方 以伏龍肝細研無時水調下三錢煎取一分。

又方 以家葛根煮汁無時服壹小錢。

補骨湯 治妊娠熱病頭暈心煩嘔吐不食。

知母 四兩 青竹茹 三兩

右坐每五錢生荊根一握粳米一握煎溫服。

施子五物湯 治妊娠傷寒壯熱頭痛。

施子 前胡 知母 各二兩 黃芩 一兩

石膏 四兩 劉散每五錢水煎溫服。

升麻湯治妊婦六七月傷寒熱病赤斑變黑溺血

升麻 梔子仁 各二 大青 杏仁

黃芩 各一兩 剉散每五錢葱白三莖水煎溫服

○妊婦傷寒熱病防損胎方論第七 九七方

論曰非節之氣傷於妊婦熱毒之氣侵損胞胎遂有墮胎漏血俱害子母之命也

治妊婦傷寒發熱痛壯熱不急治則胎落

葱白 切乙升前胡 家葛根 石膏 各十分

青黛 六分 升麻 八分 梔子仁 十二分

右取咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服

治妊婦時氣頭痛腰背強壯熱

升麻 青黛 前胡 梔子仁

黃芩 各一兩 升麻 各一兩

右取咀以水五升煎取二升半去滓分溫三服

治妊婦六七月傷寒熱入腹六小時候發熱不吐蒸熱

前胡 十分 大黃 石膏 梔子仁

知母 梔子仁 扶苓 生薑 各十分

右水八升煎取二升半後下石膏更煎二五沸分作三服

服

治妊婦傷寒苦熱不止身上斑出勿心赤黑小便如血氣

欲絕胎欲落

梔子仁 升麻 各四兩 青黛 二兩 石膏 八兩

葱白 切一升 黃芩 三兩 生地黃 十分

右取咀以水九升煎取三升去滓作三服忌熱物

治妊娠時氣身大熱今子不落護胎方

伏龍肝 研令極細

右水調塗臍下一寸乾則易去即止消清亦可

又方

井中泥塗心下乾則易去一方出本草片錄有效

又方

浮萍

川朴消

蛤粉

藍根 等分

右為末水調行臍上安胎解煩熱神妙

加遺治如婦熱病先以此藥敷臍上良效

白朮

黃芩

右為末每服一錢茶下

發熱便閉

雄雞散病

論曰熱病胎前腹中打倒者此散最為神效至六七日以後臍腹極熱者服此散即愈其胎不能自出但服此散散其胎即出矣其胎已死但看產母舌青者是其候也

果神散

又名烏金散

靈苑方名肉桂

桂心

當歸

芍藥

甘草

乾姜炒

生乾地黃略熏

附子 炮

右為細末每服一錢空心溫酒調下

陳先擇評曰夫妊娠謂之重身一命係之打理失其是罷

損胎不特病重者所致或因顛仆驚恐出入觸及寒者

妊娠瘧疾方論第九 九四方

論曰夫妊娠瘧疾者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣騰理虛而風邪乘之動前暑熱陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱發若邪動氣至交爭則發故瘧休作有時其發寒時節漸晏者此由風邪客於風府循脊而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日晏其發日早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶之內十二日入脊內上注於伏衛之脈其行九日出缺盆之內其氣既上故發早其間日發者由風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故間日播積乃發也妊娠而發則寒熱之氣相迫傷於胎故多損動也治妊娠瘧疾不差出傳驗方千金救急古今雜驗同

此方同前

術

右切以水陸升煎取一升半去滓分三服第一服未發前二服後乃進粥飲忌生葱菜集驗文仲備急同

金瘡如建康方 竹葉湯 西石膏 西碎糯米百粒

右切以水陸升煎取一升半去滓分三服第一服未發前二服後乃進粥飲忌生葱菜集驗文仲備急同

額及背前五心藥洋置頭邊當發一日勿進水及飲食

發過後乃進粥飲忌生葱菜集驗文仲備急同

黃芩 麥門冬 去心各一兩 石膏 二兩

治妊娠瘧疾寒熱頭痛心煩

甘草 半兩 烏梅 十四个

右咬咀每服四錢水一瓊煎至陸分去滓溫服

治男子婦人一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多

或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日或間日

發或三四日一發不問是瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似

瘧者並皆治之

常山 厚朴 黃芩 青皮 陳皮 白朮

甘草 檳榔 草藥 去皮

右等分咬咀每服半兩於未發時夜用米一碗酒一瓊

煎至一大瓊溫出將一宿却將滓掛用酒水更依前煎

一次去滓別以磁盛貯亦露一宿來日當發之日溫溫

面東常服頭葉少欬再服藥性大有神效

乃要取... 秦末石林... 作服法... 物片時

心身... 痛... 又有... 驅邪... 散...

驅邪散

高良薑 白朮 草果仁 陳皮

藿香 白茯苓 各一 甘草 炙半兩 縮砂仁 七錢

咬咀每四錢姜五片棗一枚煎溫服

婦人胎前產後諸疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾心
家煩渴大小便赤澀不進食脈弦數者

片皮 厚朴 姜炒 白朮 草果

茯苓 半梟 黃芩 柴胡

咬咀每四錢姜三片煎溫服

厚朴 姜炒 枳殼 炒

治婦人胎前產後諸疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾心
家煩渴大小便赤澀不進食脈弦數者

白朮 厚朴 姜炒 枳殼 炒 柴胡 黃芩 茯苓 半梟

咬咀每四錢姜三片煎溫服

五子 亂下病後更宜 如此病後更宜

痛鮮紅發熱而身重者為傷風濕也若身重而痛
故也風折於氣皮膚骨節故血氣不得流通故令身重
邪乘其經脈氣上衝頭則頭痛風氣入於腸胃則泄瀉
逆則嘔逆故為吐瀉也吐瀉甚者則多煩臟腑虛故也又
手逆或陽氣暴竭則四肢逆也妊娠之病吐瀉甚者則傷
胎也

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 去芦 厚朴 姜炒 橘紅 各一兩 當歸 炒

乾姜 炮 桂枝 各半兩

右為散每服四錢水一椀棗三箇煎至六分無時溫服

白朮散 治妊娠霍亂腹痛吐逆不止

白朮 益智仁 枳殼 製 橘紅 各一兩

足 而王 同

草豆蔻煨去良姜炒各半兩

右為散每服三錢水一錢姜半分煎至六分去滓溫服

無時

木瓜煎治妊娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸湯洗炮生薑切各木瓜切半

一六有茴香一分甘草一錢葉更半兩加紫蘇葉煎

右細剉水二錢煎一錢二分去滓分三服無時執服

一方**山芎散**治妊娠霍亂吐瀉心煩悶亂作渴

右用糯米一合泡令淨細研以水一大碗研濕取汁入

蜜一合生薑汁半合相和渴即頓服立止縮脾飲煎

五苓散 局方 **調子散** 理中丸 局方 **調經湯** 局方 **調經散** 局方

夏月預宜合此以防霍亂若有是證以此藥煎已上五方之其效神速但要極冷服

批點十字經三作並見三

治吐瀉霍亂吐瀉不止局方 此四字詳本

藥太急致煩躁者宜沉水冷頓服

草薺仁三四兩烏梅肉三四兩甘草二兩

右以明母服半兩水壹碗生薑十片煎至捌分浸以熟

水溫冷任意

補遺治妊娠霍亂發熱煩渴脈數陽證者局方 此四字詳本

人參白朮散

人參白朮

伏苓 人參 甘草

木香 藿香各半兩 乾薑一兩

為末白沸湯調二錢吐甚者加生薑汁頻二飲之

惟婦霍亂腹痛四肢逆汗出脈虛弱者理中湯治之因

傷食者湯中加陳皮青皮及寒其脉欲絕而脈不至者其可

湯中加附子脹去及痛並見局方

妊婦理亂吐利稍定但轉筋攪悶抽痛不可忍宜用

木瓜 吳茱萸 一兩 茴香 半兩 甘草 一兩

咬咀每兩錢薑五片藟菜十葉益小撮煎服

新刊婦人良方卷之四 婦人經水不調

新刊婦人良方卷之四 婦人經水不調

妊婦吐瀉

論曰凡妊婦吐瀉者其病不一或黃白或赤或水或下
化腹痛腸鳴其脈弦而緊其病多由胃氣不和或中氣
泄注如水或泄瀉及有完穀不化或腹脹滿或時時
時時嘔逆或下利清水或小便不利或熱則煩渴或入
數由乘虛熱入於胃或於胃中津液不化併於胃中
協熱利先以五苓散利小便次以黃連阿膠湯或
艾湯凡吐瀉者宜有沫腸鳴腹脹滿者宜用五苓散
小數謂之冷熱不調宜用五苓散或黃連阿膠湯
穀或化或不化腹脇或脹或不脹或痛或不痛或
氣全不思食其脉內虛外實者關脉沉緊者謂之死也

去沉積且感應元後調和之。凡治瀉先須理中焦如
中湯元是也次即分利水穀始五苓散是也治中不效然
後漸下即消渴餘糧赤石脂是也論遠方通用

厚朴 治妊娠痢泄寒中

右等分先杵令爛水拌同炒令乾用為末水煎麩糊為
食如梧桐子大每服五十食前飲下

厚朴散 治妊娠藏氣木虛宿挾風冷脾胃久弱藏府虛滯
脘腹疼痛日夜無度

厚朴散 治妊娠痢泄
右咬咀每服三錢水一錢姜三片煎至七分去滓熱服

三黃散 治痢

聖中
戊巳元
瀉瀉
風濕
加肉
水宜
利身
此言
妊娠
論曰
腥肥

瀉瀉 風濕 加肉 水宜 利身 此言 妊娠 論曰 腥肥
瀉瀉 風濕 加肉 水宜 利身 此言 妊娠 論曰 腥肥
瀉瀉 風濕 加肉 水宜 利身 此言 妊娠 論曰 腥肥

夜痛膿血赤白雜下古書所謂帶下是也原疾之由皆因
 冷熱不調大腸虛冷熱氣客於腸間熱氣乘之則赤冷氣
 乘之則白冷熱相交則赤白相雜而運滯水止名為帶下
 也其狀白膿如涕而有血雜亦有血少者如白膿涕而有
 赤脉如魚腦此名魚腦痢又有血痢者熱乘血入於大腸
 為血痢也血之隨氣外行經絡內通臟腑常無滯積若觸
 胃勞動生熱熱乘血散滲入大腸腸虛相化故成血痢也
 療妊娠患痢膿血狀如魚腦隨小腹絞痛難忍
 阿膠二 地榆二 酸石榴皮三 薤白一
 黃連一 方是謂之魚腦
 右用水七升煎取二升溫分三服忌生冷肥膩
 療妊娠白膿痢腹中冷

右用藥七升煎取二升溫分三服忌生冷
 療妊娠腹痛下痢膿血不止
 黃連一 枳實一 石枳皮一 當歸一 阿膠一
 熟艾一
 右用水六升煮取二升溫分三服忌如前
 療妊娠腹痛下痢膿血不止
 黃連八分 厚朴一 阿膠一 當歸六
 艾葉一 黃蘗一 乾薑五分
 右為細末空心米飲調下方寸匕日三服
 療妊娠臍下刺痛大便白晝夜三五行
 根黃蘗一 枳實一 大黃一

右以根黃為末研蒜作膏為元如梧子大空心粥飲下
三十元日三服妙

一方不用根黃用當歸以芍藥煎湯吞下

療妊娠痢黃水不絕

厚朴薑汁炙黃連二兩 肉豆蔻五箇

右用水二升煮取一升頓服忌如前此上陸方

文作療妊娠下痢不止方

黃蘗 乾薑 赤石脂兩 酸石榴皮一

右細切以水八升煮取二升分三服

古今錄驗療妊娠下痢方

酸榴皮 黃芩 人參 檉皮各一

粳米三合

右細切以水七升煮取一升分三服

療妊娠挾熱下痢冷熱不調千金翼同

黃連一升 黃蘗一升 梔子一升

右為末每服五錢水二碗浸三時久煮十沸頓服瘧者

加橘皮壹兩生薑二兩亦治丈夫常痢

壹方治中暑挾熱下痢無梔子仁用真蘇羊脂煎服

肘後方療妊娠下痢亦白如魚腦腹中絞痛

阿膠沙 黃蘗 地榆 當歸各一

川芎 酸榴皮各二

右為細末葱白粥飲調二錢

療妊娠下痢腹痛不食

蘇白切一合 當歸炒 地榆各一兩 甘草半兩

二升字每下

千金方

糯米一合

右為散以水柴升煮取二升去滓温分三服。

療妊娠下痢腹痛小便澀

糯米

常歸

黃耆

右細切和停以水二錢煮取一錢二分去滓温分肆服

治妊娠臨產下痢

右梔子不以多少燒存性為細末每服一大匙空心熟

水調服甚者連進四五服即止

治妊娠藏府氣痛頭併下利時時吐酸氣漸澀難轉復面

逆痿黃不美飲食

厚朴

白朮

川芎

白芍藥

當歸

熟地黃

人參

可子

右

療

烏雞子

黃丹

右每服

補遺

陳米赤白相雜

可與八卷滯下

論曰夫妊娠大小便不通者由藏府氣實而生於熱熱

論曰夫妊娠大小便不通者由藏府氣實而生於熱熱

隨停之取則成病也若熱結於大腸則大便不通結於小腸則小便不通若大小腸俱為熱所結故煩滿而大小便皆不通也

小品療姪娘子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服... 太山赤皮甘遂

右宜味為末以白蜜貳合和服如大豆粒多覺心下煩得微下者日清服之之後還將猪苓散不得下白兩服

漸至半錢以蜜為丸如紅心綠同猪苓散

古今錄驗得病六七日以上身熱入藏大小便不

利安胎除熱葵子湯

葵子

右以水伍升煮取壹升去滓盡服須臾當下便愈

又方葵子 川朴消 每服三錢水煎服

治姪娘大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食

檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通

郁李仁 北五味 桑寄生 甘草

苦梗

右為粗末每服叁錢水壹錢煎至陸分温服

治姪娘大小便不通熱閉心膈腹脇妨悶妨害飲食

大黃 木通 檳榔

大腹子 訶梨勒

右為末以童便壹錢葱白壹寸同煎至陸分調下貳錢

不

治胎前諸疾或因怒中氣充于臍或充于腰腹或
肚脹腹腹時疼可思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難
小便忽澀產門忽腫

常歸

赤茯苓

枳殼

白芍藥

川芎

川白薑

木香

粉草

右以咀每服

入錢水壹錢半煎至五分至別分去滓

無時溫服如覺受氣弱及南入枳殼減半如氣實及北

入於內加分兩服之或連日大便澀油加蜜同煎

初產治婦人便秘方

枳殼

枳殼

枳殼

右為細末沸湯煎服清氣通心口方

又治虛癆大便秘方

枳殼

枳殼

右為細末

枳殼

枳殼

又方

枳殼

枳殼

右為細末

枳殼

枳殼

又方

枳殼

枳殼

右為細末

枳殼

枳殼

又方

枳殼

枳殼

右為細末

枳殼

枳殼

又方

枳殼

枳殼

小便赤澀

枳殼

枳殼

天黃散

枳殼

枳殼

為末葱白湯下二錢

枳殼

枳殼

妊娠小便不通方論第四九方

枳殼

枳殼

論曰夫妊娠小便不通者由小腹有積聚入於膀胱

枳殼

枳殼

聖惠方
卷之六
婦人方
同上 主治取同方

右一味為末每服二錢米飲調下小水利則愈
一方無茯苓有榆白皮一兩

治婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息以膝
系于室不得滿故致此病名轉膝但利小便則愈以此藥
有茯苓故也

熟地黄

山藥

山茱萸

附子

桂心

牡丹皮

茯苓

澤瀉

右為末蜜元如梧子大每服三十元空心溫酒下

補遺治淋婦小便不通阿膠一片炙軟和葱搗爛封脐下
仍以滑石末濃煎車前子湯調下

姓娘子淋方論第五 凡五方

腫

小品

川大

赤芍藥

猪苓

甘草

枳實

甘草

右吹咀每服肆錢水宜殘煎至二分去滓
經心錄療妊娠患子淋小便澀少或數或痛

地膚草

右細切水肆升煮取貳升半去滓分服日六服文仲

小品同

赤茯苓 患淋小便澁不利小腹水道熱痛

冬葵子 壹升 芍藥 貳兩 黃芩 赤茯苓

車前子 各壹兩

右以咀以水柴升煎至貳升溫分叁服

療妊娠數月小便淋澁疼痛心煩悶亂不思食

桑白皮 木通 黃芩 芍藥 枳殼

右為粗末每服肆錢水壹碗煎至陸分溫服

療妊娠子淋小便澁痛

冬葵子 滑石 木通 各等分

右為末每服肆錢水壹碗煎白米寸煎至陸分去滓服

方見本草卷第三論

療胎前諸般淋澁小便不通

赤芍藥 等分 生剉每五錢水煎溫服甚効

安胎散 子淋甚妙

麥門冬 通草 滑石 當歸

燈心 甘草 人參 細辛 等分

細末每三錢煎麥門冬湯調下

妊娠遺尿方第六

療妊娠尿不知出時胎滿故也宜服白薇散

白薇 芍藥 各壹兩 為細末酒調下二錢

又方 白礬 牡蛎 等分

凡三方

濕

同

同

同

同

同

右為細末温酒調服亦可治

又方 用雞毛灰末之酒調方寸匕亦見第八卷第四論

補遺 桑螵蛸散治妊娠小便不禁

桑螵蛸十二箇炙 空心米飲下

又方益智子仁為末米飲下亦効

妊娠尿血方論第七

凡五方

論妊娠尿血者由勞傷經絡有熱在內熱乘於血而得熱則流溢滲入解故令尿血也

千金療妊娠卒下血及子淋方三方並出外臺

葵子壹升

右以水伍升煮取貳升分温叁服

又方

生艾葉壹斤研冬服

右以酒五升煮取貳升分温叁服

又方

生地黃

右以酒肆升煮取二升分温三服亦療落身後血

續斷湯治妊娠下血及尿血

當歸

生地黃各一續斷半兩

赤芍藥一分

右為末空心葱白煎湯調下二錢

療妊娠尿血

阿膠

熟地黃

右各等分為細末空心粥飲調二錢

補遺 薑蜜湯治妊娠小便尿血

生薑七片

蜜半盞

白茅根一握

濃煎服

五苓散

去桂加阿膠每四錢用車前子白茅根煎温服

又方白茅根濃煎湯吞爛餅食

凡十一方

產寶論曰夫妊娠腫滿由藏氣本弱因產重虛土不尅水

而散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無

擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜脚腫俗呼為皺脚亦

有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若

中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也凡妊娠經血

壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏脾胃蒸

濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫

滿也然其由有自或因泄瀉下痢藏府虛滑耗損脾胃或

因寒熱瀉利引飲太過濕漬脾胃皆能使頭面或手

清

足浮腫也然水積於胞兒未成形則胎多損壞及其胎生

日脚微腫乃胞藏水少血多水出於外故現微腫則易生

也倘有寒氣因寒冷所觸故能令腹脹腫滿也

產乳藥養子論

妊娠自三月成胎之後胎氣自脚而漸腫腿膝以來行步

艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水

出者請之子氣直至分娩方消此由胎人喜有風氣或他

任經有血風未可安投湯藥亦恐大限其首慮胎產之際

費力有不測之憂故不可不治於未產之前也古方論中

然曰臣請錄之胎遂墮身形而色黑此妊娠足腫之証見於古者參巢氏病源中但有子煩之論千金并產寶要亦畧言之劉禹錫續傳廣信方以謂妊娠有水氣而成胎太平聖惠亦言之皆非也元豐中淮南陳景初名醫也獨有方論治此病方名初謂之香附散李伯時易名曰散也

天仙藤散方

天仙藤洗去香附子炒陳皮甘草

烏藥不須要天台者但得較口苦而轉者良

右等分淨秤為細末每服參錢水壹大瓊薑參片木瓜參片紫蘇參藥同煎至藥分放溫澄清空心食前服日參服小便利氣脈通體輕腫漸消更不須多服元豐中居金陵李家病以詩贈景初曰李氏實兼有願君藥石功到家何所寄一一問紅酒知此處方得於李伯時家

產寶要錄妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓杏仁 檳榔 旋覆花

郁李仁

右為粗末以水噉并煮取二升去滓分溫二服

崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急痛

茯苓 白朮 旋覆花 杏仁

黃芩

右細切以水柒升煮取貳升半分溫參服忌桃李薑

療妊娠遍身洪腫

酢

葶藶子拾分 白木二分拾 茯苓二兩 桑白皮二兩

郁李仁八分

右為粗末以水陸升煮取貳升分溫飲服小便利即差

又方

澤瀉

葶藶略二

茯苓

白木略六

白木略六

右細切以水陸升煮取貳升分溫兩服小便利即差

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治

澤瀉

桑白皮

木通

枳殼

積殼

赤茯苓五分

右為粗末以水陸升煮取貳升分溫兩服小便利即差

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

商陸赤小豆湯

治妊娠手足腫滿急

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

千金要方 治妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

白木五分

茯苓四分

當歸

芍藥略二

右細切以鯉魚湯煎修事如食法煮取汁去魚不用每

服四錢入魚汁壹瓊半薑桑片橘皮少許煎至桑分

澤空心服集驗同

商陸赤小豆湯

治妊娠手足腫滿急

亦治 浴妊娠氣喘身腫腹脇浮腫喘急大便不通小便

赤小豆

高陸等分

右咬咀每服壹兩用水壹碗煎至柒分澄清清汁服集驗

千金方有澤漆 產寶方無澤漆有桑白皮

茯苓

白木略肆

乾薑

甘草略

杏仁

右咬咀每服壹兩用水壹碗煎至柒分澄清清汁服

指迷方治胎水

藥

大腹

桑白皮

橘皮

桑白皮

大腹

桑白皮

右咬咀每服壹兩用水壹碗煎至柒分澄清清汁服

去滓空心服

一方云無杏仁

治胎水

羌活 獨活 等分為末酒調下

治妊婦兩脚浮腫名曰胎脚因脾氣不能制水血化成水所致生料

妊娠腹內鍾鳴方第九

凡一方

治孕婦腹內鍾鳴用鼠屎前後土為細末研麝香酒調下

補遺治孕婦腹中兒哭用川黃連濃煎汁母常啣之

龍彥德孕癰方第十

凡一方

治孕癰方立効

烏藥研細粉

右用水一瓊牛皮膠一片同煎至七分溫服

醫治孕中自難後以仁者汁飲之

。妊娠不語論第十一 無方

孕婦不語論第十一 如此者不須服藥臨產月但服保
生元四物湯之類下便語得亦自然之理藥之功也
醫家不語論人臨月時尋常之藥產後能語則以為醫
之功也此功也此功也此功也此功也此功也此功也
此功也此功也此功也此功也此功也此功也此功也
此功也此功也此功也此功也此功也此功也此功也

經云飲食自時... 傷脾胃效... 未青宗... 傷脾胃效... 未青宗... 傷脾胃效... 未青宗...

木香

右為...

白木...

白朮

川芎

右為...

香正...

香正...

妊娠論第十三凡一方

許... 婦人... 不應... 益... 婦人... 不應... 益... 婦人... 不應... 益...

傷欲哭象如神靈數欠者大棗湯予急令治藥盡劑而愈
古人識病製方種種妙絕如此試而後知

大棗湯治婦人臍燥悲傷欲哭象若神靈數欠者此日主之

其早三兩 小麥一升 大棗十枚

右咬咀以水陸升煮取參升去滓分溫參服亦補脾氣

專治婦人方名甘草湯

下效欠所
在藥中習業
皆先主位
非大棗湯
投而愈矣

補遺 恐山如湯治婦人心驚驚悸燥非悲傷不止又治虛

煩其効

麥門冬 小麥 半夏 人參

白朮 芍藥 甘草

右坐... 鐵姜五片 棗一枚 桑竹茹 塊茹 同

煎溫服

又治胎... 悲白哭白笑用紅棗燒存性米飲調

新刊婦人良方補遺大全卷之十五

新刊婦人良方補遺大全卷之六

坐月門

妊娠疾病既明須知坐月避忌故以次之

產寶方周頌序第一

頌聞至靈者人最重者命人皆知命之所重而不知養命之方天年未終疾病攻奪嗟乎世無良醫者述則難愈卒素醫其舛誤多矣醫之中惟產難為急子母性命懸在片時頌勤志方書常思救療每覽名醫著述皆誌於心且夫男女構精陰陽分氣就中女弱疾狀頗多蓋其稟氣質以為人有血藏而抱育妊娠之內導理有常至於飲食之間動靜之際尤多制忌以節性情及乎既產鮮保安者蓋是損觸藏府傷動筋骨將理稍失疾患便生更值百毒取

次下藥致其所孕精漸懸危日復一日亟至于死可不痛哉故易曰天地之大德曰生則知在天地之間以生育為本又豈因生產而反危人之命乎自惟攝理因循經此差謬致其產婦不保安全且婦人生產方二三次血氣未衰飲食易進但能前性則無病生縱或偶有微病不難醫治至於四五次迫乎七八次滿腹已深血氣衰微子藏虛弱穢敗內滯風邪外攻若不病生宜須審療醫若不子細疾便危殆此醫殺之理甚明矣且社俗之家婦人產後復乳其子產既損氣已甚乳又傷血至深藏命耗神莫極於此稍失常理便合急醫或以家貧不及厚賂醫者醫者怠慢須臾困篤呼人之生產非小事也而醫者圖財侮而致死此醫殺之理又明矣且夫產前產後血氣未寧一疾苟生

百疾同作古人所以著方論於產乳者正在此也至如魚阿膠能治胎動者當歸善於胎動胎動者非一理也胎動不安者痛亦如之此略舉大綱蓋須知醫者之功以降及也黃益血生薑助氣芍藥止痛黃耆補虛用之得門其効如聖用之失理不如不醫乃知醫人不可苟作類以此疾心常思著方以濟危而學解不博未能自信所以偏採洋術志在廣行復見有般產寶胎方深入醫門乃大中歲相國南敏中傷茲婦人多患產難詢訪名醫思救人命或人舉般相國迎召問其產乳般乃撰方三卷贊於相國相國重其簡要命曰產寶此方雖存得者甚少類志在愈疾常恨不家藏一本故輒取序之蓋欲開其衆聽凡五十二篇三百七十一方兼拾晉氏之遺作

小論三篇次於序末庶幾妊娠之家自得覽斯為家內明師爾時丁巳歲秋八月序。

將護孕婦論第二

凡婦人妊娠之後以至臨月藏府壅塞關節不利切不可多睡須時時行步不宜食粘硬難化之物不可多飲酒不可亂服湯藥亦不可妄行鍼灸須寬神減思慮不得負重或登高涉險若偶然胎不安腰痛須服安胎藥一二服得安即止周遊論曰生產雖然艱難比須要在先六月壹日貼產圖并日遊胎殿所在并借地法於妊婦房內北壁上仍依位設灰帳厚鋪茵蓆周宿使無孔竅夏月亦鋪厚薦用好油單薄席紗帳以備之當其香令潔淨備辦湯藥器物既覺欲產不得喧闐人力雜亂大小陰障驚動產

婦宜預擇年高歷練生婆一人并穩當曾經慣婦人一兩入扶持不得揮霍恐產婦受驚又忌閑雜外人并惡孝緣觸之人看視切不得驚動傷早若坐婆拙不能體察胎氣方轉動之際便為欲生多端下手驚動傷早則橫倒之變從此而致也

產寶方云妊娠欲產腹雖痛而腰不甚痛者未產也且令扶行熟忍如行不得則凭物扶立行得又行或衣袋先下然後作陣腰腹痛眼中如火生此是胎離腎經兒過產門也即服催生藥一二服即扶上尊草切不可半信半疑務要產婦用力存養調停亦令坐婆先說諭之如骨中煩悶可取白蜜壹匙用新汲水調下或覺飢即喫軟飯或粥少許亦須預備勿令飢渴恐產婦無力困乏也若不飢渴亦

不須強食大凡生產自有時候不可強服催生滑胎等藥
或因坐草早勢不獲已則服之若無事強服恐變生他疾
又須戒之

滑胎例第三

七方

凡妊娠已滿十月形體成就神識咸備分氣趣產宜服滑
胎湯藥

滑胎枳殼散 瘦胎易產胡陽公主每產累日不下南山道
士進此方

商州枳殼 貳兩

粉草 壹兩

右為細末白沸湯點貳錢服空心日叁服凡懷孕六七
箇月已上服之令兒易生初生胎小微黑百日已後肉
漸變白此錐孫真人滑胎易產方然抑陽降氣為衆方

隆慶也

之冠此方

壹方枳殼壹兩計其重數中壹兩

日叁服

壹方有糯米半升淘洗控乾同炒為末米飲白湯調下

壹貳錢

溫隱居加當歸木香各等分

張氏方治妊娠胎肥壅隘動止艱辛臨月服之

產兼治腸中諸疾下氣寬膈 枳殼 貳兩 甘草 貳兩

香附子 叁兩 炒 為末薑煎湯點亦可如丈夫

攻刺脇肋疼痛者用葱白叁寸同煎服 婦

氣成塊作痛熱酒調服 大小便不通白牽牛 炒末煎

湯調服

香附子 枳殼各二兩 甘草半兩

內國治妊婦衝任脉虛補血安胎

此也黃武西當歸

右為細末煉蜜元如梧子大溫酒下每肆拾元

許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋抑陽助陰之藥甚多然胎前惡阻若陰陽交錯別生他病唯是南山道士秘授散所以抑陽助物湯所以助陰故爾然枳殼散其功甚速若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補元佐之則陽不至強陰不致弱陰陽調停有益胎前此首人未嘗論及也

易產滑胎方其藥性滑利小便

車前子

致本任至

喜言作心

軒老治產聖手

右為末酒調方寸匕服之宜飲清米調 詩云不飲

今婦人樂有子矣 產難者以

序詩云樂然而生男於產後人以為注其說矣

治產難神效 煎滑胎方產臨入月服之極有神效如

浙州施少卿方漸州徐太家傳

通明乳香 枳殼一兩

右為細末煉蜜元如梧子大空心溫酒吞下三十二元日

一服懷孕九箇月以後皆可服

陸氏方各 乳香酒

治妊婦滑胎易生

榆白皮 甘草 葵子一兩

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

一方無榆白皮各葵子散

主孕九箇月將產消息

猪肚一全月

依法用葱五味煮熟食食如不盡更食以盡為度不得與別人食無效

安胎寬氣進食理胎易產設或居處失宜偶然頓

散胎動胎痛漏胎下血兼服佛手散見神寢元 枳殼

散見前此二藥入月內大宜常服

香附子四兩 山藥二兩 縮砂仁一兩 木香四錢

粉草一兩 益智仁 紫蘇葉各半

右為細末白湯點貳錢服

無憂散治妊婦身居富貴口厭甘肥憂樂不常食物

不節飲飽便臥致令胎氣不穩根蒂墜行動艱難因致

臨產必是難生入月可服無憂散則易生矣

當歸 川芎 枳殼

乳香各三錢 木香 甘草 血餘即髮灰

心血和之 右為末每二錢水煎日進兩服

月空方位例第四出太平聖惠

正月 三月 五月 七月 九月 十一月 在丙壬

二月 四月 六月 八月 十月 十二月 在甲庚

逐月安產藏衣忌向方位第五

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布太平聖惠云凡妊

婦初入月便寫產圖一本以朱書其月某日空點在其位

如正月在丙壬可於壬位安產婦床帳內位藏衣之類

以上

掛在產婦房內北壁上若值閏月只看節氣用之又云每
 月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅木時咸池吳時
 豐隆白虎太夫天候狂虎凡十二神並從月建易其位所
 謂月令者按內經云月郭空無為主水注云論月輪中空
 日也節非十二神之數今本非聖惠考以六陽月在丙壬
 以六陰月在甲庚正如外臺所言正月在丁壬至十二月
 在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡耳今
 人多依聖惠考者特從其簡而已或云凡逐月安產藏衣
 並向月德月空方位所有十二神殺並從節氣更換若交
 次月節便作次月用書產圖者非也假如正月十四日立
 春若姪婦十二日乳臥豈可作去年十一月用也必依月
 分用之乃是若依節氣使換則天德月德所在差矣然月

空女之謂之中天空頗相類議者以為天空者亦十二神
 之數蓋諫中有天乙貴人其位無可與對者故此空是
 天空猶此神百事不宜止宜安產婦床帳藏衣之類耳焦
 惟曆云天德正月在丁二月在坤三月在壬四月在癸五
 月在乾六月在甲七月在癸八月在庚九月在丙十月在
 乙十一月在巽十二月在庚
 又堪輿曆有遊羊白虎殺神在大歲後一辰如天
 白虎在寅餘做此推之若產及藏衣犯之則子母比
 王于亭云難產逆生論稱犯一切神熱病有是難
 有自然難產兒自逆生者及有產腸胃俱下者產已則
 復如故此非疾病所致氣血所主天下之理蓋有不可
 窮詰者亦宜知之

候

八月	七月	六月	五月	四月	三月	二月	正月
庚申	丙申	庚申	丙申	甲申	丙申	坤	壬
巽巳	主坤	甲乾	壬辰	庚巽	壬坤	艮	丙
酉酉	申申	亥未	寅午	巳巳	申辰	亥寅	寅寅
精未	酉戌	子丑	卯辰	午未	辰戌	卯辰	卯辰
丑丑	戌戌	未未	辰辰	丑丑	戌午	辰辰	辰辰
亥卯	寅寅	酉卯	申子	未酉	午子	辰午	申酉
辰辰	卯辰	寅卯	巳寅	巳寅	巳寅	戌辰	酉戌

庚申 丙申 庚申 丙申 甲申 丙申 坤 壬

庚申 丙申 庚申 丙申 甲申 丙申 坤 壬
 巽巳 主坤 甲乾 壬辰 庚巽 壬坤 艮 丙
 酉酉 申申 亥未 寅午 巳巳 申辰 亥寅 寅寅
 精未 酉戌 子丑 卯辰 午未 辰戌 卯辰 卯辰
 丑丑 戌戌 未未 辰辰 丑丑 戌午 辰辰 辰辰
 亥卯 寅寅 酉卯 申子 未酉 午子 辰午 申酉
 辰辰 卯辰 寅卯 巳寅 巳寅 巳寅 戌辰 酉戌



庚

庚

北

庚

六歲行在乙卯乾三月坎震日
偏東在正南在正南白色西北
衣師看產

七歲行在丙辰兌七月巽離日
偏西在正南在正南白色正西
衣師看產

八歲行在丁巳巽四月兌坤日
偏南在正西在正東青色東南
衣師看產

九歲行在戊午坤五月離巽日
偏北在正西在正東青色西南
衣師看產

十歲行在己未離六月坤兌日
偏西在正北在正北赤色正南
衣師看產

十一歲行在庚申坎七月乾艮日
偏東在正北在正北黑色正北
衣師看產

十二歲行在辛酉震八月艮乾日
偏北在正東在正西青色正東
衣師看產

十三歲行在壬戌離九月坤兌日
偏南在正東在正西黃色東北
衣師看產

十四歲行在癸亥巽十月震坎日
偏西在正東在正西黃色東北
衣師看產

十六歲行在甲子未乾六月坎震日
偏東在正南在正南白色西北
衣師看產

十七歲行在乙丑兌七月巽離日
偏西在正南在正南白色正西
衣師看產

十八歲行在丙寅巽四月兌坤日
偏南在正西在正東青色東南
衣師看產

十九歲行在丁卯坤五月離巽日
偏北在正西在正東青色西南
衣師看產

二十歲行在戊辰離六月坤兌日
偏西在正北在正北赤色正南
衣師看產

二十一歲行在己巳巽七月乾艮日
偏東在正北在正北黑色正北
衣師看產

二十二歲行在庚午坤八月艮乾日
偏北在正東在正西青色正東
衣師看產

二十三歲行在辛未離九月坤兌日
偏南在正東在正西黃色東北
衣師看產

禮志手借地法第七

東借十步 西借十步 南借十步 北借十步

上借十步 下借十步

壁方之中肆拾餘步安產借地或有穢汚或有東海神王
或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有日遊
將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸
入地十丈令此地空閑產婦某氏安居無所妨碍無所畏
忌諸神擁護百邪速去急急如律令前項借地法於
於產婦房內北壁上
更不須避忌神殺也

禁草法第八

鋪草及籠褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母子
相生俱發鐵急急如律令

禁水法第九

欲產時貯水呪曰

南無三寶水

水在井中為井水

水在河中為河水

水在器中為淨水

水在法中為真水

自知非真莫當具水

以淨持濁

以正治邪

日遊月殺

五士將軍

青龍白虎

朱雀玄武

招搖天狗

軒轅女媧

天吞地吞

懸戶閉牖

六甲禁諱

十二神王

土符伏神

各安所在

不得動靜

不得忌干

若有動靜

若有忌干

施以神呪

當攝汝形

阿佉居阿毗羅莫多梨娑地梨娑訶

入月預備藥物第十

保氣散

佛手散

枳殼散

神寢元

榆白皮散

多刺生方作

保生元 催生丹 黑神散 大聖散 花藥石散

黑龍丹 理中元 催生符 生地黃 羌活

葵子 黃連 竹茹 烏梅 雌雄石燕

甘草 海馬 馬嘴鐵 棗子 陳皮

薑錢 黑豆 白蜜 無灰酒 童子小便

好醋 白米 前藥爐 鈹子 黃芩沙瓶

潘樂帛 醋炭盆 小石壹貳拾顆 湯瓶

軟硬炭 乾柴茅 煖水盆 洗兒肥皂頭髮 乾葶草

斷臍線及前乃 煖水盆 洗兒肥皂頭髮 乾葶草

卧交椅 軟厚氈 燈籠 火把 繳巾

油燭 發燭 灯心

催生靈符第十

書符時宜以水飛朱砂書之貼於身內此靈符上遇坐草之時

時符於針上就我內以燈燒之庶免飛揚溫水調服 治產難橫生逆產胞衣不下 靈符行 引聖靈方

治產難橫生逆產胞衣不下 靈符行 引聖靈方

麝 出 弱 弱

弱 弱 不安穩寐 覺不安穩 治橫生靈符 朱砂書此符 以順水吞下

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

此四符入月一日墨
書鞋衣上仍密安產
婦席褥下勿令人知

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

此三符遇產難
以墨書吞之

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

治胞衣不出靈符的道
急則以朱砂書符吞下

新刊婦人良方補遺大全卷之十六

婦人良方補遺大全卷之十六

○ 產難門

坐月時明前知
產難故以次之

產難論第一

血氣舒暢生理甚易何俟乎藥則孕婦當貴於運動者

凡婦人以血為主惟氣順則血順胎氣安而後生理和今
富貴之家往往保惜坐月惟恐運動故羞出入專坐出言
不思氣閉而不舒快則血凝而不流腸胎不轉動以致生
理失宜臨產必難甚至悶絕一也且如貧者坐月日夕必
苦血氣舒暢生理甚易何俟乎藥則孕婦當貴於運動者
明矣次則婦人妊娠已經六七箇月胎形已具而世人
不知禁忌恣情交合嗜慾不節使敗精瘀血聚於胞中致
令子大母小臨產必難二也何以知之生下孩子頭上有

常

白膜一片滯膩如膠俗強名曰戴白生兒身有青有黑俗
強名曰宿疾此皆是入月交合所致也如此則不特母病
其子亦生浸淫赤爛瘡瘍俗謂之胎蛆動逾歲月不差可
不戒乎。三則臨覺太早大小揮霍或信卜筮或說鬼祟
多方誤恐致令產母心驚神恐憂惱怖懼又被閑雜婦人
喪孝穢濁之人衝觸若不預為杜絕臨產必難三也何以
知之如偷生之女不正之屬既無產厄子母均安其理可
知。九臨產初然腹痛或作或止名曰弄痛坐婆跡率不
候時至便令試水試水頻併胞漿先破風颯產門產道乾
澁及其兒轉便令坐草坐草太早兒轉亦難致令產難四
也直候痛極眼中如火此是兒逼產門方可坐草即令易
產如坐草稍久用力太過產母困睡抱腰之人又不穩當

致令坐立傾側如外畏中...
深納房室...
血溢反行...
產室...
可去綿方...
不可洗頭方...
楊子建十產論第二

凡人生產先知此十產證候則生產之婦永無傷損性命
生產之間性命最重幸而孩子易生人不知福萬一有少
艱難則須臾之間子母之命懸於絲髮世人所患者惟
看生產收生之人少有精良妙手緣此而多有傾性命
因傷痛其事不為無補外有蓋腸產僕

一曰正產

正產者蓋婦人懷胎十月滿足陰陽氣足忽然腰腹作陣
疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹疼痛極甚乃至腰間重痛
穀道挺進繼之腹破血下兒子遂生此名正產

二曰傷產

傷產者蓋婦人懷胎忽有七月八月而產忽至九月十月
而產忽有經一年二年乃至四年五年而後產者今獨以
十月滿足為正產蓋一人之生陰注陽定各有時日不可
改移今有未產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却
無事是名試月非正產也但一切產母未產前而正產
候即不可令人抱腰產母亦不妄亂用力蓋欲產之婦
腹疼痛兒身未順收生之人却教產母妄亂用力兒身纏

今

方轉動却被產母用力一送便使兒子扭腰忽橫忽倒不
能正生皆緣產母未當用力之所致也凡產母用力之時
兒子順身而過門方始用力一送令兒下生此方是產
母之用力當也若未有正產之候而用力傷身其害甚
鮮今兒下生雖如握面而助之長非獨無益而又害之此
名傷產

三曰催產

催產者言婦人欲產聚破血下臍腹作陣疼痛其痛極甚
腰重穀道挺進已見是正產之候但兒却未生即可服藥
以催之忽有延及數日產母困苦已分明見得是正產之
候但兒子難生亦可服藥以助產母之正氣令兒安待下
生此名催產

四曰凍產

凍產者蓋言三冬之月天氣寒冷產母經血得冷則凝結而不散因其血之不散以至兒子不能生下此之一弊為害最深然世人不不知實若冬月產婦下部不可脫去綿衣并不坐卧寒冷之氣常帶房着火令遍房常有暖氣常令產母背身向火令臍下是膝間常有暖氣若背上心前少聞寒冷須是暖火綿衣以包之貴其血得熱則流散使兒子易生此冬月產若春秋之間天地少有陰濕寒冷之氣亦可就房中以微炭火暖之為妙

五曰執產

執產者蓋言盛夏之月欲產之婦當與上溫涼得所不可因執恣意取涼及有傷損胎氣又生疰之處不可多着人

則損今當首奪之益而產母氣血亦損其血亦虧而血得熱則上蒸能令其胎動而亦危如蟻行至不知人事世有各宜若緣此而成也此各執產者直其月少有清涼之氣陰雨之變產母亦不可任意取涼恐生執

六曰橫產

橫產者蓋兒子下生先露其手及先露其足此因不當用力而產母用力之過也臍腹疼痛兒身未順則是產母用力一逼遂致身橫而不能生下不幸而有此證候當令產母安然仰臥令看生之人推而入去先推兒之法先推其兒身令直上漸漸通手以中指摩其肩推其上而正之漸引指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒直上徐徐

正之候其身正門路皆順煎催生藥一盞令產母喫了。方可令產母用力令兒下生此名橫產。若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命。

七曰倒產

倒產者蓋因其母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉。其法只直下先露其意也。治之之法當令產母於床上仰臥令看生之人推其足入去分毫不得令產母用力亦不得驚恐候兒自順若經久不生却令看生之人輕輕用手內人門中推其足令就一畔直上令兒頭一畔漸漸順下直待兒子身轉明路正當然後煎催生藥令產母服一盞後方始用力一送令兒生下。此名倒產。看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命。

補遺 治倒產脚先出者

烏蛇蛻 一筒 蟬退 一筒 茵陳 血餘 一筒

右同燒為灰分作二服酒調溫服仰臥。或用穀尖刺兒足心刺三五次。忌以鹽少擦刺處即生。

八曰偏產

偏產者蓋因兒子回轉其身未順生路未正。力一送致令兒頭偏柱左腮忽偏柱右腮。門而不能生下。但云兒已露頂然不知兒之也。然左額角忽右額用而已。謂兒頭偏柱一。生收之之法當令產母於床上升臥令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正向人門然後令產母用力一送即使兒子生下。若是小兒頭之後骨偏柱穀道。

送轉作通

使轉作便項作頭

即令兒却只露額骨令看生之人以一巾綿衣灸令溫暖
用裹手急於教道外勞輕輕推兒頭令正即便人令產母用
力送兒生也此名偏產凡於教道外勞推兒頭正須推其
上而正之仍是小用輕力推些上兒而正之也若看生之
人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命。

九曰礙產

礙產者言兒身已順而路俱正兒子已露正頂而不能
生下蓋因兒身回轉帶攀其肩以此露正頂而不能生
此名礙產收之之法當令產母於床上仰臥令看生之人
輕輕推兒近上條於引子以中指按兒肩下其肚帶也仍
須使兒身正順方令產母用力一送便兒一下生此名礙
產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以

礙產者言兒身已順而路俱正兒子已露正頂而不能
生下蓋因兒身回轉帶攀其肩以此露正頂而不能生
此名礙產收之之法當令產母於床上仰臥令看生之人
輕輕推兒近上條於引子以中指按兒肩下其肚帶也仍
須使兒身正順方令產母用力一送便兒一下生此名礙
產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以

傷人命

十曰坐產

坐產者蓋言兒子之欲生而母不覺一條手巾令產
母以手攀之輕輕屈足坐於地兒生下非令產母臨生兒
時坐看一物此名坐產若是產母兒將欲生時坐看一
物即抵着兒路不能生也

十一曰盤腸

九四方

趙都運奉人每臨產則子腸先出然後產子產子之法其
腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能醫傳在神口口行一
坐婆施之一法而收之其法遇產後子腸不收之時以醋
半盞新及冷水七分碗調得藥產婦每喫一縮三集收

善類指坐作生

抵

盡此良法也。後學不可不知。

治推腸生方又名盤腸產

右以半夏為末，搗鼻中，則腸上矣。

又方：以大紙撚，以麻油潤了，點燈吹滅，以煙熏產婦鼻

中，腸即上矣。

又方：以草麻子十四粒去殼，研如膏，貼產婦頭頂中心

腸即上，即拭去。

催生方論第三 九三十六方

五行論命，以年月日時支干所遇五行所屬相生相值以推人之貴賤，其間最切要者，時也。若林謂命書以年為父母為己身，月為兄弟，餘支日為妻妾，土官時為子孫帝座。蓋人之生也，得其時則終身富貴矣，失其時則終身貧賤。

乎人生之時不可忽也。然則人生之時其可忽也哉？不知娠有諸生產之難，若臨產而坐既久，勞力困乏，或產前趨以救其危，當此之時，又何暇論其時耶？又聖書云：有推娠婦行年法，若行年有劫，本命相值所產歲月者，以馬皮於灰草上，令娠婦踏之，手攀鞍轡頭，則易產。今之醫者，便以此等物為產時所需之物，誠謬論也。其所以然者，謂妊婦行年偶與本命相值於所產歲月，慮有諸般艱難之厄，故以此厭禳之取其快速之意耳。如或不值，則无用矣。今錄催生數方，皆各醫士大歷用良驗者。以幸有緣產寶方論曰：夫產難者，內宜用藥，外宜用法。蓋多所救療，以取其安也。產難坐草數日，困乏不能生，此為母先有病，經絡俱閉所致。

催生林木飲子 治產難或積或倒死胎爛脹於腹中此方
屢用神妙

生大林木枝大者長一尺淨洗甘草大者五寸

右用新汲水三升半同入新沙瓶內以紙三重緊封之
文武火煎至一升半令香氣腹痛便準備候產婦腰重
痛欲坐草時溫溫飲一小瓊便寬心下開露如竟再渴
又飲一瓊至三四瓊產下重便生更無諸苦功不可坐
草早及坐婆能下手如催生藥只消一服此方至驗乃
蔡張不思方也

催生如神散 治產難橫生及胎前產後虛損月脉

不調崩漏一名催生聖散一名烏金散一名二神散

百草霜 香白芷

右二味等分研碎每服一錢於產後虛損月脉
便并少米醋打為膏沸湯調下集驗用酒調下小兒各
半瓊同煎能固血免得乾即調停熱服甚奇生其妙在此

催生如聖散

黃蜀葵花不以多少焙乾為細末熟湯調下二錢神
妙 或有漏血胎臟乾澁難產痛劇者併進三服良
久腹中氣寬胎滑即時產下如无花時只用葵子爛
研小半合以酒調瀝去滓溫過頓服尤妙 亦治打
撲傷損如胎死不下煎紅花溫酒調下

用子歌曰經驗用子

黃金因子三十粒 細研酒調能備急

命若懸絲在須臾 即今眷屬不悲泣

曹秀才方 用葵子一味研墨或研朱砂為衣每服四十粒溫酒吞下

催生丹 療產婦生理不順產齊後難並宜服之

十二月兔腦髓如海 通明乳香 一分研細

母子香 末一錢 麝香 一分研細

右四味拌停以兔腦髓和丸如雞頭穰大陰乾用油紙密封貼每服一丸溫水下即時產隨男左女右手手中取出是驗

又方 通明乳香一塊如皂子大

右為末煮腰痛時用新汲水一小瓊入醋少許同調其立令產婦兩手提兩石燕坐婆餉藥飲之先令姪婦念

醫聖藥理二為然後... 生更無痛楚伸良

經驗方如神 乳香末以多少五月五日干貼

一人在壁背捧乳鉢在壁上令一童兒以筆常畫鐘... 逐粒從筆管中過入乳鉢內研令極細以童兒面... 圓如雞頭大每服一粒無灰酒吞下海上方用乳香末... 等分為細末麝香酒調下

治難產或倒橫不順方

蛇蛻 全者 蝮蛇紙

右入新瓦瓶中鹽泥固濟燒存性為末煎榆白皮... 下一錢三服覺痛便生○一方云臨產腰痛用

麝香一字溫酒調下名**二妙散**

催生萬金不傳遺山丹

單麻子十四箇

朱砂

雄黃

各半

蛇蛻

一尺

右為細末漿水飯和圓如彈子大臨產時先用振濕淋
潔脐下次安藥一圓於脐中用蠟紙數重覆藥上以闊
帛繫之須更生下急取去藥一圓可用三次

如聖膏

治難產兼治胞衣不下兼治死胎

用單麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣即下速
洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入如聖之
妙一方男用七粒女用十四粒
一方用單麻子百粒雜黃末一錢同研並用如前法

寸金散

治產難
用敗龜尾筆燒為灰細研為末生藕汁一盞調服立

產若產婦虛弱及產有以所產之物以銀石
器內重湯調溫服

陸氏方云此難產第一方

金箔三片

鬼筆筆頭三箇

燒為灰

右一味和停用蠟為圓如梧子大作一服溫酒下

又方臘月兔腦髓塗於一張薄紙上更用一張合搗以軒
碾追三五十下每遇難生看大小書天生兩字作符

以醋湯調下極妙

又方大朱砂

隨多少端午日曬至百日不
得青兩如補百日取研如粉

右用蠟月兔腦髓和陶如綠豆大欲覺產粥飲下一圓

良以便生其產男左女右手中把出

又方

臘月兔頭一枝燒為灰

右為細末葱白煎湯調一錢立生。

指迷方

臈月兔血蒸餅切作片子蘸之以紙袋盛掛當風處

陰乾為末煎乳香湯調下一錢

又方兔皮和毛燒為灰末之以酒調方寸匕服之即產衣

不下者服之即下

治橫倒生者或先手足者

明阿膠附方

滑石末各一葵子二合

右水一盞半煎至一盞去滓分二服

治難產五六日不得分娩或因虛乏者

光明水膠二兩

右用好酒一升半微火溶膠入新雞子一箇益一錢七

搗温令產婦坐倚物上伸腰大口作一次服之覺小腹重

便生緣坐草早驚動故也

救產難經日不生

雲母粉半兩温酒調服入口當產不順者即產萬不

失陸氏方云是河無揚方云云已於三子具人亦用

失雲母粉澄過研細取一團如雞子以酒調服

治橫逆產理不順子死腹中

伏龍肝細研每服一錢酒調服之以土着兒頭上戴

出妙

廣濟療難產三日不下方

吞雞子黃二枚并少苦酒服

集驗療橫產及胎死腹中以三姓雞卵各一枚三姓監各

外臺引小品能下石得字
外臺作阿膠二句

錢二姓水共一盞相和煮五七沸分溫二服令產母東
首服之立出

療難產日久氣力之盡不能生此是宿疾

赤小豆一升以水九升煮熟取汁又炙了明黃膠一

兩同煎少時一服五合未效再服不過三四服即產

備急方療難產三日不出

吞槐子十四枚即下廣濟方有蒲黃一合千金集驗

崔氏同

又方

當歸為末酒調方寸匕服

崔生如意散臨產腰疼方可服之

人參為末 乳香各一錢 辰砂半錢

右三味一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥水再
用生姜自然汁調開少服如橫生倒生即時端順子母
平善 傳於鄂渚施漢卿屢見功效

陳氏崔生神效聖藥臨產腰疼助服之

延胡索 沒藥 白礬 白芷

姜黃 當歸 桂心等分

右為細末臨產陣痛時燒鋒刀鐵匙令通赤淬酒調

藥三錢服二一杯立產此方鳳州何也醫家寶每

密得之藥
試屢驗

崔生神效乳珠丹

乳香研細以猪心血為圓如梧桐子大以朱砂為衣日
乾每服一粒如崔生冷酒化下良久未下再服一粒如

大段難產時以蓮葉心蒂七箇水二錢煎至一錢放溫
化下一粒良久未下亦可再服此藥靈驗如神无有不
下者如胞漿先破惡水來多胎乾不得卧時須先與四
物湯及通真圓補養其血氣次更濃煎葱湯放冷如身
冷坐婆洗產丸須是欵曲洗令氣上下通暢仍更用酥
調滑石末塗產戶裏次服前催生藥則萬全矣如胎死
不下者用黑豆三合好醋半升煮令豆爛取汁一錢放
溫化下藥一粒須更便下矣萬一未下亦可再服如胎
下胞衣未下者服此亦便下也若胎橫逆不順即先服
如神散方見前再服此藥復以此藥催之合藥時要五月
五日午時極妙或七月七日或三月二日及月初上辰
日合亦得

小品療逆產方 塩塗兒足底又可急搔爪之并以塩摩
產婦腹上即產

又方 以塩和粉塗兒兩足下即順矣
集驗方療逆產 燒錢令赤納酒中飲之

又方 取夫陰毛二七葉燒以猪膏和圓如豆大吞下
兒手即握出神驗○刪繁添難方取車軋中膏蓋服

下及掌心崔氏文仲小品千金集驗備急同
療逆產胞衣不出方 取龜羣黑塵研為細末酒調方寸
匕 一方用梁上塵

張文仲療橫生逆產服諸符藥不捷者灸右脚小指尖頭
三壯艾炷如小麥大

小品療橫生倒產手足先出方 並出外臺

產難行案行逆產

屋下以室有上字

用粗針刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當回

順產逆產二條其理雖別療法蓋同可以意量逐善參用也

補遺龍蛇散 催生秘傳

蟬退一兩燒存性 大蛇蛻一條燒存性 滑石 五錢 葵子 炒二兩

為末每錢順流水微溫煖調下不可使熱湯

生催應急方 好京墨新汲水濃磨服之墨水裏兒出○又方清油同

蜜等分湯少許調頓服○油菜子以濃煎一錢服之○

又方取路傍破草鞋一隻用鼻絡小耳繩燒灰酒調服

加味芎歸湯 治產五七日不下垂死者及矮石女子交滑

不開者

川芎 當歸 各一兩 白芍 二兩 炮薑 一兩 炙甘草 一兩 生男者婦人

頭髮一握燒存性共為散每服一錢水一盞半煎服力

約人行五里生胎死胎下無自死龜殼爛胎動

催生湯 治妊娠欲產痛陣前疎經二兩日不生或產後

乏萎頓產道乾澀致令難產或產後腹痛或破水後便可服

此藥即生矣如是死胎亦下若未經破水者不宜輕服此

却用他法治之

蒼朮二兩米泔浸宿燒乾 枳殼 桔槎

陳皮 楊芍藥 川白芷 川芎

當歸 各一兩 肉桂 半夏 枳殼

麻黃 乾姜 厚朴 南木香

杏仁

伏苓各半兩

右為末每二錢順流水溫煖調下若氣熱悶白蜜湯調
或挫散每服四錢姜三片棗一枚以順流水煎溫服方
用枳枌肉桂能開通子宮餘藥助氣開竅自通麻黃內
通陽氣甚則血行即產矣冬月用之甚為的當隆暑之
時恐難輕服但以五苓散用葵子灯心煎湯調下御暑
清魂滑胎則產易矣

郭稽中產難方論第四

凡四

論曰產難者何胎側有成形塊為死胎胎上欲生時攪破迴
敗血裹其子故難產但服藥散逐其敗血即自生若前
生橫生並皆治之

麝香

右為末每服二錢以酒調下

陳無擇評曰產難不以胎側有兒攪破迴敗血為難其
胎息因緣自有難易其如橫逆多因坐草人用力過度
兒轉未速或以已破水其血必乾致胎難轉若法當加
逆先露手謂之橫法當以針刺之使自縮入即服神應黑
散以固其血必自轉生 養生方云倉星之間兩命所係
不可不廣傳蓋養氣散之功也或以益母草煎取脚底極
補遺橫產倒產等諸方已見前此不復贅

產難子死腹中方論第五

凡一

夫產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產
難或因產時未到穢露已盡而胎枯燥故子死

腹中其候產母舌青黑及胎上冷者子已死也故產處坐
卧須順四時方面并避五行禁忌若有觸犯多招火禍也
治妊娠三五箇月胎死在腹內不出

大腹子

赤芍藥

榆白皮各三分

當歸壹兩

滑石末叁分

瞿麥

葵子炒

茯苓

粉草

子本各半兩

右為粗末每服肆錢水壹錢煎至柒分去滓不拘時服
療死胎腹內不出母已危殆不得已者立效方

水銀半兩

桂末壹錢

右只作壹服溫酒調下粥飲亦可

又方以利斧煨赤置酒中待溫飲之其子便下

治妊娠胎死

腹中候其母面赤舌青者是宜錫粉

錫粉

水銀

右同研不見水銀為度以粟米肉和同煎既已大煎湯吞下

十全傳救療胎死腹中

以好辰砂壹兩水煮數沸研令極細酒調服

又方以雞子黃壹枚用薑汁壹合調雞子黃為漿服之

後後與芸薹粥良

趙和救傳下死胎方

桂心末

麝香當閉子

右同研溫酒調服須臾如手推下此之用水銀等藥不

損血氣

何氏方無麝香每用桂末貳錢有陣密時用溫童子小便

調下名觀音救生散兼治產難及橫倒生

療胎死腹中不出母欲絕 用水銀二兩頻吞之兒立出

又方用水銀如彈子大以棗肉均研和如大豆許水立出

救急治子死腹中

取夫尿貳升煮令沸飲之

文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草不

產血氣上澁心母面無顏色氣欲絕方

猪脂壹升煎白蜜壹升 淳酒壹升

右三味合煎取貳升分溫兩服不能服之隨所能服之

又療子死腹中不出○以牛尿冷母腹上立出

崔氏療胎死

甘草壹尺

蒲黃貳合

筒桂肆寸

香白朮貳升

雞子

右細切以水陸升煮取叁升頓服胎胞穢者盡去大良

產經數日不出或子死腹中母氣欲絕

瞿麥陸兩

通草

桂心各二兩牛膝貳兩

榆白皮一升

右以咀以水九升煎取三升去滓分溫三服

一字神散治子死胎不下胞破不生此方更有効救又幾

萬數

鬼臼不拘多少黃色者去毛碾為末以手指撚之如

粉極細為度每服貳錢用無灰酒壹錢同煎至捌分

通口服立生如神此藥不用羅只碾令極細

鄧知縣傳方療死胎不出

朴消為末每用貳錢溫童子小便調下知洪州進賢
 曾通仕定求云昔為豐城尉時有猫孕五子一子已
 生四子死腹中啼喚欲死試問醫者令用此藥灌之
 死子即下猶得再生後有一牛亦如此用此法亦法
 醫云本治人方用以治畜也後因以救人無不驗
 兒時曾有一親戚胎死腹中不下數日百計已窮
 意我先生人用朴消半兩末以童子小便調下胎即下
 治死胎不下其證指甲青舌青脹悶甚者口中作屎臭
 以平胃散膏貼作兩服每服酒水各壹錢同煎至壹瓊却
 投朴消半兩研細再煎三五沸傾出候微溫服及其胎即
 化血水而下
 繆宅厥意孺人杜氏生產數日不下坐渡魂童救療皆無
 効召僕診之僕曰產前脉不可若但當紫色而知之遂揭

帳明燭以察之其面色赤者此胎已死母
 却無憂矣或問曰何以知之予答曰面赤者青黃也死母
 活明矣僕自合至寶丹貳粒服之胎即落矣以此見古人
 處方神速

產難生死訣第六
 治死胎不下惟催生湯最驗

欲產之婦脉離經者此胎已死也
 於陽四倍也注云經者常也謂脉離經者此是陽加於
 一呼脉再至一吸脉再至一呼脉再至一吸脉再至一
 五百息脉行八十一吸脉再至一呼脉再至一吸脉再
 一呼脉再至一吸脉再至一呼脉再至一吸脉再至一
 脉行通計一呼脉再至一吸脉再至一呼脉再至一吸
 之經再起故曰難經行若一呼脉再至一吸脉再至一
 行十呼起故曰難經行若一呼脉再至一吸脉再至一
 單五丈乃為一息之經再起故曰難經行若一呼脉再
 復始亦不在所起之經再起故曰難經行若一呼脉再

名醫之辨脈見此沉細而滑者乃腎藏本脈也夜半覺痛難寐來日日午定知生知來日午時數也身重體熱寒文頻舌下之脈黑復青反舌上冷子當死腹中須遣母歸其

此脈者胃氣絕也又熱熱其候上反捲上冰冷不溫者子母皆死

活之候舌上青細尋者母活子死定應難是氣絕而通赤

若死而赤舌上青細尋者母活子死定應難是氣絕而通赤

青沫出頻母死子活定知其不信若能看應驗尋之賢哲

不虛陳九姓婦面與舌皆青色又頻吐痰沫者其脈下

子母必死也此古賢者應新產之脈緩活吉實大弦急死

來親活安吉之新產之後其脈才緩滑者乃血通和是

若得沉重小者吉忽若取平命不停若此是形虛脈也

調死骨者此後診得寸反性命不可停留必死也寸口溢疾不

生骨不漸絕有力者此其脈細附骨不絕審看此候分明記

長須念此向心經此乃胎前之脈也

補遺云青舌青沫又頻出乃腎氣絕當子母俱死歌

又疑舌青恐當作古亦胎前下後見此候是子得活矣愚

王子亨元產後諸疾最忌脉大以翰本詳

新編婦人良方補遺太公卷之二十七

新刊婦人良方補遺卷之六 婦人胎前產後諸症

產後門

婦人胎前產後諸症

產後諸症法第 馬順論法自其

論曰凡婦人產後血暈目眩身熱口乾者宜閉目而平酒更方可扶上床仰臥其足屈膝而高倚床頭厚鋪褥透開四壁使無風氣吹拂其時時令人以物從心膈至臍下使惡露不滯如此三日可止仍不可令多臥如臥多者承之入宜頻喚醒其說產婦分脫了三日方可上床若二日上床則必就地睡臥又豈可令產婦近地氣乎 纏生產畢不得問是男是女且先研醋黑三分服之二法云不可服醋墨有傷肺經成致嗽之戒

死無辨切
生子後也
子母相礙

誠過慮也然醋墨本破凝結之血然何明太多即不至
傷肺然所在醋桐更產後三日內令產婦嘗聞醋炭氣或
燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之以防血逆血迷血
運不省之患夏月宜於房門外燒磚以醋沃之置於房中
火及房中不道者數分晚之後須更且食白粥一味不可
令大飽頭少與之為妙逐日漸增之至兩時須是蒸得如
法不用經宿者又不可令過冷不調恐留滯成疾仍時與
童子小便一盞飲之新產後不問腹
痛不痛有病無病以童子小便以酒和半瓊溫服五七服
妙一勝世之後方可少進醇酒此小鹽味。一法
產後不可飲酒此酒不可多

飲而未出月間欲酒喫或服藥者可用淨黑豆一升小
煙出以無火酒五升漬淋之仍入好葱活此酒不可
尤妙常用此酒下藥或時時飲少許可以辟風邪氣血
下惡露行乳脉也如產婦素不善飲酒或夏月之間亦不
須強飲一勝之後惡喫物無味可爛煮羊肉或湖豬汁各
用滋味作粥飲之或喫爛炙猪蹄肉此酒不可過多
凡喫物過多思成積滯若未滿月不宜多語身勞此酒不可
惶哭泣思慮憂鬱離床行動久坐或作針線用力工
巧必食生冷粘硬粟米肥膩魚肉之物及不潔用寒服衣
洗浴或冷水洗滌常時雖未覺大損滿月之後即成勞
手脚及腰腿痠重冷痛骨節間颼颼如冷風吹雖有名醫

亦不能療大都產婦特息須是滿百日方可平復大慎觸
犯此多致身軀強直如用弓反張名曰瘰風遂致不救又
不得夜間獨臥緣夫血心虛恐有驚悸劫宜謹之所有血
衣洗濯不得於此曬曝致邪祟侵傷又不得濯足恐血
氣攻下又不得刮舌傷心制齒及就下低頭皆成血逆血
連此產家護護之常法也滿月之後尤忌任意飲食觸冒
風寒恣意喜怒梳頭用力高声作勞工巧房慾通房後
一及上高廁便溺之類如此節養攝至百晷始得血氣調
和臟腑平復自然安帖設不依此即致產後餘疾矣小可
虛羸失於將補便成大患終身悔而不及或有諸疾不論
巨細後並有方藥醫藥未得信庸醫妄投藥餌經云婦人
非止臨產須憂產後大須將理慎不得恃身軀和平取次

為之乃縱心恣意無所不至若有觸傷便難整理犯時微
若秋毫感病重如山岳知命者可不謹之

產後調理法第二

若產後將息如法四肢安和無諸疾苦亦須先服
四服亦略備補益固散之類不可過多又恐因藥致疾不
可不戒如四物湯四逆散中調內或產婦血盛初經生產
齊氣悶不安者調七寶散第廿論中服之若年久不消服
若三日後竟壯執頭痛背膈氣刺者不可使作舟車因
治之此是乳脉將行宜服五寶散一二服舟車因
床帳大暖或產婦氣盛或素多喜怒竟口收舟車如
精神鬱者此是血暈即須服血暈藥一二服舟車因
仍須看承之人照管問當也或齊氣病食不美虛困即服四

順選中圓一二服若不如此若於兩三日間其腹中時時
 振痛者此為兒枕作痛必須服治兒枕藥一二服方相第
 若大便秘或小便澀切不可服通利藥以其無津液故也
 若投通利之藥則滑泄不禁不可治也切須戒之若秘其
 必欲通利方可服如暖藥即通方相第
 補遺新產之後雖無疾故宜將息調理脾胃美進飲食則
 臟腑易平復氣血自然調和百疾不生**加味四君子湯**
 人參 伏苓 白朮 甘草
 陳皮 蒼朮 縮砂仁 黃耆各等分
 右對散每四錢姜水煎服
 產後通用方論第一
 千金云凡產後而不可會入藥爾至死虛脫自病滋

去積之口凡婦人患風氣者宜服此藥
 也凡產後七日內惡血未盡者宜服此藥
 產後七日內惡血未盡者宜服此藥
 前同此症滿月左起者宜服此藥
 消瘦不可救者宜服此藥
 早服也凡婦人月信不調者宜服此藥
 聚百病竟起宜服此藥
 後服之婦人欲令血氣每至秋夕宜服此藥
 常將服之
 凡婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心背痞滿
 或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口吐黃沫後瘀血諸疾
 並皆治之

熟乾地黄 蒲黃炒

當歸

乾姜炮

桂心

芍藥

甘草各四兩

黑豆炒去皮

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞同煎調服

烏金散治產後十八疾方論集乃論十八首言證詳

服法

一曰產後因執病胎死腹中者何但服**烏金散** 二曰

產難者何但服**烏金散** 三曰產後胎衣不下者何但

服**烏金散** 四曰產後血暈者何但服**烏金散** 五曰

產後口乾心悶者何但服**烏金散** 六曰產後不寒不

熱者何但服**烏金散** 七曰產後虛腫者何但服**烏金散**

兼**朱砂圓** 八曰產後神志不寧者何但服**烏金散** 九曰

產後月內不語者何但服**烏金散** 十曰產後腹內疼

痛者何但服**烏金散** 兼用止瀉調氣藥 十一曰

產後遍身疼痛者何但服**烏金散** 十二曰產後血崩

者何但服**烏金散** 十三曰產後血氣不通咳嗽者何

但服**烏金散** 十四曰產後不寒不熱心煩月候不來

者何但服**烏金散** 十五曰產後腹脹神嘔吐不足者

何宜服**烏金散** 次服**朱砂圓** 三二日炒生薑下穿圓

○十六曰產後口鼻黑氣及鼻衄者何論同此證不可

治○十七曰產後喉中氣喘急者何論同上證不治○

十八曰產後中風者何但服**烏金散** 已上論與郭稽

中二十一論問答同故不詳錄

桃仁 宣子 凡百病去皮失

取仁 凡百病去皮失

伏

右一味搗令極細熟以上等酒壹斗伍升研三四遍如
作麥粥法以極細為佳納小長項瓷餅中密塞以麵封
之納湯中煮一復時未停火亦勿令火猛使餅口常出
在湯上勿令沒之熟訖出温酒服壹合日再服

千金通經湯治百病產後百病理血氣補虛勞

芫花 甘草 當歸 川芎 各柒分

附子炮 乾薑 白朮 白芷

桂心 北細辛各肆分 北防風 人參

牛膝各伍分 栝子仁 熟地黃 石斛各陸分

厚朴 藁本 蕪荑 各貳分 麥門冬 附子

右二十味為末煉蜜圓如梧栝子大温酒下貳拾元

產後醋畢

松蘿生不拘多少用炭火炒紅以米泔洗淨
如此法度研令極細用絹羅過淨
用童子小便調下

四時通經散治一切諸疾婦人經水不調

當歸 芍藥 川芎 各伍分

沒藥 各伍分

右為細末每服各抄半錢用童子小便調下至陸分

通口服

五寶通經散治產後氣血行身體壯執疾痛頭目昏痛大便澀

滯悉能治之涼膈聖藥下乳

人參 白茯苓 甘草 各半兩 芍藥 各陸分

川芎 白芷 各壹兩 當歸 各陸分

右為細木每服貳半錢水壹錢煎半茶分溫服如煩熱
此大仙醫者加大黃貳錢半

治產後諸疾

生薑汁 生薑汁 大蘇仁貳兩

右和無名之藥益內慢火熬成膏溫酒調半匙服更以此
木前所傳代人之元佳 產寶方無麻仁用白蜜治產

後虛備治汗吐

治產後諸疾 俱傷五臟虛脫

治產後諸疾 氣血虛弱

殺嗜食

甘草兩 白朮 人參

右為細末

產乳方云此乃大理中須加甘草治後
之功以勝者也此產婦月內不可開新
古方中有知人補益之藥如
乾地黃大之類其藥味稍衆而中下之家村落之
地卒何以致且藥肆中少有真者不若以
易之較其功比澤蘭圓之類主治頗多也
黑龍丹治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂死
者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸 五靈脂 川芎 良薑

熟地黃各一兩

右細剉以沙合盛赤石脂泥縫紙筋鹽泥固濟炭火拾斤煨令通赤去火候冷取開看成黑糟色取出細研却入後藥

百草霜

五兩

硫黃

乳香 各一錢半

花藥石

十六

琥珀

各一錢重

右伍味並細研與前伍味再研如法修製和勻以米醋煮麵糊圓如彈子大每服壹圓炭火燒令通赤投於生薑自然汁與童子小便入酒澆出控乾研細只用此酒調下 茂恂熙寧初從事濮上幕府郡之尊醫胡者爲予言數政之前有朱汴水部施黑龍丹凡產後諸病危甚垂死者無不愈郡中及村落人賴以全活者甚衆汴受代歸婦人數千號泣遮道送行尚有一二粒未之施

予嘗媿同聘人嫂人妻也

也先人自三歲謫官淮陽家嫂馬氏年中大病醫者康從變投丹立愈訪之乃得於汴也且其每劑一粒輒受千錢必其獲厚利不欲求之後起以汝海從變飲劑一驛臨行出此方爲獻每以救人無不驗者虛謂原伴郎再帥涇原時姨母姪娘至臨潼就尊後數日有盜夜入其室驚怖成疾衆醫不能治乃以惟弟嘗遺此藥服之遂安家入金華君在秦生文度數日苦頭痛未止又心痛痛發兩股上下走注疾勢甚惡昏躁煩憤目視燈如金色勺飲不下服藥甚衆無效惟弟曰黑龍丹可服初以半粒投之即能飲粥而他藥入輒吐出不受覺痛稍緩又投半粒又得安眠自中夜服藥至五鼓下惡物盡升頭痛頓減又至食時復下數升漠然醒愈蓋敗血所

此

致其效如此建中靖國元年五月二十日郭茂恂記仲
氏嫂金華君在秦產七日而不食始言頭痛頭痛而心
痛作既而日睛痛如割如是者更作更止相去纔瞬息
間每頭痛甚欲取大石壓食之漸定心痛作則以十指
抓壁血流掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是者
十日不已國醫二三輩郡官中有善醫者亦數人相顧
無以為計且言草藥犯膏河以愈頭痛犯薑黃可以治
心痛率皆悠悠不根之言竟不知病本所起張益困頓
醫益術殫予度疾勢危矣非神丹不可愈方治藥而張
召予夫婦付以諸子與仲氏別慘怛不測言予腹日戒
張曰弟安心養疾亟出召伯氏曰事急矣進此丹可乎
仲氏尚遲遲以兩句不食然天心在也遂半粒疾少

三十一
十一
十一

間中夜再服藥下腹日痛如中昔平日一有二三
蝗虫子三疾減半巳刻又行如前則頭愈矣遂
視之奄殆无氣午後後体方涼氣方停乃後
遂平復大抵產者以去敗血為先血滯不快乃
後生夫婦不習此理者極庸醫不能中病所以疾苦之
人十死八九夫救難定豈得无夫不遇良醫終抱遺恨
今以施人俾終笑年非祈于報者所冀救疾苦養性命
爾崇寧元年五月五日郭茂恂序

露快利為佳當歸散

當歸

為藥

川芎

黃芩 各二兩

白朮

半兩

右為細末溫童子小便或酒調下二錢此方又

周頌傳授濟急方四道

頌嘗見人傳經効諸方自謂修合實有大功遂編於卷末
普用書授以濟急難治症後血暈血厥及帶血不散便成
癩疥瘰癧而面黃腫嘔吐惡心煩加日眩吐清水四服
效驗五臟虛候常日服多者食少漸愈漸瘦年久變為
勞疾如此所患偏宜服靈驗

澤瀉 藥 四兩 方藥 魚美仁 甘草

當歸 芍藥 各六分 乾姜 杜仲 前草

石骨 杜仲 細辛 厚朴

吳茱萸 枳子仁 防風 烏頭 炮

白蔞 枳殼 南椒 石額

右為細末溫童子小便或酒調下二錢

治產後諸症 黃阿膠 桔梗 故不錄

神效產後一切疾 魚皮 兩 芍藥

沒藥 杜心 好墨

青木香 麝香 白二兩 丈夫髮灰 備用 各半兩

右為細末以新瓷器盛密封勿令走氣每症後以好酒

調下一錢七如血暈衝心下血不尽臍下攢刺疼痛不可忍塊血癥疾甚首日加兩服不拘時候忌冷物菓子

保生方 方與局方同却无麻仁有川椒故不復錄

朱砂丸 治產後虛中有積結成諸疾

黑附子 桂心 白薑 各半兩 巴豆 一錢醋浸

右為細末入巴豆研停醋煮麵糊元如麻子大每服三

圓至五丸冷茶下服之取瀉為度

聖散 纒產服此蕩盡兒枕除百病

當歸 人參 木香 黃耆

川芎 甘草 茯苓 羌活

桂心 知母 大黃 炒 草豆蔻

白朮 訶子 良薑 青皮

右除地黃附子外各等分於槐中切細食父傾去汁取下面入焙龍焙乾掃羅為末纒產後用藥灸於片棗一箇煎至藥分熱服服後產母自然神來睡覺再服全除腹痛母日只參服至口下服

地黃酒 治產後百病未產壹月先服

地黃汁 好麴 好淨秋

右先以地黃汁漬麴令發準家法釀之至熟封七日取

清者服常令酒氣相接勿令絕忌生冷野滑雜物

一切毒物婦人皆可服之但夏三箇月不可合春秋宜合以地黃汁并滓內米中吹合用之若作壹碩拾碩

此宜北 為率先服 當歸湯 後服此妙

產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎衣不下
口內生瘡咽喉腫痛心中忪悸夜不待睡產後中風前弓
反張面赤牙關緊或前中如豚肝腫腹乃神煩躁恍惚
四肢腫痛及受胎不穩唇口指甲青黑

右生地黃 煎湯服之 治產後 諸症 效如 神也
石於器內用慢火煎取汁 服之 效如 神也
此藥 性溫 味甘 能補 氣血 治產 後諸 症 效如 神也
子 母 同 服 效 如 神 也
此藥 性溫 味甘 能補 氣血 治產 後諸 症 效如 神也

治產後 諸症 效如 神也
此藥 性溫 味甘 能補 氣血 治產 後諸 症 效如 神也
子 母 同 服 效 如 神 也
此藥 性溫 味甘 能補 氣血 治產 後諸 症 效如 神也

或產後 諸症 效如 神也
此藥 性溫 味甘 能補 氣血 治產 後諸 症 效如 神也
子 母 同 服 效 如 神 也
此藥 性溫 味甘 能補 氣血 治產 後諸 症 效如 神也

右 產後 諸症 效如 神也
此藥 性溫 味甘 能補 氣血 治產 後諸 症 效如 神也
子 母 同 服 效 如 神 也
此藥 性溫 味甘 能補 氣血 治產 後諸 症 效如 神也

白朮

當歸

桑白皮

大黃各二兩

細辛

桂心各二兩

生薑四兩

右咳吐用永貳升煎取壹升分為叁服如人行七八里
久非服此湯當得利利又不宜過多所利者為不獲已
而微利之其不然未合令利既初產後覺身皆虛尚藉
藥食補之宜宜取利此緣病熱既變不利苟以當塗服
湯得通氣息安帖利既未止即便復取一匙醋飯喫
即止止後但須適寒溫將息後取產復飯食之即重其
所宜如利不減宜依後方服之

白朮八分
北平七分
細辛四分
生薑各一分
桑白皮六分

右為末煉蜜圓如梧子大空心酒下貳拾圓日兩服
產後血氣不通常時不甚痛如產後血氣不通
便疼硬下寒下熱飲食不進不生肌肉心驚悸
乾粘手足沉重有此狀者宜此藥

當歸 芍藥 附子 鹿膠
鬼箭羽 人參各四分 計川皮 虎杖
白朮各三分 大散 乾地黃 朴消 各一分
烏梅肉 白薇 桂心 各四分 水蛭 一分
蒲黃 各三分 蜜出 一分

右為末煉蜜圓如梧子大空心酒下貳拾圓日兩服
外壁有赤石脂拾分於人後仁則女婿尋常依狀用
萬不失一

補遺百病新產之後以此藥祛除敗血補生新血調和
榮衛滋養臟腑使陰陽不相勝負邪氣不能相干則無
寒熱之患又治新產氣虛或外感寒邪頭疼身痛發熱
惡寒或但發熱者方見局方並用入米醋少許同煎

產科序論

陳無擇

世傳產書甚多千金外臺會王產寶馬氏王氏崔氏比日有
產書集安世有衛生寶集李母必錄等備則備矣但倉卒
之間未易研試惟李師聖序郭稽中產科經驗寶慶集下
一篇凡十八方用之頗効但其間序論未為至當始為科
理簡辨於諸方之下以備識之者非故好辯也愚嘗產後
於郭稽中一十一論一擇一以爲最善其論曰
期之不可不慎也
產後之不可不慎也

胞衣不出方論第四 九二十一
夫有產兒出胞衣不盡者世謂之息胞由產初時用力此
產兒出而胞衣不盡者世謂之息胞由產初時用力此
氣聚之則血凝故胞衣不出治之方
於兒所系者胞係連兒臍胞不出即
冷氣傷兒則成疝也舊法胞衣不出然
而已產處須順四時方面并避五行禁
令產婦難產雖腹痛者未產也欲腹
也所以然者腎候於腰胞係腎故也
無殊者即產也郭稽中論曰胎衣不下者何答曰母子

流血入衣中衣為血所脹是故不得下治之稍緩脹痛腹中以此上衝心胃疼痛喘急者但服奪命丹以逐去衣中之血血散脹消胎衣自下而無所患更有牛膠湯等用之其效錄以附之

奪命丹

附子半兩炮 牡丹皮一兩 乾漆一分碎之妙令煙盡

右為細末以醞醋壹升大黃末壹兩同放成膏和藥同

如梧桐子大溫酒吞五七圓不拘時必效方治胎衣不出臍腹堅脹急痛即殺人服此藥胎即爛下死胎

牛膠

瞿麥各門各兩

通草兩

滑石

葵子五兩

右細切以水九升煮

殺人推其胎衣是胎衣有血奔心

生或將帶收其衣衣衣繫在四帶

出此用此藥水即爛出胎衣

心胎死腹中胎衣不下至如者但心

調一錢取下惡物如胎衣身血服

化為黃水即吐出或小便中出也若

藥不能達若先治血悶則尋常之藥

西火土之效也

花藥石一斤上色硫黃四兩

右二味相拌令均先用紙和膠泥固瓦罐子一箇內可

容藥候泥乾入藥在內密泥封口了焙籠內培令透熱
便安在四方埤上鋪行字用炭一秤籠週匝自巳
午時從下生火令漸漸上徹有墜下火放夾火上直至
經宿火冷炭消盡又放經宿鐘冷定取出細研以絹羅
至細藥合內盛依法用之此藥能治胎前產後血暈不省人事
有一親戚婦人產後胞衣不下血脹迷悶不記人事告之
曰死矣僕曰予收得趙大觀文身中真花藥石散在符中
謾以一貼贈之以童便調塗藥下即避衣與惡物旋即隨
下乘輿無恙

牛膝散治姙娠五六月胎前胞衣不出

牛膝 川芎 杜仲 蒲黃各三錢
桂心 黃芩 芍藥 白朮 各二錢

右爲散 每服一錢

六分去滓 煎服

若胞衣不出者 宜服此散

右入酒一斗 煎取五升

必効方 煎服

又方以生薑汁一斗 煎取五升

又方 以水噴產婦面神驗

延年方 以洗兒水令產母飲半碗其衣即下勿令產婦

又方 牛膝 助 葵子 一合

右搗碎以水一錢半煎至一錢去滓分二川

廣濟療胎衣不出方

右以末蜜炙中土三指搗以水服之集驗千金補急同

又方 竈下土研大寸用好醋調令相合納臍中續煎生
其草湯三四合服 救急一方 見子死腹中論中

又方 以醋湯飲之出

又方 雞子一枚苦酒一合和飲之立出

一方 用單麻子名 見產難門

延年方 療胞衣不出腹脹則殺人

吞雞子黃三箇仍解髮刺喉中令嘔即出若困極以水

煮蜈蚣一枚二拾沸灌入口中汁下即出崔氏同

救急方 用赤小豆炒 東流 水吞下

產乳療產後惡血衝心或胞衣不下腹中血塊存疾喘

右大黃一兩為末以好醋半升煮之

圓如梧桐子大溫醋湯五

治胞衣不下

右酒煮黃連

又方 知花

又方 以鹿角鈔屑三分為末煮為膏調下

凡欲產時必先脫常所著衣以籠重胎衣自下仍易產

廣濟方云取夫單衣並并上立出千金集驗救急方同

補遺催生湯 治胎衣不下方

又方取產母鞋底火炙熱熨小腹上下二十七次

又方取路傍故草鞋前截連鼻子燒灰童子小便和酒調

下 又方浸芋水濃煮溫飲二碗立下

又方皂角棘燒為末每一錢溫酒調下

治胞衣不下訣

婦人百病莫甚於生產產科之難臨產莫重於催生既產
其於胞衣不下惟有花藥石散一件最為緊要如黑神
散琥珀散諸方之類雖皆有驗然鄉居或遠於藥局各卒
之間無法可施今採得胡氏寶慶方一妙法云若產訖
衣不下待稍久非特產母疲倦又且血流入胞中為
所脹上衝心為喘急疼痛必致危篤若有此證且急斷
帶以少物繫喉以助呼吸切切切切切切切切切切切
血脈不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日
不害人只要產月之懷安泰終自下矣案試有驗不可
信坐婆婆安用此法多有因此而亡深可浩歎所以胡氏
引親見其法為據

產後血暈方論第五 九十七方

論
不能
多而
其治
以補
心下
古法
燒令
產後
其腹
中致
欲分
辨者
第一
消先
取
暈

以醋醱於傍使聞其氣兼細細飲之此為一法
以醋醱而甦來即飲醱仍少與解之
然令煙濃真產母內即醒效無不
部指中論曰產後血暈者何谷白產後
血隨氣上迷亂心忪故服前生花極
知人口噤沖子無冷驚以人識子
必難愈但服此方即愈

洋蘭葉

右為末用酒煎湯各一匙
服氣定

若血過多而昏者服此方即愈

氣

又方 荷葉
生地黃汁
入蒲黃煎藥汁後
療產後血暈心悶

蒲黃

紫葛

芍藥

右咬咀以水貳升煎至柒合入生地黃汁成合更煎三
伍沸每服叁合

產後血暈心悶恍惚如見鬼

生地黄母草汁

三合根亦可

生地黄汁

童子小便

雞子清

右煎參四沸後入雞子清攪停作膏服

產後血暈狂語不識人狂亂

童子小便 生地黄汁 赤馬通 紅雪

右以上等味浸於水內通氣去滓下紅雪為兩服

產後血暈昏迷不省衝心悶絕

五靈脂

真肉

右為末溫酒調下或鐵口噤者拗開口灌之入喉即愈

一方用煎參等分酒煎六兩便用下

又方治產後血暈 右神效

張氏方治產後血暈全不省人事極危殆者
用韭菜切入在一有背雞瓶內煎熟醋浸一甲子
瓶口以瓶背向產婦鼻孔令醋氣透入氣外扶病人
起惡血衝心故有此證非能去心之滯血加以醋氣

錢妙

張氏方治產後血暈全不省人事極危殆者

用韭菜切入在一有背雞瓶內煎熟醋浸一甲子

瓶口以瓶背向產婦鼻孔令醋氣透入氣外扶病人

起惡血衝心故有此證非能去心之滯血加以醋氣

運達之用無不效

近効方療血暈絕不識人煩悶言語錯亂惡血不盡腹中絞痛胎死腹中紅花酒

紅花酒

右為末分或服每服酒或漿子小使二錢取漿半候冷分為貳服酒洋丹併煎 一方懸中便

崔氏療產乳暈絕方

以洗兒水飲之令良 或以惡血服少許良

又方 半夏

右為末圓如大... 亦療... 絕指迷文神同

又方 生赤小豆... 果流水和服方寸匕不... 入心... 煩亂... 心失... 文

又方 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

後方

湯藥

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

右方... 湯藥... 治產後血暈... 煩亂... 心失... 文

又方松煙... 錢燒通紅膏... 滅火... 氣... 未... 止... 汗... 亦... 可...

又方... 方見前

又方... 微煙逼面熏之却不可大甚恐人怯不禁

產後顛狂方論第六 九三方

產後因驚馬助血衝心昏悶發狂如有鬼祟用芍方大

煎酸棗仁湯調下一服可安

何氏方產後因敗血及邪氣入心知見出物顛狂方

用大辰砂一二錢重研入磁瓶用飯兒煎汁三四茶匙

許調仍照前法服之

此部不用小合

此部不用小合

此部不用小合

此部不用小合

產後... 後

夫產後... 後

子細辨證... 後

不定者研好朱砂酒調下

珀地黃圓服之

而狂言獨語者當在第十九卷第一論

臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺

者當在十九卷第二論求之

氣弱腰背強直或歌哭噴笑言無常作風痺治

在十九卷第三論求之

語錯亂當在十九卷第兩命求之。五則產後多因敗血
迷亂心經而顛狂言語錯亂無常或重悶者當於本卷第
五六論求之。六則因產後發身風寒惡露斷然不行
寒發熱如症甚日明。暮則語語如凡鬼狀常作熱入血
室治之且藥用生乾地黃加生乾地黃加生乾地黃
胡等分煎服如不退者以生乾地黃加生乾地黃
分兩煎服愈雖然以上諸證大抵胎前產後之疾自有專
門一定之法其藥不同如產後首當逐敗生新然後細
詳辨疾證不可妄言各症自宜詳察妄自加減方藥大
對證依古法施治未有不安者也

產後發熱

方凡...

治產後發熱而虛心發熱狂

乾荷葉 生地黃 杜川芎

右二味濃煎湯調上汁與二錢下服調分

補遺方

川生乾地黃當歸

產後不語

論曰產後不語者何人心中有心有七孔一主產後虛弱多
致積敗血閉於心竅神志不清則了又心無通於舌心
氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服

人參 石菖蒲 生乾地黃 川芎

細辛二錢 防風 辰砂別研各半兩

右為細末每服一錢薄荷湯調下不拘時

胡氏孤風散治產後閉目不語

白礬研細生用每服一錢以熱水調下

補遺治產後不語

人參 石菖蒲 石蓮子去殼不去心

等分剉每四錢水煎溫服

