

大德重校聖濟總錄卷第一百五

十六

妊娠門

妊娠嘔逆不下食

妊娠痰飲

妊娠虛煩懊熱

妊娠欬嗽

妊娠傷寒

妊娠下痢

妊娠子淋

聖濟
總錄

妊娠嘔逆不下食

論曰妊娠之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦否隔胃中虛滿其氣上溢氣不下降故雖食飲卒不得下甚則嘔

逆

治妊娠嘔逆不下食和調胃氣豆蔻丸方

草豆蔻去皮

白朮各壹兩

人參壹兩半

陳橘皮

去白焙壹兩

半夏

半兩兩人生薑半兩擣爛焙

右五味擣羅為末用棗肉為丸梧桐子大每服二十

丸生薑湯下不計時候服

治妊娠嘔逆不下食和胃順氣生薑散方

乾生薑壹分

薑黃

陳橘皮去白

白芷

白朮

甘草各半兩

右六味搗羅爲散每服二錢匕用粥飲調下不計時

候
治妊娠嘔逆不下飲食胸膈痞悶白朮散方

白朮壹兩

木香

青橘皮去白兩

丁香

麥蘗炒

人參

赤茯苓去黑皮各壹兩

檳榔各半

乾薑壹分炮裂

右一十味搗羅爲散每服二錢匕入鹽少許沸湯點

不計時候服

治妊娠嘔逆不下食升降陰陽和調胃氣茯苓湯方

茯苓去木

黃耆炙

人參

白朮各半兩

藿香葉

甘草各壹兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片同煎至六分去滓食前溫服

治妊娠嘔逆不下食和胃氣利胸膈人參湯方

人參

山芋

白茯苓去黑皮

陳粳米各壹兩

半夏半兩湯洗

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片棗

三枚擘破同煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠嘔逆不下食心腹滿悶脇肋疼痛枇杷葉湯方

枇杷葉拭去毛半夏湯洗拾遍陳橘皮湯浸去白焙

高良薑 丁香 甘草炙

檳榔剉各兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎

至六分去滓稍熱服

治妊娠嘔逆不下食飲保生湯方

陳橘皮貳兩湯浸去白瓤焙

白木半兩

麥門冬壹兩去心

人參壹兩去蘆頭厚朴壹兩去麤皮生薑汁炙

令香

白茯苓兩

右六味搗篩為末每服四錢匕水一中盞入生薑三

片淡竹葉二十片煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠嘔逆不下食飲人參散方

人參參分去蘆頭

前胡壹兩去蘆頭

白木參分

甘草半兩炙

麥門冬壹兩去心

陳橘皮壹兩湯浸去白瓤焙

白茯苓壹兩

葛根半兩剉

半夏參分湯洗米泔去滑

右九味搗篩為散每服三錢匕水一中盞入生薑五

片棗三枚煎至六分去滓溫服

治妊娠嘔逆食物不下馨香散方

藿香葉

壹兩

芎藭

半兩

半夏

半兩湯洗
去滑

當歸

參分剉
微炒

茅香

壹握
去土

麥門冬

參分
去心

右六味搗羅為細散每服三錢匕水一中盞加入生

薑自然汁半分與藥一處同煎至六分并滓溫呷不

計時候

治妊娠嘔逆不下食厚朴湯方

厚朴

去麤皮生
薑汁炙

人參

白茯苓

去黑

陳橘皮

湯浸去
白焙

白木

竹筴

半夏

為末生薑汁製作
餅暴乾各壹兩

右七味廔攪篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓食前溫服

治妊娠嘔吐惡食七物飲方

淡竹筴

壹兩

人參

貳兩

桔梗

炒

前胡

去蘆
頭

半夏

湯洗米穢廔
汁浸炒焙乾

白茯苓

去黑皮
各壹兩

右七味剉如麻豆大拌勻每服五錢匕水一盞半生

薑三片棗兩枚擘破煎至八分去滓溫服

妊娠痰飲

論曰痰飲者由氣道澀滯水飲停積結聚而不散令人
膈脘痞悶嘔逆惡心體重多唾不思食飲妊娠痰飲不

可專以破痰逐飲之劑故昔人論諸病痰飲者當以溫藥和之

治妊娠痰飲嘔逆惡心利膈丸方

半夏參兩湯洗去滑搗羅為細末生薑汁和作餅于焙乾用

前胡去蘆頭壹兩 赤茯苓去黑皮 檳榔剉碎

百合 陳橘皮湯浸去白焙乾 訶梨勒煨去核

桔梗炒 枳殼去瓤炒微黃 人參各半兩

右一十味搗羅為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後溫生薑湯下

治妊娠痰飲不消嘔逆可食半夏湯方

半夏湯洗去滑 人參 芎藭

赤茯苓去黑皮 桑根白皮炙 生乾地黄焙

芍藥各半分 陳橘皮湯洗去白焙乾兩

甘草炙半兩

右九味麩搗篩每服四錢匕水一盞入生薑半分煎取七分去滓溫服不拘時候

治妊娠痰飲留滯不思飲食前胡湯方

前胡去蘆頭壹兩 半夏貳兩以生薑自然汁壹升半漿水壹升同於銀器內慢火

煮令水與薑汁盡薄切焙乾 人參 木香各壹兩剉

厚朴塗生薑汁炙 枳殼去瓤炒

旋復花

陳橘皮湯浸去桔梗炒各

赤茯苓

去黑皮

白木各壹兩

甘草參分炙微

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五

片同煎至七分去滓不計時候溫服

治妊娠痰飲胸膈不利可思飲食旋復花湯方

旋復花

去

枳殼去蘊麩炒半夏湯洗柴編薑汁浸焙乾

木通

各壹兩

前胡去蘆頭

白木

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮湯浸去檳榔各陸兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

煎至八分去滓空心服午前再服此藥利胸膈行滯

氣消痰飲療脹滿極効有風痰人常宜服一方有甘

草炙三錢

治妊娠痰逆不思飲食止煩渴定欬麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

半夏生薑自然汁浸壹宿切炒

貝母

炮

青橘皮去白

乾薑炮

甘草

炙各壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕生薑三片水一盞慢火

煎至七分去滓通口空心食前服

治妊娠痰飲不除胸膈支滿嘔逆不思飲食赤茯苓湯

方

赤茯苓去黑皮

前胡去蘆頭

白朮

紫蘇各壹兩

半夏湯洗

大腹皮剉

人參

麥門冬去心焙各半兩

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑半分煎取八分去滓不計時候溫服

治妊娠痰飲欬嗽嘔逆不思飲食木香丸方

木香

甘草

白朮

陳橘皮湯洗去白

天南星

半夏生薑汁浸壹宿炒 白芷各半兩

乾薑壹分

右八味搗羅為末同粟米飯為丸如梧桐子大每服

二十九食後煎生薑棗湯下

治妊娠痰飲膈脘痞悶嘔逆惡心天南星丸方

天南星

半夏貳味並去積用生薑自然汁浸參宿細切焙乾用

人參

白茯苓去黑皮各壹兩 白礬壹兩半研細

右五味搗羅四味為末入白礬和藥再研令勻用生

薑汁煮麪糊軟硬得所和丸如梧桐子大每服十五

丸熟水下空心日午晚食前各一

治妊娠痰逆和脾胃思飲食黃耆湯方

黃耆剉壹兩

半夏半兩湯洗 芎藭半兩

甘草炙壹分

人參

白朮

陳橘皮

去白

赤茯苓

去黑皮

枳殼

去瓢炒

訶梨勒皮

各參分

右一十味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片

棗一枚擘同煎至六分去滓溫服不拘時

治妊娠痰盛嘔逆惡心頭目旋運枳殼丸方

枳殼

去瓢炒

乾薑

炮裂

白朮

剉炒

半夏

兩湯洗去滑焙乾

右四味搗羅為末生薑汁煮麪糊和丸如梧桐子大

每服十五丸溫米飲下食前服漸加至二十九

治妊娠痰盛膈腕滿痞不思飲食丹砂沉香丸方

丹砂

別研

沉香

細

肉豆蔻

去殼

半夏

各壹兩湯洗榮福去滑切作片子焙

人參

參

丁香

參炒

白茯苓

去黑皮剉

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

檳榔

剉各半兩

右一十味除丹砂外搗羅為末入丹砂研拌令勻鍊

蜜和丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯下食前服

治妊娠痰飲浸漬膈腕目運頭旋乾薑丸方

乾薑

炮

白礬

熬令盡

芎藭

半夏

生薑汁同炒黃各壹兩

白朮

剉

右五味搗羅為末煮棗肉和丸如小豆大每服十五

丸溫淡生薑湯下不計時候服

治妊娠痰盛調脾胃進飲食人參丸方

人參

高良薑

白茯苓去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去麩皮生薑汁炙令香熟各壹兩

半夏

貳兩湯洗柒福去滑炒令乾

乾薑炮

甘草炙各半兩

右八味搗羅爲末用生薑汁浸蒸餅心和刺爲丸如

梧桐子大每服三十九食後臨臥生薑湯下

治妊娠痰盛止嗽寬膈和氣進食白木散方

白木壹兩

人參貳兩

白茯苓去黑皮參分

黃耆微炙剉

薑製半夏各壹兩山芋

桔梗炒

桑根白皮微炙剉白芷

五味子各半兩

甘草壹分炙

右一十一味搗羅爲散每服二錢匕沸湯點食後臨

臥服

妊娠虛煩懊熱

論曰妊娠虛煩懊熱者以陽氣偏勝熱氣獨作心下懊悶頭痛面赤小便黃澁甚則淋痛是也病源又謂之子

煩

治妊娠虛煩懊熱退熱湯方

人參 甘草 多 黃芩 去黑心 各貳兩

當歸 切 芍藥 梔子 人

防風 去 義 芫胡 壹兩 去苗各

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓

溫服食後

治妊娠虛煩懊熱胎氣不寧手足煩倦此胡飲方

芫胡 去 桑上寄生 知母 切 焙

百合 洗 麥門冬 去心 升麻 各壹兩

甜竹筴 新竹刮 用參兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片同

煎至一盞去滓食後溫服

治妊娠虛煩懊熱心中悶亂頭運重嘔逆四肢倦怠伏

苓湯方

赤茯苓 去黑皮 防風 去 義 人參

白朮 剉 炒 枳殼 去麩 炒 甘草 各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服不拘時

治妊娠虛煩懊熱知母湯方

知母 切 焙 防風 去 義 黃芩 去黑心

甘草 炙 麥門冬 去心 赤茯苓 去黑皮 剉

升麻 各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至七分入竹瀝少許攪勻去滓溫服不拘時

治妊娠心下煩懊熱躁竹瀝湯方

防風 去義

麥門冬 去心煇

黃芩 去黑心

升麻

石膏 碎

梔子人 各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞竹瀝半合煎至七分去滓食後溫服日再

治妊娠煩懊虛悶四肢疼痛不睡酸棗人湯方

酸棗人 兩炒貳

芍藥

防風 去義

赤茯苓 去黑皮

芫胡 去苗

犀角 鎊

五味子

甘草 炙

人參

檳榔 剉各壹兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓不拘時溫服

妊娠欬嗽

論曰妊娠欬嗽者以肺感寒氣故也經謂形寒飲冷則傷肺久欬不已則寒氣相移不惟孕育有傷而肺氣痿弱皮毛枯悴治法宜發散寒邪資補胎氣則欬嗽自已治妊娠欬嗽喘滿短氣防已湯方

防已

白藥子各壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服未効再服

治妊娠欬嗽胸滿氣急減食此胡湯方

此胡去苗

桃人去皮尖雙天門冬去心

麥門冬去心

甘草炙 白茯苓去黑皮

山芋

黃耆剉 阿膠炙

人參各壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去

滓不計時候溫服

治妊娠欬嗽及安胎氣槐豆散方

槐豆炒

當歸酒浸切

貝母去心

芎藭

人參各壹兩

右五味麤羅爲散每服二錢匕溫酒調下日三

治妊娠欬嗽不止麥門冬飲方

麥門冬去心焙 紫苑土

杏人去皮尖

桑根白皮剉各 栝梗炒 參

甘草炙 薑

右六味麤搗篩每服三錢匕竹茹如雞子大水一盞

半煎減半入蜜少許打轉去滓溫服日三

治妊娠欬嗽人參散方

人參

陳橘皮湯浸去白焙甘草炙各兩

生薑

伍兩洗切作片子焙

右四味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下

治妊娠欬嗽胸膈不利痰涎壅悶前胡湯方

前胡去苗

和皮大腹剉

半夏為末生薑汁和作餅子

陳橘皮去白炒

甘草炙各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至六分去滓食後臨臥溫服

治妊娠欬嗽不止消痰逆和胃氣丁香半夏湯方

丁香炒

木香炮

半夏生薑汁拌炒各半兩

人參

白朮剉

桔梗炒

白豆蔻去皮

陳橘皮湯浸去白焙甘草炙

檳榔剉

前胡去苗剉炒

赤茯苓去黑皮各貳兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠欬嗽痰盛嘔逆白朮湯方

白朮貳兩

半夏壹兩生薑汁浸壹宿焙

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至半盞去滓食後溫服日三

治妊娠欬嗽痰盛喘逆桑白皮丸方

桑根白皮貳兩半夏壹宿焙阿膠炒令

人參各壹兩丹砂研壹分甘草炙半兩

右六味搗羅為末糯米粥為丸如雞頭實大每服一

丸食後臨臥含化嚥津

治妊娠感風冷欬嗽痰壅頭目昏痛荆芥飲方

荆芥穗 旋復花 前胡去苗各兩

芍藥 半夏生薑汁製去毒甘草各壹兩炙

麻黃去節煎掠去沫壹兩半

右七味麴搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

六分去滓不拘時溫服

妊娠傷寒

論曰妊娠感冒寒邪藏於皮膚洒然而寒愴然而悶頭項痛腰脊強脉浮在表者當汗之在裏者下之汗下之理制方宜輕但非破血傷胎之劑皆通用之和其陰陽正其表裏使經不傳邪無深入斯無危殆矣

治妊娠傷寒安胎出汗阿膠湯方

阿膠炒令燥壹分獨頭蒜壹頭以秋收瓜蔓裹了外

斤連命通赤放冷打開取出細研為末無瓜蔓但只以瓜根半兩代

羌活去蘆頭獨活去蘆頭蒼朮米泔浸壹宿去麩皮炒

紫苑土白朮 人參

附子炮裂去皮甘草半斤

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入連須葱

白一寸同煎至七分去滓溫服如人行十里許連服

二服至三服末後一服喫了便以冷水漱口漱一二

十徧漱罷以衣微蓋取汗

治妊娠傷寒壯熱憎寒頭疼體痛白朮湯方

白朮壹兩

麻黃去節先煎

去沫焙

石膏

葛根剉

何首烏

甘草各

壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸煎

取七分去滓溫服不計時候

治妊娠傷寒發熱惡寒身體疼痛麻黃湯方

麻黃

去節先煎蒼朮各

白朮壹兩

陳橘皮

去白炒甘草壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸鹽

豉七枚煎至七分去滓溫服不計時候

治妊娠傷寒頭痛惡寒渾身壯熱前胡湯方

前胡去蘆

細辛去苗

芎藭

麻黃

去根節先煎

杏仁去皮尖雙

枳殼去穢炒

防風去

澤瀉

芍藥各參兩

茯神去木兩

白朮

旋復花各貳兩

甘草勞破炙

乾薑炮裂各兩半

半夏參兩水煮參伍拾沸薄切放乾入生薑汁拌炒黃色

右一十五味蠶搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一

寸同煎至六分去滓稍熱服不計時候

治妊娠傷寒初受病二三日頭痛肢體疼痛煩躁惡風

身熱憎寒並皆治之白朮湯方

白朮煨炒

石膏各貳兩別研如粉 甘草炙

人參

五味子微炒

芎藭剉

麻黃去根不去節先煎去沫焙各壹兩

乾薑炮裂

右八味除石膏外蠶搗篩入石膏末拌和令勻每服

三錢匕水一盞入生薑三片棗三枚擘破同煎至六

分去滓稍熱服不拘時

治妊娠傷寒頭痛體疼安胎和氣異功湯方

麻黃去根節先煎掠去沫焙肆兩

蒼朮米泔浸壹宿

白朮各貳兩米泔浸壹宿剉焙

芎藭

甘草炙黃剉各壹兩半

右五味蠶搗篩每服三錢匕水一盞入葱白二寸煎

至七分去滓通口服日三

治妊娠傷寒憎寒壯熱頭痛體疼此胡湯方

蘇金一百五十六
此胡去

白朮 各壹兩米泔浸半日炒

芍藥

當歸乾

芍藥

防風去

赤茯苓 去黑皮黃者細切

生乾地黄 焙各半兩

右九味搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘破生

薑三片煎六分去滓不計時候溫服

治妊娠傷寒憎寒發熱頭痛體疼前胡湯方

前胡去蘆

升麻

麻黃 先煎掠去沫焙

人參

羚羊角銹

白朮 各壹兩

陳橘皮

去白炒

甘草炙壹分

右八味搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸生

薑三片煎至七分去滓稍熱服不計時候

治妊娠傷寒頭疼壯熱前胡湯方

前胡去蘆

白朮

人參

石膏碎

黃芩 去黑心各貳兩

右五味搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸同煎至六分去滓溫服空心食前

治妊娠傷寒護胎白散子方

白藥子

右一味不拘多少爲末用雞子清調塗在紙花上紙

可挽口大貼在臍下胎存處乾即以溫水潤之

治妊娠傷寒頭痛壯熱前胡湯方

前胡去蘆頭

黃芩去黑心

石膏碎

阿膠炙燥各兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎六分去滓不

拘時溫服

治時氣令不墮胎方

伏龍肝兩參

右一味水和塗臍方五寸乾即易

治妊娠七八月暴傷風寒身體煩疼寒熱往來胎動不

安頭昏眩腰背痠痛芍藥飲方

芍藥

當歸煨切

白朮

甘草炙

人參

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片漉

白三寸同煎至八分去滓溫服不拘時

治妊娠傷寒安胎益氣白朮湯方

白朮

黃芩等分新瓦上同炒香

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片大棗

一枚擘破同煎至七分去滓溫服但覺頭痛發熱便

可服三二服即差唯四肢厥冷陰證者未可服

妊娠下痢

論曰妊娠飲食過傷脾胃不和冷熱之氣入於腸間腸虛則泄故為痢也然冷多則白熱盛則赤冷熱相交赤白相雜甚則膿血雜下速宜藥之恐傷胎也

治妊娠下痢日夜頻併臍腹撮痛厚朴散方

厚朴去麤皮生薑汁炙熟參兩

吳茱萸水浸半日炒參分

藜香子微炒 乾薑剉

甘草炙

陳橘皮去白焙各壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕煎紫蘇木瓜湯調下食前服

治妊娠下痢不可療者及丈夫脾虛泄瀉肉豆蔻散方

肉豆蔻拾枚大者去殼用白麩作麩餅于嬰文武火煨令黃色去麩

草豆蔻拾枚去皮白麩裹文武火煨令黃色去麩 木香兩

訶梨勒貳拾枚拾枚炮過熟為度拾枚生俱去核 甘草壹分蜜炙

右五味搗羅為散每服二錢匕米飲調下食前

治妊娠下痢及水瀉不止米穀不消化者神捷散方

菖蒲切作片子於麩內炒 赤石脂各壹兩大火內煨通赤

乾生薑兩半

右三味搗羅為散空心米飲調下二錢匕日三

治妊娠下痢極甚者不過三五服見効狐灰散方

野狐腸連心肺須曠月收於罐子內以文武火燒取黑灰不得令遇火候有青煙出

便塞却煎子勿令透氣候冷取

右一味研為細散每服二錢匕米飲調下極甚者一

日三服大効三日內頓安如是尋常痢或疼痛立愈

治妊娠下痢日夜頻併安胎氣止腹痛阿膠丸方

阿膠炒令燥

醋石榴皮各半兩黃連壹兩去須炒

當歸焙切

肉豆蔻去殼各參分

右五味搗羅為末鍊蜜丸如赤小豆大米飲下十五

丸食前

治妊娠下痢頻併後重裏急黃連湯方

黃連去須搗碎炒

黃蘗去蘗皮各參兩

白朮肆兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片同

煎至八分去滓溫服日三

治妊娠下痢臍腹撮痛益胃氣思飲食建脾湯方

厚朴去須皮剉

蒼朮水浸去皮剉各肆兩大棗壹升煮臈剉

薑汁約伍升以來同煮厚朴蒼朮候水盡為度漉出焙乾

陳橘皮去白麩炒參兩

白茯苓去黑皮人參貳兩

甘草炒參兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片棗

一枚擘破同煎至六分去滓溫服此藥能進食調脾

胃

治妊娠下痢腹痛腸鳴白豆蔻湯方

白豆蔻 用人壹半
生壹半熟

陳橘皮 去白炒
細切

訶梨勒 去核半桂去麝
生半熟

當歸 切焙各
貳兩

枳殼 去穢漿水煮
輒麩炒半斤

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑五片棗二

枚擘同煎至七分去滓稍熱服如要丸用好棗漿水

煮去皮核細研和為丸如梧桐子大以生薑拍碎炒

黑色入水煎湯下十五丸

治妊娠下痢日夜不止方

烏梅 貳兩輒者竹串
慢火炙令乾焦

右一味為細散食前陳米飲調下二錢匕如瀉血加

黃連一兩為末

治妊娠下痢和調脾胃保護胎氣木香散方

木香 肉豆蔻去殼
蜜陀僧煨

沒藥 研陳橘皮去白
龍骨各壹

訶梨勒 去核當歸切
赤石脂

甘草 各半胡椒
乾薑炮各

右一十二味擣羅為散每服二錢匕米飲調下日三

治妊娠下痢方

敗龜 壹枚用
米醋炙

右一味搗羅為散米飲調下二錢食前服

治妊娠下痢膿血不止腹中疴痛阿膠丸方

阿膠炒令燥

白朮伍兩

黃連去須

肉豆蔻人兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸食前溫米飲下

治妊娠下痢冷熱相攻赤白相雜日夜不止訶梨勒湯

方

訶梨勒炮去核

蒼朮去皮

肉豆蔻去殼

赤石脂已上各壹兩

乾薑半兩炮裂到

阿膠壹兩搗碎炒令黃燥

艾葉壹兩炒令微黃

白朮壹兩

龍骨半兩

陳橘皮壹兩湯浸去白瓢焙

甘草壹兩炙微赤到

右一十一味搗羅為細末每服二錢匕以粥飲調下

不計時候

治妊娠下痢赤白腹中疴痛腰疼或如欲產黃蘗散方

黃蘗微炙到

桑寄生

當歸微炒到

赤芍藥

阿膠杵碎炒令黃燥

艾葉炒令微黃

芎藭已上各壹兩

乾薑參分炮裂到

甘草一分炙微赤到

右九味搗羅為散每服四錢匕以水一中盞煎至六

分去滓不計時候稍熱服

治妊娠下痢赤白心腹疔痛小便澀方

糯米合

黃耆壹兩

當歸壹兩半

右三味拌和勻以水二大盞半煎至一盞半去滓不

計時候溫分四服

治妊娠下痢赤白腹痛日夜不止白朮散方

白朮壹兩

黃芩兩

赤石脂兩

乾薑半兩

芎藭分

艾葉壹兩

人參壹兩

阿膠壹兩

右九味搗羅爲細散每服三錢匕粥飲調下不計時候

治妊娠下痢赤白疔刺腹痛不可忍石榴皮散方

醋石榴皮

阿膠壹兩

黃蘗壹兩

當歸壹兩

芎藭分

右六味搗羅爲細散每服三錢匕薤白粥飲調下不

計時候

治妊娠下痢赤白腹痛不止阿膠散方

阿膠

當歸壹兩

白朮分

艾葉半兩

醋石榴皮半兩

右五味搗羅爲散每服四錢匕水一中盞半入生薑

三片同煎至八分去滓溫服

治妊娠下痢乾薑散方

乾薑炮

細辛去苗

桂去麤皮

附子炮裂去皮椒目

豬苓各半

小麥麩炒貳兩

右七味搗羅為散每服方寸匕溫酒調下

治妊娠下痢艾葉湯方

艾葉去梗炙

白芷

阿膠炙令

白朮炒

厚朴去麤皮生薑汁炙 黃連去須各壹兩

茯苓去木

地榆皮

赤石脂研各壹兩半

黃芩去黑心

肉豆蔻去殼

右一十一味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半生薑

五片煎至八分去滓溫服

妊娠子淋

論曰婦人懷子而淋者謂之子淋因腎虛膀胱經客邪熱令洩少而數水道澀痛痛引於臍者是其候也
治妊娠子淋日夜頻數澀痛石蟹散方

石蟹碎壹枚

乳香分

滑石壹兩半

右三味研細為散每服一錢匕煎燈心湯調下

治妊娠子淋海蛤湯方

海蛤

木通剉

豬苓去黑皮各半兩

滑石

碎

冬葵子

微炒各壹分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入燈心十莖同煎至六分去滓食前溫服

治妊娠子淋滑石湯方

滑石

貳兩

赤柳根

剉半兩焙

右一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分食

前去滓溫服

治妊娠子淋小便頻澀痛白芷散方

白芷

參分

鬱金

阿膠

炙

滑石

各壹兩

各半壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎葱白湯調下

治妊娠小便頻數澀少疼痛石韋湯方

石韋

去毛

榆白皮

剉各壹兩

滑石

貳兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白二寸生薑

薑一片煎至六分去滓食前溫服

治妊娠子淋澀痛木通湯方

木通

石韋

去毛各壹兩

陳橘皮

湯浸去白炒

赤茯苓

去黑皮

芍藥

桑根白皮

剉

人參

各壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑一聚

大拍碎煎至八分去滓溫服

治妊娠子淋澁痛煩悶當歸湯方

當歸切

芍藥

赤茯苓去黑皮

甘草炙

梔子人各半兩

右五味麝搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

溫服

治妊娠子淋小便澁少疼痛煩悶赤芍藥湯方

赤芍藥壹兩

檳榔壹枚麵裹煨熟去麵

右二味麝搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治妊娠子淋人參散方

人參

木通剉

青鹽細研以湯壹盞化浸前貳

味壹宿精乾

海金沙別研各壹分

莎草根去毛貳兩

右五味將人參木通莎草根搗羅為細散同海金沙青鹽一處再研勻每服二錢匕空心酒或米飲調下

大德重校聖濟總錄卷第一百五十六

大德重校聖濟總錄卷第一百五十七

妊娠門

妊娠胎間水氣肌膚浮腫

妊娠小便不通 妊娠小便利

妊娠大便不通 妊娠大小便不通

妊娠半產 妊娠數日不產

妊娠數墮胎

妊娠胎間水氣肌膚浮腫

論曰脾合土候肌肉土氣和平則能制水水自傳化無有停積若妊娠脾胃氣虛經血壅閉則水飲不化濕氣淫溢外攻形體內注胞胎懷妊之始腫滿者必傷胎氣如臨月而脚微腫者利其小便則病可愈

治妊娠經氣壅滯身體浮腫喘促大便難小便澀澤瀉湯方

澤瀉

桑根白皮剉

木通剉

枳殼去瓤

赤茯苓去黑皮

檳榔剉各壹兩

右六味搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎煎至八分去滓食前溫服稍利為度日再

治妊娠通身浮腫喘息促小便澀防已湯方

防已 大腹皮剉各 桑根白皮剉

紫蘇莖葉 赤茯苓去黑皮各壹兩 木香壹分

右六味麤搗篩每服四錢水一盞入生薑半分拍碎

煎至六分去滓食前溫服

治妊娠身體浮腫心腹脹滿小便不通木通湯方

木通剉 香薷 桑根白皮剉各

木香 訶梨勒皮 黃芩各一分

枳殼去瓢麩炒 檳榔 紫蘇莖葉各半兩

右九味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生薑半分拍

碎煎至六分去滓溫服食前日再

治妊娠四肢腫滿小便不利喘促桑白皮湯方

桑根白皮剉壹兩 枳殼麩炒 商陸各半兩

澤瀉分 冬葵根 赤茯苓去黑皮

木通剉各壹兩

右七味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎煎至八分去滓食前溫服以利為度

治妊娠四肢浮腫皮肉拘急小便不利商陸湯方

商陸 羌活去蘆頭各半兩 桑根白皮剉壹兩

右三味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入赤小豆一百粒煎至八分去滓食前溫服日再

治妊娠身體浮腫心腹急滿小便赤澀赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 白朮 旋復花各半

杏仁湯浸去皮尖 木通 黃芩各參

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓食前溫服

治妊娠身體腫有水氣心腹脹滿小便澀茯苓丸方

赤茯苓去黑皮 檳榔剉半 白朮炒參

郁李人湯浸去皮 枳殼去瓤

葶藶子炒令黃

右六味搗羅四味為末入二味同研令細鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸煎桑白皮湯下

治妊娠水腫茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 白朮 黃芩去黑

杏仁湯浸去皮尖 旋復花各壹 防己兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服

治妊娠胎間水氣子滿體腫茯苓飲方

赤茯苓去黑皮 白朮各貳 杏仁去皮尖

旋復花兩各壹 黃芩去黑心壹兩半

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎七分去滓

溫服空心食前日二

治妊娠四肢腫皮肉拘急桑白皮飲方

桑根白皮剉炒壹兩 商陸根壹兩半 赤小豆合參

羌活去蘆頭半兩

右四味咬咀如小豆大拌勻用水五盞入生薑七片

同煮候豆熟濾去滓濁即飲汁并食豆小便利差

治妊娠偏身虛腫寄生飲方

桑寄生壹兩 桑根白皮剉炒參分 木香兩半

紫蘇莖葉壹兩 大腹貳分

右五味細剉如麻豆大拌勻每服三錢匕水一盞煎

至七分去滓溫服

妊娠小便不通

論曰妊娠小腸挾熱熱結胞內使氣道否澀故小便不

通令人腹脇脹滿臍下急痛是其證也

治妊娠小便不通及胞轉臍下脹痛木通丸方

木通剉 黃芩去黑心 冬葵子微炒

生乾地黄焙各壹兩

右四味擣羅爲末用麩糊和丸如梧桐子大每服二

十九燈心湯下食前服

治妊娠小便不通心神悶亂少腹急痛榆白皮散方

榆白皮剉

王不留行

滑石各壹兩

右三味搗研為細散每服二錢匕煎燈心湯調下

治妊娠小便不通臍下鞭痛豬苓湯方

豬苓去黑皮

木通剉

桑根白皮剉各壹兩

右三味蠶繭篩每服三錢匕水一盞入燈心同煎至

七分去滓食前溫服

治妊娠小便不通小腹脹痛冬葵子散方

冬葵子微炒

榆白皮細剉

滑石研

阿膠炙令燥各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕溫水調服不拘時

治妊娠小便不通臍下滿痛四味葵根湯方

冬葵根壹握洗去土冬即用子

車前子

木通細剉各參兩

阿膠炙令燥貳兩

右四味蠶繭篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治妊娠子淋小便不通大黃湯方

大黃剉

地膚草

豬苓去黑皮

知母微炒

芍藥

枳實去瓤炒

升麻

木通剉

甘草炙各兩

黃芩

去黑心半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分

去滓溫服日再

治妊娠小便不通茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

白朮

郁李人

湯浸去皮尖

杏仁

去皮尖雙入炒

旋復花

各壹兩

檳榔

伍枚剉

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服

治妊娠患淋小便澀不通小腹水道熱痛冬葵子湯方

冬葵子

參合

黃芩

去黑心半兩

赤茯苓

去黑皮

芍藥

車前子

各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去

滓空心溫服

治妊娠小便澀車前子湯方

車前子

貳合

冬葵根

洗剉貳兩半

右二味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分

去滓空心溫服

治妊娠小便不通快茯苓散方

赤茯苓

去黑皮

冬葵子各壹兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕以溫水調服日三

治妊娠小便不通利榆白皮湯方

榆白皮

剉

冬葵子

各壹兩

右二味廩擇篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓空心食前溫服日三

治妊娠小便澁不通利蔓荆實散方

蔓荆實

剉

右一味擣羅爲散每服二錢匕溫水調服空心午前

各一

治妊娠子淋小便數少熱痛手足煩疼地膚湯方

地膚草

剉

右一味廩搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服日三

治妊娠患子淋豬苓散方

豬苓

去黑皮

右一味擣羅爲散每服二錢匕熱湯調不拘時服

治妊娠患子淋及小便不通冬葵根湯方

葵根

壹握剉用子
壹合研亦得

右一味以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服

治妊娠小便不通方

葵根切壹

榆皮兩半

右二味以水三盞半煎至一盞半分溫三服

又方

蔓菁子伍

右一味搗羅為散溫水調服方寸匕

治妊娠小便澁滑石傳方

滑石兩

右一味細研每次用半兩以新汲水調稀稠得所塗於臍下三寸小便即利未利更塗之

妊娠小便利

論曰腎主水入胞為小便腎氣和平乃能約制洩出以時若妊娠腎虛胞冷不能約制故小便利下而多也其證令人背項憎風少腹急痛治法當加以扶養胎氣之劑

治妊娠小便滑數桑螵蛸湯方

桑螵蛸炒

人參各壹兩

鹿茸去毛

黃耆剉各兩

牡蠣粉壹兩

甘草炙

右六味燻搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大切

棗二枚擘煎至七分去滓食前溫服

治妊娠下焦冷氣少腹疼痛小便利多鹿茸丸方

鹿茸去毛酥

白龍骨燒過

桑螵蛸炒

牡蠣粉貳

右四味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九空心思前溫湯下

治妊娠遺尿雞脰散方

雞脰脰拾乾

熟乾地黃焙

當歸焙各

牡蠣粉

黃耆剉各

厚朴去器皮生薑汁炙

右六味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

治妊娠小便無度白薇散方

白薇

白芍藥各壹

右二味搗羅為散每服一錢匕食前溫酒調下日三

治妊娠小便利日夜無度菟絲子丸方

菟絲子酒浸貳兩

菖蒲

肉苁蓉酒浸切焙

蛇牀子酒浸三日

乾

河水海焙

五珠子洗焙各

防風去

遠志去心各

右七味搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大

每服十九空心溫酒下

治妊娠小便利溫氣除寒補下丸方

葫蘆巴酒浸

龍骨研

菖蒲各半

龍骨研

菖蒲各半

遠志去心壹兩半 補骨脂炒 益智皮去

肉蓯蓉酒浸壹宿切

右七味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三

十九空心溫酒下

治妊娠小便利秦椒丸方

秦椒去目及閉口炒出汗陸兩 藜香子炒壹

黃蠟肆兩蒸化入地黃汁少許攪勻

右三味搗羅二味為末鎔蠟和丸如梧桐子大每服

二十九空心溫酒下

治妊娠小便利少腹急痛艾葉丸方

艾葉炙 乾薑生各壹兩 厚朴去麤皮生薑汁炙

益智去皮各半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

九米飲下以飯壓之

治妊娠小便利日夜頻數椒菊丸方

蜀椒去目及合口炒取紅貳兩 甘菊花

肉蓯蓉酒浸壹宿切焙 菖蒲各壹兩 巴戟天去心

遠志去心 黃耆剉 附子炮裂去皮

右八味為細末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二

十九空心食前溫酒下

治妊娠小便不禁臍腹疼痛熟乾地黄丸方

熟乾地黄

焙

巴戟天

心

肉苁蓉酒浸切焙

五味子

山茱萸

酒浸炒

茯苓子炒去

萆薢

山芋

蜀椒去目及合口者炒取紅

續斷各壹兩

菟絲子

酒浸別攪

杜仲去蟲皮蜜炙各半兩

沉香

壹兩

右一十二味為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十

五丸食前溫酒下

妊娠大便不通

論曰妊娠腸胃有風加之挾熱津液不足氣道否澁故

令腸胃枯燥大便不通甚則呼吸奔喘腹脹乾嘔

治妊娠大便不通腹滿不能食養津液潤腸胃麻人丸

方

大麻人

別研如膏肆兩

訶梨勒煨去核各貳兩

大黃

劉妙半兩

右四味先搗後三味為末次入麻人鍊蜜和劑更於

臼內塗酥杵勻丸如梧桐子大每服三十九空心溫

水下大便通即止

治妊娠大便熱結旬日不通檳榔丸方

檳榔

碎劉壹兩

木香

半兩

大黃

劉妙貳兩

青橘皮湯浸去白

牽牛子兩壹半
生用壹半

炒

右五味搗羅爲末鍊蜜和劑更於白內塗酥杵勻丸
如梧桐子大每服二十九溫水下空心服

治妊娠熱在臍府大便秘澁羌活丸方

羌活

去蘆頭
兩半

大麻人別研

檳榔伍枚

防風去

枳殼去瓢
各壹兩

大黃剉炒壹
兩半

木香壹兩

右七味搗羅六味爲末與麻人同研勻鍊蜜和丸如
梧桐子大每服二十九溫水下食前服日三以微利

爲度

治妊娠大便結塞不通臍腹鞭脹不能安臥氣上喘逆

枳殼丸方

枳殼

去瓢
壹兩半 大黃微炒
兩半

右二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

九空心米飲下未通再服以通爲度

治妊娠大便不通腸脇堅脹潤腸丸方

枳殼

去瓢
爲末

大麻人別研
壹兩

右二味再研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九

食前溫水下生薑湯亦得

治妊娠大便不通葱膠湯方

葱白

壹莖切

牛皮膠

貳片大者推碎

右二味以水一盞半煎令膠烊盡去滓頓服之

治妊娠大便不通踈氣黃者丸方

黃耆

剉

枳殼

去瓤壹兩

妙威靈仙兩

右三味搗羅爲末用麪糊和丸如小豆大每服三十

丸溫水下不拘時未通稍加之

妊娠大小便不通

論曰妊娠大小便不通者以藏府盛實熱氣蘊積不時宣導之所致也若熱結於大腸則大便不通結於小腸

則小便不通今大小腸俱有熱則大小便俱不通其候令人煩滿少腹脹急惟能均調府藏使氣疏達則傳化無所留滯矣

治妊娠大小便不通臍腹脹痛梔子湯方

梔子

人壹兩

石膏

兩

黃芩

去黑心壹兩半

澤瀉

兩

芫胡

去苗壹兩半

赤芍藥

兩

葶藶

壹兩半

車前草

切半兩

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半淡竹葉十片

同煎至八分去滓食前服

治妊娠大小便不通心腹妨悶不欲飲食檳榔湯方

檳榔 剉

赤茯苓 去黑皮

大腹皮 剉

木通 剉

郁李人 湯浸去皮尖 微炒各壹兩

甘草 炙

桔梗 炒

桑上寄生 各半兩

右八味麤搗節每服四錢匕水一盞煎取七分去滓

不計時候溫服

治妊娠大小便不通七八日以上腹脹脊悶冬葵根湯方

冬葵根 乾者壹握洗 冬即用子

車前草 壹兩 乾者切

木通 細剉 參兩

大黃 剉 參兩

右四味麤搗節每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治妊娠入小便不通心腹脹悶枳殼散方

枳殼 去心 剉 參分

檳榔 剉

木通 剉 各壹兩

大黃 剉 參兩

訶梨勒 試枚煨 試枚 生各取皮用

大腹皮 參枚

右六味搗羅為散每服用童子小便一盞入葱白二

寸煎取七分去滓調下二錢匕不拘時候

治妊娠大小便不通下焦熱結此胡通塞湯方

此胡 苗

黃芩 去黑心

陳橘皮 湯浸去白 微炒

澤瀉

羚羊角 剉 各參分

梔子人 兩

石膏 兩

大黃 剉 兩

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生地黃一分拍破豉半分微炒同煎至七分去滓食前服

治妊娠大小便不通木通飲方

木通細剉兩

車前子壹兩半

黃芩去黑心壹兩

郁李人湯浸去皮暴乾壹兩半

大黃剉炒兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞煎至八分去滓

空心溫服

治妊娠大小便不通結閤氣急脹滿欲死茅根湯方

茅根剉碎

滑石

車前子微炒

大黃剉碎微炒各壹兩半

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治妊娠大小便不通冬葵子湯方

冬葵子貳兩微炒

大黃壹兩剉炒

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服

治妊娠大小便俱不通車前子湯方

車前子伍兩生用

木通剉兩肆兩

黃芩去黑心參兩剉

郁李人湯浸去皮貳兩半

大黃剉兩貳兩

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治妊娠大小便不通下部脹滿坐臥不安木通湯方

木通剉碎兩

大黃剉碎生用兩

滑石參

大麻人壹

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至七分去

滓空心溫服

治妊娠大小便不通榆白皮湯方

榆白皮剉壹兩半

桂去麤皮壹兩剉碎

甘草壹兩炙

滑石兩

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治妊娠大小便不通冬葵根汁方

生冬葵根洗貳斤細切爛搗生

細布絞取汁參合

生薑肆兩

洗切爛研生細布絞取汁半合

右二味同和令勻分作三服空心日一服未利再服

又未利盡三服

治妊娠大小便不通方

豬脂如半雞子大研切

右一味以酒半升煖令沸投豬膏在內更煎一兩沸

分三服食前溫服未通再服

妊娠半產

論曰妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由
妊婦衝任氣虛不能滋養於胎胎氣不固或攪撲閃墜
致氣血損動或因熱病溫瘧之類皆致半產仲景謂寒
虛相搏此名爲革婦人則半產漏下是也

治妊娠胎氣損動氣血不調或攪撲閃墜因致墮胎謂
之半產及產後氣血不和惡滯不盡腹中疴痛生地黃
湯方

生乾地黃

兩壹

大黃

兩壹

芍藥

白茯苓

去黑皮

當歸

切炒

細辛

去苗葉

甘草

炙

黃芩

去黑心

桂

去麤皮各半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗
大拍碎同煎至一盞去滓不拘時候溫服

治半產後胸中氣短腹脇疴痛餘血不盡煩滿悶亂蒲
黃湯方

蒲黃

兩壹

芒消

兩半

芩芻

兩壹

桂

去麤皮參分

桃人

半兩去皮尖雙人炒

生乾地黃

兩壹

焙貳

人參

兩壹

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去
滓不拘時候溫服

治半產後血下過多心驚體顛頭目運轉或寒或熱臍腹虛脹疼痛人參湯方

人參

麥門冬去心焙

生乾地黃焙

當歸炒切

芍藥

黃耆剉

白茯苓

去黑皮

甘草炙各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服

治妊娠胎月未足氣血未充輒墮胎者其血傷動下而
不止虛煩困倦茯苓散方

白茯苓

去黑皮

人參

黃耆薄切

醋石榴皮

切炒

陳橘皮

去白炒

甘草炙各壹兩

右六味搗為細散每服二錢匕熱酒調放溫服米飲亦得不拘時候

治半產後心煩悶倦羚羊角飲方

羚羊角屑半兩

芍藥壹兩

枳實去穢炒參分

人參壹兩

麥門冬去心焙半兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時候溫服

治半產後氣血不快惡露斷續延胡索湯方

延胡索

當歸切炒

芍藥

芎藭

桂去麤皮

甘草炙各兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
不拘時候溫服

治半產後惡露不盡氣攻疼痛血下成塊結桑臍腹芒
消飲方

芒消

蒲黃

芎藭

桂去麤皮

鬼箭羽各半兩

生乾地黃焙壹兩

桃人去皮尖雙人炒半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
不拘時候溫服

治半產後惡露不斷心悶氣短艾葉飲方

艾葉

當歸切焙

人參

生乾地黃焙

地榆

乾薑炮

阿膠炙令燥

右七味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分
去滓不拘時候溫服

妊娠數日不產

論曰心氣下通胞絡妊婦臨產心氣和平則胞絡滑利
若恐怖驚憂則心氣不能下通胞絡故令難產凡臨產
切忌驚憂傍人揮霍及胎未逼迫先用氣力之類依此

將護必免難產之厄

治妊娠數日不產或生不順理百方不得安立生酥葵

膏方

酥壹

秋葵子壹

白蜜斤半

滑石壹兩

瞿麥兩

大豆黃卷貳

右六味以清酒一升細研葵子內酥蜜中微火熬令

鎔卽下諸藥慢火煎常令沸如魚目約半升卽以新

綿濾貯菴器中每服半匙加至一匙多恐嘔逆

治妊娠數日不產滑胎易產甘草散方

甘草壹兩

黃芩去黑心

大豆黃卷炒

乾薑炮

桂去皮

吳茱萸湯洗去涎

同炒香各半兩

粳米淘淨

麻子人各壹合

右八味搗羅爲散每服三錢匕溫酒調下若臨月每

日頻服

治妊娠數日不產養胎易產大黃丸方

大黃貳兩

枳實去瓢炒

芍藥各壹兩

芎藭分

乾薑炮

厚朴去麤皮生薑汁多透剉各

兩半

杏仁湯浸去皮尖

白朮各分

吳茱萸湯洗去涎焙乾炒半兩

右九味搗羅爲末鍊蜜和搗勻丸如梧桐子大每服

二九溫酒下不拘時

治妊娠數日不產滑胎易產瞿麥湯方

瞿麥去根

榆白皮剉

木通剉各

冬葵子

揀淨微滑石

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至七分去

滓空心溫服

治妊娠數日不產葵子湯方

冬葵子

炒壹

滑石碎

瞿麥去根剉

丹參

剉壹

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓下牛酥白蜜各半合再煎至六分食前溫服入月

預服

治妊娠數日不產滑胎當歸散方

當歸

切焙

麻子人壹

吳茱萸湯洗去涎

大豆同

乾薑炮

知母剉

桂去麤

黃芩去黑

甘草炙各

大豆炒去

糯米各壹

右一十味搗羅為散研細每服二錢匕空腹溫酒調

下漸加至三錢匕欲作丸即鍊蜜和丸梧桐子大溫

酒下二十九

治妊娠數日不產大豆卷散方

大豆黃卷

揀微炒

麻子人

吳茱萸

湯洗去涎焙乾炒各

兩半

甘草

乾薑

黃芩

去黑心

大麥蘖

炒黃

桂

去麤皮各壹兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治妊娠數日不產益氣滑胎麥門冬丸方

麥門冬

去心

芎藭

厚朴

去麤皮生薑汁炙透剉

枳殼

去瓤炒

芍藥

赤茯苓

去黑皮剉各貳兩

大黃

剉炒

檳榔

煨剉

訶梨勒

煨取皮伍枚

右九味搗羅爲末鍊蜜和塗酥爲劑搗熟丸如棗豆

大每服二十九空心酒下

治妊娠數日不產令易產方

銅弩牙

壹隻

右一味燒弩牙通赤投半盞食醋中臨產服之

治妊娠數日不產令易產方

石鷩子

貳枚

右一味臨產令產婦兩手執之卽產

治妊娠數日不產如聖散方

生過蠶紙

燒灰

右一味研爲細散每服二錢匕溫酒調下不計時

妊娠數墮胎

論曰胚胎之始賴血氣以滋育若妊娠血氣盛強陰陽之至和相與流薄於一體唯能順時數謹人事勿動而傷則生育之道得矣若衝任氣虛將攝失宜子藏風冷不能滋養於胎故每有妊則數致傷墮也

治妊娠數墮胎子宮虛冷熟乾地黃散方

熟乾地黃

黃耆剉

芎藭

白朮

人參

常歸切焙各

乾薑炮

甘草炙

吳茱萸湯洗染福

兩各手

右九味搗羅爲散每服二錢匕食前溫酒調下

治妊娠胎動數損墮止痛安胎桑寄生湯方

桑寄生

當歸切焙

芎藭

人參

甘草炙等

右五味搗篩每服四錢匕水一盞入葱白七寸同

煎至六分去滓溫服

治妊娠數墮胎小腹疼痛不可忍阿膠湯方

阿膠炙令

熟乾地黃焙

艾葉微

芎藭

當歸切焙

杜仲去皺皮

白朮各壹兩

右七味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入棗三枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

治妊娠氣血衰微胞藏挾冷數墮胎地黃湯方

熟乾地黄

兩肆

當歸

切焙

艾葉

各式兩

芍藥

阿膠

炒令

杜仲

去麤皮剉炒

五加皮

各參兩

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓溫服空心食前

治子宮久冷妊娠數墮胎杜仲丸方

杜仲

去麤皮剉

防風

去

附子

炮裂去皮

石菖蒲

桔梗

炒

秦朮

去土

細辛

去苗葉

厚朴

去麤皮生薑汁炙

桂

去麤皮

半夏

湯洗七遍各參分

熟乾地黄

焙

沙參

蜀椒

去目并開口者炒出汗

乾薑

炮各半兩

石一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

溫酒下十五丸漸加至二十九一月效

治子宮久冷妊娠數墮胎吳茱萸丸方

吳茱萸

湯洗七遍焙

蜀椒

去目及開口者炒出汗各參兩

高良薑

附子

炮裂去皮各壹兩

青橘皮湯浸去白麩炒黃壹兩半

白朮貳兩

右六味搗羅為末用乾柿二十枚以好酒浸令軟研膏和搗得所丸如梧桐子大每服十九至十五丸空心臨臥溫熱水下

治妊娠數墮胎心腹疼痛芎藭湯方

芎藭

芍藥

白朮

阿膠炒令燥

甘草炙各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入艾葉糯米生

薑同煎至六分去滓食前服

治血氣不足子藏挾寒妊娠數墮紫石英丸方

紫石英

油作小塊以茱萸葉煮半日張細小飛

鹿茸

切片酒浸壹宿去毛炙

禹餘糧

火煨醋泮柴瀉水飛

當歸

切焙

枳殼

去瓤炒

芎藭各壹兩

側柏

微炙

艾葉

細剉曬干炒黃

阿膠粉炒黃去粉

赤芍藥

桂皮

去麩

白芷各叁分

烏賊魚骨去甲微炙

木香各半兩

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫酒下空心晚食前各一服

治婦人血氣衰弱子藏風冷妊娠數墮地黃丸方

熟地黃新潤者焙壹兩

澤蘭微者

肉苳蓉酒浸切焙 山芋

石斛沉水者

厚朴去麩皮生薑炙令透

蛇牀子炒

柏葉艾者

續斷

卷柏湯洗 五味子各半兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日

空心晚間生薑艾湯下十五丸

治婦人血海冷憊不能養胎妊娠數墜白薇丸方

白薇去蘆頭 牡丹皮剉

熟乾地黄焙

木香 當歸切焙 肉豆蔻人

遠志去心 附子炮裂去皮臍 禹餘糧火煨醋淬伍茶徧別

研 肉苳蓉酒浸去蘆皮切焙各取兩

芎藭 白茯苓去黑皮 細辛去苗葉

石膏別 獨活去蘆頭 吳茱萸湯洗去各

壹兩 蜀椒去目片閉口炒出汗半兩

黃耆剉 五味子散 桂去蘆皮各半分

右二十味除別研外搗羅為末入研藥拌勻鍊蜜和

丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心食前

治婦人曾傷三月四月胎補益調中飲方

芍藥剉 當歸切 厚朴去蘆皮生薑汁炙

續斷 芎藭剉 白朮剉

芫胡去苗

李根白皮生剉烏梅核

枳殼去瓤炒

右一十味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服

大德重校聖濟總錄卷第一百五十七

大德重校聖濟總錄卷第一百五十八

妊娠門

妊娠墮胎後衣不出

妊娠墮胎後血不出

妊娠墮胎後血出不止

妊娠諸瘡

產婦推行年等法并安產圖

妊娠墮胎後衣不出

論曰胎氣內動不能自安非時而墮既墮而胞衣不出者以衣帶尚與母氣相屬血氣猶固傷墮之次復加風冷氣血凝澁遂致衣不出治法宜以破血溫氣之劑

治妊娠墮胎胞衣不出當歸湯方

當歸切

牛膝

酒浸切焙木通剉

滑石碎各

冬葵子

炒瞿麥穗

兩

右六味搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服未下再服以下為度

治妊娠墮胎胞衣不出冬葵子湯方

蘇金一百五十五

冬葵子

炒

牛膝

酒浸切焙

木通

制各兩

瞿麥穗

壹兩

桂去

鳥皮貳兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服以下為度

治妊娠墮胎胞衣不出令胞爛莽草湯方

莽草

滑石

冬葵子

炒各參兩

瞿麥穗

牛膝

酒浸切焙

當歸

切炒各貳兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服以下為度

治妊娠墮胎胞衣不出阿膠湯方

阿膠

炙令燥

冬葵子

炒

牛膝

酒浸切焙

當歸

切焙各參分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服以下為度

治妊娠墮胎胞衣不下昏悶喘急者宜急救之雄黃散

方

雄黃

研

香墨

研各壹錢

金薄

片

馬牙消

壹分研

右四味研勻每服一錢匕以蜜少許與溫湯調服之

未下更服

總錄一百五十八

治妊娠墮胎胞衣不出地黃酒方

生地黄

以銅竹刀切炒半兩

蒲黃炒

生薑

切炒各壹分

右三味以無灰酒三盞於銀器內同煎至二盞去滓分溫三服未下更服

治妊娠墮胎胞衣不下牛膝湯方

牛膝

酒浸切焙

冬葵子

炒各半兩

右二味麤擗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服未下更服

治妊娠墮胎胞衣不出澤蘭湯方

澤蘭葉

切

滑石

末各半兩

生麻油許

右三味以水三盞先煎澤蘭至一盞半去滓入滑石末并油更煎三沸頓服之未下更服

治妊娠墮胎胞衣不出蒲黃酒方

蒲黃

炒壹合

槐子

拾肆枚爲末

右二味以酒三盞煎至二盞去滓分溫二服未下更服

治妊娠墮胎胞衣不出方

右取大豆一盞以酒三盞煎一至盞半去豆飲之

又方

右取雞子黃一枚吞之卽出

又方

右取蒲黃如棗大溫酒化服之

又方

右取生地黃汁一合苦酒一盞煎三五沸頓服之卽

下

妊娠墮胎後血不出

論曰血性喜溫而惡寒溫則宜流寒則凝泣妊娠墮胎惡血不出者由妊娠宿有風冷在於胞藏冷搏惡血故令不下令人寒熱去來臍腹滿痛口乾燥渴手足苦煩

若血隨氣逆上衝於心或語言狂妄或迷罔不省至其病變不可勝數宜速以破血下氣藥治之血下乃已

治妊娠墮胎後惡血不出四肢無力體熱心胸滿悶及諸疾烏金散方

墨貳兩打折或十挺子燒通赤用好醋壺升燕柴燻又再燒通赤放冷別研爲末

沒藥同

麒麟竭各壹

麝香壹錢

右四味並研和爲散每服溫酒調下一錢匕如血途心用童子小便和酒調下二錢匕

治妊娠墮胎後敗血不出方

墨參兩用炭火燒紅以醋醋泮如此參兩以墨糞挽於淨地上合令冷取出細研如粉

沒藥壹兩別研末

右二味合研令極細再羅過每服二錢匕以煎醋調

下不拘時

治妊娠墮胎後惡血不出少腹疔痛琥珀煮散方

琥珀研壹分

沒藥研

蒲黃

當歸去苗切焙

赤芍藥

薑黃

紅藍花

土瓜根

牛李子

延胡索

牡丹皮各半兩

右一十一味搗羅爲散每服三錢匕童子小便酒各半盞同煎至七分溫服心腹脹痛溫酒調下二錢匕

治妊娠墮胎後血不出奔心悶絕不識人紅藍花散方

紅藍花微熬過

男子髮燒灰

墨燒通紅

麒麟竭研

蒲黃隔紙炒各壹分

右五味搗研爲散以童子小便三四分調二錢匕服

之立差

治妊娠墮胎後血不出大黃湯方

大黃剉炒

當歸炙

甘草炙

牡丹去心

吳茱萸湯洗炒黃

芍藥各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一分拍破

同煎至六分去滓溫服相次再服

治妊娠墮胎後惡血不出白蜜湯方

白蜜貳兩

生地黃汁壹盞

酒半盞

右三味將地黃汁與酒於銅器中煎五七沸入蜜攪勻分作兩服放溫相次再服服三劑百病可愈

治妊娠墮胎後血不出往來寒熱腹痛桃人湯方

桃人湯浸去皮尖雙人麩炒黃色貳拾枚

吳茱萸湯洗貳兩

當歸微炙

黃耆剉炙

芍藥各壹兩

醍醐貳兩

右六味除醍醐外麤搗篩每服三錢匕生薑一分拍破水一盞酒半盞煎至六分去滓下醍醐半兩已來

攪勻溫服

治妊娠墮胎後血露不出心腹疼痛鑑鼻湯方

銅鑑鼻

別搗細如粉大黃剉微炒

芍藥

生乾地黃微炒各壹兩

甘草剉

芎藭

乾漆炒去烟各壹分

棗棗核焙

乳髮雞子大

右九味麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓投芒消少許再煎一二沸溫服相次更服

治妊娠墮胎後血不出上搶心痛煩憤豬膏飲方

豬膏柒合

白蜜合

生地黃貳兩

右三味先將豬膏地黃相和煎令赤色去却地黃內

蜜三合攪勻分溫二服相次再服

治妊娠墮胎後血不出腹中疝痛不可忍大黃飲方

大黃炒

芍藥

黃芩去黑心

當歸微炙

桃人湯浸去皮尖雙人

生乾地黃

兩半 桂去麤皮

甘草炙赤各

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食頃再服

治妊娠墮胎後血不出當歸酒方

當歸炙令香

芍藥剉炒各

右二味麤搗篩每服三錢匕以無灰酒一盞入生地

黃汁一合於銀器內慢火煎至七分去滓溫服以惡

血下為度

治妊娠胎後血不出寒熱腹痛牡丹丸方

牡丹去心

當歸炙令香

芍藥

白朮

鬼箭羽

桂去麤皮

大黃剉炒

右七味搗羅為末鍊蜜和九梧桐子大每服二十九

溫酒下時時一服漸加至三十九

治妊娠墮胎後血不出少腹滿痛方

取羚羊角燒灰細研如麩每服三錢匕不計早晚以

豆淋酒調下

妊娠墮胎後血出不止

論曰胎不安而墮既墮而血出不止者以經養不周血

投虛出甚則心神煩憤乃至昏冒也

治妊娠墮胎後血出不止龍骨散方

龍骨半兩

生乾地黃焙

地榆去苗細剉各壹兩半

當歸切

芍藥各壹兩

乾薑炮裂

蒲黃微炒

阿膠炒令燥

牛角鰓取黃牛角內者炙令

勻焦錯取

艾葉末壹分

右一十味搗羅為散每服二錢匕煎生地黄酒調服

治妊娠墮胎後血出不止地榆散方

地榆去苗剉碎壹兩

當歸切

龍骨

艾葉搗成末

蒲黃微炒各半兩

牛角鰓炙令勻應錯取末

阿膠炒令燥

生乾地黃焙各壹兩

右八味搗羅為散研勻每服二錢匕温米飲調粥食

前服

治妊娠墮胎後血出不止胸脇心腹滿痛時復寒熱甚

者桑根煎九方

桑根白皮兩

到貳麻子人淨淘伍合研

清酒伍盞煮前貳味藥至參盞

棗參拾枚大者取肉 飴糖貳兩

阿膠炙令燥，伍大合取棗糖膠同煎壹大盞加膏

乾薑炮裂 厚朴去麤皮生薑汁炙，柒伍兩碎各半兩

蜀椒去目并合口者少許 桂去麤皮

甘草炙令赤 黃藥剉碎 生乾地黄焙

玄參 五味子各壹兩 芍藥兩

右一十七味以前七味共煎成稀膏以後十味搗羅為末與前膏同和為劑塗酥更搗令勻熟丸如彈子大以溫酒化一丸食前服
治妊娠墮胎後血出不止形體虛羸地榆湯方

地榆去苗剉淨，細到壹兩，當歸炙焙切，生薑去皮切碎

艾葉搗為末，各半兩 赤石脂壹兩

右五味搗篩每服三錢匕水一盞入新竹葉十片同煎至七分去滓食前溫服

治妊娠墮胎後血出不止少腹滿痛地黃湯方

生乾地黄焙 當歸切 芎藭去蘆頭

阿膠炙令燥 艾葉各半兩

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心服之晚後再服如腹痛加杜仲五加皮
治妊娠墮胎後下血出不止榆白皮煮散方

榆白皮剉淨 當歸切焙各半兩

右二味礪搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎至七分去滓空心服

治妊娠墮胎後血出不止腹痛艾葉湯方

艾葉搗成末 阿膠炙令燥

右二味礪搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓

空腹服之未効更服

治妊娠胎墮後血出不止小薊飲方

小薊根葉剉碎 益母草去根葉切

右二味細切以水三大碗煮二味爛熟去滓至一大

碗將藥於銅器中煎至一盞分作二服日內服盡

治妊娠墮胎後血出不止方

丹參去虛頭

右一味麤搗篩每服四錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服食前

治妊娠墮胎後血出不止方

取生地黃汁半盞調代赭末一錢匕一日三五服以

差為度

妊娠諸瘡

論曰妊娠之人若人經有熱播流血脈散於肌肉榮氣

不從於肉理則生癰腫諸瘡之類內經謂諸痛痒瘡皆屬於心治法宜謂經絡平府藏則邪壅之疾自差

治妊娠諸瘡利心經疏壅滯分氣湯方

麥門冬

去心焙

檳榔

剉

當歸

焙切

人參

甘草

炙

木通

剉

羌活

去虛

芍藥

大腹皮

剉

桑根白皮

剉各

黃芩

炒分

右一十一味搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓空心日午臨臥溫服

治妊娠諸瘡地黃丸方

生乾地黃

黃耆

人參

荆芥

去梗

黃芩

去黑心

甘草

梔子人

乾薄荷葉

各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸

加至三十丸溫湯下不拘時

治妊娠血氣壅滯身體生瘡心神不寧荆芥湯方

荆芥穗

芎藭

細辛

去苗葉

威靈仙

洗剉

甘草

炙各壹兩

皂莢

半兩不燥者去皮塗酥炙

右六味搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓

食後臨臥溫服

治妊娠氣壅生瘡皂莢子散方

皂莢子貳百粒 灰火炮熟去皮

槐實肆兩

甘草多 乾薄荷葉

黃耆剉

荆芥穗各壹兩

芎藭

天麻各半兩

右八味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下沸湯亦得

不拘時

治妊娠氣血壅滯攻身體生瘡癢痒薄荷丸方

乾薄荷葉貳兩

荆芥穗壹兩

蔓荆實去皮白

玄參洗

甘草炙

大黃炒

人參

麥門冬去心各壹兩

羌活去蘆頭

細辛去苗葉壹兩半

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如雞頭大每服一九茶

酒嚙下不拘時

治妊娠氣血壅滯生瘡黃耆湯方

黃耆剉

苦參洗

羌活去蘆頭

獨活去蘆

惡實炒

甘草炙各半兩

右六味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治妊娠瘡疥煩痒癢痒秦芫丸方

秦芫半兩

黃耆剉

枳殼去殼炒

漏蘆頭去蘆

防風去叉各兩半

黃連去兩半

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫酒下空心日午夜臥服

治妊娠風熱氣盛攻身體生瘡皮膚燥澁大便結滯祛

風散方

羌活去蘆頭兩

大黃濕鎊裝兩

芍藥兩

黃耆剉參兩

朴消別研兩

當歸切焙壹兩半

右六味搗羅為散與朴消勻每服一錢匕日午夜臥

用溫蜜水調下微利為効

治妊娠風氣壅頭目不利身體生瘡白芷丸方

白芷參兩

芍藥

天南星水煎各兩

羌活去蘆頭兩

藿香葉壹兩

菊花分

防風去叉兩

細辛去苗并葉壹兩

當歸切焙兩

右九味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服二

十九薄荷湯下不拘時

產婦推行年等法并安產圖

產婦推行年法

婦人行年十三歲至四十九歲

行年庚申 反爻在正月七月 禍害在離絕命在

巽 生氣在坤 懸尸在辰戌日 閉肚在辛 八

莊在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首吉

婦人十四歲

行年在巳未 反支在二月八月 禍害在坤 絕

命在兌 生氣在離 懸尸在卯酉日 閉肚在壬

八莊在癸

宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首吉

婦人十五歲

行年在戊午 反支在三月九月 禍害在乾 絕

命在艮 生氣在坎 懸尸在寅申日 閉肚在癸

八莊在壬

宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北吉

婦人十六歲

行年在丁巳 反支在四月十月 禍害在艮 絕

命在乾 生氣在震 懸尸在丑未日 閉肚在甲

八莊在辛

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首

婦人十七歲

行年在丙辰 反支在五月十一月 禍害在震

絕命在坎 生氣在艮 懸尸在子午日 閉肚在乙

八莊在庚

宜喚東北黃衣師看產產婦宜着黃衣臥東北首

婦人十八歲

行年在乙卯 反支在六月十二月 禍害在坎

絕命在震 生氣在乾 懸尸在己亥日 閉肚在丙

入莊在丁

宜喚西北黑衣師看產產婦宜著黑衣臥西北首

婦人十九歲

行年在甲寅 反支在正月七月 禍害在巽 絕

命在離 生氣在兌 懸尸在辰戌日 閉肚在丁

八莊在丙

宜喚西方白衣師看產產婦宜着白衣臥西首

婦人年二十歲

行年在癸丑 反支在五月八月 禍害在兌 絕

命在坤 生氣在巽 懸尸在卯酉日 閉肚在庚

入莊在乙

宜喚東南青衣師看產產婦宜著青衣臥東南首

婦人二十一歲

行年在壬子 反支在三月九月 禍害在離 絕

命在巽 生氣在坤 懸尸在寅申日 閉肚在辛

八莊在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜着黃衣臥西南首

婦人二十二歲

行年在辛亥 反支在四月十月 禍害在坤首絕

命在兌 生氣在離 懸尸在丑未日 閉肚在壬

八莊在癸

宜喚南方赤衣師看產產婦宜着赤衣臥南首

婦人二十三歲

行年在庚戌 反支在五月十一月 禍害在乾

絕命在艮 生氣在坎 懸尸在子午日 閉肚在

癸 八莊在壬

宜喚北方黑衣師看產產婦宜着黑衣臥北首

婦人二十四歲

行年在己酉 反支在六月十二月 禍害在艮

絕命在乾 生氣在震 懸尸在己亥日 閉肚在

甲 八莊在辛

宜喚東南青衣師看產產婦宜着青衣臥東首

婦人二十五歲

行年在戊申 反支在正月七月 禍害在震 絕

命在坎 生氣在艮 懸尸在辰戌日 閉肚在乙

八莊在庚

宜喚東北黃衣師看產產婦宜着黃衣臥東北首

婦人二十六歲

行年在丁未 反支在二月八月 禍害在坎 絕

命在震 生氣在乾 懸尸在卯酉日 閉肚在丙

八莊在丁

宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣臥西北首

婦人二十七歲

行年在丙午 反支在三月九月 禍害在巽 絕

命在離 生氣在兌 懸尸在寅申日 閉肚在丁

八莊在丙

宜喚西方淺衣師看產產婦宜着淺衣臥正西首

婦人二十八歲

行年在乙巳 反支在四月十月 禍害在兌 絕

命在坤 生氣在巽 懸尸在丑未日 閉肚在庚

八莊在乙

宜喚東南方黃衣師看產產婦宜着黃衣臥東南首

婦人三十九歲

行年在甲辰 反支在五月十一月 禍害在離

絕命在巽 生氣在坤 懸尸在子午日 閉肚在

辛 八莊在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首

婦人三十歲

行年在癸卯 反支在六月十二月 禍害在坤

絕命在兌 生氣在離 懸尸在己亥日 閉肚在

壬 八莊在癸

宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首

婦人三十一歲

行年在壬寅 反支在正月七月 禍害在乾 絕

命在艮 生氣在坎 懸尸在辰戌日 閉肚在癸

八莊在壬

宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首

婦人三十二歲

行年在辛丑 反支在二月八月 禍害在艮 絕

命在乾 生氣在震 懸尸在卯酉日 閉肚在甲

八莊在辛

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首

婦人三十三歲

行年在庚子 反支在三月九月 禍害在震 絕

命在坎 生氣在艮 懸尸在寅申日 閉肚在乙

八莊在庚

宜喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北首

婦人三十四歲

行年在己亥 反支在四月十月 禍害在坎 絕

命在震 生氣在乾 懸尸在丑未日 閉肚在丙

八莊在丁

宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣臥西北首

婦人三十五歲

行年在戊戌 反支五月十一月 禍害在巽 絕

命在離 生氣在兌 懸尸在子午日 閉肚在丁

八莊在丙

宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西首

婦人三十六歲

行年在丁酉 反支在六月十二月 禍害在兌

絕命在坤 生氣在巽 懸尸在己亥日 閉肚在

庚 八莊在乙

宜喚東南青衣師看產產婦宜著青衣臥東南首

婦人三十七歲

行年在丙申 反支在正月七月 禍害在離 絕

命在巽 生氣在坤 懸尸在辰戌日 閉肚在辛

入莊在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首

婦人三十八歲

行年在乙未 反支在二月八月 禍害在坤 絕

命在兌 生氣在離 懸尸在卯酉日 閉肚在壬

入莊在癸

宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首

婦人三十九歲

行年在甲午 反支在三月九月 禍害在乾 絕

命在艮 生氣在坎 懸尸在寅申日 閉肚在癸

入莊在壬

宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首

婦人四十歲

行年在癸巳 反支在四月十月 禍害在艮 絕

命在乾 生氣在震 懸尸在丑未日 閉肚在甲

入莊在辛

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首

婦人四十一歲

行年在壬辰 反支在五月十一月 禍害在震

絕命在坎 生氣在艮 懸尸在子午日 閉肚在

乙 八莊在庚

宜喚東北青衣師看產產婦宜着青衣臥東首

婦人四十二歲

行年在辛卯 反支在六月十二月 禍害在坎

絕命在震 生氣在乾 懸尸在己亥日 閉肚在

丙 八莊在丁

宜喚西北黃衣師看產產婦宜着黃衣臥東北首

婦人四十三歲

行年在庚寅 反支在正月七月 禍害在巽 絕

命在離 生氣在兌 懸尸在辰戌日 閉肚在丁

八莊在丙

宜喚西方白衣師看產產婦宜着白衣臥西北首

婦人四十四歲

行年在己丑 反支在二月八月 禍害在兌 絕

命在坤 生氣在巽 懸尸在卯酉日 閉肚在庚

八莊在乙

宜喚東南青衣師看產產婦宜着白衣臥西首

婦人四十五歲

行年在戊子 反支在三月九月 禍害在離 絕

命在巽 生氣在巽 懸尸在寅申日 閉肚在辛

八莊在甲

宜喚西南黃衣師看產產婦宜著青衣臥東南首

婦人四十六歲

行年在丁亥 反支在四月十月 禍害在坤 絕

命在兌 生氣在離 懸尸在丑未日 閉肚在壬

八莊在癸

宜喚西南赤衣師看產產婦宜著赤衣臥西南首

婦人四十七歲

行年在丙戌 反支在五月十一月 禍害在乾

絕命在艮 生氣在坎 懸尸在子午口 閉肚在

癸 八莊在壬

宜喚北方赤衣師看產產婦宜著黑衣臥南首

婦人四十八歲

行年在乙酉 反支在六月十二月 禍害在艮

絕命在乾 生氣在震 懸尸在己亥日 閉肚在

甲 八莊在辛

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首

婦人四十九歲

行年在甲申 反支在正月七月 禍害在震 絕

命在坎 生氣在艮 懸尸在辰戌日 閉肚在乙

八莊在庚

宜喚東北方青衣師看產產婦宜着青衣臥東北首
凡禍害絕命之地不可令產婦向之亦不得向此大小
便

凡生氣產婦向之大吉令母子命長

凡閉肚之地臨月及產後未滿月並不得向此地大小
便及棄不淨水犯之母子大惡慎之大吉


凡八莊之地產婦牀帳不得向之開門慎之大吉

凡反支月不得令血污地或令子死腹中或產不順皆
須先布灰草然後鋪驢馬皮於上安產吉

凡懸尸之日不可攀繩宜懸馬轡攀之吉

凡行年命相值亦可坐馬皮攀轡吉

日遊圖



推日遊法

推日遊法常以癸巳日入宮一十六日宜避之至己酉方出外

癸巳 甲午 乙未 丙申

丁酉伍日在紫微北宮 戊戌 己亥

庚子 辛丑 壬寅伍日在太微南宮 乙巳

癸卯壹日在天屈西宮 甲辰 乙巳

丙午 丁未 戊申伍日在御女東宮 乙巳

己酉出外 庚戌 辛亥 壬子

癸丑 甲寅在外東北維 乙卯 丙辰

亥月天候
 壬 亥月天候
 北子夫人
 癸 北子夫人
 丑豐隆吳時起
 寅冷
 卯 寅冷
 辰乙東卯
 巳地藏衣也
 午 巳地藏衣也
 未丁南丙巳
 申庚西酉
 酉 申庚西酉
 戌 酉 申庚西酉
 亥 戌 酉 申庚西酉
 壬 亥月天候
 癸 北子夫人
 丑豐隆吳時起
 寅冷
 卯 寅冷
 辰乙東卯
 巳地藏衣也
 午 巳地藏衣也
 未丁南丙巳
 申庚西酉
 酉 申庚西酉
 戌 酉 申庚西酉
 亥 戌 酉 申庚西酉

四月圖

月空在甲庚

亥月天候
 壬 亥月天候
 北子夫人
 癸 北子夫人
 丑豐隆吳時起
 寅冷
 卯 寅冷
 辰乙東卯
 巳地藏衣也
 午 巳地藏衣也
 未丁南丙巳
 申庚西酉
 酉 申庚西酉
 戌 酉 申庚西酉
 亥 戌 酉 申庚西酉
 壬 亥月天候
 癸 北子夫人
 丑豐隆吳時起
 寅冷
 卯 寅冷
 辰乙東卯
 巳地藏衣也
 午 巳地藏衣也
 未丁南丙巳
 申庚西酉
 酉 申庚西酉
 戌 酉 申庚西酉
 亥 戌 酉 申庚西酉

五月圖

月空在丙壬



大時 招搖 咸池 吳時 雷公 豐隆
 軒帝 白虎 夫人 狂虎 天候 天狗
 運鬼力士

右一十三辰每月具注如圖產婦犯之大凶向月空
 安產天德藏衣吉利

體玄子借地法

東借十步 西借十步 南借十步
 北借十步 上借十步 下借十步

右此中產婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神擁
 護百鬼速去急急如律令前借地法於人月即朱寫

一本貼床帳正北壁上候產罷滿月除之

安產及藥衣法

正月午地之東安產婦 子地之西藏衣吉

二月酉地之南安產婦 卯地之北藏衣吉

三月子地之西安產婦 午地之東藏衣吉

四月申地之北安產婦 寅地之南藏衣吉

五月子地之西安產婦 午地之東藏衣吉

六月寅地之南安產婦 申地之北藏衣吉

七月子地之西安產婦 午地之東藏衣吉

八月寅地之南安產婦 申地之北藏衣吉

九月午地之東安產婦 子地之西藏衣吉

十月寅地之南安產婦 申地之北藏衣吉

十一月午地之東安產婦 子地之西藏衣吉

十二月酉地之南安產婦 卯地之北藏衣吉

如閏月即依節候用之

產婦衣色及首指并起日法

甲乙日生產勿着白衣宜着黑衣臥勿西首勿庚辛日

起

丙丁日生產勿着黑衣宜着青衣臥勿北首勿壬癸日

起

戊巳日生產勿着青衣宜着赤衣臥勿東首勿甲乙日
起

庚辛日生產勿着赤衣宜着黃衣臥勿南首勿丙丁日
起

壬癸日生產勿着黃衣宜着白衣勿戊巳日起禁草法
鋪草及氈蓆訖卽咒曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母
子相生俱幾鐵急急如律令

大德重校聖濟總錄卷第一百五十八