風　寒　風溫　溫熱

暑　濕　燥　疫

癡癖疹瘰　痰　痰

臨證指南

臨證指南醫案目

卷五

風
寒
風溫
溫熱
暑
濕
燥
痰

癡痴疹瘰

痰

痰飲

臨證指南醫案卷五

潯關李大瞻翰圃
錫山鄒錦畹滋九仝較
邵銘新甫

吉吳葉桂天士先生著

風

某二七 風傷衛寒熱頭痛脘悶

蘇梗一錢 淡豆豉一錢 杏仁三錢 桔梗一錢

厚朴一錢 連翹一錢 通草一錢 滑石三錢

某二一 風邪外襲肺衛畏風發熱咳嗽脘悶宜用兩和表裏

淡豆豉一錢半　蘇梗一錢　杏仁二錢　桔梗一錢半

連翹一錢半　通草一錢

風傷營衛候治

江五六　勞倦過月。氣弱加外感。頭痛惡風。營衛二氣皆怯。嗽則閃爍筋掣而痛。大凡先治表後治裡。世間未有先投黃連清裏後用桂枝和表。此非醫藥。當歸建中湯

虛人感風

沈　虛人得感。微寒熱。參歸桂枝湯加廣皮

經云。風爲百病之長。蓋六氣之中。惟風能全兼五氣。如兼寒則風寒。兼暑則曰暑風。兼濕曰風濕。兼燥曰風燥。兼火曰風火。蓋因風能鼓盪此五氣而傷人。故曰百病之長也。其餘五氣。則不能互相全兼。如寒不

能兼暑與火。暑亦不兼寒。濕不兼燥。燥不兼濕。火不兼寒。由此觀之。病之因乎風而起者自多也。然風能兼寒。寒不兼風。何以辨之。如隆冬嚴寒之時。即密室重幃之中。人若裸體而臥。必犯傷寒之病。此本無風氣侵入。乃但傷於寒。而不兼風者也。風能兼寒者。因風中本有寒氣。蓋巽爲風。風之性本寒。即巽卦之初爻屬陰是也。因風能流動鼓盪。其用屬陽。是合乎巽之二爻三爻皆陽爻也。如炎歊溽暑之時。若使數人搧一人。其人必致汗孔開。頭痛惡寒骨節疼等傷寒之病作矣。斯時天地間。寸毫無一些寒氣。實因所搧

之風。風中却有寒氣。故令人受之。寒疾頓作。此乃因傷風而兼傷寒者也。故有但傷寒而不傷風之症。亦有因傷風而致兼傷寒之症。又有但傷風而不傷寒之症。有因傷風。而或兼風溫風濕風燥風火等症。更有暑濕燥火四氣各自致傷。而絕不兼風之症。故柯韻伯所註傷寒云。傷風之重者。即屬傷寒。亦有無汗脈緊。骨節疼諸症。此柯氏之書所以能獨闢仲景生面也。至仲景所著傷寒書。本以寒爲主。因風能兼寒。故以風陪說。互相發明耳。學者看書。不可不知此理。若夫臟腑一切內外諸風。各有現症。具載內經。尤當

詳考華岳雲



寒

寒邪客肺

某二 客邪外侵。頭脹。當用平散。

蘇梗　杏仁　桔梗　桑皮

橘紅　連翹

某　寒熱。頭痛。脘悶。

淡豆豉　嫩蘇梗　杏仁　桔梗

厚朴　枳殼

風寒傷衛　寒邪兼瀉

某五二 復受寒邪。背寒。頭痛。鼻塞。　桂枝湯加杏仁

某十九 時邪外襲。衛痺發熱。頭痛。先散表邪。

淡豆豉　蘇梗　杏仁　厚朴

木防己　茯苓皮

寒客太陽膀胱經氣逆

楊四太陽脉行由背抵腰外來風寒先傷陽經雲霧自下及上經氣逆而病發致嘔痰涎頭痛小溲數行病解膀胱氣通斯逆者轉順矣當通太陽之裡用五苓散倘外感病發再議

勞倦陽虛感寒

某二八勞傷陽氣形寒身熱頭疼肢悶身痛

杏仁三錢　川桂枝八分　生薑一錢　厚朴一錢

廣皮一錢　茯苓皮三錢

傷寒症仲景立法於前詳賢註釋於後先生雖天資

顯敏若擬其治法恐亦不能出仲景範圍其所以異於庸醫者在乎能辨症耳不以冬溫春溫風溫溫熱濕溫伏暑內傷勞倦瘟疫等症誤認爲傷寒其治溫熱暑濕諸症專辨邪之在衛在營或傷氣分或傷血分更專究三焦故能述前人溫邪忌汗濕家忌汗當用手經之方不必用足經之藥等明訓垂示後人此乃先生獨擅見長之處也若夫傷寒之書自成無已註解以後凡註疏者不啻數百家其尤著者如嘉言三書景岳書傷寒三註四註等篇近有柯韻伯來蘇集傷寒論翼方翼王晉三古方選註中所解一百十

三方諸家析疑辨義處雖稍有異同然皆或登仲景之堂或造仲景之室者業醫者當日置案頭潛心參究庶乎臨症可無誤矣華岫雲

傷寒一症內經云熱病者皆傷寒之類也又曰凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑又曰冬傷於寒春必病溫其症有六經相傳併病合病兩感直中難經又言傷寒有五有中風有傷寒有溼溫有熱病有溫病其所苦各不同再加以六淫之邪有隨時互相兼感而發之病且其一切現症則又皆有頭痛發熱或有汗無汗或惡風惡寒不食

倦卧煩渴等則又大略相同故其症愈多其理愈晦毋怪乎醫者臨症時不能灼然分辨即其所讀之書前人亦並無至當不易之論將靈素難經之言及一切外感之症逐一分晰辨明使人有所遵循故千百年來欲求一鑒垣之士察六淫之邪毫不紊亂者竟未見其人幸賴有仲景之書以六經分症治以汗吐下和寒溫諸法故古人云仲景之法不但治傷寒苟能悉明其理即治一切六氣之病與諸雜症皆可融會貫通無所不宜此誠屬高論固深知仲景者也然余謂六淫之邪頭緒甚繁其理甚奥即彙集河間東

垣丹溪及前賢輩諸法而治之猶慮未能兼括盡善若沽沽焉必欲但拘仲景之法而施治此乃見聞不廣膠柱鼓瑟不知變通者矣今觀葉氏之書傷寒之法固屬無多然其辨明冬溫春溫風溫濕溫熱濕溫之治實超越前人以此羽翼仲景差可嘉惠後學觀者幸毋忽諸華蓋堂

風溫

僧五二 近日風溫上受。寸口脉獨大。肺受熱灼。聲出不揚。先與辛涼清上。當薄味調養旬日。

牛蒡子　薄荷　象貝母　杏仁

冬桑葉　大沙參　南花粉　黑山梔皮

楊 脉左實大。頭目如蒙。清竅不爽。此風溫仍在上焦。擬升降法。

乾荷葉　薄荷　象貝　蓮翹

鈎藤　生石膏末

某　風溫從上而入風屬陽溫化熱上焦近肺肺氣不得舒轉周行氣阻致身痛脘悶不飢宜微苦以清降微辛以宣通醫謂六經輙投羌防泄陽氣劫胃汁溫邪忌汗何遽忘之

杏仁　香豉　鬱金　山梔

瓜蔞皮　蜜炒橘紅

葉　風溫入肺肺氣不通熱漸內鬱如舌苔頭脹咳嗽發疹心中懊憹脘中痞滿猶是氣不舒展邪欲結痼宿有痰飲不欲飲水議梔豉合涼膈方法

山梔皮　豆豉　杏仁　黃芩

瓜蔞皮　枳實汁

郭　風溫入肺。氣不肯降。形寒內熱。胸痞。皆鬱鬱之象。辛涼佐以微苦。手太陰主治。

黑山梔　香豉　杏仁　桑葉

瓜蔞皮　鬱金

秦六三　風溫化燥熱　體質血虛。風溫上受。滋清不應。氣分燥也。議清其血

石膏　生甘草　薄荷　桑葉

杏仁　連翹

又　照前方去連翹薄荷加陳蔞皮鬱金梔皮

某　少陽風火　風火上鬱。耳後結核。目眶痛。

薄荷　牛蒡子　前胡　象貝

連翹　黑梔皮　赤芍　生甘草

風溫傷陰

某　風溫熱伏。更劫其陰。日輕夜重。煩擾不寧。

生地　阿膠　麥冬　白芍

炙草　蔗漿

馬三五　風溫熱灼之後。津液未復。陽明脉絡不旺。骨酸背楚。

治以和補。

生黃芪　鮮生地　北沙參　玉竹

麥冬　歸身　窯丸

某　陰虛風溫。氣從左升。　桂枝湯加花粉杏仁

風爲天之陽氣。溫乃化熱之邪。兩陽薰灼。先傷上焦。種種變幻情狀。不外乎三陰爲病。藪頭脹汗出身熱咳嗽。必然並見。當與辛涼輕劑。清解爲先。大忌辛溫消散。劫爍清津。太陰無肅化之權。救逆則有蕷汁蘆根。玉竹門冬之類也。若寒沉降損傷胃口。陽明頓失循序之可救逆則有復脉建中之類。大凡此症。變則爲痙厥。緩變則爲虛勞。其主治之方。總以甘藥爲要。或兼寒或兼溫。在人通變可也。邵新甫

連翹

[illegible]

[illegible]

[illegible]

温熱

溫邪入經

某二十 脉數暮熱。頭痛腰疼。口燥。此屬溫邪。

連翹　淡豆豉　淡黃芩　黑山梔

杏仁　桔梗

某　溫邪化熱。肺痺喘急。消渴胸滿。便溺不爽。肺與大腸見症。

淡黃芩　知母　鮮生地　阿膠

天冬　花粉

謝　積勞傷陽。衛疎。溫邪上受內入。爭肺。肺主周身之氣。

氣窒不化。外寒似戰慄。其溫邪內鬱。必從熱化。今氣短胸滿。病邪在上。大便瀉出稀水。肺與大腸表裏相應。亦由熱迫下泄耳。用辛涼輕劑爲穩。

杏仁　桔梗　香豉　橘紅

枳殼　薄荷　連翹　茯苓

龔　襲吸入溫邪。釀爲肺脹危症。

蘆根　桃仁　苡仁　冬瓜子

施　久患虛損。原寢食安舒。自服陰柔膩補。不但減食不寐。脘中常悶。渴欲飲涼。此口鼻吸入溫邪。先干於肺。樓補則邪愈熾。氣機阻塞。弱質不敢開泄。援引輕揚肅降。

兼以威喜丸淡以和氣。上焦得行。可進養胃法。

白沙參　苡仁　天花粉　桑葉

臂金　兼服威喜丸

王　溫邪發熱。津傷。口燥氣臊。溫邪劫津

捲心竹葉　嘉定花粉　知母　麥冬

金石斛　連翹

某　春溫身熱。六日不解。邪陷劫津。舌絳。骨節痛。以甘寒熄邪。

竹葉心　知母　花粉　滑石

生甘草　梨皮

了　口鼻吸入熱穢。肺先受邪。氣痺不主宣通。其邪熱由中及於幕原。布散營衛。遂爲寒熱。既爲邪踞。自然痞悶不飢。雖邪輕未爲深害。留連不已。熱蒸形消。所謂病傷漸至於損而後已　桂枝白虎湯

又　氣分之熱稍平。旨久胃津消之。不飢不欲納食。大忌香燥破氣之藥。以景岳玉女煎多進可效。忌食辛辣肥膩自安　竹葉石膏湯加鮮枸杞根皮

楊　伏邪發熱。煩渴。知飢無寐。乃胃津受傷所致。擬進竹葉石膏湯加花粉

葉　熱傷氣分。用甘寒方　白虎湯加竹葉

某右脉未和。熱多口渴。若再劫胃汁。怕有脫症。不飢之事。當清熱生津。仍佐理痰。俟邪減便可再商。

麥冬　人參　石膏　知母

粳米　竹葉　半夏

葉二　仲景云陰氣先傷。陽氣獨發。不寒而熱。令人消爍肌肉。條例下不註方。但曰以飲食消息之。後賢謂甘寒生津。解煩熱是矣。今脉數舌紫渴飲。氣分熱邪未去。漸次轉入血分。斯甘寒清氣熱中。必佐存陰。爲法中之法。

生地　石膏　生甘草　知母

粳米　白芍　竹葉心

熱入心

毛六十濕邪熱入營中。心熱悶。脇肋痛。平素痰火。與邪膠結。致米飲下咽。胸脹。老年五液已涸。忌汗忌下。

生地　麥冬　杏仁　鬱金汁

炒川貝　橘紅

馬少陰伏邪。津液不騰。喉燥舌黑。不喜飲水。法當清解血中伏氣。莫使液涸。

犀角　生地　丹皮　竹葉

玄參　連翹

陳嫗熱入膻中。夜煩無寐。心悸怔。舌絳而乾。不嗜湯飲。乃營中之熱。治在手經。

犀角　鮮生地　黑玄參　連翹

石菖蒲　炒蘆根

又　鮮生地　玄參　天冬　麥冬

竹葉　茯神　金箔

又　陽升風動治以鹹寒

生地　阿膠　天冬　人參

川斛　茯神　麥冬

張　營絡熱心震動　復脈湯去薑桂參加白芍

陸六九高年熱病入九日舌焦鬚濕語邪入心胞絡中逐

怕液涸神昏當滋清去邪兼進牛黃丸驅熱利竅

熱邪入心胞

竹葉心　鮮生地　連翹心　玄參

犀角　石菖蒲

胡　脉數舌赤耳聾胸悶素有痰火近日冬溫引動宿病加以勞復小便不利議治瘀熱之熱

鮮生地五錢　竹葉心一錢　芍參一錢半　玄參一錢半

石菖蒲根六分　陳胆星六分

顧　溫邪悞表劫津邪入胞絡內閉　至寶丹

玉　吸入溫邪鼻通肺絡逆傳心胞絡中震動君主神明欲迷瀰漫之邪攻之不解清竅既蒙絡內亦痺幼科不解投以豁痰降火理氣毫無一効憶平脉篇清邪中上

肺位最高。既入胞絡。氣血交阻。逐穢利竅。須藉芳香開

用局方至寶丹。

施　溫邪如瘧。陰氣先傷。苦辛再傷陽及胃。內風肆橫。肢

掣癒癡。邪閉心胞絡中。痰濁神昏。乃熱氣蒸灼。無形無

質。此消痰消食清火。竟走腸胃。與病情隔靴搔癢。速速

與至寶丹三分。冷開水調服。若得神清。再商治法。

顧　飲酒又能納穀。是內風去乎消爍。當春盡夏初。陽氣

弛張。遂致偏中於右。診脉左弦且堅。肌膚隱約斑點。面

色光亮而赤。舌胎灰黃。其中必夾伏溫邪。所恙內閉神

昏。治法以清絡宣竅。勿以攻風劫痰。扶助溫邪。平定竅

清冀其帶病久延而已

犀角　生地　玄參　連翹心

鬱金　小青葉　竹葉心　石菖蒲

又　目瞑舌縮神昏如醉邪入心胞絡中心神爲蒙謂之內閉前案已經論及濁邪鬱蒸乃無形質而醫藥都是形質氣味正如隔靴搔癢近代喻嘉言議謂芳香逐穢宜竅頗爲合理絕症難挽天機用意揶盡人工

至寶丹　四丸勻四服涼開水調化

包　老年下虛春溫上受痰潮昏譫舌絳黃苔面赤微瘧

先清上焦

天竺黃　金銀花　竹葉心　連翹　竹瀝

張　溫邪自裡而發。喉腫口渴。舌心灰滯。上焦熱蒙最怕竅閉昏痙。苦寒直降。攻其腸胃。與溫邪上僭無涉

連翹　黑梔皮　牛蒡子　杏仁　花粉

馬勃　瓜蔞皮　夏枯草　金汁　銀花露

張　週歲內。未得穀味精華。溫邪吸入。上焦先受。頭面頤頷腫浮。邪與氣血混處。刀針破傷。經絡溫邪內閉熱蘊。蔓延三焦。昏寐痰潮。舌刺卷縮。小溲點滴渾濁。熱氣結錮在裏。但膏連芩梔之屬。藥性直降。竟由胃達腸而熱氣如烟如霧。原非形質可蕩可掃。故牛黃產自牛腹。原

從氣血而成混處氣血之邪藉此破其蘊結是得效之因由也夫溫熱時癘上行氣分而漸及於血分非如傷寒足六經順傳經絡者大抵熱氣鴟張必薰塞經絡內竅故舌躁皆裡竅之欲閉欲宣內閉須得芳香氣血久鬱必致瘍毒內攻謹陳大意參末議用紫雪丹三分微溫開水調服

豬　溫邪中自口鼻始而入肺爲咳喘繼傳膽中則嗜血乃心營肺衛受邪然邪在上焦壅遏阻氣必聚爲熱瘀臭嗌渴是欲內閉惜不以河間三焦立法或謂傷寒主六經或謂肺癰當泄氣血致熱無出路胸突腹大危期

至速矣即有對病藥餌氣湧沸騰勢必湧吐無餘爲望有濟夫溫熱穢濁塡塞內竅神識昏迷脹悶欲絕者須以芳香宣竅佐牛黃金箔深入臟絡以搜鋼閉之邪今危篤若此百中圖一而已　紫雪丹

陳　溫邪逆傳膻中熱痰蔽阻空竅所進寒涼消導徒攻腸胃毫無一效痰乃熱薰津液所化膻中乃空靈之所是用藥之最難至寶丹芳香通其神明之竅以驅熱痰之結極是但緩年受溫邪最易陰虧津耗必兼滋清以理久伏溫邪爲正

犀角　鮮生地　玄參　連翹心

丹皮　石菖蒲　化服至寶丹

某　濕爲漸熱之氣。迷霧鬲間。神機不發。三焦皆被邪侵。豈是小恙。視其舌伸縮如强。痰涎粘着。內閉之象已見。宣通膻中。望其少甦。無暇清至陰之熱。

至寶丹四分　石菖蒲金銀花湯送下

熱陷血分

王十八　夜熱早凉。熱退無汗。其熱從陰而來。故能食形瘦。脉數左盛。兩月不解。治在血分

生鱉甲　青蒿　細生地　知母

丹皮　淡竹葉

許　溫邪已入血分。舌赤音低。神呆潮熱。卽發斑疹。亦是

血中熱邪。悞汗消食。益變昏厥。

犀角　細生地　玄參　丹皮

鬱金　石菖蒲

雜入厥陰

張　舌絳刺裂。面色枯槁。全無淖澤。形象畏冷。心中熱焚。邪深竟入厥陰。正氣已經虛極。勉擬仲景復脈湯。合乎邪少虛多治法。復脈去人參生薑加甘蔗汁代水煎

又　熱病悞投表散消導。正氣受傷。神昏舌强。勢如燎原。前進復脈法。略有轉機。宜遵前方去桂加參。以扶正氣爲主。復脈湯去桂加人參甘蔗汁代水煎藥

又　進甘藥頗安。奈陰液已涸。舌强音謇。撫之乾板。較諸

已前龈肉腫血有間。小便欲解。舉痛。猶是陰氣欲絕。欲寐昏沉。午間煩躁。熱深入陰之徵。未能穩許愈期也。

生白芍　炙甘草　阿膠　雞子黃

人參　生地　麥冬　炒麻仁

懊下熱陷成結

某　懊下熱陷於裏。而成結胸。所以身不大熱。但短氣胸滿煩躁。此皆邪熱內燔。擾亂神明。內閉之象。棘手重恙。

倣仲景瀉心法。備參末議。再候明眼定裁。

川連　黃芩　牛夏　炮淡乾薑

生薑　枳實

懊治傷胃津液

吳　神氣如迷。不飢不食。乃苦辛消導發散。劫奪胃津所

致。蓋溫邪手經爲病。今世多以足六經主治。故致此。

細生地　竹葉心　麥冬　玄參心

連翹心　鬱金

王姬溫熱十三日。舌黃。心中悶痛。初病手經。不當用足經方。老人怕其液涸。甘寒醒胃却熱。

鮮生地　竹葉心　麥冬　鬱金

川斛　菖蒲根

冬溫傷液

吳十五近日天未寒冷。病虛氣不收藏。所感之邪謂冬溫。參苓益氣。薄荷桔梗杏仁泄氣。已屬背謬。加補骨脂溫濇腎臟。尤不通之極。自述夜寐深更。纍纍有汗。釋年陰不

充陽易泄。論體質可却病。

桑葉　大沙參　玉竹　茵仁

生甘草　糯米湯煎藥

陳半歲冬溫入肺。膠痰化熱。因未納穀之身。不可重藥消痰通利。

炒麥冬　桑葉　大沙參　甜杏仁　地骨皮

氣血兩傷

某。脉數右大煩渴舌絳。溫邪。氣血兩傷。與玉女煎

生地　竹葉　石膏　知母

丹皮　甘草

陰虛感溫邪

陳三陰虛溫邪。甘寒清上。

白沙參　甜杏仁　玉竹　冬桑葉

南花粉　生甘草

關　陰虛挾溫邪。寒熱不止。雖不宜發散消食。徒補亦屬無益。擬進復脉湯法。

炙甘草　阿膠　生白芍　麥冬

炒生地　炒丹皮　青甘蔗汁煎

黃　體虛。溫邪內伏。頭汗淋漓。心腹空空。上熱下冷。舌白煩渴。春陽升舉爲病。猶是冬令少藏所致。色脉參視。極當謹愼

阿膠　生地　麥冬　生牡蠣

生白芍　茯苓

勞倦感暴陰液燥

張五五勞倦內傷溫邪外受兩月不愈心中溫溫液液津液無以上供夜卧嗌乾燥與復脉湯去薑桂參三服後可加參

勞倦感溫營衛胃陽兼虛

汪　勞倦更感溫邪陽升頭痛寒熱戰慄冷汗邪雖外達陽氣亦泄致神倦欲眠舌赤黃胎口不知味當以育陰除熱爲主辛散苦降非宜

復脉湯去參薑桂麻加壽甘蔗漿

曹　脉促數舌白不飢寒熱汗出初起腹痛臍右有形乃久傷勞倦復感溫邪今病兩旬又六微咳有痰並不渴

飲寒來微微齒痙此營衛二氣大衰恐延虛脫議回衛陽冀寒熱得平

黃芪　桂枝　白芍　炙甘草

牡蠣　南棗

病退胃不和

陳　熱病後不飢能食不寐此胃氣不和

香豉　黑山梔　半夏　枳實　廣皮白

華五五日鼻受寒壅不正之氣過募原擾胃系寒熱已罷猶不飽不飢舌邊赤中心黃餘邪未清食入變酸乃邪熱不勝穀以溫胆和之半麩溫胆去甘草茯苓枳實加

金黑山梔

鬱蒸結生焦

林氏 腹滿已久非是暴症近日面頷腫脹牙關緊閉先有寒熱隨現是象診脉右搏數左小乃溫邪觸自口鼻上焦先受氣血與熱膠固致清竅不利稍有痰塞之變理當先治新邪況頭面咽喉結邪必辛穿輕劑以宣通若藥味重濁徒攻腸胃矣倣東垣普濟消毒意

連翹 牛蒡子 馬勃 射干

滑石 夏枯草 金銀花露 金汁

陰虛邪伏

席 脉左數右緩弱陽根未固陰液漸涸舌赤微渴喘促自利瀉數晡刻自熱神煩譫語夫溫邪久伏少陰古人立法全以育陰祛熱但今見症陰分固有伏邪眞陽亦

不肯收納議倣劉河間濁藥輕投不爲上焦熱阻下焦根蒂自立冀其煩躁熱蒸漸緩

熟地炭　茯苓　淡蓯蓉　遠志炭

川石斛　五味子　飲子煎法

又　晚診陰中伏邪晡時而升目赤羞明舌絳而渴與育陰清邪法

生地炭　玄參心　川石斛　炒麥冬

犀角　石菖蒲

又　脉左數右軟舌乾苔白小溲淋瀝吸氣喘促煩汗腎陰不承心神熱灼蒙閉議以三才湯滋水制熱三才加

茯神黃柏金箔　晚進周少川牛黃清心丸一服

又　昨黃昏後診脉數諸早上左手數疾頓減惟尺中垂而仍動囈語不已若有妄見因思腎熱乘心膻中微閉神明爲蒙自屬昏亂隨進周少川牛黃丸一服俾迷漫無質之熱暫可泄降服後頗安辰刻診脉濡小形質大衰右邊色淡下利稀水夫救陰是要旨讀仲景少陰下利篇十下交征關關欲撮必以堵塞陽明爲治以陽明司闔有闢無闔下焦之陰仍從走泄矣議用桃花湯

人參　赤石脂　炮薑　白粳米

又　晚服照方加茯苓

又　脉左沉數右小數暮熱微汗時煩辰刻神清虛邪仍留陰分議用清補

人參　茯苓　川石斛　炙甘草

黑稻豆皮　糯稻根鬚

又　金匱麥門冬湯

程二溫熱病已傷少陰之陰少壯陰未易復者恰當夏令發泄自益酒釀造有火辛熱劫陰泄氣致形體頹然羸弱見效甚日餌雞蹄子生用其湯飲用馬料豆湯

冬傷於寒春必病溫者重在冬不藏精也蓋煩勞多慾之人陰精久耗入春則裏氣大泄木火內燃强陽

邪熱兼酒熱傷陰

無制燔燎之勢直從裏發始見必壯熱煩冤口乾舌燥之候矣故主治以存津液爲第一黃芩湯堅陰却邪即此義也再者在內之溫邪欲發在外之新邪又加慈鼓湯最爲捷徑表分明以肅清至於因循貽悞豈止一端或因氣燥津枯或致陰傷液涸先生用挽救諸法如人參白虎湯黃連阿膠湯玉女煎復脉法申明條例甚詳餘則治痙厥以甘藥緩肝昏閉用幽芳開竅熱痰之溫膽蓄血而論通瘀井井有條法眞周到邵新甫

暑傷氣分上焦明證

暑

某 大凡暑與熱乃地中之氣吸受致病亦必傷人氣分氣結則上焦不行下脘不通不飢不欲食不大便皆氣分有阻如天地不交遂若否卦之義然無形無質所以清之攻之不效

杏仁 通草 象貝 栝蔞皮

白薇 鬱金汁

姚 奔走氣亂復飲燒酒酒氣辛熱有升無降肺氣鬱蒸上下不通吞白消渴氣結自屬及腹痛痞自利不爽胃

身膚腠皆痛汗大出不解無非暑濕熱氣始由肺受漫布三焦羣醫消導苦藥但攻腸胃在上痞結仍然議淡滲佐以微辛合乎輕岐止病治上之方

西瓜翠衣　川白通草　大豆黃卷　馬兜鈴

射干　苡仁

范　伏暑阻其氣分煩渴咳嗽喘急二便不爽宜治上焦

杏仁　石膏　炒半夏　黑梔皮

厚朴　竹茹

又　痰多咳嗽是暑鬱在上醫家亂投沉降所以無效

石膏　杏仁　炒半夏　蘇金

香豉　黑山梔

王　舌白煩渴心中脹悶熱邪內廹氣分阻閉當治肺經倘逆傳膻中必致昏厥

杏仁　鬱金　滑石　黃芩

半夏　橘紅　梔蔞皮

陳四五　暑濕傷氣肺先受病諸氣皆痺當午後陽升煩喘更加夫無形氣病醫以重藥推消多見不效

西瓜翠衣　活水蘆根　杏仁　瓦仁

又　酒答中虛重鎮攻消清氣愈傷夫暑邪皆着氣分苟肺司清肅則其邪不攻自罷識仍以蠲清爲法若兩露

從天下降炎歊自蕩歸無餘　厥喜丸二錢子服

某二身熱頭脹脘悶咳嗆此暑邪外襲於肺衛當清上焦

絲瓜葉三錢　大杏仁三錢　香薷七分　通草一錢半

飛滑石三錢　白蔻仁五分

陳

脉左勁右濡頭痛脘悶麻痺欲厥舌白此暑邪內中

蒙閉清空成瘧之象平昔陰虛勿犯中下二焦

嫩竹葉　連翹　飛滑石　野薔金汁

大杏仁　川貝母

龔二四　脉寸大頭暈脘中食不多暑熱氣從上受治以苦

辛寒方

竹葉　杏仁　薏仁　滑石

香豉　山梔

張四七三瘧之邪在陰未經向愈春季洞利不食想春雨外濕水穀內衆亦濕即濕多成五泄之謂瘧瘧僅泄經隧濕邪而裹之濕邪未驅長夏吸受暑邪上蒙清空諸竅咳嗽耳聾的係新邪非得與宿病同日而語

連翹　飛滑石　嫩竹葉　荷葉邊汁

桑葉　杏仁　象貝　黑山梔

程三六暑風必挾濕濕必傷於氣分斷瘧瘧發即濕邪內發之徵濕伏熱蘊致氣壅塞咽底脘中及至進穀無碍二

便通調中下無病顯然

白通草　西瓜翠衣　活水蘆根　苡仁

吳　連朝驟熱必有暑氣內侵頭熱目瞑吸短神迷此正虛邪痺清補兩難先與益元散三四錢用嫩竹葉心二錢煎湯京用三四小杯常用菉豆煎湯服

龔　六暑必挾濕二者皆傷氣分從鼻吸而受必先犯肺乃上焦病治法以辛涼微苦氣分上焦廓清則愈惜乎當以陶書六經看病仍是與風寒先表後裏之藥致邪之在上漫延結鋼四十餘日不解非初受六經不須再辨其謬經云病自上受者治其上援引經義以論治病非

邪僻也。宗河間法。

杏仁　栝蔞皮　半夏　薑汁　白蔻仁

石膏　知母　竹瀝　秋露水煎

又　孫補顏安昨午發疹。先有寒戰。蓋此病起於濕熱。當此無汗。肌膚氣窒。至膚間皮脫如麩。猶未能全泄其邪。風疹再發。為濕因熱傳為解。一月以來病魔。而肌無膏澤。痧制枯槁。古謂瘦人之病。慮痼其陰。陰液不充。補之以味。然腥羶濁味。徒助上焦熱痰。無益培陰養液。況宿滯未去。腸胃氣尚窒鍾。必淡薄調理。上氣清爽。痰熱不至復聚。從來三時熱病。怕反覆於病後之復。當此九仞

幸加意留神爲上

玄參心　細生地　銀花　知母　生甘草

川貝　丹皮　橘紅鹽炒　竹瀝

此煎藥方。只用二劑可停。未大便時。用地冬汁膏。大便後。可用三才湯

池　伏暑至深秋而發。頭痛煩渴少寐。

薄荷　淡竹葉　杏仁　連翹

黃芩　石膏　赤芍　木通

張　病幾一月。猶然耳聾。神識不慧。嗽甚痰粘。呼吸喉間有音。此非傷寒暴感。皆夏秋間暑濕熱氣內鬱。新凉引

動內伏之邪。當以輕劑清解三焦。奈何醫者不曉伏氣爲病。但以發散消食寒涼清火爲事。致胃汁消亡。眞陰盡燥。舌邊赤。齒板燥裂血。邪留營中。有內閉癥瘕厥逆之變。況右脉小數。左脉濇弱。熱固在裏。當此陰傷日久。下之再犯亡陰之戒。從來頭面都是清竅。既爲邪蒙精華氣血不肯流行。諸竅失司聰明矣。此輕清清解。斷斷然也。議清上焦氣血之藥爲先。不投重劑苦寒。正倣古人肥人之病。慮虛其陽耳。

連翹心　玄參　犀角　鬱金　橘紅蜜炒

黑梔皮　川貝　鮮菖蒲根　加竹瀝

又　昨進清上焦法諸症雖然畧減而神識猶未清爽總由病久陰液內耗陽津外傷聰明智慧之氣俱被濁氣蒙蔽所以子後午前稍清他時皆不清明以陽盛時人身應之也擬進局方至寶丹藉其芳香足以護陽逐邪庶無內閉外脫之虞

至寶丹每服三分燈心嫩竹葉湯送

又　脉右緩大左弱面垢色已減痰嗽不爽良由胃中津液爲辛散溫燥所傷心營肺衛悉受熱焰蒸迫致神呆喘急耳聾清陽阻痺九竅不利首方宣解氣血繼方芳香通竅無形令其轉旋三焦自有專司豈與俗醫但曉

邪滯攻擊而已今已獲效當與清養胃陰肺氣體素豐盛陽弱不耐沉寒然深秋冬交天氣降則上焦先受試觀霜露下垂草木皆改容色人在氣交法乎天地兼參體質施治

枇杷葉　炒黃川貝　橘紅　鬱金

茯苓　苡仁

暑風傷肺

王　暑風熱氣入肺上熱痰喘歟

石膏　連翹　竹葉　杏仁

桑皮　苡仁　橘紅　生甘草

又　肺氣壅遏身熱喘咳嚏少　葶藶合葶藶大棗湯

某二五暑風外襲。肺衛氣阻。頭脹咳嗆。畏風微熱。防作肺瘧。

絲瓜葉　大杏仁　杏霜　桔梗

連翹　六一散

某　舌灰黃。頭痛咳逆。左肢掣痛。此煩勞陽動。暑風乘虛襲入。最慮風動中厥。

鮮荷葉三錢　鮮蓮子五錢　茯神一錢半　益元散三錢

川貝母一錢半　橘紅一錢

楊女　暑熱穢濁。阻塞肺部。氣痺腹滿。宜以輕可去實

西瓜翠衣　白通草　活水蘆根　生苡仁

臨好加入石膏末二錢

周三二暑風熱神昏。

鮮荷葉　苦丁茶　滑石　木通

杏仁　厚朴　廣皮　白蔻仁

郁六二暑熱頭脹咳嗽痛

鮮荷葉　杏仁　射干　橘紅

桑皮　桔梗　木通　滑石

暑熱阻氣中病不通

胡　不飢不食不便此屬胃病乃暑熱傷氣所致味變酸濁熱痰聚脘苦辛自能泄降非無據也。

牛夏瀉心湯去甘草乾薑加杏仁枳實

王　身熱自汗腹痛大小便不利脉虛右大左小暑熱內

閉。擬和表裏法

薄荷　枳實　黄芩　生白芍

竹葉心　黑山梔　通草　甘草

程四　二穢熱。由清竅入。直犯募原。初頭痛肌脹。今不飢痞悶。

以苦辛寒法。

杏仁　半夏　厚朴　橘紅

竹葉　黄芩　滑石

又　脉虛。舌赤消渴。伏暑熱氣。過衛入營。治在于厥陰。

竹葉　犀角　生地　麥冬　玄參

某六　舌黄。脘悶頭脹。口渴溺短。此吸受穢氣所致。

飛滑石三錢　白蔻仁七分　杏仁三錢　厚朴一錢半

通草一錢半　廣皮白一錢半

某三三穢暑吸入。內結募原。脘悶腹痛。便泄不爽。法宜芳香逐穢。以疏中焦為主

藿香梗　杏仁　厚朴　茯苓皮

半夏麴　廣皮　香附　麥芽

楊　秋暑內爍。煩渴喜得冷飲。脉右小弱者。暑傷氣分。原必兼虛也。此非結胸症。宜辛寒以徹裏邪

石膏　知母　厚朴　杏仁

半夏　薑汁

沈二三脉小色白氣分不足兼之胃弱少食閒穢濁要剖痧陰柔之藥妨胃助濁常以豬肚丸養胃入夏令熱更傷氣每食遠進生脉四君子湯一劑恪守日服可杜夏季客暑之侵　生脉四君子湯　長服豬肚丸

卜二八春夏必吞酸骨痿麻木此體虛不耐陽氣升泄乃熱傷氣分爲病宗東垣清暑益氣之議

人參　黃芪　白术　甘草　麥冬
五味　青皮　陳皮　澤瀉　葛根
升麻　黃柏　歸身　神麯

任寸六沖尺眞陰未長逢長夏濕熱交迫斯氣泄煩倦當暫

坐涼爽過月京飈至爽歇去乃却病之期與清暑益氣之屬

清暑益氣法

徐十四長夏濕熱令行肢起膿窠煩倦不嗜食此體質本怯而濕與熱邪皆傷氣分當以注夏間參用清暑益氣法

人參　白术　廣皮　五味　麥冬

川連　黄柏　升麻　葛根　神麯

麥芽　穀芽　乾荷葉汁泛丸

施四七以煩勞傷陽交長夏發泄令加見症都是氣弱亦熱傷氣也煩渴有痰先治其胃益陽明經脉主乎束筋骨以流利機關耳　金匱麥門冬湯

吳　診脉肝胆獨大尺中動數先天衰弱水虧木少滋榮當春深長夏天地氣機泄越身中煩倦食減皆熱傷元氣所致進以甘酸充養胃陰少俟秋肅天降培植下焦固納爲宜

炒麥冬　木瓜　北沙參　生甘草　烏梅

程　暑久入營夜寐不安不飢微安陰虛體質議理心用

鮮生地　玄參　川連　銀花

連翹　丹參

顧　陰虛遺熱小便淋瀝近日冒暑初起寒熱頭痛汗出不解肌肉麻木手足牽强神昏如昧成痫則輕痙厥則

暑久入營

犀角　玄參　小生地　連翹心　竹葉心

石菖蒲　滑石　化牛黃丸二服

某　初病伏暑傷於氣分微熱渴而飲邪犯肺也失治邪張逆走膻中遂古絡縮小便忽閉鼻煤裂血口瘡耳聾神昏由氣分之邪熱漫延於血分矣夫肺主衛心主營營衛二氣晝夜行於經絡之間與邪相遇或涼或熱今則入於絡津液被劫必漸昏寐所謂內閉外脫

鮮生地　連翹　玄參　犀角

石菖蒲　金銀花

注 暑風久入營絡微熱忽寒議用玉女煎

玉女煎去麥冬牛膝加丹皮竹葉

金 熱止津津汗出伏暑已解只因病屢日久平素積勞

形色脉象虛衰深慮變病今飲食未進寤寐未寧議以

飲液補虛

人參 茯神 麥冬 五味

炒白芍 塊辰砂一兩綿裹同煎

又 熱久胃汁被劫不飢不便亦病後常事耳古人論病

必寇寢食今食未加餐難寐神識未清爲病傷元氣而

熱病必消爍眞陰議用三才湯意

暑熱深入劫陰

人參　天冬　生地　麥冬　五味子

顧　右脉空大左脉小芤寒熱麻痺腰痛冷汗平素積勞內虛秋暑客邪遂干臟陰致神迷心熱煩躁刮痧似乎暑爽病不肯解此非經絡間病頗慮熱深劫陰而爲痙厥張司農集諸賢論暑病謂入肝則麻痺入腎爲消渴此其明數義淸陰分之邪仍以養正輔之

阿膠　小生地　麥冬　人參

小川連　烏梅肉

暑濕漫三焦

茶

暑濕熱氣鬱入上焦孔竅頭脹眩悶不飢腹痛惡心延久不淸有瘧痢之憂醫者不明三焦治法混投發散

消食宜平無效

杏仁　香薷　橘紅　黑山梔

牛夏　厚朴　滑石　黃芩

張　舌白罩灰黑。胸脘痞悶。潮熱嘔惡。煩渴汗出。自利。伏暑內發。三焦均受。然清氣上中爲要

杏仁　滑石　黃芩　牛夏　厚朴

橘紅　黃連　鬱金　通草

某二六　暑熱鬱遏。頭脹脘痛。口渴溺短。當清三焦

絲瓜葉　飛滑石　淡竹葉　茯苓皮

厚朴　藿香　廣皮　通草

何　暑濕皆客邪也原無質故初起頭脹胸滿但傷上焦氣分耳酒家少穀胃氣素薄一派消導雜以辛散苦寒胃再傷殘在上濕熱延及中下遂協熱自利三焦邪蒸氣衝塞塡胸躁亂口渴爪冷下脘格拒相鬬此中宮大傷況進熱飲暑受其爲胃陽殘憊而邪結內歸可知矣考暑門時風煩躁清濁交亂者苦賢每以來復丹五六十粒轉運清濁爲先攻補難施之際望其效靈耳

來復丹

吳　目黃脘悶咽中不爽嘔逆寒少熱多暑濕客氣之傷三焦不通非風寒之症

大竹葉　黃芩　杏仁　滑石　陳皮白

厚朴　半夏　薑汁

又　暑濕熱皆氣也並釀成濁痰於胃遂口甜膩滯不飢

議以宜氣理痰

川貝母　梧桐皮　杏仁　黑山梔　澤瀉

另用二賢散

某四診脉弦午後惡寒似熱不飢溺澁短赤暑熱炎蒸外襲肺衛遊行三焦致氣分窒痺而然當用和法宜薄滋味庶杜瘧患

杏仁　香薷　木通　飛滑石

茯苓　厚朴　白蔻仁　淡竹葉

又　照前方去香薷加半夏

楊工暑熱必挾濕吸氣而受先傷於上故仲景傷寒先分六經河間溫熱須究三焦大凡暑熱傷氣濕着阻氣肺主一身周行之氣位高爲手太陰經據述病樣面赤足冷上脘痞塞其爲上焦受病顯著緣乎素善飲胃中濕熱久伏辛溫燥烈不但肺病不合而胃中濕熱得燥熱鋼閉下利稀水即協熱下利故黃連苦寒每進必利甚者苦寒以勝其辛熱藥味尚留於胃底也然與初受之肺邪無當此石膏辛寒辛先入肺知母爲味清京爲肺

之母氣然不明肺邪徒日生津為是至理昔孫眞人未診先問最不悞事再據主家說及病起兩旬從無汗泄經云暑當汗出勿止氣分窒塞日久熱侵入血中略痰帶血舌紅赤不甚渴飲上焦不解漫延中下此皆急清三焦是第一章旨故熱病之瘀熱留絡而為遺毒注腑腸而為洞利便為束手無策再論濕乃重濁之邪熱為薰蒸之氣熱處濕中蒸濁之氣上迫清竅耳為失聰不與少陽耳聾同例青蒿薄荷柴胡一等亦是少陽本藥且大病如大黃甚藥若遲將苟非慎重鮮克有濟議三焦分清治從河間法初三日

飛滑石　生石膏　寒水石　大杏仁

炒黃竹茹　川通草　瑩白金汁　金銀花露

又　暮診診脉後腹脇肌膝發現癮疹氣分濕熱原有暗泄之機早間所談餘邪遺熱必兼解毒者爲此下午進藥後診脉較大於早晨神識亦如前但舌赤中心甚乾燥身體肌之熱甚於早間此陰分亦被熱氣蒸傷瘦人慮其液涸然痰咯不清養陰藥無往而非膩滯議得早進清膈一劑而三焦熱穢之蓄當用紫雪丹二三匙藉其芳香宣竅逐穢斯錮熱可解濁痰不粘繼此調理之方清營分滋胃汁始可瞻顧其宿垢欲去猶在旬日之

外古人謂下不嫌遲非臆說也　紫雪丹一錢六分

知母　竹葉心　連翹心　炒川貝　竹瀝

犀角　玄參　金汁　銀花露

又　一劑後用

竹葉心　知母　菉豆皮　玄參

鮮生地　金銀花

又　一劑後去銀花菉豆皮加入參麥冬

又　初十申刻診經月時邪厥形小數小爲病退數爲餘熱故皮膚麻蟯氣血有流行之義思食欲餐胃中有醒豁之機皆佳兆也第舌赤而中心黃苔熱蒸既久胃津

陰液俱傷致嚥物咽中若哽溺溲尿管猶痛咯痰濃厚宿垢未下若急遽攻奪恐眞陰更涸矣此存陰爲主而清腑兼之故亂進食物便是助熱惟清淡之味與病不悖自來熱病最怕食復勞復舉世共聞非臆說也

細生地　玄參心　知母　炒川貝

麥冬　地骨皮　銀花露　竹瀝

又

脉症如昨仍議滋清陰分餘熱佐清上腔熱痰

照昨日方去地骨皮銀花露加鹽水炒橘紅

某

脉虛傷暑頭重脘悶斟痰

絲瓜葉三錢　大杏仁三錢　六一散三錢　茯苓皮三錢

漢防己一錢半　綿茵蔯一錢　細木通一錢　白蔻仁五分

某　中惡暑厥。蒼朮白虎湯加滑石

王　暑邪寒熱。舌白不渴。吐血。此名暑瘵重症。

西瓜翠衣　竹葉心　青荷葉汁　杏仁

飛滑石　茵仁

暑厥

暑瘵

暑邪入厥陰

萬　暑邪不解。陷入厥陰。舌灰滑渴。心下板實。嘔惡吐蚘。寒熱。下利血水。最危之症。

川連　黃芩　乾薑　生白芍

川椒　烏梅　人參　枳實

江　暑邪深入厥陰。舌縮。少腹堅滿。聲音不出。自利上下

格拒危期至速勉擬暑門酸苦泄熱輔正驅邪一法。

黃連　淡乾薑　烏梅　生白芍

半夏　人參　枳實

暑兼血症

某十八勞傷挾暑。肺氣受戕。咳血口乾。先清暑熱。

鮮荷葉　白扁豆　大沙參　茯神　苡仁

朱三二二伏中。陰氣不生。陽氣不潛。其頭脹身痛。是暑邪初受。暑濕熱必先傷氣分。故舌白口渴身痛。早晨清爽。午夜煩蒸。狀如溫瘧。沐浴遶動血絡。宿病得時邪而來。仲景云。先治新病。後理宿病。是亦陰氣先傷。陽氣獨發也。

鮮生地　石膏　知母　玄參

連翹　竹葉心　荷葉汁

王三九　雖是欬痰失血。然强能食。不知飢。目黃晡熱。舌心黃。已現暑熱客邪症象。此先宜清理肺胃。莫因久恙而投膩補。

杏仁　象貝母　鬱金　川通草

桑葉　石膏　橘紅　苡仁

又　晚服枇杷葉膏　早六味加阿膠麥冬

又　阿膠　雞子黃　小生地　麥冬

桑葉　炒黑丹皮

徐三六　勞傷挾暑。咳血不飢。

鮮荷葉汁沖　六沙參　生苡仁　六一散

菉豆皮　杏仁　橘紅　白蔻仁

天之暑熱一動。地之濕濁自騰。人在蒸淫熱迫之中。若正氣設或有隙。則邪從口鼻吸入。氣分先阻。上焦清肅不行。輸化之機。失於常度。水穀之精微。亦蘊結而爲濕也。人身一小天地。內外相應。故暑病必挾濕者。即此義耳。前人有因動因靜之分。或傷或中之候。以及入心入肝爲瘧爲痢。中痧霍亂暴厥卒死。種種傳變之原。各有精義可參。茲不重悉。想大江以南。地卑氣薄。濕勝熱蒸。當此時候。更須防患於先。昔李笠

翁記中所謂使天只有三時而無夏則人之病也必
稀此語最確蓋暑濕之傷驟者在當時爲患緩者於
秋後爲伏氣之疾其候也脉色必濡口舌必黏或有
微寒或單發熱熱時朕痞氣窒渴悶煩冤每至午後
則甚入暮更劇熱至天明得汗則諸恙稍緩日日如
是必要兩三候外日減　日方得全解倘如元氣不
支或調理非法不治者甚多然是病比之傷寒其勢
覺緩比之瘧疾寒熱又不分明其變幻與傷寒無二
其愈期反覺纏綿若表之汗不易徹攻之便易溏瀉
過清則肢冷嘔惡過燥則唇齒燥裂每遇秋來最多

是症求之古訓不載者多獨已任編名之曰秋時晚發感症似瘧總當以感症之法治之要知伏氣爲病四時皆有但不比風寒之邪一汗而解溫熱之氣投凉即安夫暑與濕爲熏蒸粘膩之邪也最難驟愈若治不中竅暑熱從陽上蒸而傷陰化燥濕邪從陰下沉而傷陽變濁以致神昏耳聾舌乾齦血脫痞嘔惡洞泄肢冷棘手之候叢生竟至潰敗莫救矣叅先生用意宗劉河間三焦論立法認明暑濕二氣何者爲重再究其病實在營氣何分大凡六氣傷人因人而化陰虛者火旺邪歸營分爲多陽虛者濕勝邪傷氣

分爲多。一則耐清。一則耐溫。厥性之陰陽。從此可知也。於是在上者以辛涼微苦。如竹葉連翹杏仁薄荷之類。在中者以苦辛宣通。如半夏瀉心之類。在下者以溫行寒性。質重開下。如桂苓甘露飲之類。此皆治三焦之大意也。或有所夾。又須通變。至於治氣分有寒溫之別。寒者宗諸白虎法。及天水散意。溫者從乎三陳湯。及正氣散法。理營分知清補之宜。清者如犀角地黃加入心之品。補者有三才復脈等方。又如濕熱沉混之蒼朮石膏湯。氣血兩燔之玉女法。開閉逐穢與牛黃及至寶紫雪等劑。扶虛進參附。及兩儀諸

法隨其變幻審其陰陽運用之妙存乎心也附驥蕪詞高明教正。邵新甫

[illegible]阻上焦肺不[illegible]

病三日白頭眩身痛肢疼胸悶不食溺阻當開氣分除濕

飛滑石　杏仁　白蔻仁　大竹葉

炒半夏　白通草

于二酒肉之濕助熱內蒸曠痰阻塞氣分不飢不食便溺

不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺主一身之氣

化也

杏仁　栝蔞皮　白蔻仁　飛滑石

半夏　厚朴

今病多一則耐清一則耐溫厥陰之陰陽從此可知

是於其有上者以辛涼發散若如桂枝湯之類在中者以苦辛宣通如半夏瀉心之類在下者

則溫利其性質重鎮下如柱琥甘露飲之類此皆治

病之法意也其有所次又須通變至於治氣分有

失治之方異者宗諸古處法及天水散意溫者從乎

三陽湯及五苓散涼者隨分知清補之宜清者如屋

角地黃加入心之品補者有三才復脉等方又如濕

濕

濕阻上焦肺不肅降

馮三一舌白頭脹身痛肢疼胸悶不食溺阻當開氣分除濕

飛滑石　杏仁　白蔻仁　大竹葉

炒牛夏　白通草

王二十酒肉之濕助熱內蒸釀痰阻塞氣分不飢不食便溺不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺主一身之氣化也

杏仁　桔蔞皮　白蔻仁　飛滑石

牛夏　厚朴

吳五五酒客濕熱變蒸化火性不喜甜熱聚胃口犯肺氣逆吐食上中濕熱主以淡滲佐以苦溫

大杏仁　金石斛　飛滑石　紫厚朴　活水蘆根

孔心中熱不飢不寐目黃自利濕熱內伏

淡黃芩　連翹　炒杏仁　白通草

滑石　野赤豆皮

濕溫阻肺

某二九濕溫阻於肺衛咽痛足跗痺痛當清上焦濕走氣自和

飛滑石　竹葉心　連翹　桔梗

射干　蘆根

周病起旬日猶然頭脹漸至耳聾正如內經病能篇所云因於濕首如裹此死忒鼻衄皆邪混氣之象況舌色帶白咽喉欲閉邪阻上竅空虛之所諒非苦寒直入胃中可以治病病名濕溫不能自辨即有昏痙之變醫莫泛稱時氣而已

連翹　牛蒡子　銀花　馬勃

射干　金汁

濕熱穢氣阻竅

李三　時令濕熱之氣觸自口鼻由募原以走中道遂致清肅不行不飢不食但溫乃化熱之漸致穢竅不爲靈動與形質滯濁有別此清熱開鬱必佐芳香以逐穢爲法

栝蔞皮　桔梗　黑山梔　香豉

枳殼　薤金　降香末

某　感受穢邪。募原先病。喘逆。邪氣分布。營衛皆受。遂熱蒸頭脹。身痛經旬。神識昏迷。小水不通。上中下三焦交病。吾白渴不多飲。是氣分窒塞。當以芳香通神。淡滲宣竅。俾穢濕濁氣。由此可以分消

茵仁　茯苓皮　猪苓　大腹皮

通草　淡竹葉　牛黃丸二丸

吳　濕邪中傷之後。脾胃不醒。不飢口渴。議清養胃津爲穩。

濕熱傷胃津

濕溫邪入心胞

鮮省頭草　知母　川斛　苡仁　炒麥冬

張姬　體壯有濕。近長夏陰雨潮濕。着於經絡。身痛。自利發熱。仲景云。濕家大忌發散。汗之則變痙。脉來小弱而緩。濕邪凝遏陽氣。病名濕溫。濕中熱氣橫冲心胞絡。以致神昏四肢不煖。亦手厥陰見症。非與傷寒同法也。

犀角　連翹心　玄參　石菖蒲

金銀花　野赤豆皮　煎送至寶丹

濕熱內留

蔡　陽虛挾濕。邪熱內陷。所以神識如蒙。議用瀉心法。

人參　生乾薑　黃芩　川連

枳實　生白芍

張六 此濕蘊氣中足太陰之氣不爲鼓動運行試以痞結胸滿仲景列於太陰篇中槩可推求其理矣

半夏 蜜炒 茯苓 川連 厚朴 通草湯煎

周 濕傷脾陽腹脹小便不利

茅朮 厚朴 茯苓 澤瀉

猪苓 秦皮

又 五苓散 又 二朮膏

范 四肢乍冷自利未已目黃稍退而神倦不語濕邪內伏足太陰之氣不運經言舜竅在舌邪滯竅必少靈以致語言欲蹇必宜分利佐辛香以熙運坤陽是太陰裏

症之法

生於术三錢　厚朴五分　茯苓三錢　草菓仁七分

木瓜五分　澤瀉五分

又　身體稍稍轉動語蹇神呆猶是氣機未爲靈轉色豚非是有餘而濕爲陰邪不徒偏寒偏熱已也

生於术　茯苓　苡仁　薏金

炒遠志　石菖蒲升

又　脾胃不醒昔從前濕蒸之累氣升咳痰參藥幾進

炒黃川貝　茯苓　苡仁　薏金

地骨皮　淡竹葉

又　濕滯於中氣蒸於上失降不得寐口數白痰仍不渴飲開上膏佐中運利腸間亦是宜通三焦也

生於术五錢　茵仁三錢　寒水石一錢半　桔梗七分

猪苓一錢　澤瀉一錢　廣皮白一錢半

濕阻中焦陽氣

曹三十　腸胃屬腑濕久生熱氣阻不爽仍以通爲法

生於术　川黃連　厚朴　淡生薑渣

廣皮白　酒爆大黃　水法九服三錢

李四五　脉小濇痰多上湧食入脘阻大便不爽上秋至今夏不愈自述飲飲失和曾病黃疸以濕傷氣脾主治

大杏仁　茵仁　半夏　薑汁

茯苓　橘紅　鬱金　香豉

俞五五酒濕鬱傷。脘中食阻而痛。治以辛苦寒。

小川連　半夏　薑汁　枳實

茯苓　香豉

某五九舌白目黃。口渴溺赤。脉象某鈍。此屬濕鬱。

綿茵陳三錢　生白术錢　寒水石三錢　飛滑石三錢

桂枝木一錢　茯苓皮錢　木猪苓三錢　澤瀉一錢

李酒客中滿。舉地潮濕。長夏涉水。外受之濕。下起水氣。不運中焦之濕內聚。治法不以宣通經腑。致濕阻氣分。鬱而爲熱。自辟胃不主運通。水濕蘊濁於脉濂之間。二

便不爽。濕熱鬱氣交揉混亂。前賢治中滿。必曰分消。此分字明明謂分解之義。但亂藥既多。不能去病。就是將胃受傷於藥。變延肌肢腫極且痛。病深路遠。藥必從發入胃。然後四布。病所未得藥益。清陽先已受傷。此湯藥難以進商也。議用丹溪小溫中丸三錢。當以疎利腸中。取其不致流散諸經。亦一理也。小溫中丸八服

某三六陽微體質濕痰內聚。便溏脫悶。凡麻舌乾。清理濕邪。氣機升降自安。

金石斛　茯苓　半夏　廣皮白

張　脉右緩濕着阻氣

厚朴　廣皮　煨草菓　炒查肉

藿香梗　炒神麯

某二　不耐煩勞是本虛。脘悶便泄屬濕邪。先治濕。後治本。

藿香梗　廣皮　茯苓　大腹皮

厚朴　穀芽

陸　濕滯如痞。

山茵陳　草果仁　茯苓皮　大腹皮

厚朴　廣皮　猪苓　澤瀉

汪三　舌黃脘悶。穢濕內着。氣機不宣。如久釀蒸。必化熱氣。

即有身熱之累

杏仁　藿香　茯苓皮　滑石

厚朴　廣皮白

某　閱病源。皆濕熱內停之象。當走濕清熱爲主。至於藥酒蘊濕助熱。尤當永戒

生白术　赤小豆皮　綿茵陳　黃柏

茯苓　澤瀉

某　脉濡。頭脹胸身重著而痛。寒熱微嘔。此濕阻氣分。

厚朴　杏仁　白蔻仁　木通

茯苓皮　大腹皮　滑石　竹葉

某長夏外受暑濕與水穀之氣相併上焦不行下脘不通氣阻熱從濕下蒸逼不飢不食目黃舌白氣分之結

厚朴　杏仁　廣皮　茯苓

半夏　薑汁

某脉緩身痛汗出熱解繼而復熱此水穀之氣不運濕復阻氣鬱而成病仍議宣通氣分熱自濕中而來徒進清熱不應

黄芩　滑石　茯苓皮　大腹皮

白蔻仁　通草　猪苓

方四四形質頹然脉遲小溲不食不寐腹痛大便窒痺平昔

嗜酒少穀中虛濕結陽傷寒濕濁陰鬱聚爲痛

炒黑生附子　炒黑川椒　生淡乾薑　葱白

調入猪胆汁一枚

王五　冷濕損陽經絡拘束形寒酒客少穀勞力所致

桂枝　淡乾薑　熟附子　生白术

莫五十　夏四月寒熱不飢是時令潮沴氣蒸內應脾胃

夫濕屬陰晦必傷陽氣吞酸形寒乏陽運行議鼓運轉

旋脾胃一法　苓薑术桂湯

某廿地中濕氣自足先腫濕屬陰邪陽不易復畏寒筋骨

猶牽强無力以金匱苓薑术桂湯

五濁凝氣結有形酒肉挾濕

蕲艾　生香附　木香　草果

茯苓　廣皮白

江

脉緩胸上痛腹微脹便稀溺短不爽此乃濕蠱脾胃之陽致氣滯裏急宗古人導濕分消用桂苓散方

生茅术　官桂　茯苓　厚朴　廣皮白

飛滑石　猪苓　澤瀉　炒查肉

林　五

中年清陽日薄忽然脘中痞悶乃清陽不自轉旋酒肉濕濁之氣得以凝聚矣過飲湯瀉濕傷脾胃胃陽微仲景法以輕劑宣遏其陽若投破氣開降最傷陽氣有

格拒之害。　苓桂朮甘湯

嚴三　胸滿不飢。是陽不運行。嗜酒必挾濕。鬱阻其氣。久則三焦皆閉。用半硫丸二便已通。議治上焦之陽。

苓桂朮甘湯

王六　病人並病中厚味無忌。腸胃滯雖下。而留濕未解。濕重濁。令氣下墜於肛。肛墜痛不已。胃不喜食。陽明失闢。舌上有白腐形色。蓋新腸胃之濕。

生茅朮　人參　厚朴　廣皮

炮薑灰　生炒黑附子

朗二　受濕患瘡。久瘡陽乏。氣泄。半年淹淹無力。食少。嘔噫

難化。此脾胃病法以運中陽爲要。

茯苓　桂枝　生於术　炙草

苡仁　生薑

注　夏令脾胃司氣。兼以久雨泛潮。地中濕氣上干。食味重濁少運。所謂濕勝成五泄也。古云寒傷形。熱傷氣。芒種夏至。天漸熱。宜益氣分以充脾胃。此夏三月。必有康健之理。

補中益氣湯

濕邪濡漫三焦

某五穀濕邪。吸受。由募原分布三焦。升降失司。脘腹脹悶。大便不爽。當用正氣散法。

藿香梗　厚朴　杏仁　廣皮白

茯苓皮　神麯　麥芽　綿茵陳

蔡仲景云。小便不利者。爲無血也。小便利者。血症諦也。此症是暑濕氣蒸。三焦瀰漫。以致神昏。乃諸竅阻塞之兆。至小腹硬滿。大便不下。全是濕鬱氣結。彼分醫猶然以滋味呆鈍滯膩。與氣分結邪相反極矣。議用甘露飲法。

猪苓　浙茯苓　寒水石　晚蚕沙　皂莢子去皮

某十四　脘悶。便溏。身痛。脉象模糊。此屬濕蘊三焦。

厚朴　廣皮　藿香梗　茯苓皮

大豆黃卷　木防己　川通草　苡仁

洞泄積聚懷服濕熱諸藥頗與清導推陳致新乃安身處江南濕熱之鄉飲啖仍用山右濃重之味留熱出腸升腸三焦不清議攻無形之熱

清心凉膈去芒硝加菖蒲

濕傷陽氣生月德

韓三令酒水濕傷中上嘔食下泄脂液陽氣傷極再加浮腫作脹則危

人參　茯苓　乾附子　生於术

生白芍　生薑

又　酒濕類聚例以分利診脉微陽氣已敗濕壅生熱至骨痿燥清熱則陽氣自死本方遵中祛濕佐附逐走氣

分亦治濕一法

茯苓　熟附子　生薑　左牡蠣

澤瀉　車前子

麗四四濕久脾陽消乏中年未育子　眞亦憊微安腎丸法

鹿茸　胡蘆巴　附子　韭子　赤石脂

補骨脂　眞茅术　茯苓　兎絲子　大茴香

張五四陽爲痿弱有濕麻痺痔血

生白术　附子　乾薑　茯苓

某三八舌白身痛足踹浮腫從太谿穴水流如注此濕邪伏於足少陰當用溫蒸陽氣爲主

鹿茸　淡附子　草果　兎絲子　茯苓

楊　厥陰爲病必錯雜不一痿痹之後肝臟必虛發症在脇有痞腹中塊礧外堅脇下每常汩汩有聲惡虛就實常有寒熱胃中不知飢而又嗜雜吞酸厥長而數顯然厥陰陽明濕熱下滲前陰陽縮而爲濕熱症也議用防發陽明胃氣滲泄厥陰濕熱其症自愈

蒼术　半夏　茯苓　橘紅　通草

當歸　柏子仁　沙蒺藜　川楝子　茴香

即丸方

浦氏胸脇迷漫胃痛痞食肢節屈曲處冷痛經落後來身

周身腰脊不舒脉弦沉痛即便溏此濕滯阻閉氣血不行用藥先須斷酒

生茅术　炮黑川烏　薑汁　白芥子

厚朴　廣皮　專揉　茯苓

徐　温瘧初愈驟進濕鹹食物濕壅熱蒸於經絡寒戰熱熾骨節煩疼舌起灰滯之形面目發黃色顯然濕熱爲患仲景謂濕家忌發汗者恐陽傷變病蓋濕邪重着汗之不却是苦味辛通爲要耳

防己　杏仁　滑石　醋炒牛夏

通草　山梔　薏仁　野赤豆皮

某四七風暑濕渾雜氣不主宣咳嗽頭脹不飢右脉沉緩

當通陽驅邪

杏仁三錢　苡仁三錢　桂枝五分　生薑七分

厚朴一錢　牛夏一錢半　漢防已一錢半　白蒺藜二錢

濕鬱經脉痛

某汗多身痛自利小便全無胸腹白疹此風濕傷於氣分醫用血分京藥希蕁熱綫殊不知濕鬱在脉爲痛濕家本有汗不解

苡仁　竹葉　白蔻仁　滑石

茯苓　川通草

濕爲重濁有質之邪若從外而受者皆由地中之氣

升騰從內而生者皆由脾陽之不運雖云霧露雨濕上先受之地中潮濕下先受之然霧露雨濕亦必由地氣上升而致若地氣不升則天氣不降皆成燥症矣何濕之有其傷人也或從上或從下或遍體皆受此論外感之濕邪着於肌軀者也此雖未必即入於臟腑治法原宜於表散但不可大汗耳更當察其兼症若兼風者微微散之兼寒者佐以溫藥兼熱者佐以清藥此言外受之濕也然水流濕火就燥有同氣相感之理如其人飲食不節脾家有濕脾主肌肉四肢則外感肌軀之濕亦漸次入於臟腑矣亦有然不

受濕而但濕從內生者必其人膏粱酒醴過度或嗜飲茶湯太多或食生冷瓜菓及甜膩之物治法總宜辨其體質陰陽斯可以知寒熱虛實之治若其人色蒼赤而瘦肌肉堅結者其體屬陽此外感濕邪必易於化熱若內生濕邪多因膏粱酒醴必患濕熱濕火之症若其人色白而肥肌肉柔軟者其體屬陰若外感濕邪不易化熱若內生之濕多因茶湯生冷太過必患寒濕之症人身若一小天地今觀先生治法若濕阻上焦者用開肺氣佐淡滲通膀胱是即啟上閘開支河導水勢下行之理也若脾陽不運濕滯中焦

者用木朴薑半之屬以溫運之以苓澤腹皮滑石等滲泄之亦猶低窪濕處必得烈日晒之或以剛燥之土培之或開溝渠以泄之耳其用藥總以苦辛寒治濕熱以苦辛溫治寒濕繫以淡滲佐之或再加溫藥甘酸膩濁在所不用總之腎陽充旺脾土健運自無寒濕諸症肺金清肅之氣下降膀胱之氣化通調自無濕火濕熱暑濕諸症若夫失治變幻則有腫脹黃疸泄瀉淋閉痰飲等類俱於各門兼參之可也華岫雲

氣分熱

燥

某　脉右數大議清氣分中燥熱

桑葉　杏仁　沙參　象貝母

香豉　黑梔皮

肺胃津液虛

下　夏熱秋燥致傷都因陰分不足

冬桑葉　玉竹　生甘草　白沙參

生扁豆　地骨皮　麥冬　花粉

火鬱上焦

某　燥火上鬱齒脹咽痛當辛涼清上

薄荷梗　連翹殼　生甘草　黑梔皮

心陽過動傷液

桔梗　　蒙豆皮

王六老人舌腐肉消肌枯心事繁冗陽氣過動致五液皆涸而爲燥冬月無妨夏月深處林壑心境凝然可以延年每早服午乳一杯

胃陰虛

陳　秋燥復傷宿恙再發表可補益姑與甘藥養胃

麥冬　　玉竹　　北沙參　　生甘草

茯神　　糯稻根鬚

某　上燥治氣下燥治血此爲定評今陽明胃腑之虛因久病嘔逆投以辛耗或氣津液劫傷胃氣不主下行致腸中傳送失司經云六腑以通爲補半月小效全在一

通補工夫豈徒理燥而已議甘寒清補胃陰

鮮生地　天冬　人參　甜梨肉　生白蜜

張　脉數虛舌紅口渴上鬱乾涸腹熱不飢此津液被劫陰不上承心下溫溫液液用炙甘草湯

炙甘草　阿膠　生地　麥冬

人參　麻仁

某氏心中煩熱正值經來而熱渴不已若清肺氣大謬用復脉法

炙甘草　生地　阿膠　麥冬

棗仁　蓮蓮

某　陽津陰液重傷。營熱淹留不解。臨晚潮熱。舌色若赭。頻飲救亢陽焚燎。究未能解渴。形脉俱虛。難投白虎議以仲景復脉一法。爲邪少虛多。使少陰厥陰二臟之陰少甦。冀得胃關復振。因左關尺空數不藏。非久延所宜耳。

人參　生地　阿膠　麥冬

炙草　桂枝　生薑　大棗

燥爲乾澁不通之疾。內傷外感宜分。外感者由於天時風熱過勝。或因深秋偏亢之邪。始必傷人上焦氣分。其法以辛涼甘潤肺胃爲先。喻氏清燥救肺湯及

先生用玉竹門冬桑葉薄荷梨皮甘草之類是也內傷者乃人之本病精血下奪而成或因偏餌燥劑所致病從下焦陰分先起其法以純陰靜藥柔養肝腎爲宜大補地黃丸六味丸之類是也要知是症大忌者苦濟最喜者甘柔若氣分失治則延及於血下病失治則槁及乎上喘咳痿厥三消噫膈之萌總由此致大凡津液結而爲患者必佐辛通之氣味精血竭而爲患者必藉血肉之滋填在表佐風藥而成功在腑以緩通爲要務古之滋燥養營湯潤腸丸五仁湯瓊玉膏一烝丹牛羊乳汁等法各有當司也邵新甫

疫

朱　疫癘穢邪從口鼻吸受分布三焦瀰漫神識不是風寒客邪亦非停滯裏症故發散消導即犯劫津之戒與傷寒六經大不相同今嗌痛丹疹舌如砂神躁暮昏上受穢邪逆走腦中當清血絡以防結閉然必大用解毒以驅其穢必九日外不致昏憒冀其邪去正復

犀角　連翹　生地　玄參

菖蒲　鬱金　銀花　金汁

姚　疫毒口糜丹疹嗌腫治在上焦

癘邪入腦漸干心胞

犀角　鮮生地　玄參　蓮翹

石菖蒲　銀花　金汁　至寶丹

譚　口鼻吸入穢濁自肺系漸干心胞絡初病喉痛舌燥最怕竅閉神昏之象疫毒傳染之症不與風寒停滯同法

玄參　連翹　臂金　銀花　石菖蒲

鼠葉　射干　牛蒡　冲入眞白金汁一杯

楊　吸入疫毒三焦皆受久則血分漸瘀愈結愈熱當以鹹苦之製仍是輕揚理上倣古大製小用之意

玄參　西瓜翠衣　金銀花露　瑩白金汁

金氏入靜則神昏瀉邪竟入膻王先生方甚妙愚意以

芳香宣竅逐穢　至寶丹

疫癘一症都從口鼻而入直行中道流布三焦非此

傷寒六經可表可下夫疫爲穢濁之氣古人所以飲

芳香採藭草以襲芬芳之氣者重滌穢也及其傳變

上行極而下下行極而上是以邪在上焦者爲喉痹

爲口糜若逆傳膻中者爲神昏舌絡爲喉痛丹疹今

觀先生立方清解之中必佐芳香宣竅逐穢如犀角

菖蒲銀花蠶金等類兼進至寶丹從表透裏以有靈

之物內通心竅搜剔幽隱通者通鎮者鎮若邪入營

中三焦相涸熱愈盛邪愈深者宜宜藏苦大製之法仍恐性速而走在下故用玄參金銀花露金汁瓜蔞皮輕揚理上所謂敗古法而不泥其法者也考是症惟張景岳劉嘉言吳又可論之最詳然宗張喻二氏恐有遺邪留患若宗吳氏又恐邪去正傷惟在臨症權衡無或盛盛虛虛而遺人夭殃方不愧爲司命矣

節滋九

癍痧疹瘰

三焦伏熱

張　伏氣熱蘊三焦。心瘰熱發。煩渴。遍體赤癍。夜躁不寐。

兩脉數搏。

羚羊角　犀角　連翹心　玄參心

鮮生地　金銀花　花粉　石菖蒲

又　寒熱必有形象攻觸。及於胃脘之下。口渴喜飲煖湯。

癍已發現。病不肯退。此邪氣久伏厥陰之界矣。

桂枝　川連　黃芩　花粉

牡蠣　枳實

嚴　濕溫雜受身發斑疹飲水渴不解夜煩不成寐病中强食反助邪威議用凉膈疏斑方法

連翹　薄荷　杏仁　瞿金

枳實汁　炒牛蒡　山梔　石膏

又　舌邊赤昏譫早輕夜重斑疹隱約是溫濕已入血絡夫心主血邪干膻中漸至結閉爲昏痙之危苦味沉寒竟入中焦消導辛溫徒劫胃汁皆溫邪大禁議清疎血分輕劑以透斑更參入芳香逐穢以開內竅近代喻嘉言申明戒律宜遵也

犀角　玄參　連翹　銀花

石菖蒲　先煎至六分後和入雪白金汁一杯臨服研入周少川牛黃丸一丸

江　溫邪發疹濕熱內蘊便閉不通先開上焦

杏仁　蘇子　梧蔞皮　紫苑　山梔

某　風溫發疹

薄荷　連翹　杏仁　牛蒡子

桔梗　桑皮　甘草　山梔

某　風溫發疹

薄荷　赤芍　連翹　牛蒡子

桔梗　桑皮　甘草　山梔

熱邪入胞絡

費　暴寒驟加伏熱更熾邪鬱則氣血壅遏痧疹不肯外達痰氣交阻神迷喘促漸入心胞絡中有內閉外脫之憂熱注下迫自利粘膩不爽法當開其結閉消毒解其膻中之壅必得神清方保無變

連翹心　飛滑石　石菖蒲　炒金銀花

射干　通草　煎化牛黃丸一丸

熱邪入肺

朱十二　痧後痰多咳嗽氣急

蘆根一兩　杏仁一錢半　桔梗一錢　飛滑石一錢半

桑皮八分　通草一錢

痧後陰

某　痧後伏火未清內熱身痛

外寒內熱

王竹　白沙參　地骨皮　川斛

麥冬　生甘草

某　痧後熱不止陰傷

生白芍　炙甘草　生扁豆　炒麥冬

川斛　穀芽

章　涼風外襲伏熱內蒸秋金主令內應乎肺喘咳身熱始而晝熱繼而暮熱自氣分漸及血分齦肉紫而肌膚發疹辛寒清散爲是

薄荷　連翹　石膏　淡竹葉

杏仁　桑皮　苡仁

吳　病在暴冷而發。肌表頭面不透。是外蘊爲寒。內伏爲熱。肺病主衛。衛氣分兩解爲是。

麻黃　石膏　牛蒡子　枳殼汁

杏仁　射干　桔梗　生甘草

尹　環口燥裂而痛。頭面身半以上發出癮疹赤紋。乃陽明血熱。久蘊成毒。瘦人偏熱。頗有是症。何謂醫人不識。

犀角地黃湯

江　溫邪自利。癮疹。

黃芩　連翹　牛蒡　桔梗　香豉

薄荷　杏仁　橘紅　通草

李二七發瘧熱腫獨兩正面每遇九十月大發五六月漸愈七八年來如是因思夏令陽氣宣越營衛流行無間秋冬氣凜外薄氣血凝滯此濕熱漫無發泄乃少陽木火之鬱及陽明蘊蒸之濕故上焦尤甚耳法以辛涼佐以苦寒俾陽分鬱熱得疎庶幾發作勢緩

夏枯草　鮮菊葉　苦丁茶　鮮荷葉邊

羚羊角　黑梔皮　鬱金　苡仁

唐四五麻木忽高腫發瘧必有風濕襲入皮膚乃軀殼病昔人每以宣行通劑

片薑黃　羚羊角　川桂枝　桑枝

牛夏　白芥子

某丸　風塊瘧瘧咳嗽腹痛邪着表裏當用雙和

牛蒡子　杏仁　連翹　桔梗

桑枝　象貝母　煎藥送通聖丸

癍者有觸目之色而無碍手之質即稠如錦紋稀如蚊跡之象也或佈於胸腹或見於四肢總以鮮紅起發者爲吉色紫成片者爲重色黑者爲凶色青者爲不治蓋有諸內而形諸外可決其臟腑之安危邪正之勝負也如傷寒瘟疫諸症失於宣解邪蘊於胃腑而走入營中每有是患耳考方書之治其法不一大

抵由失表而致者當求之汗失下而致者必取乎攻
伏甚清之毒甚化之營氣不足者助其虛而和之抵
之至於陰癍一說見象甚微若必指定些些之癍點
爲陰猶恐不能無誤想前人此例無非覺後人勿執
見癍爲實熱之義也吾故曰必參之脉象及兼證方
妥痧者疹之通稱有頭粒而如粟象癮者即疹之屬
腫而易痒須知出要周匀沒宜徐緩不外乎太陰陽
明之患故繆氏崙以肺胃論治爲精也若先生之法
本乎四氣隨其時令之勝復酌以辛凉辛勝及甘寒
苦寒鹹寒淡滲等法而治之凡吾幼科諸友於此尤

當究心焉。邵新甫

痰

注五八宿哮久矣不發心悸震動似乎懊憹之象此屬痰火治以宣通鬱遏勿徒呆補

半夏　川連　石菖蒲　蛤粉　枳實

茯苓　川鬱金　橘紅　竹瀝薑汁法丸

劉　痰火鬱遏氣滯吸烟上熱助壅是酒肉皆不相宜右稱痰因氣滯熱鬱治當清熱理氣爲先

川連　白术　枳實　厚朴

茯苓　半夏　蔻薑湯泛丸

沈三四　痰火久嗽　海蛤丸

張姬　痰火風眩暈防仆跌

明天麻　炒半夏　茯苓　橘紅

羚羊角　鉤藤　竹瀝

陳姬　老年痰火咳逆痰有穢氣

蘆根　苡仁　桃仁　絲瓜子

葶藶　大棗

又　下虛不納濁泛嘔逆痰穢氣

熟地炭　紫衣胡桃肉　炒杞子　炒牛膝

川斛　茯神

某　痰火上逆蒙竅耳鳴頭暈　二陳加天麻鈎藤甘菊羚羊蔞皮

某　夏至節兩關脈弦長五火燔燎而肝陽胃陽尤甚動怒抽掣爲肝病食辛香厚味即病至胃病使然痰火根深非頃刻可掃除惟靜養勿恚忿薄味以清裏此病發之勢必緩由漸加功議藥乃近理治法

羚羊角　犀角　川連　礬金　出梔

北秦皮　牛黃　胆星　橘紅　生石膏

寒水石　金箔　方諸水法丸竹葉燈心湯送

何嫗　診脈右關弦滑痰多舌乾微强語言似寡蓋因痰火

上蒙津液不得上承高年頗慮風痰宜清上宣通勿進剛燥及膩滯之藥

半夏　金石斛　橘紅　黑山梔　茯苓

薑汁　生甘草　石菖蒲　竹瀝　薑汁

張　昏昏如寐神憒如迷痰熱內閉勢非輕渺

半夏　石菖蒲　桔梗　枳實

薑汁　橘紅　竹瀝　薑汁

某　薑痰

半夏麴　薑汁　石菖蒲　明天麻

白茯苓　橘紅　茯苓　鉤藤

脈左弦堅攜痰多食不易運此鬱慮已甚肝侮脾胃

有年最宜開懷不致延及噎膈

半夏　薑汁　茯苓　杏仁

鬱金　橘紅

又　脈如前痰氣未降　前方去杏仁加白芥子

濕熱蒸痰

金四六　濕熱內蒸痰火日夥根本漸怯陽泄爲汗陰泄遺濁

酒客喜於爽口食物醫藥中滋膩補方決不適用也

豬肚丸方

葉　久寓南土水穀之濕蒸熱聚痰脈沉弦目黃厥末易

內瘡疾皆濕熱盛致氣隧不得流暢法當苦辛寒淸裏

通肌。倣前輩痰因熱起。清熱爲要。

生茅朮　黃柏　瓜蔞實　山梔　萊服子

川連　半夏　厚朴　橘紅　竹瀝薑汁丸

某　病後厚味蒸痰。

風化硝　瓜蔞仁霜　枳實　礞金

生茯苓　薑汁炒山梔　竹瀝法丸

汪　脈脈濕阻熱痰。

半夏　茯苓　黑山梔　橘紅

製蒺藜　遠志　降香

徐　陽動內風。用滋養肝腎陰藥。壯水和陽。亦屬近理。夏

本火犯中胃虛

季脾胃主司肝胆火風易於貫膈犯中中土受木火之侮陽明脈衰痰多經脈不利矣議清少陽鬱熱使中宮自安若畏虛滋膩土中愈實下焦愈虛二陳去甘草加金斛桑葉丹皮

又 脈左浮弦數痰多脘中不爽煩則火升眩暈靜坐神識安舒議少陽陽明同治

羚羊角 連翹 廣皮 炒半夏麴

黑山梔皮 香豉

又 脈兩手已和惟煩動恍惚欲暈議用靜藥益陰和陽

人參 熟地 天冬 金箔

肝腎虛上有痰火

注　痰火上盛。腎氣少攝。朝用通攝下焦。暮服清肅上焦。

方法。

羚羊角　半夏　茯苓　橘紅

黑梔皮　鬱金　苦丁茶煎湯法丸暮服

熟地　淡蓯蓉　杞子　五味　牛膝

茯苓　遠志　線膠　蜜丸早服

曹五色鮮明。屬上有痰飲。蓋上實則下虛。半百年歲。未得種玉。診得脈左小不靜。右部弦滑。法當清肺胃之熱痰。益腎肝之精血。倣曼倩衞生方法。

燕窩膠　甜梨膏　人參　黃芪　麥冬

山藥　茯苓　於朮　黃節　黑節

鹿尾膠　羊肉腎　淡蓯蓉　故紙胡桃蒸　青鹽

腎虛痰多

芮　向來痰多食少而參朮服餌未合此稟質爲陽不受溫熱剛燥之劑上年冬季溫煖入春痰愈多體中微倦由乎藏聚未固春氣自地升舉之徵法當攝腎固眞乃治痰之本方爲有益

熟地　茯苓　補骨脂　胡桃肉　杞子

五味　牛膝　遠志　車前　蜜丸

痰症之情狀變幻不一古人不究標本每著消痰之方立消痰之論者甚多後人遵其法而用之治之不

驗遂有稱痰爲怪病者矣不知痰乃病之標非病之本也善治者治其所以生痰之源則不消痰而痰自無矣余詳考之夫痰乃飲食所化有因外感六氣之邪則脾肺胃升降之機失度致飲食輸化不清而生者有因多食甘膩肥腥茶酒而生者有因本質脾胃陽虛濕濁凝滯而生者有因鬱則氣火不舒而蒸變者又有腎虛水泛爲痰者此亦因土衰不能制水則腎中陰濁上逆耳非腎中眞有痰水上泛也更有陰虛勞症龍雷之火上炎爍肺以致痰嗽者此痰乃津液所化必不濃厚若欲消之不惟無益而徒傷津液

其餘一切諸痰初起皆由濕而生雖有風火燥痰之名亦皆因氣而化非風火燥自能生痰也其主治之法惟痰與氣一時壅閉咽喉者不得不暫用豁痰降氣之劑以開之餘皆當治其本故古人有見痰休治痰之論此誠千古之明訓蓋痰本飲食濕濁所化人豈能禁絶飲食若前欲消之由於外邪者邪散則痰或可清如寒痰溫之熱痰清之濕痰燥之燥痰潤之風痰散之是也若治本原者必旋消旋生有至死而痰仍未清者矣此乃不知治本之故耳今觀案中治法有因鬱因火者必用開鬱清火爲君以消痰佐之

有因濕因熱者則用燥濕清熱暑佐化痰之品若因肝腎虛而生痰者則純乎鎮攝固補此眞知治痰之本者矣若因寒因濕者更當於痰飲門兼參而治之

華岫雲

外寒引動宿飲上逆

痰飲

某六一高年衛陽式微寒邪外侵引動飲邪上逆咳嗽形寒

仲景云治飲不治咳當以溫藥通和之

杏仁三錢　粗桂枝一錢　淡乾薑一錢半　茯苓三錢

苡仁三錢　炙草四分

周向有耳聾鳴响是水虧木火蒙竅冬陽不潛亦屬下元之虛但今咳聲喉下有痰音脇痛卧着氣衝乃衝陽升而痰飲泛脈浮當此驟冷恐有外寒引動內飲議開太陽以肅上

雲茯苓　粗桂枝　乾薑　五味同薑打

白芍　炙草　當午時服

某一新涼外束肺受寒冷氣鬱不降宿飲上干而病發矣法當暖護背心宿病可却

淡生薑粉　半夏　蛤蜊粉　茯苓

桂枝木　苡仁煎湯

飲上逆肺氣不降

某五十背寒咳逆此屬飲象先當辛通飲邪以降肺氣

鮮枇杷葉　杏仁　茯苓　橘紅

生薑　半夏

某五十脈右大弦氣喘咳唾濁沫不能着枕喜飲湯水遇寒

病發此屬飲邪留於肺衛如見咳投以清潤愈投愈剩矣。葶藶子　山東大棗

徐氏痰飲上吐。喘不得卧。乃溫邪阻蔽肺氣。氣不下降。壅滯不能着右。議用宣通開氣分方法。

小青龍去細辛麻黃加茯仁白糖炒石膏

沈姍冬溫。陽不潛伏。伏飲上泛。仲景云脈沉屬飲。而色鮮明爲飲。飲家咳甚。當治其飲。不當治咳。緣高年下焦根蒂已虛。因溫煖氣泄。不主收藏。飲邪上擾乘肺。肺氣不降。一身之氣交阻。薰灼不休。絡血上溢。經云。不得卧。卧則喘甚。痺塞。乃肺氣之逆亂也。若以見病圖病。昧於色

診脉氣必致由咳變幻腹脹漲滿漸不可挽明眼醫者勿得忽爲泛泛可也茲就管見畧述大意議開太陽以使飲濁下趨仍無變於冬溫從仲景小青龍越婢合法

杏仁　茯苓　苡仁　炒半夏

桂枝木　石膏　白芍　炙草

方氏冷暖失和飲泛氣逆爲浮腫喘咳腹脹卧則衝嗆議用越婢方

石膏　杏仁　桂枝　炒半夏

茯苓　炙草

施四七勞煩太甚胃陽受傷外衛單薄怯寒畏冷食物少運

痰飲內起。氣阻濁凝。胸背皆痛。辛甘理陽已效。當此長夏。脾胃主令。崇其生氣。體正病可全好。

六君子加益智木香

黃三四 身居沿海。氛障霧露。客邪侵入清陽。陽傷畏寒。久嗽。病人不知邪病。護身。猶然用力承辦。裏結飲邪。沉痼不邪病 茯苓桂枝湯

胡四六 脈沉而微。微則陽氣不足。沉乃寒水陰凝。心痛怔忡。漸及兩脇下墜。由陽衰不主運行。痰飲聚氣欲阻。致痛之來。其心震之謂。亦如波撼岳陽之義。議用外臺茯苓飲合桂苓方

人參　茯苓　半夏　枳實

桂枝　薑汁

白二六脈沉小弦。爲陰濁飲邪。稟質陽不充旺。胸中清氣不得舒展曠達。偶觸入寒冷。或喫進寒物。飲邪暴冷。凝結胸痞。當平日食物。忌用酒肉腥濁。便清陽流行。常服仲景苓桂术甘湯百劑。若病來因冷。即服大順散。

戴　病去。神已爽慧。但本脈帶弦。平素有飲。爲陽氣不足之體。年紀漸多。防有風痺。此酒肉宜少用。勞怒當深戒矣。議外臺茯苓飲方。

人參　茯苓　廣皮　枳實

半夏　金石斛

宋四九煩勞大過陽傷痰飲日聚陽蹻脈空寤不成寐衛陽失護毛髮自墜乃日就其衰奪矣初進通飲濁以甦陽援服外臺茯苓飲

吳氏脈弦背中冷左偏微痛食少欲嘔四肢羸弱此飲邪內結議通陽氣

桂枝　茯苓　半夏　薑汁

炙草　大棗

某　眩暈惡心胸脘不爽脈右弦左弱面色紅亮此乃痰飲上泛有厥中之事

炒半夏　製茯苓　橘紅　煨天麻

石菖蒲　茯苓　薑汁

尤　口中味淡是胃陽虛。夫濁陰下降痛緩。向有飲濕爲患。若不急進溫通理陽。濁陰必致復聚。議大半夏湯法。

人參　半夏　茯苓　枳實　薑汁

脾陽不運

張二七　酒客穀少中虛。常進疎散表藥。外衛之陽亦傷。其痰飲發時。胸中痞塞。自述或飢遇冷病來。其爲陽氣受病何疑。不必見痰搜逐。但護中焦脾胃。使陽氣健運不息。陰濁痰涎焉有竊踞之理。

生於朮　川桂枝　茯苓　淡薑渣

苡仁　澤瀉　薑桂湯法丸

王三二脈沉爲痰飲是陽氣不足濁陰欲蔽當以理脾爲先俾中陽默運即仲景外飲治脾之意

苓桂朮甘加半夏陳皮水法丸

某三四舌白咳逆不渴非飲象而何宜宣溫藥和之

杏仁　苡仁　半夏　乾薑

粗桂枝　茯苓　厚朴　炙草

某　食後脘中痞阻按之漉漉有聲手麻脇痛心煩耳目昏眩是氣不流行痰飲內聚中焦用桂苓丸竹瀝薑汁法丸

又 桂枝 人參 茯苓 半夏

廣皮 炙草

黃 味過甘膩。中氣緩不主運。延綿百天。聚氣結飲。東垣云。病久髮不焦。毛不落。不食不飢。乃痰飲爲患。飲屬陰類。故不渴飲。仲景五飲互異。其要言不繁。當以溫藥和之。通陽方法。固無容疑惑。大意外飲宜治脾。內飲治腎。是規矩準繩矣。議用苓桂朮甘湯。

某 形體似乎壯實。陽氣外泄。畏風怯冷。脾陽消乏。不司健運。水穀悍氣。蒸變痰飲。隧道日壅。上實下虛。仲景謂飲邪當以溫藥和之。苓桂朮甘得效。從外飲立方。

脾腎陽虛

人參　淡附子　生於术　枳實

茯苓　澤瀉　荆瀝薑汁法丸

某老人久嗽妨食。議以外飲治脾。　苓桂术甘湯

王三四脉沉。背寒。心悸如墜。形盛氣衰。漸有痰飲內聚。當溫通補陽方復辟。斯飲濁自解。

人參　淡附子　乾薑　茯苓

生於术　生白芍

馮陽虛則形寒汗出。痰飲痞聚。都是陰濁成形。乘陽氣衰微。致上干竊踞。古人法則。必通其陽以掃陰氛。但宿病無急攻方。況平素憂營。氣滯血滯。久耗之體。未敢純

剛。防劫液耳。

人參　熟附子　淡乾薑　炒川椒　川桂枝

烏梅肉　生白芍　另眞武丸三兩

程四八　左脈沉靜。右脈微弦。四旬清陽日薄。脾臟鼓運漸遲。加以煩心縈思。水穀悍氣蘊蒸痰飲。仲景謂外飲當治脾陽。況中年常有遺泄之患。按脈非龍相之動搏。議固下益腎。轉旋運脾二方。分早晚服。早服從還少聚精七寶參用丸方

熟地　蓯蓉　枸杞　五味　萸肉　茯神

山藥　菟絲　覆盆　魚膠　菖蒲　遠志

龍骨　青鹽　熟蜜同棗肉搗丸早服五七錢

茅术　於术　半夏　茯苓　廣皮　生益智

白蒺　鈎藤　薑棗湯泛丸晚服三錢開水下

徐　清陽未展濁陰欲踞久延必結痰飲議用真武丸二錢五分人參一錢煎湯送胃陽得震濁當退避矣十服

某　脉沉弦飲泛嗆咳乃下虛無以制上議早服腎氣丸攝納下焦散失以治水泛之飲午服外臺茯苓飲轉旋中焦使食不致釀痰茯苓飲去术

胃陽虛飲逆咳嘔

某七一高年久嗽脉象弦大寤不成寐乃陽氣微漓濁飲上泛仲景云進溫藥和之

杏仁三錢　茯苓二錢　川桂枝一錢　生薑一錢

苡仁三錢　炙草四分　大棗二枚

顧二四咳嗽數月。嘔出涎沫。建中不應。已非營衛損傷。觀其面色鮮明。飲食仍進。倣飲邪上治

小半夏湯加桂枝杏仁薑汁

李八三勞傷陽氣內起痰飲。卧着氣鈍飲阻。其痰爲多。痰出稍通勢緩。且體常汗泄。并風寒表邪不解。並不熱渴。亦并火炎爍金。衛景云。飲家而痰。當治飲。不當治痰

茯苓　桂枝木　苡仁　炙草　薑汁

陳　脉濇小。舌白不渴。身動嘔痰。身如在舟車中。此寒熱

攻胃致傷逆氣痰飲互結通補陽明爲正白术甘草守中未能去濕宜緩商

人參汁　牛夏　枳實汁　茯苓

竹瀝　薑汁

馬三西　凱肉豐溢脉來沉緩始發右季脇痛湯飲下咽沼沼有聲吐痰涎頭痛此皆脾胃陽微寒濕滯聚年方壯盛不必介懷溫中佐其條達運通爲宜

茅术　厚朴　牛夏　茯苓　陳皮

淡薑渣　胡蘆巴　炙草　薑汁泛丸

馬四十　甘緩頗安辛泄不受此陽分氣衰將來飲邪日聚然

臥着痰多清氣失旋先用苓桂术甘湯繼進外臺茯苓飲

曹四七 中年陽氣日薄痰飲皆屬陰濁上干清道爲衝逆咳嗽仲景治法外飲治脾內飲治腎分晰甚明昔年曾用桂苓澤术得效是治支飲治法數年眞氣更衰古人謂飲邪當以溫藥和之須忌治嗽肺藥

先用小青龍去麻辛　接服外臺茯苓飲

程五七 昔肥今瘦爲飲仲景云脈沉而弦是爲飲家男子向老下元先虧氣不收攝則痰飲上泛飲與氣湧斯爲痰矣今醫見嗽輒以清肺降氣消痰久而不效更與滋陰

脾腎陽虛飲逆咳嘔

不明痰飲皆屬濁陰之化滋則堆砌助濁滯氣試述着
桃茨嗜一端知身體卧着上氣不下必下衝上逆其痰
飲伏於至陰之界腎臟絡病無疑形寒畏風陽氣微弱
而籌籬疎撤仲景有要言不煩曰飲邪必用溫藥和之
更分外飲治脾內飲治腎不讀聖經焉知此理

桂苓甘味湯　熟附都氣加胡桃

陳痛久氣亂陽微水穀不運蘊釀聚濕胃中之陽日薄
痰飲水濕必傾囊上湧而新進水穀之氣與宿邪再聚
復出致永無痊期仲景云飲邪當以溫藥和之又云不
渴者此爲飲邪未去故也則知理陽通陽蔵有合於聖

訓斷斷然矣　眞武湯

張四一痰飲喘咳肌肉麻痺痞脹不堪納穀冬寒日甚春暖日減全是陽氣已衰陰濁逆干犯上肺藥治嗽無非辛泄滋潤蓋辛散則耗陽滋潤助陰濁濁阻在陽分氣不肅爲夜不得卧小青龍意主乎由上以泄水寒直從太陽之裏以通膀胱表中裏藥也仲景謂飲邪當以溫藥和之驅陰邪以復陽一定成法　早腎氣去更換白芍

炒茱炭水法丸　脫外臺茯苓飲薑棗湯法丸

程六腎虛不納氣五液變痰上泛冬藏失職此病爲甚不可以肺咳消痰常用八味丸收納陰中之陽暫時撤飲

用仲景桂苓味甘湯

孫未交冬至一陽來復老人下虛不主固納飲從下泛氣阻升降而爲喘嗽發散寒涼苦瀉諸藥焉得中病仲景云飲家而咳當治飲不當治咳後賢每每以老人喘嗽從脾腎溫養定論是恪遵聖訓也

桂枝　茯苓　五味子　甘草湯代水加淡薑棗

李　賜紅久病不必攻治今者氣衝喘嗽脘脇痞阻是飲濁上僭最宜究悉

川桂枝七分　茯苓三錢　乾薑一錢　五味子同薑合搗一錢

杏仁一錢半　白芍一錢　炙草五分　生左牡蠣三錢

腎陽虛飲逆喘咳嘔

吳二七壯年下元久虛收納氣泄每交秋冬受冷冷氣深入伏飲夾氣上衝爲咳喘嘔吐疎肺降氣不效者病在腎絡中也蓋精血少壯不旺難以摟逐病根不去謂此絕慾一年小暑艾灸靜養一百二十天可愈附都氣加車前

潘二九勞力喘甚肩背惡寒飲泛上逆皆係下元虛損莫以喘用瀉肺等藥 薛氏八味丸

王 秋深天氣收肅背寒喘咳飲濁上泛緣體中陽氣少振不耐風露所致最宜煖護背部進通陽以治飲

茯苓 桂枝 牛夏 薑汁

故仁　炙草

又　早腎氣丸　夜眞武丸

陳　脈虛微。春陽地升。濁陰上干。喘不得卧。治在少陰。

人參　淡熟附子　猪胆汁

又　照前方加淡乾薑一錢半

又　脈弦。暮夜濁陰衝逆。通陽得效。議眞武法。以撤其飲。

人參　淡附子　生白芍　茯苓　薑汁

又　眞武滋濁脫。通思食能寐。昨宵已有渴欲飲水之狀。

考金匱云渴者。飲邪欲去也。當健補中陽。以資納穀

人參　生於术　淡附子　茯苓　澤瀉

又 早服腎氣丸四五錢晚用大半夏湯

人參　半夏　茯苓　薑汁

薑　脈弦右滿陽微惡寒飲濁上干咳吐涎沫且食減胃衰寒痼竊疑陰濁見症豈止一端聞嘉言謂濁陰上加於天非離照當空氛霧焉得退避反以乾黃五味陰藥附和其陰陰霾中逆肆虐飲邪滔天莫制議以仲景熟附配生薑法掃羣陰以驅飲邪維陽氣以立基本況尊年尤宜急護眞陽爲主

人參　茯苓　熟附子　生薑汁　南棗

戴　十二月間診得陽微濁飲上干爲咳不能卧曾用小

青龍湯減去麻黃細辛服後已得着枕而卧想更醫援用不明治飲方法交驚蟄陽氣發泄病勢再熾頃診脈來濡弱無神痰飲咳逆未已諒非前法可效宗仲景眞武湯法以熟附配生薑通陽逐飲立法

眞武湯去白朮加人參

腎陽虛膀胱氣化不通降

計

不卧喘嗆泛起白沫都是腎病議通太陽膀胱

茯苓　川桂枝　淡乾薑　五味子

白芍　炙草

頭

歡邪泛溢喘嗽督損頭暈身動喘甚食則脘中痞悶卧則喘咳不得息肺主出氣腎主納氣二臟失司出納

失職議用早進腎氣丸三錢以納少陰晚用小青龍法滌飲以通太陽經腑此皆聖人內飲治法與亂投賦補有間矣　小青龍去麻辛甘芍加茯苓杏仁大棗

某　形盛面亮脈沉弦此屬痰飲內聚暮夜屬陰喘不得卧仲景謂飲家而咳當治其飲不當治咳今胸滿腹脹小水不利當開太陽以導飲逆小青龍去麻辛合越婢桂枝　半夏　乾薑　五味　杏仁　石膏　茯苓　白芍

某　服三拗湯音出喘緩可見苦寒沉降之謬素多嘔逆下血中焦必虛而痰飲留伏顯然議治其飲

桂枝湯去甘草加杏仁茯苓改石糖炒石膏

某　太陽經氣不闢小水不利下肢腫浮漸上着枕氣塞欲坐濁飲上干竟有坐卧不安之象醫者但以肺病刻治於理未合急用小青龍法使膀胱之氣無阻礙濁飲痰氣自無逆冲之患矣

桂枝　杏仁　乾薑　五味

半夏　茯苓

章　伏飲陰濁上干因春地氣主升而發嘔吐不飢自然脾胃受傷六君子宜補方法未嘗不妙今診得吸氣甚微小溲晨通晝癃足踹浮腫其脏中之氣虛闔失司最

慮中滿共太陽司開陽明司闔濁陰瀰漫遍膈即是邪

陽傲仲景開太陽一法

牡蠣　澤瀉　防己　茯苓

五味　乾薑

張氏二嗆喘咳坐不得卧神迷如呆氣喘則清水寒飲邪上

沖膻中用逐飲開濁法

薑汁炒南星　薑汁炙白附子　茯苓

桂枝　炙草　石菖蒲

某三四咳綫痰少脘中不爽肌膚瘙癢皆濕邪未盡痰飲竊踞之象當用六安法

邪上沖膻中

痰飲

肺胃濕痰

杏仁　白芥子　炒半夏　茯苓

淡乾薑　橘紅

中虛濕熱

王　當年陽虛濁飲上泛喘急用真武湯丸而效因平素嗜酒少穀中虛濕聚熱蘊蒸痰目黃齦血未可爲實熱論治議方用外臺茯苓飲減甘草佐以微苦滑滲理其濕熱以酒客忌甜故也

中焦痰熱

茯苓四兩　人參二兩　芡仁四兩　枳實一兩

半夏二兩　廣皮二兩　金石斛八兩煮汁爲丸

汪　面色鮮明胸中漾漾欲嘔因鬱勃熱氣蒸爲痰飲宜暫緩參朮務清中焦熱痰

杏仁　枳實汁　橘紅　瓜蔞皮

鬱金　半夏麴　桔梗　黑梔皮

痰飲挾燥

張氏痰飲挾燥咳喉中癢

杏仁　花粉　茯苓　象貝母

橘紅　半夏麴

氣火不降

陳嫗痰飲挾氣火上踞脘痞脹不爽宜理氣熱

半夏　茯苓　瓜蔞皮　黑梔皮

橘紅　鬱金

某　脈弦右濇面亮舌白口乾不喜飲頭重岑岑然胸脘痺塞而痛得噯氣稍舒酒客穀少中虛痰飲聚蓄當此

夏令地氣上升飲邪挾氣上凾清空遂令前症之來金匱云脈弦爲飲色鮮明者爲留飲日乾不欲飲水者此爲飲邪未失故也況漐漐汗出豈是風寒春夏溫邪辛溫發散爲大禁自云身體空飄年已六旬又四辛散再泄其陽不亦左乎

半夏　薑汁　川連　吳萸

茯苓　枳實　竹瀝

潘三八遠客路途風寒外受熱氣內蒸痰飲日聚於臟之外絡脈之中凡遇風冷或曝烈日或勞碌形體心事不寧擾動絡中宿飲飲泛氣逆咳嗽氣塞喉底胸膈不思食

學當伏飲

物着袍唅吐稠痰氣降自愈病名哮喘伏飲治之得宜除根不速到老年歲仍受其累耳 小青龍湯去細辛

飲伏經絡

童五六 背寒短氣背痛映心貫膂入腰食嚬噫氣脘痞瀉出黃沫飲邪伏濕乃陽傷竊發此溫經通絡爲要緩用人參 川桂枝 生白术 炒黑濁漆 炮黑川烏 厚朴 茯苓

服次清陽少旋支脈結飲

葉四十 脈右弦舌黃不渴當心似阻昔形壯今漸瘦咳久不已卧着則咳痰出稍安此清陽少旋支脈結飲議通上焦之陽

鮮薤白　瓜蔞皮　牛夏　茯苓

川桂枝　薑汁

楊　頭中冷痛。食入不消。筋脈中常以掣痛。此皆陽微不主流行。痰飲日多。氣隧日結。致四末時冷。先以微通胸中之陽。

乾薤白　桂枝　牛夏　茯苓

瓜蔞皮　薑汁

又　微通其陽已效。痰飲阻氣。用茯苓飲去廣皮加薑汁

程三支脈聚飲。寒月喘甚。初因寒濕而得。故食辛稍安。

杏仁　牛夏　厚朴　苡仁

支脈結飲

茯苓　薑汁法丸

趙　支飲脇痛咳逆　小青龍去麻辛

汪氏　支脈結飲胠氣喘脹入脇則痛厥逆爲眩

茯苓　桂枝　半夏　杏仁

礬金　糖炒石膏

黃　支脈結飲發必喘急病發用

桂枝　茯苓　五味　炙草

馮　懸飲流入胃中令人酸痛湧噫酸水當辛通其陽以

驅飲

桂枝木　半夏　茯苓　炒黑川椒　薑汁

又　照前方加淡附子

施　診脈右虛左小弦面色黃少華采左脇肋痛五六年未愈凡久恙必入絡絡主血藥不宜剛病屬內傷勿事賦補錄仲景旋覆花湯加栢子仁歸鬚桃仁

又　初服旋覆花湯未應另更醫謂是營虛用參歸熟地桂芍炙草服後大痛醫又轉方用金鈴半夏桃仁延胡茯苓服之大吐大痛復延余治余再議方謂肝絡久病懸飲流入胃絡致痛不已議太陽陽明開闔方法

人參　茯苓　炙草　桂枝

煨薑　南棗

服苦藥痛嘔可知胃虛以參苓闢陽明用草桂開太陽并芎香入絡用薑棗通營衛生薑恐伐肝故取煨以護元氣而微開飲氣也

又

前方服之痛止議丸方

人參　牛膝　川芎　茯苓

桂枝　煨薑　棗湯丸

某　夏季陽氣大升痰多嗆咳甚至夜不得卧穀味皆變大便或溏或秘診脈右大而弦議以懸飲流入胃絡用開闔導飲法

人參　茯苓　桂枝　炙草

煨薑　南棗

又　早診脈兩手皆弦右偏大凡痰氣上湧咳逆愈甚日來小便少下焦微腫議通太陽以徹飲邪

人參　茯苓　桂枝　炙草

五味　乾薑

又　脈弦晷數不渴不思飲此飲濁未去清陽不主運行前方甘溫主平開闔能令胃喜次法開太陽以徹飲邪亦主陽通據自述心下胃口若物阻呆滯其濁鍾陽微大著其治咳滋陰適為陰濁橫戀矣議用大半夏湯法

大半夏湯加炒黑川椒

內經止有積飲之說本無痰飲之名兩漢以前諸之
淡飲仲景始分痰飲因有痰飲懸飲溢飲支飲之義
而立大小青龍半夏苓桂朮甘腎氣等湯以及內飲
外飲諸法可謂闡發前賢獨超千古與後人所立風
痰濕痰熱痰酒痰食痰之法迥異濕之痰飲之作必
由元氣虧乏及陰盛陽衰而起以致津液凝滯不能
輸布留於胸中水之清者悉變爲濁水積陰則爲飲
飲凝陽則爲痰若果眞元充足胃强脾健則飲食不
失其度運行不停其機何痰飲之有故仲景云病痰
飲者當以溫藥和之乃後人不知痰飲之義妄用滾

痰丸茯苓丸消痰破氣或與賦補等法大傷脾胃堆砌助濁其於仲景痰飲之法豈不大相乖謬乎然痰與飲雖爲同類而實有陰陽之別陽盛陰虛則水氣凝而爲痰陰盛陽虛則水氣溢而爲飲故王晉三先生取仲景之小半夏茯苓及外臺飲三湯從脾胃二經分痰飲立治法而先生又取仲景之苓桂朮甘外臺茯苓飲腎氣丸真武湯分內飲外飲治法而於痰飲之症無遺蘊矣愚歷考先生治痰飲之法則又有不止於此者然而病變有不同治法亦有異如脾腎陽虛膀胱氣化不通者取仲景之苓桂朮甘湯茯

苓飲。腎氣丸等法。以理陽通陽。及固下益腎轉旋運脾爲主。如外寒引動宿飲上逆。及膀胱氣化不通。飲逆肺氣不降者。以小青龍。合越婢等法。開太陽膀胱爲主。如飲邪伏於經絡。及中虛溼熱成痰者。則有川烏蜀漆之溫經通絡。外臺茯苓飲去甘草。少佐苦辛淸滲理濕之法。其飲邪上冲膻中。及懸飲流入胃中而爲病者。又有薑附南星菖蒲旋覆川椒等驅飲開濁。辛通陽氣等法。絲絲入箴。一以貫之。病情治法胸有成竹矣。非深於得道者。其孰能之。