

卷六十一 婦人古方

景岳全書

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄

上

二卷

金言卷一  
傳忠錄

中

道集

三卷

傳忠錄

下

四卷

脈神章

上

有目二張

五卷

脈神章

中

六卷

脈神章

下

須集

七卷

傷寒典

上

有目二張

八卷

傷寒典

下

從集

九卷

雜證謨

全書卷一

總目

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

痙證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘧氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

玄運

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

恶心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

鵶雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲瘡

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

腳氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴斂

瘡閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒

附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規上 有目四張

三十九卷

婦人規下

謨集

四十卷

小兒則上有目二張

四十一卷

小兒則下

四十二卷

痘疹証

麻疹全有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上 有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈐上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈐下

大集

四十八卷

本草正上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共六十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宦集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

因陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄

上

二卷

金言卷一  
傳忠錄

中

道集

三卷

傳忠錄

下

四卷

脈神章

上

有目二張

五卷

脈神章

中

六卷

脈神章

下

須集

七卷

傷寒典

上

有目二張

八卷

傷寒典

下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

痙證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘡氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

玄運

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

恶心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲瘡

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲 濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

腳氣 瘰證

陽瘡

三十三卷

雜證謨

疝氣 脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴斂

瘡閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒

附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則上 有目二張

四十一卷

小兒則下

四十二卷

痘疹証

麻疹全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上 有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈐上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈐下

大集

四十八卷

本草正上 有目六張

四十九卷

本草正

下

德集

五十卷

新方八略

有目七張

五十一卷

新方八陣

全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共六十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷 古方攻陣

五十六卷 散陣

五十七卷 寒陣

宦集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

因陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書卷之六十一 婦人規古方

長集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

婦人

安胎飲一 治妊娠五七個月用數服可保全產

人參

白朮

當歸

熟地

川芎

白芍藥

陳皮

甘草

炙

紫蘿

炙黃芩

各一錢

古用薑水煎服○一方有砂仁

安胎散

治妊娠卒然腰痛下血

熟地

艾葉

白芍

川芎

黃芪

炒

阿膠

炒

當歸

甘草

炙

地榆

各一錢

右加薑棗水煎服

泰山盤石散

三

治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱

或脾肝素虛倦怠少食屢有墮胎之患此方平和兼養脾胃

氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺胃弱者多用砂仁少加

黃芩更宜戒慾事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮○徐東臯曰婦人凡懷胎二三個月慣要墮落名曰小產此由體弱氣血兩虛藏府火多血分受熱以致然也醫家又謂安胎多用艾附砂仁熟補尤增禍患而速其墮矣殊不知血氣清和無火煎燥則胎自安而固氣虛則提不住血熱則溢妄行欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快脾氣多用亦耗真氣况香燥之性氣血兩傷求以安胎適又損胎而反墮也今惟太山磐石散千金保孕丸一方能奪化工之妙百發百效萬無一失甫故表而出之以爲好生君子

其知也

人參

黃芪

當歸

川續斷

黃芩

各一錢  
川芎

白芍藥

熟地  
各八分  
糯米一撮

白朮

二錢

炙甘草

砂仁  
各五分

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月之後方無慮也

地黃當歸湯 一名內補丸○治妊娠衝任脈虛補血安胎

熟地 二兩  
當歸 一兩

右每服五錢水煎服○爲丸法以當歸炒爲末熟地蒸搗膏

和丸桐子大每服百餘丸溫酒或滾湯下○許學士曰大率  
妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥最惡陰陽雜亂致生他病惟  
枳殼湯所以抑陽四物湯所以助陰耳然枳殼湯其味多寒  
若單服恐致胎寒腹痛更以內補丸佐之則陽不致強陰不  
致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

良方

當歸湯

五

治胎動煩燥或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸

人參各二三錢

阿膠炒

甘草

炒各一錢

連根葱白

一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱再煎一碗分二服

良方 阿膠散六

或頓仆或因毒藥胎動不安或腹痛腹痛上捨

短氣

阿膠

艾葉

當歸

熟地

川芎

白芍

黃芪

炙甘草

等分

右每服四錢薑棗水煎

良方 膠艾湯七

治妊娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上捨或

去血腹痛○又金匱膠艾湯在後九十三

阿膠

炒一兩

艾葉

數莖

右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散

入

治胎動腹痛

阿膠

炒

白茯苓

白术

炒

川芎

當歸

陳皮

各一錢

甘草

炒三分

右薑棗水煎服

良  
黃芪湯

九

治氣虛胎動腹痛下水

糯米

一合

黃芪

炒

川芎

各一兩

右水煎分三服

良  
鈎藤湯

十

治妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

方

鈎藤鈎

當歸

茯神

桑寄生

人參各一錢 苦梗一錢半

右水煎服○如有煩熱加石膏

良方白朮散十一 治妊娠傷寒內熱等證

白朮

黃芩

炒各二錢

右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

良方三味白朮湯十二 治妊娠內熱心痛

白朮

四錢

赤芍藥

三錢

黃芩

炒二錢

右水煎服○忌桃李雀肉

良方四味白朮湯十三 治妊娠胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿

治妊娠胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿

粥不入

白朮炒一錢 人參五分 甘草炒

丁香各二分

右薑水煎服

全生白朮散

十四

治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰胎

腫

白朮

一兩

生薑皮

大腹皮

陳皮

白茯苓

各半兩

右爲末每服二錢米飲下○如未應佐以人參甘草

探胎飲

十五

婦人經水不來三月疑似用此驗之

川芎 不拘多少爲末不見火

空心煎艾湯調下方寸七覺腹中動則有胎也臍之下動者乃血瘕也不動者血凝也病也

當歸芍藥湯 十六

治妊娠心腹急痛或去血過多而眩運

當歸

白芍藥

炒

白朮

炒

茯苓

澤瀉

各一錢

川芎

二錢

右水煎服

益母地黃湯

十七

治妊娠跌墜腹痛下血

生地

益母草

各二錢

當歸

黃芪

炒各一錢

方薑水煎服

良方獨聖散

十八

治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效

砂仁

不拘多少帶皮同炒  
刀令焦黑取仁爲末

右用熟酒調服四五分或一錢○此物有安胎導滯易產之

功實妊娠之要藥也

良方

安胎寄生湯

十九

治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生

白朮

茯苓

各五分

甘草一錢

右水煎服

二黃散

二十

治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩躁

作渴或脇肋脹痛等證

生地 熟地

右爲末每服三錢煎白朮枳殼湯下

四聖散

治漏胎下血

條芩

白朮

砂仁

阿膠各等分

右爲細末每服二錢艾湯調下○一方有芍藥無阿膠○按

此方若改爲湯砂仁用當減半

良續斷湯

治妊娠下血尿血

當歸

生地黃

各一兩

續斷

赤芍藥

各半兩

右爲末每服一錢空心用葱白煎湯調下

枳殼湯二三

治胎漏下血或因事下血亦進食和中并治惡

阻

枳殼

炒

黃芩

炙各半兩

白朮

炒一兩

右爲末每服一錢白湯調下○前四證若因脾胃虛弱宜用補中益氣湯加五味○若因脾胃虛陷宜用前湯倍加升麻柴胡○若因肺熱內熱宜用逍遙散

滑胎枳殼散一兩

此方能令胎瘦產易○湖陽公主每產空

日不下南山道人進此方

粉草炒一兩

商州枳殼炒一兩

麸炒一兩

右爲末每服一錢空心沸湯調日二服凡孕大七月宜服之

○溫隱居方加當歸廣木香各等分○或加香附一兩亦可

枳殼散二五

方在寒陣百一

治婦人血熱氣滯經候不調

金鯉魚湯二六

治妊娠腹脹胎中有水氣遍身浮腫小便不利或胎死腹中皆效

當歸五分

芍藥各一錢白朮一錢茯苓一錢半

櫛紅五分 鯉魚一尾不拘大小

右作一服將鯉魚去鱗臍白水煮熟去魚用汁鍾半入藥加  
生薑五片煎一鍾空心服當見胎水下如水未盡胎死腹山  
脹悶未除再制一服水盡脹消乃已

竹葉湯

二七

治妊娠心驚膽怯煩悶不安名曰子煩○一方

有當歸防風梔子仁

白茯苓

麥門冬

黃芩各三兩

右每服四錢竹葉五片水煎服○若因血虛煩熱宜兼用四  
物○若因中氣虛弱宜兼用四君

紫蘿飲

治妊娠失調胎氣不安上病作痛名曰子懸

臨產氣結不下等證

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

蘿葉

當歸

各一兩

人參

甘草

各半兩

右每服一兩薑葱水煎服○一方有香附無人參○若肝脾氣血虛而有火不安宜兼逍遙散○若脾氣虛弱而不安宜用四君芎歸

安榮散二九

治妊娠小便澁少遂成淋瀝名曰子淋甚妙

麥門冬

通草

渭石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛

等分

右水煎服○一方人參細辛加倍爲末每服一錢麥冬湯調  
服○若因肺經鬱熱宜用黃芩清肺飲○若因膏粱厚味宜  
用清胃散○若因肝經濕熱宜用加味逍遙散

天仙藤散三十

治妊娠三月之後足指發腫漸至腿膝飲食

不甘狀似水氣或脚指間出黃水名曰子氣

天仙藤

洗畧炒

香附

炒

陳皮

甘草

烏藥

等分

右每服三五錢加生薑木瓜各三片紫蘿二葉水煎食前口

進三服○若因脾胃虛弱宜兼六君子○中氣下陷須用補

中益氣湯

羚羊角散三一

治妊娠虛風頸項強直筋脈掣急語言蹇澁

痰涎不利不省人事名曰子癇

羚羊角

鋟

川獨活

棗仁

五加皮

薏苡仁

炒

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

去皮尖  
各五分

炙甘草

木香

各一分

右加薑五片水煎服○若因肝經風熱或怒火所致湏用加

味道遙散

人參橘皮湯三二

治妊娠脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水飲

食少進益胃和中○一名參橘散

人參

陳皮

麥門冬

白朮各一錢

厚朴

制

白茯苓

各五分

炙甘草三分

右加淡竹茹一塊薑水煎溫服○若因中脘停痰宜用二陳枳殼○若因飲食停滯宜用六君加枳殼○若因脾胃虛宜用異功散

竹茹湯三三

治孕婦嘔吐不止惡心少食服此止嘔清痰

竹茹

彈子大

陳皮

半夏

茯苓

各錢半

生薑

一錢

水鍾半粳米一撮煎七分溫服忌羊肉雞魚麵食

方 裏 半夏茯苓湯

三四

治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏 泡炒黃 陳皮

砂仁

炒各一錢

白茯苓

二錢

甘草 炒五分

右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用茯苓丸在三九

烏附湯

三五 治孕婦惡心阻食養胃調和元氣

烏藥

香附

制

白朮 土炒

陳皮 各一錢

人參

炙甘草

各八分

冰鍾半薑三片煎七分服○吐甚者加丁香砂仁各七粒

千金保孕丸

治妊娠腰背痛善於小產服此可免墮胎

之患○此卽良方杜仲丸但彼等分用

杜仲

四兩同糯米炒去絲川續斷二兩酒洗

右爲末山藥糊丸桐子大每服八丸空心米飲下忌酒

醋惱怒

毋丸三七

一名知毋丸○治妊娠血熱頓仆胎動不安或

欲臺產

知毋

炒爲末

右鴉棗肉爲丸彈子大每服一丸人參湯嚼送或丸桐子大

每服三四十丸白湯下或嚼鹽之

東胎丸三人懷胎七八個月恐胎氣大難產用此扶母氣  
東兒胎易產然必胎氣強盛者乃可服

條黃芩酒炒勿太熟冬月一兩夏月半兩白朮三兩陳皮二兩

白茯苓七錢半

右爲末粥糊丸桐子大每服五十丸白湯下

茯苓丸三九治妊娠煩悶頭暉食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓

人參

桂心

乾薑

炮

半夏

泡洗炒

橘紅

各一兩

白朮

炒

甘草

炒

枳殼  
麸炒各二兩

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸米飲下日三服○右原方  
仍有葛根一兩似非所宜也用者當酌之

達生散

四十

妊娠臨月服十餘劑則易產或加砂仁枳殼如

兼別證以意增減○詩云誕彌厥月先生如達註曰先生首  
生也達小羊也羊子易生故以此名之

人參

白朮

當歸

白芍

陳皮

紫蘿

各一錢

炙甘草

二錢

大腹皮

酒洗晒乾三錢

水一鍾半煎服○一方無當歸白芍白朮

佛手散

四一

煩惱不省并一切胎氣不安亦下死胎

川芎二錢

當歸三五錢

右咀每用半兩水煎服○若腹疼加桂○若腹痛自汗頭眩  
少氣加羊肉若不應用八珍湯○若崩下胎當爲末以酒調  
服

錢氏生化湯

四二

此錢氏世傳治婦人者

當歸五錢

川芎二錢

甘草

炙五分

焦薑三分

桃仁十粒去皮尖雙仁

熟地三錢

右咬咀水一鍾棗一枚煎八分溫服○一方無熟地 附加

減法○凡胎衣不下或血冷氣閉血枯氣弱等證連服生化湯二三劑卽下或用此送益母丸一丸卽下蓋益母草行血養血性善走而不傷人者也○一凡婦人無論胎前產後皆宜此藥○一凡血暈虛暈加荆芥穗六七分○一凡產婦氣虛氣脫倦怠無力加人參黃芪○一凡陽虛厥逆加附子肉桂○一脉虛煩渴加麥冬五味○一氣壅有痰加陳皮竹茹

○一血虛血燥便結加麻仁杏仁蔻蓉○一多汗不眠加桂神棗仁黃芪上體多汗加麻黃根下體多汗加漢防已○一

煩熱加丹皮地骨皮○一口噤如風反張瘓癰者加荆芥防  
風各三四分○一惡露未盡身發寒熱頭痛脇脹其小腹必  
然脹痛加紅花丹皮肉桂各三四分玄胡一錢○一內傷飲  
食加山楂陳皮砂仁或神曲麥芽○一外傷寒濕或加蒼朮  
白朮○一血積食積胃有燥糞贍腹脹痛加大黃二錢○一  
產後下血不止或如屋漏水沉黑不紅或斷或來或如水或  
有塊淋瀝不休此氣血大虛之候不可誤用寒涼其脈浮脫  
者可加附子輩諸陽分藥否則無救矣○佛手散單用當歸  
三錢川芎二錢此卽其變方也

三錢川芎二錢此卽其變方也

會稽錢氏世傳曰嘗論產證本屬血虛陰亡陽孤氣亦俱病  
如大補則氣血既生倘失調則諸邪易襲四物避芍藥之寒  
四物得薑桃之妙氣毋耗散法兼補虛食必扶脾勿專消導  
熱不可用芩連恐致宿穢凝滯塞不宜用桂附反招新血流  
崩三陽見表證之多似可汗也用麻黃則重竭其陽三陰見  
裏證之劇似可下也用承氣則大涸其血耳軀脇病乃腎虛  
惡露之停休用柴胡諳語汗多乃元弱似邪之證毋同胃實  
厥由陽氣之衰難分寒熱非大補不能回陽痊因陰血之虧  
豈論剛柔非滋營胡以潤絡潮熱似瘧以瘧治則遷延神亂

如邪以邪論則立困總屬大虛湏從峻補去血多而大便燥  
旋蓉加於生化非潤腸和氣之能通患汗出而小便難六君  
倍用參芪必生津助液之可利加參生化頻服救產後之危  
活命長生調攝須產前加意

當歸川芎湯

四三

治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸

熟地黃

白芍藥

炒

玄胡索

炒

川芎

桃仁

紅花

香附

青皮

澤蘭

牡丹皮

右水煎入童便酒各小半○若以手按腹愈痛此是瘀血爲

患宜用此药或失笑散消之○若按之反不痛此是血虛○  
用四物參芩白朮○若痛而作嘔此是胃虛宜用六君子○  
若或作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸

加味芎歸湯

四四

治分娩交骨不開或五七日不下垂死者

生男女婦人髮

一握燒存性

自死龜殼

一個或占過者亦可酥炙

川芎

當歸各一兩

右咀每用一兩水煎服良久不問生死胎自下

當歸黃芪湯

四五

方在補陣九八

治妊娠下痢腹痛

芎歸補中湯

四六

治氣血虛半產

川芎

當歸

黃芪

炙

白朮

炒

人參

芍藥

炒

杜仲

炒

艾葉

阿膠

炒

五味子

杵炒各一錢

甘草

炙五分

右每服五錢水煎服○若脾氣虛弱須用補中益氣湯○若

氣虛有火宜用安胎飲

保生無憂散

四七

臨產服之補其血順其氣或胞胎肥厚根

蒂堅牢者皆可使之易產又治小產瘀血腹痛

當歸

川芎

白芍

乳香

枳殼

南木香

血餘

右等分每服二三錢水煎日二服○若胞衣既破其血已涸或元氣困憊急用八珍湯斤許水數碗煎熟時飲救之飲盡再制亦有得生

人參黃芪湯四八 治小產氣虛血下不止

人參

黃芪炒

當歸

白朮炒

白芍炒

艾葉各一錢

阿膠炒二錢

右作一劑水煎服

良方牛膝散

四九

治胎衣不下腹中脹痛急服此藥腐化而下

全書卷之二  
緩則不久

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃

各三兩

當歸

一兩半

桂心

半兩

右每服五錢薑三片加生地黃一錢水煎服

局方 黑神散

五十

一名烏金散

靈苑

方名肉桂散

○治產後

惡露不盡胎衣不下血氣攻心腹痛不止及治脾腎陰虛血

不守舍吐衄等證

黑豆

二兩炒

當歸

去蘆酒洗

熟地

蒲黃

白芍

甘草

炙

乾薑

炮

肉桂

各一兩

右爲末每服一錢童便酒各半調服○良方黑神散有炮附  
子半兩無炮黃

簡易黑神散五一

方在和陣二二一

治一切失血

經驗滑石散五二一

治產難凡水下胎乾胎滯不生用此最效

滑石飛過一雨白蜜

香油各半盞

右將油蜜慢火熬熟三四沸掠去沫調滑石末頓服外以油  
調於產婦臍腹上下摩之立效

難產方

五三

令產婦以自己髮稍含於口中無心即下亦治胎衣不下

良方桂心散五十四

治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心

瓜蔞

牛膝

葛麥各五分  
或一錢

當歸

一錢或二三錢

右水煎

桂香散五十五

治胎死腹中不下

桂心三錢

射香五分

石爲末作一服酒調下

下胎小品方

五六

用麥蘖一升搗碎水二升煮一升服之卽下神效○按麥蘖

能損氣破血如此故凡脾胃虛弱及飲食不化者不宜用明

矣○又方用牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服卽下

濟廣  
下胎方五七并下死胎俱效

天花粉

四兩肉桂

牛膝

豆豉

各三兩

右咀用水七碗煎一碗半分三服每服後一時許又進一服

扶羸小品方五八虛弱人欲下胎宜用此

人參

粉草

川芎

肉桂

古乾薑

桃仁

黃芩

蟹爪

右等分每服一兩水二鍾煎八分空心服未動再服

下死胎

五九

凡胎死腹中其舌多見青黑口中甚穢而嘔腹

中不動祇覺陰冷重墜者是

用平胃散一兩以黃酒河水各一鍾煎至一鍾入朴硝三

五錢再煎三五沸溫服其死胎即化水而出萬不失一

又方單用朴硝末二錢以熟酒和熟童便調服立出或用

佛手散以酒調服亦妙

子去胎方六一

金

大慙廻

五升

瀆酒一斗煮二三沸去滓分五服隔宿勿食旦再服其胎即  
糜母無所苦于金不傳

辰方硫黃散六二

治產後陽氣虛寒玉門不閉

硫黃

烏賊骨  
味五味子

石爲末移患處日三易

硫黃湯六三

治產後玉門不歛陰戶突出

硫黃三錢

兎絲子

吳茱萸各二錢

蛇床子一錢半

右研勻用冰一鍾煎湯頻洗自收

辰方益母丸六四

一名逐魂丹○治婦人赤白帶惡露時下

止及治婦人胎前產後經中諸般奇痛無所不療本草云此  
草胎前無滯產後無虛故名益母

益母草 一味

一名茺蔚子 一名野天麻方梗對節生葉

葉頸火麻四五月間開紫花是白花者非

右於五月採取晒乾連根莖葉勿犯鐵器磨爲細末煉蜜丸  
如彈子大每服一丸用熱酒和薑便化下或隨證用湯引送  
下○一方以此爲末每服二錢或酒或薑便或隨證用引服  
之○一方凡產時倉卒未合只用生益母草搗汁入蜜少許  
服之其效甚大○一益母膏方依前採取搗爛以布濾取濃

汁用砂鍋文武火熬成膏如黑砂糖色爲度人磁罐收貯每  
服二三匙酒便調下或於治血湯藥中加一匙服之尤妙

良方奪命丹六五

治療血入胞脹滿難下急服此药血卽消衣

自下○按此方頗有廻生丹之功用下死胎必效須用當歸

方

附子炮半兩乾漆碎之炒煙盡牡丹皮各一兩

右爲細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成膏和前药

丸桐子大溫酒吞五七丸○一方有當歸一兩

廻生丹六六一治婦人產後諸疾污穢未淨及一切實邪瘀癥

死胎瘀血衝送等證

大黃膏法 用蘿木三兩河水五碗煎至三碗去粗繭用

紅花三兩炒黃色用好酒一大壺煮十餘滾去粗繭用  
黑豆三升煮熟存汁三碗去豆去皮晒乾爲末俱聽用

大黃一斤爲末用好醋入碗熬成膏次下紅花酒蘿木湯  
黑豆汁攪勻又熬成膏盆內收盛候用將鍋焦焙乾爲末  
同豆皮末俱入之

人參

白朮

青皮

木瓜

各三錢

當歸

川芎

元胡

蒼朮

香附 童便炒

蒲黃

赤茯苓

桃仁泥

熟地各一兩牛膝

三稜

山茱萸

五靈脂 地榆

甘草

羌活

陳皮 白芍各五錢

良薑四錢

烏藥二兩半

木香

乳香

沒藥各一錢

右爲末用前大黃膏爲丸彈子大金箔爲衣不拘時隨證擇  
用湯引送下一丸

斷產灸法六七

一傳方欲絕產者灸臍下二寸三分陰動脈

中三壯此當自臍中至骨際拆作五寸約之

全書卷之二  
金斷產方 又六七

四物湯 一劑

芸薹子 一撮

即油菜子 紅花

水鍾半煎八分經後空心服則不受胎

斷產小品方 六八

斷產墮胎有驗

故蠶退紙 方一尺

右燒爲末空心酒調服終身不受孕

丹溪斷子法 六九

用白麪廻一升無灰酒五升作糊煮至三升半濾去滓分作

三服候經至前一日晚五更及天明各吃一服經卽不一無

行終身無子矣

仲景 羊肉湯七十

治產婦腹中病痛寒痛血氣不足虛弱甚者

及寒月生產寒氣入於子門手不可犯臍下脹滿此產後少  
寒證也并治寒疝腹中痛及腸痛裏急者

精鷄半肉一斤

當歸三兩

生薑五兩

右用水八升煮取三升加葱椒鹽溫服七合日二服○若寒  
多者加生薑成一斤○痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩

良方 羊肉湯七十

治產婦脾虛寒邪內乘以致腹痛或頭眩睡

脇急痛

精羊肉

四兩

當歸

川芎

各半兩

生薑

一兩

右以水十盞煎至四盞分四次空心服

良方黃雌鷄湯

七二

治產後虛羸腹痛

當歸

白朮

炒

熟地黃

黃芪

炒

桂心各半兩

小黃雌雞

一隻去頭足腸翅細切

右先用水七碗煮鷄至三碗每用汁一碗約四錢煎日三服  
母鷄湯七三 治產後襟勞虛汗不止

人參

黃芪

白朮

白茯苓

麻黃根

牡蠣

煅各三錢

右用母鷄一隻去毛雜淨水六七碗同薑煮至三碗任意服

之

豬腰湯

七四

治產後蓐勞寒熱如瘧自汗無力欬嗽頭痛腹痛

俱效

豬腰

一對

當歸

白芍

酒炒各一兩

右以芍一味用水三碗煎至二碗去滓將豬腰切如骰子塊同晚米一合香豉一錢加葱椒鹽煮稀粥空心日服一次袖效○或加人參更妙

四神散

七五

治產後血虛或瘀血腹痛

當歸一錢

川芎

芍藥炒各一錢

炮薑五分

右水煎服

太巖蜜湯

七六

治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地

當歸

芍藥

炒

乾薑

吳茱萸

桂心

獨活

甘草

炒

小草

各一兩

細辛

半兩

右每服半兩水煎服

良人參湯

七七

治產後諸虛不足發熱盜汗內熱肺熱等證

○此卽參歸湯亦名園參散

人參

當歸

等分

右爲末先以豬腰子一枚切片糯米半合葱白一莖入水  
鍊煎汁八分再入藥三錢煎服

白茯苓散

七八

治產後蓐勞頭目肢體疼痛寒熱如瘡

白茯苓

一兩

人參

當歸

黃芪

川芎

白芍藥

炒

熟地

桂心

各半兩

豬腰

一對

右以水二盞入豬腰并薑棗各三事煎一盞去粗入前藥半

兩煎一盞服

良方七珍散七九 治產後不語

人參

石薑蒲

生地

川芎各一兩

細辛七錢

防風

朱砂

另研各半兩

右爲末每服一錢薄荷湯調服

良方趁痛散八十 治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝

酒炒

甘草

炒

薤白

各一兩

當歸

白朮

炒

黃芪

炒

桂心

獨活

加薑各半兩

右每服半兩水煎

補脬飲八一

治產後傷動脬破不能小便而淋瀝

生黃絲絹一尺剪碎

白牡丹皮根

白芨各一錢俱爲末

用水一碗同煮至絹爛如餳空心頓服服時不得作聲作聲  
則不效

良止汗散八二

牡蠣殼粉半兩小麥麩炒兩兩炒黃爲細末

右每服三五錢用豬肉汁調服

良方 麻黃根湯

人三 治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

麻黃根

人參

黃芪

當歸

牡蠣殼粉

甘草

右每服四五錢水煎服

三味參蘿飲

人四

治產後瘀血入肺欬嗽喘急

人參

一兩

蘿木

二兩

右作一劑水煎服○若既愈當用六君子以補脾胃○若口

鼻黑氣起宜急用此藥加附子五錢亦有得生者

良方

黃龍湯

八五

治妊娠寒熱頭疼嘿噦不食腸痛嘔痰及產

後經後外感風寒熱入胞宮寒熱如瘡等證○按此卽小柴

胡湯之去半夏也

柴胡二錢

黃芩炒

人參

甘草各一錢

右用水煎服

陳氏二母散八六

治產後熱血上攻留於肺經欬嗽喘促

知母

貝母

人參

桃仁

杏仁

俱去皮尖

白茯苓

右等分每服五錢薑水煎服

豬蹄湯八比

治氣血不足乳汁不下

用八物湯加黃芪漏蘆陳皮木通先以猪蹄煮汁二碗煎藥  
服之○或加天花粉

又方 用猪蹄一副通草二兩川芎一兩甘草一錢川山甲  
十四片炒將猪蹄洗切入水六碗同藥煎煮約至三碗加葱  
薑鹽料取汁飲之忌冷物要喫羹湯助其氣血乳汁自下更  
月不可失蓋時用葱湯洗乳爲佳

良方 沸泉散八八 下乳忌食薑椒辛辣飲食

王不留行

薺麥

麥門冬

龍骨各二錢

右用猪蹄汁一椀酒一杯煎服以木梳於乳上梳下

玉露散

八九

治產後乳脈不行身體壯熱頭目昏痛大便澀

滯

人參

白茯苓

當歸

炙甘草各五分

桔梗

川芎

白芷

各一錢  
芍藥七分

右水煎食後服○如熱甚大便秘結加大黃三五分炒用

漏蘆湯

治婦人肥盛脉氣壅結乳少

漏蘆二兩

蛇退一條

土瓜根

右共爲末酒調下二錢

括囊散 九一

治吹乳腫痛

括囊 一個  
乳香二錢

右用酒煎服○外用南星爲末以溫湯調塗

滑氏補肝散 九二 治肝腎二經氣血虧損腸脹作痛或脹頭

暉寒熱發熱或偏身作痛經候不調

熟地 白术 炒各一  
兩 茯苓 炒各一  
兩 独活 各四兩

當歸

川芎

黃芪

山藥

五味子

炒杵

山茱萸肉

木瓜

各半兩

石攻咀每服五錢棗水煎服

金膠艾湯九三 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不止

阿膠炒

川芎

炙甘草各二兩  
艾葉

當歸各二兩半

白芍

熟地各二兩

右咬咀每服五錢水煎服○一方加地榆黃芪卽名安胎散

九四

驗加味八珍湯 治婦人思慮過傷飲食日減氣血兩虛

月經不調夜夢交感或出盜汗竢成勞損

人參

白朮

茯苓

當歸

生地各一錢

炙甘草

川芎

芍藥

軟柴胡

黃芪各五分

香附剝

丹皮

各八分

水鍾半大棗一枚煎七分食前服

集驗調衛養榮湯

九五

治婦人室女一切月經不調或先或後

或絕閉不通憎寒壯熱口苦無味欬嗽躁煩頭眩漸成勞證

者

當歸

生地

麥冬

沙參

陳皮

白朮

各一錢

牡丹皮

地骨皮

各八分

柴胡稍

桔梗

各五分

穀芽

一錢

甘草

四分

右加蓮子薑棗水煎服○痰中見血加側柏葉○煩躁口乾  
加炒山梔倍麥門冬○脇下脹疼加青皮川芎○胸膈滿悶

加黃連薑炒枳實去麥冬地骨皮○夜出盜汗加黃連黃芪  
去柴胡桔梗○大便秘結加桃仁倍當歸○欬嗽不已加瓜  
薺仁阿膠○小水不利加木通茯苓

方

當歸散九六

治經水妄行不止及產後氣血虛弱惡露內

停憎寒發熱宜服此去之

當歸酒洗

川芎

白芍炒

白朮炒

黃芩

炒各半兩

山茱萸肉

一兩半

右爲末每服二錢酒調日二服○一方無山茱萸○氣虛者

去芩加桂心一兩

良方丹參散 九七 良方云丹參一味其治頗類四物湯能破宿血

補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經下產後惡血兼治

冷熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參 酒洗去土晾乾切

右爲細末每服一錢溫酒調下○經脈不調食前服○冷熱勞不拘時服

玄胡當歸散 九八 亦名延胡索散○治血積小腹疼痛或因氣

逆月經不行肚腹作痛

當歸

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳殼  
炒  
炒等分  
玄胡索  
炒等分

右爲末每服一錢熟酒調下

牛膝散九九

治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻胸膈

當歸

酒浸

牛膝

酒炒

赤芍藥

桂心

桃仁

去皮尖玄胡索

炒

牡丹皮

各二兩

木香

三錢

右爲末每服一錢溫酒調下或每服五七錢水煎服

良交加散百

治經脈不調腹中撮痛或結聚癰瘍產後中風

○又交加散方在和陣二五三

生地

一斤

生薑

十二兩

取汁

取汁

右以地黃汁炒薑粗薑汁炒地黃粗乾爲末每服二錢溫酒  
調服○加芍藥玄胡當歸蒲黃桂心各一兩沒藥紅花各五  
錢尤效

薑黃散

百一

治瘀血凝滯肚腹刺痛或腹脹發熱等證

薑黃

當歸

酒拌各二錢

蓬朮

醋炒

紅花

桂心

川芎

玄胡索

炒

丹皮

各五分

右水酒各半煎服

琥珀散

百一

治心膈迷悶肚腹撮痛月信不通等疾

烏藥

二兩

當歸

酒洗

蓬朮

醋制各一兩

右爲末每服二錢溫酒調服

溫經湯

百三

治寒氣客於血室以致血氣凝滯臍腹作痛其脉沉緊

人參

牛膝

酒炒

甘草

炒各一錢

當歸

川芎

芍藥

牡丹皮

蓬木

醋炒

桂心

各五分

右水煎服

失笑散

百四

治婦人心痛氣刺不可忍及產後兒枕畜血血正

皿上攻疼痛并治小腸氣痛

全書卷之十一  
古方  
五靈脂 淨者蒲黃等分俱炒

右爲末每服二三錢用酒煎熱服○一方用好醋一杓熬成膏再入水一鍾煎至七分熱服○一方用醋糊和丸龍眼大每服一丸以童便和水各半鍾煎七分溫服○按此方若用以止痛蒲黃宜減半若用止血則宜等分或靈脂減半亦可澤蘭湯 百五 治勞怯經閉

澤蘭葉一錢 當歸 芍藥炒各一錢 甘草炙五分

用水煎服

當歸沒藥丸

百六

治血瘀作痛及血風筋攀骨痺手足麻木

疼痛

當歸

五靈脂

炒各兩  
沒藥五錢

右爲末醋糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

醋附丸

百七

治元臟虛令月候不調腹中急痛赤白帶下血

身寒熱胎氣壅滯不固

香附米

半斤醋煮焙干爲末

右以醋糊爲丸桐子大每服三四十丸米飲下

柏子仁丸

百八

治血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸弱

而生潮熱慎勿以毒藥通之宜柏子仁丸或前澤蘭湯主之

柏子仁炒研

牛膝酒拌

卷柏

各半兩

澤蘭葉

續斷各二兩

熟地黃三兩

酒拌蒸爛杵膏

右爲末入地黃膏加煉蜜丸桐子大每服百餘丸空心米飲

下

烏賊魚骨丸

百九

此卽內經治血枯方

烏賊魚骨

去甲四兩

蘆茹

一兩卽茜根

右爲末以雀卵搗丸小豆大每服五丸或十丸鮑魚煎湯下

以飯壓之○鮑魚卽今之淡乾魚也

增損四物湯

百十

治脾虛不攝血去不止

人參

當歸

芍藥炒

川芎

乾薑

炒各一  
兩

甘草

炙四錢

右每服四錢水煎服

奇效四物湯

百十一

治肝經虛熱血沸騰而崩久不止

當歸

酒拌

熟地

白芍

川芎

阿膠炒

艾葉炒

黃芩

右每服四錢水煎

良方 加減四物湯

百十二

治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地

蓬木

三稜

肉桂

乾漆  
炒烟盡  
等分

右咬咀每服五七錢水鍾半煎七分食遠服

四物一連湯

百十三

治婦人血虛發熱或口舌生瘡或晝安

夜熱

此陰分有火

當歸

川芎

芍藥

熟地

胡黃連

宜黃連各一錢

右作一劑水煎服

人參當歸湯

百十四

治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節

作癆或虛煩咽喉

人參

當歸

生地

桂心

麥冬

白芍藥

各等分

右用粳米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去米入薑五錢蜜二枚煎服或總煎之亦可虛甚者用熟地黃

良方  
一味防風散百十五

治肝經有風以致血得風而流不歸

經者

用防風去蘆爲末每服一錢白湯調服○一名獨聖散每服

二錢空心食前用酒煮白麵清飲調下極效

龍骨散

酒炒六

治血崩不止

龍骨 煅

當歸

香附

炒各一兩

棕毛灰

五錢

右爲細末每服四錢空心米湯調下忌油膩鷄魚炙燙物

如聖散

百十七

治血崩三服全愈

棕櫚子

烏梅肉

乾薑

俱燒存性爲末各等分

右每服一錢空心烏梅湯調服○一方單用棕皮半燒半生

爲末每空心服一錢亦妙

槐榆散

百十八人

治血崩及腸風下血

槐花

地榆

等分炒焦

右二味用酒煎飲之

七灰散

百十九

治血崩神效

蓮蓬殼

瞿粟殼

醃蟹殼

益母草

旱蓮草

棕毛葉

藕節

各分候燒存性爲末

空心醋點湯調下三錢○一秘方用綿花子以銅鍋炒黑爲

末黃酒調下二三錢三兩次卽止并治崩漏小產血不止

棕灰散

百二十

方在和陣二二五

治大腸下血及崩漏矢血

柏葉散

一二一

治元氣虛弱崩中漏血年久不愈亦治白帶

柏葉

炒

當歸

生地

續斷

川芎

龜甲 炙

禹餘糧 各一

阿膠 炒五錢  
兩半

鱉甲

灸兩半

赤石脂

煅

牡蠣

煅

艾葉炒

鹿茸

灸各五錢

地榆

右爲末每服二錢粥飲調下

子芩散 一二二

一名黃芩散○治壯熱崩中下血是陽乘陰

分故經血泛溢宜清其托方

條黃芩

不拘多少爲細末

右燒秤鑊碎酒食前調下三四錢○一方有乾薑白芷○

方以木耳黃芩等分爲丸俱效

良方 防風黃芩丸 二二三 治肝經風熱以致血崩便血尿血等

證

條芩 炒黑 防風 等分

右爲末酒糊丸桐子大每服三五十丸食遠或食前米飲或溫酒送下

劫勞湯 二四

治勞嗽發熱盜汗體瘦唾中有血或成肺痿

○此救本也非劫勞也能用此者庶可望生此外恐非佳藥

矣

白芍藥

炒一錢

人參

黃芪

炒

當歸

熟地

甘草

白茯苓

五味子

桔炒

阿膠

炒

半夏

制各五分  
似有不足用者仍宜加倍  
此上乃其原方

右薑棗水煎日三服○鄉人楊元鼎女及笄病此甚危自藥一無效偶遇名醫得此方服三十餘劑遂愈不發

集歸神湯

一二五

治婦人夢交盜汗心神恍忽四肢乏力飲

食少進

人參

白朮

白茯苓

歸身各一錢

棗仁

陳皮

各八分

圓眼肉七枚

甘草

羚羊角

琥珀

末各五分

右羚羊琥珀一味不煎餘藥煎熟去粗入二末和勻食前服

白芷散一二六

治下元虛弱赤白帶下或經行不止等證

白芷一兩

海螵蛸二枚燒

胎髮一團煅

右爲末每服一錢溫酒調下

藏海

白芍藥散

一二七

治婦人赤白帶下臍腹疼痛如神

白芍二兩炒

乾薑半兩炒

右爲細末每服三錢空心溫米湯調下晚又進一服十日

效

克應丸一二八

治婦人赤白帶下

熱地

赤芍

各二兩

當歸

二兩

赤石脂

煅醋

龍骨

牡蠣

煅酒炮

茯苓

丹皮

艾葉

製

川芎

各一兩

右爲末醋糊丸桐子大每服五十丸空心白湯送下

良方  
滑石散

一二九  
治熱淋

滑石五分研  
通草

車前子

葵子各四分

右爲末以漿水調服

芍藥散

百三十

治婦人血滯腰脇痛

白芍藥

玄胡

炒

肉桂

各一兩

香附米

二兩

醋

升鹽半兩

同煮

乾

右爲細末每服二錢不拘時白湯調下

良方 通氣散 一三二

治腎虛腰痛神效

破故紙 酒炒爲末

右每服二錢先嚼胡桃肉半箇空心以溫酒送下

四製香附丸

一三二

調經養血順氣受孕

香附米

一斤分四制酒醋童便  
米泔各浸一宿晒乾用

當歸 酒洗

熟地

酒洗

白芍藥

四兩

川芎 各四兩

澤蘭葉

白朮

陳皮 各三兩

黃芩 酒炒

甘草 酒炒各一兩

酒炒各

右爲末酒糊丸桐子大每服七十丸空心白湯送下

大女金丹

此韓飛霞方也一名不換金丹○內加熟

地黃一兩卽名勝金丹○治婦人久虛無子及產前產後一

切病患此藥能安胎催生妊娠臨月服五七丸產時減痛婦

人子宮寒冷無孕如服月餘男女自至又治半身不遂帶濁

血崩及產後腹痛吐逆子死腹中氣滿煩悶臍腹作痛月水

不通中風口噤痢疾消渴敗血上衝頭疼寒熱血暈血泄見

鬼迷悶產後傷寒虛煩勞瘦凡婦人諸疾不問久近並宜服

之兼治男子下虛無力等證

人參

白朮炒

茯苓

炙甘草

當歸

川芎

白芍

白薇酒洗

丹皮

白芷

藁本

肉桂

玄胡

沒藥另研

赤石脂另研上各一兩

香附

醋浸三日炒香十五兩

醋湯下亦妙

右共十六味爲末煉蜜丸彈子大以磁瓶收貯封固每服一丸空心溫酒化下食乾物壓之服至四十九丸爲一劑以癸水調平受妊爲度妊中三五日服一丸產後二三日服一丸

琥珀丸

一三四

治婦人或老或少或產前產後百病及療三

十六種諸病七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風

十二癰手足痺疼乳中結核結毒懷胎驚動傷犯不安死胎

不下並治

琥珀

硃砂各另研

沉香

阿膠炒珠

附子

制

川芎

肉桂

五味子

石斛各五錢

牛膝酒浸

當歸

肉蓯蓉

酒洗晒干

人參

熟地

續斷

木香

沒藥各一兩

一方有牛黃 珍珠 乳香 玄胡

各一兩共二十一味

右練蜜爲丸彈子大每服一丸空心食前午後溫酒化開服

○凡服法或薑湯或米湯或酒或燈草湯或隨證用引皆可

一下○若傷寒中風角弓反張用麻黃湯隨證改湯引送下○

孕婦臨月宜一日一服至產順利不覺疼痛○凡婦人服至

五服十服之後日倍飲食其功言不盡述服者當自覺也

延年益嗣丹 一三五 滋補元氣益精黑髮○按此方卽還元

丹也但製法分兩不同宜參酌用之方在補陣一三九

人參

天門冬

酒浸去心

麥門冬

同上各三兩

熟地黃

酒蒸

生地黃

各二兩

白茯苓

酒浸晒乾

地骨皮

酒浸各五兩

何首烏

鮮者半斤

右將何首烏去皮切片如乾者用米泔水浸軟拈切外用砂鍋入黑羊肉一斤黑豆三合量着水上用錠算算上放首烏

煮而蒸之以肉爛爲度鍋蓋須蜜勿令洩氣取起晒乾爲末

煉蜜丸梧子大每服七八十九空心溫酒送下

續嗣降生丹

一三六

治婦人五臟虛損子宮冷憊不能成孕

○并治男子精寒不固陽事衰弱白濁夢泄婦人帶下寒熱

諸虛百損盜汗短氣無不感應○此方乃溫隱居求嗣保生

篇所載云東京焦員外三世無嫡嗣後遇一神僧問其故曰

無嗣者有三一祖宗無德自身無行二夫妻年命恐犯禁忌  
三精神不守妻妾血寒焦公曰治之有道乎僧曰先修德後  
修身三年之後到臺山令行童賜以方藥名續嗣降生丹依  
方服之後不及二十年子孫數人皆貴顯○此方無怪誕尅  
代之品且溫且固凡血海虛寒者服之必佳但溫力有餘補  
力不足倘益以人參白朮熟地川芎炙甘草各一兩則八珍  
全而溫補贊育之功當非淺也因命名曰加味續嗣降生丹

當歸

酒洗

杜仲

酒炒

茯神

益智仁

龍骨

煅

桂心

吳茱萸

制

乾薑

半生半熟