

重刊巢氏諸病源候總論卷八

傷寒病諸候下 凡四十四論

傷寒餘熱候

傷寒病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脈洪大實數腹內脹滿小便赤黃大便難或煩或渴面色變赤此爲府藏有結熱故也

傷寒五藏熱候

傷寒病其人先若身熱嗌乾而渴飲水卽心下滿灑淅身熱不得汗惡風時欬逆者此肺熱也若其人先苦身熱嗌乾而小腹

重刊巢氏諸病源候總論卷八

傷寒病諸候下 凡四十四論

傷寒餘熱候

傷寒病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脈洪大實數腹內脹滿小便赤黃大便難或煩或渴面色變赤此爲府藏有結熱故也

傷寒五藏熱候

傷寒病其人先若身熱嗌乾而渴飲水卽心下滿灑淅身熱不得汗惡風時欬逆者此肺熱也若其人先苦身熱嗌乾而小腹

繞臍痛腹下滿狂言默默惡風欲嘔者此肝熱也若其人先苦手掌心熱煩心欲嘔身熱心下滿口乾不能多飲目黃汗不出欲得寒水時妄笑者此心熱也若其人先苦身熱四支不舉足脛寒腹滿欲嘔而泄惡聞食臭者此脾熱也若其人先苦嗌乾內熱連足脛腹滿大便難小便赤黃腰脊痛者此腎熱也

### 傷寒變成黃候

陽明病無汗小便不利心中懊惱必發黃若被火額上微汗出而但小便不利亦發黃其人狀變黃如橘色或如桃枝色腹微滿此由寒濕氣不散瘀熱在於脾胃故也

傷寒心腹脹滿痛候

此由其人先患冷癖因發熱病服冷藥及飲冷水結在心下此爲藏虛動於舊癖故也或吐下已後病不解內外有熱故心腹脹滿痛此爲有實也

傷寒宿食不消候

此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此爲胃內有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消

傷寒大便不通候

傷寒陽脈微而汗出少爲自始汗出多爲太過陽明脈實因發其汗汗出多者亦爲太過太過者陽氣絕於裏陽氣絕於裏津液竭熱結在內故大便牢而不通也

傷寒小便不通候

傷寒發汗後而汗出不止津液少胃內極乾小腸有伏熱故小便不通

傷寒熱毒利候

此由表實裏虛熱氣乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁此熱毒所爲也

傷寒膿血利候

此由熱毒傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁壯熱而腸痛此濕毒氣盛故也

傷寒利候

傷寒病若表實裏虛熱乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁若濕毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如血腦如爛肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下清下清者不可攻其表汗出必脹滿表裏俱虛故也傷寒六七日不利更發熱而利者其人汗出不止者死但有陰無陽故也下利有微熱其人渴脈弱者今自愈脈沈弱弦者

下重其脈大者爲未止脈微數者爲欲自止雖發熱不死少陰病八九日而身手足盡熱熱在膀胱必便血下利脈浮數尺中自滑其人必清膿血若利止惡寒而拳手足溫者可治也陽明病下利其脈浮大此皆爲虛弱強下之故傷寒下利日十餘行其脈反實死

傷寒病後胃氣不和利候

此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥以自瀉下病折已後熱勢既退冷氣乃動故使心下幅牢噫噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷故也

傷寒上氣候

此由寒毒氣傷於太陰經也太陰者肺也肺主氣肺虛爲邪熱所客客則脹脹則上氣也

傷寒欬嗽候

此由邪熱客於肺也上焦有熱其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽

傷寒衄血候

傷寒病血衄者此由五藏熱結所爲也心主於血肝藏於血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻血出也肺主於氣而開竅於鼻

血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必衄  
衄家不可攻其表汗出額上痏急而緊直視而不能眴不得眠  
亡血不可攻其表汗出則寒慄而振脈浮緊發熱其身無汗自  
衄者愈

### 傷寒吐血候

此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結  
於五藏內有瘀積故吐血

### 傷寒陰陽毒候

夫欲辨陰陽毒病者始得病時可看手足指冷者是陰不冷者

是陽若冷至一二三寸者病微若至肘膝爲病極過此難治陰  
陽毒病無常也或初得病便有毒或服湯藥經五六日以上或  
十餘日後不瘥變成毒者其候身重背強喉咽痛糜粥不下毒  
氣攻心心腹煩痛短氣四肢厥逆嘔吐體如被打發斑此皆其  
候熏過三日則難治陽毒者面目赤或便膿血陰毒者面目青  
而體冷若發赤斑十生一死若發黑斑十死一生陽毒爲病面  
目斑斑如錦紋喉咽痛清便膿血七日不治五日可治九日死  
十一日亦死

壞傷寒候

此謂得病十二日已上六經俱受病訖或已發汗吐下而病證不解邪熱留於府藏致令病候多變故曰壞傷寒本太陽病不解轉入少陽脇下牢滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下其脈沈緊與小柴胡湯若已吐下發汗飲柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之寸口脈洪而大數而滑洪大榮氣長滑數胃氣實榮長陽卽盛鬱怫不得出胃實卽牢大便難卽乾燥三焦閉塞津液不通醫已發陽氣盛不用復重下之胃燥畜大便遂賓小便不利榮衛相搏煩心發熱兩目如火鼻乾面正赤舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病

傷寒百合候

百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾也其狀意欲食復不能食常默默欲得臥復不得臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不用飲食如強健人而臥不能行如有寒復如無寒如有熱復如無熱若小便赤黃百合之病諸藥不能治得藥卽劇吐利如有神靈者身形如和其人脈微數每尿輒頭痛其病六十日不愈若尿頭不痛淅淅然者四十日愈若尿快然但眩者二十日愈體證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月微見其狀惡



寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便聊  
三四旦大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈其狀小  
便淋瀝難者病在下焦也四十一日當愈各隨其證以治之耳

### 傷寒狐惑候

夫狐惑二病者是喉陰之爲病也初得狀如傷寒或因傷寒而  
變成斯病其狀默默欲眠目撓不得臥起不安蟲食於喉咽  
爲惑食於陰肛爲狐惡飲食不欲聞食臭其人面目翕赤翕黑  
翕白食於上部其聲喎食於下部其咽乾此皆由濕毒氣所爲  
也



傷寒濕蠶候

凡得傷寒時氣熱病腹內有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食食人五藏及下部蠶病之候齒無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四支沈重忽忽喜眠於此皆爲蟲食其肛肛爛見五藏卽死當數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者則心內懊憹痛此蟲在上食其五藏下脣內生瘡者其人不寤此蟲食下部皆能殺人

傷寒下部痛候

此由大腸偏虛毒氣衝於肛門故下部卒痛甚者痛如鳥啄

傷寒病後熱不除候

此謂病已間五藏尙虛客邪未散真氣不復故旦暮猶有餘熱如瘧狀此非真實但客熱也

傷寒病後渴候

此謂經發汗吐下已後府藏空虛津液竭絕腎家有餘熱故渴  
傷寒病後不得眠候

夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣盡陰氣盛則目瞑失令熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也

傷寒病後虛羸候

其人血氣先虛復爲虛邪所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕熱邪始散真氣尙少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生病焉

傷寒病後不能食候

此由陽明太陰受病被下之後其熱已除而脾胃爲之虛冷穀氣未復故不能食也

傷寒病後虛汗候

夫諸陽在表陽氣虛則自汗心藏偏虛故其液妄出

也

傷寒內有瘀血候

夫人先瘀結在內因傷寒病若熱搏於久瘀則發熱如狂若有寒則小腹滿小便反利此爲血瘀宜下之其脈沈結者血證諦也

傷寒毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱乘虛上衝於目故目赤痛重者生瘡翳白膜息肉

傷寒毒攻足候

此由熱毒氣從內而出循經絡攻於足也人五藏六府并榮俞  
皆出於手足指故毒從藏府而出

### 傷寒毒流腫候

人陰陽俱虛濕毒氣與風熱相搏則榮衛澀榮衛澀則血氣不  
散血氣不散則邪熱致壅隨其經絡所生而流腫也

### 傷寒病後腳氣候

此謂風毒濕氣滯於腎經腎主腰腳今腎既濕故腳弱而滿其  
人小腸有餘熱卽小便不利則氣上腳弱而氣上故爲腳氣也

### 傷寒病後霍亂候



霍亂吐下利止後更發熱傷寒其脈微澀本是霍亂今是傷寒  
卻四五日至陰經上轉入陰當利本素嘔下利者不治若其人  
卽欲大便但反失氣而不利是爲更屬陽明心強二十二日愈  
所以然者經竟故也下後當强强能食者愈今反不能食到後  
經中頗能食復一經能食過之一日當愈若不愈者不屬陽明  
也惡寒脈微而後利利止必亡血

### 傷寒病後瘧候

病後邪氣未散陰陽尙虛因爲勞事致二氣交爭陰勝則發寒  
陽勝則發熱故寒熱往來有時休作而成瘧也

傷寒病後渴利候

此謂大渴飲水而小便多也其人先患勞損大病之後腎氣虛則熱熱乘之則腎燥腎燥則渴渴則飲水腎虛則不能制水故飲水數升小便亦數升名曰渴利也

傷寒肺萎候

大發汗後因復下之則亡津液而小便反利者此爲上虛不能制於下也虛邪中於肺肺萎之病也欲飲而不能唾濁涎沫此爲肺萎之病也

傷寒失聲候

邪客於肺肺主聲而通於氣今外邪與真氣相搏真氣虛而邪氣勝故聲爲之不通也

### 傷寒夢泄精候

邪熱乘於腎則陰氣虛陰氣虛則夢交通腎藏精今腎虛不能制於精故因夢而泄

### 傷寒勞復候

傷寒病新瘥津液未復血氣尙虛若勞動早更復成病故云復也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脈緊者宜下之

傷寒病後食復候

傷寒病新瘥及大病之後脾胃尙虛穀氣未復若食豬肉腸血肥魚及久膩物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅餳黍飴餌炙鱠棗栗諸菓脯物及牢強難消之物胃氣虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃虛冷大利難禁不可下之必死下之亦危皆難救也大病之後多坐此死不慎護也夫病之新瘥後但得食糜粥宜少食乃飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹慎不可食猪狗等肉

傷寒病後令不復候

傷寒病後多因勞動不節飲食過度更發於病名之爲復復者謂復病如初也此由經絡尙虛血氣未實更致於病耳令預服藥及爲方法以防之故云令不復也

### 傷寒陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人傷寒病新瘥未平復而與之交接得病者名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新瘥未平復而男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度著如人之換易也其得病之狀身體熱衝脣頭重不

能舉眼內生昧四支拘急小腹痞痛手足拳皆卽死其亦有不  
卽死者病苦小腹裏急熱上衝曾頭重不欲舉百節解離經脈  
緩弱氣血虛骨髓空竭便欬欬吸吸氣力轉少著牀不能搖動  
起居仰人或引歲月方死

### 傷寒交接勞復候

夫傷寒病新瘥未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死  
也有得此病愈後六十日其人已能行射獵因而房室卽吐涎  
而死病雖云瘥若未平復不可交接必小腹急痛手足拘拳二  
時之間亡范汪方云故督郵顧子獻得病已瘥未健詣華萼視

脈專曰雖瘥尙虛未平復陽氣不足勿爲勞事也男勞尙可女勞卽死臨死當吐舌數寸獻婦聞其瘥從百餘里來省之住數宿止交接之間三日死婦人傷寒雖瘥未滿百日氣血骨髓未牢實而合陰陽快者當時乃未卽覺惡經日則令百節解離經絡緩弱氣血虛骨髓空竭便悒悒吸吸氣力不足著牀不能動搖起居仰人食如故是其證也丈夫亦然其新瘥虛熱未除而快意交接者皆卽死若瘥後與童男交接者多不發復復者亦不必死

傷寒令不相染易候

傷寒之病但人有自觸冒寒毒之氣生病者此則不染著他人  
若因歲時不和溫涼失節人感其乖戾之氣而發病者此則多  
相染易故須預服藥及爲方法以防之

重刊巢氏諸病源候總論卷八終

詠榮是姑於所與藥文錄之古以朝夕  
苦因齧相不味歸前夫顧人鍼其承兌之而發而昔者此謂之



重刊巢氏諸病源候總論卷九

時氣病諸候 凡四十三論

時氣候

時行病者是春時應暖而反寒夏時應熱而反冷秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其時而有其氣是以一歲之中病無長少卒相似者此則時行之氣也從春分後其中無暴大寒不冰雪而人有壯熱爲病者此則屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸冒之過也若



三月四月有暴寒其時陽氣尙弱爲寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病相似但治有殊耳然得時病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日法針服解散汗出愈不解三日復發汗若大汗卽愈不解止勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若病固藜蘆丸不吐者服赤豆瓜蒂散吐已解視病者尙未了了者復一法針之當解不愈者六日熱已入胃乃與雞子湯下之愈百無不如意但當諦視節度與病耳食不消病亦如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當

待六七日下之時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胷五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之熱乘虛便人胃然病要當復下之不得下胃中餘熱置此爲病二死一生此輩不愈胃虛熱入胃爛微者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生病人有強弱相倍也若得病無熱但狂言煩躁不安精神語言與人不相主當者勿以火迫但以猪苓散一方寸七已上飲之以一升若升半水可至二升益佳當以新汲井水強令飲以指刺喉中吐之隨手愈不時吐者此病皆多不瘥勿以餘藥治也不相主當必危若此病不時以猪苓散吐解之者佳殆

速死亦可先以法針之尤佳以病者過日不以時得下之熱不得泄亦胃爛矣其湯熨針石別有正法補養宣導今附於後養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩耳舉又引鬢髮卽流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩從上下二七正去肝氣令面有光又摩手令熱令熱從體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈

時氣一日候

時氣病一日太陽受病太陽爲三陽之首主於頭項故得病一日頭項腰脊痛

時氣二日候

時氣病二日陽明受病陽明主於肌肉其脈絡鼻入目故  
日內熱鼻乾不得眠夫諸陽在表始受病故可摩膏火灸發汗  
而愈

時氣三日候

時氣病三日少陽受病少陽脈循於脣上於頸耳故得病三日  
胷脇熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故可汗而愈

時氣四日候

時氣病四日太陰受病太陰爲三陰之首三日已後諸陽受病

訖卽傳之於陰太陰之脈主於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾其病在胃鬲故可吐而愈也

時氣五日候

時氣病五日少陰受病少陰脈貫腎絡肺繫於舌故得病五日口熱舌乾而引飲其病在腹故可下而愈

時氣六日候

時氣病六日厥陰受病厥陰脈循陰器絡於肝故得病六日煩滿而陰縮此爲三陰三陽俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈

時氣七日候



時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也令病不除者欲爲再經病也再經病者謂經絡重受病也

時氣八九日已上候

時氣病八九日已上不解者或是諸經絡重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未卽能傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之

時氣取吐候

夫得病四日毒在胷鬲故宜取吐有得病二三日便心胷煩滿此爲毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上焦者其人有痰



實故也所以復宜取吐也

時氣煩候

夫時氣病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥糞而煩者則謬語時繞臍痛腹爲之滿皆當察其證候也

時氣狂言候

夫病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽爭而外弁於陽四支者諸陽之本也邪盛則四支實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣

而走陽盛故妄言罵詈不避親戚大熱遍身狂言而妄見妄聞之

### 時氣嘔候

胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲食多胃虛冷亦爲嘔也

### 時氣乾嘔候

熱氣在於脾胃或發汗解後或大下之後胃內不和尙有蓄熱熱氣上熏故心煩而嘔也

### 時氣噦候

伏熱在胃令人脣滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃氣虛冷亦令致噦也

時氣嗽候

熱邪客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而嗽也

時氣渴候

熱氣入於胃藏腎惡燥熱氣盛則腎燥腎燥故渴而引飲也

時氣衄血候

時氣衄血者五藏熱結所爲心主於血邪熱中於手少陰之經

客於足陽明之絡故衄血也衄者血從鼻出也

時氣吐血候

諸陽受病不發其汗熱毒入深結在五藏內有瘀血積故令吐血也

時氣口瘡候

發汗下後表裏俱虛而毒氣未盡熏於上焦故喉口生瘡也

時氣喉咽痛候

陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於咽喉故痛或生瘡也

瘡也

都氣經辨

卷九



南京中医药大学图书馆版权所有

時氣發斑候

夫熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬言語此爲表虛裏實熱氣躁於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開泄更增斑爛表虛故也

時氣毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱毒乘虛上衝於目故赤痛或生翳赤白膜息肉及瘡也

時氣毒攻手足候

熱毒氣從藏府出攻於手足手足則焮熱赤腫疼痛也人五藏

六府井榮俞皆出於手足指故此毒從內而出也

時氣胞瘡候

夫表虛裏實熱毒內盛則多發胞瘡重者周匝遍身其狀如火瘡若根赤頭白者則毒輕若色紫黑則毒重其瘡形如登豆亦

名登豆瘡

時氣瘡瘍候

夫病新瘥血氣未復皮膚尙虛疏而觸冒風日則徧體起細瘡瘙痒如癬疥狀名爲逸風

時氣蠱候

毒氣結在腹內穀氣衰毒氣盛三蟲動作食人五藏多令洩利  
下部瘡痒若脣內生瘡但欲寐者此蟲食下部也重者肛爛見  
五藏也

時氣熱利候

此由熱氣在於腹胃挾毒則下黃赤汁也

時氣膿血利候

此由熱傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁壯熱而腹疼  
痛此濕毒氣所爲也

時氣匿利候



南京中医药大学图书馆版权所有

夫熱蓄在藏多令人下利若毒氣盛則變膿血因而成匿匿者  
蟲食人五藏及下部也若食下部則令穀道生瘡而下利名爲  
匿利若但生瘡而不利者爲匿也

時氣大便不通候

此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾結熱在內  
大便不通也

時氣小便不通候

此由汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通也

時氣陰陽毒候

此謂陰陽二氣偏虛則受於毒若病身重腰脊痛煩悶面赤斑  
出咽喉痛或下利狂走此爲陽毒若身重背強短氣嘔逆脣青  
面黑四肢逆冷爲陰毒或得病數日變成毒者或初得病便有  
毒者皆宜依證急治失候則殺人

時氣變成黃候

夫時氣病濕毒氣盛蓄於脾胃脾胃有熱則新穀鬱蒸不能消  
化大小便結澀故令身面變黃或如橘柚或如桃枝色

時氣變成瘧候

病後邪氣未散陰陽尙虛因爲勞事致二氣交爭陰勝則發寒

陽勝則發熱故令寒熱往來有時休作而成瘧

### 時氣敗候

此謂病後餘毒未盡形證變轉久而不瘥陰陽無復綱紀名爲

### 敗病

### 時氣勞復候

夫病新瘥者血氣尙虛津液未服因卽勞動更成病焉若言語思慮則勞於神梳頭澡洗則勞於力未堪勞而強勞之者生熱熱氣還經絡復爲病者名曰勞復

### 時氣食復候

夫病新瘥者脾胃尙虛穀氣未復若卽食肥肉魚鱠餅餌棗栗之屬則未能消化停積在於腸胃使脹滿結實因更發熱復爲病者名曰食復也

時氣病瘥後交接勞復候

夫病新瘥者陰陽二氣未和早合房室則令人陰腫入腹腹內痠痛名爲交接勞復

時氣病後陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人時氣病新瘥未平復而與之交接得病者名陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得

病者名曰陽易其婦人得病新瘥未平復而男子與之交接得  
病者名曰陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相  
感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體熱衝胷頭重不  
能舉眼中生眵四支拘急小腹疼痛手足拳皆卽死其亦有不  
卽死者病苦小腹裏急熱氣上衝胷頭重不欲舉百節解離經  
脈緩弱氣血虛骨髓竭使悒悒吸吸氣力轉少著牀不能搖動  
起居仰人或引歲月方死

時氣病後虛羸候

夫人榮衛先虛復爲邪熱所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽

竭盡虛邪始散真氣尙少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生眾病焉

時氣陰莖腫候

此由腎藏虛所致腎氣通於陰今腎爲熱邪所傷毒氣下流故令陰腫

時氣令不相染易候

夫時氣病者此皆因歲時不和溫涼失節人感乖戾之氣而生病者多相染易故預服藥及爲方法以防之

熱病諸候

凡二十八論

熱病候

熱病者傷寒之類也冬傷於寒至春變爲溫病夏變爲暑病暑病者熱重於溫也肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚腸滿痛手足躁不安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩冤善嘔頭痛面赤無汗至壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死脾熱病者先頭重煩痛煩心欲嘔身熱熱爭則腰痛腹滿泄兩領痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死肺熱病者先漸然起毛惡風舌上黃身熱熱爭則喘咳痺走脅應背不得大息頭痛不甚汗出而寒

丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死腎熱病者先腰痛脛酸苦渴  
數飲身熱熱爭則項痛而強脛寒骨且酸足下熱不欲言其項  
痛淖澹戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死肝熱病者左頰先赤  
心熱病者額先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱  
病者頤先赤凡病雖未發見其赤色者刺之名曰治未病一日  
汗不出大灌發者死二日泄而腹滿甚者死三日目不明熱不  
已者死四日老人嬰兒熱而腹滿者死五日汗不出嘔血者死  
六日舌本爛熱不已者死七日欬血衄血汗不出出不至足者  
死八日髓熱者死九日熱而瘡者死凡此者不可刺也熱病已



得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病者脈常盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗者生熱病七八日脈微小病者洩血口中乾一日半死脈代一日死熱病已得汗脈尚數躁而喘且復熱勿庸刺喘甚者死熱病七八日脈不躁躁不數後三日中有汗三日不汗四日死未嘗汗者勿庸刺也診人熱病七八日其脈微小口乾脈代舌焦黑者死診人熱病七八日脈不數不喘者當瘡之後三日溫汗不出者死熱病已得汗當熱不去者亦死不治也脈靜安者生脈躁者難治脈常躁靜此氣之極亦死也腹鞶常喘而熱不退者死

多汗脈虛小者生，聊實者死。養生方云：三月勿食陳薺，必遭熱

病。

熱病一日候

熱病一日，病在太陽。太陽主表，表謂皮膚也。病在皮膚之間，故頭項腰脊疼痛。

熱病二日候

熱病二日，陽明受病。病在肌肉，故肉熱；鼻乾，不得眠，故可摩膏火灸；發汗而愈。

熱病三日候

熱病三日諸陽相傳病訖病猶在表未入於藏故胷脇熱而耳聾故可發汗而愈

熱病四日候

熱病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣已入胷鬲其病喉乾腹滿故可吐而愈

熱病五日候

熱病五日少陰受病毒氣入腹內其病口舌乾而引飲故下而愈

熱病六日候



熱病六日厥陰受病毒氣入腸胃其人煩滿而陰縮故可下而愈

熱病七日候

熱病七日三陰三陽傳病訖病法當愈今病不除者欲爲再經病也再經者謂經絡重受病也

熱病八九日已上候

熱病八九日已上不解者皆由毒氣未盡所以病證不除也  
熱病解肌發汗候

此謂得病三日已還病發在表故宜發汗或病已經五六日然

其人喉口不焦乾心腹不滿又不引飲但頭痛身體壯熱脈洪大者此爲病證在表未入於藏故雖五六日猶須解肌發汗不可苟依日數輒取吐下苦一毫也風濕相合也

人熱病煩候

此由陽勝於陰熱氣獨盛否結於藏則三焦隔絕故身熱而煩

也

熱病煩候

夫熱病煩者此由表虛裏實熱氣盛則發瘡重者周而遍身若瘡色赤頭白則毒輕色紫黑則毒重其形如登豆故名登豆

瘡

熱病斑瘡候

夫病在表或未發汗或已發汗吐下後表證未解毒氣不散煩  
熱而渴渴而不能飲表虛裏實故身體發斑如錦文

熱病熱瘡候

人藏府虛實不調則生於客熱表有風濕與熱氣相搏則身體  
生瘡痒痛而膿汁出甚者一瘻一劇此風濕所爲也

熱病口瘡候

此由脾藏有熱衝於上焦故口生瘡也



熱病咽喉瘡候

上實下虛熱氣內盛熏於咽喉故生瘡也

熱病大便不通候

夫經發汗汗出多則津液少津液少則胃乾結熱在胃所以大便不通又有府藏自生於熱者此由三焦否隔脾胃不和蓄熱在內亦大便不通也

熱病小便不通候

熱在膀胱流於小腸熱盛則脾胃乾津液少故小便不通也

熱病下利候

熱氣攻於腸胃胃虛則下赤黃汁挾毒則成膿血

熱病匿候

熱氣攻於腸胃則穀氣衰所以三蟲動作食人五藏及下部重者肛爛見府藏

熱病毒攻眼候

肝藏開竅於目肝氣虛熱毒乘虛則上衝於目重者生瘡翳及赤白膜也

熱病毒攻手足候

夫熱病攻手足及人五藏六府井榮俞皆出於手足指今毒氣

從府藏而循於經絡攻於手足故手足指皆腫亦焮痛也

### 熱病嘔候

胃內有熱則穀氣不和新穀入胃與熱氣相搏胃氣不平故嘔或吐下已後藏虛亦令嘔也

### 熱病嘔候

伏熱在胃則令人胷滿胷滿則氣逆氣逆則嘔若大下已後飲水多胃內虛冷亦令嘔也

### 熱病口乾候

此由五藏有虛熱脾胃不和津液竭少故口乾也

熱病衄候

心藏傷熱所爲也心主血肺主氣開竅於鼻邪熱與血氣并故衄也衄者血從鼻出也

熱病勞復候

夫熱病新瘥津液未復血氣尙虛因勞動早勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也

熱病後沈滯候

凡病新瘥後食豬肉及腸血肥魚脂膩必大下利醫所不能復治也必至於死若食餅餌粢飴哺炙膾棗栗諸果物脯及牢實

難消之物胃氣尙虛弱不能消化必結熱復病還以藥下之



南京中医药大学图书馆版权所有

重刊巢氏諸病源候總論卷九終



南京中医药大学  
南京中医药大学图书馆版权所有

重刊巢氏諸病源候總論卷十

溫病諸候

凡三十四論

溫病候

經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃爲傷耳其傷於四時之氣皆能爲病而以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣焉卽病者爲傷寒不卽病者爲寒毒藏於肌骨中至春變爲溫病是以辛苦之人春夏必有溫病者皆由其冬時觸冒之所致也凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏

至日者爲病暑其冬復有非節之暖名爲冬溫毒與傷寒大異  
也有病溫者汗出輒復熱而脈躁病不爲汗衰狂言不能食病  
名爲何也曰病名曰陰陽交陰陽交者死人所以汗出者皆生  
於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪卻而  
精勝則當食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今由汗而輒  
復熱者是邪勝也汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此  
不稱其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不  
見一生雖愈必死凡皮膚熱甚脈盛躁者病溫也其脈盛而滑  
者汗且出也凡溫病人二三日身軀熱脈疾頭痛食飲如故脈

直疾八日死四五日頭痛脈疾喜吐脈來細十二日死此病不治八九日脈不疾身不痛目不赤色不變而反利脈來牒牒按不彈手時大心下鞠十七日死病三四日以下不得汗脈大疾

者生脈細小難得者死不治也下利腹中痛甚者死不治其湯熨針石別有正方存神攘辟今附於後

養生方導引法云常以雞鳴時存心念四海神名三遍辟百邪

小鬼令人不病

東海神名阿明

南海神名祝融

西海神名巨乘

北海神名禹強

又云存念心氣赤肝氣青肺氣白脾氣黃腎氣黑出周其身又兼辟邪鬼欲辟卻眾邪百鬼常存心爲炎火如斗煌煌光明則百邪不敢干之可以入溫疫之中

### 溫病一日候

溫病一日太陽受病諸陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間故頭項腰脊痛

### 溫病二日候

溫病二日陽明受病病在於肌肉故肉熱昇乾不得眠故可摩膏火灸發汗而愈

溫病三日候

溫病三日少陽受病故胷脇熱而耳聾三陽始傳病訖未入於藏故可發汗而愈

溫病四日候

溫病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣入胷鬲之內其病咽乾腹滿故可吐而愈

溫病五日候

溫病五日少陰受病毒氣入腹其病口熱舌乾而引飲故可下而愈

# 溫病六日候

溫病六日厥陰受病毒氣入腹胃其病煩滿而陰縮故可下而愈

## 溫病七日候

溫病七日病法當愈此是三陰三陽傳病竟故也今七日病不除者欲爲再經病也再經病者是經絡重受病也

## 溫病八日候

溫病八日已上病不解者或是諸經絡重受於病或經發汗吐下之後毒氣未盡所以病證不罷也

溫病九日已上候

溫病九日已上病不除者或初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於三陰所以停滯累日病證不罷皆由毒氣未盡表裏受邪經絡損傷府藏俱病也

溫病發斑候

夫人冬月觸冒寒毒者至春始發病病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天時溫暖人感乖戾之氣未卽發病至春又被積寒所折毒氣不得發泄至夏遇熱溫毒始發出於肌膚斑爛隱軫如錦文也

溫病煩候

此由陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心府而煩者則令人悶而欲吐若其胃內有燥糞而煩者則謬語而繞脅痛也

溫病狂言候

夫病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽爭而外弁於陽四支者諸陽之本也邪盛則四支實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親戚大熱遍身狂言而妄聞視也

溫病嗽候

邪熱客於胃府上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故令噦

溫病嘔候

胃中有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲水多胃虛冷亦爲嘔也

溫病嘔候

伏熱在胃令人胃滿胃滿則氣逆氣逆則嘔若大下後胃氣虛冷亦令致嘔

溫病渴候

熱氣入於腎藏腎藏惡燥熱盛則腎燥腎燥則渴引飲

溫病取吐候

溫病熱發四日病在胃鬲當吐之愈有得病一二日便心脅煩滿爲毒已入兼有痰實亦吐之

溫病變成黃候

發汗不解溫毒氣瘀結在胃小便爲之不利故變成黃身如橘色

溫病咽喉痛候

熱毒在於胃府三焦隔絕邪客於足少陰之絡下部脈不通熱

氣上攻喉咽故痛或生瘡也

溫病毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱毒乘虛上衝於目故赤痛重者生瘡翳也

溫病衄候

由五藏熱結所爲心主血肺主氣而開竅於鼻邪熱傷於心故衄者血從鼻出也

溫病吐血候

諸陽受邪熱初在表應發汗而不發致熱毒入深結於五藏內

有瘀血積故吐血也

溫病下利候

風熱入於腸胃故令洞泄若挾毒則下黃赤汁及膿血

溫病膿血利候

熱毒甚者傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁此由溫毒

氣盛故也

溫病大便不通候

脾胃有積熱發汗太過則津液少使胃乾結熱在內故大便不通也



南京中医药大学图书馆版权所有

溫病小便不通候

發汗後津液少膀胱有結熱移入於小腸故小便不通也

溫病下部瘡候

熱攻腸胃毒氣既盛穀氣漸衰故三蟲動作食人五藏則下部生瘡重者肛爛見府藏

溫病勞復候

謂病新瘥津液未復血氣尙虛因勞動早更生於熱熱氣還入經絡復成病也

溫病食復候



凡得溫毒病新瘥脾胃尙虛穀氣未復若食犬豬羊肉并腸血及肥魚炙脂膩食此必大下利下利則不可復救又禁食餅餌炙臘棗栗諸生果難消物則不能消化停積在於腸胃便脹滿結實大小便不通因更發熱復成病也非但雜食梳頭洗浴諸勞事等皆須慎之

溫病陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人溫病新瘥未平復而與之交接因得病者名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病雖瘥未平復男子與之交接得病

者名陰易若二男二女並不自相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體熱衝骨頭重不舉眼中生昧四支拘急小腹疼痛手足拳皆卽死其亦有卽不死者

者病苦小腹裏急熱上衝骨頭重不欲舉百節解離經脈緩弱氣血虛骨髓竭便悒悒吸吸氣力轉少著牀不能搖動起居仰人或引歲月方死

溫病交接勞復候

病雖瘥陰陽未和因早房室令人陰腫縮入腹腹疼痛名爲交接之勞復也

卷一  
溫病瘥後諸病候

謂其人先有宿疹或患虛勞風冷積聚寒疝等疾因溫熱病發汗吐下之後熱邪雖退而血氣損傷府藏皆虛故因茲而生諸病

溫病令人不相染易候

此病皆因歲時不和溫涼失節人感乖戾之氣而生病則病氣轉相染易乃至滅門延及外人故須預服藥及爲法術以防之

疫癘病諸候

凡三論

疫癘病候

其病與時氣溫熱等病相類皆由一歲之內節氣不和寒暑乖候或有暴風疾兩霧露不散則民多疾疫病無長少率皆相似如有鬼厲之氣故云疫癘病

養生方云封君達常乘青牛魯女生常乘駮牛孟子綽常乘駮馬尹公度常乘青驃時人莫知其名字爲誰故曰欲得不死當問青牛道士欲得此色駮牛爲上青牛次之駮馬又次之三色者順生之氣也云古之青牛者乃柏木之精也駮牛者古之神宗之先也駮馬者乃神龍之祖也云道士乘此以行於路百物之惡精疫氣之癘鬼將長揖之焉延年之道存念心氣赤肝氣

青肺氣白脾氣黃腎氣黑出周其身又兼辟邪鬼欲辟卻眾邪  
百鬼常存心爲炎火如斗煌煌光明則百邪不敢干之可以入  
溫疫之中

疫癘炮瘡候

熱毒盛則生炮瘡瘡周而遍身狀如火瘡色赤頭白者毒輕色  
黑紫黯者毒重亦名爲登豆瘡

瘴氣候

夫嶺南青草黃芒瘴猶如嶺北傷寒也南地暖故太陰之時草  
木不黃落伏蟄不閉藏雜毒因暖而生故嶺南從仲春訖仲夏

行青草



南京中医药大学图书馆版权所有

巢氏病源

卷一

重刊巢氏諸病源候總論卷十終



重刊巢氏諸病源候總論卷十一

瘧病諸候 凡十四論

瘧病候

夏日傷暑秋必病瘧瘧之發以時者此是邪客於風府循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以日作常晏也衛氣之行風府日下一節二十一日至尾骶二十二日下脊內注於伏衝伏衝脈其行九日出於缺盆之中其氣既上故其病稍早發其間日發者由邪氣內薄五藏橫連募原其道遠其氣



北京中医药大学图书馆版权所有

深其行遲不能日作故間日蓄積乃作夫衛氣每至於風府腠理而開開則邪入焉其衛氣日下一節則不當風府奈何然風府無常衛氣之所應必開其腠理氣之所舍則其病已風之與瘧也相與同類而風獨常在也而瘧特以時休何也由風氣留其處瘧氣隨經絡沈以內薄故衛氣應乃作陽當陷而不陷陰當升而不升爲邪所中陽遇邪則捲陰遇邪則緊捲則惡寒緊則爲慄寒慄相薄故名瘧弱乃發熱浮乃來出旦中旦發暮中暮發夫瘧其人形瘦皮必慄問曰病瘧以月一日發當以十五日愈設不愈月盡解

足太陽瘡令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱渴然後熱上  
汗而出難已刺郄中出血

足少陽瘡令人身體解倦寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕  
然熱多汗出其刺足少陽

足陽明瘡令人先寒灑淅灑淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日  
光火氣乃快然刺足陽明腳肤上

足太陰瘡令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔  
嘔已乃衰卽取之

足少陰瘡令人吐嘔甚久寒熱熱多寒少欲閉戶而處其病難

正

足厥陰瘡令人腰痛少腹滿小便不利如癃非癃狀也數小便意恐懼氣不足腸中悒悒刺足厥陰肺瘡者令人心寒寒甚熱間善驚如是有見者刺手太陰陽明

心瘡者令人煩心甚欲得清水乃寒多寒不甚熱刺手少陰肝瘡令人色蒼蒼然太息甚狀若死者刺足厥陰見血

脾瘡者令人疾寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰腎瘡令人灑灑腰脊痛宛轉大便難目眩徇徇然手足寒刺足

太陽少陰

胃瘧令人且病也善飢而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脈出血

肺病爲瘧乍來乍去令人心寒寒甚則熱發善驚如有所見此肺瘧證也若人本來語聲雄恍惚爾不亮拖氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此卽肺病聲之候也察觀疾表裏相應依源審治乃不失也

心病爲瘧者令人心煩其病欲飲清水多寒少熱若人本來心性和雅而急卒反於常倫或言未竟便住以手剔腳爪此人必死禍雖未及呼曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之



不可治者明而察之

肝病爲瘧者令人色蒼蒼然氣息喘悶戰掉狀如死者若人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未竟以手觸眼如有所思若不卽病禍必至矣此肝病聲之證也其人若虛則爲寒風所傷若實則爲熱氣所損陽則瀉之陰則補之

脾病爲瘧者令人寒腹中痛腸中鳴鳴已汗出若其人本來少於喜怒而忽反常瞋喜無度正言鼻笑不答於人此是脾病聲之候證不盈旬月禍必至也

腎病爲瘧者令人悽悽然腰脊痛而宛轉大便澀自掉不定手

足而寒若人本來不喜不怒忽然謇而好瞋怒反於常性此腎已傷雖未發覺是其候也見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手捫腹此是腎病聲之證虛實表裏浮沈清濁宜以察之逐以治之夫瘧脈者自弦弦數多熱弦遲多寒弦小緊者可下之弦遲者溫藥已脈數而緊者可發其汗宜針灸之脈浮大者不可針灸可吐之凡瘧先發如食頃乃可以治之過此則失時

溫瘧候

夫溫瘧與寒瘧安舍溫瘧者得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因遇大暑腦髓爍脈肉消

釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕出此病藏於腎其氣先從內出之於外如此則陰虛而陽盛則病衰而氣復反入人則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘡 瘡先寒而後熱此由夏傷於暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒寒之藏於腠理皮膚之中秋氣傷於風則病盛矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘡夫病瘡六七日但見熱者溫瘡矣

瘡瘍候

夫瘧瘧者夏傷於暑也其病秋則寒甚冬則寒輕春則惡風夏  
則多汗者然其蓄作有時以瘧之始發先起於毫末伸欠乃作  
寒慄鼓頸腰脊痛寒去則外內皆熱頭痛而渴欲飲何氣使然  
此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽升於陰則陰實陽  
虛陽明虛則寒慄鼓頸巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛陰氣  
勝勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則  
內熱內外皆熱則喘而渴欲飲此得之夏傷於暑熱氣盛藏之  
於皮膚之間腸胃之外此榮氣之所舍此令汗出空疏腠理開  
因得秋氣汗出遇風乃得之及以浴水氣舍於皮膚之內與衛

氣并居衛氣者晝日行陽此氣得陽如外出得陰如內薄是以日作其間日而作者謂其氣之舍寫內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作

間日瘡候

此由邪氣與衛氣俱行於六府而有時相失不相得故邪氣內薄五藏則道遠氣深故其行遲不能與衛氣偕出是以間日而作也

風瘡候

夫瘡皆生於風風者陽氣也陽主熱故衛氣每至於風府則腠

理開開則邪入邪入則病作先傷於風故發熱而後寒慄

癰瘡候

夫癰瘡者肺系有熱氣盛於身厥逆上下中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及之陰故但熱而不寒寒氣內藏於心而外舍分肉之間令人消鑠脫肉故命曰癰瘡其狀但熱不寒陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔也

山瘴瘡候

此病生於嶺南帶山瘴之氣其狀發寒熱休作有時皆由感溪

巢氏病源  
源嶺嶂濕毒氣故也其病重於傷暑之瘧

痰實瘧候

痰實瘧者謂患人脣鬲先有停痰結實因成瘧病則令人脹滿氣逆煩嘔也

寒熱瘧候

夫瘧者風寒之氣也邪并於陰則寒并於陽則熱故發作皆寒熱也

往來寒熱瘧候

此由寒氣并於陰則發寒風氣并於陽則發熱陰陽二氣更實



更虛故寒熱更往來也

補卷十一

寒瘡候

此由陰陽相并陽虛則陰勝陰勝則寒寒發於內而並於外所以內外俱寒故病發但戰慄而鼓頸顧也

勞瘡候

凡瘡積久不瘡者則表裏俱虛客邪未散真氣不復故疾雖暫

間小勞便發

瘡發作無時瘡候

夫衛氣一日一夜大會於風府則腠理開閉則邪入邪入則病

作當其時陰陽相并隨其所勝故生寒熱故動作皆有早晏者  
若府藏受邪內外失守邪氣妄行所以休作無時也

久瘧候

夫瘧皆由傷暑及傷風所爲熱盛之時發汗吐下過度府藏空虛榮衛傷損邪氣伏藏所以引日不瘥仍故休作也夫瘧歲歲發至三歲發連月發不解脇下有否治之不得攻其否但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者引衣自溫覆汗出小便自引利卽愈也

重刊巢氏諸病源候總論卷十一終

重刊巢氏諸病源候總論卷十二

黃病諸候

黃病候

黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後壯熱口裏有血當下之法如瘀肝狀其人少腹內急若其人眼睛澀疼鼻骨疼兩膊及項強腰背急卽是患黃多大便澀但令得小便快卽不慮死不用大便多多卽心腹脹不存此由寒濕在表則熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏煩鬱不得消則大小便不通故身體面目皆變黃色凡黃候其寸口近掌無脈口鼻冷氣並不

可治也

急黃候

脾胃有熱穀氣鬱蒸因爲熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也有得病卽身體面目發黃者有初不知是黃死後乃身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃也

黃汗候

黃汗之爲病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染衣正黃如蘖汁其脈自沈此由脾胃有熱汗出而入水中浴若水入汗孔中得成黃汗也

犯黃候

有得黃病已瘥而將息失宜飲食過度犯觸禁忌致病發名爲犯黃候

勞黃候

脾藏中風風與瘀熱相搏故令身體發黃額上黑微汗出手足中熱薄暮發膀胱急四支煩小便自利名爲勞黃

腦黃候

熱邪在骨髓而腦爲髓海故熱氣從骨髓流入於腦則身體發黃頭腦痛眉疼名爲腦黃候

陰黃候

陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名爲陰黃

內黃候

熱毒氣在脾胃與穀氣相搏熱蒸在內不得宣散先心腹脹滿氣急然後身面悉黃名爲內黃

行黃候

瘀熱在脾藏但肉微黃而身不甚熱其人頭痛心煩不廢行立名爲行黃

辨黃候

辨應作癬

氣水飲停滯結聚成癖因熱氣相搏則鬱蒸不散故脇下滿痛而身發黃名爲癖黃

噤黃候

心脾二藏有瘀熱所爲心主於舌脾之絡脈出於舌下若身滿發黃舌下大脈起青黑色舌噤強不能語名爲噤黃也

五色黃候

凡人著黃五種黃皆同其人至困冥漠不知東西者看其左手脈名手肝脈兩筋中其脈如有如無又看近手屈肘前臂上當

有三歧脈中央者名爲手肝脈兩廂者名歧脈看時若干脈全無兩廂壞其人十死一生難可救濟若中央脈近掌三指道有如不絕其人必不死脈經三日漸徹至手掌必得汗汗罷必愈婦人患黃看右手脈眼青黃視其瞳子青脈亦青面色青者是其由脾移熱於肝肝色青也其人身熱而發黃赤視其眼赤高視心腹脹滿脈赤便是此由脾移熱於心心色赤故其人身熱而發赤黃不可治治之難差其人身熱發黃白視其舌下白垢生者是此由脾移熱於肺肺色白也其人身熱發黑黃視其脣黑眼黃舌下脈黑者是此由脾移熱於腎腎色黑也故其身熱

而發黃也

風黃候

凡人先患風濕復遇冷氣相搏則舉身疼痛發熱而體黃也

因黃發血候

此由脾胃大熱熱傷於心心主於血熱氣盛故發黃而動熱故  
因名爲發血

夫黃因黃發痢候

此由瘀熱在於脾胃因而發黃挾毒卽下痢故名爲發痢

此熱因黃發瘡候

此病由熱傷於心主血熱盛則血隨大便而下名爲血痔

因黃發癖候

夫黃病皆是大熱所爲熱盛之時必服冷藥冷藥多則動舊癖

因黃發病後小便澀兼石淋候

黃病後小便澀兼石淋發黃疸此皆由蓄熱所爲熱流小腸小便澀少而痛下物如沙石也

因黃發吐候

黃病吐下之後胃氣虛冷其人宿病有寒飲故發吐

黃疸候

黃疸之病此由酒食過度府藏不和水穀相并積於脾胃復爲風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如飢令身體面目及爪甲小便盡黃而欲安臥若身體多赤黑多青皆見者必寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也渴而疸者其病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱

酒疸候

夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃內生熱因大醉當風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑若下之久

久變爲黑疸面目黑心中如噉蒜齧狀大便正黑皮膚爪之不  
仁其脈浮弱故知酒疸心中熱欲嘔者當吐之則愈其小便不  
利其候當心中熱足下熱是其候證明也脈浮先吐之沈弦先  
下之

### 穀疸候

穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣  
衝熏所致陽明病脈遲食難因飽飲者則發煩頭眩者必小便  
難此欲爲穀疸雖下之其腹必滿其脈遲故也

### 女勞疸候

女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大  
熱而交接交接竟入水所致也

### 黑疸後

黑疸之狀若小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是夫  
黃疸酒疸女勞疸久久多變爲黑疸

### 九疸候

夫九疸者一曰胃疸二曰心疸三曰腎疸四曰腸疸五曰膏疸  
六曰舌疸七曰體疸八曰肉疸九曰肝疸凡諸疸病皆由飲食  
過度醉酒勞傷脾胃有瘀熱所致其病身面皆發黃但立名不

同耳

胞疽候

胞疽之病小腸有熱流於胞內故大小便皆如糞汁此爲胞疽

風黃疽候

夫風濕在於府藏與熱氣相搏便發於黃卽小便或赤或白好  
臥而心振面虛黑名爲風黃疽

濕疽候

濕疽病者脾胃有熱與濕氣相搏故病苦身體疼面目黃小便  
不利此爲濕疽

自古黃疽無藥矣小朝斷意小丸藥由大柴大

冷熱病諸候 凡七論

病熱候

夫患熱者皆由血氣有虛實邪在脾胃陽氣有餘陰氣不足則風邪不得宣散因而生熱熱搏於府藏故爲病熱也診其脈關上浮而數胃中有熱滑而疾者亦爲有熱弱者無胃氣是爲虛熱跗陽脈數者胃中有熱熱則消穀引食跗陽脈龐而浮者其病難治若病者發熱身體疼痛此爲表有病其脈自當浮今脈反沈而遲故知難差其人不卽得愈必當死以其病與脈相反故也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云偃臥合兩膝布兩足而生腰口內氣振腹七  
息除壯熱疼痛通兩脰不隨

又云覆臥去枕立兩足以鼻內氣四十所復以鼻出之極令微  
氣入鼻中勿令鼻知除身中熱背痛

又云兩手卻據仰頭向日以口內氣因而咽之數十除熱身中

傷死肌

客熱候

客熱者由人府藏不調生於虛熱客於上焦則胷鬲生痰實口  
苦舌乾客於中焦則煩心悶滿不能下食客於下焦則大便難



小便赤澀

冷熱候

夫虛邪在於內與衛氣相搏陰勝者則爲寒真氣去去則虛虛則內生寒視其五宮色白爲有寒診其脈遲則爲寒緊則爲寒濶遲爲寒微者爲寒遲而緩爲寒微而緊爲寒寸口虛爲寒其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云一足向下踏地一足長舒向前極勢手掌四方取勢左右換易四七去腸冷腰脊急悶骨疼令使血氣上下

布潤

又云兩足相合兩手仰捉兩腳向上急挽頭向後振勢極三七  
欲得努足手兩向舒張身手足極勢二七去竅中生百病下部

虛冷

又云父跌兩手反向拓席漸漸向後努齊腹向前散氣待火急  
還放來去二七去齊下冷腳疼五藏六府不和

又云兩手向後拓腰蹙髀極勢左右轉身來去三七去腹肚臍  
冷兩髀急曾按不和

又云牙跪兩手向後手掌合地出氣向下始漸漸向下覺腰脊  
大悶還上來去二七身正左右散 骨腰三七去臍下冷解谿

內疼痛

寒熱候

夫陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒陽者受氣於上焦以溫皮膚分肉之間令寒氣在外則上焦不通不通則寒獨留於外故寒慄也陰虛內生熱者有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熏胸中故內熱也陽盛而外熱者上焦不通利皮膚緻密腠理閉塞不通衛氣不得泄越故外熱也陰盛而內寒者厥氣上逆寒氣積胸中而不寫不寫則溫氣去寒獨留則血渙泣血渙泣則脈不通其脈不通脈



則盛大以濇故陰陽之要陰密陽固若兩者不和若春無秋若  
冬無夏因而和之是謂聖度故陽強不能陰氣乃絕因於露風  
乃生寒熱凡小骨弱肉者善病寒熱骨寒熱病無所安汗出不  
休齒本槁取其少陰於陰股之絡齒爪槁死不治診其脈沈細  
數散也

### 寒熱往來候

夫寒氣并於陰則發寒陽氣并於陽則發熱陰陽二氣虛實不  
調故邪氣更作寒熱往來也脈緊而數寒熱俱發必當上乃愈  
脈急如弦者邪入陽明寒熱脾脈小甚爲寒熱

養生方云已醉飽食發寒熱也

冷熱不調候

夫人榮衛不調致令陰陽否塞陽并於上則上熱陰并於下則下冷上焦有熱或喉口生瘡曾鬲煩滿下焦有冷則腹脹腸鳴絞痛泄痢

寒熱厥候

夫厥者逆也謂陰陽二氣卒有衰絕逆於常度若陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥熱厥之爲熱也必起於足下者陽起於五指之表集於足下而聚於足心故也故陽勝則足



下熱熱厥者酒入於胃則絡脈滿而經脈虛脾主爲胃行其津液陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營其四支此人心數醉若飽已入房氣聚於脾中未得散酒氣與穀氣相并熱起於內故遍於身內熱則尿赤夫酒氣盛而慄悍腎氣有衰陽氣獨勝故手腳爲之熱寒厥之爲寒必從五指始上於膝下陰氣起於五指之裏集於膝下聚於膝上故陰氣勝則五指至膝上寒其寒也不從外皆從內寒寒厥何失而然陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也春夏則陽氣多而陰氣衰秋冬陰氣盛而陽氣衰此人身質壯以秋冬奪其所

用下氣上爭未能復精氣溢下邪氣因從之而上氣因於中陽  
氣衰不能添榮其經絡故陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒  
夫厥者或令人腹滿或令人暴不知人或半日遠至一日乃知  
人者此由陰氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂  
則不知人太陽之厥踵首頭重足不能行發爲晦仆陽明之厥  
則癲疾欲走則呼腹滿不臥臥則面赤而熱妄見妄言少陽之  
厥則暴聾頰腫胸熱脹痛慄此不可以運太陰之厥腹滿脹脹  
後不利以不欲食食之則嘔不得臥也少陰之厥者則舌乾尿  
赤腹滿心痛厥陰之厥者少腹脹痛脹脹不利好臥屈膝陰縮

腫脹外熱其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後  
養生方導引法云正偃臥展兩足鼻內氣自極搖足三十過止  
除足寒厥逆也

重刊巢氏諸病源候總論卷十二終



重刊巢氏諸病源候總論卷十三

氣病諸候

上氣候

夫百病皆生於氣故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收聚熱則腠理開而氣泄憂則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同怒則氣逆甚則嘔血及食而氣逆上也喜則氣和榮衛行通利故氣緩焉悲則心系急肺布葉舉使上焦不通榮衛不散熱氣在內故氣消也恐則精卻精卻則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行寒則經絡渙澀故氣收聚也熱則腠



理開竅榮衛通故汗大泄也憂則心無所寄神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘且汗外內迅故氣耗矣思則身心有所止氣留不行故氣結矣診寸口脈伏腎中逆氣是諸氣上衝腎中故上氣而附腫體息其脈浮大不治上氣脈躁而喘者屬肺肺脹欲作風水發汗愈脈洪則爲氣其脈虛寧伏匿者生牢强者死喘息低仰其脈滑手足溫者生也濇而四末寒者死也數者死也謂其形損故

養生方云飲水勿急咽久成氣病其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云兩手向後合手拓腰向上急勢振搖臂肘來去七始得手不移直向上向下盡勢來去二七去脊心肺氣壅悶散消正坐並膝頭足初坐先足指相對足跟外扒坐止少欲

安穩須兩足跟向內相對坐足指外扒覺悶痛漸漸舉身似款便坐足上待共內坐相似不痛始雙豎腳跟向上坐上足指並反向外每坐常覺去膀胱內冷膝風冷足疼上氣腰痛盡自消適也

又云兩足兩指相向五息正引心肺去厥逆上氣極用力令兩足相向意止引肺中氣出病人行肺內外展轉屈伸隨無有違

逆

卒上氣候

肺主於氣若肺氣虛實不調或暴爲風邪所乘則府藏不利經絡否澀氣不宣和則上氣也又因有所怒則氣卒逆上甚則變嘔血氣血俱傷其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手交叉頸下自極致補氣治暴氣咳以兩手交頸下各把兩頸脈以頸句交中急牽來著喉骨自極三通致補氣充足治暴氣上氣寫喉等病令氣調長音聲弘亮

上氣鳴息候



肺主於氣邪乘於肺則肺脹脹則肺管不利不利則氣道澀故氣上喘逆鳴息不通診其肺脈滑甚爲息奔上氣脈出魚慄者主喘息其脈滑者生駛者死也

上氣喉中如水鷄鳴候

肺病令人上氣兼胷鬲痰滿氣行壅滯喘息不調致咽喉有聲如水鷄之鳴也

奔氣候

夫氣血循行於經絡周而復始皆有常度肺爲五藏上蓋主通行於府藏之氣若肺受邪則氣道不利氣道不利則諸藏氣壅

則失度故氣奔急也

### 賁豚氣候

夫賁豚氣者腎之積氣起於驚恐憂思所生若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志傷動氣積於腎而直下遊走如豚之奔故曰賁豚其氣乘心若心中踴躍如車所驚如人所恐五藏不定食飲輒嘔氣滿胷中狂癡不定妄言妄見此驚恐賁豚之狀若氣滿支心心下悶亂不欲聞人聲休作有時乍瘥乍極吸吸短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔此憂思賁豚之狀診其脈來觸祝觸祝者病賁豚也腎脈微急沈厥賁豚



其足不收不得前後

上氣嘔吐候

肺主於氣肺爲邪所乘則上氣此爲鬲內有熱胃間有寒寒從胃上乘於肺與鬲內熱相搏故乍寒乍熱而上氣上氣動於胃胃氣逆故嘔吐也

上氣腫候

肺主於氣候身之皮毛而氣之行循環藏府流通經絡若外爲邪所乘則膚腠閉密使氣內壅與津液相并不得泄越故上氣而身腫也

集解  
卷之二  
結氣候

結氣病者憂思所生也心有所存神有所止氣留而不行故結於內

養生方云哭泣悲來新哭訖不用卽食久成氣病其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云坐生腰舉左手仰其掌卻右臂覆右手以鼻內氣自極七息息間稍頓右手除兩臂背痛結氣

又云端坐生腰舉左手仰掌以右手承右脇以鼻內氣自極七息除結氣

又云兩手拓肘頭杜席努肚上極勢待大悶始下來去上下五  
七去脊背體內疼骨節急強肚腸宿氣行忌太飽不得用肚編  
也

### 冷氣候

夫藏氣虛則內生寒也氣常行府藏府藏受寒冷卽氣爲寒冷  
所并故爲冷氣其狀或腹脹或腹痛甚則氣逆上而面青手足  
冷

### 七氣候

七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣憂氣喜氣愁氣凡七氣積聚牢大

如杯若拌在心下腹中疾痛欲死飲食不能時來時去每發欲死如有禍狀此皆七氣所生寒氣則嘔吐惡心熱氣則說物不章言而遑怒氣則上氣不可忍熱上搶心短氣欲死不得氣息也恚氣則積聚在心下不可飲食憂氣則不可極作暮臥不安席喜氣卽不可疾行不能久立愁氣則喜忘不識人置物四方還取不得去處若聞急卽手足筋攣不舉

### 九氣候

九氣者謂怒喜悲恐寒熱憂勞思因此九事而傷動於氣一曰怒則氣逆甚則嘔血及食而氣逆也二曰喜則其氣緩榮衛通



利故氣緩三曰悲則氣消悲則使心系急肺布葉舉使上焦不通熱氣在內故氣消也四曰恐則氣下恐則精卻精卻則上焦閉閉則氣還氣還則下焦脹故氣不行五曰寒則氣收聚寒便經絡渙澀使氣不宣散故也六曰熱則腠理開腠理開則榮衛通汗大泄七曰憂則氣亂氣亂則心無所寄神無所歸慮無所定故氣亂八曰勞則氣耗氣耗則喘且汗外內皆越故氣耗也九曰思則氣結氣結則心有所止故氣留而不行眾方說此九氣互有不同但氣上之由有九故爲九氣類也

短氣候

平人無寒熱短氣不足以息者體實實則氣盛盛則氣逆不通  
故短氣又肺虛則氣少不足亦令短氣則其人氣微常如少氣  
不足以呼吸診其脈尺寸俱微血氣不足其人短氣寸口脈沈  
胷中短氣脈前小後大則爲胷滿短氣脈洪大者亦短氣也

### 五鬲氣候

五鬲氣者謂憂鬲恚鬲氣鬲寒鬲熱鬲也憂鬲之病胷中氣結  
煩悶津液不通飲食不下羸瘦不爲氣力恚鬲之爲病心下苦  
實滿噫輒酢心食不消心下積結牢在胃中大小便不利氣鬲  
之爲病胷脇逆滿咽塞鬲不通噫聞食臭寒鬲之爲病心腹

脹滿咳逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛食不消不能食肥熱鬲之爲病藏有熱氣五心中熱口中爛生瘡骨煩四支重脣口乾燥身體頭面手足或熱腰背皆疼痛胃脾引背食不消不能多食羸瘦少氣及癖也此是方家所說五鬲形證也經云陽脈結謂之鬲言憂恚寒熱動氣傷神而氣之與神並爲陽也傷動陽氣致陰陽不和而府藏生病結於胷鬲之間故稱爲鬲氣眾方說五鬲互有不同但傷動之由有五故云五鬲氣

夫逆氣者因怒則氣逆甚則嘔血及食而氣逆上人有逆氣不

育不逆氣候

出自而當首不前屈屈而當首皆育視其不

得臥而息有音者有起居如故而息有音者有得臥行而喘者  
有不能臥不能行而喘者有不能臥而喘者皆有所起其不  
得臥而息有音者是陽明之逆足三陽者下行今逆而上行故  
息有音陽明者爲胃脈也胃者六府之海其氣亦下行陽明逆  
氣不得從故不得臥夫胃不和則臥不安此之謂也夫起居有  
如故而息有音者此肺之絡逆絡脈之氣不得隨經上下故留  
經而不行此絡脈之病人起居如故而息有音不得臥而則喘  
者是水氣之客夫水者循津液而流也腎者水藏主津液津液  
主臥而喘診其脈趺陽脈太過則令人逆氣背痛溫溫然寸口

脈伏背中，有逆氣關上，脈細，其人逆氣腹痛，脹滿，其湯熨針石，別有正方補養宣導，今附於後。

養生方導引法云：以左足踵拘右足拇指，鼻內氣自極，七息除癆逆氣。

### 厥逆氣候

厥者逆也。謂陰氣乘於陽，陰氣居於下，陽氣處於上，陽虛則陰實，實則陰盛。陰盛則上，乘於陽，衛氣爲之厥逆。失於常度，故寒從背起，手足冷逆。陰盛故也。

### 少氣候

此由藏氣不足故也肺主於氣而通呼吸藏氣不足則呼吸微弱而少氣腎痛少氣者水在藏府水者陰氣陰氣在內故生氣診右手寸口脈陰實者肺實也若少氣腎內滿彭彭與搏相引脈來濡者虛少氣也左手關上脈陰陽俱虛者足厥陰少陽俱虛也病苦少氣不能言右手關上脈陰陽俱虛者足太陰陽明俱虛也病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒脈弱者少氣皮膚寒脈小者少氣也

遊氣候

夫五藏不調則三焦氣滿滿則氣遊於內不能宣散故其病但

煩滿虛脹

胷脇支滿候

肺之精氣在於右脇肝之積氣在於左脇二藏虛實不和氣蓄於內故胷脇支滿春脈不及令人胷痛引背下則兩脇脹滿寸口脈滑爲陽實胷中逆滿也

夫虛上氣胷脇支滿候  
寒冷在內與藏府相搏積於脇下冷乘於氣氣則逆上衝於胷脇故上氣而胷脇支滿

久寒胷脇支滿候

陰氣積於內久而不已則生寒寒氣與藏氣相搏衝於胃腸故

支滿

乏氣候

夫虛極之人榮衛減耗府藏虛弱氣行不足所以呼吸氣短也

走馬奔走及人走乏飲水得上氣候

夫走馬及人走則大動於氣氣逆於胃內未得宣散而又飲水  
水搏於氣故有上氣

食熱餅觸熱飲水發氣候

夫食熱皆觸動肺氣則熱聚肺間熱氣未歇而飲冷水水入於

肺冷熱相搏氣聚不宣爲冷所乘故令發氣

氣分候

夫氣分者由水飲搏於氣結聚所成氣之流行常無壅滯若停積水飲搏於氣則氣分結而住故云氣分

腳氣病諸候 凡八論

腳氣緩弱候

凡腳氣病皆由感風毒所致得此病多不卽覺或先無他疾而忽得之或因眾病後得之初甚微飲食嬉戲氣力如故嘗熟察之其狀自膝至腳有不仁或若痺或淫淫如蟲所喙或腳指及

膝脛灑灑爾或腳屈弱不能行或微腫或酷冷或痠疼或緩縱  
不隨或攣急或至困能飲食者或有不能者或見飲食而嘔吐  
惡聞食臭或有物如指發於蹊腸逕上衝心氣上者或舉體轉  
筋或壯熱頭痛或胷心衝悸寢處不欲見明或腹內苦痛兩兼  
下者或言語錯亂有善忘誤者或眼濁精神昏憊者此皆病之  
證也若治之緩便上入腹入腹或腫或不腫胷脇滿氣上便殺  
人急者不全月緩者或一二月初得此病便宜速治之不同  
常病病既入藏其脈有三品內外證候相似但脈有異耳若病  
人脈得浮大急緩宜服續命湯兩劑若風盛宜作越婢湯加尤

四兩若脈轉駛而緊宜服竹瀝湯脈微而弱宜服風引湯二三  
劑此皆多是因虛而得若大虛乏氣短可其間作補湯隨病體  
之冷熱而用若未愈更作竹瀝湯若病人脈浮大而緊駛此是  
三品之最惡脈脈或沈細而駛者此脈正與浮大緊者同是惡  
脈浮大者病在外沈細者病在內治亦不異當消息以意耳其  
形或尚可而手腳未及至弱數日之內上氣便死如此之脈急  
服竹瀝湯日一劑湯勢恆令相及勿令半日之內無湯也若服  
竹瀝湯得下者必佳竹汁多服之皆須熱服不熱停在胃鬲更  
爲人患若已服數劑病及脈勢未折而若脹滿者可以大鱉甲

湯下之湯勢盡而不得佳下可以丸藥助令得下下後更服竹  
瀝湯趣令脈勢折氣息料理乃佳江東嶺南土地卑下風濕之  
地易傷於人初得此病多從下上所以腳先屈弱然後毒氣循  
經絡漸入府藏府藏受邪氣便喘滿以其病從腳起故名腳氣  
其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云坐兩足長舒自縱身內氣向下使心內柔和  
適散然後屈一足安膝下努長舒一足仰取指向上便急仰眠  
頭不至席兩手急努向前頭向上努挽一時各各取勢來去二  
七遞互亦然去腰疼腰髀冷血冷風痺日日漸損

又云覆臥傍視內踵生腰以鼻內氣目極七息除腳中弦痛轉筋腳酸疼腳痺弱

又云舒兩足坐散氣向湧泉可三通氣徹倒始收右足屈捲將兩手急捉腳湧泉挽足踏手挽一時取勢手足用力逆氣向下三七不失氣數尋去腎內冷氣膝冷腳疼也

又云一足屈之足指仰使急一足安膝頭心散心兩足跟出氣向下一手拓膝頭向下急捺一手向後拓席一時極勢左右亦然二七去膝髀疼急

又云一足踏地一足向後將足解谿安踏上急努兩手偏相向

後側身如轉極勢二七左右亦然去足疼痛痺急腰痛也

腳氣上氣候

此由風濕毒氣初從腳上後轉入腹而乘於氣故上氣也  
腳氣痺弱候

此由血氣虛弱若受風寒濕毒與血并行膚腠邪氣盛正氣少  
故血氣澀澀則痺虛故令痺弱也

腳氣疼不仁候

此由風濕毒氣與血氣相搏正氣與邪氣交擊而正氣不宣散  
故疼痛邪在膚腠血氣則澀澀則皮膚厚搔之如隔衣不覺知

是名爲不仁也

腳氣痺攣候

腳氣之病有挾風毒風毒則搏於筋筋爲攣風濕乘於血則故令痺攣也

腳氣心腹脹急候

此由風濕毒氣從腳上入於內與藏氣相搏結聚不散故心腹脹急也

腳氣腫滿候

此由風濕毒氣搏於腎經腎主於水今爲邪所搏則腎氣不能

宣通水液水液不傳於小腸致壅溢府藏府藏既浸漬於皮膚之間故腫滿也

腳氣風經五藏驚悸候

夫溫濕成腳氣而挾風毒毒少風多則風證偏見風邪之來初客膚腠後經府藏藏虛乘虛而入經遊五藏與神氣相搏神氣爲邪所乘則心驚悸也