

宛平趙賢齊編述

中國實用藥物學

中國醫藥研究會出版

# 女界寶

## 育兒法



彩面洋裝一冊

本書分為三編凡十六章敘述  
生殖之原理妊娠之心得嬰  
兒之保護手續

均為前人所  
未曾道及都三萬

餘言附圖十餘幅家庭預  
備此編誠可為嬰兒之福音也

定價大洋八角

上海棋盤街中市

### 廣益書局發行

宛平趙賢齊編述

中國實用藥物學

中國醫藥研究會出版



衛生新書

女醫者

洋裝厚面一厚冊  
定價大洋四角

說明且均有治療及預防之方法可以隨時檢查女界得此洵保護軀體健康之秘笈也

男女婚姻衛生寶鑑

洋裝厚面一厚冊  
定價大洋一元  
是書實集東西各國  
新籍二十餘種擇其  
中之有關青年男女  
衛生之學說分門別  
類撰要譯錄間附以  
吾國舊有關於男女  
衛生之學說融會貫  
通以資考鏡其有裨  
於實用者良多增附  
精圖數則購者從速  
為快

最新育兒法

洋裝厚面一厚冊  
定價大洋八角  
本書分為三編凡  
十六章叙述生理  
之原理產後之心  
得嬰兒之保護手  
續均為前人所未  
曾道及都三萬餘  
言附圖十餘幅家  
庭預備此編誠可  
為嬰兒之福音也

各病治療催眠衛生

洋裝厚面一厚冊  
定價大洋八角  
本書凡二十章發  
明新新之心理學  
生理學并推考暗  
示之學術演述試  
驗之法門具微妙  
諦確有真鑿醫學  
家得此書而觀摩  
斯專權奇驗如操  
左券

全書共數十萬言所載最新療病諸法不下  
數千則皆根究最新醫理作為問答體凡一  
切疑難雜症及男女衛生之必要莫不切實

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

不利。有得心應手之妙。

一是書不專為醫者而設。即鄉僻小區。一時難以求醫。或遇醫不明。鮮不受誤者。倘人人手置一編。以備緩急。未始非衛生之一助耳。

一編者學淺才疏。遺漏難免。所願海內諸君子。有以教正。非獨啟人之幸也。

一是書祇求實用。不尚浮詞。字句間不免粗陋。尚望閱者諒之。編者識。

中國實用藥物學卷首

總論

一 凡藥色青入肝。色赤入心。色黃入脾。色白入肺。色黑入腎。

二 凡藥味酸入肝。味苦入心。味甘入脾。味辛入肺。味鹹入腎。

三 凡藥酸者。能瀉。能收。苦者。能瀉。能燥。能堅。甘者。能補。能和。能緩。辛者。能散。能潤。能橫行。鹹者。能下。能軟。堅。淡者。能利竅。能滲泄。

四 凡藥氣燥入肝。氣焦入心。氣香入脾。氣腥入肺。氣腐入腎。

五 酸傷筋。苦傷氣。甘傷肉。辛傷皮。毛。鹹傷血。

六 多食酸。則脈凝滯。而色變。多食苦。則皮槁。而毛拔。多食辛。則筋急。而爪枯。多食

七 鹹則肉胝。膈而唇揭。多食甘。則骨痛而髮落。

凡藥在土中者。中半以上為根。其氣上行。病在中上。焦者用之。中半以下為梢。其氣下行。病在中下。焦者用之。藥出土者。中半以上為苗。其氣味上升。中半以下為身。為幹。其氣味中守。下達咸宜。藥之為枝者。達四肢。為皮者。達皮膚。為心為幹者。內行臟腑。質之輕者。上入心肺。重者。下入肝腎。中空者。發表。內實者。攻裏。枯燥者。入氣分。潤澤者。入血分。

八 藥有以形名者。人參是也。有以色名者。黃連是也。有以氣名者。香薷是也。有以味名者。甘草是也。有以質名者。石膏是也。有以時名者。夏枯草是也。有以功效名者。骨碎補是也。

九 藥有畏惡相反。所謂畏者。畏其制我。不得自縱。所謂惡者。惡其異我。不能自盡。所謂相反者。各懷酷毒。兩仇不共。共則必害事也。

十 風淫於內。治以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以辛散之。濕淫於內。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。熱淫於內。治以寒鹹。佐以苦甘。以酸收之。以苦發之。火淫於內。治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。燥淫於內。治以苦溫。佐以

甘辛。以苦下之。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。十一。凡藥酒製升提。薑製溫散。入鹽走腎而軟堅。入醋注肝而收斂。童便製除劣性。而降下。米泔製去燥性而和平。乳製潤枯生血。蜜製甘緩益元。黑豆甘草湯漬。並解毒。羊酥猪脂塗燒成滲骨。容易脆斷。去穰者免脹。去心者除煩。

十二。凡病在上。先食而後藥。病在下。先藥而後食。病在四肢。宜饑服。而在晝。病在骨髓。宜飽服。而在夜。

十三。凡用丸藥之法。去下焦之病。其丸極大光而圓。治中焦者次之。治上焦者。則甚小。稠糊麩丸者。取其遲化。直達下焦。或酒或醋者。取其收散之意也。用半夏南星者。取其去濕也。以薑汁煮糊為丸者。制其毒也。稀糊為丸。或水浸一宿。炊餅為丸。及滴水為丸者。皆取其易化也。煉蜜為丸者。取其遲化。而氣循經絡也。用蠟為丸者。取其難化。而旋施功也。大抵湯者。蕩也。去久病者用之。散者。散也。去急病者用之。丸者。緩也。不能速去其病。用藥舒緩治之者也。



# 藥

## 補益藥表散藥

性温

黃芪。炙草。白朮。遠志。當歸。茯苓。覆盆子。沙苑。杜仲。白扁豆。鹿茸。紫河車。熟地。五味子。山萸。

性寒

人參。沙參。冬瓜仁。龜甲。鼈甲。白芍。生地。苡仁。牡蠣。

性平

玉竹。石斛。菟絲。茯苓。茯神。柏仁。枸杞。酸棗仁。女貞子。大棗。胡桃。龍眼肉。山藥。百合。阿膠。桑螵蛸。牛膝。蓮子。芡實。

性温

蒼朮。桔梗。獨活。羌活。防風。藁本。白芷。細辛。麻黃。荆芥。紫蘇。天麻。川芎。香薷。桂枝。五加皮。陳皮。葱白。虎骨。青皮。

性寒

前胡。薄荷。鈎藤。蔓荊子。淡豆豉。蟬蛻。連翹。大青。竹葉。

性平

菊花。柴胡。殭蠶。全蠍。葛根。柴胡。升麻。秦艽。

攻裏藥 理氣藥

性温 使君子。厚朴。檳榔。皂角刺。莪朮。益母。山查。穀芽。麥芽。神麩。青皮。  
 萊服子。白芥子。海螵蛸。

性寒 大黃。枳實。芒硝。瞿麥。元明粉。穿山甲。

性平 三稜。牛膝。琥珀。桃仁。

性温 菖蒲。旋覆花。桔梗。川芎。延胡。姜黃。莪朮。砂仁。白蔻。草蔻。肉蔻。木  
 香。藿香。烏藥。丁香。杏仁。陳皮。蘇子。

性寒 馬兜鈴。鬱金。香附。桑皮。代赭石。

性平 葛根。升麻。柴胡。三稜。枇杷葉。

# 物

濕利藥寒去藥血理

性寒 性温 性平 性寒 性温

<p>茅根。黃芩。黃連。防己。葶藶。澤瀉。車前。燈草。瞿麥。茵陳。桑皮。海金沙。猪苓。苦練子。赤小豆。苡仁。冬瓜仁。滑石。</p>	<p>川椒。陳皮。木瓜。荔枝。白菴。白朮。蒼朮。半夏。牽牛。草薶。藿香。茴香。良薑。檳榔。大腹皮。晚蠶砂。</p>	<p>厚朴。草果。川椒。吳茱萸。附子。補骨脂。葫蘆把。砂仁。白菴。肉菴。茴香。良姜。肉桂。丁香。生薑。</p>	<p>牛膝。蒲黃。三棱。琥珀。蘇木。沒藥。桃仁。絲瓜。血餘。</p>	<p>荷葉。龜甲。鼈甲。穿山甲。白芍。丹參。丹皮。大小薊。地榆。鬱金。茅根。瞿麥。藍根。側柏葉。槐花。藕節。</p>	<p>當歸。續斷。益母草。澤蘭。元胡。紅花。姜黃。莪朮。蒺藜。降香。伏龍肝。乳香。紅麴。五靈脂。海螵蛸。荊芥。</p>
---	---	---	------------------------------------	--	---

中國實用藥物學

藥物表

藥

性平

扁竹。草薺。茯苓。琥珀。木通。

藥火瀉

性温

甘草。沙參。元參。夏枯草。連翹。白芍。生地。丹皮。蘆根。黃芩。蒲公英。  
黃連。知母。龍胆。青黛。大青。忍冬。地丁。豆根。牛蒡。射干。馬勃。黃柏。  
地骨皮。竹茹。竹葉。石膏。犀角。羚羊。地龍。青蒿。天冬。寸冬。浮小麥。  
貝母。藍根。

痰去

性寒

貝母。栝萐。竹瀝。鉄落。葶藶。天冬。寸冬。馬兜鈴。花粉。

藥

性平

殭蠶。

# 表

## 藥 瀉 收      藥 燥 潤

性平

覆盆子。金櫻子。蓮子。芡實。禹餘糧。龍骨。蓮蕊鬚。御米殼。

性寒

牡蠣。白芍。椿白皮。

性溫

皮。五味子。何首烏。益智。砂仁。肉蔻。山萸。烏梅。石榴皮。赤石脂。胡桃

性平

柏子仁。枸杞子。酸棗仁。玉竹。麻仁。桃仁。

性寒

沙參。元參。天冬。寸冬。貝母。括萸。花粉。白芍。生地。知母。

性溫

款冬花。紫菀。當歸。熟地。茯苓。杏仁。阿膠。

附錄

明目藥

殺虫藥

性寒

性温

苦練子。

使君子。檳榔。川椒。杏仁。

青箱子。决明子。蜜蒙花。夜明砂。石决明。甘菊花。夏枯草。

# 中國實用藥物學目錄

## 卷首

例言九條	一
總論十三條	一至三
藥物表十三種	一至三

## 卷上

### 草部 一百十六種

黃芪	一
甘草	一
人參	一
沙參	一
丹參	一
元參	一
白朮	二
蒼朮	二
玉竹	二
石斛	二
遠志	二
菖蒲	二

牛膝	三
甘菊花	三
五味子	三
天門冬	三
麥門冬	三
款冬花	三
旋覆花	三
桔梗	三
馬兜鈴	四
半夏	四
天南星	四
貝母	四
栝蒌	四
天花粉	四
夏枯草	四
獨活	五
羌活	五
防風	五
藁本	五

葛根	五
升麻	五
白芷	五
細辛	五
柴胡	五
前胡	六
麻黃	六
荊芥	六
連翹	六
紫蘇	六
薄荷	六
天麻	六
秦艽	七
鉤藤鈎	七
當歸	七
川芎	七
白芍	七
生地黃	七
熟地黃	七

何首烏	八
牡丹皮	八
續斷	八
益母草	八
澤蘭	八
延胡索	八
紅花	九
大小薊	九
地榆	九
蒲黃	九
鬱金	九
薑黃	九
蓬莪朮	九
荆三稜	九
白茅根	十
蘆根	十
大黃	十
黃芩	十
黃連	十
知母	十
龍胆草	十

青黛	十一
大青	十一
牽牛	十一
防己	十一
葶藶	十一
木通	十一
澤瀉	十二
車前子	十二
燈草	十二
瞿麥	十二
扁竹	十二
海金沙	十二
茵陳	十二
香蒿	十二
青蒿	十二
附子	十三
補骨脂	十三
肉蓯蓉	十三
胡蘆巴	十三
菟絲子	十三
覆盆子	十三

蒺藜子	十四
使君子	十四
益智仁	十四
砂仁	十四
白芷菴	十四
肉苁蓉	十四
草苴菴	十四
香附	十五
木香	十五
藿香	十五
茴香	十五
良薑	十五
金銀花	十五
蒲公英	十五
地丁	十六
山豆根	十六
牛蒡子	十六
射干	十六
草薺	十六
青箱子	十六
決明子	十六



卷下

木部 三十八種

馬勃	十六
板藍根	十六
紫苑	十七
茯苓	一
茯神	一
琥珀	一
柏子仁	一
側柏葉	一
肉桂	一
桂枝	一
枸杞子	二
地骨皮	二
山茱萸	二
酸棗仁	二
杜仲	二
女貞子	二
桑白皮	二
梔子	二

豬苓	三
黃柏	三
枳實	三
厚朴	三
檳榔	三
蔓荊子	三
金櫻子	三
烏藥	四
大腹皮	四
槐花	四
苦楝子	四
五茄皮	四
椿白皮	四
密蒙花	四
皂角刺	四
吳茱萸	四
川椒	五
蘇木	五
降香	五
丁香	五
乳香	五

沒藥	五
蘆薈	五
竹瀝	六
竹茹	六
竹葉	六
菓部 十八種	六
大棗	六
桃仁	六
杏仁	六
烏梅	六
陳皮	七
青皮	七
木瓜	七
山查	七
枇杷葉	七
石榴皮	七
胡桃	七
龍眼肉	七
荔枝核	七
蓮子	八

蓮蕊鬚

藕節

荷葉

芡實

穀菜部 十九種

穀芽

麥芽

浮小麥

赤小豆

白扁豆

淡豆豉

麻仁

薏苡仁

御米殼

神麩

紅麩

葱白

生薑

山藥

百合

菜蔬

八

八

八

八

八

八

八

八

九

九

九

九

九

九

九

九

十

十

十

十

白芥子

冬瓜仁

絲瓜

禽石部 九種

石膏

滑石

芒硝

元明粉

赤石脂

禹餘糧

代赭石

伏龍肝

鐵落

禽獸部 七種

五靈脂

夜明砂

阿膠

虎骨

犀角

羚羊角

鹿茸

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十一

十一

十一

十二

十二

十二

十二

十二

十二

蟲魚部 十三種

龍骨

穿山甲

海螵蛸

龜甲

鱉甲

牡蠣

石決明

殭蠶

晚蠶砂

桑螵蛸

蟬蛻

全蠍

地龍

人部 二種

血餘

紫河車

十二

十三

十三

十三

十三

十三

十三

十三

十三

十四

十四

十四

十四

十四

十四

十四

# 中國實用藥物學

卷上

## 草部

補氣  
固表

黃芪

**【性質】**

微溫味甘

**【功用】**

生用固表除肌熱。炙用補中壯

脾胃。生血生肌排膿內託。

**【禁忌】**

痘證毒盛者勿用。

**【用量】**

每服二錢至四錢。

**【處方】**

同生地。熟地。黃柏。黃連。黃芩。歸身。棗

仁。治血虛盜汗。

同生地。熟地。歸身。人參。棗仁。五味。治表虛自汗。

同白芷。白芨。甘草。忍冬。皂角刺。排膿止痛。

甘草

**【性質】**

平味甘。

**【功用】**

生用性平而瀉火。炙用性溫而補

脾。入峻劑則緩正氣。入潤劑則養血。能協和諸藥。使之不爭。解百

藥毒。

**【禁忌】**

中滿證勿用。

**【用量】**

每服一錢至二錢。**【處方】**

同人參。菖蒲。益智。圓肉。棗仁。治健忘。

同人參。生地。寸冬。阿膠。麻

仁。治心脾血枯。

同寸冬。石膏。竹葉。知母。治煩悶躁渴。

人參

**【性質】**

微寒味甘苦。

**【功用】**

除煩渴。生津液。添精神。定驚

有補  
有瀉  
能表  
能裏  
可升  
可降

補氣

瀉火

悸治虛咳喘促。瘧痢反胃。虛勞內傷。發熱自汗。【禁忌】肺有火

及肺氣不利者。勿用。【用量】每服五分至二錢。【處方】同五

味。寸冬。補血生津液。同白朮。茯苓。甘草。治脾虛不思飲食。同

甘草。歸身。五味。寸冬。治血虛發熱。【附錄】黨參性平味甘補氣

除煩渴。西洋參性寒微甘苦補肺生津。東洋參性溫味苦甘

補氣

沙參【性質】微寒味甘苦【功用】專補肺氣。養肝益脾胃。治久

嗽肺痿。【禁忌】肺寒作嗽者勿用。【用量】每服二錢至四錢

【處方】同百合。元參。貝母。桔梗。甘草。寸冬。白芍。治肺虛久嗽

【附錄】空沙參即薺芫性甘淡微寒解百藥毒。

丹參【性質】微寒味苦【功用】破宿血。調血經。安生胎。墮死胎

治腹痛癥瘕。目赤腫痛。【禁忌】忌醋。畏鹹水。【用量】每服一

錢至二錢。【處方】同寸冬。沙參。五味。甘草。青蒿。花粉。治煩滿

元參【性質】微寒味苦鹹【功用】益精明目。利咽喉。通二便。治

補血  
瀉肺火

補心  
去瘀生新

補水

瀉火

陽毒發斑煩渴喉痺潮熱骨蒸 **禁忌** 脾虛泄勿用 **用量**

每服二錢至四錢 **處方** 同生地菊花蒺藜杞子柴胡能明目

同貝母連翹甘草花粉薄荷夏枯草治瘰癧 同知母寸冬竹

葉治熱病燥熱煩亂

白朮 **性質** 溫味甘苦 **功用** 利小便止水泄消痰水進飲食

祛勞倦治水腫黃疸濕痺癰癤 **禁忌** 血燥無濕勿用 **用量**

每服二錢至四錢 **處方** 同澤瀉車前治水腫 同寸冬石斛

黃柏白芍木瓜苡仁五味治痿 同石斛浮小麥治脾虛盜汗

蒼朮 **性質** 溫味甘辛烈 **功用** 發汗除濕消水腫逐痰飲治

風寒 **禁忌** 燥結多汗者勿用 **用量** 每服一錢至二錢

**處方** 同川芎甘草藁本白芷羌活治風寒濕

玉竹 **性質** 平味甘 **功用** 補中益氣潤心肺除煩渴治莖寒

自汗一切不足之證 **禁忌** 畏鹹鹵 **用量** 每服三錢至四

錢 **處方** 同黃芪治大便虛閉

補脾 燥濕

補脾 燥濕

補而潤 古名 姜蕤

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

補肝腎  
瀉惡血

去風温  
補肝腎  
明目

補肺腎  
瀉精氣

瀉肺火  
滋腎  
潤燥痰

牛膝

**【性質】**

平味苦酸

**【功用】**

酒蒸則甘酸而温。補肝腎。强筋

骨。生用則散惡血。破癥瘕。治心腹諸痛。淋痛。尿血。經閉。產難。癰腫。惡瘡。**【禁忌】** 夢遺及脾虛下陷。因而腿膝腫痛者。勿用。**【用量】**

每服一錢至二錢。**【處方】** 同青蒿。杞子。治血虛發熱。或再加生地。寸冬。尤有功效。

甘菊花

**【性質】**

平味甘苦

**【功用】**

養目血。去翳膜。散風熱。治頭

痛。**【用量】** 每服二錢至四錢。**【處方】** 同穀精。草葦。豆皮。治目翳。

五味子

**【性質】**

温味酸鹹

**【功用】**

斂肺氣。除煩渴。益氣生津。補

虛。瀉精。退熱。斂汗。甯嗽。定喘。止嘔。住瀉。**【禁忌】** 咳嗽有火者。勿用。**【用量】** 每服二錢至四錢。**【處方】** 同乾葛。扁豆。治酒疸。

同苦茶。甘草。久嗽有特效。

天門冬

**【性質】**

寒味苦甘

**【功用】**

止渴消痰。治肺痿。肺癰。痰嗽

喘促。虛勞。骨蒸。吐膿。吐血。足下熱痛。**【禁忌】** 瀉者勿用。**【用量】**

補肺  
瀉熱  
潤燥

潤肺  
止咳

下氣  
消痰  
一名  
金沸草

散寒

每服二錢至四錢 **【處方】** 同生地人參潤燥養血 同生地寸

冬白芍牛膝鱉甲杜仲續斷治吐血

麥門冬 **【性質】** 微寒味甘苦 **【功用】** 瀉熱除煩消痰止咳治客

熱虛勞肺痿肺癰經枯乳閉血熱妄行 **【禁忌】** 氣弱胃寒勿用

**【用量】** 每服三錢至四錢 **【處方】** 同人參五味杞子治虛熱

同沙參五味治心肺虛熱

款冬花 **【性質】** 溫味辛 **【功用】** 消痰止咳治嗽逆上氣咳吐膿

血寒熱結氣 **【禁忌】** 肺熱致嗽者勿用 **【用量】** 每服一錢至

錢半 **【處方】** 同款冬花百部烏梅治久咳嗽

旋覆花 **【性質】** 溫味苦辛鹹 **【功用】** 治痰結堅痞唾如膠漆噫

氣不除大腸水腫 **【禁忌】** 虛者勿用 **【用量】** 每服五分至錢

半 **【處方】** 同人參半夏代赭石甘草薑棗治心下痞堅噫氣不

除

桔梗 **【性質】** 微溫味苦辛有小毒 **【功用】** 表散風寒治胸膈滯

麥門冬 款冬花 旋覆花 桔梗



**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

散結氣  
瀉熱  
潤肺

瀉火  
潤肺  
化痰  
俗作瓜萋  
瀉火  
潤燥

瀉火  
軟結

貝母

【性質】

微寒。味辛苦。

【功用】

治咳逆上氣虛勞煩熱吐血

咯血肺痿肺癰喉痺乳閉

【禁忌】

風寒生痰勿用

服二錢至四錢

【處方】

同知母牡蠣猪蹄治乳汁不下 同陳

皮前胡石膏知母寸冬竹瀝治痰瘧

栝萋

【性質】

寒味苦

【功用】

能清上焦火使痰氣下降清咽利

腸通乳消腫生津止渴治結胸熱痢

【禁忌】

虛痢勿用

每服二錢至三錢

【處方】

同枳實黃連半夏治結胸

天花粉

【性質】

寒味苦酸

【功用】

滑痰解渴生肌排膿消腫行

水治口燥唇乾胃熱黃疸乳癰瘡痔

【禁忌】

脾胃虛寒勿用

用量

每服二錢至四錢

【處方】

同人參寸冬治肺液枯消渴

夏枯草

【性質】

微寒。味辛苦

【功用】

解內熱散結氣治瘰癧濕

痺目珠夜痛

【禁忌】

久服傷胃

【用量】

每服一錢至三錢用

莖葉

【處方】

同連翹忍冬貝母元參花粉薄荷紫背天葵甘草

治療瘰

同甘菊地丁忍冬連翹白芨甘草生地白芷消腫毒

散風濕

獨活 **【性質】** 微温。味辛甘。 **【功用】** 治風寒濕痺。傷風頭痛。頭暈

目眩。齒痛。及癰。 **【禁忌】** 風熱及血虛勿用。 **【用量】** 每服一錢

至錢半。 **【處方】** 同秦艽。防風。川芎。當歸。治風濕。

發表  
去風濕

羌活 **【性質】** 温。味辛苦。 **【功用】** 治風濕頭痛。剛瘦柔痲。 **【禁忌】**

血虛頭痛。或遍身痛。勿用。 **【用量】** 每服五分至錢半。 **【處方】**

同防風。白芷。川芎。甘草。發散風寒。

發表

防風 **【性質】** 温。味辛甘。 **【功用】** 治上焦風邪。頭痛目眩。脊痛項

強。周身盡痛。為去風濕之要藥。 **【禁忌】** 血虛頭痛。氣虛自汗。勿

用。 **【用量】** 每服一錢至二錢。 **【處方】** 同白芍。黃芪。治表虛自

汗。同荆芥。白芷。生地。地榆。黃芪。治破傷風。

去風  
寒濕

藁本 **【性質】** 温。味辛。 **【功用】** 專治風寒頭痛。連腦。 **【禁忌】** 虛

者勿用。 **【用量】** 每服五分至一錢。 **【處方】** 同羌活。細辛。川芎。

葱白。治寒鬱頭痛。

解表  
提氣

葛根 **【性質】** 平。味甘辛。 **【功用】** 開腠發汗。解肌退熱。亦為治脾

發表  
提氣

發表  
去風濕

散風  
寒濕

發表  
和裏  
提氣

胃虛瀉之聖藥

**【禁忌】**

上盛下虛勿用

**【用量】**

每服一錢至

二錢

**【處方】**

同白芷甘草山藥白茯苓焦朮治血痢不止

升麻

**【性質】**

平微寒味苦甘

**【功用】**

表散風邪治頭痛寒熱虛

痢後重久泄脫肛崩中帶下

**【禁忌】**

血虛火升勿用

**【用量】**

每服五分至二錢

**【處方】**

同人參蓮子治噤口痢

同滑石川

連紅麴白芍甘草治痢

白芷

**【性質】**

溫味辛

**【功用】**

通竅發汗治頭目昏痛眉稜骨痛

產後傷風

**【禁忌】**

血熱有虛火者勿用

**【用量】**

每服一錢至

二錢

**【處方】**

同甘草生薑大棗治傷寒

細辛

**【性質】**

溫味辛

**【功用】**

治風寒濕痺咳嗽上氣頭痛脊強

**【禁忌】**

氣虛及血虛勿用

**【用量】**

每服三分至八分

同五味白芍甘草肉桂炮薑黃芪蘇梗治咳逆上氣筋骨疼痛

柴胡

**【性質】**

平微寒味苦

**【功用】**

酒炒用主氣下陷能引之上

升生用主瘧疾寒熱頭眩嘔吐胸痞脇痛口苦目赤

**【禁忌】** 血

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

散風

補血  
瀉肝  
瀉血

補血  
瀉火

補肝腎

血痢寒痺 **【禁忌】** 川芎香竈辛散單服久服令人暴亡 **【用量】**

每服一錢至錢半 **【處方】** 同續斷生地白膠杜仲山萸五味人

參黃芪棗仁治血崩不止。

白芍 **【性質】** 微寒味苦酸 **【功用】** 瀉肝火安脾肺利小便散惡

血益氣除煩斂汗安胎補勞退熱治心痞脇痛 **【禁忌】** 虛寒勿

用產後虛寒尤忌 **【用量】** 每服二錢至四錢 **【處方】** 同川連

滑石甘草升麻人參蓮心扁豆紅麩乾葛治痢 同歸身生地牛

膝炮薑續斷寸冬五味治產後虛熱 **【附錄】** 赤芍尤能散惡血

破堅積治血痺經閉。

生地黃 **【性質】** 寒味甘 **【功用】** 瀉心火清肺燥補血消痰治吐

衄崩漏痘證大熱 **【禁忌】** 多服損胃 **【用量】** 每服二錢至四

錢 **【處方】** 同黃芪川連黃柏棗仁五味寸冬桂圓肉牡蠣治盜

汗不止 同寸冬五味牛膝杞子車前阿膠寸冬治尿血

熟地黃 **【性質】** 微溫味甘 **【功用】** 填骨髓生精血聰耳明目治



養血 潤燥

補肝腎 瀉精

瀉火 補血 活血

補肝腎 活血

血虛發熱。乾咳痰嗽。氣喘短促。**【禁忌】** 氣鬱勿用。**【用量】** 每服二錢至四錢。**【處方】** 同沙苑。菴蓉。鹿茸。山萸。五味。治男子精寒無子。同肉桂。山藥。山萸。丹皮。澤瀉。白茯苓。治命門火衰陽痿不起。

何首烏 **【性質】** 微溫。味苦。澁。**【功用】** 添精髓。斂血氣。強筋骨。止

崩帶。治久痢惡瘧。勞瘦血虛。**【禁忌】** 忌葱蒜。萊菔。無鱗魚。**【用**

**量】** 每服二錢至四錢。**【處方】** 同忍冬。地榆。川連。白芍。升麻。葛

根。甘草。滑石。山豆根。犀角。石蠶。治痢純血。同牛膝。鱉甲。陳皮。青

皮。治瘡在血分。

牡丹皮 **【性質】** 寒。味辛。**【功用】** 瀉血中伏火。涼血而生血。破積

血。通經脈。治吐血衄血。骨蒸煩熱。**【禁忌】** 經行過期不淨者忌

用。胎前亦酌用。**【用量】** 每服二錢至四錢。**【處方】** 同寸冬。五

味。白茯苓。甘草。木通。生地。治心包絡之火。

續斷 **【性質】** 溫。味苦。辛。**【功用】** 通血脈。理筋骨。暖子宮。破瘀血

行瘀血  
一名  
莞蔚

行血  
消水

活血  
順氣

生肌止痛治金瘡折跌【禁忌】血虛熱勿用【用量】每服一錢至二錢【處方】同五味木瓜炮薑牛膝丹皮生地治產後火

升

益母草【性質】微温味辛甘【功用】消水行血去瘀生新調經

脈治血痛血淋血運乳癰【禁忌】益母無補益勿以其有益母

之名而濫用之【用量】每服一錢至二錢【處方】同川芎歸

身白芍生地杜仲阿膠續斷安胎止痛

澤蘭【性質】微温味苦甘辛香【功用】破宿血調月經消癥瘕

散水腫治產後血淋腰痛鼻血撲損癰毒【禁忌】無瘀血勿用

【用量】每服二錢至三錢【處方】同元胡歸尾赤芍牛膝三

稜莪迷治血癥

延胡索【性質】温味辛苦【功用】能行血中氣滯氣中血滯並

治癥瘕崩淋產後血運暴血上衝折傷積血【禁忌】血虛血熱

勿用【用量】每服一錢至二錢【處方】同川芎當歸生地白

行血  
古名  
紅藍花

瀉血  
涼血

止血

生行血  
炒止血

芍。白膠。牛膝。香附。治經阻少腹痛。

紅花 **【性質】** 温味辛 **【功用】** 破瘀血消腫止痛治經閉。療子死

腹中 **【禁忌】** 過用使血行不止而死 **【用量】** 每服五分至一

錢 **【處方】** 同當歸。生地。牛膝。白芍。益母。川芎。延胡。治產後惡血

不盡

大小薊 **【性質】** 涼味苦甘 **【功用】** 破血下氣治吐血衄腸癰小薊

較大薊力緩 **【禁忌】** 補虛勿用 **【用量】** 每服一錢至二錢 **【**

處方 **】** 同藕節。蒲黃。木通。滑石。生地。歸尾。甘草。梔子。淡竹葉。治血

淋

地榆 **【性質】** 微寒味苦酸澆 **【功用】** 治吐血崩中腸風血痢 **【**

禁忌 **】** 氣血虛寒勿用 **【用量】** 每服一錢至二錢 **【處方】** 同

秦芫。白木。歸尾。桃仁。枳實。澤瀉。皂角子。治血痢

蒲黃 **【性質】** 平味甘 **【功用】** 生用性滑行血消瘀通經利小便

炒用性澆止血。治崩帶遺精 **【禁忌】** 無瘀血勿用生蒲黃 **【用**

行血  
散鬱

破血  
行氣

破血  
行氣

破血

**量** 每服一錢至二錢。**處方** 同槐花。側柏。炒芥穗。枳殼。治腸風。

**鬱金** **性質** 寒。味苦辛。**功用** 涼心熱。散肝鬱。治吐衄。尿血。經

脈逆行。血氣諸痛。敗血攻心。顛狂失志。**禁忌** 血虛痛。勿用。

**用量** 每服一錢至三錢。**處方** 同韭菜。降香。歸身。生地。童便。

治吐血便血。

**薑黃** **性質** 溫。味苦辛。**功用** 通月經。治氣脹。血積。折跌。撲損。

**禁忌** 血虛服之。病反增劇。**用量** 每服一錢至二錢。**處**

**方** 同肉桂。枳殼。治左脇痛。同當歸。牛膝。生地。元胡。肉桂。治血

積痛。

**蓬莪朮** **性質** 溫。味苦辛。**功用** 破氣中之血。消瘀。通經。開胃。

化食。治心腹諸痛。奔豚。痲痺。**禁忌** 虛人勿久服。**用量** 每

服一錢至二錢。**處方** 同大黃。黃連。三稜。枳殼。茯苓。治腹中痛。

**荆三稜** **性質** 平。味苦。**功用** 消腫止痛。通乳墮胎。治血瘀氣

行氣  
消積

瀉火  
止血

瀉熱  
止嘔

瀉血分濕  
熱  
下有形積  
滯

結瘡硬食停。【禁忌】身虛勿用。【用量】每服一錢至二錢

【處方】同木香、檳榔、青皮、陳皮、枳殼、黃柏、黃連、大黃、芒硝、牽牛、香附治積聚。

白茅根 【性質】寒味甘。【功用】治吐血衄血。血閉寒熱淋漓崩

中肺熱喘急。內熱煩渴。黃疸水腫。【禁忌】孕婦勿用。【用量】

每服一錢至二錢。【處方】同銀花、連翹、薄荷、竹葉、甘草、桔梗、丹

皮、生地治衄血。

蘆根 【性質】寒味甘。【功用】治嘔噦反胃。消渴客熱。煩躁內熱。

【禁忌】因寒反胃嘔吐勿用。【用量】每服二錢至四錢。【處

方】同桑葉、杏仁、連翹、薄荷、桔梗、甘草治肺熱咳嗽。

大黃 【性質】寒味苦。【功用】下燥結而除痰熱。通大腸而有燥

糞。治發熱譫語下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癥瘕積聚。留飲宿

食心腹痞滿。二便不通。【用量】每服八分至三錢半。【處方】

同芒硝、枳實、厚朴治大腸有燥糞發熱譫語。

瀉熱  
去濕

瀉火  
燥濕

瀉火  
潤燥  
滑腸

黃芩黃連知母

黃芩

【性質】

寒味苦

【功用】

消痰利水。解渴安胎。治血痢腹痛。

黃疸五淋。氣逆血閉。上焦濕熱。火嗽喉腥。目赤腫痛。【禁忌】血

虛寒勿用。【用量】每服二錢至三錢。【處方】同白芍。甘草。治

濕熱腹痛。及瀉痢。同白芍。寸冬。白朮。治胎不安。【附錄】中虛

者名曰枯芩。又曰片芩。功用瀉肺火。清肌表之熱。內實者名曰条

芩。又名子芩。功用瀉大腸之火。

黃連

【性質】

大寒大苦

【功用】

解渴除煩。治腸澼瀉痢。痞滿嘈

雜。腹痛心痛。【禁忌】虛寒勿用。【用量】每服一錢至三錢。

【處方】同黃芩。黃柏。知母。甘草。治癩疹已透。煩躁不止。同槐花。

枳殼。乳香。沒藥。治腹痛痢。純血。

知母

【性質】

寒味辛苦

【功用】

清肺火。潤腎燥。利二便。消浮腫。

消痰定喘。止渴安胎。治苓勞骨蒸。燥渴虛煩。久痢久瘧。【禁忌】

久服令人泄。【用量】每服一錢至三錢。【處方】同寸冬。石膏。

貝母。陳皮。鱉甲。青蒿。牛膝。治久瘧煩渴。同黃柏。車前。木通。寸冬。

瀉肝胆火  
去下焦濕  
熱

瀉肝火

瀉心胃熱  
毒

大瀉氣分  
之濕

甘草。治陽強不痿。

龍膽草 **【性質】** 大寒大苦 **【功用】** 治寒熱驚癇時氣溫熱黃疸

脚氣咽喉風熱赤睛胥肉癰疽瘡疥 **【禁忌】** 過服損胃 **【用量】**

每服一錢至二錢 **【處方】** 同犀角洋蘆薈川連寸冬知母連翹

羚羊丹皮銀花鈎藤鐵落水煎治癩狂

青黛 **【性質】** 寒味鹹 **【功用】** 治溫病發斑吐咯血痢小兒驚癇

疳熱丹熱 **【禁忌】** 血虛有火勿用 **【用量】** 每服一錢至二錢

**【處方】** 同梔子黃連犀角知母元參生地石膏治溫病發斑

大青 **【性質】** 大寒微苦鹹 **【功用】** 治溫病熱狂陽毒發斑黃疸

熱痢丹毒喉痺 **【禁忌】** 非心胃熱毒勿用 **【用量】** 每服一錢

至二錢 **【處方】** 同忍冬連翹薄荷竹葉甘草芥穗牛蒡丹皮生

地。治溫疹。

牽牛 **【性質】** 熱味辛有毒 **【功用】** 利大小便逐水消痰殺蟲墮

胎。治水腫喘滿疔癖氣塊 **【禁忌】** 胃弱氣虛勿用 **【用量】** 每

瀉下焦血  
分之濕熱

大瀉氣秘  
行水

行水  
瀉小腸火

服一錢至二錢 **【處方】** 同栝榔、茯苓皮、大腹皮、椒目、赤小豆、澤瀉、木通治水腫喘滿

防己

**【性質】**

大寒味大苦

**【功用】**

治肺氣喘嗽、熱氣諸癰、濕瘡

脚氣水腫風腫

**【禁忌】**

血虛及上焦氣分濕熱勿用

**【用量】**

每服一錢至錢半

**【處方】**

同黃芪、白茯苓、甘草治皮水

葶藶

**【性質】**

大寒味辛苦

**【功用】**

行膀胱水瀉肺中水氣、臍急

者非此不能除破積聚癥結、消腫除痰、止咳定喘、通經利便 **【禁忌】**

**【忌】** 久服令人虛

**【用量】**

每服五分至一錢

**【處方】**

同大棗

治肺癰喘急

木通

**【性質】**

平味辛甘淡

**【功用】**

通大小腸、膀胱、導諸濕熱、由

小便出、並能破血、催生、行經、下乳、治淋漓不通、水腫浮大 **【禁忌】**

汗多勿用、孕婦忌

**【用量】**

每服一錢至三錢

**【處方】**

同生地

甘草、竹葉、治心熱便赤、同牛膝、生地、天冬、寸冬、五味、甘草、黃柏

治尿血、同白茯苓、澤瀉、車前、猪苓、燈心、治癰閉



瀉膀胱火  
利水

行水  
瀉熱

利水  
清熱

利水  
破血

澤瀉

**【性質】**

寒味甘淡微鹹

**【功用】**

治疾飲嘔吐瀉痢腫脹水

痞脚氣疝痛淋漓

**【禁忌】**

腎虛精滑目虛不明皆勿用**【用量】**

每服一錢至二錢

**【處方】**

同白茯苓白朮猪苓肉桂治寒濕

車前子

**【性質】**

寒味甘

**【功用】**

滲膀胱濕熱催生下胎治濕痺

五淋暑濕瀉痢

**【禁忌】**

腎氣虛勿用

**【用量】**

每服錢半至三

錢

**【處方】**

同生地牛膝天冬寸冬黃柏五味杞子人參白膠治

尿血及女子血淋

同白朮蒼朮木瓜石斛草薢白茯苓五加皮治

濕痺

燈草

**【性質】**

寒味甘淡

**【功用】**

降心火利小便治五淋消水腫

燒灰吹喉痺

**【禁忌】**

小便不禁勿用

**【用量】**

每服一子至三

子

**【處方】**

燈草灰同炒鹽少許共末吹喉治喉痺

瞿麥

**【性質】**

寒味苦

**【功用】**

利小腸治熱淋通經墮胎明目去

翳

**【禁忌】**

虛人勿用

**【用量】**

每服五分至二錢

**【處方】**

同

木通車前扁竹大黃滑石甘草梔子治淋痛

通淋 一名 扁蓄

通淋

扁竹 **【性質】** 平味甘苦 **【功用】** 治黃疸五淋蟲蝕下部 **【禁忌】**

無濕勿用 **【用量】** 每服一錢至三錢 **【處方】** 同木通甘草梢

竹葉赤芍治血淋

海金沙 **【性質】** 寒味甘淡 **【功用】** 治膀胱濕熱腫滿五淋莖痛

難忍 **【禁忌】** 熱狂勿用 **【用量】** 每服一錢至二錢半 **【處方】**

同滑石茵陳雲苓皮杏仁晚蠶砂苡仁黃芩通草川連治濕温

茵陳 **【性質】** 寒味苦 **【功用】** 治脾胃濕熱黃疸瘡癩 **【禁忌】**

陰黃勿用 **【用量】** 每服一錢至二錢 **【處方】** 同滑石藿香梗

茯苓澤瀉苡仁椒目白蔻仁厚朴廣皮治黃疸

香蒿 **【性質】** 温味辛 **【功用】** 治陰暑霍亂嘔逆水腫脚氣口氣

為夏月解表之要品 **【禁忌】** 無表病勿用 **【用量】** 每服五分

至錢半 **【處方】** 同扁豆厚朴治傷暑

青蒿 **【性質】** 寒味苦 **【功用】** 治骨蒸勞熱等勞虛熱久瘧久痢

虛煩盜汗 **【禁忌】** 實火勿用 **【用量】** 每服一錢至二錢 **【處】**

利濕 清暑

利濕熱

退勞熱

補命門火  
逐風寒濕

**方** 同黃芪、鱉甲、地骨、秦艽、紫菀、人參、黃芩、柴胡、生地、知母、白芍、天冬、治骨蒸勞熱。

附子

**【性質】** 大熱、味辛甘、有毒。  
**【功用】** 治傷寒陰毒、中風中寒、

氣厥痰厥、心腹冷痛、暴泄脫氣、霍亂轉筋、小兒慢驚、痘瘡灰白、一

切沉寒痼冷之證、並能通經墮胎。  
**【禁忌】** 反貝母、半夏、栝萸、白

芫、中其毒者、以甘草、黃連、犀角煎湯解之。  
**【用量】** 每服五分至

錢半、冷服。  
**【處方】** 同人參、白芍、甘草、砂仁、陳皮、治慢驚。同白

朮、木瓜、肉桂、牛膝、青皮、治寒疝。  
**【附錄】** 發散生用、峻補熟用。

補骨脂

**【性質】** 大溫、味辛苦。  
**【功用】** 暖丹田、縮小便、治五勞七

傷、腰膝冷痛、腎冷精流、腎虛泄瀉。  
**【禁忌】** 血虛有熱、及大便不

禁、勿用。  
**【用量】** 每服一錢至二錢。  
**【處方】** 同杜仲、桃肉、治腰

痛。同肉桂、治虛洩。

肉蓯蓉

**【性質】** 溫、味甘酸鹹。  
**【功用】** 峻補精血、滋潤五臟、益髓

強陰、治五勞七傷、腰膝冷痛、崩帶遺精。  
**【禁忌】** 陽易舉而精不

補腎命  
滑腸

補命門火  
一名  
破故紙

補腎命  
除寒

固勿用。【用量】每服一錢至三錢。【處方】同山萸、五味、黃芪、歸身治腎燥洩瀉。

胡蘆巴。【性質】温。味苦。【功用】暖丹田治腎臟虛冷痲疝冷氣。

寒濕脚氣。【禁忌】血虧勿用。【用量】每服一錢至二錢半。

【處方】同鹿茸、菟絲子、補骨脂、萆子、茴香、附子、白朮、茯苓治腎虛冷。

補脾肝腎

菟絲子。【性質】平。味甘辛。【功用】強血益精助筋脈益氣力治

五勞七傷精寒淋瀝口燥舌乾。【禁忌】大便燥結勿用。【用量】

每服二錢至四錢。【處方】同熟地治血損。同杜仲治氣虛。

同白茯苓蓮子治白濁。

覆盆子。【性質】微温。味甘酸。【功用】益腎固精補肝虛起陽痿。

縮小便治肺虛。【禁忌】小便不利勿用。【用量】每服二錢至

四錢。【處方】同人參、山萸、附子、白茯苓、丹皮、澤瀉、山藥治命門虛

寒。

補肝腎

補肝腎  
破瘀

蒺藜子 **【性質】** 微温味苦 **【功用】** 沙苑蒺藜治虛勞腰痛遺精

帶下刺蒺藜催生墮胎治乳閉癥瘕 **【禁忌】** 沙苑媾精難出勿

用 **【用量】** 每服二錢至四錢 **【處方】** 同河車膠生地杞子杜

仲山查黃柏益母治肝血虛及腎衰

使君子 **【性質】** 温味甘 **【功用】** 健脾胃除虛熱殺臟蟲治五疳

療瀉痢便濁 **【禁忌】** 無蟲積勿用忌熱茶犯之作瀉 **【用量】**

每服一錢至三錢 **【處方】** 同蘆薈蕪荑滑石麥芽厚朴陳皮殺

疳蟲消疳積

益智子 **【性質】** 温味辛 **【功用】** 澆精固氣攝唾涎縮小便治客

冷犯胃冷氣腹痛嘔吐瀉泄遺精崩帶 **【禁忌】** 因熱而致崩帶

遺精勿用 **【用量】** 每服一錢至二錢 **【處方】** 同白朮白茯苓治

白濁 同遠志茯苓甘草治赤濁

砂仁 **【性質】** 温味辛香 **【功用】** 快氣調中通行結滯去痰逐冷

消食醒酒治心腹痞脹噎膈嘔吐上氣咳嗽赤白瀉痢霍亂轉筋

補脾  
殺蟲  
消積

燥脾腎  
補心腎  
澆精

行氣調中  
一名  
縮砂

行氣 暖胃

行氣 燥脾 瀉腸 一名肉果

行氣 燥濕 去寒 一名草果

奔豚崩帶並能止痛安胎 **【禁忌】** 血虛火炎勿用 **【用量】** 每服錢半至三錢 **【處方】** 同人參陳皮藿香白茯苓炙草治吐瀉不食

白芷菹 **【性質】** 大温味辛 **【功用】** 消酒積除寒濕化食寬膨治

脾虛瘧疾感寒腹痛吐逆反胃 **【禁忌】** 火升作嘔勿用 **【用量】**

每服一錢至二錢半 **【處方】** 同半夏陳皮生薑白朮白茯苓治寒

痰作吐 同扁豆五味木瓜橘紅治中滿嘔吐

肉芷菹 **【性質】** 温味辛香 **【功用】** 逐冷去痰消食解酒止虛泄

冷痢治冷積心腹脹痛小兒吐逆乳食不下 **【禁忌】** 火痢勿用

**【用量】** 每服錢半至二錢半 **【處方】** 同人參補骨脂吳萸五

味砂仁治冷洩 同砂仁陳皮人參紅麴查肉藿香麥芽治飧洩

草芷菹 **【性質】** 大温味辛香 **【功用】** 暖胃健脾破氣開鬱燥濕

寒除痰化食治寒客胃痛霍亂瀉痢 **【禁忌】** 血不足勿用 **【用**

**量】** 每服錢半至三錢 **【處方】** 同青皮厚朴柴胡黃芩半夏甘

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

去寒濕  
古名藁香

散寒  
燥濕

瀉熱  
解毒  
一名忍冬

瀉熱毒  
一名  
黃花地丁

腸冷氣癩疔陰腫乾濕脚氣 **【禁忌】** 多服損目發瘡 **【用量】**

每服一錢至二錢半 **【處方】** 同荔枝核治疔 同山藥白芍甘

草白茯苓焦米治食不下

良薑 **【性質】** 熱味辛 **【功用】** 暖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛

霍亂瀉痢瘴瘧冷瀝 **【禁忌】** 肺胃熱勿用 **【用量】** 每服一錢

至錢半 **【處方】** 同茯苓皮桂枝薑黃杏仁厚朴陳皮晚蠶砂炙

甘草治寒濕痺痛

金銀花 **【性質】** 寒味甘 **【功用】** 治癰疽疥癬楊梅惡瘡腸瀉血

痢 **【禁忌】** 補虛勿用 **【用量】** 每服一錢至三錢 **【處方】** 同

防風白芷歸尾陳皮甘草貝母花粉乳香沒藥穿山甲皂角刺治

癰疽

蒲公英 **【性質】** 平味甘 **【功用】** 消腫核化熱毒專治乳癰疔毒

亦為通淋妙品 **【用量】** 每服二錢至三錢 **【處方】** 同忍冬花

粉貝母治乳癰



瀉熱毒  
一名  
紫花地丁

瀉熱解毒

瀉熱毒

一名

鼠粘

一名

惡實

瀉熱

解毒

消痰

去風濕

地丁 **【性質】** 寒味苦辛。 **【功用】** 治癰疽發背。疔瘡癩癧。無名腫

毒。 **【用量】** 每服一錢至二錢半。 **【處方】** 同知母。黃柏。黃連。花

粉。黃芩。甘草。歸尾。白芍。三稜。莪朮。治癰瘡未潰。

山豆根 **【性質】** 寒味苦。 **【功用】** 消腫止痛。治喉癰喉風。齧腫齒

痛。喘滿熱咳。腹痛下痢。五痔諸瘡。 **【禁忌】** 食少而瀉勿用。 **【用**

**量】** 每服一錢至二錢半。 **【處方】** 同牛蒡。馬勃。甘草。治溫毒。

牛蒡子 **【性質】** 平味辛。 **【功用】** 利咽喉。理痰嗽。消癰疹。利二便。

散諸腫瘡瘍之毒。 **【禁忌】** 痘證虛寒勿用。 **【用量】** 每服一錢

至三錢。 **【處方】** 同紫草。生地。犀角。治痘瘡。血熱不出。

射干 **【性質】** 寒味苦有毒。 **【功用】** 瀉實火。消腫毒。通經閉。利大

腸。治侯痺咽痛。結核癧疔。便毒瘡母。 **【禁忌】** 虛人勿用。 **【用量】**

每服一錢至二錢半。 **【處方】** 同連翹。牛蒡。忍冬。馬勃。治溫病喉

咀咽痛。

萆薢 **【性質】** 平味甘苦。 **【功用】** 治風寒濕痺。腰痛久冷。膀胱宿

瀉肝明目  
一名  
草决明

瀉肝明目

解熱

涼血破血

水陰痿失溺。莖痛遺精痔瘻惡瘡。【禁忌】血虛及腎虛腰痛勿用。【用量】每服一錢至錢半。【處方】同蓮子。白茯苓。車前。木通。

澤瀉。牛膝。甘草。黃柏。治濕。

青箱子。【性質】微寒。味苦。【功用】去風熱。明眼目。治青盲障翳。

蟲疥惡瘡。【禁忌】腫子散大勿用。【用量】每服一錢至三錢。

【處方】同菊花。甘草。明目。

决明子。【性質】平。味甘苦鹹。【功用】除風熱。治青盲內障。翳膜。

遮睛。赤腫。眶爛。淚出羞明。【用量】每服一錢至二錢。【處方】

同蓮子。元參。生地黃。治赤腫眶爛。

馬勃。【性質】平。味辛。【功用】清肺解熱。治喉痺咽痛。鼻衄失音。

外用。傳諸瘡。【用量】每服一錢至三錢。【處方】同連翹。牛蒡。

忍冬。射干。生地。治溫毒咽痛。

板藍根。【性質】涼。味甘苦。【功用】清熱破血。解毒涼血。【用量】

每服一錢至錢半。【處方】同牛蒡。元參。甘草。桔梗。馬勃。連翹。殭

潤肺  
止嗽

蠶薄荷治大頭温。

紫菀

【性質】

温味苦辛。

【功用】

消痰止嗽治嗽逆上氣咳吐膿

血

【禁忌】

肺熱作嗽勿用。

【用量】

每服一錢至錢半。

【處方】

同欸冬花百部烏梅治久咳嗽。

中國實用藥物學卷上終

上海廣益書局出版

足本  
大字  
校正  
加批

時病論

名醫秘傳之……枕中寶  
時醫臨證之……指南針  
是書為雷少逸先生原著。以陰陽應  
象大論八句經旨為綱。集四時六氣  
之病為目。分載治法成方。附列臨證  
醫案。對今酌古。切合時宜。洵為醫家  
應診投時之利器也。  
(全書四冊。定價六角)

實驗秘本

女科秘訣大全

名醫心血之……結晶  
女界安全之……保障  
是書為陳蓮舫先生撰述。專詳  
婦女一科。計分五大類。子目共  
五百七十餘條。取前賢之精義。  
為後學之津梁。攷證病源。至為  
詳備。斯誠女界之枕中鴻寶也。  
(全書三冊。定價九角)

足本大字註釋加批

傷寒論集註

醫家之寶筏

救世之慈航

錢塘張隱菴先生註釋。凡六卷。闡  
發先賢奧旨。昭示來茲。最為精確。  
傳世已久。去年復覩陳蓮舫先生  
家藏板。上列眉批。旁證曲引。採集  
諸家評註。參附己意。語語折中。疑  
義冰釋。嘉惠後人。功匪淺鮮。洵屬  
海內不經見之秘本也。  
(全書四冊。定價八角)

各省分局均有出售

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

半。**【處方】**同丹砂、滑石、竹葉、木通、寸冬。治小便閉。同乳香、沒藥、元胡、乾膝、鱉甲治血暈。

補心脾

柏子仁

**【性質】**

平味甘香

**【功用】**

養心氣潤腎燥愈驚悸助脾

潤肝腎

滋肝聰耳明目益血止汗

**【禁忌】**

多瀉多痰勿用

**【用量】**

每

服二錢至四錢

**【處方】**

同松仁、麻仁。治老人大便虛閉。

補血

側柏葉

**【性質】**

微寒味苦澀

**【功用】**

止吐衄崩淋腸風血痢

止血

**【用量】**每服一錢至二錢

**【處方】**

同連翹、忍冬、甘草、桔梗、生地、丹皮、梔子、炭治鼻衄。

補腎命火

肉桂

**【性質】**

大熱甘辛

**【功用】**

發汗通血脈補虛墮生胎治表

虛自汗腹中冷痛濕盛泄瀉痼冷沈寒

**【禁忌】**

目疾勿用

**【量】**每服五分至一錢

**【處方】**

同人參、炮薑、附子。治中寒腹痛。

桂枝

**【性質】**

溫味辛甘

**【功用】**

治傷寒頭痛中風自汗手足痛

風

**【禁忌】**

血虛火炎勿用

**【用量】**

每服五分至錢半

**【處方】**

同白芍、甘草、生薑、大棗。治中風。

去風寒

補虛  
潤燥

退勞熱

補肝腎  
瀋精

補肝  
潤燥  
甯心

枸杞子 **【性質】** 平味甘 **【功用】** 補虛勞強筋骨利大小腸治噎

乾吐消渴 **【禁忌】** 便滑勿用 **【用量】** 每服二錢至三錢 **【處**

**方】** 同熟地白朮白茯苓治腎虛目暗

地骨皮 **【性質】** 寒味甘淡 **【功用】** 止胸脇痛利大小腸治五內

煩熱吐血尿血咳嗽消渴肌熱虛汗療傳尸有汗之骨蒸 **【禁忌】**

非勞病勿用 **【用量】** 每服一錢至三錢 **【處方】** 同銀柴胡

胡黃連秦艽鱉甲赤茯苓青蒿知母甘草治勞熱骨蒸

山茱萸 **【性質】** 微溫味酸辛瀋 **【功用】** 暖腰膝縮小便治風寒

溼痺耳鳴耳聾月事過多 **【禁忌】** 陽強不痿小便不利勿用 **【**

**用量】** 每服一錢至二錢 **【處方】** 同人參五味牡蠣益智治老人小

便淋瀝 同杜仲牛膝生地白膠山藥治腎虛腰痛

酸棗仁 **【性質】** 平味甘酸 **【功用】** 堅筋骨除煩止渴斂汗甯心

療胆虛不眠酸痺久瀉 **【禁忌】** 有實火勿用 **【用量】** 每服一

錢至三錢 **【處方】** 同人參茯苓神白朮甘草治振悸不眠 同知

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。



行水

【用量】每服錢半至三錢。【處方】同連翹寸冬竹葉川連燈心甘草瀉心火。【附錄】梔子生用瀉火炒用止血內熱用仁表熱用皮。

豬苓

【性質】平。味苦甘淡。【功用】治懊懷消渴腫脹淋濁瀉痢

瘴瘧。【禁忌】無濕勿用。【用量】每服一錢至三錢。【處方】

同白朮澤瀉滑石阿膠治口渴思水。

黃柏。【性質】寒。味苦微辛。【功用】治骨蒸勞熱諸痿癱瘓目赤

耳鳴消渴便閉黃疸水腫水瀉熱痢痔血腸風漏下赤白諸瘡癢

痛。【禁忌】虛火勿用。【用量】每服一錢至二錢半。【處方】

同木瓜白朮白朮蒼朮石斛生地治痿

枳實。【性質】寒。味苦。【功用】治胸痺結胸食積五膈痰癖癥結

嘔逆咳嗽水脹脇脹瀉痢淋閉痔腫腸風。【禁忌】孕婦及虛人勿

用。【用量】每服一錢至二錢半。【處方】同川芎歸身白芍秦

芫治腸風下血。【附錄】枳實利胸膈枳殼利腸胃枳實力猛枳

破氣  
行痰

泄腎火

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

去風溼

至二錢 **【處方】** 同人參、沈香、檳榔。治鬱結上氣。

五加皮 **【性質】** 温味辛苦。 **【功用】** 治筋骨拘攣。陰痿囊溼。女子

陰癢小兒脚弱。 **【禁忌】** 肝腎虛而有火勿用。 **【用量】** 每服一

錢至錢半。 **【處方】** 同陳皮、茯苓皮、薑皮、大腹皮。治風溼。

瀉腸

椿白皮 **【性質】** 寒味苦澁。 **【功用】** 治洩瀉久痢崩帶腸風夢遺。

燥濕

滑精 **【禁忌】** 痢疾滯未盡勿用。 **【用量】** 每服一錢至二錢。

**【處方】** 同甘草、芡實、炒蒲黃。治血痢。

潤肝

密蒙花 **【性質】** 微寒味甘。 **【功用】** 潤肝燥。治目中赤脈。青盲膚

明目

翳赤腫眵淚羞明畏日小兒疳氣攻眼。 **【用量】** 每服一錢至二

錢。 **【處方】** 同生地、元參、甘菊、決明子。治目疾。

破堅

皂角刺 **【性質】** 温味辛。 **【功用】** 潰散癰疽。治癰毒妬乳風癩惡

潰瘍

瘡。胎衣不下。 **【禁忌】** 癰疽已潰勿用。 **【用量】** 每服五分至一

錢。 **【處方】** 同花粉、貝母、甘草、乳香、沒藥、川山甲。治癰疽未潰。

去風溼

吳茱萸 **【性質】** 大熱味辛苦有小毒。 **【功用】** 除濕解鬱。去痰殺

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

散寒

呢逆。痲痺奔豚。瘡瘡灰白。**【禁忌】**熱證忌用。**【用量】**每服一錢至二錢。**【處方】**同白菟。霍香。陳皮。厚朴。砂仁。治霍亂。

活血伸筋

乳香**【性質】**温味辛苦香**【功用】**生肌止痛。託裏護心。治心腹

一名

諸痛。癰疽瘡腫。產後折傷。亦治癲狂。**【禁忌】**氣虛勿用。**【用量】**

薰陸香

沒藥**【性質】**平味苦**【功用】**散結氣通滯。血消腫止痛。生肌。治

散瘀

每服一錢至二錢半。**【處方】**同金銀花。地丁。沒藥。治瘡痛。

定痛

金瘡杖瘡。翳暈目赤。亦療產後血氣之痛。**【禁忌】**血虛諸痛勿

用。**【用量】**每服一錢至二錢。**【處方】**同元胡。歸尾。治血瘀。

瀉熱

蘆薈**【性質】**大寒味大苦**【功用】**功高清熱。殺蟲涼肝。明目鎮

殺蟲

心。除煩。治小兒驚癇五疳。**【禁忌】**泄瀉勿用。**【用量】**每服一

錢至錢半。**【處方】**同羚羊角。寸冬。生地。知母。龍胆。鈎藤。連翹。冬

桑葉。治癲狂。

# 竹部

乳香 沒藥 蘆薈

瀉火

滑痰

潤燥

瀉熱

涼血

瀉煩熱

竹瀝

**【性質】**

大寒味甘

**【功用】**

消風降火潤燥行痰治中風口

噤痰迷大熱風癱癲狂煩悶

**【禁忌】**

有寒痰勿用

**【用量】**

每

服一錢至二錢

**【處方】**

同石膏杏仁雲苓防己通草半夏廣皮

治中風不語

竹茹

**【性質】**

微寒味甘

**【功用】**

治上焦煩熱膈噎嘔哕吐血衄

血肺痿驚癇崩中胎動

**【禁忌】**

不因熱而胎動勿用

**【用量】**

每服一錢至錢半

**【處方】**

同木瓜陳皮寸冬枇杷葉人參蘆根

石斛治胃熱嘔噦

竹葉

**【性質】**

寒味甘辛淡

**【功用】**

消痰止渴治咳逆喘促嘔噦

吐血中風失音小兒驚癇

**【用量】**

每服五分至一錢

**【處方】**

同寸冬石膏知母甘草治壯熱消渴

# 菓部

補脾

大棗

**【性質】**

平味甘

**【功用】**

補脾益氣潤心肺生津液和百藥

潤心肺

破血

潤燥

瀉肺

潤燥

下氣

瀉腸

斂肺

桃仁 杏仁 烏梅

**【禁忌】**

齒痛及小兒疳病勿用忌葱魚

**【用量】**

每服一錢至

四錢 **【處方】**

同白朮人參黃芪歸身甘草茯神遠志桂元肉治

脾血虛

桃仁

**【性質】**

平味苦甘

**【功用】**

通大腸血秘治熱入血室血燥

血痞損傷積血血痢經閉皮膚血熱燥癢蓄血發熱如狂 **【禁忌】**

血不足勿用 **【用量】**

每服一錢至三錢 **【處方】**

同甘草芒

硝。大黃桂枝治蓄血發狂

杏仁

**【性質】**

溫味辛苦有小毒

**【功用】**

通大腸氣閉殺蟲散寒

消積行痰治咳逆上氣煩熱喘促 **【禁忌】**

**【禁忌】**

肺虛而咳勿用 **【用**

**量】** 每服一錢至三錢 **【處方】**

同白芍甘草五味蘇梗百合款

冬花治氣逆喘促

烏梅

**【性質】**

溫味酸澆

**【功用】**

生津止渴治久痢久嗽下血血

崩

**【禁忌】**

病有當發散治者勿用 **【用量】**

每服二箇至四箇

**【處方】** 同川連治赤痢



**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

瀉腸

【處方】同寸冬、五味、白芍、甘草治卒噦不止。

石榴皮 【性質】温味瀉酸。【功用】止泄痢下血崩帶脫肛。【禁

忌】痢積未淨勿用。【用量】每服一錢至二錢。【處方】同芡

實蓮子治虛痢。

肉補腎命

胡桃 【性質】熱味甘。【功用】肉之功用温肺潤腸補氣養血治

皮瀉腸

腰膝虛痛虛寒喘嗽皮之功用斂肺定喘固腎瀉精。【用量】每

服一錢至三錢。【處方】同補骨脂補命門火。

補心脾

龍眼肉 【性質】平味甘潤。【功用】養心補血治思慮過度健忘

怔忡。【用量】每服一錢至三錢。【處方】同生地、天冬、寸冬、丹

參、柏仁、遠志、蓮肉、五味、人參、茯神。補心安神。

散寒溼

荔枝核 【性質】温味甘瀉。【功用】散寒氣止胃痛治癩疔卵腫。

亦療婦人血氣諸痛。【禁忌】無寒溼滯氣勿用。【用量】每服

一錢至二錢半。【處方】同川練子、肉桂、附子、元胡、桃仁、白朮、良

薑治寒疝。

補脾  
瀉腸

蓮子 **【性質】** 平味甘澁 **【功用】** 治脾泄久痢白濁夢遺女人崩

帶 **【禁忌】** 大便燥勿用 **【用量】** 每服二錢至四錢 **【處方】**

同茯苓山藥白朮扁豆甘草苡仁治脾虛下痢

瀉腸

蓮蕊鬚 **【性質】** 平味甘澁 **【功用】** 益血固精止夢泄遺精吐崩

諸血 **【用量】** 每服五分至一錢 **【處方】** 同茯苓芡實龍骨沙

苑治遺精

涼血

藕節 **【性質】** 平味甘澁 **【功用】** 止吐衄淋痢治產後血悶消渴

心煩 **【用量】** 每服二錢至四錢 **【處方】** 同生地丹皮白芍犀

角治胃熱吐血

提氣

荷葉 **【性質】** 平味苦 **【功用】** 散瘀血留好血痘瘡倒靨者用此

發之治吐衄崩淋損傷產瘀 **【禁忌】** 虛人勿用 **【用量】** 每服

五分至一錢 **【處方】** 同側柏葉艾葉生地為丸治血熱妄行

補脾

芡實 **【性質】** 平味甘澁 **【功用】** 固腎益精補脾去溼治泄瀉帶

瀉腸

濁小便不禁夢遺滑精 **【禁忌】** 大小便不利勿用 **【用量】** 每

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

補脾  
除濕

白扁豆 **【性質】** 微溫味甘 **【功用】** 通利三焦消暑除溼止渴止

瀉 **【禁忌】** 多服壅氣 **【用量】** 每服一錢至三錢 **【處方】** 同

寸冬五味川連乾葛解酒毒

淡豆豉 **【性質】** 寒味苦 **【功用】** 治溫病頭痛煩躁滿悶懊懷不

眠發斑嘔逆 **【用量】** 每服一錢至三錢 **【處方】** 同金銀花連

翹牛蒡薄荷甘草治風溫

麻仁 **【性質】** 平味甘 **【功用】** 潤胃燥通乳催生治汗多便難

**【禁忌】** 腸滑勿用 **【用量】** 每服二錢至四錢 **【處方】** 同生地

何首烏柏仁杞子寸冬治老人大便虛閉

薏苡仁 **【性質】** 微寒味甘 **【功用】** 治水腫溼痺脚氣疝氣泄痢

熱淋肺痿肺癰咳吐膿血筋急拘攣 **【禁忌】** 因寒筋急勿用

**【用量】** 每服錢半至三錢半 **【處方】** 同桔梗防己元參貝母括

萸甘草杏仁治肺癰

瀉腸 **【性質】** 平味酸澇 **【功用】** 治久嗽瀉痢遺精脫肛並療

行氣  
消食

破血  
消食

發表

散寒  
止嘔

多溺 **【禁忌】** 風寒作嘔勿用 **【用量】** 每服五分至一錢 **【處**

**方】** 同山藥、炙甘草、砂仁、苡仁。治久痢。

神麩 **【性質】** 温味辛甘 **【功用】** 回乳下胎、開胃化水、治痰逆癥。

結瀉痢脹滿 **【禁忌】** 胃火盛勿用 **【用量】** 每服一錢至二錢。

**【處方】** 同白朮。健脾燥溼。

紅麩 **【性質】** 温味甘 **【功用】** 治赤白下痢、跌打損傷、產後惡露。

不盡 **【禁忌】** 忌神曲 **【用量】** 每服一錢至錢半 **【處方】** 同

甘草、滑石。治暑痢。

葱白 **【性質】** 平味辛甘 **【功用】** 治傷寒頭痛、陰毒腹痛、脚氣奔

豚 **【禁忌】** 同蜜食殺人 **【用量】** 每服一寸至三寸 **【處方】**

同生姜、麻黃、桂枝、杏仁、甘草。治傷寒。

生薑 **【性質】** 温味辛 **【功用】** 治傷寒頭痛、傷風鼻塞、咳逆嘔噦。

胸壅痰膈、寒痛溼瀉 **【禁忌】** 生瘡人勿用 **【用量】** 每服一錢。

至三錢 **【處方】** 同甘草、半夏、白茯苓、陳皮。治中焦溼痰 **【附錄】**

生乾薑逐寒發表。炮乾薑除胃冷亦治癥瘕。並皆定嘔消痰。溫臟腑沈寒痼冷。去寒溼亦有殊功。

補脾肺

山藥

【性質】平味甘。【功用】止瀉痢。治虛損勞傷。健忘遺精。

瀆精

【用量】每服二錢至四錢。【處方】同生地。杞子。牛膝。甘菊。五味。

白茯苓治肝腎虛怯

補脾潤肺

百合

【性質】平味甘。【功用】止咳益氣。治浮腫臃脹。痞滿寒熱。

止咳

又治百合病。【禁忌】中寒下陷勿用。【用量】每服二錢至三

錢。【處方】同寸冬。五味。白芍。甘草。補脾胃氣。

行氣

萊菔

【性質】溫味辛。【功用】生用則吐風痰。散風寒。寬胸膈。炒

消食

用則化痰定喘。消食除脹。治下痢後重。【禁忌】虛喘勿用。【用

量】每服一錢至二錢半。【處方】同神曲。山查。茯苓。陳皮。治食積。

行氣

白芥子

【性質】溫味辛。【功用】發汗散寒。化痰消腫。治咳嗽反

化食

胃。痺木脚氣。【禁忌】久嗽勿用。【用量】每服一錢至錢半。

【處方】同白朮。治胸膈痰飲。

補脾利水

冬瓜仁

【性質】寒味甘 【功用】利二便消水腫止消渴散熱毒

癰腫

【用量】每服二錢至四錢 【處方】同茯苓車前甘草利

小便

通經脈

絲瓜

【性質】平味甘 【功用】消浮腫滑腸下乳治腸風崩漏疝

活血

痔癰疽

【用量】每服一錢至二錢 【處方】同猪苓赤小豆治

水腫

# 金石部

瀉火

石膏

【性質】大寒味甘辛淡 【功用】治溫病鬱結無汗發熱惡

寒日晡潮熱肌肉壯熱小便赤濁大渴引飲舌焦牙痛發斑發疹

【禁忌】胃弱血虛勿用 【用量】每服二錢至四錢 【處方】

同粳米甘草知母治熱病

滑石

【性質】寒味淡 【功用】治中暑積熱嘔吐煩渴黃疸水腫

利水  
瀉火

脚氣淋閉水泄熱痢吐血衄血諸瘡腫毒又能通乳滑胎 【禁忌】



**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

**Page not available.**

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

中。心腹血痛。驚疔瘧症。亦能殺蟲。【禁忌】血虛勿用。【用量】每服一錢至二錢半。【處方】同降香。紅曲通草。紅花。元胡。治胃腕瘀血痛。

散血明目

夜明砂

【性質】

寒味辛

【功用】

活血消積。治目盲翳障。血氣腹

一名天鼠矢

痛

【用量】

每服一錢至二錢

【處方】

同決明子。治翳障。

補血潤燥

阿膠

【性質】

平味甘

【功用】

滋腎補血。清肺養肝。潤燥定喘。利

大小腸。治虛勞咳嗽。肺痿吐膿。吐血衄血。血淋血痔。腰痠骨痛。崩帶胎動。【禁忌】瀉者勿用。【用量】每服一錢至三錢。【處方】

同炙草。白芍。寸冬。生地。白膠。杞子。歸身。杜仲。續斷。治胎漏下血。

去風

虎骨

【性質】

微熱味辛

【功用】

治風痺拘攣。疼痛驚悸。顛癇犬

健骨

咬

【用量】

每服一錢至錢半

【處方】

同牛膝。木瓜。生地。山藥。

山萸。黃柏。杞子。寸冬。五味。治痿不能步履。

瀉心腎

犀角

【性質】

寒味苦酸鹹

【功用】

治溫病時疫。發黃發斑。吐血

大熱

下血蓄血。譫狂痘瘡。黑陷。又能消癰化膿。定驚明目。【禁忌】孕

婦勿用 **【用量】** 每服三分至八分 **【處方】** 同生地紅花寸冬紫草白芍牛蒡治血熱痘疹。

瀉心肝火

羚羊角 **【性質】** 寒味鹹 **【功用】** 治驚癇搐搦骨痛筋攣狂越僻

謬夢魘驚駭血痢腫毒温病伏熱煩滿氣逆食噎不通 **【用量】**

每服三分至八分 **【處方】** 同杞子菊花穀精生地五味女貞子

黃柏治肝熱目翳

大補陽虛

鹿茸 **【性質】** 温味甘 **【功用】** 生精補髓強筋健骨治腰腎虛冷

四肢痠痛頭眩眼黑崩帶遺精 **【禁忌】** 血虛生熱勿用 **【用量】**

每服五分至一錢 **【處方】** 同牛膝杜仲山萸熟地補骨脂巴

戟山藥茯苓菟絲治腰痛陰痿

### 蟲魚部

瀉腸斂驚

龍骨 **【性質】** 平味甘澇 **【功用】** 固精止汗定喘斂瘡治多夢驚

癩脫肛吐衄崩帶遺精 **【禁忌】** 忌魚 **【用量】** 每服一錢至二錢

半 **【處方】** 同牛黃。鈞藤。丹砂。生地。茯神。琥珀。金箔。天竹黃。竹瀝。治大人顛症。小兒驚癇。

通經絡一 穿山甲 **【性質】** 寒。味鹹。 **【功用】** 通經下乳。消腫潰癰。止痛排膿。

名鮫鯉 治風濕冷痺。 **【用量】** 每服一錢至二錢半。 **【處方】** 同花粉。歸

尾。桃仁。白朮。治血瘀痛。

通血脈一 海螵蛸 **【性質】** 微溫。味鹹。 **【功用】** 治血枯血癢。血崩血閉。腹痛。

名烏賊骨 環臍陰蝕腫痛。瘡疔疔蟲。聾耳出膿。 **【用量】** 每服一錢至二錢。

**【處方】** 同蒲黃。治舌腫出不止。

補血 龜甲 **【性質】** 平。味甘。有毒。 **【功用】** 治骨蒸勞熱。腰脚痠痛。久瀉。

久痢。久嗽。咳瘧。癥瘕。崩漏。五痔。產難。 **【禁忌】** 腎虛無熱。勿用。

**【用量】** 每服一錢至三錢。 **【處方】** 同熟地。知母。黃柏。治血虛火熾。

補血退熱 鱉甲 **【性質】** 平。味鹹。 **【功用】** 治勞瘦骨蒸。往來寒熱。溫瘧。瘧母。

腰痛。脇堅。血癥。痔核。經阻。難產。陽癰。瘡腫。驚癇。斑痘。 **【禁忌】** 忌

雞子。莧菜。 **【用量】** 每服一錢至三錢。 **【處方】** 同青蒿。寸冬。五

補水

瀉腸

軟堅

瀉風熱

明目

去風化痰

燥溼去風

味生地杞子牛膝。治骨蒸勞熱。

**牡蠣** 【性質】微寒味苦瀉。【功用】止嗽斂汗。固大小腸。治虛勞。

煩熱溫瘧赤痢老血痕疔遺精崩帶。【禁忌】虛寒勿用。【用量】

每服一錢至三錢。【處方】同龍骨桂枝白芍甘草薑棗。治夢洩。

**石決明** 【性質】涼味鹹。【功用】除青盲內障散赤膜外障。通五。

淋愈瘡疽治骨蒸勞熱。【用量】每服一錢至三錢。【處方】同

甘菊川連決明子甘草明目。

**蠶蠶** 【性質】平味鹹辛。【功用】治中風失音頭痛齒痛喉痺咽

腫小兒驚疳膚如鱗甲並能下乳汁滅癥瘕。【用量】每服一錢

至二錢。【處方】同元參甘草桔梗馬勃連翹。治咽腫。

**晚蠶砂** 【性質】溫味辛甘。【功用】治風溼為病支節不隨皮膚

頑痺腰脚冷痛瘀血冷血爛弦風眼。【用量】每服錢半至三錢

【處方】同滑石茵陳雲苓杏仁苡仁黃芩通草海金沙川連治

濕溫。

補腎

桑螵蛸

【性質】

平味甘鹹

【功用】

治虛損陰痿夢遺白濁血崩

腰痛傷中疝瘕

【用量】

每服一錢至三錢

【處方】

同茯神遠

志菖蒲人參當歸龍骨鱉甲治便數又能補心安神

去風熱

蟬蛻

【性質】

寒味甘

【功用】

發痘疹退目翳催生下胞治皮膚

瘡瘍中風失音

【禁忌】

孕婦勿用

【用量】

每服五分至一錢

半

【處方】

同薄荷蘆根丹皮生地發痘疹

去風熱

全蠍

【性質】

平味甘辛有毒

【功用】

治頭風眩掉驚癇搐掣口

眼喎斜

【禁忌】

小兒慢脾風勿用

【用量】

每服一錢至錢半

【處方】

同僵蠶蟬蛻治驚風

瀉熱利水

地龍

【性質】

寒味鹹

【功用】

治溫病大熱狂言療大腹黃疸脚

氣

【用量】

每服一錢至三錢

【處方】

同石膏知母丹皮甘草

治溫病

人部

和血

血餘 **【性質】** 平。味苦。 **【功用】** 補血消痰。通關格。利二便。治血痢。

血淋。舌血。鼻血。轉胞不通。 **【用量】** 每服二分至五分。煨用。 **【處**

**方】** 同敗龜板。治交骨不開。

大補氣血

紫河車

**【性質】** 温。味甘。鹹。 **【功用】** 治一切虛損勞極。療恍惚失

志。顛癩。 **【用量】** 每服一錢至三錢。 **【處方】** 同人參。鹿茸。黃芪。

當歸。白膠。補骨脂。五味。巴戟天。治虛損。

中國實用藥物學卷下終



中華民國十二年八月初版  
中華民國十三年六月再版

版權所有  
准印

代售處

中國實用藥物學全一冊

定價大洋三角

編述者 宛平趙賢齊

印刷者 上海文華書局

出版者 中國醫葯研究會

棋盤街中市

發行者 上海廣益書局

廣東 永漢北路 江西 府學前

北京 楊梅竹斜街 長沙 萬福街 廣益書局

漢口 半邊街 開封 書店街