

重修政和經史證類備用本草

重修政和經史證類備用本草卷第百

已酉新
增衍義

成都唐

慎微

續明證

類

類

唐書... 續明證... 類... 類... 類...

救校勘

草部上品之上總八十七種

楊氏

滄莖

楊氏

三十八種神農本草經

白字

二種名醫別錄

墨字

藏書

五

一種唐本餘

藏書

藏書

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精

昌蒲

菊花

苦薏白
菊續注

藏書

人參

天門冬

甘草

乾地黄

术

菟絲子

牛膝

茺蔚子

女萎

附 萎 藜

防葵

苳胡

麥門冬

獨活

附 羌 活

升麻

車前子

附 葉 根

木香

薯蕷

今呼 山藥

薏苡

以 音

人

澤瀉

附 葉 實

遠志

附 小 草

龍膽

細辛

石斛

巴戟天

白英

白蒿

赤箭

菴藷

音 藷

荊實

音 實

薯蕷

赤芝

黑芝

青芝

白芝

黃芝

紫芝

卷柏

一種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王

堯木香

草犀根

薇

無風獨搖草

零餘子

百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石蘂

仙人草

會州白藥

救窮草

草豉

陳思岌

千里及

孝文韭

倚待草

雞侯菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

槌胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

斬金菜

益妳草

蜀胡爛

雞脚草

難火蘭

菱蕎

石薺寧

藍藤根

七仙草

甘家白藥

天竺乾薑

池德勒

兗州黃精

丹州黃精


滁州黃精



荆門軍黃精



永康軍黃精



解州黃精





商州黃精



洪州黃精

解州黃精

相州黃精



黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕

身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一

名鹿竹生山谷二月採根陰乾園隱居云今處處有二月始

根似菱蕤菱蕤根如荻根及昌蒲音既節而平直黃精根如鬼曰黃連

大節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而為仙經所貴根葉

華實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鈎吻相似惟

莖不紫花不黃為異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦為奇

事唐本注云黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指菱蕤肥

根頗類其小者肌理形色都大相似今以鬼曰黃連為比殊無傍騁

又黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鈎吻蔓生亦非比類今按

別本注今人服用以九蒸九暴為勝而云陰乾者恐為爛壞呂禹錫
等謹按相抄子云一名垂珠服其花勝其實其勝其根但花難得
得其生花十斛乾之纔可得五六斗耳而服之日可三合非大有役
力者不能辦也服黃精僅十年乃可得其益耳且以斷穀不及木木
餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年之時可以
與老小休糧人食之謂為米脯也廣雅云黃精龍狗也永嘉記云
黃精出崧陽永寧縣嶺南雜記論云黃精君陳藏器云黃精陶云將鈎
吻相似但一善一惡耳按鈎吻即野葛之別名若將野葛比黃精則
二物殊不相似不知陶公憑何此說其葉偏生不對者為偏精功用

不如正精 **黃精寒** 云補五勞七傷助筋骨止飢

耐寒暑益脾胃潤心脾單服九蒸九暴食之駐顏入藥生用

經云 黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北皆有之以嵩山

茅山者為佳三月生苗高一二尺以求葉如竹葉而短兩兩

相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀

子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用今

通八月採山中九蒸九暴作果賣甚甘美而黃黑色江南人說黃精苗

葉稍類鈎吻但鈎吻葉頭極尖而根細蘇恭注云鈎吻葛生非比類

恐南北所產之異耳初生苗時人多採為菜茹謂之筆菜味極美採

取尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名萎蕤一

名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭一名白及二

月三月採根入地八九寸為上細切一石以水二石五斗者去苦味

漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃末相和令得所

捏作餅子如錢許大初服二枚日益之百日知亦焙乾篩末水服功

與上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛乾之可得五六斗服

之可以長生世傳華他漆葉青黏散云青 **雷公云** 凡使勿用鈎

黏是黃精之正葉者書傳不載未審的否 **食療** 黃

只是葉有毛鈎子二箇是別認處若誤服害人黃精葉似 **食療** 黃

竹葉凡採得以溪水洗淨後蒸從已至子刀薄切曝乾用 **食療** 黃

精能老不飢其法可取甕子去底釜上安置令得所盛黃精令滿密

蓋蒸之令氣溜即暴之第二遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生時有一碩



熟有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五外服三百日後盡見鬼神餌必昇天根葉花實皆

可食之但相對者是不對者名偏精

多少細剉陰乾搗末每日淨水調

服任意多少一年之周變老為少

之見野草枝葉可愛即拔取根食之甚美自是常食久而遂不創輕

健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身

欻然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告

其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其

主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒饌五味香羹置

往來之路觀其食否果來食食訖遂不能遠去擒之具述其故指所食之草即

道藏神仙芝草經

黃精寬中益氣五藏調良肌肉

黃精也老顏色鮮明髮白更黑齒落更生先下三尸蟲上尸好寶貨百日下午

中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下爛出花實根三等花

為飛英根

博物志

昔黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不

為氣精

靈芝瑞草經

黃

稽神錄


臨川有士人產所使

聖惠方


地仙根莖不限

即黃精也

戎州菖蒲



衛州菖蒲



衡州菖蒲



昌蒲味辛温
且禹錫等謹按久風濕痺通用樂云昌蒲平

無毒主風寒濕痺欬

逆上氣開心孔補五藏通九竅明目自出音聲主耳

聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒溫瘡
身積熱不解可作浴湯以服輕身聰耳目不忘不迷惑

益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡

嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根陰

乾秦皮秦尤為之使惡地膽麻黃陶隱居云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石積上概音既節為好在下濕地大根者

昌蒲葉有脊一如劍刃四月五月亦作小釐華也東間溪側又有名溪

上昌蒲者謬矣此止主效逆亦斷蚤蟲爾不入服御用詩詠多云蘭

蓀正謂此也目禹錫等謹按吳氏云昌蒲一名堯韭羅浮山記云山中昌蒲一寸二十節藥性論云昌蒲君味苦辛無毒治風濕痺痺耳

鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥癢石澗所生堅小一寸九節者

上此昌蒲亦名昌陽日華子云除風下氣丈夫水藏女人血海冷敗

多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋治客風瘡疥澁小便秘腹藏

蟲及蚤蠹耳痛作末炒承熱裏罾其驗忌飴糖羊肉石昌蒲出宣州
二月八月採取**圖經曰**昌蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池
州戎州者佳春生青葉長一二尺許其葉中心有

脊狀如劍無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥沙石土中臘月移之尤易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治擇一斤許以水及米泔浸各一宿又刮去皮切暴乾搗篩以糯米粥和勻更入熟蜜搜丸梧子大絺葛袋盛置當風處令乾每旦酒飲任下三十九丸臨卧更服二十九丸久得効如本經所說又蜀人用治心腹冷氣擗痛者取一二寸槌碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒患心痛嚼一二寸熟湯或酒送亦効其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者此即醫方所用石昌蒲也又有水昌蒲生溪澗水澤中甚多蕪亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石昌蒲不堪入藥用但可搗末油調塗疥

雷公去

凡使勿用泥昌夏昌

蠶今藥肆所慎多以兩種相雜尤難辨也其二件相似如竹根鞭形黑氣穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩黃緊硬節稠長一寸有九節者是真也採得後用銅刀刮上黃黑硬節皮一重子用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條剉用

千金方

日月未足而欲產者搗昌蒲根汁一二外灌喉中

又方

久服聰明益智甲子日取昌蒲一寸九節者陰乾百日為末服方寸匕日三服耳目聰明不忘

又方

治產後崩

中下血不止昌蒲一兩半剉酒二盞煎取一盞去滓分三服食前溫服

又方

治好忘久服聰明益智七月七日取昌蒲酒服

三方寸匕飲酒不醉好事者服而**肘後方**扁鵲云中惡與卒死
驗之不可犯鐵若犯之令人吐逆鬼擊亦相類已死者

為治皆參用此方搗昌蒲生根絞汁灌之立差尸厥之病卒死脉猶
動聽其耳中如微語聲股間暖是也亦此方治之又人卧忽不寤勿

以火照照之害人但痛蓋其踵及足拇指甲際**又方**耳聾昌蒲根
而唾其面即活又昌蒲末吹鼻中柱末內舌下**又方**一寸巴豆一

粒去心二物合搗分作七**又方**卒胎動不安或腰痛胎轉搶心
九綿裹塞耳日著一丸効**又方**下血不止昌蒲根汁三升服之**又**

方若下血不止昌蒲三兩酒**經驗方**治離腫發背生昌蒲搗
五升煮取二升分三服貼若瘡乾搗末以水調

塗之并用**子母秘錄**治胎動勞熱不安去血手足煩**產書**治
和方同昌蒲搗取汁服二升分三服

後下血不止昌蒲二兩以**夏禹神仙經**昌蒲薄切令日乾者三
酒二升煮分作兩服止斤以絹囊盛之玄水一

斛清者玄水者酒也懸此昌蒲密封開一百日出視之如綠菜色以
一斗熟黍米內中封十四日間出飲酒則一切三十六種風有不治

者悉**漢武帝內傳**武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰吾
較九嶷山人也聞中嶽有石上昌蒲一寸九節

食之長生故來**抱朴子**南中多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦蓋
採之忽然不見遊牝多也及夏則唯食昌蒲一味却肥當

角解之時其茸甚痛獵人逢之其鹿不敢逸走伏而不動獵者先以
繩繫其茸截取之以其血未散然後斃鹿又韓蕞服昌蒲十三年身


上生毛曰視書萬言皆誦之冬但不與
又昌蒲須得石上一十九節紫花九莖別說云謹按今陽羨山中
逆水而生根鬚略無少泥土根葉極緊細一寸不啻九節入藥極佳
今二浙人家以瓦石器種之且暮易水則茂水濁及有泥滓則萎近
方多稱用石昌蒲必此類也其地澤所生肥大節疎龜
慢恐不可入藥唯可作果盤蓋氣味不烈而和淡爾

衍義曰

菖蒲世又謂之蘭蒸生水次失水則枯根節密若氣味足


粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有下俚教以菖蒲三斗對日乾之
椿羅為末布蓆上使病瘡人恣卧其間仍以被衣覆之既不粘着衣
被又復得睡不五七日間其瘡如尖後自患此瘡亦如此用
應手神驗其石菖蒲根絡石而生者節乃密入藥須此等

鄧州菊花



衡州菊花

菊花



菊花味甘平無毒主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死

肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除骨中煩熱安腸胃利

五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節華一名

日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名

傳延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根二月採

葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾木枸杞根桑根白皮為之

使爾隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者為真

一種青莖而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦蕒非真其華正相似唯

以甘苦別之爾南陽鄆縣最多今近道處處有取種之便得又有白

菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不白仙經以菊為

妙用但難多得宜常服之爾自為錫等語按爾雅云鞠治癯注今之

秋華菊經性論云甘菊花使能治熱頭風旋倒地腦骨疼痛身上諸

風令消散陳藏器云苦蕒味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止

澆花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊菊甘而蕒苦語曰苦如蕒是也

云白菊味苦漆髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不老益顏

色又靈寶方茯苓合為丸以成鍊松脂和每服如鷄子一九令人好

顏色不老主頭眩生平澤花紫白五月花抱朴子劉生丹法用白菊

花汁和之楊損之云甘者入藥苦者不任日華子云菊花治四肢遊

風利血脉心煩胃膈壅悶并癰毒頭痛作枕明目葉亦明目生熟並

可食菊有兩種花大氣香莖紫者為甘菊花小氣烈莖青小者名野

菊味苦然雖如此園蔬內種肥沃後同一圖經曰菊花生雍州川

澤及田野今處

處有之以南陽菊潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊之種類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘此為真有青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者華亦大名苦蕒非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白藥黃其黃菊葉似蒿蒿花葉都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾用唐天寶單方圖載白菊云味辛平無毒元生南陽山谷及田野中潁川人呼為田蜂菊汝南名蔡苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地檄蒿諸郡皆有其功主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落背中痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二十七壯并服此白菊酒及丸永差其法春末夏初收軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再漸加三方寸匕若不欲飲酒者但和羹粥汁服之亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯三大斛酒中經七日服之日三常令酒氣相續為佳

食療云

甘菊平其藥正月採可作

聖惠方

治頭風頭旋用九月

羹莖五月五日採花九月九日採並主頭風目眩淚出去煩熱利五藏野生苦菊不堪用九日菊花暴乾取家糯米一斛蒸熟用五兩菊花末搜拌如常醞法多用細麵麴為候酒熟即壓之去滓每煖一小盞服

外臺

秘要

治酒醉不醒九月九日

肘後方

治丁腫垂死菊葉一握搗絞汁一升入口即活此神

真菊花末飲服方寸匕

驗冬用
其根

食醫心鏡

甘菊主頭風目眩背中洶洶目淚出風痺骨肉痛切作羹煮粥并生食並得

玉

函方

王子喬變白增年方甘菊三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰容成九月上寅日採名曰金精十二月上寅日採

名曰長生長生者根莖是也四味並陰乾百日取等分以成日合搗千杵為末酒調下一錢匕以蜜丸如桐子大酒服七丸一日三服百

日身輕潤澤服之一年髮白變黑服之二年齒落再生服之三年八十歲老人變為童兒神効

衍義曰

菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應候而開者是也月令所謂菊有黃花者也又鄧州白

菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用專治頭目風熱今多收之作枕




潞州人參



威勝軍人參

兗州人參



滁州人參



人參味甘微寒微溫無毒 主補五藏安精神定魂魄
 止驚悸除邪氣明目開心益智 療腸胃中冷心腹鼓痛
 腎脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積令人
 不忘及服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名
 人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼
 東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風
 扶苓為之

使惡洩疏反藜蘆陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟者形細而

堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百

濟百濟今臣屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之爾實用並不

及上黨者其為藥切要亦與甘草同功而易蛀音注蚌音仲唯內器中

密封頭可經年不壞人參生一莖直上四五葉相對生花紫色高麗

人作人參讚曰三極五葉皆陽向陰欲來求我假音賈樹相尋檟樹

葉似桐甚大陰廣則多生陰地採作甚有法今近山亦有但作之不

好唐本注云陶詵人參苗乃是薺荑桔梗不悟高麗讚也今路州平

州澤州易州檀州冀州幽州媯州並出蓋以其山連亘相接故皆有

之也今注人參見用多高麗百濟者潞州太行山所出謂之紫團參

亦用焉陶云俗用不入服非也巨禹錫等謹按藥性論云人參惡白

鹹生上黨郡人形者上出海東新羅國又出渤海主五藏氣不足

五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏六腑保

中守神又云馬蘭為之使消骨中痰主肺萎吐膿及癩疾冷氣逆上

傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加而用之請病云人參和細辛

密封經年不壞日華子云殺金石

圖經曰人參生上黨山谷及遼

藥毒調中治氣消食開胃食之無忌東今河東諸州及泰山

皆有之又有河北推揚及閩中來者名新羅人參然俱不及上黨者

佳其根形狀如防風而潤實春生苗多於深山中背陰近報音賈漆

下濕潤處初生小者三四寸許一極五葉四五年後生兩極五葉未

有花莖至十年後生三極年深者生四極各五葉中心生一莖俗名

...

百尺杆三月四月有花細小如粟藥如絲紫白色秋後結子或七八
枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神二月四月八月月上旬採根
竹刮去土暴乾無令見風泰山出者葉幹青根白殊別江淮出一種
土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二尺葉相對生生五七節
根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋採根不入藥本
處人或用之相傳欲試上黨人參者當使二人同走一處人參舍之
一不與度走三五里許其不合人參者必大喘舍者氣息自如者其
人參乃真也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困
弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水二大外煮取四合熱頓服
日再兼以人參汁煮粥與飲李直方司勳徐郎中於漢南患反胃兩
月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名
醫持論此藥難可為儔也又雜他藥而其効最著者張仲景治胃痺
心中痞堅留氣結胃脘滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參木乾薑
甘草各三兩四味以水八升煮取三升每服一升日三如臍上築者
為腎氣動去木加桂四兩吐多者去木加生薑三兩下多者復其木
悸者加茯苓二兩渴者加木至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒
者加乾薑至四兩半滿者去木加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥
一升許微自溫勿發揭衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病者
無不用之或作湯或蜜丸或加減皆奇効胡洽治霍亂謂之溫中湯
陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四順厚朴諸湯不可
暫闕常須預合每至秋月常齋自隋唐石泉公王方慶云治中丸以
下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排比也其三方者治

中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六外煎取二外半分四服若下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯

海藥云

出新羅國所貢又有手脚狀如人形長尺餘以於木夾定紅線纏飾之味甘微

溫主腹腰消食補養臟腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩躁變酸水又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者吐人慎之

雷公云

凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心疝之患也

秘要

治蜂蝎螫人方 人參嚼以封之 千金方 開心肥健人人參一分猪肪十分酒拌和服一百日百日滿體髓溢

日誦千言肌膚潤澤去熱風痰

肘後方

治卒上氣喘急鳴息便欲絕 經驗後方 人參末服方寸匕日五六服

治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾為末麪糊丸如棗豆大每服十九食後生薑湯吞下

方

治狗咬破傷風以人參不計多少桑柴火上燒令煙絕用蓋子合研為末摻在瘡上立効 勝金方 治吐血以

人參一味為末鷄子清投新汲水調下一錢服之

靈苑方

治咳嗽上氣喘急嗽血吐血人參好者搗為末每服三錢

七鷄子清調之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹鮮醬麪等并勿過醉飽將息佳

行義曰

人參今之用者皆河北權場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實用之有據土人得一


稟則置於版上以色茸纏繫根頗纖長不與播場者相類
 根下垂有及一尺餘者或十歧者其價與銀等稍為難得



建州天門冬



漢州天門冬



兗州天門冬



西京天門冬

梓州天門冬

温州天門冬



天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨

髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利

小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顛勒

生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾垣衣地黃為之使畏曾青隨

隱居云奉高太山下縣名也今處處有以高地大根味甘者為好張華博物志云天門冬逆將有逆刺若葉滑者名緜休一名顛棘可以

浣繅素白如絨音越紆類金城人名為浣草擊其根温湯中投之以浣衣勝灰此非門冬相似爾按如此說今人所採皆是有刺者本名

顛勒亦粗相以浣垢衣則淨桐君藥錄又云葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬自

一種不即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異爾門冬蒸剝去皮食之甚甘美止飢雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火烘之

也俗人呼苗為棘刺者作飲乃宜人而終非真棘刺爾服天門冬禁食鯉魚唐本注云此有二種苗有刺而澁者無刺而滑者俱是門冬

俗云顛刺浣草者形貞詔音暝之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨門冬浣草之名也今按陳藏器本草云天門冬陶云百部根亦

相類苗異爾按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖根長尖內虛味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所說乃是同

類今人或以門冬當百部者說不明也呂禹錫等按爾雅云蔞蔞蔞冬注云門冬一名滿冬蔞音門抱朴子云或名地門冬或名莖門

冬或名巔棘或名淫羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘆而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可

服食然善令人下氣為益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駛於木及黃精也入山便可蒸若煮啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散

并搗絞其汁作液以服散尤益藥性論云天門冬君主肺氣欬逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕齊止消渴去熱中風宜

久服煮食之令人肌體滑澤除身中一切惡氣不潔之疾令人體淨蜀人使浣衣如玉和地黃為使服之耐老頭不白能冷補患人體虛

而熱加而用之揚損之云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之

子云貝母為使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并

嗽消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血去心用圖經曰天門冬生奉高山谷今處處有之春

香極尖細而踈滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆

名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無

花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者為勝頗與百

部根相類然圓實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根四

破之去心先蒸半炊間暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥洛

中出者葉大幹鹿殊不相類嶺南者無花餘無它異謹按天門冬別

名爾雅謂之藜亡彼切一名藟與門同冬山海經云條谷之山其草

多芍藥藟冬是也抱朴子及神仙服食方云天門冬一名顛棘在東

嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在

南嶽名百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有其名各異其實一也

在北嶽地陰者尤佳欲服之細切陰乾擣下篩酒調三錢七日五六

圖經曰

雷公云

採得了去上皮一重便劈破去心用柳木甑燒柳木柴蒸一伏時洒酒令遍更添火蒸出曝去地二尺已

之詳

何

來作小架上鋪天門葉將蒸了天門冬攤令乾用

食療

補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煮之食後服之若

曝乾入蜜丸尤佳

外臺秘要

治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮曝乾搗篩酒

服方寸匕若人亦用洗面甚佳

經驗後方

服天門冬法不計多少去心皮為末每服方寸匕日三四服不絕甚益人

以酒飲之又治癥瘕積聚去三尸

孫真人枕中記

天門冬末服方寸匕日三

輕身益氣延年耐老百病不侵

修

無間山中入

除恒勿廢久服益若釀酒服之去癥瘕積聚風痰

癩狂三蟲伏尸

益氣令人不飢百日還年耐老

輕三年走

道書八帝聖化經

欲不畏寒取天門冬茯苓等

及奔馬

寒時單衣汗出

抱朴子

云杜紫微服天門冬御八十妾有男一百四十人日行三百里

天門冬齒落更生細髮復出

神仙傳

甘始者太原人服天門冬在人間三百餘年

列仙傳

赤頭子食

衍義曰

天門冬麥門冬之類雖曰去心但以水漬漉使周潤滲入肌俟軟緩緩攪取不可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不效乃曰藥不神其可得乎治肺執之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服餘如二經

汾州甘草



府州甘草



汾州甘草

甘草國老味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨

長肌肉倍力金瘡疔時勇切解毒温中下氣煩滿短氣

傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精

安和七十二種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜

甘名美草一名蜜草一名露草生河西川谷積沙山及上

郡二月八月除日採根暴乾十日成木乾漆苦參為之使惡遠志反大戟芫花甘遂

海藻四物陶隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸

夷中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火

炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者破刀破不復好青州間亦有不

如又有紫甘草細而實乏時可用此草最為衆藥之主經方少不用

者猶如香中有沈香也國老即帝師之稱雖非君為君所宗是以能安和草石而解諸毒也蘇頌按爾雅云藎大苦注今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖亦有節節有枝相當疏引詩唐風云采芩采芩首陽之巔是也藥論云甘草君忌猪肉諸藥衆中為君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使諸藥有功故號國老之名矣主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內

傷令人陰痿主婦人血瀝腰痛虛而多熱加而用之 **日華子**云安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養

氣壯筋骨解冷 **圖經**曰甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西熟入藥炙用 河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉

如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺葉細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除口採根暴乾十

日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云藎大苦

釋曰藎一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云藎似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也藎與

苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草

湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒為衆藥之要孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定方稱

大豆解百藥毒嘗試之不効乃加甘草為甘豆湯其驗更速又備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解毒藥並是嘗用物畏人得其法

乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥辭久住彼與之親狎乃得其實凡欲食先取甘草一寸炙熟嚙咽汁若中毒隨即吐出乃用都憚藤

黃藤二物酒煎令溫常服毒隨大小度出都憚藤者出嶺南高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物不吐者非毒也崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方神授極奇秘以甘草三大兩生搗別篩末大麥麩九兩

於一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水搜
如餅劑方圓大於瘡一分熱傳腫上以油片及故紙隔令通風冷則

換之已成膿水自出未成腫便內消當患腫著藥時常須喫黃耆粥
甚妙又一法甘草一大兩微炙搗碎水一大外浸之器上橫一小刀

子置露中經宿平明以物攪令沫出吹
沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效

雷公云

凡使須去頭尾尖處其頭尾吐

人每斤皆長三寸剉劈破作六七片使蒸器中盛用酒浸蒸從已至
午出暴乾細剉使一斤用酥七兩塗上炙酥盡為度又先炮令內外

赤黃**外臺秘要**救急瘦疾甘草三兩炙每旦**百一方**小兒初
用良以小便者三四沸頓服之良生未可

與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以纏綿點兒口中
可得一規殼止兒當使吐胃中惡汁此後待兒飢渴更與之若兩服

並不吐盡一合止得**又方**中蠱者煮甘草服之當痰出若平生預
吐惡汁兒智惠無病服防蠱者宜熟炙甘草者服之凡中蠱

毒即內消不**又方**食牛羊肉中毒者煮甘草**經驗方**崔宣州衍傳
令吐痰神驗草汁服之一二外當愈赤白痢方甘

草一尺炙擘破以淡漿水蘸三二度又以慢火炙之後用**梅師方**
生薑去皮半兩二味以漿水一外半煎取八合服之立効

治初得痢冷熱赤白及霍亂甘草一兩炙**孫真人食忌**主一切
豆蔻七箇剉以水三外煎取一分服傷寒甘

草如中指長炙細剉取童子小便一**廣利方**治肺痿久咳嗽涕唾多
外和前取七合空心服日再服之骨節煩悶寒熱甘草

十二分炙搗為末每日取小便
三合甘草末一錢匕攪令散服
御藥院 治二三日咽痛可與
甘草湯去滓日三服今

古錄驗 治陰下濕痒甘草一尺並切以水五
度差
金匱玉函 菜中
有水

莨菪葉圓而光有毒誤食之令人狂亂
狀若中風或吐甘草煮汁服之即解
又方 治誤飲饌中毒者未
審中何毒卒急無藥

可解只煎甘草薺茺
湯服之入口便活
又方 治小兒撮口及發噤方用生甘草一分
細判以水一盞煎至六分去滓溫與兒

服令吐痰涎後以
乳汁點兒口中差
又方 治小兒中蠱欲死甘草半兩判以水
一盞煎五分去滓作二服當吐蠱出
又方

治小兒廩瘦憊憊方甘草二兩炙焦杵為
末蜜丸如棗巨大每溫水下五九日二服
傷寒類要 治傷寒三
日咽痛

者與甘草二兩炙水三升
煮取一升半服五合日三
又方 傷寒脉結代者心悸動方甘草二
兩水三升煮取一升半服七合日二

姚和衆 治小兒尿血甘草五分以水六合煎
取二合去滓一歲兒一日服令盡
淮南子 甘草主
生肌肉

衍義曰 甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似有白
毛實作角生如相思角作一本生子如小扁豆齒嚙不破

今出河東西界入藥須微炙
不爾亦微涼生則味不佳

乾地黃

冀州地黃



沂州地黃



乾地黃味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺填

骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七

傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃

中宿食飽力斷絕補五藏內傷不足通血脉益氣力

利耳目生者尤良○生地黃大寒主婦人崩中血不

止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮

墜腕折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕身不

老一名地髓一名芫一名芑生咸陽川澤黃土地者

佳二月八月採根陰乾得麥門冬清酒良惡具母畏蕪荑陶

有子實實如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最好次歷

陽今用江寧板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用一意而此直

去陰乾色味乃不相似更恐以蒸作為失乎大貴時乃取牛膝萎雜

作之人不能別仙經亦服食要用其華又善生根亦主耳暴聾重聽

乾者黏濕作丸散用湏烈日暴之既燥則斤兩大減一斤纔得十兩

散爾用之宜加量也今按陳藏器本草云乾地黃本經不言生乾及

蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾則平宣當依此以用之目

禹錫等謹按爾雅

云芫地黃注云一名地髓江東呼芫音怙

性論云乾地黃君能補虛損溫中下氣通血脉久服變白延年治產

後腹痛主吐血不止又云生地黃忌三白味甘平無毒解諸熱破血

通利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而

用之爾雅云乾生二種皆黑鬚髮良藥目詳云乾地黃助心膽氣

安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運助筋骨長

志日乾者平火乾者溫功用同前又云生者水浸驗淨者名夫黃半

浮半沈者名人黃沈者名地黃沈者

圖經曰

地黃生咸陽川澤黃土

力佳半沈者次浮者劣煎忌鐵器
 同州為上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及
 尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房
 如連翹子甚細而沙褐色根如人手拍通黃色鹿細長短不常二月
 八月採根蒸三二日令爛暴乾謂之熟地黃陰乾者是生地黃種之
 甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地
 則根大而多汁其法以葦席圓編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中
 為壇壇上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮
 屠也乃以地黃根節多者寸斷之蔣壇上層層令滿逐日以水灌之
 令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斲傷故
 也得根暴乾之熟乾地黃最上出同州光潤而甘美南方不復識但以生
 地黃草煙熏使乾黑洗之煤盡仍白也今乾之法取肥地黃三二十
 斤淨洗更以揀去細根及根節瘦短者亦得二三十斤搗絞取汁投
 銀銅器中下肥地黃浸漉令泔飯上蒸三四過時時浸漉轉蒸訖又
 暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴糖須麤器內收之以其脂
 柔喜暴潤也又醫家欲辨精粗初採得以水浸有浮者名天黃不甚
 用半沈者名人黃為次其沈者名地黃最佳也神仙方服食地黃採
 取根淨洗搗絞取汁煎令小稠內白蜜更煎令可丸晨朝酒送三十
 丸如梧子曰三亦入青州棗肉同丸又煎膏入乾根末丸服又四月
 採其實陰乾篩末水服錢七其効皆等具花名地髓花延年方有單
 服二法又治傷折金瘡為最要之藥肘後方療腕折四肢骨破碎及

筋傷蹉跌爛搗生地黄熬之累所傷處以竹簡編夾之遍急縛勿令

轉動一日一夕可以十易則差崔元亮海上方治一切心痛無問新

久以生地黄一味隨人所食多少搗絞取汁搜麩作餅餓或冷淘食

良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病三

年不差深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得蟲置於

竹節中每所食皆飼之因食地黃餘餓亦與之隨即壞爛由此得方

劉禹錫傳信方亦紀其事云正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂

氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇狀無目

足等微似有口蓋為此物所食

自此遂愈食冷淘不用著塩

酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵器令

人腎消并白髮髮男損榮女損衛也

食療 地黃微寒以少蜜煎或

浸食之或煎湯或入酒

飲並妙生則寒主齒痛

垂血折傷葉可以羹

外臺秘要 張文仲治骨蒸方生地黄一分

搗取汁三度搗絞汁盡分再服

若利即減之以

千金方 治牙齒根欲動脫生地黄細判綿裹着齒

身體涼為度

上啞之漬齒根日三四并燕之十日大佳

胎生地

肘後方 治耳中常鳴生地黄截塞耳數易之以差

為度一云以紙裹微灰火中煨之用良

百方 胎生地

黃汁一升漬酒四合煮

又方 治衄大咬人搗地黃汁

三五沸服之不止又服

飲之并塗瘡口百度止

梅師方 治墮

骨蹉跌骨碎破搗生地黄髮熱裏

三日夜數易若血聚以針使之

又方 治吐血神効方生地黄黃汁

一外二合白膠香二兩以

甕器盛入甌蒸令膠消服又方治乳癰搗生地黃汁傅之食醫心鏡主勞瘦骨蒸日晩寒

熱咳嗽唾血生地黃汁二合煮白粥博濟方治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黃

杵如泥隨腫大小攤於布上擦木香末於中孫兆方治鼻衄及腸

又再攤地黃一重貼於腫上不過三五度黃龍腦薄荷等分子母秘錄小兒患蠱毒痢生地黃汁產寶娠

為末冷水調下下血如月信通恐胎漏方乾地黃乾薑等分為末用酒調方寸匕抱朴子楚文子服地黃八年

淮南子云地黃主屬骨

衍義曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點此人謂之牛

血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱瀆地黃者生與生乾常慮太寒

如此之類故後世改用熟者蒸曝之法以細碎者洗出研取汁將鹿

地黃蒸出曝乾投汁中浸三二時又曝再蒸如此再過為勝亦不必

多此等與乾生二種功治殊別陶但云擣汁和蒸殊用工意不顯其

法不注治瘵故須悉言耳

倉木

齊州木



荆門軍木



商州木



石州木




舒州术



歙州术



越州术



木味苦甘温無毒主風寒濕痺死肌瘰疬止汗除

熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間

風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益

津液暖胃消穀嗜食作煎餌以服輕身延年不飢一名山

薊一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三

月八月九月採根暴乾防風地榆為之使陶隱居云鄭山即南

勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣

弭災疹九散煎餌並有法其苗又可作飲甚香羨去水木乃有兩種

白朮葉大有毛而作極根甜而少膏可作丸散用赤朮葉細無極根

小苦而多膏可作煎用昔劉涓子接取其精而丸之名守中金丸可

以長生東境朮大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白
非自然用時宜刮去之日禹錫等撰醫方氏本草云朮一名山芥一
名天蘇爾雅云朮山薊注今朮似薊而生山中疏云生平地者即名
常服山精爾雅性論云白朮君忌桃李雀肉菘菜青魚味甘辛無毒能
主大風痺痺多年氣刺心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止

下泄主面光悅駐顏去黥治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛吐瀉不住
及胃氣虛冷痢日華云木治一切風疾五勞七傷冷氣腹脹補腰

膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨弱軟痲痺氣塊婦人冷
癥瘕溫疾山嵐瘴氣除煩長肌用米泔浸一宿入藥如常用又名吃

力伽蒼 **圖經曰** 木生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以蒿山茅
者去皮 **圖經曰** 山者為佳春生苗青色無極一名山薊以其葉似

刺也莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊
花或有黃白花者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細根皮

黑心黃白色中有膏液紫色二月三月八月九月採暴乾乾濕並通
用今八月採之服食家多單餌之或合白茯苓或合石昌蒲並搗末

旦曰水調服晚再進久以彌佳又麝取生木去土水浸再三煎如飴
糖酒調飲之更善今茅山所製木煎是此法也陶隱居云昔者劉涓

子按取其精而丸之名守中金丸今傳其法乃是膏煎恐非真耳謹
按木有二種爾雅云木山薊楊抱享薊釋曰此辨薊生山中及平地

者名也生平地者名薊生山中名木陶注本草云白木葉大而毛
甜而少膏赤木細苦而多膏是也其生平地而肥大於眾者名楊抱

薊今呼之馬薊然則楊抱即白木也今泉生杭越舒宣州高山崗上
葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作極生二月三

月八月九月採根暴乾以大塊紫花者為勝又名 **唐本云** 利小
乞力伽凡古方云木者乃白木也非謂今之木矣

用苦酒漬之用 **聖惠方** 治雀目不計時月用蒼木二兩搗羅為
拭面黥點極効 **聖惠方** 散每服一錢不計時候以好羊子肝一

散每服一錢不計時候以好羊子肝一

箇用竹刀子批破搽藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮外臺

熟為度患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟眾亦治小兒雀目

秘要 療忽頭眩暈經久不差四體漸羸食無味好食黃土木三斤

李雀蛤 翅三斤搗篩酒和併丸如梧桐子大曝乾飲服二十九忌桃

日三服 **千金方** 治中風口噤不知人木四 又方 療煩悶白木末

經驗方 烏鬚鬚駐顏色壯筋骨明目除風氣潤肌膚以服令人

輕健蒼木不計多少用米泔水浸三兩日逐日換水候滿

日取出刮去黑皮切作片子暴乾用慢火炒令黃色細搗末每一斤

末用蒸過茯苓半斤煉蜜為丸如梧桐子大空心卧時溫熱水下十

五丸別用木末六兩甘草末一兩拌和勻 又方 治內外障眼蒼木

作湯點之下木丸妙忌挑李雀蛤及三白 又方 治內外障眼蒼木

逐日換水後刮去黑皮細切入青鹽一兩同炒黃色為度去鹽不用

木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同搗為末每日不計時候

但飲食蔬菜內調 **梅師方** 治心下有水白木三兩澤瀉五兩

下一錢七服甚驗 **驗方** 治毒氣攻症足脛久瘡不差白木為細末鹽漿水洗瘡乾貼

之米 二日一換可以負重涉險凶年與老小休糧人不能別之謂

產寶 產後中風寒遍身冷育口噤不識人方 **荀子注** 列仙

白木四兩以酒三外煎取一外頓服

消子齊人隱於岩 **抱朴子** 內篇曰南陽文氏值亂逃臺山中飢困

山餌木能致風雨 欲死有一人教之食木遂不飢數十年

乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故木一名山精神藥經曰必欲長生當服山精

人長生絕穀致神仙 梁庾肩吾 踏玉液足使坐致延生伏深銘感

衍義曰 蒼木其長如大小拍肥實皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮白木麤促色微褐氣味亦微辛

苦而不烈古方及本經止言木未見分其蒼白二種也只緣陶隱居言木有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將

蒼木置而不用如古方平胃散之類蒼木為最要藥功尤速殊不詳本草元無白木之名近世多用亦宜兩審然康曰聞道人遺言餌水

黃精令人久壽亦無白字

單州菟絲子



菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健

汁去面黥養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘

瀝口苦燥渴寒血為積又服明目輕身延年一名菟蘆

一名菟縷一名蘆蒙一名玉女一名赤網一名菟纍音羸生朝

鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細為赤網色淺而大

為菟纍九月採實暴乾得酒良署預松脂為之使惡菌陶

多皆浮生藍紵麻蒿上舊言下有茯苓上生菟絲今不必爾其莖按以

浴小兒療熱痹音沸用其實先酒漬之一宿仙經俗方並以為補

藥臣禹錫等謹按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓

根也抱朴子云菟絲之草下有伏兔之根無此兔則絲不得生於上

然實不屬也又內篇云菟絲初生之根其形似兔掘取割其血以和

丹服之立變化藥世論云菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓

去腰疼膝冷以服延年駐悅顏色又主消渴熱中

七傷治鬼交泄精尿血潤心肺苗莖似黃麻線無根株多附田中草

被纏死或生一叢如席闊開花結子不

分明如碎黍米粒八月九月已前採

有之以窵句者為勝夏生苗如絲綜蔓延草木之上或云無根假氣

而生六七月結實極細如蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其實

圖經曰菟絲子生朝鮮川

澤田野今近京亦

有之

而生

有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟纍其功用並同謹按
爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本

經并以唐蒙為一名又詩云蔦與女蘿毛傳云女蘿菟絲也陸機云今

合藥菟絲也而本經菟絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木

類寄生松上者亦如菟絲寄生草上豈二物同名本經脫漏乎又書

傳多云菟絲無根其根不屬地今觀其苗初生纒若絲遍地不能自

起得他草梗則纏繞隨而上生其根漸絕於地而寄空中信書傳之

說不謬矣然云上有菟絲下有茯苓茯苓抽則菟絲死又云菟絲初

生之根其形似菟掘取剖其血以和丹服之今人未見其如此者豈

自一類乎仙方多單服者取實酒浸暴乾再浸又暴令酒盡篩末酒

服以而彌佳兼明目其

苗生研汁塗面斑神效

菟絲子稟中和凝正陽氣受結偏補人衛氣助人筋脉一莖從樹感

技成又從中春上陽結實其氣大小受七鎰二兩全採得去鹿薄殼

了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾

入臼中熱燒鐵杵一去三千餘杵成粉用苦酒并黃精自然汁與菟

絲子相

時後方

治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升

又方

治痔發痛

如蟲齧菟然子熬令黃黑末和

又方

治面上粉刺搗菟絲

經驗

後方 治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器內用酒過一寸五日暴乾為末將元浸酒再

入少醇酒作糊搜和丸如梧
桐子大空心酒下二十九
又方固陽丹菟絲子二兩酒浸十日

蜜炙搗用署預末酒煮為糊丸如
梧桐子大空心用酒下五十九
子母秘錄治小兒頭瘡及女

產書治橫生菟絲子為末酒調
下一錢匕米飲調亦得
修真方酒一斗浸良久漉出

暴乾又浸以酒盡為度每服二錢温酒下日二服後喫三五匙水餅
壓之至三七日加至三錢匕服之令人光澤三年老變為少此藥治

腰膝去風
久服延年

衍義曰菟絲子附叢木中即便蔓延花實無綠葉此為草中之異
其上有菟絲下有茯苓之說未必耳已於茯苓條中具言之

單州牛膝



牛膝
君為味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不

懷州牛膝



滁洲牛膝



歸州牛膝



本草六

五

四

可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消

老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人

月水不通血結益精利陰氣止髮白及服輕身耐老一

名百倍生河内川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾惡

火陸英龜甲畏白前隨隱居云今出近道蔡州者最良大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有雌雄雄者莖紫色而節大為勝爾

唐本注云諸藥八月已前採者皆曰乾火乾乃佳不爾飽爛黑黯其十月已後至正月乃可陰乾巨馬錫等謹按藥性論云牛膝且忌牛肉

能治陰痿補腎填精逐惡血流結助十二經脉病人虛羸加而用之

日華子云牛膝治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血運落死胎壯陽懷州者長白近道蘇州者色紫

圖經曰淮閩粵關中亦有之然不及懷州者為真春生苗莖高二三天青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如是兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者為雄青細者為雌二月八月十月採根陰乾根極

長大而柔潤者佳莖葉亦可單用葛洪治老瘡久不斷者取莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不即漸更作不過三劑止唐崔元

亮海上方治瘡用水煮牛膝根未發前服今福州人單用土牛膝根淨

洗切焙乾搗下篋酒煎溫
服云治婦人血塊極效
凡使去頭并塵土了用黃精自

聖惠方 治眼卒生珠管牛膝并藥
擣絞取汁日三四度點之
又方 治氣濕痺著膝痛用牛

於豉汁中相和煮作
粥和鹽醬空腹食之
外臺秘要 治勞瘵積久不愈者長生牛膝一

未發前服臨
發又一服
千金方 治婦人小戶嫁痛牛膝五兩酒三
又方 風

瘰癧癭牛膝末酒服方寸匕
日三并主骨疽癩病及瘡癰
肘後方 口中及舌上生瘡爛取牛膝

又方 治卒暴癥腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗
漬密封熱灰火中溫令味出服五合至一外量力服之
又

方 治齒痛牛膝末
着齒間含之
又方 凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸蠱

飲一兩至
日三服
又方 治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅
痛牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈
經

驗後方 治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生地黃汁五
外浸晝暴夜浸汁盡為度蜜丸梧桐子大空心溫酒下三

十九久服壯筋骨駐
顏色黑髮津液自完
梅師方 治竹木針在肉中不出取
生牛膝莖搗末塗之即出
又方 治胸

出牛膝八兩葵子一兩以
水九升煎取三升分三服
又方 治金瘡痛所生牛
膝搗傳瘡上立差
孫真人食忌

治牙齒疼痛燒牛
膝根及致牙齒間


又方

治卒得惡瘡人不識
者以牛膝根搗傅之

行義曰

牛膝今西京作畦種有長三尺者最佳與花
蓉酒浸服益腎竹木刺入肉醫爛瘻之即出

莢蔚子



莢蔚子味辛甘微温微寒無毒主明目益精除水氣

療血逆大熱頭痛心煩久服輕身○莖主癰瘡上音癰下音謫癢

可作浴湯一名益母一名益明一名天札一名貞蔚生海濱

池澤五月採陶隱居云今輿處有葉如荏苒子形細長三稜方用亦稀唐本注云搗莢蔚莖傅丁腫服汁使丁腫毒

內消又下子死腹中主產後血脹悶諸雜毒腫丹油等腫取汁如豆

滴耳中主聾耳中虺蛇毒傳之良今按陳藏器本草云此草田野間

人呼為鬱臭草本功外苗子入面藥令人光澤亦搗苗傳乳癰惡腫

痛者又搗苗絞汁服主浮腫下水兼惡毒腫又按別本注云其子狀

如拈黃子而稍龐大微有陳氣作煎及搗絞取汁服之下死胎也目

節間又名益母疏引劉敞曰萑臭穢臭穢即萑蔚也葉似萑方莖白

後血脹苗葉同功乃益母草子也節節生花如雞冠子黑色九月採

圖經曰他國切爾雅云萑音佳推郭璞云今萑蔚也葉似萑方莖白

華華生節間陸機云韓詩及三蒼皆云推益母也故曾子見之感恩

劉敞亦謂推臭穢臭穢即萑蔚也今園圃及田野見者極多形色皆

如郭說而苗葉上節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜五月採
又云九月採實醫方中稀見用實者唐天后鍊益母草澤面法五月
五日採根苗具者勿令著土暴乾搗羅以水和之令極熟團之如雞
子大再暴仍作一鑪四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久
即去大火留小火養之勿令絕經一復時出之甕器中研治篩再研
三日收之使如燥豆法廣濟方療小兒疳痢困垂死者取益母草煮
食之取足差止甚佳章丹治女子因熱病胎死腹中搗此草并苗令
熟以少許煖水和絞取汁頓服良又主難產搗取汁七大合煎半頓
服立下無新者以乾者一大握水七合煎服又名鬱臭
草又名苦低草亦主馬齒細切此草和醋炒傳之良

聖惠方

治婦人勒乳痛成癰益母為末水調
塗乳上一宿自差生搗爛用之亦得
又方 治產後血不下益母搗
絞汁每服一小盞入酒

一合溫
攪勻服
外臺秘要
治折傷內損有瘀血每天陰則痛煎治產婦
諸疾神方三月採益母草一名負擔一名夏

枯草洗擇令淨於箔上攤暴令水乾別用拔斷可長五寸已來勿用
刀即置鍋中以水二碩以來令草上水深二三寸煎煮候益母爛水

三分減二漉出草取五六斛汁瀉入盆中澄之半日已來以綿濾取
清汁盆中滓澱盡棄之其清汁於小釜中慢火煎取一斛以來如稀

錫每取梨許大煖酒和服之日再服以和羹粥並可如速行不能稀
煎去即更煉可丸得每服之七日內則疼痛漸瘳七日平復或有產

婦惡露不盡及血暈一二服
差其藥治風益心力無忌
肘後方
治一切產後血病并一切傷
損益母草不限多少竹刀切

洗净鐵器內鍊成膏藥器內
封之並以酒服內損亦服
孫真人
治馬咬方益母草
細切和醋炒封之
食醫心鏡

治小兒疳痢痔疾以益母草
葉煮粥食之取汁飲之亦妙
簡要濟眾
新生小兒浴法益母草五
兩對水一斗煎十沸溫浴而

不生
瘡疥
斗門方
治癩子已破用
益母搗傳瘡妙
丹房鏡源
燒益母灰用麩湯澆
燒之編治面上風刺

亦制
集驗方
治婦人帶下赤白色益母草花開時
採搗為末每服二錢食前溫湯調下
子母秘錄
治

後血暈心氣絕益母
草研絞汁服一盞妙
又方
治小兒疳益母
草絞汁稍稍服

衍義曰 菘薺子葉至初春亦可煮作菜食凌冬不凋碎唐武
 后九燒此灰入緊向藥九燒之義已具冬灰條下

滁州菱薺



舒州菱薺



女萎菱薺味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋

結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆

爛淚出女服去面黑點好顏色潤澤輕身不老一名熒一

名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後

採陰乾畏鹵鹹陶隱居云按本經有女萎無菱薺別錄無女萎有菱薺而為用正同疑女萎即菱薺也惟名異爾今處處有其

根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續
斷莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此都無
止減之說疑必非也萎蕤又主理諸石人服石不調和者煮汁飲之

唐本注

云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經朱書是

女萎能効墨字乃萎蕤之効今以朱書為白字

云萎蕤釋曰藥草也一名萎一名萎蕤似竹大者如箭竿有節

葉狹長而表白裏青根大如指長一二尺可啖

時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良

女萎萎蕤二物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女萎而此

都無止洩之說疑必非也按女萎蕤又於中品之中出之云主霍亂

洩痢腸鳴正與陶注上品女萎相會如此即二萎功用同矣更非二

物蕤乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹為其

似竹一名地節為其有節魏志樊阿傳青藜一名黃芝一名地節此

即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉為散主

五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰脚惟有熱不可服晉

嵇紹有骨中寒疼每酒後苦垂服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔

華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也

益氣出均州

日華子云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚

疼痛天行熱

圖經曰萎蕤生泰山山谷丘陵今滁州舒州及漢中
狂服食無忌皆育之葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹
強直似竹箭葍有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可取三月開
青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二

名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂蔞委萎上於為切下人壽郭璞注云藥草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能劫黑字是萎蕤之功觀古方書所用則似差別胡洽治時氣洞下醫下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣齒半酒中用女萎及古今錄驗治身體癢癢斑剝女萎膏乃似朱字女萎緣其主中風不能動搖及去疔好色故也又治傷寒七八日不解續命斃甲湯治脚弱斃甲湯並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤飲又主虛風熱發即頭熱萎蕤丸乃似此黑字女萎緣其主虛熱濕毒腰痛故也三者主治既別則非一物明矣然陳藏器以為更非二物是不然矣此女萎性平味甘中品女萎味辛性溫性味既殊安得為物又云萎蕤一名地節極似偏精疑即青黏華他所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者非敢以為

雷公云

凡使勿用鉤吻并黃精其二物相似萎蕤只信然耳

皮有小黃點採得先用竹刀刮上節皮

外臺秘要

主發熱口乾小便澀萎蕤

了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

外臺秘要

五兩煮之


楊氏產乳

療久痢脫肛不止取

防葵

女萎切一外燒薰之

襄州防葵



防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺
不下欬逆溫瘧癩癩驚邪狂走療五藏虛氣小腹
支滿臙脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身
中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一
名爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及

嵩高太山少室三月三日採根暴乾

陶隱居云北信斷今用建平間者云本與

狼毒同根猶如三建今其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒陳以亦不能沉矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之患其根葉

似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有

之其興州採得乃勝南者為隣蜀土也巨禹錫等云防葵君有小毒能治疝氣痲痺氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消

散治鬼瘡主百邪圖經曰防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇鬼魅精怪通氣恭云襄陽望楚山東及興州西方有之

其興州採得乃勝南者為隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其

葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如蔥花景天輩而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒

同根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣三月三日採

六月開花即結實採根為藥**陳藏器云**按此二物一是上品而陶云防葵與

物善惡不同形質又別陶既為此說後人因而用之防葵將以破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云

凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異効又不同切須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中生採得二

十日便蚰用之唯輕為妙欲使先須揀去蚰末後用甘草湯浸一肘宿漉出暴乾用黃精自然汁一二外拌了土器中炒令黃精汁盡


後方

治癲狂疾防葵末温酒服一刀圭
至二三服身潤有小不仁為候

丹州紫胡



壽州紫胡



襄州紫胡

淄州柴胡



江寧府柴胡



此藥胡君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣

飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸

痰熱結實胃中邪逆五藏閒遊氣大腸停積水脹及濕

痺拘攣亦可作浴湯又服輕身明目益精一名地薰一

名山菜一名茹草葉一名芸蒿辛香奇食生洪農川谷

及冤句二月八月採根暴乾

得茯苓桔梗大黃石膏麻子人甘草桂以水一斛煮取四升入

消石三方寸七療傷寒寒熱頭痛心下煩滿半夏為之使惡皂枳畏
女苑藜蘆陶隱居云今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似

邪蒿春秋有白藟晉弱長四五寸香美可食長安及河內並有之此
此胡療傷寒第一用書不詳云此是古柴字上林賦云此薑及爾雅

云貌音邈此草並作此字且此草根紫色今太常用此胡是也又以
木代系相承呼為此胡且檢諸本草無名此者傷寒大小此胡湯最

為痰氣之要若以芸蒿根為之更作茨音大謬矣百禹錫等謹按藥
論云此胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞之羸

瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煮服良請烟云主痰滿胃
脅中痞曰云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤

心肺添精補髓天行溫疾圖經曰柴胡生洪農山谷及冤句今關
熱狂之絕宵骨氣滿健忘圖經曰柴胡生洪農山谷及冤句今關

者為勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊亦有似斜蒿亦有似
麥門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色

似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾
張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後

人治寒熱此陳藏器陶云芸蒿是並胡主傷寒蘇云紫薑作
為最要之藥紫此草紫色上林賦云此薑今常用此

胡是雷公曰凡使莖長軟皮赤黃鬚出在平州平縣即今銀
也州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是

苳胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以麤布拭了細剉用之勿令犯火立便無効也

孫尚藥

治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任意時時服

一日別說云

謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其真故市人多以

同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也

衍義曰

呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱

青蒿煎丸用此胡正合宜耳服之無不效熱去即須急已若或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多曰華子又謂補五勞七傷藥


性論亦謂治勞之羸瘦若此等病苟無實熱醫者熱而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士

自何處治中下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張


仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜

麥門冬

隨州麥門冬



睡州麥門冬



麥門冬為味甘平微寒無毒主心腹結氣腸中傷飽

胃絡脈絕羸瘦皆氣身重目黃心下支滿虛勞客熱

口乾燥渴止嘔吐愈痿蹙強陰益精消穀調中保神定

肺氣安五藏令人肥健美顏色有子久服輕身不老

不飢 秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊著一名

禹葭 一名禹餘糧葉如韭冬夏長生生函谷川谷及堤

坂肥土石間久廢處二月三月八月十月採陰乾地黃車前為之使惡

款冬 苦瓠畏苦參青葙陶隱居云函谷即秦關而麥門冬異於羊韭之名矣處處有以四月採冬月作實如青珠根似穉麥故謂麥門冬

以肥大者為好用之湯澤抽去心不爾令人煩折穀家為要二門冬潤時並重既燥即輕一斤減四五兩爾陳藏器本草云麥門冬

本經不言生者按生者本功外去心煮飲止煩熱消渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如本經方家自

有分別出江寧小潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子圓碧久服輕身明目和車前子乾地黃

為丸食後服之去溫瘴變白明目夜中見光 目馬錫等謹按吳氏云

一名馬韭一名麴音門火冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘

一名隨脂神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒季氏甘小溫扁鵲無毒生山谷肥地葉如韭肥澤叢生採無時實青黃藥性論云麥

門冬使惡苦畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢即浮腫下水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿虛勞客

熱日華子云治五勞七傷安魂定 圖經曰 麥門冬生函谷川谷及 隄坂肥上石間久廢處 魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽

今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作
連珠形似穰麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓
如珠江南出者葉大者苗如麤葱小者如韭大小有三四種功用相似
或云吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎餌之取
新根去心搗熟絞取汁和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃
成酒化溫服之治中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駛又
主金石藥發麥門冬去心六兩人參四兩甘草二兩炙三物下篩蜜丸如
梧子曰再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人處得神驗不可
言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去
兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤
之搗末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中搗爛即
內黃連末曰中和搗候丸得即併手丸大如梧子食後飲下五十九丸
日再但服兩日其渴必定若重者即初服藥每一服一百五十九丸第
二日服一百二十九丸第三日一百九丸第四日八十九丸第五日依本服
丸若欲合藥先看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見
知如似可每日只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚淨去毛
洗了以水三大斗煮令爛去頭取汁可一斗
已來細細服之亦不著蓋不過三劑平復

衍義曰

麥門冬根上子也治心肺虛熱并
虛勞客熱亦可取苗作熟水飲


鳳翔府獨活

茂州獨活

寧化軍羌活



文州獨活



文州羌活



獨活味苦甘平微温無毒主風寒所擊金瘡止痛賁豚

癩瘡

音

女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服

輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡荽

者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或

隴西南安二月八月採根暴乾豚實為之使陶隱居云藥名無

羌活羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川為獨活

色微白形虛大為用亦相似而小不如其一莖直上不為風搖故名

獨活至易蛀宜密器藏之唐本論云獨活君味苦辛能治中諸風濕冷奔喘逆

臣禹錫等謹按藥性論云獨活君味苦辛能治中諸風濕冷奔喘逆

氣皮肌苦痒手足攣痛勞損主風毒齒痛又云羌活君味苦辛無毒

能治賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎邪遍身癩痺

子云羌活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭眩明目赤疼及伏

梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活母

類圖經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今蜀漢出者佳春

者是夾石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故一

名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色

而節密者為羌活黃色而作塊者為獨活一說按陶隱居云獨活生

西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活

類桔梗而大氣味了不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活

亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小

類菴活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此為真者而市人

或擇菴活之大者為獨活殊未為當大抵此物有兩種西川者黃色

香如蜜隴西者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既

用獨活而又用菴活茲為謬矣篋中方療中風緣覺不問輕重便須

吐涎然後次第治之吐法用菴活五大兩以水一大斗煎取五外去

滓更入好酒半外和之以牛芎子半外炒下篩令極細以前湯酒煎

酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可用下藥及繆針灸但用補治湯餌自差

後暴乾去淫羊 千金方 治中風通身冷口噤不知人獨活四肘

後方 治風齒疼頰腫獨 經驗後方 治中風不語獨活一兩剉

炒有聲將藥酒熱投蓋良 必効方 治產後腹中絞刺疼痛菴活二

久温服三合未差再服 子母秘錄 治中風腹痛或子腸脫 小品方 治產後風虛獨活

湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三兩水三升者取升半 又方 治

後中風語澁四肢拘急菴活三兩為末每服 文潞公 治牙齒風上


五錢水酒各半蓋煎去滓温服經驗方同 地黃各三兩末每服三錢水

一盞煎和滓温服卧時再用

滁州外麻



漢州外麻



茂州外麻



秦州升麻



升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼
辟温疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒
癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年

一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

陶隱居云舊出寧州者第一形

細而黑極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞
骨升麻北部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用

人言是落新婦根不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒取葉按作小兒浴湯主驚悸今按別本注云今高高出者色青功用不

如蜀者臣禹錫等謹按藥性論云蜀外麻主治小兒風驚癇時氣

熱疾能治口齒風蠱腫牙根浮爛惡臭熱毒膿血除心肺風毒

熱壅閉不通口瘡煩悶癩癰腫疏豆瘡水煎綿沾拭瘡上主百邪鬼

魅陳藏器云陶云人言外麻是落新婦根非也相似耳解毒取葉作

小兒浴湯主驚按今人多呼小外麻為落新婦功用同於外麻亦大

小有殊日華子云安魂定魄并鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳蠱又名

落新婦蜀外麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以

四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚

二月八月採日暴乾今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡

腫毒之屬殊効細剉一兩水一升煎鍊取濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之楊炎南行方療瘰癧湯用外麻又有外麻膏外麻搗湯并療諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方服乳石補壅法云南方養生治病無過丹砂其方用外麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物相合蜜丸如梧子每日食後服三丸又有七物外麻丸外麻犀角黃芩朴消梔子大黃各二兩破二外微熬同搗散蜜丸覺四肢大熱大便難即服三十九丸取微利為知若四肢小熱

雷公曰

採得了刀刮於食上服二十九非但辟瘴兼甚明目

聖惠方

治小兒斑瘡及豆瘡心躁眠臥不安用川外麻一味不計多少

了用黃精自然汁浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之

細剉水一盞煎去滓取汁
以綿露汁洗拭瘡盤上
外臺秘要
比歲有病天行發斑瘡頭
面及身須臾周匝狀如火


燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死治差後盤黥彌歲方減此
惡毒之氣所為以水煮外麻綿露洗之苦酒煮弥佳但躁痛難忍也

千金翼
治產後惡血不盡或經月半歲外麻三兩清酒
五升煮取二升半分溫再服當吐下惡物極良
肘後

梅師方
治時行病發瘡外麻五兩以水
蜜二味同煎三沸半服半傳瘡
姚和衆

小兒尿血蜀外麻五分水五合
煎取一合去滓一歲兒一日服盡

滁州車前子



車前子味甘鹹寒無毒主氣癢止痛利水道小便除

濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人

有子明目療赤痛久服輕身耐老

葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤

止煩下氣除小蟲一名當道一名芣音浮苜音以一名蝦蟇衣

一名牛遺一名勝鳥音昔生真定平澤丘陵阪道中五月

五日採陰乾陶隱居云人家及路邊甚多其葉搗取汁服療洩

越岸谷不老而長生也韓詩乃言芣苢是木似李食其實宜子孫此

為謬矣唐本注云今出開州者為最臣禹錫等謹按爾雅云芣苢馬

引陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當

道也幽州人謂之牛舌草可驚作茹大滑其子治婦人難產藥性論

痛淚出壓丹石毒去心胃煩熱葉主泄精病治尿血能補五藏明目

利小便通五淋蕭炳云車前養肝日華子云常山為使通小便淋瀝

壯陽治脫精
心煩下氣
圖經曰
車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮

匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑
色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或

種之蜀中尤尚北人取根口乾作紫苑賣之甚誤所用謹按周南詩
云采采芣苢爾雅云芣苢馬馬車前郭璞云今車前草大葉當

道長穗好生道邊江東人呼為蝦蟇衣陸機云馬馬一名車前一名
當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可齧

者同作茹大滑其子治婦人難產是也然今人不復有噉者其子入
藥最多駐景丸用車前菟絲二物蜜丸食下服古今為奇方其葉今

醫家生研水解飲
之治衄血甚善
雷台
凡使須一窠有九葉內有葉莖可長一

者力全堪用使葉勿使葉莖
使葉剉於新瓦上攤乾用之
聖惠方
治熱痢不止者搗車前葉

溫分
二服
又方
治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等

治陰痒痛車前子以水三
外煮三沸去滓洗痒痛處
又方
治尿血車前草搗絞

車前子草一斤水三升
煎取一升半分三服
又方
治石淋車前子二升以絹囊盛水八

梅師方
治姙娠患淋小便澀水道熱不通車前子五兩葵子母秘

百一方
小便不通

外臺秘要

子母秘

錄治橫生不可出車前
子末酒服二錢匕
治瀉歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈
夫人云市人有此藥三文一貼甚效

公曰吾輩藏腑與市人不同不可服夫人買之以國醫藥雜進之一
服而愈後公知之召賣藥者厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前

子一味為末米飲下二錢匕云此藥利水
道而不動氣水道利則清濁分穀藏自止矣

衍義曰車前陶隱居云其葉擣取汁服療洩精大誤矣此藥甘滑
利小便走泄精氣經云主小便赤下氣有人作菜食小便

不禁幾為所誤



滁州青木香



廣州木香

海州青木香



木香味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露療

氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒丹行

藥之精以服不夢寤厭鬼寐輕身致神仙一名蜜香生永

昌山谷

陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶音

白上來乃云大秦國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香

不入藥用惟制蛀蟲丸用之常能煮以沐浴大佳爾唐本注云此有

二種當以崑崙來者為佳出西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如
菊花其實黃黑所在亦有之今按別本注云葉似署預而根大花紫
色功效極多為藥之要用陶云不入藥用非也臣禹錫等謹按蜀
本云今苑中種之花黃苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛藥性
論云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛

積年冷氣痲痺癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疔
刺隋書云樊子蓋為武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多

瘡氣獻青木香以禦霧露南州異物志云青木香出天竺是草根狀如
甘草蘭烟云青木香功用與此同又云崑崙船上來形如枯骨者良

日華子云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎建脾消食療羸劣膀胱冷痛嘔逆反胃

州舶上有來者他無所出陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉
似羊蹄而長大花如菊實黃黑亦有藥如山芋而開紫花者不拘時

月採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香
不堪入藥用偽蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸

皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木
香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩篩末沙

糖和之馴馬都尉鄭景志其名去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如
梧子空腹酒下三十九日再其効甚速然用藥不類古方而云仲景

者不知何從而得之邪雜修養書云正月一日取五木煮湯以浴令
人至老鬚髮黑徐錯注云道家謂青木香為五香亦云五木道家多

以此浴當具其義也又古方主癰疽五香湯

中亦使青木香青木香名為五香信然矣

海藥謹按山海經云生東海崑崙

崑崙山**雷公曰**

凡使其香是蘆葍根條左盤旋採得二十九日方硬
如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也

外臺秘要

治狐臭若服內陰下恒濕臭或作瘡
青木香好醋浸致腋下夾之即愈

傷寒類要

天行熱病若發赤黑斑如痲青木香

孫尚藥

治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸

二兩水二升煮取一升頓服之効
黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾爲末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下此方李景純傳有一婦人久患痢將死夢

別說云

謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說爲得本在草部而

中觀音授此方服之遂愈
圖經所載廣州一種乃是木類又載滁州海州者乃馬兜鈴根此山鄉俗名爾治療冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾

衍義曰

木香專泄少背腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速又一種嘗自岷州出塞得生青

木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高三四尺花黃一如金錢其根則青木香也生罽之極辛香九行氣

明州薯蕷



永康車薯蕷

滁州薯蕷



眉州薯蕷



薯蕷味甘温平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中

益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眼眩下氣止腰痛補虛

勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不飢

延年一名山芋秦楚名玉延鄭越名土薯音除生嵩高山

谷二月八月採根暴乾

紫芝為之使惡甘遂圖經云今近道處處有東山南江皆多掘取食之以充

糲南康間最大而美服食亦用之唐本注云署預日乾搗細篩為粉食之大美且愈疾而補此有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不

美蜀道者尤良巨勝錫等謹按吳氏云署預一名諸署齊越名山羊一名脩脆一名兒草神農甘小温桐君雷公甘無毒或生臨胸鍾山始

生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中心白皮黃類芋生論云署預臣能補五勞七傷去冷風止腰疼鎮心神安魂魄開達

心孔多記事補心氣不足患人體虛羸加而用之異苑云署預野人謂之士諸若欲掘取嘿然則獲唱名使不可得人有植之者隨所種

之物而像之也圖經云助五藏彊筋骨圖經曰署預生嵩高山長志安神主泄精健忘乾者功用同前

之以北都四明者為佳春生苗蔓延籬援莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鎗二月

八月採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不堪暴乾用之法取鹿根刮去黃皮以水浸末白礬少許除水中經宿取淨洗去涎焙

乾近都人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種苗生以竹梢作援援高不得過二尺夏月頻澆之當年可食極肥美南中有

一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯煮之作塊不散味更珍美云食之尤益人過於家園種者又江湖閩中出一種根如薑芋之類

而皮紫極有大者一枚可重斤餘刮去皮煎煮食之俱美但性冷於此地者耳彼土人單呼為藟音若殊亦曰山藟而山海經云景山其

望少澤其草多藎音與署預同郭璞注云根似芋可食今江南人

單呼藎音儲語或有輕重耳據此注則藎預與藎乃一種南北之產

或有不同故其形類差別然字音殊儲不同蓋相傳之訛也一名山芋

為不能制麩毒也熟煮和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之入藥更妙也

者山中生皮赤四面有鼠生者妙若採得用銅刀削去上赤皮洗去涎蒸用

中細研然後下於銚中先以酥一大匙熬令香次旋添酒一盞煎攪令勻空心飲之

瘦損無力生署藥半斤刮去皮以刀切碎研令細爛於鑊中著酒酒沸下署預不得攪待熟着少鹽葱白更添酒空腹飲三二盃妙

衍義曰山藥按本草上一字犯英廟諱下一字曰菹唐代宗名

本名慮歲久以山藥為別物故書之此物貴生乾方入藥其法冬月

以布裹手用竹刀子刮去皮於簷下風溼處盛竹節中不得見日色

一冬乾五分俟全乾收之惟風緊則乾速所以用乾之意蓋生濕則滑不可入藥孰則只堪啗亦帶氣餘如經

食療

治頭疼利丈夫助陰力和麩作餅餠則微動氣

雷公曰

凡使勿用平田生二三紀內者要經十紀

聖惠方

補虛損益顏色用署預於砂盆

食醫心鏡

主下焦虛冷小便數

薏苡人

葦苳人



葦音苳音改音以人味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風

濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久

服輕身益氣其根下三蟲一名解豕蝨一名屋茨音一名起實

一名蘘音感生真定平澤及田野八月採實採根無時陶隱居云

常山郡近道處處有多生人家交趾者子最大彼土呼為葦音幹珠

馬援大取將還人饒以為真珠也實重累者為良用之取中人今小

兒病虻蟲取根煮汁糜食之甚香而去虻蟲大効今按陳藏器本草

云葦苳收子蒸令氣細暴乾磨取人炊作飯及作麩主不飢溫氣輕

身煮汁飲之主消渴又按別本注云今多用梁漢者氣力劣於真定取青水色者良呂禹錫等

食主肺痿肺氣吐膿血效嗽涕唾上氣昔馬援煎服之破五溪毒腫種於彼取人甑中蒸使氣餹暴於日中使乾按之得人矣

平去乾濕脚氣大驗**圖經**曰薏苡人生真定平澤及田野今所在有之春生

六月結實青白色形如珠子而稍長故呼意珠子小兒多以線穿如

古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心骨甲錯者溲苦酒煮薏苡

人令濃微溫頓服之肺有血當吐愈廣濟方治冷氣薏苡人飯粥法

細春其人炊為飯氣味欲勻如麥飯乃佳或者粥亦好自任無忌根

定今人多取葉為飲香益中空膈甚勝其雜他藥用者張仲景治風

濕身煩疼日晡劇者與麻黃杏仁薏苡人湯麻黃三兩杏仁三十枚

甘草薏苡人各一兩四物以水四升煮取二升分溫再服又治胃痺

每服方寸匕日三**陳藏器**餘主消渴然虺虫**雷公**凡使勿用臧

其糲米時人呼為粳糲是也若薏苡人顆小色青味甘咬着黏人齒

夫用一兩以糯米二兩同熬令糯米熟去糯米取使若更以鹽湯煮

過別是**外臺秘要**治牙齒風痛薏苡根四兩水四

修制亦得外煮取二升含冷易之斷便生

又方

腫喉卒難

人二
又方
蝮蟲攻心腹痛薏苡根二斤切水七
梅師方
肺疾唾膿血

兩杵碎以水三升煎取
外入酒少許服之
食醫心鏡
治筋脉拘攣以風濕痺下氣
除骨中邪氣利腸胃消水腫

久服輕身益氣力薏苡人一升搗為散每
服以水二升煮兩匙末作粥空腹食之
馬援
後漢馬援傳援在交
趾常餌薏苡實用能

輕身省慾以勝瘴氣南方薏苡實
大援欲以為種軍還載之一車
衍義曰
薏苡人此李商隱太倉
銘中所謂薏苡似珠不

可不虞者也取人用本經云微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素問注
中大筋受熱則縮而短縮短故攣急不伸此是因熱而拘攣也故可

用薏苡仁若素問言因寒即筋急者不可更用此也凡用之須倍於
他藥此物力勢和緩須倍加用即見效蓋受寒即能使人筋急受熱

故使人筋攣若但熱而不曾受又亦
能使人筋緩受濕則又引長無力




齊州澤瀉

瀉澤



邢州澤瀉



澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏

益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消

渴淋瀝逐膀胱三焦停水久服耳目聰明不飢延年輕

身面生光能行水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉

一名苦草一名鵠瀉生汝南池澤五月六月八月採根陰乾畏海

蛤文葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服

輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕

以服面生光令人無子九月採

陶隱居

云汝南郡屬豫州今近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青

弋形大而長尾間必有兩歧為好此物易朽蠹常須密藏之葉使長

叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上唐李

注云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善也巨為錫等詳按爾

雅云蒨葛疏云蒨一名蒨即藥草澤瀉也藥性論云澤瀉君味苦能

主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道日華子云治五勞七傷

主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難產補女人血

圖經曰

澤瀉生汝南池澤今山東向陝江淮亦

海令人有子葉壯水藏下乳通血脉有之以漢中者為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月採根陰乾今人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而長尾間有兩歧最佳爾雅謂之蒨羊朱切一名蒨與曷同粒夕切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉木各十分麋銜五分合以二指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後飯張仲景治雜病心下有支飲苦胃澤瀉湯主之澤瀉五兩木二兩水

二升煎取半升分溫再服治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水為最要深師治支飲亦同用澤瀉木但煮法小別先以水二升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉取五合合此二汁為再服病甚欲眩者服之必差仙方亦單服澤瀉一物搗篩取末水調日分服六兩百日

雷公曰

不計多少細剉酒浸一宿漉出曝乾任用也

經驗方

澤瀉

體輕久而健行
皂莢水煮爛焙乾為末鍊蜜為丸如桐子
大空心以溫酒下十五丸至二十九丸甚妙治腎藏風生瘡尤良

衍義曰

澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搖渴煩小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於行水本經

又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水張仲景八味丸用之者亦不過引接桂附等婦就腎經別无他意凡服澤瀉散人未有不小便

多者小便既多腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用

泗州遠志



解州遠志



齊州遠志

威勝軍遠志



商州遠志



本草

卷五

四

遠志

君為

味苦溫

無毒

主欬逆

傷中

補不足

除邪氣

利

九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣

止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃以服輕身

不老好顏色延年葉名小草主益精補陰氣止虛損

夢洩一名棘苑一名蔓繞一名細草生太山及冤句川谷四

月採根葉陰乾得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠藜蘆葦蠶齊蛤陶隱居云按藥名無齊蛤恐是百合

冤句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今用一斤正得三兩皮爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入

仙方藥用唐本經云藥錄下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶云恐是百合非也今注遠志莖葉似大青而小比之麻黃陶不識爾

目為錫等謹按爾雅云蔓繞棘藜注今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草藥性論云遠志畏蟻螬治心神健忘安魂魄令人

不迷堅壯陽道主夢邪日華子云主膈氣驚魘長圖經曰遠志生

肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤服無忌泰山及冤句川谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似麻黃而青又如葦豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及

一尺四月採根葉陰乾今云曬乾用泗州出者花紅根葉俱大於它
 處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳古木通用遠志小草今醫
 但用遠志稀用小草古今錄驗及范汪方治胃痺心痛逆氣膈中飲
 不下小草丸小草桂心蜀椒去汗乾薑細辛各三分附子二分炮六
 物合搗下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三
 丸日三不知稍增以知為度禁猪肉冷水生葱菜

雷公曰 遠志
 凡使

先須去心若不去心服之令人悶去心
 了用熟甘草湯浸宿瀝出曝乾用之也


肘後方 治人心孔惛塞多
 志喜誤丁酉日密自

至市買遠志着巾角中
 還為末服之勿令人知

抱朴子 內篇云陵陽仲子服遠志二十年
 有子三十七人開書所視便記而

志不

信陽軍草龍膽



襄州草龍膽



睦州草龍膽



沂州草龍膽



龍膽味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續

絕傷疔五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢

去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕又服益智不忘輕身耐老

一名陵游生齊胸山谷及冤句二月八月十月十二月採根

陰乾貫衆為之使惡防葵地黃陶隱居云今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚苦故以膽為名今按別本注云葉似龍葵味苦如膽

因以為名呂錫等謹按藥性論云龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱骨熱癰腫治時疾熱黃口瘡日華子云小豆為使治客忤疝氣熱病狂

語及瘡疥明目龍膽生齊胸山谷及冤句今近道亦有之宿根黃白色下抽根十餘本類牛膝煩益智治健志

圖經曰

直上生苗高尺餘四月生葉似柳葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十二月採根陰乾俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澁取根細剉用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎一錢七溫服之治四肢疼痛採無時侯禁經霜雪不凋此同類而別種也古方治痘多用之集驗方穀痘丸苦參三兩龍膽一兩二物下飾牛膽和丸先食以麥飲服之如梧子五丸日三不知稍增刪繁方治勞痘同用此龍膽加至二兩更增梳子人三七枚三物同飾搗丸以猪膽服如前法以飲下之其說云勞痘者因勞為名穀痘者因食而勞也

雷公云 採得後陰乾欲使時用銅刀切去鬚土頭了對於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餽之令人溺不禁

聖惠方 治蛔蟲攻心如刺吐清水龍膽一兩去頭對水二盞煮取一盞去滓隔宿

外臺秘要 治卒下血不止龍膽一虎口以水不食平旦頓服

後方 治卒心痛龍膽四兩酒三外煮取一外半頓服

肘 五外煮取二外半分為五服差

信州細辛



華州細辛



崑崙軍細辛



細辛味辛温無毒主效逆頭痛腦動百節拘攣風

濕痺痛死肌温中下氣破痰利水道開胃中除喉痺聾

^音聾鼻風癩癩疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽

通精氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰

山谷二月八月採根陰乾曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷

明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反蒙
蘆陶隱居云今用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者

用之去其頭節人患口臭者含之多效最能除痰明目也臣禹錫等謹按范子云細辛出華陰色白者善吳氏云細辛一名細草神農黃

帝雷公桐君辛小温歧伯無毒季氏小寒如葵葉赤黑根一葉相連藥性論云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風風頭手足拘急

安五藏六腑添膽氣去皮風濕痺能止眼風淚下明目開胃中滯除齒痛主血閉婦人血瀝腰痛目華子云治嗽消死肌瘡肉骨中結聚忌

細辛生華山谷今處處有之然它處所出者不及華州者真其根細而其味極辛故名之曰細辛二月八月

採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅吐人用時須細辨耳杜蘅春初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高三二寸莖如麥藁鹿細每窠上

有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉莖間罅內蘆頭上貼地生紫花其花似見不見鬮結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經

霜即枯其根成窠有似飢帚密閉細長四五寸微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香以人多誤用故此詳述之

凡使一揀去雙葉服之害人須去頭土了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之

聖惠方治口臭及蠶齒腫痛細辛煮取農汁

外臺秘要治卒客忤停口不能言別說云非華陰者

不得為細辛用若杜蘅之類自應依本性於用爾又細辛若單用末不可過半錢七多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年關中或用此毒入者聞平涼獄中嘗治此故不可不記非本有毒但以不識多寡之用因以有此

雷公云

衍義曰

細辛用根今惟華州者佳柔韌極細直深紫色味極辛嚼之習習如椒治頭面風痛不可闕也葉如葵葉赤黑非此則杜衡也杜衡葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋根似白前又似細辛義漢間一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵不可用

溫州石斛



春州石斛



石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸

瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱

痺音沸氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志

除驚一名蘇蘭一名禁生一名杠蘭一名石遂音逐生六安山谷

水傍石上七月八月採莖陰乾陸英為之使惡疑水石巴豆畏

出始興生石上細實桑灰湯沃之色如金形似蚱音窄蝻音猛髀者為

佳近道亦有次宣城間生櫟樹上者名木斛其莖形長大而色淺六

安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可為酒漬煮湯用

爾俗方最以補虛療脚膝唐本注云作乾石斛先以酒洗捋蒸炙成

不用灰湯今荆襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭

生一葉而性冷一種大如雀髀名雀髀斛生酒漬服乃言勝乾者亦

如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也日為錫等謹按藥性論

云石斛君益氣除熱主治男子腰脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨中久

冷虛損補腎積精腰痛養腎氣益力日華子云治虛圖經曰石斛

損劣弱壯筋骨暖水臟輕身益智平胃氣逐虛邪生六安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及温台州亦有之以廣南者為

陸英為之使惡疑水石巴豆畏

陶隱居云今用石斛

唐本注云作乾石斛先以酒洗捋蒸炙成

日為錫等謹按藥性論

日華子云治虛

生六安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及温台州亦有之以廣南者為

生六安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及温台州亦有之以廣南者為

生六安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及温台州亦有之以廣南者為

生六安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及温台州亦有之以廣南者為

生六安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及温台州亦有之以廣南者為

生六安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及温台州亦有之以廣南者為


雷公云凡

累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀凡
斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用
先去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝乾却用酥蒸從已至酒却
徐徐焙乾用石斛鎖涎滋丈夫元氣如斯修事服滿一鎰永無骨痛

衍義曰

石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實今人多以木斛渾行醫工亦不能明辨世又謂之金釵石斛蓋後人取象而言之然甚不經將木斛折之中虛如禾草長尺餘但色深黃光澤而已真石斛治胃中虛熱有功

潯州巴戟天



歸州巴戟天

巴戟天味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨

安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛

下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷三月八月採

根陰乾

覆盆子為之使惡朝生雷丸丹參陶隱居云今亦用建平直都者狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心唐本注云

巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為勝

云巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損加而用之

風治邪氣療水腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣

亦有之皆不及蜀川者佳華似茗經冬不枯俗名三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根

陰乾今多焙之有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用

黑豆同煮欲其色紫此殊失氣味尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫以淮巴戟莫能

辨也真巴戟嫩者亦白乾時亦煮治使紫力劣弱不可用今兩種市中皆是但擊破視之其中紫而鮮潔者偽也真者擊破其中雖紫又

有微白慘如粉色理小暗也

雷公白 凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令

色理小暗也 雷公白 却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令

色理小暗也 雷公白 却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令

衍義曰

巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽

要中間紫色則多偽以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從中

米同炒米微轉色不用米大黃一兩對炒同為末熟蜜為丸溫水服五七十九仍禁酒遂愈

白英味甘寒無毒主寒熱入疽消渴補中益氣久服輕身

延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採

花冬採根

陶隱居云諸方藥不用此乃有解音酢菜生水中人蒸食之此乃生山谷當非是又有白草葉作羹飲甚療勞而

不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病疑或是此

唐本注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五稜實圓若龍葵子生青

熟紫黑煮汁飲解勞東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨今

按陳藏器本草云白英主煩熱風癩丹毒瘡瘻寒熱小兒結熱煮汁

飲之一名鬼目爾雅云符鬼目注似葛葉有毛子赤如耳瑤珠若云

子熟黑誤矣又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒

白蒿



白蒿



白蒿味甘平無毒生五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長

毛髮令黑瘰癧心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老

生中山川澤二月採陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方

藥家既不用皆無復識之所主療既殊佳應更加研訪服食七禽散

云白兔食之仙與前菴蒿子同法爾厚本注云爾雅繁音煩瞞音婆

蒿即白蒿也此蒿葉鹿於青蒿從初生至枯白於眾蒿欲似細艾者

所在有之也今按別本注云葉似艾葉上有白毛鹿遊俗呼為蓬蒿

臣禹錫等謹按爾雅疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以豆薦繁菹陸

機云凡艾白色為瞞蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一

名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰繁游胡游胡旁勃

也孟詵云白蒿寒春初此蒿前諸草生搗汁去熱黃及心痛其葉生

按醋淹之為菹甚益人又葉乾為末夏日暴水痢以米飲和一是空

腹服之子主鬼氣末和酒服圖經曰白蒿蓬蒿也生中山川澤今

之良又燒淋灰煎治淋瀝疾所在有之春初最先諸草而

生似青蒿而葉鹿上有白毛錯澁從初生至枯白於眾蒿頗似細艾

二月採此爾雅所謂繁音煩瞞音婆蒿是也疏云蓬蒿可以為菹故



詩箋云以豆薦繁菹陸機云凡艾白色為瞞蒿今白蒿春始生及秋

香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云
繁游胡游胡旁勃也此草古人以為菹孟詵亦云生按醋食今人
但食蔓蒿不復食此或疑此蒿即蔓蒿而孟詵又別著蔓蒿條所說

不同明是二物乃知古今食品之異也。又今階州以白蒿為茵陳，蒿苗葉亦相似，然以入藥，恐不可用也。按蒿類亦多，爾雅云：繫之醜，秋蒿言春時各有種名。至秋老成，皆通呼為蒿也。中品有馬先蒿，云生南陽川澤，葉如益母草，花紅白。八九月有實，俗謂之虎麻，亦名馬新蒿。詩小雅所謂匪莪伊藟是也。陸機云：藟牡蒿，牡蒿牡蒿，莢慈刀切也。三月始生，七月華，似胡麻花而紫，赤八月為角，角似小豆角，銳而長。一名馬新蒿，郭璞注：爾雅藟牡蒿，謂無子者，而陸云有子，二說小異。今當用有子者為正。下品又有角蒿，云葉似白蒿，花如瞿麥，紅亦可愛。子似玉，不留行，黑色，作角，七八月採。又有茵陳蒿，草蒿下自有條白蒿，馬新蒿古方治癩疾，多用之。深師方云：取白艾蒿十束，如外大，煮取汁以麴及米一斗，如釀酒法，候熟，稍稍飲之。但是惡疾，遍體面目有瘡者，皆可飲之。又取馬新蒿搗末，服方寸匕，日三服。如更赤起，服之年都差平復。角蒿醫方鮮有用者。

兗州赤箭

赤箭



赤箭味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿

音下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母名鬼

音下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母名鬼

乾陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭

風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有

羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤箭唐本注云此芝類莖似

箭箭赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心

脉去根五六寸有十餘子衛似芋其實似苦楝子核作五六稜中肉

如麩日暴則枯萎也得根即生噉音澹之無乾圖經曰赤箭生陳

服法也目為錫等謹按藥性論云赤箭無毒倉川谷雍

州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭薜葉

生其端四月開花薜葉俱赤實似苦楝子核作五六稜中有肉如麩

日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子

為衛似芋三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗七月八月九

月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合

離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草為物下根如

羊魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相湏而實不連但以氣

相屬耳如蕞絲之草下有伏莖之根無此莖則絲不得上亦不相屬

也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲三豈得終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序列云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津閏始萌未衝枝葉勢力溥濃故也至秋枝葉津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下又云華實莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不必都依本文是其義也他亦同此比

別說云

謹按今醫家用天麻即是此赤箭

根今補注與圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者為上今翰林沈公括最為博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻赤箭本為一物並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃與此赤箭所說都不相干即明別是一物爾然中品之下所為天麻者世所未嘗見用今就

寧州蒼藺子



此赤箭根為天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從箨中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理

行義曰赤箭天麻苗也然與天麻治療不同

故後人分之為二經中言八月採根暴乾故知此即苗也

秦州蒼藺子

菴音藺音藺音子味苦微寒微溫無毒主五藏瘀血腹中

水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒

熱周痺婦人月水不通消食明目又服輕身延年不老

駞音巨駞音虛食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十

月採實陰乾荆實慧苾為之使陶隱居云狀如蒿艾之類近道

等謹按藥性論云菴藹使味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹

滿能消瘀血日華子云治腰脚重痛膀胱疼明日及骨節煩痛不食

圖經曰菴藹子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗

人通以九月採江南人家多種此辟蛇謹按本經久服輕身延年不

老而古方書少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治療驚邪狸骨丸

之類皆大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主疏折瘀血並單

用菴藹一物煮汁服之亦未服今人治打撲損亦多用此法飲散皆

通其效最速服食方不見用者廣利方治諸瘀血不散變成癰搗



菴藹子

實 著



實 著 州 蔡



著實味甘 酸平 無毒 主益氣充肌膚明目聰慧先

知服不飢不老輕身 生少室山谷八月九月採實日乾

為之本經云此草所在有之以其莖為莖陶誤用楮實 圖經曰 著實

室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一

於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用

其莖為莖以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰

龜千歲乃遊於蓮葉之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無 毒螫徐廣注曰劉向云龜千歲而靈著百年而一本生百莖又著先 生云著生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰 天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今世取著者不能

中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上著長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不言如此然則此類其神物乎故不常有也

赤芝味苦平主腎中結益心氣補中增智慧不忘以食

輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山
陶隱居云南嶽本

以小霍山代之非正也此則應生衡山也英公云安心神

黑芝味鹹平主瘧隆音利水道益腎氣通九竅聰察以食

輕身不老延年神仙一名玄芝生常山
唐本注云五芝經云皆以五色生於五嶽

諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕以食輕身不

老延年神仙一名龍芝生泰山英公云不忘強志

白芝味辛平主效逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇

悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食

輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘温主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好

顏色以服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝

皆無毒六月八月採


署預為之使得疑良得麻子人白瓜子杜桂共益人惡常山畏扁青茵蘆蒿陶隱居

云按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆仙草之類俗所稀見族種甚多形色環異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木樛音軟名為紫芝蓋止療痔而不宜以合諸補丸藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也巨禹錫等謹按爾


雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土

土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也抱朴子云赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞澈如堅冰也又云木芝者松柏脂淪地千歲化為茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵藥性論云紫芝使畏羸味甘平無毒主能保神益壽

海州卷柏



海州卷柏



卷

君免切

相味辛

甘温

平微寒無毒

主五藏邪氣女子

陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子

止欬逆治脫肛散淋結頭

中風眩痿廢強陰益精

久服輕身和顏色

令人好容

體一名萬歲一名豹足一名求服一名交時生常山山谷

石間五月七月採陰乾

陶隱居云今出近道叢生石土上細葉似柏卷屈狀如雞足青黃色用之去下近

石有沙土處臣禹錫等謹按范子云卷柏出三輔吳氏云卷柏神農

辛平桐君雷公甘建康記云建康出卷柏藥性論云卷柏君能治月

經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅日華子云鎮心圖經曰卷柏

治邪啼泣除面疝頭風暖水藏生用破血多用止血而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱瘡頭痛

辟瘟疫名辟蛇雷其狀如鹿塊蒼木節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青

色葉摘之有乳汁搗汁飲驗

其一本云大破

堯木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒堯木香末堯木香堯渠國所獻如大呂塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉
草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦務間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘡瘡寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功用如犀故名草犀解毒為最生衢務洪饒間苗高二三尺獨莖根如細辛研服更良生水中者名木犀也海藥云

謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛平
無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者

服之得活

薇味甘寒無毒以食不飢調中利大小腸生水傍葉似

萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異

武王誡之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也

藥云謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若

鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

云生嶺南又云生大秦國性温平無毒主頭面遊風遍身癢煮汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之

零餘子味甘温無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬

乾功用強於署預有數此則是其一也一本云大如雞

海藥云謹按廣志

子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳
剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎為丸
卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳
云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却
老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之
亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃

生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕飢年當穀也

石蕊藥主長年不飢生太山石上如花蕊藥爲丸散服之今時無復有王隱晉書曰庾褒入林慮山食木實餌石蕊藥得長年也

仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傅之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚躄接汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離萑草北地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出

會州也

救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生巴西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同然非一物也陳思岌蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘴蠱毒煮

服之吐下亦搗傳瘡蟲蛇犬等咬處藤生道旁籬落
間有之葉細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補
虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝
所種以是爲名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有
石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫
補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是
蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦
無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名
倚待生桂州如安山谷葉圓高三三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣洲記
曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人爲夫所愛生園中細如片花
紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也

鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服
風緩及偏風並正生山南峽中葉似苟杞根如葛黑
色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃
天行黃疸疽瘡瘡瘡中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫
並水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍
亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根

作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與
毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胃煩熱天行溫瘴
出蒼梧陳家解藥用之故有陳家之号蔓及根並似土
瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅
門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防己出明山

龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李
邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓
赤珠似龍葵但子熟時赤耳

槌胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目
功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門

冬用之去心

甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又
主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗
餌食之甜美止洩搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓
如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿閉癖

子孟娘菜味苦小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰
囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘦瘰癧癭
瘤作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取以
為菜一名孟母菜一名厄菜

吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人將
來也

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

藜菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傅丁瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花中甜

汁飲之如蜜

益妳草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高三三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生安南似懷香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似菟絲子長少許

蓼蕎味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胃脇刺痛煮服之亦食其苗如葱韭亦

擣傳蛇咬瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良
石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥癢野雞漏下血
煮汁服生山石上紫花細葉高二尺山人並用之

藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽者服之生新羅國根如
細辛

七仙草主杖瘡搗枝葉傅之生山足葉尖細長

甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白
藥功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未
盡又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龍巖州已南甘
家亦因人爲號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多
毒物亦多解物豈天寶乎

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰背疼痲痺氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑

池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人用之

重修政和經史證類備用本草卷第六



重刊炮制

重刊炮制

重刊炮制

重刊炮制

重刊炮制

重刊炮制

重刊炮制

重刊炮制

本草綱目

本草綱目

本草綱目

重修政和經史證類備用本草

成都唐慎微

續證類

巴西新
增衍義

續證類備用本草

救校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經

揚州李氏

滄葦

編

二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



續證類

監實

續注 殿青布

黃連

芎藭

絡石

地錦扶芳土敲石血薛荔木
蓮常春藤等續注

薜蘿

疾梨子

黃耆

白水耆赤水
耆木耆續注

肉苁蓉

草苁蓉附

防風

葉附花
續注

蒲黃

香蒲

續斷

漏蘆

營實

白薔薇
根續注

天名精

決明子

注莖
續注

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花

附續筋

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子

鴨舌
草附

千歲蘘

藤是也

景天

附花

茵陳蒿

杜若

沙參

白兔藿

徐長卿

石龍荔

敗荔續注

薇銜

雲實

附花

王不留行

鬼督郵

附唐

白花藤

附唐

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寡婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草



福州馬藍



蜀州藍葉



江陵府吳藍



藍實

藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蟲蚊

音其小兒鬼也

疰鬼

螯毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔

毒其莖葉可以染青生河內平澤

陶隱居云此即今染縹音禁碧所用者至解毒人卒

不能得生藍汁乃流縹布汁以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒唐本注云藍實有三種一種圍徑二寸許厚

三四分出嶺南云療毒腫太常名此草為木藍子如陶所引乃是菘藍其汁押普更切為澱音殿者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪染菘藍為澱惟堪染青其蓼藍不堪為澱惟作碧色爾臣禹錫等謹按蜀本

圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有人皆種之爾雅云葢馬藍注今大葉冬藍也疏今為澱者是也藥性

論云藍實君味甘能填骨髓明目耳目利五藏調六腑利關節治經絡中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱毒日華子云吳藍

味苦甘冷無毒治天行熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒風癩除煩止渴殺疥解毒藥毒箭金瘡血悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤

眼產後血運解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱熱疳陳藏器云蘇云菘藍造澱按澱多是槐藍蓼藍作者入藥勝槐藍澱寒傳熱瘡

解諸毒滓傅小兒禿瘡熱腫初作上沫堪染如青黛解毒小兒丹熱和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥甘藍此人食之去熱黃也又云

青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲
燒作黑灰傳惡瘡經年不差者及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡
瘡入水不爛熏嗽殺蟲熏虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以
器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療
丁腫狐刺等惡瘡又浸汁和生薑
圖經曰藍實生河內平澤今處
黃服止霍亂真者入用假者不中
畦種蒔三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼
子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有
菘藍可以爲澱者亦名馬藍爾雅所謂葳馬藍是也有莢藍但可漆
碧而不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類
苦益菜土人連根採之焙擣下筵酒服錢匕治婦人敗血甚佳又江
寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白性寒去熱解毒止吐
血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并
附之後漢趙歧作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人皆以
種藍染紺爲業藍田彌望黍稷不殖至今近京種藍特盛云藍汁治
蟲豸傷咬劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一掬入雄黃麝香二物
隨意看多少細研投藍汁中以點咬處若是毒者即并細服其汁神
異之極也昔張薦負外在劔南爲張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上
一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從骨前下至心經兩宿頭面
腫疼如數斗筮大壯漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千
并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信
欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍

汁一莖益取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於交頰兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條云從胡國來及太原廬陵南康等染澱亦堪傳熱毒等染瓮上池沫紫碧色者同青黛功

聖惠方

治時氣熱毒心

神煩躁用藍澱半大匙以新汲水一盞服

又方

治小兒中蠱下血欲死擣青藍汁頻頻服半合

千金方

治

上生瘡連年不差以八月藍葉壹斤擣取汁洗不過三日差

又方

治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解慎勿割

斷繩抱取心中猶溫者刺雞冠血滴着口中即活也男雌女雄

又方

熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁以洗瘡

日十度并擣葛根為散煮葛根汁服方寸匕日五服差

又方

治驚癇藍葉一斤擣以水三升絞取汁服一升日二

翼

治急疳蝕鼻口數日欲死取藍澱傳之令遍日十度夜四度差

肘後方

治人身體重小腹急熱上衝骨頭重不能

舉眼中生瞋膝脛拘急欲死取藍一把水五升鼠屎兩頭尖者二七枚煮取二升盡服之溫覆取汗

葛氏方

新被毒箭擣藍

青絞汁飲并傳瘡上如無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中

又方

中水毒擣藍青汁以少水和傳頭面身上令匝

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍取汁服數升無藍浣青絹取汁飲亦佳

又方

食杏人中毒藍子汁解之

梅師

方治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒頭又方治上氣咳嗽呷呀息氣
內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳

葉水浸良久擣絞取汁一外空腹頻服瀕吏以杏人研取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差

治小兒赤痢擣青藍汁二分分四服

又方治小兒丹藍澱傳熱即易

廣五行記求徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開

一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作澱有一僧以澱致器中此虫遂避器中

走瀕吏化為水矣

衍義曰藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等


毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉為未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍黃豈非青出於藍

而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪

採汁染翠碧花成長穗細小淺紅色

芎窮

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭味辛温無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急

金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚

出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛

脅風痛温中内寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生

武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾得細辛療金瘡止痛得牡蠣療

頭風吐逆白芷為之使陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜

謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名藤

蕪亦入藥別在下說俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安

二百里正長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安百

八十里山連接七百里唐本注云今出秦州其人間種者形塊大重

實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採為佳今云三月四

月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出者今不復

用百禹錫等謹按蜀本圖經云苗似芹胡荽蛇牀葦叢生花白今出

秦州者為善九月採根乃佳吳氏云芎藭神農黃帝岐伯雷公辛無

毒扁鵲酸無毒季氏生溫孰寒或生胡無挑山陰或太山葉香細青

黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根

有節似馬銜狀藥性論云芎藭臣能治腰脚軟弱半身不遂主胞衣

不出治腹內冷痛日華子云畏黃連治一切風一切氣一切勞損切

血補五勞壯筋骨調眾脉破癥結宿血養新血長肉鼻衄吐血及溺

血痔瘻腦癰發背瘰癧癭贅瘡疥及排膿消瘀血

圖經曰芎藭生武功山谷斜谷西嶺藤蕪芎藭苗也生雍州川澤及宛

句今關陝蜀川江東山中多有之而以蜀川者為勝其苗四五月間

生葉似芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細淮南子所謂夫亂人者若芎藭

之與藁本蛇床之與藤蕪是也其葉倍香或蔣於園庭則芬馨滿徑

江東蜀川人採其葉作飲香云可以已泄瀉七八月開白花根堅瘦

黃黑色三月四月採暴乾一云九月十月採為佳三月四月非特也

關中出者俗呼為京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀

腦芎此最有力也藤蕪一名蘄古芹字巨斤切古方單用芎藭含咀以主口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之治風痰殊佳

聖惠

方 治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉酒一大盞煎至五分去滓入生地黄黃汁二合煎三兩沸食前分二服 千金

方 治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升 經駁後方 治頭風化痰 煎取二升半分三服不耐者徐徐進之 川芎不計分

兩用淨水洗浸薄片子日乾或焙杵為末煉 斗門方 治偏頭疼 蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下一丸 用京芎細

劉酒浸 靈苑方 治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空 服之佳 心濃煎艾湯下一匙頭腹內微動者是有胎也

續十全方 治胎忽因倒地忽舉動擊重促損腹中不安及子死 腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出

又方 風齒敗口臭 御藥院方 真宗賜高公相國去痰清目進飲 但含芎藭 食生犀丸川芎十兩緊小者粟米

泔浸三日換切片子日乾為末作兩料每料入麝腦各一分生犀半 兩重湯煮蜜杵為丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩隔壅

加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩 春秋注云 麥麴鞠窮 加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分 所以禦濕 簡

文帝勸醫文 麥麴芎藭纒 止河魚之腹

衍義曰 芎藭今出川中大塊其裏色白不油色嚼之微辛甘者佳 他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭

面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云子一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可以服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋單服耳若單服既久則走散真氣既使作藥佐使又不以服中病便已則烏能至此也

蕪蕪無味辛溫無毒主效逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰

去三蟲及服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇

蕪一名茈藜芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月

採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香騷人借以為譬方藥用甚稀

二種一種似芹葉一種如蛇牀香氣相似用亦不殊按爾雅云蘄萑蕪蕪注香草葉小如菱狀疏引郭云如菱蒿之狀

圖經曰蕪蕪說文已具芎藭條下廣志曰蕪蕪香草魏武帝以藏衣中管子曰五沃之土

生蔞蕪蕪郭璞贊曰蕪蕪香草亂之蛇床不隕其貴自烈以芳

黃連



宣州黃連



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛背傷泣出明目腸

辟腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澀膿血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令

人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山三月八月採

龍骨理石為之使惡菊花堯花玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴豆毒
陶隱居云巫陽在建平今西閬者色淺而虛不及東陽新安諸縣最

勝臨海諸縣者不佳用之當布裏按去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道方服食長生唐本注云蜀道者鹿大節平味極濃苦療渴為

最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今注醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者為勝呂禹錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花

黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳藥性論云黃連臣一名支連惡

白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒蕭炳云今出宣州絕佳東陽亦有歙州處州者次陳藏器云主羸瘦氣急

日華子云治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾猪肚蒸為丸治小兒疳氣

圖經曰黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六

月結實似芹子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始

堪採古方以黃連為治痢之最胡洽方載九蓋湯主下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下悉主之以黃連長三寸三十枚秤重兩半龍骨

如碁子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合如此

九上九下內諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度可得一外頓服即止又香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分

兩停同擣篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如神其久冷人即用煨熟大蒜作丸此方本出李絳真部手集方嬰孺用之亦効

人即用煨熟大蒜作丸此方本出李絳真部手集方嬰孺用之亦効

又治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取黃連末一大兩白羊子
肝一具去膜同於砂盆內研令極細衆手燃爲丸如梧子每食以煖
漿水吞二七枚連作五劑差但畏諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁
食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪囚出活之囚
後數年以病自致死一旦崔爲內障所苦喪明逾年後半夜歎息獨
坐時聞階除間悉窅之聲崔問爲誰曰是昔所蒙活者囚今故報恩
至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於
世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分停細切以雪水或甜水
煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可
用之其說云凡眼目之病皆以血脉凝滯使然故以行血藥合黃連
治之血得熱即行故乘
雷公去 凡使以布拭上肉毛然後用漿水
熱洗之用者無不神効
浸二伏時漉出於柳木火中焙乾
用若服此藥得十兩不得食猪肉
若服至三年不得食猪肉一生也
外臺秘要 治卒心痛黃連八兩
者取五升絞去滓寒
一味咬咀以水七升
溫飲五合日三服

又方 治目卒痒目痛未黃
連乳汁浸點皆中止
千金方 治大熱
毒純血
荆宣連六兩以水七升煮取三升半夜
露星月下平旦空腹頓服之少卧將息
肘後方 治眼淚出不止濃
汁漬綿乾拭目

又方 赤痢熱下久不止黃連末雞子
白丸飲服十九三十九即差
又方 治卒消渴小便多
黃連縮篩蜜和服三

十九治 又方 赤白痢下令人下部疼重故名重下
出膿血如雞子
渴延年 又方 白日夜數十行絞臍痛治之黃連一升酒五升煮取

本堂十七

一升半分再服當小絞痛**經驗方**治暴赤白痢如鴉鴨肝者痛不忍黃連黃芩各一兩以水二升煎取一升分三服熱與冷

即疑**梅師方**傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連四兩水三升煎取一升去滓分服**斗門方**治痔疾有

頭如雞冠者用黃連末傅之即差更加赤小豆末尤良**簡要濟眾**小兒吐血不止以一兩去鬚擣為散每服一錢

水七分入豉二十粒同煎至五分去滓溫服量兒大小加減進**博濟方**治久患脾洩神聖香黃散

以慢火炒令薑乾脆色深去薑取連擣末每服二錢匕空心鵬茶清下甚者不過二服差**勝金方**治眼黃連丸

少搥碎用新汲水一大碗浸至六十日後用綿濾過取汁入元碗內却於重湯上熬不住以匙蕩攪候乾為度即穿地坑子可深一尺以

瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然如灸法然後以藥梳覆上四畔封泥開孔令煙出盡即止取出刮下丸如小豆大每服十九丸甜竹

葉湯**又方**治久痢累醫不差黃連一兩為末以雞子白和為餅炙令如紫肝色杵為末以漿水三升慢火煎成膏白痢加

酒半盞同煎每服半合**廣利方**治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎溫米飲調下食前服切以童子小便五大合浸經宿微

煎三四沸去滓食上分兩**杜壬**治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連服如人行四五里再服一兩乾薑半兩各為末每用連二

錢薑半錢和勻**子母秘錄**因驚舉重胎動出血取黃連末空溫酒下酒服方寸七日三服孫尚藥同**又方**

小兒赤白痢多時體弱不堪宣連濃煎和蜜服
日六七服量其大小每煎三分水減二分頻服
又方小兒耳後月蝕瘡末黃連

傳小兒鼻下兩道赤者名曰蠶亦名赤鼻
又方疳鼻以米泔洗傳黃連末日三四度佳
姚和衆小兒

方小兒食土取好土濃煎抱朴子乳汁煎之治目中百病
宋王微黃

連讚黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身
梁江淹黃連

頌黃連上草丹砂之次藥孽辟妖長靈火視衍義曰黃連今人多

以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又
不顧寒熱多少但以盡劑為度由是多致危困若氣實初病熱多血

利服之便止仍不必盡劑也
或虛而冷則不須服餘如經

絡石



絡石味苦温微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾古焦癰

腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎

主腰髖音寬痛堅筋骨利關節以服輕身明目潤澤好顏

色不老延年通神一名石鮫音陵一名石蹉一名略石名明

石名領石名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖

石上或生人間正月採杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母菖蒲

者或云是石類既云或生人間則非石猶如石斛等繫石以為名爾

唐本注云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石側

若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名

耐冬山南人謂之石血療產後血結大良以其苞絡石木而生故名

絡石別錄謂之石龍藤主療蝮蛇瘡絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心
悶刀斧傷諸瘡封之立差今按陳藏器本草云絡石黃汁服之主一
切風癰白宜老在石者良在木者隨木有功生山之陰與薜荔相似
更有木蓮石血地錦等十餘種藤並是其類大略皆主風血暖腰脚
變白不衰若呼石血為絡石殊誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正
青臣禹錫等謹按蜀本圖經云生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延

木石之陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑今所在有六月七月採莖葉日乾藥性論云絡石君惡鐵精殺孽毒味甘平主治喉

痺喉痹器云地錦味甘溫無毒主破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒生

淮南林下葉如鴨掌藤蔓著地節處有根亦緣樹石冬月不死山人產後用之一名地噤蘇恭注曰絡石石血亦此類也扶芳藤味

苦小溫無毒主一切血一切氣一切冷去百病又服延年變白不老山人取楓樹上者為附楓藤亦如桑上寄生大主風血一名滂藤隋

朝稠禪師作青飲進煬帝以上渴生吳郡採之忌塚墓間者取莖葉細剉煎為煎性冷以酒浸服藤苗小時如絡石薜荔質緣樹木三五

十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細子一年一熟子亦入用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取

無時也又云土鼓藤味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹內諸冷血閉疆腰脚痠白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如

珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名為常春藤日華子云木蓮藤汁傳白癩瘡瘍及風惡疥癬又云常春藤一名龍鱗薜荔

圖經曰

絡石生泰山山川谷或石山之陰或高山巖上或生人間今在廩有之宮寺及人家亭園山石間種以為飾葉圓如細橘正

青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑正月採或去六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木

上者隨木性而移薜荔木蓮地錦石血皆其類也薜荔與此極相類但莖葉龐大如藤狀近人用其葉治背癰乾未服之不利即愈木蓮

但莖葉龐大如藤狀近人用其葉治背癰乾未服之不利即愈木蓮

更大如絡石其實若蓮房能壯陽道九勝地錦葉如鴨掌蔓著地上
隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳

雷公云

凡採得後用鹿布揩葉上莖蔓上毛了
用甘草水浸一伏時出切日乾任用

外臺秘要

治喉痺咽喉寒喘息不通須臾欲絕神驗以絡石草
二兩水一升煎取一大盞去滓細與須臾即通

背癱

云薜圖經

荔治背癱晟頃寓宜興縣張渚鎮有一老舉人聚村學年七十餘忽
一日患發背村中無他醫藥急取薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以
其滓傅瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云
其本蓋得薜荔之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



疾藜子味苦辛温微寒無毒主惡血破癥結積聚

喉痺乳難身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣

小兒頭瘡癰腫陰癩可作摩粉其葉主風癢可煮以浴

以服長肌肉明目輕身一名旁通一名屈人一名正行一名

狝羽一名升推一名即藜一名茨生馮翊平澤或道傍

七月八月採實暴乾烏頭為之使闊隱去多生道上而葉

行多著木屐今軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼蒺藜易云據于疾

禁言其凶傷詩云牆有茨不可掃也以刺梗穢也方用甚稀爾今按

別本注云本經云温別錄云寒此藥性宜通以服不冷而無壅熱則

其温也目禹錫等兩雅云茨蒺藜注布地蔓生細葉子有三角

刺人藥性論云白蒺藜子君味甘有小毒治諸風癰瘍破宿血療吐

膿主難產去躁熱不入湯用日華子云治實掩腎氣肺氣骨膈滿催
生并墮胎益精療腫毒及水藏冷小便多止
遺瀝泄精溺血入藥不計丸散並炒去刺用
圖經曰蒺藜子生馮翊平澤或道
傍七月八月採實暴乾又冬採黃白色類軍家鐵蒺藜此詩所謂
牆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一

種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓
 絲布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可
 採其實味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬藻子酷
 相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古方云蒺藜
 子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單餌蒺藜云不問黑白
 但取堅實者春去刺用煎主痔漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒
 中五尸擣蒺藜子蜜丸
 服如胡豆二枚日三愈

雷公云

凡使採後淨揀擇了蒸從午至
 酉出日乾於木臼中春令皮上

刺盡用酒拌再蒸從
 午至酉出日乾用

太盞煮取半盞仰卧先滿口含飯以汁一合灌鼻
 中不過再灌之嚏出一兩個瘰肉似赤蛹蟲即差

引腰痛搗末蜜和丸酒
 服如胡豆大二丸日三服

寸
又方 治腫蒺藜子一外熬令黃搗篩以麻油和如泥
 炒令焦黑以塗故布上剪如腫大勿開頭指上

蟲攻心如刺吐清汁七月七日採蒺
 藜子陰乾作灰先食服方寸匕日三

上如破
又方 備急小兒蠅螻瘡繞身匝即死以
 塗之佳 蒺藜擣葉傳之無葉用子亦可

洗三寸截之以水五外煮取二外去滓內銅器中
 又煮取一外內小器中如稠糖下取傳瘡腫上

外臺秘要

治急

千金方

塗瘡腫

又方

治遍身風
 痒生瘡疥

以蒺藜子苗煮湯洗之立差千金翼同

梅師方

治難產礙胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死蒺藜子貝母各四兩為

末米湯下一匙相去四五里不下再服

孫真人食忌

治白癩風以白蒺藜子生搗為末作湯服之

神

仙秘百云

服蒺藜子一碩當七八月熟時收日乾春去刺然後杵為末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長

生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二年老若復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕長生

衍義曰

蒺藜有兩

等一等杜蒺藜即今之道傍布地而生或生牆上有小黃花結莖刺此正是牆有茨者花收摘蔭乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服

治白癩風又一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢結子如羊內腎補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜

憲州黃耆



黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩

疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏

間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利

陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡

一名戴椹一名獨椹一名艾草一名蜀脂一名百本

生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲陶隱居

叨陽色黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌膚能新者亦

甘溫補又有蘘陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作

膏貼用消癰腫俗方多用道家不須厚云此物葉似羊齒或如

蕞藪獨莖或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之目

皮黃肉白長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳藥性論云黃耆

一名王孫治發背內補主虛喘腎衰耳聾療寒熱生隴西者下補五

藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之藥性論云出原州華原谷子山

花黃曰華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癥癰瘰癧

瘦贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽并

治頭風熱毒赤目等藥中補益呼為羊肉又云白水者涼無毒排膿
治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃耆赤水者涼無毒治血退熱毒餘
功用並同上木耆涼無毒治煩排
膿力微於黃耆遇關即倍用之

圖經曰

黃耆生蜀郡山谷白水
漢中今河東陝西州郡

多有之根長二三尺已來獨莖作叢生枝莖去地二三寸其葉扶踈
作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月
中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水
耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以苜
蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔
韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳唐許裔宗初仕陳為新蔡王外
兵參軍時抑太后感風不能言脉沈而口禁裔宗曰既不能下藥宜
湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣

如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其効如
此因附著之使善醫者知所取法焉

雷公云

凡使勿用木耆
草真相似只是

生時葉短并根橫先瀆去頭上皺皮了蒸
半日出後用手擘令細於槐砧上判用

聖惠方

治肺壅得吐以
黃耆二兩拊為

細末每服三錢水一中盞
煎至六分溫服日三四服

又方

治緩疽以一兩拊成散不
計時候溫水調下二錢匕

秘要

主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者以二兩藺
茹三兩苦酒浸一宿以猪脂五合微火上煎取三合絞去滓

以封瘡上日三
兩度其肉即消

肘後方

治酒疽心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤
黑黃班由大醉當風入水所致黃耆二兩

治頭風熱毒赤目等藥中補益呼為羊肉又云白水者涼無毒排膿
治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃耆赤水者涼無毒治血退熱毒餘

功用並同上木耆涼無毒治煩排
膿力微於黃耆遇關即倍用之
圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水
漢中今河東陝西州郡

多有之根長二三尺已來獨莖作叢生枝幹去地二三寸其葉扶踈
作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月

中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水
耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以苜

蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔
韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳唐許裔宗初仕陳為新蔡王外

兵參軍時抑太后感風不能言脉沈而口禁裔宗曰既不能下藥宜
湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣

如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其効如
此因附著之使善醫者知所取法焉
雷公云凡使勿用木耆
草真相似只是

生時葉短并根橫先須去頭上皺皮了蒸
半日出後用手壁令細於槐砧上剉用
聖惠方治肺壅得吐以
黃耆二兩拊為

細末每服三錢水一中盞
煎至六分溫服日三四服
又方治緩疽以一兩拊成散不
計時候溫水調下二錢匕
外臺

秘要主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者以二兩藺
茹三兩苦酒浸一宿以猪脂五合微火上煎取三合絞去滓

以封瘡上日三
兩度其肉即消
肘後方治酒疽心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤
黑黃斑由大醉當風入水所致黃耆二兩

木蘭一兩為末酒服方寸七日三服**梅師方**補肺排膿以黃耆六兩剉碎初虞世

治陷甲生入肉常有血疼痛黃耆當歸等分為末貼瘡上若有惡肉更研少硫黃末同貼**孫用和**治腸風瀉血黃耆黃

連等分右為末麥糊丸如菘巨大每服三十九米飲下**席延賞**治虛中有熱欬嗽膿血口

黃耆四兩甘草一兩為末每服三錢如茶點羹粥中亦可服**別說云**謹按黃耆本出綿上為良


憲水者即綿上地相鄰爾若以謂柔韌如綿即謂之**行義曰**防風

綿黃耆然黃耆本皆柔韌若偽者但以乾脆為別爾黃耆

世多相須而用唐許嗣**綱**宗為新蔡王外兵參軍王太后病

如霧重薄之是夕語

肉菘蓉



風不能言脉沈難對醫告術窮嗣宗曰餌液不可進即以黃耆防風

下氣

肉苁蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖

中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱

脫邪氣腰痛止痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五

月五日採陰乾陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬馱便有言是野馬精落地所生生時似肉以作羊肉羹補虛

乏極佳亦可生噉苳苳河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不如也唐

本注云此注論草苳苳陶未見肉者今人所用亦草苳苳刮去花用代肉爾本經有肉苳苳功力殊勝比來醫人時有用者目馬錫等謹

按蜀本圖經云出肅州祿福縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草苳苳四

月中旬採長五六寸至一尺已來莖圓紫色採取壓令扁日乾原州秦州靈州皆有之吳氏云肉苳苳一名肉松蓉神農黃帝鹹雷公酸

季氏小溫生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採性論云肉苳苳臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御過倍大

補益主赤白下補精敗面黑勞傷用苳苳四兩水煮令爛薄切細研精羊肉分為四度五味以米煮粥空心服之日華子云治男絕陽不

興女絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄積尿血遺瀝帶下陰痛據本草云即是野馬精餘瀝結成採訪人方知敦落樹下并土壅

九子平

上此即非馬交之處陶說誤耳又有
花菘蓉即是春抽苗者力較微耳
圖經曰肉菘蓉生河西山谷

州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝
落地所生今西人云大木間及土壟垣中多生此非游牝之所而乃

有則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人
血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根

採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日
採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品單之刮去鱗

甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服
補藥又有一種草菘蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取刮去

花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石
上如藕根初生掘取陰乾亦名草菘蓉性溫補男子疑即是此物今

人鮮用故少有辨
之者因附見於此
陳藏器序云強筋建髓菘蓉鱓魚為末黃
精酒丸服之力可十倍此說

出軋
雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以撥刷刷去沙土淨
寧記甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔

人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒
浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得所

衍義曰

肉菘蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為殼於義為允
又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者

方可作羹老者苦
入藥少則不效

防風味甘
 辛溫無毒
 主大風頭眩
 痛惡風風邪
 目盲無所見
 風行周身骨節
 疼痛煩滿脅痛
 脅風頭面去來

風防府中河



風防州齊



風防州同



風防州解



四肢攣急字乳金瘡內瘞及服輕身葉主中風熱汗

出一名銅芸一名茵草一名百枝一名屏風一名蔞根名

百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴

乾得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風殺
附子毒惡乾薑藜蘆白斂莞花陶隱居云郡縣無名沙苑今第一

出彭城蘭陵即近琅邪者蠶州互市亦得之次出襄陽義陽縣界亦
可用即近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療風

最要道方時用唐本注云今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦
佳葉似牡蒿附子苗等別錄云又頭者令人發狂又尾者發痼疾子

似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風
輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃

妄注爾目禹錫等謹按蜀本圖經云葉似牡蒿白花八月九月採根
藥性論云防風日花主心腹痛四肢拘急行履不得經脉虛羸主骨


節間疼痛段成式酉陽雜俎云青州防風子可亂葷撥日華子云治
三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癰緩通利五

藏關脉五勞七傷羸損盜汗心圖經曰防風生沙苑川澤及邯鄲
煩體重能安神定思勺氣脉

有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿
而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房

似蔣蘿花實似胡蔓而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月
 採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉
 青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋堯間及江東
 出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然
 云動風氣本經云葉主中風熱
 汗出與此相反恐別是一種耳
經驗後方 治破傷風防風天南
 星等分爲末每服二
 三匙童子小便五升
 煎至四升服愈即止
又方 治崩中防風去蘆頭炙赤色爲末每服
 二錢以麩糊酒調下更以麩糊酒投之
 此藥累行義文具黃
 經有効者條下

蒲黃



蒲黃味甘平無毒志
 腹膀胱寒熱利小便止血消瘀

血以服輕身益氣力延年神仙 生河東池澤四月採

陶隱居云

此即蒲釐力之切花上黃粉也伺其有便拂取之甚療血仙經亦用此

臣禹錫等謹按藥性論云蒲黃君通經脈止女子崩中不住主痢血

止鼻衄治尿血利水道日華子云蒲黃治撲血悶排膿瘡癰婦人帶

下月候不勻血氣心腹痛妊孕人下血墜胎血運血癥兒枕急痛小

便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻衄吐血下乳止泄精血痢此即是蒲

上黃花入藥要破血消腫即生使要補血止血即炒用蒲黃篩下後

有赤滓名為葶炒用甚 圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也

益腸止瀉血及血痢 生南海池澤今處處有之而秦州

者為良春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然周禮以為菹謂其始

生取其中心入地大如匕柄白色生噉之甘脆以苦酒浸如食笋大

美亦可以為鮮今人罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如

武士捧杵故俚俗謂蒲捷亦謂之蒲釐花黃即花中藥屑也細若金

粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小

兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲葶入藥以益腸已洩殊勝

雷公云凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味阻及吐人

用之 千金方治重舌舌上生瘡涎出以 又方治丈夫陰下濕痒

妙 蒲黃傳之不過三度差 蒲黃末傳之三四良

肘後方治腸痔每大便常血水服 葛氏方忍小便久致胞轉

頭致地
三度通

又方

若血內漏者蒲黃二兩水服方寸匕立止

梅師方

治產後血不下蒲黃三兩水三升煎

取一外
頓服

孫真人食忌

主卒吐血以水服蒲黃一外

簡要濟眾

治吐血唾血蒲黃一

兩擣為散每服三錢
溫酒或冷水調妙

又方

治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢用生地黃汁調下量兒大小加減進之

塞上方

治鼠竅痔蒲黃末空心溫酒下方寸匕日三服

又方

治墜傷撲損瘀血在內煩悶蒲黃末空心熱酒調下

三錢子母秘錄

治日月未足而欲產者蒲黃如棗許大以井花水服

又方

治脫肛腸出蒲黃和猪脂

傳上日
三五度

楊氏產乳

療母勞熱胎動下血手足煩躁蒲黃根絞汁服一二外

產寶

治產後下

血虛羸迨死蒲黃二兩水二升煎取八合頓服

又方

治產後如乳并癰腫蒲黃草熟杵傳腫上日二度易之并煎葉汁飲之亦佳

食之亦
得並差

催生

蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黃各為末三處貼之如經日不產各抄一錢匕新


汲水調服立產此
常親用之甚妙

衍義曰

蒲黃處處有即蒲槌中黃粉也今京師謂槌為蒲棒初得黃細羅取萼別貯以備他用將蒲黃水調為膏摩為塊人

多食之以解心臆虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆
淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

泰州香蒲



香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明

目聰耳少服輕身耐老一名睢七余切一名醮生南海池

澤陶隱居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢菁茅一名香茅以供宗廟縮酒或云是薰草又云是驚麥此蒲

亦相類爾唐本注云此即甘蒲作薦者春初生用白為茹亦堪蒸食山南名此蒲為香蒲謂昌蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊茅也

其驚麥薰草香茅野俗皆識都不為類此並非例也蒲黃即此香蒲花是也


圖經曰

文具蒲黃條下


晉州續斷



越州續斷



絳州續斷



本草綱目

卷之六

節

續斷味苦辛微温無毒主傷寒補不足金瘡癰傷

折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生

肌肉及跣傷惡血腰痛關節緩急又服益氣力一名龍豆

一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月

採陰乾地黃為之使惡雷丸陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓

莖葉節節斷皮黃皺狀如雞脚者又呼為桑上寄生忍皆非真時人

又有接骨樹高文餘許葉似朔音朔音濯皮主療金瘡有此接骨

名疑或疑而廣州又有一藤名續斷一名諾藤斷其莖器承其汁飲

之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝挿地即生恐此又相類李云是

虎藋與此大乖而虎藋亦自療血爾唐本注云此藥所在山谷皆有

今俗用者是葉似苧而莖方根如大藋黃白色陶注者非也續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒

有五六枝藥性論云續斷君主絕傷去諸温毒能通宣經脉日華子

去助氣調血脉補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰

癰撲損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子

宮冷又名大

圖經曰續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒

藋山牛蒡

越晉州亦有之三月已後生苗幹四稜似苧

麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊
 赤黃色七月八月採謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似
 但大於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今
 越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其鹿良醫人用之但
 以節節斷皮黃皺者為真

雷公云 凡使勿用草芥根緣真似續斷若誤用服
 之令人筋軟採得後橫切剉之又去向裏

硬筋了用酒浸一伏時焙乾用

外臺秘要 治淋取生續斷絞取

子母秘錄 治產後心
 悶手足煩熱狀狀氣欲絕血暈心頭硬乍寒乍熱增寒忍不禁續斷
 皮一握剉以水三升煎取一升分三服溫服如人行三二里再服無

所恐此藥救產後垂死



海州漏蘆



單州漏蘆

秦州漏蘆



沂州漏蘆



漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疔疔濕痺下
乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益
氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根

陰乾

陶隱居云喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有
療諸癩疥此久服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗

用之俗中取根名鹿驪力支切根苦酒摩以療瘡疥唐本注云此藥俗
名英蒿莖葉似白蒿花黃生莖長似細麻如筋許有四五瓣七月八
月後皆黑異於眾草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驪
山南謂之木藜蘆有毒非漏蘆也今按別本注云漏蘆莖筋大高四

五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者
佳陶注云根名鹿驪唐注云山南人名木藜蘆皆非也漏蘆自別爾

巨萬錫壽通按蜀本圖經云葉似角蒿今曹交州下濕地最多六月

七月採莖曰乾之黑於衆草藥性論云漏蘆君能治身上熱毒風生

惡瘡皮肌瘙痒癰瘻陳藏器云按漏蘆南人用苗北土多用根樹

生如茱萸樹高三三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之曰華子云連翹為

使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背癩癰腸風排膿

補血治撲損續筋骨傳金瘡止血長肉通經脉花苗並同用俗呼為

鬼油麻形并氣味似乾牛蒡頭上有白花子

圖經曰

秦海州皆有之舊說莖葉似白蒿

有莢花黃生莢端莖若筋大其子作房類油麻房而小七八月後皆

黑異於衆草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡

丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一葇上海州者花紫碧如

單葉蓮花花莖下及根傍有白茸裏之根黑色如蔓菁而細又類葱

本淮南人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者

葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單

州出者為勝六月七月採莖苗曰乾八月採根陰乾南方用苗北土

多用根又此下有飛廉條云生河內川澤一名漏蘆與苦芙鳥老切相

類惟葉下附莖有皮起似箭羽又多刻鉸花紫色生平澤又有一種

生山崗上葉頗相似而無疏缺且多毛莖亦無羽根直下更傍枝生

則肉白皮黑中有黑脉曰乾則黑如玄參經云七月八月採花陰乾

用蘇恭云用莖葉及療疔蝕殺蟲有驗據此所說與秦州海州所謂

漏蘆者花葉及根頗相近然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有用飛廉者既未的識故不復分別但附其說於下

雷公

凡使勿用獨漏

緣似漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏蘆細剉拌生甘草相對蒸從已至申去其草淨揀用

聖惠方

治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢

冷熱不調以漏蘆兩枚為散每服以猪肝兩散子一錢匕鹽少許以水煮熟空心頓服

外臺秘要

治虬蟲漏蘆并以餅腫和方寸匕服之

以蘆實味酸温微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣

陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏

客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷搗生肉復肌

牆薇名牆麻一名牛棘一名牛勒一名蒼靡名山棘生零

陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

園隱居去營實即是牆薇子以白花者為良根亦可

煮釀酒莖葉亦可煮作飲臣烏錫等謹按蜀本圖經云即薔薇也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所

在宥之葛洪治金創方用薔薇末一方寸匕日三服之藥性論云薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日華子云白薔薇根味苦

澁冷無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者用良

雷公

今薔薇也凡採得去根并用麈布拭黃毛了用刀於外臺秘要

及刺不出薔薇根末又方治折箭刺入肉膿囊不出堅修又方治

小睡中遺尿不自覺以千金方治口瘡久不差及胷中並生瘡三

稍燕効冬取根又方治壅熱口中及舌生瘡爛剉根濃又方諸

腫發背及癰癤已潰爛疼又方治小兒疳痢行數暴多生薔薇根

痛薔薇殼更炙之即愈又方洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲

天名精



明州天名精

差之肘後方治口瘡以根避風打去土

煮濃汁温舍冷易聖惠同

天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便

除小蟲去痺除背中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕

身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精名

玉門精一名疑顛一名蟾蜍蘭一名覲生平原川澤五月採

垣衣為之使陶隱居云此即今人呼為豨音喜菴音枚亦名豨首夏

月擣汁服之以除熱病味至苦而去其恐或非是唐本注云鹿活草

是也別錄名天蔓菁南人名為地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名

蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除

諸毒腫丁瘡癩痔金瘡內射身痒癢靡不止者搯之立已其豨菴苦

而臭名精乃辛而香全不相類也呂禹錫等謹按蜀本圖經云地菘

也小品方名天蕪菁一名天蔓菁聲並相近夏秋抽條頗似薄荷花
紫白色味辛而香其葉似山南菘菜爾雅云荊藿豕首釋曰藥名也
一名麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止陳藏器云天名精本經一
云麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止陳藏器云天名精本經一
名麥句薑蘇云鹿活草也別錄云一名天蔓菁南人呼為地菘與蔓
菁相似故有此名爾雅云大鞠蘧麥注云麥句薑蘧麥即今之瞿麥
然盜非麥句薑爾雅注錯如此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙氣
辛臭名為地菘人呼為劉煨草主金瘡言劉煨昔曾用之異苑云青

州劉燼宋元嘉中射一麋剖五藏以此草塞之蹶然而起燼怪而拔
 草便倒如此三度燼密錄此草種之主折傷多愈因以名焉既有活
 鹿之名雅與麋事相會陶蘇兩說
 俱是地菘功狀既同定非二物
圖經曰 天名精生平原川澤今
 江湖南皆有之夏秋抽
 條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘香氣似蘭
 故名蟾蠩蘭狀如藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名交句薑一名豕首
 爾雅所謂刻音列藪音真豕首是也江東人用此以燻
 音炒蠶蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘條

波明子



滁州波明子



眉州波明子



波明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白

膜眼赤痛淚出療瘡口青久服益精光輕身生龍門川

澤石波明生豫章十月十日採陰乾百日

著實為之使惡大麻子陶隱居

云龍門乃在長安北今處處有葉如苙苙子形似馬蹄呼為馬蹄波

明用之當濤碎又別有草波明是萋音妻蒿子在下品中也且禹錫

等謹按唐本云石波明是蚌蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明目故並有波明之名俗方惟以療眼也道術時須蜀本圖經云葉似苜蓿而闊大夏花秋生子作角實似馬蹄俗名馬蹄波明今出廣州桂州十月採子陰乾爾雅云藟若莢苑釋曰藥草波明也郭

云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰陵也關西謂之藜苳性論云决
明目利五藏常可作菜食之又除肝家熱朝朝取一匙按令淨空心吞
之百日見夜光本草云苳苳是江離子苳字音吐草也似莞生海
邊可為席又與决明葉不類本草决明注又無好事者更詳之陶云
决明葉如苳苳按苳苳性平無毒火炙作飲極香除痰止渴令人不
睡調中生道傍葉小於决明隋稠禪師作五色飲以為黃飲進湯帝
嘉之日華子云馬蹄决明助肝氣益精水調未塗消腫毒協太
陽穴治頭痛又貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也



經曰

决明子生龍門川澤今處處有之人家園圃所蒔夏初生苗
高三四尺許根帶紫色葉似苳苳而大七月有花黃白色其

子作穗如青茱豆而銳十月十日採陰乾百日按爾雅藜苳苳莞釋
曰藥草决明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸關西謂之藜苳
與此種頗不類又有一種馬蹄决明葉如江豆子形似馬蹄故得此
名又萋蒿子亦謂之草决明未知孰為入藥者然今醫家但用子如
茱豆者其石决明是蠶蛤類當在蟲獸部中

食療云

平葉主明目利五藏食之甚良
子主肝家熱毒氣風眼赤淚每

外臺秘要

治積年失明不識人决明
子二升杵散食後以粥飲

千金方

治肝毒熱取决
明作菜食之

衍義曰

决明子苗高四五尺春亦
為蔬秋深結角其子生角

中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野
或成段種蜀本圖經言葉似苳苳而闊大甚為允當

隨州丹參



丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱

積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰

脊強脚痺除風邪留熱少服利人一名却蟬草一名赤

參一名木羊乳生桐栢山川谷及大山五月採根暴乾

畏鹹水反藜蘆陶隱居云此桐栢山是淮水源所出之山在義陽非

江東臨海之桐栢也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬

酒漬飲之療風痺道家時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微

寒恐為謬矣唐本注云此藥冬採良夏採虛惡目為鑄等謹按蜀本

圖經云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一

苗數根今所在皆有九月十月採根藥性論云丹參目平能治脚弱

疾痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精滿煩去酒浸
 服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有效日華子云養神定
 志通利關節治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂掛膿止痛生肌長肉破
 宿血補新生血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪
 心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒
圖經曰丹參生桐柏山川谷及泰
 頭痛赤眼熱溫在悶又名山參
 州亦有之二月生苗高一尺許莖葉方稜青色葉生相對如薄荷而
 有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長亦尺餘一苗數根五
 月採暴乾又云冬月採
 者良夏月採者虛惡
聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛白
 汗出欲死以丹參一兩杵為散

每服熱酒調
千金方治落胎身下有血丹參十二兩以酒
 下二錢匕佳
 五分煮取三升外溫服一升日三服
梅師
方治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微
 調取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上肘後方同

茜根



茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下

血膀胱不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳

名地血一名茹蘆一名茅蒐一名精生喬山川谷三月三月

採根暴乾畏見姑陶隱居云此則今染絳茜草也東間諸處乃有

少而豐賤故也詩云茹蘆在坂者是呂禹錫等謹按蜀本圖經云染絳

草葉似黍葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木上根紫

赤色今所在有八月採根爾雅云茹蘆茅蒐疏引陸機云一名地血

齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓藥性論云茜根味甘主治六極傷心

肺吐血瀉血用之陳藏器云茜根主蠱煮汁服之今之染絳者字亦

作精周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜主蠱為最也

白華子 玄味醜止鼻洪帶下產後血運乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癬泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥劉炒用

圖經曰

茜根一作精生喬山山谷今近處皆有之染絳草也許慎說文解字以為人血所生葉似黍葉而頭尖下闊三五對生

節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云茹蘆茅蒐精草也齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾今圃人或作畦種

蔣故貨殖傳云苞茜千石亦比千乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之于寶以嘉草為蘘荷陳

藏器以為蘘荷與
茜主蟲之最也

雷公云

凡使勿用赤柳草根真似茜根只是
味酸澁不入藥中用若服令人患內

障眼速服甘草水解之即毒氣散凡使茜
根用銅刀於塊砧上剉日乾勿犯鐵并鉢

簡要濟衆

治吐血不
定茜草一

兩生擣羅為散每服二錢水一中
蓋煎至七分放冷食後服之良

傷寒類要

治心痺煩心
中熱茜根主之

方

治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉根各三
兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈

飛廉味苦平無毒

主骨節熱腫重酸疼

頭眩頂重皮

間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風

邪欬嗽下乳汁及服令人身輕

益氣明目不老可煮可

乾一名漏蘆一名天薺一名伏猪

一名飛輕

一名伏兔一

名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採

花陰乾

得烏頭良惡麻黃

處處有極似苦艾鳥老切惟葉
下附莖輕有皮起似箭羽葉又多刻缺花紫色俗方殆無

用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今既別有漏蘆則非此
別名爾唐本注云此有兩種一具陶證生平澤中者其生山崗上者

越州五味子



秦州五味子



日差二十
日平復

金翼

治疳蠶食口齒及下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢匕著痛處其痛忍之若不痛非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無數十

葉頗相似而無疎欽且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脉曰乾則黑如玄參用葉莖及根療疳蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芡為漏蘆並非是也
本圖經云葉似苦芡莖似軟羽紫花子毛白今所在平澤皆有五月六月採日乾
雷公云凡使勿留血
蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒色便如血色可表之凡修事先刮去麤皮了杵用苦酒拌之一夜至明漉出日乾細杵用之
千

百高錫等謹按蜀

號州五味子



五味子味酸温無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不

足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名

玄及生齊山谷及代郡八月採實陰乾旋蒼為之使惡萎

云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪
腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈曰暴之
乃可搗篩道方亦須用唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹
味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先也其葉似杏而
大蔓生木上子作房如落葵大如夔子一出蒲州及藍田山中今注
今河中府歲貢焉同錫等謹按蜀本圖經云並赤色蔓生花黃白
生青熟紫味甘者佳八月採子日乾爾雅云蒹蒹藉注五味也蔓生
子叢在莖頭疏云一名菜一名莖藉藥性論云五味子君能治中下

氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣薰嗽加用之曰華子云明曰暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋痲痺賁冷氣

消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨五味子生齊山谷及代郡今

亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫爾雅云葇

莖豬注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名葇一名葇豬今有數種大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾用一說小顆皮皺泡者有

白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一大合以木杵臼細擣之置小瓷瓶中以百沸湯

投之入少蜜即密封頭凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜置火邊良久湯成堪飲

雷公云一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸移門子服五味從已至申却以漿水浸一宿焙乾用

抱朴子子十六年面色如玉女入水不移門子服五味露入火不灼

衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜再上火待蜜熟俟冷


器中貯作湯肺虛寒人可化作湯時時服作果可以寄遠本經言温今食之多致虛熱小兒益甚藥性論以謂除熱氣日華子云謂暖水

臟又曰除煩熱後學至此多惑今既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之入藥生曝不去子

旋花



施州旋花



旋花味甘温無毒主益氣去面疔黑色媚好其根味辛

主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一

名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾陶隱居云東人呼為

山薑南人呼為美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛煮服甚効作丸散服之辟穀止飢近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色殊辛美子狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多唐本注云此即

真山薑爾陶復於下品旋菑注中云此根出河南北國來根似芎藭

惟膏中用今復道似高良薑二說自相矛盾且此根味甘山薑味辛

都非此類其旋菑膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若

亂之也又將旋菑花名金沸作此别名非也別錄云根主續筋也

陳藏器本草云旋花本功外取根食之不飢又取根苗搗絞汁服

之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也

錫等謹按蜀本圖經云旋菑花根也蔓生葉似罌預而多狹長花紅

白色根無毛節蒸煮堪噉味甘美根名筋根今所在川澤皆有二月

八月採根日乾謂云旋徐元切復音伏用花菑音福旋徐願反用

根今云旋復根

即菑旋悞矣

圖經曰旋徐願切花生豫州平澤今處處皆有之

蘇恭云此即平澤所生旋菑音福是也其

根似筋故一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗作

叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍野根無毛節蒸者堪噉甚甘

美五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有旋徐

元切復花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續筋法取旋

菑草根淨洗去土擣量瘡大小傳之日一二易之乃差止一名脆腸草俗

謂敲子花也黔南出一種旋花鹿莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

衍義曰旋花蔓生今河北京西開陝田野中甚多最難鋤艾治之

又生世又謂之敲子花言其形肖也四五月開花亦有多

葉者其根寸截置土下頻灌溉

方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除宵中

痰癖久服益氣輕身不老通神明一名水香生大異池

澤四月五月採

陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太伯所居故呼大吳今東間有煎澤草

名蘭香亦或是此也生濕地李云是今人所種似都梁香草

云此是蘭澤香草也八月花白人間多種之以飾庭池溪水澗傍往往亦有陶云不識又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識也

今按別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為鷲尾香時人皆煮水以浴療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭澤香並非也

等謹按蜀本圖經云葉似澤蘭尖長有歧花紅白色而香生下濕地陳藏器云蘭草與澤蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草本功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六

月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光

潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦名煎

澤草盛洪之荊州記曰都梁縣有山山下有水清淺其中生蘭草因名為都梁亦因山為號也

衍義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香惟花

地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且鞠長及一二尺四時常
青花黃中閒葉上有細紫點有春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭
色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他
花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用者
本經蘇注八月花
白此即澤蘭也

忍冬味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽

十二月採陰乾

陶隱居云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名
忍冬人惟取煮汁以釀酒補虛療風仙經少用

此既長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難
得者是貴遠賤近庸人之情乎**唐本注**云此草藤生繞覆草木上苗
莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下
有毛花白藥紫今人或以絡石當之非也**今按**陳藏器本草云忍冬


主熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條云温非也**目擊錫等謹**
按藥性論云忍冬亦可單用味辛主治腹脹滿能止氣下泄

後方

飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常遁尸者附骨
入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風尸者

淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉尸者纏骨結藏
衝心脇每發絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏
廢每節氣至則輒致大惡此一條別有治後發也忍冬莖葉
坐數斛煮令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

南京蛇牀子



蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿

濕癢除痺氣利關節癩癩惡瘡溫中下氣令婦人子藏

熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一

名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆薜

生臨淄川谷及田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母陶

落間甚多花葉正似薜蘿唐本注云爾雅一名野音吁臣禹錫等謹

按蜀本圖經云似小葉苜蓿花白子如黍粒黃白色生下濕地今所

在皆有出楊州襄州者良採子暴乾爾雅云肝虺牀注蛇床也一名馬牀藥性論云蛇牀人君有小毒治男子女人虛濕痺毒風癘痛去

男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差療齒痛及小兒驚癇曰華云治暴冷煖丈夫陽氣助女人陰氣撲損

痰血腰跨疼陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小便凡合藥服食即投去皮殼取人微炒殺毒即不轉作湯洗病則生使圖經

曰蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄州者勝三月生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一

窠似馬芹類四五月開白花又似散水子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之肝一名虺牀雷公云使

須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三伏時漉出日乾却用生地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數号曰鬼考也

千金方治產後陰下脫蛇床子絹又方治小兒癰瘡杵蛇床末和猪脂塗之金

匱方温中坐藥蛇床子散方蛇床子人為末以白粉少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然温矣

密州地膚子



蜀州地膚子



地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣

去皮膚中熱氣散惡瘡疔痕強陰久服耳目聰明輕

身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及

田野八月十月採實陰乾陶隱居云今田野間亦多皆取莖

經不甚須唐本注云地膚子田野人名為地麥草葉細莖赤多出熟

田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐人未識之別錄云擣絞取

汁主赤白痢洗目去熱暗雀盲遊痛苗灰主痢亦善北人亦名涎衣

草目鳥錫等謹按蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白

色今所在有藥性論云地膚子君一名益明與陽起石同服主丈夫

陰痿不起補氣益力治陰疽癩疾去熱風可作湯沐浴日華子云治客

熱丹腫又名落帚子色青似一眠起蠶沙矣圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀

六寸根形如蒿莖赤葉青大似荆芥三月開黃白花八月九月採實

陰乾用神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨掃也一名

鴨舌草陶隱居謂莖苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說

不同而今醫家便以為獨掃是也密州所上者其說益明云根作叢生

每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而

蘇薛成可採正與此地獨掃相類若然恐西北所出者短弱故蘇注

云爾其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉止赤白痢和氣益腸胃解惡瘡毒三四月五月採

中傷因有熱暝者取地膚子白汁注目中

方 治積年久疥腰痛有時發動六月七月

便數去少忽熱痛酸索手足疼煩地膚子十

二兩初以水四升煎取二升半分溫三服

外臺秘要 治目痛及眯忽

肘後

治姪娠患淋小便

療小便秘多或

兗州千歲藥



千歲蘂力軌切汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長

肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名蘂燕生太

山川谷陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥都不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸

不識此非甚是異物正是未研訪尋識之爾唐本注云即蘂音纓音藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終不死藤汁

味甘子味甘酸苗似葡萄其莖主噦於月切逆大善傷寒後嘔噦更良今按陳藏器本草云千歲蘂陶云藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延

木上汁白人不復識仙方或須唐本注即云蘂藤得千歲者汁甘子酸按蘂是山蒲桃斫斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣

滴目中去熱腎赤障更無甘汁本經云汁甘明非蘂也千歲蘂似葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名菅荒連蔓而生子赤

可食毛詩云葛蘂注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲蘂謂蘂蘂者深是妄言呂禹錫等謹按蜀本圖經云今處處有取汁用當

在夏秋也日華子云味甘酸止渴悅色圖經曰千歲蘂生泰山川谷作藤生蔓延木

年多大者佳莖葉同用又名蘂藤上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛蘂者也蘇恭謂是蘂藤深


為謬妄陶隱居陳藏器說最得之

行義曰

千歲藥唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還鬢則長生可致藤生太湖終南徃徃

有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫号冲和先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣古驍騎將軍甘守誠曰常春者千歲藥也旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內慙請求藥穿山逐逃去今書之以備世疑

景天



景天味苦酸平無毒主夫熱火瘡身熱煩邪惡氣諸

蟲毒痂疔凡几寒熱風痺諸不足花去女人漏下赤白輕

身明目以服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名

據火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰

乾陶隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火葉可療金瘡止
血以洗浴小兒去煩熱驚氣廣州城外有一樹云大三四圍呼

為慎火樹江東者甚細小方用亦稀其花入服食眾藥之名此最為
麗今注皇朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶

之誤爾自禹錫等謹按蜀本圖經云慎火草葉似馬齒莧而大藥性
論云景天君有小毒能治風癩惡痒主小兒丹毒及治發熱驚疾花

能明目日華子云景天冷治心煩熱狂圖經曰景天生泰山山谷
赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下今南北皆有之人

家多種於中庭或以盆盎植於屋上云以辟火謂之慎火草春生苗
葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦

有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及嬰
孺風癩在皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁

以熱手摩塗之日再但具外臺秘要治癰癤以慎火草一斤搗
熱毒丹瘡皆可如此用之絞取汁傳上熱炙摸之再

三即千金方治小兒丹發慎火草生一握搗絞汁以拭子母秘
差之掄上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

錄治產後陰下脫慎火草一斤陰又方治小兒赤遊行於體上下
乾酒五外煮取汁分溫四服至心即死搗生景天傳瘡上

楊氏產乳

療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩搗和如泥塗之

又方

療

火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之

衍義曰

景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是草藥

即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也然極易種但折生枝置土中頻澆溉旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾為末水

調掃游風赤種植執者



絳州茵陳蒿

江寧府茵陳

茵陳蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結

黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕又服輕身

益氣耐老面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡

岸上五月及立秋採陰乾陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉

瘠用仙經云白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤爾今按陳

藏器本草云茵陳本功外通關節去滯熱傷寒用之雖蒿類苗細經

冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字也今又詳此非菜中茵

陳也呂尚錫等謹按茵陳本圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採

苗陰乾藥性論云茵陳蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小便赤

日華子云石茵陳味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼

瘡癰女人癥瘕并閃損之絕又名茵陳圖經曰茵陳蒿生泰山及

蒿山茵陳本出和州及南山嶺上皆有圖經曰丘陵坡岸上今近

道皆有之而不及泰山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細

無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉故名茵

陳蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府又有一種茵陳

葉大根瘦黃白色至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白

本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵陳乃有數種或著其說云

山茵陳京下及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾

則色黑江南所用莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘
辛俗又名龍腦薄荷具中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香
烈性溫誤作解脾藥服之大令人煩以本草論之但有茵陳蒿而無山茵
陳本草注云茵陳蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北地用為山茵陳者
是也大體世方用山茵陳療癆痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利
膈治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試
取京下所用山茵陳為解肌發汗藥灼然少効江南山茵陳療傷寒
腦痛絕勝此見諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下膈去胃中煩方家
少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿復當別是一物
主療自異不得為山茵陳此說亦未可據但以功較之則江南者為
勝以經言之則非本草所出醫方所用

雷公云

凡使須用葉有八角者採得陰乾去

根細剉用

千金方

治遍身風痒生瘡疥茵陳不
勿令犯火

食醫心鏡

茵陳主除

大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘡癘
利小便切煮羹生食之亦宜人

衍義曰

茵陳蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極效
又一僧因傷寒後發汗不澈有留熱身面皆黃多熱期年

不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋与此藥服五日
病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳山柈

子各三分秦艽外麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二
合去滓食後溫服以知為度然此藥以茵陳蒿為本故書之

杜若



杜若味辛微温無毒主胃脅下逆氣温中風入腦戶頭

腫痛多涕淚出眩倒目眈眈莫郎切止痛除口臭氣久服

益精明目輕身令人不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白

連一名白芩一名若芝生武陵川澤及冤句二月八月採

根暴乾得辛夷細辛良惡並胡前胡陶隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高良薑而細味辛香又絕似旄復根殆欲

相乱葉小異爾楚詞云山中入芳若杜若此者一名杜蘅今復別有杜蘅不相似唐本注云杜若苗似蘆薑生陰地根似高良薑全少辛

味陶所注旋復根即真杜若也巨禹錫等謹按蜀本圖經云苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出破州嶺南者甚好

計然云杜蘅杜若出南郡漢中大者大善**圖經**曰杜若生武陵川澤及冤句今江湖多


小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜蘅而中品自有杜蘅條杜蘅爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚蘅者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜杜蘅與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也古方或用而今人罕使

故亦少有識之者**雷公云**凡使勿用鴨喋草根真相似只是味効不同

三重綯作袋盛陰乾臨使**爾雅**一曰杜若土

以蜜浸一夜至明漉出用鹵香草也

歸州沙參



淄州沙參



隨州沙參



沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺

氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏

補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚

一名白參一名識美一名文希生河内川谷及冤句般

陽續山二月八月採根暴乾惡防已反藜蘆

沙參并人參是為五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也

今沙參出華州為善臣禹錫等謹按蜀本圖經云花白色根若葵根藥性論云沙參臣能去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五

藏風氣曰華子云補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒圖經曰沙參生河内川谷

今出淄齊潞隨州而江淮荆湖州郡或有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有义牙七月間紫花根如葵根節許大赤黃色

中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白辨上仍有白黏膠此為小異古方亦單用葛洪卒得諸疝小腹及陰中

相引痛如絞白汗出欲死者擣篩末酒服方寸匕立差

白兔藿味苦平無毒主蛇虺蜂蠆狗菜肉蠱毒

鬼症風症諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着

痛上立消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山

谷陶隱居云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞

有識之者想當似葛爾須別廣訪交州人未得委悉唐李注云

此草荆襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與眾草異蔓

生山南俗謂之白葛用療毒有效而交廣又有白花藤生葉似女貞


莖葉俱無毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非藿

也用葉苗者真矣二物療治並如經說各自一物下條載白花藤也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉圓若蓴今襄州北汝州南崗上有五月六月採苗日乾

煮白兔藿飲之乾則擣末傳諸毒妙

溜州徐長卿



泗州徐長卿



海藥云主風邪熱極宜

徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣

溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山

谷及隴西三月採

陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁爾氣亦相似今狗

脊散用鬼督郵當取其強悍宜膏脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭唐本注云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細

辛微魚長而有腺昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青

七月八月著子似蘿摩子而小九月苗黃十月周生下濕川澤之間今所在有之八月採日乾

圖經曰

徐長卿生泰山山嵒

谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似

細辛微魚長有腺氣三月四月採一名別仙蹤

雷公云

凡採得魚杵拌少蜜令遍用葵器盛蒸三伏時日乾用

石龍菟味苦微寒

微溫無毒主心腹邪氣小便不利

利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出

汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳

目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍

華一名懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷

濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以

作席者但多節爾唐本注云別錄云一名方賓主療蛇蟲及不消食

爾今按別本注云別錄云微温今之服用能除熱蓋不温也錫等謹按蜀本圖經云莖如絳叢生俗名龍鬚草今人以爲席者所

在者之八月九月採根暴乾陳藏器云按龍鬚作席彌敗有垢者取方尺煮汁服之主淋及小便卒不通今出汾州亦處處有之

薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸

氣賊風鼠癘癰腫暴癥逐水療痿廢久服輕身明目

一名糜銜一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中

川澤及冤句邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱居云俗用亦少唐本注云

此草叢生似芫蔚及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾銜此草差又有大小二種楚人猶謂

大者為大具風草小者為小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絕產無子
 百禹錫等謹按蜀本圖經云葉似芡蔚叢主有毛黃花根赤黑也
陳藏器云一名無心草非草無心者南
 人名吳風草方藥不用之
素問云黃帝曰有病者身熱解慳
 汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉木各十分麋衡五分合以三指撮為後飯

瀛州雲實



雲實味辛苦溫無毒主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴
 花莖見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼

久服輕身通神明 益壽一名負實一名雲英一名天豆

生河間川谷十月採暴乾

陶隱居云今處有子細如葶藶子而小黑其實亦類葶藶燒之致

鬼未見其法術唐本注

云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名

天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如首梢枝間微刺俗謂苗為

草雲母陶云似葶藶非也 **禹錫等謹按蜀本圖經**云葉似細槐花

黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月

採圖經曰

雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大黃黑

色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實實過時即枯落治瘡藥中多用之

雷公云

凡使採得

後鹿擣相對拌渾顆

豫實蒸一日後出用

河中府玉不留行



成德軍王不留行



江寧府王不留行

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺

內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘦乳婦人難產久服輕身

耐老增壽生太山山谷二月八月採陶隱居云今處處有人言是藜子亦不爾葉似酸漿

子似菘子而多入癰瘻方用之目禹錫等謹撰蜀本草圖經云葉似菘藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三

月收苗五月收子曬乾藥性論云王不留行能治風毒通血脈日華子云治發背遊風風癱婦人血經不勻及難產根苗花子並通用又

名禁宮花
圖經曰
王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆剪金花有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根

葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子
狀又似猪藍花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草河北生
者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其
中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風痲有王不留行湯最效
不出疼痛以王不留行爲
未熟水調方寸匕即出

雷公云

凡採得拌渾蒸從已至未出却下
漿水浸一宿至明出焙乾用之

梅師方

治竹木針
刺在肉中

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百

精毒温瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草

唐本注云苗
惟一莖葉生

莖端若繖音傘根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長
卿代之非也唐本先附
一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭籜高二尺
已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生隨花生葉心黃白色二月八月
採根所
在皆有

雷公云

凡採並細剉了擣用生甘
草水煮一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主

虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤

唐本注

云苗似野葛而
白花根皮厚肉白其骨

柔於野葛唐本先附目禹錫等詳按蜀本圖經云葉有細毛蔓
生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋

公去


凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同菜花藤酸
澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛温無毒主肢節風痛筋脉不遂拉傷
瘀血五緩攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採

無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉

雷

閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時○圖經曰

不地

容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微鹿褐累累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林

野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之

似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在

有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內

有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器錄

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦

煮服之亦傳病上生嶺南葉二椹花紫色一名承露仙

又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異

云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手脚不遂等風生研服揚氏產乳療中盡毒人肝藤以清水磨一

彈丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如

竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似

骨黑者似角云是越王行海作筭有餘弃水中而生

海藥云

謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨筭籌所餘弃水中故生此遂名筭味鹹温主水腫淨氣結

聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煮服之

石筭味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越

志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也海藥云

主風秘不通五鬲氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛

尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊脰蛇咬犬毒酒及水磨

服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬藜根似菘

蕪而小也海人極用之海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取一七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮

服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩

生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人

呼爲給教羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中
餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木
香安南亦有一名飛騰

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松
葉上有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬瘡瘡上蔓
生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子



重修政和經史證類備用本草卷第七