

# 永樂大典

卷三千六百十五

永樂大典卷之三千六百十五

十寒

寒

諸寒證治十

張仲景傷寒論辨太陽病脈證并治太陽病項背強凡凡無汗惡風葛根湯主之。或無已語。太陽病項背強凡凡汗出惡風者中風也。項背強凡凡無汗惡風者中風表實也。表虛宜解肌未實宜發汗是以葛根湯發之也。太平聖惠方太陽病項背強無汗而惡風者宜麻黃湯。許叔微普濟本事方有人患傷寒無汗惡風項背屈而且強予曰項強凡凡葛根湯證或人問曰何謂凡凡予曰凡凡者如凡凡足疾屈而強也謝復古謂病人羸弱須過凡凡而起誤也蓋仲景論中極有難曉處振振欲擲也心中悞悞外氣怫鬱鬱胃不仁膈內作痛如此之類甚多然寧中許守末因因其獨于感傷寒之初不能辨其病證見其項背而汗多以涼藥解治之至於再三遂成陰毒六日卒迥痛悍之遂著陰毒形證訣三篇。雲岐子保命集太陽經病項背強頭痛太陽從上至足凡凡而無汗肌熱者屬陽明惡風在表也。脈浮而過於平脈宜葛根湯。太陽經病頭痛項背強凡凡而

永樂大典卷之三千六百十五

熱不思風。目疼鼻乾而刺者傳陽明也。脈浮大而長。傳胃則嘔。宜葛根湯。太陽傷寒中風。經與經合。尺寸俱長。陽明受病。當二三日發。以其脈大并絡於目。故身熱目疼鼻乾不得財。陽明經始於鼻交頰中從頭下至足。行身之前為表之裏。其陽明經標熱本實。標陽則熱本於胃胃者水穀之海。故本實。其從標則浮而長。從本則沉而實。陽明為肌肉之本。標病身熱。蒸蒸而不惡寒。本實胃中燥。鼻乾目疼。凡凡而熱。陽明榮發汗。在本者不榮下。發之則變黃證。太陽主表榮衛是也。榮衛之下。肌肉屬陽明。二陽併病。葛根湯主之。衛者桂枝。榮者麻黃。榮衛之中。麻黃桂枝各半湯。榮衛之下。肌肉之分者。葛根湯。又名解肌湯。汪時傷寒發明書云。若自汗惡風者。名曰中風。

葛根湯方

葛根 四兩

麻黃 三兩 去節 桂 二兩 去皮

芍藥 二兩 切

甘草 二兩 炙

生薑 三兩 切

大棗 十二枚 擘

本半云。輕可去實。麻黃葛根之屬是也。此以中風表實。故加二物於桂枝湯中也。

右七味。以水一斗。先煮麻黃葛根減二升。去沫。內諸藥。煮取三

升去滓溫服一升。覆取微似汗不須啜粥。餘如桂枝法將息及禁忌。  
太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。或無已註。傷寒有合病。有併  
病。本太陽病不解。併於陽明者。謂之併病。三經俱受邪。相合病者。謂之合  
病。合病者。邪氣甚也。太陽陽明合病者。與太陽少陽合病。陽明少陽合病  
皆言必自下利。有以邪氣併於陰。則陰實而陽虛。邪氣併於陽。則陽實而  
陰虛。寒邪氣甚。客於二陽。二陽方外實而不主裏。則裏氣虛。故必下利。與  
葛根湯以散經中甚邪。索矩傷寒新書云。合病者。初覺病。便兩經或三  
經相合受邪是也。朱肱傷寒活人書。又問二陽有合病。有併病。何也。答  
曰。脈浮大而長。頭疼腰痛肌熱。目赤鼻乾者。合病也。太陽初得病。時發其  
汗。汗先出不微。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒者。併病也。三陽皆有合  
病。唯三陰無合病。不可不知也。太陽證罷。但發潮熱。手足絳絳。汗出大便  
難而譫語者。下之愈。宜大承氣湯。若太陽證罷。不可下。宜用桂枝麻黃  
各半湯。小發汗。設面赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。若發汗不大。微  
則陽氣怫鬱。不得越散。當汗不行。煩躁不知痛處。其人短氣。但坐以汗出  
不微故也。更以麻黃湯發其汗。則愈。何以知汗出不微。以脈澀故知之。  
越則真活人百問釋疑。第二問。又云。太陽與陽明合病。脈必浮大而長。外

承氣大輿卷三十六百五

二

證必頭疼腰痛。脈熱日疼。鼻乾也。惡汗此問。太陽陽明合病。其論脈固熱  
也。其證治則非也。何者。蓋仲景論所出合病證治。有三。自下利者。葛根湯  
不下利。但嘔者。葛根加半夏湯。喘而胃滿者。麻黃湯。此問皆不言何邪却  
以己意云。惡寒者。升麻湯。不惡寒。反惡熱。大便不秘者。白虎湯。解利之不  
惡寒。反惡熱。大便秘。或譫語者。承氣湯。下之上。件皆是治陽明經自病藥。  
不可以治合病。非特此爾。少陽門中。亦不該載。太陽少陽合病併病。又何  
邪惡者。疑合病與併病之為難明也。又夫今始釋之。蓋合病者。二陽經或  
三陽經同受病。病之不傳者也。且如太陽陽明併病一證。若併而未盡。是  
傳未過。尚有未證。仲景所謂太陽證罷。面色赤。陽氣怫鬱在表。不得越  
煩躁短氣是也。猶當汗之以各半湯。若併之已盡。是為傳過。仲景所謂太  
陽證罷。潮熱手足汗出。大便難。而譫語者是也。法當下之以承氣湯。是知  
傳則入府。不傳則不入府。所以仲景論太陽陽明合病。止出三證。知前於  
太陽陽明併病。則言其傳變如此也。又三陽經互相合病。皆自下利。仲景  
於太陽陽明合病。則主以葛根湯。太陽少陽合病。主以黃芩湯。少陽陽明  
合病。主以承氣湯。至於太陽少陽併病。其證頭項強痛。眩暈如結。胃心下  
痞。軟常刺。大椎肺俞肝俞不可汗下。少陽陽明併病。本論問。又三陽合病。

永樂大典

卷三六一五

一證。獨有證治見後問。三陽者與三陰合病。即足兩感。所以三陰合病也。太陽與陽明合病。不下利但嘔者。葛根加半夏湯主之。或無已註。邪氣外甚。陽不主裏。裏氣不和。氣下而不上者。但下利而不嘔。裏氣上逆而不下者。但嘔而不下利。與葛根湯以散其邪。如半夏以下逆氣。當岐子保命集。太陽經與陽明合病。頭痛項強。身熱不惡風。脈浮強。不下利。陽明本實。但嘔者。少陽也。宜服葛根加半夏湯。

葛根加半夏湯方

葛根 四兩

麻黃 三兩 去節 湯泡去黃汁 焙乾 升

生薑 三兩 切

甘草 二兩 炙

芍藥 二兩

桂枝 二兩 去皮

大棗 十二枚 劈半 夏半升 洗

右八味。以水一斗。先煮葛根麻黃。減二升。去白沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。

太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。未解也。喘而汗出者。葛根黃芩黃連湯主之。或無已註。經日不宜下。而後攻之。內虛熱入。暢熱遂利。桂枝證者。邪在表也。而反下之。虛其陽胃。為熱所乘。遂利不止。邪在表則先陽脈。邪在裏則先陰脈。下利脈微遲。邪在裏也。促為陽盛。雖下利而脈

永樂大典卷三六一五

三

促者。知表未解也。病有汗出而喘者。為自汗出而喘也。即邪氣外甚所致。喘而汗出者。為因喘而汗出也。即裏熱氣逆所致。與葛根黃芩黃連湯散表邪。除裏熱。當岐子保命集。太陽經與陽明經為病。頭痛項強。身熱鼻乾。脈浮大而長。當葛根湯解肌。從陽明之治也。若無陽明脈證。獨有太陽脈浮自汗惡風。桂枝湯主之。反下之。裏虛利不止。脈浮大而長者。葛根加黃芩黃連湯。黃連苦而堅內。能止下利。黃芩苦寒。主水熱裏實。是以加之。

葛根黃芩黃連湯方

葛根 半斤

甘草 二兩 炙 味甘平

黃芩 二兩 味苦寒

黃連 三兩 味苦寒

內經曰。辛甘發散為陽。表未解者。散以葛根甘草之甘。苦以堅之。裏氣弱者。堅以黃芩黃連。

右四味。以水八升。先煮葛根。減二升。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫再服。王素外臺秘要方。忌豬肉冷水。海藻。松菜。

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘者。麻黃湯主之。或無已註。此太陽傷寒也。寒則傷榮。頭痛身疼腰痛。以至牽連骨節疼痛者。太陽經榮血不利也。內經曰。風寒客於人。使人毫毛畢直。皮膚閉而為熱。

者寒在表也。風并於衛。衛實而榮虛者。自汗出而惡風寒也。寒并於榮。榮實而衛虛者。無汗而惡風。以榮強衛弱。故氣逆而喘。與麻黃湯以發其汗。麻黃時傷寒總病論云。傷寒之脈浮盛而按之溫者是也。脈浮而緊。浮為風。緊為寒。風傷衛。寒傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。外證必發熱。無汗或喘。其人但憎寒。手足指末必微厥。大而復溫。掌心不厥。此傷寒無汗用麻黃湯。凡脈浮數。或浮緊無汗。小便不數。病雖十餘日。尚宜麻黃湯也。宋邦傷寒新書云。中風與傷寒。並可投桂枝麻黃。若分中風自汗用桂枝者。其虛人也。傷寒無汗用麻黃者。其實人也。由此中風自汗。實人者麻黃亦可用。傷寒無汗虛人者。桂枝亦不可用。故曰桂枝麻黃。於中風傷寒。並可投也。桂枝湯虛人可服。非實人亦可服者。無麻黃在中。麻黃湯實人可服。然虛人亦可服者。無附子在中。餘無藥做此。朱肱傷寒活人書云。傷寒熱病。藥性須涼。不可太溫。夏復麻黃湯。須加知母半兩石膏一兩。黃芩一分。蓋麻黃性熱。夏月服之。有發黃斑出之失。唯冬及春與病人。素虛寒者。乃用正方。不在加減。許叔微普濟本事方論麻黃湯加減法。並依活人書。仲景論傷寒。一則桂枝。二則麻黃。三則青龍。桂枝治中風。麻黃治傷寒。青龍治中風見寒脈。傷寒見風脈。三者如鼎立。人皆能言之。而不曉前人處方。

水藥大要卷三十六百十五

四

用藥之意。故醫者多不用。無足怪也。且脈浮而緩者。中風也。故書合惡寒。漸漸惡風。翕翕發熱。仲景以桂枝對之。浮緊而滑者。傷寒也。故頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘。仲景以麻黃對之。至於中風。脈浮緊。傷寒。脈浮緩。仲景皆以青龍對之。何也。予嘗深究三者。若證候與脈相對。用之無不應手。而愈。何以言之。風傷衛。衛氣也。寒傷榮。榮血也。榮行脈中。衛行脈外。風傷衛。則風邪干陽氣。陽氣不固。發越而為汗。是以自汗而表虛。故仲景用桂枝以發其邪。芍藥以治其血。蓋中風則病在脈之外。其病稍輕。雖同曰發汗。特解肌之藥耳。故仲景於桂枝證云。今半身掣掣微似有汗者佳。不可如水淋漓。病必不除。是知中風不可大發汗。汗過則反動榮血。邪氣乘虛而襲之。故病不除也。寒傷榮。則寒邪入陰血。而榮行脈中者。也。寒邪居脈中。非特榮受病。邪自內作。則并與衛氣犯之。又則浸淫及骨。是以汗不出而熱。齒乾以煩冤。仲景以麻黃發其汗。又以桂枝甘草助其發散。解除內外之邪。榮衛之病。屬大抵二藥皆發汗。而桂枝則發其衛之邪。麻黃并榮衛治之。亦自有深淺也。何以驗之。仲景桂枝第九九證云。病常自汗出者。此為榮氣和。榮氣和者。外不諧。以衛氣不共榮氣諧和。故病常行脈中。衛行脈外。復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。又第四十七證。

亡發熱汗出者此為榮衛強故使汗出欲散邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和又第一卷云寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒脈浮緊者紫衝俱病也麻黃湯中并用桂枝此仲景之意也至於青龍雖治傷風見寒熱傷寒見風脈之病然仲景云汗出惡風者不可服之服之厥逆使有筋傷內咽之證故青龍一證尤難用須是形證諦審然後可行故王真大夫經治止用桂枝麻黃各半湯蓋慎之也 有人病傷寒身熱頭痛于診之曰邪在表此表實證也當汗之以麻黃湯或人問曰傷寒大抵因虛故邪得以入之今邪在表何以云表實也子曰古人稱邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實蓋邪之入人也始因虛及邪居中則反為實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實能明此四字則仲景三百九十七法可坐而定也何以言之有表實有表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛于於表裏虛實歌中常論其事矣仲景麻黃湯之類為表實而設也桂枝湯之類為表虛而設也裏實則承氣之類是也裏虛則四逆之類是也表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則愈表裏俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華他傳有所史倪尋李延共止俱頭痛身熱所苦正同他曰尋當下

永樂大典卷三千六百十五

五

利之延當發汗或難具異他日尋外實延內實故治之異 許叔微傷寒九十論麻黃湯證鄉人丘巨忠寓毗陵為福寺病傷寒予為診視見其發熱頭疼煩渴雖浮數無力自尺以下不至予曰雖麻黃證而尺連弱仲景云尺中遲者榮氣不足血氣微少未可發汗予於建中湯加當歸黃耆今飲之翌日病者不耐其家晚夜皆發汗藥其言至不遜予以鄉人隱忍之但以建中調理而已及六七日尺部方應遂投麻黃湯服第二服狂言煩悶煩更稍定已中汗矣五日愈又論曰仲景論雖云不避晨夜即使治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日若不備次第雖暫時得安虧損五臟以促壽限何足尚哉昔范雲為陳霸先屬官霸先有九錫之命在旦夕矣雲偶感寒疾恐不及預處事召徐文伯診視之懇使可得愈乎文伯曰便差甚易後恐二年後不復起爾雲曰期間道夕死猶可况二年乎文伯以大塊地布枕藉葉設席置雲卧其上頃刻汗解以溫粉裹之翌日愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒矣夫取汗先期尚促壽限况不顧表裏不待時日便欲速愈乎每見病家不耐病三四日晝夜促汗醫者顧利恐別更醫隨情順意鮮不致斃故予書此以為龜鑑 李知先傷寒活人書括論麻黃桂枝湯服桂枝湯吐者其後必吐膿血出證治論服麻黃湯發

項目暎刺者必如。出活人書。頭發熱汗出惡風。宜桂枝湯之類。應解散而用麻黃者。二者均為解散。正分輕重。不可不察也。仲景云。無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃。古人有汗者當解散。無汗者當發汗。成無已傷寒明理論麻黃湯方。本草有曰。輕可去實。即麻黃芎根之屬是也。實謂寒邪在表。皮膚空實。榮衛勝。津液內固之表實。非腹滿便難之內實也。聖濟經曰。汗不出而發寒。邪氣勝而中惡。輕劑所以揚之。即麻黃芎根之輕劑耳。麻黃味甘黃用以為君者。以麻黃為輕劑。而專主發散。是以為君也。桂枝為臣者。以風邪在表。又緩而膚理疎者。則必以桂枝解其肌。是用桂枝為臣。寒邪在經來實而發寒者。則非桂枝所能獨散。必專麻黃以發汗。是當麻黃為主。故麻黃為君。而桂枝所以為臣也。內經曰。寒淫于內。治以甘熱。佐以辛苦者。茲是類歟。甘草味甘平。杏仁味甘苦溫。用以為佐使者。內經曰。肝苦急。急食甘以緩之。肝者榮之土也。傷寒榮勝衛固。血脈不利。是專味甘之物以緩之。故以甘草杏仁為之佐使。且桂枝湯主中風。風則傷衛。風邪併於衛則衛實而榮動。仲景所謂汗出惡風者。此為榮弱衛強者。是矣。故桂枝湯佐以芍藥。用和榮也。麻黃湯主傷寒。寒則傷榮。寒邪併於榮。則榮實而衛

水藥大要卷三十六百十五

六

虛內經所謂氣之所并為血虛。血之所并為氣虛者是矣。故麻黃佐以杏仁。用利氣也。若是之論。實處方之妙理。劑劑之洞微。該通君子。熟明察之。乃見功焉。劉守真病機氣宜保命集解利傷寒論。夫傷寒之法。先言表裏。及有緩急。三陽未當息。裏當緩。三陰未當緩。裏當急。又曰。脈浮當汗。脈沉當下。脈浮汗急而下緩。謂三陽表也。脈沉下急而汗緩。謂三陰表也。麻黃湯謂之急。麻黃附子細辛湯謂之緩。內經云。有清形以為汗。為汗之緩。裏之表也。又曰。在皮者汗而發之。為汗之急。裏之表也。急汗者。太陽。緩汗者。少陰。是藏府之輸應也。假令麻黃附子細辛湯是少陰證。始因發熱。脈沉。裏和無汗。故清形以為汗也。假令麻黃湯是太陽證。頭項痛。脈浮。裏和。浮無汗。裏和是也。在皮者汗而發之也。經曰。治主以緩。治客以急。此之謂也。假令得肝脈。其外證善涼。而青善怒。其三部脈俱弦。而浮。表寒裏和。謂清便自調也。麻黃湯內加羌活。防風。各三錢。謂脈主風。是脾受病。大便秘。或泄下赤水無數。皆裏不和也。假令得心脈。其外證面赤。口乾善噦。其尺寸脈俱浮而洪。惡寒裏和。清便自調也。麻黃湯內加黃芩石膏各三錢。謂心主熱。是小腸受病也。假令得脾脈。其外證面黃善噫。善思善味。尺寸脈俱浮而緩。裏和惡寒。麻黃湯內加白朮防己各五錢。謂脾主濕。胃經受病

# 永樂大典

卷三六一五

也。假令得脾脈。其外證面白善噦。惡寒不熱。欲哭。其尺寸脈俱浮而濡。裏和惡寒。麻黃湯內加桂枝。生薑各三錢。謂脾主燥。是大腸受病也。假令得紫脈。其外證面黑善恐。其尺寸脈俱浮。而裏和惡寒。麻黃湯內加附子生薑。謂腎主寒。是膀胱經受病也。已上五證皆表之表。謂在皮膚者。汗而發之。皆府受病。表之裏者。下之當緩。謂隨藏。表證外顯。尺寸脈俱浮。而復有裏證。謂發熱飲水。便利赤澀。或瀉下赤水。按之內實。或痛。麻黃湯去麻黃杏仁。與隨藏元加藥同煎作五服。每下一證。初一服加大黃半錢。邪盡則止。未盡第二服加大黃一錢。邪未盡加大黃一錢半。如邪未盡又加之。邪盡則止。此謂先緩而後急。是表之裏證。下之當緩也。假令得肝脈。其內證四肢滿閉。淋瀝便難轉筋。其寸尺脈俱沉而弦。裏和惡寒。肝經受病。麻黃附子細辛湯內加羌活。防風各三錢。假令得心脈。其內證煩心心痛。掌中熱而嘔。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。心經受病。湯內加黃芩石膏各三錢。假令得脾脈。其內證腹脹滿。食不消。怠惰嗜卧。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。脾經受病。加白朮。防己各三錢。假令得肺脈。其內證喘咳。洒淅寒熱。其尺寸脈俱沉。裏和惡寒。肺經受病。加薑桂各三錢。假令得腎脈。其內證泄瀉而下重。足腫冷而逆。其脈尺寸俱沉。腎經受病。加附子。生薑各三錢。已上五證

永樂大典卷三千六百五

七

裏之表也。宜漬形以爲汗。皆藏受病也。裏之裏者。下之當急。謂隨藏內證已顯。尺寸俱沉。復有裏證者。謂大小便閉澀。或下赤水。或瀉無數。不能飲食。不忍風寒發熱引飲。其脈俱沉。或按之內實而痛。此謂裏實。宜連下之。麻黃附子細辛湯內去麻黃。與隨藏元加藥內分作三服。每下一證。初一服加大黃三錢。邪盡則止。如邪未盡。再一服加大黃二錢。又未盡第三服加大黃一錢。此先急而後緩。謂是裏之裏也。當連下之也。劉守真傷寒直格論傷寒表證。夫傷寒之候。頭項痛。腰脊強。身體拘急。表熱惡寒。不煩躁。無自汗。或頭面目痛。肌熱鼻乾。或胃滿而喘。手足指末微厥。脈浮數而緊者。邪熱在表。此皆麻黃湯發汗之證也。或天水散之類。甚佳。無使藥不中病。而益加害也。益元散 一名天水散 一名太白散。治身熱嘔吐泄瀉。腸澀下痢赤白。治淋濁癰瘰。疔小疔偏主石淋。瀉胃中積聚寒熱。大益精氣。通九竅。六府津液。去留結。消畜水。止渴利中。除煩熱。心躁。治腹脹痛。胸補益五藏。大養脾胃之氣。此腎水之藏。非胃土之所也。理內傷陰虛。安寔定寔。補五勞七傷。一切虛損。主痛癢驚悸健忘。止煩滿。短氣。感傷咳嗽。添飲食不下。肌肉疼痛。治口瘡牙齦疔腫。明耳目。壯筋骨。通經脈。和氣血。消水穀。保真元。解百藥酒食邪熱毒。耐勞役。飢渴寒熱。辟中外諸邪。

所傷。火服桂志。輕身。壯顏益壽。及解中暑傷寒。疫癘。飢飽勞損。憂思慮。志怒驚恐。傳染。并汗後遺熱。勞復諸疾。蒸解兩感傷寒。能令遍身結滯。宜通氣和而愈。及婦人下乳。催生。并產後積液血虛。陰虛熱甚。一切諸瘧。並宜服之。無患。吹乳。乳發。或已覺吹乳。乳癰。頓服即愈。逆神驗之仙藥也。石淋服金石熱藥。結為砂石。自小便中出。痛不可忍。益元散。增石六兩。白散。好者。甘草一兩。右為細末。每服三錢。蜜少許。溫水調下。或無蜜亦可。每時日三服。或欲冷飲者。新井水調下亦得。解利發汗。煎蔥白五枚。湯下。每服水一盞。蔥白五寸。豆豉五十粒。煮取汁七分。調併三四服。以効為度。此藥是寒涼解散熱鬱。設病甚不解。多服無害。但有益耳。本世傳名太白散。俗患性寒。忽易得之。戰物而又不明。素問造化之理。故不取本。神驗之言。而多不用焉。若以隨證驗之。乃凡人之仙藥也。何可缺歟。夫傷寒當汗則不可下。當下則不可汗。且如誤服此藥。則汗自不出。而裏熱亦獲其効。亦有裏熱。便得宣通而愈者也。或半在表。半在裏。可和解而不可吐下。發汗者。若服此藥。多愈。或不愈。亦小減。加涼膈散和解尤佳。或自當汗解者。更加蒼朮。麻末三錢。同葱豉煎湯調服尤良。或孕婦不宜滑石。麻黃。桂枝等發汗。即用甘草一兩。蒼朮二兩。同為麻末。每服四錢。水一盞。蔥白

水藥大典卷三十六百五

八

五寸。豉五十粒。同煎至六分。濾去滓。熱服。併二三服。取微汗。是名地毒散。非孕婦亦可服。或太白散。加麻黃二兩。士節煎服。世云神白散。或通毒散。加麻黃與蒼朮等分。去節。濟眾云青龍散。或青龍散。更加滑石末。與蒼朮二倍。是為發汗之妙藥。名曰大通毒散。此方唯正可汗者即用。誤服之則轉加熱也。或解利兩感。煎涼膈散。調下益元散。四錢。或下乳用豬肉。麩羹。或粥飲之類。調下四錢。不拘時候。日三服。及宜食肉。麩羹。催產。溫香油。柴調下五錢。并二三服。以產為度。或死胎不下者。煎三乙承氣湯一服。調下益元散五錢。須臾更頻用油柴調益元散。溫服。前後俱下。而胎下可活。產母也。凡難產。或死胎不下。皆由風熱燥滯。氣結滯。而不能舒。緩。故產戶不得自然開通也。此藥力至。則結滯頓開。而產矣。後俱不可溫補。而反生燥熱也。俗未知產後亡液。損血。疼痛。怖懼。以致神狂。氣亂。則陰氣損。虛邪熱大甚。而為諸熱。證由不措。素問。不知造化。故不識證候。陰陽。反以寒為產後。諸虛百損。使為虛冷。而無熱也。誤以熱藥溫補。或見煩渴者。不令飲水。本雖善心。為害多矣。宜知治病之道。但以臨時審其藏府六氣虛實。明其標本。如法治之而已矣。此藥泛常多用。然雖為効至大。而俗以病異藥同。時謂其行。反招侮。便今以黃丹加合。批紅色。名曰紅玉散。加青黛。今

輕碧色。名碧土散。加薄荷葉一分。名蘇蘇散。主瘧不殊。收効則一。俗曰備  
 然。何能別此。可速安傳。可顯古功。後之學者。其先心為。雙解散。善解風寒  
 暑濕。肌飽勞逸。憂愁思慮。恚怒悲恐。四時中外諸邪所傷。但覺身熱頭疼。  
 拘倦。痲痛。無問自汗。無汗。憎寒發熱。渴與不渴。有甚傷寒。疫癘。汗病。兩感。  
 風氣雜病。一切舊病作發。三日東外。並宜服之。設若感之甚。本解散者。  
 常服三兩日間。亦漸效。可。並無所損。或寒熱極甚。腹滿而痛。煩渴。諸妄。須  
 可急下者。以大承氣湯下之。三。承氣湯亦妙也。或下後未愈。或經未全。  
 或大汗前後。逆氣。或汗後餘熱不解。或遺熱勞復。或感他人病氣。汗毒傳  
 染。或中瘴氣。或氣羊氣。一切穢毒。并毒。酒毒。食一切藥毒。及墜墮打撲  
 傷損疼痛。或久新風眩頭疼。中風偏枯。破傷風。洗頭風。風癩病。或婦人產  
 後諸疾。小兒驚風。積熱。瘡瘍。疹痘。諸證。無問日數。但服之。周身中外氣血  
 宣通。病皆除愈。是。以。以。通。聖。散。如。大。水。散。各。一。半。防。風。川。芎。當。歸。  
 切。切。芍。藥。薄。荷。葉。淨。大。黃。麻。黃。土。林。石。節。連。翹。芒。消。別。切。  
 各。半。兩。石。膏。別。切。桂。枝。各。一。兩。滑。石。十。五。兩。別。切。白。木。山。梔。  
 子。荆。芥。穗。甘。草。四。兩。別。切。黃。芩。各。一。分。右。為。末。每。服。用。五。六  
 錢。水。一。大。盞。半。入。蔥。白。五。五。盞。豉。五。十。粒。生。薑。三。片。煎。至。一。盞。濾。汁。去。滓。

永樂大典卷三千六百十五

九

溫服無時。日三四服。以効為度。常服三錢。水一中盞。煎六分。絞汁。溫服。不  
 拘時。晝夜四服。設愈後。更宜常服。使病不再作。新病不生。並無過竟。無  
 問歲數。乃平人常服之仙藥也。凡人已衰老。則腎水真陰損虛。即風熱燥  
 鬱。精血凋竭。枯燥而死。但宜此藥。扶補滋潤者也。嗟夫。世俗反以妄傳  
 中平已上。火氣漸衰。止是虛冷。更無熱病。誤服熱毒之劑。害人無數。豈知  
 識病之法。全憑脈證。以別寒熱。陰陽虛實。豈可以中平上下。而別邪。此藥  
 除孕婦及產後月事。經水過多。并泄瀉者。不宜服。或治雜病。亦宜治風熱。  
 極妙。一名通氣防風散。一名通解散。張子知治法。心要。論雙解散。對守氣  
 製雙解散。益元散。各七八錢。又生薑。蔥白。同煎。解傷寒。三二日間。以其傷  
 寒初覺。亦傷寒起。傷寒疑似之間。解表則恐傷於內。攻裏則恐傷於外。故  
 製雙解散。表裏齊見。俱解。甚為得法。然有不解者。猶未盡善也。子和增作吐  
 法。亦同上藥一梳。先服一半。探引吐出。風痰。次服一半。仍用酸棗湯投之。  
 使近衣被。蓋汗。則十解八九。此法于和得之。規。非。準。繩。之。外。世。所。未  
 知也。世人止知桂枝湯。麻黃湯。能汗。獨不知涼藥之能汗。又盡善也。熱藥  
 汗。或不發。反益其病。涼藥。於之。百無損矣。素問曰。辛甘發散。為傷。白粥配  
 蔥。食之。便能發汗。益元加薄荷。亦然。承氣。用生薑。棗。以其辛甘發散之意。

劉守真雙解。予和漢馬吐法。豈非涼藥亦能發汗。雲岐子保命集。太陽  
標病。身熱頭痛。項背強。身疼惡風。是寒則傷榮。脉浮而緊。表實無汗而喘  
者。宜麻黃湯。太陽尺寸脉俱浮。脉從標本。桂枝主衛而在表。故風則傷衛  
衛者氣也。氣從於表。太陽行身之後。故先用桂枝。寒則傷榮。榮者血也。血  
為有形之說。血近於經。經有始終。榮衛皆周不息。豈有止也。寒邪傷榮。脉  
浮而緊。身熱惡寒。頭項痛而無汗。故終始者為經。以身熱者為表。以浮者  
為標。故太陽病先桂枝。次麻黃。麻黃為瀉表之實。手憲德生堂經驗方  
云。麻黃湯夏月加黃芩。升麻。紫胡煎。簡室寶鑑脉經曰。寸口脉緊。苦頭  
痛。宜麻黃湯。針眉衝顙頰。

麻黃湯方

麻黃 三兩。味甘溫。去節  
桂枝 二兩。去皮。味辛熱  
甘草 一兩。炙。味甘平  
杏仁 七十箇。湯去皮。炙。味辛溫  
內經曰。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。麻黃。甘草。開肌發汗。桂枝。杏  
仁。散寒下氣。

右四味以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去  
滓。溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法。特息。王焘外臺秘

永樂大典卷三千六百五

十

要方忘海。蔞菴生憲。按張仲景傷寒論云。麻黃湯惟主傷寒。不  
主中風。若中風。但可服前桂枝湯。

太陽與陽明合病。喘而胃滿者不可下。宜麻黃湯主之。成無已註。陽受氣  
於胃中。喘而胃滿者。陽氣不宣發壅而逆也。心下滿。腹滿。皆為實。當下之。  
此以為胃滿非裏實。故不可下。雖有陽明。然與太陽合病。為屬表。是與麻  
黃湯發汗。許叔微普濟本事方。治太陽陽明合病麻黃湯。有人病傷寒  
脉浮而長。喘而胃滿。身熱頭痛。腰脊強。身乾不得眠。予曰。太陽陽明合病  
證。仲景法中有三證。下利者葛根湯。不下利嘔逆者如半夏。喘而胃滿者。  
麻黃湯也。治以麻黃得解。有人問傷寒傳入之序。自太陽。陽明。少陽。太陰。  
少陰。厥陰所傳有次第何哉。予曰。仲景本論無說。古今亦無言者。惟龐安  
常謂陽主生。故太陽水傳足陽明土。土傳足少陽木。為微邪。陰主殺。故足  
少陽木傳足太陰土。土傳足少陰水。水傳足厥陰木。為微邪。予以為不然。  
足少陰水傳厥陰木。安得為微邪。蓋邪強傳會失之穿鑿。胡不觀素問陰  
陽雜合論云。太陽振起於巨陰。名曰陰中之陽。陽明振起於厥陰。名曰陰  
中之陽。少陽振起於厥陰。名曰陰中之少陽。太陰振起於隱白。名曰陰中  
之少陰。少陰振起於清溪。名曰陰中之少陰。厥陰振起於大敦。名曰陰中

永樂大典

卷三六一五

之純陰。故其次序正與此合。大抵傷寒始自中風寒。得之於陰。是以止傳足經者。皆陰中之陽。陰中之陰也。不特此也。以六氣在天者考之。厥陰為初之氣。少陰為二之氣。太陰為三之氣。少陽為四之氣。陽明為五之氣。太陽為終之氣。此順也。逆而言之。太陽而後陽明。陽明而後少陽。少陽而後太陰。太陰而後少陰。少陰而後厥陰。傷寒為病逆而非順。故以是為序也。雲岐子保命集。太陽標病頭痛身熱。合陽明標發熱不惡風。而反惡熱。脈浮而長。高而實。滿不可下。當從脈浮而治。以麻黃湯解表。從太陽也。太陽病十日以去。脈浮細而嗜卧者。外已解也。誤胃滿。胸痛者。與小柴胡湯。脈但浮者。與麻黃湯。成無已註。十日以去。而解之時也。脈浮細而嗜卧者。表邪已罷也。病解已和解之。若脈但浮而不細者。則邪氣但在表也。與麻黃湯發散之。龐安時傷寒總論云。病十日以上。脈浮細嗜卧者。為已安。似小柴胡和之。細而逆者。勿與。重吐于保命集。太陽病頭痛項背強。十餘日不解。脈浮而細。胃中滿。胸痛者。太陽少陽併病。與小柴胡湯。如脈浮而不細反緊者。宜麻黃湯。太陽中風。脈浮緊發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脈微弱。汗出惡風者。不可服。服之則厥逆筋惕肉瞤。此為逆也。大青龍湯主之。成無已註。此中風見寒脈也。浮則為風。風

永樂大典卷三六一五

十一

則傷衛。緊則為寒。寒則傷榮。榮衛俱病。故發熱惡寒。身疼痛也。風并於衛者。為榮弱衛強。寒并於榮者。為榮強衛弱。今風寒兩傷。則榮衛俱實。故不汗出而煩躁也。與大青龍湯發汗。以除榮衛風寒。若脈微弱汗出惡風者。為榮衛俱虛。反服大青龍湯。則必亡陽。故生飲逆。筋惕肉瞤。此治之逆也。朱肱傷寒活人書。問有發熱惡寒煩躁手足濕。而脈反浮緊者。有寒多熱少。不煩躁。手足微冷。而脈反浮緩。答曰。此石傷風見寒脈。傷寒見風脈也。蓋發熱惡風煩躁手足濕。為中風候。脈浮緊為傷寒候。是中風見寒脈也。寒多熱少不煩躁。手足微冷。為傷寒候。脈浮緩為中風候。是傷寒見風脈也。中風見寒脈。傷寒見風脈。宜服大青龍湯。蓋大青龍證。脈似桂枝反無汗。病似麻黃反煩躁是也。蘇州有汗。為桂枝證。脈不煩躁。為麻黃證。大青龍湯治病與麻黃湯證相犯。但病尤重。而又加煩躁者。用大青龍湯也。以其中風并傷寒俱盛。故大青龍湯添麻黃作六兩。又似合桂枝湯藥味在內。以石膏。所以為緊。此治榮衛俱病。若證不著。誤入大青龍湯。則發汗多傷人。以其有煩躁一證。故可用大青龍。大抵表外風者。為傷風。感寒冷者。為傷寒。或風則傷衛。寒則傷榮。桂枝主傷衛。麻黃主傷榮。大青龍主榮衛俱傷。故也。或傷衛者。病在皮膚之間也。以衛行脈外。為陽。主外皮膚之間

衛氣之道路故也。其病淺。寒傷榮者。氣中於肌肉也。以榮行於中。為陰主內。肌肉之間。榮氣之道路故也。其病深。所以桂枝與麻黃所施各異。或勿誤用。以有淺深之別。風寒之殊。大醫當宜審辨。大青龍也。宜慎用。仲景云。脈微弱。汗出惡風者。不可服青龍。服之則厥逆筋惕肉瞤。此逆也。類案云。凡發汗過多。筋惕肉瞤。振振搖動。或虛羸人。微汗止。便有此證。俱宜服真武湯以救之。羸甚者。去芍藥。或量多少。與之。惡熱者。去附子。餘依加減法。仲景製真武湯。若調理明者。無此證。許叔微傷寒九十論。大青龍湯證。一何保義。從太尉軍中得傷寒。脈浮濡而緊。予曰。苦頭痛發熱惡風無汗。則麻黃證也。加煩躁則大青龍證也。何曰。目今煩躁甚。予投以大青龍。三投而汗解。論曰。桂枝。麻黃。青龍。皆未證發汗藥。而桂枝治汗出惡風。麻黃治無汗惡寒。青龍治無汗而煩躁。三者皆欲微汗解。若汗多亡陽而虛。則煩躁而不待眠也。予知先傷寒。活人書括論。大青龍湯。大青龍證。脈似桂枝。反無汗。病似麻黃。反煩躁是也。脈弱者。汗為桂枝證。脈緊不煩躁。為麻黃證。大青龍湯治病。與麻黃湯證相似。但病尤重。而又加煩躁者。用大青龍湯也。以其中風并傷寒。故青龍湯添麻黃。又合以桂枝湯藥味。在內。更加石膏。所以為緊。此治榮衛俱病。若證不實。誤用大青龍湯。則

水藥大典卷三十一百五

發汗多傷人。以其有煩躁一證。故不用大青龍也。大抵感外風者。為傷風。感寒冷者。為傷寒。故風則傷衛。寒則傷榮。桂枝主傷衛。麻黃主傷榮。大青龍主榮衛俱傷也。風傷衛者。病在皮膚之間。也以衛行於外。而傷主外。皮膚之間。衛氣之道路故也。其病淺。寒傷榮者。寒氣中於肌肉也。以榮行於中。為陰主內。肌肉之間。榮氣之道路故也。其病深。所以桂枝與麻黃所施各異。或勿誤用。以有淺深之別。風寒之殊。大醫當宜審辨。大青龍也。宜慎用。仲景云。脈微弱。汗出惡風者。不可服青龍。服之則厥逆筋惕肉瞤。此為逆也。宜服真武湯。仲景特設此藥以救之。或無已傷寒。明理論。大青龍湯方。青龍東方甲乙木神也。應春而生。肝身發土之令。為數榮之主。萬物出甲開甲。則有兩岐。肝有兩葉。以應木葉。所以謂之青龍。以發散榮衛兩傷之邪。是應肝木之體。耳桂枝湯主中風。麻黃湯主傷寒。二者發散之純者也。及乎大青龍湯。則不然。雖為發汗之劑。而所主又不一。必也中風。脈浮緊。為中風。見寒脈。是風寒兩傷也。傷寒。脈浮緩。為傷寒。見風脈。是風寒兩傷也。風無寒。寒無風。乃大青龍湯專主之也。是在脈證。雖欲與桂枝湯解肌以祛風。而不能已其寒。則病不去。或欲以麻黃湯發汗以散寒。而不能去其風。則病仍在。茲仲景所以特處大青龍湯。以兩解之。麻黃味甘溫。

桂枝味辛熱。寒則傷榮。必以甘發之。風則傷衛。必以辛散之。此風寒兩傷。榮衛俱病。故以甘草相合。而為發散之劑。麻黃發汗。桂枝在麻黃。為君。桂枝為臣。以本實。故理宜。則以麻黃為主。是也。麻黃發汗。桂枝在麻黃。為君。桂枝為臣。味甘。味甘。平。杏仁。味甘。苦。甘。為助。佐麻黃。以發表。大棗。味甘。溫。主養味。辛。甘。相合。佐桂枝。以解肌。石膏。味甘。辛。微寒。風陽邪也。寒。陰邪也。風則傷陽。寒則傷陰。榮衛陰陽。為風寒兩傷。則非輕劑所能獨散也。必用輕重之劑。以同散之。乃得陰陽之邪俱已。榮衛之氣俱和。是以石膏為使。石膏為重劑。而又身連肌表者也。大青龍湯。發汗之重劑也。非桂枝湯之所同。用之稍過。則又有亡陽之失。經曰。若脈微弱。汗出惡風者。不可服。服之則厥。逆筋惕肉瞤。此為逆也。又曰。一服汗者。停後服。若復服。汗多亡陽。逆虛。惡風。煩躁。不得眠也。即此觀之。劑之輕重。可見矣。其用湯者。宜詳審之。又溫粉方。白朮。藜蘆。川芎。白芷。芍藥。右搗羅為細末。每末一兩。入米粉三兩。和令勻。粉撲周身。止汗。無藥本亦得。楊仁齋直指方云。傷風。見寒。脈。傷寒。是風。脈。為榮衛俱受邪。用大青龍湯。然大青龍不可輕用。須是風寒俱發。又加煩躁一證。方可與之。較易簡者。謂二證交攻。則桂枝麻黃湯兼用。尤為穩當。劉守真傷寒五格論。供中風寒頭項

永樂大典卷三千六百十五

痛。肢體疼。手足溫。為中風也。反無汗。惡寒。脈浮緊者。為傷寒也。或頭項痛。腰脊強。身體拘急。指末微厥。不自汗。為傷寒也。反煩躁。而脈緩者。為傷風也。風則傷衛。而寒則傷榮。為物必以陰求陽。陽求陰。陰陽相應。則為和平。故榮者陰氣也。寒加之。則傷耳。故又曰。寒傷血。血亦陰也。衛陽氣也。風亦陽也。故風加之。則傷耳。故曰。熱傷氣。氣為陽也。經言。陰寒主於閉藏。而陽熱主於開泄。故寒傷榮。則腠理閉。密。佛熱。內則躁熱。而無汗。故脈數浮而繁也。風傷衛。則腠理開。泄而自汗也。故脈浮而緩。以邪熱泄越。故脈不能實。陽明主於肌肉。故自汗多。而脈反遲也。熱乃陽中之至陽。故傷熱。蒸則大汗自出。病雖為熱。脈不能實。而虛弱也。然佛熱。否閉。無汗者。故當病也。其汗泄通泰。而亦病者。蓋春極則否也。大人氣和。而為汗。如天地氣和。而為雨。過多則滂。火不雨。則旱。有無多少。貴乎應時。與東方帝則災。害至矣。為事皆然。雲岐子保命集。傷寒六經以太陽為始。故背為外。腹為內。背主表。腹主裏。太陽行身之後。為諸陽之表。風寒中人。先傷於表。故外而之內。邪中衛者。桂枝。中榮者。麻黃。在肌者。葛根。在筋者。青龍。去葛根。而加石膏。便為大青龍。無水者。不用因水。而用之也。太陽經中風。頭項強。脈浮而繁。發熱。中風。脈當得緩。自汗出。今反浮緊。無汗。而煩躁。可解表。宜大青

永樂大典

龍濟 王好古醫量元氏云傷寒得傷風脈。傷風得傷寒脈。故仲景有大青龍之劑。及汗出過多。或不可服。有筋傷肉爛之證。許公學士得傳以此。則知麻黃桂枝不可輕用也。及洪川韓氏又有桂枝之戒。以其治亂貴賤之不同。芳草養壘之不等故耳。至於楊氏明理。特有互見脈體。非精於持診者。則未易能之。後之學者。妄所適從。故先師察古老人。博採衆方。別立一法。作十味大羌活湯。無問有汗無汗。中風中寒。悉皆治之。使喜溫者去五積之變熱。好涼者除雙解之變寒。雖市夫農子。用之而無失。自非聖賢之前身。豈能下筆。有此曾以耶。東垣先生云。治傷風得傷寒脈。傷寒得傷風脈。極與脈不同。故各半湯。桂枝二麻黃一湯。桂枝二越婢一湯。麻黃杏仁甘草石膏湯。大青龍湯。去桂。是海藏老餘證辨并藥。傷風脈緊。仲景大青龍湯主之。無汗惡風。仲景葛根湯主之。已上一二證。傷風得傷寒脈。傷寒得傷風脈。是也。易老斷為桂枝麻黃各半兩。

### 大青龍湯方

麻黃 六兩 去節 味甘 溫  
桂枝 二兩 去皮 味甘 熱  
甘草 二兩 炙 味甘 平  
杏仁 四十箇 去皮 炙 味甘 溫  
生薑 三兩 切 味辛 溫  
大棗 十二枚 擘 味甘 溫

本草大要卷三十六重五

十四

石膏 如鷄子大 碎 味甘 微寒

辛甘均為發散。然風宜辛散。寒宜甘發。辛甘相合。乃能發散榮衛之風寒。麻黃。甘草。石膏。杏仁。以發散榮中之寒。桂枝。薑。棗。以解除衛中之風。

右七味以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉粉之。一服汗者。停後服。汗多亡陽。遂虛。惡風。煩躁不得眠也。王焘外臺秘要方云。忌海藻。菘菜。生蔥等物。

傷寒脈浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯發之。或無已註。此傷寒見風脈也。傷寒者身疼。此以風勝。故身不疼。中風者身輕。此以無風。故乍有輕時。不久厥吐利。無少陰裏證者。為風寒外甚也。與大青龍湯以發散表中之風寒。龐安時傷寒總論云。少陰當言太陰。按太陰證內有脈浮。手足溫者。繫太陰。太陰當發黃。證屬青龍湯。似桂枝湯證。及無汗而脈緊。似麻黃證。反身不疼而脈浮緩。陳無擇三因方辨論曰。有汗不得服麻黃。無汗不得服桂枝。切忌不得誤。若寒證見風脈。却以麻黃桂枝各半湯。古人治傷風熱多寒少。惡風脈浮緊。無汗。用青龍湯。蓋先

永樂大典

卷三六一五

傷風而後傷寒。風淫而在而寒。脈已行。故有是病也。若先傷寒而後傷風。寒多熱少。不煩躁微厥。脈當浮緩弱而自汗。即傷寒先風脈。但青龍紫菀。不若各平湯平和無悔吝也。諸經皆微此。注嗜傷寒發明書經曰。傷寒。脈浮。腹身不疼。但重乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯主之。按此與前。藥不汗止。明確。或注今而論之。以前條。為傷風。見其脈。以此條。為傷寒。先風脈。同大青龍湯。為治。活人書中。注述之。然以上條。詳之。恐不可輕。或論大傳。俱前條。中風子。是傷寒。誤作中風耳。而此條。決非大青龍湯也。

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。林億等按。王云。證按。小青龍湯。大要治水。又按本草。芫花。下十二水。若水去。利則止也。又按千金。形腫者。應內麻黃。乃內杏仁者。以麻黃發其陽。故也。以此證之。豈非仲景意也。或無已註。若傷寒表不解。心下有水。飲則水寒相搏。肺寒氣逆。故乾嘔發熱。而欬。針經曰。形寒。飲冷。則傷肺。以其兩寒相感。中外皆傷。故氣逆而上行。此之謂也。與小青龍湯。發汗散水。水氣內漬。則所傳不一。故有或為之證。隨證增損。以斷化之。有劑局方。小青龍湯。治傷寒表不解。心下有水。乾嘔發熱。欬。微喘。又治溢飲。身體疼痛。及欬逆倚息。不得安卧。或因形寒。飲冷。內傷脾。

永樂大典卷三六一五

十五

經。咳嗽喘急。吐涎沫。註宜服之。或無已傷寒。明理論。小青龍湯方。青龍。象肝木之內岐。而土兩傷之疾。中風。見寒脈。傷寒。見風脈。則為榮衛之兩傷。故以青龍湯主之。傷寒表不解。則麻黃湯可以發。中風表不解。則桂枝可以散。惟其表且不解。而又加之。心下有水氣。則非麻黃湯所能發。桂枝湯所能散。乃須小青龍湯。始可祛除水實之邪。氣夏。麻黃味甘辛溫。為發散之主。表不解。應發散之。則以麻黃為君。桂味辛熱。甘草味甘平。甘草為陽。佐麻黃。表散之用。二者所以為臣。芍藥味酸微寒。五味子味酸溫。二者所以為佐者。寒飲傷肺。咳逆而喘。則肺氣逆。內經曰。肺欲收。急食酸以收之。故用芍藥五味子為佐。以收逆氣。乾薑味辛熱。細辛味辛熱。半夏味辛微溫。三者所以為使者。心下有水。津液不行。則腎氣燥。內經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。是以乾薑細辛半夏為使。以散寒水。運氣。寒水鬱。津液通行。汗出而解矣。心下有水氣。散行。則傳不一。故又增損之證。若渴者。去半夏。加栝蒌根。水畜則津液不行。氣燥而渴。半夏味辛溫。燥津液者也。去之。則津液易復。栝蒌根味苦微寒。潤枯燥者也。加之。則津液通行。是為渴所宜也。若微利去麻黃。加芫花。水氣下行。漬入腸間。則為利。下利者。不可吹其表。汗出必脹滿。麻黃為表散。非下利所宜。故去之。芫花味苦寒酸。

苦。為湯泄之劑。去利則止。是花下水。故加之。若噎者去麻黃加附子。經曰。水得寒氣。冷必相搏。其人即噎。又曰。病人有寒復發汗。胃中必吐。乾噎。為胃氣虛竭。麻黃發汗。非胃虛冷所宜。故去之。附子辛熱。熱則濕其氣。辛則散其寒。而噎者為實。而相佐之。是以祛散寒之氣。若小便不利。少腹滿。去麻黃加茯苓。水蓄在下。急不行。為小便不利。少腹滿。凡邪客於體者。在外者可汗之。在內者可下之。在上者可導之。在下者可泄之。水蓄下。急。泄泄可也。發汗則非所當。故去麻黃。而茯苓味甘淡。專行津液。內經曰。濕淫於內。以淡滲之。滲。漸行水。甘淡為所宜。故加茯苓。若喘者去麻黃加杏仁。喘為氣逆。麻黃發汗。去之則氣易順。杏仁味甘苦溫。加之以泄逆氣。金匱要略曰。其形腫者。故不內麻黃。乃內杏仁。以麻黃發其汗。故喘逆形腫。標本之疾。加減所同。蓋其類矣。十便良方。小青龙湯。若其狀酒漸。寒。但欲厚衣。近火。頭重時痛。鼻窒塞。濁涕如膿。痰動。汗出。亦或無汗。甚則戰慄。此由寒邪之氣。從外入中。或因飲冷。客於肺經。內外合邪。留於經絡。謂之感寒。寒從外至。則兩寸口脈俱緊。或寒從內起。其脈帶遲。惡寒無汗者。劉宗真傷寒直格云。小青龙湯治傷寒表未罷。心下水氣。水雖未罷。而已有熱入於裏。佛鬱於胃。則飲食水液不能傳化。宣行。蓄積不散。而為此。非裏熱大實。煩渴引飲過多。停積而為病者。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。水不浸潤。宜散。滋潤腸胃。藏府。故熱而渴。或噎。或喘。或小便不利。少腹滿。而喘也。水液不能宣行。則濕熱甚於腸胃。故或利也。此方主溫散其水。以潤腸胃。藏府之燥。以開發中外之停熱。結滯者也。雲岐子保命集。太陽經病。身熱頭痛。惡風。脈浮而滑。表不解。心下水氣。而嘔。或咳者。小青龙主之。心下水氣。加細辛乾薑辛而散水。五味子酸收而止渴。故宜小青龙湯。太陽經病。頭痛身熱。惡風。因飲水而欬者。邪在於表。因飲水而不消。形寒飲冷。則傷肺。故微喘。脈浮而緊。宜小青龙湯。太陽經病。頭痛項強。腰脊強。脈浮而緊。是傷寒也。法當解表。反飲冷水。內無邪熱。不能勝水。故停心下。乾嘔而欬。或渴。或噎。水停心下。或利。水氣逆上。或小便不利。膀胱受濕。或喘。傷肺。宜小青龙湯。凡病表裏傷寒。而口乾引飲。水氣在內。停而不散。外有表証未除。內有水者。小青龙湯主之。王好古醫壘元成論。小青龙湯。後人增損。為華蓋散。大青龙。去桂石膏。倍加杏仁治欬。又云。病溢飲者。當發其汗。小青龙湯主之。尚從善傷寒紀玄妙。用集論。小青龙湯。傷寒欬嗽。欬逆。倚息不得。此二證之外。加減者六。然治者四。其湯下後加減。以治變證者。又有四焉。此

水藥大典卷三十一百五

其

不飲而為此。非裏熱大實。煩渴引飲過多。停積而為病者。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。水不浸潤。宜散。滋潤腸胃。藏府。故熱而渴。或噎。或喘。或小便不利。少腹滿。而喘也。水液不能宣行。則濕熱甚於腸胃。故或利也。此方主溫散其水。以潤腸胃。藏府之燥。以開發中外之停熱。結滯者也。雲岐子保命集。太陽經病。身熱頭痛。惡風。脈浮而滑。表不解。心下水氣。而嘔。或咳者。小青龙主之。心下水氣。加細辛乾薑辛而散水。五味子酸收而止渴。故宜小青龙湯。太陽經病。頭痛身熱。惡風。因飲水而欬者。邪在於表。因飲水而不消。形寒飲冷。則傷肺。故微喘。脈浮而緊。宜小青龙湯。太陽經病。頭痛項強。腰脊強。脈浮而緊。是傷寒也。法當解表。反飲冷水。內無邪熱。不能勝水。故停心下。乾嘔而欬。或渴。或噎。水停心下。或利。水氣逆上。或小便不利。膀胱受濕。或喘。傷肺。宜小青龙湯。凡病表裏傷寒。而口乾引飲。水氣在內。停而不散。外有表証未除。內有水者。小青龙湯主之。王好古醫壘元成論。小青龙湯。後人增損。為華蓋散。大青龙。去桂石膏。倍加杏仁治欬。又云。病溢飲者。當發其汗。小青龙湯主之。尚從善傷寒紀玄妙。用集論。小青龙湯。傷寒欬嗽。欬逆。倚息不得。此二證之外。加減者六。然治者四。其湯下後加減。以治變證者。又有四焉。此

仲景治法。要明其理。不可不知。非特治傷寒而然。金匱治濕飲脾癰。婦人霍亂。唯逆吐涎沫者是也。信乎小青龍治咳嗽。曲盡其法矣。吳起傷寒指掌圖云。水為至陰。其性則寒。病有內熱。得水則消。燥之。若身熱內寒。得水則兩寒相搏。故水停心下。用小青龍湯。以乾薑。細辛。半夏之辛。行其水也。餘如茯苓等劑。取其能下蓄水。若水結在胃。但頭汗出。偏身無汗。是水飲不得外泄。用陷胃湯下之。少陰內寒。必當溫也。蘭室寶鑑胡氏云。凡傷寒水氣。皆因飲水過多所致。水停心下。氣上乘心。則為悸。為喘。結於胃。腸。則為結胸。冷氣相搏。則為噎。上迫於肺。則為欬。漬入腸中。則為下利。邪熱所薄。蓄於下焦。則為小便不利。少腹滿。或臌急。溢於皮膚。則為腫。舉類而索之。無所不得矣。大抵瘕水氣法。病在陽。則小青龍湯。病在陰。則玄武主之也。

### 小青龍湯方

麻黃 三兩。去節。味甘溫。  
芍藥 三兩。味酸微寒。  
五味子 半升。味酸溫。  
乾薑 三兩。味辛熱。  
甘草 二兩。炙。味甘平。  
細辛 三兩。味辛溫。  
桂枝 三兩。去皮。味辛熱。  
半夏 半升。湯洗。味辛微溫。

水藥大典卷三六十五

十七

寒邪在表。非甘草不能散之。麻黃桂枝甘草之辛甘。以發散表邪。水停心下而不行。則腎氣燥。內經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。乾薑細辛。半夏之辛。以行水氣而潤腎。欬逆而喘。則肺氣逆。內經曰。肺欲收。急食酸以收之。芍藥五味子之酸。以收逆氣而安時。

石八味以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。或無已。註加減法。若微利者。去麻黃。加羌活。如鷄子。熱令赤也。下利者。不可攻其表。汗出必脈滿。麻黃發其陽。水漬入胃。必作利。羌活下十二水。水去利則止。若渴者。去半夏。加栝蒌根三兩。辛燥而苦潤。半夏辛而燥。津液非渴者所宜。故去之。栝蒌味苦而生津液。故加之。若噎者。去麻黃。加附子一枚。炮。經曰。水得寒氣。冷必相搏。其人即噎。加附子溫散水寒。病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蛇。去麻黃。惡發汗。若小便不利。少腹滿。去麻黃。加茯苓四兩。水畜下焦不行。為小便不利。少腹滿。麻黃發津液於外。非所宜也。茯苓泄蓄水於下。加所當也。若喘者。去麻黃。加杏仁半升。去皮。炙。金匱要畧曰。其人形腫。故不內。麻黃內杏仁。以麻黃發其陽。故也。喘。吁。形腫。水氣。標本之疾。麻安時傷寒總病論云。如無羌活。以桃花一鴨子。大不炒代之。

傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已渴者。此寒去欲解也。小青龍湯主之。或無已註。欬而微喘者。水寒射肺也。發熱不渴者。表證未罷也。與小青龍湯發水散水。服湯已渴者。裏氣溫。水氣散。為欲解也。太陽病外證未解。脈浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。或無已註。脈浮弱者。榮衛銜強也。重以于保命集。太陽經病。外證未解。脈浮弱者。浮者為陽。弱者為陰。法當自汗。故宜桂枝湯。太陽病下之微喘者。表未解故也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。或無已註。下後大喘。則為裏氣大虛。邪氣傳裏。正氣將脫也。下後微喘。則為裏氣上逆。邪不能傳裏。猶在表也。與桂枝湯以解外。加厚朴杏仁以下逆氣。孫思邈千金翼方云。宜桂枝湯。一云麻黃湯。許叔微著濟本事方。戊申正月。有一武臣為寇所執。置舟中。艤板下。數日得脫。乘飢恣食。良久解衣。則虱次日遂作傷寒。自汗而脈不利。一醫作傷寒而下之。一醫作解衣中邪而汗之。雜治數日。漸覺昏困。上喘息高。醫者惶惶失措。予診之曰。太陽病下之。表未解微喘者。桂枝加厚朴杏仁湯。此仲景之法也。指今醫者急治藥。一吸喘定。再吸藥發微汗。至晚身涼而脈已和矣。醫曰。某平生不用仲景方。不知其神捷如是。予曰。仲景之法。豈誰後人也哉。人自寡學。無以發明耳。雲岐子保命集。太陽標中風。身熱頭痛。項強。惡

水藥大典卷三十六百五

十八

風。反下後。脈浮而弱。自汗而喘。肺主於氣。上逆而喘。因下動胃氣。加厚朴屬陽明。上氣而逆。屬肺加杏仁。故宜桂枝加厚朴杏仁湯。太陽病禁下下之後。身熱惡風。脈浮者。表未解。脈浮而微者。陰也。法微喘而為傷肺下之傷。宜桂枝湯厚朴杏仁湯。太陽病外證未解者。不可下也。下之為逆。欲解者。宜桂枝湯主之。或無已註。經曰。本於汗而復下之。為逆也。若先發汗。治不為逆。太陽病先發汗不解。而復下之。脈浮者不愈。浮為在外。而反下之。故令不愈。今脈浮。故知在外。當須解外則愈。宜桂枝湯主之。或無已註。經曰。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡湯仍在者。復與柴胡湯。此罪已下之。不為逆。則其類矣。太陽病。脈浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服藥已微除。其人發煩。日晡劇者。必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。或無已註。脈浮緊。無汗。發熱。身疼痛。太陽傷寒也。雖至八九日。而表証仍在。亦當發其汗。既服溫暎發散湯藥。雖未作大汗。亦微除也。煩者。身熱也。邪氣不為汗解。勢而變熱。蒸於經絡。發於肌表。故生熱煩。肘受血而能視。始者寒氣傷榮。寒既變熱。則血為熱持。於肌表。故日晡也。劇者熱甚於經。迫血妄行。而為衄。得衄則熱隨血散而解。陽氣重者。熱氣重也。與麻黃湯以解前太陽傷寒之邪也。龐安時

永樂大典

卷三六一五

傷寒總論云。脈浮緊無汗。服湯未中病。其人發煩目眩。喘者必短。小如而脈尚浮者宜麻黃湯。如後脈已微者不可再行也。凡脈浮自汗。服湯不中病。桂枝證尚在。必頭痛甚而致短。小如而脈尚浮者。再與桂枝湯。如後脈已微者不可再行也。索隱傷寒新書云。如血後有中。大汗而解者甚多。許叔微傷寒九十論。大汗如血證。至人秦氏子得傷寒。發熱身疼。骨節疼痛。惡風無汗。或者勸其不須服藥。待其自安。如是半月矣。而病不除。不得已而召醫。一醫至問其日數。又不審其脈與外證如何。但云已過期矣。不可汗不可下也。且與調其氣藥。與止其氣藥。末後召子。子診其脈浮滑而緊大。此麻黃湯證無可疑者。但恐當汗不汗。熱化為血。則必有衄血之證。言未已。藥已如血。余急以麻黃湯與之。犀角地黃湯繼之。血止而汗解。數日愈。論曰。仲景云。凡作湯藥。不可遲。晨夜覺病。須臾即宜便治。不尋早晚。則易愈矣。或稍遲。病即傳變。雖欲除治。必難為力。今之醫者。不完根源。執以死法。必汗之於四日之前。下之於四日之下。殊不知此大綱也。又云。病不服藥。猶待中醫。此為無醫而誤也。苟大小便不通。必待其自差者。蓋前後不得。必下并服。數日而死矣。又况結實。蓄血。發黃。發熱之類。未有方藥而愈者。知者知變。惑者執迷。以取禍也。須是隨病淺深。在表在

永樂大典卷三千六百五

九

裏。或陰或陽。早為治療。如極熱。惡寒。身大熱。素問曰。邪風之至。疾如風雨。故善治者治皮毛。其次治肌膚。其次治筋脈。其次治五臟。其次治六腑。治五臟者半死矣。扁鵲望春侯而走。其以此。靈岐子保命集。太陽標病頭痛惡寒。脈浮而緊。無汗身疼痛。八九日不解者。未經發汗。微發其汗。小除其煩。日暎劇者。邪氣循經上攻。頭者諸陽之會。必作如也。陽氣重故耳。宜麻黃湯。太陽標病身熱惡寒。脈浮而緊。無汗身疼痛。表實榮氣不得泄。煩躁必如。宜麻黃湯。當汗不汗則如也。太陽病脈浮緊。發熱身無汗。自如者愈。或無已註。風寒在經。不得汗解。鬱而變熱。如則熱隨血散。故云自如者愈。二陽併病。太陽初得病時發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之為逆。如此可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。若發汗不徹。不足言。陽氣怫鬱不得越。當汗不汗。其人躁煩。不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得。其人短氣。但坐以汗出不徹故也。更發汗則愈。何以知汗出不徹。以脈濇故知也。或無已註。太陽病未解。併入陽明。而太陽證未罷者。名曰併病。續自微汗出。不惡寒者。為太陽證罷。陽明證具也。法當下之。若太陽證未罷者。為未解。則不可下。當小發其汗。先解表也。陽明之經。循面色

緣緣正赤者。陽氣怫鬱在表也。當解之。以取其汗。若發汗不徹者。不足言。陽氣怫鬱。止是當汗不汗。陽氣不得越散。邪無從出。權甚於經。故雖煩也。邪循經行。則病無常處。或在腹中。或在四肢。按之不可得。而短氣。但貴以汗出不徹。更發汗則愈。內經曰。諸過者切之。滑者陽氣有餘。為身熱。無汗。是以脉滑。知陽氣擁鬱。而汗出不徹。龐安時傷寒總論云。二陽併病。太陽初得時。發其汗。汗先出後不徹。因轉屬陽明。自微汗不惡寒。若太陽證不罷。不可下。下之為逆。如此者。可小發其汗。設面色正赤者。陽氣怫鬱在表。當解之。蒸之。若汗出不徹。當短息不足言。陽氣怫鬱不得越。當汗出而不汗。其人短氣。但坐。以汗出不徹故也。宜麻黃湯更發其汗。即愈。何以知其汗不徹。其脉澀故知也。古今本手多差誤。以從來所見病人證候。中符合如此。故改正。素問傷寒新書云。併病者。一經病未已。又一經病是也。併病兩經。或三經。亦合病也。楊仁齋直指方。若太陽證尚在。桂枝麻黃各半湯。若太陽證已退。但有陽明者。大承氣湯下之。雲岐子保命集。太陽經病。頭痛項強。身熱不罷者。不可下。是禁也。下之為逆。醫以小發其汗。邪氣不越。則面色正赤。陽氣怫鬱而不得越也。蓋當汗而不汗也。故其人躁煩者。邪氣不能散也。行於經中。乍在四肢。乍在腹中。按之不能得

永樂大典卷三千六百五

二十

經一兩次。汗解邪氣不除。則致病人短氣。但坐者。虛也。故汗出不徹。脉浮而濡。故知之。更發汗則愈。脉浮數者。法當汗出而愈。若下之。身重心悸者。不可發汗。當自汗出乃解。所以然者。尺中脉微。此裏虛。須裏實。津液自和。便自汗出愈。或無已註。經曰。諸脉浮數。當發熱而洒淅惡寒。言邪氣在表也。是當汗出愈。若下之。身重心悸者。損其津液。虛其胃氣。若身重心悸。而尺脉實者。則下後裏虛。邪氣乘虛傳裏也。今尺脉微。身重心悸者。知下後裏虛。津液不足。邪氣不傳裏。但在表也。然以津液不足。則不可發汗。須裏氣實。津液足。便自汗出而愈。脉浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。何以知之。然以榮氣不足。血少故也。或無已註。針經曰。身重者。無汗。尺脉遲者。為榮血不足。故不可發汗。龐安時傷寒總論論。言陽明病脉遲。汗出多微。惡寒宜桂枝湯。不責榮不足。蓋以脉長大而遲也。此必軟緊而遲。不可汗。宜小建中湯。又云。凡脉緊病必無汗。惟濡而緊病必自汗。勿誤行桂枝。宜建中湯也。諸脉動數。微弱。不可發汗。宜建中湯。若煩躁者。宜竹葉湯。許叔微普濟本事方。昔有鄉人立生者。病傷寒。予為診視。發熱頭疼煩渴。脉浮數而無力。尺以下透而轉。予曰。雖麻黃證。而尺透轉。竹葉云。尺中透者。榮氣不足。血氣微少。未可發汗。予於建

中湯加當歸。黃者。今飲。翌日脉尚爾。其家煎迫日夜皆發汗藥。言與不遇  
夫。予思之。但只用是中調榮而已。至五日尺部方度。遂投麻黃湯。喉第  
風發狂。須臾稍定。暮睡已中汗矣。信知此事。是雖是難。仲景雖云不避  
夜。即宜便治。醫者亦須顧其未衰虛實。待其時日。若不備次第。暫時得  
胸積五藏。以促壽限。何足貴也。南史記范雲。初為陳武帝屬官。武帝有九  
錫之命。存且夕矣。雲忽感傷寒之疾。恐不得預慶事。召徐文伯診視。以實  
懸之曰。可使得愈乎。文伯曰。便差甚易。只恐二年後不復起耳。雲曰。朝聞  
道夕死猶可。况二年乎。文伯以火燒地。布桃葉設席。置雲於上。頃刻汗解  
裏以濕粉。翌日愈。雲甚喜。文伯曰。不足喜也。後二年果卒。夫取汗先期。尚  
促壽限。况不顧未衰。不待時日。使欲速劫乎。每見病家不耐病。三四日  
夜促汗。醫者隨情順意。鮮不敗事。故予言此。為醫者之戒。潘思敬加減  
藥錄集云。假令尺中逆者。不可發汗。榮氣不足血少故也。宜小柴胡湯。脉  
浮者病在表。可發汗。宜麻黃湯。或無已註。浮為輕。予得之。以候皮膚之氣。  
內經曰。其在皮者。汗而發之。脉浮而數者。可發汗。宜麻黃湯。或無已註。浮  
則傷衛。數則傷榮。榮衛受邪。為病在表。故當汗散。王叔和脉經云。太陽  
病脉浮而數者。可發其汗。屬桂枝湯證。病常自汗出者。此為榮氣和。榮氣

永樂大典卷三千六百五十五

和者外不諧。以衛氣不共榮氣和諧故爾。以榮行脉中。衛行脉外。復發其  
汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。或無已註。風則傷衛。寒則傷榮。衛受風邪而榮  
不病者。為榮氣和也。衛既受邪。則不能與榮氣和諧。亦不能衛護皮膚。是  
以常自汗出。與桂枝湯解散風邪。調和榮衛則愈。雲岐子保命集。太陽  
中風。脉浮而緩。今反浮而濡者。因小發汗。脉濡而榮者。身必疼痛。當大發  
汗。如尺中弱。者不可發汗。尺者陰也。弱者陰虛也。陰主血虛。則尺虛不能  
作汗。故知榮也。病常自汗出。榮氣和也。不解者。衛氣不與榮氣和也。脉若  
榮衛之中。榮衛不和。脉平。榮衛不和。則脉病。當和榮衛。使脉得平。宜桂枝  
湯。病人藏無他病。時發熱自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗  
則愈。宜桂枝湯主之。或無已註。藏無他病。裏和也。衛氣不和。表病也。外臺  
云。裏和表病。汗之則愈。所謂先其時者。先其發熱汗出之時發汗則愈。  
雲岐子保命集。太陽病身熱惡寒。惡風。脉浮而弱。自汗出而不止。榮衛不  
和也。宜桂枝湯。傷寒脉浮緊。不發汗。因致衄者。麻黃湯主之。或無已註。傷  
寒脉浮緊。邪在表也。當與麻黃湯發汗。若不發汗。則邪無從出。雖甚於衄。  
迫血妄行。自致衄也。傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小使  
清者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。若頭痛者。必衄。宜桂枝湯。或無已註。

不大便六七日。頭痛有熱者。故宜當下。若小便清者。知裏無熱。則不可下。經曰。小便數者。大便必數。不更衣十日。無所苦也。况此不大便六七日。小便清者。不可責邪在裏。是仍在表也。與桂枝湯以解外。若頭疼不已。為表不罷。鬱甚於經。迫血妄行。止為如也。雲岐子保命集。太陽病脈浮而弱。身熱。小便清。知不在裏。太陽本不病。邪在標。宜桂枝湯。太陽病。若頭痛者。必切。乃邪無從出也。宜桂枝湯。傷寒發汗解半日許。復煩。脈浮數者。可更發汗。宜桂枝湯。主之。或無已註。煩者。熱也。發汗身涼。為已解。至半日許。身復熱。脈浮數者。邪不盡也。可更發汗。與桂枝湯。凡病若發汗。若吐。若下。若亡津液。陰陽自和者。必自愈。或無已註。重亡津液。則不能作汗。必待陰陽自和。乃自愈矣。大下之後。復發汗。小便不利者。亡津液故也。勿治之。得小便利。必自愈。或無已註。因亡津液。而小便不利者。不可以藥利之。俟津液足。小便利。必自愈也。下之後。復發汗。必振寒。脈微細。所以然者。以內外俱虛故也。或無已註。發汗則未虛。而亡陽下之。則裏虛。而亡血。振寒者。陽氣微也。脈微細者。陰血弱也。下之後。復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔。不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯主之。或無已註。下之虛其裏。汗之虛其表。既下又汗。則表裏俱虛。傷至於甚。陽氣後虛。虛不勝邪。

承氣大與卷三千六百十五

二十三

正邪交爭。故晝日煩躁不得眠。夜陰生。陽虛不能與之爭。是夜則安靜。不嘔。不渴者。裏無熱也。身無大熱者。表無熱也。又無表證。而脈沉微。知陽氣大虛。陰寒氣勝。與乾薑附子湯。退陰復陽。施虛續易簡方。論薑附湯。今本顯載於局方。附子皆云生用。斷斷不易。凡世之侍傍聖教。膚淺稱醫者。視為日用常行。何煩與志。寧亦各不習過目。一訣一線。悉云熟用。然生之與熟。大相遠絕。利害所關。是不學之誤一也。其方仲景二出。用乾薑一兩。附子一枚。生去皮臍。然附子較重一兩。去皮臍已不重分。况有不重一兩者乎。兼其方載乾薑既為主治之君。在附子之上。已知其不責附子之等分也。顧不獨不載生用。却載二味各一兩。是不學之誤二也。本方只主治傷寒經汗下已之後。晝日煩躁不得眠。煩者。煩落不得眠。三子。志寧不與增湯。夜而安靜。不嘔。不渴。表證已無。脈沉微。慮變為陰極之證。故處乾薑引其陽行其脈。生附逆其元傷之寒邪。顧指炮熟為用。邪可去乎。是不學之誤三也。顧至於本方服餌法。復引仲景分脈為證。復反不遵仲景本法。云脈候沉微。却云六脈沉伏。脈候之微。骨不足。舉之無有。微脈極細而數。于下若有若無。主和分別。二脈者。正以各有主病。今指微為伏。是不學之誤。

# 永樂大典

## 卷三六一五

四也。又云易熱附為生。名曰通湯。治傷寒下利。是不等之大誤五也。藕餅傷寒下利。仲景立二十四法。未詳分為二十五條。各隨其無見之證。各著其對病之方。有與續命湯者。有與生薑瀉心湯者。有與續命湯者。有與甘草瀉心湯者。有與大柴胡湯者。有與四逆湯者。有與當歸四逆湯者。有與通脈四逆湯。桃花湯。真武湯。白頭翁湯。梔子豉湯。小青龍加芫花湯。五苓散。桂枝人參湯。十棗湯。葛根黃芩湯。赤石脂禹餘糧湯。大承氣等湯之不一。惟有少陰病下利。脈微一證。始屬白通湯耳。顧但欲合易簡之名。不分脈證。只以傷寒下利四字總包之。白通湯一藥總治之。只此誤自有一十九條。非獨五也。不知自慶元丙辰。王淳祐年。五九有易簡撰其病。委其有投其藥。變壞時殺數人。志寧不與增修。後從其誤。使人重信。則必自淳祐年。五傳十。信五。寢寢不已。又復假人無已。時矣。痛哉。痛哉。更詳陳之。庶發其味。仲景一百一十三方。用附子者二十一。熱用者十有三。必佐麻黃。桂枝。大黃。黃連。黃芩。細辛。葶生用者八。薑附湯。四逆湯。白通湯。白道加豬膽汁湯。通脈四逆湯。四逆加豬膽汁湯。四逆人參湯。茯苓四逆湯是也。必方方皆用乾薑為主。未聞用熟附。依乾薑也。學不遺此。則將何以語湯劑。庶民瘼耶。雲岐子保命集。少陰本病論。少陰脈尺寸俱沉。標本俱陰。其經

永樂大典卷三千六百十五

二十三

始於足心。循腹上行。繫舌本。貫腎絡肺。故口燥舌乾而渴。為經病也。身寒自汗。四肢懈。小便清。腹滿。惡寒。脈沉而微。此少陰本病也。當溫之。宜附子。單治少陰。乃以熱治寒。皆少陰本藥也。上好古陰證。舉例云。若自汗者。木附湯。若無汗者。薑附湯。手仲南水類。鈴方。薑附湯。治傷寒自利。六脈沉伏。手足厥冷。

### 乾薑附子湯

乾薑 一兩 味辛熱

附子 一枚 生用 去皮 破 八片 味辛熱

內經曰。寒淫所勝。平以辛熱。虛寒太甚。是以辛熱劑勝之也。

右二味以水三升。煮取一升。去滓頓服。龐安時傷寒總病論云。不可作糞散。

發汗後身疼痛。脈沉遲者。桂枝加芍藥生薑各一兩。人參三兩。新加湯主之。或無已。汗後身疼痛。邪氣未盡也。脈沉遲。榮血不足也。經曰。其脈沉者。榮氣微也。又曰。遲者。榮氣不足。血少故也。與桂枝湯以解未盡之邪。加芍藥。生薑。人參。以益不足之血。朱佐傷寒活人書。又問發汗後身疼痛。脈沉而遲。常用何藥。答曰。仲景有桂枝加芍藥。生薑。人參。新加湯。蓋為此證也。小建中湯。無治汗後身痛。脈沉而遲者。若霍亂吐瀉止而身疼痛不

休者。少與桂枝湯即愈。發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之。或無已汗。發汗後喘。當作桂枝加厚朴杏仁湯。汗出則喘愈。今汗出而喘。為邪氣擁遏。桂枝湯不能發散。故不可更行桂枝湯。汗出而喘。有大熱者。內熱氣甚也。無大熱者。未邪必甚也。與麻黃杏仁甘草石膏湯。以散其邪。雲岐子保命集。太陽標病。脈浮緊而頭痛。色發其汗。雖漏不止。不可行桂枝。自汗而喘。邪在上焦。而無大熱者。未傳入裏也。宜麻黃杏仁甘草石膏湯。石膏之氣清。治太陽頭痛。甘緩其胃。杏仁治上焦之喘。非麻黃發汗之治也。

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃四兩。去節。味甘溫。

杏仁五十箇。去皮尖。味甘溫。

甘草二兩。味甘平。

石膏半斤。碎。綿裹。味甘寒。

內經曰。肝者。息。息。食甘以緩之。風氣通於肝。風邪外甚。故以純甘之劑發之。

右四味以水七升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。

溫服一升。

發汗過多。其人又手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之。或無已。

永樂大典卷三千六百十五

二十四

桂。發汗過多。亡陽也。陽受氣於背。背中心陽氣不足。故病又手自冒心。心下悸。欲得按者。與桂枝甘草湯。以調不足之氣。許叔微傷寒九十論。又手自冒心。證。乙巳六月。吉水一商。譚姓。寓城南。得傷寒八九日。心下悸。惕然。以兩手捫心。身體振振動。桂。醫者以為心下痛。治之不效。予曰。此汗過多之所致也。仲景云。未持脈時。病人又手自冒心。心下悸。所以然者。以裏發汗。虛故如此。又云。發汗過多。其人又手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯證。予投以黃耆建中。真武。及甘草桂枝。漸得平復。雲岐子保命集。太陽病。身熱頭痛。脈浮而緊。無汗。醫發汗過多。其人又手自冒心。心下悸。欲得按者。因發汗多。虛故也。宜桂枝加甘草湯。甘以緩之也。

桂枝甘草湯方

桂枝四兩。去皮。味辛熱。

甘草二兩。味甘平。

桂枝之辛。走肺而益氣。甘草之甘。入脾而緩中。

右二味以水三升。煮取一升。去滓分服。

發汗後。其人臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。或無已語。汗者。心之液。發汗後。臍下悸者。心氣虛而腎氣發動也。腎之積名曰奔豚。發則從少腹上至心下。為腎氣逆欲上凌心。今臍下悸。為腎氣發動。故云。

作奔豚。與茯苓桂枝甘草大棗湯。以降腎氣。雲岐子保命集。太陽病發汗後未解。其人臍下悸者。邪氣內結。欲作奔豚。當散之。宜茯苓桂枝甘草大棗湯。

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半斤。味甘平

甘草 二兩。炙。味甘平

大棗 十五枚。擘。味甘平

桂枝 四兩。去皮

茯苓以伐腎邪。桂枝能泄奔豚。甘草大棗之甘。補助脾土。以平腎氣。煎用甘爛水者。揚之無力。取不助腎氣也。

右四味以甘爛水一斗。先煮茯苓減二升。內諸藥煮取三升。去滓溫服一升。日三服。作甘爛水法。取水二斗置大盆內。以杓揚之。水上有珠子五六千顆相逐。取用之。李知先傷寒活人書括云。一名勞水。蓋水性本鹹。勞之則甘也。李仲南永類鈴方云。七味蔥白湯用勞水者。同此義也。

發汗後腹脹滿者。厚朴生薑甘草半夏人參湯主之。或無已語吐後腹脹。與下後腹滿皆為實。言邪氣乘虛入裏為實。發汗後外已解也。腹脹滿。知非裏實。由脾胃津液不足。氣滯不通。壅而為滿。與此湯和脾胃而降氣。

永樂大典卷三千六百十五

二十五

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴 半斤。去粗皮。味苦溫

生薑 半斤。切。味辛溫

半夏 半升。洗。味辛平

人參 一兩。味甘溫

甘草 二兩。炙。味甘平

內經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。用苦泄之。厚朴之苦。以泄腹滿。人參甘草之甘。以益脾胃。半夏生薑之辛。以散滯氣。

右五味以水一斗。煮取三升。去滓溫服一升。日三服。太平聖惠方云。厚朴用生薑汁炙令香熟。

傷寒若吐若下後心下逆滿。氣上衝胃。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動經。身為振振搖者。茯苓桂枝白朮甘草湯主之。或無已語。吐下後裏虛。氣上逆者。心下逆滿。氣上衝胃。表虛陽不足。起則頭眩。脈浮緊。為邪在表。當發汗。脈沉緊。為邪在裏。則不可發汗。發汗則外動經絡。損傷陽氣。陽氣外虛。則不能主持諸脈。身為振振搖也。與此湯以和經益陽。雲岐子保命集。太陽經傷寒若吐邪在上焦。若下邪在裏也。吐下後不愈。非其治也。心下逆滿者。下之過也。氣上衝胃起。則頭眩者。吐之過也。脈沉緊者。發汗動經。浮緊當汗。沉緊不當汗。故汗則動經。身為振振。宜茯苓桂枝白朮甘草湯。王好古醫

聖元戎云。心下瘦飲胃腸支滿。日恒當以桂枝茯苓甘草白朮湯主之。小便則利。氣短有微飲。當從小便去也。亦以上藥主之。腎氣丸亦主之。

### 茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓四兩。味甘平。

桂枝三兩。去皮。味辛熱。

白朮二兩。味苦甘溫。

甘草二兩。炙。味甘平。

傷不足者。補之以甘。茯苓白朮生津液而益陽也。氣逆者。散之以辛。桂枝甘草行陽散氣。

右四味以水六升。煮取三升。去滓分溫三服。

發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。或無已。發汗病解。則不惡寒。發汗病不解。表實者。亦不惡寒。今發汗病且不解。又反惡寒者。榮衛俱虛也。汗出則榮虛。惡寒則衛虛。與芍藥甘草附子湯。以補榮衛。宜以子保命集。發汗病不解。反惡寒者。虛故也。小便清。大便依度。腹痛者。皆宜芍藥甘草附子湯。

### 芍藥甘草附子湯方

芍藥三兩。味酸微寒。

甘草三兩。炙。味甘平。

附子一枚。炮。去皮。破八片。味辛熱。

永樂大典卷三千六百十五

二十六

芍藥之酸。故飲津液而益榮。附子之辛溫。則陽氣而補胃。甘草之甘。調和辛酸而安正氣。

右三味以水五升。煮取一升五合。去滓分溫服。疑非仲景意。

發汗若下之。病仍不解。煩躁者。茯苓四逆湯主之。或無已。汗發若下。病宜解也。若病仍不解。則發汗外虛陽氣。下之內虛陰氣。陰陽俱虛。邪猶不解。故生煩躁。與茯苓四逆湯。以復陰陽之氣。索疇傷寒新書云。病經汗下。有虛有實。尚從善傷寒起玄妙用集云。四逆湯以補陽。加茯苓。人參。以益陰。陰陽之氣既復。而煩之證解矣。

### 茯苓四逆湯方

茯苓六兩。味甘平。

人參一兩。味甘溫。

附子一枚。生用。去皮。破八片。味辛熱。

甘草二兩。炙。味甘平。

乾薑一兩。味辛熱。

四逆湯以補陽。加茯苓。人參。以益陰。

右五味以水五升。煮取三升。去滓溫服。七合。日三服。

發汗後。惡寒者。虛故也。不惡寒。但熱者。實也。當和胃氣。與調胃承氣湯。或無已。汗出而惡寒者。表虛也。汗出而不惡寒。但熱者。裏實也。經曰。汗出

永樂大典

卷三六一五

不思寒者此表解裏未和。與調胃承氣湯和胃氣。孫思邈千金翼方言  
 不思寒但熱者實也。當和其胃氣。宜小承氣湯。一云調胃承氣湯。索鉅  
 傷寒新書云。發汗後思寒者虛也。不思寒但熱者實也。此各一端耳。且發  
 汗後思寒有實。但熱有虛。如此則亦悟百病皆有虛實也。若流汗後思寒  
 止為虛。但熱止為實。始如按圖書驗耳。是止知其一。莫如其也。餘證微  
 此太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之  
 今胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之或無已語  
 發汗已解胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與之胃氣得潤則愈若脈  
 浮者表未解也。飲水多而小便少者謂之消渴。裏熱甚者也。微熱消渴者  
 熱未成實。上焦燥也。與五苓散生津液和表裏。乃侯述中濟意經驗單  
 方患傷寒人若發熱欲飲水者即須使與水飲。如是飲水過多結伏胃腸  
 當服五苓散。或陷胃元。或無已傷寒明理論五苓散方。苓。水。也。雖今之  
 今夫道行津液。利代腎邪。專為疏水之功也。五苓之中。茯苓為主。故  
 曰五苓散。茯苓味甘平。豬苓味甘平。甘。甘。也。熱。甘。淡。內。經。曰。味淡滲  
 泄為陽。利大便曰攻下。利小便曰滲泄。水飲內蓄。當須滲泄之。必以甘淡  
 為主。是以茯苓為君。豬苓為臣。白朮味甘溫。脾惡濕。水飲內蓄。則脾氣不

永樂大典卷三千六百十五

治。益脾勝濕。必以甘為助。故以白朮為佐。澤瀉味鹹寒。內經曰。鹹味下泄  
 為陰。泄飲導滲。必以鹹為助。故以澤瀉為使。桂味辛熱。腎惡燥。水蓄不行  
 則腎氣燥。內經曰。腎惡燥。惡食辛以潤之。散濕潤燥。可以桂枝為使。多飲  
 暖水。令汗出愈者。以辛散水氣外泄。是以汗潤而解也。施盧續醫簡方  
 論五苓散。孫奉主治陽明經傷寒發熱。渴欲飲水。小便不利。反主治少陰  
 病下利六七日。欬而嘔。渴。心煩不得眠。皆以猪苓湯。安云即五苓散去桂  
 加滑石。仲景即無陽明經傷寒發熱渴欲飲水之證。只有脈浮發熱。渴欲  
 飲水。小便不利者。猪苓湯。其脈浮者。乃太陽經傷寒。即非屬陽明經。此  
 出證誤。孫云猪苓湯。即五苓散去桂加滑石。合去桂并去白朮。不云去朮  
 只云去桂。合加滑石。阿膠。只加滑石。不加阿膠。誤。皆此甚。傷暑中者伏暑。  
 衛生家寶五苓散治傷寒汗後發渴。小便不利。若陽明汗多而渴者。不可  
 用宜竹葉湯。劉守真傷寒直格。五苓散治中者并傷寒。大發汗後胃中  
 乾煩躁不得眠。脈浮小便不利。微熱煩渴。及表裏俱熱。飲水反吐。石曰水  
 逆。或攻痞不解。或口乾煩渴。小便不利。或痞尚在。而利不止者。或當汗而  
 反下之。利遂不止。脈浮表不解。自利或小便不利者。凡用五苓散證。無問  
 脈之沉浮。或一切留飲不散。以此散水止渴。并解兩感。太陽少陽俱病。經

言六經病證者是也。或一切吐瀉霍亂無問寒熱及小兒瀉驚風無問急慢皆宜服之。雲岐子保命集太陽經病發汗後大汗出表解也。津液內空胃中乾燥而不得眠。故欲飲水。小便不通水無所歸也。宜五苓散。太陽證發於揉者汗而解之。發於裏者攻而利之。病在太陽渴而飲水者熱結膀胱也。膀胱者傳導津液之所故有熱則多渴而煩。小便不利宜五苓散是太陽入本藥也。五苓散太陽經藥。白虎湯陽明經藥。猪苓湯少陰經藥。王好古此事難知。論五苓散為下劑。五苓散太陽裏之下藥也。太陽高則汗而發之。下則引而竭之。渴者入太陽本也。當下之。使自膀胱中出也。大濕相合腎燥膀胱熱。小便不利。此藥主之。小便利不宜用。然太陽病熱而渴。小便難利亦宜五苓散下之。常服不服則生何證。答曰。當服而不服。較清水去必就陽明燥火。或胃發黃。故有調胃承氣湯證。此太陽入本夫下也。不當服服之則生何證。答曰。不當服服之是為犯本。小便強利。津液重亡。使陽之極則侵陰而成血證也。輕則桃仁承氣重則抵當。故五苓散調和陰陽者。乃太陽陽明之間。故為調和之劑。酒毒小便亦宜五苓散。若熱在中焦未入太陽之本。小便自利而清。是津液已行。若與五苓利之。是重潤腎水也。不惟重潤腎水。酒毒之熱亦不能去。故上下通瀉而發黃也。

水藥大典卷三十六百十五

二十八

也。若入血室則蓄血也。五苓散以瀉濕熱。假令太陽證傷寒自外入。標本有二說。以主言之。膀胱為本。經絡為標。以邪言之。先得者為本。後得者為標。此標先受之。即是本也。後入于膀胱。本却為標也。此乃客邪之標本也。治當從客之標本。若小腸火為本。若膀胱水為本。寒毒之氣從標入本。邪與子經相合。而下至膀胱。五苓主之。桂枝湯中之陽茯苓陽中之陰相引而下入于本。導出邪氣。而大子經小腸。自上之下。足經膀胱。自下之上。火邪之氣。從下之上。以內為本。水中有火。火為客氣。當再責其本。兩腎相通。又在下部。音在下焦。如瀆相大明矣。生地黄黃藥。邪從本受。下焦火邪遺於小腸。是熱在下焦。填塞不便。自內之外也。表之裏藥。桂枝澤瀉。猪苓茯苓。為陽中之陰。裏之表藥。生地黄黃連黃藥。為陰中之陽。治酒病宜發汗。若利小便。黃連不肯下行。故曰火鬱則發之。辛溫散之。是從其大體也。是知利小便則濕去熱不去。動大便尤為疎慢。大便者有形質之物。酒者無形之水。從汗而發之最為之近。是濕熱俱去。以辛溫發其大也。佐以香寒除其濕也。王好古醫壘元丸論五苓散。若胃弱小便少亦宜少減二苓。澤瀉加白朮桂。佐以生薑之類。若水停心下。煎生薑三錢或半兩。味濃調服五苓散。神三錢或半兩亦可。太陽標病傳入標之本。發渴瀉不利。

以此散導之。邪自膀胱而出也。若未渴。其用五苓散。反引邪氣入裏。而不能解也。故易老云。五苓散即太陽經之下藥也。若傷寒太陽眩暈而渴者。不宜用此。陽明證。復有仲景五苓散一條。甘露飲。枳朮湯。梅師方。以其消痞去水。故入陽明例。飲酒而泄瀉者。脾胃受濕也。何以知之。仲景厥而心下悸者。宜先治水。當服茯苓甘草湯。却治其厥。不爾。水漬入胃。必作利也。故飲而瀉者。五苓散。甘露飲。神効。飲酒若過度。必作利者。裏急後重者。濕熱之毒。浸漬腸胃也。當作別治。甘露飲。即五苓散。去豬苓。加石膏。寒水石。滑石。甘草是也。並用濃生薑湯調服。食前。其所加三石。臨時視病寒熱輕重多少。隨宜用之。假令病人臍下有悸者。吐涎沫而顛眩水也。五苓散主之。李仲南水類錄方云。五苓散。以吐清入脾。末于酒入胃。中着心。神恍惚。加辰砂。隔年者不可用。危亦林傳効方云。五苓散。治秋合涼。反注雨。冬發濕疫。李憲德生堂經驗方。五苓散。夏月加柴胡。麥門冬。云此藥汗之輕者。潘思敬加煨藥。搗集。五苓散。逆證。加煨。陽明證。去桂。發斑。加朱砂末。中酒。加乾葛。頭痛。加川芎。咳嗽。加五味子。心氣不足。加麥門冬。胃中嘔吐。加人參。去濕。加蒼朮。定喘。加馬兜鈴。痰多。加半夏。小便閉澀。加瞿麥。大小便不通。加黃連。腹中痛。加三稜。逆熱。加青皮。盜汗。

水藥大典卷三千六百十五

二十九

加麻黃根。蚶血。加烏藥。勞復。加桔梗。目赤。加芍藥。退腫。加茵陳。眼白肉赤。加石膏。止瀉。加陳皮。水腫。加葶藶。伏暑。加燈心。下部赤腫。加椒紅。眼黃。加前胡。又云。水無所歸。宜五苓散。求結心。下亦同。汪疇傷寒發明書云。子太陽小腸經。與子少陰心經。為表裏。以應土氣。則君火司氣。天之熱也。經曰。水流下而就濕。火炎上而就燥。故暑熱中人。則火之藏腑先受之者。病在子太陽少陰也。凡傷寒汗出不解。脈浮發熱。煩渴。小便不利者。子太陽經受病也。小腸者。受熱之腑。其經受病。宜疏利水道。以滲之。五苓散。豬苓湯。證是也。

五苓散方

豬苓 十八銖 味甘 平 去皮

茯苓 十八銖 味甘 平

白朮 十八銖 味甘 平

澤瀉 兩六銖 平 味酸 鹹

桂 半兩 去皮 味辛 熱

淡者一也。口八一而為甘。甘喜而反淡。甘緩而淡滲。豬苓。白朮。茯苓。三味之甘。潤虛燥而利津液。酸味下泄為陰。澤瀉之鹹。以泄伏水。平甘於散。馬陽。桂枝之辛甘。以和肌表。右五味為末。以白飲和服。方寸匕。日三服。多飲暖水。汗出愈。

發汗已。脈浮數煩渴者。五苓散主之。成無已註。發汗已。浮數者。表邪未盡也。煩渴。止津液胃燥也。與五苓散和表潤燥。傷寒汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。成無已註。傷寒汗出而渴者。止津液胃燥。邪氣漸傳裏也。五苓散以和表裏。若汗出不渴者。邪氣不傳裏。但在表而未虛也。與茯苓甘草湯和表合衛。

### 茯苓甘草湯方

茯苓 二兩。味甘平。

生薑 三兩。切。味辛溫。

桂枝 二兩。去皮。味辛熱。

甘草 一兩。炙。味甘平。

茯苓甘草之甘。益津而和衛。桂枝生薑之辛。助陽氣而解表。

右四味以水四升。煮取二升。去滓分溫三服。

中風發熱六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。成無已註。中風發熱。至六七日則當解。若不解煩者。邪在表也。渴欲飲水。邪傳裏也。裏熱甚則能消水。水入則不吐。裏熱少則不能消水。停積不散。飲而吐水也。以其因水而吐。故名水逆。與五苓散和表裏。散傳飲未持脈時。病人手又自冒心。師因教試令飲而不飲者。此必兩耳聾無聞也。所以然者。以重發汗虛故如此。成無已註。發汗多。亡陽。胃中陽氣

水藥大典卷三十六百十五

三十

不足者。病人手又自冒心。師見外證。知陽氣不足也。又試令飲而不即飲者。耳聾也。知陽氣虛明矣。耳聾者。陽氣虛。精氣不持。上通於耳故也。許叔微傷寒九十論。傷寒耳聾。證成中平。額試山陽。一時官病傷寒八九日。耳聾而無聞。有醫者作少陽治。意謂仲景稱少陽受病則胃脹痛而耳聾也。予診其脈。見兩手弱而無力。予曰。此非少陽。若以少陽則渴飲心煩。但寐咽痛。今俱無此證。但多汗驚悸。必汗過多之所致也。仲景云。未持脈時。今病人軟而不軟者。兩耳聾無所聞也。所以然者。以重發汗虛故如此。病家曰。醫者嘗多發汗。夫子授以真武白朮。附子湯。藥數日。耳聾。調治得愈。發汗後飲水多。必喘。以水灌之。亦喘。成無已註。喘。肺疾。飲水多喘者。飲冷傷肺也。以冷水灌洗而喘者。形寒傷肺也。發汗後水藥不得入口。為逆者。更發汗。必吐下不止。成無已註。發汗後水藥不得入口。為逆。發汗已。陽胃中虛冷也。若更發汗。則愈損陽氣。胃氣大虛。故吐下不止。發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊懣。梔子豉湯主之。成無已註。發汗吐下後。邪熱乘虛客於胃中。謂之虛煩者。熱也。胃中煩熱。鬱悶而不待發散者是也。熱氣伏於裏者。則喜暍。今熱氣浮於上。煩擾陽氣。故不得眠。心惡熱。熱甚則必伸昏。是以劇者。反覆顛倒而不安。心中懊懣而煩悶。

快懷者俗謂鶻突是也。內經曰：其高者因而越之。與梔子豉湯以吐胃中之邪。或無已傷寒明理論梔子豉湯方。內經曰：其高者因而越之。其下者引而竭之。中滿者瀉之於內。其有邪者瀉形以為汗。其在皮者汗而發之。治傷寒之妙。雖有變通終不越此數法也。傷寒邪氣自表而傳裏。留於胃中。為邪在高。分則可吐之。是越之之法也。所吐之證。亦自不同。如不經汗下邪氣蘊鬱於胸。則謂之胸實。應以瓜蒂散吐之。瓜蒂散吐胃中實邪者也。若發汗吐下後邪氣未盡。留於胃中。則謂之虛煩。應以梔子豉湯吐之。梔子豉湯吐胃中虛煩者也。梔子味苦寒。內經曰：酸苦湧泄為陰。湧者吐之也。湧吐在煩。必以苦為主。是以梔子為君。煩為熱。熱者必以苦勝熱者。必以寒香。豉味苦寒。助梔子以吐虛煩。是以香豉為臣。內經曰：氣有高下。病有遠近。證有中外。治有輕重。適其所以為治。依而行之。所謂良夫。劉守真傷寒直格云：凡諸梔子湯皆非吐人之藥。以其燥熱結之甚。而藥頗攻之。不能開通。則鬱發而吐。因其嘔吐發開。鬱結則氣通津液。宜行而已。故不須再服也。王好古醫量元成云：若少氣者加甘草以邪在上焦而不受藥。故吐之。雲岐子保命集：汗下後心中懊憹。頭汗出煩而不得眠。心中微結而痛者。梔子豉湯主之。傷寒醫以九藥下之。身熱不

永樂大典卷三千六百十五

三十一

去裏不結微煩。而不待眠者。梔子乾薑湯主之。傷寒汗下後喘而不得眠者。梔子豉加杏仁二十枚主之。傷寒汗下後咳嗽而煩。不得眠者。梔子豉加人參芍藥各五錢主之。傷寒發水攻裏之後。傳變不同。下之早而有結。胃痞氣結。胃者邪氣結而實。痞氣者邪氣痞而虛。虛實之間。邪在中心。與正氣相搏。懊憹而煩。不得眠者。宜梔子豉湯。大抵不得眠者。從陽明所得。太陽中所有。梔子豉湯者。自太陽而傳陽明也。謂之曰太陽梔子豉湯。陽明有梔子豉湯者。本經自傳而得之者也。李憲德生堂經驗方：梔子豉湯。治傷寒六七日後。脇腹疼。大便結。始因酒食所傷。發熱發渴者。枳實一錢。厚朴二錢。山梔子一錢。大黃三錢。另研。豉三錢。右以吐如法。修製。分作二服。每服水一盞半。生薑三片。煎一大匙。却下大黃再煎。去滓溫服。此下藥之輕者。

梔子豉湯方

梔子 十四枚。擘。味苦寒。

香豉 四合。綿裹。味苦寒。

酸苦湧泄為陰。苦以湧吐。寒以勝熱。梔子豉湯相合吐劑宜矣。

右二味以水四升。先煮梔子得二升半。內豉煮取一升半。去滓分爲二服。溫進一服。得吐者止後服。

若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。成無已註。少氣者。熱傷氣也。加甘草以益氣。嘔者。熱煩而氣逆也。加生薑以散氣。少氣則氣為熱傳散而不收者。甘以補之可也。嘔則氣為熱傳逆而不散者。辛以散之可也。發汗若下之而煩熱。胃中空者。梔子豉湯主之。成無已註。陽受氣於胃中。發汗若下。使傷氣不足。邪熱客於胃中。結而不散。煩熱而胃中空者。與梔子豉湯以吐胃中之邪。傷寒五六日。天下之後身熱不去。心中結痛者。未欲解也。梔子豉湯主之。成無已註。傷寒五六日。邪氣在裏之時。若大下後身熱去。心胃空者。為欲解。若大下後身熱去。而心結痛者。結胃也。身熱不去。心中結痛者。虛煩也。結胃為熱。結胃中為實。是熱氣已收。欲於內。則外身熱去。虛煩為熱客胃中。未結為實。散漫為煩。是以身熱不去。六七日為欲解之時。以熱為虛煩。故云未欲解也。與梔子豉湯以吐除之。傷寒下後。心煩腹滿。臥起不安者。梔子厚朴湯主之。成無已註。下後但腹滿而不心煩。即邪氣入裏為裏實。但心煩而不腹滿。即邪氣在胃中。為虛煩。既煩且滿。則邪氣壅於胃腹間也。滿則不能坐。煩則不能臥。故臥起不安。與梔子厚朴湯吐煩泄滿。王好古醫壘元戎云。梔子湯五法。皆汗下吐後用之。以邪氣陷於胃中。居最高之分。故隨證加收用之。經曰。其高者因而越之。

水藥大典卷三千六百十五

三十二

梔子厚朴湯方

梔子 十四枚 擘 味苦寒

厚朴 四兩 薑炙 味苦溫

枳實 四枚 水浸去殼炒 味苦寒

酸苦湧泄。梔子之苦以湧虛煩。厚朴枳實之苦以泄腹滿。

已上三味以水三升半。煮取一升半。去滓分二服。溫進。一服得吐者。止。後服。李憲德生堂經驗方云。此藥吐之輕者。

傷寒醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯主之。成無已註。丸藥不能除熱。但損正氣。邪氣未虛。留於胃中。而未入深者。則身熱不去。而微煩。與梔子乾薑湯吐煩正氣。

梔子乾薑湯方

梔子 十四枚 擘 味苦寒

乾薑 二兩 味辛熱

苦以湧之。梔子之苦以吐煩。辛以潤之。乾薑之辛以益氣。

右二味以水三升半。煮取一升半。去滓分二服。溫進。一服得吐者。止。後服。

凡用梔子湯病人舊微瀉者。不可與服之。成無已註。病人舊微瀉者。裏虛。

而寒在下也。雖煩則非熱。故不可與附子湯。內經曰。先泄而後生他病者治其本。必且調之。後乃治其他病。太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩身瞤動。振振欲擗地者。真武湯主之。或無已註。發汗不解。仍發熱。邪氣未解也。心下悸。頭眩身瞤動。振振欲擗地者。汗出亡陽也。裏虛為悸。上虛為眩。經虛為身瞤。振振。與真武湯主之。溫經復陽。許叔微普濟本事方云。鄉里有姓京者。以需地為業。于平三十。初得病身微汗。脉弱。惡風。醫以麻黃藥與之。汗遂不止。發熱心多驚悸。夜不待眠。語不識。令筋傷肉瞤。振振動搖。醫者又進驚風藥。予曰。強汗之過也。仲景云。脉微弱汗出惡風。不可服青龍湯。服之則筋傷肉瞤。此為逆也。惟真武湯可救。進此三服。佐以清心丸。竹葉湯。數日遂愈。施虛續易簡方論真武湯。如發熱而泄瀉者。服此藥或未止。宜投四逆湯。兼下震靈丹。當麻手而愈。此藥不惟陰證傷寒可服。若虛勞之令憎寒壯熱。咳嗽下利。皆宜服之。因易名曰陽湯。增損一如前法。今人每見寒熱證。便作虛勞治之。及病後未復常者。多用地黃。當歸。麻黃。葶補益精血。殊不知此等藥味。多欲總腸。若脾胃大敗。充實。服之却能滋養。然猶恐因時致傷胃氣。胃為倉庫之官。受納水穀之處。五臟皆取氣於胃。所謂精氣血氣。皆由穀氣而生。若用地黃等

永樂大典卷三千六百十五

藥。未見其為土也。而穀氣已先有所損矣。此孫兆謂補腎不如補脾。正謂是也。故莫若以固陽湯調其寒熱。不致傷脾。飲食不減。則血氣自生。若勞瘵之疾已成。無藥能療。惟膏肓灸法。最為效驗。然傷晚亦恐不及。其他證狀。胃風湯。道遠飲。方中具言之。又保活人書云。太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地者。真武湯主之。少陰病二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沉重。疼痛。自下利。此為水氣。其人或利或小便不利。或不利或嘔者。真武湯主之。由是而觀。則知此藥不獨能治太陽病。而少陰病亦治之也。王氏因其水氣之說。乃云。此由渴後飲水。停留中脘所致。即此以明心傳頭暈身熱。瞤動等證。意以為時少陰病。而不知此證乃太陽傷風。合行桂枝誤作傷寒。醫治用麻黃以發汗。汗出過多。亡陽發熱而致此。不應泛引痰飲之說。為傷寒之證。誤矣。然其如痰雖本於活人書。而附子一節。較之孫氏証實。則互相矛盾。使後學無所適從。活人書云。嘔者去附子。如生薑三片。夫生薑嘔家聖藥。治嘔用此。固宜。如寒嘔則附子不當去。秘寶云。不下利去附子。如生薑。合前作平助。使果不下利。附子去亦無害。既不言治。則增生薑何義。王氏於此。獨加生薑而不去附子。生薑固治嘔矣。而附子尚存以之治寒。嘔則可。若熱而嘔者。豈

下敗通事哉三家皆說未盡當作不下利而嘔者去附子加生薑如此方  
可以貫三家之說也 又按仲景云主治有二一以治太陽病發汗汗出  
不解其人心中悸頭眩身動振振欲擗地者仲景謂汗多亡陽而然碩  
叔謙反云此由渴後飲水停滯中脘所致兼上項浴只是經汗不解碩自  
添一下字作經汗下不解一誤仲景一云治傷寒二三日不已至四五日  
腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者仲景謂此證有水氣而然碩反  
不云因有水氣二誤又落却小便不利四字三誤仲景著證知四肢沉重  
疼痛乃水性流重故痛亦沉重碩悉却沉重緊要兩字四誤仲景云自下  
利頭反作大便自利則是大便如常流利未為清切自下利即是小便不  
利因為自下利此正如不因醫家藥發其汗而自有汗類也五誤及其述  
仲景加減法小便不利者去茯苓其汗元有小便不利一證下利者去芍  
藥加乾薑見得係是自下利不是大便如常自利嘔者去附子加乾薑碩  
不云去附子只云每服加生薑五片六加減中又成此誤意草情然吳曉  
增不增修不修葛地於是方後捨去論傷寒證治自入野說以本有學濫  
云今人每見寒熱多用地黃當歸鹿茸輩補益精血殊不知藥味多甘却  
成戀腸詳前三品識未為甘若梨馬丸又何戀腸况大物性有盡制而用

永樂大典卷三千六百十五

之將使無盡物用有窮變而通之將使無窮志寧何爾執一而廢百也既  
又果曰若脾大敗充實方能滋養然猶恐因而致傷胃氣胃為倉庫之官  
水穀之處此十字自軒帝正經傳之古今只曰名原之官水穀之海經又  
曰腸胃為本蓋海字無所不納處之一字皆通經途說來更詳脾胃大段  
充實之人精血自旺何假藥餌滋養脾胃既充實又如何猶恐一時致  
傷胃氣况胃屬陽明聖經中指為至陽能腐熟穀食果菜一切滋味傳於  
脾分於大腸小腸二便之下其氣上騰何地黃當歸鹿茸使傷其胃氣又  
果曰所謂精氣血氣皆由穀氣而生此腐熟亦能知曉何苦使斥用地黃  
等藥未見其為生血而穀氣已先損矣其說謬甚茲特為詳而陳之無貽  
志寧謬說斥上品名藥以沮絕後世之滋養補益也孫若斥其三品多甘  
甘莫甘於甘草經方少有不用者又甘莫甘於蜜而補劑未嘗不數以丸  
者况稼穡作甘黍稷稻粱麥林神農皆稱其甘甘受和脾喜甘者此未易  
以地黃當歸鹿茸而能傷胃氣也若斥其三品能傷胃氣不知如何而傷  
也傷胃氣者惟穀果菜滋味過傷耳經故曰飲食自倍腸胃乃傷又曰  
陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味又曰傳之則生失之則死傷之  
則病審此又未易云地黃當歸鹿茸而能傷胃氣也若斥地黃等藥傷穀

# 永樂大典

## 卷三六一五

氣。是又自通曉。說中未。凡人身有氣。恐其傷。欲其損。新能為。精為血。不損則病。有如傷寒。差後多食。發為食復。作熱。仲景治法。惟日損。飲則愈。若斤三品。不可為退寒熱。治虛寒。用姜何。本草地黃。則曰。作湯除。寒熱。當歸。則曰。虛冷。人宜加。而用之。鹿茸。又如。何能傷胃。氣耶。志寧。何見。併將。神農。亦為之。毀。吁。大哉。孔子。天縱。將聖。則詩。定書。約禮。明樂。擊易。而。脩。春秋。亦只。述。古人之。意。不。易。妄。作。志。寧。何。人。哉。乃。敢。以。此。因。世。俗。地。黃。亦。有。可。斤。者。志。寧。却。不。能。深。究。地。黃。一。品。當。公。詔。世。必。以。酒。九。蒸。九。曝。而。使用。否。則。有。滯。脾。之。禍。愚。諄。諄。之。告。惟。祈。衛。生。君子。生。熟。藥。詳。當。作。子。孫。陰。德。遵。當。公。製。度。而。志。寧。又。引。孫。光。云。補。腎。不。如。補。脾。為。證。其。若。只。以。用。陽。湯。調。其。寒。熱。不。致。傷。脾。是。又。會。胃。而。言。脾。也。且。如。固。陽。湯。即。真。武。湯。易。其。名。不。能。調。陰。調。陽。如。何。分。寒。分。熱。無。載。其。方。分。兩。又。成。大。誤。本。方。白。茯苓。三分。白。芍。藥。三分。各。計。重。七。錢。半。白。朮。二。分。則。重。五。錢。附。子。一。枚。炮。去。皮。臍。破。作。八。片。只。用。二。片。計。之。未。及。重。二。錢。計。孫。方。云。用。茯苓。芍。藥。各。三。分。却。合。元。方。則。附。子。當。用。二。錢。孫。方。云。用。附。子。三。分。則。附。子。多。用。五。錢。半。重。謂。之。合。法。可。乎。凡。此。主。說。類。皆。庸。言。但。語。耳。只。可。一。時。生。中。登。為。常。談。安。可。載。于。春。用。永。遠。誤。人。也。至於。未。後。又。極。其。謬。曰。若。勞。瘵。之。疾。已。成。無。

永樂大典卷三六一五

三十五

藥能療。惟膏肓。灸法。最為效驗。然。或。傷。晚。亦。恐。不。及。其。他。怪。難。胃。風。湯。道。遠。散。中。具。言。之。勞。瘵。灸。膏。肓。既。傷。乎。晚。胃。風。湯。道。遠。散。可。得。而。入。口。乎。志。寧。可。謂。不。學。無。識。之。甚。者。又。按。無。求。于。云。水。飲。內。蓄。上。乘。於。肺。為。喘。為。咳。古人。治。目。水。而。飲。病。在。陽。則。小。青。龍。湯。主。之。病。在。陰。則。真。武。湯。主。之。咽。喉。乾燥。者。不。可。發。汗。成。無。已。註。津。液。不。足。也。索。疴。傷。寒。新。書。云。咽。喉。乾。燥。難。合。以。治。可。發。汗。淋。家。不。可。發。汗。發。汗。必。使。血。成。無。已。註。勝。既。衰。熱。則。淋。反。以。湯。藥。發。汗。亡。耗。津。液。增。益。客。熱。勝。既。虛。燥。必。小。便。血。索。疴。傷。寒。新。書。云。淋。家。宜。平。涼。藥。和。解。取。汗。瘡。家。雖。身。疼。痛。不。可。發。汗。發。汗。則。瘡。成。無。已。註。未。虛。聚。熱。則。生。瘡。瘡。家。身。疼。如。傷。寒。不。可。發。汗。發。汗。則。未。氣。愈。虛。熱。勢。愈。甚。土。風。故。變。瘡。也。龐。安。時。傷。寒。總。病。論。云。以。瘡。瘡。家。膿。血。過。多。索。疴。傷。寒。新。書。云。瘡。家。身。疼。痛。可。平。藥。和。解。不。汗。切。家。不。可。發。汗。汗。出。必。額。上。陷。脈。急。緊。直。視。不。能。瞬。不。得。眠。成。無。已。註。切。者。上。焦。亡。血。也。若。發。汗。則。上。焦。津。液。枯。竭。經。絡。乾。澀。故。額。上。陷。脈。急。緊。諸。脈。者。皆。屬。於。日。筋。脈。緊。急。則。牽。引。其。目。故。直。視。不。能。瞬。明。合。日。也。針。經。曰。陰。氣。虛。則。目。不。瞬。亡。血。為。陰。虛。是。以。不。得。眠。也。索。疴。傷。寒。新。書。云。切。家。有。汗。證。可。發。之。許。叔。微。傷。寒。九。十。論。切。血。證。雖。陽。張。士。美。病。傷。寒。七。八。日。口。燥。飲。水。而。不。燕。

入。微而細。脉浮緊身熱。醫者云。傷寒脉浮緊。不發汗。因致。蚘者。屬麻黃湯。主之。予曰不可。古人雖云當汗不汗。熱化為血。此證亦有不可汗者。仲景云。陽明病口燥。但欲漱水而不咽者。必蚘。蚘家不可發汗。發汗則額上陷。不得眠。不能咽。此只可用小品犀角地黃湯。若當時行麻黃。必額上陷。直視不眠也。亡血家不可發汗。發汗則寒慄而振。成無已註。針經曰。奪血者無汗。奪汗者無血。亡血發汗。則陰陽俱虛。故寒慄而振。慎思救加賦。藥經集云。若脈中閉。咽乾。燥。亡血。如家淋家。房家不可發汗。已上六證。並宜小柴胡湯。汗家重發汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。與禹餘糧丸關。成無已註。汗者心之液。汗家重發汗。則心虛恍惚。心亂。奪汗則無水。故小便已陰中疼。雲岐子保命集。太陽中風。自汗出。醫反發其汗。必恍惚心亂。以虛而反。又一度之。則心神虛而恍惚。小便已陰疼。氣虛也。宜禹餘糧丸。兩室實。雖類。暴日恍惚。心亂。傷證也。陽虛甚。神明無所依。依則亂也。病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐蚘。成無已註。病人有寒。則當溫。兼反發汗。損陽氣。胃中冷。必吐蚘也。本發汗而復下之。此為逆也。若先發汗。治不為逆。本先下之。而反汗之。為逆。若先下之。治不為逆。成無已註。病在表者。汗之為宜。下之為逆。病在裏者。下之為宜。汗之為逆。經曰。陽盛陰虛。汗之則死。下

水藥大典卷三千六百五

三十六

之則愈。傷在陰盛。汗之則愈。下之則死。傷寒醫下之。續得下利。清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。成無已註。傷寒下之。續得下利。清穀不止。身疼痛者。急當救裏。以裏氣不足。必先救之。急與四逆湯。得清便自調。知裏氣已和。然後急與桂枝湯。以救表。身疼者。表邪也。內經曰。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。此以寒為本也。太平聖惠方云。夫病下之。後續得下利。水穀不止。身微疼痛。急當救裏。宜溫之。與治中。四逆。附子湯。諸溫藥之。藥實此子。保命集。太陽病。傷寒。頭疼。項強。當發其汗。反下之。清穀不止。裏寒也。一身疼痛者。表寒也。急當救裏者。先治其本。宜四逆湯。從少陰本也。桂氣裏和。外身疼痛。後治其表。宜桂枝湯。病發熱。頭痛。脉反沉。若不差。身體疼痛。當救其裏。宜四逆湯。成無已註。發熱。頭痛。未病也。脉反沉者。裏寒也。經曰。表有病者。脉當浮大。今脉反沉。故知愈也。見表病而得裏脉。則當差。若不差。為內虛寒甚也。與四逆湯救其裏。汪時傷寒發明書。經曰。病發熱。頭痛。脉沉。不差。身疼痛。當救其裏。宜四逆湯。入口。下利。身體疼痛。先溫其裏。乃攻其表。溫裏四逆湯。攻表桂枝湯。活人書云。兩感病。無治法。但云。治有先後。序第三卷。言傷寒下後利不止。身體疼痛。急當救裏。宜四逆

湯。後身疼痛。清。使自調者。急當救表。宜桂枝湯。遂以意做。效治。兩感有先  
後。宜先救其裏者。陽氣內止。則不必醫也。內。饒正。急當救表。亦不可緩也。  
今按論中此條。正與活人書所引救裏救表一條相連。正是太陽少陰兩  
感治法。成注不得其意。注若表而出之。今又以活人書救表之說。及其治  
法。餘經兩感論中無文。皆宜做此。兩感於寒熱入臟者不治。自有本條也。  
太陽病先下之而不愈。因復發汗。以此表裏俱虛。其人因致胃。胃家汗出  
自愈。所以然者。汗出表和故也。得裏和。然後復下之。成無已註。胃者鬱也。  
下之則裏虛而止。汗之則表虛而止。陽表裏俱虛。寒氣併鬱。其人因致  
胃。金匱要畧曰。亡血復汗。寒多致令鬱胃。汗出則併鬱之邪得解。則胃愈。  
金匱要畧曰。胃家欲解。必大汗出。汗出未和而裏未和者。然後復下之。太  
陽病未解。脈陰陽俱停。必先振慄汗出而解。但陽脈微者。先汗出而解。但  
陰脈微者。下之而解。若欲下之。宜調胃承氣湯主之。成無已註。脈陰陽俱  
停。無偏勝者。陰陽氣和也。經曰。寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等。  
此脈陰陽為和平。雖劇當愈。今陰陽既和。必先振慄汗出而解。但陽脈微  
者。陽不足而陰有餘也。經曰。陽虛陰盛。汗之則愈。陰脈微者。陰不足而陽  
有餘也。經曰。陽虛陰虛下之則愈。王叔和脈經云。此屬大柴胡湯證。陰

永樂大典卷三千六百十五

三十七

微一作尺實。孫思邈千金翼方。但陽脈微者。先汗之而解。宜桂枝湯。太  
陽病發熱汗出者。此為榮弱衛強。故使汗出。欲散邪風者。宜桂枝湯。成無  
已註。太陽中風。風併於衛。則衛實而榮虛。榮者陰也。衛者陽也。發熱汗出  
陰弱陽強也。內經曰。陰虛者陽必湊之。故少氣時熱而汗出。與桂枝湯解  
散風邪。調和榮衛。雲岐子保命集。太陽病脈浮而弱。身熱惡風。頭痛項  
強。自汗不止。榮弱衛強。榮弱者汗自出。血不能守而泄於外。衛不能環。是  
知榮衛不和也。欲  
散邪風。宜桂枝湯。

# 永樂大典卷之三千六百十五

重 珠 總 校 官 傅 郎 臣 高 拱

學 士 臣 瞿 景 淳

分 校 官 編 修 臣 王 希 憲

書 寫 院 士 臣 陳 國 泰

國 際 監 生 臣 教 河

臣 孫 世 良