

*Samuelis Dale*

PHARMACOLOGIÆ,

SEU

MANUDUCTIONIS

AD

MATERIAM MEDICAM

SUPPLEMENTUM:

Medicamenta Officinalia

Simplicia priore Libro

omissa,

COMPLECTENS;

Ut & Notas Generum Characteristicas,

Specierum Synonyma, Differentias,

& Vires.

*Cum duplici INDICE*

*tam Pharmacologie ipsa, quam Supplementi,*

*altero Nominum & Synonymorum precipuo-*

*rum Latino, altero Germanico,*

*in gratiam Tyronum.*

Juxta Exemplar Londinense.

1705.

---

B R E M Æ,


Apud PHILIPPUM GODOFREDUM

SAURMAN.


Anno MDCCVII,

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*





# PRÆFATIO.


 Um in Præfatione ad  
 superiorem meum Li-  
 brum succinctam red-  
 didi rationem cur Scientia  
 simplicium perquam necessa-  
 ria fuit omnibus Medicinam  
 facientibus, unà cum opinio-  
 nibus antiquorum super eâ re  
 Medicorum, & quoniam ra-  
 tiones attuli quæ me potissi-  
 mùm impulerunt ad illum  
 Tractatum publici juris fa-  
 ciendum, supervacaneum  
 ) ( 2 duxi

PRÆFATIO.

*duxi ea repetere quæ ibidem  
dixeram, satis esse ratus, cer  
tiores facere Lectorem de  
causis hoc opus in lucem e  
mittendi, & quæ adhibui au  
xilia in perficiendo eodem &  
consummando.*

*Postquam Typis mandave  
ram priorem meum Tracta  
tum, Anno 1693. animad  
verti plurimas res medicas  
quæ jam tum cœperunt obti  
nere in usu medicinali à me  
omissas, plurimi quoque libr  
eò spectantes tum tempori  
in manus inciderint qui non  
dum impressi fuerint, ve  
quorum saltem notitiam non  
dum habui. Verùm cum mih  
inno*

PRÆFATIO.

innotuit ab aliquam multis etiam ingeniosis Librum meum æqui bonique acceptum fuisse in Regionibus exteris, quin & inter peregre proficiscendum se illum non tantum in Gallia, & Hollandia, verum etiam in Italia, & in ulterioribus Germaniæ oris, subiit considerare Supplementum fore necessarium quo majori esset usui aliis regionibus, & cum iter jam fecisset usque ad viciniam Græciæ, antiqui istius Scientiarum Fontis, quod non è re foret adicere ex Dioscoride exterisque Pharmacopœis, quodcunque non adhuc impressum penes me fuit, & non quod expectandum fuit usquedum Liber a-  
 iam requireret impressionem, sed seorsim continuò edendum.

Postquam non contemnendum jam progressum feci in constituto subjecto, certior sum factus Gallorum Regem mandasse ingeniosum, nullique secun-

PRÆFATIO.

*dum Botanicum D. Tournefortium in Græciam, Insulasque adjacentes, ad investigandas Dioscoridis plantas, id quod effecit ut ad tempus destiti ab opere, sperabam enim fore quod cum insignis iste Vir redux fuisset, aliqua saltem in lucem ederetur ad dirimendam vexatissimam istam inter Botanicos quæstionem de veris antiquorum Græcorum plantis: verum enim verò quamobrem visum fuit præstantissimo Botanistæ invidere Orbiliterariæ, alium laborum suorum Orientalium fructum præter Corollarium, me sane latet.*

*Operam dedi ut ubique de Materia Medica Dioscoridis liquido constaret, atque ad eò consului præcipuos Authores qui de hoc Subjècto tractarunt, & quam presse potui adhæsi textui, ad suppetias etiam meas adhibere lubuit Matthioli Translationem, ut & Commentarium: in his libris concinnandis*

*inivi*

PRÆFATIO.

inivi viam nemini perviam; qualis  
 nulla (quod sciam) fit mentio in aliqua  
 Lingua, ideoque tam vivos quam  
 mortuos consului, plurimos scilicet  
 doctos, eosque ingeniosos Viros, si-  
 mul & Libros; quoniam verò necesse  
 omninò fuit unicuique rei medicæ ad-  
 dicere virtutes, verùm quandoquidem  
 libri institutum brevitatem exigit, at-  
 que adeò ut in Epitomen redigeretur,  
 hoc in causa fuit, quod eosdem excerpfi  
 ex Authoribus qui id mihi effectum de-  
 derunt: verùm ne Jovis Corvi ad  
 instar furtivis me efferrem plumis, mi-  
 hique plus tribuerem quam par est,  
 quam meritus sum, ad calcem unius-  
 cujusque transcriptionis imposui Au-  
 thoris nomen unde mutuo accepi, no-  
 tas scil. characteristics, easque præ-  
 fertim ex operibus nuperi mei vicini,  
 & amici longe colendissimi, Digniss.  
 & Solertiss. D. Joan. Raii, jam nunc,

PRÆFATIO.

*ut fas est credere, in gloria, nec non à Pharmacopœia Schroderi; unde accidit quod nonnulli perperam existimavere primum Volumen nihil aliud esse quam transcriptum ex istiusmodi Authoribus; & non opus (ut revera est) prorsus novum.*

*Hoc mihi potius in gloriam cedit, quam in vituperium, ideoque lubens agnosco me sæpe sæpius amicos quosdam, dum opus moliebar, consuluisse, quorum nonnullos memini, nec immeritò in Præfatione ad primum Volumen, nec opus est illos hoc in loco repetere, sed eò referam Lectorem meum ut illorum nomina illi innotescant; quibus addere licet D. Guil. Sherard LL. D. qui jam Consul agit Smyrnæ pro Societate Turcica, D. David Kreig M. D. D. Jacobum Petiver, & D. Finch, Pharmacopœas Londini.*



*Nominum abbreviatorum  
Dilucidatio.*

**A.** Litera margine posita indicat  
Mineras, Plantas, & Anima-  
lia illa, quibus præfigitur An-  
glia alumna esse.

*Act. Philos. & Transact. Philos.* Acta Philo-  
sophica Regia Societatis Londinen-  
sis.

*Agricol.* Agricola de Re Metallica.

*Aldrov.* Aldrovandus.

*Alpin.* Prosperus Alpinus.

*Amman.* Pauli Ammanni Munusductio ad  
Materiam Medicam.

*Ang. & Anguil.* Aloysius Anguillara.

*Bellon.* Bellonius.

*Bocc.* Paulus Boccone in descriptione Plan-  
tarum rariorum Siciliae, &c.

*Bod.* Joannis Bodæi à Stapel Comment.  
in Theophrasti Historiam.

*Abbreviatorum*

- Boet.* Boetii de Boot Gemmarum & Lapidum Historia.
- Bonann.* Bonanni Recreatio mentis & oculi.
- Bont.* Jacobus Bontius in Historia Naturali Ind. Orient.
- Breyn. Cent.* Jacobi Breynii Centuria; *idem* *Prod.* 1. & 2. Prodrumus primus & secundus ejusd.
- Breyn. Dissert. Bot.* Joannis Philippi Breynii Dissertatio Botanica.
- Cam.* Camerarius.
- Camel. Syllab.* Georgii Josephi Camelli Stirpium Insul. Luzonis, &c. Syllabus.
- C. B.* Caspari Bauhini Pinax. *C. B. prod.* Prodrumus ejusdem. *C. B. Theat.* Theatrum ejusd.
- Cat. Angl. & Cat. Plant. Angl.* Joannis Raii Catalogus Plantarum Angliæ.
- C. C.* Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam nascentium ejusd.
- C. Jamaic. & Cat. Jamaic.* Hans Sloanii Catalogus Plantarum Jamaicensium.
- Cæs. & Cæsalp.* Andreas Cæsalpinus.
- Chab.* Dominici Chabræi Stirpium Scia-graphia.
- Charlt. ex.* Gualteri Charltoni Exercitatio-

*Dilucidatio.*

tiones de Differentiis & Nominibus  
Animalium.

*Clus.* Carolus Clusius.

*Col. & Colum.* Fabius Columna.

*Commel. in not.* Joannes Commelin in No-  
tis ad Hortum Malabaricum.

*Commel. Prælusd. Bot.* Caspari Commelini  
Præludia Botanica.

*Diosc.* Pedacius Dioscorides Anazarb.

*Dod.* Remberti Dodonæi Pemptades.

*El. Bot.* Jos. Pitton Tournefort Elemen-  
ta Botanica.

*Ephem. German.* Ephemerides Germa-  
nicæ.

*Flo. Lugd. Bat. Flo.* Floræ Lugduno-Bata-  
væ Flores.

*Gal. & Galen.* Galenus.

*Garz.* Garziæ ab Horto Aromaticum Hi-  
storia.

*Gaz. Pet.* Jacobi Petiverii Gazophylaci-  
um Naturæ & Artis. Dec. 1. 2. 3. 4.

*Ger. & Ger. emac.* Joannis Gerardi Historia  
Plantarum emaculata.

*Gesn.* Conradus Gesnerus.

*Herm. & Herm. Cat.* Horti Lugduno-Ba-  
tavi Catalogus, Paulo Hermanno.

*Hern.* Francisci Hernandez Plantarum,  
Ani-

*Abbreviatorum*

Animalium, &c. Mexicanorum Historia.

*Hoffman.* Casparus Hoffmannus de Medicamentis Officinalibus.

*H. Beaurum.* Catalogus rariorum Horti Beaumontiani, à Kiggelario editus.

*H. M.* Hortus Malabaricus.

*H. Ox.* Roberti Morisoni Historia Plantarum Oxoniensis. Pars. 2. & 3.

*Imperat.* Ferrandus Imperatus in Hist. Nat.

*J. B.* Joannis Bauhini Historia Plantarum. 3. Voll.

*Jonsf.* Joannis Jonstoni Historia Animalium.

*Jonsf. D.* De Arboribus ejusdem.

*Laet. & de Laet.* Joannis de Laet de Gemmis & Lapidibus.

*Lister. & List.* Hist. A. A. Martini Listeri Histor. Animalium Angliæ; *idem icon.* & *Hist. Conch.* Historia Conchyliorum ejusdem.

*Lob. & Lobel.* Lobelius in Adversaria & Observat.

*Marg. & Marck.* Georgii Marcgravii Historia Naturalis Brasiliæ.

*Matth.* Petri Andreae Matthioli Commentarius in Dioscoridem.

*Dilucidatio.*

- Mer. P. & Mer. Pin.* Christophori Merrett Pinax Rerum Naturalium Britannicarum.
- Mor. Prælusd.* Roberti Morisoni Præludia Botanica.
- Mor. umb.* idem in umbelliferarum distributione.
- Mouff.* Thomæ Mouffeti Theatrum insectorum.
- Munt.* Abrahamus Muntingius in Aloideo, Herba Britannica.
- Mus. Reg. Soc.* Musæum Regiæ Societatis.
- Mus. Pet.* Jacobi Petiverii Musæum.
- Offic.* Nomina usitata in Officinis denotat.
- P. B.* Phytologia Britannica.
- P. B. P.* Paradisi Lugduno-Batavi Prodromus.
- P. Al.* Leonardii Plukenetii Almagestum Botanic.
- P. Mant.* Mantissa ejusdem.
- P. P.* Phytographia ejusdem.
- Park.* Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum; *idem. Parad.* Paradisus ejusdem.
- Parad. Bat.* Pauli Hermanni Paradisus Batavus.

*Abbreuiatorum*

*Plin. C.* Plinius secundus in Historia Naturali.

*Pis. & Pison.* Guil. Pisonis Historia; *idem Mant.* Mantissa Aromatica ejusd.

*Rauwolf.* Leonardi Rauwolfii Itinerar. in Orient.

*R. Cat.* Joannis Raii Catalogus Plantarum Angl.

*R. D.* Dendrologia ejusdem.

*R. H.* Historia Plantarum ejusd. 3. Voll.

*R. Meth.* Methodus Phantarum nova ejusdem.

*R. Meth. A.* Eadem emendata & aucta, ejusdem.

*R. Ornith.* Francisci Willoughbæi Ornithologia, à Joanne Raio edita.

*R. Ichth.* Franc. Willoughbæi Ichthyologia ejusd.

*R. Synop. Animal. & H. Animal.* Joannis Raii Synopsis Animalium.

*R. Synop.* Synopsis Plantarum ejusd.

*Rivin.* Augusti Quirini Rivini Introductio ad Rem Herbariam.

*Rondel.* Rondeletius.

*Ruel.* Joannes Ruellius.

*Salv.* Salvianus.

*Scalig.* Scaliger.

*Schrod.* Joannis Schroderi Pharmacopœia.

*Schvvenck-*

*Delucidatio.*

*Schwenckfeld.* Schwenckfeldius.

*Sibbald.* Roberti Sibbaldi Balenalogia nova

*Syen. in not.* Arnoldus Seyen in notis ad Hortum Malabaricum.

*Theoph.* Theophrasti Eresii Historia Plantarum.

*T. Coroll.* Josephi Pitton Tournefort Corollarium Institutionum Rei Herbariæ; *idem Inst.* Institutiones Rei Herbariæ ejusdem.


*Trag.* Hieronymus Tragus.

*Turn.* Turnerus.

*Volck.* Jo. Geo. Volckameri Flora Norimbergensis.

*Vit.* In usu sunt.

*Vorm.* Wormii Musæum.



*Spatii loco adjecti sunt aliquot Libri*

*Med. qui Bremæ in Bibliopolio reperiuntur Saurmanniano.*

*Aldrovandi Dendrologia fol.*

*Argenterii Opera Medica fol.*

*Augenii Scripta Medica fol.*

*Abrahamæ Icones Stirpium fol.*

*Auderoni Pharmacopœa fol.*

*Bertini Medicina fol.*

- Boneti Medicinæ Septentrional pars secunda.  
 Crucii de Arte Medicina fol.  
 Fabricii Opera Anatomica, cum fig. fol.  
 Foresti Opera omnia Medica fol.  
 Forti Consultat. & Responsiones Med. fol.  
 Fuchsi Opera Medica, fol.  
 Galegii Opera Physico-Medica fol.  
 Hoffmanni Scripta Medica fol.  
 Horsti Opera Medica fol.  
 ——— Dispensatorium fol.  
 Laurentii Scripta Medica fol.  
 Libavii Syntagma Alchymix fol.  
 Lipenii Bibliotheca Medica fol.  
 Mermannii Consultat. & Respons. Medica, fol.  
 Parisanus de Microscomicæ subtilitate fol.  
 Saxonix Tr. de Medicina pract. fol.  
 ——— ——— Pulsibus fol.  
 Schenckii Observationes Medicinales fol.  
 Scholtzii Consilia Medica fol.  
 Sommerhofii Lexicon Pharmaceutico-Chy-  
 micum fol.  
 Sorbaiti Opera Medica fol. •  
 Vidii Ars Medicinalis fol.  
 Wechtleri Homo oriens & occidens fol.  
 Zacchiæ Quæstiones Medico-Legales fol.  
 Zwelferi Observationes ad Pharmacopœam  
 August. fol.



PHARMACOLOGIÆ,  
SEU

*Manuductionis ad Materiam  
Medicam,*

LIBER PRIMUS.

SECTIO PRIMA.

De  
Aquis Medicamentosis.

---

*I. Aquæ Simpliciores.*

Pag. 40. post lin. ult. adde:

**N** 1. Ad quæ aqua sine peculiari mentione alterius, e. g. pluvix, &c. recipi jubetur.

N. 2. Præfertur inter fontanas quæ fluit ab Oriente ad Occidentem, quæ decurrit à montanis locis altioribus, item quæ visu, gustu & olfactu, pura, clara, tenuis, levis, ac sincera deprehenditur, ut & quæ citò incalescit, & citò refrigeratur; quæ Hyeme calidior; æstate frigidior. Aquam hanc in-  
A jectò

jecto pane tosto corrigere, ægrotisque, loco potus sat grati concedere nostrates consueverunt. *Schrod.*

Lotiones in aqua fontana, seu Balnea frigida Veteribus in frequenti usu fuisse ad varios morbos sanandos legimus; nuperrimè etiam plurimum commendantur à medicis nonnullis eruditis; inter quos eminent D. J. Floyer, Equ. Aurat. M. D. scripto non ita pridem libello de eorum usibus, titulo *Antiquæ Ψυχρολαστίας redivivæ*, &c. in quo p. 22. & 23. Catalogum exhibuit Morborum Aquis Balnearum *Sti. Chaddi* prope *Lichtfieldiam* sanabilium.

Balnea autem frigida in quatuor genera dividit, viz. 1. est eorum quæ moderatum obtinent calorem, uno tantùm gradu corporis nostri humoribus minorem; cujusmodi sunt Balnea frigida *Buxtoni* in *Derbia* & *Bristolie* in *Somersetia*. 2. Aquæ fluviatiles æstivo sole calefactæ. 3. Aquæ fontium frigidissimorum, quales sunt *S. Winifridæ* in *Com. Flint*, & *Serbach* in *Lancastria*, *S. Chad* supradiçtæ, &c. 4. Fontes frigidi minerali quòdam imprægnati, ut 1. Sulphuris foetidi fontes, cujusmodi sunt *Godshalle* in *Staffordia* & *D. Nath. Cursoni* Equ. Aurat. prope *Derbiam*. 2. Aquæ Vitriolicæ. 3. Aquæ vitriolo Cupri infectæ. 4. Fontes Salini & Aqua Marina. 5. Aquæ petrificantes, ut *Newnhamenses* in *Warwicensi* Comitatu, &c. 6. Aquæ bituminosæ, ad *Milow-Bridge* in *Staffordia*, &c. 7. Aquæ Nitrosæ purgantes. 8. Aquæ plumbo imprægnatæ, ad

*Holy-Well* &c. 9. Aquæ Stannoæ in *Devonia* & *Cornubia*. 10. Alabastrites, ut prope *Tutbury* in *Staffordia*. 11. Aquæ margâ tinctæ, ut quæ prope *Hinchley* in *Leicestria* habentur. 12. Aquæ calce imbutæ, ut quæ prope *Verulamium* in *Hartfordia*, & *Walshall* in *Staffordia* occurrunt. Qui plura velint, librum ipsum consulant: Quem in Latinum versum in *Hollandia* impressum iri audio.

Præter morbos prædictos *S. Chaddi* aquis sanabiles, aliæ plurimæ medelæ insignes Balneis frigidis effectæ, per totum librum memorantur, quarum multæ ab eruditis medicis hodie viventibus observatæ sunt.

A. 2. Aqua Putealis *Offic.* *Brunnen-Wasser*. Fontana vilior, & crudior ut plurimum habetur; eò quod ponderosior plerumque sit ac linguam magis feriens. Verùm si ex vivis scaturiat scaturiginibus, reliquisque bonitatis signis abundat; illius vices subire haud inepta est.

A. 3. Aqua fluviatilis *Offic.* *Fluß-Wasser*. Quod radiis solaribus exposita fuit, magis habetur digesta quidem, quam putealis: Verumtamen in usurpatione ejus, non erit inutile, spectare, unde originem trahat, quòque perlabatur.

A. 4. Aqua Palustris *Offic.* *Sumpfsicht Wasser*. Pessima omnium censetur, adeoque à Medicina eliminanda.

Pag. 41. lin. 4. post Verbum *sit* adde:

Aquam marinam in receptacula *Saltz-Brun-*  
A 2
ben/

ben/Salz Pfannen dicta infundunt, ubi Solis calore coagulatur. Pro modis conficiendi Vid. *Act. Philosoph. Lond.* n. 51.

Joannes Speed Salis cujusdam meminit à lateribus lapidum quorundam in fluvio *Were* juxta *Butterbeck* prope *Dunelmum* jacentium exeuntem, qui Solis calore, æstivo tempore, ab aqua salsa rubente refluxûs marini tempore in *Salem* candidum induratur. *A. Camdeno* quoque memoratur in *Britannia* p. 744. his verbis: *Inde Vedra decurrit, crebrò eminentibus saxis interpolatus, quibus si aqua infundatur, parumque misceatur, salsam imbuat qualitatem.*

Pag. 41. lin. 5. post verb. *transportatur*  
adde:

Alium Salis ex aqua marina conficiendi modum *Lemingtoniæ* in Comitatu *Hantoniæ* usitatum, ab insula cui inædificatur oppidum istud, nomine *Port See* Salz dicti meminit *D. Joan. Collins* in Tractatu suo *De Sale & Piscatura* p. 18. Aquam scilicet marinam in Vasa, Salz Pfannen dicta infundunt, ubi primo Solis calore paulùm evaporatur, postea ignis vi excoquitur, Sal purgatur & coagulatur.

Quinetiam Salis Genus ex aqua marina coquendo efficitur, cujus parandi modus apud *S Shields* prope *Novum Castrum* usitatus, (quod genus *Sal Novo castrensis* i. e. Salz von Neu Castle/ inde dicitur) ut & in comitatibus *Dunelmensi* & *Northumbrico* à *D. Collins* libro prædicto p. 10. quo lectorem refero.

Sal insuper in *Lancastria* ex arena marina elicitur; modum videtis apud clarissimum *A. Joan. Raium* in *Vocum Anglicarum localium Sylloge* Ed. 3. p. 209. *Camdenum* in *Britannia* p. 753. his verbis descriptum: *In ora hâc maritima multis in locis sabuli cumulos videas, quibus aquam subinde infundunt, donec salsuginem contraxerit, quam postea subditis glebis in candidum salem excoquunt.* Nec in *Lancastria* tantùm sed in *Hantonia* ut à prædicto *D. Collins* p. 15. certiores facti sumus.

A. 6. Aqua pluvialis *Offic.* *Regen: Wasser.* Est aqua levis linguamque minùs foriens, fontanæ vicariæ, utimur eâ ut plurimum destillatâ. Sunt qui præferunt imbres à Meridie advolantes, vel ab Oriente, utpote quas radiis solaribus magis imprægnatas & digestas arbitrantur.

A. 7. Aqua Nivea *Offic.* *Schnee: Wasser.* Pluviali affinis est, magisque penetrans, ad còque & ad sudorem movendum non inefficax, quas vires naturæ salinæ acceptas refert, quâ præ reliquis abundat, vi frigoris condensata. *Vires.* Odontalgiam pertinacissimam aquâ niveâ fuisse domitam scribit *Zacut.*

Pag. 41. lin. 23. adde:

*Vires.* Vim habet laxandi, resistit i&tibus animalium venenatorum, collectus ab herbis ophthalmicis oculorum affectibus convenit. *Witeel* in *Schrod.*

11. *Aquæ Minerales.*

Pag. 41. lin. ult. subjunge :

Hæ à vicino nostro D. Ben. Allen, M. B. in *Historia sua Chalybeatarum & purgantium aquarum Angliæ* in duo genera dividuntur. 1. est earum quæ copiosum Salem nitrosum continent, quales sunt quæ ad *Leez, Witham, & Markshall* in *Essæxiæ* comitatu, *Knaresborough* in *Eboracensi* provincia, *Ilmingtoni* in *Warwicensi* agro & *Aylesham* in *Norfolciæ* occurrunt. 2. *Acidulæ* seu *Chalybeatæ* leviores, ut *Tunbridgenses* in *Cantio*, *Wellingburgenses* in *Northamptonia*, *Islingtonienses* prope *Londinum*, *Felstedenses* in *Essæxia*, & *Oultonenses* in *Norfolciæ*.

Prædictus Autor tertium adhuc Genus harum aquarum constituendum arbitratur, cui *Acidochalybeatarum* nomen convenire censet. Hujus generis characteristicam facit: Quod ponderosiores sint, coloris sui tenaces, quod mineræ minis, plus spiritus contineant, quodque cum gallis colorem *Cerasi* instar rubentem reddant, ad modum *Spirituum Vitriolicorum*. Hanc classem esse ad quam *Markshallenses* & *Knaresburgenses* propriè & peculiariter pertinent. Hanc divisionem instituisse sibi in animo fuisse affirmat, verum ob nimiam festinationem memoria excidit membrum hoc tertium & omissum est.

Pag. 42. lin. 4. subjunge :

Hæ etiam à prædicto Autore in 3. species dividuntur, 1. *Seleniticæ*, quæ *Epshamiæ* in *Surreia*,

reia, Actoni & Kensingtonia in Middlesexia, & Colcestria in Essexia scaturiunt. 2. Quæ in terra lutosa æquabili existunt ut ad Richmond, Lambeth, & Surreia, Dulwich in Cantio, Northall, & Barnet in Hartfordia, Upminster & Brentwood-Weal in Essexia. 3. Quæ chalybeatam admixtam habent, ut Scarburgi in Eboracensi Comitatu, & ad Woodham Ferrers in Essexia.

Quod ad vires & usus prædictarum mineralium aquarum attinet eas in libro prædicto requirendas omitto.

## SECTIO SECUNDA.

De

### Terris Medicamentosis.

#### I. De Bolo.

Pag. 43. pro 3. & 4. Specie adde:

3. **B**olus Toccaviensis *Offic. Charlt. Ex. To*  
*ckayscher Bolus.* Notas Boli Armenæ  
 veræ habet, & instar butyri in ore  
 liquefcit. In *Transylvania* ad *Toccaum*  
 seu *Tockai* effoditur. *Vires.* In Catarrhis &  
 peste valdè commendatur. A *Cratone* in u-  
 sum medicum fuit traductum, qui eam præ-  
 ferat Armenæ, quæ Imperatori ex *Turcia* al-  
 lata erat. An à priore differat nescio.

Pag. 43. lin. ult. adde:

4. Bolus candidus *Offic. candidus Ligni-*  
*ensis seu Terra sigillata Goltbergensis Charlt.*  
*Ex. Axungia Lunæ Chymicis weißer Bolus.*

Effoditur ad Goltbergam in Ligies, & Stragonium. *Vires.* Capitis dolores mulcet & mitigat, cerebrum roborat, Diarrhœæ & Dysenteriaë medetur, albumque Uteri fluorem peculiari vi curat.

## II. De Argillis.

Pag. 45. lin. 2. subjunge:

3. **T**erra Lemnia alba *Offic. Worm. Charlt. Ex* weisse Lemnische Erde. Aliquantulum tenax & lubrica est, ob pinguedinem, adeo ut linguæ adhæreat sine mordacitate. Si in aqua resolvitur, similis erit molli ceræ. In Insulæ Lemno eruitur. *Vires.* Sanguinis ex Utero profluvia, & fluxus muliebres compefcit, venenis morbisque malignis resistit; rabidi canis morsui medetur.

4. Terra Eretria *Offic. Charlt. Ex.* Eretrianische Erde. Duæ sunt Eretriades, una alba est altera cinericea. Optima habetur ad cinerum ceum colorem vergens perquam mollis: quasi per æramenta tracta tractim ducatur lineam violaceam refert. *Vires.* Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, leviter mollientem: cava explet, & sanguinolenta conglutinat. *Diosc.*

5. Pnigites *Offic. Charlt. Ex Worm.* Terra Pnigites *Diosc.* schwarze Erde. Pinguis est, spissa, mollis, nigra, adstringens & acris valdè, sapore Vitriolum refert. *Vires.* Eosdem effectus habet quos Cimolia, paulo tamen infirmior est. *Diosc.* Partibus diversis constare affirmat *Wormius.*



Pag. ead. lin. 10. post *Vulgò* adde:

Sive Terra Strigensis. Sigillata Strigoniana  
*Charlt. Ex. Silesiaca sigillata qui Chymicis Axungia Solis dicitur ejusd.* Terra sigillata Silesiaca, sive Terra sigillata Germanica, Sigillum Strigoniense, Axungia Solis Chymicorum *Worm.*

Pag. ead. lin. 11. post *Erde* subjunge:

*Strigische Erde.* Terra est lutei coloris, ad vedinem vergens, pinguis, viscosa, instar tyri in aqua vel ore diffuens. *Vires.* Cum terra Lemnia viribus convenit, sed efficacior. Magnopere laudatur à *Sennerto Lib. de este.*

8. Terra Turcica *Offic. sigillata Turcica brod. Pastilli Turcicis characteristis insigni- Worm. Türkische Erde.* Color internus totus massæ cinereus. *Vires.* Pro terra Lemnia communiter venditur, cujus viribus respondet.

9. Terra sigillata Livonica *Offic. Worm. Charlt. x. Siesländische Siegel- Erde.* Rubicundior est quam Terra Silesiaca. *Vires.* Valde adstrictiva est; ideoque in Dysenteria, Diarrhœa aliisque profluviis commendatur.

Pag. 47. lin. 28. adde:

13. Terra Chia *Offic. Charlt. Ex. Worm. Erde aus er Jusul Chios.* Ex Insula Chio allata est terra crustosa, candida, vergens ad cinereum, samiaë similis. *Vires.* Ad rugas abstergentias, ad ambusta aliaque ad quæ Samia commendatur. *Worm.* Ejus loco substitui potest vel Samia vel Cimolia alba.

## III. De Marga.

Pag. ead. lin. 15. adde:

**A** 1. Marga *Offic. Schrod. Mer. P. Steinmarch Mergel.* Variæ sunt species & colores, ut ruffa, grisea & lutea. Est portio quædam pinguis & quasi medulla in saxis nonnullis dum franguntur reperta. *Vires.* Siccat, adstringit, consolidat, sarcotica est, tartarum, sanguinemque coagulatum resolvit. *Schrod.*

2. Marga saxatilis cinerea *Offic. Worm. Golarica Agric. Utschfarben Marck.* In saxorum cavitatibus & fissuris reperitur.

Cinerei est coloris, ex crustis crassis constans, sapore acidiusculo. *Vires.* Adstringentem & Emplasticam vim habet, sanguinis profusum sistit. Externè cum Terra Samiâ viribus convenit.

3. Marga saxatilis incarnata *Offic. Worm. Charlt. Ex. Fleisch fârbicht Marck.* Ex montibus Bohemicis & Lygiis allata. Terra est pinguis & lubrica, colore incarnato, ponderosa, linguæ adhærens, digitos subluteo colore tingens. *Vires.* Prodest ruptionibus, fracturis, fluxionibus, Hæmorrhœicis Dysentericis; venenis morbisque pestilentibus resistit.

4. Marga candida *Offic. Feroensis Charlt. Ex. ex insulis Feroensibus Worm. Stenomarga Agric. Agaricus mineralis Imper. Lapis Morochthus Boet De Laet. Lac Lunæ quibusdam Weisser Stein Marck.* In Germania reperitur.

ur. Substantia est fungosa, alba, friabilis. *Vires.* Refrigerat, adstringit, Sanguinis eruptiones sistit.

A. 5. Lapis Morochthus *Offic. Boet.* Morochthus *De Laet.* Morochthus aliis Leucogæa, Leucographis, Galaxius, Graphida, Galactites *Worm. Charlt. Ex. Weisser Marmor.* Est substantia mollis, lubrica, colore varians, viridis, aliquando alba, nigra, vel mellis. Reperitur in Anglia, Saxonia, Ægypto, &c. *Vires.* Convenit iis qui sanguinem expuunt, celiacis, & vesicæ doloribus, ad fluxus maricis commendatur. Ulcera oculorum sanat. *Diosc.*

6. Lapis Galactites *Offic. Boet. de Laet.* Milchstein. Substantia est molli, cinerei coloris, gustu dulcis. Invenitur in Saxonia. *Vires.* Laudatur ad fluxiones oculorum, & ulcera *Diosc.* Nutricum Lac auget *Boet.*

7. Lapis melitites *Offic. de Laet. Boet.* Honigstein. A Galactite tantum colore & dulcedine differt. *Vires.* Eiusdem cum Galactite effectus *Diosc.* Abstergere paulo magis ac paulo alidior Galactite videtur *Galen.*

*Inter Morochthum, Galactitem & Melititem hoc discriminis ponunt, quod Morochthus lacteum succum edat, absque mellis dulcedine, nec albus, nec cinereus existens. Galactites vero albus vel cinereus est, lacteum succum sine mellino sapore promens. Melitites vero vario colore, succum lacteum mellis dulcedine exhibet. Sic Wormius, verum has tres Jo. de Laet. lib. de Gemmis & Lapidibus p. 142 inter*

ter se differre statuit, & hoc modo distinguit. Qui igitur cinereo colore constat aut nigro, Galactites fuerit: qui flavescit, mellis similitudinem etiam in colore referens, merito dici possit Melitites: subviridis autem Morochthus. Nitel autem gemma instar Morochthus magis quam ceteri.

8. Lapis Thyites *Offic. Boet. de Laet. Grünstein.* Subviridi est colore, Iaspidem imitatus, cum diluitur tamen lacteum succum reddit. Vehementer mordet. In Æthiopia gignitur. *Vires.* Tenebras, quæ pupillis obversantur, expurgat *Diosc.*

Thyites *Dioscoridis* quid fuerit nobis incognitum est. At neque superioris seculi scriptoribus melius intellectum. *Fuchsius* lapidem Turcicum esse existimat, cujus opinio à *Matthiolo* bene refutatur, ad quem lectorem remitto. *Agricola lib. 6. de Nat. Fossil.* à Morochtho nihil differre iudicat.

#### IV. De Creta.

Pag. 50. lin. 18. adde:

**A.** 3. Plumbum nigrum *Offic. Nigrica* fabrilis *Mer. Pin. Charl. Ex.* An Creta nigra mollis & dura argenteis maculis nitens *Kentman? schwarze Kreiden.* Invenitur in fodinis. Mollis est, sed tamen consistentiæ firmioris, lævis & splendens, non petrosa, in frustra variæ magnitudinis divisa. *Vires.* Refrigerat, siccatur, repellit. Usus præcip. adversus strumas tumoresque frigidos & Phlegmaticos. Ad ducendas lineas, & monochromata à *Pictori-*

toribus & fabris usurpatur. N. B. Optima  
ensetur quæ invenitur in Anglia, quæ ex Hispania  
adfertur fragilis est, pessima quæ ex India Orientali  
advehitur.

4. Creta Selenusia Offic. Selenusia Terra  
quibusdam. Selenusische Erde. Maxime lau-  
latur, quæ vehementer resplendet, candida,  
friabilis & humore dilui celerrimo. Vires. Sic-  
cat & astringit, ad ulcera commendatur.

---

## SECTIO TERTIA.

De

### Sulphuribus Medicamentosis,

#### III. De Bitumine,

Pag. 54. lin 8. adde:

**W**ormius Gagatem duriozem tantum  
lapidis speciem facit, cumque  
expolitur à Plinio Gemmam Samo-  
thraciam, à Nicandro Lapidem Thra-  
cium, à nonnullis lapidem Obsidianum voca-  
ri ait.

A. 2. Lithanthrax Offic. Mer. Pin. seu Car-  
bo fossilis Charlt. ex Boet. Carbo fossilis seu  
Lithanthrax Worm. Stein Kohlen. In agro  
Derbiensi, &c. reperitur. Vires. Exsiccandi & di-  
gerendi vi pollet Worm.

Pag. 54. lin. 19. adde:

4; Lapis Thracius Offic. Thracischer Stein.  
Nasci-

Nascitur in flumine quodam *Scithiæ*, cui *Ponto* nomen est. *Vires*. Vis ei *Gagatis Diosc.*

Varia inter Authores occurrunt opiniones de hoc lapide. *Matthiolus* historiam ejus ex *Galeno* his verbis tradit: *Est & alius lapis, cujus meminit Nicander hunc in modum,*

*Si lapis uratur candenti Thracius igni, &  
Post madefiat aqua, flagrabit totus: at idem  
Mox oleo affuso, penitus restinguitur: adfert  
Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomen  
Cui Pontus, ---*

*Verum nullus ejus in medicina usus: neque Nicander præter graveolentiam, quæ suffitu feras fugat, quicquam ei adscripsit.* Verum fabulosum potius quam verum esse concludit, cum nec à seipso nec ab amicorum quoquam in *Italia* inveniri potuerit. *Boetius de Boet* nonnullos eum pro *Gagate*, alios pro *Lithanthrace* habere ait. In *Officinis nostris Anglicanis* hodiernum incognitus est. Verum cum *Dioscorides* *Gagatis vires* ei attribuit, *Gagates* pro eo substitui & usurpari potest.

Pag. 56. lin. 4.

Ex hoc Bitumine, addito olei Anisi tantillo *Pharmacopolæ nostri Londinenses Balsamum Chilenfis* nomine celebratum conficiunt.

## SECTIO QUARTA.

De

## Salibus Medicamentosis.

## I. De Sale Communi.

Pag. 59. lin. 24. post *pollet* subjunge:

**M**odus excoquendi Salem ex aquis fontium Salinorum in *Cestria*, *Wigornia* & *Staffordia* describitur à doctissimo viro & amico nostro D. *Joan. Raio* in *Sylloge Vocum Anglicarum* p. 204. Item in *Actis Philosoph. Lond.* N. 53. 54. 142. & 156. Necnon à D. *Willins* Tractatu de *Sale* & *Piscatura* p. 5. & D. *Plot.* *Ist. Nat. Stafford.* p. 93.

Hoc in loco addere possem modum purificandi Salem, qui fit vel dissolvendo Salem peum vel Salem marinum Gallicum in aqua marina, deinde coquendo, clarificando, in granula coagulando, prout in *Essèxia* ministratur: idem fere est cum Salis *Cestris* depuratione.

*Marburia* in *Cestria*, Anno Dom. 1670. detecta est Petra Salis Nativi, unde emanat liquor visus valdè acutus. Petra hæc inter 33 & 34 pedas nostræ mensuræ à terræ superficie asurgit, estque duritie & puritate Alumini par, que pulverem comminuta in salem candidum & acutum abit. Qui plura de hac rupe scire desiderant *Act. Philosoph. Lond.* N. 66. consulant, Ex hoc salis genere ex *Cestriæ*

comitatu per mare ad nos delata prope *Camalodunum* efficitur Sal ille, qui apud *Essexenses* *Salz auff Salz*. i. e. Sal super Salem, seu Sal ex Sale dictus.

Aqua è fontibus salinis mediterraneis ad siccitatem excoquatur, rursus ejus Sal tantillo aquæ fontanæ diluatur, cristallos verè cubicas dat (*ut scribit clarissimus D. Mart. Lister D. M. in exercitatione sua de Fontibus medicatis Angliæ p. 4.*) in medio verò superiore latere, sive plano, velut quædam perspicuitas, puta à materiæ deficientiæ sive inanitate habetur: reliqua autem quinque latera solida & albida sunt.

Idem etiam laudatissimus Autor observat quòd non obstante proxima affinitate, quæ inter Salem puteorum mediterraneorum & marinum intercedit, eos tamen specie inter se differre: siquidem anguli cristallorum salis puteorum mediterraneorum integri sunt, ut dictum; cum anguli cristallorum genuini salis marini, aut eorum saltem aliqui in plana triangularia abscissi sunt, ab uno cuborum latere: undè colligit aquam marinam ab omnibus aliis aquis distinctam esse. Qui plura de his velit eundem doctissimum Autorem consulat, apud quem utriusque generis figuras inveniat. Videtis etiam *Act. Philosoph. Lond.* n. 156, p. 492.



Pag. 60. post lin. 14. adde:

## II. De Sale Gemmæ.

**S**AL Gemmæ supra dicto modo solutus, in crystallos cubicos coagulatus, ideòque ab eodem D. Lister pro eadem Salis specie habetur.

## III. De Sale Nitri.

Pag. 61. lin. 4. subjunge:

**I**ngeniosissimus vir D. Martinus Lister in libro suo citato figuras crystallosum Nitri exhibuit ut & eorundem descriptionem, quam huc transcripsi: *Nitrum, in crystallos sexangulas tenues, longas, & æqualiter crassas concrescit. Hæ, crystallos sua latera parallelogramma habent. Eadem autem desinunt, ex altera tantum parte, vel quadam acie, vel mucrone, pyramidis in modum acuminato, scilicet, ob varium positum duorum planorum laterum. Ex altera vero parte haud poliuntur crystallos, sed semper quasi præfractæ desinunt; idque moneo, ne Nitri figura à me primùm delineata & evulgata, & à quodam ut video nuper minùs rectè exposita, aliquem decipiat.*

Notandum autem est, mucronem illum acuminatum, quam ferè ex altera parte uniuscujusque crystallos nitri, ad modum cori figuratum esse diximus, ex ipsa prismæ extremitate esse constitutum, & nullatenus, ipsum prismæ corpus extenuari: quod tamen multos de his nitri crystallos incautè somniare video. De simplici autem & primaria harum crystallosum concretione loquor: nam fortuita quadam plurimarum coitione id aliquando evenire videtur.

E

At illa  
quidem

quidem differentia notanda est, quòd quæ sic fortuito coeunt, eadem, si denuò aqua diluantur, in perfectam sui generis speciem tandem ex toto reduci possint.

Præter Crystалlos verò sexangulares è sale petræ diluto formatas, ibidem etiam non rarò (si id sal minus purgatum sit) alias quoque crystалlos cubicas multangulares, nescio quasdam reperias: & hæ omnes seorsim collectæ, ex nova solutione, vel in crystалlos Nitri supra descriptas abeunt, vel suam originem, si alienæ sunt, fatentur. Sal autem Nitri dictus in ignem impositus, illicò flammam tenuem concipit, & ex toto non sine strepitu absumitur, omnino nihil capitis mortui, aut Colcotharis, ut Chymici loqui amant, relicto.

Pag. 60. ad finem paginæ adde:

Hic æquum esse judico errorem à me superiori volumine admissam agnoscere & emendare. Salem scilicet *Salis petræ* memini, ut qui quotidiani usûs esset in culinâ nostris, p. 61. quem p. 62. *Salis petræ* ex Indiis advecti speciem nondum depuratum esse affirmavi, verùm postea melius edoctus agnovi *Salem* illum *Salis petræ* dictum *Salis marini* speciem esse adhærentem lateribus & fundo doliorum *Rühl'sasser* dictorum, in quæ liquor post primam *Salis Petræ* depurationem ex aheno cochlearibus infunditur ad refrigerandum usque dum digitus absque læsione in eum immiti possit, antequam in vasa ad crystallizandum, *Christallisir Gefässe* dicta, exprimitur. Vide *D. Collins* librum superius me-

moratum, p. 125. ubi affirmat coctione valida glebas affici Sacchari panum conicorum aut Aluminis magnitudine, quæ à *Pharmacopolis* nonnunquam Salis petrae depurati nomine divenduntur.

#### IV. De Alumine.

Pag. 63. lin. 3. adde:

**F**iguræ Aluminis, ejusque pariter descriptio à D. *Lister* libro prædicto traditur his verbis: *Lixivium* è cremato Aluminis metallo diuque servato percolavimus, siccavimusque: id autem *Crystallos albas* ad hunc modum figuratas dabit; nimirum his figura paululum compressa est, ex altera parte, quasi vertice dicas, planum sexangulum habet, ex altera & opposita parte sive basi plano similiter sexangulo insidet; ejus autem latera claudunt tria sexangula plana, quibus alternatim bina plana quadrangula interponuntur, ita quælibet integra aluminis *crystallus* ex undecim planis conficitur: Scilicet, è quinque sexangulis, & senis quadrangulis planis: illa autem ipsa *crystallus* quam descripsi, quinquaginta circiter grana pendebat. N. B. Simplex autem & primario universorum salium concretio benè, & diligenter notanda est. Nam ubi ea diutius processit, *crystalli* quidem magnitudine augeri videntur: At id serè sit plurium salium integrorum & primariorum conjunctione quadam fortuita, unde verè & naturalis *Crystallorum* figuræ confusio oritur.

Pag. 63. lin. 11. subjunge:

Modus efficiendi Alumen rupeum *Solse* in

Italia accuratè traditur à D. Paulo Boccone in Museo suo della Fisica, &c. quem consulat Lector. In plerisque convenit cum præparatione Aluminis vulgaris.

### V. De Borace.

Pag. 64. Ad finem Capitis 5. adde:

**V**ires. Digerit, exsiccat, & sine morfu carnem liquefacit. Ulceribus quæ consolidationem respuunt cum fructu accommodatur, modice pota vomitus movet. *Worm.*

### VI. De Vitriolo.

Pag. 64. lin. 28. subjunge:

**W**ormius etiam hujus generis Vitrioli in Anglia parandi modum descripsit, quem quia brevis est ipsius verbis huc transcribere non pigebit: *Lapides ex quibus Vitriolum excoquitur ad littus Orientale Insulæ Sheppey reperiuntur. Ubi ingentem horum copiam collegerunt, per spatiosam aream terræ mistos spargunt donec imbrium illuvie, accedente Solis æstu & calore in terram seu pulverem redigantur subtilissimum, nitrosum sulphureum odore prætereuntes offendentem. Interea aqua per hanc terram percolata in subjecta vasa per tubulos & canales derivata in vasa plumbea ampla sex vel septem dierum spatio coquitur ad justam consistentiam, tum in aliud vas plumbeum effunditur immixtis asscribus aliquot, quibus adherens concrescat vitriolum omnibus refrigeratis. Nullo alio vase coqui aut contineri hoc lixivium potest quàm plumbeo; cui ut facilius ebulliat ferri injiciunt particulas,*

las, quæ à lixivio plane consumuntur. Modus etiam Vitrioli *Brickleia* in *Essèxia* conficiendi à celeberrimo Viro D. *Jo. Raio* vicino & amico nostro tradita in libello supracitato, cum processu *Wormiano* convenit: Eandem methodum, in Vitrioli præparandi domibus *Waltoni* & *Ramseia* in Eadem *Essèxia* sectatam observavi. Verùm in *Italia* ejus præparandi modus diversus est, ideòque *Matthioli* verbis descriptum dabimus.

*Minera glebas in acervos mediocres coniectos igne supposito accendunt. Sponte autem urunt semel accensa, donec in calcem seu cineres maxima ex parte relucantur. Mineram combustam in piscinas aquæ plebas obruunt, agitando, miscendoque eam, ut aqua imbuetur substantia Vitrioli. Aquam hanc Vitriolatam à sedimento claram hauriunt; & in caldaria lumbea transfundunt, quam igne supposito decoquunt. Verùm dum ebullit, in medio coctura vel parum supra vel infra addunt modicum ferri veteris vel glee æris, juxta intentionem operantis. Aquam Vitriolatam decoctam in vasa lignea transfundunt in quibus frigescentis congelatur in Vitriolum.*

Vitriolum viride à prædicto D. *Lister* pariter depingitur & describitur his verbis: *Vitriolum autem viride, à Pyrite ferreo nascitur; cuius maturæ & perfectæ crystalli perpetuò ex utraque arte mucronatæ sive acuminatæ sunt, & ex decem lateribus inæqualibus constant: scilicet, ex quatuor mediis planis pentagonis, & ad singula quæque extrema acuminata, terna plana triangula habent; erinde ut in figura representatur.*

Pag. 65. lin. 21. adde:

Apud *Goslarienses* conficitur Vitriolum hoc modo: Calcinantur Lapidēs Pyrites dicti, calcinat liberiori aëri exponuntur, sic enim vel spontè efflorescit Vitriolum, vel per elixationem cum aqua prodit.

## SECTIO QUINTA.

De

### Fossilibus Metallicis Medicamentosis.

**L**apis Schistus *Offic. Worm. Boet. De Laet. Charlt. Ex. Schiefer-Stein.* Ex Germania transportatur. Substantia est metallica crocei coloris, si optimus fuerit, alias nigricat, laminas habens tenues, invicem hærentes, splendentes, & perspicuas, *Vires.* Vim exhibet Hæmatitæ, sed ad omnia infirmiozem *Diosc.*

#### VI. De Cobalto.

Pag. 70. post lin. 18. adde:

**P**Ræter colorem *Ultramarinum* dictum à *Lapide Lazuli* & *Armenio* factum pag. 84. *Pharmac.* nostræ memoratum, pro cuius præparatione addiscenda ad *Boetium Lectorem* remitto: Aliud cœrulei genus est, non tantum à *Pictoribus*, sed etiam à *Matronis* & *lotricibus* nostris usitatus, *Schmelzblau* dictus, sed frequentius à forma ejus *blaue Stärke* i. e. *Cœruleus*

*ruleus pulverisatus*, qui à Cobalto, cineribus clavellatis, & silicibus albis conficitur: cujus conficiendi modus apud *Saxones* in *Germania*, prout ab amicissimo viro D.  *Davide Krieg* M. D. mihi communicatus est, sic se habet. Primo Cobaltum in mola in tenuissimum pulverem comminuitur, cumque cineribus clavellatis mixtum in fornice funditur in vitrum obscurè cœruleum; deinde iterum commotum, & cum idonea quantitate silicum alborum mixtum denuo funditur in vitrum, quo tandem pulverisato partes tenuiores lotionem separantur & postea exsiccantur. N. 1. Quò plures silices post primam fusionem materiæ admiscantur, eo major erit Smalti quantitas, verùm pallidior. 2. Inter lavandum, quod primò à massa abscedit purius & pallidius est posteriore.

## *VII. De Phrygio Lapide.*

[*Apis Phrygius* *Offic. Boet. de Laet. Phrygischer Stein.* Nascitur in *Cappadocia*. Est leba pumicosa, præfertur qui pallescit, pondere mediocris absque solida compage, acineis albis *Cadmia* instar distinctus est. *Vires.* Astringendi expurgandi & crustas inducendi vim habet. Lavatur ut *Cadmia*. *Diosc.* Morbis oculi, atque ad ulcera &c. utilis est. *Valen.* In *Officinis nostris Anglicanis* hodie gnota est.

## IX. De Sory.

Pag. 71. lin. ult. subjunge:

4. **M**Elanteria *Offic.* Duplicis est Originis, quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur salis modo concrevit. Alia verò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, levis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. *Vires.* Vim causticam eam obtinet, quam & Misy. *Diosc.* In officinis nostris nunquam reperitur.

## X. De Asio Lapide.

**L**apis Asius *Offic.* Asius vel Assius lapis quem etiam Sarcophagum vocant *Worm. Charlt. Ex.* Sarcophagus sive Assius lapis *De Laet.* & Asius seu Assius lapis *Boet & Stein.* Est minerale leve, fungolum, friabile, scissile, pumico colore, sapore falso. In *Usu.* Minera, falsugo subflava summo lapidi insidens, compage tenui, gustu mordente. *Vires.* Utraque vim habet adstrictoriam, & modicè erodentem. Ulcera vetera siccant & cicatrici repugnantia sanant, excrescentia cohibent: cava explent; tetra ulcera & fungis similia expurgant. *Diosc.* Longè validior flos seu falsugo existimatur.



I. De Metallis perfectis, quorum  
mineræ in usu Officinis non sunt.

VI. De Cupro,

Pag. 78. lin. 16. post *infringendi* adde:

**F**LOS æris *Offic.* Spangrün. Sunt parva, subrubra, splendentia granula, seminis illi magnitudine aut minora, quæ laminæ creæ, supra vaporem ab aquâ æris liquefacto cum è fornace effluit inpersâ elevatum pensæ accrescunt. In fornacibus, ubi æs cum funditur in Tridentino agro, sæpius legit Matthiolus in hunc modum. Cùm in fornaci liquatum, in paratum receptaculum extra fornacem diffunderetur, anteam omnino coiret in massam, frigidam super ipsum adhuc ignitum infundebat, statimque vapor magnus excitabatur, sub quo ox ferream laminam & eam quidem amaram, subiciebat, tamdiuque tenebat donec cessabat vapor. *Vires.* Adstringit, & excrementia coerces: offusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet. *Diosc.* Terriorum partium facultatis est, quam aut æstum aut squama. *Galen.* Nusquam in Officinis nostris reperitur, quapropter ejus vice rugine perpetuò utuntur.

## SECTIO SEXTA.

## I. De Lapidibus minus pretiosis

Pag. 82. lin. 11. adde:

## II. De Lapide arenoso.

**A** Lapis arenosus *Offic.* Saxum arenarium *Worm. Boet. Charlt. Ex.* Ammites vel Hammites, *Mer. Pin. Sand Stein.* Lapis est asper & veluti ex arenis compositus. Variis in locis invenitur.

Pag. 91. post cap. 3. addatur:

## V. De Adarce.

**A** Darces *Offic. Boet. Adarce J. B. Chab.* Est tanquam concreta falsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Afii similis & omni forma Alcyonia, & aliquantum cavo proxima, ut videri posset lacustre Alcyonium. *Vires.* Ad evellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, similia accommodatur. Et in summa vis ei acris. Humorem evocat, qui in alto concrevit, & Ischiadicis prodest. *Diosc.*

Utrum Adarces *Dioscoridis* idem sit cum eo *D. Plot.* in *Hist. Nat. Oxoniensi*, p. 126. non ausim determinare, neque an vires eadem sint, à quoquam hæctenus, quod sciam, exploratum fuit. *Plotii* Adarces nihil aliud est quàm con-

con-

concretio particularum lapidearum, colore calbido, quas aqua ad occurſæ aquæ altus, chalibeatæ ſcilicet, præcipitat, adeoque ramina, virgultas aliaque corpora quæ præerfluit incruſtat.

Hujusmodi incruſtationem obſervarunt multi eruditi Autores, ut v. g. *Pancirollus* quatuor circiter ab urbe *Roma* milliaribus extra portam *Hoſtiensem* vulgò *Sancti Pauli*, & *D. Martinus Liſter*, M. D. in *Aquæ-ductu Arcuoil ad Parisios*, qui exinde malam de ea opinionem concipiunt, poſterior utique doctiſſimus & laudatiſſimus vir inde colligit quicquid in quæ-ductibus, tuborum aquas deferentium tera cruſtâ petroſâ obducit: idem in reniſus & veſica, præſertim infirmiorum & teneriorum effecturum veriſimile eſſe. Vid. *er ad Parisios* § *Exercitat. de calculo humano.*

Qui plura de *Adarce* velit *Boetium* conſultet, p. 403.

Pag. 84. pro 7. cap.

## VII. De Unicornu Foſſile.

**A.** Unicornu foſſile *Offic.* Cornu foſſile *Worm. Charlt. Ex.* foſſile vulgò *Monocetotis cornu Boet.* *Ceratitis Fejn.* *Ebur foſſile Luſ.* *Lapis Arabicus Ceſalp.* *Dens Elephanti retreſactus aliis Lithomarga alba.* *Gegraben Einhorn / gegraben Elffenbein.* Eſt ſubſtantia lapidea, colore, lævore, & forma, quandoque cornu referens; quandoque durius, quandoque mollius; cortice exteriori duro, flavescen-

scente, nigro aut subcinereo; medulla molli, friabili, compacta, linguæ firmiter adhærente, sapore adstringente, & exsiccante. In fodinis reperitur. *Vires.* Cum Terra Lemnia viribus convenit, & contra morbos malignos commendatur.

Pag. 86. pro X. cap. adde:

### X. De Thermolitho.

**A.** Thermolithus *Offic.* Lapis Schistos *Charlt. Ex.* Schistos Cornubiensis diu calorem retinens *Mer. Pin. Warm-Stein.* In Agro Cornubiensi reperitur. Hunc in Catalogo Simplicium medicinalium ad calcem Pharmacopœia D. *Skipton* insertum invenio, sed de usu ejus medicæ nihil occurrit inter Autores.

Pag. 88. lin. 4. adde:

Eruditissimus vir D. *Martinus Lister*, M. D. in *Itinere suo ad Lutetiam Parisiorum* hujus Gypsi seu Alabastritis ad *Montmartre* fodinas esse refert; quodque ibidem igni aperto exposita uratur: Durissimum autem genus duarum triumve horarum spatio satis coquitur. Se etiam fodinas ejus vidisse ait prope *Clifford-Moor* in *Eboracensi* provincia ubi *Hall-plaster* dicitur. *Saal-Plaster*: cœmentura quo atria obducuntur.

### XVIII. De Ludo Paracelsi.

**A.** Ludus Paracelsi *Offic.* *Helmont, Charlt. Ex.* Silex ille quem *Helmont Ludum Paracelsi*

elli vocat *Worm*. *Wachs: Aldern*. Lapis est uccini citrini colore, magis tamen opacus, ariae magnitudinis, venarum instar lapidem obscure cinereum transcurrens. In maritimiis saxosis sæpius invenitur. *Vires*. A *Paralyso* pro *Lithonriptico* commendatur. *D. ren* diureticum probum esse existimat, & ad arenulas expellendas usui esse posse.

### XIX. De Silice.

*A. Silex Offic. Boet. Mer. Pin. Worm. Charlt. Ex. Rieselstein*. Ubique reperitur. *Vires*. licum communium usus esse potest, ad tarream mucilaginem incidendam, calculum solvendum, ac proinde ad obstructions ferandas. Extrinsecus frequenti usu in dentifriciis adhibentur. *Schrod.*

### XX. De Lithocolla.

*Lithocolla Offic.* Est glutinum inquit *Dioscorides* quo lapides junguntur: conflatur autem ex Marmore, Lapide Pario & tauro glutine. *Vires*. Potest candente Speciladmotum, incommodos oculis pilos reicere. *Diosc.*

### XXI. De Molari.

*A. Lapis molaris Offic. Mühl: Stein*. In Agro Derbiensi effodiuntur. Hunc in catalogo simplicium Officinalium ad calcem pharmacopoeiæ *D. Shipton* insertum invenio, quam rationem nescio, cum usus ejus in

Anglia, quantum novi, solus est ad frumentum comminuendum.

## XXII. De Cote.

**A.** Cos *Offic. Worm. Charl.* Ex. Cotes *Boet. Novaculæ Mer. Pin. Weßstein.* Lapis durior est, ferramentis acuendis aptus: Estque vel Oloarius, colore flavicante, *Probiere Stein/* vel aquaticus, isque vel albicante colore. *Schleiffstein /* vel nigricante *Weßstein* dictus. *Vires.* Ramatum attritum Alopecias pilis explere, mammas prohibere ne intumescant, lienem extenuare cum aceto potum, & comitialibus prodesse. *Diosc.*

## XXIII. De Marmore.

**A.** Marmor album *Offic. Worm. Parium Boet. Charl.* Ex. *weißer Marmor.* Ab Alabastro vulgari tantum duritie distat, & splendore cum politus est. *Vires.* Internè sumpta calculus resolvit. *Galen.*

Pag. 88. post lin. ii. pro 15. cap. adde:

## XX. De Porphyrite.

**P**ORPHYRITES *Offic. Worm. Charl.* Ex. *Boet. Parphyrie. Roth Marmelstein.* Marmor est durissimum rubrum. *Vires.* Lithonripticer esse creditur, & cum Ophite viribus convenire.

## II. De Lapidibus Medicamentosis formatis.

### I. De *Ætite*.

Pag. 90. post lin. 21. pro 2. spec. adde:

**A.** *Geodes Offic. Boet. De Laet. Ætitis tertius Worm. unechter Adlerstein.* Vas in locis sabulosis & glareosis reperitur Anglia. Lapis est rotundus aut oblongus, colore rubiginis & pugni sæpe magnitudine, terram, aut lutum, aut arenam coniens. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

### De *Lapide Lyncis*.

Pag. 91. linea ult. adde:

2. *Ceraunia sive Fulminaris Lapis Offic. Ceraunias Boet. De Laet. Donnerkeil / Donnersteyt / Stralsstein.* Cunei pyramidalis plerumque figura, colore aut nigro, aut fusco. Germania reperitur. *Vires.* Mulierculæ defluxionibus in genas, mammillas, &c. Ricant: In Hydrope & Ictero etiam profusus dicitur *Witz. in Schrod.*

### IV. De *Astroitide*.

**A.** *Astroites seu Stellaris Lapis Offic. primum Boet. quartus Plot. Hist. Nat. Ox. p. 88. Tab. fig. 7. Lithog. Brit. N. 163. Charl. Ex. Stellalapis De Laet. Sternstein.* Lapis est rosus moderate durus, colore albido, ad capi-

capitis humani magnitudinem quandoque  
 excrescens. In fodinis tam Angliæ quam  
 Germaniæ reperitur. *Vires.* Antiloimicus  
 putatur, & vermes necare exhibitus infanti-  
 bus ad gr. 4. *Witz. in Schrod.*

### III. De Lapidibus pretiosis opacis.

Pag. 92. lin. 1. adde:

#### I. De Achates.

**A.** Achates *Offic. Worm. Mer. Pin. Boet. Charlt.*  
*Ex. De Laet.* Ein Achat. Lapis est vario-  
 rum colorum: ab Onyche differt quod hæc  
 zonis & crustis variorum colorum; Achates  
 vero lineis & maculis ludat. A Jaspite du-  
 ritie & lævore. *Vires.* Venenis pestiferis  
 ut & Viperarum & Scorpionum ictibus resolu-  
 stere creditur; cor recreat, sitim febricanti-  
 tium ore contenta sedat.

Pag. 92. pro 3. & 4. species adde:

#### III. De Sardonyche.

**S**ardonyx *Offic. Boet. Charlt. Ex de Laet.* Ein  
 Sardonier. Ex Sardio & Onyche à na-  
 tura simul composita est. Qui plura de Sar-  
 donyche velit consulat, *Jo. De Laet. p. 70.*

#### IV. De Chalcedonio.

**C**halcedonius *Offic. De Laet. Boet* alius Car-  
 chedonias *Charlt. Ex.* seu Carcedonius

*Worm*



*Worm. Chalcedonier.* Gemma est quasi per nomen, vel nullo vel levi aliquo colore tineta, semiperpicua, Sculpturæ propter duritiam contumax. *Vires.* Contra omnia atræbilis symptomata commendatur.

*Boetius* hanc differentiam inter *Onychen, Sardonychera* & *Chalcedonium* ponit. Quod *Sardonyx* sit, dum *Onychi Sardi* rubicundus color distincte adjunctus est. *Chalcedonius* dum adest rubicundus, & niger color distinctus. *Onyx* vero propriè, dum adest niger, & abest rubicundus.

Pag. 93. lin. 9. pro 6. adde:

### VI. De Memphite.

[*Apis Memphites Offic. Memphis, Stein.* Invenitur calculorum magnitudine, pinguis, versicolor. In Ægypto juxta Memphin reperitur. *Vires.* Trito & illito, quæ uenda aut secanda sunt, sine periculo obtupescere, ita ut non sentiant cruciatum. *Diosc.*

Hic Lapis quis fuerit à *Dioscoridis* temporibus in tenebris delituit, *Boetius* in capite de *Onyche* hæc habet; Dum zona alba imagine scalitur ac nigra zona loco strati substernitur, à nonnullis Memphitis, hodie *Camehnia* vocatur à *Gemnariis*, quasi alia gemma esset, & pag. 565. à *Ludovico Dulci* hæc citat: Memphitas à *Memphi* civitate dicta est. Bibita aut cum aceto macerata, stuporem inducit membris, ut absque dolore amputari possint.

Pag, 92. lin. 24. pro 8. & 9. & 10. cap. adde:

### VIII. De Malachite.

**M**alachites *Offic. Charlt. Ex. seu Molochites Boet. Molochites De Laet. Ein Malachit.* Ad Jaspidis, vel Prasii species referri potest. Opaca est, Malvæ instar viridis. Invenitur in Cypro, Misnia & comitatu Tirolensi. *Vires.* Pro extinguendo æstu febrili exhibetur. *Witz, in Schrod.*

### IX. De Turchoide.

**T**urchois *Offic. Worm. Charlt. Ex. Boet. De Laet. Ein Turckis.* Gemma est opaca, ex viridi, albo & cœruleo quasi composita, viride æris exacte referens: quidam Jaspidis speciem esse putant. *Vires.* Ad casum mirabiles ejus vires experti sunt. Imprimis memorandum exemplum quod *Boetius* de seipso refert, p. 266.

### X. De Prasio.

**P**rasius *Offic. Charlt. Ex. Boet. Prasus sive Prasius De Laet. Grün & Stein.* Maxima ex parte viridis est, sed raro sine punctis atris & aliquando alba distinctus, *Vires.* Smaragdi vires habet, verum minores, *Boet.*

IV. De Lapidibus pretiosis diaphanis.

S E U

De Gemmis.

Pag. 98. lin. 26. subjunge:

*X. De Adamante.*


**A** Damas Offic. Worm. Charlt. Ex. De Laet. Boet. Ein Demant. Gemma est durissima & preciosissima, sine colore, aquæ instar liaphana. Ex India orientali transportatur. Vires. Pro viribus consule præfationem nostram de Gemmis.



PHARMACOLOGÆ,  
SEU

*Manuductionis ad Materiam  
Medicam*

LIBER SECUNDUS.



De Phytologia

CLASSIS PRIMA,  
SEU

LITHOPHYTOLOGIA.

*De Plantis substantiæ Lapideæ,*

*De Corallio.*

**P**AG. 107. lin. 10. adde. *Vires.* Cum reli-  
quis viribus convenit. *Diosc.*

Lin. 16. subjunge:

*Corallium*, Germ. *Corallen* quod aliqui *Lithodendron* appellarunt, inquit *Dioscorides*, marinum esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atque emergit, tanquam effuso aëre protinus concreascit; cujus aut potius *Sextii Nigri* opinionem etiam *Plinius* sectatus est, & ante eum; *Ovidius* in Libro *Metamorphoseon*,

*Quo primùm contigit auras*

*Tempore, durefcit: mollis fuit herba sub nudis.*

Experientia hoc falſi convincit. Teſtan-  
tur enim viri fide digniſſimi, inquit Erudi-  
tiſſimus D. Raius, qui ejus piſcationi (ut lo-  
quuntur) interfuerunt non minùs ſub undis,  
quàm ſupra undas durum & lapideum eſſe,  
cortice duntaxat molli & muſcoſo (qui tamen  
facile deraditur) integri.

Machina quâ ad Corallium extrahendum u-  
untur indigenæ, ad Promont. *Cau de Creux*  
in Catalonia, eſt Crux lignea grandis, cu-  
jus centro, ut in aquis promptè ſubſidat af-  
gitur globus plumbeus magni ponderis: Huic  
utem adnectitur funis validus, prælongus.  
Inicuique cruci ſeu extremo crucis rete or-  
iculare appenditur. Demiſſa in aquas cru-  
e, cum Urinatores in imo mari rupem in-  
enerunt cavernoſam, Corallii foeram, is cui  
anis regendi cura demandatur, in ejus ca-  
a unum vel alterum Machinæ crus impellit,  
deoque Corallium (ſi quod inibi oritur) re-  
ibus implicitum abrumpunt & extrahunt qui  
uperne, in lembis præſtolantur. R. H. p. 61.  
quibus plura de Corallio adeat lector. Item in  
epiſtolis Boccone, *Fer. Imperatum* in *Historiâ &*  
*Gianſum, &c.*

CLASSIS SECUNDA,  
SEU  
BOTANOLOGIÆ.  
SECTIO PRIMA.

De Plantis Imperfectis,

Pag. 108. ante lin. 22. adde:

I. De *Alga graminea.*

**N**OTÆ sunt: planta submarina consistentia herbaceæ foliis gramineis in foliorum sinu semina continentis. R. Meth. Auct. p. 4.

*A.* *Alga Offic.* Ger. *Chav.* angustifolia vitrariorum C. B. J. B. *Fucus secundus* Diosc. marinus sive *Alga marina graminea* Park. See-Gras Meer-Gras. In litoribus marinis ubique reperitur. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vim habet refrigeratorem, non podagræ modò, sed etiam inflammationibus utilem. *Diosc.*

II. De *Fuco.*

**I.** *A.* *Quercus marina* *Offic.* Ger. *Park* *Fucus maritimus* vel *Quercus maritima* vesiculas habens C. B. sive *Alga marina latifolia* vulgatissima R. H. p. 70. *Synop. Plant. Ejusd.* See-Eiche. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

Descriptio quam *Quercus suæ marinæ* *Theophrastus*

*brastus* tradit, adeo brevis est & imperfecta, t Botanicis inter se altercandi occasionem habuerit. *Clusius* & *Casalpinus* Corallinae frutescentis speciem quandam esse volunt, qui-uscum consentire non possum, sed huc potius referendam censeo, quod *Theophrastus* quercum suam marinam folium oblongum, cassum & carnosum habere prodiderit.

2. *Fucus Offic.* tertius *Diosc.* Alga tinctoria *B.* tinctoria sive *Fucus marinus Rocella tinctorum* dictus *C. B.* *Fucus marinus Rocella tinctorum C. B.* Alga cornu cervi divisura *usd.* An *Fucus* sive alga membranacea purpurea parva *R. Synop.*? *Purpurfarbig Geesrasß.* In mari Mediterraneo reperitur, *Usu.* erba.

3. *Vitis marina* & *Lenticula marina Offic.* *Lenticula marina ferratis foliis Ger. Park.* *Fucus folliculaceus ferrato folio C. B.* *folliculaceus maritimus bacciferus Fjusd.* *Sargaso Pis. Deer & Einsen.* In rupibus maritimis, *Usu.* erba.

### III. De Musco marino.

**A.** *Lichen marinus Offic. Ger. marinus platyphyllos P. Al.* *Fucus marinus, Lactumarina* dictus *Park.* primus *Diosc.* *Lactucæ lio Kl. Bot. T. Inst,* *Muscus marinus Lactucæ lio C. B.* *Lactuca marina Chab.* marina sive tybacea *J. B.* *Sec Leber-Kraut.* *Petris, Scrotilis* ipsisque testis adnascitur. *Usu.* Herba,

*Vires.* Cum Alga viribus convenit. Adversus Serpentes dedit *Nicander*.

2. Muscus marinus *Offic. marinus capella-ceus Dioscoridis Park. marinus capillaceus Discoridis Donati R. H. p. 79.* Fucus capillaceo folio *Theoph. Meer & Moos.* In mari Adriatico invenitur, in scopulis testaceisque. Planta est gracilis, capillacea, caulis expers. *Ufu.* Tota planta. *Vires.* Præcipua ei spissandi vis, & collectiones cohibendi, & podagras; quas refrigerare opus sit. *Diosc.*

Hæc planta *Constantino* pro Musco marino *Dioscoridis* accipitur, cum quo potius consentio quàm cum iis qui pro Musco illo *Corallinam* *Officin.* habent. *Parkinsonus* noster pro Fuce capillaceo folio *Theophrasti* habet.

Pag. 109. lin. 3. subjunge:

### V. De Alcyonio.

Quenam sint corpora illa Alcyonia *Græcis dicta,* Unde originem habeant, inter *Botanicas* controvertitur, & adhuc dubium manet. *Plinius* nidos quarundam avium in mari extructos esse tradit. Imperatus minuta paleæ & pilorum frustula, in massas agitatione maris conglobata. *Schrochius* arundinum cum foliis suis progeniem esse, quodque in pluribus quæ dissectuit, & aperuit plantam ipsam obvolutam in medio invenerit, affirmat. *Dioscorides* 5 species enumerat. Harum quatuor in hoc capite exhibemus; quintam lib. 3. in capite vel *Ostreorum* vel *Mitylorum*; quorum scilicet pro-  
gemi-



nies est. Eorum autem utrumvis secundum Dioscoridis censerī potest, notis scilicet nullis in textu appositis reclamantibus.

1. Alcyonium durum *Offic.* durum sive primum Dioscoridis Imperato C. B. Spangiosum *Officinarum* J. B. *Chab.* Harter unechter Schwamm. *Usu.* Tota planta. *Vires.* In foeminarum smegmata assumuntur contra lentiginēs, lichenes, lepras, vitiliginēs, niritias & maculas in facie, reliquoque corpore. *Diosc.*

2. Alcyonium vermiculatum *Offic.* vermiculare Imperati C. B. vermiculatum purpureum candidum & flavescens *T. Inst.* Gesprenstelt unechter Schwamm. *Usu.* Planta integra. *Vires.* Iis qui difficili urina vexantur, aut renulas in vesica colligunt idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni *Diosc.*

3. Alcyonium stupposum *Offic.* Stupposum Imperati J. B. stupposum dictum *Chab.* stupposum vel quartum Dioscoridis Imperato C. B. *Säfsicht* unechter Schwamm. *Usu.* Planta. *Vires.* Eiusdem cum præcedenti vires obtinet verum haud parum imbecilliores. *Galen.*

4. Alcyonium tubulosum *Offic.* J. B. Forma fructus alicujus ficus C. B. *Röhricht* unechter Schwamm. *Usu.* Integra planta. *Vires.* Dealbandis dentibus aptum est: in alia smegmata, Psilothraque assumitur cum sale mistum. *Diosc.*

## VI. De Fungo.

Pag. 109. lin. 9.

1. **A** Fungus *Offic.* esculentus 12. *Park.* pileo-  
lo lato & rotundo livido *C. B.* campe-  
stris albus supernè, infernè rubens *J. B. Chab.*  
*Schwamm* Champignon. *Pilze.* In pascuis  
sterilioribus in autumno. *Ufu.* Integra plan-  
ta in culinis Aceto condita, in *Officinis* au-  
tem raro aut nunquam usurpatur.

A. 2. Crepitus Lupi *Offic.* Lupi sive Fun-  
gus ovatus *Park.* Fungus rotundus orbicu-  
laris *C. B.* orbicularis. *Ger.* pulverulentus di-  
ctus Crepitus Lupi *J. B. Chab.* Lycoperdon  
vulgare *El. Bot. T. Inst.* Wollfs Fist Bubens  
Fist vulge Bovist. In pascuis ubique ferè in  
Autumno invenitur. *Ufu.* Integræ plantæ.  
*Vires.* Siccat & astringit, unde vulneribus  
inspersus sanguinem sistit, ulcera inveterata  
desiccant, hæmorrhoidum fluxum cohibet:  
Oculis tamen inimicus censetur. *R. H. p. 105.*

A. 2. Lycoperdon maximum *Offic.* Alpi-  
num maximum *El. Bot.* Alpinum maximum,  
cortice lacero *T. Inst.* Fungus maximus ro-  
tundus, pulverulentus dictus, Germanis  
*Pho Fist. J. B.* Fungi rotundi orbicularis se-  
cundum genus *C. B.* Großer Staub voller  
*Schwamm.* In pinguioribus pascuis & ad  
fimeta. *Ufu.* Planta integra. Caput huma-  
num magnitudine interdum æquat. *Vires.* Ad  
compescendas sanguinis eruptiones etiam pe-  
ricu-

culosissimas commendatur: in quem usum  
 onfores eos adservare multis Germaniæ in  
 cis observavit *Clusius*.

Pag. 110. lin. 16. subjunge :

A.6. Tubera *Offic. C. B. J. B. Matthioli* *El.*  
*t. terræ Ger. terræ edibilia Park. Morcheln.*  
 terra effodiuntur. *Ufu.* Integra planta ma-  
 gitudine varia, tuberculis extantibus inæ-  
 qualis, externâ facie rugosâ, nigrâ, internâ  
 constantia alba, gustu fatuo, odore non ni-  
 l gravi. *Vires.* Venerem stimulant, cocta  
 pro Emplastro imposita Anginosi profunt.

7. Boletus *Offic. Tubera cervina C. B. Park.*  
 uberum genus quibusdam Cervi Boletus *J.*  
 Cervi Boletus *Chab. Hirsch; Brunst Hirsch;*  
*Schwamm.* E terra effodiuntur. *Ufu.* Inte-  
 gra planta magnitudine Juglandis, inæqualis,  
 ternè cineraceo colore, interna ex albo  
 purpurascente, gustu grato. *Vires.* Rari u-  
 s est, nec adhibetur nisi quod nonnulli ad  
 bidinis stimulum, lactisque incrementum  
 commendent. Extrinsicus commenda-  
 tur ad Uterinas ascensiones compescendas &  
 virtus difficultatem. *Schrod.*

In Italia Tubera terræ quærendi & colli-  
 endi modo ridiculo utuntur. Porcellum  
 illicet in pascua ubi eorum proventus est  
 gunt, qui odore inventa rostro eruit; eum-  
 que insequitur quidam, qui cruta colligit.

Pag. III. lin. 25.

3. **A.** Muscus pyxidatus *Offic.* Ger. Park. J. B. pyxidatus major & minor *T. Inst.* pyxoides *C. B.* Musco-Fungus pyxidatus vulgarior minor. *H. Ox. Kelch & Moos.* In aridioribus. *Usu.* Integra Herba. *Vires.* In Tussi convulsivo puerorum specifica æstimatur.

A. 4. Lichen cinereus terrestris *Offic.* *R. Synop. Cat. Plant. & Hillor.* Musco-Fungus terrestris latifolius cinereus Hepaticæ facie *H. Ox.* Muscus terrestris Hepaticæ facie *vulgò.* Erd Leber-Kraut. In pascuis siccioribus non infrequens reperitur. *Usu.* Tota planta. *Vires.* Adversus morsum Canis rabidi egregium est medicamentum.

## SECTIO SECUNDA.

Herbæ semine minutissimo & nudis oculis vix conspicuo.

## II. De Musco trichoide.

Pag. III. lin. 30.

**A.** Muscus clavatus *Offic.* clavatus sive Lycopodium *Ger. Park.* squamosus vulgaris repens, clavatus *T. Inst.* terrestris repens sive clavatus *C. B.* terrestris repens à Trago pictus *J. B.* terrestris

tris repens Tragi hab. Rachen-Leiterlein. Wolffs  
 Klauen. In ericetis & montosis. Julio & Au-  
 gusto floret. *Ufu*. Planta integra, Flos sive  
 Pulvis clavarum citrinus. *Vires*. Refrigerat  
 & siccatur. *Ufus* præcipue in Calculo expel-  
 endo, in fluxu alvi. Extrinsecus in laxita-  
 e dentium in consolidatione & siccatione  
 vulnerum Schrod. In Epilepsia puerorum flos  
 nultum valet, inque Cardialgia eorundem  
 & torminibus ventris flatulentis R. *Synop.*

## VI. De Equiseto.

Pag. 115. lin 28. subjunge:

**A** Cauda Equina minor & Equisetum mi-  
 nus *Offic.* Equisetum segetale *Ger.* Ar-  
 vense longioribus setis *C. B.* minus terrestre  
*J. B.* minus terrestre sive arvense *Chab.* Rosa  
 Schwanz. Pferde Schwanz. Schafftheu. In-  
 ter segetes solo homidiore. *Ufu*. Herba. *Vires*.  
 Cum priore viribus convenit.

A. 3. Polygonum foemina *Offic.* Equiseti fa-  
 cie Polygonum foemina *J. B.* *Chab.* Cauda E-  
 quina foemina *Ger.* Equisetum palustre bre-  
 vioribus foliis polyspermon *C. B.* palustre al-  
 terum brevioribus setis *Park.* Pferde Schwanz.  
 Weiblein. In stagnis & lacubus, & ad flu-  
 viorum ripas. *Ufu*. Herba. *Vires*. Vulneraria  
 est planta.

Herbæ femine minutissimo, caule  
carentes Epiphyllispermæ.

Pag. 116. lin. 26. adde :

## II. De Hemionitide.

**F**oliis integris est & indivisis, sinu in basi uniuscujusque ad pediculum falcato, cum appendice utrinque producto R. Meth. p. 63.

Hemionitis Offic. J. B. vulgaris C. B. major Ger. Park. Hemionium sive Hemionitis quibusdam Splenium Chab. Gemeine hemionitis, Maul- & Esel- & Farren- & Kraut. In Italia provenire dicitur. Usu. Herba. Vires. Ex Aceto pota Lienem absumit. Diosc.

Pag. 117. lin. 18.

## VI. De Lonchitide.

**A**ngustia & longitudine foliorum, ut & loco natali a Polypodio differt. R. Synop. p. 45.

A. Lonchitis Offic. aspera Ger. aspera minor. C. B. Park. altera foliis Polypodii J. B. altera foliis Polypodii, Asplenium sylvestre nonnullis Chab. Filix sive Lonchitis altera foliis Polypodii P. Al. Polypodium angustifolium folio vario T. Inst. Engelsüß- & Baumfaren. In humidioribus nemorosis asperis & ericetis. Usu. Folia. Vires. Herbam esse vulneribus glutinandis, In eisque inflammationem excitari non potest. Pota ex aceto Lienem absumit Diosc.

Lonchitis *Dioscoridi* duplex est, altera fo-  
 is Porri, quam solum *Plinius* novit, cujus  
 emen triangulum & lanceæ cuspidi simile,  
 unde etiam planta ipsa sibi cognomentum ar-  
 rogavit, nec unquam reperisse, nec ab aliis  
 inventum vidisse scribit *Matthiolus*.

Pag. 119. lin. 8. subjunge:

Laborantes lienis incremento recreat. Ra-  
 x & potu & illitu cum axungia vulneribus  
 gitta arundinacea factis est auxilio. *Diosc.*

### VIII. De Dryopteride.

Innis densius dispositis, angustioribus, pediculis  
 brevibus aut nullis insidentibus, filici mari similis  
 Meth. p. 64.

A. Dryopteris *Offic.* Adversariorum *Ger. emac.*  
 re Filix Querna repens *Park.* Filix Quer-  
 C. B. minor non ramosa *J. B. Chab.* minor  
 illustri *R. Cat. & Hist. Ejusd.* Eichfarren Kraut.  
 locis palustribus & putridis. *Ufu.* Integra  
 anta. *Vires.* Psilothrum est cum Radicibus  
 ita: illinitur enim primum postquam cor-  
 is exudavit, mox sudor abluitur, & re-  
 ns imponitur. *Diosc.* Facultatem habet se-  
 icam.

Hujus usum *Rondeletius* perniciosum esse  
 impertum affirmat, cum ab ignaris quibus-  
 m Delphinatûs Pharmacopœis vice Poly-  
 odii medicamenti immitteretur. In Phar-  
 acopolarum quorundam officinis aliquando  
 veni sub titulo Adianthi albi,

Pag.

## XIII. De Agno Scythico.

**A**gnus Scythicus *Offic.* Scythicus Borometz  
*J. B. Chab. append. Tartaricus Act. Philos.*  
*Lond. N. 247. p. 461.* Frutex Tartaricus *C. B.*  
 Planta - Animal seu Borometz, Agnus Scythi-  
 cus. *Scytisch oder Tartarisch Lam* Ex China &  
 Tartaria allata est. *Ufu.* Lanugo *Poco Semp.*  
*Offic. Gilden-Moos. Mus. Reg. Soc. 386.* Color  
 est lutescente obscuro unam circiter quartam  
 uncia longam. serici instar splendens. *Vires*  
 Adversus Hæmoptysin usurpatur. *Dos.* Ses-  
 grana. Tres autem doses curationem perficere  
 traduntur. *D. Brown* apud Chineses in fre-  
 quenti usu esse refert ad sanguinem è vulne-  
 ribus recentibus fluentem sistendum, quemad-  
 modum apud nos Araneorum telæ.

Non opus est ut hic repetam mirabilem &  
 fabulosam historiam hujus plantæ quæ à *Duro-*  
*to, Scaligero,* aliisque eorum sequacibus tradi-  
 tur. Sufficiat dixisse, quòd in arcula rariorum  
*Chinensium* ad Regiam Societatem *Londin.* missa  
 inerat, quòd plus pedem longa erat, carpus  
 humanum crassa, protuberantiis variis ina-  
 qualis, & propè extremum pediculos quosdam  
 emittens; aut 4 uncias longos Filicino cau-  
 exactè similes, lanugine prædicta obtectos. Similitudo  
 quam obtinet cum Filicibus quibus-  
 dam arboreis Jamaicensibus fecit, ut hic tan-  
 tisper eam colloceam, donec pleniorẽ ejus  
 cognitionem & historiam consequar.



## SECTIO TERTIA.

De

Herbis flore imperfecto seu  
stamineo.

Pag. 126. lin. 22. adde:

## 1. De Mercuriale.

*Cujus Nota, Folia in caule bina opposita, per margines crenata, Florum calices triphylli, Fructus in foemina didymi, i. e. bini conjuncti, singuli singula femina continentur. Calices triphylli etiam in foemina fructui subsunt. R. Meth. p. 20.*

A. 1. Mercurialis *Offic. Scbrod.* mas & foemina *Ger. Park. J. B. Chab.* annua *H. Ox.* annua glabra fulgaris *R. Synop.* testiculata sive mas *Dioscoridis & Plinii C. B.* spicata sive Foemina *Dioscoridis & Plinii ejusd.* Bingelkraut/Weiblein. In hortis & incultis reperitur. Aetate floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Calfacit & siccant, abstergit, alvum movet, bilem ac aquas purgat. Extrinsicus vulvae adhibita *Menses & secundinas trahit, tumores emollit, creberrimi usus est in clysteribus. Scbrod.*

A. 2. Cynocrambe *Offic.* mas & foemina *Ger. emac.* mas & foemina sive Mercurialis repens *J. B. Chab.* Mercurialis perennis repens *Cynocrambe dicta R. Synop.* sylvestris *Cynocrambe dicta mas & foemina Park.* montana testiculata & spicata *C. B.* Hundskraut/Hundssole. In sylvis & sepibus. Vere floret. *Usu.*

D

Herba

Herba. *Vires.* Hæc quamvis *Prævotio* eadem cum præcedente vires obtinere dicatur; effectus tamen quos in nonnullis prope *Salopiam* eam comedentibus produxit, eam Soporiferæ & malignæ qualitatis participem esse convincunt.

Quænam planta sit *Cynia* seu *Cynocrambe* *Dioscoridi* dicta *Botanici certant*, & adhuc sub iudice lis est. *Cæsalpinus* Atriplicis speciem esse vult. *C. Bauhinus* *Parietariæ.* *Lonicerus* ad *Apocynum* eam refert. *Matthiolus* ad plantas quas hic exhibeo, quæ quidem cum *Dioscoridis* descriptione aliququaliter conveniunt, præsertim fœmina.

3. *Phyllon Offic.* *Arrhenogonon* & *Thelygonon* *Chab.* *Arrhenogonon* & *Thelygonon* folio incano *Monspessulana* *J.B.* *Arrhenogonon* sive marificum & *Thelygonon* sive fœminificum *Ger.* marificum & fœminificum. *Park.* testiculatum & spicatum *C. B.* *Mercurialis* perennis maritima incana *Phyllon* dicta testiculata & spicata *H. Ox.* fruticosa, incana testiculata & spicata *El. Bot. T. Inst.* *Sunderbingel-Kraut.* In hortis curiosorum apud nos reperitur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Mauritanis ad muliebres morbos magno in usu est. *Clus.* Illius decoctum demorsis à cane rabido commendant aliqui. *Magnol*

## VI. De Ambrosia.

*Fructu* echinato monospermo, à flore remoto, solit lacinitatis à reliquis differt,

Ambrosia *Offic. Ger. Chab. hortensis Park. hortensis lanuginosa H. Ox. maritima C. B. quibusdam. J. B. foliis Absinthii odoratis humilior Herm. Cat. Ambrosienkraut / Taubenkraut/Eichaus Cappadocia. Apud nos in hortis colitur. Uju. Herba. Vires. Repellendi & reprimendi facultatem obtinet H. Ox. Vim habet astringentem, inquit Galenus.*

Ambrosia à Dioscoride in hunc modum describitur: *Puillus frutex est, ramosus trium palmarum altitudine: foliis Rutæ, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis gravidi, qui nunquam florem pariunt, odore vino- sò suavi: radice tenui sesquipedali. Cujus descri- ptionis brevitatis non levis controversiæ & dissensionis inter Autores occasio fuit, Ni- ander referente Anguillario pro Liliæ specie eam habet, Cordus ad Tanacetum refert, Lo- nicerus, Lacuna aliique ad Abrotonum: Taber- namontanus ad Artemisiam, Matthiolus ad Na- bertii genus, C. Bauhinus & sequaces ad plan- tam hic traditam, quibus & nos potiùs con- sentimus. N. B. Catalogum Pharmacopœiæ Londinensi præfixam Ambrosiam a Botrye non distinguit, sed utramque unius plantæ synonymam facit.*

Pag. 128. lin. 12. verbo est adde:

Ad necandos Vermes in corpore humano insignis est remedium. *Harlow, in Med. Curios. sub titulo, Mexico-Saamen.*

## X. De Lapatho.

Pag 130. lin. 30.

**A**N Rhaponticum Antiquorum & Rhabarbarum modernorum sit una & eadem specie planta, à Botanicis controvertitur (u rectè observat clarissimus & eruditissimus *D Raius*) aliis eandem esse affirmantibus, alii negantibus: Nonnulli etiam sibi non constant, & nunc eandem nunc diversam affirmant, quorum sententias & rationes vid apud *J. Baubinum in Appendice Tom. 2. Histori Plantarum.* Id tamen hoc in loco cum *Alpin* observabo, Plantam hanc verum esse *Dioscoridis* Rhaponticum à Rhabarbaro Officinarum omnino distinctum, ut suo in loco ostendam eamque radicem quæ in Pharmacopœorum & Pharmacopolarum Officinis pro Rhapontico divenditur hujus plantæ radicem non esse, sed Centaurii majoris cujusdam specie ut eodem in loco demonstravi.

Pag. 131. lin. ult. subjunge:

Hanc plantam veram & genuinam *Dioscoridis* Britannicam esse contendit *Muntingius* siquidem descriptionibus ejus, inquit doctissimus *D. Raius*, quæ apud veteres extant tum facie tum viribus per omnia respondeat.

Pag. 132. lin. 9. adde:

**A. 6.** Lapathum sanguineum *Offic. Parisiativum sanguineum Ger. sanguineum* sive sanguis Draconis herba *J. B. Chab. folio acuto rubente C. B. DrachenBlut/ roth blätterich*

Mengelwurß. In hortis colitur. Junio floret.  
*Ufu.* Folia, Semen. *Vires.* Folia alvum cient  
 in jufculo. Semen pulverizatum & in aliquo  
 decocta astringente potum singularem habet  
 efficaciam in sistendis nimis mensibus & simi-  
 libus Fluxibus. *Cam.*

At perperam eos omnino facere, qui suc-  
 um hujus Lapathi Sanguinem Draconis Of-  
 cinarum vel nuncupant vel suspicentur.  
*bab.*

Pag. 132. lin. 30. verbo *Foliorum*  
 subjunge:

*Vires.* Palato gratior est quam vulgaris,  
 elleque omnia præstat quæ illa. *Chab.*

Pag. 133. lin. 4. subjunge:

### XIII. De Fegopyro.

*VOTÆ* sunt flosculi pentaphylli speciosi, in spicis  
 e foliorum alis egressis Semine triquetro cum con-  
 neribus convenit, ejus tamen colore sordidiore &  
 terra et ulenta ab iisdem differt. R. Synop. p. 58.  
 A. Fegopyrum *Offic.* vulgare erectum *El.*  
*W.* T. *Int.* Dodonei *H. Ox.* R. Synop. *Volck.*  
 agotriticum *J. B. Chab.* Tragopyrum *Ger. e-*  
*tic. Pak.* Frumentum Saracenicum Matthioli  
 ulgo Fagopyrum *Herm. Cat.* Erysimum ce-  
 cale seu Theophrasti folio hederaceo *C. B.*  
 Buchweizen/Heidenforn Seritur in agris, Ju-  
 nio floret. *Ufu.* Semen triangulum colore  
 sordidum. *Vires.* Minus nutrit quam Hor-  
 deum aut Secale.

Pag. 133. lin. pro Capite XVII. adde:

### XVII. De Potamogetone.

**P**otamogetonis notæ sunt in aquis nasci; flores spicati, quadrifolii, quorum singulis quaternæ continentur semina; florum spicæ pediculis oblongis insidentes. R. Synop. p. 62.

A. Potamogeton *Offic.* *Chab.* rotundifolium C. B. rotundioro folio J. B. latifolium *Ger.* Fontalis major latifolia vulgaris *Park.* Saamfraut. In aquis stagnantibus & piscinis frequens. Junio & Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra vetera ulcera & nomas. *Diosc.*

### XVIII. De Atriplice.

Pag. 134. pro 2da specie Atriplicis adde:

2. **H**alimus *Offic.* *Chab.* Clusii J. B. latifolium *Ger.* latifolius sive fruticosus C. B. latifolius, sive Portulaca marina incana major *Park.* Atriplex Halimus dicta latifolia R. H. latifolia, seu Halimus fruticosus latifolius H. Ox. maritima fruticosa Halimus dicta latifolia B. *Al.* Meer-Gewächs / Meerburzel. In sepibus mari proximis, regionibus calidioribus, floret æstate. *Usu.* Radix. Folia. *Vires.* Radix convulsa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsâ pota: eadem lactis ubertatem facit. Folia decoquuntur ciborum gratia. *Diosc.*

## XIX. De Blito.

Pag. 135. lin. 4. verbo *humectat* adde:  
 stur oleris modo, alvo utile est. *Diosc.*

A. Atriplex sylvestris *Offic. J. B. Chab.* syl-  
 vestris altera *C. B. Ger. emac.* sylvestris  
 folio sinuato saturate virente spica rubra *H.*  
*ix.* Chenopodium folio laciniato coma pur-  
 purascente *T. Inst. Wilde Melste.* In fimetis.  
 Estate floret. *Ufu.* Herba, Semina parva,  
 compressa, rotunda, nigra splendentia. *Vires.*  
 Alvum mollit. Panas discutit sive crudum  
 sive coctum illinatur. Semen cum aqua mul-  
 ta potum Regium morbum sanat. *Diosc.*

A. 3. Atriplex olida *Offic. Ger. foetida C. B.*  
*J. B. Chab.* olida sive sylvestris foetida *Park.*  
 Blitum foetidum Vulvaria dictum *R. Synop.*  
 Chenopodium foetidum *El. Bot. T. Inst. Stins-*  
*fende Melste.* In locis ruderatis & in fimetis.  
 Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Uterina  
 est, menses provocat, foetum mortuum se-  
 cundinamque expellit, in Hysteriis multum  
 prodest.

A. 4. Pes anserinus *Offic.* Atriplex dicta:  
 Pes anserinus *J. B. Chab.* sylvestris latifolia *C.*  
*B. sylvestris latifolia sive Pes anserinus Ger.*  
*emac. Park.* Blitum Pes anserinus dictum *R.*  
*Synop.* Chenopodium Pes anserinus primum  
 Tabernamontani *El. Bot. T. Inst. Gänsefuß/*  
*Säu-Todt.* In fimetis. Julio floret. *Ufu.* Her-  
 ba. *Vires.* Viribus praestat, quibus & præ-  
 cedentes.

Pag. 136. lin. 27. adde:

Coquitur cum lenticula ut ventrem sistat: quod magis radice ejus præstatur. *Diosc.*

Pag. 138. lin. ult. subjunge:

### XXIV. De *Percepier*.

**S**ITU florum in foliorum alis, calicibus quadripartitis, seminibus in singulis utriculis singulis ab *Alchimilla* differt, ut omnino genere distinctum sit *R. Meth. A. p. 23.*

*A. Percepier* *Offic.* Anglorum *Ger. emac.* Anglorum quibusdam *J. B. Chab.* Polygonum *Selinoides Park.* Chærophylo nonnihil similis *C. B. Alchimilla* annua minima hirsuta foliis infernè albicantibus *H. Ox. Englische Steinbrech.* Inter segetes & in solo restibili steriliore. Æstate floret *Usu.* Herba. *Vires.* Vehementer & repentè urinas ciere & calculum comminuere creditur. *R. Synop.*

### XXV. De *Camphorata*.

Pag. 137. lin. ult. verbo *Herba* adde:

*Vires.* Siccat & astringit, nervorum genus roborat, confert in doloribus Arthriticis, Spasmodicis, Paralytici, defluxionibus oculorum, Catarrhis, Cephalica est planta.

### XXVI. De *Kali*.

Pag. 141. lin. 12. subjunge:

**A**T neque ex hac herba sola conficitur *Soda*, sed nonnullis in locis *Fucos* aliasque plan-



lantas marinas urunt ad eum usum. Item  
 d cineres clavellatos pro Sapone communi  
 ficiendo silicem fœminam urunt una cum  
 ramine, in lixivio cinerum ligni prius ma-  
 erato. *Harvici* insuper mihi narratum est,  
 quod lixivium quo ibi utuntur ad linteamina  
 mundanda è Lupuli viminum exsiccatorem  
 ineribus paratum esse.

## SECTIO QUARTA.

Herbæ flore aggregato semi-  
 nibus papposis.

### 1. De Lactuca.

Pag. 143. lin. 21.

**A** Lactuca sylvestris *Offic.* sylvestris  
 costa spinosa *C. B.* sylvestris laci-  
 niata *Park.* sylvestris foliis disse-  
 ctis *Ger. emac.* sylvestris, seu Endi-  
 via multis dicta folio laciniato, dorso spino-  
 so *J. B. Chab.* Wilder Lattich/Leber-Distel/Gänß-  
 Zung. Ad sepes. Junio floret. *Usu.* Herba,  
 Semen. *Vires.* Dolores mitigat, semen mi-  
 nuit, libidinem supprimit, & Venerem ar-  
 cet. *Diosc.*

3. Chondrilla prima *Offic.* *Diosc.* cærulea  
*Ger.* cærulea altera Cichorei sylvestris folio  
*C. B.* cærulea latifolia laciniata *eiusd.* & *Park.*  
 cærulea sive purpurea *eiusd.* Chondrille vel  
 Chondrilla *Chab.* vel Chondrilla cærulea *J. B.*

Lactuca sylvestris perennis, purpuro cæruleo, laciniato longo folio *H. Ox.* perennis humilior flore cœruleo *El. Bot. T. Inst.* Chondrilla Kraut / flein Sonnenwirbel. In Italia & Germania in locis incultis crescit. Æstate floret. *Ufu.* Herba.

Hanc plantam Chondrillam primam Dioscoridis existimo.

## II. De Chondrilla.

**NOTÆ** sunt, *florum capitula seu cauliculos Lactuca minores habere caulibus secundum longitudinem pressius junctos, Folia alterna, levia, Lactuca angustiora, semina oblonga, & angusta.*

Chondrilla altera *Offic. viminea J. B. Chab. juncea Ger. juncea viscosa arvensis: quæ prima Dioscoridis C. B. viminalibus virgis Park. Lactuca sylvestris viminea Volck. sylvestris perennis lutea juncea viminalibus virgis H. Ox. Ufer-Chondrilla / Dieß-Chondrilla.* In arenosis Germaniæ, Italiæ, &c. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Caules & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. *Diosc.*

Hanc pro Chondrilla 2da Dioscoridis *Folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum: caulem succo madentem luteo: radice tenui rotunda levi, vegeta flavescente succosa, potius habendam existimo quam Chondrillam bulbosam C. Bauhini.*

*Dioscorides* duo hujus plantæ genera memorat. De priore hæc habet, *Caulem, flores*  
 & fo-

3 folia habet Cichorio similia: qua ex causa nonnulli sylvestris Intybi speciem esse pronunciarunt, verum tenuior tota est. Ideoque neque Chondrilla juncea viscosa arvensis C. B. neque Chondrilla prior legitima Clusii esse potest, cum eam utraque flores luteos habeat, secus quam ichoreum, quod cœruleos obtinet.

### III. De Soncho.

Pag. 144. lin. 10. subjunge:

A. Hieracium majus *Offic.* majus folio Sonchi vel Hieracium Sonchites C. B. Sonchus Hieracites major repens cauliculo hirsuto inter segetes *H. Ox.* repens multis Hieracium majus *J. B.* repens multis, quibusdam Hieracium majus *Chab.* arborescens *Ger. Park.* per arborescens palustris Hieracii facie *Le m. Cat. Grosse Gänse Distel / groß Sonchen* tant. In arvis. Julio floret. *Ufu.* Folia. *Vim refrigerandi habet & modice subtingendi, inflammationibus prodest. Heracium cum radice illata, vibratis à Scorpione illius auxiliatur. Diosc.*

Pag. eadem lin. 20. adde:

*Vires.* Vim suam ad ea ad quæ superior impendit. *Diosc.*

### V. De Pulmonaria Gallica.

A. Reliquis Hieraciis differt semine parvo brevi nigro: ab Auricula muris, quod folia pilis longis hirsuta non sint, quemadmodum illius, & in plerisque locis laciniata aut dentata, *R. Meth. p. 30.*

A. 3. Pulmonaria Gallica & Pulmonaria aurea *Offic.* Gallica Phthifica sive aurea latifolia *Ger. emac. Herm. Flo. Alt.* Hieracium murorum folio pilosissimo C. B. latifolium hirsutum folio unico cauli insidente *H. Ox.* murorum Bauhini, quod est Pulmonaria Gallorum Lobelii *Park.* Pilosella major quibusdam, alius Pulmonaria flore luteo *J. B. Chab Buchlattiich, Fransch oder gülden Lungen Kraut.* In sylvis, muris antiquis & aggeribus umbrosis. Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum Pulmonaria maculosa viribus convenit.

Pag. 146, lin. 12. subjunge:

## IX. De Tragopogone.

*Insigni notâ à reliquis differt, quod calycis floris radii ipsius folia seu petala longitudine excedant. folia herbe gramineæ imitantur.* R. *Synop.* p. 76.

A. Tragopogon *Offic. Chab.* luteum *Ger. Park. parad.* pratense luteum majus C. B. flore luteo *J. B. Boecksbaert mit gelben Blumen.* In pratis & pascuis. Junio & Julio floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Radices valde nutriunt, unde tabidis & macilentis conducunt. Vitiis pectoris, tussi & respirationi difficili, nec non pleurisi mederi dicuntur. Urinæ stillicidio subveniunt, & calculum expellunt, lancinationibus æstuantibus ventriculi & thoracis auxiliantur.

Her-

# Herbæ flore aggregato semini- bus pappo destitutis.

Pag. 147. lin. ult. subjunge:

## XII. De *Lapsana*.

*Floribus caules & ramulos terminantibus cum Hieracio convenit, à Cichorio differt: seminibus solidis eu pappo destitutis cum hoc convenit, ab illo diver-um est. R. Synop. p. 77.*

A. *Lapsana* *Offic.* Ger. sive *Lapsana* *Chab.* vulgaris *Park* *Dodonæi J. B. El. Bot.* *Soncho* affinis *Lapsana domestica C. B.* *Cichorio* affinis *Lapsana domestica, Mor. Prælu. Bot.* *Intybus* sive *Endivia erecta lutea Napifolia, Lapsana dicta H. Ox.* *Sonchen Kraut/wilder Kohl.* In hortis & incultis frequens. Junio & Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Efficax esse censetur in sanandis papillis ulceratis, unde & nomen papillaris sortita esse videtur *R. H.* Resiccantem ac extergentem, & nonnihil dirigentem facultatem obtinet: folia caulisque coquuntur & in cibum recipiuntur. *H. Ox.*

Quæ veteribus fuerit *Lapsana* non facile est nobis explicare, *Dioscoridi* sylvestre est o-lus, plus nutriens quàm *Lapathum*, ac cujus caules & folia cocta eduntur. *Lapsanæ* au-tem nomine variæ ac diversæ à scriptoribus botanicis donatæ fuere plantæ.

XIII. *De Sefamoide.*

*F*Lore est radiatò, flosculis marginalibus iis quæ discum medium componunt, multo longioribus. *R* Meth. p. 31.

Sesamoides parvum *Offic.* parvum *Matthioli Ger.* Chondrilla Sesamoides dicta *Park.* cæruleo *Cyani capitulo C. B.* Catanance quærundam *El. Bot. T. Inst.* Dalechampii flore *Cyani folio Coronopi J. B. Chab.* Cichorium *Cyani capitulo Mar. Præhud. Bot.* cæruleum *Coronopi foliis angustis, caliculis squamatis argenteis H. Ox.* Sesamoides *Kraut.* In aridis locis transmarinis calidioribus. Junio floret *Usu.* Herba. *Vires.* Detrahit bilem, pituita flosque humores, illitum ex aqua tumores atque tubercula discutit. *Diosc.*

Sesamoidis duæ species à Dioscoride memorantur & describuntur. Verum descriptiones ejus adeò breves sunt & obscuræ, ut quænam sit major ejus species ad hanc usque diem dubium & incertum maneat, nonnullis ad Helleborum eam referentibus, aliis ad Resedam, aliis ad Thymelæam: De minore etiam specie variæ opiniones sunt, verùm quam hic exhibeo cum descriptione Dioscoridis, quam subjungo, omnium optimè convenit.

*Sesamoidi parvo cauliculi sunt dodrantales: foli Coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula florum pene purpureorum medio eorum albo: Semen Seseame fulvum amarum: radi. tenuis.*

## XIV. De Scolymo Theophrasti.

NOTÆ sunt Folia spinosa Carduo similia, flosculi  
& semina foliolo ad singula apposito separata.  
Meth. A. p. 31.

Scolymus *Offic.* Chrysanthemus C. B. Theophrasti sive Eryngium luteum Monspeliensium *Park.* Eryngium luteum facie Cardui *term. Cat.* Carduus chrysanthemus Narbonensis *Ger.* Spurius chrysanthemus Narbonensis *Volck.* Spina lutea J. B. lutea, Scolymus Theophrasti, Eryngium luteum Monspeliensium *Chab.* Cichorium luteum Scolymoides spinis horridum Narbonense *H. Ox.* Cichorio affinis, chrysanthemus aculeata Cardui facie perennis *P. Al.* Gùlden Distel. In Italia reperitur. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum Eryngio viribus convenire creditur.

## SECTIO QUINTA.

De

Herbis flore composito discoide  
papposis.

## III. De Conyza.

Pag. 150. lin. 7. subjunge:

**C**onyza major *Offic.* *Ger.* major vera  
*H. Ox.* major verior Dioscoridis  
*Park.* mas Theophrasti major Dioscoridis C. B. major Monspeliensis  
odo-

odorata *J. B. Conyza Pulicaria Chab.* Virga aurea major foliis glutinosis & graveolentibus *El. Bot. T. Inst.* Grosse Dürnwurzel. In Italia, &c. juxta vias passim provenit. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Suffitu venenatas bestias fugat, culices abigit, & pulices necat *Diosc.*

Pag. eadem lin. 17. subjunge:

3. *Conyza minor Offic.* minor vera *Ger. H. Ox. J. B. Chab.* minor vera Penæ *Paik.* fœmina *Theophrasti minor Dioscoridis C. B.* Virga aurea minor foliis glutinosis & graveolentibus *T. Inst.* Kleine Dürnwurzel. In calidioribus regionibus juxte mare reperitur. Autumno floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum primo virus convenit.

#### IV. De Tripolio.

**H**erba est flore composito in pappos abeunte, inodora, foliis integris & indivisis, innoxia *R. Synop.* p. 79.

A. *Tripolium Offic. Chab.* majus *eiusd.* majus & minus *J. B.* vulgare majus & minus *Ger.* majus sive vulgare & minus *Park.* majus cœruleum & minus *C. B.* majus flore albo *Comel. Cat.* flore albo *Brem. P. 1.* flore nudo *R. Synop.* Aster maritimus cœruleus *Tripolium dictus ejusd.* maritimus purpureus *Tripolium dictus R. H.* cœruleus glaber litoreus, pinguis *Tripolium majus dictus,* & litoreus pinguis *Tripolium minus dictus Ox.* maritimus palustris cœruleus *Salicis tolk*



*A. Bot.* See Stern's Kraut. In Salsis maritinis. Julio floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* In vino pota zii aquam urinamque per alvum extrahit *Diosc.*

## VI. De Doronico.

Pag. 151. lin. 11. adde:

**V**ires. Calefacit & siccatur, tumores discutit, Alexipharmaca est, &c. *Schrod.* sed crede qui vult, verum enimvero nostra sententia venenosa est planta & non sine periculo mandanda, cui tamen quidam moderni minime astipulantur.

2. Doronicum Germanicum & Arnica *Offic.* Germanicum *Park.* Plantaginis folio alterum *B.* Germanicum foliis semper ex adverso ascendentibus villosis *J. R. Chab.* Calendula *Alina Ger.* Arnica *Schrod.* *Gemsen's Burck's* Schwindel-Kraut. In montosis reperitur. Ætate floret. *Ufu.* Planta. *Vires.* Calefacit & siccatur, partium est tenuium, Sudorifica & iuretica nonnunquam & vomitoria, &c. *Schrod.* In *Officinis nostris* raro aut nunquam occurrit, perniciosam esse plantam etiam existimo.

*Alisma Offic.* Alisma Matthioli sive Plantago montana *J. B.* Doronicum Pannonicum extum *Clus.* Doronico affine Alisma Matthioli seu potius Plantago montana *Chab.* Ungarische *Gemsen's Burck's.* In Pannonia. Majo floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Planta vulneraria & haemorrhagica reperta est frequenti experientia

utpote unica & optima Panacea ab alto lapsorum *Ephem.*, *Germ.* Anno 9 & 10.

### VIII. De Virga aurea.

Pag. 152. lin. 8. subjunge:

3. **H**erba Doria *Offic.* Doria Lobelii *Ger.* Doria vulgaris *Park.* Virga aurea major vel Doria *C. B.* aurea major carnosis succulentis foliis ad caulem latis *H. Ox.* Alisma Matthioli sive Doria *J. B.* sive Damasonium, Dorea & virga aurea Monspeliensium *Char.* Jacobæa pratensis altissima Limonii folio *El. Bot.* Groß: Guldene Wundt-Kraut. Doria Wundt-Kraut. Ad ripas fluviorum oritur, Julio & Augusto floret. *Usu.* Folia, *Vires.* Vulneraria est insignis & cum priore viribus convenit.

### VIII. De Helichryso.

Pag. eadem, lin. 23. subjunge:

2. **C**hrysome *Offic.* peregrina major frutescens *Breyn. Cent.* Elichryson Orientale *C. B.* Helichrysum sive Chrysome frutescens latifolia flore corymbifero toto aureo *H. Ox.* Heliochrysum Orientale sive Amarantus luteus *Park.* Stœchas citrina floribus magnitudine, & colore speciosa *J. B.* Chama Gnaphalium Alexandrinum sive Stœchas citrina Orientalis *H. R. P.* luteum peregrinum specioso flore *Volck.* Orientalische Rhein-Blumen/gelbe breit blätterigte Rhein-Blumen. In

Creta

Creta Infula reperitur. Julio floret. *Usu.*  
 Radix. *Vires.* Excalfacit & adstringit: his  
 conveniens quos jecur, aut pulmonis inflam-  
 matio malè habet, contra purgationes Vul-  
 æ decocta cum Hydromelite assumitur  
*Diosc.*

## IX. De Jacobæa.

**A** Ceteris papposis non lactescentibus foliis lacinia-  
 tis. floribus flavis radiatis in umbellas digestis dif-  
 fert. *R. Synop. p. 82.*

A. Jacobæa *Offic.* Ger. sive Jacobi flos *Chab.*  
 vulgaris *J. B.* vulgaris major *Park.* vulgaris  
 unniata *C. B.* St. Jacobs *Raut.* In pascuis  
 umidioribus ad vias & locis incultis. Ju-  
 nio & Augusto floret. *Ulm.* Herba *Vires.* Cum  
 concione vires & facultates eadem obtinet  
*rag.* Imprimis autem Vulneribus, inflamma-  
 tionibus & fistulis medetur *R. H. p. 285.* Cali-  
 cum cataplasmati formâ ad verius ventris  
 tormina, (quæ miserè Disenteriâ affectos ex-  
 tuciant & tantum non interimunt) felici suc-  
 cessu fuisse abdomini applicatum observat  
*Isman.*

Pag. 153. lin. 19. subjunge:

## XII. De Cacalia.

**N** OTÆ sunt Calix floris integer, tubi cylindrici  
 formâ, ad margines duntaxat denticulatus, flos-  
 culi quadrifidi, folia subrotunda, integra serrata *R.*  
*Meth. A. p. 34.*

Cacalia *Offic.* quibusdam *J. B.* incano foliè

*Ger.* folio rotundo incano *Park.* foliis crassis hirsutis *C. B.* sive *Leontice Veterum* quibusdam: aliis vero *Tussilaginis species Chab. Calialia*, fremder *Hufflattig.* Ad *Sylvarum* margines, inter frutices & umbrosis in locis, *Junio* & *Julio* floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* In tussi & *Scabritie* arteriæ asperæ commendatur. *Succus* ejus defluens prodest arteriæ asperæ similiter ut *Glycyrrhiza: Galen.*

### XIII. De Bacchare.

**F**loribus nudis, foliis integris odoratis, sapore acro & amaro, nec non magnitudine sua à reliquis hujus generis distinguitur *R. Synop. p. 83.*

*A. Baccharis Offic. Montpelienfium Ger. Park. Conyza major vulgaris C. B. major Matthioli, Baccharis quibusdam J. B. Conyzae majoris genus Baccharis quibusdam Chab. Eupatorium montanum Verbasci folio vulgatius Baccharis dictum H. Ox. Gemeine Dürreweurz.* In montosis siccioribus & in aggeribus. *Autumno* floret. *Ufu.* Folia, Radix. *Vires.* Radix in aqua decocta, ruptis, vulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati salutaris, &c. Folia adstringunt. *Capitis dolore* profunt, &c. odor somnum gignit *Diosc.*

Quænam planta sit *Baccharis Dioscoridis* inter *Botanices* scriptores dubium adhuc manet, aliis ad *Conyzam*, aliis ad *Gnaphalium*, nonnullis ad *Asterem* eam referentibus.

## XIV. De Gnaphalio.

Pag. 154. lin. 10. adde:

**G**naphalii historiam adeo paucis perstrinxit *Dioscorides*, ut non modo difficile, sed etiam impossibile videatur (ut recte observat *Matthiolus*) ut quisquam conjicere ac discernere possit, quænam planta sit, quæ verum repræsentat: Nos ad speciem vulgarissimam potius referendam censuimus, ut quæ omnium frequentissima occurrat.

2. *Leontopodium Offic. majus Park. Gnaphalium Alpinum Ger. Alpinum magno flore folio oblongo C. B. Alpinum pulchrum J. B. Chab. Filago Alpina capitè folioso T. Inst. Löwen-Fuß. In montosis. Julio floret. Usu. Radix. Vires. Appensam ad amatoria prodesse & tubercula discutere tradunt. Diosc.*

## SECTIO SEXTA.

## De Herbis Capitatis.

## I. De Cinarâ.

Pag. 155. lin. 11. subjunge:

2. **S**colymus sylvestris *Offic. Dioscoridis Park. Cinarâ sylvestris ejusd. Parad. Ger. sylvestris latifolia C. B. Carduus Scolymus sylvestris J. B. sive Scolymus sylvestris; Scolymus Dioscoridis Chab. sive Cinarâ sylvestris latifolia H. Ox. Wilde-Erd-schocke. In Italia & Gallia occurrit. Usu. Flos.*

*Vires.* Contra sterilitatem valere & gravidarum partus ad justum tempus conservare, vulgus arbitratur. Lac coagulat. *Magol.*

3. *Cactos Offic.* Scolymus *Chab.* Carduus esculentus *Park. parad.* sive Scolymus sativus spinosus *J. B.* spinosissimus elatior Chardone dictus *H. Ox.* Cinara spinosa cujus pediculi esitantur *C. B.* Artischocke/ Erdschocke. In Italia invenitur. *Ufu.* Pediculi foliorum Terrâ obruti candidi à cute emundati. *Vires.* Cum reliquis viribus conveniunt. Hyemé crudum cum sale & pipere in cibos veniunt *C. B.*

4. *Costus nigra Offic.* Cinara sylvestris Cretica *C. B. Park.* Carduus Agriocinara Cretensium ex quo Costus nigra Officinarum *J. B.* Agriocinara Cretensium *Chab.* Candische Erdschocke. In Creta reperitur. *Ufu.* Radix nigra.

*Bellonius* Pharmacopolas Gallicos radicem hujus pro *Costo Indico* vero divendere scribit, & apud veteres in usu fuisse credit.

5. Carduus pinea *Offic.* pinea *Theophrasti Alp. Exot.* Creticus humillimus integris & angustis foliis *H. Ox.* pinea seu Ixine *Theophrasti Park.* Carlina acaulos gummifera *C. B.* Cinara acaulis gummifera *R. H. p. 301.* Cnicus *Carlinae folio,* acaulos, gummifer aculeatus, flore purpureo & flore albo *T. Coroll. Fichten, Distel.* In Insula Creta invenitur.

## II. De Carthamo.

**F**oliis levibus viridibus, floribus crocei coloris in capitulis modice spinosis, semina alba quadrangula continens pappo destituta à reliquis differt.

Pag. 155. antelin. 28. inferre:

## III. De Cnico.

**F**oliis spinosis mitioribus, capitula foliorum circulo obvallata, floribus flavis ab aliis distinguitur.

Pag. 156. lin. II. add.

## IV. De Cirsio.

**F**oliis integris, spinulis mitioribus brevioribus & minus pungentibus ab aliis differt.

Cirsium Offic. foliis non hirsutis, floribus compactis C. B. foliis non hirsutis Ger. emac. montanum capitulis compactis Park. Monspelianum, folio longo glabro Matthioli Chab. Carduus cirsium Monspeliacum, folio longo Matthioli J. B. Carduo - Cirsium foliis non glabro hirsutis floribus compactis P. Al. Melancholy; Distel. Juxta Monspelum variis in locis. Junio floret. Usu. Radix. Vires. Loco laboranti adalligatum, dolores varicum sedare scripsit Andreas.

## V. De Carduo.

**C**arduus foliis spinosis seu aculeis rigidioribus armatis, floribus purpureis, seminibus papposis à reliquis capitatis distinguitur.

Pag. eadem lin. 27. adde:

Acerrimæ facultatis est, succus cutem adurit, est tamen ad ulcera maligna depurganda utilis. *Bellon. Epist. ad Clus.*

3. *Acanus Offic.* Theophrasti *Park.* Carduus latifolius achinos obsoletæ purpuræ ferens *C. B. Theophrastus; Distel.* In Insula Creta reperitur, ubi antequam in caulem abeat comeditur. *Vires.* De viribus hujus Cardui nihil inveniо inter authores.

Hanc stirpem Acanon veteribus dictam fuisse judicat *Bellus* conjecturis non despiciendis fretus, quas apud ipsum vide *R. H.* p. 314. Consule etiam *Parkinsonum* in *Theatro suo Botanico* p. 974.

4. *Acarna Offic.* Theophrasti *Ger.* major caule non folioso *C. B. Park.* *Acarnæ* similis Carduus polyacanthus *Leon di Cardi Moschio. Casabonæ Chab.* Polyacanthus *Casabonæ Acarnæ* similis *J. B.* Carduus polyacanthus folioso caule, *Acarna* dictus *Herm. Cat.* polyacanthus caule non folioso *Acarna major* dictus *P. Al.* cœruleus procerior, spinis ternis per intervalla foliorum marginibus donatus *H. Ox.* seu Polyacantha vulgaris *El. Bot. Fisch; Distel.* In Italia sponte oritur, apud nos in hortis colitur. Julio floret.

A. 5. *Acanthium Offic.* vulgare *Park.* album *Ger.* Spina alba latifolia tomentosa sylvestris *C. B.* alba sylvestris *Fuchsio J. B. Chab.* Carduus tomentosus *Acanthium* dictus vulgaris *R. Synop.* tomentosus latifolius sylvestris; Spi-



*A. alba* vel *Acanthium* dictus *Herm. Cat. alatus*.  
*amentosus latifolius vulgaris. T. Inst. A-*  
*anthum* dictus *Volck. Wollichte Distel/Weg-*  
*Distel. Ad vias & in incultis Julio & Augu-*  
*o floret. Usu. Folia & Radices. Vires. Ad*  
*media opisthotoni bibuntur. Diosc.*

### V I. De *Calcitrapa*.

*Apitulum* squalis in aculeos rectos, oblongos & s  
 rigidos exeuntibus: foliis non spinosis à reliquis  
 fert.

*A. Carduus stellatus Offic. Ger. stellatus fo-*  
*is Papaveris erratici C. B. stellatus sive Cal-*  
*itrapa J. B. Chab. Stellatus sive Calcitrapa*  
*vulgaris Park. Jacea ramosissima, capite lon-*  
*is aculeis stellatim nascentibus armato H.*  
*ix. Stern. Distel. Juxta vias publicas in-*  
*ue incultis & sterilioribus. Æstate floret. Usu.*  
*los, Semen. Vires. Aqua florum, vel pul-*  
*is seminum Calculum expellit.*

Pag. 157. lin. 6. adde:

Frigidæ est & temperatæ, atque adeo re-  
 ellentis facultatis; In Erysipelate, morbo re-  
 gio, palpitatione cordis & uterina suffoca-  
 tione prodesse dicitur. *H. Ox.*

Pag. ead. lin. 15. subjunge:

### V III. De *Jacea*.

*A. Cyano* differt figura flosculorum ex quibus tota-  
 lis flos componitur, profundius, sc. in longas  
 & angustas lacinias divisas *R. Synop. p. 89.*

*A. i. Jacea Offic. nigra Ger. Chab. nigra vul-*

garis *Park.* nigra pratensis latifolia *C. B.* nigra vulgaris capitata & squamosa *J. B.* *Floresen-Blum.* In pascuis nimis frequens. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Contra Tonsillarum tumores valet.

2. *Stœbe Offic.* argentea major *Ger.* major foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginosis *C. B.* Salmantica prima *Clusii Park.* Salmanticensis prior *Clusii* five *Jacea Intybacea J. B. Chab.* *Jacea Intybacea Volck.* major foliis Cichoraceis mollibus, flore stamineo *H. Ox.* foliis Cichoraceis, villosis altissima flore albo *T. Inst.* foliis Cichoraceis villosis altissima *El. Bot.* *Bersilberte Glocken-Blume.* In hortis apud nos colitur. Julio floret. *Ufu.* Herba, Semina. *Vires.* Folia & semen astringunt, quapropter decoctum Dysentericis infunditur, auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis profunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent. *Diosc.*

Tam brevis est & imperfecta *Stœbes* descriptio apud *Dioscoridem*, ut Botanicos in varias distraxerit sententias, & ut diversis plantis id nominis attribuerent, induxerit. Cujus hic loci Synonyma exhibeo, æquo aut forte potiori jure hoc nomen sibi vindicare possit, cum in calidioribus regionibus frequens nascatur, quam *Jacea magna* cujus iconem *Matthiolus* exhibet, eâve quam *Dodoneus* è *Bibliotheca Casarea* hausit. Quomodo vires

vires hujus cum ea *Dioscoridis* conveniunt experimentis factis tempus prodet. †

Pag. 158. lin. 6. post verbum *reperitur* adde :

*Radix* crassa, oblonga, densa, foris fusca, intus ad croceum tendens, per transversum secta, spiras ostendens, saporis amaricantis subacris & subastringentis, odoris non ingrati.

Ibid. lin. 8. verbo *venditur* adde :

Quænam sit genuinum *Dioscoridis* *Rhaponticum* superius in Capite de *Lapathis* ostendi.

### X. De *Serratula*.

**F**oliis non spinosis à *Carduo*, iisdem serratis à *Jacea* differt, omnium partium parvitate à *Centaureis* majore distinguitur.

A. *Serratula* *Offic.* C. B. J. B. *Tabernamontani* *Chab.* purpurea *Ger.* vulgaris flore purpureo *Park.* vulgaris foliis laciniatis *H. Ox.* *Jacea nemorensis* quæ *Serratula* vulgo *El. Bot.* *Purpur Scharten-Kraut.* In sylvis & in pratensibus. Julio floret. *Usu,* Herba. *Vires.* Vulneraria est, Ulcera mundat & carne replet, hæmorrhoidum dolores mulcet, enterocelas sanat, *R. Synop.* p. 88.

### XI. De *Bardana*.

Pag. 158. lin. ult. subjunge :

2. A. *Arctium* *Offic.* *Lappa major montana* capitulis tomentosus seu *Arctium* C. B. *Bardana major altera* *Ger. emac.* major lanuginosus

nosus capitulis *Park.* Personata sive Lappa altera cum capitulis villosis *Chab.* altera cum capitulis villosis *J. B.* vulgaris capitulis minus tomentosis *R. Synop.* Grosse Klette / Grosse Docken Kraut In locis ruderatis & ad vias, Julio floret. *Usu.* Radix, semen. *Vires.* Cum priore viribus pollet. Decocta cum semine radix in vino dentium dolores mulcet, si contineatur in ore dococtum: ambusta pernionesque foventur eodem: bibitur adversus coxendicum dolores & stranguriam è vino. *Dioscorid.*

## SECTIO SEPTIMA.

### De Herbis Corymbiferis.

Pag. 160. lin. 33. subjunge:

#### I. De Flore Solis.

**A** Reliquis cujusunque generis plantis distinguitur flore omnium maximo barbulis umbonem medium coronantibus flavis & cuspidatis. *R. H.*

1. Flos Solis *Offic.* Solis major *Ger.* Chrysanthemum Peruvianum sive Flos Solis *Park. parad.* Indicum, flore & semine maximis annum *Herm. Cat.* Indicum maximum annum non ramosum *H. Ox.* Helenium Indicum maximum *C. B.* Herba maxima *J. B. Chab.* Chimalath Peruviana, Flos Solis. *Herm.* Corona Solis Tabernamontani *El. Bot. T. Inst.* Sonnens Blume. In hortis colitur. Augusto floret. *Usu.* Germina floris, Semina oblonga, tumidiuscu-

viscosa & nonnihil compressa, nigra. *Vires.* Germina cocta Venerem stimulant. *Semina* pedus leniunt & ardorem extinguunt, liberalius autem devorata capitis dolorem excitant. Traumatica est planta.

2. Battata Canadensis *Offic.* Battatas de Canada *Park.* & *Parad.* Flos Solis pyramidalis, parvo flore, tuberosa radice, Heliotropium Indicum quorundam *Ger. emac.* Solis tuberosus, Indicus, sive Adenes Canadensis *Griff. virid. Lusitan.* Corona Solis parvo flore, tuberosa radice *El. Bot.* Helianthemum Indicum tuberosum *C. B.* Helenium Indicum tuberosum *H. R. P.* Chrysanthemum Indicum radice tuberosa *Herm. Cat.* perenne majus foliis integris Americanum tuberosum *H. Ox.* Canadense strumosum *Florent. Sch.* Adenes sive Flos Solis glandulosus *J. B.* Indianische Wurzel, Erdschocke von Jerusalem. In hortis apud nos colitur. *Usu.* Radix in Culinis.

### III. De Crysanthemo.

Pag. 161. lin. 16. verbo occurrit adde:

**F**olia seu Herba ferventi stomacho, oculorum inflammationibus, proci duæ sedi, ac inguinum tumores auxiliantur. Aqua florum si bibatur, anginæ & pueris comitiale malum opitulatur. *Diosc.*

2. Buphthalmum *Offic.* *Chab.* Cotulæ folio *C. B.* alterum *Matth.* peregrinum *Alp. Exot.* alterum Cotulæ folio *Park.* *Ger. emac.* tenuifoli-

folium folio Millefolii fere J. B. Chrysanthemum Cotulæ folio *Her. Cat.* alterum Cotulæ latiori folio *P. Al.* orientale Cotulæ folio ampliore *H. Ox.* Cotula flore luteo radiato *El. Bot. T. Inst.* Ochsen Auge / Gold Blume. In locis orientalibus sponte oritur, apud nos in hortis curiosorum nutritur. Junio floret. *U. su.* Herba. Flos. *Vires.* Herba vulneraria est. Flores cum cerato triti tumorum duritias discutunt. *Diosc.*

*Buphthalmi* nomine variæ donantur plantæ, *Imperatus* hoc legitimum esse statuit, cui & nos subscribimus, *Buphthalmum* enim *Fœniculi* folia habere affirmat ipse *Diosc.*

3. Chrysanthemum *Offic.* foliis *Matricariæ* C. B. veterum seu majus folio valde laciniato *Chab.* majus folio valde laciniato flore croceo J. B. Gold Blume mit Metterkraut, Blättern. In hortis colitur, sed rarius. Æstate floret. *U. su.* Flores. *Vires.* Cum cerato triti steatomata discutere produntur. *Diosc.*

## VI. De Othonna.

**H**ujus Nota sunt floris calyx integer oblongus, petala lata, semina longa compressa: folia laciniata *Tanaceti* æmula R. H. p. 342.

*Othonna* *Offic.* *Tagetes Indicus*, Flos Africanus *Chab.* *Tagetes Indicus* minor simplici flore, sive *Caryophyllus Indicus*, sive Flos Africanus J. B. Flos Africanus minor simplici flore *Ger.* minor simplex *Park.* *Tanacetum Africanum* sive flos Africanus minor C. B. Chry-

Santhemum Africanum Tanaceti folio procumbens, sive minus flore simplici *H. Ox.* Caryophyllus Mexicanus quintus Tlapalcotli Coaxochitl *Herm.* Indianische Neglein/Sammet oder Studenten-Blume. In hortis feritur. Æstate floret. *Ufu.* Succus inspissatus. *Vires.* Oculorum medicamentis adjicitur, ubi expurgare est opus: abstergit enim omnem caliginem. *Diosc.*

Pag. 162. lin. 17. subjunge:

### V. De Millefolio.

2. **A** Chillea *Offic.* sive Millefolium nobile *Ger.* Achillea siderites sive nobilis odorata *Park.* Achillea Millefolia odorata *J. B. Chab.* Millefolium majus album odore Camphoræ *Herm. Cat.* nobile *Trago T. Inst. El. Bot.* nobile & Stratiotes vera *Tragi H. Ox.* Tanacetum minus album odore Camphoræ *C. B. Edel Garbe/Weisser Reinfaren.* In Germania, Italia & Gallia provenit. Julio floret *Ufu.* Herba. *Vires.* Sanguinis fluxus seu profluvia ubicunque sistit. Extrinsicus *Vulneraria* est insignis.

Pag. 165. lin. 11. subjunge:

### X. De Bidente.

**NOTÆ** sunt semen cornutum seu bidens, folia in caule bijuga, flores interdum radiati, aliàs nudi. *R. Meth. Auct. p. 37.*

*Acmella* *Offic.* Chrysanthemum bidens *Zeylanicum* *Acmella* dictum seu *Bidens* *Zeylani-*

lanicum, flore luteo, Lamii folio Breyn. *Dis-  
sert. Bot.* Cannabina aut Bidens Urticæfolia  
Indicalithontriptica D. *Hotton, Act. Philos. Lond.*  
N. 257. p. 365. Senecio Indiæ Orientalis Ocy-  
mi majori folio profundè crenato P. *Al. Tab.*  
315. n. 2. Acmella, *Uchmella*. In Insula Zey-  
lanica sat copiose reperitur, unde in Euro-  
pam transportatur. *Usu.* Folia, semen. *Vires.*  
Diaphoretica est & anodyna, humores visci-  
dos tenaces attenuat, obstructiones reserat,  
materiam tartaream in renibus vel vesicâ  
concretam resolvit, calculosque aliquomodo  
frangit. *Semen* in Colica, Febribus & Pleu-  
ritide optimum est remedium. Breyn. *Dis-  
sert.* p. 14.

Pag. 166. lin. 12. adde :

Prodest etiam in Cachexia, ad uterinos fri-  
gidos affectus utiliter adhiberi solet, men-  
sesque provocat. Semen lumbricos expel-  
lit. *H. Ox.*

### XV. De Absinthio.

Pag. 167. lin. 23.

CUM Gerardo, C. Baubino aliisque hanc spe-  
ciem Absinthium Ponticum Dioscoridis es-  
se existimo : Vulgare enim Romanum est, sic  
olim dictum, quod fuerit Plebi Romanæ sa-  
crum, & quod in agro Romano antiquis-  
ve ruderibus passim inveniatur : Ponticum ve-  
ro à Ponto in quo Plurimum nasci traditur :  
Unde falluntur qui vulgare aliud à Romano &  
Pontico existimant.

Pag.



Pag. 167. lin. ult. post verbum *convenit* adde :

Sed mitiori, palato etiam magis grato. Ex  
 ongo usu comorum hujus, quæ Saccharo ad-  
 ervatæ fuerant, Hydropicos quosdam quasi  
 leploratos sanitati restitutos se novisse scri-  
 bit *Matth.*

Pag. 168. lin. 7. subjunge :

4. Absinthium Santonicum *Offic.* Santoni-  
 cum Gallicum *C. B. Magnol. append. Fransch-  
 Burm-Saamen.* In Gallia Narbonensi repe-  
 ritur cum Seriphio Gallico permixtum. *Usu.*  
 Herba. *Vires.* Cum Seriphio viribus conve-  
 nit. *Diosc.*

Pag. eadem lin. 19. subjunge :

Non levis est controversia inter Botanicos  
 de Lumbricorum seminibus *Officinarum*: a-  
 liis Zedoariæ semina esse affirmantibus, aliis  
 Absinthii: Zedoariæ semina non esse auda-  
 cter affirmare ausim, quia hæc rotunda sunt  
 & fusca, & vasculo tricapsulari contenta;  
 quæ notæ Lumbricorum semini *Offic.* nostra-  
 tibus superius descripto nullatenus conve-  
 niunt. Alii idcirco, ut dixi, Absinthii cu-  
 jusdam semina esse opinantur, cujus *C. Bau-  
 hinus* in *Pinace* pag. 139. non pauciores qua-  
 tuor species producit, quarum primam & se-  
 cundam, non tantum unam & eandem plan-  
 tam esse credo, verùm illam ipsam quæ no-  
 stra Lumbricorum semina profert. *Rauwol-  
 fus* eam in *Palestina* ubique provenire scribit.  
 Utrum ad caput de Absinthio propriè perti-

neat, an ad illud de Abrotano potius referenda, impræsentiarum determinare non libet.

6. Santonicum viride *Offic.* Chouan *Pomet.* Grüner *Burm-Saamen.* Semini Lumbricorum superius descripto simile est, majus duntaxat, & coloris luteo-viridis, *Vires.* Cum priori viribus convenit.

Huic simile si non idem me vidisse aliquando memini apud Pharmacopolas Londinenses. *Pometus* ad Parisios è Turcia primò allatum esse affirmat.

7. Helichrysum *Offic.* Chab. Heliochryson *Park. parad.* quorundam, foliis Abrotani *J. B.* Elichryson foliis Abrotani *C. B.* Coma aurea sive Helichryson *Ger.* Absinthium tenuifolium corymbis æqualibus seu compactis *H. Ox.* corymbiferum annuum *El. Bot. T. Inst.* Stáchas *Blumen / gelbe Keim-Blumen.* In hortis apud nos colitur. Julio floret, *Ufu.* Herba. *Vires.* Contra serpentium ictus, coxendicium dolores, urinæ stillicidia ruptaque commendatur, ciet menses, & sanguinem concretum dissolvit, destillationes sistit. *Diosc.*

## XVI. De Abrotano.

Pag. 169. lin. 3. subjunge:

2. **A.** Artemisia tenuifolia *Offic.* tenuifolia seu leptophyllos, aliis Abrotanum *J. B.* Chab. Abrotanum campestre *Ger. C. B. Park.* inodorum *Schwenck.* Wilde *Aber-Raute / wilde Stabwurz.* In locis arenosis reperitur. Junio flo.

floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Dolorem ventriculi & nervorum mitigat.

Pag. 169. lin. ult. subjunge:

### XVIII. De Dracone Herba.

*Flosculis in spicis dispositis, foliis integris longis & angustis à reliquis distinguitur.*

Dracunculus *Offic.* hortensis C. B. hortensis sive Tarchon J. B. *Chab.* Draco herba *Ger.* herba sive Tarchon & Dracunculus hortensis *Park.* Abrotanum Lini folio acriori & odorato T. *Inst.* mas Lini folio acriori & odorato *Fl. Bot.* *Tragum / Kaysers-Salat.* In hortis apud nos colitur. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Excalfacit, incidit, digerit, aperit, menses provocat, flatus dissipat, appetentiam excitat, pituitam educit & cerebrum humidum purgat.

## De Herbis Corymbiferis affinibus.

### II. De Dipsaco.

Pag. 171. lin. 14. subjunge:

3. A. Virga Pastoris *Offic.* *Park.* Pastoris vulgaris J. B. *Chab.* Dipsacus minor sive Virga Pastoris *Ger. emac.* sylvestris capitulo minore, vel Virga Pastoris minor C. B. Kleine wilde Karten-Distel. Ad sepes in humidis & aquosis. Julio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Aquam foliorum in appetitu depravato mu-

lierum laudat *Æginet.* Pulvis commendatur in Hæmoptyli ad *3i Prax. Mayern.*

### III. De Echinopo.

**I**nsigni capitis in Sphæricam figuram conglobati notâ ab aliis plantis facile dignoscitur. R. H. p. 383.

1. *Crocodilion Offic. Echinopus Chap. major J. B. Scabiosa Cardui folio, Sphærocephala elatior Herm. Cat. Carduus globosus Ger. Sphærocephalus latifolius vulgaris C. B. Sphærocephalus sive globosus major Park. Grosse Eberwurk/Spher-Distel/Bollen-Distel.* In hortis colitur. Æstate floret. *Ufu.* Radix, Semen. *Vires.* Radix pota sanguinem copiosum per nares pellit: datur lienosis, eos evidenter adjuvans. Semen Urinam ciet. *Diosc.*

*Crocodilion à Dioscoride ita describitur: Chamaeleontis nigri figuram habet: nascitur in sylvis, radice longa, levi, aliquantulum lata, odore ut Nasturtii acri.* Sed quænam planta sit, quamvis variæ eo nomine à Botanicis scriptoribus appellentur, non ita facilè est determinare. Nonnulli *Carlinam* esse volunt, alii *Eryngium maritimum.* Utraque opinio à *Matthiolo* solide refutatur, cujus rationes apud Authorem requirendas omitto. *Andreas Lucana, Adversariorum Auctores & Lobelius in Observationibus,* plantam quam hic exhibeo *Crocodilii* nomine donant, quorum authoritati impræsentiarum sententiam meam submitto, ut quæ descriptio-

tioni superius datæ præcipue convenire videatur.

2. Spina alba *Offic.* alba quibusdam capite chinato *J. B.* leucas sive Spina alba *Chab.* Carduus globosus acutus *Ger.* Sphærocephalus acutus minor *Park.* Sphærocephalus capitulo longis spinis armato *C. B.* Echinopus reticus capite magno aculeato *T. Coroll.* Scariosa acanthoides conglobato capite, longis spinis munito *P. Al.* Spitzige Spher-Distel. In ortis curiosorum apud nos colitur. Æstate orens. *Ufu.* Radix, Semen. *Vires.* Radix cœliacis efficax est, urinam ciet, decoctamentum dolori prodest. Semen convulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. *Diosc.*

Spina alba *Dioscoridis* quam his verbis describit: *Folia fert albi Chamæleontis, angustiora, liquantum hispida, & aculeata: caulem supra bicubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, orbicantem, intus cavum: in cacumine capitulum inst spinosum, echini marini æmulum, sed minus & blongum: flores purpurei, in quibus semen, ceu cnicum, sed rotundius.* Est etiam planta controversa, quæque eruditorum nonnullorum ingenia vexavit eosque in partes distraxit. *Annullarius* alique eam esse quam hic damus affirmant, quorum opinio maxime verisimilis videtur, Autorisque descriptioni præ aliis convenire, ideoque eam ita appellavi.

3. Spina Arabica *Offic.* Carduus spinosissimus Sphærocephalus rigidis aculeis armata

*C. B. spinosissimus Sphærocephalus*, *Cardui Arabici nomine missus Park. Arabische Distel.* In hortis facile assuescit. Æstate floret. *Ussu.* Radix, folia. *Vires.* Folia ad Sanguinis rejectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluxiones radix etiamnum valet. *Diosc.*

*Spina Arabica Dioscoridis* est etiam alia planta ambigua; nec mirum, cùm nihil aliud de eo dicat, quàm quòd naturâ *Spinæ albae similem esse constet.* Quod adeò obscurum est, ut nodum hunc *Gordianum* solve re ferè impossibile fuerit. *C. Baubinus* eumque secutus *Parkinsonus* Plantam de qua hic agimus eo nomine missum affirmantes, ut huc referrem mihi autores fuerunt, quamvis *Cesalpinus* & *Anguillara* ad aliam plantam, nimirum ad *Carduum tomentosum Adversariorum Spinam Arabicam Dioscoridis* retulerunt.

4. Ritro *Offic.* *Echinopus minor J. B. Chab.* *Cardus globosus minor Ger.* *Sphærocephalus cœruleus minor C. B.* *Sphærocephalus minor Park.* *Scabiola Cardui folio Sphærocephala humilior Herm. Cat.* *Kleine Spher. Distel.* In hortis etiam colitur. Julio florens. *Ussu.* Radix. *Vires.* Cum primo viribus convenit.

Ritro, *Tetralicis* & *Chalceios* plantarum meminit *Theophrastus*, posteriorum duarum etiam *Plinius*, nullis descriptionibus additis; unde quænam plantæ sint Botanicorum nemo certò determinare potest. *Lobelius* in iconibus *Echinopum Chab.* pro Ritro, *Tetralice* & *Chalceio* *Ejusdem Authoris* accipit. *Anguillara* &  
*Lobe.*

*Lobelius* Ritro nomine hanc plantam appellantes ut eam hic collocarem me induxerunt. Huc etiam transcribam quicquid de iis *C. Bauhinus* in *Pinace* pag. 381. habet.

Ῥύθρον Theophrastus 6. Hist. 3. *hec solum* habet: *Alia* supernè cacumine tantum ramos spargunt quemadmodum *Ruthrum*. Sunt tamen qui velint mendosè pro ἔρυγγις, apud Theophrastum legi, quod ex *Pliniana* lib. 21. cap. 16. loci illius Theophrasti interpretatione colligitur cum ibi non *Ruthrum* sed *Eryngium* legatur.

*Hæc* libuit aspergere, cum huic & sequentibus, hæc nomina à quibusdam tribuantur: ut verborum brevitatis obstat quo minus certi quid statui possit.

Τετραλίξ (quam cum reliquis aculeatis plantis enumerat Theophrastus 6. Hist. 3.) inquit, à quibusdam vocata, æstate floret: Et *Plinius* lib. 21. cap. 16. quædam æstate florent, ut *Tetralix*. Sed non est confundenda cum *Erica*, quam Athenienses *Tetralicen* vocant, eodem lib. 11. cap. 16. authore.

Χάλκει (Ærariam *Gaza* vertit) apud Theophrastum & *Plinium* esse volunt, cum tamen eius historia apud neutrum extet: Sic Theophrastus 6. Hist. 3. inter natura spinosas *Chalceios*, quæ tamen non aculeatis foliis constat: Et *Plinius* lib. 21. cap. 16. Item *Acarna*, *Leucacanthos* *Chalceos*, &c. in foliis non habent aculeos.

## IV. De Eryngio.

Pag. 171. lin. ult. pro 2da & 3tia specie  
adde:

2. **A**. Eryngium campestre *Offic.* Eryngium  
*Chab.* vulgare C. B. J. B. mediterraneum  
*Ger.* mediterraneum seu campestre  
*Park.* Braken-Distel / Manns-Freu. In Anglia  
rarius est, in transmarinis autem frequens,  
Julio floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum priore  
viribus convenit.

3. Eryngium trifolium *Offic.* *Park.* R. H. trifolium  
Alpini *H. Ox.* Dreyblätterigte Manns  
Freu. In hortis curiosorum nonnunquam colitur.  
*Usu.* Radix. *Vires.* Cum primo etiam  
viribus convenit.

## SECTIO OCTAVA.

### De Herbis Monospermis.

#### I. De Valeriana.

Pag. 173. inter lin. 7. & 8.

2. **A** Valeriana sylvestris *Offic.* Valeriana  
*Rivin.* sylvestris major, *Ger.*  
*Park.* C. B. sylvestris magna aquatica  
J. B. *Chab.* sive Phu majus sylvestre  
P. B. major sylvestris foliis latioribus  
*Mor Umb.* Phu & Valeriana *Officinarum* Germanorum  
*Volck.* Grosser wilder Baldrian. In sylvis & dumetis præsertim humidis & ad aquas,  
Majo, Junio & Julio floret. *Usu.* Radix.



dix. *Vires.* Pulvis ad coch. semiss. in Vino aut quovis liquore exhibitus, certum est remedium contra Epilepsiam. Pueris tamen minore dosi exhibetur in lacte. *Column.* Ruptis, convulsis & ex alto præcipitatis utilis. Ad oris & gingivarum inflammationes, exulcerationes & aphthas prodest. *H. Ox.* Contra febres tertianas valet. *Schwab.*

Pag. 173. lin. 22. viribus *Nardi Celticæ*  
adde:

Calfacit & siccat, viriumque earundem est cum *Spica Indica*, majore tamen cum utilitate adhibetur in urina cienda, ventriculo roborando, flatibus discutiendis. Extrinsicè additur Malagmatis unguentisque calfacientibus. *Schrod.*

4. *Nardus montana* *Offic. Ger. Chab.* montana tuberosa *Park.* montana radice olivari *C. B.* *Valeriana* *Nardus dicta radice olivari* *H. Ox.* *Berg. Spicanarde.* In montibus Neapolitanis. Æstate floret. *Usu.* Radix cum foliis. *Vires.* Ad eadem ad quæ *Celticum* efficax. *Diosc.*

## II. De *Valerianella.*

**S**eminibus pappo destitutis à *Valeriana* differt, caulibus dichotomis ab aliis ferè omnibus plantis. *R.* *Meth. A. p. 44.*

A. *Lactuca agnina* *Offic. Ger. Park.* agnina latifolia *P. B.* agnina vulgò *Herm. Cat.* *Valeriana campestris inodora major* *C. B.* *Valeria-*

nella arvensis præcox humilior, femine depresso *Mor. Umb.* Pseudovaleriana annua arvensis præcox, humilis, femine compresso rotundo *H. Ox.* Locusta Herba prior *J. B.* Herba, Pes Locustæ *Chab. Lämmer- & Lattich/ Feld- & Kapunzelchen.* Inter segetes, & in hortis. Vere floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Refrigerat & humectat, facultateque & temperamento haud dissimilis Lactuæ, cujus loco hybernis & primis veris mensibus inter olea obtinet locum.

### III. De Dentellaria.

*Hujus nota sunt fructus oblongi, hirti, villis armati; flores è tubo oblongo in quinque segmenta expansi, & in spicas congesti, folia alterna. R. Meth. A.*

Plumbago *Offic.* Plinii *Ger.* quorundam Clusii *El. Bot.* Dentellaria *Rondeletii J. B. Chab.* Lepidium Dentellaria dictum *C. B.* Monspe-liacum Dentellaria dictum *Park. Bley- & Burck/ Flöh- & Kraut.* In Gallia & Italia nascitur. Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Caustica est planta. Dolores dentium mitigat carpis applicata, aliis vero manu tantum retenta.

### VI. De Pimpinella.

Pag. 175. lin. 25. pro 2da specie subjunge:

2. **C**Uminum sylvestre *Offic. Ger. Park. Chab.* sylvestre capitulis globosis *C. B.* sylvestre primum, valde odoratum, globulosum *J. B.*

J. B. Cuminoides vulgare *El. Bot. T. Inst.* Pastinaca tenuifolia Cretica capitulis globosis *Mor. Umb.* Daucus odoratus Creticus Sanguisorbæ capitulis villosis *P. Al.* Umbelliferis affinis capitulis globosis & villosis *H. Ox.* Wilder Rümme. In Insula Creta, &c. locis glareosis. *Usu.* Semen. *Vires.* Adversus tormina inflationesque commendatur; singultus sedat, sugillata tollit, testium inflammationes repellit.

Pag. 176. lin. 10. pro cap. 8. adde:

### VIII. De Thaliatro.

**C**haracteristicae sunt folia umbellatarum in modum divisa, flores staminosi, semina ut in umbelliferis striata. *R. Synop. p. 101.*

A. Thaliatrum *Offic.* seu Thaliatrum majus *Ger.* majus vulgare *Park.* majus filiquâ angulosâ aut striatâ *C. B.* nigrius caule & semine striato *J. B. Chab.* Grosse Wiesen-Raute. In pratis & locis humidis. Junio floret. *Usu.* Herba, Radix. *Vires.* Ulcera antiqua ad cicatricem perducit. *Diosc.* Aperit, incidit, alvum movet, urinam ciet, icterum sanat, pesti resistit. Radix optimum Rhabarbari substitutum esse creditur.

## SECTIO NONA.

De

## Herbis Umbelliferis.

Pag. 182. inter lin. 10. &amp; 11. adde:

## VI. De Oreoselino.

**N**OTÆ sunt folia Petroselini aut Cicuta similia, flores rosæ formæ. R. Meth. A.

1. Petroselinum montanum *Offic.*  
*Schrod.* Oreoselinum majus Clusii *H.*  
*Ox.* sive Apium montanum & Apium montanum Dalechampii *Chab. Ger. Mor. Umb.* Apii folio minus *El. Bot. T. Inst.* Apium montanum vulgatus *Park.* montanum, folio ampliore *C. B.* montanum Dalechampii *J. B.* Libanotis montana Apii hortensis foliis nigrioribus *P. Al. Berg. Petersilge.* In locis montanis reperitur. *Usu.* Radix, Semen. *Vires.* Calfacit & siccant, alexipharmacum est, sudorificum, diureticum, discutiens. *Usus præcip.* in calculo renum ac vesicæ, in Peste, in flatibus, in stranguria. *Schrod.*

2. Daucus montanus *Offic.* montanus Apii folio major *C. B.* selinoides major *Park.* Libanotis Theophrasti nigra *Ger.* altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra *J. B. Chab.* nigra seu Saxifragia Venetorum *Mor. Umb.* Laserpitium minus Paludapii folio, semine cristato *P. Al.* Oreoselinum Apii folio majus  
*El.*

*El. Bot. T. Inst.* Schwarze Hirschwurzel/Mohr-  
Kummel. In montosis Italiae. Julio floret. *Usu.*  
Semen. *Vires.* Calfacit, aperit, incidit, uri-  
nam & menses ciet, partum expellit, tumo-  
res discutit.

## X. De Ferula.

Pag. 183. lin. 32. Et omnia synonyma deleantur, in quorum loco substitue sequentia.

1. **F**erula Galbanifera *Offic.* fruticosa semper  
virens, foliis Anisi, Galbanifera, ex qua  
Galbanum Officinarum *P. B. P.* Africana Gal-  
banifera, Ligustici foliis & facie *Par. Bat.* A-  
nisum Africanum frutescens folio & caule  
rore cœruleo tinctis *P. P. Tab. 12. f. 2.* frutico-  
sum Africanum Galbaniferum *H. Ox.* Oreose-  
linum Africanum Galbaniferum frutescens,  
Anisi folio *T. Inst.* Anisoides arborescens, Li-  
gustici foliis & facie, flore luteo, Capitis Bo-  
næ Spei *Breyn, p. 2.* An ferula Galbanifera  
*Lob?*

Pag. 184. lin. 9. subjunge:

2. **F**erula *Offic. Ger.* tenuiore folio *Park.* ma-  
jor seu foemina *Mor. Umb.* foemina Plinii  
*C. B.* folio foeniculi, semine latiore & rotun-  
diore *J. B. Chab. Niesen-Fenchel.* In hortis Bo-  
tanorum aliquando colitur. Julio floret.  
*Usu.* Medulla caulium, Semen, Succus seu  
Gummi Sagapenum dictus. *Vires.* Viridis  
medulla pota sanguinem spuentibus & cœ-  
liacis prodest, sanguinis eruptiones sistit, ca-  
pitis

pitis dolores lenit. Semen potum torminibus auxiliatur. *Diosc.*

3. Panax Asclepium *Offic* Asclepias Ferulæ facie *Ger. emac.* Libanotis Ferulæ folio & semine *C. B.* quibusdam, flore luteo, semine Ferulæ *J. B. Chab.* Ferulæ folio & semine, sive Panax Asclepium Ferulæ facie *Lobellii Park.* Ferula Libanotidis odorem & succum fundens, seu Panax Asclepium *Mor. Umb.* minor *El. Bot.* minor ad singulos nodos umbellifera *T. Inst.* Panax-Kraut/Allheilwurk des Æsculapius. In *Istria* provenit. Æstate floret. *Usu.* Flores, Semen. *Vires.* Auxiliarem vim habent flores & semina contra ulcera phagedenas & tubercula, si trita & cum melle imponantur: adversus Serpentes si vino bibuntur. *Diosc.*

4. Libanotis altera *Offic.* Fœniculi folio, semine foliaceo *C. B.* Panax Asclepium Anguillaræ & Camerarii *Park.* Ferula folio glauco, semine lato oblongo, quibusdam Thapsia ferulacea *J. B. Chab.* Thapsier/Candische Heilwurk. In *Insula Candia* reperitur. Æstate floret. *Usu.* Radix, Herba, Semen. *Vires.* Trita omnium herba communiter Hæmorrhoidum profluvia sistit: Sedis inflammationes & condylomata mitigat. Siccæ radices ulcera purgant, menses & urinas cient. Potum Semen ad eadem pollet. *Diosc.*

Pag. 185. post lin. ult. adde:

## XI. De Libanotide.

*NOTÆ* hujus generis characteristicæ sunt folia tenui-

niter dissecta, semina tumida, nucis Myristicæ parva figura, fungosâ substantiâ nucleum ambiente. R. H. p. 424.

Libanotis *Offic. Chab.* Ferulæ folio, semine anguloso C. B. Cachryophorus quibusdam floribus luteis J. B. Galeni Cachrys verior *Ger.* Ferulæ folio, sive Cachryfera, sive Cachrys vera *Park.* Cachrys semine fungoso lævi *H. Ox.* sive Libanotis Cachryophoros semine fungoso lævi *Mor. Umb.* semine fungoso lævi foliis Ferulaceis *Ejusd. El. Bot.* *Weyrauch's; Wurk; Fenchel-Kraut.* In montibus *Italiae & Siciliae, &c.* Majo floret. *Usu.* Radix & Semen. *Vires.* Vim habet excalfaciendi & vehementer exiccandi; quare abstergentibus medicamentis inferitur. *Diosc.*

## XII. De Laserpitio.

NOTE sunt Quatuor alæ foliaceæ per longitudinem decurrentes in singulis seminibus. Alæ hæ membranaceæ in binis seminibus dum adhuc viridia & conjuncta sunt, sex tantum videntur, binis illis ad basin singulorum seminum arctè sibi invicem commissis. R. *Meth. A.* p. 48.

Laserpitium *Offic. Ger.* Gallicum C. B. *Park.* è regione *Massiliæ* allatum J. B. lobis angustioribus lucidis saturatè virentibus plurifariam divisis *P. Al.* angustifolium foliis conjugatim positis quinquifidis *H. Ox.* foliis angustioribus dilutè virentibus *Mor. Umb.* Silphium sive Laserpitium *Chab.* *Lasel-Kraut.* In hor-

hortis colitur. Æstate floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. Excalfacit, fugillatis, strumis ac tuberculis medetur, Ischiadicis, excrescentiisque circa sedem tollendis convenit, Veneri resistit; os commendat. *Diosc.*

### XIII. De Scandice.

**S**eminibus in rostrum productis, Geranii moschati rostra referentibus, ab aliis umbelliferis abunde distinguitur. R. Synop. p. 103.

A. Scandix *Offic. Mor. Umb.* Semine rostrato vulgaris C. B. vulgaris, seu Pecten Veneris *Park.* Pecten Veneris J. B. *Chab.* Veneris seu Scandix *Ger. Nadel-Körffel/Venus-Strahl/Venus-Kamm.* Inter segetes frequens. Majo & Junio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Stomacho & Ventriculo utile est. Decoctum, vesicæ, renibus & jecinori confert. *Diosc.*

### XV'III. De Angelica.

Pag. 188. pro Secunda specie Angelicæ adde:

2. **A.** Herba Gerardi *Offic. Ger.* Podagraria vulgaris *Park.* Angelica sylvestris minor sive erratica C. B. Sylvestris, repens J. B. *Chab.* Podagraria dicta *Mor. Umb.* Geiß: Süß/Geiß:Gras. Ad sepes, præcipue hortorum. Junio & Julio floret. *Ufu*. Radix, Herba. *Vires*. Eisdem cum Sativa viribus pollere creditur, quamvis languidior sit. Podagram juvat.



Pag. 189, lin. 16, subjunge:

## XXI. De Bulbocastano.

**R**adice esculenta, foliis tenuius incis, semine longuisculo glabro, ab aliis Umbellatarum generibus facile distinguitur. R. Synop. p. 105.

A. Bulbocastanum *Offic. J. B. Chab. Morimb.* Majus & minus *Ger.* Majus folio Apii

B. Nucula terrestris major & minor *Park. Erd. Nuß Erd Castanien Sau. Castanien.* In

vascuis solo arenoso aut glareoso frequens.

Vere floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Venerem

stimulat, multum nutrit. Cruenta mingenibus & etiam spuentibus auxiliatur. *Trall.*

## XXIV. De Sisaro &amp; Amomo.

Pag. 191. lin. 16. pro 3a, 4ta & 5ta Specie adde:

**S**ecacul *Offic.* Sisarum Syriacum *C. B.* alterum Syriacum *Park.* pastinaca Syriaca & Sacacul Arabum quibusdam *J. B.* Apium Syriacum radice ampla eduli *H. Ox.* Syrische Zucker Kublein. Zucker Wurzel. Circa Halpum reperitur. *Usu.* Radix longa, crassa, intus candida, lævis, externe verrucosa. *Vires.*

A. 4. Selinum segetale *Offic. Park.* Sii foliis *Ger.* Sium terrestre umbellis rarioribus *H. Ox.* Silon alterum vel Amomo congener Sii foliis nostras *P. Al.* Honig Wurzel. Zucker Möhelein: Inter segetes solo humido & lutoso Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Contra tumores valet.

A. 5. *Sium Offic. majus latifolium* Ger. latifolium C. B. maximum latifolium J. B. *Chab.* *Dioscoridis* sive *Pastinaca aquatica major* Park. *Sium aquaticum latifolium* Mor. *Umb.* *Wasser, Wasser naef. Wasser Eppich.* In fluviis & locis paludosis. Julio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Cruda coctaque esa calculos rumpunt, atque excernunt, urinas cient, menses & partus extrahunt. *Dysentericis* in cibo auxiliantur *Diosc.*

### XXVII. De Apio.

Pag. 193. pro 3a specie Apii adde:

3. **B**unium *Offic. Dalechampii* J. B. *Chab.* *Daucus Petroselini vel Coriandri folio* C. B. *Petroselini vel Coriandri folio seu Bunium Dalechampii* Park. *Saxifraga montana minor Petroselini vel Coriandri folio* H. Ox. *Apium octavum* R. H. p. 449. *Wilde Petersilge.* In locis saxosis & asperis. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Urinam ciet, excalfacit, secundas evocat: lieni, vesicæ, renibus utile est. *Diosc.*

### XXIX. De Cicutâ.

Pag. 194. pro 2da Specie Cicutæ lin. 13. subjunge:

2. **S**eseli *Peloponense Offic. Peloponnesiacum recentiorum* Park. *Peloponense Matthioli sive Cicutaria quorundam* J. B. *Cicutaria latifolia foetida* C. B. *maxima foetida Chab.* *Cicuta latifolia foetidissima* Ger. *emac. Mor.*

*Mor. Umb.* Grosser breit Blätterigter Schierling. In montibus Rhætiae invenitur. *Ufu.* Radix, Semen. *Vires.* Eisdem viribus cum Sefeli Massiliensi præditum est. *Dioscorides.*

### XXX. De Phellandryo.

**N**ote sunt, caulis crassissimus, folia amplissima, multifariam in minutas particulas ad modum *Cicutæ* divisa, florum petala equalia, bifida. R. Meth. A. p. 52.

A. Phellandrium *Offic.* El. Bot. T. *Inst.* vel *Cicuta* aquatica quorundam J. B. Plinii quibusdam aliis *Cicutaria* aquatica *Chab.* *Cicutaria* palustris *Ger.* *Palustris tenuifolia* *Park.* C. B. *Mor. Umb.* *Cicuta* palustris *Cordi Volck.* Wasser Schierling. In aquis cænosis & rivis pigrioribus. Æstate floret. *Ufu.*

Pag. 195. post lin. 23. adde:

### XXXIII. De Gingidio.

**U**mbella à flore delapso, clausa, ejusque radiis prælongis, rigidis, duris ab aliis omnibus Umbelliferis distinguitur. R. H. p. 456.

*Gingidium* *Offic.* umbellâ longâ C. B. *Hispanicum* *Ger.* *Visnaga* J. B. *Chab.* seu *Gingidium* *Mor. Umb.* *Gingidium* appellatum *Park.* *Foeniculum* annuum; umbellâ contractâ oblongâ. T. *Inst.* Spanisch Zahnstecher & Kraut. Spanisch Kôrffel. In hortis apud nos colitur. Æstate floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Olus hoc crudum, coctum conditumve estur magna stomachi utilitate: Urinam ciet. *Decoctum*

ctum ex vino potum vesicæ prodest. *Diosc.*  
Radii umbellarum pro dentiscalpiis multis in  
usum veniunt. *R, H.*

### XXXV. De Fœniculo.

Pag. 196. post. lin. ult pro 3a specie  
Fœniculi adde:

3. **M**Yriophyllon *Offic.* Millefolium aqua-  
ticum *Ger.* Aquaticum vulgatius *Park.*  
Aquaticum umbellatum capillaceo brevique  
folio *C. B.* Aquaticum Fœniculo simile Um-  
belliferum *J. B.* Fœniculo simile Millefolium  
aquaticum umbelliferum *Chab.* Wasser- Sen-  
schel. In paludosis oritur. Aprili floret. *Usu.*  
Herba. *Vires.* Vulneraria esse planta credi-  
tur.

### XXXVI. De Pyrethro.

*Radice fervida, semine nigricanti à reliquis differt.*

**P**Yrethrum verum *Offic.* Sylvestre *Ger.* Um-  
belliferum *C. B.* Umbelliferum primum  
*Park.* Umbelliferum Matthioli *J. B.* Umbelli-  
ferum latiore folio *H. Ox.* Echt Spanisch/  
Mauer-Kraut *Bertram.* In hortis Botanico-  
rum colitur. Æstate floret. *Usu.* Radix pol-  
licis crassitudine, colore exterius ex fusco  
flavescente, interius nigro, sapore acri ad-  
modum & fervido. *Vires.* Ad dentium dolo-  
res tollendos cum sua causa non infeliciter in  
ore continetur. In Lethargicis affectibus, Para-  
lysi, &c. Usurpatur.

Pag. 197. post. lin. 22. infere:

## XXXVIII. De Dauco Cretico.

**N**Ote sunt, folia minutissimè dissecta, semen longum, incanum, villosum, acre. R. Meth.

A. p. 52.

Pag. 198. post lin. 2. adde:

## XXXIX. De Petroselino.

**F**Olia Apio hortensi similia, semen parvum oblongum hirsutum, quibus à reliquis differt. R. Meth.

A. p. 52.

Pag. eadem, lin. 13. subjunge:

2. Selinum montanum Offic. Apium peregrinum foliis subrotundis C. B. semine viloso, seu incano, peregrinum primum Clusii Mor. Umb. Selinum sive Apium peregrinum Clusii Park. Vishaga minor quorundam, Selinum peregrinum Clusio, semine hirsuto J. B. Berg Petersilge. Berg Peterlein. In hortis Botanicorum nonnunquam colitur. Usu. Semen. Vires. Cum præcedenti viribus convenit.

## XL. De Caucalide.

**S**emine aculeato echinato aut hispido ab aliis umbelliferis abunde distinguitur. R. Synop.

p. 114.

A. 1. Caucalis Offic. Lato Apii folio C. B. Apii foliis, flore rubro Ger. Arvensis latifolia purpurea Park. Lappula canaria latifolia sive Caucalis J. B. Chab. Kletten Rorffel Feldes Kletten. In arvis reperitur. Junio & Julio flo.

floret, *Ufu*. Herba *Vires*. Crudum coctum-  
ve olerum modo estur, Urinam movet *Diosc.*

A. 2. Pseudo, Selinum *Offic.* Caucalis minor  
flosculis rubentibus *Ger. emac.* Minor flore ru-  
bente *Park.* Semine aspero, flosculis ruben-  
tibus C. B. Anthriscus quorundam semine aspe-  
ro hispido J. B. *Chab* Hecken Petersilgen. Acker-  
Kletten. In dumetis & ad sepes. Julio & Augu-  
sto floret. *Ufu*.

Pag. 199, lin. 10. subjunge:

#### XLIV, De Bupleuro.

*Foliis integris oblongis à reliquis distinguitur.*

**B**upleurum *Offic.* Folio subrotundo sive  
vulgatissimum C. B. Perenne angustifo-  
lium *Mor. Umb.* Perenne longis & angustis  
foliis incurvis *H. Ox.* Auricula leporis um-  
bella lutea J. B. *Chab.* Hasen-Dehrlein. In  
collibus provenit, Julio & Augusto floret. *U-*  
*fu.* Herba. *Vires.* Inter herbas transmarinas re-  
censetur.

#### XLV. De Sefeli Æthiopico.

**P**lanta est fruticosa Umbellam in fastigio gestans  
foliis integris glabris.

Sefeli Æthiopicum *Offic.* Æthiopicum fru-  
tex *Ger. Park. Mor. Umb. H. Ox.* Æthiopicum  
Salicis folio C. B. Æthiopicum fruticosum  
Periclymeni folio J. B. Bupleurum arbore-  
scens Salicis folio *El. Bot. T. Inst.* Strauchicht  
Hirsch-Wurzel Weisser Enzian. In hortis cu-  
rioforum nonnunquam reperitur. Augusto  
floret. *Ufu*, Semen, *Vires.* Semen Massiliense Sefel

mul

multò acrius est & odoratius, unde eximiarum virium esse creditur.

## SECTIO DECIMA.

### De Herbis Stellatis.

#### II. De Rubia.

Pag. 200. lin. 25. pro 2da Specie subjunge:

2. **A** Rubia Sylvestris & Rubeola *Offic.*  
 Sylvestris *Ger. Park.* Sylvestris  
 aspera, quæ sylvestris Dioscori-  
 dis C. B. Sylvestris monspesulana  
 major J. B. Wilder Meyer. Groß Stern Meyers  
 Kraut. In sepibus reperitur. Æstate florens.  
*Usu.* Radix. *Vires.* Cum sativo viribus con-  
 venit.

#### III. De Mollugine.

Flores huic albi, folia latiora. R. Meth. A. p. 541.

**A** Mollugo *Offic.* Vulgatiore *Park.* Monta-  
 na angustifolia vel Gallium album lati-  
 fotium C. B. Rubia sylvestris lævis *ejusd.* P. B.  
 Angulosa aspera J. B. Gallium album vulgare  
*El. Bot.* Alyssum *Plin. lib. 24. cap. 11.* Unehter  
 Meyer / Weisser Meyer / weiß Wallstroh. In  
 sepibus & dumetis. Junio floret. *Usu.* Ra-  
 dex. *Vires.* Rubiæ sativæ viribus pollet, sed  
 mitior est.

*Alyssum foliis tantum & ramis minoribus, ab Ery-  
 throdano distare scribit Plinius.*

## VII. De Synanchica.

**N**ote sunt, folia ad singula genicula quaterna, flores velut in umbella. R. Meth. A. p. 55.

A. Rubia Synanchica Offic. Cynanchica. C.  
 B. J. B. Chab. Rubeola vulgaris quadrifolia, lævis floribus purpurascens El. Bot. T. Inst. Synanchica Lugdunensis Ger. Emac. Asperula repens Gesneri, seu Saxifraga altera Cæsalpini Park. Brein Wurk; kleine Röhre In sterilibus & cretaceis, Æstate floret. Usu. Herba. Vires. Ad Anginam tum sumpta, tum admota, utilissima esse creditur.

SECTIONIS DECIMÆ.  
APPENDIX.

De Herbis quibus terna singulis floribus succedunt semina.

## De Nasturtio Indico.

**N**ote sunt; folia peltata, pediculo in medio inserto; flores irregulares, pentapetaloides cum calcari retrorsum producto, semina nuda, ad singulum florem terna, rugosa, majora. R. Meth. A.

Nasturtium Indicum Offic. Ger. Park. Indicum majus C. B. Indicum folio peltato scandens J. B. Chab. Viola Indica scandens Nasturtii sapore & odore, flore flavo Herm. Cat.

Acris



Acris Americana five Acriviola folio peltato minor & vulgaris *P. Al.* Violaë affinis umbicato seu peltato folio scandens, sapore Naturtii, Americana minor *Breyne. P. 2.* Acriviola *Volck.* Cardamindum minus & vulgare *El. Bot. T. Inst.* Pelon Mexixquilitl seu Pelon Chili *Herin.* Indianische Kresse. Peruvia Indigena est, apud nos autem in hortis frequens colitur. Per totam aëstatem floret. *U. su.* Herba, flores. *Vires.* Ventriculo ex frigida causa imbecilli aut ex flatu dolenti subvenit flos. Acetariis & in oleribus adhibetur. Adversus contumacem ac malignam scabiem, itemque vulnera recentia commendatur.

## SECTIO UNDECIMA

### *De Herbis Asperifoliis.*

Pag. 203. lin. ult. adde:

**P**OPULUS medicorum uno ore vim saporiferam attribuit Cynoglossò, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potuit *D. Fuller.*

### *V. De Anchusa.*

Pag. 205. lin. 18. subjunge:

**R**Adix adstringit, vulneraria, Alexipharmacà, ac Uterina est, partum extrahit, renum vitiis, lieni, & bile suffusis datur, ad ambusta, ulcera vetera, & ignem sacrum

commendatur; demorsis à serpentibus opitulatur.

2. *Anchusa lutea* *Offic. Ger. J. B.* Lutea major *Park.* Lutea rarior & elegantior *Chab.* Major floribus luteis *C. B.* *Symphytum Echii* folio ampliore, radice rubra *El. Bot.* *Echii* folio ampliore, radice rubra, flore luteo *T. Inst.* Gelbe Ochsen-Zunge. In Germania, & Gallia reperitur. Julio floret. *Ufu.* Radix; sed in *Officinis Anglicanis* nunquam reperitur. *Vires.* Cum *Hyssopo* & *Nasturtio* potatas ventris tineas excutit. *Diosc.*

Tres species *Anchusæ* à *Dioscoride* describuntur, quænam autem plantæ sunt inter *Auctores* non convenit, aliis eas aliò referentibus. *Cæsalpinus* & *Thalius* *Echium* vulgare eo nomine insigniunt. *Turnerus*, *Dodoneus* & *Cordus* duas species *Buglossi* constituunt, quo argumento nescio, cum nota illa characteristica nimirum quòd *radix manus inficiat sanguineo colore*, nulli eorum conveniat. Recentiores *Botanici* plures hujus plantæ species proponunt, à quibus binæ illæ quas hic exhibeo 2da & 3a *Dioscoridis* cum *C. Baubino* recte censi posse existimo, prima major duntaxat secundæ species esse videtur.

## VI. De Echio.

Pag. eadem, lin. ult. adde:

**L** Umborum dolores sedat, *Diosc.*  
2. *Lycopsis* *Offic. Chab. Ægyptiaca C. B. Park.* *Dioscoridis* quibusdam *J. B.* *Echium Ori-*

Oriente longioribus floribus *H. Ox.* Wall.  
 Ochsen-Zunge. Circa Alepum reperitur. *Ufu.*  
 Radix. *Vires.* Cum oleo illita vulneribus  
 medetur, & cum farina hordeacea ignibus  
 acris: Sudores peruncta movet. *Diosc.*

De Lycopsi magna inter Botanicos lis est:  
 aliis nomen illud uni, aliis alteri plantæ at-  
 tribuentibus. *Matthiolus*, *Lacuna*, *Dalecham-*  
*pius* & *Castor Durantes* Cynoglossum esse vo-  
 lunt, quorum primus *Ruellium* & *Fuchsi* e-  
 jusdem opinionis esse ait. Verum *Ruellius*  
 Linguam Canis esse non posse, ut multi sui  
 temporis Herbarii voluerunt, descriptioni-  
 bus utriusque collatis affirmat. *Cordus* Echi-  
 um vulgare, *Dodonæus* (in editione Gallica)  
 Buglossum majus, *Lonicerus* Buglossum sylve-  
 stre, veram *Dioscoridis* Lycopsin esse autu-  
 mant, quorum nullius opinioni consentire  
 possum; & plantam à *Rauwolfio* inventam ge-  
 nuinam potius *Dioscoridis* Lycopsin esse exi-  
 stimo, quam præcedentium quamlibet, aut  
 eam quæ à *C. Baubino* sub eo nomine exhi-  
 betur.

A. 3. Onosma *Offic.* *J. B. Chab.* Lycopsis *C.*  
*B.* Anglica *Ger. Park.* Echium alterum *P. B.*  
 alterum seu Lycopsis Anglica *Mer. Pin.* La-  
 tissimo folio Lycopsis dictum flore diluto pur-  
 purascente *Herm. Cat.* Ramosius annum flore  
 suave-rubente *H. Ox.* *Stein Ochsen-Zun-*  
*ge.* In Insula Jerseia observavit eruditissimus  
*D. Sberardus LL. D. Ufu.* Folia. *Vires.* In vino  
 pota partus extrahit. *Diosc.*

Onosma insuper planta est, quæ Botanicos Auctores in varias sententias distraxit, & quo referenda sit incertos reddidit. *Dioscorides* enim folia *Anchusæ* similia habere scribens, caule autem, flore & semine destitui, magnum altercandi occasionem præbuit. Error hic *Dioscoridis* inde oriri videtur, quod primo post exortum anno eam invenerit, cum folia tantum promit, quemadmodum *Cynoglossum*, *Buglossum*, *Echium*, aliæque id genus plantæ. ad quas & hanc refero, ni *Dioscorides* ipse diversis in Capitibus de iis egisset. Est autem error vulgaris in quem & alii inciderunt; quomodo enim planta quævis produci potest, si fructu & semine carent? Ab icone quam exhibet *J. Baubinus* & foliorum cum *Anchusæ* similitudine, ad hanc plantam potius retuli.

## VII. De Heliotropio.

**S**eminibus levibus non splendentibus, floribus in spicis longis recurvis, foliis lanuginosis à reliquis differt. R. Meth. p. 95.

1. *Heliotropium majus* *Offic. Ger. Park. Majus Dioscoridis C. B. Majus flore albo J. B. Herba Cancri Chab. Sonnen, Wende Krebs Blume.* In hortis colitur Æstate floret. *Usu.* Herba, Semina triangula brevia cinerea. *Vires.* Decoctum pituitam bilemque per alvum extrahit, ictis à Scorpionibus prodest. Semen carnis excrescentias reprimat, verrucas peniles tollit; menses & fetus ducit. *H. Ox.*

2. *Heliotropium minus* *Offic. Ger. Park. Mi-*

nis supinum & Supinum alterum C. B. Minus quorundam J. B. Chab. Humi fufum flore minimo femine magno T; Corol. Klein niedrige Sonnen Wende Krebs Blume. In hortis etiam colitur. *Ufu.* Herba, *Vires.* Cum priore viribus convenit.

Pag. 206. pro Cap. X. adde:

### X. De Cerinthe.

**S**emina in hoc genere unicuique flori bina succedunt levia, per maturitatem nigra, quo à reliquis omnibus hujus generis differt. R. H. p. 506.

Cerinthe *Offic.* Major Ger. Major flore luteo & rubro Park. quorundam major versicolore flore J. B. Seu Cynoglossum montanum majus C. B. Cerynthe veteribus, Cerinthe quorundam Chab. Honig Wurzel. grofse Berg Hunds Zunge. In hortis curiosorum reperitur. Vere floret. *Ufu.* Herba, *Vires.* De viribus nil certe traditur.

## SECTIO DUODECIMA.

### De Herbis Verticillatis.

#### III. De Stœchade.

Pag. 211. post lin. 19. pro 2da. Specie adde:

2. **T**Ragium alterum *Offic.* Alterum Dioscoridis quibusdam foliis Trichomanis J. B. Alterum Dioscoridis, Secudas Arabum & Halepensium Chab. Stœchadi ferratæ affinis C. B. Unecht Socks Kraut. Circa Halepum inve-

invenit *Raavolfius*. *usu*. Herba, Radix. *Vires*. Tam crudam quam coctam Dysenterici prodesse dicit *Diosc.*

Tragium alterum à *Dioscoride* in hunc modum describitur. *Folia Scölopendrii habet, & radicem sylvestris Raphani tenuem candidam. Folia autera Autumno hirci virus olent; exinde sibi Tragii nomen adoptavit. Provenit in montibus & precipitiis, unde non immerito à Rouwolfio pro vero supponitur.*

## VI. De Satureia.

Pag. 212. pro 2da, 3tia & 4ta specie Satureiæ adde:

2. **T**hymbra *Offic.* Satureia hortensis *Ger.* *Vulgaris Park.* Montana *C. B.* Perennis hortensis vulgaris *H. Ox.* Durior *J. B.* Durior sive Thymbra *Chab.* Hortensis sive Thymbra legitima *Dioscoridis Grisl. V. Lusit.* Calamintha frutescens, Satureiæ folio, facie & odore *T. Inst.* Winter Saturey. Winter Isop. In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. Thymbra vera *Offic.* Græca *J. B.* sive Satureia Cretica legitima *Park.* Satureia Cretica *C. B. Ger. emac.* Cretica latiore foliō *H. Ox.* Frutescens Arabica folio fimbriato hirsuto *Breyn. P. 2.* Saturey. Sadaney. Pfefferkraut. In Insula Creta reperitur. *Usu.* Herba, sed in *Officinis nostris* advena est, *Vires.* Uri.

Irinam & menses provocat, tuffientibus  
um melle valet.

4. *Satureia Spicata* *Offic.* C. B. *Sti. Juliani*  
*Ger.* *Spicata* *Sti. Juliani Park.* Foliis tenuibus  
ive tenuifolia *Sti. Juliani quorundam* J. B.  
tenuifolia *Sti. Juliani quorundam* : *Thymbra*  
*vera* sive genuina aliis *Chab.* *Thymbra* *Sti.*  
*Juliani,* sive *Satureia vera* *Lobelio El. Bot.*  
*Keifen Saturey. Epitichte Saturey.* In colli-  
bus & muris. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.*  
Cum reliquis viribus convenit.

*Saxifragam primam Matthioli* pro hac plan-  
ta C. *Baubin*us habet, *Parkinsonus* autem diversam  
facit, quem consule.

## VII. De Thymo.

**D**iffert à *Satureia*, cui alias similis est, odoris fra-  
grantiâ, & floribus in oblonga capitula conge-  
stis. R. H. p. 519.

*Thymum verum* *Offic.* *Creticum* *Ger.* *Cre-*  
*ticum* sive *Antiquorum* J. B. *Legitimum* ca-  
pitatum *Park.* *Thymus capitatus* qui *Diosco-*  
*ridis* C. B. *Hyssopus capitata minor,* *Thy-*  
*miodore* H. Ox. *Thymian.* *Thymien-Kraut.* In  
Creta sponte oritur, in hortis apud nos re-  
peritur. Æstate floret. *Ufu.* Herba, *Vires.*  
Attenuat, incidit, aperit, usus præcipue  
in vitiis Pulmonum anhelosis & orthopnoi-  
cis; Mensis & urinas ciet, partus & secun-  
dinas expellit. Vermes necat, pituitam per  
alvum trahit, tumores discutit, concretum  
*Sanguinem* dissolvit, *Ischiadicis* subvenit.

IX. *De Serpyllo.*

Pag. 213. lin. 21. pro 2. 3. & 4ta Specie  
Serpylli adde:

2. **T**Hymus sylvestris *Offic.* Narbonensis Zy-  
gis dictus *H. Ox.* Serpyllum Creticum  
*Ger.* Folio Thymi C. B. Narbonense *Park.* Syl-  
vestre, Zygis *Clusio.* Thymo vulgari rigi-  
diori simile *J. B.* Thymbra Hispanica *Coridis*  
folio *El. Bot. T. Inst.* Wilder Thymian / wilder  
Demuth / Zinnen-Kraut. In hortis curiosorum  
colitur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.*  
Cum Thymo viribus convenit.

A. 3. Serpyllum verum *Offic.* Vulgare flo-  
re amplo *R. Synop.* Sativum C. B. Majus *Park.*  
Foliis Amaraci *Ger.* Serpylli vulgaris secun-  
dum genus *J. B.* Thymians Großmutter / Groß-  
ser Garten-Quendel. In hortis colitur. Æstate  
floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Menses & Urinam  
ciet; torminibus, ruptis, vulsis & jecorinis  
inflammationibus auxiliatur, capitis dolores  
mulcet, maximè vero Phreneticis & Lethar-  
gicis convenit, cruentos vomitus sedat, ad-  
versus Serpentes prodest. *Diosc.*

4. Thymus citrinus *Offic.* Serpillum citra-  
tum *Ger. Park.* Foliis citri odore C. B. Citri  
odore *J. B. Chab.* Citronen Quendel. In mon-  
tosis Augusto floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum  
reliquis viribus convenit.

Pag. eadem, post lin. 26. pro sexta  
specie adde:

6. Saxifraga vera *Matth.* Vera Dioscori-  
dis



dis Matthioli *Park.* *Rechter Steinbrech* des *Dioscoridis*: nach dem *Matthiolo*. In petris & asperis. *Ufu.* Herba *Vires.* Coctus in vino febricitantibus opitulatur. Stranguriæ prodest, singultum ledat, calculos vesicæ frangit & urinam ciët. *Diosc.*

Hæ sunt vires *Saxifragæ* suæ à *Dioscoride* attributæ, verum huic plantæ non rectè ex sententia nostra adscribuntur, in eo *Matthiolum* tantùm secutus. Quænam sit vera *Antiquorum Saxifraga* in capite de *Lychnide* ostendere conatus sum, & plantæ illi vires hæc convenire existimo: Quænam planta hæc sit aliis multis præter illum *Botanicis* non apparet, adeoque à nonnullis suspecta est.

## X. De *Tragorigano*.

*Verticillis densis à Thymo & Serpyllo differt.*

1. *Tragoriganum* *Offic.* *Chab.* *Creticum* *C.* *B. Park.* *Cretense* *Ger.* Quibusdam nigrius, folio duro, flore purpureo *J. B.* Foliis *Thymbræ* majoribus duris nigricantibus punctatis flore purpureo minore *P. Al.* *Tragoder* *Boeck's* *Dosten.* In *Creta* *Insula* invenitur. *Martio* floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Calfacit, *Urinam* ciët, *Menses* provocat, *Stomachum* imbecillum corroborat.

2. *Tragoriganum* alterum *Offic.* *Clusii* *Ger.* *Hispanicum* *Park.* *Angustifolium* *C. B.* *Tenuioribus* foliis, flore candido *J. B.* *Chab.* *Creticum* minus & tenuius *Alp. Ex.* *Spanisch*

Schmall-blättrich Bock's-Dosten. In regno Valentino reperitur. Martio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

### XI. De Polio.

Pag. 214. post lin. 14. pro tertia Specie Polii adde:

3. **P**OLIUM alterum *Offic.* Montanum, Lavendulæ folio C. B. *Park.* Lavendulæ folio flore albo *Ger.* Berg-Polium mit Lavendul-Blättern. In hortis Botanicorum. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum precedentibus viribus convenit.

### XII. De Teucrio.

**S**TATURÂ suâ & magnitudine, foliis latioribus à Chamædry differt, quacum floribus galeâ carentibus convenit. R. H. p. 526.

Teucrium *Offic.* C. B. Multis J. B. Latifolium *Ger.* Majus vulgare *Park.* sive Teucrium *Chab.* Chamædry fruticosior sive Teucrium vulgare flore ochroleuco *H. Ox.* Frutescens Teucrium vulgò *El. Bot. Inst.* Staudicht *Ger.* manderlein. In Italia & Sicilia provenit. Æstate floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Calfacit & siccat. Epatica ac splenica est, confert in Serpentium ictibus. Ut in externa facie Chamædryn refert, ita iisdem viribus pollet.

De  
Plantis Verticillatis herbaceis.

XIV. De *Mentha*.

Pag. 215. pro 4ta, 5ta & 6ta Specie  
Menthæ adde:

4. **A.** *Mentha Saxifraga Offic.* *Saxifraga angustiore folio spicata sapore acri fervido P. Mant.* Spicis brevibus & habitioribus, foliis Menthæ fuscæ, sapore fervido Piperis *R. Synop. p. 124.* Pfeffer-Münz. In aquosis & ad fossas nonnunquam reperitur. Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* In calculo renum & vesicæ remedium specificum æstimatur.

Hæc planta ab illiterato quodam medico Londinensi pro magno adversus calculum arcano habebatur: quæ ne detegi posset, adeò cautus erat, ut quoties ea uti occasionem habuit, se in conclave quoddam seu cameram inclusit, usquedum eam in particulas adeò minutas discidisset, ut quænam planta esset invenire ferè impossibile foret: Tandem minuto ejus frustulo ad D. D. *Watson* allato, in horto suo illud deposuit, quo germinante secretum revelatum est.

A. 5. *Auricularia Offic.* Indorum ad surditatem efficax *Malab.* Mentastrum minus *Ger. emac.* Hirsutum *Park.* *Mentha palustris folio oblongo C. B.* Mentastrum aquatici genus hirsutum spica latiore *J. B. Chab. Ceylonische Pflanz*

ße/Wasser-Münze. In aquosis & ad ripas fluviorum non infrequens. Augusto & Septembri floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Efficacissimam in surditate est remedium.

D. *Marlow* in observationibus suis cujusdam plantæ meminit *Plantæ Zeylanicæ* nomine absque ulla descriptione aut notâ, qua possit dignosci, & beneficia ejus ad posteros derivari; unde inter eruditos Botanicos dubium exortum est, quænam species plantæ esset quam hac appellatione intelligit. Omnes quidem consentiunt, Menthæ quandam speciem fuisse, quænam vero, adhuc dubium manet. Ingeniosus vir D. *Plukenet* Menthæ cujusdam verticillatæ in *Marilandia* nascentis, cujus nomen in *Mantissa pag. 129.* exhibet, esse opinatur. Dignissimus Vir D. *Sloane* Menthæ aquaticæ speciem quandam esse existimat, neque rejicienda est ejus conjectura, quoniam in minutis quibusdam ejus fragmentis, à D. *Finchio* Pharmacopœo Londinensi, viro ingenioso D. *Marlow* prædicti successore, apud quem omnium ejus Arcanorum specimina, variorum etiam præparaciones inveniuntur, Menthæ aquaticæ odorem exquisitum observavi. Idemque candidus vir D. *Finchius* hanc herbam, non obstante exotico nomine ei à D. *Marlow* imposito, Anglicanæ originis esse mihi affirmavit, quin & fragmenta à prædicto D. *Finchio* mihi donata cum planta ipsa cujus Synonyma è C. B. *pin.* aliisque dedi,

dedi, conveniunt, sententia confirmor, nimirum eas rectè à me collatas esse.

6. *Mentha crispa* *Offic.* *Rotundifolia crispa spicata* C. B. *Spicata rotundifolia crispa* J. B. *Chab.* *Cruciata* Park. *Cruciata sive crispa* Ger. *Krause-Münke.* In hortis reperitur. Augusto floret. *Usu.* Herba. *Vires.* In imbecillitate ventriculi pulvis quotidie sumptus commendatur. *Stockerus.* In vomitu laudat *Etmullerus.*

Pag. 216. lin. 19. subjunge:

Quænam planta sit *Polycnemon Dioscoridis* inter Botanicos etiamnum controvertitur, aliis ad aliam eam referentibus. Nos cum *Lobelio* ad hanc potiùs quam ad *Bugulam* vel *Prunellam* reducendam censuimus, quod *Dioscorides* boni odoris & acris esse scribat, quod de earum neutra dici potest.

## XVI. De *Lycopside.*

Foliis rugosis ad basin laciniatis & odore carentibus à *Mentha* differt. R. Synop. p. 125.

A. *Lycopus* *Offic.* *Palustris*, glaber *El. Bot.* *T. Inst.* *Marrubium aquaticum* Ger. *Aquaticum vulgare* Park. *Aquaticum* quorundam J. B. *Chab.* *Palustre glabrum* C. B. *Pseudomarrubium aquaticum vulgare* H. Ox. *Palustre Rivin.* *Wasser-Andorn / Gled-Kraut.* In aquosis & ad rivulos. Julio floret. *Usu.* Herba.

XIX. *De Majorano.*

Pag. 217. pro 2da, 3tia & 4ta Specie  
Majoranæ adde :

2. **M**Arum Syriacum *Offic. Ger.* Syriacum  
vel Creticum *Park. Herm. Cat.* Creti-  
cum *Alp. ex.* Majorana Syriaca vel Cretica  
*C. B.* Syrisch Mastich-Kraut/ Amber-Kraut. In  
hortis colitur. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum præ-  
cedenti viribus convenit.

3. Origanum Heracleoticum *Offic. Ger.*  
Heracleoticum verius *Park.* Heracleoticum  
Matthioli, aliis fortè Creticum *J. B. Chab.*  
Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii *C. B.*  
Unechter Majoran/Wild-Dosten. Reperitur in  
hortis. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Ex-  
calfacit, demorsis à Serpente convenit, ruptis,  
convulsis & hydropicis datur. *Diosc.*

4. Majorana oleracea *Offic.* Major Anglica  
*Ger.* Latifolia sive Major Anglica *Park.* Hor-  
tensis viridis tenuior *H. Ox.* Sylvestris peren-  
nis *C. B.* Origanum onites *ejusd.* Heracleoti-  
cum Ruellii sive Majorana major *J. B. Winst.*  
ter-Majoran/Englisch Majoran. In hortis inter  
olera feritur. Æstate floret. *Ufu.* Herba in  
culinis pro olere. *Vires.* Iisdem cum Origa-  
no vulgari viribus pollet.

XXI. *De Hormino.*

Pag. 219. post lin. 3. pro prima Specie  
Hormini adde :

1. **H**Orminum *Chab.* Satiyum *Offic.* *C. B.* Sa-  
tium

tivum genuinum Dioscoridis *Park.* Sylvestre foliis purpureis *Ger.* Comâ purpuro-violaceâ *J. B. Bald. Scharley, wilder Salbey.* In hortis curiosorum apud nos seritur. Julio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Ad Venerem stimulantam cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argemas, albuginesque: extrahuntur etiam aculei ex corpore. *Diosc.*

Pag. eadem lin. 9. adde:

In pulverem redacta, & naribus indita sternutamenta provocat, catarrhum tollit, & cerebrum purgat. Decocta in vino menses movet, secundinas ejicit, Venerem stimulat.

3. *Æthiopsis Offic. Ger. Chab. multis J. B.* Foliis sinuosis *C. B. Sclarea Æthiopica, sive Æthiopsis laciniatis & non laciniatis foliis Park.* Vulgaris lanuginoso amplissimo folio *El. Bot. T. Inst. Horminum Æthiopicum incanum foliis sinuosis Æthiopsis dictum Herm. Cat. Volck. Æthiopicum foliis sinuosis. H. Ox. Æthiopische Scharley.* In hortis colitur. Æstate floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Ischiadicis, Pleuriticis, Arteriæ scabritiei auxiliatur. *Diosc.*

4. *Horminum sylvestre Offic. Sylvestre latifolium Ger. Sylvestre latifolium, verticillatum C. B. Germanicum humile Park. Gallitricho affinis planta, Horminum sylvestre latifolium Clusio J. B. Chab. breit-blätterichte wilde Scharley.* In Germania frequens occurrit. Æstate floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Viribus magis pollet quàm Sativum.

A. 5. Oculus Christi *Offic.* Horminum sylvestre *Ger.* &c.

*Lin.* 14. dele Folia sed rarius, & lege Semen.

*Vires.* Oculis inditum utile est ad excutiendam eorum caliginem & educendum corpuscula quæ in illos inciderunt.

## XXII. De Galeopsi.

*NOTÆ* sunt, folia urtica, odor fœtidus, semina parva, per maturitatem nigra: floris labium superius in cochlearis formam excavatum, inferius tripartitum, medio segmento obtuso, longo lato utrinque reflexo, lateralibus parvis brevibus. *R.* Meth. A. p. 62.

A. 1. Galeopsis *Offic.* Vera *Ger.* Legitima Dioscoridis *Park.* Procerior fœtida spicata *El. Bot. T. Inst.* sive urtica iners magna fœtidissima *J. B.* Lamium maximum sylvaticum fœtidum *C. B.* Stachys sylvatica *Rivin.* Fœtida *Sepium* flagellis reptatricibus *H. Ox.* Grosse taupe oder todte Messel / Hecken-Messel. Ad sepes. Julio & Augusto floret. *Usu.* Folia, Semen, dūritias & carcinomata dissipant: Strumas, panos & parotides discutiunt: ad putrescentia, gangrenas, & nomas commendatur. *Diosc.*

A. 2. Panax coloni *Offic.* Coloni, seu Marubium aquaticum acutum *Ger.* Galeopsis antifolia fœtida *J. B.* Palustris, Betonicæ flore variegato *T. Inst.* Stachys palustris *da C. B.* Aquatica *Rivin.* Sideritis Anglica *stru-*



strumosa radice *Park.* Brauner Wasser-Andorn.  
In aquosis & ad fluvios. Julio floret. *Usu.*  
Herba. *Vires.* Vulneraria herba est insignis.

Pag. 220. lin. 19. pro Cap. 26. & 27. adde:

## XXVI. De Acino.

**N**Otae sunt, folia *Serpylli* aut *Ocymi minoris*, florum cauliculi oblongi, striati, collo angusto ventre turgidiore. Flores secundum caules ex alis foliorum exeuntes non in capitula congesti in summis caulibus, quo à *Serpyllo* differt. *R. Meth. A.* p. 64.

A. *Acinos Offic.* multis *J. B. Chab.* sive *Ocymum sylvestre H. Ox.* *Ocymum sylvestre Ger.* *Clinopodium arvense Ocymi facie C. B.* minus seu vulgare *Park.* Stein-Poley / wilde Basilien. In montosis cretaceis. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Menses & alvum sistit. Illita panos ignemque sacrum sanat. *Diosc.*

N. B. *Mulierculis Botanopolis Londinensibus* pro *Polio montano* hac planta venditur.

## XXVII. De Stachy.

**V**erticillis densis; foliorum canitie & lanugine à reliquis differt. Adde, floris labium superius elatum, bifidum & cochlearis modo concavum, inferius tripartitum, lateralibus segmentis adeò parvis ut crenæ potiùs videantur. *R. Meth. A.* p. 63.

*Stachys Offic.* *Ger.* *Dioscoridis Park.* minor *Italica C. B.* Folio candicante densiore non serrato minor *H. Ox.* Niedriger Andorn / fleiner Italianischer Andorn. In hortis colitur. Junio

floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Vim habet ex-  
factoriam, & acrem, menses & secundas pel-  
lit. *Diosc.*

## XXVIII. De Marrubio.

Pag. 220. lin. ult. sub finem pro 2da  
Specie junge:

2. Pseudo-dictamnus *Offic.* Ger. Park. Verti-  
cillatus inodorus C. B. Dictamnium adul-  
terinum quibusdam verticillatum, vel potius  
Gnaphalium veterum J. B. Dictamnus spu-  
rius inodorus acetabulis Moluccæ minoribus  
*Herm. Cat.* Marrubium Pseudo-dictamnium di-  
ctum R. H. p. 557. Marrubio congener sive  
Pseudo-dictamnus major inodorus P. Al. Gna-  
phalium veterum, Centunculus. Dictamnium  
ad ulterinum quibusdam *Chab.* falscher Diptam-  
unechte Eschwurz. In hortis colitur. Julio flo-  
ret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum Marrubio u-  
in externâ facie ita & viribus convenit.

## XXIX. De Clinopodio.

Folia fert Majoranæ sylvestris, flores in verticilli-  
lis densis circa caulium nodos, quorum tubi quam  
in Marrubio longiores; labia superiora rotundata  
elata & plerumque bifida, inferiora tripartita, se-  
gmento medio latissimo. R. Meth. A. p. 64.

A. Clinopodium *Offic.* Majus Park. quorum-  
dam Origani facie J. B. Origano simile C. B.  
Acinos Ger. Grosse wilde Polcy/ grosse wilde Ba-  
slien. Ad sepes passim. Junio & Julio floret  
*Ufu*

*Ufu.* Herba. *Vires.* Bibitur ad convulsa, ru-  
ta, strangurias, Serpentium ietus: Menses  
& partus pellit. Alvum sistit. *Diosc.*

### XXX. De Lamio.

Pag. 221. lin. 20. pro tertia Specie Lamii  
adde:

**A.** 3. Leucas montana *Offic.* Lamium luteum.  
*Ger. Park.* Folio oblongo luteum C. B.  
Spurium flore luteo *Volck.* Pseudo-lamium flo-  
re luteo *Rivin.* Galeopsis *Chab.* sive Urtica  
ners flore luteo J. B. Gelbe Archangel / gelbe  
todte Nessel. In sylvis & dumetis. Junio flo-  
ret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Contra animalium  
venena, præcipuè marinorum opitulatur.  
*Diosc.*

### XXXI. De Sideritide.

**O** Dore gravi & foetido cum Lamio convenit, sed  
foliorum figura differt. R. Meth. A.

Sideritis *Offic.* Hirsuta procumbens C. B.  
Clusio Hispanica, hirsuta J. B. Prima herba  
Judaica *Park.* Herba Judaica *Ger.* Eiser-Wurß/  
Blies-Kraut. In petrosis Italiae, Hispaniae, &c.  
Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Illita folia  
suapte vi vulnera sine inflammationis peri-  
culo jungunt. *Diosc.*

De Sideritide agentes multum inter se dis-  
sentiunt Botanici, & plures plantæ sunt qui-  
bus id nominis ab eis attribuitur. *Dioscorides*  
tres Sideritidis Species describit; quarum  
primam stirpem à me hoc in loco exhibitam  
esse

esse existimo, ut quæ judicio nostro melius conveniat cum brevi *Dioscoridis* descriptione, lib. 4. cap. 29. quam quævis alia. *Sideritin* (inquit loco citato) aliqui *Heracleam* vocant: folia habet *Marrubii*, sed longiora, satis ad frondem *Quercus*, aut *Salviæ accedentia*, minora tamen & aspera: Caules edit quadratos, dodrantem altos, aut etiam majores, non injucundi gustus, aliquantumque subastringentis: in quibus per interstitia orbiculatæ, vertebrae, ut in *Marrubio* spectantur: & semen in nigrum: nascitur in petrosis. Secundam *Sideritidem* *Pimpinellam sanguisorbam* *Offic.* P. 190. *Pharmacolog. nost.* esse, cum nuperis *Botanicis* consentio. Tertium, *Geranium Robertianum* seu *Gratiam Dei* *Offic.* p. 342. ejusd. *Pharmacolog.*

### XXXIII. De Calamintha.

**NOTÆ** sunt flores plures simul pediculis oblongis ramosis è foliorum sinibus egressis insidentes, rari & sparsi, è tubo oblongo in duo labia hiantes, quorum superius bifidum rotundatum, alatum, inferius tripartitum. *R. Meth. A.* p. 65.

Pag. 222. pro 2da Specie Calamintæ adde:

2. **A.** Calamintha sylvestris *Offic.* Odore *Pulegii* *Ger.* Flore minore odore *Pulegii* *J. B. Chab.* Altera odore *Pulegii* foliis maculosis *Park.* *Pulegii* odore seu *Nepata* *C. B. Feld. Münke/ Ucker. Münke/ Balsamuth.* In agris sepium & agrorum marginibus. *Ju-*  
nic

nio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit, cui succedaneum est, & pro ea *Mulierculis Botanopolis Londinensibus* non infrequens venditur.

Pag. 223. ad vires Ballot adde:

Vis ejus efficax adversus canis morsus, foliis ex sale illitis. Ferventi cinerè flaccescunt folia, & condylomata reprimunt, purgant & sordida ulcera cum melle. *Diosc.*

### XXXVI. De Cardiaca.

*NOTA sunt, folia circumscriptione subrotunda & profundè laciniata: floris labium superius in canalem inflexum, & inferiore multò longius, inferius tripartitum; calix valdè brevis, & seminibus ad summitatem usque repletus. R. Meth. A. p. 64.*

Cardiaca *Offic.* J. B. Park. Ger. seu Lycopus Ruellii Chap. Marrubium Cardiaca dictum H. Ox. Cardiaca dictum, fortè primum Theophrasti C. B. Herß & Gesspann / Herß & Gessper / Mutter & Wurß. In hortis & in fimetis. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Urinam & menses ciet, pectus à pituita detergit, lumbricos necat, palpitationem cordis, & cardialgiam in infantibus juvat, in lienis morbis, & affectibus hystericis utilis æstimatur.

### XXXVII. De Chamæpity.

Pag. 223. ad vires Chamæpityos adde:

**V**ulnere glutinat, nomas cohibet, menses movet, fœtum pellit, abortum provocat.

In

In urinæ difficultate, & in mictura sanguini multum commendatur *H. Ox.* Ictero medetur si septem diebus in vino potetur. *Diosc.*

2. Chamæpitys altera *Offic.* Moschata foliis ferratis *C. B.* sive Iva Moschata Monspelienfium flore purpurafcente *Chab.* Iva Moschata Monspeliaca *Ger.* Anthyllis altera herbariorum *Park.* Fransche Erdpin/Feld-Cypriff In Gallia frequens reperitur. Junio floret *Ufu.* Herba.

3. Chamæpitys tertia seu mas *Offic.* Odoratior *Park.* Incana exiguo folio *C. B.* Folio non laciniato *J. B.* Folio non laciniato seu tertia Dioscoridis Matthiolo *Chab.* Tertia Dodonæi *Ger.* Italiânische Erdpin/Erdfifer. In Italia non infrequens. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Hæ duæ vim superioris obtinent sed non usque adeò efficacem. *Diosc.*

Pag. 224. lin. 4. viribus Bugulæ subjunge:

Tam intrinsecus quàm extrinsecus adhibita: confert & ictero, hepatis obstructioni urinæ retentioni, herniis, &c. *Schrod.*

Pag. 224. lin. ult. adde:

*Gesnero* in remediis Scordio præfertur. In ulceribus gangrænosis claudendis celebravit *Hildanus.*

## SECTIO XIII.

De Herbis Semine nudo  
Polyspermis.

## III. De Ranunculo.

Pag. 250. pro 2da, tertia, quarta & quinta  
Speciebus Ranunculi adde:

1. **A**. Ranunculus palustris *Offic.* Palustris rotundifolius *Ger.* Palustris Apii folio lævis *C. B.* Palustris flore minimo *J. B. Chab.* Palustris Sardonius lævis *Park.* Rund-blätterichter Wasser-Krähen Fuß/ Wasser-Hahnen Fuß. In aquis gaudet. Junio & Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Folia, flores, & cauliculi recentes illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent: formicantes verrucas, & pensiles, alopeciasque paulisper illitu tollunt. *Diosc.*

A. 3. Ranunculus flammeus *Offic.* Flammeus major *Ger.* Palustris flammeus major *Park.* Longifolius palustris major *C. B.* Folio longo maximus *Lingua Plinii J. B. Chab.* Großer lang blätterichter Wasser-Hahnen-Fuß. Groß Spehr-Kraut. In fossis palustribus. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

A. 4. Flammula *Offic.* Ranunculus flammeus minor

minor *Ger.* Palustris flammeus minor sive angustifolius *Park.* Longifolius palustris minor *C. B.* Longifolius aliis Flammula *J. B.* Longifolius Flammula dictus *Chab.* *Grosse-Spehrs* *Wurz.* In partis aquis, locisque uliginosis frequens. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vi-res.* Cum reliquis vi caustica convenit. Foliis ludit nunc æqualibus nunc serratis, unde Ranunculus flammeus serratus *Ger.* *Park.* Palustris serratus *C. B.*

5. Ranunculus montanus *Offic.* Montanus maximus albus *Park.* Montanus Aconiti folio albus flore majore *C. B.* Aconiti folio *Ger.* Flore albo *Alpinus major J. B. Chab.* *Berg-Hahnen-Fuß* mit weissen Blumen. In montium sylvis locis. Maio & Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vi-res.* Cum reliquis Ranunculis viribus convenit.

A, 6. Ranunculus acris *Offic.* Surrectis cauliculis *Ger.* Pratenfis erectus acris *C. B.* Pratenfis erectus acris vulgaris *Park.* Rectus non repens, flore simplici luteo *J. B. Chab.* *Brennender Wiesen Hahnen-Fuß.* In partis & paludibus. Maio & Junio floret. *Ufu.* Folia. *Vi-res.* Vesicat, exulcerat, apud rusticanos nostros in usu est.

7. Thora *Offic.* *Chab.* Valdensis *Ger.* Folio Cyclamini *J. B.* Aconitum Pardalianches alterum, seu Thora minor *C. B.* Pardalianches, seu Thora minor *Park.* Ranunculus Asphodeli radice dictus Phthora minor *H. Ox.* *Item* Thora montis Baldi sive Sabaudica *Ger.*



Aconitum Pardalianches primum seu Thora major C. B. Pardalianches seu Thora major Park. Ranunculus Asphodeli radice dictus Phthora major H. Ox. Rotundifolius Alpinus flore parvo, grumosa radice Phthora major dictus P. Al. Alpinus Cyclaminis folio, Ranunculus rotundifolius Alpinus flore parvo, grumosa radice Thora major dictus Volck. Leopardt-Giff. Wolffs-Burgh. In montibus Helveticis reperitur. *Ufu.* Herba, *Vires.* Vi caustica prædita est.

#### IV. De Eranthemo.

**F**oliis tenuissimè dissectis, radice annua, floribus Polypetalis à reliquis differt.

A. Flos Adonis *Offic.* Park. Chab. Adonis flore rubro Ger. Adonis vulgò aliis Eranthemum J. B. Adonis hortensis flore minore atro-rubente C. B. Æstivalis flore minore ruberrimo H. Ox. Ranunculus arvensis foliis Chamæmeli flore phœniceo T. *Inst.* Adonien mit tuncfel rothen Blumen Adonis-Röslein. In arvis nascitur sed rarius. Junio & Julio floret. *Ufu.* Flos, *Vires.* Ad dolores colicos & nephreticos leniendos utilem esse scribit Parkinsonus.

#### V. De Myosuro.

**F**losculi herbacei pentapetali, semina in spicam oblongam caudæ muris æmulam excurrunt. R. Synop. p. 282.

A. Myosuros *Offic.* J. B. Chab. Cauda muris

muris *Ger.* Holoſteum Loniceri Cauda muris vocatum *Park.* Holoſteo affinis Cauda muris *C. B.* Adonia puſilla fegetalis gramineis foliis ſpiſſis, flore obſoleto, ſpicâ caudam murinam æmulante *P. Ae.* Mäuſe-Schwanzlein. In arvis & ad vias. Maio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Viribus Plantaginis & Coronopi à quibuſdam convenire creditur.

Pag. 228. Ad vires Alceæ adde:

Ex emplaſticorum & emollientium medicamentorum numero eſt. Celebratur ab Empiricis ad caliginem oculorum. Aquâ decocta torminibus inteſtinorum remedio eſt *R. H.* Totius corporis calidis doloribus apprimè conducit *J. B.* Cum vino aut aqua pota, dyſentericis ruptisque medetur. *Dioſc.*

Pag. 231. Ad vires Plantaginis aquaticæ adde:

Procidentiam ani curare, rubentem podagram, capitis dolorem è cauſâ calidâ mulcere, cruento ſputo urinæque mederi tradit *Schvvenckfeld.* Succus lac in mammillis conſumit. *Roffli.*

## XV. De Sagitta.

**F**oliis eſt alate ſagittæ formam referentibus floribus tripetalis, ſemina flori unicuique ſuccedunt in capitulum congeſta denſeque ſtipata. *R. Meth.* *A. p.* 67.

*A. Sagitta Offic. Major Ger. J. B. Aquatica major C. B. Major latifolia Park. Chab. Ranunculus paluſtris folio Sagittato El. Bot. Paluſtris folio Sagittato maximo T. Inſt. Pfeil-Haupt.*

Haupt. Groß Pfeil-Kraut. in rivulis & aquis. Maio & Junio floret. *Ufu.* Herba, Semen. *Vires.* Temperamento est frigidus humidus & iisdem cum Plantagine aquatica viribus pollet. *Matth.*

## XVI. De Clematide.

**N**Otæ sunt semina plumulis longis adnascentibus cincinnata, flos quadrifolius seu cruciatus, sapor in plerisque speciebus fervidus. R. Meth. A. p. 69.

1. Clematis altera *Offic.* Cœrulea vel purpurea repens C. B. Peregrina cœrulea sive rubra *Ger.* Peregrina flore rubro vel purpureo simplex *Park.* sive Flammula flore purpureo & cœruleo simplex *J. B. Chab. Wald-Rebe: Lieuen Jungfern Anker.* In sepibus Italiae & Hispaniae reperitur, Julio & Augusto floret. *Ufu.* Folia, Semen. *Vires.* Semen tritum pituitam bilis & que detrahit. Folia illita Lepras purgant. *Dioscorid.*

A. 2. Atragene *Offic.* Viorna *Ger.* Clematis sylvestris latifolia C. B. Sylvestris latifolia sive Viorna *Park.* Latifolia seu Atragene quibusdam *J. B.* Athragene Theophrasti quibusdam *Chab. Reifiger Freude. Breit blätterichte Wald-Rebe.* In sepibus. Julio floret. *Ufu.* Tota planta, *Vires.* Flore, cortice, semine & radice vim urendi habet.

3. Flammula Jovis *Offic.* Jovis surrecta *Ger. Park. Recta* C. B. Clematis sive Flammula

surrecta alba J. B. Chab. *Muffrechte Wald-Rebe*. In hortis colitur. *Ætate* floret. *Usu*. Herba cum floribus. *Vires*. Vim urendi cum reliquis habet.

Pag. 231. lin. ult. subjunge:

### XIX. De Anemone.

**N**ote sunt semina in capitulum oblongum congesta, pappo seu lanugine copiosa cincta. R. Meth. A. p. 69.

1. Anemone hortensis *Offic.*. Geranii Ruper-tiani folio cœruleo: an Dioscoridis? C. B. Geranifolia *Ger.* J. B. Chab. Tenuifolia sive Geranifolia cœrulea *Park.* Garten Anemone, Anemonen Rößlein. In hortis colitur. *Usu*. Herba. Radix. *Vires*. Acrem vim habet. Commanducata Radix pituitam trahit. *Diosco-rides*.

2. Anemone sylvestris *Offic.* Matthioli Ger-Sylvestris alba major C. B. Sylvestris latifolia alba sive tertia Matthioli *Park.* Magna alba plurimâ parte anni florens J. B. *Grosse weiße wilde Anemonen Rößlein*. In hortis colitur. *Usu*. Herba. *Vires*. Cum priore viribus con-venit.

### XX. De Pulsatilla.

**N**ote sunt semina cincinnata, plumulis longis adherentibus flores hexapetali. R. Meth. A. p. 69.

Pulsatilla *Offic.* Chab. Vulgaris *Ger.* Danica *Park. parad.* Folio crassiore & majore flore C. B.

B. Purpurea cœruleave J. B. Ruchenschellen.  
Schlott-Blumen. In hortis colitur. Apri-  
li floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum Anemone  
viribus convenit.

---

## SECTIO XIV.

### De Herbis Pomiferis.

#### 1. De Granadilla seu Contrayerva.

Pag. 233. lin. 4. subjunge:

**I**N priore meo Libro *Muntingium* secutus  
*Contrayervam* *Offic.* pro radice cujusdam  
*Granadilla* Speciei exhibui. Verum plan-  
tam à P. Camello eo nomine descriptam  
cùm sit ramosa (si modò vera *Contrayer-*  
*va* ei cognita fuerit) ad hanc Tribum mini-  
mè pertinere constat. Nihilominus Descri-  
ptio ejus adè imperfecta est, ut ad quamnam  
referenda sit indè expiscari nequeam.

Pag. 236. pro Cap. IX. adde:

#### IX. De *Momordica*.

**N**Otae sunt, fructus verrucosis tuberculis exaspe-  
ratus minimus, carne pauca, unica intus ca-  
vitate, quæ sponte aperitur, & semina continet ca-  
liptra seu pileolo quodam involuta, plerumque cre-  
nata; flores ad centrum usque in quinque lacinias fin-  
duntur. R. Meth. A. p. 71.

*Momordica* & *Balsamina* *Offic.* *Momordica*  
*Schrod. Herm. Cat. Officinarum Volck. Vulga-*

ris *El. Bot. T. Inst.* Momordica, Balsamina, Cucumeraria, Pomum mirabile *Chab.* Balsamina mas *Ger. Park.* Rotundifolia repens seu mas *C. B.* Cucumerina Indica, folio integro, fructu variegato *Commel. in not.* Cucumeraria, Momordica, Charantia, Balsamina mas *Munt.* Cucumeraria *J. B.* Cucumis puniceus *Cordi H. Ox.* Balia-Mucca Piri *H. M. T. 8.* Balsam-Kraut Manlein Balsam Aepffel. In hortis colitur. Augusto floret. *Ufu.* Fructus. *Vires.* Refrigerat parùmque siccatur, vulneraria est, dolores ac præsertim hæmorrhoidum mitigat. Extrinsicis sauciatis confert nervis, Herniæ, ambustis, &c. *Schrod.* Balsamum ex fructu hujus plantæ oleo insolatæ per longum tempus factum: valet optimè in vulneribus, ulceribus, maximè hæmorrhoidibus, matricis ulceribus, rupturis, &c. *Pharm. Bat.*

Antequam *C. Baubinus* pinacem suam ediderat duos tantum novi Botanices scriptores qui *Momordicæ* nomen meminerunt: Post eum *Schroderus*, *Chabræus*, *D. Hermannus*, *D. Volckamerus* & *D. Tournefortius* ejus mentionem fecerunt, nemo tamen eorum eo nomine *Balsaminam marem* intelligit, sed omnes hanc plantam; neque quisquam Botanices Autor aut auditus mihi aut cognitus eam unquam ita appellat, neque vires ab ipso *D. Bates* Balsamo *Momordicæ* attributæ hujus virtutibus disconveniunt.

## SECTIO XV.

## De Herbis Bacciferis.

## I. De Chamæmoro.

**N**Ota hujus, flos pentapetalos, fructus è pluribus acinis arcte stipatis, mora rubi æmulantibus, compositus. R. Meth. A. p. 72.

A. 1. Chamæmorus Offic. Ger. Vaccinia nubis ejusd. Anglica Park. Cambro Britannica sive Lancastrense Vaccinium nubis ejusd. Chamærubus folio Ribes Anglica C. B. Rubo Idæo minori affinis Chamemorus J. B. Chab. Rubus Alpinus humilis Anglicus, Vaccinia nubis (i. e.) Wolefen, Beeren. Krez, Beeren. vulgò dictus P. Al. An Chamæmorus Norwagicus Park. Norwagicus Clusii J. B. Chamærubus folio Ribes C. B. Norwegische Brom-Beer. In summis Angliæ Alpibus reperitur. Julio & Augusto fructum maturum edit. Ufu. Fructus. Vires. In scorbuto multum laudat Hoierus.

A. 2. Chamærubus Offic. Saxatilis C. B. Rubus saxatilis Ger. Alpinus saxatilis Park. Tricoccus ejusd. Alpinus humilis J. B. Chab. Alpinus humilis Gesneri El. Bot. Stein-Beeren. Brom-Beer. Montium altiorum incola est. Junio floret. Ufu. Baccæ. Vires. Cum Rubo Idæo viribus convenit.

## II. De Smilace aspera.

Pag. 240. pro 2da Specie adde:

2. **S**Milax aspera *Offic. Ger. J. B. Chab.* Aspera fructu rubro *Park.* Aspera fructu rubente *C. B. Scharffe* oder stechende *Winde.* In hortis colitur. Æstate floret. *Ufu.* Folia, viticuli, baccæ. *Vires.* Noxios humores per sudorem & transpirationem evacuat, cutis vitia expurgat, venena arcet, articulorum dolores sedat. Succedaneum est *Sarsaparilla.*

Pag. 242. lin. ult. adde:

## IX. De Monophyllo.

**C**ujus notæ flosculi tetrapetali stellati, spicatum digesti, foli è terra exorta (duo enim, vel tria in caule sunt) singularia, baccæ rubræ, ut in *Lilio convallium.* *R. Meth. A. p. 73.*

*Monophyllon* *Offic. Ger. sive Unifolium Park.* *Unifolium, sive Ophrys unifolia J. B. Chab.* *Lilium convallium minus C. B. Smilax unifolia humillima El. Bot. Einblatt.* In sylvis & dumetis. Maio & Junio floret. *Ufu.* Flos. *Vires.* Cum *Lilio convallium* viribus convenit.

Pag. 243. lin. ult. subjunge:

## XII. De Ipecacuanha.

**F**lores & baccæ sunt racemose, unde ab *Herba Paris* differt.

*Ipecacuanha* *Offic. Pomet. Pis. Act. Philos. Lond.*



*Lond. N. 238. Ipecacuanha Marl. ob. Hipocacuanha Bagl. Prax. Ipecacoanna Brasiliensis Marg. Ipecaya sive Pygaya Laet. Purch. Pilg. Vol. 4. Herba Paris Brasiliana polycoccus R. H. p. 669. Periclymeno parvum Brasilianum Alexipharmacum P. Al. Periclymeno accedens planta Brasiliiana, flosculis congestis albis H. Ox. Brasilianische Einbeer. Ipecacuanha. Ex Brasilia exportatur. Ufu. Radix parvatenuis, nodosa, foris fusca, intus fere buxei coloris, sapore amaricante. Vires. In fluore albo multum valet. Specificum est, ac fermè infallibile remedium in fluxibus Dysentericis, aliis Hemorrhagiis sanguineis, colliquationibus humorum, &c. Baglio. Infusa vel in pulvere sumpta per vomitum & secessum purgat, & non solum in Dysenteria sed etiam in affectibus ventriculi datur cum successu.*

### XIII. De Solano.

Pag. 244. pro 3a & 4ta Speciebus Solani subjunge:

3. **A** Momum Plinii *Offic. Ger. Plinii vulgò Herm. Cat. Solanum fruticosum bacciferum C. B. Fruticosum Americanum, dictum Amomum Plinii Park. Strychnodendros. J. B. Appollinaris Solani species ex Appennino; Strychnodendros: Solanum arborescens Chab. Baumichter. Staudichter Nachtschatten. In insula Madera sponte oritur. Julio & Augusto floret.*

4. *Battata Virginiana* *Offic. Ger. Park.* *pas Americanum J.B. Americanum, Pycnomum Opanank Insulæ Virginiae radix: Chuno Chab. Solanum tuberosum esculentum B. Virginiansche Potatoes. Erd-Aepffel. Virginia sponte oritur, apud nos in hortis colitur. Junio & Julio floret. Usu. Radix. In Culinis, in Officinis nunquam. Virg. Cum Battata Hispanica viribus convenit creditur.*

#### XIV. De Lycopersico.

**A** *Solano fructu in plures cellulas diviso fert. Floris figurâ convenit. R. Meth. p. 74.*

Pag. 244. lin. 27. subjunge:

#### XV. De Melongena.

**A** *Solano differt quod fructus ejus solidus sit carnosus & sine cavitate, cum Solano mollis sit, cavus succulentus. R. Meth. A.*

*Mala insana* *Offic. Ger. Insana Syriaca Paris. Malum insanum folio non spinoso Munt. Solanum pomiferum fructu oblongo C. B. Pomiferum fructu rotundo J. B. Melonger fructu oblongo El. Bot. Arabum, Melanzan Solanum pomiferum Chab. Belingela Pis. Lusitanis Melongela Latinis: Tongu Angolensibus, Macumba Congensibus Mareg. Melanzan Aepffel. Doll-Aepffel. In hortis apud nos colitur, Aestate floret. Usu. Fructus.*

Pag. 245. lin. II. subjunge:

## XVII. De Bella Donna.

¶ Lores habet campaniformes, concavos & tubulosos, margine in quinque segmenta acuta diviso; uctus major, in duas cellas divisus, malignus & venenatus. R. Meth. A. 74.

A. Solanum lethale Offic. Ger. Park. Melanocerasus C. B. Manicum Chab. Manicum mulis seu Bella donna J. B. Furiosum, luridè purpureo flore calathoide, melanocerasus. P. Al. Cosmesticum Hofman. Solano congener flore campanulato vulgatus, latioribus foliis H. Ox. Bella donna Clusii El. Bot. Donna, majoribus foliis & floribus T. Inst. Wald Nachtschatten. Tödliche Nachtschatten Döll. Wurk. In locis ruderatis & ad semitas. Junio & Julio floret, usu. Folia. Vires. Recentia mammis imposita, earum duritias & tumores emolliunt, discutiunt & sanant etiam cancrasas R. H. Intus sumpta maligna est & lethalis planta.

## XVIII. De Halicacabo.

Pag. 245. lin. 23. subjunge:

¶ Morbo articulari efficacius esse creditur. 2. Solanum somniferum Offic. Ger. Park. Somniferum verticillatum C. B. Chab. Somniferum antiquorum Alp. ex. Verticillatum J. B. Verticillatum angustiore folio flore ochroleuco Ban. Cat. Vesicarium verticillatum fructu erecto minore H. Ox. Alkekengi Mexicanum Herm. Fructu parvo verticillato El. Bot.

Bot. *Peevetti H. M.* Schlafmachender Nachtschatten. Nachtbeer. In hortis Botanicorum Julio floret. *Ufu.* Radix, Fructus. *Vires.* Radix vim habet somniferam, Opio tamen mitiorem. Fructus, urinam vehementer ciet unde Hydropicis exhibetur. Decoctus dentium doloribus auxiliatur. Radicis succum cum melle oculorum hebetudines tollit. *Diosc.*

### XIX. De *Asparago.*

Pag. 246. lin. 5. subjunge:

**A** *Sparagus sylvestris Diosc.* Sylvestris mollis & tenuissimo folio *D. Jons.* Pratensis *J. B.* Sylvestris tenuissimo folio *C. B.* *Wilder Spargen.* Circa Monspelim observatur. Soli transplantatione à sativo differt.

2. *Asparagus petræa, & Corruda Offic.* Petræa sive Corruda *Ger.* Foliis acutis *C. B.* Acuto folio petræus *Jons.* *D.* Sylvestris foliis acutis *Park.* Corruda *J. B.* Sive *Asparagus sylvestris Chab.* Stein Spargen. Dorn Spargen. Ad sepes & in dumetis Italiæ, &c. frequens. Augusto floret. *Ufu.* Turiones, Radix. *Vires.* Cum Sativo viribus convenit, cujus vice eo utuntur Monspelienses Pharmacopœi.

### XX. De *Oxycocco.*

**N**ote hujus folia *Serpylli*, viticulae tenues supinae, flosculi tetrapetaloides, bacca sublonga, locus palustris. *R. Meth. A. p. 75.*

1. *Oxycoccus Offic.* sive *Vaccinia palustris J. B. Chab.* *Oxycoccum Cordi Volck.* *Vaccinia*

a palustris *Ger. Park.* Vitis Idæa palustris  
*B. Moos Beer.* Viehbefinge. In palu-  
 is locisque putridis. Jnnio floret. *Usu.* Fru-  
 us. *Vires.* Fluxus alvi vomitumque sistit,  
 im sedat, ventriculum corroborat, æstum  
 bilem compescit, pesti resistit.

2. Uva Gruina *Offic.* Vitis Idæa palustris  
 virginiana fructu major *R. H. p. 685.* Idæa  
 palustris Americana, oblongis splendidibus  
 lus fructu grandiore, rubro, pluribus in-  
 s acinis referto *P. P. Tab. 320. f. 6.* Cranich-  
 beeren. Ex Nova Anglia transportatur. *Usu.*  
 tæ. *Vires.* Ad Scorbutum præstare cre-  
 tur. In culinis nostris etiam reperitur.

## SECTIO XVI.

### De Herbis Multifiliquis seu Corniculatis.

#### II. De Telephio.

Pag. 248. pro 2da Specie Telphii adde:

**A** Rhodia radix *Offic. Ger. Park. C. B.*  
*J. B. Chab.* Telephium radice  
 Rosam spirante, majus *Herm. Cat.*  
 Luteum minus, radice Rosam re-  
 olente *H. Ox.* Anacampseros, radice Rosam  
 irante *El. Bot.* Radice Rosam spiran-  
 major *T. Inst.* Rosen; Burz. Rhodieser  
 Burz. In montosis reperitur. Vere floret.  
*su.* Radix tuberosa fragilis. foris fusca, in-  
 is albida, odore & sapore roseo. *Vires.* Cal-  
 facit

facit & siccat, Cephalica est. *Ufus.* præcipue in dolore capitis.

### III. De Cepæa.

**N**otæ sunt Folia succulenta Portulacæ similia. Flores stellati in Caulibus à medio summum tenus.

Cepæa *Offic.* Ger. C. B. J. B. Chab. Matthioli Park. Sedum Cepæa dictum *Herm. Cat.* annum album, oblongo Portulacæ minoris folio *H. Ox.* Cepeen Kraut. Aelfer Wurzel. In hortis seritur. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vi-res.* Folia in vino pota Urinæ stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus opitulatur. *Dioscoridis.*

Pag. 248. Ad vires Illecebræ adde:

Acris est planta ac vehementer excalefaciens. Intrinsicus succus aliquo liquore extractus vomitum movet, crassos, pituitososque ac biliosos humores potenter educit, unde in febribus quartanis mirè confert. Inter antiscorbutica recensetur. Extrinsicus rubificat, vesicas excitat, ac tandem exulcerat. *Diosc.*

Pag. ead Ad vires Umbil. Veneris adde:

Leviter astringere, refrigerare, repercutere & abstergere asserit *Gal.* Succus inflammationibus, ignibus sacris, strumis & perionibus illitu auxiliatur; stomachi ardorem mitigat, &c. Folia cum radice comosa calculosis profunt & Urinam cient. *Dioscorid.*

## VI. De Pæonia.

Pag. 249. pro 4ta Pæoniæ Specie adde:

**P**æonia flore albicante *Offic.* flore pleno albicante *Park. Parad.* flore ex albido leno major & minor *C. B.* fœmina polyanthos flore albo *Ger.* fœmina polyanthos *Chab.* bo flore pleno, sive polyanthos alba fœmina *J. B.* Pœonien Weiblein mit weissen Blumen. In hortis reperitur. Maio floret. *usu.* Radix. *Vires.* Cum priore viribus conuenit.

## VII. De Helleboro nigro.

Pag. 250. lin. 14. subjunge:

**N** passione Hysterica, & affectione Hypochondriaca remedium specificum & efficacissimum æstimatur. *Purcel.*

**A. 2.** Helleborastrum *Offic.* *Ger.* Helleboraster minor flore viridante *Park.* Helleborus niger *extensis* flore viridi *C. B.* niger sylvestris ramosus, latiore folio deciduo *H. Ox.* Elleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo, radice diuturna *J. B. Chab. Bærssus.* Schwarze Niesewurz. Christwurz. In locis montosis. Martio & Aprili floret. *usu.* Radix, folia. *Vires.* Folia aduersus variolas aliosque morbos contagiosos (in cerevisia pota) mirè commendat *D. Johnson.* Radix eadem facultates cum genuino habet. Purgat inferiorem ventrem, pituitam & flavam bilem duens *J. B. Hippitriaci & Pecuarii* in lue jumentorum

torum huic plurimum confidunt; scilicet bo-  
um palearia, equorum cutem infra cervi-  
cem, pecudum aures stylo pertundunt, dein  
fibras radicum hujus per vulnus transfadigunt,  
unde *Pflockwurzels* dicuntur.

A. 3. *Consiligo Offic. Helleborastrum Pharm.*  
*Bat. Helleboraster maximus Ger. maximus si-*  
*ve Consiligo Park. Helleborus niger foetidus*  
*C. B. niger ramosus angustifolius semper vi-*  
*rens elatior H. Ox. Elleborus niger sylve-*  
*stris adulterinus etiam hyeme virens J. B.*  
*Chab. Schmalblätterigte, Niesewurzel.* In  
sylvosis sed rarius. Februario & Martio flo-  
ret. *Usu. Folia. Vires. Pulvis foliorum exsic-*  
*catorum pauca quantitate verminantibus*  
*pueris, exhibetur, optimumque & certissi-*  
*imum remedium vulgò æstimatur. Adno-*  
*tat autem bene Tragus internis corporis par-*  
*tibus adhiberi non debere, sed ab illo ca-*  
*vendum tanquam á pestilentissima herba.*

### VIII. De Fraxinella.

Pag. 250. lin. ult. subjunge:

**D**uas Tragii species *Dioscorides* memorat,  
verum adeò obscure de iis scripsit; ut  
non leves controversiæ inter Botanicos de  
earum prima indè exortæ sint, varias plan-  
tas eo nomine appellantes. *Gesnerus* Polygo-  
num bacciferum pro eo habet, *Dodoneus* in  
*Historia Gallica*, Atriplicem olidam quam Tra-  
gium Germanicum vocat; *Pona & Bellus* An-  
drosemum foetidum, *Tragium Creticum*  
Bel-



Bellonio dictum, *Lobelius* *Tragium Dioscoridis* *Fraxinellam* nostram esse arbitratur, in cujus opinionem & ipse propendeo, quod nulla alia ex prædictis planta, *Lentisco semine folio & ramis similis, singulis tamen minoribus*, dici potest.

Alterum *Dioscoridis* *Tragium Rauwolfius* *Stœchadis* speciem fuisse credidit, ut suo loco ostendi.

2. Anisum Indicum *Offic.* Indicum stellatum *Ger. emac.* peregrinum *C. B.* exoticum *Philippinarum Insularum Park.* Zingi fructus stellatus sive Anisum Indicum *J. B. Chab.* *Fœniculum Sinense Fr. Redi Exper. Nat.* *Cardamomum Siberiense Patavinorum Hort. Bosian.* *Euonymo adfinis Philippinarum Insularum*, Anisum spirans, nuculas in capsulis stelliformiter congestis, proferens *P. Al. Indianischer Anieß/* à similitudine seminum Anisi quoad odorem, & *Stern-Anieß/* à figura capsulæ seminum stellam referente. Ex India Orientali ad nos transportatur. *Usu.* Theculæ, quæ fusci coloris sunt, singulæ singula semina coloris fusci splendens, Lenticulæ circiter magnitudine continent.

## IX. De Abutilo.

*Foliis mollibus Althææ, floribus è foliorum alis exeuntibus Alceæ thecis bivalvibus cum solitariis in singulis seminibus ab aliis hujus generis differt.* *R. Meth. A. p. 77.*

*Abutilon Offic. Dodonæi El. Bot.* *Althæa lutea Ger. Theophrasti flore luteo C. B. Theophrasti flore luteo quibusdam Abutilon J. B.*

*Chab.* lutea sive *Abutilon Avicennæ putatum*  
*Park.* *Alcea Indica*, *Abutilon dicta major*, peri-  
 carpio membranaceo, orbiculari, compresso,  
 vertice corniculis extùs coronato, intùs in  
 decem aut duodecim loculamenta diviso *P.*  
*Al.* *Zbisch* mit gelben Blumen/*Allthe.* In hortis  
 seritur. Julio floret. *Usu.* Folia, Semen. *Vires.*  
 Folia externè ulcera mundant. Semen uri-  
 nam provocat, calculum expellit.

### X. De *Caltha Palustri.*

**N**ote sunt flos *Ranunculi*, sed nudus absque perian-  
 thio, siliqua radiatim disposita, folia integra sub-  
 rotunda. *R. Meth. A.* p. 78.

*A.* *Chamæleuce Offic.* *Caltha palustris J. B.*  
*Chab.* *palustris major* *Ger.* *palustris vulgaris*  
*simplex Park.* *palustris flore simplici C. B.* *Pseu-*  
*do-Helleborus ranunculoides pratensis ro-*  
*tundifolius simplex H. Ox.* *Populago El. Bot.*  
*Rüh-Blume/ Gold- Wiesen- Blume.* In aquosis.  
 Majo floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Lumborum  
 doloribus propitia est. *Diosc.*

### XIV. De *Aconito.*

Pag. 252. post lin. 9 pro 1. & 2. Speciebus  
*Aconiti*, adde:

- N**apellus *Offic.* verus cœruleus *Ger.* ve-  
 rus flore cœruleo *Park.* *Aconitum cœ-*  
*ruleum seu Napellus primus C. B.* magnum  
*Napellus Chab.* magnum purpureo flore, vul-  
 gò *Napellus J. B.* *Münchs- Kappen / Narreu-*  
*Kap-*

Rappen / blau Eisen-Hütlein. In hortis reperitur. Julio floret. *Vires.* Facultate est hominibus aliisque animalibus exitiali & pernicioſa R. H.

2. Aconitum Ponticum *Offic.* luteum Ponticum *Ger.* Iycoctonum *Chab.* Iycoctonum luteum *C. B.* luteum Ponticum serotinum flore albido *Park.* folio Platani, flore luteo pallente *J. B.* Wolffswurz mit weißlichten Blumen. In hortis colitur. Julio floret. *Vires.* Maligna est planta.

Hoc est Aconitum alterum *Dioscoridis*, Iycoctonum & Cynoctonum dictum: cujus tres faciat species, hoc ad tertium refertur quam Ponticum vocari ait: *Foliaque habere Platani, sed longiora, nigriora, & crebriore difſura: caulem filicis pediculo ſimilem, nudum, cutitanti altitudine: Semen verò in ſiliquis oblongis remanere, ac radicibus tandem eſſe in Squilla marinae modum nigreſcentibus.* Chab.

## SECTIO XVII.

### De Herbis flore Monopetalo vasculiferis.

#### II. De Nicotiana.

Pag. 251. pro 2da Specie Nicotianæ adde:

**H**Yoscyamus luteus *Offic.* *Ger.* Petum Anglicanum *Pharmacol. Bat.* Tobacco Anglicum *Park.* Nicotiana minor

C. B. Priapeia, quibusdam Nicotiana minor  
 J. B. *Chab.* Englisch Taback. In hortis seritur.  
 Julio & Augusto floret. *Ufu.* Folia. *Vires.*  
 Cum Hyoscyamo viribus convenit.

Hæc planta pro Mandragora & Nicotiana  
 Muliereulis Botanopolis Londinensibus non  
 rarò venditur.

### III. De Gentiana.

Pag. 255. pro 2da, 3tia & quarta specie  
 Gentianæ adde:

2. **G**entianella verna *Offic.* verna major *Ger.*  
*emac.* Alpina verna major *Park.* Alpina  
 angustifolia magno flore C. B. Alpina magno  
 flore *P. Al.* Gentiana Alpina magno flore *J. B.*  
 Alpina flore magno cœruleo, *Violæ Mariana*  
*Chab.* Quinta sive Gentianella verna major  
 Clusii *H. Ox.* Alpina pumila angustifolia ma  
 gno flore *El. Bot.* Berg; Gentianel mit Glocken  
 Blumen. Summis Alpium jugis sponte repe  
 ritur, in hortis autem frequens nutritur. A  
 prili & Majo floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Ama  
 rissimus est totius plantæ Sapor, ideoque je  
 cinoris vitiis, nempe regio morbo & obstre  
 ctionibus, auxiliatur. *J. B.*

A. 3. Pneumonanthæ *Offic.* *Ger.* Gentianell  
 autumnalis Pneumonanthæ dicta *Park.* Ge  
 tiana palustris angustifolia autumnalis major  
*ejusd.* Gentiana species, Calatina quibusdam  
 radice perpetua sive palustris *J. B.* Species pa  
 lustris Calathiana viola quibusdam *Chab.* Qu  
 ge

gen: Blumen. In ericetis humidioribus reperitur. Autumno floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Efficax à recentioribus adversus pestilentes morbos habetur, & ad virulentorum animalium morsus & ictus. Alii præclaras ei vires in sanandis pulmonum affectionibus ac hepatitis adscribunt *J. B.* Gentianæ viribus convenit multò tamen imbecillior est.

*A. 4.* Gentianella autumnalis *Offic.* fugax minor *Ger.* autumnalis Centaureæ minoris foliis *Park.* fugax quarta Clusii flore dilute purpurascente & cœruleo elegantissimo *J. B.* fugax Clusii *Chab.* Gentiana brevi folio *C. B.* Kleiner Himmels: Stengel. In montosis cretaceis & pascuis siccioribus. Septembri floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Iisdem facultatibus cum majore Gentiana pollere creditur.

Hæc planta præstantissimum est stomachicum, & è gratissimis herbis amaris, Centaurium minus longè superans, cujus loco in frequenti nunc dierum usu esse incipit apud ingeniosos Medicos & Pharmacopœos *Londonenses.*

#### IV. De Convolvulo.

Pag. ead. pro prima & 2da Speciebus Convolvuli adde:

1. **A.** Smilax lævis *Offic.* lævis, Convolvulus major *Chab.* lævis sive lenis major albus *C. B.* *Park.* vulgaris major albus seu flore majore albo *H. Ox.* major flore albo *P. B.* Grosse weisse Binde/Zaun: Glocken. Ad sepes &

in hortis. Æstate floret. *Ufu*. Radix. *Vires*.  
Expurgat humores biliosos acres & serosos.

A. 2. Helxine cissampelos *Offic.* cissampelos multis sive Convolvulus minor. J. B. Convolvulus minor arvensis. C. B. minor albus vulgaris *Park.* minor purpureus *ejusd.* vulgaris flore minore purpureo *H. Ox.* minor. Salsione veterum, Helxine cissampelos *Chab.* Smilax lævis minor *Ger.* Kleine Winde / Kornwinde. In arvis. Junio floret. *Ufu*. Herba. *Vires*. Foliorum succus potu dejicit alvum. *Diosc.*

Ingeniosus & eruditus vir D. *Tournefortius* *El. Bot.* p. 109. Jalapam Convolvuli radicem non esse ait, sed cujusdam Mirabilis Peruvianæ speciei quam *Jalapam Officinarum fructu rugoso* vocat, cujus notitiam à *P. Plumier* habuit.

Pag. 257. pro 6ta Specie Convolvuli adde:

8. **B**atatas *Offic.* C. B. J. B. planta peregrina Indica Camotes, Amotes & Aies etiam dicta Clusii *Chab.* Battatas Occidentalis Indiæ & Inhamæ Orientalis Lusitanorum *Park.* Convolvulus Indicus Batatas dictus *R. H.* Indicus radice tuberosa eduli, cortice rubro Batatas dictus *P. B. P.* Indicus Orientalis Inhamæ seu Batanas. Sisarum Peruvianorum seu Battata Hispanorum *H. Ox.* radice tuberosa esculenta, Spinachia folio, flore albo, fundo purpureo, semine post singulos flores singulo *Cat.*  
*Jamaic.*

*Jamaic.* Sifarum Peruvianum sive Battatas Hispanorum *Ger. emac.* Jética vulgò Batata *Pis.* Brasiliensibus *Marg.* Kappa kelengu *H. M.* Spanische Potatoës. Peruvianische Zucker-Rüben. Utriusque Indiæ multis in locis sponte oritur. *Usu.* Radix. *Vires.* Temperata est, & cocta vel assa ventrem emollit, estur aut cruda, aut cocta in deliciis ob saporis gratiam æstimatur.

### V. De Cneoro.

*Caule non scandente à Convolvulo differt.*

**A.** Cneoron album & Dorycnium *Offic.* album foliis Oleæ argenteo molli *C. B.* *Jons.* *D.* album foliis argenteis *Ger. emac.* album Dalechampii aliis Dorycnium *Chab.* Dorycnium Imperati *J. B.* Creticum Alpinum *Park.* Convolvulus major rectus Creticus argenteus *H. Ox.* argenteus umbellatus erectus *El. Bot. T. Inst.* Stein-Röflein. In Candia reperitur. Julio floret. De viribus & usu nil invenio apud Authores.

### VI. De Campanula.

*Note sunt, flos campanulatus in quinque plurimum laciniis ad margines sectus summo fructui insidens, vasculum seminale in terna loculamenta divisum, succo lacteo scatere. R. Meth. A. p. 82.*

*A. 1.* Campanula *Offic.* radice esculenta flore cœruleo *Herm. Cat.* Rapunculus *Chab.* esculentus *G. B.* esculentus vulgaris *Park.* vulga-

ris campanulatus *J. B.* Rapuntium parvum  
*Ger.* Kleine Rapunzel. In aggeribus fossarum  
 Julio floret. *Ufu.* Radix in culinis, Semina in  
 Officinis. *Vires.* Semen oculorum fluxiones  
 cohibet. Succus aurium dolores sedat. *Diosc.*

A. 2. Trachelium *Offic.* majus *Ger.* majus  
 flore purpureo *Park.* majus sive Cervicaria  
*P. B.* Campanula, Cervicaria *Chab.* vulgatio  
 foliis Urticæ major & asperior *C. B.* major &  
 asperior folio Urticæ *J. B.* Halskraut / Hals  
 Wurzel. In sylvosis & ad sepes. Julio floret.  
*Ufu.* Folia. *Vires.* Ad anginas commendatur,  
 etiamque in tumoribus & inflammationibus  
 oris. &c.

3. Medium *Offic.* Dioscoridis Rauwolfio *J.*  
*B.* *Chab.* Viola mariana peregrina *Park.* maria-  
 na laciniatis foliis peregrina *C. B.* Campanu-  
 la toliis profunde incisiss, fructu duro *T. Corol.*  
 Syrische Milch: Blöcklein mit zerkerbten Blät-  
 tern. In Syria & Græcia reperitur. *Ufu.* Ra-  
 dix, Semen. *Vires.* Radix menses sistit, Se-  
 men menstrua pellit. *Diosc.*

Hanc cum *Rauwolfio Dioscoridis* potius Me-  
 dium habendum esse existimo, quàm Violam  
 Marianam quam *Matthiolus* pro eo exhibet  
 quod melius convenit cum brevi illius de-  
 scriptione à *Dioscoride* tradita, *lib. 4. cap. 18.* in  
 his verbis: *Medion in saxis, & opacis nascitur*  
*folia habet Iridis: caulem tricubitalem, & in e-*  
*florem grandem, purpureum, rotundum: semine Cu-*  
*ci minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi*  
*gustu acerbo.*



## VII. De Viola Mariana.

**A** Campanula differt fructu in quinque cellas diviso & floris marginibus minùs profunde sectis. R. Meth. A.

Viola Mariana *Offic.* Ger. Mariana flore purpureo *Park.* Mariana Dodonæi quibusdam Medium *J. B. Chab.* Campanula hortensis folio & flore oblongo *C. B. Coventry; Glöcklein / Purpurrothe Milch; Glöcklein.* In sylvis & montosis, apud nos tantum in hortis reperitur. Æstate floret. *Ufu.* Radix in Officinis rarè, in culinis autem inter olera. *Vires.* Refrigerat, siccat, parùm astringit.

Pag. 258. post lin. 29. adde:

## IX. De Pinguicula.

**N**ote sunt cauliculi nudi, unicum in summitate florem violam referentem calcari donatum gestantis, vasculum seminale bivalva subrotundum, folia humi strata, pallida, humore pingui madentia. R. Meth. A. p. 90.

A. Pinguicula *Offic.* Gesneri *J. B. Gesneri* Cuculata *Historiæ Lugdunensis Chab.* seu, Sanicula Eboracensis *Ger. Park.* Sanicula montana flore calcari donato *C. B.* Viola palustris Pinguicula vel ἰβυργον, dodecatheon *Plinii H. Ox. Butter-Wurk. Schmer-Wurk. Bergs Sanifel.* In montosis humidis. Majo floret.

K 5

*Ufu.*

*Ufu.* Herba. *Vires.* Vulneraria est planta, & ad ramices puerorum eximia. Syrupum ex ea factum purgat pituitam satis strenuè.

Pag. 259. lin. 14. subjunge:

Oculorum fluxionibus & inflammationibus auxiliatur, foliis cum polenta tritis & impositis. Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit. *Diosc.*

## XI. De Antirrhino.

*N*Ota sunt flos rictum exprimens, clausus nonnullis dictus, labio superiore bifido, inferiore tripartito, calcari carens. Vasculum seminale in bina loculamenta divisum vituli caput & naves referens, è tribus foraminibus semina fundens. R. Meth. A. pag. 90.

A. Artirrhinum *Offic.* minus *Ger.* sylvestre *Medium Park.* arvense majus C. B. arvense minus *H. Ox.* angustifolium *sylvestre J. B.* angustifolium flore rubro *Herm. Cat.* angustifolium in quibusdam minus aliis *Chab. Kalbs-Maul/ Klein Drant.* In arvis arenosis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* In suffusionibus oculorum, & in passione *Hysterica* à quibusdam commendatur.

## XII. De Aristolochia.

Pag. 260. lin. 12. subjunge:

4. *P*istolochia *Offic.* *Ger.* vulgatio *Park.* *Aristolochia* *Pistolochia* dicta C. B. polyrrhi-

205 J. B. Chab. Osterlucey mit viel dünnen langen Wurzeln. In Italia, Gallia & Hispania sponte oritur. Æstate floret. Ufu. Radix. Vires. Cum reliquis viribus convenit.

Pag. 262. lin. 10. subjunge:

## XVI. De Aleætorolopho.

**N**Ote flores galeati & labiati, labello tripartito: florum calices ampli, & vesicularum instar inflati, vascula seminalia occultantes bicapsularia compressa aut subrotunda, tum in summo, tum in lateribus in duo foliola se aperientia, semimbus foeta oblongis vel compressis. R. Meth. A. p. 91.

A. 1. Aleætorolophus, Crista galli Ger. Chab. galli foemina J. B. Pedicularis sive Crista galli lutea Park. pratensis lutea vel Crista galli C. B. Gelb Läuse-Kraut/Rödel-Kraut. In pascuis. Junio floret. Ufu. Herba. Vires. In tussi & caligine oculorum commendatur. Park.

A. 2. Pedicularis Offic. Ger. pratensis purpurea C. B. purpurea palustris seu pratensis vulgaris humilior H. Ox. pratensis rubra vulgaris Park. quibusdam Crista galli flore rubro J. B. Chab. Rödel / Braun-Rödel / Läuse-Kraut. In pratis & pascuis humidioribus. Æstate floret. Ufu. Herba. Vires. Frigida & sicca est, undè ad fistulas & sinuosa ulcera utilis. Sanguinis profluvium & menses sistit. Virofam facultatem habet, unde internos ejus usus condemnat J. B.

## XVIII. De Melampyro.

**N**Ota floris labium superius arcuatum seu fornicatum & incisum, inferius integrum, sibi mutuo conjuncta: folium breve laciniatum & canaliculatum, pericarpium sinu suo excipiens bivalve, quod à cuspide ad basin in duas carinas aperitur, &c. Semina triticeis similia. R. Meth. A. p. 91.

1. Triticum vaccinum *Offic.* Melampyrum sive Triticum vaccinum *Chab.* multis sive Triticum vaccinum *J. B.* purpureum *Ger.* purpurascens coma *C. B.* Cratægonum purpureum *Park.* Rüh-Weizen. Inter segetes passim. Junio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* In medicina nondum quod sciamus usum obtinuit cum *J. Bauhino* consentimus, gratus autem pastus est bobus & vaccis saginandis.

A. 2. Cratægonum *Offic.* album *Ger.* vulgare *Park.* Melampyrum luteum latifolium *C. B.* album. Triticum Vaccinum quorundam *P. B.* sylvaticum flore luteo, sive Satureia lutea sylvestris *J. B.* Gelber Rühweizen / wilder Rühweizen / Wald-Hirse. In sylvis & in dumetis. Junio & Julio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Venerem stimulat. *Lob.*

## XIX. De Polygala.

**N**Ota sunt flos ima parte clausus, summa expansus & in duo labia divisus, superiore bifido, inferioro-

seriore plerumque fimbriato; vascula seminalia Tblastospeos, compressa, didyma. Fructus floris calice obtegatur, è quinque foliis composito, quorum tria parva, duo grandia, velut ala fructum amplectentia.  
R. Meth. A.

A. Polygala *Offic.* Ger. vulgaris C. B. vulgaris *Officinarum* Volck. minor Park. tetrapetala, siliculosa bicapsularis, longo & angusto folio, minor H. Ox. Polygalon multis J. B. Chab. Flos Ambarvalis vulgo Herm. Cat. Milch-Burk / Kleine Kreuz-Blümlein. In pascuis siccioribus frequentissima, Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Ex amarore calidam & siccam esse probant; folia in vino cocta bilem per alvum dejiciunt. *Gesn.*

Hæc est Polygala *Officinarum Angliæ & Botanicorum* plerorumque modernorum; verum plantam illam esse quam hoc nomine tradit *Dioscorides*; neque descriptio, neque vires ut credamus permittunt, cum nec folia Lentis habeat, nec facultatem augendi lac, quorum utrumque Polygalæ attribuitur.

## SECTIO XVIII.

De

## Herbis floribus tetrapetalis.

*De Plantis flore uniformi tetrapetalo  
siliquosis.*

Pag. 265. pro Cap. I. adde post lin. 12.

*I. De Leucoio.*

*Cujus nota, siliquæ oblongæ, compressæ, bivalves, membranâ intergerinâ in duo loculamenta, duas seminum compressorum; aliâ foliaceâ cinctorum series continentia, divisæ, flores majusculi odorati. R. Meth. A. p. 94.*

Leucoium album *Offic. Ger. simplex fativum Park. incanum majus C. B. hyemale & diu durans album J. B. Chab. Weisse Walde Nägelein/ Schnee-Tröpflein.* In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Flores. *Vires.* Ulcera oris & rimas sedis sanant, contra vulvæ inflammationes valent. *Diosc.*

Pag. 304. lin. 30. adde

*IV. De Viola Lunaria.*

*Siliquâ latâ brevi à Leucoio distinguitur cum quo seminis figura compressâ convenit. R. Meth. A. p. 95.*

1. *Bulbonach Offic.* Bulbonac vulgatissime  
*P. B.* Viola lunaria sive Bulbonach *Ger. Park.*  
 lunaris vulgaris *ejusd. Parad.* lunaria major si-  
 liqua rotunda *C. B.* Lunaria major siliqua ro-  
 tundiore *J. B.* Leucoium lunatum seu luna-  
 rium latifolium majus annum, siliquâ rotun-  
 dâ, flore violaceo seu subcœruleo *H. Ox.* lu-  
 natum &c. flore purpureo *Herm. Cat.* Frembd  
 Mond-Kraut / Mondveiel. In montanis sylvis  
 crescit, apud nos autem in hortis colitur.  
 Æstate floret. *Uju.* Radix, Folia, Semina. *Vi-*  
*res.* Radix abstergit, mediocriter calfacit &  
 urinam cit, ut Rapunculus, folia calido, acri-  
 que & amaro gustu sunt: Pulvis seminis ama-  
 rissimi cum aqua appropriata exhibetur in E-  
 pilepsia. *Cam. Schwenckfeld.*

2. Viola lunaria *Offic.* Lunaris longioribus  
 siliquis *Ger.* lunaris altera sive peregrina *Park.*  
*Parad.* lunaria major siliquâ oblongâ *C. B.* Lu-  
 naria major *Chab.* major siliquâ longiore *J. B.*  
 Leucoium majus perenne siliquâ lunatâ lon-  
 gâ coronatâ *H. Ox.* Mondveiel mit länglichten  
 Schoten. In montibus Saleva, &c. provenit.  
 Majo floret. *Uju.* Folia. *Vires.* Quidam in  
 Helvetia chirurgus ex contusis foliis & Sani-  
 cula parabat unguentum vulnerarium non  
 contemnendum. *Cam.*

## V. De Hesperide.

*A* Leucoio differt tum siliquis, que non ut in Leu-  
 coiis compressæ sunt, sed tumida & subrotun-  
 da;

*de; tum seminibus, quæ teretiuscula & oblonga. R. Meth. A. p. 95.*

Hesperis *Offic.* hortensis C. B. flore purpureo albo & vario *Chab.* sive Viola matronalis *Park. Thead. & Parad.* Hesperides flore purpureo albo & vario J. B. Viola matronalis purpurea *Ger.* matronalis vulgò *Herm. Cat. Matronen-Blölen/ Biolen mit Purpur-Blumen.* In hortis colitur. Aprili, Majo & Junio floret. *Ufu.* Herba, Semina. *Vires.* Tussi convulsis & difficulter spirantibus mederi tradit *Clus.* Urinas insuper & sudores propellere, incidere, abstergere & digere J. B. Erucae ut sapore ita facultate proxima videtur, *Dod.*

## VI. De Alliaria.

*Seminibus oblongis teretiusculis cum Hesperide convenit, floribus parvis, foliis subrotundis, odor Allii ab eadem differt. R. Meth. A. p. 95.*

A. Alliaria *Offic. Ger. C. B. J. B. Park.* Hesperis Allium redolens *H. Ox. El. Bot. Herm. Cat. Knoblauchskraut.* In sepibus. Vere floret *Ufu.* Herba, *Vires.* Aperit, incidit, tenuium est partium. Interne urinam ciet, venenum expellit, tussim veterem sanat, dolores colicos sedat. Externe putredini resistit, unde gangrænam ulceraque putrida atque maligna sanat.



## VII. De Brassica.

Pag. 266. pro 2da, 3tia, 4ta & 5ta Speciebus  
Brassicæ, adde:

2. **B**Rassica capitata rubra *Offic.* Ger. Park.  
*parad.* C. B. J. B. Nother Kopff-Kohl. In  
hortis colitur. *Usu.* Folia. *Vires.* Decoctum  
hujus saccharo tantillo temperatum, potum  
horis medicinalibus egregium est ad promo-  
vendum materiæ purulentæ in Empyema per  
urinas effluxum. *Etmullerus.*

3. Caulis rubra *Offic.* Brassica rubra Ger. C.  
B. rubra vulgaris J. B. Chab. sativa rubra, aper-  
ta levis H. Ox. Nother oder brauner Kohl. In  
hortis colitur. *Usu.* Folia. *Vires.* Decoctum  
cum Saccharo sumptum in Asthma celebra-  
tur à Riverio.

4. Brassica Sabauda *Offic.* Ger. Park. alba  
capite oblongo non penitus clausa C. B. Ita-  
lica tenerrima glomerosa, flore albo J. B. Chab.  
Savoyen-Kohl. In hortis nostris colitur in  
culinarum usu.

5. Brassica florida *Offic.* Ger. Park. cauliflo-  
ra C. B. multiflora J. B. Chab. Caulis florida  
Park. *parad.* Bluhmen-Kohl / Käse-Kohl. In  
hortis etiam colitur. Æstate floret. *Usu.* In  
culinis nostris non raro invenitur.

## VIII. De Turritidi.

*Foliis imis hispida, quæ caules vestiunt glabris, glaucis; siliquis teretibus, erectis, cauli approximantibus & ferè parallelis ab aliis hujus generis distinguitur. R. Meth. A. p. 95.*

*A. Turritis Offic. Ger. vulgator J. B. Chab. Park. Lobelio El. Bot. Brassica sylvestris hispida, non ramosa C. B. sylvestris sive Brassicæ affinis Turritis dicta P. Al. sylvestris foliis integris per terram stratis, & in caulibus hispida H. Ox. Leucoium flore albo, siliquis uno versu dispositis & reflexis ejusd. Thurm. Senff. wilder Kohl mit scharffen Blättern. In aggeribus arenosis. Junio floret. Usu. Herba. Vires. Succus in ulcera oris à quibusdam commendatur, Lumbricos necat.*

## IX. De Rapo.

Pag. 266, lin. 28. pro 2da Specie Rapæ, adde:

2. *A. Rapa sylvestris Offic. C. B. Rapum sylvestre Ger. Herm. Cat. Chab. sylvestre non bulbosum Park. sylvestre Matthioli J. B. Wilde Rüben. In arvis Æstate floret. Usu. Radix. Vires. Additur in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totoque corpore utimur. Diosc.*

## X. De Napo.

Pag. 267. post lin. 7. subjunge:

2. *A. Napus sylvestris Offic. C. B. J. B. Chab. Napus Bunias Fuchsio P. B. Bunias syl.*

sylvestris Lobelio *Ger. emac.* five Napus sylvestris *Park.* Rüben/Steck-Rüben. Inter segetes & in aggeribus fossarum. Æstate floret. *Usu.* Semen. *Vires.* Cum priore viribus convenit, quibus acrior est.

Ex hujus semine tuso & presso Oleum Rüb-Dehl nostratibus dictum cum eruditissimo amico & vicino nostro elici censemus.

3. Pseudo bunium *Offic.* Napus sylvestris Cretica *C. B. Park.* Candische wilde Rüben. In Insula Creta reperitur. *Usu.* Herba. *Vires.* Tormina atque stranguriam laterumque dolores sanat: strumas discutit cum sale & vino illita. *Diosc.*

Utrum Napi dulcis an sylvestris semina in compositione Theriacæ Venetiænæ usurpari debeant, inter eruditos magna est controversia. In Officinis nostris prioris semina præscribuntur, Græcis scil. secutis, nam *Dioscorides* sylvestris alicujus speciei non meminit: Et *Andromachus* senior qui dulcis semen Napi præscribit: *Matthiolus* etiam *Epist. lib. quinto* ad *Balthaserum* domestici Napi semen præstantius contra venena quam sylvestrem affirmat. *Andromachus* filius enumerans simplicia medicamentum hoc ingredientia, sylvestrem speciem commendat, quod semina ejus acriora sint, proinde & efficaciora esse creduntur. Verum *Galenus lib. 1. de Antidotis* ab utroque dissentit, & Pseudo-bunii semina in Pharmaci illius compositione utenda præscribit.

## XI. De Synapi.

Pag. 267. post lin. 26. adde:

2. **A.** Rapiſtrum *Offic. Chab.* arborum *Ger Park.* flore luteo *C.B. J. B.* Sinapi arvenſe præcox, ſemine nigro *H. Ox. Wilde Kobl/Triller/Hedderich.* Inter ſegetes frequenter reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Semen. *Vires* Reſiccantem autem ac extergentem, nonnihilque digerentem facultatem obtinet, urinam provocat. *J. B.*

## XII. De Raphano.

Pag. 268. pro 2da Specie Raphani,  
adde:

2. **A.** Armoracia *Offic. Schrod.* Raphanuſylveſtris *Ger.* Rapiſtrum album articulatum *Park.* flore albo ſiliquâ articulatâ *C.B.* flore albo *Mer. Pin.* flore albo Eruçæ foliū *P. B.* flore albo ſtriato, Sinapi album agreſtè *Trago J. B.* flore albo ſtriato *Chab.* Raphaniſtrum flore albo ſtriato ſiliquâ articulatâ ſtriatâ minore *H. Ox. Wild Merrettich/Heidenreich* Inter ſegetes. Junio floret. *Uſu.* Radix. *Vires* Calfacit & ſiccant, mucilaginem tartaream incidit, attenuat, reſolvit, viſcera aperit, diuretica, lithontriptica & antiſcorbutica eſt *Schrod.*

## XIII. De Eruca.

Pag. 268. lin. 28. pro 2da Specie Erucae  
subjunge:

2. **A.** Eruca sylvestris *Offic.* Ger. sylvestris  
vulgatior *Park.* sylvestris major lutea,  
caule aspero *C.* B. sylvestris major vulgatior  
foetens *H. Ox.* tenuifolia perennis flore luteo  
*J. B. Chab. Wilde Naucke.* In muris. Junio flo-  
ret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Urinam vehemen-  
tius pellit & multo sativa acrior est. *Diosc.*

## XIV. De Sinapistro.

Pag. 269. pro 2da Specie Sinapistri,  
adde:

2. **A.** Barbarea *Offic.* Ger. *J. B. Chab.* flore sim-  
plici *Park.* Eruca lutea latifolia, sive  
Barbarea *C. B.* latifolia lutea seu Barbarea ma-  
jor & minor *H. Ox.* Nasturtium hybernum  
quorundam *P. B.* Sisymbrium Erucae folio,  
flore luteo *El. Bot.* Winterfresse / *St. Barbere*  
*Kraut.* In muris, aggeribus, & juxta rivulos.  
Majo & Junio floret. *Ufu.* Herba, Semen,  
*Vires.* Calida & acris est, urinam ciet, & cum  
Nasturtio viribus convenit; commendatur  
in Scorbuto, Succus in unguentis sordida &  
impura ulcera siccatur. Semen acre est, diu-  
reticum & lithonripticum.

## XV. De Eryfimo.

Pag. eadem pro prima Specie Eryfimi,  
adde:

1. **A.** *Camelina Offic. Ger. sive Myagrum alterum amarum Park. Myagrum filiquâ longâ C. B. Myagro affinis planta filiquis longis J. B. affinis planta filiquis longis & floribus parvis luteis Chab. Eryfimum Galeno & Theophrasto R. H. p. 811. Eruca sylvestris latifolia, folio integro, flore luteo minore H. Ox. Turritis Leucoii folio Fl. Bot. Theriacals Burm. Saamen/ grosse wilde Kresse. In locis putridis nonnunquam reperitur. Junio & Julio floret. Ufu. Herba. Vires. Lumbricos necat & arcet, ventriculum roborat, venenum expellit, Paralyticos & Epilepticos juvat, ulcera oris sanat.*

## XVI. De Raphanistro.

Pag. 270. post lin. ult. pro 2da Specie  
Raphanistri, adde:

2. **A.** *Raphanus aquaticus Offic. Ger. Park aquaticus foliis in profundas laciniâs divisâs C. B. aquaticus Tabernamontani J. B. aquaticus Tabernamontani flore luteo Chab. Armoracia foliis laciniatis Volck. Sifymbrium aquaticum foliis in profundas laciniâs divisâs filiquâ breviori El. Bot. Wasser-Kettich. In fossis palustribus. Junio & Julio floret. Ufu. Herba. Vires. Cum priore à quibusdam viribus convenire creditur.*

## De Tetrapelalis filiculosis seu capsulatis.

### XVIII. De Myagro.

**NOTA** sunt capsulae tumidiores, flores lutei, semina subrotunda. R. Meth. A. p. 97.

A. Myagrum Offic. Ger. Chab. sativum C. B. Park. dictum Camelina J. B. majus sativum H. Ox. Sesamum Tragi & Officinarum Volck. Alysson segetum foliis auriculatis acutis El. Bot. T. Inst. Lein oder Flachsdotter. Inter segetes Lini invenitur frequens. Usu. Semen. Vires. Contusum igne torrent, perunctisque virgis ad lucernarum lamina utuntur. Hoc pingui, scabritias corporis laevigari, atque expoliri constat. Diosc. Emplastica vim obtinet. Galen.

### XIX. De Draba.

**NOTAE** genericae sunt capsulae tumidae & subrotundae, flores albi. R. H. p. 821.

Draba Offic. Dioscoridis Ger. vulgaris Park. umbellata, vel Draba major capitulis donata C. B. sive Arabis Chab. multis flore albo J. B. filiculosa repens major, foliis magis incanis spanospermis vulgaris H. Ox. Lepidium humile incanum arvense El. Bot. T. Inst. Arabischer Senff / oder Türkische Kresse. In hortis colitur. Junio floret. Usu. Herba, Semen. Vires. Cum Ptisana coquitur herba in Cap-

padocia maximè. Semen aridum pro Pipere obsoniis admiscetur. *Diosc.*

## XXIV. De Thlaspi.

Pag. 273. prima & tertia Speciebus Thlaspi adde:

1. **A**lyssum *Offic.* incanum Serpylli folio minus *El. Bot. T. Inst.* Thlaspi Alysson dictum campestre minus *C. B.* Græcum *Ger.* arvense minus luteum *Park.* minus quibusdam, aliis Alysson minus *J. B. Klein* Schildbesem Kraut. In glareosis. Aprili & Majo floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Decoctum singultus sine Febri potu discutit, cum melle trita vitia cutis in facie & lentigines emendat. Contusa in edulio rabiei canis mederi putatur *Diosc.*

Alyssi nomine plurimæ donantur plantæ tum à veteribus tum à recentioribus. Descriptione *Dioscoridis* plantam hic propositam Alyssum esse existimo, ut ex descriptione subnexa persuasus sum, non speciem illam Leucoii cui *Dodonæus* & *Lobelius* id nomen attribuunt.

Alysson *exiguus frutex est, unicaulis, subasper, rotundis foliis: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen latum. In montibus & asperis locis emicat.*

Alyssum *Galenii* in capite de Marrubio cujus species est, superius exhibui. Alysson *Plinii* ab utroque differt, ut quod ad stellatarum tribum pertinet, & Mollugo appellamus, quantum ea descriptione ejus colligere licet.



A. 3. *Thlaspi Chab.* minus *Offic.* vulgatissimum *Ger.* vulgatius *J. B.* *Vaccariæ folio Park.* arvense, *Vaccariæ incano folio majus C. B.* *Gruer Bauren-Senff / Bauren-Kresse.* In arvis inter segetes. Junio floret. *Usu.* Semen. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

### XXV. De Bursa pastoris.

**C**ujus notæ, capsulæ *Bursæ seu trianguli isoscelis* (ut loquitur *D. Tournefortius*) figurâ, sapor *fatus.* *R. Meth. A. p. 99.*

Pag. 273. post lin. ult. adde:

### XXVI. De Brassica marina.

**F**oliis carnosis cæsiis cum *Brassica* convenit, floribus albis, capsulis subrotundis monospermis in acumen exeuntibus ab eadem differt. *R. Meth. A. p. 99.*

A. *Brassica sylvestris Offic.* *maritima C. B.* *marina Anglica Ger.* *marina monospermos Park.* *monospermos Anglica J. B. Chab.* *maritima major repens,* multiflora alba monospermos *H. Ox.* *Crambe maritima, Brassicæ folio El. Bot. T. Inst. Englisch-Kohl / See-Kohl.* In arenosis maris littoribus. Julio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Vulnere illitu conglutinat, & inflammationes tumoresque discutit. *Diosc.*

Tres *Brassicarum* species à *Dioscoride* memorantur, *fativa, sylvestris & marina.* Quarum duæ à nobis jamjam editæ sunt, nimirum *Brassica fativa p. 297.* & *marina in capite*

de Convolvulo p. 286, Brassica sylvestris quid sit restat ut inquiramus. Descriptio ejus apud *Dioscoridem* adeò brevis est & succincta, ut dissensionem aliquam inter Botánicos pepererit, varias plantas pro ea sumentes, inter quas quam hîc exhibeo, *Dioscoridiana*, hirsutie excepta quam *Dioscorides* plantæ à se traditæ attribuit, in nostra autem desideratur, notis omnibus convenit.

Pag. 274. lin. 10. subjunge:

## XXVIII. De *Ambrosia campestri*.

*Foliis & odore Nasturtii cum ea convenit, quamvis siliquis hispidis seu verrucosis ab eodem differat. Siliquæ compressæ in duas cellulas dividuntur, quarum singulæ singula semina continent. R. Meth. A. p. 98.*

A. *Ambrosia campestris* *Offic.* campestris repens C. B. *Coronopus Ruellii* *Ger.* recta vel repens *Ruellii* *Park.* *Ruellii* seu *Nasturtium verrucosum* J. B. *Nasturtium verrucosum* *Chab.* verrucosum capsulâ bivalvi asperâ seu hirsutâ *H. Ox.* sylvestre capsulis cristatis *El. Bot. T. Inst.* supinum capsulis verrucosis *R. Meth. A.* *Nasturtio* affinis monospermos capsulâ verrucosâ *P. Al.* *Schweine Kresse / wilde Kresse.* In uliginosis. Junio floret. *Usu.* *Herba.* *Vires.* Cum *Nasturtio* viribus ut facie convenire creditur.

De Herbis flore tetrapetalo  
anomalis.

## II. De Papavere.

Pag. 277. pro 4. 5. & 7ma speciebus Papaveris adde:

4. **A.** Argemone *Offic.* capitulo longiore glabro *H. Ox. Mor. Præhud. R.H. p. 856.* Papaver laciniato folio, capitulo longiore glabro *R. F. & Synop.* erraticum, capite longissimo glabro *El. Bot. T. Inst.* Argemone dictum capitulo longiore glabro *Herm. Catal.* Langföpffichter Mohn/ Wilder Mohn. In aggeribus fossarum. Junio floret. *Usu.* Folia, Succus. *Vires.* Folia illitu inflammationes compescunt. Succus Argema & nubeculas expurgat. *Diosc.*

Planta quam hîc pro Argemone exhibeo, proximè accedit, si non prorsus eadem sit cum *Dioscoridea*, cujus descriptionem subjungo. *Argemone in totum sylvestri Papaveri similis est. Folia habet Anemones, divisa: Florem puniceum, caput in cauliculo papaveris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem dimittit.*

A. 5. Papaver corniculatum *Offic. Chab.* corniculatum luteum C. B. corniculatum luteum maritimum J. B. Park. cornutum flore luteo *Ger.* Glaucium flore luteo *El. Bot. T. Inst.* Gehörnter Mohn mit gelben Blumen. In arenosis maritimis. Junio floret. *Usu.* Semen. *Vires.* Cum præcedentibus viribus convenit.

7. Glau-

7. *Glaucium Offic.* *Argemone Mexicana El. Bot. T. Inst.* *Papaver spinosum Ger. emac. C. B. J. B.* *spinosum campestre Chab.* *spinosum Americanum Park.* *spinosum luteum, foliis venis albis notatis H. Ox.* *Chicallotl Hern.* *Stachlichter Mohn/ purgierende Distel.* In hortis Botanicorum colitur. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Succus *Glaucium* dictus. *Vires.* Ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret. *Diosc.*

Quin etiam *Glaucium* succus est à *Dioscoride* memoratus, verum è quam planta emanat vel exprimitur, inter Botanicos controversatur. Ego ad hanc plantam præ aliis cum *C. Bauhino* referendum puto, *Dioscoridis* descriptione, quam hinc subjungo, ut ita opinor inductus. *Glaucium succus est herbae, quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, foliis ferè corniculati Papaveris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Folia in olla fictili, semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, usque dum flaccescant: deinde contusis succum exprimunt.*

### III. De Onagra.

**N**ota sunt siliquæ flores antevertentes, quæ per maturitatem quadrifariam partitæ & dehiscentes quatuor seminum series ostendunt. Flores summis siliquis insident, & integri unâ cum calicibus decidunt; siliquæ lanigeræ sunt. R. Synop. 181.

A. *Onagra Offic.* *Chamænerion Ger.* *latifolium vulgare El. Bot. T. Inst.* flore *Delphinii Park.*

*Park.* *Lysimachia Chamænerion dicta latifolia C. B. speciosa*, quibusdam *Onagra dicta Chab. speciosa*, quibusdam *Onagra dicta siliquosa J. B. Grosse Weiderich; Köflein / Milch Kraut.* In montibus. Julio floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Feros mitigat, & cieures facit; illitu quoque maligna ulcera mulcet. *Diosc.*

*Onagra frutex est, ait Dioscorides, arboris specie, admodum magnus; folia habens Amygdalæ similia, sed latiora & Liliæ foliis magis accedentia: flores Rosarum specie, magnos: radicem albam, longam, quæ siccata odorem vini reddit.*

#### IV. De Tithymalo.

Pag. 277. lin. ult. ad vires *Esulæ majoris*,  
adde:

**E**Radicibus, herbis & lacteo succo, unguentum efficacissimum adversus scabiem capitis contagiosam confici potest; estque hoc singulare quoddam unguentum. *H. Ox.*

Pag. 278. ad vires *Cataputiæ minoris*, adde:

Grana 12. vel 14. tusa vinoque pota totum corpus commovent; alvum purgant; pituitam & bilem ducunt; vomitiones potenter provocant; phlegma, choleram & melancholiam adducunt. *Trag.*

Pag. 279. lin. 8. subjunge:

6. *Tithymalus characias Offic. characias Monspeliensium Ger. Park. characias rubens peregrinus C. B. amygdaloides seu characias J. B. Chab. Esula characias rubens Rivin.*

Wolffs-Milch mit schmalen Mandel-Blättern. In Saxosis Galliaë & Italiaë nascitur. Martio floret. *Ufu.* Radix, folia, semina, & succus. *Vires.* Radices, folia & semina acrem & urentem facultatem obtinent. Succus alvum purgat vehementius. *Diosc.*

7. Tithymalus myrtites *Offic.* myrsinites sive myrtites *Chab.* myrsinites *J. B. Park.* myrsinites latifolius *C. B. Ger.* Esula foliis myrti *Rivin.* Myrten Wolffs-Milch. in Calabria & Sicilia provenit. Æstate floret. *Ufu.* Radix, folia, semen, succus. *Vires.* Consimilem antedicto fortiuntur facultatem. *Diosc.*

A. 8. Tithymalus paralius *Offic. J. B. Ger. Chab.* paralius sive maritimus *Park.* maritimus *C. B.* Esula marina Linariæ folio *Rivin.* Meer Wolffs-Milch. In arenosis maritimis. Junio floret. *Ufu.* Tota planta. *Vires.* Similes ad usus reconditur.

9. Tithymalus cyparissias *Offic. C. B. Ger. J. B.* cyparissias vulgaris *Park.* Esula Officinarum *Volck.* Cypressen Wolffs-Milch. In hortis curiosorum nonnunquam reperitur. Æstate floret. *Ufu.* Succus. *Vires.* Eadem cum superioribus.

10. Tithymalus dendroides *Offic. J. B.* arboreus *Park.* myrtifolius arboreus *C. B.* myrsinites arboreus *Ger.* Esula caule crasso *Rivin.* Baum Wolffs-Milch. In montosis Neapolitanis, &c. *Ufu.* Folia, semina, succus. *Vires.* Eiusdem effectus cum superioribus habent. *Diosc.*

11. Tithymalus platyphyllos *Offic. Ger. latifolius Hispanicus C. B. Park. Breitblättrichte Wolffs-Milch.* In Hispania reperitur. Æstate floret. *Usu.* Radix, succus, folia. *Vires.* Reliqua genera, quæ superscribuntur, idem efficiunt. Pisces necat, tufus & aquæ inspersus. *Diosc.*

12. Pityusa *Offic. Tithymalus foliis brevibus aculeatis C. B. cyparissias vulgaris Park. quoad icon. Wolffs-Milch mit scharfgespitzten Blättern.* In Italia provenit. *Usu.* Radix, *Vires.* Purgat per sedem.

A. 13. Peplus *Offic. sive Esula rotunda C. B. Ger. J. B. Chab. Esula rotunda sive Peplus Park. folio rotundo Rivin. Tithymalus parvus annuus foliis subrotundis non crenatis Peplus dictus R. Synop. rotundis foliis non crenatis Herm. Cat. annuus erectus foliis non crenatis H. Ox. Wolffs-Milch mit runden Blättern.* In hortis. Junio floret. *Usu.* Herba, fructus. *Vires.* Bilis, ac pituita detrahitur in hydromelite potu. Obsoniis inspersa conturbat alvum. *Diosc.*

A. 14. Peplis *Offic. Ger. Park. J. B. maritima folio obtuso C. B. Tithymalus maritimus supinus annuus Peplis dictus R. Synop. maritimus purpuro-colore, procumbens, Peplis dictus P. Al. maritimus folio aurito obtuso EL Bot. maritimus, folio obtuso, aurito, rubro perinde ac caule T. Inst. sive Peplis maritima folio obtuso H. Ox. Purpurrothe See-Wolffs-Milch.* In littoribus maris arenosis. Æstate floret. *Usu.* Herba, *Vires.* Eisdem cum reliquis habet.

15. Chamæsyce *Offic.* Ger. Park. C. B. J. B. Dioscoridis & Plinii *Chab.* Tithymalus exiguus procumbens Chamæsyce dictus *Herm. Cat.* minimus ruber rotundifolius procumbens *H. Ox.* exiguus glaber, Nummulariæ folio *El. Bot. T. Inst.* Esula minima Chamæsyce dicta *Volck. Kleineste Wolffs-Milch.* In agris & vineis Italiæ, &c. reperitur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Alvum resolvit, Succus simili effectu prodest. Illitus contra Scorpionis ictus auxiliatur. *Diosc.*

16. Apios *Offic.* J. B. vera Ger. sive Ischas *Chab.* sive Tithymalus tuberosus *Park.* Tithymalus tuberosus pyriformi radice C. B. *Wolffs-Milch mit rundknollichter Wurzel.* In Creta Insula. *Usu.* Radix. *Vires.* Purgationes movet. *Diosc.* NB. Tollunt humores & verrucas omnis generis.

17. Hippophaes & Hippophæstum *Offic.* *Park.* Anguillaræ & Dodonæi sive Spina purgatrix J. B. *Chab.* quibusdam *ἀκανθα καὶ γαρπητή* i. e. Spina purgatrix C. B. Rhamnus Catharticus Oleæ folio *ejusd.* Tithymalus maritimus spinosus *ejusd.* spinosus *Wheler. itin. p. 307.* maritimus Creticus spinosus *Park.* Stech-Dorn. stachlichte *Wolffs-Milch.* In Morea oritur. *Usu.* Succus. *Vires.* Purgat per deorsum pituitosos humores.

Ἰπποφάεις à Dioscoride sic describitur, Frutex est densus, surculosus, foliis longis oleaginis proximis, angustioribus, mollioribus, inter quæ spinæ candicantes, sicca, angulosa, floribus hederæ corymbos referentibus.



racematim coherentibus, sed minoribus mollibusque  
 & ex albido partim rubentibus: radice crassa, molli,  
 lactei succi plena, amara. Ἰπποφάιστον autem ab  
 eodem autore his verbis: Id quod Hippophæstum  
 appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophaes,  
 estque Spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cau-  
 liculo, sine flore, &c. unde clarè apparet unam  
 & eandem specie plantam esse, posteriorem  
 duntaxat juvenem antequam excaulescat.  
 Quænam autem planta sit non levis est con-  
 troversia, nec facilè dirimenda. Columna  
 Cardium stellatum eo nomine appellat, du-  
 bitat etiam annon *Rhamnus Salicis folio*, &c. C.  
 B. ità denominari debeat. C. *Bauhinus* Hippo-  
 phaes *Anguillarii* ab Hippophae *Dioscoridis* se-  
 parat, priorem ad *Rhamnum* referendam  
 censens, quàm rectè nollem determinare,  
 nec tamen earum quamlibet genuinam esse  
 existimo, quia nullius radices lacteum suc-  
 cum præbent. Scribit *Matthiolus Hieronymum*  
*Amatheum* *Opitergensis* Medicum plantam  
 ad se attulisse, Venetiis ad eum à *Joanne Ba-*  
*p-tista Zopisso* Papiensi Medico missam, quæ  
 non modo notis omnibus *Dioscoridis* Hippo-  
 phæstum referebat: sed etiam viribus, ut se  
 experimento comperisse testatus est. Quod  
*Matthiolus* de ea inveniendâ non prorsus de-  
 sperare fecit. *Parkinsonus* *Tithymali* speciem  
 esse opinatur, à quo cur dissentiam rationem  
 non video, atque idcirco non tantùm in eo  
 capite collocavi, sed & synonyma collegi &  
 contuli.

Pap. 280. lin. 2. subjunge:

In Præluđiis Botanicis viri ingenioſi D. *Caspari Commelini* pag. 17. me reprehensum invenio, quod in *C. de Euphorbio* tres specie distinctas plantas pro unius & ejuſdem Synonymis poſuerim, nimirum *Schadida Calli H. M.* Euphorbium *Dod.* & *Tithymalum Africanum spinosum*, &c. P. P. *Tab. 231. Fig. 1.* Ut ergo me vindicem, & reprehensionī huic minimè obnoxium ostendam, Primò observandum est, Euphorbium *Dodonæi* inter reliqua synonyma à me non recenseri: nec enim in ea tum opinione fui, uti nec adhuc sum, eam veram Euphorbii plantam esse; aliter enim non omissem reliqua *Dodonæana* plantæ synonyma, quæ apud utrumque *Baubinum*, *Gerardum*, *Parkinsonum*, aliosque habentur. Veruntamen minimè dubitans, quin nupèrus eruditus vir & insignis Botanicus *Paulus Hermannus*, qui diu in *India orientali* vixerat, & in multis simplicibus pharmacis invenien- dis felix admodum fuerat, Euphorbii veri plantam probe perspectam haberet, non admodum scrupulosus fui, synonymum reliquis annumerare quod ille fidenter Euphorbio *Officinarum* attribuit, nulla interposita differentia inter Euphorbium *Dodonæi Lob.* & suum. Cur autem D. *Commelinus Hermannus* synonyma omitteret, quæ ego adhibui, *Dodonæi* afferet quod ego non dedi, capere nequeo, nisi ut communis Patriæ causa *Hermannus* non apertè sed per latera mea feriret.

Quod

Quod ad D. *Plukenetii* nomen attinet dubitanter illud propositui; undè quivis primo aspectu facile posset discernere, mihi de eo non satisfactum esse; *Plukenetium* duntaxat secutus sum; qui annon *Planta* à se delineata cum *Hermanniano* *Euphorbio* eadem esset quæsit.

## VI. De *Rutâ*.

Pag. 280. pro 2da Specie *Rutæ*, addè:

**R**UTA montana *Offic. Ger. sylvestris major* C. B. *Park. J. B. sylvestris seu Ruta sylvestris major* Chab. *Wilde Raute*. In montosis. Julio floret. *Usu. Herba. Vires.* Cum priori viribus convenire creditur, quæ acrior est.

## VII. De *Plantaginè*.

Pag. 281. ad vires *Plantaginis angustifoliæ*, adde:

**P**Ulvīs foliorum ad ʒi data in *Conservo Rosarum rubratum* ad tertianas valde commendatur. *Boyleus*.

Pag. ead. lin. 26. subjungè:

Hanc plantam pro *Stella terræ Act. Philoſoph. Londinen. n. 187. p. 298.* memorata ad *Hydrophobiam canum* curandam utile habeo; ob hæc rationes: 1. Quod *Herba ipsa stellam* magis refert quam *Sesamoides Salamanticum*, quod ibidem pro eâ accipitur. 2. Locis nonnullis, necnon à scriptoribus quibusdam ita appellatur. 3. *Plantagines* in genere

omnes & in specie hæc herba à medicis contra morsum canis rabidi commendatur.

4. *Holostium Offic.* vel *Holestium Chap.* *Salmanticum Ger. Park.* hirsutum albicans majus C. B. *Plantagini simile J. B.* *Plantago mollis sive Holostium hirsutum albicans majus H. Ox.* *montana Holostium dicta tomentosa P. Al.* *angustifolia albida Dodonæi El. Bot.* *Spanische Wegerich/Wegebreit.* In arenosis, Aprili & Majo floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vulneraria est planta. *Ufus* ejus præcipue ad rupta.

## IX. De Coride.

**C**ujus notæ, flos monopetalos, personatus, posterius tubulatus, anterieus velut flabelliformis, fructus ferè globosus, in multas partes debiscens, seminibus sætus subrotundis, & in ipso calice reconditus. R. Meth. A. p. 90.

*Symphytum petræum Offic.* petræum foliis *Thymi C. B.* *Coris cœrulea maritima ejusd.* *cœrulea Monspeliaca Ger.* *Monspeliensium Park.* *Monspessulana purpurea J. B. Chab.* *Stein-Günfel. Stein-Wallwurh.* In maritimis. Majo floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Siccat, astringit, conglutinat. Vulneraria est planta.

*Symphyti petræi nomine permultæ donantur plantæ, viz. Prunella, Sanicula, Virga aurea, Coris Monspessulana, Hyssopum vulgare, Polium vulgare montanum, Trachelii & Consolidæ species aliquæ, &c. A Dio-*  
*scoride*

*scoride* autem sic describitur. Ramulos habet *Origano* similes, capitulis & foliis veluti *Thymus*: totum verò lignosum odoratum & gustu dulce est, salivamque ciens. Radice nititur longâ, subfulvâ; digitali, crassitudine.

Prædicta descriptione diligenter perpensa, Autores illos rectè sentire mihi met persuadere non possum, qui stirpem illam vel cum *Thalio Caryophyllum saxatilem* esse volunt, vel cum *Lobelio Prunellæ* speciem, vel cum *Tabernamontano Virgæ aureæ*.

## SECTIO XIX.

### De Herbis flore papilionaceo seu Leguminosis.

#### De Leguminosis scandentibus.

##### I. De Phaseolo.

Pag. 285. pro 2da Specie Phaseoli adde:

2. **P**haseolus *Offic.* vulgaris *Italicus* humilis, seu minor albus cum orbita nigricante *J. B.* erectus *Park.* peregrinus fructu minore albo *Ger. emac.* minor, fructu albo, umbilico maculâ nigrâ notato, vel fructu renali parvo albo, umbilico circa hilum maculâ nigrâ insignito *H. Ox.* minor siliquâ sursum rigente, *El. Bot.* minor siliquâ sursum rigente, fructu albo *T.*

*Inst.* Smilax siliquâ sursum rigente, vel Phaseolus parvus Italicus C. B. Kleine Italiânische Bohne. Türkische oder Fransche Bohnen. In hortis seritur. Julio floret. *Usus* Siliqua. *Vires.* Virides cibo alvum emollunt, ad vomitiones idonei. *Diosc.*

Hanc *Dioscoridis* Phaseolum esse cum *Matthiolo* concludo.

3. Soia *Offic.* Phaseolus Japonicus ex quo Japonensium Soia, qui intinctus species est, conficitur *Herm.* Species Phaseoli parvi albi, è Japonia allata, è qua conficiunt condimentum *Ketchup* dictum, duum generum, liquidum nimirum & solidum.

Hujus notitiam debemus Botanico erudito D. Paulo Hermanno nuper defuncto, qui eam doctissimo amico nostro D. *Guilielmo Sherrard,* Ll. D. communicavit, sub titulo suprascripto, unde nos habuimus.

## II. De Abro.

*Folius, alatis à Phaseolo, differt.*

1. **A** Brus *Offic.* *Alp.* *Ægypt.* Aracus Indicus sive Africanus *Park.* Phaseolus glycyrrhizites folio alato, Piso coccineo, atrâ maculâ notato *Cat. Jamaic.* alatus major, fructu coccineo, maculâ nigrâ notato *Comel. in not.* Indicus ruber Bontio *R. H.* secundus ruber, qui Abrus Prospero Alpino dicitur *Bont.* ruber Abrus vocatus *Alp.* Indicus minor semine coccineo, nigrâ maculâ notato *H. Ox.* arborefcens alatus & volubilis major Orientalis

his fructu coccineo hilo nigro notato P.P.T.  
 214. f. 5. Pisum Indicum minus coccineum  
 C.B. Americanum coccineum aliis Abrus J.  
 B. Americanum coccineum vel nigrum A-  
 brus quibusdam Chab. Glycyrrhiza Indica  
 vulgò Herm. Cat. Indica siliquis & seminibus  
 Pisi coccineis, hilo nigro notatis P.B.P.  
 Konni H. M. T. 8. Indianische rothe Erb-  
 sen. Ex utraque India ad nos ad-  
 fertur. Ufu. Semina. In Officinis nostris  
 duæ ejus Species habentur, una magnitudi-  
 ne Pisi majoris ex cinereo nigricantis; alte-  
 ra Vicia vulgari paulò major; ambæ coloris  
 sunt coccinei, hilo nigro. Vires. Hæ valde  
 commendantur adversus ophthalmiam seu  
 inflammationem oculorum, ad fluxus humo-  
 rum à capite exsiccandos, ad nervos opti-  
 cos roborandos, spiritus animales recrean-  
 dos, cerebrum caliginosos vapores discutiendos,  
 & visum acuendum. Minores in frequenti  
 nunc dierum usu sunt ad peritrachelia pro-  
 pueris.

Pag. 285, lin. ult. subjunge:

#### IV. De Lathyro.

**N**ote, Caules membranulis secundum longitudi-  
 nem extantibus aucti, compressi & angulosi;  
 folia ex unica tantum pinnarum medie costæ nexa-  
 rum conjugatione composita; siliquis brevioribus, la-  
 tioribus, duabus aversa parte membranulis, secun-  
 dum longitudinem excurrentibus alatis, seminibus an-  
 gulosis. R. Meth. A. p. 103.

A. Lathyrus *Offic.* latifolius C. B. Narbonensis *Rivin.* major latifolius *Ger. emac.* major perennis *Park.* major latifolia flore majore purpureo speciosior *J. B.* major latifolia, flore majore purpureo speciosior Narbonensis *Chab.* Clymenum Dioscoridis quibusdam. *Rothe Wicken.* In sylvis & dumetis. Æstate floret. *Ufu.* Succus ex toto cum radice exprimitur. *Vires.* Ad Sanguinis rejectiones, in potu efficax est: cœliacos, rubraque fœminarum profluvia, refrigerando infrænât: Sanguinem naribus erumpentem supprimit. Folia & siliquæ recentibus trita vulneribus imposita ea ad cicatricem perducunt. *Dioscorides.*

## V. De Aphaca.

**F**oliis integris triangulis, ex adverso binis, & capreolis e foliorum alis exeuntibus à Piso & Lathyro plurimum differt. *R. Meth. A. p. 103.*

A. Aphaca *Offic. Ger. Park. El. Bot.* Lathyrus luteus annuus foliis Convolvuli minoris *H. Ox.* Vicia lutea foliis Convolvuli minoris C. B. quæ Pitine Anguillaræ, latâ siliquâ flore luteo *J. B. Chab. Gelbe Wicken.* Inter fegetes. Junio florent. *Ufu.* Semina. *Vires.* Astringendi vim habent: quare torrefacta stomachi alvique fluxiones sistunt. *Diosc.*



## VI. De Vicia.

Pag. 286. lin. 8. subjunge :

**M**ediocria, nigricantia, parum compressa.  
*Vires.* Excalfaciunt & siccant, munda-  
 dant, abstergunt & astringunt. Cum Aphaca  
 viribus non differt herba. *Matth.*

A. 2. Aracus, & Vicia sylvestris *Offic.* sive  
 Cracca major *Park.* Vicia sylvestris *Offic.* sive  
 Cracca major *Ger.* semine rotundo nigro C.  
 B. sepium folio rotundiore acuto *ejusd. item,*  
 vulgaris acutiore folio, semine parvo nigro  
*ejusd.* vulgaris sylvestris semine parvo & ni-  
 gro frugum J. B. vulgaris sylvestris frugum:  
 semine parvo & nigro, Cracca quibusdam  
*Chab.* sylvestris semine nigro & variegato,  
 folio acutiore *H. Ox.* Wilde Wicken. In se-  
 pibus & aggeribus, itemque inter segetes.  
 Vere floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum priore viri-  
 bus convenire creditur.

Pag. eadem. lin. 15. subjunge:

Compressa, flavicantia. *Vires.* Oculorum  
 aciem obtundit, ægre concoquitur, stoma-  
 cho incommoda est eumque & intestina in-  
 flat, alvum sistit, ad nervosa & pulmonem, &  
 caput incommoda est. *Diosc.*

De Herbis flore papilionaceo non  
scandentibus siliquis simplici-  
bus erectis.

VIII. De Lupino.

Pag. 287. pro 2da Specie Lupini adde:

2. **L**upinus sylvestris *Offic.* sylvestris flore  
cœruleo *C. B.* flore cœruleo *Ger.* cœ-  
ruleus minor *Park.* sylvestris, purpureo flo-  
re, semine rotundo vario *J. B. Chab.* sylve-  
stris angustifolius *H. Ox.* Wilde Bohnen  
Feig Bohnen. In hortis apud nos seritur  
Julio floret. *Ufu.* Semina, compressa, vari-  
gata, rotunda, plana. *Vires.* Cum prior  
viribus convenit.

Pag. 288. post. lin. 21. insere:

XII. De Onobrychide.

**N**otæ sunt, flores spicati spicis densis longissimis  
pediculis è foliorum sinibus egressis, *insident*  
*bus*; siliquæ chinatæ sive aculeatæ, monospermae *R*  
*Meth A.* p. 150.

A. Onobrychis *Offic.* vulgaris *Park.* foliis Vi-  
ciæ fructu echinato major *C. B.* major sili-  
culis echinatis cristatis in spicâ digestis *H*  
*Ox.* sive Caput Gallinaceum *Ger.* Polygalor  
Gesneri *J. B. Gesneri,* Onobrychis quibus-  
dam *Chab.* Hahnen-Kopff. Hahnen-Rämpf-  
ten. In cretaceis & in pratis. Junio & Ju-  
lio

lio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Suate vi, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum vino pota strangurias sanat: illita ex oleo sudores movet. *Diosc.*

Quamvis planta quam hic pro *Dioscoridis* Onobrychide cum *Clusio*, *Tbalio*, &c. exhibeo, *Gesnero* Glaux dicatur, *Lobelio* Caput Gallinaeum, *Cesalpino* Lupinus, *Dodonæo* Vicia, *Lugdanesi* Polygala, descriptio tamen ejus à *Dioscoride* tradita his verbis: *Folia habet Lentis fere longiora, caulem dodrantalem, florem puniceum, radicem parvam: & à Plinio, Folia lentis paulo longiora; florem rubentem; radicem exiguam & gracilem:* quamvis utraque brevis sit, melius tamen convenit huic plantæ, quam *Campanulæ arvensi* ad quam eam refert *C. Baubinus* in *Pinace* p. 215. Verum non satis constat quæ herba sit: quidam enim *Rutæ sylvestri*, alius *Galegæ*, alius *Hedysaro*, alii aliis plantis *Onobrychidis* tribuunt nomen. Et præterea *Onobrychidem* & *Onopordon* unam herbam esse putat *Cornarius*.

## De Herbis flore papilionaceo, non scandentibus siliquis propendentibus.

Pag. 289, lin. 4. subjunge:

### XV. De Orobo.

**C**ujus nota, folia è pluribus pinnarum medie constituta in caudam quandam procurrenti adnexa-  
rum,

rum, conjugationibus composita; siliqua tenues & teretiuscula; semina ferè ovata. R. Meth. A. p. 140.

A. Astragalus sylvaticus *Offic.* Ger. sylvaticus foliis oblongis glabris C. B. Astragaloides sive Astragalus sylvaticus *Chab.* sive Astragalo magno *Fuchsi* vel *Chamæbalano* leguminosæ affinis planta J. B. Orobus sylvaticus nostras, siliquis propendentibus, tuberosa radice *H. Ox.* sylvaticus foliis oblongis glabris *El. Bot.* Lathyrus sylvestris lignosior *Park.* Wilde Züser Erbsen. Heides Erbsen. In sylvis & dumetis. Aprili floret. *Ussu.* Radix. *Vires.* Hujus tuberibus utuntur *Scoti montani* ad eisdem affectus quibus *Glycyrrhiza* convenit; ad quam sapore accedunt. R. *Synop.*

## XVI. De *Securidaca.*

*Cujus note, Flores velut umbellatim dispositi in summo pediculo; siliqua longa, angusta recta, compressa, orâ utrinque elatâ & internodiis quadratis composita, quorum unumquodque semen etiam quadratum includit.* R. Meth. A. p. 105.

*Securidaca* *Offic.* *Chab.* *Rivin.* lutea major C. B. flore luteo siliquâ latâ oblongâ J. B. vera plurimis flosculis luteis corymbi modo dispositis, siliquis latis compressis inter granum & granum junctis, seminibus quadratis *H. Ox.* *Hedysarum majus* Ger. majus sive *Securidaca major vera.* Vogel Wicken. Inter segetes calidarum regionum reperitur, apud

apud nos in hortis colitur. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Stomacho utile in potu. Additur in antidota. Ante coitum subditum, concipiendi spem adimit. *Diosc.*

Securidaca à *Dioscoride* sic describitur: *Fru-tex est foliis ciceris: semen ruffum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim emulatur: amarum gustu. Nascitur in segetibus & bordeis.* Nullius plantæ semen scribit *Clusius* aptius veterum *Securim* refert quam hujus, cujus opinioni subscribo.

## XVII. De Anthyllide Leguminosa.

**N**ota, silicule calicibus in vesiculas membrana-ceas intumescens occultata. R. Meth. A. p. 105.

A. 1. Anthyllis leguminosa *Offic.* Ger. leguminosa vulgaris *Park.* leguminosa, Loto affinis, *Vulneraria pratensis H. Ox.* Loto affinis. *Vulneraria pratensis C. B.* *Vulneraria rustica J. B.* rustica *Anthyllis magna, Anthyllis leguminosa Chab.* Gelber Hasen-Klee. Wund-Kraut. In pascuis cretaceis. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Herba est Traumatica.

2. Anthyllis prior *Offic.* leguminosa marina, Bætica vel Cretica sive Auricula muris *Camerarii Park.* falcata Cretica *ejusd.* Loto affinis siliquis hirsutis circinatis C. B. affinis siliquis hirsutis circinatis C. *Baubini, H. Ox.* affinis *Anthyllis falcata Cretica Parkinsono ejusd.* *Trifolium falcatum Alp. exot.* Auricula muris

muris Camerarii J. B. *Chab.* Medicago Cretica Vulnerariæ facie *El. Bot.* Vulnerariæ facie Hispanica *ejusd.* Gefrümter Klee. Meer Anthyllis. In Creta, Sicilia, &c. ad marilittus. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Urinæ difficultati renibusque plurimum prodest, vulvæ pituitas emollit, cum rosaceo & lacte imposita vulneribus medetur. *Diosc.*

De Herbis flore papilionaceo non scandentibus, quarum siliquæ per maturitatem articulatim rumpuntur.

### XVIII. De Indico sive Indigo.

Pag. 290. lin. ult. adde :

**A** *Stragalus parvus* est à terra frutex, foliis *Græcis Ciceri* similis: flore purpureo, parvo; radice rotunda, *Raphani* modo grandi, quæ adnata appendices firmas habet, nigras, præduras; velut cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Nasctur in ventosis, opacis & in nivalibus.

2. *Polygala vera* *Offic.* major *Massiliotica* C. B. *Valentina marina* *Park.* Colutea caule Genistæ fungoso J. B. *Chab.* *Astragalus* *Matthioli* *Ger. emac.* *Coronilla* caule Genistæ fungosa *El. Bot.* *Milch-Kraut.* In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Pota lactis abundantiam facit. *Diosc.*

*Polygala* Græcis tam vulgaris erat planta & probe cognita; ut *Dioscorides* brevem admo-

modum ejus descriptionem dederit, unde inter Botanicos multæ de eo exortæ sunt controversiæ, quorum sententias hâc non recensabo. Quam hic exhibeo verum & genuinum *Dioscoridis* Polygala esse videtur, quoniam ut *Matthiolus* rectè observat, cum descriptione istius plantæ convenit, *Cacolearius*, à quo eam accepit, lac nutricibus augere se sæpius expertum esse illum certiore fecit, quæ hujus plantæ propria facultas est.

### XIX. De Ornithopodio.

**S**iliquis articulatis recurvis, duabus tribusve simul nascentibus, & aviculæ pedes referentibus ab aliis differt. R. Meth. A. p. 106.

A. 1. Ornithopodium *Offic.* radice nodosa *Park.* majus & minus *ejusd.* majus & minus *Ger.* tuberculis nodosa *C. B.* majus & minus *ejusd.* tuberosum *Dalechampii* *J. B.* flore flavescente *ejusd.* tuberosum *Dalechampii* flore ex albo rubescente *Chab.* Avis pes *ejusd.* Vogel: *Wfote.* Vogel: Fuß. In arenosis & glareosis. Æstate. *Ufu.* Herba. *Vires* floret Calculos renum, ac vesicæ frangit & expellit. Herniæ auxiliatur.

2. Scorpioides *Offic.* *Rivin.* *Matthioli* *Ger.* *Matthioli* sive *Portulacæ folio* *Park.* *Portulacæ folio*, corniculis longioribus tenuioribus ac articulatis *H. Ox.* pinguifolium triphyllon corniculis articulatis intortis *P. Al.* *Portulacæ folio* *C. B.* *Telephium Dioscoridis* seu *Scorpioides* ob siliquarum similitudinem *ejusd.*

*just.* Telephium Scorpioides J. B. *Chab.* Ornithopodium Portulacæ folio *El. Bot. T. Inst.* Scorpion-oder Raupen-Kraut. In hortis nostris colitur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Excalfacit & siccatur *Galen.* Illita Scorpiionum ictibus præsentaneo est auxilio. *Diosc.*

Herbæ flore Papilionaceo, siliquis geminatis, duplicem seminum seriem continentibus.

## XX. De Tragacantha.

Pag. 201. lin. 20. subjunge:

2. **P**Oterium *Offic.* Spina hirci minor *Ger.* Tragacantha altera seu minor, Poterion fortè Dioscoridis *Park.* altera Poterium fortè Clusio *J. B. Chab.* Granatensis foliis incanis deciduis flore albo *H. Ox.* Tragacanthæ affinis lanuginosa sive Poterium. *C. B.* Schmall *Boeck's Dorn.* Granatensi regno nascitur. Æstate floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Tusæ præcis nervis & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque ejus nervorum affectibus prodest. *Diosc.*

## XXI. De Astragalo.

**A** Tragacantha, qua cum siliquâ duplici intus alveolo secundum longitudinem divisâ convenit, costâ mediâ cui foliola annectuntur in folium desinente differt. Adde semina Sesamacea dicta, quod ossicula sesamoidea referant. *R. Meth. A.*  
P. 106.



1. *Astragalus Offic.* Dioscoridis quibusdam  
*J. B. Chab.* Dioscoridis vulgò Christianæ radix  
*Rauwolf.* An *Astragalus Syriacus Ger. Park. J. B.*  
*Chab.* *Syriacus hirsutus C. B. argenteus Wheel.*  
*Itin.* Dioscoridis *Milchwicke / Erdmoren.* In  
 Syria crescit. Æstate floret. *Usu.* Radix. *Vi-*  
*res.* Alvum sistit in vino pota, urinam mo-  
 vet: vetustis ulceribus sicca efficaciter in-  
 spergitur: Sanguinem supprimit. *Diosc.*

Adeò brevis est & imperfecta quam tradit  
*Dioscoridis Astragali* descriptio, ut quam plan-  
 tam intelligat ad hunc usque diem dubium  
 maneat; nonnullis uni, aliis alteri generi id  
 nomen attribuentibus. Quicquid alii opinen-  
 tur, ego ad plantam hanc *Rauwolfianam* po-  
 tiùs quam ad aliam quamlibet referendam  
 censeo, & ut Lector judicet, *Dioscoridis* de-  
 scriptionem subjungo:

*Astragalus parvus est à terra frutex, foliis &*  
*ramis Ciceri similis: flore purpureo, parvo; radice*  
*rotunda, Raphani modo grandi, quæ adnatas appen-*  
*dices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua*  
*inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur*  
*in ventosis, opacis & in nivalibus.*

2. Radix dulcis *Offic.* *Glycyrrhiza echinata*  
*Park.* *echinata Dioscoridis Ger.* capite echina-  
 to *C. B.* *echinata Dioscoridis non repens J. B.*  
*spuria echinata Volck.* *Scythica, Glycyrrhiza,*  
*Liquiritia Chab.* *Pseudo-glycyrrhiza Rivin.*  
 Onobrychis flore cœruleo, siliculis hirsutis  
 seu asperis, ad imum Platani pilulæ modo  
 junctis *H. Ox.* *Stachlichte Leckriße / falsch Süß-*  
 N Holz.

*Soslg.* In hortis colitur. Æstate floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Cum Glycyrrhiza viribus convenit. Pulvis pterygiis commodissimè inspergitur. *Diosc.*

Hæc est *Dioscoridis* Glycyrrhiza, cujus loco siliquosæ species in *Officinis* nostris usurpatur.

A. 3. *Glaux* *Offic.* *Dioscoridis* *Ger.* *Hispanica* *J. B.* *Chab. Rivin.* *Hispanica* *Clusii* *Park.* *montana* *purpurea* nostras *R. H. & Synop.* *Astragalus* *montanus* *purpureus* *Anglicus* *T. Inst.* *supinus* *siliquis* *villosis* *glomeratis* *El. Bot.* *Hispanicus* *siliquâ* *epiglottidi* *simili* *flore* *purpureo* *major* *Tornefortii* *Herm. Cat.* *Ciceri* *sylvestri* *minori* *affinis* *si* *non* *idem* *C. B.* *Dioscoridis* *Milch-Burgh* *Fœnum* *græcum*, *Mutter-Kraut.* In montosis & campestribus cretaeis. Junio floret. *Ufu.* *Herba.* *Vires.* Coquitur cum hordeacea ad renovandum extincti lactis ubertatem. *Diosc.*

*Glaux* *Dioscoridis* quænam planta sit à Botanicis etiam controvertitur; *Anguillarius*, *Parkinsonus* & *Alpinus* Lotum esse volunt. *Gesnerus* (ut antea dixi) *Onobrychidem*, *Turnerus* plantam sequentem; *Dodonæus*, *Cordeus* & *C. Baubinus* Plantæ marinæ cujusdam parvæ speciem; *Lobelius*, *Gerardus* & *Clusius* stirpem quam hic exhibeo. A *Dioscoride* sic describitur: *Glaux* *Cytiso*, *aut* *lenticulæ* *foliis* *similis*, *quæ* *supernè* *virent* *aversaq;* *candidiora* *spectantur*: *ramuli* *à* *terra* *exiliunt* *quini* *senive* *tenues* *ab* *radice*: *dodrantem* *alti*: *flores* *violæ* *albæ*, *purpurei* *exeunt*, *minores* *tamen*.

A. 4. *Glaux vulgaris* *Offic.* vulgaris leguminosa seu *Glycyrrhiza sylvestris* *Park.* *Glycyrrhiza sylvestris* floribus luteo-palescentibus C. B. *sylvestris* quorundam, *Fœnum Græcum sylvestre* aliis *Chab.* *Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris* seu *sylvestris* *H. Ox. El. Bot.* *Astragalus Glaux leguminosa* dictus *Volck.* *Fœnum Græcum sylvestre*, seu *Glycyrrhiza sylvestris* quibusdam J. B. *Hedysarum Glycyrrhizatum* *Ger. Leckrihen Wicke wild.* *Fœnum græcum.* In dumetis & agrorum marginibus. Julio floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

5. *Cicer sylvestre* *Offic.* *Ger.* *sylvestre majus* *Park.* *sylvestre* foliis oblongis hispida majus C. B. *sylvestre multiflorum* J. B. *sylvestre multiflorum*, radice crassa, & folliculis brevibus ventricosis hirsutis *Chab.* *Astragalus luteus perennis* siliquâ gemellâ rotundâ, vesicam referente *H Ox. El. Bot.* *Glaux altera perennis*, folliculis turgidis *R. H p 935* *Wilde Richern / wilde Ziser Erbsen.* In agris & incultis Italiae, &c. sponte nascitur. Æstate floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Calfacit & siccat, abstergit, aperit, cum *Cicere* viribus convenit.

Herbæ flore Papilionaceo non  
scandentes trifoliæ.

## XXII. De Trifolio.

Pap. 291. post lin. ult. pro prima Specie  
Trifolii, adde:

1. **T**rifolium bituminosum *Offic.* *Ger.* *Ri-*  
*N 2* *vin.*

*vin.* bitumen redolens C. B. bituminosum seu Trifolium cœruleum, aut violaceum bitumen redolens *H. Ox.* Asphaltites sive bituminosum *Park.* Asphaltites sive bituminosum odoratum & non odoratum *J. B.* Asphaltites sive bituminosum, Oxitryphyllum & Menianthes dictum *Chab.* Stinckender Klee. In hortis colitur. Augusto floret. *Usu.* Radix, Folia, Semen. *Vires.* Semen & folia in aqua pota Pleuriticis, urinæ difficultati, Comitialibus, Hydropibus, fœmininisque affectibus auxiliantur, menses cient. Serpentium ictus sanant. Radix Alexipharmaca est *Diosc.*

A. 2. Trifolium purpureum *Offic.* Phæum fuscum luxurians quaternis, quinis & senifoliis *H. Ox.* Trifoliis affine Quadrifolium phæum *Lobellii J. B. Chab.* Lotus quadrifolius *Ger.* Quadrifolium hortense album C. B. fuscum *Park.* Purpur-*Burz* / Purpur-*Gras* / vierblättrichter Klee. In pratis reperitur, undè in hortis summo studio colitur. Æstate floret *Usu.* Herba. *Vires.* Succus humores pituitosos ex intestinis expellit. Oris & gutturi ulcera sanat, morbillos & variolas arcet: præsentaneo remedio purpureæ puerorum febris æstimatur.

### XXIII. De Meliloto.

Pag. 293. pro 3tia Specie Meliloti adde:

3. **M**elilotus verus *Offic.* Italica *Park.* Italica sive Patayina *Ger.* Italica folliculis rotundis

tundis C. B. magno semine rotundo, rugoso  
 J. B. magno semine rotundo, rugoso, folli-  
 culis melini Meliloti vulgaris Chab. lutea, se-  
 minis pericarpio magno rugoso, rotundo, al-  
 bo H. Ox. Italianische Melilote, Stein-Klee.  
 In Italia nascitur, apud nos tantum in hortis  
 feritur. Julio floret. Usu. Herba, flores. Vir-  
 res. Cum Meliloto vulgari viribus convenit.

Pag. 293, lin. ult. subjunge:

## XXVI. De Medica.

Siliquâ in cochleæ formam contorta ab aliis Trifo-  
 liis distinguitur. R. Meth. A. p. 108.

Medica Offic. Chab. sativa, siliquâ contortâ  
 magis tortili H. Ox. major erectior, floribus  
 purpurascens J. B. Falcata sativa floribus  
 purpurascens Volck. Trifolium Burgundi-  
 cum Ger. siliqua cornutâ sive Medica C. B. Fœ-  
 num Burgundiacum vulgò Herm. Cat. Burgun-  
 diacum sive Medica legitima Park. Medicis  
 Heu/Burgundisch Heu/gehörnter Klee. Seritur  
 in agris. Æstate floret. Usu. Herba. Virres.  
 Viride, quibus refrigeratione opus est, illitu  
 suffragatur. Diosc.

## XXVII. De Loto.

Reliquis leguminibus trifoliatis distinguitur, quòd  
 præter folia terna in extremo pediculo, bina ha-  
 beat ad ejus exortum cauli adnata, ut quodammo-  
 do pentaphyllos dici possit. R. Meth.

Trifolium Hæmorrhoidale Offic. rectum al-

bum hirsutum valdè J. B. *Chab.* Lotus hæmorrhoidalis major sive Trifolium hæmorrhoidale majus *Park.* pentaphylos siliquosus villosus C. B. incana sive Oxytriphylum Scribonii Largi *Ger.* Πολυκέρατος frutescens incana alba, siliquis curtis crassioribus & brevioribus erectis H. Ox. *Gülden-Ader-Klee / Sackenklee.* In Sicilia, Gallia, &c. sponte reperitur Ætate floret. *Usu.* Semen, *Vires.* In hæmorrhoidibus commendat *Riverius.*

## SECTIO XX.

### De Herbis Pentapetalis vasculiferis.

*Herbæ pentapetalæ foliis in caule ex adverso binis.*

#### I. De Caryophyllo.

Pag. 298. lin. 13. subjunge:

2. **C**aryophyllus flore simplici *Offic.* hortensis simplex flore majore C. B. simplex major *Ger.* Betonica coronaria sive Caryophyllus flore simplici sativus J. B. Einfache Garten-Nägelein / Garten-Nelken. In hortis à satione seminis oritur. Julio floret. *Usu.* Flos. *Vires.* Cum priore viribus convenit sed inferior æstimatur.

3. Caryophyllus sylvestris *Offic.* sylvestris vulgaris latifolius C. B. Betonica coronaria sive Caryophyllus sylvestris vulgatissimus

J. B.

J. B. coronaria vulgarissima *Chab.* Armeria alba *Ger.* an Armerius latifolius flore rubro saturo holoserico *Park. parad.* Wilde Nägelein. In pascuis & incultis. Julio floret. *Ufu.* Succus. *Vires.* Cum aqua Ononidis & florum Lili convallium calculum atterit & comitiis prodest J. B.

4. Caryophyllus barbatus *Offic.* hortensis barbatus latifolius C. B. barbatus hortensis simplex latifolius H. Ox. Betonica coronaria latifolia petræa flore punctulis albis notato J. B. Armeria rubra latifolia *Ger.* Armerius latifolius simplex, flore rubro *Park. parad.* Gasse Wilhelms-Feld-Nägelein / bärtigte Donner-Nägelein. In hortis colitur. Julio floret. *Ufu.* Hujus usum introduximus Montbelgardi ad panni sc. lanei maculas tollendas, si (cujuscunque generis is fuerit) hujus herba fricetur, deinde limpida aqua abluatur J. B.

## II. De Lychnide.

Pag. 299. lin. 18. subjunge:

3. **L**Ychnis Coronaria *Offic.* *Chab.* coronaria vulgo J. B. coronaria Dioscoridis sativa C. B. coronaria vulgaris *Park.* coronaria rubra *Ger.* coronaria sativa flore rubro H. Ox. Rosen-Lychnis / Spiel-Spelten. In hortis colitur. Junio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Bilem per alvum trahit, i&ctis à Scorpione subvenit. *Diosc.*

A. 4. Lychnis sylvestris *Offic.* sylvestris rubello flore *Ger.* sylvestris flore rubro *Park.* syl

vestris sive aquatica purpurea simplex C. J. sylvestris minus hirsuta, flore rubello simplici H. Ox. Ocymoides purpureum multis J. J. Rohte wilde Lychniß / rothe wilde Mergen-Rölein. Ad sepes. Æstate floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

A. 5. Ocymoides *Offic.* Chab. album multum J. B. sylvestris flore albo Ger. Park. P. B. sylvestris alba simplex C. B. sylvestris hirsuta perennis alba simplex H. Ox. Ocymastrum vulgare Herm. Cat. Weiße wilde Lychniß / weisser Biederstöß. Inter segetes & ad sepes. Æstate floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Siccatur, tenuiumque est partium Galen. Viperarum cæterorumque serpentium moribus medetur. Ischiadicos juvat. *Diosc.*

A. 6. Nigellastrum *Offic.* Lychnis segetum major C. B. hirsuta segetum major H. Ox. Lychnoides segetum sive Nigellastrum Park. Nigella Brunfelsii & Officinarum Volck. Pseudo-melanthium Ger. J. B. Chab. Raden / Ror Nägelein. Inter segetes. Junio & Julio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Calidum & siccum est, in pefso cum melle subditum menses evocat Hippocrat.

7. Vaccaria *Offic.* Ger. J. B. Chab. Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ C. B. segetum Vaccaria rubra dicta Park. segetum Vaccaria dicta H. Ox. Rüh-Basilien / Rüh-Kraut / Lydweich. Inter segetes. Junio & Julio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Calidum est & siccum; urinam provocat.



8. *Muscipula* *Offic.* viscaria sive *Lychnidis* species J. B. *Chab.* *Lychnis viscaria* sive *Muscipula* *Ger.* viscosa rubra altera sylvestris C. B. sylvestris rubra minor *Park.* viscosa rubra nultis foliis angustis parvis cingentibus genicula superiora H. Ox. Kleb-Lychniß / rothe wilde Mergen-Rößlein. Inter segetes sponte nascitur. Junio & Julio floret. *Ufu.* Semen. *Vires.* Cum prioribus viribus convenire creditur.

9. *Saxifraga antiquorum* *Offic.* antiquorum quibusdam J. B. antiquorum quibusdam, *Gypsophyton*, & *Symphytum petraeum* *Chab.* magna *Matthioli* *Ger.* major *Italorum* *Matthioli* *Park.* *Caryophyllus Saxifragus* C. B. *Lychnis minor Saxifraga* *P. Al.* Grosser Steinbrech des *Matthioli*. In summitate montis Lupi. Junio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Mirificè tota planta calculos comminuit & expellit. *Matth.*

*Dioscorides* de *Saxifraga* sua tradit, *Quod frutex surculosus sit, in petraeis & asperis locis nascens, Epithymo similis.* Quæ descriptio adeò brevis est, ut multas inter Autores excitaverit controversias, multæque stirpium diversæ omninò species vel pro ea habeantur, vel eo nomine appellentur. In *Officinis nostris Anglicanis* duo plantarum genera *Saxifragæ* nomine insigniuntur proque ea usurpantur, quarum utrunque priore volumine tradidi pag. 211. & 339. Verùm earum neutrum cum *Dioscoridis* descriptione convenit, quamvis

eædem vires illis ab Autoribus tribuantur. Hoc in loco inquirendum restat quænam planta Saxifraga Antiquorum fuerit. *Matthiolum* & *Lugdunensis* Autor *Satureiæ* speciem esse volunt; quæ à *C. Bauhino* eandem esse censetur cum *Thymbra S. Juliani Lobeliana*. *Parkinsonus* Saxifragam veram *Matthioli* & *Thymbra S. Juliani Lobelii* unam & eandem plantam nullatenus probat, ideoque *C. Bauhinum* reprehendit quod utrumque *Satureiæ* suæ spicatæ Synonymam facit, & affirmat plantam illam quam ipse vidit & gustavit, minimè vel odore vel gustu cum *Satureia* vel *Thymo* convenire; sed *Thymo* suo inodoro *Prod. p. 108.* eandem esse imaginatur. *Dodoneus* & *Gerardus* *Serpyllum* vulgare *Dioscoridis* Saxifragam esse judicant. At nec huic opinioni consentire potest *Parkinsonus*, nec sanè immeritò iudicio nostro prædictas opiniones rejecisset, ni ipse interim plantæ *Matthiolanæ* nimis pertinaciter adhæsisset, cum potiori ratione aliam ejusdem Autoris ad *Dioscorideam* potiùs accedit, quam nos idcirco pro ea habemus; de cujus admirandis viribus in calculo comminuendo & expellendo non tantùm experienciâ propriâ comprobatis, sed etiam *Calceolarii Pharmacopœi Veronensis* (qui eam sibi primo communicavit) testimonio confirmatis, ad *Matthiolum* ipsum Lectorem remitto.

## III. De Cisto.

Pag. 300. lin. 10. subjunge:

2. Cistus mas *Offic.* Cistus *Chab.* mas folio rotundo hirsutissimo C. B. *Jons. D.* mas major folio rotundiore J. B. mas folio subrotundo *Park.* Cistus *Männlein/ Cistus-Rößlein.* In Italia & Hispania sponte oritur, apud nos tantum in hortis reperitur. Æstate floret. *Usu.* Folia, Flos. *Vires.* Vim habet adstringentem, prosunt Dysentericis & Diarrhœis, Ulceribus oris, veteribus ambustisque sanant. Flores magis sunt efficaces. *Galen.*

3. Cistus Hypocistidem ferens *Offic.* mas vulgaris *Park.* mas cum Hypocistide *Ger.* mas folio oblongo incano C. B. *Jons. D.* mas IV. folio oblongo albido J. B. mas IV. *Monspeliacus* folio oblongo albido *Chab.* Cistus mit Hypocist. In saxosis collibus & sylvis reperitur. Æstate floret. *Usu.* Hypocistis. Vide *Pharmacologiam nost. pag. 370.*

4. Cistus fœmina *Offic.* *Ger.* fœmina vulgaris *Park.* fœmina folio *Salviæ* C. B. *Jons. D.* fœmina *Monspeliaca* flore albo J. B. *Chab.* Cistus-*Weiblein* mit *Salbeyen* Blättern. In hortis colitur, Æstate floret. *Usu.* Folio, Flos. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

Cistus à *Dioscoride* sic describitur; *Frutex* est in petrosis locis nascens, multis ramis præditus, foliosus, non altus. Folia rotunda, acerba, hirsuta. Flores velut *Mali Puniceæ* sed in fœmina albi.

## IV. De Helianthemo.

**H**ujus nota, Calices ad modum floris expansi, triphylli capsulae trigonae, in tres carinas debiscentes. R. Meth. A. p. 109.

A. Panax Chironium & Helianthemum  
 Offic. Chironium Matthioli Jons. D. Chamæcistus vulgaris flore luteo ejusd. & C. B. P. B. Helianthemum vulgare Park. Anglicum luteum Ger. luteum Germanicum ejusd. vulgare flore luteo J. B. Chab. Cistus humilis sive Chamæcistus vulgaris flore luteo Herm. Cat. humilis vulgaris flore luteo P. Al. Volck. Heyden-Isop / Sonnen- oder Gilden-Bünsel. In montosis siccioribus & cretaceis. Junio & Julio floret. Usu. Radix, Herba. Vires. Potaradix Serpentum venenis resistit. Illita coma eadem præstat. Diosc.

## V. De Hyperico.

[Pag. 300. pro 2. 3 & 4. Speciebus Hyperici adde:

2. **A.** Ascyrum Offic. Ger. vulgare Park. Hypericum Ascyron dictum Chab. Ascyron dictum caule quadrangulo J. B. seu Androsæmum Ascyrum dictum, caule quadrangulo H. Ox. Androsæmum hirsutum C. B. Hart-Hau / Hart-Heu. In locis aquosis oritur. Julio & Augusto floret. Usu. Herba, Flos, Semen. Vires. Herba & Flores ejusdem cum Hyperico usus sunt Lobel. Semen ad Ischiadicos efficax est, biliosa per alvum purgat, Diosc.

3. *Coris Offic. lutea* C. B. Matthioli *Park.*  
*Ger. legitima Cretica Belli ejusd. Hypericoides*  
*Coris quorundam & Coris legitima Cretica*  
*J. B. Chab. Hypericum seu Coris legitima Eri-*  
*cæ similis H. Ox. saxatile tenuissimo & glau-*  
*co folio El. Bot. Unehz Johannis-Kraut / Erd-*  
*Kieffer. Insulæ Cretæ indigena est. Majo*  
*floret. Usu. Semen. Vires. Urinas mensesque*  
*ciet: est & auxilio ex vino potum à Phalan-*  
*gio demorsis, Ischiadicis & Ophisthotonicis.*  
*Diosc.*

A. 4. *Androsæmum Offic. vulgare Park.*  
*maximum frutescens C. B. Hypericum maxi-*  
*imum Androsæmum vulgare dictum R. Synop.*  
*seu Androsæmum maximum (quasi frute-*  
*scens) bacciferum H. Ox. Siciliana aliis Cici-*  
*liana vel Androsæmum J. B. aliis Ciciliana,*  
*vel Androsæmum, tota bona quibusdam Chab.*  
*Clymenum Itatorum Ger. Groß Beeren tragend*  
*Johannis-Kraut. In dumetis & sepibus. Ju-*  
*lio & Augusto floret. Usu. Folia, Flos, Se-*  
*men. Vires. Cum Hyperico viribus convenit.*

### VIII. De Alfine.

Pag. 302. pro 2, 3, & 4. Speciebus Alfines,  
 adde:

2. **A.** *Gramen Leucantherion Offic. Ger.*  
*Park. Fuchsi sive leucanthemum J. B.*  
*Chab. Caryophyllus arvensis glaber flore ma-*  
*jore C. B. Lychnis arvensis glabra, flore ma-*  
*jore H. Ox. Alfine pratensis gramineo folio*  
*ampliore El. Bot. I. Inst. holostea glabra folio*  
 gra-

gramineo flore majori *Volck.* Blumen-Gras. In sylvis, dumetis & sepibus passim. Vere floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Refrigerandi & siccandi vi pollet. In inflammationibus oculorum prodest.

3. *Paronychia Offic.* Alfine-folia incana *J. B.* *Chab.* Anthyllis maritima Alfines folio *C. B.* maritima incana *Park.* marina incana alfine-folia *Ger.* Polygonum maritimum folio Alfines *H. Ox.* Alfine maritima Centumgrana *Cæsalpino* dicta *P. Al.* See-Wege-Gras. In maritimis & vineis. Æstate floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Illita Paronychiis atque favis remedio est. *Diosc.*

Herbæ flore Pentapetalo, foliis  
in caule, alterno aut nullo  
ordine positis.

### IX. De Portulaca.

Pag. 302. lin. 26. subjunge:

2. **P**ortulaca sylvestris *Offic.* *Ger.* *Park.* angustifolia sive sylvestris *C. B.* sylvestris minor sive spontanea *J. B.* *Chab.* Wilde Portulac. In vervactis & ad vias frequens. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

### X. De Sedo.

Pag. 303. pro 2da Specie Sedi, adde:

2. **A.** *Paronychia rutaceo* folio *Offic.* *Ger.* foliis incisiss *Park.* *Tridactylus* *Chab.*  
Tri-

Tridactylites tectorum flore albo J. B. Sedum tridactylites tectorum C. B. spurium tridactylites tectorum Volck. Alfine tridactylites Herm. Cat. Saxifraga verna annua humilior El. Bot. Rothstein / Bogel-Kraut. In muris & tectis. Majo floret. Usu. Herba. Vires. Ad Scrophulas valdè commendatur.

### XI. De Cotyledone.

Pag. ead. lin. 21. adde:

2. **U**Mbilicus Veneris alter *Offic.* Veneris minor *Ger. emac.* Cotyledon altera *Matthioli Park. parad.* altera versicoloribus floribus *ejusd. Theat.* media foliis oblongis ferratis C. B. Sanicula aizoides foliis oblongis ferratis *Herm. Cat.* Sedum serratum J. B. *Chab.* Saxifraga Sedi folio angustiore ferrato *El. Bot.* Nabel-Kraut / Frauen-Nabel. In montibus Germaniæ. Æstate floret. Usu. Herba. Vires. Cum Sempervivo viribus convenit.

Pag. 304. lin. 7. adde:

### XIII. De Gramine Parnassi.

**N**ote sunt, Pericarpium conoides è tribus carinibus compositum; flos in uno cauliculo unicus, speciosus, albus, duum generum staminibus; folia parva hederacea. R. Meth. A. p. III.

A. Gramen Parnassi *Offic.* *Ger.* Parnassi vulgare *Park.* Parnassi, flore albo simplici C. B. Parnassi *Dodonæo*, quibusdam Hepaticus flos J. B. *Chab.* Cistus humilis *Herm. Cat.* humilis palu-

palustris, Hædere folio, Perfoliata nostras F. Al. Pyrola rotundifolia palustris nostras, flore unico ampliore H. Ox. Parnassia palustris & vulgaris El. Bot. Parnasser-Grasß/Leber-Blumen. In palustribus putridis gaudet. Augusto floret. *Usu.* Radix, Herba, Semen. *Vires.* Succus foliorum & decoctum radiceis probatissimum sunt oculorum medicamentum. Semen vehementius urinam impellit: alvur vomitionesque sistit. *Diosc.*

Hepar roborat & obstructionibus libera  
*Chab.*

Pag. 304. post lin. 29. adde:

### XV. De Reseda.

**N**ota sunt, flos hexapetalos, è foliis valdè irregu-  
laribus compositus; siliqua oblonga triangu-  
perpetuò hians, sex seminum ordines continens. F.  
*Meth. A. p. 112.*

A. 1. Reseda *Offic.* Plinii Ger. vulgaris C. 1  
lutea J. B. Plinii quibusdam *Chab.* minor se-  
vulgaris *Park.* Reseda / Rauckfen / Streichkray  
In arvis cretaceis reperitur. Junio & Julio  
floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Sedat dolores, in-  
flammationes discutit.

2. Phyteuma *Offic.* J. B. Monspeliensium  
*Chab.* Reseda Phyteuma dicta *Herm. Cat.* mi-  
nor vulgaris *El. Bot. T. Inst.* Resedæ affin.  
Phyteuma dicta C. B. affinis Phyteuma Mor-  
speliensium dicta *Park.* Valeriana septima Gè  
Kleine Reseda / Klein Streich-Kraut. Circa Mon-  
spelum provenit. Æstate floret. *Usu.* Herb.

*Vire*



*ires.* Quam ad amatoria convenire, nonnulli riptum reliquerunt. *Diosc.*

Quamvis *Dioscorides*, ut adnotavi, plantæ quentis nullam descriptionem dederit, eoque inter Botanicos non leves diffensiones de ea causavit: in descriptione tamen huius plantæ folia *Struthio* similia ei attribuit, inde etiam non leviozem in diversas sententias abeundi Autoribus occasionem dedit. *Matthiolus* Campanulam hanc esse vult, *Casalpinus* Ranunculum; *Columna* vel *Scabiosam* vel *alerianam*; *Honorius Bellus* *Antirrhini* specimen, Alii *Luteolam*, nos vero cum *J. Bauhino* ad hanc plantam potiùs referendam cenemus.

## XVI. De Luteola.

*Reseda* differt capsulâ brevi, in tres carinas antequam semen maturescat debiscente, quarum unaqueque duos seminum ordines continet, ut in *Viola*. & carinæ initio conjunguntur, & vasculum efficiunt usum. R. Meth. A.

A. *Struthium Offic.* Luteola Ger. herba Salicis folio C. B. Cretica ejusd. vulgaris Park. vulgaris Cretica ejusd. Lutea Plinii quibusdam *J. B. Chab.* *Reseda tinctorum Salicis folio* Luteola dicta *Herm. Cat. Färber-Gras.* In muris locis ruderatis; Æstate floret. Usu. Herbar. Ad usum Tinctorum seritur, colore teo tingit. *Vires.* Nonnulli contusum vulnibus imponunt R. H. quidam ad Morbum regium commendant. Pro *Glasto à Mulierculis*

culis Botanopolis Londinensibus frequens venditur.

Quamvis Struthium veteribus Græcis addeò probè cognitum fuerit, ut *Dioscorides* descriptione non indigere putaverit; Posteris tamen temporibus eruditorum ingenia non parum torfit. *Cordus* pro imperatoria eam habuit. Nonnulli, ut observavit *C. Baubinus*, pro Valeriana rubra; *Fuchsius*, *Lonicerus* & *Thalius* pro Saponaria. Quorum omnium opiniones rejicit idem *C. Baubinus*, ut & quandam *Lychnidis* speciem pro ea ad se misit. *Lacuna* & *Gesnerus* Luteolam vulgarem Struthium esse existimant: quibus adversatur *Matthiolus* Pseudo-struthium eam herbam appellans. *Honorius Bellus* in 2da sua ad *Clusium* Epistola Luteolam Struthium esse statuit, cum quo & ego consentio, atque existimo à vulgari Luteola separandum non esse, ideòque utrumque conjunxi.

### XVIII. De Geranio.

Pap. 305. pro 4. 5 & 6. Speciebus Geranii,  
adde: ) ) )

4. **G**eranium tuberosum *Offic. Ger. J. B. Chab.*  
tuberosum majus *C. B.* tuberosum ve  
bulbosum *Park.* Storch-Schnabel mit runder  
knolliger Wurzel. In curiosorum hortis colitur.  
Junio & Julio floret. *Usu.* Radix. *Vires*  
In vino pota vulvæ inflammationes discutit  
*Diosc.*

A. 5. Geranium sanguineum *Offic. Ger. san*  
guine

guineum magno flore C. B. sanguineum sive Hæmatodes, crassa radice, J. B. sanguineum sive Hæmatodes, crassa radice flore purpureo Chab. Hæmatodes Park. Blut- Wurzel. In ericetis & dumetis præsertim montosis. Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Quocunque modo fere exhibita, sanguinem undecunque manantem mirum in modum compescit. *Trag.*

A. 6. Geranium batrachoides *Offic.* Ger. batrachoides flore cœruleo Park. batrachoides album, & ex albo cum cœruleo colore varium J. B. Chab. batrachoides, Gratia Dei Germanorum Lobelio C. B. Blauer und Weisser Storch-Schnabel. In pratis & pascuis humidioribus Junio & Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Pulvis siccatur vulnere impositus, non modò Sanguinis fluxum statim sistit, sed mirè & subito consolidat. *Stockerus.*

## XX. De Nigella.

Pag. 307. pro 2da Specie Nigellæ, adde:

2. **M**Elanthium *Offic.* sylvestre Ger. sylvestre sive arvense J. B. Chab. Nigella arvensis Park. arvensis cornuta C. B. Feuchels Blumen. Wilder schwarzer Kümmel. Inter segetes reperitur. Junio floret. *Usu.* Semina, *Vires.* Cum priore viribus convenit.

## XXI. De Lino.

Pag. 308. pro 2da Specie Lini, adde:

2. **A**Linum catharticum *Offic.* sylvestre catharticum Ger. *emac.* pratense flosculis

lis exiguis *C. B.* minimum flosculis albis, *Al-*  
sine verna glabra quorundam *Chab.* *Chama-*  
*linum Clusii* flore albo, sive *Linum sylvestre*  
*catharticum Park.* *Alsine verna glabra floscu-*  
*lis albis*, vel potius *Linum minimum J. B.*  
*Purgierend. Flach.* *Klein Lein-Kraut.* In pa-  
scuis siccioribus, montosis & cretaceis, Ju-  
nio & Julio floret. *Ufu.* *Herba.* *Vires.* *Ca-*  
*thartica vi prædita est.* *Tertianas curat.*

Pag. 308. lin. 20. post verbum *cenfetur*, adde:  
Nullibi nisi in *China* sponte provenire *Garcias,*  
*Acosta & Linschotianus* rectè consentiunt; un-  
de vel in navibus ad nos adfertur, vel per  
*Tartariam* camelis ad *Alepum*, vel aliâ viâ ad  
*Moscoviam.*

Pag. 308. lin. ult. junge:

*Radix hæc Dioscoridi & Galeno ignota fuit,*  
unde malè quidam *Rhaphonticum* eorum cum  
nostro *Rhabarbaro* confundunt: Nam *Rhæ-*  
um *Dioscoridis* non habet vim purgatricem,  
& notis veri *Rhabarbari* caret. *Rhabarbarum*  
enim substantiâ compactum est, ponderosum  
& aridum, sapore amarum, odore acri, co-  
lore exterius rufescente, intus ex ruffo fla-  
vescente [cum venis aliquot intensioribus]  
ac maceratum vel manducatum tingens cro-  
ceo colore. *Rhaphonticum* non est compactum  
sed rarum, non ponderosum sed leve, non  
odoratum similiter *Rhabarbaro*, *J. le Brun.*

Ab *Abrahamo Muntingio* accuratè describi-  
tur, ergo non bene affirmat *Ammanus* *Rha-*  
*bar*

barbarum verum nemini descriptum unquam esse.

## Herbæ Pentapetaloides vasculiferæ.

### XXIII. De Paralyfi.

Pag. 309. post lin. ult. adde:

3. **A.** Herba Petri *Offic.* Primula pratensis inodora lutea *Ger.* veris caulifera pallido flore inodoro aut vix odoro *J. B.* veris caulifera, flore simplici pallido vel luteo inodoro *Chab.* veris sive Verbasculum pratense vel sylvaticum inodorum *Herm. Cat. Volck.* Paralyfis altera odorata flore pallido polianthos *Park. parad.* Verbasculum pratense aut sylvaticum inodorum *C. B.* Grosse Schlüssel-Blumen. Himmel-Schlüssel. St. Peter Schlüssel. In sylvis & dumetis. Vere floret. *Usu.* Folia. *Vires.* In Anasarca in Vino albo per noctem infusum commendat *Stockerus.*

### XXIV. De Auricula Urfi.

**A** Primula differt foliis levioribus & densioribus, floris calice brevioribus ut florum tubi ferè nudi appareant, foliorum quorundam rudimentis in caulibus vertice, è quibus florum pediculi exeunt. *R.* Meth. *A.* p. 83.

Auricula Urfi *Offic.* flore purpureo *Ger.* *Fl. Bot.* flore carneo *Park.* flore rubente *Chab.* sive Primula veris Alpina flore rubente *J. B.*

*Sanicula Alpina purpurea* C. B. *Kothe* *Bär-Dehrlein*. *Bär-Sanickel*. *Berg-Schlüssel-Blumen*. In Alpibus & montosis oritur. Vere floret. *Usu*. Herba. *Vires*. Herba Traumatica æstimatur. Cum *Sanicula* viribus convenire creditur.

## XXV. De *Androsace*.

**N**ote sunt vascula rotunda; calices magnos, quinquefidios, expansos, flosculis in umbellam sparsos parvos pentapetaloides; folia parva, nervosa, Plantaginea, crenata. R. Meth. A. p. 84.

*Androsaces* *Offic.* *Chab.* annua spuria *Ger*  
*Androsace* *Matthioli* altera J. B. altera major *Matthioli* *Park.* vulgaris latifolia annua *El Bot. T. Inst.* *Auriculæ ursi* affinis, *Androsace* dicta major *Herm. Cat.* *Saniculæ* affinis planta, *Androsace* dicta major *H. Ox.* *Alfine* affinis, *Androsace* dicta major C. B. *Sommer Nabel-Kraut.* *Manns-Harnisch.* In arenosis nascitur. Aprili floret. *Usu*. Herba *Vires* Copiosam hydropicis urinam ciet, in vino posita; podagricis utiliter illinitur. *Diosc.*

## XXVI. De *Apocyno*.

**C**ujus note siliquæ ad singulos flores gemine unicasapsulares, univalves, ab interiori latere per longitudinem debiscentes, & in his semina cum propendente lanugine imbricum modo stylo nutritivo incumbentia; Succum lacteum fundere; folia in caulis bina adversa. R. Meth. A. p. 78.

Apocynon *Offic.* folio subrotundo C.B. latifolium non repens *Park.* folio rotundiore flore ex albo pallescente J. B. *Chab.* erectum fruticosum folio subrotundo glauco *Parad. Bat.* Periploca latifolia *Ger.* Hundsröl. In hortis curiosorum nonnunquam reperitur. Autumno floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Cum adipe in panis cocta; canes, lupos, vulpes, &c, enecat in cibo data. *Diosc.*

### XXX. De Verbasco.

Pap. 3 11. pro. 2. & 3. Speciebus Verbasci,  
adde:

2. **A.** Verbascum nigrum *Offic.* *Ger.* nigrum vulgare *Park.* nigrum flore ex luteo purpurascens C. B. nigrum flore parvo apicibus purpureis J. B. *Chab.* Schwarzhlich Wollkraut. Königs-Kerze. In aggeribus fossarum. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Radix, Folia, Flores. *Vires.* Radix astringit, in alvi profluvio prodest, [Folia & Flores] cum prioribus viribus convenit. *Diosc.*

A. 3. Verbascum album *Offic.* mas foliis longioribus *Park.* flore albo parvo J. B. *Chab.* lychnitis Matthioli *Ger.* lychnitis flore albo parvo C. B. Wollkraut mit weissen Blumen. Secus vias variis in locis reperitur. Augusto floret. *Ufu.* Folia, *Vires.* Cum reliquis viribus convenit,

XXXI. *De Blattaria.*

**F**Lorum situs in spicis rarior; & foliorum color viridior, capsula figurâ Sphærica à Verbasco differt. R. Meth. A. p. 85.

Blattaria Offic. lutea J. B. vulgaris lutea Chab. flore luteo Ger. lutea folio oblongo laciniato C. B. lutea minor seu vulgaris Park. annua ramosa, floribus luteis staminibus purpureis H. Ox. Schaben; oder Motten-Kraut. In lutosis aggeribus. Julio florêt. Ufu. Herba. Vires. Cum Verbasco viribus convenire creditur.

Pag. 313. lin. ult. adde:

XXXVI. *De Valeriana Græca.*

**F**Oliis longis pinnatis Viciæ ferè in modum, floribus amplis, deorsum nutantibus, vasculis seminalibus turbinatis, in tria loculamenta divisus per maturitatem in summitate debiscentibus, semina parva, oblonga, nigricantia continentibus, ab aliis hujus generis differt. R. Meth. A. p. 86.

A. Polemonium Offic. vulgare cœruleum El. Bot. T. Inst. Valeriana Græca Ger. Park. Græca violacea Mor. Umb. Græca quorundam Chab. Græca quorundam flore cœruleo & albo J. B. cœrulea C. B. Spuria Violaceo flore Volck. Vulneraria alata Blattariæ flore cœruleo H. Ox. Griechischer Baldrian. Jacobs-Steiner. In sylvis. Æstate floret. Ufu. Radix, Herba. Vires. Radix ex vino bibitur contra



venenatas bestias ac dysenteriam : ac ex aqua adversus urinæ difficultatem & ischiadem : ex aceto drachmæ pondere lienosis. Dentium quoque dolores mitigat commaducata *Dioscorid.* Herba *Vulneraria* est insignis.

Hæc etiam planta ab antiquis ita imperfectè describitur, ut quænam sit adhuc in tenebris lateat ; nonnulli enim *Valerianæ*, alii *Lychnidis* speciem eam facient. Ego peritissimum illum Botanicum D. *Josephum Pitton-Tournefort*, M. D. præ aliis sequi prætulerim, qui huic plantæ hoc nomen attribuit, & *Dioscoridis* descriptionem subnectere :

*Polemonia ramis exilibus, utrinque pinnatis: foliis paulò quàm Rutæ majoribus, ac longioribus, Calamintinæ aut Sanguinariæ proximis quibus in summis velut corymbi dependent nigro semine, &c.*

### XXXVII. De *Nymphæa*.

Pag. 314. lin. 17. adde :

3. **A.** *Morsus Ranæ* *Offic.* *Ger.* *Nymphæa alba minima* C. B. *alba minima sive Morsus Ranæ* J. B. *Frosch-Biß.* In aquis pigrioribus & cœnosis. Julio floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum *Nymphæa alba* viribus pollet.

### XXXVIII. De *Faba Ægyptiaca*.

**H**ujus notæ, *Folia* & *flores Nymphææ*, *fructus fungosus* & *rugosus globum dimidium cui summa pars præcisa est referens, pluribus ad viginti qua-*

*tuor' usque loculis distinctus, quorum unusquisque fructum glandi similem continet.* R. Meth. A. p. 128.

Faba Ægyptia *Offic. Bod. à Stapel.* Ægyptia Dioscoridis & Theophrasti cujus radix Colocassia dicebatur. *Park.* Ægyptia legitima Dioscoridis *Camel. Syllab.* sive Cyanus Ægyptia *J. B.* Fructus valdè elegans, Faba fortè Ægyptia Dioscoridis *ejusd.* & *Chab.* Faba Ægyptia Colocassia *ejusd.* Fabæ Ægyptiæ affinis *Ger.* Ægyptiacæ Dioscoridis affinis *C. B.* Colocassia sive Eaba Ægyptia veterum *ejusd.* Nymphæa Indica flore purpureo *Bont.* Indica maxima *P. B. P.* Indica Faba Ægyptia dicta flore incarnato Nelumbo Zeilonensium *Parad. Bat.* glandifera Indiæ paludibus gaudens, foliis umbilicatis amplis, pediculis spinosis, flore roseo purpureo & flore albo *P. Al.* Madaraspatana Nasturtii Indici scutato folio solidiori venis atris, pediculo spinulis asperato *P. P. Tab. 207. fig. 5. Tab. 122. fig. 1.* flore suave purpurascente Japonica *Breyn. P. 2.* Nymphæa affinis glandifera Ægyptiaca flore pleno pulchro purpureo *H. Ox.* affinis Malabarica, flore amplo rosaceo, albicante colore *Commel. in not.* affinis Malabarica, folio & flore amplo, colore candido *ejusd.* Tamara *H. M.* Bem-Tamara *ejusd.* Nelumbo *T. Inst.* Lien Sinarum *Ogilo Chin.* Egyptische Bohnen. Colocasia. In Ægypto crescit. *Ufu.* Radix. *Vires.* Adstringendi facultatem obtinet, & Stomacho utilem: Dysentericis cœliacisque prodest. *Dioscorides.*

## SECTIO XXI.

## De Herbis Radicibus bulbosis.

## I. De Lilio.

Pag. 316. pro 2da Specie Lili adde:

2. **H**emerocallis *Offic.* Liliium aureum  
*Ger. Park.* purpuro-croceum ma-  
 jus C. B. rubens croceum majus  
 J. B. rubens vel croceum majus,  
 Hemerocallis *Chab.* Nothe Gold: oder Feuer-  
 Lilien. In hortis colitur. Junio & Julio flo-  
 ret. *Ufu.* Radix, Folia. *Vires.* Radix pota aut  
 cum melle & lana in pefso appofita, aquam  
 educit & fanguinem. Folia trita mamma-  
 rum inflammationes à partu contractas, ocu-  
 lorúmque collectiones mitigant. Radix &  
 Folia igne ambuftis utiliffime illinuntur, *Dio-  
 scorides.*

Pag. 316. post lin. 18. adde:

## III. De Cepastro.

**F**oliis fistulosis graveolentibus cum Ceba convenit,  
 radicibus proliſeris & caulibus non ventricofis  
 ab ea differt.

A. 1. Allium ſylveſtre *Offic.* *Ger. emac. Park.*  
 ſylveſtre tenuifolium Dodonæi *Volck.* cam-  
 peſtre juncifolium capitatum purpureſcens  
 majus C. B. Sphærocephalum purpureum ſyl-  
 ve-

vestre *J. B. Chab.* *Cepa juncifolia minor purpurascens T. Inst. Feld-Lauch. Hundsz Knoblauch.* In arvis. *Usu. Radix. Vires.* Cum Allio sativo viribus convenit.

2. *Cepa ascalonica Offic. ascalonica Matthioli El. Bot. T. Inst. H. Ox. ascalonica sive fistilis J. B. Chab. sterilis C. B. ascalonica sive ascalonitides Park. ascalonitides Ger. emac. Eschlauch. Winter-Zwiebeln.* In hortis culinarum usui colitur. *Usu. Radix. Vires.* Excalfacit & siccat, incidit, aperit, provocat, dejicit, cibi appetentiam facit, vermes intestinorum necat. *Matth.*

3. *Schœnoprassum Offic. Ger. Park. Porrum sectivum juncifolium C. B. sectivum & Schœnoprassum quorundam J. B. Chab. Cepa sectilis juncifolia perennis H. Ox. El. Bot. Schnittlauch. Binkenlauch. Holllauch.* In hortis etiam reperitur. *Usu. Folia. Vires.* Cum Cepis viribus convenit. In culinis pro olere crudo usurpantur.

#### IV. De Allio.

Pag. 317. lin. 11. subjunge:

2. **O**phioscorodon *Offic. Ger. Scorodoprassum alterum bulboso & convoluto capite Park. Allii genus Ophioscorodon Chab. genus Ophioscorodon dictum quibusdam J. B. Allium sativum alterum sive allioprassum caulis summo circumvoluto C. B. Schlangen Knoblauch. Siegwurz/ Allermanns Harnisch Männlein. Rockumbol.* In hortis colitur.

tur. Julio floret. *Ufu.* Radix, Nuclei. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit, mitior tamen est.

### V. De Moly.

2. **M**oly *Offic.* Dioscorideum *Ger. Park.* Dioscoridis parvum quibusdam J. B. Dioscoridis parvum quibusdam flore candido *Chab.* angustifolium umbellatum C. B. Schmalblättrig Moly. In hortis colitur. Aprili floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Ad vulvæ apertiones, si trita cum Irino unguento in pefso subjiciatur. *Diosc.*

3. Moly Theophrasti *Offic.* Theophrasti sive Homeri *Park.* Theophrasti magnum J. B. Theophrasti magnum, floribus albis stellatis *Chab.* Homericum *Ger.* latifolium liliflorum C. B. Ornithogalum Indicum latifolium floriferum Sphæricum colore colossino aut albo *H. Ox.* Moly mit Lilien-Blumen. In hortis curiosorum non in frequens nascitur. Junio & Julio floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Cum præcedente viribus convenire creditur.

### VI. De Porro.

Pag. 137. pro 2. & 3. Speciebus Porri adde:

2. **A**mpeloprassum *Offic.* Porrum vitigineum *Ger. El. Bot.* sylvestre vinearum C. B. Allium sylvestre amphicarpon, foliis porraceis, floribus & nucleis purpureis *R. Synop. Edit. 2. p. 230.* Weinberg-Knoblauch. In montibus *Westmorlandicis* observavit D. Lawson. Junio floret. *Ufu.* Folia. *Vires.* Stomacho magis quam Porrum adverbatur; plus autem excal-

excalfacit, urinam & menses vehementius ciet. Idem contra serpentium morsus convenit. *Diosc.*

Ampeloprassi nomine quam plantam intelligent Rei Botanicae Autores, ab optimis & nuperrimis scriptoribus plurimum dubitatur, aliis alio illud referentibus, in quam incertitudinem inducti sunt ex eo quod *Dioscorides* illud non descripserit. Quatuor apud *C. Bauhinum* Herbarum Species invenio, quibus hoc nomen ab aliis & aliis Botanicis tribuitur, è quibus hanc quæ plura habet suffragia elegi.

A. 3. Scorodoprassum *Offic. Chab. Park.* primum *Clusii Ger. emac.* dictum *J. B. Allium Sphærico* capite folio latiore sive Scorodoprassum alterum *C. B. maximum* multis Porraceis foliis latioribus sphærico capite ex floribus albis conflato *H. Ox. montanum* majus Anglicum *Newtonii R. H. p. 1125.* Holmense sphærico capite *R. Synop. Edit. 2. p. 229.* *Ucker oder Ucker Knoblauch. Bilder-Lauch.* In *Insula Holms* dicta copiose provenit. Junio floret. *Usu.* Folia *Vires.* Allii & Porri qualitatum particeps: Unde promiscuas sibi vires ex utroque vendicavit.

## VII. De Narcisso.

**C**ujus nota, Flos è vaginâ membranaceâ oritur summo fructui insidens, in sex lacinias totidem petala imitantes divisus, calice medium occupante; nunc longiore, nunc brevior. *R. Meth. A. p. 116.*

A. 1. Narcissus *Offic.* medio-luteus *Ger.* medio-luteus vulgaris *Park.* pallidus circulo luteo *C. B.* medio-luteus cum aliquot floribus *J. B. Chab.* Gelbe Narcissen. Jonquillen. Mersben-Blumen. In pascuis & aggeribus. Aprilifloret. *Usu.* Radix. *Vires.* Cocta sive estur sive bibitur vomitoria est: ambustis igni prodest, præcisos nervos glutinat: luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus subvenit. Vitia cutis in facie, vitiliginesque emaculat. Ulcerum sordes expurgat: abscessus rumpit: infixæ corpori extrahit. *Dioscorid.*

A. 2. Pseudonarcissus *Offic.* Anglicus *Ger.* Anglicus vulgaris *Park.* Narcissus sylvestris pallidus calice luteo *C. B.* Bulbocodium *Chab.* vulgare *J. B.* Wilde bleiche gelbe Hornungs-Blumen. Circa margines agrorum. Martio floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

### VIII. De Tulipa.

**C**ujus notæ, Radix bulbosa tunicata; flores amplè hexapetali, nudi, in singulis caulibus naturâ singuli, erecti; caules foliis aliquot cincti. Stylus in fructum abit oblongum triangulum, in tria loculamenta binis singula seminum Liliaceorum sibi invicem superincumbentium ordinibus repleta; quo cum Lilio convenit. *R. Meth. A. p. 119.*

Tulipa *Offic.* præcox lutea *C. B.* tota lutea *Ger.* præcox flava *J. B. Chab.* Gelbe Tulipe. In hortis reperitur. Vere floret. *Usu.* Radix.

dix. *Vires.* Eisdem viribus cum Battatis & Pastinacis latifoliis à quibusdam prædita affirmatur.

## IX. De Ornithogalo.

**N**ota, staminula florum lata spicata, quorum tria acuminata, tria bifida seu sinuata sunt. Stamina hæc capitulum seu stylum includunt arctè coeuntia, etiam explicatis foliis exterioribus. Florum petala aversâ parte lineis virentibus plerumque notata. R. Meth. A. p. 119.

A. Ornithogalon Offic. Chab. vulgare Ger. Park. vulgare & verius J. B. umbellatum medium angustifolium C. B. umbellatum minus candidum vulgare H. Ox. Stern aus Bethlehem. Vogel-Milch. Weisse Feld-Zwiebel.

In hortis colitur. Majo floret. *Usu.* Radix. Semen. *Vires.* Radix cruda & cocta manditur. [Semen] coquitur cum pane ut Melanthium. Diosc.

## X. De Hyacintho.

Pag. 317. pro secunda specie Hyacinthi adde:

**B**ulbus Vomitorius Offic. Muscari Clusii Ger. obsoletiore flore Clusio T. Inst. majus obsoleto flore El. Bot. Hyacinthus racemosus moschatus C. B. racemosus seu botryoides major, seu Muscari majus obsoleto albo flore H. Ox. botryoides major moschatus sive Muscari flore cinericeo Park. parad. odoratissimus dictus Tibcadi & Muscari J. B. odoratissimus, Dipcadi & Muscari dictus Chab. Muscus Hyacinth. Wohlriechender Kraus



**Trauben-Hyacinth.** In vicinis Constantinopolitani hortis. Aprili floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Ea mansa vel decoctum potum Vesicæ malis medetur. Vomitiones movet. *Diosc.*

Pag. 318. post lin. 12. adde :

## XII. De Sisyrrhinchio.

**N**OS à flore distinximus, cujus folia illa quæ sursum reflectuntur in *Iride* [bulbosa] bifida sunt, in *Sisyrrhinchio* integra. R. Meth. A. p. 117.

*Sisyrrhinchium* *Offic.* Theophrasti Columnæ R. H. p. 1167. minus angustifolium C. B. H. Ox. *Crocus* *Italicus* parvo flore radice rostrata *El. Bot.* *Bulbocodium* *Crocifolium* flore parvo violaceo T. *Coroll.* Spanisch Nußlein *Sisyrrhinchium.* In *Cirinola* succrevit. *Ufu.* Radix.

## XIII. De Gladiolo.

**F**olia *Gladii* laminam referunt. Floris structura peculiaris est; inferius enim tubulosus, superne in duo velut labia expanditur, quorum superius simplex est & in alveum inflexum, inferius in quinque partes divisum. Radix duplici tubere constat, altero alteri superincumbente R. Meth. A.

*Gladiolus* *Offic.* *Narbonensis* Park. *Italicus* Ger. floribus ex uno versu dispositis major C. B. H. Ox. sive *Xiphion* J. B. Chab. Kornflag, Schwertel. In hortis nostris colitur. Junio

nio floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. Attrahendi, discutiendi, & nimirum siccandi vim habet. *Galen*.

#### XIV. De Colchico.

*F*oliis latis, vâsculis seminalibus majoribus à Croco differt; Flores nudi, à radice statim orti, absque pediculis herbaceis, Liliaceis similes. R. Meth. A. p. 116.

A. 1. Colchicum Offic. *Chab*. J. B. commune C. B. purpureum & Anglicum album *Ger. Park*. *Wiesen-Saffran / Wiesen-Zeitlosen / Nascete Huren*. In pratis solo pingui occurrit. Autumno floret. *Ufu*. Radix. *Vires*. Comesa fungorum more, strangulando enecat. *Diosc*.

2. Ephemereum Offic. *Tödliche Wiesen-Zeitlosen*. In sylvis & opacis, & à Dioscoride sic breviter describitur: *Folia habet Lili, sed tenuiora: caulem parvum: florem candidum, amarum, semen molle: radicem unam, digitali crassitudine, longam adstringentem, odoratam. Vires. Hujus radix dentibus præcipua, si decocto ejus colluantur. Folia in vino cocta discutiunt tumores & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt. Diosc*.

Per Ephemereum plantam deleteriam tantum intellexisse videtur *Theophrastus*, ut rectè observat *Chabræus*. *Dioscorides* autem nullum Ephemero vim lethalem assignat. *Plinius* non tantum non exitiosam sed salutiferam esse affirmat, unde ab eruditis valde ambigitur de hac planta, nec adhuc quo referenda sit inter eos

eos convenit. *C. Baubinus* sub hoc nomine duas proponit plantas; & *Columna Digitalis* quandam speciem pro ea habet: *Mauritani* & eos secuti superioris ætatis *Medicii Ephemerum* cum *Hermodactylis* confuderunt.

Pag. 318. lin. ult. subjunge:

## XVI. De Dente Canino.

*Nota*, flos in uno caule unicus, hexapetalos, deorsum natans, petalis reflexis; fructus in terna loculamenta divisus, quorum singula seminibus oblongis repleta. Adde radicem carnosam dentis canini quodammodo figurâ. *R. Meth. A. p. 119.*

Dens caninus *Offic. Ger.* caninus flore purpurascente & flore rubro *Park. parad.* Dens Canis latiore rotundioreque folio *C. B.* flore purpurascente *H. Ox.* *Satyrium*, quorundam *Erythronium bifolium*, flore unico radiato purpureo *J. B.* *Satyrium Erythronium* quorundam; *Dentalis* species aliis *Chab.* *Breitblätteriger Hundszahn mit Purpur-Blumen.* *Roth Stendel-Wurz/ Schoß-Wurz.* Ad quorundam montium radices reperitur. *Aprili* floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Dolores colicos mitigat, epilepticos pueros juvat, ventris tineas juvat; *Venerem* stimulat, *Corpus* nutrit.

A nonnullis *Satyrium erythronium* *Dioscoridis* creditur, sed erroneè *Parkinsoni* iudicio, qui *Tulipam* pro ea habet.

## SECTIO XXII.

De

Herbis bulbosis affinis.

## I. De Iride.

Pag. 322. pro 5. Specie Iridis, adde:

5. **C**hamæiris *Offic.* tenuifolia *Ger.* Tabernamontani *H. Ox.* angustifolia major & minor *Park. parad.* Iris humilis, feu Chamæiris angustifolia graminea *Herm. Cat.* angustifolia prunum redolens major & minor *C. B.* graminea, cui quotannis pereunt folia *J. B.* graminea cui quotannis pereunt folia, flore variegato *Chab.* Gras-blätteriger Schwertel/ kleine wilde Iris. In hortis colitur. Majo floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum primo viribus convenire dicitur.

Pag. eadem post lin. 21. adde:

## III. De Liliastro.

**C**ujus nota, Flos exactè Liliaceus; fructus oblongus, ab apice in tres partes debiscens, & in tria locularienta, seminibus angulosis repleta divisus; radices parvis Napis similes, fibris aliquot adnatis. *R. Meth.* A. p. 118.

Phalangium *Offic.* Antiquorum *Ger. emac.* magno flore *C. B.* flore Lili J. B. Allobrogicum *Park.* Allobrogicum magno flore Lili *H. Ox.* Asphodelus Allobrogicus magno flore  
Lili

Lilii *Herm. Cat.* Liliastrum Alpinum minus *El. Bot. T. Inst.* Spinnen-Kraut/Erde-Spinnenkraut/Grass-Lilien. In hortis apud nos colitur. Junio floret. *Usu.* Folia, Flos, Semen. *Vires.* Cum vino pota auxiliantur contra Scorpiorum Phalangiorumque ictus: Tormina quoque discutunt. *Diosc.*

#### IV. De Aloë.

Pag. 322. lin. 25. dele Aloe vulgaris & quæ sequuntur ad verbum *Vires* in lin. 24. cujus in loco adde:

1. **A**Loë *Offic.* J. B. *Chab.* vulgaris C. B. H. *Ox.* vera vulgaris *Munt.* vulgaris sive Sempervivum marinum *Ger. Park.* Caragata Brasiliensibus *Marg.* tertia *Pison.* Kadanaku vel Catevala *H. M.* Gemeine Aloë. Utriusque Indiæ incola est. *Usu.* Folia. Succus inspissatus Aloe Barbadosis *Offic.* vocatur, aliquando niger lucidus, aliquando hepatis fere colore, odore gravi, sapore amaricantissimo. Ex Insula Barbados in Cucurbitis magnis adfertur. *Vires.* Folia ad ambusta commendantur. Succus inspissatus cum Aloë Succotrina viribus convenit.

2. Aloë Guineensis Caballina vulgari similis, sed tota maculata *Commel. Præhud. Bot.* Ross-Aloe. *Usu.* Succus inspissatus quibus pars impurior arenosa, sordibus conspurcata, & idcirco nigricans Aloë Caballina dicitur. Pars purior colorem hepatis referens Aloë Hepatica vocatur.

Caballinam hanc vocat prædictus Autor, quia fractis foliis Succus Aloën Caballinam redolet.

3. Aloë Succotrina *Offic.* Succotrina angustifolia spinosa, flore purpureo *Breyn.* P. 2. Indiæ Orientalis serrata, sive Succotrina vera, floribus phœniceis *Hort. Beaum.* Americana serrata, floribus coccineis P. B. P. An Aloë Americana Anonæ foliis, floribus suaverubentibus, ex codice Beningiano P. P. *Tab. 240. fig. 4?* Succotrin-Aloë, Aloë aus der Insel Zuccotra. In Insula Succotora in India Orientali reperitur. *Usu.* Succus inspissatus ex nigro splendentis colore, sed quando teritur croceus; odoris non ingrati: cujus colligendi modum hodiernum D. *Raio* communicavit D. *Josua Palmer* M. D. è dictatis D. P. *Hermanni* his verbis:

*Ex foliis à radice avulsis manu vel instrumento leviter compressis succus destillat in vas recipiens. Subsistere debent partes crassæ per noctem, aliæ vero supernatant. Postero die in aliud vas infundunt & insolant, ut concresecat & exsiccetur, in quo tempore fulvum acquirit colorem.*

Ex Insula Succotora in coriis bestiarum ad nos transportatur: & à Caballina puritate sola differre à quibusdam creditur.

Pag. 323. lin. 19. subjunge:

De variis Aloes speciebus & plantis è quibus omnes effluunt aut eliciuntur, liceat mihi hoc in loco dubia mea aperire. Cùm

Phar-

Pharmacologiam meam conscriberem, quanta esset differentia, odoris respectu, inter *Succotrinam*, *Caballinam* & *Barbadensem Aloën*, observans, suspicionem mihi injecit, non ex puritate tantum inter se differre, ut vulgò opinantur; quamvis quòd ab eodem loco adveherentur, priores duas præcipuè puritate tantum differre, ut dixi, quemvis faciliè persuadere posset; ingens tamen differentia, quam, odoris respectu, inter *Barbadensem* & *Succotrinam* intercedere animadverti, suspicionem mihi movit, *Barbadensem* ab eadem cum *Succotrina* planta non elici, ideoque de ea in specie quæsi, an ab eadem planta esset necne? Unde ab eruditissimo & ingeniosissimo Viro D. *Hans Sloane* M. D. ex propria observatione cum in Insula illa esset, certior factus sum, *Barbadensem Aloën* Aloes vulgaris C. B. succum esse, non Aloës Americanæ *Dod.* ut antea suspicabar. Ab aliis etiam admonitus *Succotrinam Aloën* ejusdem originis esse, ut videre possis in *Historia Plantar. D. Raii*, (ex dictatis D. *Hermanni*) p. 1196. unde eas hoc modo disposui in *Pharmacologia*.

At neque solus sum in hac suspitione, cum ingeniosissimus Botanicus D. *Commelinus* in *Preludiis suis Botanicis*, p. 46. conciliare non potest differentiam odoris inter *Aloën Caballinam* & *Succotrinam*, quæ tanta est ut frequentibus lotionibus aliisque modis *Caballina* à vehementi ingrato suo odore liberari nequeat, cum identitate speciei. Unde rectè affirmat, ex

diversis Aloës speciebus succo amaro præditis, elici posse succum vulgari similem, & earundem virium: cujus verba hic transcribo: *Etiam si variae Aloes species existunt, quæ succum fundunt amarum, harum tamen unica est, quæ Aloes vulgaris à C. Bauhino, Dioscoridis à Fabio Colonna, Arabica Socotrina Officinarum à Morifono vocatur, & ab omnibus Botanicis veram Aloem fundens planta existimatur, cujus succus concretus in Officinis Pharmaceuticis Græco Latinoque Aloes nomine innotescit. Hic succus triplex est, vel Aloe Succotrina (quæ & Lucida dicitur) Hepatica vel Caballina vocatur, quæ sola duntaxat puritate impuritateve, ut plurimorum est opinio, differunt; omnium purissima est Succotrina, quod nec ego inficior, sed aliquam tamen dubitandi ansam geminæ aliæ Aloës species statim indigitatæ exhibent, ut Aloe Succotrina angustifolia spinosa flore purpureo Breynii, & Aloe Guineensis Caballinæ vulgari similis, sed tota maculata; dum prioris succus recens saporis odorique Aloes Succotrinæ, alterius autem Aloes Caballinæ respondet; adde denique Aloem Caballinam Officinarum à fœtore illo ingrato, quem spirat, nullo artificio aut lotionè liberari posse, quod factu, meo judicio, non esset difficile, si sola impuritate à Succotrina differret: nullus tamen etiam dubito, quin ex variis Aloes speciebus, succum amarum continentibus, succus Aloes vulgaris succo similis, & quoad vires respondens, colligi possit.*

Cumque verisimile sit, Succotrinam Aloem à D. Breynii planta profluere; Caballinam & He  
pati



*paticam à Commeliniana, & Barbadosensem à Vulgari Aloe, ut antea dixi; omnes de novo inferui.*

### V. De Yucca.

**A**B aliis differt, foliis quodammodo gramineis, acutis & pungentibus, floribus deorsum nutantibus plurimis in eodem caule; pediculis longis. R. Meth. A. p. 193.

Yucca Offic. sive Yucca Peruviana Ger. foliis Aloes C. B. H. Ox. sive Jucca Park. parad. Indianisch Brod / Jucca. In America sponte oritur, apud nos autem in hortis. Ufu. Radix. Vires. De usu ejus in Medicina nil invenio.

### VI. De Cannacoro.

**C**UI flores oblongi, in spicam congesti, è sex vel septem petalis linguæformibus, & trifoliato quasi calice constructi, insidentes pericarpio trigono echinato, in tres cellulas semina rutunda continentis distincto; folia lata, radix tuberosa, nodosa. R. Meth. A. p. 117.

Sagittaria alexipharmaca Offic. Canna Indica radice alba alexipharmaca Cat. Jamaica. Indica angustifolia, pediculis longis ad imum folium, nodo singulari geniculatis P. Al. Arundo Indica angustifolia, flore rutilo, pediculis donata H. Ox. Agutiguepo-obi Brasilien-sibus Marg. Acutiguepo-obi Pison. Radix quædam in Malaca, quæ adversus vulnera Sagittis toxico illitis facta, præsentaneum remedium est Garcies, C. B. Malaca quædam

toxicis Sagittis resistens *J. B.* Pfeil-Kraut  
 Spieß-Kraut. In hortis Jamaicæ feritur. *Ufu*  
 Radix superius rotunda, subruffa, inferius fi-  
 brata. *Vires.* Alexipharmaca est insignis; ad-  
 versus vulnera toxicis Sagittis facta lauda-  
 tur.

### VIII. De Galanga.

Pag. 337. post lin. 10. adde:

13. **C**Assumuniar *Offic.* aliàs *Rysagon Peach.*  
*Obs.* *Casimunar Marl.* *Risagon Mus. Reg.*  
*Soc.* An *Zerumbeth*, seu *Zingiber rubrum*,  
*sylvestre*, *Ternatense Camel. Syllab.?* *Casumu-*  
*nar / Runder Zittwer / Block-Zittwer.* Ex India  
 Orientali ad nos transportatur. *Ufu.* Radix,  
 quæ tuberosa est, ad pollicem aut amplius  
 crassa, in taleolas transversas secta, superfi-  
 cie circulis (ut in Galanga) quasi geniculis  
 notata, fusca, intus flavescens, saporis ama-  
 ricantis aromatici, odoris fragrantis. *Vires.*  
 Moderatè calfacit & astringit: Partium est  
 tenuium: Nervos roborat: Spiritus anima-  
 les & vitales reficit, ventriculum confortat,  
 flatus expellit. In Apoplexia, motibus con-  
 vulsivis, Paralyfi, Tremore, Hysterica passio-  
 ne, Hypochondriacis affectibus, Vertigine,  
 & intestinorum Torminibus curandis Medi-  
 camentum est præstantissimum. *D. Peachy*  
*M. D.* pro Corticis Peruviani correctorio eam  
 commendat. Qui de viribus ejus plura sci-  
 re desiderant, *D. Peachy* & *D. Marlow* Obser-  
 vationes consulant.

## IX. De Aro.

Pag. 332, post lin. 10. adde:

2. **D**Racunculus major *Offic.*, bistorto folio  
C. B. major Matthioli *Ger.* Arum caulescens  
Rumicis agrestis foliis sibi invicem implicatis  
Virginianum *P. P. Tab.* 271. *fig.* 1. major caulescens  
Lapathi foliis *H. Ox.* Drachen- oder Natter-Wurzel / Schlangen-Kraut. In Virginia  
sponte oritur. *Usu.* Radix. *Vires.* Calfacit & siccatur,  
prodest contra Orthopnoeas, rupta, convulsa, tussim & destillationes;  
*Diosc.*

## X. De Arisaro.

**A**B Aro differt floris formâ, qui tubus est ima parte  
clausus, summa apertus, & in caputii modum incurvatus.  
*R. Meth. A.* p. 75.

Arisarum *Offic.*, angustifolium *Dioscoridis* fortè  
C. B. angustifolium *Ger.* J. B. Chab. longifolium  
*Park.* Arum humile angustifolium pistillo longissimo,  
tenui, inflexo, mucronato *Herm. Cat.* Scorzonerae folio  
*El. Bot.* Münchs-Kappe / Klein Aron mit schmalen Blättern.  
In Italia ac Dalmatia reperitur. *Usu.* Radix. *Vires.*  
Illitu nomas sistit, *Diosc.* Calfacit, siccatur, incidit,  
aperit, abstergit, digerit. *Galen.*

## XI. De Satyrio.

Pag. 333. lin. 2. subjunge:

**D**UÆ Satyrii species à *Dioscoride* memorantur,  
quarum priorem his verbis describit.  
*Saty-*

*Satyrium* aliqui *Trifolium* vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici aut Lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem nudum: florem Lili effigie, candidum: radicem bulbosam, mali magnitudine, fulvâ, intus ut ovum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingrâtam. Alteram in hunc modum. Est & alterum *Satyrium Erythronium*, sive *Erythraicon*, i. e. rubrum, semine lini, majore, duro, levi, splendente: quod fertur non secus atque *scincus* libidinem excitare. Cortice radicis gracili, rufo, intus autem albo, includitur, sapore dulci, non ingrâto ori. Ab ejus temporibus non levis controversia de hac stirpe, inter eruditos Medicos & Botanicos, exorta est; alii uni, aliis alteri plantæ id nomen accommodantibus; verum plerique ex *Orchidum* familia eas esse volunt, cui opinioni *Officinæ* nostræ consentiunt; atque idcirco in priore meo libro radices hæc, quæ nunc pro *Satyrio* usurpantur, eodem nomine insignivi; quamvis eodem tempore non eram nescius nonnullos Authores id nominis *Orchidi palmatæ*, alios *Cynosorchidi* attribuerent. Nunc ergo mutatâ sententiâ, quænam *Dioscoridis* *Satyria* sint, mihi optimè demonstratum videtur à *Parkinsono*, aliisque; qui pro *Tulipis* ea habuere, ut quæ superius recitatis descriptionibus omnium optimè convenit.

3. *Cynosorchis Offic. major* Ger. prior J. B. *latifolia* hiante cuculo major C. B. prior *Dodonæi* flore copioso, dilutè purpureo *Chab.*

Orchis

Orchis major latifolia *Park.* latifolia hiante cuculo major *El. Bot. T. Inst. Hundſ-Hoden. Stendelwurk; Männlein.* In locis herbidis circa Basiliam. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum præcedentibus viribus convenit.

4. Serapias *Offic.* ſive Salep *Marl. Obſ. Saſep / Berghändlens-Wurk.* In Turcia reperitur. *Uſu.* Radix oblonga, alba pellucida, paulum compreſſa, & nonnihil corrugata. Sapore gummi Tragacanthæ referens, odoris nullius ex Turcia ad nos importatur. *Vires.* Analepticum inſigne habetur, Sterilitati opitulatur, Venerem ſtimulat, abortivum impedit, partum faciliat, Chocolatæ modo præparata eſt.

Quamvis formam externam, ſi ſpectes, ex Orchidum tribu meritò cenſeri poſſet, cujuſnam tamen plantæ radix ſit inter eruditos adhuc ambigitur.

A. 5. Tragorchis *Offic.* maximus *Ger.* maxima *Park.* Orchis ſive Tragorchis maxima *Mer. Pin.* Saurodes ſive Tragorchis maximus *P. B.* barbata, odore hirci, brevior longiorque folio *C. B.* barbata, foetida *J. B.* Orchis, Cynoforchis, Satyrium *Chab. Boek; Hödlein / Boek; Külleſen / Geilwurk.* Solo pinguiſſimo naſcitur. Majo & Junio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum Satyrio viribus convenit.

A. 6. Triorchis *Offic.* *Ger.* alba odorata major & minor *Park.* vel Tetrorchis alba, odorata major *C. B.* alba odorata minor *Ejuſd.* Orchis ſpiralis alba odorata minor *J. B. Chab.*

ſeu.

seu Testiculus odoratus *Mer. P.* spiralis autumnalis *P. B.* flore albo odorato *Ejusd.* Großwölriehend Knaben-Kraut. In pascuis siccioribus. Autumno floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum prioribus viribus convenit.

A. 7. Orchis palmata *Offic.* palmata pratensis latifolia longis calcaribus C. B. palmata major mas sive Palma Christi mas *Park.* palmata pratensis major, sive Palma Christi mas *Gerardi P. B.* sive Palma Christi mas *Mer. Pin.* Palma Christi mas *Ger.* Palmata non maculata J. B. Satyrium Regium palmata *Chab.* Königlich Stendelwurz-Männlein / Wasserhändleins-Wurzel. In pratis humidis & palustribus. Majo floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum reliquis viribus convenire videtur.

## XII. De Orobanche.

**C**ujus flores figurâ ad Orchin accedunt, ut & dispositione in spicam, verum ab Orchidibus floribus in eo differunt, quod unico petalo constant. Fructus etiam, semina minutissima continens, bivalvis est. Folia è radice nulla exeunt, quæque in caule sunt rudimenta tantum foliorum esse videntur. R. *Meth. A. p. 92.*

A. Orobanche *Offic. Chab.* flore majore J. B. major garyophyllum olens C. B. sive Rapum Genistæ *Ger. Park.* Sonnen-Wurzel / Sommer-Wurzel / Löwen-Schwanz. In glareosis & aridis locis. Junio & Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Herba siccata & in pulverem trita præfens est ad Coli dolores remedium. Condi-

ta aut ejus Syrupus ad Splenicis & Hypochondriacos affectus usus est eximii. Extrinsecus ad tumores duros & schirrosos molliendos exhibetur. D. Bowle.

### XIII. De Squamata.

*Cujus nota, Radices squamose, flores in perianthio quadrifido maximam partem latitantes, galeâ ubrà, barbâ tripartitâ lacteâ: semen rotundum, satis magnum, & per maturitatem nigrum. R. Meth. A. p. 92.*

A. Squamaria & Squamata *Offic. Volck.* Orobanche radice dentata major C. B. radice lentata, sive Dentaria major Matthioli *Park.* Dentaria major Matthioli *Ger.* Anablatum Cordi sive Aphyllon J. B. Cordi sive Aphyllum ad Orobanchen accedens *Chab.* Zahnkraut / Schuppenkreuz oder Streubelwurzel / Dhnblat. In umbrosis sepium aggeribus. Annulli floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Consolidat, glutinat, in Herniis & vulneribus, variisque affectibus à fluxionibus ortis prodest.

Pag. 333. post lin. 14. adde:

### XV. De Bifolio.

*Cujus nota, Radices fibrosæ, folia nervosa & fere Plantaginea, bina in caule oppositâ, flores Orbidis, calcari carentes. R. Meth. A. p. 121.*

A. Bifolium *Offic.* sylvestre vulgare *Park.* najus vulgare *H. Ox.* majus seu Ophrys major quibusdam J. B. Ophrys *Chab.* bifolia C. B. *Ger.*

*Ger.* Orchis bifolia herbaceo flore major *Herm.*  
*Cat.* Zwenyblat/wilder Durchwachs. In sylvis &  
 dumetis. Majo & Junio floret. *Ufu.* Herba.  
*Vires.* Adstringit & glutinat, præcipue ad  
 hernias & vulnera conglutinanda commen-  
 datur.

## XVI. De Helleborine.

*Cujus nota, Folia nervosa, radices fibrosa, flores  
 hexapetali Orchidis similes, calcari carentes. R.*  
*Meth. A. p. 121.*

A. Helleborine *Offic. Ger.* latifolia montana  
 C. B. Elleborine *Dodonæi J. B. Chab.* flore vi-  
 ridante *Park.* Breit-blätterig wild Niesz-Kraut/  
 Niesz-Burz. In sylvis cæduis, lucis & opacis.  
 Majo floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum Helle-  
 boro albo à quibusdam viribus convenire cre-  
 datur, sed in *Officinis nostris* raro aut nun-  
 quam reperitur.

## SECTIO XXIII.

De

Herbis graminifoliis, non culmi-  
 feris, flore stamineo.

### I. De Cypero.

Pag. 335. pro 3. & 4ta Specie Cyperi, adde:

3. **T**Rasi *Offic. J. B.* Malinathalle Theo-  
 phraasti *Chab.* Cyperus esculentu  
*R. H. p. 1301.* rotundus esculentu  
 angu



angustifolius C. B. esculentus sive Trasi Italo-  
 rum Ger. *emac.* dulcis rotundus esculentus  
 Trasi dulce vocatus Park. *Güsser wilder Gals-  
 gan.* In Italia & alibi nascitur. *Uju.* Radix.  
*Vires.* Cum prioribus viribus convenit.

4. Papyrus *Offic.* Nilotica J. B. Ger. Niloti-  
 ca Alpina, *Berd* Ægyptiis dicta: *Biblos* Syriaca  
 quorundam *Chab.* Nilotica sive Ægyptiaca  
 C. B. Antiquorum Nilotica Park. Cyperus Ni-  
 loticus vel Syriacus maximus papyraceus H.  
 Ox. *Egyptisch Pappier-Riedt.* In Ægypto &  
 Syria nascitur *Uju.* Caules. *Vires.* Ad laxan-  
 das fistulas utilis est. Aqua ex scapis recentibus  
 destillata ad oculorum suffusiones, cali-  
 gines atque obscuritates proficua est.

Ex Papyro olim chartæ fiebant ad scriben-  
 di usum, conficiendi modum vide apud *Pli-  
 nium*, l. 13. cap. 11, 12. Chartæ ex Papyro in de-  
 suetudinem obierunt; novo chartarum arti-  
 ficio, Anno 1470, invento, conficiendi cu-  
 jus modum videlicet apud clarissimum *Raium*,  
 p. 1302. Antè chartarum usum in Palmarum  
 foliis primo scriptitatum, ut rectè observat  
*Plinius*, deinde in quorundam arborum libris.  
 Et adhuc hodie ex Palma *Lantor* dicta Indos  
 suam chartam parare ad scriptionem scribit  
*Linschotanus.* *Lerius* in Provincia Mangi ar-  
 borem esse scribit *Cal* nomine, folio grandì  
 quod chartæ usum præbeat in tota India. *Pe-  
 trus Martyr* Chaldæos, literarum primos re-  
 pertores; in arboris *Copeia* dictæ foliis pri-  
 mò scriptitasse refert. *M. Fumée* præter arbo-  
 rem

rem *Copei*, esse aliam Guajabara dictam, in cuius foliis stylo vel aciculâ scriptitant Indi. Præter supradictas, varias arbores meminit *C. Bauhinus* in *Pinace*, p. 19. quæ pro papyro usurpantur. *Attalus* (uti creditur) *Pergamenus*, animalium coria arefacta huic usui adaptanda invenit.

## II. De Junco.

Pag. 336. lin. 17. subjunge:

**A.** 2. *Oxyschœnos* *Offic.* Juncus acutus capitulis Sorgi *C. B.* pungens sive Juncus acutus capitulis Sorgi *J. B. Chab.* maritimus capitulis Sorgi *Park.* Stechend grosse Sees Binsen. In maritimis. *Usu.* Integra Herba, Semen.

**A.** 3. *Holoschœnos* *Offic.* Juncus aquaticus maximus *Ger.* lævis maximus *Park.* maximus sive Scirpus *C. B.* maximus holoschœnos *J. B. Chab.* Scirpus altissimus *El. Bot.* Grosse & Binsen. Bull. Binsen. In fluminibus & piscinis majoribus. *Usu.* Integra planta. *Vires.* Semen utriusque tostum sistit alvum, rubra fœminarumque profluvia: Urinam ciet: Somnum conciliat. Planta tenera, convenienter illinitur adversus Phalangiorum morsus *Diosc.*

Pag. 337. post lin. 3. adde:

## IV. De Sparganio.

**P**ilulis suis echinatis sphericis Platani pilulas emulantibus, à reliquis sui generis abundè distinguitur. *R. Synop.* p. 277.

A Sparganium *Offic. Chab.* ramosum *Ger.*  
 C. B. *Park.* quibusdam J. B. Butomos dissectâ  
 paniculâ vulgò Platanaria, quia pilulas ha-  
 bet Platani pitulis similes *Bod. in Theorb. Niede-*  
*Gras. Schwertel Nied. Zgels Knospen.* Ad  
 fluviorum ripas, inque palustribus frequens.  
 Junio floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Contra Ser-  
 pentis venena cum vino datur. *Diosc.*

### V. De Typha.

**N**ota est florum effigies turbinata & in clavem  
 composita. R. *Synop.* p. 278.

A. Typha *Offic. Ger.* palustris major C. B. J.  
 B. palustris seu major *Chab.* palustris maxi-  
 mus *Park. Narren- Kolben. Wasser Kolben/*  
*Kagen Schwanz.* In stagnis & ad rivulorum  
 ripas. *Usu.* Flos. *Vires.* Hujus herbæ flos  
 suillo adipe eloto exceptus ambustis mede-  
 tur.

### VI. De Acoro.

*Peg.* 338, lin. 3. subjunge:

2. **A**corus Asiaticus *Offic.* verus sive Cala-  
 mus aromaticus, Asiaticus, radice te-  
 nuiore *Herm. Cat.* Asiaticus radice tenuiore  
*Hermanni H. Ox.* Brasiliensis aromaticus mi-  
 nor, Capitatinga, aliis Jacareatinga *Pisonis*  
*ejusd.* verus Asiaticus radice tenuiore, vel  
 Calamus aromaticus *Garziæ P. Al.* Calamus  
 aromaticus *Harz.* aromaticus orientalis folio  
 & radice tenuiore *Act. Philos Lond.* n. 274. p.  
 943. Capicatinga, aliis Jacareatinga *Acori*

species *Pis. Va-embu H. M.* Wahrer Calamus. Ulfers-Wurz. Utriusque Indiæ incola est. *Ufu. Radix. Vires.* Cum priore viribus convenit.

## SECTIO XXIV.

### De Herbis Culmiferis.

#### III. De Zea.

Pag. 339. post lin. 20. adde:

**A**D præparaciones hujus grani referendi videntur *Vermicelli* Genoæ facti ita dicti à similitudine cum parvis *Vermicellis* filamentosis: Duum sunt generum, albi & lutei, inque Nobilium & Generosorum culinis in jusculis & brodiis usurpantur, & analeptici habentur.

Pag. ead. post lin. 31. adde:

*Tritici species est, glumis adè arctè granis adherentibus, ut eas trituro non deponat.* R. Meth. A. p. 125.

Pag. 340. lin. 5. verbo [rarius] junge:

*Vires.* Plusquam *Hordeum* alit, ori grati Panis recens suavis est, & concoctu facilis Halica, ex *Zea* præparata, in aceto cocta lepras tollit; unguium scabrities extricat; incipientibus *Ægilopiis* medetur. Decoctur *Dysentericis* prodest. *Diosc.*

2. *Briza* *Offic.* monococcus *Ger.* *Zea* *Briza* dicta

dicta, seu Monococcus Germanica C. B. monococcus, sive simplex sive Briza Park. monococcus Briza quibusdam J. B. simplex & monococcus Briza Chab. St. Peters Korn. Spelt. Einforn. In Germania seritur. Ufu. Semen. Vires. Cum priore viribus convenit.

Ex Zeæ & Brizæ farina fit puls quem Crimnon Græci vocitant. Abundè alit, sed ægrè conficitur: alvum vehementius adstringit. Dioscorides.

3. Olyra Offic. Park. Triticum Amylæum Ger. Zea Amylea sive Olyra C. B. Theat. verna J. B. Deutscher Reiß. Hammel Korn. In Germania seritur. Tarde metitur. Ufu. Semen in culinis Germanicis. Vires. Cum Zea viribus pollet, sed minus aliquanto nutrit.

Fit quoque ex Olyra Crimnon.

#### IV. De Hordeo.

Pag. 340 pro 2da Specie Hordei, adde:

2. Zeopyrum Offic. seu Tritico-speltum C. B. Theat. sive Trittico-speltum Lobelii Park. Hordeum nudum Ger. nudum sive Gymnocrithon J. B. nudum sive Gymnocrithon Zeæ species & Zeopyrum quorundam Chab.. Triticum æstivum spicâ Hordei polystichii H. Ox. Nackte Gersten. Weizen Spelt. In Germania seritur. Ufu. Semen. Vires. Refrigerat, ut Hordeum, sitim sedat.

**S** Pica habit ore & e squamis compactili ab aliis di-  
gnoscitur. R. Meth. A. p. 126.

• Phalaris Offic. Ger. J. B. Chab. vulgaris Park.  
major semine albo C. B. Canarien Grass. Ca-  
narien Saamen. In Hispania & Gallia Nar-  
bonensi sponte oritur. Usu, Herba, Semen.  
Vires, Semen & Herbæ succum pota ad vesi-  
cæ dolores & cruciatus commendant veteres.  
R. H. p. 1248.

Pag. 342. post lin. 10. adde:

*X. De Sorgo.*

**C**ulmi altitudine & crassitie grani figurâ ad Mi-  
lium accedentis, magnitudine, jubâ erectâ à  
Milio aliisque frumentis paniculatis differt. R.  
Meth. A.

Sorghum Offic. Ger. Sorghî J. B. Milium  
Indicum Chab. Milium Arundinaceum sive  
Indicum semine subrotundo C. B. Theat. A-  
rundinaceum, subrotundo semine, Sorgho  
nominatum ejusd. Pin. Melica sive Sorghum  
Park. Sorg Saamen. Indianischer Hirse.  
In Italia seritur. Usu, Culmorum medulla, flos.  
Vires. Medulla contra Strumas, Flores ad Dy-  
senteriam & Fluorem muliebrem commendat  
Mattb.

*XI. De Lacryma Jobi.*

**P**aniculâ e glumis acerosis, nullum post se granum  
relinquentibus, compositâ, seminibus perforatis,  
ma-

*maximis, politi levoris, & invictæ duritiei, à glutinis separatis seu remotis, culmis arundinaceis. ab aliis culmiferis facile distinguitur. R. Meth, A. p. 126.*

Lacryma Jobi *Offic. Ger. Park. Job Clusii El. Bot. Jobi vel Mariæ Chab. Jobi multis, sive Milium Arundinaceum J. B. Milium arundinaceum, semine Lithospermi facie, maximo, durissimo Herm. Cat. Lithospermum arundinaceum fortè Dioscoridis & Plinii C. B. Spiobs: & hränen. In hortis colitur. Usu. Semen. Vires. Ad Calculum renum & vesicæ commendat. Lob.*

## XII. De Avena.

Pag. 342. post lin. 20. subjunge:

**A** Mylum ex hujus semine paratum apud *Wallos* in cibis æstimatur, & *Llunnery* dicitur.

A. 2. *Ægilops Offic. bromoides Ger. bromoides Belgarum Park. quibusdam aristis recurvis sive Avena pilosa J. B. Festuca utriculis lanugine flavescens C. B. Avena pilosa: Ægilops aristis recurvis. quorundam Chab sylvestris pilosa aristis recurvis H. Ox. Haber & walch. Wilder oder tauber Haber. Inter segetes frequens. Usu. Semen, Vires. Cum priorè convenit viribus.*

## XIII. De Festuca

**G** Ramen est paniculatum locustis squamosis & aristatis.

A. 1. Bromus *Offic.* sterilis *Ger.* herba sive Avena sterilis *Park.* Ægilops *Chab.* Matthiolo fortè J. B. Festuca avenacea sterilis elatior. C. B. Gauch: Haber. Taub: Haber. Ad sepes & in agrorum marginibus. Majo mense. *U.* Herba. *Vires.* Exiccatoriam vim habet, gravem oris halitum emendat. *Dioscorid.*

2. Festuca *Offic.* Italica *Ger.* altera capitulis duris C. B. sive Ægilops Narbonensis *Park.* sive Ægilops altera capitulis duris C. B. *Theat.* Gramen sive Festuca altera capitulis duris *Bot.* *Monsp.* Gersten: Swalch. Italianisch: Swalch. In Italia, Gallia Narbonensi, &c. vulgatissima. *U.* Semen. *Vires.* Exsiccat adstringendo citra calefactionem multam.

#### XIV. De Lilio.

Pag. ead. lin. ult. subjunge:

A. 2. Phœnix *Offic.* Lolium simile J. B. Lolium rubrum *Ger.* rubrum sive Phœnix *Park.* Gramen loliaceum angustiore folio & spica C. B. Mäuse Gerste. Mäuse Korn. Ad vias & in pascuis. *U.* Herba. *Vires.* Siccat & adstringit, alvum mensesque sistit, urinam infrænât. Locis nonnullis pro jumentorum pabulo feritur.

#### XV. De Alopecuro.

A Spica molli sericeâ, caudam vulpinam referente, dicta sunt hæc gramina. R. Meth. Grain. p.

173.

Alopecuros *Offic.* *Ger.* genuina *Park.* Gramen



men Alopecuros spica brevis J. B. Chab. Alopecuroides spica rotundiore C. B. Alopecurus spica rotundiore ejusd. Theat. Rosenstert. Fuchs's Schwanz. In Gallia & Italia reperitur. Usu. Herba,

Pag. 343. post lin. II. adde:

## XVII. De Gramine Dactyloide.

**A** Spicis velut in digitos explicatis, non tantum nomen accipit, sed à reliquis distinguitur.

I. Gramen Mannæ Offic. mannæ esculentum Ger. dactylon esculentum C. B. Ischæmon lativum sive Gramen Mannæ esculentum Park. Graminis genus, dens caninus tertius, Gramen mannæ Chab. genus Dens caninus tertius, sive Gramen primum vel Galli crus J. B. Manna Gras. Schwaden Gras. Himmel's Chau. In Germania, Polonia, &c. seritur. Usu. Semina, quæ parva sunt, oblonga, pellicida, coloris albi, saporis exigui, decorticata esse videntur instar Oryzæ. Vires. Oryzæ qualitates habet, mediocriter ventrem adstringit, mammarum durities solvit; in cibis mediocriter alit. Matth. Admirandarum virium esse dicuntur ad Rachitidem puerorum persanandam. Vide D. Marlow's observationes de seminibus Russicis.

Cujusnam autem plantæ semina sint inter eruditos hujus seculi non convenit, nonnullis Palmæ cujusdam Sago cognatæ picem granulata esse existimantibus, aliis Graminis Mannæ semina; cum quibus & ego con-

sentio, atque idcirco ea sic collocavi & denominavi: qua in sententia valdè confirmatus non ita pridem fui ab ingeniosissimo viro D. Joanne Philippo Breynio M.D. cui in peregrinatione sua *Anglicana* cum *Brantria* me benevolè inviseret, ea ostendi.

A. 2. Gramen dactylon *Offic.* dactylon folio arundinaceo majus; aculeatum forte *Plinio C. B.* dactylon folio arundinaceo majus *Ejusd. Theat.* dactylon radice repente five *Officinarum T. Inst.* dactyloides radice repente *Ger.* repens cum paniculis graminis *Mannæ J. B.* repens cum paniculis graminis *Mannæ*; Gramen dactyloides multis *Chab.* canarium *Ischæmi* paniculis *Park.* *Hahnen-Fuß* *Gras.* In arvis & vinetis, locisque arenosis. *Ufu.* Radix. *Vires.* Cum Gramine Canino viribus pollet.

### XVIII. De Arundine.

Pag. eadem pro 2. 3. 4. & 5ta speciebus  
Arundinis adde:

2. **A** Rundo scriptoria *Offic.* *Ger.* J. B. scriptoria atro-rubens *C. B.* Harundo minor five Elegia *Park.* *Schreib-Rohr.* In locis humidis *Græciæ, Italiæ, &c.* *Ufu.* Calamus.

3. Arundo donax *Offic.* *Park* Cypria *Ger.* fativa *C. B.* maxima & hortensis *J. B.* *Chab.* *Groß-Rohr.* *Cyperisch-Rohr.* In Italia, Hispania, &c. *Ufu.* Radix. *Vires.* Cum Arundine vallatoria viribus convenit, *Diosc.*

4. *Arundo Tabaxifera* *Offic.* Mambu *Pison.* Indica maxima arborea cortice spinoso *Hernanni Syen. in not.* arborescens *Tabaxifera C. B. Theat.* arbor in qua humor lacteus gignitur, qui *Tabaxir Avicennæ & Arabibus* dicitur *Ejusd. Pin.* arborea Mambu vel Bambu dicta *P. Al.* Canna ingens Mambu vel Bambu dicta *Park, Tabaxir Garcix & Acoftæ Chab. Bambu & Bamboes Nienhov. Leg. Ily H. M. Bambus Rohr.* In Malabar crescit. *Ufu.* *Tabaxir. Vires.* Propter vim insignem medicamentosam magni fit, & ab Arabibus, &c. avidè coëmitur.

A. 5. *Gramen Arundinaceum* *Offic.* arundinaceum paniculâ spadiceâ molli majus *C. B.* tomentosum arundinaceum *Ger.* spicâ candidâ & serici modo lucens *J. B.* plumosum *Lobellii,* spicâ candidâ & serici modo lucens *Chab.* *Calamogrostis* sive *Gramen tomentosum Park.* *Arundo sylvatica* elatior paniculâ molli & serici modo lucenti *H. Ox. Rieds Grass.* In sylvosis humidis, *Ufu.* *Radix. Vires.* Cum *Arundine* convenit.

## XIX. De Calamo Saccharifera.

Pag. 344. lin. 12. adde :

2. **A** *Rundo farcta* atro rubens *Offic.* farcta maxima atro rubens *C. B.* nastos sive farcta crassa & major *J. B.* nastos sive farcta, crassa & major : *calamus Toxicus Theophrasti Chab.* farcta decima *Park. icon. Riet. Spanisch Rohr.* Ex *India & Syria* adfertur.

3. Arundo farcta flava *Offic. C. B.* farcta *Ger.* farcta nona *Park. icon.* nastos sive farcta, seu toxica, & gracilis plicatilis *J. B.* nastos, seu farcta, sive toxica gracilis & plicatilis *Indica Chab. Pfeil-Rohr.* Ex Syria adfertur.

4. Arundo farcta Indica *Offic.* farcta Indiæ Orientalis Sanguinem Draconis manans *H. Ox.* Drachen-Blut *Rohr.* In India Orientali crescit. *Usu.* Succus è fructu Drachen-Blut in granis dicta.

Modus rubram materiam colligendi est, fructum in aqua calida macerare, donec materia illa rubra in fundo vasis subsideat: unde aqua aut evaporata aut effusa concretis ex fundo vasis colligitur. Hæc rubra materia ea est ex qua fit *Vernix* qua Cistæ & Pyxides *Ghinenses* obduci solent *H. Ox.*

5. Calamus odoratus *Offic.* aromaticus *Chab.* aromaticus Syriacus *C. B.* aromaticus verus quibusdam *J. B.* aromaticus Matthioli *Park.* Arundo Syriaca aromatica foliis ex adverso sitis *H. Ox.* Calamus odoratus *Camel. Syllab.* Aromatisch *Rohr/Calmus.* In India oritur. In Officinis nostris Anglicanis nunquam occurrit.

## SECTIO XXV.

De Herbis Anomalis seu incertæ  
Sedis.

## I. De Tribulo aquatico.

Pag. 344. lin. ult. verbo. *Nuces* adde :

**H** Erba. *Vires.* Noces dum recentes calculis juvant. Herba refrigerat & inspissat, inflammationes sedat, ulcera oris & gingivas sanat.

## II. De Stratiote.

**N** ilo innatat Aizoi arborescentis foliis, pro radice tenuissima fibrarum filamenta in aquas demittens; Flores nulli vel nondum observati. R. Meth. A. p. 129.

Stratiotes *Offic.* Ægyptia J. B. Ægyptia Dioscoridis *Velling.* Ægyptia, Stratiotes Antiquorum *Chab.* aquatica vera Dioscoridis & Ægyptiaca *Park.* Lenticula palustris Ægyptiaca, sive Stratiotes aquatica foliis Sedo majore latioribus C. B. Wasser Seegrün/Ägyptische Wasser Linse. In Nilo oritur. *Usu.* Folia *Vires.* Refrigerat Sanguinem sistit, inflammationes sedat.

## III. De Acantho.

**A** Canthus sylvestris *Offic.* *Park.* sylvestris aculeatus *Ger.* aculeatus C. B. sylvestris sive Branca Ursina spinosa *Chab.* Carduus acan-

canthus sive Branca Ursina spinosa J. B. *Wils.*  
*de Bären Klau.* In hortis Botanicis colitur.  
 Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum priore vi-  
 ribus convenit.

#### IV. De Leontopetalo.

**H**Uc radix tuberosa ; flores Ranunculi , stellati,  
 pentapetali R. Meth. A. p. 129.

1. Leontopetalon *Offic.* Ger. C. B. Chab. quo-  
 rundam J. B. foliis costæ ramosæ innascenti-  
 bus T. Coroll. Löwentap. Schwarze Niebe.  
 In Apulia nascitur, Serius floret. *Usu.* Radix.  
*Vires.* Serpentium ictibus auxiliatur *Diosc.* Di-  
 gerendi facultatem & exiccandi, excalfacien-  
 dique possidet. *Galen.*

2. Cryfogonum *Offic.* Ger. Park. Dioscoridis  
 quibusdam J. B. Chab. Leontopetalo affinis fo-  
 liis Quernis C. B. Leontopetalo foliis costæ  
 simplici innascentibus T. Coroll. Roth: Niebe.  
 In Syria oritur. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum priore  
 convenit.

Pag. 345. lin. ult. subjunge :

#### VI. De Persicaria siliquosa.

**C**Aulis flavicans pellucidus , folia Mercurialis ;  
 Flores flavi penduli calcari donati. Siliquæ bre-  
 ves per maturitatem dissilientes & semina projici-  
 entes.

A. Persicaria siliquosa *Offic.* Ger. Balsamina  
 lutea sive Noli me tangere C. B. Herba im-  
 patiens seu Noli me tangere , flores petalo  
 luteo H. Ox. Noli me tangere J. B. Chab. Mer-  
 curialis sylvestris, Noli me tangere dicta ; si-

ve *Perficaria siliquosa* Park. Bild Balsam  
Kraut. Spring Saamen Kraut. In hortis  
reperitur. *Ufu.* Herba. *Vires.* Vi diuretica in-  
signi pollet, ut Diabetem inducat. Faculta-  
te fertur perniciosa & deleteria. *Dod.*

## VII. De *Hypecoo.*

**C**ujus nota folia tenuiter dissecta: Siliquæ longæ  
planæ articulatae, in singulis internodiis singula  
semina longiuscula continentes. R. Meth. A. p. 129.

1. *Hypecoon Offic.* C. B. *Chab.* siliquosum  
J. B. siliquis erectis articulatis incurvis *H. Ox.*  
legitimum *Clusii Park.* *Cyminum cornicula-  
tum* sive *Hypecoon Clusii Ger.* Horns Rüm-  
mel. In Gallia Narbonensi sponte oritur.  
Majo floret. *Ufu.* Herba. *Succus.* *Vires.* Natura  
eadem quæ *Papaveris succo Diosc.* Ejus succus  
instar *Opii* somnum inducit. *D. Herm.*

2. *Cuminum siliquosum Offic. Ger.* *Hypecoi*  
altera species C. B. *Hypecoum* alterum *Park.*  
*Hypecoon* siliquis propendentibus non arti-  
culatis bivalvibus incurvis *H. Ox.* Scho-  
tichter wilder Rüm-  
mel. In Hispania reperitur.  
Majo floret. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum priore vi-  
ribus convenit.

## VIII. De *Epimedio.*

**C**ujus nota sunt, Cauliculi in ternos ramulos, ramu-  
li in ternos pediculos folia sustinentes, *Hedera-  
ceorum* ferè figurâ, divisi; flores tetrapetali gemi-  
nati aut potius octopetali; siliquæ bivalves, tenues;  
semina compressa rotunda. R. Meth. A. p. 129.

*Epimedium Offic. Ger. C. B. Park.* *Dodonæi*  
El.

*El. Bot.* quorundam *J. B.* quorundam floribus purpureis cum apicibus luteis *Chab.* *Bischoffs Hut.* In Hortis apud nos reperitur. *Ufu.* Radix, Folia, *Vires.* Utraque conceptum adimit.

### *XI. De Tribulo terrestri*

**F**olia huic Lenticulae aut Ciceris; flores pentapetalii; fructus muricati, è quinque velut triangularibus partibus compositi, quarum cuspides in centro concurrunt, reliqui anguli in longam & acutam spinam exeunt. *R. Meth. A. p. 130.*

*Tribulus terrestris Offic. Ger. Park. J. B. Chab. terrestris Ciceris folio, seminum integumento aculeato C. B. Burzel Dorn.* In Italia reperitur. Julio floret. *Ufu.* Herba, semen. *Vires.* Refrigerat, inspissat, inflammationes juvat, ulcera oris putredinesque gingivarum sanat. Semen contra venena commendatur; ictos à Serpentibus recreat.



## CLASSIS TERTIA.

SEU

## DENDROLOGIA.

## SECTIO PRIMA.

De

Arboribus caudice simplici  
non ramofo.

## I. De Palma.

Pag. 346. post. lineam 26. adde :

**P**ALMA oleosa *Offic.* coccifera ex Guinea C. B. Guinea J. B. foliorum pediculis, fructu pruniformi luteo oleoso *Cat. Jamaic.* Nucifera Guineensibus incolis Palma Adyl *Jonf. D.* Arbor Manicongo, Sambaancie Palma *Chab.* Nucula Indica altera *Park.* An Nucula *Ger. emac.* Palm; oder Dehle Baum. In Guinea spontanea crescit. *Usu.* Oleum seu potiùs Unguentum crassum Aurantii coloris, odore suavi, ex hoc fructu confectum ad hunc modum: Nempe carni è nucleis avulsæ, adjiciunt aquæ ferventis bonam partem; deinde jubent ut pulpa in lebetè diu agitetur commisceaturque exactè super ignem, deinde remotum ab igne lebe-

R

tem

tem tamdiu stare sinunt, donec amurca omnis in fundum subsiderit; tandem oleum aquæ supernatans cochleari excipiunt: quo exhausto aqua fervente iterum effusâ operationem repetunt. Eligenda est recens non rancidum, coloris Aurantii, odoris suavis, consistentiæ Butyri. *Vires.* Extrinsicus Anodynum est, Nervos confortat, dolores Podagricos mitigat, lassitudines juvat, contractiones relaxat.

3. *Coccus Offic. Nieremberg.* Palma Indica Nucifera Coccus dicta *R. H. 1356.* nucifera Indica major *Jons. D.* ducifera Americana major prima Cocoeire seu Coqueire *Ejusd.* Indica coccifera angulosa *C. B.* nucifera arbor *J. B.* coccifera, seu Nux Indica, Indis Lubi *Camel. Syllab.* Indica nucifera *Chab.* major coccifera *H. Beaum.* sive Nux Indica vulgaris ferens coccos *Park.* Nux Indica & Cocci vocata arbor *Hern.* Indica *Chab.* Indica arbor *Ger.* Indica vulgaris *Pis. Mant.* Indica Coquo Lusitanis dicta *Bont. in Garc.* Inaja Guacuiba vulgè Coccus *Pis.* Inaja-gacuiba cujus fructus Inaja-guaca *Marg.* Tenga *H. M.* Coco oder *Cofus & Nussbaum.* Utriusque Indiæ alumna est *Ufu.* Fructus medulla, liquor arboris Suri dictus, liquor nucleo contentus. *Vires.* Liquorem seu Vinum Suri Phthificis mirè conferre aiunt, & valdè opportunum esse urinæ renumque vitiiis laborantibus. E nucleis confusis atque expressis lac extorquetur citra ignis operam, lumbricis enecandis utilissimum.

mum. Liqueor nucleo contentus siti febrilibusque extinguendis calori que contemperando idoneus est. *R. H.*

4. Coccus de Maldiva *Offic. Park.* de Maldiva sive Nux Indica ad venena celebrata *Chab.* Palma coccifera figura Ovali *C. B.* Nux Indica ad venena celebris sive Coccus de Maldiva *C. B.* Tavarcare quibusdam *R. H.* sive Nux Maldivensium *Pis. Mant.* Maldivische Coccus-Nuß. In India Orientali reperitur. *Ufu.* Fructus magnus figura ovali, cortice nigro, medulla candida, porosa, sapore excellenti. *Vires.* Laudatur adversus venena, ad Colic dolores, Paralyfin, Epilepsiam, aliosque nervorum affectus. Specificam qualitatem promovendi partum difficilem habet.

5. Ebenus Æthiopica *Offic.* Palma Haira *Park.* Americana spinosa *C. B.* tota spinosa major, fructu pruniformi *C. Jamaic.* Brasiliensis sexta *Airi Pis.* Portoricensis spinosissima vini-fera *Hort. Beaum.* Palmæ facie Haira *J. B.* Ebenus *Chab.* Haira sive Ayri *Jons. D.* Eben-Holz Eben-Baum. In America frequens reperitur. *Ufu.* Lignum nigrum densissimum. *Vires.* De viribus Ebeni vide pag. 435. Pharmacologiæ nostræ.

In priore meo libro duas Ebeni species memini, quarum hodie usus est inter mechanicos. Verum an utervis earum vera & genuina Antiquorum Ebenus sit, adhuc controvertitur. *Dioscorides* duas describit species. Prima ex Æthiopia defertur nigra, nullos

habens venarum discursus, factitii cornus levore: cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens, &c. Altera ex India lineis candidis & fulvis intercurrentibus, eademque maculis prædita: cæterum prior bonitate antecedit. Plinius in ejus descriptione inquit: Rara est arbor, quam nullam aliam nisi Palmarum generis decuit. Unde concludo Plantam quam hîc exhibeo Ebenum Æthiopicam esse, & illam *Helbigii* Indicam.

Ex quo hæc scripsi, veram Ebenum Indicam à D. *Camello* descriptam inveni: quæ cum Baccifera sit arbor in tribu illa inveniet Lector.

Pag. 349. lin. 15. subjunge:

Fructus hujus arboris insignis etiam usûs est; à D. *Marloe* Nux Malabarensis dictus Nuce Moschata cui aliàs valdè similis, major est, etiam compressus cum umbilico in medio, altera extremitate rotunda. *Vires.* Admirandarum virium est in Scrophulis curandis. Sanguinem corrigit, Humores noxios alterat; Hepar & Lienem emendat, facultatem digestivam restituit: totumque corporis habitum in meliorem mutat.

NB. Fructus immaturus vertiginem inducit, non secus ac si sumpto vino quis ebrietatem contraxerit.

7. *Sagou Offic.* Palma prunifera Japonica *Herm. Cat.* Japonica spinosis pediculis Polypodii folio *P. B. P.* Indica caudice in annulos protuberantes distinctio, fructu Bruniformi

R. H. 1360. vinifera Belgarum *Breyne*, Prod. 1. farinifera Japonica Sateclou Japonensis *Ejusd.* P. 2. Palmam referens arbor farinifera C. B. Arbor farinifera *Park.* Todda-panna, seu Montta-panna *H. M.* Sagou-Baum / Indianisch Brod. In India Orientali multis in locis nascitur. *Ufu.* Fæces medullæ hujus arboris facîle solubiles Cari confecta quoad magnitudine referentes, sapore aquoso, colore ex fusco albicante, odoris nullius. Hoc autem modo conficitur *Sagou.* Arbore decisa & in taleas fissâ medulla ruspando eximitur, quæ in mortario grandi pistillo ligneo strenuè contunditur; deinde aquâ probè commixtâ, per pannum percolatur, in alveum satis capacem, in quem substantia medullæ defluit. Levioribus duntaxat furfuribus & quisquiliis in panno remanentibus, quæ ut inutiles abjiciuntur: Quod in alveum decidit subsidere permittitur, quod brevi fit: Dein aqua è læcibus elutriatâ, ex iisdem efformantur placentulæ, è quibus in clibano coctis Panis efficitur satis probus, ab Indigenis in inopia Orizæ esitatus; vel eadem granulata & exsiccata in Europæas regiones transportantur. *Vires.* A nonnullis valdè nutritiva & analeptica habetur, omnisque generis fluxiones sistere dicitur.

Utrum *Sagou* sit medulla trunci aut gemmæ alicujus Palmæ seu Gummi arboris non amplius quæstio est, medullam esse omnibus consentientibus; verùm cujus generis Pal-

mæ nondum extra controversiam est, inter Botánicos apprimè gnaros, aliis aliam & aliam arborem esse opinantibus. *C. Baubinus* medullam gemmæ seu capitis Palmæ Regalis dictæ Barbadoensis seu Jamaicaensis *Rohylbaum*. dictæ referendis facit. Quod *Clusius* & omnes nostri nuperi peregrinatores negant, medullam trunci esse uno ore affirmantes. Neque hîc cessat controversia; siquidem *Robertus Knox* nauclerus, qui per multos annos in *Ceylona* Insula captivus detinebatur, medullam *Codda Panna* H. M. Talipot *Singalensibus* dictæ esse asserit. In cujus sententiam initio inclinabat eruditissimus vir *D. Jobannes Raius*. Verum *Horti Malabarici* autoribus medullam *Todde Pannæ* esse ex qua *Sagou* conficitur affirmantibus; *Pisone* etiam & *Margravio* duas arborum species in *Brasilia* nascentes, & utraque Palmas describentibus, quarum Medulla ad Panem conficiendum ab indigenis usitata erat; obvium est conjicere plures *Palmarum* species *Sagou* præbere. Sed vera & genuina species è medulla *Todde Pannæ* conficitur ut *D. Raius* à *D. Tancredo Robinson* M. D. certior factus est, qui ejus iconem inter alia rariora ad *Societatem Regiam Londinensem* ex *India Orientali* transmissam in ejusdem Societatis Muséo, & nos etiam vidimus.

8. *Chamæhiphes* *Offic.* *Chamærepis* *Theoph.* Palma minor *C. B.* humilis seu *Chamæripes*, sive Palma humilis Hispanica spinosa & non spinosa *J. B.* *Chab.* folio plicatili seu flabelliformi

formi humilis *R. H. p. 1369.* humilis sive Chamærrhiphes vel Palmites *Park.* Palmites sive Chamærrhiphes *Ger.* Niedriger Palm-Baum / Kleiner Palm-Baum. In Hispania, Lusitania; & Italia crescit. *Ufu.* Bacca. *Vires.* Contra omnes fluxiones vi sua adstringenti commendantur. Folia ad Sportulas, Tegetes & Scopas parandas incisa sunt.

9. Palma Sanguis Draconis fundens altera *Offic.* foliis & caudice undique spinis longis acutissimis nigris armata *D. Scherard.* Ein ander Drachen-Blut-Baum. In Amboyna oritur. *Ufu.* Resina è fructu exstillans.

Ex quo librum priorem in lucem emisi, literis aliquot ab ingeniosissimo illo Botanico *D. Guilielmo Scherard. LL. D.* nunc Consule Societatis Mercatorum Turcicorum Smyrensiū certior factus sum, tres dari species arborum quæ Sanguinem Draconis præbent. 1. Illam *Clusii* à me jam editam *p. 463.* libri supradicti quæ propriè Palma est, & huic Capiti inferi debet. 2. Quam hic exhibeo, cujus fructus, *Fructui squamosa Clusii Exot. lib. 2. cap. 3.* similis est, Nucis Myristicæ circiter magnitudine, squamis tectus, inter quas & corticem continetur nucleus parvus, qui concusso fructu crepitat. 3. Draco arbor, &c. *Hort. Amstel.* quam inter arbores siliquosas disposui. *Pomet.* etiam in *Histoire de Drogues* pag. 259. tres Sanguinis Draconis species enumerat, quarum primam Indicam vocat, estque *Clusiana*: *adam*, Canariensem appellat,

cujus duas icones exhibet diverfarum arborum, quarum prima filiquofa eft foliorum anguftiorum, quæ fortè tertia eft D. *Scherard*. 2dam foliis latioribus depingit, fructu Alkekengi referente. 3tiam *Pometus* falſam vocat & ex Hollandia allatam ait. *Quin & Camellus* S. J. duas Sanguinis Draconis ſpecies memorat, quarum primam *Sanguinis Draconis Ofſcinarum* vocat, qui idem eſt cum *Cluſiano*, cujus gummi *Camellus* ſic deſcribit, *Pulverifatus coloris eſt vilioris Laccæ aut Boli ordinariae*. Unde eum Sanguinem noſtrum Draconis in maſſis ſeu glebis eſſe exiſtimo. Secundum *Sanguinis Draconis Piſtorum Cinnabarin Dioſcorides* denominat, qui eſt *Sanguis noſter Draconis in guttis ſeu guttatus*; verùm cujus arboris ſucus ſit non dicit, dubitat tamen an non producat à quadam Arbore Peruviana à *Monarde* deſcripta. Fortaſſe idem fuerit cum gummi quod à ligno Nephritico deſluere dicit. Alia fortaſſe præter has Sanguinis Draconis ſpecies eſt cujus notitiam à D. *Hyde* habuit ingenioſus Botanicus D. *Jacobus Bobart*, à Cana ſeu Arundine hauſti, quam in Capite Arundinum in hoc libro diſpoſui. Verùm an differat à *Scherardina* 2da non auſim determinare: Quamvis enim in notis nonnullis deſcriptiones conveniunt, tamen adeò breves ſunt, ut de illis certò judicare aut definire non poſſimus.

Hujus fructum à D. *Scherardo* ex Hollandia, cum in itinere eſſet verſus Smyrnam accepi  
&



& fragmenta quædam ipsius gummi, admodum puri & cum purissimo Sanguine Draconis in guttis colore convenientis.

## II. De Musa.

1. **M**usa *Offic.* Serapionis *Ger.* arbor *J. B.* *Park.* caudice viridi, fructu longiore, falcato, anguloso *Cat. Jamaic.* aut Amhusa Arabibus, & Persis Daracht *Chab.* Muza ex flore Sinensi *Jons. D. icon.* Palma humilis longis latisque foliis *C. B.* Ficus Indica fructu racemoso foliis oblongis *ejusd.* Indica racemosa foliis & fructu amplissimis, Musa Arabibus dicta *P. Alm.* exotica cruciata *Sterb. Cit. cult.* Ficoides sive Ficus Indica longissimo latissimoque folio, Musa Serapionis dicta *H. Beaum.* seu Ficus Indica longissimo latissimoque folio, fructu longissimo, Musa Serapionis dicta *Herm. Cat. Bala H. M.* Bananiera *Pis. Marog.* Mantain-Baum/Musa-Baum. Utriusque Indiæ incola est. *Usu.* Fructus. *Vires.* Multum nutrit, Urinam cit, Venerem stimulat.

2. Banana *Offic.* Musa, caudice maculato fructu recto, rotundo brevior odorato *Cat. Jamaic.* Ficoides seu Ficus Indica longissimo latissimoque folio, caule maculato, fructu minore *H. Beaum. Senioriæ Jons. D. Pacoeira Pis. Marog.* Bonana-Baum. In America colitur. *Usu.* Fructus. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

## SECTIO SECUNDA.

### Arbores fructu à flore remoto Glandiferæ.

Pag. 352. post lin. 13. adde:

#### III. De Fago.

**N**otæ sunt, nux duplex triquetra eidem tegumento inclusa, aspero, hirsuto, quadripartito. R. Meth. A. p. 140.

A. Fagus *Offic.* C. B. Ger. Park. Chab. Fagus Latinorum, Oxya Græcorum J. B. Büchel Buch-Baum / Büchen-Holz. In meridionalibus Angliæ frequens. Autumno fructum fert. *Usu.* Folia. *Vires.* Tusa & imposita calidis tumoribus profunt easque discutunt, & torpentia membra corroborant. Esitata labiorum, gingivarumque vitiis mirificè opitulantur. *Matth.*

#### V. De Quercu.

Pag. 353. post lin. 8. adde:

2. **P**Hagus & Esculus *Offic.* vel Esculus J. B. Chab. sive Esculus Park. Quercus parva sive Phagus Græcorum & Esculus Plinii C. B. Eßbare oder süsse Eichel. In Græcia & Dalmatia reperitur. *Usu.* Cortex, Folia, Glandes, Caliculæ. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. Cerrus & Ægilops *Offic.* Cerrus, Corris, Ægilops Idæorum, Aspris Macedonum, &  
Far-

Farnia Italorum *Chab.* Cerrus *Ægilops* *Aspris*  
*Theophrasti* putata *J. B.* Cerris majore glande  
*Ger.* *Ægilops* sive Cerrus mas majore glande  
*Park.* *Quercus* calyce echinato glande majore  
*C. B.* *Cer/Eichel/bittere Eiche.* In Italia nascitur.  
*Ufu.* Radix, Folia, Cortex, Glandes.  
*Vires.* Radix Scorpionibus adversatur, Folia,  
 Cortex & Glandes fluxiones sistunt.

4. Robur *Offic.* tertia *Clusii J. B.* sive *Galla*  
 major altera *Ger. emac.* sive *Quercus* cum  
 gallis *Chab.* cum galla majore rugosa *Park.*  
*Quercus* gallam exiguæ nucis magnitudine  
 ferens *C. B.* *Groß Ball-Äpfel-Baum / Hagz*  
*Eiche.* In Istria & Pannonia crescit. *Ufu.* *Gallæ*  
 seu tubercula excrementitia, nidus cujusdam  
 Insecti rotundi.

## VI. De Ilice.

*Cujus Nota, Folia dentata aut aculeata, perpetua.*  
*R. Meth. A. p. 140.*

Pag. 353. post lin. ult. adde:

2. *Smilax* arborea *Offic.* *Arcadum* glandifera  
 major *Park.* glandifera arbor *Chab.* *Dale-*  
*champi* *J. B.* *Ilex* arboræa *ejusd. & Chab.* ma-  
 jor glandifera *Ger.* major aculeata & non acu-  
 leata *Park.* oblongo serrato folio *C. B.* folio  
 rotundiore molli modiceque finuato, sive  
*Smilax* *Theophrasti ejusd.* *Grosse Scharlach-*  
*Eiche / Stech-Eiche / Stein-Palme.* In Italia &  
 Gallia *Narbonensi* frequens occurrit. *Ufu.*  
 Cortex, Folia, Glans. *Vires.* Vehementius  
 astringit *Ilex* quam *Quercus.*

3. Phellodrys *Offic. Chab.* alba latifolia & angustifolia *Park.* candicans latifolia, mollior aculeata & candicans angustifolia serrata *C. B.* Nigra Dalechampii *J. B.* Lorbeer-Eiche Corck-Eiche. In Dalmatia & Græcia reperitur. *Ufu.* Folia, Cortex, Glans, *Vires.* Cum Quercu viribus convenit.

## Arbores fructu à flore remoto Coniferæ.

### VIII. De Abiete.

Pag. 356. lin. 5. subjunge:

**A**B ingenioso amico meo D. Davide Kriegs M. D. certior factus sum solam differentiam inter Resinam & Picem Burgundicam esse in coctione Picis Burgundicæ, ex aheno exemptæ cum primum bullire incipit, atque idcirco mollior est, & coloris magis brunnei. Hoc observavit in *Saxonia* solo suo natali.

### IX. De Pinu.

Pag. 357. post lin. 10. adde:

3. **P**inus maritima *Offic.* sylvestris montana *Ger.* maritima major *ejusd.* & *C. B.* maritima Theophrasti Lobelio *J. B.* *Chab.* sylvestris maritima, conis firmiter ramis adhærentibus *ejusd.* & *J. B.* Meer-Sichten. In Gallia Narbonensi oritur. *Ufu.* Cortex, Folia, Resina. *Vires.* Cum præcedentibus viribus convenit.

Pag. 359. post. lin. 16. adde:

### XIV. De Arbore Vitæ.

**N**Otæ sunt Folia squamatim incumbentia, ramuli compressi, conuli oblongi è squamis compositi. R. Meth. A. p. 138.

Arbor vitæ *Offic.* Ger. Park. vitæ sive Paradisiaca *Chab.* vitæ sive Paradisiaca vulgò dicta, odorata ad Sabinam accedens J. B. Thuya Theophrasti C. B. Baum des Lebens. Americæ incola est, apud nos autem in hortis curiosorum reperitur. *Usu.* Folia. *Vires.* Digerit & abstergit, partium est tenuium.

### XV. De Alno.

**A**Rbor est Julifera, fructum squamoso conoide, folio Coryli. R. Meth. A. p. 138.

A. Alnus *Offic.* Ger. *Chab.* vulgaris J. B. Park. rotundifolia glutinosa viridis C. B. Erlenz oder Elsen-Baum/ Eller-Baum. In aquosis gaudet. *Usu.* Cortex, Folia. *Vires.* Cortex siccatur & astringit. Folia viridia imposita tumores discutunt & inflammationes restinguunt, Traumatica sunt internè sumpta.

Arbo-

Arbores flore à fructu remoto  
Bacciferæ.

XVII. De Junipero.

Pag. 360. lin. ult. subjunge:

2. JUNIPERUS major *Offic.* major baccâ cœrâ-  
leâ C. B. maxima Ger. maxima Illyrica  
*Park.* J. B. *Chab.* Wachholder-Baum / Kranz-  
met-Baum. In Græcia provenit. *Usu.* Li-  
gnum, Baccæ. *Vires.* Cum priore viribus  
convenit.

XVIII. De Oxicedro.

**N**Otae sunt Folia Cupressina; terna in unoquoque  
acino officula dura. R. Meth. A. p. 141.

1. Oxycedrus *Offic.* Lycia Ger. Cedrus fo-  
lio Cupressi major, fructu flavescente C. B.  
folio Cupressi media majoribus baccis, & fo-  
lio Cupressi minor *ejusd.* Lycia retusa Bello-  
nio dicta J. B. sive Oxycedrus Lycia *Chab.*  
Phœnicea folio Cupressi *Park.* Juniperus fo-  
lio Cupressi major fructu flavescente *Herm.*  
*Cat.* major Dioscoridis Clusio *P. Al.* folio Cu-  
pressi media majoribus baccis teretifolia *ejusd.*  
Ceder-Baum aus Phœnicia. Ceder-Baum mit  
grossen Beeren. In Hortis Botanicorum repe-  
ritur. *Usu.* Lignum, Bacca. *Vires.* Cum Ju-  
nipero ut in externa facie, ita in viribus con-  
venit.

In priori meo libro Olibanum exhibui inter minùs cognita, & varias Autorum de Arbore Thurifera opiniones recensui. Post divulgatum illud Opusculum, Autorem quendam vidi qui diserte affirmat, Arborem hanc in *Carolina* gummi præbere adeò simile vero Olibano ut cum casu quodam miscuisset particulas gummi à se ibi collectas, cum Olibano ab *Europa* allato, tantùm fuisse eorum similitudinem observavit, ut particulas earum à se mutuo separare non potuerit, undè concludit hanc Arborem esse quæ Olibanum producit.

2. *Sabina baccifera* *Offic.* *Ger.* *Park.* *J. B.* *baccifera major* *Park.* *folio Cupressi* *C. B.* *folio Cupressi altera ejusd.* *Cedrus baccifera* fructu minore cœruleo *R. H.* *Juniperus Alpina*, *Sabinam* referens *P. Al.* *Beerens-tragend* *Sages* *Baum* / *Sewen-Baum*. In hortis curiosorum nonnunquam colitur. *Usu.* *Folia.* *Vires.* Cum *Sabina* viribus convenire creditur.

## XIX. De Taxo.

*Nota* sunt, *Folia molliora*, *saturo virore prædita*, *pedunculatim circa ramulos disposita*; *Baccae unicam intus granum continentem*. *R. Meth. A.* p. 141.

*A.* *Taxus* *Offic.* *Ger.* *C. B.* *J. B.* *Park.* *Chab.* *Eiben* oder *Jben*-*Baum* / *Taxus-Baum*. In montosis sylvis & sepibus. Quæ de facultate venenosa & lethifera hujus arboris apud veteres habentur, an vera sint necne contraria

ria recentiorum experimenta dubium faciunt.  
*R. Synop. vid. ejusd. Hist. p. 1416.*

## Arbores flore à fructu remoto Lanigeræ.

### XX. De Populo.

Pag. 361. post. lin. 14. adde:

2. **A.** Populus alba *Offic. Ger. Park. Chab. alba*  
 folio majore *Jonsf. D. alba λεύκη J. B.*  
 alba (quæ λεύκη ab albedine dicitur) majori-  
 bus foliis *C. B. Weiß Pappel-Baum/weiß Papp-*  
*pel-Weiden. In aquosis gaudet. Usu. Cortex.*  
*Vires. In dolore Ischiadico, intus & extra, in*  
*Stranguria, & in ambustis adhibetur. R. Synop.*

**A. 3.** Populus tremula *Offic. C. B. tremula*  
 sive Libyca *Jonsf. D. Libyca Ger. Park. Libyca*  
*Plinii, κερκίς Theophrasti J. B. Libyca Cercis*  
*Theophrasti Chab. Lybischer Pappel-Baum/*  
*Zitter-Pappeln / Aspen oder Espen. In sylvis &*  
*locis uliginosis. Usu. Folia. Vires. Cum Po-*  
*pulo nigro viribus convenire creditur.*

### XXI. De Salice.

Pag. eadem lin. ult. adde:

**A. 2.** Salix rubens *Offic. vulgaris rubens C.*  
*B. angustifolia purpurea seu nigra Park. ru-*  
*bra minimè fragilis folio longo angusto J. B.*  
*Jonsf. D. Chab. folio utrinque glauco, vimini-*  
*bus rubris C. C. Cat. Angl. Rohr Weiden-Baum.*  
*In aquosis gaudet. Usu. Folia, Cortex. Vires.*  
*Cum priore viribus convenit.*



A. 3. *Salix helice* *Offic.* helice *Theophrasti* *Park.* rosea *ejusd.* rosea *Anglica* *Ger.* humilis capitulo squamoso *C. B.* tenuior, folio minore utrinque glabro fragilis *J. B. Jons. D. Chab.* humilior foliis angustis subcœruleis ex adverso binis *R. H. R. Synop.* Gelbe Baum Weiden. Kleine Weiden. Juxta torrentes crescit.

A. 4. *Salix nigra* *Offic.* folio *Amygdalino* utrinque virente aurito *C. B. Jons. D.* Spontanea *Amygdalino* folio fragilis auriculata *J. B. Chab.* viminalis nigra *Park.* folio splendente auriculato flexilis *C. C. Cat. Angl. R. H. R. Synop.* Glänzende Weiden. Bläß Weiden. In *Salicetis* reperitur.

Arbores flore à fructu remoto  
Vasculiferæ.

## XXII. De Ostry.

**N**otæ cujus sunt, Putamen fructus alatum seu ligula foliaceâ auctum; folia Ulmi aut Fagi. *R. Meth.* p. 140.

A. *Ostrys* *Offic.* sive *Ostrya* *Park.* *Ostrya* *Ulmô* similis, fructu in umboilicis foliaceis *C. B. Jons. D.* *Fagus* sepium *Chab.* sepium vulgò, *Ostrys* *Theophrasti* *J. B.* *Carpinus* *Matthioli* *Herm. Cat.* *Betulus* sive *Carpinus* *Ger.* *Aceri* cognata foliis oblongis rugosis serratis, ad *Ulmum* accedentibus, vasculis disjunctis, membranis foliaceis, seminibus ipsis appositis pluribus confertis *P. Al. Heek. oder Hage. Büchen. Stein. Büchen.* In sylvis & sepibus.

De Usu ejus in Medicina nihil invenio apud  
Auctores.

## SECTIO III.

### De Arboribus flore fructuque ag- gregato.

#### 1. De Ficu.

Pag. 362. post lin. 28. adde :

2. **C**aprificus *Offic. Ger. Park. J. B.* Ficus  
sylvestris Dioscoridi *C. B.* sylve-  
stris, sive Caprificus *Jons. D. Wil-*  
*der Feigen Baum.* In Græcia aliis-  
que calidis locis reperitur. *Usu, Fructus, Vi-*  
*res.* Cum Sativa viribus convenit.

3. Ficus Indica *Offic. J. B.* Indica Orientalis  
*Jons. D.* Indica, Arbor radicum Indiæ *Chab. In-*  
*dica arcuata Park.* Indica foliis Mali Coto-  
nei similibus, fructu ficubus simili, ex Goa  
*C. B.* Arbor ex Goa sive Indica *Ger. Katou-*  
*Alou H. M. Indianischer Feigen Baum.* In  
India Orientali oritur. *Usu, Fructus. Vires,*  
Cum Sativa viribus pollet.

4. Sycomorus *Offic. J. B. Ger. Chab. Ægyp-*  
*tia Jons. D.* sive Ficus Ægyptia *Park.* Ficus fo-  
lio Mori Fructum in caudice ferens *C. B. Æ-*  
*gyptischer Feigenbaum. Maulber Feigen / U-*  
*dams Feigen.* In Ægypto & alibi reperitur.  
*Usu. Fructus, Lacryma, Vires.* Fructus refri-  
gerat; & humectat, ventriculum laxat, &  
sub-

subvertit ; tumores duros sanat. Lacryma pesti  
& venenis adversatur.

5. Ficus Cypria *Offic.* J. B. folio Sycomori,  
fructum non in caudice gerens C. B. sylve-  
stris Cretica folio non diviso leviter crenato  
T. *Coroll.* Sycomorus Cypria *Chab. Jons. D.* al-  
tera sive Ficus Cypria *Park.* Enperischer Feis-  
genbaum. In Insula Cypro nascitur. *Ufu.* Fru-  
ctus. *Vires.* Cum priore convenit.

Pag. 366. lin. 3. subjunge:

### V. De Alypo.

**A**lypum *Offic.* montis Ceti *Ger.* Monspe-  
liensium sive Herba terribilis *Park.* Mon-  
speliensium sive frutex terribilis J. B. Fru-  
tex terribilis. Empetrum, Alypum mon-  
speliensium *Chab.* Thymelæa foliis acutis ca-  
pitulo Succisæ C. B. *Jons. D.* Scabiosa frute-  
scens Myrtifolia, flore cœruleo villoso *P. Al.*  
Globularia fruticosa Myrtifolio tridentato *El.*  
*Bot.* Zungen-blatt. Kellers-Hals mit spizigen Blät-  
tern. In monte Ceti oritur. *Ufu.* Folia. *Vi-*  
*res.* Vim catharticam vehementem obtinet,  
nec minus violenter purgat bilem, pituitam  
& aquas quam Tithymalus J. B.

## SECTIO IV.

## De Arboribus fructu umbilicato.

## De Pomiferis umbilicatis.

## IV. De Sorbo.

Pag. 369. post lin. 18. adde:

**A.** 2. *Ornus Offic.* sive *Fraxinus sylvestris Park.* *Sorbus aucuparia J. B.* *aucuparia, Ornus aucuparia Chab.* *sylvestris sive Fraxinus bubula Ger.* *sylvestris foliis domesticæ; similis C. B.* *sylvestris pinnatis angustioribus foliis, undique glabris fructu parvo miniato P. Al.* *Ebereschen Baum. Vogelbeerbaum.* In montosis & uliginosis oritur. Majo floret. Septembri fructum maturat. *Usu.* Fructus. Liquor è vulnere exstillans. *Vires.* Fructus Hydragogum egregium præbet, in Scorbuto sanando aptum, *D. Needham.* Liquor assiduè potus ad Scorbuticos & spleneticos affectus à nonnullis commendatur. *R. H.*

## V. De Mespilo.

Pag. 370. post lin. 6. adde:

**A.** 2. *Aria Offic.* *Theophrasti Ger.* *Sorbus Alpina J. B.* *Chab. sylvestris Aria Theophrasti dicta Park.* *Mespilus Alni lanato folio*

lio major *Herm. Cat.* Alni folio subtus in-  
 cano Aria Theophrasti dicta *R. Synop.* Alni ef-  
 figie, lanato folio, major *C. B. Meelbeer-  
 Baum. Wild Sperder-Baum.* In monti-  
 bus sylvosis & petrosis. Aprili floret. *Ufu.*  
 Fructus, *Vires.* Tusses Jujubarum instar le-  
 nit, & sputum promovet.

3. Diospyrus *Offic. J. B.* Mespilus Alni lana-  
 to folio minor *Herm. Cat.* folio rotundiore,  
 fructu nigro subdulci *El. Bot.* Alni effigie la-  
 nato folio minor *C. B. Jons. D.* Pyrus cervina  
 Italis *R. H. p. 1461.* Vaecinia alba *Ger.* Vitis  
 Idæa tertia *Clusii Park.* Weisse Heidel-Beer.  
 In Alpibus & montosis. Majo floret. *Ufu.* Fru-  
 ctus, *Vires.* Cum præcedente viribus con-  
 venit.

4. Pyracantha *Offic. Park.* quibusdam *J. B.*  
 seu Oxyacantha quibusdam *Chab.* Oxyacantha  
 Theophrasti *Ger.* Dioscoridis sive Spina  
 acuta Pyrifolio *C. B.* Mespilus Pyrifolia *Jons.  
 D.* Spinosa Pyrifolia *Herm. Cat.* aculeata Py-  
 rifolia *El. Bot.* Weiß-Dorn. Hagedorn. In  
 hortis colitur. *Ufu.* Baccæ. *Vires.* Cum Spina  
 alba viribus convenit.

## VI. De Cratægo.

**F**oliis laciniatis, floribus eosque sequentibus fru-  
 ctibus umbellatim congestis, ossiculis intus duris  
 à reliquis differt.

A. 1. Sorbus torminalis *Offic. Ger.* tormina-  
 lis seu vulgaris *Park.* torminalis & Cratægus  
 Theophrasti *J. B.* torminalis *Plinii* Cratægus

Theophrasti *Chab.* Mespilus Apii folio sylvestris non spinosa, seu Sorbus torminalis C. B. Apii folio sylvestris non spinosa, aliis Sorbus torminalis Cratægus Theophrasti *Jons. D.* Wilder Sperber-Baum. Elzen-Baum. In Sepibus. Majo floret, Septembri fructum maturat. *Ufu.* Fructus. *Vires.* Refrigerat & adstringit, fluxus alvi sistit.

2. Aronia *Offic.* Mespilus aronia *Ger.* aronia veterum *J. B. Chab.* aronia sive Neapolitana *Park.* Apii folio laciniato C. B. *Jons. D.* folio laciniato spinosa fructu majore esculento *R. H. p.* 1458. *Uzarolen.* Mispilen mit drey Steinen. Welcher Nesselbaum. In hortis curiosorum aquæ nos colitur. Majo floret, *Ufu.* Fructus. *Vires.* Moderate alvum constringit.

### VIII. De Arbore Febrifuga Peruviana.

Pag. 373. lin. 3. subjunge:

**P**eruviani Corticis usus in Officinis probè cognitus est. Verum cujusnam arboris sit, eruditis nondum satisfactum est. • In priori meo libro varias de ea opiniones, quæ mihi tum occurrebant exhibui. Post opusculum illud editum, in *Itinerario Waseri* qui professione Chirurgus erat, invenio sequentem de eo narrationem.

Aricæ (inquit Autor iste) in Peruvia magnam

gnam hujus Corticis quantitatem vidî, & ab Hispano quodam edoctus sum corticem fuisse arboris *Mangles* aquarum dulcium quæ in lacu magno regionis istius nascebatur.

Verum Historia seu Relatio hæc multum superatur ab alia in *Actis Philosophicis Londinensibus* N. 290. tradita à D. *Guilielmo Oliver*, M.D. ab ingenioso Pharmacopœo *Gadibus* in *Hispania* degente, qui in *Peruvia* diu vixerat, eumque corticem sæpius collegerat, accepta: quam quoniam Arboris descriptionem continet, Latinam facere & huc transferre non gravabor.

Cortex *Peruvianus* ab arbore desumitur *Pruni* circiter magnitudine, foliis hederaceis, sed paulo minoribus, semper virentibus. Autumno colligitur, & cortex circumcirca delibratur tam trunci quam ramorum, qui quatuor mensium spatio iterum succrescit *Suberini* in modum. Fructum fert *Castaneæ* non absimilem (excepta exteriori testa seu tegmine) qui propriè appellatur *China-China*, & ab indigenis pluris æstimatur quàm Cortex à trunco aut ramis detractus.

### IX. De *Opuntia*.

**N**ote sunt, Fructus carnosus, pulpâ humidâ, multa semina includens. Verum ab aliis quibuscunque plantis abundè destinguitur ex modo nascendis: folio enim plantatur, & ex meris foliis, aliis ex aliis enascentibus, constat. Flos etiam & fructus è folio emergit. R. Meth, A, p. 144.

1. *Opuntia* *Offic.* vulgò *Herbariorum* *J. B.*  
*Ficus Indica* *Ger.* *Indica major* *Park.* *Indica*  
*folio spinoso fructu majore* *C. B.* *Indica* *Tuna*  
*dicta, sive Opuntia sola hirsutie pungens* *P.*  
*Al.* *Tuna Indorum* *Jonsf. D.* *Stachlichte* *Indi-*  
*dianische Feigen.* In utraque India nascitur.  
*Usu.* Fructus, folia, *Vires.* Refrigerant &  
 humectant, Febres ardentes extinguunt, si-  
 tim sedant.

2. *Cochinillifera* *Offic.* *Ficus Indica major*  
*lævis sive non spinosa,* *Vermiculos* quos  
*Cochinilla* vocant proferens *P. P. Tab. 281.*  
*Fig. 2.* *Arbor Cochenille* *Duret.* *Nochezno-*  
*patli* seu *Nopalnochezтли* in quo *Coccus* *In-*  
*dicus* nascitur *Hern.* *Nepalnocheteli* seu *No-*  
*chetzli* *Nopalli* *Jonsf. D.* An *Opuntia* maxi-  
 ma, folio oblongo rotundo majore, spinu-  
 lis obtusis mollibus & innocentibus obsito,  
 flore striis rubris variegato *Cat Jamaic.* *Cochi-*  
*nillen Baum.* In America reperitur. *Usu.*  
*Vermiculi;* de quibus vide *Pharmacologiam no-*  
*stram,* p. 491. & *Act. Philosoph. Lond. N. 193.* & *N.*  
 292.

## Bacciferæ Umbilicatæ.

### X. De Loto arbore.

**A** *Ceraso* differt foliis *Urticæ* quodammodo similibus,  
 fructibus in singulis foliorum alis singulis, cum  
 in *Ceraso* plures ex eodem nodulo seu gemma erum-  
 pant, carne paucâ; officulo velut quadripartito. *R.*  
*Meth. A. p. 150.*



Lotus arbor *Offic. Ger. Park.* Lotus fructu  
 Cerasi C. B. arbor fructu Cerasi J. B. *Chab.*  
 domestica *Jons. D.* Lotus: Baum. Nessel-  
 Baum. In Italia & Francia reperitur. *Ufu.*  
 Fructus. *Vires.* Adstringit & alvum sistit, matu-  
 rus minus. Decoctum Dysentericis Fœminis-  
 que profluvio laborantibus confert,

Pag. 374. lin. ult. subjunge:

### XV. De Vaccinio.

**F**rutice parvo, flore urceolum referente, fructu  
 bumido parvo, non racematim nascente, innotes-  
 cit. *R. Meth. A. p. 145.*

1. Vitis Idæa *Offic.* foliis carnosis & ve-  
 lut punctatis *Jons. D.* Idæa foliis carnosis &  
 velut punctatis, sive Idæa radix Dioscoridis  
 C. B. Radix Idæa putata, & Uva Ursi J. B.  
*Chab.* Vaccinia Ursi sive Uva Ursi apud Clu-  
 sium *Ger. emac.* Uva Ursi Galeni Clusio *Park.*  
 Spanische Staudel-Beer. Heidel-Beer. In I-  
 talia, &c. reperitur. Majo floret. *Ufu.* Fru-  
 ctus. *Vires.* Alvum mensesque & omnem a-  
 bundantiam Sanguinis sistit. *Diosc.*

A. 2. Myrtilius *Offic. Volck.* Vitis Idæa foliis  
 oblongis crenatis, fructu nigricante C. B. I-  
 dæa fructu nigro J. B. Vaccinia Pannonica  
 sive Vitis Idæa *Ger.* nigra Pannonica *Park.*  
 rubra foliis Myrtinis crispis *Mer. Pin.* rubra  
 foliis Myrtinis crispis *D. Merret R. H. Synop.*  
*Cat. Plant. Angl.* Schwarze Heidel-Beer.  
 Bief-Beer. In laxosis, Majo floret. *Ufu.*

Baccæ. *Vires.* Frigidæ sunt, & cum manifesta adstrictione resiccant. Ventriculo æstuantanti conveniunt, sitim sedant, febrium calores mitigant, alvum reprimunt, vomitum sistunt, adversus choleram morbum profunt. *Dod.*

Pag. 376. post lin. 21. adde :

### XVII. De Osyride.

**N**ote sunt, Folia Linaria, flores Ribis, fructus si-  
ve bacca rotunda, cum unico intus officulo. R.  
Meth. A. p. 147.

Osyris *Offic.* Plinio R. H. p. 1489. frutescens baccifera C. B. Cassia poetica Lobelii Ger. poetica Monspelienisium Park. lignea Monspelienisium J. B. Cassien. Poeten. Rosmary. In Italia & Gallia Narbonensi oritur. Majo floret. *Usu.* Totus frutex. *Vires.* Adstringentem facultatem obtinet.

Pag. 379. post lin. 17. adde :

### XX. De Lauro Tino.

**N**ote sunt, Flos monopetalos quinquepartitus; fructus Olive figurâ, magis acuminatâ, monospermos, cortice parvam carnosâ; semen pellicula cartilagineâ tectum. R. Meth. A.

Laurus Tinus *Offic.* Ger. Tinus, Laurus sylvestris Chab. Tinus Lusitanica cœruleâ baccâ Park. Sylvestris Corni fœminæ foliis subhirtis C. B. Lauri Tini sylvestris primum genus J. B. Tinus prior Clusii *El. Bot.* Portugallischer wilder Lorbeer-Baum. Lusitanix incola

cola est. Julio & Augusto floret. *Ufu.* Baccæ. *Vires.* Intro assumptæ purgant deorsum non levi totius corporis perturbatione. *Park.* Mezerionis aut Laureolæ baccæ os & fauces inflammant.

## SECTIO VI.

### De Arboribus Pruniferis.

Pag. 397. lin. 14. subjunge:

#### VIII. De Nuce Virginiana.

**F**oliis Laurinis seu glabris & splendentibus; fructu parvo turbinato, pulpam paucam continente, à reliquis Pruniferis differt.

Nux Virginiana *Offic.* Prunifera vel Nucifera seu Nuciprunifera arbor Americana præcelsa, angustis Lauri foliis, latè virentibus, Mastichen odoratam fundens *P. P. Tab. 217. fig. 5. Cat. Jamaic. R. D. p. 44.* Virginianische Nuß. In Insula Barbados reperitur. *Ufu.* *Officulum* nuclei Avellanæ magnitudine circiter & figurâ est, glabrum colore fusco cum hilo prope alterum extremum, durum *officulum* continens nucleo intus albo globulari, sapore amariuscule, eoque & odore aromatico. *Vires.* Obstructiones hepatis potenter reserat, totamque Sanguinis massam depurat, & Scorbuticum malumque habitum corporis emendat, volatilibus illis salibus vitalem hunc liquorem imprægnando, quæ e-

um

um evanidum & languescentem ad puriorem & spirituosiore[m] statum restituit, adeoque à fixatione eum præservat. Cutem etiam à maculis aliisque impuritatibus liberat. *Marl. ob.*

Paradoxum alicui fortasse videre possit, quòd ego fructum hunc pro *Marlovii* Nuce Virginia[n]a exhiberem, cum rusticus ille medicus, qui primus virium ejus descriptionem ad *D. D. Croon* transmisit, disertè affirmet eum fructum esse *Locus* arboris, quæ *Gummi Animæ* præbet: De quo *Gummi* superius tractavi in Libro meo priore p. 458. Cui respondeo, cum *D. Marlow* primus fuerit, qui observationem hanc publicaverit, concedendum est, verisimillimum esse illum quid nomine illo intelligeret, omnium optimè novisse; ideoque, cum fructum illum hoc titulo propriâ ipsius *D. Marlow* manu subscriptum apud *D. Finch* invenerim, non veritus sum eum absque omni scrupulo hic collocare. Præterea addi potest, quòd cum hæc etiam arbor *gummi* præbeat *Animæ* non absimilem, occasionem errandi medico prædicto potuerit subministrare.

### X. De *Myrobalanis*.

Pag. 400. lin. ii. verbo [angulosum] junge:

**F**aba Bengalensis *Offic. R. D. p. 134.* Bengalische Bohne dicta, excrecentiarumgosa, rotunda, compressa, cava, umbilici in modum, magna, foris fusca, intus nigricans,

cans, saporis styptici & astringentis, odoris nullius. *Vires.* Astringit fortiter, & ad omnes hæmorrhagias, præsertim ad hæmoptysin sistendam, summè utilis, Sanguinem modicè incrassans, venarum & arteriarum oscula obdurans, & rupturas consolidans, humores acres & erodentes mitigans & contemperans. *Marloe.*

D. *Marloe* prædictus primus erat, quod sciam, qui exoticum hoc medicamentum, ejusque usum Orbi literato publicavit sub ænigmatico nomine *Faba Bengakensis*. Unde nonnulli fructum ex *Bengala*, &c. *Clusii exot. lib. 2. cap. 14.* esse opinati sunt. Alii Myrobalani quandam speciem, alii denique florem Myrobalani Citrini, quia sæpe inter fructus illos invenitur. Mihi excrescentia quædam esse videtur ex punctura insecti cujusdam excitata; aut magis propriè fructus Myrobalani citrini ipse vulneratus, qui venenati hujusmodi ictûs occasione monstruosam hanc formam assumit. Ipse Prunos sæpissimè observavi hujusmodi ictu ab insecto quodam inflicto formam naturalem amisisse, & cavos intus fieri absque ullo officulo.

## XI. De *Jujuba*.

Pag. 401. post lin. 29. addè:

2. **O**Enoplia *Offic.* spinosa & non spinosa *Ger. emac. C. B.* spinosa & non spinosa, sive *Napeca*, sive *Zizyphus alba Park.* sive *Nabca*, *Paliurus Africana Chab.* *Nabca folio Rhamni*

ni vel Jujubæ J. B. Grosse Jujubent. Weisse Brustbeer. In Ægypto, Creta & alibi incolata est. *Ufu.* Fructus. *Vires.* Fructus immaturus astringit, stomachi alvique relaxationem firmat. Succus maturarum purgabilem è ventriculo.

#### XIV. De Olea.

Pag. 404. post lin. ult. adde:

2. **O**leaster *Offic.* sive Olea sylvestris *Park.* J. B. Chab. Olea sylvestris *Ger.* sylvestris sive Oleaster *Jons.* D. sylvestris folio duro, subtus incano C. B. Wilder Oehlbaum. Oliven Baum. In Italia, Hispania, aliisque locis spontanea oritur. *Ufu.* Folia. *Vires.* Cum Oliva sativa viribus convenire creditur.

Pag. ead. lin. 24. subjunge:

#### XV. De Saponaria Arbore.

**N**ote sunt, Flos rosaceus; fructus sphericus nucleâ fœtus pariter sphericâ, nucleum condente ejusdem formæ. R. Meth. A. p. 151.

Arbor saponaria *Offic.* saponaria Americana R. H. p. 1548. prunifera, racemosa, folio alato, costâ mediâ membranulis utrinque extantibus donatâ, fructu saponario *Cat. Jamaic.* seu Nuciprunifera fructu saponario, orbiculato, monococco, nigro, Americana P. P. Tab. 217. fig. 7. Quity Pison. Brasiliensibus *Marog.* saponariæ sphaerulæ *Chab.* sphaerulæ

culæ arboris Filicifoliæ J. B. Nuculæ saporariæ non edules C. B. Arbor Mistecæ provinciæ fructu avellanæ simili *Laet. Jons. D. Baccæ Bermudenses Marl. Obs. Seiffen-Beerem.* In insula Jamaica & alibi Indiæ occidentalis oritur. Octobri fructus maturescit. *Ufu.* Fructus cum jam siccus sphericus, coloris est rubentis; Galla minor, hilo amplo, sapore amaro, odore nullo; unicum rotundum nigrum officulum continens. *Vires.* Multum commendantur adversus chlorosin. *Marl. Obs.* Baccæ ad chlorosin singulare & specificum medicamentum sunt, post chalybeata incasum usurpata, morbum illum debellantes & sanantes. Spiritus, tinctura, aut extractum exhibenda sunt potius quam baccæ crudæ R. D. p. 134.

Europæus horum usus in medicina à D. *Marloe* orbi literato primùm communicatus est, per modum Epistolæ à medico quodam rustico ad egregium Virum D. *Boyle* scriptæ. Verùm cum nomen hoc adeo ænigmaticum esset, ut difficulter conjici posset quid essent; & duo ex Amicis meis, quos super hac re consului, de iis diversum sentirent, uno Palmæ cujusdam semina esse opinante; altero hujus arboris fructus, in cujus opinione confirmatus fui à prædicto D. *Finch*, qui me eorum nonnullis, è cistula propriâ D. *Marloe* manu *Bermudes Beerem* inscripta desumptas donavit.

## XVI. De Pado.

**N**Otae sunt; folia ad Salicis latifoliae potius quam ad Cerasi folia accedunt; fructus, racemosi Cerasis similes; ossiculum tamen oblongum, scabrum; secus quam in Cerasis. R. Meth. A. p. 150.

A. 1. Padus *Offic.* Cerasus avium nigra & racemosa *Ger.* racemosa fructu non eduli C. B. racemosa sylvestris *Jons.* D. racemosa quibusdam, aliis Padus *J. B. Chab.* avium racemosa *Park.* Schwarze Vogel-Kirschen. In montosis & Alpinis nascitur. *Ussu.* Fructus. *Vires.* Ad Epilepsias puerorum appensus collo commendatur.

2. Mahaleb *Offic.* Macaleb Gesneri *Ger.* Machaleb Germanicum *Park.* Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata *J. B. sylvestris amara; Arabum Mahaleb putata Chab.* Ceraso affinis C. B. *Jons.* D. Stein Kirschen. In petrosis montibus oritur. *Ussu.* Nuclei. *Vires.* Calfaciunt; emolliunt. *Matth.*

## XVII. De Lauro-ceraso.

**F**Ructu racemoso; ossiculo longiore, tenuiore, à Ceraso foliis amplis, crassis, semper virentibus; ab eadem & aliis differt. R. Meth. A.

Lauro-cerasus *Offic.* *Ger.* J. B. Clusii *El. Bot.* Cerasus folio Laurino C. B. Cerasus Trapezuntina, sive Lauro-cerasus *Park.* Lauro-cerasus, Laurus Trapezuntina *Chab.* Lauriers Kirschen. In hortis nostris frequentissima. *Majo*



Majo floret. *Ufu.* Baccæ. *Vires.* Ad Scorbutum à nonnullis commendantur.

## XVIII. De Persea.

*FRUCTU* pyriformi, racematim cohærente, nucleum cordis effigie continente, foliis Lauri similibus à reliquis differt.

Persea *Offic.* C. B. J. B. *Jons. D.* arbor Ger. arbor Clusii *Park.* Laurus Indica *Aldin.* Prunifera arbor, fructu maximo pyriformi, viridi, pericarpio esculento butyraceo, nucleum unicum maximum, nullo ossiculo tectum cingente *Cat. Jamaic.* Ahvacaquanhiti seu arbor querciformis butyraceo fructu *Hern. Jons. D.* Pyrosimilis fructus in Nova Hispania nucleo magno C. B. Pyrifacie Aguacat J. B. Nicaraguæ pomum nuce rotunda *ejusd.* pomum *Chab.* Mala Americana pyri facie C. B. *Persier-Baum/ Spanische Beer.* Insulæ Jamaicæ indigena est. *Ufu.* Folia, Fructus. *Vires.* Fructus Stomacho est utilis, Folia arida pulverisata illitu sanguinis eruptiones sistunt. *Diosc.*

## XIX. De Manga.

*NOTE* sunt, folia bina, terna, aut quaterna eodem pediculo, flos racematim, fructus magnus reniformis.

Manga *Offic.* Indica fructu magno reniformi *R. H. p.* 1550. Mangas *Park.* sive Amba J. B. Amygdalam referens fructus hirsutus *Ejusd.* Mangas & Amba *Linschotani Chab.* domesti-

ca *P. Al.* Persicæ similis putamine villosa *C. B.*  
 Mango, Amba, & Ambe *Camel. Syllog.* Arbor  
 mangifera *Bont. Jons. D.* Conchifolia Indiae  
 orientalis comantibus floribus & fere corym-  
 bosis *P. P. Tab. 142. fig. 1.* Mao sive Mau *H. M.*  
 Mango-Baum. In India orientali oritur. *Ulu.*  
 Fructus muriâ conditus: *Officula. Vires.* Fru-  
 ctus conditus frigidus & humidus est. *Of-*  
 ficulis assatis alvi profluvia sisti ajunt.

---

## SECTIO VII.

De

### Arboribus Bacciferis.

*Arbores & Frutices Baccifera, fru-*  
*ctu monopolyreno.*

Pag. 410. adde:

#### *I. De Zizypha.*

**N**OTÆ sunt, folia longa, mollia, alternatim po-  
 sita, flos monopetalos, tubulatus, in sex partes  
 dissectus; fructus oblongus, olive-formis.

Zizypha *Offic. Cappadocica Ger. Cappado-*  
*eica, quibusdam Olea Bohemica J. B. Chab.*  
*Olea sylvestris folio molli incano C. B. Olea-*  
*ster Cappadocicus Park. Elæagnus orientalis*  
*angustifolius, fructu parvo oliveformi, sub-*  
*dulci T. Coroll. Wilde Zujuber / wilde Brust-*  
*Beerlein. In Bohemia, Hispania, &c. reperi-*  
 tur.

sur. Æstate floret. *Usu.* De usu & viribus nil invenio.

## II. De Arbuto.

**F**lore urceolari insignis; fructu carnosò, eduli, in quinque loculamenta partito, seminibus aliquot adnascentibus onusta, à reliquis differt. *R. Meth. A. P. 155.*

A. 1. *Arbutus Offic. Ger. Park. Arbutus Comarus Theophrasti J. B. Chab. folio serrato C. B. Jonsf. D. Unedo Plinii vulgò Herm. Cat. P. Al. Erdbeer-Baum.* In sylvis & dumetis calidioribus. *Usu. Fructus. Vires.* Acerbus est & austerus.

2. *Adrachne Offic. Park. Theophrasti Ger. J. B. Theophrasti Arbuto seu Comaro proximè accedens Chab; Arbutus folio non serrato C. B. Jonsf. D. Dioscoridis vera Comara dicta Wheel Itin. Niedriger Erdbeer-Baum.* In Græcia oritur. *Usu. Fructus. Vires.* Cum priore viribus convenit.

D. *Georgius Wheeler* hanc arborem *Dioscoridis* Arbutum esse credit, contra opinionem *Matthioli* qui primam speciem eam esse affirmat.

Pag. 415. post lin. 7. adde:

## VIII. De Phillyrea.

**F**lore quadrupartito, fructu & semine spherico, foliis in caule binis oppositis, ab *Alaterno* distinguitur, quam *Botanici* & *Hortulani nostrates* cum eâ

*confundentes, utramque indiscriminatim Phillyream denominarunt. R. Meth. A. p. 152.*

Phillyrea *Offic.* folio Ligustri C. B. *Jons. D.* latiusculo folio J. B. *Chab.* latiore folio Ger. latifolia foliis ferè non serratis *Park.* Phillyree *Stein-Linde.* In hortis colitur. *Usu.* Folia. *Vires.* Siccant & adstringunt, ad oris ulcera maxime commendantur,

## X. De Thymelæa.

Pag. 415. post lin. 21. adde:

*NOTE sunt, flores monopetali quadripartiti; fructus carnosus semen continentes unicum, oblongum rotundumve, tunica cartilaginea tectum, R. Meth. A. p. 152.*

Pag. 416. post lin. 7. adde:

3. Cneoron niger *Offic.* Matthioli *Ger. emac.* Matthioli suffrutex J. B. *Chab.* Thymelæa minor sive Cneoron Matthioli *Park.* Alpina Linifolia humilior flore purpureo odoratissimo *El. Bot.* foliis acutis, floribus odoratis, purpureis, Cneoron Matthiolo dicta *Herm. Cat.* Thymelææ affinis facie externâ C. B. *Jons. D.* *Stein-Röflein.* In montosis provenit. Aprili floret. *Usu.* Cortex. *Vires.* Cum Chamælæa viribus convenire creditur.

4. Empetrum *Offic.* Thymelæa foliis Kali lanuginosis falsis C. B. Sanamunda secunda Clusii *Ger. emac.* J. B. *Chab.* altera Clusii *Park.* Sanamunda/ Kellers-Hals mit wöllichen Kali-Blättern. In maritimis Bæticæ sponte oritur.  
Februa-

Februario floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Drachmæ pondere cum decocto Cicerum sumpta mirificè purgat. *R. H. p. 1589.*

5. Sanamunda *Offic.* prima Clusii *Ger. emac.* Thymelæa foliis candicantibus, Serici instar mollibus *C. B. Tartonraire Massiliensium Park. Massiliensium, Sanamunda prima Clusii J. B. Chab. Sanamunda mit weichen Blättern. In Gallo-provincia sponte provenit. Ufu. Folia. Vires. Vi caustica prædita sunt.*

## XI. De Viburno.

**N**otæ, vimina lenta, lanuginosa; folia subrotunda, proni facie incana; flores in umbellis, bacce per maturitatem nigrae compressæ, ovales ferè; semina ejusdem figuræ, valde compressa, canaliculata & fere ossæ. *R. Meth. A. p. 147.*

*A. Viburnum Offic. Park. vulgò C. B. Matthioli El. Bot. Lantana sive Viburnum Ger. vulgò aliis Viburnum J. B. Chab. Kleiner Mähls-Baum/Schling-Baum. In sepibus non infrequens. Æstate floret. Septembri maturescunt acini. Ufu. Folia, Baccæ. Vires. Siccant & adstringunt, unde ad tonsillarum & gutturis inflammationes, columellæ proci-dentiam, dentes vacillantes, alvi fluxiones commendantur, Matth.*

## XIII. De Rhamno.

*Rutice est spinoso, fructu minore, pulpâ humidâ unicum intus semen claudente. R. Meth. A. p. 152.*

1. Rhamnus albus *Offic.* spinis oblongis, flore candicante *C. B. Jons. D.* primus Clusii *Ger.* secundus Monspeliensium sive primus Clusii *Park.* cortice albo Monspeliensis *J. B. Chab.* Stechdorn mit weissen Blumen. Hispaniæ, Lusitaniæ, &c. incola est. Majo floret, Autumno fructus maturat. *Usu.* Folia. *Vires.* Igni sacro & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. *Diosc.*

2. Rhamnus niger *Offic.* niger Theophrasti *Park.* tertius Clusii *Ger. Chab. J. B.* tertius flore herbareo baccis nigris *C. B.* flore herbaceo, baccis nigris *Jons. D.* Schwarzer Stechdorn. In hortis nonnunquam reperitur. Majo floret. *Usu.* Fructus. *Vires.* Decoctum membra relaxata & dissoluta atque podagræ dolores juvat.

A. 3. Oleaster Germanicus *Offic.* Rhamnus secundus Clusii *Ger.* primus Dioscoridis Lobelio sive litoralis *Park.* Salicis folio angustio, fructu flavescente *C. B. Jons. D.* sive Oleaster Germanicus *J. B. Chab.* Rhamnoides fructifera foliis Salicis, baccis leviter flavescens *T. Coroll.* Teutscher Stechdorn / Weiden-Dorn. In maritimis arenosis. Junio floret, Septem-

*De Arboribus.*

bri fructum maturat. *Ufu.* Baccæ. *Vires.*  
Rob acidum est, commendaturque ad Dy-  
senteriam.

*XIV. De Ebena Indico.*

**E**Benus *Offic.* C. B. J. B. *Chab.* Ebenum sive  
Lignum Indicum *Camel. Syll.* Eben-Baum/  
Eben-Holz. Ex India orientali adfertur. *Ufu.*  
Lignum.

Arborem hanc cum *P. Camello* verum Anti-  
quorum Ebenum Indicum esse existimo, est-  
que arbor baccifera foliis Juglandinis simili-  
bus quoad magnitudinem; atque idcirco  
quod de ea scripsi pag. 392. libri mei prioris  
huc transferendum est.

Huic subjungit *Camellus* sex alias arbores  
quas omnes pro variis Ebeni speciebus ha-  
bet: quarum primam in Capite Palmarum  
jam dedi; ideoque illuc Lectorem meum  
ablego.

Pag. 420. post lin. 19. addē:

*XVIII. De Fagara.*

**F**agara *Offic.* Ger. major J. B. *Chab.* seu Cayu-  
tana Luzonis *Camel. Syllab.* Fagara Cocculo  
Indo similis Fructus *Park.* Cubebis affinis Fa-  
gara major C. B. Rubus exoticus *ejusd.* Rubi  
facie senticosa planta *Lobelio J. B. Park. Chab.*  
In Philippinis Insulis reperitur. *Ufu.* Baccæ.  
harum cortex exterior, tener, subniger, sa-  
poris aromatici & acriusculi, hæ maturæ rum-

puntur, & granum nigrum splendidum, sat solidum, saporis & odoris expers exhibent. *Vires.* Calfaciunt & siccant, stomachi ac Hepatis frigiditati utiles, concoctionem juvant, & alvum adstringunt. *Avicen.*

## Arbores & Frutices bacciferæ fructu tripyreno.

Pag. 423. post lin. 2. adde;

### XXII. De Alaterno.

*Nota sunt; Foliis in ramis & surculis alterno ordine sitis, baccis tricoccis, à Phillyrea differt.*  
R. Meth. A. p. 154.

1. Alaternus *Offic.* J. B. Chab. Spina Burgi Monspeliensium *Ejusd.* Alaternus major & minor *Park.* Plinii, & humilior *Ger.* sive Philyca elatior & humilior C. *Baubini P. Al.* Philyca elatior & humilior C. B. *Jons. D.* Hoher Alatern-Baum. In hortis colitur. *Ussu.* Fructus. *Vires.* Moderatè alvum constipat.

2. Celastrus *Offic.* Theophrasti C. B. *Park. Jons. D. Ger. emac.* Alaternus latifolia, Celastrus dicta *Herm. Cat.* Alatern Baum mit breiten Blättern. In hortis curiosorum nonnunquam reperitur. De viribus & usu nil invenio apud Autores.

3. Cassina *Offic.* C. B. Cassine vera Florida-norum, Arbuscula baccifera Alaterni ferme facie, foliis alternatim sitis, tetrapyrene *Pl. Mant. Casie: Strauch / Casie: Baumlein.* In  
Caro-



Carolina oritur. *Uſu.* Folia unciam circiter longa ſunt, ſemiunciam lata, figurâ folia Senæ repræſentantia, colore quando exiccata ſunt nigricante, cum ſplendore ſupernè, ſubtus viridiora, odore nullo, ſapore paulum aromatico. *Vires.* In Variolis optimum medicamentum habetur, fermentationem Sanguinis nimis violentam cohibens, nec tamen facultatem expulſivam penitus ligans. Expectorationem promovet, & pulmones tutatur. Caput denique & guttur ne invadant variolæ impedit. *D. Marloe.*

#### 4. Perygua *Offic. Marl. Obſ.*

In *Uſu* ſunt, Fragmenta foliorum exiccatorum, feſtucarum & pulvis, unde allata diſcere nequeo. *Vires.* Purgat interdum, aliàs vomitum excitat, nonnunquam inſenſibilem perſpirationem promovet, prout natura inclinât. Specificum præſtantiffimum habetur in Diabete, cujus effectus in morbo illo curando plura exempla profert *D. Marloe.*

Cujusnam plantæ Perigua fragmenta ſit, quæſtio eſt non facilè determinanda: neque eruditorum in re Botanicâ opiniones facilè poſſunt conciliari. Sunt qui pro Alaterni Specie eam habent, quorum autoritate permotus eam hoc in loco diſpoſui. Alii quærunt an ſit Peragu *H. M. T. 2. p. 41.* Mihi veriſimillimum videtur plantam eam eſſe cujus meminit *Du Biſcay* in Navigatione ſua ſurſum in *Rio de la Plata* ſub titulo *Herba de Paraguay*, quâ indigenæ adverſus vapores minerales &

noxios utuntur: quæque iisdem infervit pro medicamento ad vomitum excitandum.

### XXIII. De Sambuco.

Pag. 424. post lin. ult. adde:

3. **S**ambucus montana *Offic.* racemosa rubra C. B. *Park. Jons. D.* racemosa *Chab.* racemosa acinis rubris J. B. racemosa vel Cervina *Ger.* Wald: oder Berg-Holder / Hirsch-Holder / Berg-Elhorn. In hortis colitur. *Ufu.* Folia. *Vires.* Frigida & Soporifera est, & cum Bella donna viribus convenit.

Arbores & frutices Bacciferæ  
fructu tetrapyreno.

### XXV. De Thea.

Pag. 428. lin. 2. subjunge:

**I**N Anglia tres species *Theæ* in usu sunt. Quarum Prima *Bohe* dicitur, est folium parvum ad nigredinem vergens, quod aquam plerumque cui incoquitur brunneo aut rubente colore tingit, & sapore Sennæ infusum refert.

Secunda *Thea viridis* est, nonnullis *Singhæ* dicta. Hæc duorum generum est. Alterum folio oblongo & angusto, alterum minore: utrumque æque bonum, & colore cœruleo viridi; commanducatum crispum admodum videtur, & aquam colore pallidè viridi inficit.

Tertia *Imperialis Thea* dicitur. Folio est amplo laxo, cum reliquæ duæ folio sunt convolutæ: optima visui viridis est, in ore crispa, & odore jucunda.

Omnes hæ Theæ Species à China adferuntur uniusquæ & ejusdem arboris folia esse existimantur; differre tantum tempore colligendi, & præparandi, seu ut vocant curandi modo. *Vires.* Omne genus Thearum vires jam tradidi. Bohe duntaxat Sanativa & Balsamica habetur, naturæ languentis restauratrix, & adversus Phthisin & Tabem prophylactica.

Pag. 430. post lin. 6. adde:

### XXIX. De Lycio.

*Rutex* est baccifer spinosus, à Rhamno, ut videtur, distinguendus spinis minoribus & brevioribus, quæ longiores validioresq; in Rhamno. Addi etiam potest Folia esse minora in Lycio. R. Meth. A. p. 195.

Lycium *Offic.* Buxi foliis *Jons.* D. C. B. facie pruni-sylvestris sive Italicum *ejusd.* Italicum *J. B. Chab. Park.* vulgatus *ejusd.* Italicum *Jons. D. Bot.* à *Stapel.* Buxi foliis rotundioribus *Syriacum* vel *Persicum* *Breyn. 2. Prod.* *Hispanicum* *Ger.* Rhamnus *Hispanicus* Buxi folio minor *El. Bot.* *Italiánischer Bux-Dorn.* In Hispania aliisque locis calidioribus oritur. *Ufu.* Rob ex foliis & ramis, cujus parandi modus à *Dioscoride* sic describitur. Rami cum radiculis

culis tusi, & antè per multos dies macerati coquuntur, tum abjectis lignis itidem liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lycium adjecta decoctioni amurca, aut Absinthii succo aut felle bubulo. Simili modo fit Lycium Semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glebis intrinsecus nigris, intus cum fregeris rufis, odore minimè viroso, cum amaritudine astringens, crocino colore. *Vires.* Adstringit, caliginem oculorum discutit: genarum Scabiem, pruritus, veteresque fluxiones sanat: facit ad purulentas aures, exulceratas gingivas, tonsillàs, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum: cœliacis dysentericis potum inditumque convenit: datur sanguinem excreantibus & tussi ex aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotio devoratur, aut in aqua bibitur: flavos facit pilos, reduviis, ulceribus quæ serpunt, aut putrescunt, medetur: fœminarum profluvia appositum sistit: rabiosorum ictibus ex melle potum, aut vice catapotii auxiliatur. *Diosc.*

Duæ Lycii species à *Dioscoride* memorantur. Alter à planta in *Græcia* nascente, quam hic exhibeo, Lycium simpliciter dicta: altera à planta Indica de qua in *Capite de Aca-*cia agam quæ nomine *Cate* innotescit.

Pag. 431. lin. ult. subjunge:

Frutices Bacciferæ fructu  
polypyreno.

XXXII. De Rubo.

Pag. 432. lin. ult. subjunge:

3. **A.** Chamæbatos *Offic.* Chamærubus sive  
Humirubus *Park.* spinosus fructu cœ-  
ruleo *Jonsf. D.* Rubus minor fructu cœruleo  
*J. B. Chab.* repens fructu cœsio *C. B. Ger. emac.*  
*Kraß-Beer / Chau-Beer.* Inter segetes reperitur.  
Majo floret. Autumno fructum maturat. *Ufu.*  
Fructus. *Vires.* Cum primo viribus convenit.

XXXIII. De Uva marina.

**N**Ota sunt Ramuli & surculi Equiseti æmuli, aphyl-  
li, Fructus ad nodos Rubi fructibus similes. *R.*  
*Meth. A. p. 195.*

Tragos *Offic.* sive Uva marina major *J. B.*  
*Chab.* Uva marina major *Ger.* Polygonum bac-  
ciferum maritimum majus *C. B.* bacciferum  
sive Uva marina major *Park.* Ephedra mariti-  
ma major *El. Bot.* Meer-Trauben. In Sicilia  
aliisque locis maritimis oritur. *Ufu.* Fructus.  
*Vires.* Ex vino poti cœliacis & foeminis flu-  
xione laborantibus auxiliantur. *Diosc.*

## SECTIO OCTAVA.

De

## Arboribus Pomiferis.

## V. De Nuce Vomica.

Pag. 442. post lin. 8. adde:

3. **F**ABA Sti. Ignatii *Offic.* Nux petita seu Faba Sancti Ignatii *Act. Philos. Lond. No. 249.* Igalur, seu Nux Vomica legitima Serapionis Camelli *Ejusd. No. 250.* seu Nux Vomica legitima Serapionis Camelli, Faba Sancti Ignatii vulgo *R. H.* Cucurbitifera Malabathri foliis scandens Catolungay & Contara Philippinis Orientalibus dicta, cujus Nuclei Pepitas de Bysayas aut Catbalogan & Fabæ Sancti Ignatii ab Hispanis, Igalur & Mananaog *i. e.* Victoriosi, Insularia nuncupati *Pl. Mant. St. Ignatius-Bohne.* Ex India Orientali transportatur. *Ussu.* Semina oblonga, avellanæ Nuci cum putamine pares, aut etiam paulò majores, nodosa, durissima, diaphana & quasi cornea substantia, saporis intensius amari, coloris autem inter album & glaucum. *Vires.* Veneno resistit, febres quartanas curat, urinam & menses provocat; vertiginem inducit & vomitionis ciet,

SE-

## SECTIO NONA.

De

Arboribus fructu per maturitatem sicco.

## I. De Staphylo dendro.

**N**OTÆ sunt Flores racemosi, pentapetali; fructus vesicula in duos aut tres loculos divisa, nuces continentis calvaria figurâ. R. Meth. p. 157.

A. Staphylo dendron Offic. J. B. Chab. sylvestre & vulgare Herm. Cat. Matthioli El. Bot. Nux velicaria Ger. Park. Pistachia sylvestris C. B. Deutsche Pimpernüsse. In sepibus nonnunquam reperitur. Majo floret. Autumno nucleos maturat. Usu. Nuclei. Vires. Cum Pistachia viribus à quibusdam convenire creditur.

Pag. 445. post. lin. ult. adde:

## VI. De Cotino.

**N**OTÆ sunt, Semina compressa rubentia, lenticularis equalia, obiter disposita in cymis tenuissimorum, sed rigidorum filamentorum, latè diffusis, pilis plumatim obsitis quæ ad summos ramulos oriuntur. R. Meth. A. p. 158.

Cotinus Offic. Matthioli C. B. coriaria Plinii Jons. D. coriaria Dodonæi El. Bot. Cocci-gria Cotinus coriaria nonnullis putata Chab. live

five Cotinus putata J. B. Coggygia Theophrasti vel Cotinus coriaria Plinii Ger. sive Cotinus coriaria Park. Färber-Baum / Färber-Saub. In Italia reperitur. Majo floret. Augusto fructus maturefcit. *Ufu.* Fructus. *Vires.* Siccat & adstringit, insigniter faucium & genitalium ulcera sanat, fluxus alvi menses que sistit.

Pag. 447. post lin. 10. adde:

### LX. De Spiræa.

**NOTÆ** sunt, Flos pentapetalos; fructus è pluribus siliquis seu vaginis compositus, quarum unaqueque semina aliquot compressa continet. R. Meth. A. p. 158.

Spiræa Offic. *Jons.* D. Theophrasti Clusio Ger. *emac.* Theophrasti fortè Clusio J. B. Park. *Chab.* Salicis folio *El.* Bot. Frutex spicatus foliis Salignis ferratis C. B. Spiræa. In hortis colitur. Julio floret. Augusto Semen maturat. *Ufu.* Semen. *Vires.* Astringentem facultatem habet.

Pag. 448. post lin. 22. adde:

### XI. De Acere.

**Cujus nota,** Folia laciniata aut angulosa; semina bina juncta, vasculis duris, membranis extantibus alatis inclusa. R. Meth. A. p. 157.

A. I. Acer majus Offic. Ger. majus, multis falsò Platanus J. B. majus, quibusdam Platanus dictum *Chab.* majus latifolium, Sycomorus



rus falso dictum *Park.* montanum candidum  
*C. B.* montanum candidum, aliis *Platanus*  
*Jonsf. D.* Groß Ahorn Baum. Maßholder-  
 Baum. Lein-Baum. In Cœmeteriis & am-  
 bulacris. Majo floret. Fructus maturescit  
 Septembri. *Ufu.* Succus ex vulnerato arbo-  
 re. *Vires.* Ad Scorbutum utilis esse cre-  
 ditur.

Ex hujus Succo Saccharum præparant Ca-  
 nadenses: vide *Act. Philos. Lond. No. 171. p. 988.*

A. 2. Acer minus *Offic. Ger. emac.* minus  
 sive vulgare *Park.* campestre & minus *C. B.*  
 campestre, aliis *Opulus* campestris veterum  
*Jonsf. D.* Acer *Chab.* vulgare minori folio *J. B.*  
 Klein Ahorn-Baum. In sepibus frequens.  
 Majo floret. *Ufu.* Radix. *Vires.* Contusa è  
 vino jecinoris doloribus utilissime imponitur.  
*Plin.*

3, Acer montanum *Offic. Park.* montanum  
 flavum sive crispum *C. B. Jonsf. D.* montanum  
 Orientalis Platani foliis atro-virentibus *P. P.*  
*Tab. 252. fig. 1.* Berg Ahorn-Baum. In mon-  
 tosis.

### XIII. De Ulmo.

Pag. 451. pro 2da & 3a Speciebus Ulmi  
 adde:

2. A. Ulmus montana *Offic. C. B.* montana,  
 aliis latifolia *Jonsf. D.* latiore folio *Park.*  
 folio latissimo scabro *Ger. emac.* Berg Ulm-  
 Baum. Berg-Rüster. In sepibus frequens.  
 U *Ufu.*

*Ufu.* Cortex. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. Macer *Diosc. Theoph. veterum* C. B. Græcorum *Park. Jons. D.* Dioscoridis & Græcorum *J. B. Chab.* Ulmo affinis, vasculis membranaceis & semine intus incluso composito *R. H. p.* 1779. Griechisch Macerbaum. Ex Barbaria advehitur *Ufu.* Cortex flavescens, crassus, gustu perquam adstringens. *Vires.* Contra cruentas excreationes, Dysenterias & alvi fluxiones bibitur. *Diosc.*

Pag. eadem lin. ult. adde:

### XV. De Platano.

**N**ota sunt Fructus in pilulas sphericas conglobati, multa semina continentes. *R. Meth.* A. p. 140.

Platanus *Offic. C. B. J. B. Ger. Chab.* vulgaris *Jons. D.* Orientalis vera *Park.* pilulis majoribus *Herm. Cat.* Orientalis pilulis amplissimis *P. Al.* Frembd Ahorn. Orientalischer Ahorn oder Wald-Eschern-Baum. In Creta oritur. *Ufu.* Folia, Cortex, Pilulæ. *Vires.* Tenerrima folia in vino decocta & illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes levant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulæ in vino potæ serpentium moribus auxiliantur. *Diosc.*

### XVI. De Eleagno.

**A.** Eleagnus *Offic.* Gale Frutex odoratus Septentrionalium, Eleagnus *Cordo, Chamæ-*

mælæagnus Dodonæo *J. B. Chab.* Myrtus Brabantica sive Elæagnus Cordi *Ger.* Rhus Myrtifolia Belgica *C. B.* sylvestris, sive Myrtus Brabantica vel Anglica *Park.* Brabantia scher oder Englischer Myrten Baum. Locis paludosis gaudet. *Ufu.* Folia, *Vires.* Siccatur & discutit; Lumbricos necat.

## XVII. De Paliuro.

**N**Ote sunt, Spina longæ acutissima; fructus petasoides, pulpâ intus fungosâ ossiculum durum continens trispermum, hoc est, tribus conceptaculis cum singulis in unoquoque seminibus donatum. *R. Meth. A. p. 158.*

Paliurus *Offic. Ger. Chab.* Dodonæi *Herm. Cat. El. Bot.* sive Rhamnus tertius Dioscoridis *Park.* Jujubinis foliis fructu petasoide *P. Al.* Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso *C. B. Jons. D. Christi; Dorn.* Italiæ, &c. incola est. Majo & Junio floret; Autumno fructum maturat. *Ufu.* Folia, Radix, Baccæ. *Vires.* Radix & folia astringunt, ventrem fluentem cohibent, digerunt & Phymata curant. Fructus incidendi vim obtinet, calculos vesicæ comminuit & pectoris pulmonisque excretionibus auxiliantur. *R. H. p. 1709.*

## SECTIO X.

De Arboribus & Fruticibus sili-  
quosis.Arbores & Frutices flore uni-  
formi.

Pag. 445, lin. 8. subjunge,

II. De *Acacia gloriosa*.

**N**Ota sunt, Folia pinnata, siliqua lata echinata, fru-  
ctus rotundus durus.

Bonduch *Offic.* Indorum *Jons.* D. cinerea fo-  
liis longioribus *Art. Philosoph.* Lonnd n. 267. Ar-  
bor exotica spinosa foliis Lentisci C. B. spi-  
nosa Indica muricatis siliquis *Park.* Lobus  
echinatus *Ger. emac.* echinatus fructu casto  
foliis longioribus *P. B. P.* alius exoticus hir-  
sutus cum piso duro cinerei coloris *Chab.*  
*ἐχινώδης* cum piso duro cinerei coloris *J. B.*  
*Acacia gloriosa* Lentisci foliis spinosa, flore  
spicato luteo, siliqua magna muricata *P. P.*  
*Tab. 2. fig. 2.* *Caretti H. M. Tom. 2.* Inimboy  
Brasilensibus *Marog.* Brasilianorum frutex  
spinofus spicatus, platylobis echinoidibus,  
glycyrrhizæ foliis *Breyn. Prod. 1.* Inimboia  
sive sylva de praya Lusitanis *Pison.* Moluctis  
sche Nüsse oder Bezaar Nüsse. Utriusque In-  
diæ alumna est. *Usu.* Fabæ rotundæ, cinerei  
colo-

coloris, intus albæ saporis impense amari, odoris nullius. *Vires.* Herniosis tumoribus conducunt, flatus dissipant dolorem colicum sedant, stomachum debilem confortant, menses movent, in calculo profunt. *Vid. Morlow. Observat.*

Pag. 457. post lin. 3. adde:

### V. De Angsana.

**A**ngsana *Offic.* Draco arbor Indica siliquosa Populi folio, Angsana vel Angsava Javanica *Commel. Hort. Amst. R. D. p. 113.* In India Orientali oritur. *Usu.* Lachrymæ. *Vires.* Virtutibus astringentibus pollet, & in affectibus apthosis præ cæteris remediis conducit.

Gummi hujus arboris ab eruditissimo & ingeniosissimo D. *Commelino* in Pharmacopolarum *Officinis* nomine Sanguinis Draconis in guttis divenditum esse dicitur: unde non possum non observare (præter ea quæ jam scripsi in Capite de Palmis) quòd Botanices Autores quænam arbor sit, valdè incerti sint, & magna obscuritate ac confusione laborent, aut diversas arbores esse quæ hoc gummi producant.

Pag. 460. post lin. 17. adde:

### IX. De Nerio.

**N**ote sunt, Flos speciosus, siliqua & semen *Apo-cyni*, lanugine seu pappæ adherente alatum. *R. Meth. A. p. 160. 196.*

Nerium *Offic.* five Rhododendron *Chab.* five  
 ve Oleander *Ger.* five Rhododendron flore  
 rubro & albo *J. B.* floribus rubescentibus &  
 floribus albis *C. B. Jons. D.* Oleander five Lau-  
 rus *Rosea Park.* vulgò *Herm, Cat.* Oleander,  
 Lorbeer Rosen. Unholden Kraut. In hortis  
 colitur. Julio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Ex-  
 trinsecus vim digerendi habent. Intra cor-  
 pus assumpta pernicioſa & venenosa esse scri-  
 bit *Galen,*

Arbores & Frutices filiquosæ flo-  
 ribus difformibus seu Papilio-  
 naceis.

## XII. De Arbore Judæ.

**N**ote sunt, Folia circinata ferè rotunditatis *Asa-*  
*ri* sed majora, alternatim in ramulis nascentia;  
 floris structuræ peculiaris, folia etenim lateralia *Ala-*  
*dicta,* folium superius seu vexillum superant, præter  
 aliorum hujus generis normam, præterea folium in-  
 ferius è duobus foliis seu majoris partibus penitus se-  
 paratis componitur; Siliquæ longæ, compressæ, mem-  
 branaceæ. *R. Meth. A. p. 162.*

1. *Cercis Offic.* prior *Theophrasti* quibus-  
 dam, aliis *Colytea Theophrasti R. H.* Ar-  
 bor Judæ *Ger. Park.* Judaica *Chab.* Judaica ar-  
 bor *J. B.* siliqua sylvestris rotundifolia *C. B.*  
 sylvestris vulgaris *Jons. D.* spuria rotundifolia  
 sylvestris *Volck.* Siliquastrum *El. Bot.* Gus-  
 Das

das Baum. In hortis colitur. Æstate florens.

2. Acacalis Offic. quorundam, sive Kesmesan foliis Ceratiæ J. B. Dioscoridis C. B. Siliquæ sylvestri similis ejusd. Jons. D. Wilde Schoten. Acacalis. Circa Constantinopolin reperitur. Usu. Semen. Vires. Tam vulgare Constantinopoli ad oculorum morbos est remedium, ut tritum sit proverbium; Si dolent oculi habes Chesmesen R. H.

### XIII. De Spartio.

**A**ltitudine suâ & viminibus junceis à Genistellâ differt. R. Meth. A. p. 162.

Spartium Offic. Chab. arborescens seminibus lenti similibus C. B. Jons. D. Spartum Hispanicum frutex vulgare Park. Genista Hispanica Ger. juncea J. B. Hispanica, floribus luteis amplis, seminibus lenti similibus Herm. Cat. Spanische Pfriemen. In Italia, Hispania, &c. nascitur. Junio & Julio floret. Usu. Vimina, flores, semina. Vires. Cum Genista vulgare viribus convenit, quâ tamen efficacior est.

### XIV. De Scorpio.

**N**ote sunt, tota ex aculeis densissimis ferè componitur; folia enim post exortum brevi decidunt. R. Meth. A. p. 162.

A. 1. Scorpius Offic. Genista spinosa vulgaris Ger. emac. spinosa major longioribus aculeis C. B. Jons. D. spinosa major vulgaris seu

Scorpius Theophrasti quam Gaza Nepam transtulit *Park.* Genistellæ spinosæ affinis, Nepa quibusdam *J. B.* spinosæ affinis Nepa & Scorpius quibusdam *Chab.* Genista-Spartium majus longioribus aculeis *El. Bot.* Gespels Dorn. Scorpions-Kraut. Ericetis & inculcis nascitur, Vere floret. *Ufu.* Tota planta, *Vires.* Cum Genista viribus convenit.

A. 2. Nepa *Offic.* Genista aculeata minor sive Nepa Theophrasti *Ger.* spinosa minor *Park.* spinosa major brevibus aculeis; *C. B. Jons. D.* Genista-Spartium majus brevioribus aculeis *El. Bot.* Klein Gespels Dorn. Scorpions-Kraut. Psriemen-Kraut. Cum priore convenit. Autumno floret. *Ufu.* Tota planta, *Vires.* Cum priore viribus etiam convenit.

Pag. 461. post lin. 14. adde:

## XVI. De Anagyride.

**N**ote sunt, odor fœtidus, flores è foliorum sinibus bini, terni aut quaterni simul exeuntes, figurâ, observante *D. Tournefortio*, peculiari, siquidem folium superius multo brevius est reliquis. *R. Meth. A. p.* 163.

Anagyris *Offic. Chab.* fœtida *C. B. Ger. Park. Jons. D.* vera fœtida *J. B.* Stinckendt Bohnen-Baum. Bohnen-Klee. In Italia provenit. Majo & Junio floret. *Ufu.* Folia, Semen. *Vires.* Tenera Folia trita tumores illitu reprimunt: si partus hæreat & secundæ mensesque morentur; drachmæ pondere bibuntur



tur in passo: sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino: Radicis cortex concoquendis, discutiendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet. *Diosc.*

## XVI. De Laburno.

**C**ujus nota, statura & magnitudo insignis; Flores plures simul velut in racemo dependentes. R. Meth. A. p. 163.

Laburnum *Offic. Chab.* arbor trifolia Anagyridi similis *J. B.* Anagyris *Ger.* non foetida sive Laburnum majus *Park.* non foetida major vel Alpina *C. B.* foetens major vel Alpina *Jons. D.* Cytisus Alpinus latifolius flore racemoso pendulo *El. Bot.* Kleiner Bohnenbaum ohn Gestanf. In montibus provenit. Junio & Julio floret. *Ufu.* Folia. Semen. *Vires.* Purgat per inferiora & superiora vehementius.

## XVII. De Cytiso.

**S**tatura eà humilior quam præcedens, & magnitudo minor, siliqua compressa. R. Meth. A. p. 163.

1. Cytisus *Offic.* incanus siliquis falcatis *C. B.* *Jons. D.* septimus cornutus *Ger.* siliquâ incurvâ folio candicante *J. B.* siliquâ incurvâ *Chab.* Medica frutescens incana, seu Trifolium frutescens incanum siliquâ falcatâ planâ, folio candicante *P. Al.* Medicago trifolia frutescens incana *El. Bot. T. inst.* Falcata incana *Rivin.*

Gehöreter Weißklee, Grau- & Staudichter Weißklee mit Sichel- & Formigen Schoten. In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Refrigerant: tumores discutunt: decoctum potu urinam ciet. *Diosc.* Ex hujus ligno Turcæ ensium manubria conficiunt. *Volck.*

Quamvis Veteres unicam tantum Cytisi speciem descripserunt idque imperfectè; Recentiores tamen plurimas invenerunt plantas quibus id nomen attribuunt. Quocirca stirps quam hic propono æquo jure Cytisi *Dioscoridis* nomen sibi vindicare potest quàm alia quævis, imò potiori, cum *Volckamerus* lignum ejus hodiè in usu esse apud Turcas affirmet (ut supra scripsi) adeoque si illarum regionum nativum non est, tamen ibi probe cognitum sit.

2. Pseudo-cytisus *Offic.* hirsutus. *Ger.* Cytisus hirsutus *J. B.* quartus Hispanicus *Clusii Chab.* Hispanicus arboreus *Park.* foliis sub-ruffa lanugine hirsutis *C. B.* Staudichter Weißklee mit rauhen Blättern. In Italia & Sicilia invenitur. *Usu.* Folia.

3. Acacia altera *Offic.* altera trifolia *Ger.* altera *C. B.* secunda seu altera *Dioscoridis Park.* Asphaltatus secunda trifolia, quæ Acacia secunda *Matthiolo trifolia J. B.* secunda trifolia, Acacia secunda quorundam *Chab.* Cytisus spinosus *Herm. Cat.* spinosus Acacia dictus *R. H.* Cytiso-spartium aculeatum Acacia trifolia dictum *P. Al.* Einander Egyptischer Schoten-Dorn. In Sicilia, Italia, &c. reperitur.

ritur. *Ufu.* Succus. *Vires.* Astringit, sed viribus inferior [est quàm vera Acacia] & ocularibus medicamentis utilis. *Diosc.*

Pag. eadem post lin. ult. adde:

### XIX. De Colutea.

**S**iliquis vesicæ in modum turgidis & velut inflatis ab aliis distinguitur. R. Meth. A. p. 163.

Colutea *Offic.* Ger. vesicaria C. B. J. B. *Jons.* D. Chab. vesicaria vulgaris Park. Falsche Senet Blätter. Welsche Linsen. Schaf-Linsen. In hortis colitur. Junio & Julio floret. *Ufu.* Folia, Semina. *Vires.* Purgant non solum per inferiora, sed & vomitiones movent.

### XX. De Acacia.

Pag. 510. pro 2da Specie Acaciæ adde:

2. **L**ycium Indicum *Offic.* Indicum putatum *Garciaë* Park. Garcia sive Cate J. B. Chab. foliis Ericæ C. B. Ericæ foliis, Cate Garciaë *Jons.* D. Arbor spinosa in Java, unde Cate ejusd. spinosa, unde Cate sive Lycium exprimitur Bont. Indianischer Bux Dorn. In India Orientali oritur. *Ufu.* Succus inspissatus Cate dictus. *Vires.* Dentes & gingivas corroborat & firmat.

Num Cate Bontii & Terra Japonica sive Catechu una & eadem res sint, dubium est non facile solubile inter eruditos hujus seculi. Ex proximitate nominum Cate & Catechu facile inducor ut credam eandem esse. Verum è contrario *Helbigius*, ut in superiore meo li-

bro p. 387. monui, diserte affirmat Catechu ab arbore illa desumi, cujus fructum Indigenæ cum calce & Betle foliis manducant, quam *Bontius* fidenter affirmat *Arecæ* seu *Fau-fel* fructum esse; tanto viro non possum non fidem adhibere; præsertim cum considero illum eo loci diu vixisse. Cùmque tanta observetur varietas in colore & pondere *Terræ Japonicæ*, quamvis sub eodem nomine omnes huc adferantur, non video cur diversarum plantarum genimina esse non possint.

## SECTIO XI.

### De Partibus Stirpium minus cognitarum.

#### *II. De Corticibus minus cognitis.*

Pag. 470. post lin. 4. adde:

**P**seudo-cassia Dioscoridis *Jons. D.* Cannela crassiore cortice vulgari *ejusd.* Pseudocassia sive Cinnamomum vulgare, crassiore cortice *J. B. Chab.* Cinnamomum seu Cassia crassior, Pseudo-cassia *C. B. Wilder Cinnnet Baum. Caneel Baum.* Ex India Orientali transportatur.

## III. De Lignis minus cognitis.

## De Agallocho seu Ligno Aloes.

Pag. 472. post. lin. 12. adde:

**R**everendus Pater Camelli in Syllabo suo varia hujus ligni genera adnotavit, quæ ex Appendice eruditissimi viri Joannis Radii Dendrologiæ huc transcribam.

Lignum Aloës *Manilam* Sinæ de *Cauchina* defertur triplex.

1. *Sokhio*, quod caudicis pars extrema esse videtur, leve, coloris cinerei, ex nigro virgatum, amarum tantillum, odoratum modicè, non gummosum. 2. *Thimhio*, est *Officinarum*, subnigrum solidum & ponderosum, striis & venis intersectum, gummosum, amarum, valdè odoriferum, aquis in-natans. *Hisp.* Calamba. 3. *Gilam-hio*, ex cinereo est pallescens, molle sed odoratum validè.

Aliud *Kalapà* dilatatum adservo, *Thim-hio* magis fuscum, & magis ponderosum, & aquæ fundum petens. Aliud præterea lignum *Sinæ* afferunt nigerrimum, odoris modici, quod *Vai-hio* vocant. Aliud verò rufescens, odoris præstantissimi, *Chitua* vocant.

His addi potest quod nuper à doctissimo viro D. Jacobo *Cunningham* ad ingeniosissimum D. Jacobum *Petiver* transmissum, & ab illo mihi communicatum est in his verbis.

## De Ligno Calambac &amp; Aloes.

**C**alambac verum cognoscitur ex ejus odore suavi, gustu amaricante & aromatico, & ex ejus mollitie instar Cerae vel Mastiches cum dentibus masticatur, & digitorum unguibus cedit. Bonitatis varii sunt gradus, unde ejus valor (in Regno Cochinchinensi sive Annamico, ubi praecipue si non solummodo provenit) à 10 ad 50 Tael & amplius ascendit pro una libra Anglica. Respectu coloris tria sunt genera, scil. Coloris varii seu nigro-purpurei instar capitis Anatis (sicut comparationem instituunt Annamici. 2<sup>o</sup>. Coloris maculati instar Tigris, 3<sup>o</sup>. Coloris flavi, velut luteum ovi. Quod sua sponte in terram decedit, id plerumque coloris est varii & melioris notæ. Calambac lingua Annamica vocatur Kenam, Mercatores Sinae Tokienses Kelam pronunciant, vocabulum verò mon vel moe significat Lignum, unde fortè derivatur vox Calambac. Lignum Aloes in ejus decocto vel succo coctum pro Calambac vero à quibusdam venditur, sed diutius siccatum fragrantiam, mollitiem, &c. amittit.

Lignum Aloes seu Agallochum, quo propius ad Calambac accedit, eo melius, plerumque verò durius est, & cum masticatur, quasi pulvis in ore magis siccum est, nec adeò pingue, & omnibus aliis qualitatibus debilioribus dignoscitur. Ejus libra una valet ad 5 mas ad 6 Tael. Lignum Aloes Lusitanicè Pao Agula; Annamicè Keang i. e. odorum nominant. Sinae linguâ Mandarinica hoc Tchih-hiang, i. e. odorum pavidum seu fundum petens,

tens, alterum Suk-hiang i. e. odorum pingue vocant.


Arbores Ligna hæc producentes diversi esse generis quidam asserunt, alii negant; qui asserunt, dicunt arborem bacciferam Do dictam (cujus specimen habetur in herbario tuo sicco) Lignum Aloes producere, quæ fortè est Arbor baccis rubris à Serapione memorata: alii dicunt ex variis arboribus fieri Lignum Aloes: ab omnibus autem conceditur Calambac fieri ex arbore cujus fructus (quem nunc mitto) ferè pyriformis, lanuginosus, magnitudine Myrobalani citrinæ, cortice crasso & lignoso vel fungoso, bifariam dehiscens, totidem semina (septo medio intercepta) turbinata cum appendicibus membranaceis continet calyci insidens quinquifido. Fructus pulverisatus ad ventris tormina insigne remedium.



# ZOOLOGIA.

## CLASSIS PRIMA,

### *De Animalibus Exanguibus.*



## SECTIO I.

### De Animalibus Exanguibus minoribus, seu, de Insectis,

#### Insecta Apoda:

Pag. 481. post lin. ult. adde:

#### *III. De Limace.*

**A** 1. *Limax ruber* *Offic. Schrod.* quartus subrufus, montanus *List. Hist. Animal. Angl. App.* subrufus *Ejusd. H. Conch.* magna Germanis à colore ruffa *Aldrov. Jons.* Grosse rothe Schnecke. In agris reperitur. *Usu.* Liqueur Limacum hoc in modo paratus. Rubri Limaces concisi miscantur cum pari pondere salis communis conjicianturque in manicam Hippocratis, ut in



in cella defluant in liquorem. *Vires.* Dolentes partes podagricæ illinuntur, & verrucæ scalpello prius abrasæ faciliè averruncantur. *S. Closs.* Ani procidentiam tollit. *Schrod.*

A. 2. *Limax ater* *Offic. List. Gesn.* tertia tota nigra *Ald. Jons. Schwarze Schnecke.* *Vires.* Contusa & applicata Ulcera mirificè leniunt. *Enzelius.*

*Insecta pedata non alata.*

*VII. De Araneo.*

Pag. 483. post lin. 15. adde:

A. 2. *Araneus niger* *Offic. List. H. Animal.* *Angl. Schwarze Spinne.* In sylvis, dumetis & pascuis non infrequens. *Vires.* Inter approbata remedia D. *Matthæi Lister* Equitis aurati, proavi mei plurimum honorandi, illud invenio, quod sine invidia communicandum putavi; nimirum aquam stillatitiam ex Araneis nigris optimè vulnera sanare; idque fuisse ex secretis D. *Gualteri Raleigh*, fortissimi viri. *List. Hist. prædict.*

Pag. 484. post lin. 13. adde:

*X. De Julò.*

A. *Julus* *Offic. Mouff. Charlt. Ex. Aldrov. Jons. Mer. pin. Kleiner Bielsfuß / Gally-Wurm.* Insecta est terrestris longa, ex annulis multis compacta, multis pedibus arcuatim repens, si tangitur in globum se complicans. In hortis reperitur. *Vires.* Ictericæ

tiæ & Urinæ difficultati confert ex vino potus. *Gharlt.*

### XI. De Scolopendra.

**A.** Scolopendra *Offic. Charlt. Ex. Mouff. Mer. pin. terrestris Aldrov. Jons. Bielfuß/ Dyrwurm.* Vermiculus est longissimus, planus, gracilis, trium digitorum longitudine, coloris sublutei aut ruffi, pedibus multis utrinque refertus, & antennis binis longiusculis, caudaque bifida ornatus. *Vires.* In vino cocta pro depilatoria à quibusdam æstimantur.

### XII. De Scolopendra marina.

**A.** Scolopendra marina *Offic. Charlt. marina prima Rondel. Aldrov. Jons. marina rubicundior Mouff. Mer. pin. See. Bielfuß.* In profundo maris invenitur *Gesn.* In Ostrearum areis *Mouffet.* *Vires.* In oleo decocta si illinatur, avellit capillos: sed contactu pruritus facit. *Diosc.*

Insecta Anelytra, seu pennis nudis & detectis.

Pag. 487. post lin. 3. adde:

### XIV. De Vespa.

**A.** Vespa *Offic. Mer. pin. Aldrov. Charlt. Ex. Mouff. Jons. Eine Wespe. Usu Insectæ. Vires.* Obstructiones renum & vesicæ aperiunt, cal-

calculum frangunt, & à quibusdam cum Asellis æstimantur virtutibus convenire.

## XV. De Crabrone.

**A.** Crabro *Offic. Aldrov. Mer. pin. Jons. Mouff. Charlt. Ex. Eine Hörliß oder Hörnsen. Usu. Favi. Vires.* Adversus Scrofulas equis infunditur. *Charlt.*

## XVI. De Formica.

Pag. 487. post lin. 14. adde:

**A.** 2. Formica major *Offic. Aldrov. Herculeana* *ἰππομύρμηκες Charlt. Ex. alata ἰππομύρμηκες Aristoteli ejusd. major Aristoteli ἰππομύρμηκες Jons. Ross. Almeiß. Vires.* Venerem excitat: oleum per infusionem Podagram & Paralyfin juvat.

In Capite de Gummi Laccæ, *Garcie* opinionem tradidi, nimirum formatum illud esse à magnis quibusdam formicis alatis: contrarias etiam opiniones retuli; ut easdem hic repetere non sit opus. Verum an Arbores istæ à Formicis prædictis terebrentur, an ab Indica quadam Formica tota specie diversa, non aulim determinare.

## XXI. De Eruca.

Pag. 489. post lin. 23. adde:

**P**inum Erucæ à *Dioscoride* absque descriptione nominantur. Hæ à *Matthiolo* in Pinnis Tridentinis frequenter inveniri traduntur:

tur: quæ, quantum ex ejus descriptione colligere licet, gregariæ sunt, Sepiariarum nonnullarum adinstar, quæ telâ amplâ universæ se includunt.

## Insecta Coleoptera, seu Vagini-pennia.

### XXII. De Scarabæo.

Pag. 490. post lin. 22. adde:

4. **B**uprestis *Offic. Aldrov. Jons. Mouffet. Charl.*  
*Ex. Ein Qualster/ grüner stinckender Käfer.*  
 Ex *Cantharidum* genere esse videtur; sed oblongiore corpore; elytrum exterius ex viridi flavescit, vel potius aurum imitatur. Longiora item crura habet, & crassicula. Oculi globosi, prominentes. Ex fronte juxta oculos, duo cornua oblonga articulata gerit. Caput parvum; Os patulum durum robustum, forcipatum, dentatum, quo crudeliter vulnerat & mordet. Venter non rotundus, sed in longum productus. *Vires.* Eroderere, ulcerare calorem elicere vim habent. *Diosc.*

Buprestis à *Dioscoride* memoratur his verbis: *Simili modo vocantur Buprestes genera quædam Cantharidum.* Quæ Descriptio adeo brevis est, ut magnas controversias excitaverit inter Auctores Zoologicos. Descriptio quam hic exhibeo à *D. Pennio* desumpta est, qui affirmat, quod circa Heydelbergam frequen-

quentes inveniuntur; suntque Capricorni species. *Plinius* Buprestes in Italia frequentes esse scribit, quas *Matthiolus* Scarabæi parvum genus esse ait: *Mouffetus* præter prædictam Bupestrin à *Pennio* descriptam, 3. aut 4. Scarabæorum species meminit, quas pro Buprestum generibus habet. Nonnulli Araneum parvum rubicundum pro Bupresti habent, sed præter rationem. Neque Gryllo-talpæ figura in Anglica editione *Dodonæi* absque censura transeunda est.

Pag. 491. lin. 6. post verbum *Offic.* adde:

Cochenille *Durat.* Coccinilla *Laet.* Cochinele, Coccus radicum *Grew. Mus. R.S.* Cochinille, sive Fici Indici grana *Park.* Ficus Indicæ grana *C. B.* Nepalnocheztli, seu Coccus Indicus in Tunis quibusdam nascens *Nieremb.* Scaraboolus hæmisphæricus Cochineelifer *Gaz. Pet. T. 3. fig. 5.* Cochineal *Act. Philos. Lond. n. 176. 193.*

Pag. 493. lin. 6. subjunge:

Quamvis Cochinilla Officinarum Scarabæi *Marien*, *Würmchen* nostratibus dicti species sit; non est tamen noster communis, ut *D. Salmonus* in *Dispensatorio* suo & *Seplasiario Londinensi* erroneè affirmavit. Nam quamvis 8. aut 10 species Scarabæi illius in Anglia viderim, nullus tamen ex eis compressus aut contusus delicatum illum Cochinillæ colorem præbuit.

In *Actis Philosoph. Londin. n. 292.* D. *Lewenboeck* microscopicas quasdam observationes dedit de *Cocconilla* ad probandum eam animale substantiam esse non fructum aut ex crescentiam alicujus Plantæ, ut *Mercator* quidam *Amsteredamensis* existimabat. Quod ad argumentum quo utitur ad opinionem suam confirmandam, nimirum quod Insecta hæc transmutationem non subeant, quia in ovis quæ ex eorum corporibus exemit, Animalculum sex pedibus præditum semper observaverit; cum ad contrarium probandum æquè inservire possit hoc argumentum: nam cum *Scarabæorum* genus ova ponit, quæ omnia in *Hexapoda* Animalcula abeunt, quæ in *Scarabæos* tandem mutantur. His addere liceat, quod ingeniosus ille *Rerum naturalium* exquisitor D. *Jac. Petiver* in *Gazophylacio* suo *Tab. 1. fig. 5.* *Cochiniliæ* in omnibus suis formis figuras exhibuit: scil. *Hexapodis, Aureliæ, & Scarabæi.*

Pag. 394. lin. 17. subjunge:

### XXV. De *Blatta*.

**A.** *Blatta* *Offic. foetida* *Mouffet. Charlt. Ex. Aldrov. Jons. Insect. Mer. pin. Scarabæus impennis tardipes* *Gazophylac. Nat. & Art. Tab. 24. fig. 7.* *Schabe / Motte / langsam-friechender Wurm.* In cellis vinariis reperitur. *Vires.* Cum oleo decocta aurium dolores instillatu mitigant. *Diosc.*

## SECTIO SECUNDA.

## De Exanguibus majoribus.

*Exanguia Mollia, sive Mollusca.*

Pag. 496. lin. 18. subjunge:

## II. De Lepore marino.

**L**epus Marinus, Offic. Charl. Ex. marinus primus Aldrov. Jons. See. Hase. Maris incola est, Loliginī parvæ similis est describente Dioscoride. *Vires.* Per sese tritus, aut cum Urtica marina illitus capillos evellit. *Diosc.*

## APPENDIX.

*Zoophyta Exanguia Mollia.*

**Z**oophyta sunt, quæ nec animalium, nec plantarum, sed tertiam ex utroque naturam habent, & ut Aristoteles loquitur, τὰ ἱκταμφορεῖζοντα φύτῃ ἔ ζωῷ, quæ ambigunt inter plantam & animal, quæ Plantanimalia dici possunt. C. B. Pin.

## III. De Pulmone marino.

**A.** Pulmo marinus Offic. Aldrov. C. B. Jons. See. Lunge. Mari innatat. Colore est crystalli in modum pellucido, cum cœruleo misto, substantia tam fragili, ut vix è mari integer eximi queat. *Vires.* Podagras per-

nionesque emendat Pulmo marinus recens tritus & illitus. *Diosc.*

#### IV. De *Urtica marina*.

*Urtica dicta*, quòd admota contrectantis manum pungat. *Plin.*

A. *Urtica marina* *Offic.* *Aldrov.* *Charlt. Ex. Jons.* *marina* 5. & 6. *Rondeletii C. B.* *Urticæ vel Pulmonis marini species Mer. Pin. See-Nessel.* Aquis innatat æstuque maris in litore sæpe rejicitur. Corpora sunt pellucida rotunda compressa gelatinæ in modum cum venis rubris intermixtis. *Vires.* Cum Lepore marino viribus convenit.

#### Exanguia Testacea.

##### *Turbinata.*

#### VIII. De *Buccino*.

Pag. 504. lin. 1. post verbum [ostendimus] adde:

*Clonia* *Offic.* est media pars circa quam testa volumen claviculatim intorquet. *Vires.* Cremata simili modo Purpuris Buccinisque facultatem urendi consequuntur. *Diosc.*

##### *Bivalvia.*

#### X. De *Ostre*o.

Pag. 505. lin. 29. post verbum [est] adde:

3. *Fœtus*, i. e. *Vesicaria marina* *Offic. J. B.* *Chab. Cat. Angl.* *Pila marina* velut ex ampullis



pullis constans ad spumæ similitudinem C. B. Ein See-Ball. Hæ æstu maris in litora sæpe rejiciuntur. 4. Testa petrificata, i. e. Lapis Ostracites Offic. Ostracites Laet. Boet. maximus rugosus & asper List. H. A. A. Plot. H. Ox. Tab. 4. fig. 19. major crassiusculus, vulgari Ostreo non abfimilis Lud. Lithog. Testæ similitudinem habet, crustosus & in laminas fissilis. In fodinis & glareosis reperitur.

Pag. 506. lin. 6. junge:

Ostracite utuntur mulieres pumicis loco ad pilos auferendos. Potus in vino menses fluentes sistit. A purgatione sumptus conceptionem prohibet. Ad nomas, & mammarum inflammationes imponitur utiliter. Diosc. Cum floribus Chamæmeli sumptus Lithontripticum insigne æstimatur.

Pag. 508. lin. 9. subjunge:

### XV. De Pectunculo.

A. Pectunculus Offic. Charlt. Ex. vulgaris, albidus, rotundus, circiter 26. striis majusculis, & planioribus donatus List. H. A. A. capite minore, rotundiore, & magis æquali margine List. H. C. Concha striata prima Aldrov. Eine Muschel. Passim in littore arenoso magna copia reperiuntur. Usu. Caro in culinis, testa in Officinis. Vires. Caro gratissimi saporis est, tam cruda quam cocta. Ex testa usta & in cinerem redacta dentifricia optima conficiuntur.

## XVI. De Tellina.

**A.** Tellina *Offic.* Aldrov. Jons. Charlt. Ex. mari Italici Bonan. intus ex viola purpurascens in ambitu serrata *List. H. A. A.* subfusca angustior intus purpurascens *ejusd. H. C.* Bräunlichte kleine Schnecke. In mare capiuntur. *Vires.* Recentes alvo utiles, sed maximè jus earum. Salitæ uruntur, tritique in cinerem & cum cedria instillatæ, avulsos palpebrarum pilos renasci non patiuntur. *Diosc.*

## XVII. De Chama.

**C**Hama *Offic. Charlt. Ex.* ab altero tantum latere ferè naturaliter hiantibus *List. H. C.* Chama, alio nomine Glycymerides magna, hoc est, Chama magna dulcis *Bonan.* Chama Glycymeris *Aldrov. Rondel. Jons.* Grosse Muschel/ Bastart-Muschel. In mare Iberico reperitur. *Vires.* Chamarum aliarumque conchularum in exigua aqua decoctarum jus, alvum ciet; id cum vino assumitur. *Diosc.*

## XVIII. De Farragine.

**A.** Farrago *Offic. Aristot.* Australis, Aleyonium secundum Dioscoridis *C. B.* Vesicaria marina nigra, Farrago Aristotelis quorundam *J. B. Chab.* Mytilorum aliorumve testaceorum foetura nobis videtur.

## Exanguia Crustacea.

Pag. 508. post. lin. ult. adde:

### XX. De Astaco marino.

**A.** Astacus *Offic.* Aldrov. marinus communis  
*Jons.* marinus *Mer. Pin. Charlt. Ex. Seez*  
*Krebs / Humber.* in mari capiuntur. *Vires.*  
Caro multum nutrit, undè in Phthisi com-  
mendatur. Crusta seu Testa cremata in vino  
pota Renes expurgat, & Calculos frangit.

### XXI. De Squilla.


**A.** Squilla *Offic.* *Jons.* *Charlt. Ex.* parva *Mer. Pin.*  
parva *Rondeletii Aldrov. Garnat/ Garnel/*  
*kleine Seez Krebs oder Krabbe.* In mari capiun-  
tur. *Vires.* Cum Astaco viribus convenit.

Pag. 509. lin. 2. deleatur verbum *marinus*  
cujus loco lege *Pagurus.*

Pag. 509. lin. ult. junge:

### XXIV. De Echino Marino.

**A.** Echinus marinus *Offic. Mer. Pin. Aldrov.*  
*Jons.* Ein Seezgel / Hochei. In alto mari  
capiuntur. *Vires.* Stomacho ventriq̃ue uti-  
lis est: urinam cit. Hujus testa cruda inassa-  
ta commodè medicamentis admiscetur, quæ  
Pforas abstergunt. Crematæ verò cinis for-  
dida ulcera expurgat, luxuriantem carnem  
reprimat.



## CLASSIS SECUNDA.

De

Animalibus Sanguineis.

## SECTIO PRIMA.

De Piscibus.

*De Piscibus Anguilliformibus, seu  
levis, lubricis.*

Pag. 512. post lin 12. adde:

## I. De Lampetra.

**L**ampetra figura oris rotunda seu ovali, foramine in summo rostro, pinnarumque tum ventralium tum branchialium carentia ab aliis omnibus sui generis, hoc est longis & lubricis piscibus, facile distinguitur. R. Ichthy. p. 104.

A. Lampetra Offic. Rondel. Jons. major Aldrov. R. Ichthy. Salvian. Mustela sive Lampetra Bellonii Gesn. Eine Lamprete. In fluminibus majoribus, quæ è mari subeunt, frequens reperitur. Usu. Caro. Vires. Caro venerem stimulat, multum nutrit.

II. De

## II. De Serpente marino.

Serpens marinus Offic. Aldrov. Gesn. Rondel. Bellon. Salv. Jons. Charlt. Ex. See: Schlange. In mari Mediterraneo reperitur. Ufu. Caro. Vires. Cum radice Liliæ Urinæ incontinentiam juvat. Plin.

Pag. eadem post lin. 2. adde:

## IV. De Remora.

Remora Offic. Aldrov. Imperat. Charlt. Ex. Jons. Iperuquiba & Piraquiba Brasiliensibus Margg. Saugendfisch/Schiffhalter/Schiffhemmer. In alto mari reperitur. Vires. Venerem inhibet, Abortus prohibet, fœtumque ad maturitatem continere creditur. Aldrov.

Pag. 513. post lin. 3. adde:

## VI. De Siluro.

Silurus Offic. Rondeletii Gesn. Glanis Aldrov. Salv. Wells/Weller/Scheid/Scheiden. In Danubio flumine, &c. reperitur. Ufu. Caro. Vires. Recens in cibo nutrit & facilem præbet alvum, sale verò conditus, minimum suppeditat alimentum: arteriam expurgat & vocem expedit. Illita saliti caro aculeos & infixæ corpori spicula extrahit. Muria ejus incipientibus dysenteriis prodest, si in defidentium fœtus adjiciatur: fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusu medetur. Diosc.

Pag. 513. lin. ult. subjunge:

De Piscibus corpore contractiore vel saltem non admodum lubrico, qui pinnis ventralibus carent.

### VIII. De Hippocampo.

**H**ippocampus *Offic. Rondel. Aldrov. Mouffet. Jonsf. Charlt. Ex. See-Ros.* In mari Mediterraneo capiuntur. *Vires.* Cremati cinis exceptus cum Liquida pice, Axungia, seu Amaracino Unguento illitus, Alopecias replet. *Diosc.* Remedium adversus Canis rabidi morsum, *Ælian.*

### IX. De Acu.

**A**cus *Aristot.* secunda species *Rondel.* secunda Species *Rondeletii Gesn.* Acus *Aristotelis Aldrov. Jonsf.* Typhle, sive Typhline Antiquorum *Bellon.* Horn-Fisch / Pfeffer-Fisch. In mare Adriaticò invenitur. *Vires.* Cinerem in potu ad stillicidium urinæ commendat. *Galen.*

Pisces non aculeati tribus in dorso pinnis donati.

Quamvis lapides seu officula Dentalio in Officiis Pharmacopolarum similia in capitibus Asini Antiquorum dicti observentur,  
ut,

ut & Afelli mollis; & ut opinor, in reliquis hujus generis omnibus: verum tamen seu genuinum ex Afello majore desumitur. Quocirca Synonyma omnia Prioris mei libri p. 656. dele, & eorum vice substitue.

## X. De Afello.

1. **A.** Afellus *Offic. Jons.* major *Charlt. ex. ma-*  
*ior. vulgaris R. J&h.* Merlucius, Cabeliau *Mer. Pin.* major vulgaris, Belgis Cabeliau. Morhua vulgaris (maxima Afellorum species) *Bellon.* Morhua vel Molva altera *Aldrov.* Molva, vel Morhua altera minor *Rondel. Gesn.* Frischer Cabeliau. *Stocffisch.*

A. 2. Oniscus *Offic.* Afellus mollis major, seu albus *R. I&by.* mollis *Jons. Tab. 2. Mer. Pin.* An merlanus *Rondel.* *Wheitings.* Kleine Rotscheer. In mari reperitur. *Ufu.* Caro, Jecur. *Vires.* Caro omnes gentes & judicant, & sentiunt esse saluberrimum. *Turn.* Jecur in Phthisi commendatur.

Pag. 514. lin. 19. lege:

*Pisces non aculeati quibus unica in dorso pinna marini.*

Pisces non aculeati, quibus unica in dorso pinna, fluviatiles & edentuli.

Pag. 519. post. lin. 22. adde:

*XVIII. De Leucisco.*

**A.** Leuciscus *Offic.* Bellon Jons. Charlt. ex Aldrov. Mer. Pin. secundus Rondel. Leucisci secunda species Rondeletii Gesn. Sicut nig. In fluviis reperitur. *Ufu.* Caro in Culinis. Pinguedo & Fel in Officinis. *Vires.* Caro mollis suavisque est. Pinguedo aurium doloribus succurrit, & cum Felle ejusdem permista oculorum caliginem abstergit. Rondel.

*XIX. De Rutilo.*

**A.** Rutilus *Offic.* R. Icthp. sive Rubellus fluviatilis Gesn. fluviatilis Gesneri Jons. sive Rubellus fluviatilis Charlt. ex. sive Rubellus Mer. Pin. Phoxinus alter Rondel. Une Roffe Bellon. Roth. Federn. Plöße. Roddow. In fluviis frequens est. *Ufu.* Caro. *Vires.* Ad venerem excitandam à quibusdam æstimatur.

Pisces non aculeati quibus duæ in dorso pinnæ eriguntur.

*XX. De Genere Thunino.*

**N**ote sunt, præter pinnas insigniores pinnule aliquot exiguæ propè caudam summo dorso & in corpore innascentes. R. Icthp. pag. 176.

A. 1. Thunnus *Offic.* Aldrov. Jons. Charlt. Thynnus, seu Thunnus Bellon. Gesn. Orcynus Rondel. Ein Thunin oder Spansche Ma  
ckrel



*cfrel.* In alto mari invenitur. *Vires.* Conditanei Thunni caro sumpta iis auxiliatur, quos vipera, nomine præster momorderit: sed oportet vinum quàm plurimum subinde cogantur haurire, ita ut vomitione reddatur. Contra Acrimonias esitatorum maxime valet; canum moribus utilissimè illinitur. *Diosc.*

A. 2. Scomber *Offic. Rondel. Bellon. Gesn. Aldrov. Charlt. ex. Jons.* Scombrus *R. Ichthy. icon.* Ein Makrel oder Macarel. Maris incola est. *Vires.* In Ictero commendatur. Jecur obstructions juvat. *Ælian.*

Pag. 520. post lin. 16. adde:

## XXII. De Gobio.

A. Gobius niger *Offic. Bellon. Rondel. Jons. niger Rondeleti Aldrov. Gesn. marinus Charlt. ex. marinus fluviatili viridior, & maculis magis respersus Mer. Pin. Go vel Gobius marinus R. Ichthy. Icon.* Ein Meer Cob. See Quappe. See Nalraup. In rupibus marinis capitur. *Vires.* Assus & sine sale mansus, Dysenterias, Lienterias & nimia egerendi desideria, quæ cum dolore fiunt, sanat. *Sim. Seth.* Illitus contra serpentium canumque morsus auxilio est. *Diosc.*

Pisces spinosi quibus pinnarum dorsalium radii aliqui aculeati sunt.

§ Pisces aculeati duabus in dorso pinnis, anteriore autem spinis radiata.

Pag. 521. post lin. 16. subjunge:

### XXV. De Milvo.

**M**ilvus *Offic. Bellon. Salvian. Aldrov. Jons. Charlt. ex. Milvago Plin. Hirundo Rondel. Gesn. Pirabebe prima Pison. ἰγνξ Oppian. Ein fliegend Roth-Fisch. In Oceano, & in mari Mediterraneo plurimi habentur. Usu. Fel. Vires. Oculorum caliginem abstergit.*

### XXVI. De Mullo.

**M**ullus *Offic. Bellon. minor Salv. barbatus Rondel. barbatus Rondeletii Gesn. Aldrov. barbatus minor Charlt. ex. Jons. Kleine Barbe oder Barne. Roth-Bart. In mari Mediterraneo reperitur. Usu. Caro. Vires. Mullorum assiduo cibo aciem oculorum hebetari constat. Is marini Draconis, Aranei & Scorpionis moribus medetur, si crudus atque dissectus admoveatur, Diosc.*

## XXVII. De Uranoscopio.

**U**Ranoscopus Offic. Aldrov. Jons. Salv. seu Cœli spectator Charlt. ex. Callionymus vel Uranoscopus Rondel. vel Uranoscopus Ronleletii Gesn. ἡμεροσκοπίος Oppian. Ein Himmelsucker. Stern-Sucker. In mari Mediterraneo frequens capitur. Usu. Fel. Vires. Præens ad Oculorum suffusiones remedium esse estimatur.

## XXVIII. De Dracone Marino.

**A**. Draco marinus Offic. Bellon. Draco Jons. marinus & Trascina Salv. sive Araneus Plin. Rondel. Gesn. Araneus Charlt. ex. alter Aldrov. See-Drache. In Oceano nec non mari Mediterraneo capitur. Usu. Cineres recentes è capite. Ossa. Vires. Recentis è capite cinis, contra omnia venena prodesse, affirmat Rondel. Ossibus scarificatis gingivis dentium dolores sedari scribit Plin.

## XXIX. De Umbra.

**U**Mbra Offic. Salvo Rondel. Gesn. marina Aldrov. Chromis Bellon. Charlt. ex. Scicœna sive Umbra Jons. Schatten-Fisch. See-Brachs-men. Mager-Fisch. In mari Mediterraneo capitur. Usu. Ossa in capite reperta, Lapides Umbrarum Officinis dicti. Vires. Ad dolorem colicum commendantur. In Gallia aurifices argento inclusos vulgo divendere solent, ap-

pellantque *Pierres de Colique*, quasi lapides colicis utiles. Ajunt enim gestatos ac collo appensos, non solum colicos dolores abigere, sed etiam vetare, ne amplius redeat. *Bellon.*

### XXX. De Coracino.

**C**Oracinus *Offic. Rondel. Aldrov. Charlt. ex. Jons.* *Corvinus Salv. Corvo R. Ich. icon. Kappen. Ein Rab.* Cum priore capitur. *Usu.* Ossa in capite reperta, *Lapides Coracini Officinis dicta. Vires.* Ad Nephriticum dolorem vel Colicum à vulgo æstimantur, ab aliis etiam ad morbum regium. *Rondel.*

Pisces aculeati unica in dorso pinna, radiis anterioribus spinosis posterioribus mollibus.

### XXXI. De Melanuro.

**M**elanurus *Offic. Aldrov. Rondel. Bellon. Gesn. Salv. Charlt. ex. Jons. Schwartz. Schwanz. Kuhlbarsch. Ein Brandt. Fuchs.* In mari Mediterraneo reperitur. *Vires.* Assus visum acuit, jus verò Colicos sanat, teste *Kiranide.*

### XXXII. De Mæna.

**M**æna *Offic. Rondel. Bellon. Gesn. Aldrov. Charlt. ex. Jons. Houting. Cackarell.* In mari Mediterraneo etiam reperitur. *Vires.* Ex capitibus cinis, si illinatur, callosas sedis rimas abo-

abolet. Ejus etiam garam oris putrilagines collutione sedat. *Diosc.*

### XXXIII. De Smaride.

**S**maris *Offic. Rondel. Bellon. Gesn. Jons. Charlt. ex. Weisser Houting. Weiß Cackarell.* Maris Mediterranei incola est. *Vires.* Saliti caput exustum, excrecentes ulcerum oras pulvillosque reprimat, nomas cohibet, thymos clavosque absunit. Caro non secus ac sal-famentum prodest à Scorpione percussis, aut à cane demorsis. *Diosc.*

### XXXIV. De Turdo.

**A.** Turdus *Offic. Charlt. ex. secundus Aldrov. Jons. vulgatissimus R. Ich. primus Rondel. Eine Meer, Drossel oder See-Pfau.* In Oceano etiamque mari Mediterraneo reperitur. *Vires.* In Epilepsia & Pleuritide commendat *Trallian.*

**A. 2.** Merula *Offic. Salv. Rondel. Aldrov. Jons. Charlt. ex. Turneri Mer. Pin. Turdus niger R. Ich. Koch-Fisch. Meer, Schley.* In Oceano reperitur. *Vires.* In curatione Epilepsiae & dysenteriae hepaticae ex intemperie frigida exhiberi jubet *Trallian.* In distemperantia hepatis & in febricitantibus commendat *Plin.*

### XXXV. De Julide.

**J**ulis *Offic. Salv. Rondel. Aldrov. Gesn. Bellon. Jons. Charlt. ex. Regenbogen-Fisch. Zünckerlein. Dor-fella.*

fella. Circa Genuam frequens est. *Vires.* Ju-  
alvum emollit, & urinas ciet. *Plin.*

### XXXVI. De Scorpio Marino.

**S**corpius marinus *Offic.* Scorpius *Aldrov.*  
*Jons.* *Salv.* major *Rondel.* *Gesn.* Scorpio  
*Charlt. ex.* Grosser Scorp-Fisch. In mar-  
Mediterraneo reperitur. *Usu.* Fel. *Vires.* Ac-  
suffusiones oculorum, albuginem & hebetudi-  
nes convenit. *Diosc.*

### XXXVII. De Aspredine.

**A.** Cernua *Offic.* fluviatilis *Bellon.* *Gesn.*  
*Charlt. ex.* Aspredo Caii; Aurata fluvi-  
atilis *Trag.* Perca fluviatilis minor *Aldrov.* *Jons.*  
fluviatilis minor Aurata *Tragi* *Gesn.* Kaulparß,  
Kaulparß, In rivulis majoribus Angliæ. *Usu.*  
Officula in capite reperta. *Vires.* Adversus  
calculos renum; & quæ in costis alibi  
sentiuntur dolores pungentes commenda-  
*Gesn.*

### Pisces Cartilaginei.

Bag. 521. lin. ult. subjunge:

#### § De Cartilagineis planis.

### XXXVIII. De Pastinaca marina.

**A.** Pastinaca *Salv.* marina *Offic.* *Charlt. ex.*  
marina lævis *Bellon.* marina lævis *Bello-*  
n.

nii *Aldrov. Jons. marina prima Rondel.* Aquila  
 piscis, seu Pastinaca marina *Mer. Pin.* Ein  
 Weilstert. Gisst Roche/ Stachel-Roche. In  
 alto mari reperitur. *Ufu.* Jecur, Aculeus qui  
 ejus cauda enatus. *Vires.* Jecur ad pruri-  
 tum conferre prædicant, in oleo decoctum  
 lichenas & lepras tollit. *Wotton.* Aculeus  
 adversus squamis reflectitur, dentium dolores  
 mitigat, nam eos frangit & evocat. *Diosc.*

### XXXIX. *De Raia.*

**A.** Raia *Offic. clavata Aldrov. Rondel. Gesn.*  
*Mer. Pin. Charlt. ex. clavata prima Jons.*  
 Ein Roche. In Oceano reperitur. *Ufu.* Caro,  
 Jecur, Fel. *Vires.* Caro Venerem stimulat,  
 analeptica est. *Jecur* easdem vires obtinet  
*Fel* oculorum caliginem abstergit, pruritus  
 sanat.

### XL. *De Squatina.*

**A.** Squatina *Offic. Aldrov. Salv. Jons. Charlt. ex.*  
*Rondel. Gesn.* Ein Engel-Fisch oder Meer-  
 Engel. In Oceano Brittanico & alibi capi-  
 tur. *Ufu.* Ova, Coria, Cinis. *Vires.* Ova  
 exiccata ad sistenda alvi profluvia multum  
 conferre experientia compertum piscato-  
 rum, qui iis ad omnes alvi fluores utuntur.  
*Rondel.* Ex cute optimum fit in psora & sca-  
 bie smegma, ejusdemque cinis contra alope-  
 ciam & ulcera capitis manantia prodest.  
*Aldrov.*

XLI. *De Torpedine.*

**T**Orpedo *Offic. R. Ich. Aldrov. Salv. Rondel. Jons. Charlt. ex. Gesn.* Ein Bitterling. Schläfer oder Krampffisch. In mari mediterraneo reperitur. *Vires.* Diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet, eadem apposita everfam sedem prociduamque coeracet. *Diosc.*

## De Cartilagineis longis.

XLII. *De Cane Carcharia.*

**A.** Canis Carcharias *Offic. Charlt. ex. Gesn.* Carcharius, seu Lamia *Rondel.* Canis Aristoteli *Aldrov. Jons. Perck. Fisch. Grosser Hundt. Fisch.* Tum mari Mediterraneo, tum in Oceano reperitur. *Usu.* Dentes Serpentes, & dentes ejusdem petrifacti *Glossopetrae Offic. dicti. Vires.* Dentes adversus venena æstimantur: eos mulierculæ è collis puerorum suspendunt, quoniam dentitionem juvare vulgò creduntur, puerorumque arcere pavores. *Rondel. Glossopetrae* vim alexipharmacam obtinere à quibusdam creditur.

## De Piscibus Cetaceis.

Pag. 523. lin. ult. subjunge:

XLV. *De Delphino.*

**A.** Delphinus *Offic. Aldrov. Rondel. Gesn. Charlt. ex. Jons.* Ein Delphin oder Meers Schwein.



**Schwein.** In Oceano Britannico & alibi invenitur. *Ufu.* Jecur, Cinis, Venter, Adeps. *Vires.* Venter siccus & tritus in potu Spleneticos sanat. Jecur assum & in Cibo sumptum tertianam, quartanamque & omnem nocturnum typhum integrè sanare asserit *Kiranid.* Cinis inter medicamenta quæ Lichenas & Lepras tollunt, enumeratur à *Plinio.* Adeps medetur Hydropicis liquatus & cum vino potus. *Idem.*

## XLVII. De Cete.

Pag. 524. dele vocem *Orca* omniâque synonyma in 2. 3. & 4ta lineis sequentibus, ut ad *Sperma Ceti* minimè pertinentia & sequentia adde:

1. **A.** *Cetus Offic. Clus. exot. Balæna R. Ich. icon. Tab. fig. 3. Jons. icon. Tab. 42 macrocephala bipennis Sib. Obs. Balænarum tertium genus Purchas. Trompa Park.*

Præter prædictas duæ aliæ Cetorum species à *D. Sibbald. E. A.* recensentur in quorum capitibus *Sperma Ceti* invenitur.

Pag. 526. lin. 5. dele verbum *Cetus Offic.* & in ejus loco substitue *Balæna Offic.*

Alia præterea aliquot Piscium species à *D. Salmon* in *Pharmacopœia sua Londinensi* memorantur, ut v. g. *Cyprinus latus, Alausa minor, Alburnus Liparis Apue Corbitæ, Aquila marina, aurita, Conger, Clupea, Cuculus, Lavaretus, Lyra, Lochs, Orbes, Passer & Rhombus:* quibus cum

nullæ vires medicæ attribuantur, sed usus duntaxat culinares, plura de iis dicere superfedeo nomina sola sufficere existimans.

---

## SECTIO II.

### *De Avibus.*

Aves aquaticæ fissipedes maximæ.

Pag. 529. post lin. 21. adde:

Aves aquaticæ fissipedes Piscivoræ.

Pag. 530. post. lin. 4. adde:

### II. *De Ardea.*

2. **A**sterias *Offic.* Ardea stellaris *R. Ornith. Gesn. Charlt. ex.* Ardea asterias sive stellaris *Aldrov. Jonsf. Taurus Plin. Butorius & Botaurus recentioribus: Ocnus Aristotel. Ein schöner blauer Reiger. Rohrdommel. Stern, Reiger. Juncetis, arundinaceis, &c. latitat. Usu. Cutis, Plumæ. Vires. Ustæ Hæmorrhagias sistunt.*

Pag. 530. post lin. 22. adde:

## Aves aquaticæ limosugæ.

## IV. De Scolopace.

**A.** Gallinago *Offic.* Scolopax *R. Ornith. Charlt.*  
*ex.* Scolopax sive Perdix Rustica *Aldrov. Jons.* Rusticula, vel Perdix rustica major  
*Gesn.* Rusticula major *Mer. Pin.* Eine Schnepff.  
 Schnepffshuhn. Holzschneppse. In aquo-  
 sis gaudet. *Usu.* Cineres. *Vires.* Lithontriptici  
 æstimantur.

## V. De Pluviali.

**G**lottis *Offic.* Baltn. *Gesn.* Limola Venetorum  
*ejusd.* Pluvialis major *Aldrov.* major *Aldrovando Jons. Charlt. ex.* Ein groß Wasser-  
 Huhn. In aquosis gaudet. *Usu.* Fel. *Vires.*  
 Oculorum morbis medetur. Gelatina carnis  
 Analeptica æstimatur.

Aves aquaticæ fissipedes Insecti-  
voræ.

## VI. De Vanello.

**A.** Vanellus *Offic. Charlt. ex. Mer. Pin. Jons.*  
*Gesn.* Capella sive Vanellus *Aldrov. R. Ornith.*  
 Ein Gwiß. Kwiß. In aquosis etiam  
 gaudet. *Usu.* Cineres, Cor, Cutis. *Vires.* Ci-  
 neres in vino poti colicos juvant, & in Ca-  
 taplasmatis forma applicata, Canis rabidi  
 mor-

morsus sanant. Cor dolorem lumborum mitigat. Cutis in cephalalgia æstimatur.

Aves aquis innatantes fissipedes, quibus digiti nullis ad latera membranis augentur.

### VII. De Gallinula.

**G**allinularum notæ characteristicæ, quibus ab aliis avium generibus distinguuntur, sunt, Caput parvum, Corpus ferè aductum, gracile & ad latera compressum: Rostrum breve & modicè inflexum: Alæ breviusculæ, concavæ & Gallinaceis similes Cauda perbrevis: Crura longa: Digiti longissimi: Volatus breves. R. Ornith. p. 232.

A. Gallina aquatica Offic. Gallinula chloropus major. Aldrov. R. Ornith. Jons. chloropus Charlt. ex. Ein Wasser-Huhn. In piscinis juxta nobilium ædes plerunque victitat. Usu. Ventriculus, plumæ eorúmque cineres. Vires. Ventriculus in Asthmate commendatur. Fumus plumarum contra Passionem Hystericam æstimatur. Cineres ejusdem ulcera vetera, & fistulas siccant.

Aves natatrices fissipedes digitis ad latera membranis auctis.

### VIII. De Fulica.

**A.** Fulica Offic. Aldrov. Jons. Gesn. Cotta major, sive Calva Charlt. ex, Phalaris Kiranid.

*nid.* Mergus niger & Pullus aquaticus *Albert. mag.* An Cotta, sive Cutta Anglorum *Aldrov. Jons.* Ein schwarzer Taucher. Rohr- Hänlein. Locis palustribus & stagnantibus delectatur. *Ufu.* Caro, Cor. *Vires.* Cor in Epilepsia commendatur. Caro contra ictus Araneorum in usu est.

Aves palmipedes angustirostræ.

*IX. De Mergo.*

**R**ostris angustis, in extremo aduncis, serratis à reliquis Palmipedibus tetradactylis digito postico soluto differt.

A. Mergus *Offic.* Merganser *Charlt. ex. Jons. Aldrov.* Fœmina R. *Ornith.* mergus cirratus longiroster major *Aldrov. Harl. Bellon.* Ein langschnäblicher Taucher. Mergigel. In oris maritimis reperitur. *Ufu.* Jecur. *Vires.* Inveteratum autem sale mergi jecur ex hydromelite binis ligulis potum, secundas pellicit *Diosc.* Id assatum cum oleo, & modico sale datum, mirificè conferre à rabido cane morsis asserit *Ætius.* Avis totum assum & in cibo sumptum elephantia & spleni medetur. Sanguis ejus antipharmacum est, & feris venenatis resistit. Ova dysenteriam, & renes & stomachum sanant. *Kiramid.*

*X. De Laro.*

**L**arus palmipes est, Rostro oblongo, angusto, acuto, ac parumper in extremo recurvo; naribus oblongis;

*longis; alis longis & validis, cruribus breviusculis; pedibus parvis, Sc. R. Ornith. p. 261.*

A. Larus *Offic.* major *Aldrov.* hybernus *Baltn.* major *Aldrovandi R. Ornith.* fuscus sive hybernus *ejusd.* Eine *Mewe.* See *Mewe.* *Hohl's Brod.* In rivulis salis gaudet. *Ufu.* Cerebrum, Cor, Ventriculus. *Vires.* Cerebrum siccatum Epilepsiam curat. *Aurelian.* Cor in partu difficili commendatur. Ventriculum & concoctionem juvat. *Kiranid.*

## Aves palmipedes cruribus brevioribus Latirostræ.

Pag. 532, lin. 10. adde:

### XIII. De Vulpanfere.

A. Vulpanfer *Offic.* *Aldrov. Charlt. ex.* sive Chenalopex *Jons.* Tadorna *Bellon.* Chenalopex, Vulpanfer *Mer. Pin.* Tadorna *Bellonii* Vulpanfer quibusdam *R. Ornith.* Eine *Fuchs & Gans.* Ein *Lumme.* In maritimis observatur. *Ufu.* Adeps. *Vires.* Contra Herpetes & tumores faciei à quibusdam commendatur.

## Aviculæ rostris longissimis seu Piscivoræ.

Pag. 533. post. lin. II. adde:

### XVI. De Merope.

**M**erops *Offic. Aldrov. Bellon. Jons. Charlt. ex.*  
sive *Apiaster R. Ornith. Ein Bienen-Fraß* o-  
der *Bienen-Fresser. In Creta & Italia frequens*  
*reperitur. Usu. Avis ipsa, Cor, Fel. Vires.*  
*Merops & Cor ejus, Cardiacos, ictericos &*  
*stomachicos juvant; Fel cum melle & succo*  
*Rutæ oculorum suffusionem sanare tradit*  
*Kinarid.*

## Aviculæ rostris tenuibus seu Insectivoræ.

### XVII. De Alauda.

Pag. 533. lin. 19. & 20. dele *Aldrov. Gesn. vulga-*  
*ris R. Ornith. pag. 149. cujus in loco*  
substituere:

**C**ristata *Gesn. Aldrov. cristata, Viennæ Au-*  
*striæ visa & descripta R. Ornith. p. 151. Ges-*  
*sammte Lerche.*

Pag. eadem *Galeritæ viribus adde:*

*Hæc assa & in cibo sumpta cæliacos adju-*  
*vat. Diosc.*

## XVIII. De Hirundine.

Pag. 534. lin. 16. subjunge:

2. **A.** Apos Offic. Aldrov. Jons. Gesn. major Turn. Charlt. ex. Hirundo apus R. Ornith. Mer. Pin. Spiren / Rhein: Schwalben / Mauer: Schwalbe. Æstate in Anglia venit. Ufu. Avis ipsa. Vires. In vino sumpta tormina sanat. Plin.

3. Hirundo Indica Offic. maritima Act. Philosoph. Lond. n. 285. pag. 1396. Sinensis nido eduli Bontii R. Ornith. p. 157. Hirundo Chinensis Bont. pag. 66. An Hirundo exotica aquatica Jons. Mantiss. Indianische Wasser: Schwalbe. In maritimis Chinensibus. Ufu. Nidus semi-hemisphæricæ figura, ovi Anserini magnitudine, pellucidus, substantiâ ichthyocollam referente. Vires. Venerem stimulat.

## XIX. De Rubecula.

**A.** Rubecula Offic. Jons. Charlt. ex. Gesn. sive Erithacus Aldrov. R. Ornith. Ein Rohtkehlchen / Rohtbrüstlein. Ufu. Avis ipsa. Vires. Venerem stimulare à quibusdam æstimatur.

## XX. De Luscinia.

**A.** Luscinia Offic. Aldrov. Gesn. Jons. Charlt. ex. seu Philomela R. Ornith. seu Lusciniola Mer. Pin. Eine Nachtigall. Ufu. Caro, Fel. Vires. Caro in Cachexia prodest, cerebrum confortat. Fel cum Melle illitum, visum perfectè acuit. Kiranid.



## XXI. De Ficedula.

**A.** Ficedula *Offic. Charlt. Ex. Atricapilla Jons.* five Ficedula *Aldrov. R. Ornith. p. 162. Ein Schnepfflein/Wüstling. Usu. Avis ipsa. Vires.* Ficedula in cibo aciei visui medicamentum præbet. *Diosc.*

Aviculæ magnis crassis & validis  
rostris seu Phytivoræ.

Pag. 536. post lin. 3. adde:

## XXV. De Rubicilla.

**A.** Rubicilla *Offic. Charlt. Ex. Mer. Pin. seu Pyrrhula Aldrovandi R. Ornith. Pyrrhula seu Rubicilla Aldrov. Jons. Byrriola Scalig. Ein Blut-Finck. Usu. Caro. Vires. In Colicos affectus à quibusdam æstimatur.*

Pag. eadem lin. 10. adde:

## XXVII. De Carduele.

**A.** Carduelis *Offic. R. Ornith. Aldrov. Gesn. Jons. Charlt. Ex. Aurivittis Turner. Chrysomitris & Avis Jovis quibusdam. Ein Stieglitz/Distel-Finck. Usu. Avis ipsa. Vires. Assa & in cibo sumpta, Iliacos & Colicos perfectè curat. Kiranid.*

## XXVIII. De Linaria.

**A.** Linaria *Offic. Aldrov. Gesn. Jons. Mer. Pin. Charlt. Ex. vulgaris R. Ornith. p. 190. Ein*

Denferling / Zserken. *Usu. Caro. Vires.* Analeptica à quibusdam æstimatur, Calculos & Renibus & Vesica expellit.

Aves rostro & unguibus minùs hamatis majores.

§. Aves majores rostris crassis, validis & longiusculis rectis,

Pag. 537. lin. 12. subjunge:

### XXXI. De Monedula.

**A.** Monedula *Offic. Jons. Charlt. Ex.* Graculus vel Monedula *Turn. Mer. Pin.* Monedula sive Lupus *R. Ornith. Aldrov.* Eine Thale oder Dale / Thole. *Usu. Caro. Vires.* Externe applicata tumores dissolvit, & Scrophulas juvat.

### XXXIII. De Graculo.

**G**Raculus *Offic. Charlt. Ex.* Argentoratensis *Aldrov. R. Ornith. Jons.* Eine wilde Thale / Häher. In agro Argentoratensi reperitur. *Vires.* Cum Monedula viribus convenit.

Aves

Aves majores rostris brevioribus  
aut minoribus donatæ, seu  
Granivoræ.

*Gallinaceum Genus.*

XXVI. De Gallo gallinaceo.

Pag. 539. lin. 7. post verbum *Ova* adde:

**L**apis in ventriculo reperitur *Lapis Alectorius* in *Officinis* dictus: colore variat, interdum enim Chalcedonio & Crystallo obscuro similis est, interdum fuscum, vel cinereum colorem habet, interdum sanguineis venis distinguitur: raro, *Plinio* teste, fabe magnitudinem excedit.

Pag. 540. ad finem *Vires Galli gallinacei* adde:

*Lapis Alectorius* Venerem excitat ori inclusus, sitim ac cordis æstum sedat, mulieribus virorum gratiam conciliare, constantiam, ac eloquentiam gestatori tribuere, contraque quævis pericula tutum facere creditur, scribit *Boetius*; sed credat qui vult.

Pag. 541. post lin. 18. adde:

XXVIII. De *Meleagride*.

**A.** *Meleagris* *Offic.* Gallo pavo *Aldrov. Gesn. Jons. Charlt. Ex. Mer. pin.* Gallo pavo sive *Meleagris* & *Numidica avis* *R. Ornith.* *Gallus Indicus* *quibusdam, Welsch, oder Indianisch*

Türckisch Huhn. *Vires*. Caro Analeptica æstimator, Veneremque excitans.

Pag. 542. post lin. 13. adde:

### XXXI. De Attagene.

**A.** Attagen *Offic.* Aldrov. *Jons.* Ex. Bellon. Lappopus altera *Plin.* Attageni Aldrovandi seu Francolino Italarum similis si non eadem. *R. Ornith.* Ein Hasel-Huhn / Türck-Huhn. In altissimis montibus reperitur. *Usu.* Caro, Fel *Vires.* Conceditur purulentis à *Tralliano*, Nephriticis à *Galeno*. Cerebrum & genituram auget. *Avicen.*

Pag. 543. lin. ult. subjunge:

### XXXIII. De Turdis.

**N**ote omnibus communes sunt, magnitudo inter Columbas & Alaudas media; Rostrum longitudinis & crassitiei mediocris, deorsum modicè inflexum; Os intus flavum: Cauda longa; victus e baccis & insectis promiscuus. *R. Ornith.* p. 137.

**A. 1.** Turdus *Offic.* *Charlt.* Ex. primus *Aristot.* vulgaris *Mer.* *Pin.* Viscivorus minor Bellon simpliciter dictus *Aldrov.* *Jons.* simpliciter dictus sive Viscivorus minor *R. Ornith.* Ein Ziemer oder Krammetz-Vogel. *Vires.* Myrtorum baccis farti & assii ventris profluvio laborantibus exhibentur *Plin.* *Bellon.* Tempore pesti in aceto macerati laudantur *Alexand.* *Bened.* Pulverem adversus Napellum commenda *Gainarius.*

A. 2. *Merula* *Offic.* *Aldrov.* *Jons.* *Charlt.* *Ex.* *Mer.* *pin.* *Gesn.* vulgare *R.* *Ornith.* *Collyrion* *Turn.* Eine Amsel / Merl. *Ufu.* Avis ipsa, *Stercus.* *Vires.* Avis inassata cum Myrti baccis dysentericis mederi scribit *Plin.* Fimus cum aceto mistus extirpat lentigines. *Jonsf.*

A. 3. *Sturnus* *Offic.* *Aldrov.* *Jonsf.* *Gesn.* *Charlt.* *Ex.* vulgaris *Mer.* *Pin.* Eine Staar / Sprehe. Circa Turres & altiora ædificiorum culmina. *Ufu.* Fimus. *Vires.* Cosmetica æstimatur, ad alphos, pannos, impetiginem & morpheim. *Galen.*

4. *Galgulus* *Offic.* *Galbula* *Aldrovandi* seu *Picus* nidum suspendens *R.* *Ornith.* *Icterus* *Plin.* *Chloreus* *Aristot.* *Oriolus* *Albert.* *Picus* nidum suspendens *Aldrov.* *Jonsf.* Ein Widwolt / Geelgorst / bey Salmon genandt Gelber Hemsmerling. *i. e.* *Emberica* *lutea* *Vires.* Ad morbum regium commendat. *Plin.*

## Aves rostro & unguibus aduncis seu Rapaces vel Carnivoræ.

### *Aves Rapaces diurnæ.*

#### XXXIV. De Aquila.

Pag. 544. pro prima Specie Aquilæ adde:

1. **A.** *Aquila* *Offic.* *Mer.* *pin.* fulva sive Aurea *R.* *Ornith.* *Chrysaetos* *Aldrov.* *Gesn.* *Jonsf.* *Charlt.* *Ex.* Ein Adler / Guldend-Adler. *Ufu.* Fel,

Stercus. *Vires*. Fel destillatum cum oleo violaceo ad aurium dolorem & tinnitum; firmum ad abortum commendat. *Avicenn.*

Pag. 545. post lin. 9. adde :

### XXXVI. De Buteone.

**A.** Buteo *Offic.* *Jons.* *Charlt.* *Ex.* vulgaris *R.* *Ornith.* sive *Triorchis Aldrov.* *Mer.* *Pin.* Ein Busfahrn / Maßweyh / Ruttelweyh. *Usu.* Testiculi. *Vires.* Ex aqua fontis cum melle decocto ad Venerem commendantur. *Jons.*

Pag. 546. post lin. ult. adde:

### XLI. De Ulula.

**A.** Ulula *Offic.* *Aldrov.* *Gesn.* *Jons.* *Charlt.* *Ex.* *Strix cinerea R.* *Ornith.* Eine Eule / Graue Nacht-Eule. *Usu.* Fel, Adeps, Caro. *Vires.* Fel ejus prædicatur ad albugines, suffusiones & caligines. *Adeps* ad claritatem. *Caro* cocta in oleo cui liquato admiscetur butyrum ovillum, & mel ad sananda ulcera valet. *Plin.* In Arthritide à quibusdam æstimatur.

**D.** *Salmon* in *Dispensatorio* suo, *Barnaclam*, *Corvum leguminalium Erythropedem*, *Fodeam*, *Jyngem*, *Oriolum*, *Pelicanum*, *Picum marinum*, *Pluvialem*, *Psittacum*, *Puffinum*, *Querquedulam*, *Rallam*, *Sneppam*, *Turdum exoticum*, & *Urogallum* memorat, quorum cum vires nullas medicas à quocquam Autore traditas invenio, omisi, ut & *Arquatam Anatem fistularem*, *Colymbum*, *Coraciam*,  
Embe-

*Embericam albam, Fringillam, Phœnicopterum & Passerem Canariensem* Seplasi ejus, cum varietatibus ejusdem generis, aliisque multis quæ ad Historiam Avium, potius pertinent, quàm ad *Pharmacopœiam* aut *Pharmacologiam*.

---

## SECTIO TERTIA.

### De Serpentino Genere.

Pag. 548. lin. 15. subjunge:

#### III. De Cæcilia.

**A.** Cæcilia *Offic. Jons.* Cæcilia, Typhlops *Al-drov. Gesn.* Cæcilia Typhlinus *Græcis R. Synop. A.* Typhlops Cæcilia *Mer. pin.* Eine Blindschleiche. *Vires.* In medicina adhibuit *Oswaldus.* Theriaca namque ex Cæciliis & Aqua Theriacali paratum pro sudorifero in Pestilentia exhibebat, *Gesn. Ep.*

#### IV. De Serpente Indico.

**S**erpens Indicus *Offic.* Indicus Coronatus, Diademate seu conspicillo insignitus *R. Synop. A.* Cobras de Capello Lusitanis dictus *Garc. ab Hort.* Vipera Indica vittata gesticularis *Cat. Mus. Ind.* Vipera pileata *quibusdam.* Indische Haupt-Schlange. *Usu.* Lapis aut potius Os capitis, *Pedro del Cobra* dictus, figuræ

ovalis, ex uno latere planus, ex altero gibbosus, coloris fusci & splendentis, poris aliquot interspersis. *Vires.* Omnis generis venena expellit, seu intus sumpta, seu exterius applicata: putrefactioni resistit; transpirationem insensibilem promovet, spiritus vitales excitat; Cor recreat, Sanguini fermentationem novam communicat, & Naturæ succurrit in omnibus morbis malignis. *Marl. Ob.*

Quamvis Lapis hic à *Garcia*, *Redi* aliisque descriptus fuerit: Hujus tamen seculi Eruditi de eo differunt, duobus præcipuè in rebus. **I.** An sit res naturalis, an factitia? *Kircherus* in *China sua illustrata*, & *Thevenot* in *Relationibus diversorum insigniorum itinerum & navigationum*, in capite serpentis magni Chinenfis inventos fuisse affirmant. *Clar. D. Boyl.* in capite Serpentis Africani. Econtra alii affirmant Res artificiales esse, ut *R. P. Boccone* in *Museo di Fisica*. *D. Mead* M. D. eos ossa calcinata, aliaque testacea fragmenta esse supponit. *Thevenotus jun.* cinerum radicum combustarum, & Terræ cujusdam propè *Diu* in *India* inventa.

Altera controversia est de eorum viribus. *P. Kircherus* varia experimenta tradit de earum effectu in extrahendo veneno à morfu viperæ, aliisque Serpentis instillato. Idem confirmat clarissimus *Boyleus* experimento in Fele juvene factò, *Tractatus de medicinis specificis*. Item *D. Clayton* in *Narratione de Virginia*,  
A. S.



*Act. Philosoph. n. 210.* scribit se præsentem fuisse cum prædictus *D. Boyle* idem experimentum tentavit in variis Pullis, qui omnes sanati sunt. *D. Havers M. D.* salutarem ejus effectum in cane vidisse ait. Quinetiam *D. Tyson M. D.* in *Anatomia Anguis crotalophori* historiam narrat à celebri quodam *Medico Londinensi* acceptam, qui quendam à Viperis commorsum sanavit. Idem præstitit *D. Baglivius* in quodam à Scorpione percusso. Quamvis tamen apud prædictos omnes experimenta prædicta optimum successum habuerunt, apud alios tamen *D. Redi* scil. & *D. Charas* quæ tentarunt, non eundem effectum sortita sunt.

Cum jam expediverim, & in epitomen contraxerim eruditorum utrinque opiniones; quid restat quam ut eas conciliare adnitar, quod ut efficaciam tantummodo observabo, me duas hujus generis lapidum species vidisse, quorum prior ossi similis erat, porosus, cum dentibus limæ in eo visibilibus. Alter corpore compactiore, polito, quam factitiam esse credo, & prioris simulatricem, undè conjicio experimenta quæ non successerunt ab artificialibus hisce lapidibus facta esse, non à veris.

### De Serpentibus.

*H*Alas Sauva lege Ajas Sauva: Serpens est maximus veneno carens, quandoque diametri orgyialis, longitudinis triorgyialis.

Pueros, Apros, & Damulas integras ingurgitat, ut in illo qui An. 98. Binnanii interfectus fuit, vidimus.

*Halas Bitin*, species est *Sauvæ* minoris circumferentiæ, longitudinis majoris. Qui hoc 1700. An. Loogii interfectus è D. *Jacobo Petiver* misi, & cujus pellem byrsodepsicè curatam, aut subactam longitudinis fuit quinque orgyiarum, & dimidiæ; crassitudinis femoralis. Fel ex eo siccum pependit ꝑiii, ꝑi. Lapidem quem in capite tenui teliculo tectum, gerere ferunt, vocant *Carbunculum*, quem vidi apud D. *Franciscum de Somonte*: diaphanus erat ut *CrySTALLUS*, orbicularis, luce carens, magnitudinis *Nucis Juglandinæ*; quem *J. Alzina* asservabat rotundo-planus erat, magnitudinis *Ovi columbini*, coloris flavi, quasi auri, pellucidus, sed noctu non relucens. Alium, *Manilæ* habuisse *N. N.* Vir fide dignissimus, asseveravit quatuordecim millibus *Imperialium* appretiatum. Alium, inventum fuisse *Guiguanii* tanti fulgoris, ut ad ejus lucem litteras legerint, & scripserint, ni fallor refert *J. Ignatius Alzina* in *M. S. H.* Ex *MSS. Cl. Camelli*.

*Lapis Colubrinus* quondam magni æstimatus, nunc & *Manilæ* vili divenditur pretio: Non ex *Colubro* ut vulgus sibi persuadet, sed factitius ex *Cornu Cervi* in olla oblutata ad nigredinem usto, effictus, & ut niteat politus. Hunc *Mauritani* adulteratum vocant, verum ex nescio quâ, terræ sigillatæ simili argil-

argilla confici referunt. Verus Serpentum moribus impositus medetur: in Febri Petechiali, si plures imponantur, auxilio sunt: *Anno 1681.* Branæ triennem puerulum qui Arsenicum lacte dilutum hauserat, hujuscemodi lapidis iteratâ applicatione tantùm, à præfenti liberavi mortis periculo. An virtus hujus lapidis adscribenda sali in C. C. non probè usto, remanenti? An poris quibus scatet, attrahat ut Cucurbitulæ? *Ex MSS. ejusd.*

Alius magnitudinis Avellanæ redemptus fuit à Nigritis qui noctu Lampadis ad instar lucem spargebat, ità ut ad ejus lucem legere & scribere potuerit.

*Sauvæ* pinguedinis circiter  $\text{℥x}$  redemi ab Indo *Anno 1694.* uno ex Serpente exemptas. Carne vescuntur Indi.

## V. De Sepe.

**S**Eps *Offic. Jons. Charlt. Ex.* sive Lacerta Chalcidica Columnæ *Aldrov. R. Synop. A. Eine Ruppfer. Eidey / Seps.* Liburni in litore maris arenoso invenit *D. Raius. Vires.* In vino pota morsus suos sanat, *Diosc.*

## VI. De Crocodilo.

**C**ROCODILUS *Offic. Jons. Aldrov. Charlt. Ex.* Lacertus omnium maximus, Crocodilus dictus *R. Synop. A. Ein Crocodill / Allegarde.* In Nilo, Gange aliisque fluviis majoribus invenitur. *Usu. Sanguis, Pinguedo, Vires. Sanguis*

guis visui claritatem conciliat. Pinguedo vulneribus & carcinomati prodest. *Jonsf.*

Pag. 549. post lin. 22. adde:

### IX. De Chamæleonte.

**C**hamæleon *Offic. Jonsf. Charlt. Ex. Chamæleo*  
*R. Synop. A. Eine Katten-Eidex. Usu. Fel,*  
 Cor, Animal ipse. *Vires. Fel Hypochymata*  
 tollit, *Marcell.* Cor contra quartanam com-  
 mendat *Plin.* Contra epilepsiam & podagram  
 laudat *Trallian.*

Pag. ead. post lin. ult. adde:

### XI. De Salamandra aquatica.

**A.** Lacertus aquatilis *Offic. Schrod. aquaticus*  
 niger *Mer. pin. Salamandra aquatica R.*  
*Synop. A. Jonsf. Charlt. Ex. Cordulus Bellon.*  
 Scincus aquæ quibusdam. *Wasser-Moldy/ Wasse-*  
*ser-Eidex.* In piscinis & aquis stagnantibus.  
*Vires. Pulvis ad facilem evulsionem dentium*  
 commendatur. *Schrod.*

## SECTIO IV.

De

## Quadrupedibus.

*Quadrupeda Bisculca.**VIII. Caprinum genus.*

Pag. 563. post lin. 13. adde :

2. **I**BEX *Offic. Aldrov. Jons. Charlt. Ex. Ein Steinbock / Eibisch / Weiß. Summarum alpium incola est. Usu. Sanguis, Fimus. Vires. Sanguinem in vino sumptum ad calculum commendat Gesn. Fimus in Ischiadicis & Arthriticis laudat Marcel. Coagulum eadem cum leporino vires habet. Seraph.*

Pag. 564. post lin. 9. adde :

4. **A**Ntilopus *Offic. Gazella Africana R. Synop. A. Strepliceros Plin. Capra strepticeros Aldrov. Jons. Charlt. Ex. Eine Indianische Weiß / Antilope. Africæ incola est. Usu. Ungula, Cornua. Vires. Antepileptica & Antihysterica æstimatur.*

*IX. De Cervino genere.*

Pag. 566. post lin. 20. adde :

2. **R**Angifer *Offic. Jons. Charlt. Ex. Cervus Rangifer R. Synop. A. Machils Plin. Taran-*

randus *Agricol. Eliot.* Ein Reiner/Reiniger/Rennsthier/Renneschier. In Lapponia invenitur. *Usu.* Cornu, Ungula. *Vires.* In spasmaticis profunt. *Jonsf.*

Pag. 567. post. lin. 27. adde:

A. 6. Dama *Offic. vulgaris Mer. pin.* vulgo *R. Synop. A.* vulgaris sive Recentiorum *Gesfn.* Cervus Platyceros, vel Platyceros simpliciter dictus *Plin.* Ein Dam-Hirsch/Dam-Thier. In vivariis. *Usu.* Cornua. *Vires.* Cum cornubus Cervi viribus convenit.

*Lapides Bezoartici Mexicani* eximantur ex Cervis, prouti & *Campetzani*, ubi *Contrayerba* abundat: *Peruviani* ex *Vicunnis*, *Quana-co* & *Alce* ubi pariter *Contrayerva* invenitur: *Persici*, seu *Indici Golgondani* ex *Cercopithecis*, & *Capris*. *Ex Capris*, leves sunt, sine nitore friabiles, coloris in viridem tendentis, saporis amari, formæ ovalis, magnitudinis variæ, constantes ex laminulis, minus læves, aut politi. His mihi imposuerunt *Anno 1697.* eos pro *Cercopithecorum* dividentes. *Emeram No. 144.* pendentes omnes simul sexaginta & unam unciam, Unciam 14. Regalibus argenteis *Hispanis*, erant autem omnes integri, & ex his 12 Ovo Gallinaceo aut pares, aut majores: 30 columbino Ovo majores: 40 ovo columbino pares: 50 ovo columbino minores: 12 Nuce *Avellanâ* majores. *Ex Cercopithecis*, nitidè perpoliti sunt, magis compacti, lapidei, & ponderosi quàm  
sunt

sint Caprearum, constantes ex laminulis, subamari coloris, cinereè, vel viridiusculè, vel fuscè virentis, ex his dein emeram uncias 23. Unciam duobus Imperialibus, erant autem No. 33. Magnitudinis ovi Gallinacei 4: Ovo columbino majores 6: Ovo columbino pares 4: Oliva supares 5: Oliva minores 11. Teretes pollicem crassi, biunciam, & sesquiunciam longi 3: Horum 3i Macai venditur Imp. Goæ tribus Imper. & dimidio. Meliaporì 7 & 8 Imper. quorum 6 vel 7. unam pendent unciam: Fragmentorum verò uncia duobus Imp. De reliquo, pro magnitudine crescit æstimatio, & pretium.

*Mexicani*, & *Luponici* coloris sunt dilutè terrei, & saporis nullius, vix alicujus in medicina effectus boni: hos Officinæ Occidentales vocant. *Peruviani*, coloris sunt ex viridi nigricantis, & hos Orientales vocant.

*Indi* & *Mauritani* Lapides Bezoarticos generari narrant ex repletionè, & pabuli indigestione: Et sanè factibile est, ut ex indigestione multum tenacis ac viscosæ procreetur mucilaginis, & superveniente sanguinis effervescentia, prædicta mucagoviolenter decocta, non solum magis ac magis glutinosa evadat, incrassetur, ac inspissetur, sed & accedente aliquo sale petrificante, & insolubilibus, ac indigestibilibus (ut sunt Fructuum officula, lapilli, lignorum fragmenta, argillacea terra, fibrosarum herbarum, radicum, corticum tormentum, implicata, impacta, ac super-

superinducta, in lapides usque indurefcendo abeat. Nec improbable, tunc malè affecta animalia ex instinctu naturali, plantas depascere amaras, & una cum his Contrayervam, & similia alexipharmaca, ità ut ex horum succo, tenaci illæ viscositati commixto, lapidi Bezoartico color subviridis, sapor amaricans, & virtus Alexipharmaca. Hinc Lapidés ii qui in animalibus tabe consumptis, aut ut ferunt repletionè extinctis reperiuntur, plerumque majores, aut si parvi, numerosi sunt, nec non cæteris efficaciores censentur. Ita in Provincia *Sonora Mexici*, in Cervo emortuo *Lucas Valentinus* Lapidem invenit libras quinque pendentem; qui 500. Imp. æstimatus fuit.

In Jucatan, Hispanus in Cervo tabe consumpto invenit Sexaginta Lapidés, fermè omnes æquales, magnitudinis Nucis Avellanæ. In Lapidibus confractis, Golgondanis, ex Capris, & Cercopithecis inveni: ex tomentolis filamentis compactum globulum, odoris suavis. Subruffum fibroso-tomentosum glomum, saporis aciduli. Pulveris impactas radicum fibrillas. Oblonga Lignorum, corticum, & fructuum, aut foliorum pediculorum frustella. Lapidés nigros, ruffos, cinereos, duros, & friabiles. Terræ argillacæ rubentis, & nativæ fragmina. Semen, ni fallor, Viticis. Semen trifore magnitudine Ciceris nucleo putrente, acidô. Nucleum osse Tamarindorum potiorem. Os  
fermè



fermè unciale, nucleo Dactylorum simile, onifore, oleo scatens, in aliis pulveres varios.

Velesius ab Arziniega, Bezohar vocat legitimos in animalium ventriculis (Hisp. Tripon, Quaxo, & Buche) inventos. 2. Lachrymas Cervi. 3. Fictitios, quos needum vidi, præter Nicolaô-Manuchianos, formæ variæ, quos ex fragmentis componit, includendo integrum minorem, sed faciliè distinguuntur, quia non sunt laminulati. Alios idem componit globosos, sigillatos, ex variis cordialibus, & Cordiales vocat. Alii deferuntur Goa ovales, Gaspar-Antoniani, pariter ex variis rebus compilati. An Lapidés de Goa Georgii Batei? Illi verò an ejusdem Batai Lapidés Contrayervæ?

## Quadrupeda quadrifulca.

Pag. 569. post lin. ult. adde:

### XII. De Hippopotamo.

**H**ippopotamus Offic. Aldrov. Jons. Charlt. ex. Ein See-Pferd. Meer-Ros. Wall-Ros. Usu. Testes, Dentes. Vires. Testes exiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur. Diosc. Dentes in annulos tornati, plurimum valere creduntur adversus spasmus flatulentum Charlt.

Quadrupeda unguiculata pedibus bifidis.

*XV. De Camelo.*

**C**amelus *Offic. Aldrov. Jons. Charlt. ex.* Ein Cameel oder Dromedarius. In Asia & Africa invenitur. *Usu.* Sanguis, Fel, Fimus, Urina. *Vires.* Sanguis Dysenteriam juvat, conceptionem auxiliatur, Epilepsiam curat. Fel Ophthalmica est. Fimus in Apoplexia commendatur. Urina ad dentes dealbandos & purgandos vim habere creditur. *Plin.*

Quadrupeda unguiculata pedibus multifidis.

Antropomorpha.

*XVI. De Simia.*

**S**imia *Offic. R. Synop. Aldrov. Gesn. Jons. Charlt. ex.* Ein Affe. *Usu.* Cor. *Vires.* Assum & cum melicrato coctum memoriam acuit. *Porta.*

Pag. 573. post lin. 18. adde:

*XIX. De Phoca.*

**A.** Phoca *Offic. Charlt. ex.* seu Vitulus marinus *R. Synop. A.* Vitulus marinus *Aldrov. Jons.* Ein Meer-Kalb. Meer-Schwein. *Usu.*

*Ufu.* Caro, Adeps. *Vires.* Carnem in Epilepsia & suffocatione Uteri commendat *Avicen.* Adipem ad morbos Mulierum laudat *Hippocrat.*

Quadrupeda vivipara pede multo, herbivora binis prælongis dentibus anterioribus in utraque maxilla.

Pag. 575. lin. 13. subjunge:

XXII. De *Hystrice.*

**H**ystrix *Offic.* *Charlt. ex. Aldrov. Gesn. Jons. R. Synop. A.* Ein Stachel-Schwein. *Ufu.* Animal ipsum. Lapis *Pedro del Porco* dictus. *Vires.* Animal iisdem affectibus conducere videtur ut *Erinaceus.* *Jons.*

*Hystrix,* Indis *Balatnamatinic.* Reperitur in Provincia *Caraga* magnitudinis Porcelli octimestris. Ex hac eximitur Lapis Porcinus, seu *Hystericus Malacensis,* *Hisp.* *Piedra de Puerco Spin.* *Ægagropilus* potius, quam Lapis dicendus; constat enim ex tomento, fibrillis, & materia friabili, subruffa, amaricante, & de foris quibusdam in partibus, ceteis, & subnigris quasi unguibus cooperatus, ut in tribus quos vidi observavi. Nec laminulatus, aut tunicatus, neque ponderosus,

rosus, aut politus, ut Bezoar, sed levis, & asperiusculus ut Ægagropila.

Lapidem Hystericum Malacesem vidi dein alium, ponderis ℥v. emptum 150. Imper. appretiatum verò 500. Imper. orbicularis erat, læviusculus, coloris carneoli pallefcen- tis, quasi pellucidus, substantiæ solubilis; ad tactum linguæ mox acriusculè & summè amaricans.

*Hyæna Luzonis non odorata, seu Leytensium Sarimao.* Animal est Putorio compar, & ma- jus, sed dentibus instructum validissimis, lon- gioribus, & aduncis: His & unguibus A- pri, aut Damulæ dorso sese tenacissimè affi- git, ibidémque pertinaciter persistit, donec usque Aper cursu lassatus, & doloris mole- stia defatigatus succumbat, & péreat, & tunc vorat ad saturitatem. Dentes Sarimao quan- doque in Apri, aut Damulæ dorso defixi re- periuntur, scilicet cum fortuito casu Sarimao relictis dentibus excutitur. Hos Indi super- stitiosè æstimare solent.

*Lac-vig, Boholanorum,* speciem esse referunt Lupi ferocis, magnitudinis Vituli, homini- bus seu animalibus infesti. An Coyote Me- xicanorum?

*Mustela* Hisp. Comaderia. Germ. Wiesel.

*Mustela* syl. Viverra, seu Furunculus. Hisp. Huron. Germ. Hamster.

*Putorius* Hisp. Gardunna. Germ. Ziesel.

*Mures* quos in Insula Mindoro ex arborum computrescentibus foliis oriri ferunt, affir- mant

mant qui curiosè investigavêre, non ex arborum foliis, sed ex Arundinis Vallatoriæ speciei, fructibus generari.

Pag. 577. post lin. ult. adde:

**XXVI. De Glire.**

**G**Lis *Offic. Bellon. Gesn. Jons. Aldrov. Charlt. ex Jons. Glis Gesneri & aliorum R. Synop. A. Kasse. Ratte. Kellmauß. Usu. Caro, Pinguedo, Excrementa, Cinis. Vires. Carnis esu Bulimo laborantes liberantur. Pinguedo ad conciliandum somnum plantis pedum injungitur. Excrementa in liquore aliquo pota calculos discutunt: eadem cum aceto & rore marino Alopeciam sanant. Cinis combusti ad claritatem oculorum prodest. Plin.*

Quadrupeda vivipara unguiculata multifida, carnivora, capite brevior, seu.

**Genus Felinum.**

Pag. 578. lin. 16. subjunge:

**XXVIII. De Tigredine.**

**T**igris *Offic. Aldrov. Gesn. Jons. Charlt. ex. R. Synop. A. Ein Tieger. Tieger, Thier. Usu. Adeps. Vires. Cum Adipe canino viribus convenire creditur.*

Pag. 584. lin. 10. subjunge;

Quadrupeda vivipara, pede unguiculato multifido, rostro productiore, carnivora, minor, seu

Genus Mustelinum, Vermine-  
umve.

**H**OC genus ab aliis Quadrupedum rapacium generibus differat: 1. Parvitate sua. 2. Corporis figura gracili, longa, capite parvo sublongo, pedibus brevibus. 3. Intestinorum brevitate & simplicitate. 4. Dentium numero. R. Synop. A. 195.

### XXXVIII. De Mustela.

**I. A.** Mustela Offic. Charlt. ex. Mer. Pin. vulgaris R. Synop. A. Matth. Aldrov. Gesn. Ein Wiesel. Wieselchen. Usu. Animal ambustum exenteratur, & inveteratum sale in umbra siccatur. Ventriculus. Vires Animal ut supra præparatum: Ea ꝓii cum vino pota, adversus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio: toxico simili modo sumpta, resistit. Ejus ventriculus Coriandro factus, inveteratusque, percussis à Serpente & Comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert; cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ strumæ juvan-

vantur : Comitibus etiam prodest. *Dioscorides.*

A. 2. *Viverra Offic. Gesn. Charlt. ex. Mustela sylvestris ejusd. Jons. Aldrov. sylvestris Viverra dicta R. Synop. A. Ein Zlecke. Usu. Caro. Fel. Vires. Utraque in Epilepsia commendatur.*

### XXXIX. De Ichneumone.

**I**Chneumon *Offic. Aldrov. Gesn. Jons. R. Synop. A. Charlt. ex. Mus Pharaonis seu Ægypti Bellon. Indicus Ælian. Indianische oder Ægyptische Ratte. Usu. Fimus. Vires. Cum seminibus, Sinapi & Aceto Podagram juvat & Alopeciam curat.*

Quadrupeda vivipara rostro productiore, dentibus pluribus, incerto numero.

Pag. 685. lin. ult. subjunge:

### XLIII. De Vespertione.

**A.** *Vespertilio Offic. Aldrov. Gesn. Jons. Charlt. ex. R. Synop. A. Eine Fleder oder Spect. Maus. Vesperi apparet Ætate ; Hyeme verò latet in cryptis, rupibus, &c. Usu. Caro, Sanguis. Vires. Caro præparata Scirrho & Podagræ adhibetur. Sanguis in lopecia conducit. Galen.*

Benè observat eruditissimus ille vir D. J.

*Raius* hoc Animal malè à nonnullis inter Aves accenseri, ob alas & volatum, cum nec pennatum sit, nec rostratum, nec oviparum.

Hic etiam omisi Bèstias aliquas, à D. *Salmon* memoratas in duobus libris prædictis, e. g. *Bubalum*, *Martem* & *Putorium*; aliasque nonnullas quibus nullus quod sciam, Autor vires aliquas adscripsit; alias suspectas aut saltem controversas, ut *Gulonem*, *Hyenam* & *Satyrum*.

## OMISSA.

Pag. 129. *Pharm.* lin. 16. adde:

**I**N superiore meo libro pro *Grana Tiglia Ricini* vulgaris semina descripsi, in quem errorem indè lapsus sum, quod in Officinis Pharmacopolarum nostratium titulo *Grana dillorum Peruvianorum* ea divendita fuisse observaveram, cum ea ità descripsisse debuisssem, Fructus est oblongus, ovalis, glaber, Ricino vulgari minor & angustior, una parte gibbus, altera depressus colore fusco, saporis acris, exurentis, & nauseosi.

### XXVIII. *De Marrubio.*

Pag. 122. *Suppl.* adde:


3. **A**lyssum Galeni *Offic. Ger.* Alyssum Galeni *Clusio Park.* Alysson verticillatum foliis profunde incisus C. B. Marrubium Alysson dictum *R. H. p.* 557. Marrubium Alysson dictum,



Etum, foliis profundè incisis *Herm. Cat.* Marrubium album foliis profundius incisis, flore cœruleo *H. Ox.* *Alyssen.* Galeni *Dollwurk.* In hortis colitur. *Ufu.* Herba. *Vires.* Cum Marrubio albo viribus convenire creditur.

F I N I S,

*Index*



*Index omnium Simplicium Officinalium  
que tum in Pharmacologia,  
tum in hoc Supplemento conti-  
nentur.*

*NB. Numerus absolutè positus Phar-  
macologiam; litera S hoc Sup-  
plementum notat.*

		Acacallis	S 311
A.		Acacia altera	S 314
		—Germanica	398
<b>A</b>	Bies foemina p.	Vera	462
	—mas	Acanthum	S 72
	Abrotanum foemi-	Acanthus	345
	na	—sylvestris	S 253
	—mas	Acanus	S 72
Abrus	S 182	Acarna	S 72
Abfinthium Pont.	S 80	Accipiter	545
—Romanum	167	Acer majus	S 304
Santonicum	S 81	—minus	S 305
Seriphium	168	montanum	S 305
Vulgare	167	Acetosa arvensis lan-	
Abutilon	S 145	ceolata	132
			Rom.

I N D E X.

-Rom. rotundifol.	132	Ageratum	166
Vulgaris	<i>ibid.</i>	Agnus	560
Acetofella	312	Agnus Castus	381
Acetum	425	—Scythicus <sup>a</sup>	S 48
Achates	S 32	Agresta	425
Achillea	S 79	Agrifolium	428
Achiotl	457	Agrimonia	175
Acicula	S 334	Alabastrites lapis	87
Acidulæ	S 6	Alabastrum	<i>ib.</i>
Acinos	S 121	Alana terra	48
Acmella	S 79	Alaternus	S 296
Aconitum	S 252	Alauda	533 S 351
Acorus adulterin.	321	Album Canis	581
—Asiaticus	S 243	Album Græcum	581
Verus	337	Alcanna	421
Acus	S 334	Alcea	228 306
Adamas	S 35	Alcedo	533
Adarces	S 26	Alces	567
Adiantum Album	119	Alchimilla	138
—Aureum	113	Alcyonium durum	S 41
—Nigrum	121	—Stupposum	<i>ibid.</i>
Vulgare	119	Vermiculatum	<i>ibid.</i>
Adrachne	S 291	Vesicarium	S 330
Ægilops Arbor	S 266	Tubulosum	S 41
	267	Alectorius lapis	S 355
—Herba	S 247	Alectorolophus	S 155
Ærugo	78	Alga	S 38
Æs	<i>ibid.</i>	Alisma	S 65
Æs viride	<i>ibid.</i>	Alkekengi	245
Æthiopsis	S 119	Alliaria	S 160
Ætites Cupis	89	Allium Hortense	317
Agallochum	470 S 317	—Sylvestre	S 219
Agaricum	109		Al.

I N D E X.

Alnus	S 269	Amomum	190
Alnus nigra	422	— Plinii	S 137
Barbadensis	S 229	Vulgare	190
Aloe Caballina	<i>ibid.</i>	Amoris Poma	244
Hepatica	S 232	Ampelitis terra	54
Succotrina	S 230	Ampeloprasum	S 221
Vulgaris	322	Amurca, fæx Olei	404
Alopecurus	S 248	Amygdalus amra	393
Alfina	301	— Dulcis	393
Althæa	228	Amylum	339
Alumen	62 S 19	Anacardium Occid.	405
Plumosum	85	— Orientale	406
Rochi	63	Anagallis aquatica	275
Rupeum	62	— Terrest. foemina	301
Saccharinum	62	— mas	301
Sciffile	85	Anagyris	S 312
Vulgare	63	Anas	532
Alypum	S 275	Anchusa	205
Alyssum Diosc.	S 168	— Lutea	S 106
Galeni	S 376	Androsaces	S 214
Plinii	S 103	Androsæmum	S 205
Amaranthus	135	Anemone hortens.	S 132
Ambra-grisea	57	— Sylvestris	S 132
liquida	396	Anethum	182
nigra	57	Angelica	188
Ambrosia	S 51	Angsana	S 309
Campestris	S 170	Anguilla	512
Amethystus	97	Anguis	547
Amiantus	85	Animal Bezoartic. Oc-	
Ammi verum	195	cidentalis	567
Vulgare	<i>ibid.</i>	— Moschifar	570
Ammoniacum	184	Zibethicum	582

Animi

I N D E X.

Animi Gummi	458	Putealis	S 3
Anisum	193	Thermalis	42
Indicum	S 145	Aquila	S 544
Anonis	293	Aquilæ lapis	89
Anser	531	Aquilegia	251
Anthera	374	Arabicum gummi	462
Antherophyllus	377	Aracus	S 185
Anthora	252	Araneus	483
Anthos	211	Niger	S 321
Anthyllis leguminosa		Arbor vitæ	S 269
	S 189	Saponaria	S 286
Prior	ibid.	Arbutus	S 291
Antilopus	S 365	Arctium	S 75
Antimonium	72	Ardea	529
Antirrhinum	S 154	Stellaris	S 346
Antithora	252	Areca	346
Aparine	201	Arenamaris	82
Aper	568	Arenosus lapis	S 26
Apes	484	Aresta bovis	293
Aphaca	S 184	Argemone	S 171
Apios	S 176	Argentina	230
Apium	192	Argentum	75
Apocynum	S 214	Vivum	68
Apus	S 352	Argilla	44
Aqua fluviatilis	S 3	Aries	560
Fontana	40	Arisarum	S 235
Marina	41	Aristolochia Clemat.	
Mineralis	41, S 5, 6.		260
Nivea	S 5	Longa	259
Palustris	S 3	Polyrrhizos	260
Pluvialis	S 5	Rotunda	260
		Ar-	

I N D E X.

Armeniaca mala	391	Asinus	514
Armenus lapis	85	Aspalathus	515
Armoniac. Gummi	184	Asparagus	245
		- Petraea	S 140
Armoracia	S 164	Sylvestris	ibid.
Arnica	S 65	Asperula	201
Arsenicum album	52	Asphaltus	54
— Citrinum	53	Asphodelus albus	322
— Rubrum	ibid.	- Luteus	ibid.
Arthanita	323	Asplenium	117
Artemisia Chinenf.	169	Astacus fluviatilis	508
- Tenuifolia	S 82	- Marinus	S 331
— Vulgaris	169	Aster Atticus	161
Arum	331	Asteria	98 S 346
Arundo	343	Astragalus	S 192
- Donax	S 250	- Sylvaticus	S 188
Farcta atro rub.		Astrantia	188
	S 251	Astroites	S 131
— Flava	S 252	Atractylis	156
— Indica	ibid.	Atragene	S 131
Saccharina	343	Atriplex	134
Scriptoria	S 250	- Olida	S 55
Tabaxifera	S 251	Sylvestris	S 55
Afa dulcis	395	Attagen	S 356
- Foetida	185 413	Avellana	352
Afarum	137	Avena	342
- Virginianum	138	Aurantia	437
Afchia	520	Auriculæ Judæ	109
Asclepias	310	- Leporis	S 102
Ascyrum	S 204	Muris	144
Asellus infecta	483	Urſi	S 113
- Piscis	S 335	Auricularia herba	S 115
		Auri-	

I N D E X,

Auripigmentum	52	Virginiana	S 138
Aurum	53.75	Bdellium	474
Axungia vitri	139	Becabunga	275
<b>B.</b>		Behen album	298
<b>B</b> Accæ Bermudenses		Belemnites	91
	S 287	Bellis major	162
Baccharis	S 68	minor	163
Balanus Myrepfica	455	Ben nuces	455
Balauftia	371	Benzoin	395
Balsamina	236	Berberis	422
Balsamita foemina	166	Berillus	97
Mas	<i>ibid.</i>	Beta alba	136
Balsamelæon	410	nigra	<i>ibid.</i>
Balsamum Capiivi	410	rubra	<i>ibid.</i>
Gileadense	410	Betle	364
Judaicum	410	Betonica aquatica	261
è Mecha	410	Pauli	274
Peruvianum	456	Vulgaris	220
Syriacum	410	Betula	359
Tolutanum	357	Bezoar Occidentalis	567
Bamia Moschata	306	Orientalis	564
Banana	S 265	Bifolium	S 239
Bangué	306	Bislingua	241
Barbarea	S 165	Bismabra	228
Barbus	519	Bismuthum	70
Bardana minor	127	Bistorta	134
major	158	Bitumen Judaicum	54
Basilicum	218	Blatta	S 326
Battata Canadensis		Byzantina	500
	S 77	Blattaria	S 216
— Hispanica	S 151	Blitum	134
		Bole-	

I N D E X.

Boletus Cervi	S 43	Bufo	550	Bufo	550
Bolus Armena	43	Buglossum hortenfe	204	Buglossum hortenfe	204
Bohemica	<i>ibid.</i>	— Sylvestre	205	— Sylvestre	205
Candida	S 7	Bugula	223	Bugula	223
Toccaviensis	S 7	Bulbocastanum	S 97	Bulbocastanum	S 97
Bombax	305	Bulbonac	S 159	Bulbonac	S 159
Bombyx	488	Bulbus vomitorius	S 224	Bulbus vomitorius	S 224
Bonduch	S 308	Bunias	267	Bunias	267
Bonus Henricus	135	Bunium	S 98	Bunium	S 98
Borago	204	Buphthalmum	161 S 77	Buphthalmum	161 S 77
Borax	63	Bupleurum	S 102	Bupleurum	S 102
Bos	558	Buprestis	S 324	Buprestis	S 324
Botargum	521	Burfa pastoris	304	Burfa pastoris	304
Botrys	135	Buteo	S 358	Buteo	S 358
Branca Urfina	345	Buxus	446	Buxus	446
Brassica capitata alba	266				
— rubra	S 161				
Florida	<i>ibid.</i>	C.			
Marina	257	CAcalia	S 67	CAcalia	S 67
Sabauda	S 161	Cacao	442	Cacao	442
Sativa	66	Cactos	S 70	Cactos	S 70
Sylvestris	S 170	Cadmia factit. Botr.	78	Cadmia factit. Botr.	78
Bresilium lignum	464	— Ostracitis	79	— Ostracitis	79
Briza	S 242	Placitis	79	Placitis	79
Bromus	S 248	Nativa metallica		Nativa metallica	
Bruscus	242		70 S 22		70 S 22
Bryonia alba	240	Cæcilia	S 359	Cæcilia	S 359
— nigra	241	Calaminaris lapis	83	Calaminaris lapis	83
Bubalus	560	Calamus Aromat.	337	Calamus Aromat.	337
Buccinum	503	Odoratus	S 252	Odoratus	S 252
Bufo	550	Calamintha palust.	216	Calamintha palust.	216
			Mon.		Mon.



I N D E X.

— Montana	222	Caprifolium	375
Sylvestris	S 124	Capficum	244
Vulgaris	222	Carabe	56
Calcarius lapis	88	Caranna	431
Calcitrapa	S 73	Carbo fossilis	S 13
Calculus è Vesica hu-		Cardamine	269
mana	587	Cardamom. maj <sup>o</sup>	324
Calendula	160	minus	325
Caltha	ibid.	Cardiaca	S 125
Calx viva	48	Carduelis	S 353
Extincta	ibid.	Carduus albus	S 73
Cambugium	437	Benedictus	155
Camelina	S 167	Fullonum	171
Camelus	S 370	Mariæ	156
Campanula	S 151	Pinea	S 70
Camphora	387	Stellatus	S 73
Camphorata	139 S 56	Tomentosus	S 72
Cancamum	475	Carlina	152
Cancer fluviatilis	509	Carneolus lapis	92
Marinus	509	Caroba	463
Canella alba	389	Carpinus	S 273
Canis	581	Carpio	518
Carcharias	S 344	Carpobalsamum	411
Cannabis	124	Carthamus	155
Cantharides	490	Carum	191
Capillus Veneris	119	Caryophyllata	228
Capo	539	Caryophyllus Aro-	
Capparitis	430	matic.	377
Capra alpina	563	Barbatus	S 199
Capro	562	Hortensis	298
Capreolus	566	Simplex	S 198
Capri-cerva	564	Sylvestris	198
Caprificus	S 274	Casia caryophyll.	378

I N D E X.

Fistula	457	Nigra	403
Lignea	386	Rubra	403
Cassina	S 296	Ceraunia	S 31
Cassumuniar	S 234	Cercis	S 310
Castanea	352	Cerinthe	S 109
Castor	575	Cerrus	S 266
Castoreum	575	Cernua fluviatil.	S 342
Catachu	347 S 315	Cerrussa veneta	77
Cataputia major	128	Cervus	565
minor	278	Volans	489
Cate	S 315	Ceterach	117
Catulus	581	Cetus	524 S 355
Catus domesticus	579	Chalcedonius lap.	S 32
Sylvestris	579	Chalcidas	574
Caucalis	S 101	Chalcitis	71
Cauda Equina maj.	116	Chalybs	73
— minor	S 45	Chama	S 330
Muris	S 130	Chamæacte	423
Caviarum	515	Chamæabatos	S 301
Caulis alba	266	Chamæcissus	221
Rubra	S 161	Chamæcistus	S 204
Cedrus	358	Chamæcyparissus	165
Celastrus	S 296	Chamædryas	214
Centaurium majus	157	Chamæiris	S 228
minus	310	Chamæleon Serpent.	S 364
Centinodia	133	Albus	152
Cepa	316	Niger	156
Ascalonica	S 220	Chamæleuce	S 146
Cepea	S 142	Chamæmalus	16
Cera alba	485	Chamæmelum	16
Citrina	ibid.	Chamæmorus	S 13
Cerasus Avium	S 288	Cha	

I N D E X.

Chamæpitys	223	Sylvestre	S 195
Altera	S 126	Cichoreum fativum	146
Tertia	<i>ibid.</i>		
Chamæriphis	S 262	Sylvestre	147
Chamærubus	S 135	Cicindela	493
Chamæfyce	S 176	Ciconia	530
Chamælæa	415	Cicuta	194
Chærefolium	186	Cimex	482
Cheiri	265	Cimolia alba	46
Chelidonium maj <sup>o</sup>	277	Purpurascens	46
Minus	226	Cinara	155
Chenopodium	S 55	Cineres clavellati	139
Chermes	353	Cinnabaris factitia	69
Chia terra	S 9	Nativa	68
China	239	Cinnamomum	384
China Chinæ	371	Album	389
Chinensis terra	44	Cionia	S 228
Chocolata	441	Cirsium	S 71
Chondrilla altera	S 58	Cistus foemina	S 203
Prima	<i>ibid.</i>	Ledon	299
Chrysanthemum	161	Mas	S 203
	S 79	Citria malus	436
Chryfocolla	63	Citrullus	234
Chryfocome	S 66	Clematis	S 133
Chryfogonum	S 254	Clinopodium	S 122
Chryfolithus lapis	98	Cneoron album	S 151
Chryfopafius	98	Nigrum	S 292
Chryfopafius	98	Cnicus	155
Cicada	487	Cobaldum	70 S 22
Cicer album	289	Cocca Gnidia	416
Nigrum	<i>ibid.</i>	Coccinilla	491
Rubrum	<i>ibid.</i>	Coccus	S 258

I N D E X.

de Maldiva	S 259	Corazinus	S 340
Coccus baphica	491	Corallina	112
Cochinella	491 S 325	Corallium album	107
Cochinellifera	S 280	Nigrum	107
Cochlea	499	Rubrum	107, S 36
Cochlea marina	498	Coriandrum	198
Cochlearia hortensis		Corinthiacæ Uvæ	426
	271	Cornix	537
maritima	271	Cornus	403
Coculus Indus	419	Coris	S 205
Coffee	445	Corona Solis	S 76
Colchicum	S 226	Coronopus	281
Colocynthis	234	Corruda	S 140
Colubrina Virginia		Cortex Peruvianus	
	260		371, S 279
Colubrinum lignum		Winteranus	379
	239	Coryus	536
Columba	542	Corylus	351
Colutea	S 315	Cos	S 30
Concha	508	Costus amara	329
Consilago	S 144	Dulcis	ibid.
Consolida major	206	Hortorum	166
Media	223	Nigra	S 70
Minima	163	Cotinus	S 303
Regalis	251	Cotricula	S 30
Saracenicæ	151	Cotonea	368
Contrayerva	232 S 133	Cotula foetida	164
Convolvulus	S 252	Coturnix	542
Conyza major	S 63	Cotyledon	303
Media	150	Conhage	285
Minor	S 64	Crabro	S 323
Copal	416	Cranium human.	591
		Cras-	

I N D E X.

Crassula	247	Cynocrambe	S 49
Crepitus Lupi	S 42	Cynoglossum	203
Creta alba	48	Cynorrhodon	373
Selenusia	S 15	Cynosbatus	<i>ibid.</i>
Christa Galli	S 158	Cynosorchis	S 236
Crithmum	195	Cyperus longus	334
Crocodilion	S 84	Rotundus	335
Crocodilus	S 363	Cypressus	359
Crocus	318	Cytini	370
Cruciata	200	Cytisus	S 313
Crystallus	87		
Cubebæ	419	D.	
Cuculus	546	<b>D</b> Actylus	36
Cucumis asininus	236	Dama	S 366
Hortensis	235	Datura	258
Sylvestris	236	Daucus Creticus	197
Cucurbita	233	Hortensis	198
Cuminum	187	Montanus	S 92
Siliquosum	S 255	Nostras	197
Cuniculus	575	Vulgaris	<i>ibid.</i>
Cupressus	359	Delphinium	251
Cuprum	77	Delphinus	S 344
Curcuma	324	Dens caninus	S 227
Cuscuta	282	Leonis	145
Cyanus major	156	Dentalium falsum	497
Minor	<i>ibid.</i>		S 334
Cyclamen	323	Verum	497
Cydonia mala	368	Dentaria	265
Cygnus	531	Dentellaria	<i>ibid.</i>
Cyminum	187	Dictamnus albus	250
Siliquosum	S 257	Creticus	217
Sylvestre	S 90	Digitalis	261
		Bb 3	Dio-

I N D E X.

Diospyrus	S	277	Eleoselinum	192
Diphryges		78	Elephas	572
Dipsacus sativus		171	Elleborus albus	129
Sylvestris		<i>ibid.</i>	Niger	250
Doronicum Germ.		151	Empetrum	S 292
Romanum		151	Encrasicholus	515
Dorycnium	S	154	Endivia	147
Draba	S	167	Entalium	497
Draco arbor		418	Enula campana	150
Dracomarinus	S	339	Ephemerum	S 226
Dracontium		331	Epimedium	S 255
Major	S	235	Epithymum	282
Dracunculus	S	83	Equisetum	115
Drakena		233	Minus.	S 45
Dryopteris	S	47	Equus	555
Dulcamara		244	Marinus	572
E.			Eretria terra	S 8
<b>E</b> Benus Æthiopicus			Erica	452
	S	259	Erigerum	153
Indicus		392	Erinaceus	584
Verus.	S	295	Eruca Herba	268
Ebulus		423	Sylvestris	S 165
Ebur		572	Eruca Insectum	489
Echinopus	S	84		S 323
Echinus marin <sup>9</sup>	S	331	Ervum	288
Terrestris		585	Eryngium campest.	S 88
Echium		205	Trifolium	<i>ibid.</i>
Elaterium		469	Vulgare	171
Elatine		259	Erysimum	269
Elæagnus	S	306	Esculus	S 266
Elemi gummi		405	Esula major	277
			Minor	

I N D E X.

Minor	278	Sylvestris	S 274
Euonymus	428	Filipendula	231
Eupatorium Avic.	153	Filix fœmina	120
Cannabinum	153	Florida	ibid.
Græcorum	175	Mas	118
Mefuæ	166	Flammula	S 127
Euphorbium	279	Jovis	S 133
Euphrasia	262	Flos Adonis	S 129
Euphrasia	262	Æris	S 25
		Auriculæ	449
		Solis	S 76
F.		Fœniculum com.	196
<b>F</b> aba Ægyptia	S 218	Dulce	ibid.
Bengalen	S 284	Maritimum	195
Hortensis	287	Porcinum	183
Sti. Ignatii	S 302	Vulgare	196
Fabaria	247	Fœnugræcum	293
Fagara	S 295	Folium Indum	387
Fagus	S 266	Malabathrum	387
Farfara	149	Formica	487
Farrago	S 330	Major	S 328
Faufel	346	Fragaria	229
Febrifuga	165	Frangula	422
Fegopyrum	S 53	Fraxinella	250 S 144
Felis	579	Fraxinus	448
Ferrum	73	Fucus	S 38
Ferula	183 S 93	Fulica	S 348
Festura galbanif.	S 93	Fumaria	174
Ficedula	S 353	Bulbosa	294
Ficus	362	Fungus esculentus	
Ægyptia	S 274		S 42
Cypria	S 275	Cervinus	S 43
Indica	S 274	Bb 4	Pul.

I N D E X.

Pulverulentus <i>S</i> 42	Columbinum 305
Sambucinus 109	Moschatum <i>ibid.</i>
	Robertianum <i>ibid.</i>

G.

<p><b>G</b>Agates 54</p> <p>Galanga maj. 330</p> <p style="padding-left: 2em;">Minor. <i>ibid.</i></p> <p>Galbanum 183</p> <p>Galega 288</p> <p>Galeopsis <i>S</i> 120</p> <p>Galerita 533</p> <p>Galgulus <i>S</i> 357</p> <p>Gallæ <i>S</i> 267</p> <p>Gallina 539</p> <p style="padding-left: 2em;">Aquatia <i>S</i> 348</p> <p>Gallinago <i>S</i> 347</p> <p>Gallium 200</p> <p>Gallinula <i>S</i> 348</p> <p>Gallus 539</p> <p>Gambogia 437</p> <p>Gannanaperide 371</p> <p>Garum 115</p> <p>Genista 461</p> <p style="padding-left: 2em;">Hispanica <i>S</i> 311</p> <p style="padding-left: 2em;">Spinosa <i>S</i> <i>ibid.</i></p> <p>Gentiana 255</p> <p>Gentianella autumnalis <i>S</i> 149</p> <p style="padding-left: 2em;">Verna <i>S</i> 148</p> <p>Geodes lapis <i>S</i> 31</p> <p>Geranium batrachoides <i>S</i> 211</p>	<p>Tuberosum <i>S</i> <i>ibid.</i></p> <p>Gerardi Herba <i>S</i> 96</p> <p>Gingidium <i>S</i> 99</p> <p>Ginszeng 303</p> <p>Gith 307</p> <p>Gladiolus <i>S</i> 225</p> <p style="padding-left: 2em;">Luteus 321</p> <p>Glandes Quercinæ 353</p> <p>Glans Unguentaria 455</p> <p>Glastum 274</p> <p>Glaucium <i>S</i> 172</p> <p>Glaux Dioscor. <i>S</i> 194</p> <p style="padding-left: 2em;">Vulgaris <i>S</i> 195</p> <p>Glis <i>S</i> 373</p> <p>Glossopetra <i>S</i> 344</p> <p>Glottis <i>S</i> 347</p> <p>Glycyrrhiza 287</p> <p>Gnaphalion 154</p> <p>Gnidia grana 416</p> <p>Gobius <i>S</i> 337</p> <p>Gossypium 304</p> <p>Graculus <i>S</i> 354</p> <p>Gramen arundinaceum <i>S</i> 251</p> <p style="padding-left: 2em;">Caninum 343</p> <p style="padding-left: 2em;">Dactylon <i>S</i> 250</p> <p style="text-align: right;">Leu-</p>
--	---



I N D E X.

Leucanthem.	S 205	Halcyon	533
Mannæ	S 249	Halcyonium	58
Parnassi	S 207	Halec	514
Grana Paradisi	327	Halicacabum	245
Kermes	353	Haliæetus	544
Tiglia	128	Halimus	S 54
Granadilla	232	Harmel	280
Granata	370	Hasta Regia	322
Granatus lapis	96	Hedera arborea	376
Gratiola	262	Terrestris	221
Grossularia	374	Helenium	150
Grus	529	Heliochryson	S 82
Gryllus	488	Heliotropium	S 108
Guajacum	447	Tricoccum	127
Gummi Ammoniac.		Lapis	92
	148	Helleborastrum	S 143
Animi	458	Helleborine	S 240
Arabicum	462	Helleborus albus	129
Caranna	431	Niger	250
Ceraforum	403	Helxine	137
Copal	416	Cissampelos	S 149
Elemi	405	Hemerocallis	S 219
Guajaci	447	Hemionitis	S 46
Hederæ	376	Hepatica nobilis	226
Juniperi	360	Vulgaris	114
Lacca	402	Heptaphyllum	229
Senica	463	Herba Doria	S 66
Tragacantha	291	Gerardi	S 96
Gutta Gamba	438	Paralyseos	309
Gypsum 87	S 28	Paris	243
H.		Petri	S 213
Hæmatitis lapis	67		

I N D E X.

Hermodactylus	319	Hyacinthus	317
Herniaria	141	Lapis	96
Hesperis	S 160	Hydrargyrum	68
Hibernicus lapis	84	Hydrolapathum	131
Hieracium	144	Hydropiper	133
majus	S 59	Hyoscyamus albus	254
Hippocampus	S 334	Luteus	S 147
Hippoglossum	241	Niger	254
Hippolapathum	131	Hypecoon	S 255
Hippolithus	556	Hypericum	300
Hippophaes	S 176	Hypocistis	333 S 203
Hippopotamus	s 369	Hippoglossum	241
Hippofelinum	189	Hyssopus	212
Hircus	562	Hyftrix	S 371
Hirudo	481		
Hirundo	534	I.	
Indica	s 352	Jacea	S 73
Maritima	<i>ibid.</i>	Jacobæa	S 67
Hirundinaria	310	Jalapium	256
Hispidula	145	Jasminum	420
Hœdus	562	Jaspis lapis	92
Holoschoenos	s 242	Japonica terra	347
Holostium	s 180	Iberis	272
Homo	587	Ibex	S 365
Hordeum	340	Ibiscus	228
Gallicum & Perla-		Ichneumon	S 375
tum	340	Ichthyocolla	516
Horminum hortense		Ilex	353
	219	Illecebra	248
Sativum	s 118	Imperatoria	188
Sylvestre	219	Indico	289
			In-

I N D E X.

Indicum	289	Lacertus aquat.	S 364
Indigo	289	Terrestris	548
Inguinalis	161	Lacryma Jobi	s 247
Intybus	147	Lactuca agnina	s 89
Ipecacuanna	S 136	Hortensis	143
Iris Florentina	321	Sylvestris	s 57
Illyrica	321	Ladanum	299
Lutea	321	Lagopus	292
Nostras	320	Lamium album	221
Ifatis	274	Luteum	s 123
Ispida	533	Rubrum	221
Iva arthritica	223	Lampetra	s 332
Judaicus lapis	90	Lampfana	s 61
Juglans arbor	351	Lapathum acutum	132
Jujuba	401	Rubrum	s 52
Julus	s 321	Sanguineum	ibid.
Juncus odoratus	336	Lapis Adamas	s 35
Vulgaris	336	Ætites	89
Juniperus maj.	S 270	Alabastrites	87
Vulgaris	360	Alectorius	s 335
		Amethystus	97
K.		Amianthus	85
K Ali	139 s 56	Arenosus	s 26
Keiri	265	Armenus	84
Kermes	353	Asius	s 24
		Belemnites	91
L.		Bezoar Occident.	567
L Abdanum	299	Orient.	564
Labrum Veneris	171	Bufo nites	513
Lac Lunæ	s 10	Calcarius	88
Lacca Gummi	402	Calaminaris	83
		Carneolus	92
		Che-	

I N D E X.

LapisChelidonium	534	Stellaris	s 31
Chrysolithus	98	Thracius	s 13
Coracinus	s 340	Thyites	s 12
Fulminaris	s 31	Topasius	s 98
Galactites	s 11	Umbranus	s 393
Geodes	s 31	Lappa	158
Granatus	96	Larix	358
Hæmatitis	67	Larus	s 349
Heliotropium	92	Laserpitium	s 95
Hibernicus	84	Lathyrus	378
Hyacinthus	96	Lathyrus	s 183
Judaicus	90	Lavendula	210
Lazuli	84	Laureola	415
Lyncis	91	Daphnoides	415
Manatea	573	Lauro-cerasus	s 288
Memphites	s 33	Laurus	444
Melitites	s 11	Alexandrina	241
Molaris	s 29	Tinus	s 282
Morochthus	<i>ibid.</i>	Lazuli lapis	84
Nephriticus	93	Lemnia terra alba	s 8
Opites	88	Sigillata	45
Phrygius	s 23	Vulgaris	<i>ibid.</i>
Porcinus	s 371	Lens	286
Rubinus	96	Palustris	111
Sapphirus	97	Lenticula marina	s 39
Sardus	92	Lentiscus	412
Schistus	s 22	Leo	578
Serpentinus	88, s 362	Leontopetalon	s 254
Smaragdus	97	Leontopodium	s 69
Selenitis	86	Lepidium	272
Secularis	<i>ib.</i>	Lepus marinus	s 327
Spongiæ	82	Terrestris	573
		Leu-	

I N D E X.

Leucas montana	s 123	Linaria avis	s 353
Leuciscus	s 336	Herba	259
Leucoium album	s 158	Cervina.	116
Luteum	265	Linum	307
Levisticum	189	Catharticum	s 211
Libanotis	s 94	Liquidambar	365
altera	s 94	Liquiritia	287
Lichen arboreus	111	Lithanthrax	s 13
Marinus	s 39	Lithargirus Argenti	77
Terrestris	s 44	Auri	77
Vulgaris	114	Lithocolla	s 29
Lignum Aloes	470	Lithospermon	206
Aspalthi	467 471	Lixivium	140
Colubrinum	439	Locusta Insecta	488
Flavum	363	Lolium	342
Guajacum	447	Lonchitis	s 46
Juniperinum	360	Lotus arbor	s 280
Moluccense	128	Urbana	292
Nephriticum	465	Lucius	517
Rhodium	467	Ludus Paracelsi	s 28
Rubrum	465	Lujula	312
Sanctum	448	Lumbricus terrestris	481
Sapan	464	Luna	75
Ligusticum	190	Lunaria	115
Ligustrum	421	Lupinus	286
Lilium album	315	Sylvestris	s 186
Convallium	242	Lupulus salictarius	124
Limax ater	s 320	Lupus Bestia	580
Ruber	s 321	Piscis	513
Terrestris	498	Luscinia	s 352
Limonia malus	437	Lutra	584
Limonium	173		

Lich-

I N D E X.

Lychnis coron.	S 199	Sylvestris	368
Sylvestris	298 S 201	Manata lapis	573
Lycium	S 299	Manatea lapis	<i>ibid.</i>
Indicum	S 315	Manati	573
Lycoperdon	S 42	Mandragora	243
Lycopodium	S 44	Manga	S 289
Lycopsis	S 106	Manna	449
Lycopus	S 117	Thuris	473
Lyncis lapis	91	Mareasita	70
Lynx	578	Marga	47 S 10
Lysimachia	300	Candida	S 10
		Saxatilis cinerea	<i>ib.</i>
		Incarnata	<i>ibid.</i>
<b>M.</b>		Margarita Orient.	506
<b>M</b> Acaleb.	S 288	Occident.	<i>ibid.</i>
Macer	S 306	Scotica	<i>ibid.</i>
Macis	394	Marmor	S 30
Magistrantia	188	Marrubium album	220
Magnes	66	Nigrum	223
Majorana	217	Mars	73
Oleracea	S 118	Marum	213
Malabathrum	384	Syriacum	S 118
Malactites	S 34	Mastiche	412
Malicorium	370	Mater Perlarum	506
Malva arborea	227	Matricaria	165
Verbenacea	228	Matrifylva	375
Vulgaris	227	Mecaxochtl	364
Mala Aurantia	437	Mechoacanna alba	256
Citra	436	Nigra	256
Cydonea	368	Medica	S 197
Granata	370	Medium	S 152
Infana	S 128	Medulla saxorum	S 10
Limonia	437	Mel	
Malus hortensis	368		

I N D E X.

Mel		485	Millepes	483
Melanteria	S	24	Milvus Avis	545
Melanthium	S	211	Piscis	S 338
Melanurus	S	340	Minium	77
Meleagris	S	355	Misy	71
Melia terra		49	Molaris lapis	S 29
Melilotus		292	Mollugo	S 103
Verus	S	196	Moluccense lignū	128
Melissa		222	Moly Dioscoridis	
Melitea terra		49		S 221
Melo		235	Theophrasti	<i>ibid.</i>
Memphites lapis	S	33	Molybdæna	76
Mena piscis	S	340	Momordica	522 S 133
Mentha aquatica		215	Monedula	S 354
Cataria		219	Monoceros	522
Crispa	S	117	Monophyllon	S 136
Scortensis		215	Morus	362
Saxifraga	S	115	Morsus Diaboli	170
Mercurialis	S	49	Gallinæ	302
Vulgaris		126	Ranæ	S 217
Mercurius crudus		68	Moschata Nux	394
Mergus	S	349	Moschus	570
Merops	S	351	Motacilla	535
Merula Avis	S	357	Moxa	169
Piscis	S	341	Mugil	521
Mespilus		369	Mullus	S 338
Meum Athamantic.			Mulus	557
		187	Mumia	590
Mezereon		415	Mus Alpinus	576
Milium		342	Araneus	585
Solis		206	Domestic <sup>9</sup> maj.	577
Millefolium		162	minor	<i>ibid.</i>
				Indi-

I N D E X.

Indicus	S	375	Myxaria	381
Musa arbor	S	265		
Musca domestica		484	N.	
Hispanica		490	Napus dulcis	267
Muscerda		577	Sylvestris	S 162
Muscipula	S	201	Napellus	S 146
Muscus arboreus		III	Naphtha	55
Clavatus	S	44	Napha	437
Cranii		113	Narcissus	S 222
Marinus	107 S	40	Nardus Celtica	173
Pulmonarius		III	Indica	335
Pyxidatus	S	44	Montana	S 89
Terrestris		<i>ibid.</i>	Nasturtium aquati-	
Mustela Bestia	S	375	cum	270
Piscis		512	Hibernicum	S 165
Mustelus		522	Hortense	272
Myagrum	S	167	Indicum	S 104
Myofurus	S	129	Sylvestre	270
Myriophyllon	S	100	Nepa	S 312
Myrobalanus	Belliri-		Nepeta Vulgaris	219
ca		400	Nephritic. lignum	465
Chebula		400	Nerium	S 309
Citrina		<i>ibid.</i>	Nicotiana	254
Emblica		<i>ibid.</i>	Nigella	307
Indica		399	Nigellastrum	S 200
Nigra		<i>ibid.</i>	Nihil album	79
Myrrha		434	Gryseum	79
Myrrhis		186	Ninzin	303
Myrtilus	S	281	Nitrum	61 S 17
Myrtus		376	Noctua	546
Mytulus		507	Nucula terrestris	S 97
Myxa		381	Nummularia	313
			Nux	



I N D E X.

Nux avellana	352	Onofina	S 107
Ben	455	Onyx	92
Indica	S 259	Opalus	98
Malabarica	S 260	Ophioglossum	115
Mofchata	394	Ophioscorodon	S 220
Piftachia	443	Ophites	88
Virginiana	S 283	Opium	275
Vomica	439	Opobalsamum	411
Nymphæa alba	314	Opopanax	180
Lutea	ibid.	Opuntia	S 280
		Orchis	S 238
		Oreofelinum	181
		Origanum Cretic.	218
		Heraclitorum	S 118
		Vulgare	217
		Gnithogalon	S 224
		Ornithopodium	S 191
		Ornithis	S 276
		Orobanche	S 239
		Orobis	288
		Oryza	311
		Osmunda Regalis	120
		Osteocolla	83
		Ostracites	S 329
		Ostreum	505
		Ostrya	S 273
		Osyris	S 282
		Othonna	S 178
		Ovis	560
		Oxalis	132
		Oxyacantha	422
		Oxycedrus	S 270
			Oxy.
			Cc
Chra	45		
Ocymum caryo-			
phyllatum	218		
Citratum	ibid.		
Oculi Cancrorum	508		
Oculus Christi	S 120		
Ocymoides	S 200		
Oenophia	S 285		
Oesipus	561		
Olea	404		
Oleaster	S 286		
Germanicus	S 294		
Oleum terræ	55		
Olibanum	472		
Onager	657		
Onagra	S 172		
Oniscus Insecta	483		
Piscis	S 335		
Onobrychis	S 186		
Ononis	293		

I N D E X.

Oxycoccus	S 140	Parietaria	137
Oxylapathum	132	Paris Herba	243
Oxychœnos	S 242	Paronychia	S 206
		Rutacea	S <i>ibid.</i>
P.		Parthenium	164
PAdus	S 288	Parus	535
Pæonia albicans	S	Passer domesticus	536
	143	Troglodytes	534
Fœmina	249	Pastinaca aquatica	
Mas,	<i>ibid.</i>		S 98
Paliurus	S 307	Hortensis	180
Palma Christi	128	Piscis	S 342
Dactylifera	346	Sylvestris	179
Oleoia	S 257	Pavo	541
Palumbus	543	Pectunculus	S 329
Pampinus	424	Pedicularis	S 155
Panax Asclepium	S 94	Pediculus	482
Herculeum	180	Pedro del Cobra	S 359
Chironium	S 204	Del Porco	S 371
Coloni	S 120	Pentaphyllum	229
Panicum	341	Peplis	S 175
Panthera	578	Peplus	<i>ibid.</i>
Papaver album	275	Pepo	234
Corniculatum	S 171	Perca	520
Erraticum	277	Percepier	S 56
Nigrum	276	Perdix	541
Rhœas	277	Perfoliata	198
Rubrum	<i>ibid.</i>	Perforata	300
Papyrus	S 241	Periclymenum	375
Paradisi Grana	327	Perygua	S 297
Paralysis	309	Perla	506
Pardus	578	Persea	S 289
		Per-	

I N D E X.

Perfica malus	391	Pica	537
Perlicaria maculata	133	Picea	355
Non-maculata	<i>ibid.</i>	<i>Pierre de Colique</i>	<i>S</i> 340
Siliquosa	<i>S</i> 254	<i>de Cobra</i>	<i>S</i> 359
Peruvianus cortex		Pilosella	144
	372 <i>S</i> 279	Pimenta	379
Pes anserinus	<i>S</i> 55	Pimpinella	175
Columbinus	305	Saxifraga	191
Leporinus	292	Pinguicula	<i>S</i> 153
Petasites	149	Pinus	356
Petroleum	55	Maritima	<i>S</i> 268
Petroselinum Mace-		Sylvestris	356
donicum	198	Piper album	446
Montanum	188 <i>S</i> 92	Jamaicense	379
Vulgare	193	Indicum	245
Petum	254	Longum	363
Peucedanum	183	Nigrum	446
Phagus	<i>S</i> 266	Piperitis	273
Phalangium	<i>S</i> 228	Pisum	285
Phalaris	<i>S</i> 246	Pissasphaltus	590
Phaseolus	285 <i>S</i> 181	Pisellaon Indicum	55
Phellendrium	<i>S</i> 99	Pistachia	443
Phellodrys	<i>S</i> 268	Pistolochia	<i>S</i> 154
Phoca	<i>S</i> 370	Virginiana	260
Phœnix	<i>S</i> 248	Pityusa	<i>S</i> 175
Phrygius lapis	<i>S</i> 23	Pix Burgundica	355
Phu major	172	Plantago angustifol.	
minor	173		281
Phyllitis	116	Aquatica	230
Phyllon	<i>S</i> 50	Latifolia	281
Phyllyrea	<i>S</i> 292	Terrestris	<i>ibid.</i>
Phyteuma	<i>S</i> 208	Vulgaris	<i>ibid.</i>

I N D E X.

Platanus	S 306	Portulaca	302
Plumbago herba	S 90	Maritima	S 54
Minera	S 90	Sylvestris	S 206
Plumbum crudum	76	Potamogeiton	S 54
Nigrum	660; S 12	Potentilla	330
Pneumonanthe	S 148	Poterium	S 192
Pnigites terra	S 8	Prassium	220
Poco Sempie	S 48	Prassius lapis	S 34
Polemonium	S 216	Primula veris	309
Polium alterum	S 114	Proscarabeus	494
Creticum	214	Propolis	485
Montanum	213	Prunus Brignolensis	
Polygala Dioscorid.			398
	S 190	Damascena	397
Vulgaris	S 157	Gallica	<i>ibid.</i>
Polygonatum	242	Prunella	220
Polygonum foemina		Prunellus	398
	S 45	Prunus	379
Mas	133	Pseudoacorus	321
Polypodium	116	Pseudobunium	S 163
Polytrichum	113	Pseudocassia	S 316
Poma amoris	244	Pseudocytifus	S 314
Citria	436	Pseudodictamn <sup>o</sup>	S 122
Hortensis	368	Pseudoselinum	S 102
Sylvestris	<i>ibid.</i>	Pseudonarcissus	S 223
Pompholyx	79	Psyllium	281
Populus alba	S 272	Ptarmica	161
Nigra	361	Pulegium cervin.	216
Tremula	S 272	Regale	216
Porcus	567	Pulicaria	150
Porphyrites	S 30	Pulmo marinus	S 327
Porrum	317	Pulmonaria aurea	S 60

Gal-

I N D E X.

Gallica	S 60	Montonus	<i>ibid.</i>
Maculosa	203	Palustris	S 128
Vulgaris	<i>ibid.</i>	Vulgaris	227
Pulsatilla	S 132	Rapa	266
Purnex lapis	82	Sylvestris	S 162
Punica mala	370	Raphanus aquaticus	
Purpura	504		S 166
Pyracantha	S 277	Hortensis	267
Pyrus	368	Rusticanus	270
Pyrethrum	163	Sylvestris	268
Verum	S 100	Rapistrum	S 164
Pyrola	333	Rapum	266
		Regina Prati	23E
Q.		Regulus	534
Quercus arbor	352	Remora	S 333
Marina	S 38	Reseda	S 208
Quinefolium	229	Resina Abietina	355
Quinquenervia	281	Laricea	358
Quinquina	371	Pinea	356
		Terebinthina	411
R.		Vulgaris	356
Radicula	267	Rha	130
Radix dulcis	S 193	Rhabarbarum Mona-	
Raia	S 343	chorum	<i>ibid.</i>
Raiola	<i>ibid.</i>	Verum 308	S 212
Rana viridis	551	Rhamnus albus	S 294
Vulgaris	<i>ibid.</i>	Niger	<i>ibid.</i>
Rangifer	S 365	Solutivus	429
Ranunculus	227	Rhapontic. verum	130
Acris	S 128		S 52
Flammeus	<i>ibid.</i>	Vulgare	158
		Rhinoceros	569
		Cc 3	Rho-

I N D E X.

Rhodia radix	467	Capraria	288
	<i>S</i> 141	Montana	<i>S</i> 179
Rhodium lignum	467	Muraria	119
Rhois obsoniorum	416	Sylvestris	280
Rhus	<i>ibid.</i>	Rutilus	<i>S</i> 336
Ribes niger	375		<i>S.</i>
Ruber	375		
Ribesia	<i>ibid.</i>	<b>S</b> Abina baccif.	<i>S</i> 271
Ricinus herba	127	Vulgaris	359
Americanus	128	Saccharum album	343
Insecta	482	Candum album	343
Ritro	<i>S</i> 86	Rubrum	344
Robur	<i>S</i> 267	CrySTALLINUM	343
Rosella	313	Rubrum	343
Ros	41	Sagapenum	185
Solis	313	Sagitta	<i>S</i> 130
Rosa alba	374	Sagittaria	<i>S</i> 233
Canina	373	Sagou	<i>S</i> 260
Damascena	<i>ibid.</i>	Sal Ammoniacum	588
Rubra	374	Alkali	149
Rosmarinus	211	Commune albū	59
Rubia sylvestris	<i>S</i> 103	Nigrum	41
Synanchica	<i>S</i> 104	Fossile	<i>S</i> 15
Tinctorum	200	Gemmæ	59
Rubicella	<i>S</i> 353	Lancastrense	<i>S</i> 4
Rubecolla	352	Marinum	41
Rubinus lapis	96	Novo-Castrense	<i>S</i> 4
Rubrica terra	47	Portocense	<i>ibid.</i>
Rubus Idæus	432	Super Salem	<i>S</i> 16
Vulgaris	432	Petraë	62
Ruscus	24 I	Salamandra	549
Ruta	280	Salix alba	361
			Heli-

I N D E X.

Helice	S 273	Castiliensis	ibid.
Nigra	S ibid.	Hispanicus	ibid.
Rubens	S 272	Niger	ibid.
Salvia hortensis	ma-	Venetus	ibid.
jor	209	Saponaria	299
Minor	210	Sapphirus lapis	97
Sylvestris	224	Sarocolla	465
Virtutis	209	Sardius lapis	92
Vitæ	119	Sardus lapis	ibid.
Sambucus arbor	423	Sardonix	S 32
Humilis	423	Sarsaparilla	238
Montana	S 298	Sassafras	384
Samia terra	47	Satureia	212
Sampfuchum	217	Spicata	S III
Sanamunda	293	Satyrium foemina	332
Sanctum lignum	447	Mas	332
Sandaracha	Arabum	Saxifraga alba	303
	360	Antiquorum	S 201
Sandyx	77	Vera	S 112
Sanguis Draconis	418	Vulgaris	194
	S 252. 263	Scabiosa	170
Sanguisorba	175	Scammonium	256
Sanguisuga	481	Scandix	S 96
Sanicula	199	Scarabæus	489. 490
Santalum album	433	Scariola	147
Citrinum	433	Schistus lapis	S 22
Rubrum	465	Schœnanthus	336
Santonicum	femen	Schœnoprassum	S 220
	168	Scincus	549
Viride	S 82	Scilla	318
Sapan lignum	464	Sclaræa	219
Sapo albus	140	Scolopendra	S 322
Communis	ibid.		S 322

# I N D E X.

Scolopendrium	117	Septinervia	281
Scolymus	157	Serapias	s 237
Sylvestris	s 69	Sericum crudum	489
Theophrasti	s 63	Seriola	147
Scomber	s 337	Serpentaria	Virgin.
Scombrus	ibid.		260
Scordium	224	Serpens	547
Scorodonia	224	Indicus	s 359
Scorodoprasum	s 222	Marinus	s 333
Scorpio marinus	s 342	Serpent. lapis	88 s 362
Terrestris	483	Serpyllum	213
Scorpioides	s 191	Verum	s 112
Scorpius	s 311	Serratula	s 75
Scorzonera	145	Sesamoides	s 62
Scrophularia	261	Sesamum	345
Minor	226	Seseli Æthiopic.	s 102
Sebesten	380	Creticum	181
Secacul	97	Massiliense	ibid.
Secale	339	Pratense	194
Securidaca	s 189	Peloponense	s 98
Sedum majus	247	Vulgare	190
Minus	303	Sideritis	s 123
Selenites	86	Sigillata terra	45
Selenusia terra	s 13	Sigillum Salomonis	242
Selinum	194 s 97	Siler montanum	190
Montanum	s 101	Silesiaca terra	45
Sempervivum	247	Silix	s 29
Senecio	153	Siliqua dulcis	463
Senica gummi	463	Silurus	s 33
Senna	454	Simia	s 370
Sepia	496	Sinapi	267
Seps	s 363	Sifer	



I N D E X.

Sifer	190	Sperma Ceti	525
Sifymbrium	215	Spica Nardi	335
Sifyrhinchium	S 225	Vulgaris	210
Sium	98	Spina alba Arbor	370
Smaris	S 341	Herfla	S 85
Smaragdus lapis	97	Arabica	S 86
Smerillus	67	Cervina	429
Smilax arbor	S 26	Solutiva	ibid.
Aspera	S 138	Spinachia	126
Lævis	S 149	Spirea	S 304
Smyris	67	Spodium Græcorum	79
Smyrniūm	189	Officinarum	572
Soda	140 S 56	Sphondylium	179
Soia	S 182	Spongia	108
Solanum hortense	244	Spongitis lapis	82
Lethale	S 139	Spuma maris	58
Lignosum	242	Squamaria	S 239
Somniferum	S 139	Squatina	S 343
Soldanella	257	Squilla herba	318
Solidago	151	Piscis	S 331
Sonchus asper	144	Stachys	121
Lævis	143	Stacte	434
Sophia Chirurgor.	269	Stannum	74
Sorbus	369	Staphis agria	251
Torminalis	S 277	Staphylodendron	S 303
Sorghum	S 246	Stellaris lapis	S 31
Sory	71	Stœbe	S 74
Sparganium	S 243	Stœchas Arabica	211
Spartium	S 311	Citrina	152
Spatula foetida	321	Stramonium	257
Specularis lapis	86	Stratiotes	S 253
Spelta	340	Strigenſis terra	S 9
		C c 5	Stru-

I N D E X.

Struthio	538	Tanacetum	166
Struthium	S 209	Tapfus barbatus	311
Sturio	515	Tarachon	S 81
Sturnus	S 357	Taragon	ibid
Styrax calamita	382	Taraxacum	241
Liquida	382	Tarsi	S 240
Suber	454	Tartarum album	42
Succinum album	55	Rubrum	ibid
Citrinum	56	Taurus	551
Nigrum	54	Taxus arbor	S 27
Succisa	170	Bestia	58
Sulphur nativum	51	Telephium	241
Caballinum	52	Tellina	S 331
Commune	ibid.	Terebinth. Argenti	
Factitium	ibid.		351
Vivum	52	Chiensis	41
Sumach	416	Communis	351
Sus	568	Cypria	41
Sycomorus	S 277	Veneta	351
Symphytum	206	Terebinthus	41
Minimum	163	Teredo	49
Petraeum	S 180	Terra Ampelites,	5
Synanchica	S 104	Argillacea	4
		Chia	S
		Eretria	S
		Fabriliis	4
		Goltburgensis	S
		Japonica	34
		Lemnia	4
		Livonica	S
		Melitea	4
		Pnigitis	S
			R

T.

<b>T</b> Abacum	254
Tacamahaca	392
Tagetes	S 78
Talchum	86
Talpa	585
Tamarindus	460
Tamariscus	451

I N D E X.

Rubrica	47	Verus	<i>ibid.</i>
Samia	<i>ibid.</i>	Vulgaris	213
Selenusia	s 13	Tilia	445
Sigillata	45	Tinca	518
Silesiaca	45	Tincar	62
Strigenfis	s 9	Tithymalus characias	S
Tripolitana	47		173
Turcica	s 9	Cypariffias	S 174
Testudo marina	550	Dendroides	<i>ibid.</i>
Terrestris	550	Helioscopius	278
Teucrium	s 114	Myrtites	S 174
Thalictrum	s 91	Paralius	<i>ibid.</i>
Thapsia	183	Platyphyllos	S 175
Thea	427 s 299	Topafius lapis	98
Therma	41	Tormentilla	230
Thermolithus	s 28	Torpedo	S 344
Thora	s 128	Tota bona	133
Thlaspi	273	Tragacantha	291
Vulgaris	s 169	Tragium	S 144
Thunnus	s 336	Alterum	S 110
Thus masculum	472	Tragopogon	S 60
Vulgaris	256	Tragorchis	S 237
Thuris Cortex	469	Tragoriganum	S 113
Manna	473	Alterum	<i>ibid.</i>
Thuya	s 243	Tragós	s 301
Thymbra	s 110	Trachelium	s 152
Vera	<i>ibid.</i>	Tribulus aquaticus	344
Thymallus	520	Terrestris	s 256
Thymelæa	415	Trichomanes	118
Thymus	213	Trifolium acetosum	312
Citrinus	s 112	Aquaticum	312
Sylvestris	s 112	Anreum	226
			itu

I N D E X.

Bituminosum	s 195	Valeriana Græca	s 210
Hæmorrhoidale	S 197	Major	172
Odoratum	292	Minor	172
Purpureum	s 196	Sylvestris	s 8
Paludosum	312	Vanellus	s 342
Vulgare	292	Vaynillus	460
Triorchis	s 237	Veratrum album	120
Tripolis terra	47	Nigrum	250
Tripolitana terra	<i>ibid.</i>	Verbascum album	21
Tripolium	s 64	Nigrum	s 21
Trifago	214	Vulgare	31
Triticum Indicum	341	Mas	210
Vaccinium	s 156	Vermis terrestris	48
Vulgare	339	Vermicularis	241
Truta	520	Veronica fœmina	250
Tubera	s 43	Mas	274
Tulipa	s 223	Vervex	56
Turbith	257	Vesicaria marina	S 330
Turchois lapis	s 34	Vespa	s 322
Turdus	s 356	Vespertilio	37
Marinus	s 341	Vetonica	291
Turpethum	257	Viburnum	s 29
Turritis	s 162	Vicia	280
Turtur	543	Sylvestris	s 18
Tussilago	149	Victorialis	310
Tutia	78	Vinca pervinca	310
Typha	s 243	Vincetoxicum	310
		Vinum	424
V.		Viola	304
Vacca	559	Lunaria	s 150
Vaccaria	s 202		Lu
Vaccinia	s 140		



# I N D E X.

Z.			
Z Anthoxylon	363	Zeopyrum	S 245
Zea	340	Zibethum	583
Zedoaria longa	328	Zingiber	327
Rotunda	328	Zizypha	S 290
		Zurumbet	328

**Register der Deutschen Wörter über  
 das Supplementum, welches dann auch  
 über die Pharmacologia selbst kan gebraucht wer-  
 den/ indem im Supplemento hinwieder die  
 Anweisung zu finden/ alwo es in der Phar-  
 macologia auffzuschlagen ist.**

A.			
<b>A</b> Uraup	337	Allermanns Harnisch	220
Aberraute	82	Aloe ejusque species	229
Achat	32	& seqq.	
Achmella	80	Althee	146
Acmella	80	Allyssen	377
Acker-Burzel	142	Amber-Kraut	118
Acker-Condrißen	58	Ambrosien-Kraut	51
Acker-Knoblauch	222	Amsel	357
Acker-Münze	324	Andorn	
Acker-Wurk	244	Kleiner Italiänischer	121
Adams-Feigen	274	Niedriger	121
Adler	357	Wasser-Andorn	117
Adler-Stein	31	Anemouen-Röflein	132
Adonis-Röflein	129	Aniß	145
Aegyptische Bohnen	218	Indianischer Aniß	145
Wasser-Linsen	253	Stern-Aniß	ibid.
Aethiopische Scharley	119	Artflope	365
Affe	370	Apffel	
Ahorn-Baum ejusque spe- cies. 305. & seqq.		Doll-Apffel	138
Alatern-Baum	296	Erd-Apffel	138
Allegarde	363	Melanzan-Apffel	ibid.
Alheil-Wurk	94	Arabische Distel	86
		Arabischer Senff	167
		Archangel	123
		Aron	

# Regifter.

Arion	235	Bauren-Kresse	169
Artifchocke	70	Senff	ibid.
Aspen	272	Berg-Elhorn	298
Auffrechte Wald-Rebe	132	Händlein-Wurz	237
Azarolen	278	Berg-Hahnen-Fuß	128
		Holder	298
<b>B.</b>		Berg-Hunds-Auge	109
Bären-Klau	254	Berg-Peterlein	101
Bärs-Fuß	143	Peterfilge	101
Bärs-ohrlein	214	Berg-Polium	114
Bär-Sanickel	ibid.	Berg-Sanickel	153
Baldrian	88	Berg-Spicanarde	89
Griechischer Baldr.	216	Berg-Schlüsselblumen	214
Balsam-Äpfel	134	Berg-Ulmbaum	305
Balsam-Kraut	134. 255	Bermudes-Beeren	287
Balsemuth	124	Bertram	100
Barbe	338	Biebeer	281
St. Barben-Kraut	165	Bienenfraß	351
Barme	338	Bieß-Condrißen	58
Basilien	121. 122	Bingel-Kraut-Weiblein	49
Ruh-Basilien	200	Bingzen-Lauch	220
Baum		Bullbingzen	242
Bonana-Baum	265	Seebingzen	242
Büch-Baum	266	Bischoffshut	256
Coccos-Baum	258	Bitterwurz	148
Drachenblut-Baum	263	Bleywurz	90
Eben-Baum	259	Blindschleiche	359
Erlen-Baum	269	Blumen-Gras	206
Kohl-Baum	262	Blut-Finck	353
Mango Baum	290	Blutwurz	211
Mofa Baum	265	Bocksbart	60
des Lebens	269	Bocksdorn	192
Del-Baum	257	Bocksdosten	113. 114
Palm-Baum	263. 257	Bockshödlein	237
Perfier-Baum	289	Bocksküllecken	237
Plantain-Baum	265	Bockstrauch	109
Sagva-Baum	262	Bollendistel	84
Racholder-Beer-Baum	270	Bolus	7
Baumichter Nachtschatten	137	Türkischer	7
		Weisser	7
		Bonen	

# Register.

Bonen-Baum	312. 313	wahrer Calmus	244
Klee	313	Cameel	370
Bengalische Bonen	284	Canarien-Graß	246
Egyptische Bonen	218	Saamen	246
Fransche	182	Candische wilde Rüben	163
Italanische	182	Cancel-Baum	316
Bovist	42	Casie-Strauch	296
Brackenbistel	88	Casumunar	234
Brandfuchs	340	Castanien.	
Brasilianische Einbeer	137	Erd-Castanien	97
Breitblättrichter Hundszahn	227	Sau-Castanien	97
Breitblättrichte Walb-Nebe		Cederbaum aus Phœnicia	270
be	131	mit grossen Beeren	270
Breitblättrichte wilde		Ceyren-Kraut	142
Scharley	119	Ceylonische Pflanze	115
Brennender Habuensfuß	128	Chalcedonier	33
Brod: Indianisch Brod	261	Championon	42
Brombeer	135	Chondrillen-Kraut	58
Norwegische	135	Alter-Chondrillen	58
Brunnen-Basser/ Andorn		Biech-Chondrillen	58
	121	Christwurz	143
Brustbeer	286. 290	Cimmerbaum	316
Bubenst	42	Citronen-Quendel	112
Buchbaum	266	Cistus ejusque species	203
Büchenholz	266	& seqq.	
Heck- oder Hagebüchen		Coccos-Nußbaum	258
	273	Maldivische Coccos-	
Buchlattich	60	Nuß	259
Buchweizen	53	Coralien	36
Burgundisch Heu	197	Corck-Eiche	268
Burzel-Dorn	256	Cranichbeeren	141
Bußfahren	358	Creuzblümlein	157
Butterwurz	153	Creuzwurz	239
Burdorn	299	Crystallisir-Gefässe	18
Indianischer Burdorn	315	Crocodill	363
		Cypresse	126
<b>C</b>			
Cabeliau	335		
Cacarell	340. 341	<b>D</b>	
Calmus	252	Alle	354
		Dam-	



# Register.

Dambirsch.	Dam	Thier	Eben, Holz	ibid.
			366 Ebereschen-Baum	271
Delphin			344 Edel-Garbe	79
Demant			35 Eiben-Baum	271
Demuth			112 Eibisch-Geist	365
Diptam			122 Eich-Farren-Kraut	47
Distel			Eiche ejusque species	267
Babische Distel		86		& seqq. 51
Bollen Distel		84	Eichel ejusque species	266
Bracken Distel		88		& seqq.
Fichren Distel		70	Eider. Kupffer-Eider	363
Fisch Distel		72	Ratten-Eider	364
Gulden Distel		63	Wasser-Eider	ib.
Karten Distel		83	Einbeer	
Melancholey Distel		71	Brasilianische	137
Purgirende Distel		172	Einbeer-Baum	291
Spher Distel		84	Einblat	136
Theophrastus-Distel		72	Einhorn gegraben	27
Weg Distel		73	Einkorn	245
Wollichte Distel		ib.	Eisen Hütlein	147
Doll-Aepffel		138	Eiserwurk	123
Dollwurk. Galeni			Elfenbein	27
		139	Elhorn	298
Donner-Art. Donnerkeil		31	Eller-Baum	269
Dorn Spargen		140	Elfen-Baum	ib.
Dosten. Boecks-Dosten		113	Elken-Baum	278
Wilder Dosten		118	Engelsuß-Baum-Faren	46
Drache			Engell-Fisch	343
See-Drache		339	Meer-Engel	ib.
Drachen-Blut		52	Englisch Steinbrech	56
In Granis		252	Mayoran	118
Drachen Blut-Baum		263	Enkian	148
Drachen Wurk		235	Weisser Enkian	102
Dromedarius		370	Erbfen/Heide-Erbfen	188
Drossel. Meer-Drossel		341	Indianische rothe Erbsen	183
Dürrwurzel		64. 68		183
Durchwachs		240	Wilde Züser Erbsen	188
	E.		Erd-Castanien	97
Eben Baum		259. 295	Erde. Cretrianische Erde	8
			D d	sem.

# Register

Lemnische	ib.	Wasser Fenchel	109
Liefländische	ib.	Fichten. Meer fichten	268
Selenusische	13	Fichten Distel	70
Striegische	9	Fincke. Blutfincke	353
aus der Insul Chios	9	Diestelfincke	353
Erd Riser	126	Fisch Distel	62
Erd Leber Kraut	44	Flachs Dotter	167
Erdmoren	193	Fleder Manß	375
Erd Nuß	97	Flocken Blume	74
Erdpin	126	Flob Kraut	90
Erdshoefe	70	Fœnum Græcum	194. 195
Candische Erdshoefe	ib.	Fransche Erdpin.	126
Von Jerusalem	77	Fransch Wurmsaamen	82
Wilde Erdshoefe	69	Frauen Nabel	207
Erd Spinnen Kraut	229	Frosch Biß	217
Erlen	269	Fuchs Gangß	350
Eschlauch	220	Fuchs Schwanz	249
Eschwurz	122	G.	
Espen	272	Gänse Distel	59
Eule	358	Gänse Fuß	55
Nacht Eule	ib.	Gänse Jung	57
Erstein	24	Galgan	241
F.		Gallapffel Baum	267
Färber Baum	304	Gallywurm	321
Färber Laub	ib.	Gamanderlein	114
Falscher Diptam	122	Garnat	331
Falsch Süßholz	193	Garnel	ib.
Feigen Baum ejusque spe-		Gauch Haber	248
cies 274 & seqq.		Geelgorst	357
Feld Cypresse	126	Geilwurz	237
Feld Kletten	101	Geiß Eibisch	365
Feld Lauch	220	Geiß Fuß	96
Feld Münze	124	Geiß Grasl	ib.
Feld Napunkelchen	90	Geiß Klee	314
Feld Zwiebel	224	Geiß Indianische	365
Felsen Saturnen	111	Gelbe Archangel	123
Fenchel Blumen	211	Gelbe Ochsen Zunge	106
Fenchel Kraut	95	Gelbe todte Nessel	123
Riesen Fenchel	93	Gemsen Wurz.	65
		Gen.	

# Register.

H.

Gentianella	149	Hag Büche	277
Gersten Tzwalch	248	Haag Eiche	267
Gespel Dorn	312	Haag Dorn	277
Giwiz	347	Haber	247
Glied Kraut	117. 123	Tauber; oder wilder	248
Glöcklein. Covendry Glöck-	lein 153	Haber Tzwalch	248
Gold Blume	77	Häher	354
Goldblume mit Metterkraut		Hæmioniatis	46
Blättern	78	Hals Kraut	152
Goldwiesen Blume	146	Wurzel	ibid.
Gras	38	Hahnen Fuß ejusque speci-	es 127 & seqq.
Färber Gras	209	Gras	250
Geiß Gras	96	Hahnen Lämcken	186
Hahnen Fuß Gras	250	Hahnen Kopff	ibid.
Meer Gras	38	Hammel Korn	245
Paruasser Gras	208	Hänsferling	354
Ried Gras	243	Hase. See Hase	327
See Gras	38	Hasen Klee	189
Grosse Anemonen Köpfelein	132	Hasen Ohrlein	102
Basilien	22	Hecken Nessel	120
Bauren Sempff	169	Petersilge	102
Docken Kraut	76	Hedderich	164
Gartenquendel	112	Heidel Beer	281. 277
Klette	76	Heiden Hop.	204
Pfeil Kraut	131	Heiden Korn	53
Poiay	22	Heidenreich	164
Spehr Kraut	127	Heilwurk	94
Spehr Wurk	128	Hemmerling	357
Stern Meyer Kraut	103	Hertz Gespann	125
Taube Nessel	120	Henting	336
Wund Kraut	66	Himmel Sucker	339
Grünstein	12. 14	Himmel Schlüssel	213
Gülden Uderklee	198	Himmel Thau	249
Gülden Moos	48	Hiobs Thränen	247
Gülden Wund Kraut	66	Hirsch Brunst	43
Günsel. Gülden Günsel	204	Hirsch Holder	298
Sonnen Günsel	ibid.	Hirsch Schwamm	43
Stein Günsel	180		

# Register.

Hirsch-Wurzel	93. 102	Sonquillen	223
Hochel	331	Iris	228
Hörliß	223	Isercken	354
Hörnsen	ib.	Iſop. Winter Iſop	110
Hohlbrod	350	Heiden Iſop	204
Hollauch	220	Italiänisch Andorn	121
Honig Stein	11	Bohne	182
Honigwurzel	97. 109	Burdorn	298
Hornfißch	334	Erd-Rifer	126
Hornungs-Blumen	223	Erdpin.	ibid.
Houting	340. 341	Meilot	197
Hufflattig	68	Jucca	233
Huhn	356	Injuben	286. 290
Türkhuhn	356	Zuckerlein	341
Haselhuhn	ib.	Zungfern Ancker	131
Türkisch	ib.	R.	
Welschhuhn	ib.	<b>K</b> äfer	324
Humber	331	Kalbs-Maul	154
Hundfißch	344	Karten Distel	83
Hundshoden	237	Kazen Leiterlein	45
Hunds Köhl	49. 215	Kazen Schwanz	243
Hunds Knoblauch	220	Kaulpars	342
Hunds-Kraut	49	Kaysers Salat	83
Hunds-Zunge	109	Kellers-Hals	275. 292
Hyacinth	224	Kieselstein	29
		KirschenLaurierKirschen	288
<b>J</b> acobs Kraut	67	Stein Kirschen	ib.
Leiter	216	Vogel Kirschen	ib.
Iber-Baum	286	Kirwig	347
Ibisch	146	Klee ejusq; species	189 & seqq.
Igel. See Igel	331	Klette. Acker-Kletten	102
Igels-Knospen	243	Feld-Klette	101
Ignatius-Bohne	302	Große Klette	76
Ilece	375	Knabenkraut	238
Innen-Kraut	112	Knoblauch ejusque species	220 & seqq.
Indianisch Brod	261	Körffel. Kletten-Körffel	101
Erbsen	183	Nadel-Körffel	96
Feigen	280	Spanisch-Körffel	99
Indianische Hirse	246		
Johannis Kraut	205		

# Register.

Kochfisch	341	Leckriße	193. 195
Kohl/ ejusque species	161	Lein:baum	305
	& seqq.	Leindotter	167
Wilder Kohl	61	Lein:Kraut	212
Kohlbaum	262	Leopard:Gifft	129
Kohlen	13	Lerche/ gekammte Lerche	351
Stein:kohlen	13	Lienen	131
Kornflag	225	Lilien/ rothe Gold: Lilien	219
Krähenfuß	127	Graf: Lilien	229
Krammetsvogel	356	Linde/ Stein: Linde	292
Krampff: Fisch	344	Linse/ Schaaff: Linsen	315
Kraßbeer	301	Löwen: Fuß	69
Krausemünze	117	Löwen: Schwanz	238
Krebsblume	108. 109	Löwen: Tap	254
See: Krebs	331	Lorbeerbaum	282
Kreide	12	Lorbeer: Eiche	268
Kreßbeer	135	Lorbeer: Rosen	310
Kresse/ Türckische Kresse	167.	Lotus: Baum	281
	105	Lumme	350
Wilde Kresse	166. 170	Lungenkraut	60
Winter: Kresse	165	Lunge/ See: Lunge	327
Küchenschellen	133	Lychnis ejusque species	199 & seqq.
Kühblume	146		
Kühkraut	200	<b>M.</b>	
Kühweizen	156	<b>M</b> Macrel	337
Kühlbarsch	340	Macerbaum	306
Kümmel/ Hornkümmel	255	Mager: Fisch	339
Mohrkümmel	93	Macrell	337
Wilder Kümmel	91. 211.	Majoran/ Englisch Majoran	118
	255	ran	118
L.		Uechter	118
Lamm/ Tartarisch Lam	48	Winter: Majoran	118
Lämmer: Lattich	90	Malachit	34
Lamprete	332	Mango: baum	290
Läuse: Kraut	155	Manna: Graf	249
Lattich	57	Mannsharnisch	214
Laser: Kraut	155	Allermanns: Harnisch:	
Leber: blumen	208	Männlein	220
Distel	57		

# Register.

Manns-Tren	88	Mengelwurk	53
Dreyblätterichte	88	Mergel	10
Marck	10	Mergen-Rößlein	200. 201
Aschfarben	10	Merl	350
Fleischfärbicht	10	Merzen-blumen	223
Margen-Rößlein	200. 201	Meßpilen mit drey Steinen	278
Marien-Würmchen	325		
Marmor	30	Mexico-Saamen	51
Maßholder Baum	305	Meyer/ unechter	103
Maßweh	358	Kraut	ibid.
Maßichkraut	118	Weisser	ibid.
Maulbeer		Wilder	ibid.
Feigen	274	groß Stein-Meyer-	
Maul-Esel Farrenkraut	46	Kraut	103
Mäuse-Gerste	248	Meewe	350
Korn	248	See-Meewe	ibid.
Schwänzelein	130	Milch-Glöcklein	152. 153
Medick-Hen	197	Kraut	173. 109
Meel-Baum	293	Stein	11
Meelbeer-Baum	277	Wicke	193
Meer-Anthyllis.	190	Wurk	157. 194
Meer-Burzel	54	Mohn/gehörnter mit gelben	
Meer-Cob.	337	Blumen	171
Engel	343	Langköpffiger	171
Fichte	268	Stachlichter	172
Gewächs	54	Wilder	171
Gigel	349	Mohr-Kämmel	93
Graß	38	Molch/Wasser-Molch	364
Linßen	39	Moluckische Nüsse	308
Moos	40	Moly	221
Schley	341	Mondkraut	149
Schwein	345. 370	Mondveiel	150
Trauben	301	Moosbeeren	141
Melancholy-Dißel	71	Kelchmoos	44
Melanzan-Äpfel	138	Morcheln	43
Melilote-Italiänische	197	Motte	326
Melte stinckende	55	Mottenkraut	216
wilde	55	Mühlstein	29
Memphisstein	33	Münchskappen	146
		Münze!	

# Register.

Münze/ Acker Münze	124	wilde	240
Feldmünze	ibid.	schmalblättrichte	144
Krausmünze	117	schwarze	240
Pfeffermünze	115	Norwegische Brombeer	135
Wassermünze	116	Ruß/Bezoar/Ruß	308
Musa:baum	265	Erdnuß	97
Muschel	329	Moluckische	308
Mutterkraut	194	Spanische	225
Echt Spanisch Mutter-		Virginianische	283
Kraut	100	D.	
Mutterwurz	125	<b>S</b> chfen: Auge	78
Myrien:baum	307	Zunge/gelbe	106
N.		Stein:Schfenzunge	107
<b>N</b> abelkraut	207	Wall:Schfenzunge	106
Commer:Nabelkraut	214	Nelbaum	257
Nachtbeer	140	Nhnblat	239
Nachtigall	352	Nhrwurm	322
Nachtschatten		Drant	154
Baumichter	137	Orientalische Rheinblumen	66
Schlafmachender	140	Osterlucen	155
Tödtliche	139	P.	
Wald:Nachtschatten	139	<b>P</b> alm:baum	257
Nackete Gerste	245	Stein:Palme	262
Nackete Huren	226	Panax:Kraut	94
Nadel:Körffel	96	Pappelbaum Lybischer	272
Narcysen	223	Weiden weisse	272
Narrenkölben	243	Pappier:Ried	241
Natterwurz	235	Parnasser:Gras	208
Negelein ejusque species		Pastinack/	
198. 199 & seqq.		Wasser:Pastinack	98
Indianische	79	Perckisch	33. 44
Nessel:baum	281	Perrierbaum	289
Hecken:Nessel	120	Peterlein	101
Grosse taube Nessel	ibid.	Berg:Peterlein	101
See:Nessel	328	St. Peters Korn	245
Todte Nessel	120	Peters Schlüssel	213
Niedriger Andorn	121	Peterssilge/ Berg:Peterfilge	
Niesewurz/ breitblättrichte			93. 101
		Dd 4	Hecken:

# Register.

Hocken: Peterfilge	102	Rappen	340
Wilde Peterfilge	98	Raucke	165. 208
Pfau/ See: Pfau	341	Raupenkraut	192
Pfefferfisch	334	Raute/ Wiesen: Raute	91
Pfefferkraut	110	Wilde Raute	179
Pfeil: haupt	130	Ratte	373
Pfeil: kraut	131. 234	Regenbogenfisch	341
Pferde: Schwanz	45	Reiger/ schöner blauer	346
Weiblein	45	Stern: Reiger	346
Pflockwurzel	144	Reiner	366
Pfriemen: kraut	312	Reiniger	366
Phillyree	292	Rellmanß	373
Phosist	42	Renneschier	373
Pilze	42	Rennthier	ibid.
Pimpernuße/ Teutsche	303	Reiß/ Teutscher Reiß	245
Plantain: baum	265	Reisiger Frende	131
Plöße	336	Rheinblumen / gelbe	82
Poconien: weiblein mit weiß:		Selbe breitblättrige	66
sen Blumen	143	Orientalische	66
Poley/ Stein: Poley	121	Rheinfaren/ weisser	79
wilde grosse Poley	122	Reseda	208
Potatoes Spanische	151	Rettich/ Wasser: Rettich	166
Port: See: Salz	4	Rhodieserwurz	141
Portulac/ wilde	206	Ried	251
Probier: Stein	30	Gras	ibid.
Purgierende Distel	172	Roche	343
Flachs	212	Gift: Roche	343
Purpur: Gras	196	Stachel: Roche	ibid.
Wurz	196	Roddow	336
Q.		Rödelkraut	155
Qualster	324	Rohr/ Aromatisch Rohr	251
Quappe / See: Quappe	337	Bambus Rohr	252
Quendel/ Citronen: Quendel	112	Cyperisch Rohr	250
Garten: Quendel	112	Dommel	346
R.		Drachenblut: Rohr	252
Rab	340	Groß Rohr	250
Raden	200	Hähnlein	349
		Pfeil: Rohr	252
		Schreib: Rohr	250
		Röß:	



# Register.

Röflein/		Saltz: Bruben	3
Adonis-Röflein	129	See: Saltz	4
Anemonen-Röflein	132	Saalpflaster	28
Stein-Röflein	151	Saamkraut	54
Weiden-Röflein	172	Saamen / Canarien: Saa-	
Röthe / Kleine Röthe	104	men	246
Rosen-Lychuis	199	Sorgsaamen	ibid.
Wurz	141	Springsaamen: Kraut	
Ros / Meer-Ros	370		255
Wall-Ros	ibid.	Sammetblume	79
Rosmary / Poeten-Rosmary		Sanamunda	292, 293
	282	Sandstein	26
Ros Schwanz	45	Sardonier	32
Rothbart	338	Saturey	110
Rothbrüstlein	352	Feld-Saturey	111
Federn	336	Epizige	111
Fisch fliegend	338	Winter-Saturey	110
Rothe Gold-Lilien	219	Sau-Castanien	97
Rothkäfchen	352	Saugend Fisch	333
Rothblätterichte Mengel		Sau Todt	55
wurz	52	Schabe	326
Marmorstein	30	Schabenkraut	216
Rothscheer	335	Schaffinsen	315
Stein	207	Schafftheu	45
Rüben	163	Scharley	118
Sandische Rübe	163	Aethiopische Scharley	119
Rothe Rübe	254	Breitblätterigte wilde	
Schwarze Rübe	ibid.	Scharley	119
Wilde Rübe	162	Waldscharley	119
Rüster	305	Scharffe Winde	136
Ruttelweyh	358	Schartenkraut	75
		Schatten-Fisch	339
<b>S</b>		Scheide / Scheiden	333
Sadaney	110	Schieferstein	22
Segebaum	271	Schierling grosser breitblät-	
Sagoubaum	261	terichter	99
Saley	237	Wasser-Schierling	99
Saltz anff Saltz	16	Schiffhalter / Schiffhemmer	
von Neu-Castel	4		333
Pfannen	4		

# Register.

Schildbesem Kraut	168	Schwam	40. 42
Schläfer	344	Fälscht unechter	41
Schlaffmachender Nacht-		Gespreckelt unechter	41
schatten	140	Grosser Staub voller	42
Schlange / Indianische		Harter unechter	40
Haupt Schlange	359	Hirsch Schwam	43
Schlangen Knoblauch	220	Röhrichter unechter	41
Schlangenkraut	235	Schwarze Riesewurk	143
See Schlange	333	Schwarzschwanz	340
Schleiffstein	30	Schweinkresse	170
Schlingbaum	293	Schwertel	225
Schlottblumen	133	Großblätterichter	228
Schlüsselblumen	213	Kied	243
St. Peters Schlüssel	213	Schwindelwurk	65
Schmalblättrich Bocksdor-		Scorpionskraut	192. 312
sten	114	Scorpsisch	342
Moly	144	See Alkraup	337
Riesewurk	221	Ball	229
Schmelkblau	22	Brachsenmen	359
Schmeerwurk	153	Drache	ibid.
Schnecke bräunlichte	330	Gras	38
Grosse rothe	320	Grün	253
Schwarze	321	Hase	327
Schnee Tröpflein	158	Liberkraut	39
Schnepff	347	See Lunge	327
Holz Schnepff	347	Pfau	341
Schnepff Huhn	347	Pferd	370
Schnepfflein	353	Quappe	337
Schnittlauch	220	Kopf	334
Schloßwurk	227	Schwein	370
Schotendorn	314	Sternkraut	65
Wilde Schoten	311	Wege Gras	206
Schreib Rohr	250	Senecblättr falsche	315
Schuppenwurk	239	Senff Arabischer	167
Schwaden Gras	249	Grosser Bauren Senff	169
Schwalbe / Indianische		Seiffenbeeren	287
Wasser Schwalbe	352	Seps	363
Mauer Schwalbe	ibid.	Sesamoide3 Kraut	62
Rhein Schwalbe	ibid.	Sewen:	

# Register.

Seibenbaum	271	Staar	357
Siegwurz	220	Stachas Blumen	82
Sommerrurzel	238	Stärke. Blaue Stärke	22
Sonchenkraut	61	Stachlichte Leckrixe	193
Groß Sonchenkraut	59	Stachel Schwein	371
Sonnenblume	76	Standel Beer	281
Günsel	204	Standicht Gamanderlein	114
Wendt	108. 109	Nachtschatten	137
Wirbel	58	Stechdorn schwarzer	294
Wurzel	238	Deutscher	294
Spanische Standelbeer	281	Eiche	ib.
Körffel	99	Stechende Winde	136
Ruf	225	Steck Rüben	163
Pfriemen	311	Steinbeeren	135
Begebreit	180	Brech des Dioscor.	113
Spargen/ Dorn Spargen	140	Matthioli	201
Wilder Spargen	ibid.	Englische	56
Stein Spargen	ibid.	Bock	365
Speck Maus	375	Büchsen	273
Spehrkraut	127	Günsel	180
Wurz	128	Klee	197
Spelt	245	Kohlen	31
Spiel Speltzen	199	Linde	292
Sperberbaum	277. 278	Marck	10
Spehr Distel	84	Stein Ochsen Zunge	107
Kleine Spehrdistel	86	Palme	267
Spitzige	85	Phrygischer stein	23
Spicanarde	89	Polcy	121
Spiel Spelten	199	Rößlein	292
Spießkraut	234	Spargen	140
Spinne	321	Sandstein	26
Spinnenkraut	229	Sterustein	31
Spiræa	304	Stralstein	31
Spiren	352	Thracischer stein	13
Spitzichte Satiren	111	Stendelwurz	227
Sprehe	352	Männlein	237
Springsaamenkraut	255	Königlich Stendelwurz	238
Stabwurz	82	Stern	

# Register.

Stern aus Bethlehem	224	Wiesen Zeitlosen	226
Distel	73	Trag-Doffen	113
Stern Sucker	339	Tragan	83
Kraut. See: stern: kraut	65	Triller	164
Sternstein	31	Türckiß	34
Stieglis	353	Türckische Bohnen	182
Stockfisch	335	Kresse	167
Storchschnabel ejusq; spe-		Tulipe Gelber	223
cies 210, 211		Swalch	248
Stralstein	31	<b>B.</b>	
Strauchichte Hirschwurzel	102	Beiel. Mondweiel	149
Streich kraut	154	Beilstert	343
Streubel wurk	239	Venus Kamm	96
Studenten Blume	79	Strahl	96
Syrisch Mastichkraut	118	Viehbesinge	141
Zucker Wurzel	97	Viel Fuß	321, 322
<b>L.</b>		Violen. Abend: Violen	149
Zaback	148	Weisse Winter: Violen	149
Zaubenkraut	51	Virginianisch Potatoes	138
Zaube	120	Unecht Bockskraut	109
Zaube Nessel	120	Unechte Eschwurk	122
Zaucher	349	Johannis kraut	205
Langschnäblichter	16	Unechter Meyer	103
Taxus Baum	271	Unholdenkraut	310
Thale	354	Ulmbaum	305
Thapsier	94	Vogelbeer Baum	276
Thaubeer	201	Vogel Fuß	191
Theriack's Wurm: saamen	166	Vogel: kirschen	288
Thole	354	Kraut	207
Thracischer stein	13	Milch	224
Thunin	336	Pfote	191
Thurm Semff	162	Roßen stert	249
Tieger. Tieger: Thier	373	<b>B.</b>	
Thymian ejusq; species	III, 112	Wacholder Baum	270
Tödliche Nachtschatten	139	Wachs: Adern	29
		Wald Hirse	156
		Holder	298
		Nachtschatten	139
		Räges	

# Register.

Nägelein	157	Glas-Weiden	273
Rebe	131	Weidereich Köpflein	173
Auffrechte Wald-Rebe	132	Weißdorn	277
Breit-blätterichte Wald-Rebe	131	Weisser Enzian	102
Wall Ochsen-Zunge	107	Weisse Feld-Zwiebel	224
Stroh weiß	103	Weiß Ballstroh	103
Wurz	180	Wiederstoß	200
Warmstein	28	Winter Viole	149
Wasser Andorn	117	Weizen Spelt	245
Brunnen Wasser	3	Weller/Wells	333
Brunnen-Wasser Andorn	121	Welsche Linsen	315
Eppich	98	Welscher Respel-Baum	278
Fenchel	100	Wespe	322
Fluß-Wasser	3	Weyrauch's Wurz	95
Händleins Wurz	238	Wetzstein	30
Hahnen Fuß	127	Wheiting's	335
Huhn	347. 348	Wicken. Gelbe Wicken	184
Kolben	243	Yeckrisen Wicken	195
Krähen-Fuß	127	Rothe Wicken	184
Linsen	253	Vogel Wicken	188
Münze	116	Wilde Wicken	185
Pastinack	98	Widwol	357
Regen Wasser	5	Wiederstoß Weisser	200
Rettich	166	Wiesel. Wieselchen	374
Schierling	99	Wiesen Raute	91
Schne-Wasser	5	Saffran	226
See-Grün	253	Zeitlosen	226
Wegebreit	180	Wilde Basilien	121
Grosse Wegebreit	206	Landische Rüben	163
Spanische	180	Wilder Demuth	112
Wegedistel	73	Rohl	162
Wegerich	180	Wilde Richern	195
Weiden-Baum roth	272	Kresse	170
Weidendorn	294	Ruh-Weizen	156
Gelbe Weiden	273	Wild Laub	222
Glänkende Weiden	ib.	Merrettich	164
		Wilder Meyer	103
		Mohn	171
		Portulac.	206

Wilde

ESP

Register.

Wilde Rancke	165	Wurm; Saamen	Fransch	81
Scharley	119			
Wild Sperberbaum	277	Grüner		82
Thymian	112	Theriacks	Wurmsaamen	166
Wilde Bicken	185			
Zieser Erbsen	195			
Winde scharffe oder stehende	136	<b>U</b> ucca	2. 233	
	110			
Winter Isop	165	<b>Z</b> ahn kraut	239	
Kresse	108	Stocher kraut	Spanisch.	99
Majoran	119			
Salbey	110	Zeitlosen		226
Saturey	149	Ziemer		356
Violen	220	Zimmet Baum		316
Zwiebeln	135	Zieser Erbsen		195
Wolcken Beeren	42	Zitterling		344
Wolffs Fuß	129	Zitter Pappeln		272
Wolffsklaffen	174 & seqq.	Zittwer		234
Wolffs Milch ejusq; species	129	Zungen Blat		275
	215	Zucker Möhrlein		97
Wollschwurz	ib.	Rüblein		ib.
Wollkraut schwärzlicht	73	Peruvianische		151
Mit weissen Blumen	189	Zucker Wurzel	Indianische	77
Wollichte Distel	66			
Wundkraut		Syrische		97
GroßGuldenWundkraut		Zwey Blat		240

G R D E.

