

大德重校聖濟總錄卷第五

十七

心腹門

心腹痛

心腹卒脹痛

腹痛

腹虛脹

久腹脹

腹脹腸鳴切痛

腹內結強

臏脹

鼓脹

脇肋痛

脇痛煩滿

息積

心腹痛

論曰藏府氣虛風寒客之邪正相薄故上衝於心絡而為心痛下攻於腹膜而為腹痛上下攻擊則心腹疼痛其或陰氣凝結久而不散內攻腸胃則變為寒中脹滿泄利之證

治心腹徹痛諸虛冷氣脹滿黃耆湯方

黃耆剉壹兩

當歸切兩

人參

甘草炙剉各壹兩

乾薑炮貳兩

芍藥

厚朴去麤皮生薑汁炙

半夏湯洗去滑

桂去麤皮各壹兩半

蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分
去滓溫服冷氣多者加附子一枚炮裂去皮臍
治心腹冷痛獨活湯方

獨活去蘆
頭

人參

白茯苓去黑
皮

吳茱萸水浸壹
宿炒

甘草炙

乾薑炮

陳橘皮湯浸去
白焙

黃耆剉

桂皮去麤

芍藥

芎藭

防風去叉各
壹兩

當歸切焙
貳兩

右一十三味麤搗篩每服水二盞用羊肉二兩先煮
至一盞去肉下藥末三錢匕生薑一分切棗二枚擘

破煎至七分去滓溫服日三

治心腹刺痛五辛湯方

蜀椒去目及閉口
者炒出汗

乾薑炮

細辛去苗

桂去麤
皮

熟乾地黄焙

芍藥

防風去
叉

苦參

甘草炙

當歸切

吳茱萸水浸一宿
炒各壹兩

梔子去
皮

烏梅去核各
貳枚

右一十三味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘

破煎至七分去滓溫服日二

治暴冷心腹痛頭面冷汗出霍亂吐下脉沉細及傷寒

冷毒下清水及赤白帶下當歸湯方

當歸切 人參 乾薑炮

白茯苓去黑皮 厚朴去蘆皮生 木香

桂去蘆皮 桔梗炒 芍藥

甘草炙 剉合

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服日三

治心腹痛食冷物即發及吐惡水桔梗散方

桔梗炒 麥門冬去心 白茯苓去黑皮

相榔煨剉各 枳殼去瓢 人參

厚朴去蘆皮生 芍藥 陳橘皮湯浸去白

桂去蘆皮 右一十味擣羅爲散空心煎薑棗湯調下二錢匕加

至三錢匕

治心腹冷痛丁香湯方

丁香半兩 甘草炙 桂去蘆皮

乾薑炮各 厚朴去蘆皮生 赤芍藥剉各

人參 白朮各 剉青

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞酒半盞同煎至

八分去滓空心溫服良久再服

治心腹卒痛厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩

吳茱萸水浸壹分炒乾壹兩

半

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治心腹疼痛每發時連臍腹刺痛多吐涎沫桑白皮散

方

桑根白皮

酸石榴皮

蕪荑

各半兩

厚朴

青兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟

生薑

壹分

檳榔末貳錢

右六味搗篩為麤散水二大盞煎至一盞去滓下檳

榔末攪令勻稍熱分為三服

又方

佳心壹兩

乾薑

壹兩炮裂剉

右二味搗篩為細散每服一錢匕溫酒調下不計時

候

治心虛寒心中脹滿悲憂不樂或夢山丘平澤半夏補

心湯方

半夏

陸兩

宿薑

伍兩

茯苓

桂心

橘皮

各參兩

白朮

兩

防風

遠志各二兩

枳實參兩

右九味剉如麻豆拌勻每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫服不拘時候

治一切心腹痛不可忍沉麝丸方

沉香剉

麝香研

沒藥研

丹砂研

血竭研各壹兩

木香半兩

右六味搗研爲末銀石器燉生甘草膏丸皂莢子大生薑鹽湯嚥下一丸端午日午時合

治心腹冷氣痛調中丸方

乾薑炮半兩

人參

白茯苓去黑皮

甘草炙剉

白朮各伍兩

右五味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心溫漿湯下

治冷氣攻衝心腹疔痛短氣汗出芎藭散方

芎藭

莎草根炒

青橘皮去白焙

蓬莪茂炒各壹兩

烏藥貳兩

右五味搗羅爲散溫酒調下二錢匕甚者三錢匕更飲五合煖酒得吐差未退更服只三服止

治腹中虛寒心腹切痛補血小建中湯方

桂去麤皮參分

甘草炙半兩

白芍藥壹兩半

右三味咬咀如麻豆每臘五錢匕水二盞入生薑一分切碎大棗四枚擘破同煎至一盞去滓更入膠飴半兩許再煎令膠飴化溫服甚者日三服此藥偏能治腹中虛寒補血尤止腹痛常人見其藥性溫平未必用然腹痛按之便痛重按却不甚痛者此止是氣痛重按愈痛而堅者當有積也氣痛不可下下之愈痛此虛寒證也尤宜服此藥外臺治虛勞腹中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥婦人小腹痛亦用此張仲景傷寒論陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與此不差者小芫胡湯主之此二藥皆主腹痛

治卒心腹痛桂朴散方

桂去麤皮

厚朴去麤皮生薑汁炙各半分

吳茱萸

湯洗焙乾醋炒半兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下

心腹卒脹痛

論曰胃爲水穀之海足陽明之脉也陽明之脉絡屬心
心胃不和寒氣乘之則氣聚於胃中令水穀不化胃滿
連心故心腹卒脹痛也

治心腹卒痛如刺兩脇脹滿高良薑湯方

高良薑貳兩

當歸切

桂去麤皮各壹兩半

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治心腹卒脹痛吐痰不止半夏湯方

半夏湯洗去滑焙 甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙

桂去麤皮

人參

白朮各壹兩

大腹皮并子兩枚微煨

右七味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞半入生薑

三片煎至七分去滓空心溫服日再

治冷熱相擊心腹卒痛不可忍當歸湯方

當歸切

高良薑

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

半

桃人

陸拾粒去皮尖雙人數炒別

桂去麤皮壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服日三

治心腹卒疔痛如刺胸脇脹滿厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙

當歸切

桂去麤皮

高良薑

芎藭各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治心腹受冷卒脹滿短氣疔痛吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾炒 乾薑炮

附子炮裂去皮臍各壹兩

枳實湯浸去細辛去苗

人參各半兩

右六味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服一

十丸溫酒下不拘時候

治心腹卒脹痛胸脇支滿欲死枳實散方

枳實去麩炒 桂去麩皮各壹兩

右二味搗羅為細散每服二錢匕米飲調下

治心腹卒脹痛桂心丸方

桂去麩皮貳兩 烏頭炮裂去皮臍壹兩

右二味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五

丸米飲下漸增至七丸

治心腹卒脹痛桃白皮湯方

桃白皮剉壹兩

右一味以水三盞煎取一盞去滓頓服根皮亦佳

治心腹氣滯卒脹滿悶此胡湯方

芫胡去苗貳兩半 赤茯苓去黑皮 陳橘皮去白焙

厚朴去麩皮塗生薑汁炙香熟壹兩半 紫蘇莖葉

檳榔各參兩剉 生薑去皮薄切焙乾伍兩

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服如人行五里再服利動即効

治心腹卒脹痛槓榔湯方

檳榔

剉碎拾枚

生薑

去皮薄切焙乾

陳橘皮

湯浸去白焙

枳殼

去麩炒

甘草

炙到各參兩

大黃

剉炒

木香

各貳兩

右七味麝搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服微利即効

治心腹卒脹痛膈氣噎塞宿食不消大便秘澁神保丸

方

木香

胡椒

各壹分

巴豆

拾枚去皮心研

乾蠍

柒枚炒

右四味搗研爲末湯化蒸餅丸如麻子大丹砂爲衣

每服三九心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎

湯下血氣痛炒生薑醋小便下小便不通燈心湯下

血痢藏毒楮葉湯下肺氣甚者白礬蚌粉各三分鉛

丹一分同研爲散煎桑根白皮糯米飲調下二錢腎

氣脇下痛懷香子酒下大便不通蜜湯調槓榔末一

錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲下

腹痛

論曰藏府內虛寒氣客之與正氣相擊故令痛也又有

冷積不散乍間乍甚爲久腹痛者若重遇於寒則致腸鳴下利蓋腹爲至陰之所居又爲陰邪客搏故也

治腹痛疴刺除寒冷溫脾人參湯方

人參

附子炮裂去皮臍

甘草炙各兩

乾薑炮裂

大黃剉碎醋炒

當歸切焙各兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞

去滓溫服日三

治冷氣腹痛引腰背脇下痛當歸湯方

當歸切焙

桂去麤皮各兩半

乾薑炮裂參分

吳茱萸湯浸焙乾炒貳兩半

大黃剉碎醋炒

人參各半兩

甘草炙

芍藥剉炒各兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時日二

治卒寒腹痛拘急芎藭湯方

芎藭

當歸切焙

甘草炙

黃芩去黑心

芍藥剉炒各兩

乾薑炮裂

桂去麤皮各半兩

杏仁去皮尖雙仁炒參拾枚

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心日午臨卧溫服

治氣攻心脇或冷結腹痛不下飲食高良薑湯方

高良薑

當歸切焙

厚朴去麩皮生薑汁炙令燥出

各貳兩

桔梗炒

陳橘皮去白

吳茱萸

湯浸焙乾炒各壹兩半

桃人去皮尖雙入麩炒香拾枚

訶梨勒微煨去核伍枚

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生薑一棗大

拍破同煎取一盞去滓溫服日三

治腹中冷痛人參丸方

人參

桂去麩皮

茯神去木

黃耆剉

木香炒

牡蠣燒研如粉

遠志去心炒

甘草炙剉各半兩

右八味搗羅爲末棗肉丸如小豆大每服二十九黍

門冬湯下加至三十九

治積冷在心腹腹痛短氣胸背痛脇下有冷氣不能食

如錐刀刺或如蟲食鍼灸不差狀如鬼神往來赤石脂

丸方

赤石脂

乾薑炮裂

附子炮裂去皮臍

烏頭炮裂去皮臍

人參

桂去麩皮

細辛去苗葉各壹兩

真珠研細半兩

右八味搗研羅爲細末鍊蜜丸如小豆大每服七丸

米飲下加至十九日再

治寒冷腹痛四物加黃耆芍藥湯方

黃耆剉

桂去麤皮

乾薑炮

芍藥剉炒各壹兩

甘草炙

當歸切焙各壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心日午臨臥各一

治寒冷腹痛吳茱萸湯方

吳茱萸水浸一宿暴乾 人參

桂去麤皮

半夏湯洗去滑

當歸切焙各壹兩

小麥壹合

甘草炙

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍破同煎取八分去滓溫服空心晚食前各一

治寒中腹痛四物當歸湯方

當歸切焙壹兩

桂去麤皮

甘草炙

乾薑炮裂各壹兩半

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服空心日午臨臥各一

治久冷腹痛不止安息香丸方

安息香研

補骨脂炒各壹兩

阿魏研貳錢

右三味搗研羅爲細末醋研飯爲丸如小豆大每服十九空心粥飲下

腹虛脹

論曰胃氣脹則令人腹滿不能食此蓋脾胃虛弱冷氣搏於陰經故胃脹滿塞而不能飲食其氣虛者但虛脹而膨滿於腹肋也

治脾胃不和中寒虛脹人參湯方

人參

白茯苓去黑皮

肉豆蔻去殼

檳榔

剉

木香各壹分

白朮

訶梨勒皮

半生半炮

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

蓬莪茂

剉

京三稜

煨剉各壹兩

右一吋味麤擣篩每服二錢匕水一盞生薑三片木

瓜一片同煎至八分去滓熱服

治心胸滿悶氣滯腹虛脹大腹湯方

大腹子

肆枚剉

檳榔貳枚剉

陳橘皮湯浸去白焙

前胡去蘆頭

桔梗剉

半夏湯洗棗編切焙

枳殼

去瓢麩炒各壹錢

赤茯苓去黑皮壹兩

右八味麤擣篩每服二盞匕水一盞入生薑三片煎

至六分去滓溫服不拘時候

治腹虛脹分導滯氣分氣散方

仙人枯骨

壹兩

檳榔大者壹枚剉

防已

白豆蔻

各壹分

皂子

雄者貳佰柒拾枚炮萊菔子炒

青橘皮湯浸去白焙各半兩

麝香研半

牽牛子尾上炒焦令作聲為度壹兩

右九味搗研為細散每服一盞匕煎大腹皮湯調下

不拘時候

和脾胃治虛脹化久滯進飲食木香三稜散方

木香壹兩

京三稜煨剉肆兩

甘草炙剉參錢

青橘皮湯浸去白焙壹兩

山芋

白茯苓去黑皮各半兩

右六味搗羅為細散每服一錢匕入鹽如茶點不拘

時候

治大瀉後虛氣心腹脹滿不香丸方

木香壹兩

歐椴炒肆拾玖枚

胡椒貳佰粒

青橘皮湯浸去白焙 陳橘皮湯浸去白焙各半兩

萊菔子微炒 草豆蔻各壹分

右七味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服七

丸煎橘皮湯下空心食前

治心腹虛脹兩脇疼痛不欲飲食厚朴三稜丸方

厚朴

去麤皮為末生薑汁拌和銀器內炒乾陸兩

京三稜炮剉

半夏

湯洗米編槓榔剉各去滑炒乾

右四味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二

十九 空心食前生薑湯下

治中焦冷氣腹脹飲食不消吳茱萸丸方

吳茱萸

湯浸去滑焙乾桂去麤皮各壹兩

檳榔剉半兩

陳橘皮

湯浸去白焙參分

右四味搗羅為細末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服

十五丸生薑湯下不拘時候

治心腹虛脹四聖丸方

乾蠟

去土炒壹兩

胡椒

木香

青橘皮

湯浸去白焙各壹分

右四味搗羅為細末研飯和丸如茱萸大薑橘湯或

溫酒下五七丸不拘時候

久腹脹

論曰久腹脹者冷氣結於腹內與藏氣相搏積久而不散也蓋腹為至陰之所居脾胃為倉廩之官今寒氣在內與藏氣相搏停積不散故為久脹脾胃既虛則難以腐熟水穀故脹久不已則令人變飲濕之疾治久腹脹滿悶丁香丸方

丁香

朱香

各壹分

白木

甘草

炙剉

厚朴

去麤皮生薑汁炙

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸去白焙

陳麴

炒

麥蘖

炒

草撥

犬黃炒各半兩

右一十一味搗羅為細末鍊蜜丸如彈子大每服一

丸食前細嚼米飲下

治久腹脹煩悶食不消厚朴丸方

厚朴去蘼皮塗生薑汁炙熟

丁香皮

桑根白皮剉炒 白朮

桔梗炒

沉香剉 人參

檳榔剉各壹兩

右八味搗羅為細末麩糊丸如梧桐子大每服三十

丸空心橘皮湯下

治久腹脹寒氣結搏不得散陳橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

防已半兩

赤茯苓去土 檳榔剉

木通各參分剉

紫蘇莖葉壹兩 木香半兩

大腹皮壹兩

右八味瀝搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎煎至六分去滓不拘時溫服

治久腹脹氣痛不散桃人丸方

桃人湯去皮尖雙人麩炒研

當歸焙

芍藥赤 訶梨勒煨用

桂去蘼皮

蓬莪茂剉 檳榔剉各壹兩

青橘皮湯浸去白焙貳兩

右八味搗羅為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不拘時候溫酒下二十九

治久腹脹氣滯腸胃結澀橘皮丸方

陳橘皮湯使去白焙 青橘皮湯浸去白焙 乾薑炮

大黃炒 京三稜炮 厚朴去麩皮塗生薑汁火

牽牛子壹半炒壹半生各半兩

右七味搗羅為細末醋煮麩糊丸如梧桐子大食後

生薑湯下十五丸加至二十九

治久腹脹胸背痛檳榔湯方

檳榔剉 枳殼去瓤炒 桔梗炒

白朮 赤芍藥 丹參各壹兩

右六味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至七分去滓不拘時候溫服

治久腹脹無力不思食不香丸方

木香 陳橘皮湯浸去白焙 白朮各半兩

檳榔剉壹兩 萊菔子微炒貳兩

右五味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大不拘時候

以生薑湯嚼下二十九

腹脹腸鳴切痛

論曰腹者至陰之所居寒氣所傷則陽衰陰盛於是有

腹脹腸鳴切痛之病此蓋脾弱胃虛氣脹滿痞冷氣加之與正氣交爭故也不已則變下利之證

治腹脹腸鳴切痛發作有時白朮湯方

白朮

赤茯苓去黑皮

當歸切焙

桂去麩

桔梗去蘆頭

陳橘皮湯浸去白焙

吳茱萸湯洗焙乾炒

人參各壹兩

甘草炙剉分

細辛去苗葉

厚朴去麩皮生薑汁炙貳兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

棗一枚去核煎至七分去滓溫服不拘時候

治腹脹腸鳴切痛不入食草豆蔻湯方

草豆蔻去皮

木香

桂去麩皮

芎藭

赤芍藥

白朮

檳榔剉

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

當歸參分剉炒

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去

滓溫服空腹食前

治風冷內積腹脹腸鳴疔痛當歸湯方

當歸切焙

白朮

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白焙

人參各壹兩

青橘皮湯浸去白焙

甘草炙剉各半兩

右七味蠶疇篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓溫服不拘時候

治脾虛腹脹腸鳴切痛食少無力高良薑湯方

高良薑半兩 人參分 草豆蔻去

陳橘皮湯浸去 訶梨勒煨去核 丁香兩

厚朴去 薑皮生薑 桂去 參分

甘草炙

右九味蠶疇篩每服三錢匕水一盞棗二枚去核煎

至七分去滓不拘時溫服

治腹脹腸鳴不欲飲食丹參湯方

丹參剉 桔梗去 食茱萸炒

細辛去 白茯苓去 厚朴去 汁炙

右六味蠶疇篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓不拘時溫服

治腹脹雷鳴胸背痛桔梗湯方

桔梗去 丹參切 白木

枳殼去 芍藥 檳榔剉

右六味蠶疇篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎全

七分去滓溫服日三

治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿附子粳米湯方

附子炮裂去皮 半夏湯洗去滑切焙 甘草炙剉各壹兩

右三味剉如麻豆每服三錢七水一盞半生薑三片

棗二枚去核粳米一撮同煎米熟去滓溫服日三

腹內結強

論曰血氣溫則流通寒則凝結腹內結強者風冷邪氣積於腹中也凝結而不散與正氣相擊上下流走或按之有根狀如覆杯食寒則腹中鞭滿妨害飲食留滯經久則變結瘕

治寒氣結強腹內疼痛檳榔丸方

檳榔剉 芍藥赤者 桂去粗皮

乾漆炒煙出 京三稜炮剉各壹兩 蓬莪茂炮剉各壹兩

右六味搗羅爲末醋煮麩糊丸如雞頭大丹砂爲衣每服一丸生萊菔一塊同嚼溫熟水下不拘時候

治脾胃氣不和累有傷滯腹內結強食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸膈脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各壹兩

吳茱萸湯洗焙乾 礞石礞石成霜剉

巴豆霜抄半錢匕

右六味搗羅四味爲末與礞石巴豆霜同拌勻醋煮麩糊爲丸如菟豆大每服十九加至十五丸早晚食

後臨臥服大便溇利即減丸數

治寒氣結強日久不消丁香皮煮散方

丁香皮

京三稜炮

檳榔剉

白术

薑黃

陳橘皮湯浸去白

當歸切

甘草炙剉各半

右八味搗羅為散每服二錢匕水一盞生薑一棗大

切煎至七分夫滓溫服日三夜一

治冷氣不散腹內結強堅鞭疼痛白术散方

白术

厚朴去蘊皮生人參

吳茱萸湯洗焙

白茯苓去黑皮

麥蘖炒

陳麴炒

芎藭各參兩

右八味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下日三

治腹內結強攻衝腹痛不香丸方

木香

丁香各壹分

肉豆蔻去殼

補骨脂炒

華澄茄

桂去麩皮

益智去皮各壹兩

青橘皮湯浸去白

京三稜剉

蓬莪茂剉各貳兩

葫蘆巴炒

檳榔剉

礞砂別剉各半兩

右一十三味除礞砂外搗羅為末入礞砂和勻稀麩

糊和丸棗豆大每服二十九至三十九溫酒下不拘

時侯

治冷氣不散腹內結強青橘煮散方

青橘皮湯浸去白焙 益智炒去皮

烏頭炮裂去皮臍

檳榔生 威靈仙去土

蓬莪茂炮

桂去麤皮各壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕水一盞入生薑三片

同煎至七分溫服日三

治冷氣積聚腹內結強日久攻築腹內疼痛丁香丸方

丁香 青橘皮湯浸去白焙 縮沙人

桂皮去麤 木香各半兩 檳榔參枚剉

硝砂別研

右七味搗羅為末醋煮麪糊和丸如菘豆大每服二

十九至三十九食後生薑湯下

治腹內結強不可按抑飲食不化平胃丸方

杏人去雙人皮尖 丹參兩

苦參 葶藶子隔紙炒 玄參各貳兩

芎藭 桂去麤皮

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七丸

日三以知為度

臙脹

論曰內經謂濁氣在上則生臃脹此陰陽反作病之逆從也夫清陽為天濁陰為地二者不可相干今濁氣在上為陰氣干擾清陽之氣鬱而不散所以臃塞腸滿而常若飽也

治陰盛生寒腹滿臃脹吳茱萸湯方

吳茱萸

湯浸焙炒

厚朴

去蘊皮生薑汁炙

桂

去蘊皮

乾薑

炮兩

白朮

陳橘皮

湯浸去白焙

人參

各壹兩

蜀椒

去目并閉口者炒出汗半兩

右八味剉如麻豆每服四錢匕以水一盞半入生薑

三片煎至七分去滓溫服日三

治虛冷氣滿臃脹不能飲食雖食不消嘔逆虛滿腹內雷鳴下氣桔梗丸方

桔梗

剉炒壹兩

吳茱萸

湯浸焙乾炒

白朮

各壹兩

桂

去蘊皮參分

人參

白茯苓

去黑皮

厚朴

去蘊皮生薑汁炙

陳橘皮

湯浸去白焙

枳殼

去黑皮炒

乾薑

炮

甘草

炙剉各壹兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

溫酒下二十九加至三十九

治腹冷臃脹及虛氣不能食茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

人參

白木 厚朴去麤皮生薑汁炙 五味子

黃耆各壹兩 桂去麤皮

右八味剉如麻豆每服五錢匕水二盞入薑三片煎

至一盞去滓溫服日三

治虛冷臍脹及嘔逆醋心翻胃不能食面色萎黃人參

湯方

人參 白茯苓去黑皮 白朮各壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙 陳橘皮湯浸去白焙

桂去麤皮 半夏湯洗柒編去

甘草炙

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑五片

煎至七分去滓空心溫服日再

治臍腹不能食背上冷汗出白朮湯方

白朮 人參各貳兩 厚朴去麤皮生薑汁炙

陳橘皮湯浸去白焙 桂去麤皮

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎

至六分去滓溫服日二不拘時

治虛冷臍脹或反胃兩脇妨滿食不化厚朴湯方

厚朴去麤皮薑汁炙 檳榔枚 肉豆蔻去殼

吳茱萸湯浸 陳橘皮湯浸 白朮兩

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎取八分去滓空腹溫服良久再服

鼓脹

論曰內經謂有病心腹滿且食則不能暮食名為鼓脹夫水穀入口則胃實腸虛食下則腸實胃虛若乃飲食不節寒溫失宜胃滿氣逆聚而不散大腸無以傳道故心腹逆滿氣鼓而脹也且食不能暮食則以至陰居中五陽不布水穀化遲而然也

治鼓脹且食不能暮食雞屎醴方

雞屎乾者

一匙半入生薑正八

右一味為末每用醇酒調一錢匕食後臨臥服一匙治鼓脹堅塊此胡湯方

芫胡去苗

籠甲去裙爛醃炙剉

郁李人湯浸去皮尖搗碎

芍藥

大黃剉炒各壹兩半

桃人貳拾壹枚湯浸去皮尖雙

妙人

訶梨勒皮壹兩半桂去麤皮壹兩

右八味除郁李人外剉如麻豆再同和勻每服四錢匕水一盞半煎至七分去滓入朴消少許空腹溫服如人行四五里再服

治鼓脹牡丹湯方

牡丹皮壹兩半

桃人湯浸去皮尖雙

檳榔 剉

桑根白皮 剉各籠甲 剉壹兩 貳錢

大黃 壹兩 剉

厚朴 薑汁炙 去麩皮 生郁李人皮 尖湯浸去

枳殼 去瓢 薑炒 各壹兩 半

右九味 剉如麻豆 每服五錢 匕水一盞 半入生薑 半

分切 煎至八分 去滓 空腹溫服 如人行四五里 再服

治腸胃冷氣 鼓脹 不能食 白朮湯方

白朮 壹兩 半

木香

陳橘皮 湯浸去白 焙各壹兩

芍藥 壹兩 半

桑根白皮 剉

木通 剉各壹兩

牽牛子 壹兩 半 搗取 粉壹兩 旋入

右七味 除牽牛粉 外剉如麻豆 每服五錢 匕水一盞

半煎至八分 去滓 入牽牛粉 半錢 穴腹溫服

治鼓脹 四肢羸瘦 喘息促 食飲漸減 小便澀 少妨悶海

蛤丸方

海蛤 研貳

木香 壹兩 壹分

桂 去麩皮 半兩

防己

訶梨勒皮

厚朴 汁炙各壹兩

檳榔 壹兩 半 剉

旋復花 兩

籠甲 去穢 兩壹分

郁李人 湯浸去皮 尖研貳兩

右一十味 搗研為末 鍊蜜和丸 如梧桐子大 每服十

五丸 至二十九 濃煎木通湯 下空腹食前服

治癥瘕 腹脹滿 鞭如石 腹上青脉 浮起 紫葛粉丸方

紫葛粉兩貳

赤芍藥

桔梗剉炒各壹兩半

紫苑去土兩

木香

訶梨勒皮各壹兩半

郁李人湯浸去皮尖半兩研

犬黃剉貳兩

牽牛子壹兩搗取粉半兩

右九味搗研為末，鍊蜜和丸，如梧桐子大，每服二十

丸，用木通大棗濃煎湯下，丸少以意加減。

治鼓脹桔梗湯方

桔梗剉炒貳兩

防葵半兩

犬黃剉炒壹兩半

桃人湯浸去皮尖雙人肆拾玖枚炒

右四味剉如麻豆，每服三錢匕，水一盞，煎至六分去

滓，入芒消末半錢，七空腹溫服，如人行五六里再服。

日三

治鼓脹不食茯苓湯方

赤茯苓去黑皮

木通剉各貳兩

芍藥壹兩半

吳茱萸湯洗焙乾炒 郁李人湯浸去皮尖各壹兩

檳榔參枝剉

紫苑去苗土壹兩

右七味剉如麻豆，每服五錢匕，水一盞，半煎至八分。

去滓，空腹溫服，日二。

脇肋痛

論曰：脇肋痛者，足厥陰經虛寒氣乘之也。足厥陰肝經

其支脉起足大指叢毛上循入貫膈布脇肋寒邪之氣乘虛則傷於經脉邪氣與正氣相搏故令脇肋痛也

治脇下偏痛發熱脉弦此寒也當以溫藥下寒大黃附

子湯方

人黃

剉碎醋炒兩半

附子

炮裂去皮脂參枝

細辛

去苗葉兩

右三味剉如麻豆每服三錢七水一盞半煎至七分

去滓溫服如人行四五里再服

治脇肋痛腹冷或食冷物不消或塊聚不轉心肋脹悶

刺痛霍亂桂心丸方

桂皮

去麤

訶梨勒

煨去核

厚朴

去麤皮生薑汁炙各壹兩

已上三味細剉掘地作坑子用炭火燒赤吹去灰以

醖醋一茶盞并藥投於坑子中急以瓦椀熱蓋土培

勿令漏氣待冷即取之入後藥

乾薑

炮

草豆蔻

皮

陳橘皮

湯浸去白焙

木香

各壹兩

阿魏

研壹分

檳榔

煨剉半兩

郁李人

湯浸去尖炒半兩

三

三

朴消

兩

右一十一味取前三味與後八味同搗羅為末鍊蜜

和丸如小豆大每服溫酒下二十九初服急行三二

百步又服二十九掣兩脚各二三十下貼膝便坐氣

即散也

治寒氣入客胸脇引痛當歸湯方

當歸切

枳殼去穢炒

赤芍藥炒

檳榔剉

木香

桔梗炒

附子炮裂去皮臍

白朮各壹兩

訶梨勒剉用皮壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入生薑半

分切煎至七分去滓溫服不拘時候

治腹滿脇肋痛不可忍備急四神丸方

桂皮去麤

附子炮裂去皮臍

乾薑炮裂各壹兩

巴豆辟拾粒去心膜炒出油盡

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服三丸溫

水下不動更加三丸當下惡物黃綠水一二升以溫

漿水止之三五日即差

治脇肋疝痛上攻心胸檳榔丸方

檳榔剉

桂皮去麤

當歸剉

赤芍藥

桃人湯浸去皮尖雙人越炒

枳殼炒

訶梨勒剉

桑葉剉

青橘皮湯浸去白

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸溫酒下不拘時候

治胸脇氣不利腹脹急痛半夏湯方

半夏壹兩半湯洗去滑知

桂皮壹兩

檳榔

剉各壹兩

右三味廬搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎煎至六分去滓溫服不拘時候

治冷氣內攻脇肋疼痛不入飲食葶澄茄湯方服二十

葶澄茄

剉

厚朴

去蘊皮生

桂皮

去蘊

桔梗

炒

當歸

剉

赤芍藥

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去

草豆蔻

皮

訶梨勒

煨去核

檳榔

剉

白木

各壹兩

右一十二味廬搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑

半分切大棗二枚擘破煎取七分去滓稍熱服不拘

時候

治脇胸氣妨悶疼痛茱萸丸方

茱萸

湯浸米編

麝香

研各壹兩

當歸

切焙半兩

右三味將二味搗羅為末入麝香同研勻鍊蜜和丸

如小豆大每服二十九丸熱酒下不拘時

脇痛煩滿

論曰手少陽為三焦之脉主通行三氣往窮必反以下

為順者也其脉起於小指次指之端上循俠益布膻中

散絡心包若其經脉虛風冷乘之迫於心絡則心氣內

鬱不得調達或上攻於胸或下引於脇是為脇痛煩滿

治脇痛煩滿上攻心胸不利木香湯方

木香壹兩

檳榔剉貳兩

芍藥兩半

厚朴去薑皮生薑汁炙

桂去蟲皮

羌活去塵頭

京三稜剉

獨活去塵頭

芎藭

大黃剉

乾薑炮

人參切各壹兩

附子炮裂去皮臍半兩 陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右一十四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七

分去滓溫服空心日午夜臥各一

治氣滯不勻脇痛煩滿不思飲食葦澄茄丸方

葦澄茄炒

藿香葉

懷香子炒

人參

檳榔剉各壹兩

丁香

木香各半兩

甘草炙

蓬莪茂煨各壹兩

右九味搗羅爲末入麝香一錢匕研細鍊蜜丸如雞頭大每服一九細嚼橘皮生薑湯下空心食前

治腹脇痛脹滿煩躁不思飲食烏藥湯方

烏藥剉

藿香葉

檀香剉

丁香皮各壹兩

木香半兩

葦澄茄炒參分

檳榔伍枚

桂去蟲皮半兩

甘草炙剉壹兩

右九味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治一切冷心腹脇痛煩滿不消木香丸方

木香壹分

京三稜煨剉各壹兩

芫花醋炒半兩

檳榔剉

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

乾薑炮

桂去麤皮各半兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右八味搗羅爲細末煮棗肉丸如梧桐子大每服十

五丸生薑湯下日三

治腹脇痛積滯不消煩滿痞悶不思食白木丸方

白朮

檳榔剉

薑黃炒剉壹兩

沉香剉

京三稜煨剉各壹分

大腹剉壹兩

莎草根去

丁香皮各壹分

木香

丁香

桂去麤皮各半兩

右十一味搗羅爲細末酒浸炊餅丸如梧桐子大

每服二十九溫酒下嚼破溫水下亦可

治脇腹痛脹滿上下攻衝煩悶木香湯方

木香壹分

楮梗去麤頭炒

人參

白茯苓去黑皮

枳殼去瓢麤炒各壹兩

桂去麤皮

甘草炙剉

檳榔剉各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片棗

一枚去核煎至七分去滓溫服

息積

論曰內經謂病脇下滿氣逆二三歲不已病名曰息積夫消息者陰陽之更事也今氣聚脇下息而不消積而不散故滿逆而為病然氣不在胃故不妨於食特害於氣而已其法不可多刺宜為導引服藥藥不能獨治者蓋導引能行積氣藥力亦藉導引而行故也

治息積脇下氣逆妨悶喘息不便呼吸引痛沉香丸方

沉香剉

桂去麝皮

檳榔煨剉各貳兩

人參

青橘皮湯浸去白焙

訶梨勒皮

白木

京三稜煨剉

木香各參分

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸橘皮湯下漸加至三十九日二服

治息積脇下氣逆妨悶歲久不已桔梗丸方

桔梗剉炒

枳實炒

籠甲去泥關醋炙

人參

當歸焙切

白木

乾薑炮各兩

桂去麝皮

吳茱萸湯洗焙乾炒

甘草炙各兩分

大麥蘖炒壹兩半

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二

十丸溫酒下日再服漸加至三十丸

治息積脇下氣逆滿悶妨脹赤茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮壹兩半大腹剉半兩

高良薑壹兩

吳茱萸

湯洗參偏焙乾炒參分

訶梨勒

煨去核

陳橘皮

湯浸去白焙各壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空腹溫服日晚再服

治息積腸下妨悶喘息氣逆白朮丸方

白朮

枳實炒

桂去麤皮各壹兩半

人參

貳兩

陳橘皮

湯浸去白焙

桔梗

剉炒

甘草

炙各壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九溫酒下不拘時候日二服

治息積腸下氣逆滿悶檳榔湯方

檳榔

剉

訶梨勒

煨去核各貳兩

吳茱萸 陳者淘染偏焙乾炒

半

陳橘皮

湯浸去白焙參兩

右四味麤搗羅每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空腹日二服

治息積腸下氣逆滿悶陳橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙乾

吳茱萸

陳者水淘染偏炒乾各壹兩半

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入鹽少許煎至七分不計時候去滓溫服

大德重校聖濟總錄卷第五十七

大德重校聖濟總錄卷第五十八

消渴門

消渴

消渴煩躁

消渴口舌乾燥

消渴腹脹

消渴後虛乏

消渴小便白濁

三消統論

論曰消瘴者膏粱之疾也肥美之過積爲脾瘴瘴病旣成乃爲消中皆單陽無陰邪熱偏勝故也養生之士全真鍊氣濟其水火底於適平若乃以慾竭其精以耗散其真所受乎天一者旣已微矣復飲肥甘或醉醇醴貪餌金石以補益引溫熱以自救使熱氣熏蒸虛陽暴悍腎水燥涸無以上潤於心肺故內外消鑠飲食不能滋榮原其本則一推其標有三一曰消渴以渴而不利引飲過甚言之二曰消中以不渴而利熱氣內消言之三曰腎消以渴而復利腎燥不能制約言之此久不愈能

為水腫癰疽之病慎此者服藥之外當以絕嗜慾薄滋味為本

消渴

論曰消渴者渴而引飲乃復澍少是也得之五石之氣內燥津液腎氣不化故渴甚而澍少也久不治則經絡壅澁留於肌肉變為癰疽

治三消渴疾消石散方

消石

茜根

鉛霜各壹兩

右三味搗羅為散每服一錢匕冷水調下

治三消渴疾桃紅散方

赤石脂

石膏各

栝樓根剉

白石脂

鉛丹各壹兩

甘草炙半兩

右六味搗羅為散冷水調下二錢匕

治三消渴疾鉛黃丸方

鉛丹

黃連去須各半兩

乾葛粉

栝樓根各壹分

右四味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大冷水下二十九

治消渴香墨散方

墨壹兩

栝樓根參兩

鉛丹半兩

右三味搗羅為散拌勻第一服藥末二錢匕新水

盡調下次日一服水調藥末一錢匕不計時候服藥
時不得忌水任意飲二兩盡後自然怕水服三五日
見効

治消渴飲水無度沃焦散方

泥鱸魚

壹拾頭陰乾去頭
尾燒灰碾細爲末

乾荷葉

碾細
爲末

右二味末等分每服各二錢匕新汲水調下遇渴時

服日三候不思水卽止

治消渴日飲水數斛不止葛根丸方

葛根

剉

栝樓根

剉

附子

炮裂去
皮臍

鉛丹

炒令紫研
各壹兩

右四味先將三味搗羅爲散入鉛丹同研令勻鍊蜜
和丸如梧桐子大每服二十丸煎茅根湯下日三服

治消渴飲水無休菝葜飲方

菝葜

剉

湯瓶內各壹兩

烏梅貳兩并核
推碎焙乾

右三味麤搗篩每服二錢匕水一盞於石器中煎至

七分去滓稍熱細呷

治消渴飲水不休神應散方

滑石

研

寒水石

研各
半兩

右二味碎研爲散用生雞子一枚搗破去黃留清調
和藥末合如稠膏却納在雞殼內以紙封口用鹽泥

固濟暴乾炭火內燒令通赤放冷去土并殼取藥研令絕細為度每服大人二錢七小兒半錢匕米飲調下

治消渴銀寶丸方

水銀

豐兩用鉛栝樓根半

苦參

牡蠣

煨為粉

知母

煨

蜜陀僧

多壹兩

鉛丹

兩半

右七味搗羅為末若陽人患用未曾生長雌豬肚一枚若陰人患用雄豬肚一枚貯藥在內以線縫合用索子十字繫在一新磚上令徒轉又別用栝樓根

半斤細切入在水中一處同煮自平旦煮至午時取出候冷細切肚子及藥同搗為膏丸如梧桐子大陰

乾每服五丸溫水下

治消渴殊勝散方

烏賊魚骨

去甲

海浮石

煨

楮梗

剉

葛根

丹砂

研水

虎杖

燒過各壹分

右六味搗羅為散渴時煎麥門冬湯調下二錢七空心日午夜臥各一服

治消渴飲水不止栝樓根丸方

栝樓根

剉

黃連

去

知母

煨

麥門冬去心各

右四味搗羅為末，鍊蜜為丸，如梧桐子大，每服三十

丸，米飲下。

治消渴飲水，日夜不止，生津丸方。

青蛤粉 白滑石各壹

右三味研為細末，用黃蘗魚涎和為丸，如梧桐子大，

每服三十丸，煎陳粟米飲下，不拘時候。

治消渴累年不愈者，莎草根散方。

莎草根去毛壹兩 白茯苓去黑皮半兩

右二味搗羅為散，每服三錢匕，陳粟米飲調下，不計

時候。

治消渴減食，飲水不休，楮葉丸方。

乾楮葉炒 桑根白皮剉炒 人參

白茯苓去黑皮 定粉各壹兩

右五味為細末，取楮汁和丸，如梧桐子大，每服二十

丸，煎人參湯下，不計時候。

治消渴疾久不愈，楮葉散方。

蝸牛焙乾半兩 蛤粉 龍膽去土

桑根白皮剉炒各壹分

右四味搗羅為散，每服一錢匕，煎楮葉湯調下，不拘

時候

治渴疾澄水飲方

銀湯餅內蟻

水萍焙乾

葛根剉

右三味各等分麤搗篩每服五錢匕水一盞半同煎

至一盞去滓溫服

治消渴支骨飲方

豬脊骨伍寸

棗貳拾枚

甘草微炙

乾薑炮各半分

右四味咬咀以水三升同煎至一升發時量意加熱

水服

治消渴竹龍散方

五靈脂

黑豆生去麩各半兩

右二味搗羅為散每服二錢匕煎冬瓜湯調下無冬

瓜卽用冬瓜苗葉子煎湯俱可一日二服小可渴只

一服差渴定後不可服熟藥唯宜服八味丸仍更宜

用五味子代附子

治消渴後八味丸方

熟乾地黄焙導兩

桂去麩皮

牡丹皮

山芋

白茯苓去黑皮

山茱萸各壹兩

澤瀉

五味子各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸薄鹽湯下

治消渴金英丸方

鈴丹

麥門冬焙心

牡蠣煨研如粉

知母焙各壹兩

黃連去須

栝樓根

苦參各貳兩

金薄片壹佰

銀薄片壹佰

生栝樓根貳兩研如膏

日二服小和飲只

右一十味搗羅為末用生栝樓根和為丸如梧桐子大每服四十九食後米飲下日再夜一當日渴止十日已來漸覺減即一日兩服服三十五丸一月外每

日一服服三十九夏月即用蜜為丸服藥之次腹中忽冷痛即取厚朴二兩去麤皮薑汁炙陳橘皮三分去白焙生薑二兩切以水二升煎取半升去滓分溫二服服訖良久以飯壓之如腹中不痛即止
治消渴及諸渴不止冬瓜飲方

大冬瓜壹枚

黃連去須半斤

右二味先搗黃連為末將冬瓜三停中截去一停取二停淨去瓢子內黃連末於冬瓜中却取截下一頭蓋却捺白麩厚裹冬瓜令徧即更以黃土鞭泥裹一重候微乾坐瓜在灰火中四面簇炭火燒令泥赤即

止候冷打去泥土并剥去麩搗開瓜頭裏面有黃連汁不限多少瀘過每服一盞渴即飲之立差未差更

作一服

治因好食熱麩炙肉及服補治壅熱藥并乳石三焦氣隔心肺乾熱口乾舌焦飲水無度小便日夜不知計數心欲狂亂服此救急止渴栝樓飲方

栝樓膏枝黃熟者去皮用瓢并子

冬瓜壹枚中樣者剖破頭邊內

栝樓子內

右二味用黃土泥裹冬瓜令勻可半指厚候乾簇炭火燒令泥通赤即止去泥取瓜就熱碎切爛研布絞

取汁約七八合更入白蜜兩匙頭攪令調勻候稍冷即分三度服藏府熱歇即不思水自無小便如不是栝樓熟時節即獨燒冬瓜服之

治消渴疾人參煎方

人參壹兩

葛根劉氏兩

右二味搗羅為末每發時須得燻豬湯一升已來入藥末三錢匕又入蜜二兩都一處於鑊子內慢火熬之至三合已來似稠黑錫便取出於新瓷器內每夜飯後取一匙頭含化嚙津重者不過三服

治肖葛口乾煩躁飲水無度鉛霜丸方

鈴霜半兩

青黛

栝樓根末各壹兩

龍腦少許

右四味細研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸微嚼煎竹葉湯下新汲水下亦得食後日三

治積年消渴好食冷物竹葉湯方

青竹葉剉碎

白茯苓去黑皮

地骨皮剉

栝樓根各壹兩

桂去麤皮

甘草剉各半兩

麥門冬去心焙

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入小麥一撮

煎至八分去滓食後溫服日二

治消渴膈熱煩躁生津液梅蘇丸方

白梅肉各半兩

紫蘇葉各半兩

烏梅肉各半兩

人參壹分

麥門冬去心參分

百藥煎兩

消渴甘草炙剉壹兩半

訶梨勒炮去核壹分

右八味搗羅爲末鍊黃蠟汁拌和爲丸如雞頭實大

每服一丸含化嚙津不計時候路行解渴

治消渴不止下元虛損牛膝丸方

牛膝酒浸切

生地黃汁升伍

右二味先細搗羅牛膝爲末入地黃汁浸夜浸晝暴

復浸汁盡爲度鍊蜜丸如梧桐子大空心溫酒下三

十九丸服壯筋骨駐顏黑髮

治消渴不止鉛黃散方

鉛壹斤

水銀貳兩

先將鉛旋投入水銀候面上有花暈並便以鐵匙

掠取於鉛內研細

皂莢壹挺

不艸者塗酥炙令黃去皮子入麝香壹錢同研爲末

右三味爲散每抄皂莢末一錢匕以水一中盞煎至六分去滓放溫食後調下鉛黃散半錢匕服之

治消渴方

冬瓜壹枚

削去皮

右一味埋在濕地中一月將出破開取清汁飲之喻

二三料遂愈

治渴疾飲水不止甘露散方

乾豬胞十枚剪破出却氣去却繫著處用乾盆子一

隻燒胞煙盡取出研令極細每服一錢七溫酒調下

不拘時候

治消渴飲水不止薑魚丸方

乾生薑末兩

壹兩

右一味用鯽魚膽汁和丸如梧桐子大每服七丸米

飲下不拘時候

治消渴飲水不止水骨丸方

湯瓶內水燉壹

兩

右一味研為細末燒粟米飯和丸如梧桐子大每服十五丸人參湯下不拘時候

治消渴發作有時心脾有熱飲水無度人參湯方

人參

桑根白皮剉炒各

麥門冬去心

知母

枇杷葉拭去

黃連去須

葛根剉

白茯苓去黑皮

地骨皮

淡竹根各壹兩

右一十味細剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎

取八分去滓溫服

治消渴飲水過多心腹脹滿桑白皮湯方

桑根白皮剉炒

人參

黃耆剉炒

草豆蔻去皮各壹兩

枳殼去瓤炒

骨木香

芍藥

半夏湯洗去滑

檳榔剉各半兩

桂去麤皮參分

枇杷葉拭去毛蜜炙半兩

右一十一味蠶搗篩每服五錢匕用水一盞半入生

薑五片煎取八分去滓溫服

治久渴旬日見効腫脰散方

雞臙脰黃皮

雞腸各伍具炙乾

鹿角膠炙

白龍骨

白石脂

漏蘆去蘆頭炙各壹兩

土瓜根兩

黃連去須

苦參

牡蠣粉各貳兩半 桑螵蛸各參兩

右一十一味為散每服一錢匕至二錢匕米飲調下

日三夜一

治消渴飲水過多麥門冬丸方

麥門冬去心焙 栝樓根 大麻人研

大黃蒸貳度切炒 苦參粉 鐵粉各參兩

雞膽胫黃皮一枚炙柴 黃芩去黑心

澤瀉各壹兩半 龍齒研 土瓜根

知母焙 石膏研各貳兩 銀薄貳佰片和謔

右一十四味擣研為末鍊蜜丸如梧桐子大每食後

煎生地黃湯下二十五丸日二服

治消渴黃連牛乳丸方

黃連去須壹斤為末 麥門冬去心貳兩 牛乳

地黃汁 葛汁並壹合

右五味合研衆手丸如梧桐子大每服二十九空心

粥飲下日再漸加至四十九

治消渴小便數少虛極羸瘦黃耆丸方

黃耆剉 鹿茸去毛酥炙 牡蠣假壹後時

土瓜根 黃連去須 白茯苓去黑皮

人參壹兩半

右七味搗羅爲末研令細鍊蜜爲丸如梧桐子大每服三十九丸用何首烏湯下

治消渴飲水不止麥門冬丸方

麥門冬去心

升麻

黃連須去

黃蘗去心

黃芩去黑心

生乾地黄焙

人參合

栝樓根柴

苦參剉

右九味搗羅爲末以牛乳和衆手丸如梧桐子大每服三十九丸食前米飲下

治消渴飲水不輟多至數斛竹葉湯方

甘竹葉切

大麻人炒

赤林米各壹升淘淨

鹿脚肆隻湯浸去皮毛骨細研肉

白茯苓去黑皮壹兩

薤白貳兩切

右六味剉如麻豆分作八服每服先以水三盞煎麻人竹葉取二盞去滓澄清入諸藥鹿脚又煎去滓取

一盞微微飲之渴止爲度

治消渴小便數少菝菹飲方

菝菹

土瓜根各貳兩半

黃耆剉

地骨皮

五味子各貳兩

人參

牡蠣熬粉各壹兩半

石膏碎肆兩

右八味搗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

淨空腹溫服

治消渴及小便無度鉛丹散方

鉛丹

白石脂研

赤石脂研

胡粉各半兩

石膏碎

甘草如手搗大者生

澤瀉各壹兩

栝樓根貳兩

右八味搗研爲散每服三錢匕新汲水調下日三更

量虛實加減若渴甚夜二服勿用酒一劑可救數人

鉛丹久服腸痛則宜減之小兒每服一五錢匕亦瘳

酒渴

治消渴初因酒得人參湯方

人參

甘草半生半炙各壹兩

右二味麤搗篩以搏豬水去滓澄清取五升同煎至

二升半去滓渴即飲之永差

治消渴黃連丸方

黃連去須壹兩

苦參斤壹

麝香壹錢

右三味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服六十九

空腹茶下日再任意喫茶不限多少

止渴備急方

右以大豆芽嫩者三五莖塗酥炙令黃熟搗羅爲散

每服二錢匕煎人參湯調下

消渴煩躁

論曰消渴煩躁者陽氣不藏津液內燥故令煩渴而引飲且躁也內經謂諸躁狂越皆屬於火蓋以心腎氣衰水火不相濟故也

治消渴熱盛煩躁恍惚麥門冬飲方

生麥門冬銚心甘竹溼合

小麥貳

知母壹兩

蘆根貳

生地黃兩

右六味剉如麻豆每用半兩水三盞煎至二盞去滓入竹瀝少許分二服食後

治消渴心脾中熱煩躁不止下焦虛冷小便多羸瘦蘆

根湯方

蘆根壹斤

黃耆剉

栝樓根

牡蠣煨各

知母兩

生麥門冬去心陸兩

右六味咬咀每服三錢匕水一盞煎取七分去滓食

後乘湯細服

治煩渴不止咽乾躁熱昏悶翠碧丸方

青黛研

麥門冬去心焙

葛根剉各

半夏湯洗去滑痰

人參

知母焙各

栝樓根分

天南星牛膽置

寒水石火煨

右九味搗研爲末麪糊和丸如梧桐子大金薄爲衣
每服十五丸人參竹葉湯下食後臨卧服

治消渴心脾實躁熱多渴化爲小便知母飲方

知母焙切

生蘆根各參兩

土瓜根貳兩

黃芩去黑心

甘草炙各壹兩半

龍齒參兩

大黃貳兩半

右七味咬咀每五錢匕水三盞煎取二盞去滓下生
麥門冬汁二合食後分溫三服

治消渴及心藏躁熱飲水無度桑白皮湯方

桑根白皮剉

人參

知母焙切

麥門冬焙去心

枇杷葉刷去毛

黃連去須剉炒

葛根剉

地骨皮去土

淡竹根洗去土暴乾剉各半兩

兩

右九味麪搗篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食前服日再服

治消渴心中煩躁黃耆湯方

黃耆剉

白茅根剉

麥門冬去心剉

白茯苓去黑皮各參兩

石膏剉

車前子去土伍兩生

甘草貳兩半

右七味麪搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

空腹溫服

治消渴煩躁心藏熱引飲茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

麥門冬

去心炒兩各肆

石膏

伍兩去土

茅根

剉壹升

右四味麤搗篩每服五錢匕水二盞入冬瓜一片同煎至一盞去滓溫服不拘時候日四五服

治消渴發熱心神煩躁引飲麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

黃耆

剉

雷連

須去

桑根白皮

剉各兩

石膏

兩

知母

焙剉各半

栝樓根

各參

人參

剉

甘草

炙

葛根

剉

赤茯苓

去黑皮

地骨皮

壹兩去心

升麻

各半

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生薑半

分切淡竹葉二七片煎至二分去滓不計時候溫服

治消渴上焦虛熱心中煩躁此胡飲方

此胡

去

葛根

剉

蘆根

剉

地骨皮

剉

百合

剉

桑根白皮

剉

知母

切

麥麩

各參

貝母

去心炒

茅根

剉

犀角

鎊

甘草

剉

木通

剉

木

一盞入

生薑

黃

木通

剉

犀角

鎊

甘草

剉

木通

剉

木

一盞入

生薑

黃

石一十三味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生地黃
半分同煎至七分去滓食後溫服日三

治消渴煩躁驚悸不安天門冬煎方日三

生天門冬去心白蜜任 桑根白皮

右二味先以水五盞煎天門冬至三盞新汲水淘四

五過漉出別以熟水一盞下蜜攪勻瓷餅貯浸大門

冬五日密封每食後食一兩

治丹石發關節毒氣不宜心肺躁熱渴不進飲水旋作

小便久即為癰疽發背茅根飲方

白茅根剉壹兩半 桑根白皮剉 麥門冬去心壹兩半

白茯苓去黑皮 露蜂房炙黑色

右五味搗篩如黍米粒大每服四錢匕水一盞半入

竹葉十餘片細剉棗二枚擘同煎至八分去滓食後

服二匙

治消渴胸膈煩悶躁渴飲水無度人參飲方

人參壹兩 白茯苓去黑皮 甘草炙各半兩

麥門冬去心 白三

右四味咬咀如麻豆大以水五盞煎取二盞去滓溫

頓服之

治消渴口乾煩躁飲水無度鉛白霜丸方

鉛白霜兩半青黛兩枯樓根末壹

龍腦壹

右四味細研勻鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九煎竹葉湯嚼下食後日三

治消渴煩熱白礬丸方白礬壹斤竹葉半

白礬燒令盡鉛白霜各壹斤人參壹斤

右二味細研令勻鍊蜜和丸如雞頭大綿裹含化嚥

津葉下心裏二葉華國煎生人伏去食

治消渴煩熱心中在亂葛根汁方葛根壹斤水壹斗

生葛根皮伍斤細切木杵臼中爛搗如泥淨布換取汁壹斗

白蜜兩

右二味同攪勻不限早晚渴即飲一盞量力飲之頻服亦不損人

治消渴心胸煩躁黃連丸方

黃連壹斤

桔樓根

甘草壹斤

梔子人壹兩半香豉炒黃貳兩半

右五味搗羅為末鍊蜜和劑更於鐵臼內塗酥杵勻

熟丸如梧桐子大午食後溫漿水下三十九

消渴口舌乾燥

論曰脾主口心主舌消渴口舌乾燥者邪熱積於心脾

津液枯耗不能上湊故也其證飲食無味善渴而口苦

治法當滌去心脾積熱使藏真濡於脾則愈

治消渴口乾脣焦心脾藏熱唯欲飲水茯苓湯方

白茯苓去黑皮

麥門冬去心焙石膏伍兩

茅根剉壹升

右四味蠶搗篩每服四錢匕水一盞半入冬瓜一片

同煎至七分去滓溫服不拘時

治消渴口舌乾燥四肢痠疼日晡頰赤煩悶升麻丸方

升麻

黃連須去

龍膽酒洗

黃芩去黑心剉

犀角鎊

姜蕤

知母焙各壹分

前胡去薑

鼈甲醋炙去裙

朴消研壹分

右十味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸不拘時溫漿水下

治消渴脣乾舌燥枸杞湯方

枸杞根剉貳兩

石膏碎壹兩

小麥壹兩

右三味蠶搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治消渴口舌乾燥麥門冬丸方

麥門冬去心焙

生乾地黄焙

升麻

黃芩去心

黃連去心

黃蘗去皮

人參

栝樓實

苦參各二兩

右九味搗羅爲末以牛乳和衆手丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸米飲下

治消渴口乾舌燥酸棗人丸方

酸棗人升壹

醋石榴子

暴乾葛根到參伍合

烏梅

伍拾枚去核炒

麥門冬

去心焙

白茯苓

去黑皮各參兩

覆盆子

去莖貳兩

桂

去麤皮壹兩

栝樓根

參兩

石蜜

別研肆兩

右一十味丸味搗羅爲末與石蜜和令勻更入鍊蜜

和丸如酸棗大每服一丸不拘時含化嚥津

治消渴口乾舌燥地黃煎方

生地黃

細切參斤

生薑

細切參斤

生麥門冬

去心貳斤

右三味一處於石臼內搗爛生布絞取自然汁用銀石器盛慢火熬稀稠得所以瓷合貯每服一匙用溫

湯化下不拘時

治消渴口乾喜飲水小便數心煩悶健忘怔忡麥門冬

丸方

麥門冬

去心倍

土瓜根

剉

山茱萸

鹿茸

酒浸炙去毛

牛膝

去苗

狗脊

碎剉去毛

茯神去木

人參各壹兩

黃連須去

菟絲子

酒浸一宿暴乾別搗為末各壹兩半

龍骨燒

牡蠣

煨各

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九不拘時煮小麥飲下加至三十九

治消渴口乾日夜飲水無度渾身壯熱冬瓜飲方

冬瓜

壹枚重參斤去皮瓢分作拾貳片

麥門冬去心

黃連

去須壹兩半

右三味以二味麤搗篩作十二服每服水三盞入冬

瓜一片擘碎同煎至一盞去滓溫服日三夜二

治消渴飲水不止小便中如脂舌乾躁渴喜飲栝樓丸方

栝樓根

伍兩

黃連

去須壹兩

浮萍草

貳兩

右三味搗羅為末用生地黃汁半盞於石臼內木杵

搗令勻再入麩糊丸如梧桐子大每服三十九食後

臨卧牛乳湯下日三煎苜蓿湯下亦得

治消渴膈熱咽乾止煩渴生津液烏梅湯方

烏梅肉

炒貳兩

茜根

劉壹兩

黃芩

去黑心壹分

葛根

剉

人參

白茯苓

去黑皮

甘草

各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓不拘時溫服

治消渴口舌乾燥地黃煎丸方

生地黃

取汁

生栝樓根

取汁

羊脂

碎切

白蜜

壹斤

黃連

去須壹斤別搗為末

右五味先取地黃汁等四味入銀石器內慢火煎令

脂消熟傾出將黃連末同搗令得所衆手丸如梧桐

子大每服二十九粟米飲下日三五服

治消渴日夜飲水不止小便利地骨皮飲方

地骨皮

玉瓜根

栝樓根

薦根

剉各體

麥門冬

去心

棗

柴枚

右六味剉如麻豆每服四錢匕水一盞煎取八分去

滓溫服不拘時

治消渴口舌焦乾精神恍惚栝樓根湯方

栝樓根

切

黃連

去須

石膏

碎各

枸杞葉

切半斤

甘草

炙

黃連

去須

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治消渴口乾小便數茅根湯方

茅根

剉

蘆根

剉

菝葜

剉各

石膏碎壹兩半

烏梅去核炒

淡竹根剉壹兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎取一盞去滓溫服不拘時

治消渴腎藏虛損腰脚無力口舌乾燥磁石湯方去滓

磁石壹兩半搗如麻粒大先以水淘去赤汁候乾分為伍貼每貼用綿裹入藥內煎

黃耆剉

地骨皮剉

生乾地黄焙

五味子

桂去粗皮

枳殼去穢炒

檳榔剉各半兩

右八味七味麤搗篩分為五貼每貼先用水三盞與磁石一貼同煎至一盞半去滓分三服外

治消渴舌乾引飲麥門冬湯方

生麥門冬去心壹兩半

栝樓根參兩

茅根水浸

竹筴各伍兩

小麥剉

烏梅去核

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治消渴舌乾體瘦方

枸杞根白皮

小麥剉

生麥門冬去心各壹升

右三味以水一斗煮取五升去滓湯即飲之

治口中乾燥無津液而渴豬膽煎方

雄豬膽伍枚

定粉壹兩

右二味以酒煮膽候皮爛卽入粉研細同煎成煎丸如雞頭大每服二丸含化嚥津

消渴腹脹

論曰脾土制水通調水道下輸於膀胱消渴飲水過度內潰脾土土不制水故胃脹則爲腹滿之疾也內經謂水爲陰腹者至陰之所居是以水飲之尋先見於腹滿治消渴飲水不止小便復澀心腹連膀胱脹悶胸膈煩熱檳榔湯方

檳榔剉

桑根白皮剉

赤茯苓去黑皮

紫蘇莖葉剉

木通剉

麥門冬去心焙各壹兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生薑半分切蔥白七寸煎至六分去滓不計時候溫服人主事半治久患消渴小便數服止小便藥多渴猶不止小便復澀兩肋連膀胱脹悶急妨心胸煩熱赤茯苓丸方

赤茯苓去黑皮

桑根白皮剉

防已

麥門冬去心焙

壹兩半

木香剉

去白粉

郁李人

湯浸去皮焙

各壹兩研

右六味先搗前五味細羅爲末與郁李人研令勻鍊蜜和爲劑更於鐵臼內酥杵令勻熟丸如梧桐子大

每日空腹煎木通棗湯下三十九至晚再服漸加至

五十九

治消渴飲水過多心腹脹滿不能食人參湯方

人參壹兩 桑根白皮剉半兩 陳橘皮壹兩湯浸去白焙

半夏湯洗柒遍去滑半兩 黃耆剉分兩 木香

赤芍藥 草豆蔻去毛炙 桂去權式

檳榔剉 枇杷葉各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半

分煎至六分去滓不計時候溫服蓋人參湯下

治消渴腹脇虛脹心下滿悶旋復花湯方

旋復花淨擇去莖葉微炒 桑根白皮剉各壹兩

紫蘇并嫩莖乾者又各半兩 犀角鎔各半兩 赤茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白微炒 白朮黃耆

右六味麤搗篩每七錢匕水三盞入棗二枚擘生薑

半分拍破鹽豉半匙同煎至一盞半去滓分溫三服

每食後一服如人行十五里已來更一服

治消渴飲水過多心腹脹滿或脇肋間痛腰腿沉重人

參湯方

人參 芍藥各壹兩 大腹子兩枚慢炙

葛根剉 赤茯苓去黑皮 黃芩去黑皮

桑根白皮

知母兩半

麥糵壹分

枳殼

大腹干

火丙

石一十味 廔擣篩每服三錢匕 水一盞入生薑如棗

大拍破煎至七分去滓空心温服食後夜臥再服

治消渴飲水過多心腹脹滿木香湯方一跟

半木香 枳殼

木芍藥 枳殼

人參 桑根白皮

黃耆

草豆蔻 桂

枇杷葉

蒲葶 桑根白皮

右一十一味 廔擣篩每服四錢匕 水一盞半入生薑

如棗大拍破同煎至八分去滓食前服日三

治消渴喉乾不可忍飲水不止腹滿急脹麥門冬湯方

麥門冬 烏梅

右二味 廔擣篩每服三錢匕 水一盞煎至半盞去滓

食後温服日三

消渴後虛乏

論曰久病消渴之人榮衛不足筋骨羸劣肌膚瘦瘁故

病雖差而氣血未復乃為虛乏又有緣少服乳石而消

渴者病後津液虛竭經絡否澀亦令虛乏須防癰疽之

變救治之法所不可忽

治消渴後四肢羸弱氣虛之地黃生薑煎丸方

生薑汁升壹 生地黄汁升伍 蜜貳斤綿

生麥門冬汁升參 牛脛骨內髓升壹 茯神木去

甘草炙 石斛根去 黃連去須各肆兩

栝樓根伍兩 五味子微炒 知母焙 丹參各貳兩

人參 當歸切焙

肉苁蓉酒浸切焙參兩除前五味外 茯苓拾壹 枳實拾壹 枳殼拾壹 枳實拾壹 枳殼拾壹

地骨皮升貳 胡麻人貳升 萎蕤兩伍

生竹根升參

右二十味先以水一斛五升煮地骨皮等四味至水

四升絞去滓下麥門冬地黃汁再煎五六沸却下蜜

髓薑汁再煎至七升為膏稀稠得所入前件藥末和

為丸如梧桐子大不拘時候竹葉湯下三十九

治虛熱小便利而多服石散人虛熱當風取冷患脚氣

發動兼消渴後虛乏腎脉細弱阿膠湯方

阿膠貳兩 乾薑貳兩 麻子壹升

遠志兩肆 附子壹枚

右五味除阿膠搗篩薑散以水七升煮取二升半去

滓內膠令烱分三服說云小便利多白日夜數拾行

頻服良

治虛熱四肢羸之湯熱不止消渴補虛茯神煮散方

茯神

肉苳蓉去鱗切細酒浸參
日取出焙乾秤

萹藜各肆
兩

生石斛去
苗

黃連須去

栝樓根

丹參各壹
兩

甘草炙

五味子

知母

人參

當歸切焙各
參分

大麥蘗炒柴
合半

右一十三味麻摺篩每服五錢七水一盞半煎至一

盞去滓食前溫服

治消渴後氣乏體羸腿脛細瘦苳蓉丸方

肉苳蓉酒浸
切焙

黃耆剉

牛膝去苗焙
切酒

車前子

萹藜

白茯苓去黑
皮

地骨皮

黃連須去

檳榔煨各壹
兩半

山芋

菟絲子酒浸
別搗

蒺藜子炒去
角

人參

白芍藥各壹兩
別搗

桑螵蛸炒各
壹兩

枳殼去瓢
炒參分

生乾地黄焙
兩

右一十八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服空

心粟米飲下三十九

治消渴後虛乏鍾乳丸方

鍊成鍾乳粉 續斷

藥師黃

石韋去毛各壹兩

杜仲去蠶皮剉炒

天雄炮裂去皮半兩

山茱萸

蛇牀子各壹兩

遠志心去

肉蓯蓉酒浸切焙壹兩參分

防風又去

山芋

石斛大酒浸空

赤石脂各壹兩參分

甘草炙

牛膝酒浸切焙各壹兩

右一十六味搗羅爲末鍊蜜九如梧桐子大每服三

十九溫酒下

治消渴後虛乏填骨煎方

白茯苓去黑皮

菟絲子酒浸焙別搗

山茱萸

當歸切焙各兩半

肉蓯蓉酒浸切焙 大豆炒去皮

石韋去毛各兩參分

牛膝酒浸

巴戟天去心 小麥

麥門冬去心各兩半

天門冬去心參兩 五味子去心 訶梨勒

人參

遠志去心各兩半 桂去麤皮壹兩參分

附子炮裂去皮臍

石斛去根各兩半

右一十七味搗羅爲末用生地黃生栝樓根各三斤

搗絞取汁以銀石器慢火煎減半然後內藥并下白

蜜十兩牛髓五兩再煎令如糜食如雞子黃大米飲

下日三藥末不必盡入惟看稀稠得所佳

治消渴羸瘦小便不禁鉛丹散方

鉛丹研壹兩

栝樓根參

黃連去須

白石脂 各壹兩半

右四味搗羅為散每服二錢匕食後以漿水調下

治消渴肌膚羸瘦或轉筋小便利甚栝樓根散方

栝樓根

黃連五須

防已 黃大米炒

鉛丹 研各壹兩半

右四味搗羅前三味入研鉛丹和勻每食後良久煎

醋一合水二合調三錢匕日二服

消渴小便白濁

論曰消渴飲水過多久則滲漏脂膏脫耗精液下流胞

中與水液渾濁隨其小便利下膏凝故謂之消渴小便

白濁也

治消渴小便白濁如脂腎溼湯方

白羊腎

壹具去黃耆剉脂膜切

杜仲剉

五味子

生薑切各壹兩半

生乾地黃兩壹

人參兩半

棗伍枚去核

磁石參兩推碎綿裹

右九味除羊腎磁石外剉碎分為二劑先以水四升

煎腎與磁石及二升去腎然後下諸藥再煎取入合

去滓分二服食訖

治消渴府藏枯燥口乾引飲小便如脂鐵粉丸方

鐵粉研水飛過乾秤壹兩再研

雞膽雌乾伍枚炙熟

黃連去須參兩

牡蠣炒研如

右四味先搗二味細羅爲末再與鐵粉牡蠣研勻鍊蜜和劑以酥塗杵熟搗丸如梧桐子大每服三十九食前煎粟米飲下漸加至四十九

治消渴小便濃濁如麵汁此爲腎冷金牙石湯方

金牙石

搗碎研

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙熟

石菖蒲

各壹兩半

貝母

煨去心壹兩

烏梅去核微炒

葶藶子

炒別搗如膏各參分

桂去麤皮

高良薑

菟絲子

酒浸兩宿暴乾微炒別搗各半兩

右九味先搗八味爲麤末次入金牙石再研勻每服

三錢匕水一盞入麤二枚去核煎七分去滓早晚食前溫服

治消渴能食而飲水多小便如脂麩片日夜無度冬瓜

飲方

冬瓜壹枚

黃連

去須拾兩別搗爲細末

右二味先取冬瓜剖開去瓤淨糝黃連末在瓜內却用瓜頂蓋於熱灰中煨熟去皮細切爛研布絞取汁每服一盞至二盞食前服日三夜二

治消渴飲水不知休小便中如脂舌乾口渴黃連丸方

黃連去須

栝樓根各伍兩

右二味搗羅為末生地黄汁和劑石臼內用木杵塗酥搗勻熟丸如梧桐子大每服三十丸食後牛乳下

日二

治消渴下冷小便濃白如泔嘔逆不下食葶藶丸方

葶藶子 慢火炒別搗如膏壹兩半

桂皮 去麤

羚羊角 鎊

白茯苓 去黑皮

芫胡 去苗

鼈甲 去裙襴醋浸炙

防風 去叉

菟絲子 酒浸兩宿焙乾炒別搗

牛膝 去苗

安息香 各參分

陳橘皮 湯浸去白焙壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和劑酥塗杵搗勻熟丸

如梧桐子大每服三十九空腹酒下

治消渴飲水極多肢體羸弱小便如米泔腰膝冷痛諸

方不能治者山茱萸丸方

山茱萸

栝樓根 剉

玉瓜根 剉

苦參

龍骨 細研各壹兩半

黃連 去須參兩半

石六味先搗羅五味次入龍骨再研勻用生栝樓汁

和劑酥塗杵搗勻熟丸如梧桐子大每服三十九食

後煎白茅根飲下日三

治消渴尿脂小便如泔肉菹蓉丸方

肉菹蓉 去皺皮酒浸切焙

澤瀉

五味子

巴戟天去心

當歸焙切

地骨皮各壹兩

磁石煨醋淬

人參

赤石脂各壹兩半

韭子炒

白龍骨

甘草炙

牡丹皮各壹兩

熟乾地黄焙壹兩

禹餘糧煨參分

桑蛸炙肆拾枚

右一十六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸以牛乳下日三

大德重校聖濟總錄卷第五十八