

OBSERVATIONES

ET

EXPERIENTIAE,

quas


circa remedia eorumque formulae

in Instituto medico-clinico Patavino a Prof. Lippich directo,
septem annorum (1834/35—1840/41) cursu praescribi solita

conscriptis, et medicorum usui

adcommodavit

DR. FRANCISCUS KÖSTL.



VIENNAE.

A p u d B r a u m ü l l e r & S e i d e l .

1843.

Der Arzt soll die Krankheiten durch Anregung der natürlichen Heilprocesse bekämpfen, das Mittel soll ihm Werkzeug seyn, dessen er sich mit klarem Bewusstseyn der krankhaften Vorgänge bedient, nicht sein Denken allein in Anspruch nehmen, nie soll die Heilmitteltheorie vor der pathologischen Entwicklung der Heilebjecte vorwalten.

J. F. C. Hecker,
Geschichte der neueren Heilkunde.

Praefatio.

Quae discendi cupidine ductus patienter lubenterque notaveram, ea ut etiam typis vulgari permetterem, fatens me ex eorum numero esse conari, qui profiendo scribunt et scribendo prosiciunt, non inutiles causae fuerunt. Agitur enim de observationibus et experientiis therapeutico-pharmacologicis in Scho-la medica clinica superiori Patavina ab eximio Professore *Lippich* directa cursu annorum septem factis, quae Academiam nunquam, castam vero naturam semper sapiunt, ideoque a nulla unquam postera die delentur, et ut Instituti clinici Patavini actorum partem constituant, sat satisque dignae. Agitur de remediorum, quibuscum pericula instituta fuere, partim usus rarius, novitus partim introductorum haud exiguo delectu. Obveniunt vero inter alia: Acidum hydrocyanicum et phosphoricum, Agnus castus, Aquae sulfureae ad montes Euganeos prope Antenoream urbem, Caesaris Augusti temporibus jam celeberrimae, Aquae salino - martiales Catullianae pone Recobarium, Aquae acidulo - salino - ferruginosae Recobarienses, Aquamaris adriatici, Argenti nitras simplex, aut aci-

dulus (binitras), Argentum nitricum fusum, Auri-pigmentum, Aurum muriaticum natronatum, Ballota lanata, Cainca, Carex arenaria, Chinini citras et murias, Colchici vinum, Creosotum, Croton Tigillum, Electricitas galvanica, ferruginosa pilularum massa Valleti, Ferri proto oduretum, et prussias, Hydrargyri cyanuretum et deutojoduretum, Lichenina, Malum Granatum, Nicotiana, oleum jecoris Aselli, Pigmentum indicum, Pix liquida, Pyrola umbellata, Scolopendrium, Scopolina atropoides, Sphaerococcus crispus, Sphaerococcus confervoides, unacum aliis venetarum lacunarum algis, Theriaca, et Terebinthinae oleum destillatum. Ut in curae adminicula quaedam, quorum unum ad faucium ulceram syphiliticam, salivationem mercurialem, etc., ut de prophylactico contra scarlatinae contagium taceam, alterum ad pneumophthisin tubercularem multo citius et securius, ac cum quocumque alio medicamine hucusdum potuit, sananda, egregiam suam contulit operam, oculum animaliumque converterent, de Scopolina atropoide, a Professore *Lippich* primum in usum medicum vocata, et de venetarum lacunarum algis, Sphaerococco confervoides, Ulva Lactuca, Fuco aciculari, etc. fusius quid, ne succinctam monographiam dicam, insuper conscripsi. Adjuncta cuilibet medicamini, quae in dicto Clinico ordinari solebant, formularum medicorum exemplaria nec superslta, quin imo Medicinae practicae imprimis tironibus admodum grata censeo, itaque eorumdem, ni aliorum quoque, quibus scholarum

clinicarum acta cordi esse debent, satagens votis. Licet pruriret animus, molem pertractandam systematico quodam ordine distribuendi, ne vero nisi observata absque verborum plures paginas replentium ambage, referre simpleiter agerem alia, alphabeticum ordinem servavi, qualem in opusculo: „*Speculum pharmacologicum*“ a me jam observatum, materiei seopo optime respondentem, mente et animo praestans quidam Vir declaravit. Praeluceret mihi in condenda medicamentorum divisione systematica divisio morborum nosologiea, genesi et crisi superstructa, cardinibus enim pragmatico-historicis; quoniam quae ex stationariae sic dietae, epidemieae, endemieae aliasrumque, quibuseum organismus humanus necessitatem fovet, potentiarum dominium venerandi neglectu, in pericula incurrere nolle; quoniam praeeuntibus Divo *Hippocrate*, *Galeno*, *Paracelso*, *Helmontio*, *Stahlio*, *Aretaeo*, *Celso*, *Fernelio*, *Fr. Hoffmanno*, *Boerhaavio*, *Frankio*, *Reilio*, *Hufelandio*, aliisque naturae observatoribus, sub faustis semper auspiciis el. Professoris *Francisci ab Hildenbrand*, dilectissimi mei moderatoris, cuius ingenii ac animi dotes in servidum me amorem rapiunt, sed et ego ipse, quam sub diverso tegmine coeli exereui, in praxi mea Naturam solam saepe morbos egregie percurare, arcere, et corporis integritatem tueri vidi, nee non expertus sum, omnes academiarum potestates conexas tantum non facere, quam Natura sponte sua absque illis facit et peragit: est Deus in nobis, per quem

vivimus omnes. Quaenam momenta in praxi, de quo loquor, clinicum quandam patavinum Virum duxerint, ejusdem opera sat clare demonstrant, et quantum valeat illud *Celsi* effatum: „Differre pro natura locorum genera Medicinae, et aliud esse Romae, aliud in Aegypto, aliud in Galiis.“

Auctor.

Index medicaminum.

A.	Pagina	Pagina	
Absynthium	1	Alumen	18
Acetas Ammoniae solutus .	20	Ammonia pura liquida . .	22
— — — dilut.	21	Ammoniacum	19
— — et Lixivae	20	Ammonium benzoicum . .	21
— Lixivae solutus . .	133	— carbonicum	21
— Morphii	158	— muriaticum	22
— Plumbi acidul. siccus	162	— — — martiatum	24
Acetum antisепticum Ph. A.,		Amygdalae dulces	25
s. A. aromaticum . .	2	Aylum	26
— commune, s. A. Vini		Angelica	26
optimum	3	Anisum stellatum	27
Acida, in genere	5	Anthemis Pyrethrum . . .	166
Acidum benzoicum	3	Aqua Calcis	48
— hydrochloric., s. mu-		— Creosoti	82
riaticum dilutum . .	5	— communis simplex . .	27
— muriaticum oxygenat.	7	— destill. Cerasorum nigr.	60
— nitricum	7	— — Cinnamomi . . .	78
— nitrico-muriaticum .	8	— — fl. Aurant., s. A.	-
— phosphoricum	9	Naphae	38
— sulfuricum	9	— — Foeniculi . . .	104
— tartricum	11	— — Laurocerasi . . .	135
Aconitum	12	— — Melissae	145
Acorus Calamus	46	— — Menthae pip. . .	146
Acupuncture	14	— — Rosarum	171
Aether aceticus	14	— phagedaenica	121
— nitriens	14	— vegeto-miner. Gouvardi	163
— sulfuricus	14	— maris adriatici . . .	32
Aethiops antimonialis . .	113	Aquae acidulo-salino-ferrugi-	
— mineralis	112	nosae Recobariens.	32
Agnus castus	15	— minerales Bohemiae .	33
Allinm Cepa	16	— salino-mart. Catnillian.	31
Aloë	16	— sulfureae Aponenses .	29
Althaea	17	— — St. Danielis ad	
		Aponum	81
		— sulfureae Rainerianaes .	30

VIII

	Pagina		Pagina
<i>Arcanum duplicatum</i>	134	<i>Centaurium minus</i>	59
<i>Argentum nitricum</i>	33	<i>Cera alba</i>	60
<i>Arnica</i>	34	— <i>citrina</i>	60
<i>Asa foetida</i>	35	<i>Cerasus nigra</i>	60
<i>Aurantium</i>	37	<i>Cernussa alba</i>	164
<i>Auripigmentum</i>	38	<i>Cetaceum</i>	60
<i>Aurum muriaticum natronat.</i>	38	<i>Chamomilla</i>	61
<i>Axungia porci</i>	39	<i>China flava</i>	62
B.			
<i>Ballota lanata</i>	39	— <i>fusca</i>	65
<i>Balneum universale tepidum</i>	28	<i>Chloras Calcis</i>	47
— <i>vaporis</i>	29	<i>Chlorum liquidum</i>	7
<i>Balnea alcalina Stuetziana</i>	155	<i>Cichoreum</i>	72
<i>Balsamum Copaivae</i>	39	<i>Cicuta virosa</i>	77
— <i>Opodeldoc</i>	40	— <i>vulgaris</i>	73
<i>Bardana</i>	40	<i>Cinuamomum</i>	78
<i>Baryta muriatica</i>	40	<i>Citras Chinimae</i>	70
<i>Belladonna</i>	41	<i>Citrus</i>	79
<i>Benzoas Ammoniae</i>	21	<i>Colchicum</i>	79
<i>Bismuthum nitricum praec.</i>	44	<i>Colombo</i>	80
<i>Borax veneta</i>	44	<i>Conium macul.</i>	73
<i>Butyrum rec. insuls.</i>	45	<i>Corallina Corsicana</i>	81
— <i>Cacao</i>	46	<i>Cortex regius</i>	62
C.			
<i>Cainca</i>	46	— <i>Peruvianus</i>	65
<i>Calamus aromaticus</i>	46	<i>Cremor Tartari</i>	199
<i>Calcaria chlorica</i>	47	<i>Creosotum</i>	82
— <i>hydrochlorica</i>	47	<i>Crocus</i>	83
— <i>sulfurata</i>	49	— <i>Martis aperitivns</i>	95
<i>Calomel</i>	117	<i>Croton Tiglinn</i>	84
<i>Camphora</i>	50	<i>Cncurbita</i>	85
<i>Cannabis sativa</i>	54	<i>Cuprum sulf.</i>	85
<i>Cantharides</i>	55	<i>Cyanuretum Hydrargyri</i>	122
<i>Capilli Veneris</i>	56	<i>Cydonia vulg.</i>	86
<i>Carbonas Ammoniae</i>	21	D.	
— <i>oxydi Plumbi</i>	164	<i>Deutojoduretum Hydrargyri</i>	122
<i>Carburetum Ferri nativum</i>	107	<i>Digitalis purp.</i>	86
<i>Carex arenaria</i>	57	<i>Dulcamara</i>	90
<i>Caryophylli</i>	57	E.	
<i>Cascarilla</i>	57	<i>Elaeosaccharum cort. Aurant.</i>	38
<i>Cassia</i>	57	— <i>Foeniculi</i>	105
<i>Castoreum</i>	58	— <i>Macis</i>	151
		<i>Electricitas</i>	91

	Pagina		Pagina
Electuarium Stoerckii	175, 207	Ferruum carbonicum oxydulat.	96
Elixir acidum Halleri . . .	10	— limatum	98
— robor. Whyttii . . .	66	— muriaticum	98
Emplastrum Cantharidum 55, 56		— sulfuricum	99
— — perpetuum, s. Jamini .	94	Filix mas	103
— Cicutae	77	Flores Salis ammon. martial.	24
— de Galbano crocat.	105	— Sulfuris	196
— Diachylon	164	— Zinci	207
— Meliloti	144	Foeniculum	104
— mercuriale	116	Fomenta Schmucker. . . .	150
— spermatis Ceti .	60	Fucus Helminthochorton .	81
Equisetum arvense	93	Fumaria	104
Euphorbium	94		
Extractum Absynthii	2		G.
— Aconiti	12	Galbanum	105
— Aloës	16	Gentiana lut.	105
— Belladonnae . . .	41	Glacies	28
— Cascarillae . . .	57	Globuli martiales	103
— Centaurii min. . .	60	Gramen	106
— Chamomillae . . .	62	Graphites	107
— Cichorei	72	Gratiola	106
— cort. Aurant. . .	38	Guajacum	108
— — Peruviani .	65	Gummi arabicum	108
— Colchici	79	— Guttae	109
— Conii macul. . .	73	— resina Ammon. . .	19
— Croci	84		H.
— Digital. purp. . .	88		
— Dulcamarae . . .	91	Helleborus albus	109
— Ferri pomatum . . .	97	Hepar Calcis	49
— Gentianae	105	Hirundines	110
— Graminis	106	Hordeum	110
— Hyoscyami	123	Hydrargyrum amm. muriat.	121
— Liquiritiae	139	— muriat. mite . . .	117
— Myrrhae	148	— — corrosivum . . .	120
— Nucis jugl. . . .	150	— oxydatum rubrum	116
— Opii aq.	156	— oxydul. muriatic.	117
— Quassiae	167	— — nigrum pur.	116
— Taraxaci	199	— stibiato - sulfurat.	113
— Trifolii	204	— — sulfuratum nigr.	112
			F.
Faba	94	Hydriodas Lixivae	131
Ferrum carbonicum	95	Hyoscyamus niger	125

	P agina		P agina
	H.		M.
Ichthyocolla	126	Manua	143
Ipecacuanha	126	Matricaria	144
Iris florentina	129	Mel	144
	J.	— Rosarum	172
Jacea	130	Melilotus	144
Jalapa	130	Metissa	145
Jodium	131	Mentha pip.	146
Juniperus	132	Mercurius niger Moscati .	116
	K.	— praecep. albus .	121
Kali hydriodicum	131	— — ruber .	116
Kermes minerale	194	— sublim. corrosiv.	120
	L.	Mezereum	146
Lac vaccinum	134	Millefolium	147
Lapis causticus	133	Morphinum	157
— infernalis	33	— aceticum	158
Laurocerasus	135	Morus	147
Lavandula	136	Moschus	147
Landanum liq. Sydenh. .	157	Mixtura Griffithii	171
Lichen island.	136	Mucilago g. arabici	108
Lichenina	137	Murias Auri et Soda	38
Linimentum saponato-camph.	53	— Barytae	40
Linum	138	— Calcis	47
Liquiritia	139	— Chininae	71
Liqnor hydrosulfureticus pro balneo	49	— Ferri ammoniacalis	98
— mercurialis	121	Myrrha	148
— terrae fol. Tartari .	133		N.
Lixiva fusa	133	Nicotiana	149
Lutum thermal.	30	Nitras Argenti	33
Lycopodium	139	— Bismuthi praec.	44
	M.	Nitrum	149
Magisterium Bismuthi . . .	44	Nux juglans	150
Magnesia carbonica	139	— moschata	150
— usta	140	— vomica	151
— sulfurica	141		O.
Malum Granatum	143	Olenum Amygdal. dulc. . .	26
Malva	142	— Caryophyllor. destill. .	57
		— Croton. Tiglia pressum .	84
		— Hyoscyami coctum .	125
		— Juniperi	132
		— Lavandulae destill. .	136
		— Lini	138

	Pagina		Pagina
Oleum jecoris Aselli	152	Rosa	171
— uncis juglandis press.	150	Rubus Idaeus	172
— Olivarum	152	S.	
— Ricini	170	Sabina	172
— Terebinthinae destill.	200	Saccharum Saturni	162
Ononis spinosa	153	Sal amarus	141
Opium	153	— ammoniacus	22
Ovum gallinae	153	— Seignetti	200
Oxymel simplex	144	Salep	173
P.		Salvia	173
Papaver albus	154	Sambucus	74
— Rhoeas	159	Santonicum	174
Petroleum	159	Sapo medicinalis	174
Phellandrium aq.	160	— domesticus et venetus .	175
Pigmentum indicum	160	Sperma Ceti	60
Pilulae Valleti	96	Spiritus Aetheris nitrici . .	14
Pinus sylv.	161	— — sulfurici	14
Pix navalis liq.	161	— Juniperi	133
Plumbum aceticum acidum . .	162	— Mindereri	21
— carbonicum	164	— Salis acidulus	5
Polygala Senega	164	— — ammoniaci caust. .	22
Potassa carbonica neutra . .	165	Stibii oxydulum hydro-sulf.	
— hydrochlorica	165	aurant.	193
Protojoduretum Ferri	102	— — hydro-sulf. rubr. .	194
Prunus domestica	166	Strychnina	151
Prussias Ferri	103	Succens Allii Cepae	16
Pulvis Cortumii	150	— spiss. Aloës	16
— temperans	149	— mali Aurantii	37
Pyrethrum	166	— — Granati	143
Pyrola umbellata	166	— Liquiritiae	139
Q.		Sulfas Chininae	66
Quassia	167	— Lixiviae	13½
Quercus	167	— Zinci artefactus	208
R.		Sulfur aurat. Antimonii . .	193
Ratanhia	167	— crudum	195
Rheum	168	— depuratum	196
Ricinus	170	Sulfuretum Calcis	49
Roob Juniperi	133	— Hydrargyri	112
— Sambuci	174	Symplynum	197
Ricinus	170	Syrupus capill. Veneris . .	56
Roob Juniperi	133	— Cichorei c. Rheo . . .	72
— Sambuci	174	— cort. Aurant.	37

	Pagina		Pagina
Syrupus Diacodii	154	Tinctura maiatis Ferri	98
— Kermesinus	11	— Opii compos.	157
— Mororum	147	— — simplex	156
— Rubi Idaeи	172	— Rhei aquos.	168
T.		Tragacantha	203
Tamarindus	197	Trifolium	203
Tanacetum	200	Triticum	204
Taraxacum	198	U.	
Tartras Lixivae acidulus . .	199	Ulmus	205
— — et Sodaе	200	Unguentum Graefeanum	122
— — stib.	194	— Hydrarg. ciner.	113
Tauri Fel	201	Uva Ursi	205
Terebinthina	200	V.	
Theriaca Andromachi	203	Valeriana	206
Tilia	203	Verbascum	207
Tinctura Cantharid.	56	Viola tricolor	130
— Castorei	59	Vitriolum Zinci artef.	208
— Chnae fuscae comp. . . .	66	Z.	
— Colchici	80	Zincum oxydatum	207
— Digitalis purp.	88		
— Jodii	132		

**OBSERVATIONES
ET
EXPERIENTIAE**

therapeutico - pharmacologicae.

Absynthium.

(*Artemisia Absynthium* Bot.)

Praeplacuit in helminthiasi, praemissis ut plurimum aliis vermis fugis; in convalescentia aliquorum morborum acutorum, e. gr. tromophreneseos bibonum, febris intermitit., gastriae, biliosae, gastrico-verminosae, etc.; item in aliquibus chronicis, uti in scrofula, chlorosi, ubi martialibus et similibus contra has affectiones adhibendis viam aperiebat.

Infusum aquosum communiter ex drachm. duabus ad colat. unc. octo; aut ex drachm. tribus, uncia semis, ad colat. unc. decem paratum, prae aliis in usu fuit.

Rec. Summitat. Absynth. drachm. duas

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo detur.

S. *Omni bihorio cochl. cib. duo (etiam epicratice, vel ad vascul. coff. dimid.).*

Connubium: eum Sautonio, addito Sale amaro; e. cortice Chin. reg., in scrofula; in chlorosi secundaria, c. Valeriana, praemissis amaro-tonicis, extraeto Absynthii ipso; e. Tanacetum et Rheo, in cardiectasi passiva eum helminthiasi et oligaemia; e. tinctura Rhei aq., in helminthiasi; c. extracto Quassiae, in chlorosi; c. tinctura Chinæ, pro coronide euræ hepatitidis typhoideæ.

Rec. Summit. Absynth. drachm. duas

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Extr. Quassiae scrupul. unum.

M. D. S. *Omni bihorio vascul. dimidium.*

Extractum Abs. (aquo.) solutum in infusis aromaticis, v. gr. Chamomillae, ad praeparandam martiale curam in chlorosi; e. g.

Rec. Fl. Chamomill. vulg. drachm. tres

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Extr. Absynth. drachm. unam.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Ex infuso Melissae, in cardiectasi hypertrophica cum incipiente hydrothoracee, post adaequatam curam antiphlogisticam, perstante attamen nimia nervorum mobilitate et superveniente valde molesta anorexia, quae inde pacabatur, ablata et illa; ex inf. Cent. min., in serofula; ad draehmam dimidiam vel integrum, c. aliis amaris extractis.

Extractum in pilulis; e. g. in chlorosi, antemissis Magnesia carb., Rheo, etc.

Rec. Extr. Absynth. drach. unam

Pulv. Absynth. q. s. ut formentur pilulae Nr. XX.

Consperg. pulv. rad. Irid. flor.

D. S. Omni bihorio pilulae quatuor.

Connubium: eodem in morbo, eadem forma, c. Ferro sulf. et extr. Valerian.; porro e. Chinino sulf.; e. extr. Ferri mal.; c. pilul. Valleti et extr. Quass.; e. extr. Centaur. min.; e. fl. Sal. ammon. mart., etc.: de quibus singulis suo loco.

Pulveris Absynth. nonnisi q. s. ad pilulas ex extractis amaris formandas praescribebatur.

Acetum aromaticum.

(s. antisepticum Ph. Austr.)

Inserviebat curae vitali, in f. bilioso - verminosa, in nervosam versa: status enim delirii, meteorismi, obauditionis, animi indifferentiae, etc. praeter alia, lotiones cum Aeeto arom. institui jussit. Sie in cholera orientali, usque dum calor redire inciperet, continuabatur in frictionibus, ope hujus Aceti extremitatum levi cyanoseos gradu corrugatarum, elasticitate privatarum.

Acetum commune et Acetum Vini optimum.

Scopo repercutienti optime providebant acetata frigida capiti imposita, in febri gastrico-typhode; fomenta ad frontem ob fortes capitae dolores, in febri biliosa rheumatica.

Rec. Aq. frigid. libram unam

Aceti commun. unc. unam.

D. S. Fomentum ad frontem.

Cum glacie; pro pediluvio, in peripneumonia rheum.-biliosa c. dilatatione arcus aortae:

Rec. Aceti Vini optim. libr. semis

Glaciei contus. libram.

S. Pediluvio addatnr.

Cum Spir. Vini rectificatiss.; pro lotionibus assiduis brachiorum, abdominis et pectoris ad sudores ciliendos in cuti arida urente, in f. gastrico - nervosa.

Rec. Aceti Vini optim.

Spir. Vini rectificatiss. ॥ ॥ unc. duas.

D. S. Pro lotionibus.

Cum Melle; enema ingrediebatur, in alvina obstipatione.

Rec. Aq. commun. unc. octo

Aceti Vini optimi unciam

Mellis despumat. unc. semis.

M. D. S. Pro clystere.

Ingrediebatur enema ex Asa foetida; mixturam ex acetate Morphii c. Aq. dest.; ad sinapismos praeterea sumitur: de quibus singulis suo loco erit sermo.

Oxymel simplex quaere sub *Mel.*

Acidum benzoicum.

In catarrho chronicō et asthmate catarrhalī cum suppressa expectoratione:

Rec. Aq. dest. fl. Samb. unc. quatuor

Ammoniae pur. liq. scrup. semis

Acidi benzoici q. s. ad perfectam Ammonio tribnendam neutram indolem; adde:

Syr. simpl. unc. unam et semis.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Acidum hydrocyanicum.

In haemoptysi inflammatoria, cum tubereulosi et amenorrhoea: fortis aderat cardiopalmus, qui semel devictus, denuo comparuit:

Rec. Acidi hydrocyanici methodo Kelleri parati) guttas sex.*

D. ad lagenulam charta obscura obductam et embolo vitreo firmiter clausam, loco frigido servandam.

S. Sumat omni bihorio guttas tres Saccharo instillatas.

Post dies septem ab initia cura eessavit sputum sanguineum, quo die suspendebatur Acidum hydrocyanicum. Sed non multo post sanguis ejicitur per vomitum, cedens nonnisi venae-sectioni, pediluvii et Sali culinari ore sumpto.

Alio in casu, haemoptysi scilicet inflammatoria cum residuis pneumophthiseos tubercularis et cardiectasi, tentabatur sequens formula:

Rec. Spirit. Vini rectificatiss. grana nonaginta

Acidi hydrocyanici methodo Kelleri parati guttas decem.

D. ad lagenulam etc. ut supra, sigillo munitam.

S. Omni bihorio guttas duas — tres cum pulvere Sacchari.

Constat, quod in posterum ordinaretur deeoetum Sphaero-eoci erispi e. aq. Lauroc., et melius exinde valuerit aeger.

*) Pharmacop. Hass. elector. sequentem pro parando Acido hydrocyanico *alcoholico* continet formulam, cuius auctor Keller est: Rec. Kali ferreo-bornssici unc. 2; inmitte in retortam vitream, tabulatam minorem, cuius rostrum per tubum vitreum rectangularum cum vitro alto cylindrico, quod in mixturam refrigerantem, vel nivem, vel glaciem contusam, impositum est, communicat. Vitro cylindrico ingere Spiritus Vini rectificatissimi dr. 14, juncturisque luto ex farina et vesica clavis, affunde per tubulum retortae Acidi Vitrioli concentrati puri unc. 1, jani ante dilutam Aquae destillatae unc. 1. Fiat ex balneo aquae, rostro ascendentē retortae, destillatio quam diu liquidum, in striis cohaerentibus oleo-aethereis, in cylindrum expediatur, ut solet per sextam partem horae. Destillatione peracta obtinentur Acidi limpidi unc. 2.

Fuit casus scirri mucosae ventriculi membranae juxta pylori regionem ad carcinomatis exitum perducti, cum fungi medullaris suspicione, et hepatis phlegmasia. E privata cl. Professoris praxi scimus, scirro membranae ventriculi mucosae affectum quemdam sub usu hujus remedii ultra annum et dimidium cum malo vitam protraxisse.

Tentabatur quoque hujus Acidii externus usus in digitii ulcere scrofuloso inveterato, ex quo plorabat sanies copiosa, adhibito antea oleo Jce. Aselli, et exterue aqua Creosoti:

Rec. Aq. destill. commun.

Spirit. Vini rectificatiss. $\frac{v}{ii}$ unc. semis

Acidi hydrocyanici guttas sex.

M. D. ad lagenulam nigram operculo vitro clausam.

S. Pro injectionibus in ulcus saniosum bis de die.

Digitus vero post dies octo gangraenescere incepit, quamobrem disarticulatio facta est.

Acidum muriaticum dilutum.

(Spir. Salis acidus Ph. Austr., Acid. hydrochl. dilut.)

Praemitto breviter quaedam de Acidis, seu potius de potibus acidulis. In bilio-so-subinflammatoria individui diathesi scorbutica leviter affecti sitis, ejusque fomes praecipuus, bilis nimurum et digestionis humor quivis male mistus, corrigebantur acidulis potulentis. Potus ex acidis mineralibus dilutis gratae reficiebant in synochis degeneribus, et in specie gastrico-nervosis. Haustus aciduli frigidi apti evadabant in meningitide peripherica, quae supervenit bronchitidi biliosae ac haemoptisi; in pleuritide recidiva abeunte in hypolepsin, sublatente lenta arachnitide in pellagroso, quum praecepimus scopus esset, diuresin et expectorationem promovendi; in gastro-enteritide catarrhalis cum nota biliosa; in metroperitonitide puerperali; in variola cum nota biliosa, ad facilitandam eruptionem, biliosae quidem colluviae copiam porro imminuendam, et corrigendam, ejus tamen a cuti derivantem nimiam profusionem, alios insuper humores secum rapientem aliquantum moderandam; in zosteris cum catarrhastmate cardiaco; in tromophrenesi potus aciduli vinum mentientes; in quotidiana cum epilepsia. Potibus acidulis intra-

paucas horas compositae fuere omnes turbae, quae ex Morphina acetica methodo endermatica adhibita terruere intoxicationis metu. Ex acidulorum vegetabilium usu molesta phaenomena cardiaca aueta propter aegro ingratam Digitalem penitus conticuere.

Acidum muriaticum dilutum potui inserviens, obvenit in mixturis, ad draehmam; in collutorio ad drachmam unam, et ultra; in pediluviiis idem Acidum concentratum ad unc. semis, usque uncias duas, et quidem in copula cum Acido nitrico.

In febri gastrico-nervosa:

Rec. Decociti Hordei l. a. p. libr. tres

Acidi muriat. dilut. drachm. unam.

D. S. Pro potu.

In f. gastrico-verminosa; sec. *Chomel*:

Rec. Aq. font. libr. duas

Acidi hydrochlor. diluti scrupul. duos

Syrupi Mororum unc. unam.

M. D. S. Potus.

In febri gastrica e. nota cat.-rheumat. transgressa in nervosam lentam cum exanthemate aphthoso in tractu intestinali et cavo oris:

Rec. Aq. font. libr. tres

Acidi muriat. dilut. drachm. unam

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Potus.

Eadem formula in typho intestinali cum exanthemate miliari substituebatur potui ex Acido sulf. dil. Agendum quippe erat in massam sanguinis per resorptionem sordium certe corruptam, nec non in exuleerationes in intestinis jam existentes, denique vero non obliviouscendo phaenomenorum ex perverso systematis cerebralis et praeceipue gangliaris imperio.

In penultimo casu quadravit sequens collutorium:

Rec. Herb. Salviae drachm. tres

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Acidi muriat. dilut. drachm. unam

Mell. despum. unc. unam.

M. D. S. Collutorium.

Recipiebatur ad unguenta (unacum Acido nitr.), ad sinapismos aeuendos; ad pediluvia (unac. Acido nitr.), quae Heleno

Scott, Bernardo Johnson et per eminentiam Italo Tantini debentur. Uniebatur cum hydrochloratibus Chinae, Ferri et Ammoniae.

Acidum muriaticum oxygenatum.

(Chlorum liquidum Ph. Austr., s. Chlorina liq.)

Interne ad drachm. semis et integrum et ultra, multa aqua dilutum, ex decocto mucilaginoso; in erysipelate gangraenoso:

*Rec. Dec. Alth. ex uncia parati, libram
Acidi muriat. oxygenat. dilut. drachmam
Syr. simpl. unc. unam.
M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.*

In typho intestinali c. exanthemate miliari, rebus male vergentibus, potui glaciali c. Acido sulf., et post ex Acido hydrochl. substituebatur:

*Rec. Aq. font. libr. tres
Chlori liquid. dilut. scrup. duos
Syr. cort. Aurant. unc. duas.
M. D. S. Potus.*

Sensim dosis augebatur ad scrupulos quatuor.

Acidum nitricum dilutum.

Ad usum internum Acidii nitrici diluti drachma dimidia usque integrum ab initio, ascendendo quoque ad duas; pro pediluviis et unguento in connubio c. Acido muriatico.

In pemphigo scorbutico, sed quum contra scorbutum magis agendum esset; itidem in metrorrhagia activa:

*Rec. Dec. Gramin. conc. ex unc. duas parat. libr. duas
Acidi nitrici diluti drachm. semis
Syr. simpl. unc. unam.
M. D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.*

Cum Rheo et cort. Aurant., in erysipelate gangraenoso:

*Rec. Rad. Rhei elect. r. t.
Cort. Anrant. $\frac{1}{2}$ drachm. duas
Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Col. unc. sex adde:
Acidi nitrici diluti drachm. unam
Syr. simpl. unc. unam.
M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.*

Unaem Nitro in pneumonitide, in ascite et anasarea; sumebatnr ex deeoeto Duleamarae et cort. Ulmi inter., in impetigine seabida; ex deeoeto Ononis spinosae, in cardiectasi hypertrophica, eum bronchopneumonitide lenta; ex dee. Sarsaparillae et Guajaci, in syphilide universalis, sub schemate ulceris fauces devastantis, dolorum osteocoporum et fluoris albi in scorbutica; in eodem casu Acidum nitricum vires acuebat cyanureti Hydrargyri postea ordinati, adeo ut ex duobus hujus praeparati granis salivatio ingrueret.

Acidum nitrieo-muriaticum, forma pediluvii, validum extitit remedium in hepato-splenemphraxy subinflamm. febr. e. hydropericardio incipiente, et initio hydrothoracis, in hepatitide chronica; in hepatitide peritonaea, eum tumore ad superficiem hepatis, ad residuum adhuc parvum dissolvendum tumorem, practer Calomel ad prima usque salivationis prodroma, pediluvia Tantiniana sedule et cum fructu adhibebantur; itidem in stenosi valvularum semilunarium, etc.

Rec. Acidi nitrici

— muriatici $\frac{aa}{aa}$ unciam semis (sensim augend. ad unc. unam — duas)

Aquae font. libram unam (— duas).

M. D. ad vitrum epist. vitro clausum.

S. Aquae admiscendum pro pediluvio.

Durities hypoehondrii jam imminuta, sed adhuc perstans ante usum talis pediluvii in f. tertiana dupl. e. hepato-splenemphraxy, eodem sedule adhibito, omnis perfecte evanuit.

Unguentum ex Acido nitrieo-muriat. in hepato-splenemphraxy ordinabatur, postquam linimentum saponato-camphorat. e. Conio macul., et hoc e. farina semin. Sinapis adhibita hypochondria tumentia, et sub attactu dolentia adhuc reliquissent:

Rec. Acidi nitrici dilut.

— muriat. dilut. $\frac{aa}{aa}$ drachm. tres

Axung. porci unc. unam et semis.

M. f. l. a. Unguent.

D. S. Ad ungenda hypochondria ter de die.

Sed hypochondriorum inde sensibilitas aucta magis erat, quare ad alia consugiendum fuit.

De connubio hujus Acidi cum nitrate Argenti, et de sismis, quos ingreditur, sermonem adhuc occasione data faciam.

Acidum phosphoricum.

Interne in mixturis, aqua satis temperatum: in febri gastrico-nervosa; in amenorrhoea retentionis cum fluore albo vicario (aegra praeter acetatem Sodaem, Acidum phosph. et Boracem nil sumsit, et sana evasit); in cardiectasi dextera, cum hepato-colitidis chronicis conseetariis, in hydropem tendente. Mitigatis inde symptomatibus cardiaeis, imprimis palpitatione et anxietate, somnum torrentibus ad blandiendum nervis mobilioribus, Asa foetida et Acidum phosph. eum aliquo fruetu ordinabantur. In metritide seleryntica (metroscleremate inflammatorio) cum elytrorrhoea symptomatia, aegra sanguinis emissionibus localibus, eceoproticis, aqua Laurocerasi, Acido phosphorico diluto tractabatur: fuit autem sub initio curae eachexia peculiaris, symptomata quaedam polyeholiae, regio uteri tumidula, dolens, ani pruritus, tenesmus ad alvum, constantes lumborum dolores, febricula obseura quaedam quotidie, fluxus pro maxima parte bruneus, foetens, collum uteri inerassatum durum, calens, et os uteri labii inacqualibus dotatum.

Rec. Decocti Hordei l. a. parati libr. duas

Acidi phosphorici diluti drachm. unam

Sacch. alb. unc. unam.

M. D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

Acidum sulfuricum dilutum.

Interne. In typho intestinali cum exanthemate miliari, qua antisepticum; in notaco-myelitide lumbarum malactea, cum notaeo-meningitide deinceps diffusa, quum praemissa generosa cura antiphlogistica, torpor major observatus methodum expseret antiphlogistico-tonicam; in cardiectasi passiva (absque simultanea hypertrophia) cum splenemphraxi; in scabie, ubi post anglicanam methodum sic dictam scabies extincta, major vero cutis irritabilitas organica diutius relinquebatur, spuriis psoriasis papulis in dorso cum primis emergentibus, opitulans; in ephidrosi chronica (in connubio c. China); in chlorosi secundaria; in tromophrenesi bibonum (e. syr. Kermes.); itidem in tache dorsali incipiente eum siente epilepsia (ex ouania), quum

praeter cardiopalmum et puncturas ad spinam dorsi, nil adhuc adnotandum esset :

Rec. Aq. font. libras tres

Acidi sulf. dilut. drachman

Sacch. alb. unc. duas.

M. D. S. Potus.

Frequentissime vero ordinabatur sequenti modo :

Rec. Aq. font. libr. duas vel tres

Acidi sulf. dilut. drachm. semis

Sacch. alb. (v. Syr. simpl.) unc. nnam.

M. D. S. Potus.

Praeterea sumebatur interne ad drachmam de die, in decoctis Gram., Hord., et infusis.

Externe quoque, uti in aphthis (dr. $1\frac{1}{2}$ pro Mell. despum. unc. 2). In blennorrhoea syphilitica c. hydrargyrosi, quum contra hanc potius et primum agendum esset, fauces ulceribus consitae, labia et os dolerent, et deglutitio aegre procederet :

Rec. Mell. commun. unc. unam

Acidi sulf. dilut. drachm. semis (— duas).

M. f. Linimentum.

S. Os internum illiniendum ope penicilli.

Caeterum ad mentem James Henry ad corrigendum Salis amari saporem ejusve vim acuendam propositum connubium cum Sale amaro tantoties in usu fuit; sic Acidum sulfur., dummodo scopus therapeuticus postularet, lubenter jungebatur cum Digitali, Ipecacuanha, Ferro et Chinino sulfuricis, cum Peruviano Cortice, cum Millesolio.

Idem Acidum sub forma praeparati officinalis :

Elixir acidum Halleri, s. Liquor a. H. Ph. A.

Ex decoctis, infusis, mixturis, vel et solum guttatim; pro potu: in f. nervosa (ex inflammat.-gastroca); in synocha cum congestione capitis; in tromophrenesi bibonum; unacum inf. Melissae in febris statu nervoso - colliquativo; in leueochlorosi primaria; in charactere febrium nervoso; in cardiectasi passiva et stenocardia; in incipiente cordis dilatatione; in scorbuto; in ephidrosi chronica. Dosis a scrupulo ad drachm. semis, unam de die:

Rec. Aq. font. libr. tres

Elixir acid. Halleri *drachmam*

Syr. simpl. *unc. duas.*

(s. Syr. Rubi Idaei unc. unam.)

M. D. S. Potus.

Bibonibus, tromophrenesi laborantibus, loco syrapi alterius addebatur syrpus Kermesinus, ut vini rubri, quod Patavini amant, aqua remixti color esset; passimque delirantes huncce potum pro vino sumebant cupiebantque. Ubi vina flava sunt, hu-jus syrpi loeo syrpus corticum Aurantiorum substitui potest.

Simili modo etiam c. limonea tartarica ordinabatur.

In metroperitonitide puerperali:

Rec. Elixir acidi Halleri scrupulum.

S. Guttas tres per vicem in frustulo Sacchari.

Ex infuso Ipeeacuanhae in f. gastrico-nervosa; ex infuso Melissae, fl. Verbasci, Tiliae aut pro potu, saepius vero pro medicamine:

Rec. Rad. Ipecacuanh. r. t. grana duodecim

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. sex adde:

Elixir acid. Halleri *scrupulum*

Syr. simpl. *unciam.*

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Ex decoeto Althaeae cum aq. Laurocerasi, in febri ga-strieo-nervosa irritativa; eodem modo ex decocto Tamarind., Hordei, Senegae, Corticis Peruviani; unacum Aqua Naph. et tint. Whythii in tabe mesenterica praescribebatur.

Acidum tartricum.

In pneumonia; in f. nervosa neglecta; in morbis bilioso-gastrico-rheumaticis; in cardiectasi hypertrophica cum incipiente hydrothorace; potui admiscetur ad saporem gratum; draehma semis vel integra ejus decoctis solventibus addebatur, recipiendum quoque ad pulveres aërophoros.

Rec. Acidi tartrici drachm. unam

Sacch. alb. *drachm. duas.*

M. f. pulv: div. in dos. aeq. sex.

D. sub Nr. I.

Rec. Bicarbonatis Sodaæ drachm. unam

Sacch. alb. drachm. duas.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.

D. sub Nr. II.

S. Pulvis ex Nr. I. in poculo aquae solvatur, dein addito pulvere uno ex Numero II. ebibatur sub effervescentia.

Est enim: Potus sic dictus Riverii, de quo plus sub Soda.

Rec. Acidi tartrici drachmam (v. drachm. un et sem.)

Aq. fount. libr. duas (v. libr. tres)

Sacch. alb. unc. semis (v. unc. unam).

M. D. S. Potus.

Addita Cremoris Tartari uncia una, Limonea eccoprotica ex illa Limonea tartarica emergit.

A c o n i t u m.

Extractum ad grana sex—duodecim in pilulis, pulvere interne.

*In spondylorheumate lumbari; in arthrorheumate; in catarrho bronchiorum, sub finem curae; in herpetica eruptione in cruribus, quae tanquam salutare naturae conamen considerata foveri debuit; in nevralgia brachiali: praemissis vero semper aptis remediis ad debellandum statum phlogisticum. Sub morbi decremento copiosus observabatur sudor. In anaesthesia paraplegica cum nota rheumatica, eur sequens formula nil juverit, videbis sub articulo *Electricitas, Strychnina:**

Rec. Extr. Aconiti Napell. grana tria

Sacch. albi drachm. semis.

M. f. pulv. divide in dos. sex.

D. S. Sumat ad vesperam omni bihorio pulverem unum, interpolatim cum Strychnina.

In cephalea rheumatica, cum intercurrente colica, debelata prius colica:

Rec. Extr. Aconiti Napell. grana sex

— Taraxaci scrupulum

Pulv. Liquirit. q. s. ad pilul. Nr. XV.

Consp erg. eodem pulvere.

D. S. Omni trihorio pilulae duae.

Comparuit sudor, quin immumeretur dolor. Septimo ab hac cura die propter constrictionis in præcordiis sensum suspensi et ejus loco infusum Chamomillæ dari debuit. Sequens formula

profuit in nevrorheumate erurali hypoeleptio, antemissis vero hirudinibus:

Rec. Kermet. mineral.

Extr. Aconiti Napell. *āā grana quinque*

— Liquirit. *scrupul. unum*

Pulv. Liquir. q. s. ut form. inde pilulae Nr. X.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Itidem in bronchitide eatarrhali, ad promovendam expeorationem, tussin pacandam, praemissis vero Hyoseyamo, Kermete et unguento stibiato.

Cum Hyoseyamo et Magnesia, in hydroperieardio ineipiente eum eatarrho symptomatico ex ossificatione arteriarum arthritica in haemorrhoidario:

Rec. Extr. Aconiti

— Hyoscyami *āā grana quatuor*

Carbonat. Magnes. *scrupulum.*

M. f. pulv. divide in dos. sex.

D. S. omni vespera pulveres tres.

Postea in eodem easu:

Rec. Sulf. a. Antimon.

Extr. Aconiti *āā grana sex.*

— Taraxaci q. s. ut f. pil. sex.

Conspurg. pulv. Liquirit.

D. S. omni bihorio pilulam unam.

Cum Sulfure aurat. Antimon., Calomele et extr. Tarax., in rheumatismo articulari ascerbili genu dextri in transudationem tendente, morbo jam per aliquod tempus in statu perstante, quum jam majori energia agendum esset in membranas fibrosas, inque cutim:

Rec. Sulf. aurat. Antimon.

Calomel. laevigat.

Extr. Aconiti Napell. *āā grana quatuor*

— Taraxaci *scrupulos duos*

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilul. Nr. XX.

Conspurg. pulv. eodem.

D. S. omni bihorio pilulae duae.

Cum gummiresina Guajaci, in rheumatismo chronico:

Rec. Extr. Aconiti Napell. *grana sex*

Gummires. Guajaci nativ. *grana novem*

Sacch. alb. *drachm. unam et semis.*

M. f. pulv. aeq. div. in dos. aeq. octo.

D. S. omni bihorio pulvis sumendus unus.

Ex decocto *Sassaparillae*, in luc medorrhoica cum arthritide rheumatica, praemissis *Rheo* et *Magnesia*: jam primis duobus a cura dicibus sudor evadebat de nocte copiosus, doloribus vero genuum parum immunutis, motu difficulti, nulla quoque in colli glandulis mutatione.

In unguento, contra spondylitidem lentam in individuo rachitico:

Rec. Ung. digest. unc. unam

Vitellum Ovi unius

Extr. Aconiti Napell. gr. decem.

M. exact. f. unguent.

D. S. Adplicandum plagae ex vesicante relictæ, renovandum bis in die.

A cupunctura.

Semel ad evacuandum serum in anasarca instituebatur. Altera vice cum Electricitate (Vide).

Aether aceticus.

In charactere f. nervoso, penes *Ipecacuanham*, *Camphoram*, *Valerianam*, frictiones aromat. Sed vitam revocare haud potuit.

Aether nitricus.

Spiritus nempe *Aetheris nitrici* (*Spir. Nitri dulcis Ph. Austr.*) in connubio cum *Nitro* et *Acido nitrico*, contra ascitem et anasarcam, postquam *Ferrum* et *Chininum hydrochloric.*, *Aloë*, *Squilla*, linim. sap.-camph. et ol. dest. *Junip.* adhibita fuerunt.

Aether sulfuricus.

In statu f. nervoso, abdomine meteoristica expenso, et dolore ad iliacam dextram, jam in usu vocato vesicante, et limimento sap.-camphor.:.

Rec. Aether. sulf. drachm. unam.

D. in vase probe clauso.

S. Pro frictione ad hypogastrium, consumendus binis vicibus.

Itidem in metrorrhonitide puerperali, satisfaciendo curac vitali, venter inferior ungebatur.

Spiritus Aetheris sulfurici a scrupulo semis, integro usque drachmam semis in mixturis et infusis diversis, uti *Arnicae*, *An-*

gelicae, Melissae, etc., generatim omni in morbo, quo sanguinem alacrius movendi et sensiferam vitam excitandi scopus fuit; sic in f. gastrico-biliosa cum signis adynamiae, utut praesentibus dolore et vertigine capititis, meteorismo, diarrhoea involuntaria, etc.:

Rec. Aq. dest. Foeniculi *unc. tres*
Spir. Aether. sulfur. *guttas triginta*
Syrupi Diacodii *unc. unam.*
M. D. S. Omni hora cochl. cib. duo.

Postea in casu eodem:

Rec. Iufus. rad. Arnicae mont. ex *drachm. duabus* parati
unc. decem
Col. refrig. adde:
Spirit. Aether. sulf. *gutt. viginti quatuor*
Elaeosacch. Foenic. *drachmam.*
M. D. Epicratice sumendum.

In ascite diffuso, ad vires aegrae sustinendas durante operatione:

Rec. Aq. Cinnamom. simpl. *unc. duas*
Spir. Aether. sulf. *scrup. semis*
Syr. simpl. *unc. semis.*
M. D. S. Statim.

In eodem casu, quum debilitas summa adasset:

Rec. Olei essentialis Juniperi *scrupul. semis*
Spir. Aether. sulf. *drachm. semis.*
M. D. S. Guttas quinque omni dimidia hora stillatim in frustum Sacchari.

Obsecundando indicationi curae vitalis, ad sensibilitatem nervorum sopiaendam, dolores leniendos, vitam vero irritativam, vasculorum prascertim excitandam:

Rec. Aq. dest. Cinnamom. simpl. *unc. quatuor*
Tincturae Opii simpl. gutt. triginta quinque
Spirit. Aeth. sulf. *unc. unam.*
M. D. S. Omni dimidia hora cochl. cib.

Agnus castus.

In tabe dorsali incipiente cum fiente epilepsia (ex onania). Prius adhibita jam fuerit Camphora, Chininum, Hyoscyamus, Acidum sulf., aqua Rosar., — Goulardi, Nitrum, etc., balnea,

semicupia: aderant nunc pollutiones sex circiter in die, vertigines, dolores, myrmekysmus, tremores universales, dolores ad testes.

Rec. Stipit. tenuium et folior. Vitis Agni casti drachm. tres
Inf. s. q. aq. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl. Dein ebulliant per minuta quinque; Col. unc. octo adde:

Syr. simplic. unc. unam.

M. D. S. Pedetentum sumendum.

Haec dosis Agni Casti sensim adaugebatur ad unciam.

Allium Cepa.

Succus Cepae rec. expr. ad fovendam novorum furuncularum eruptionem, qui pro salutaribus judicari debuerunt, in eezeamate ehronioe: aeger autem ob dolorem ex suceo accusatum non tulit.

Aloë soccotrina.

Succus spissatus in pilulis, pro re nata cum aliis substantiis medieatis, a grano dimidio ad grana decem bis terve de die.

Extractum ejusdem aquosum resina destitutum in solutione et pilulis, individuis sensibilioribus eadem dosi.

Forma pilularum, purgandi seopo, in cardiostenosi valvularum semilunarium praeceipue aorticarum e. hypertrophia et ectasi cordis consequutiva ex processu lithiaseos, quum purgantia fortiora indicata essent (extr. Aloës grana 12—19 intra diem consumebantur); in hepato-splenemphraxi ex febri intermittente, jam sub finem curae; in aseite diffuso e. hepatemphraxi (sed purgantia leniora majoris emolumenti evadebant).

Rec. Extr. Aloës aquos. scrupul. duos

Pulv. rad. Jalapp. scrupul. unum.

M. f. pilulae quindecim. Conspurg. pulvere Liquirit.

D. S. Sumat omni-bihorio pilulam.

Haee formula oecurrebat etiam e. Sapone medicinali.

In hydrope ascite:

Rec. Aloës soccotrin. grana decem

Rad. Scillæ marin. r. ras.

Kermet. mineral. $\overline{\text{aa}}$ grana sex

Extr. Tarax. q. s. ut f. pil. decem.

Conspurg. pulv. rad. Liquir. D. S. omni-bihorio pilula una.

In ictero febrili ob tarditatem alvi, unacum Felle Tauri, Sapone, Sale ammon., postea etiam cum prioribus et fl. Sal. ammon. mart.; quibus omnibus quum alvus nou obediret:

Rec. Infus. rad. Rhei chinens. ex drachm. duabus parati unc. octo

Extr. Aloës aquos. scrupulum.

M. D. S. Omni hora vasculum coff. semis.

In chlorosi, post usum Absynthii, Ferri:

Rec. Extr. Aloës aquos. grana quindecim

Pulv. Liquirit. q. s. ad pilul. quinque.

D. S. Sumat tempore matutino.

Menstrua inde comparuerunt.

In simili casu:

Rec. Extr. Aloës aquos. drachm. semis

— Malatis Ferri grana duodecim

Pulv. Acori q. s. ut f. pil. XXIV.

Consp. eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilula sumenda.

Addebatur huic formulae pro necessitate extr. Absynth., — Trifol. fibr., — Quass., — Centaur. min., etc.

Egregium exstitit remedium in provocandis menstruis chlorotiarum, quum post Parthenium et Boracem molimina menstrua jam adcessent (unacum pilulis V alle ti); aut postquam ope amari- cantium et aquarum Recobariensium praeparatae essent. Aloës usus in chlorosi primaria sanguine jam melioris notae et copiae parato, ejus rivum ad genitalia allexit. Pilulae hujus extracti cum Ferro sulf. in amenorrhoca c. fluore albo yicario et incipiente scorbuto in scrofulosa, sub finem curae robur addebant. Ingr diebatur quoque pilulas ex sulf. Ferr., Croco, et extr. Quassiae, in enteritide lenta c. f. interm. quotid. symptomatica et nota pel lagrosa, symptomatibus maniae.

Althaea off.

Radix in decocto ex drachmis duabus, semiuncia et drachmis sex ad col. unciarum octo, decem, librae unius; herba in infuso eadem dosi. Connubia: c. Salc ammon. c. aq. Lauroceras., Manna, c. Nitro, c. acetate Lixivae et Ammoniac., Elixir acid.

Köstl Observ.

Hall., Tamarind., rad. Polygal.; subjungebatur infusis Ipecacuanh., etc.; c. tinctura anodyna pro elystere; collutorio, epithemati inserviebat.

Rec. Rad. Althaeae unc. semis
— Gramin. unc. unam et semis
Consc. coq. c. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h.
Col. librae unius adde:
Roob Sambuc. unc. unam.
M. D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

Arridebat haec formula in variis febribus irritativis, exanthematicis, etc.

In decocto Alth. Manna lubenter solvebatur. Syrupus Althaeae forma linetus e. muc. g. arab., aq. Lauroe., vel extr. Hyose.; ad leniendam tussim et dolorem minuendum:

Rec. Mucilag. g. arab.
Syrupi Alth. \overline{aa} unc. unam
Aq. dest. Lauroceras. drachmam.
M. f. linctus.
D. S. Epicratice.

A I u m e n.

Interne forma pulveris: in pneumophthisi tuberculari, omninoesis alvinis evaeuationibus, et praemisso dee. Salep:

Rec. Alumin. crudi drachm. semis
Sacch. alb. drachm. unam.
M. exactiss. f. pulv. div. in dos. sex.
D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Continuabatur insimul in dee. Salep.

Tales pulveres, sed omni hora sumebantur in amphimerina gastrico-rheumatica in nervosam versa, vel soli, vel in connubio cum Moscho, aut cum hoc et Ipecaeuana. Etiam ex decocto Chineae c. Aledo sulf. ordinabatur Alumen erudum, in simili easu.

Externe, in linea favosa faciei ex residuis syphilidis in subiecto serofuloso, quasi sub finem curae, quum labium superius tumeret et doloreret:

Rec. Alumin. crudi *drachm.* *duas*
Tincturae thebaicae drachm. *unam*
Mellis despumati unc. *unam.*
M. D. S. Pro usu externo.

Collutorium: in isthmide phlegmonosa cum laxitate, abscessu sponte rupto, copiosa inde suppuratione, tonsilla lateris alterius leviter tumente; sic in incipiente scorbuto, ore valde foetente, in stomatitide sub finem curae propter partium laxitatem a morbo reliquam:

Rec. Inf. *Salviae ex unc. semis* parat. *unc. decem*
Alumin. crudi drachm. semis.
M. D. S. Collutorium et gargarisma.

In angina faucium sub similibus conditionibus, praemissis jam mitioribus:

Rec. Inf. *Salviae ex drachm. tribus* parati *unc. decem*
Alumin. crudi scrupulum
Mell. Rosar. unc. unam.
M. D. S. Collutorium.

In decubitu:

Rec. Albumin. *Ovi unius*
Alumin. crudi drachm. unam.
Agitentur iusimul ope cultri, donec in spumam densam abeant.
D. S. Adplicetur ad os coccygis.

Ammoniacum, i. e. Gummi-resina Ammoniacum.

Pilularum forma: in leucorrhoea a statu pituitoso pendente, pituita vero intestinali evacuata et revulsa, fluore jam decrescente:

Rec. Gummi-resin. Ammoniac.
*Extr. Myrrhae aquos. \overline{aa} scrupul. *unum**
Calomel. laevig. grana quatuor
Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilulae Nr. XX.
Consperg. eodem pulv.
D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Ex quo nunc imminutus, nunc aductus fluxus; quare ad alia consugiendum erat, i. c. ad aq. Catullianas.

In pneumonia notha Sydenhami, in statum febris nervosum

tendente: lente nimis, cum sputorum tarda coctione cedenti morbo, inter postrema unguentum stib. et pilulae ex gummires. Ammon. eum extr. Trisol. fibrini opponebantur, in plenariam aegri salutem.

Acetas Ammoniae solutus.

In febri tertiana cum hepatalgia et nota biliosa, quum manifesta adesset a tempestate humida et frigida exasperatio, et indoles simplieior rheumatica asseetionis pateret, haee infuso Tiliae e. acetate Ammon. devicta est, per copiosos sudores. In biliosa subcontinua, in intermittentem versa, erisis tarda, dolorum vagantium et iterum iterumque insurgentium supposita causa, per diaphoresin adjuvabatur eodem remedio proeurratam; in arthrorheumate, postquam per Tartarum emet. ptyalismus abdominalis et oralis productus fuerat; in tromophrenesi bibonum, quum post sumtum Tartarum emet. somnus eritius comparuisset eum sudore, hic acetate Ammoniae sustinebatur; in blennorrhoea syphilitica eum hydrargyrosi, penes usum Seopolinae: infusum Tiliae e. acet. Ammoniae. Porrigebatur ex decoeto Ononis spinos., in ascite et anasarea post febres intermittentes; ex infuso Melissae et Ipeecauanh. in charaktere febrium nervoso; ex decoeto Duleamar., in rheumatismo humeri ad reconvalescentiam tendente; ex infuso Ipeecauanh. in anaesthesia paraplegiea cum nota rheumatica, ab initio curae. Dosis a drachma una, ad duas de die:

*Rec. Infus. fl. Tiliae ex uac. semis parati unc. decem
Acetat. Ammon. solut. drachm. unam
Roob Sambuc. uuc. unam.
M. D. S. Epicratice.*

Addebat hinc inde Tart. emet. granum.

Acetas Ammoniae et Lixivae crises per urinam et sudores sustentabat, in amphimerina catarrheumatico-gastrica, in pleuritica serosa exsudatione etc.

*Rec. Dec. e rad. Gramin. uuc. duab. per $\frac{1}{2}$ hor. ad Col.
libr. uuius par. adde:
Acetat. Ammon. solut. drachm. unam
— Lixiv. sol. drachm. duas*

Syr. simpl. unc. unam.
M. D. S. Epicratice.

Votis utplurimum satisfecit.

Acetas Ammoniae solutus dilutus.

(Spiritus Mindereri Ph. Austr.)

In rheumatismo :

*Rec. Inf. fl. Sambuci ex uncia semis parati unc. decem
Col. refrig. adde :
Spirit. Mindereri drachmas duas
Roob Sambuci unc. unam.
M. D. S. Epicratice sumatur.*

Ammonium benzoicum.

In erysipelato oedematoso cum catarrho bronchiali , erysipelate fugato , catarrho saltem superstite , qui post evanescensem naturalem illam episasin potius exasperabatur , cum dyspnœa majore , sputo parciore , et oborto adhuc tumore lienis . Quum ageretur de colatorio catarrhali , cuius natura senum fere indigere assolet , in melius restituendo , Ammonium benzoicum propinabatur ; quod primo quidem cum dyspnœa tussim et sternorem adauxit , mox tamen sputa larga , vitellini coloris procuravit atque horum ope incommoda illa imminuit , adjuvante vesicatorio intra scapulas posito . Sal ammoniacus postea porrigebatur , quod vero minorem virtutem bechicam explicavit Ammonio benzoico . En formulam :

*Rec. Dec. e rad. Alth. unc. semis per $\frac{1}{4}$ hor. ad Colat. unc.
decem parato adde :
Benzoatis Ammon. solut. drachm. unam
Oxymellis scill. unc. unam.
M. D. S. Quavis hora coch. 2.*

Ammonium carbonicum.

(Carbonas Ammoniae, Alcali volatile siccum Ph. Austr.)

Interne : in scarlatina papulosa , ad sollicitandam diapneusin , non qua specificum , uti Strahl intendit , carbonatis Ammoniae drachma semis die morbi sexta dabatur , et sinapismi

plantis applicabantur. Continuatis hisce per subsequos duos dies universalis cutis rubore, prius jam cedente, papulae ad diem 9., comparente largo sudore, epistaxis et desquamationis initio ad faciem dissipabantur.

Externe forma unguenti: in tertiana dupli anomala e. hepatico-phraxy atque cardiopalmo; penes dec. Tarax. e. Sale ammon. Unguentum aromaticum ad regionem hepatis infrieabatur tempore apyrexiae. Splenitidem peritonacam e. quartana triplici recidiva, hirudines, tonico-solventia; et ung. carbon. Ammon. devieere. Hoc esse utile quoque deprehendebatur in depellendis intumescientiis mammarum in lactantibus et in duriore tumore fumando glandularum salivalium:

Rec. Ung. simpl. unciam

Carbonat. Ammoniae drachm. unam et semis.

M. f. l. a. Ungueut.

D. S. Regio epigastrica inungenda (in infarctibus).

Ammonia pura liquida.

(Spir. Salis Ammoniaci causticus Ph. Austr.)

Vide Acidum benzoicum.

Ammonium muriaticum.

(Sal ammoniacus Ph. Austr.)

*Depurat*atum: interne adjungebatur decoctis et mixturis ut plurimum solventibus, ad scrupulum, duos, drachmam semis, usque unam.

Rec. Decocti Tarax. ex unc. duabus per $\frac{1}{2}$ hor. parati libram unam

Salis ammon. depurat. scrupulum unum

Succi Liquirit. depur. scrup. duos.

M. D. S. Omni biorio vascul. coff. semis.

Hac esse formula inserviebat in splenemphraxy, in f. quartana cum hepato-splenemphraxy (Sal. ammon. dr. 2, et alternativum cum sulf. Chin. sumt.); quartana simplici e. hypocondriis elatis, sub exordio curae.

Ex decocto Senegae: in pneumonia notha Sydenh., in statum nervosum tendente; in peripneumonia et bronchitide rheu-

matico - catarrhali, quum aegra propter diarrhoeam exhaudentem viribus pene fractis in somnum tenderet: sputa inde copiosa, faciliter ejecta, et insequens levamen.

Ex infuso Ipecacuanhae: in nervosa catarrho - gastrica cum parenterite folliculosa; in typhode pneumonitica.

Ex decocto Althaceae c. aq. Laurocerasi: in pneumobronchitide catarrhali lenta, c. suspicione tuberculorum in pulmonibus: sputa inde mox evadabant mucosa, copiosa, sudore interim restricto et urina sedimentum mucosum deponente.

Ex infuso Rhei: in diarrhoea pellagrosa, cum striis sanguineis, tenesmo, oedemate.

Ex infuso Liquiritiae: in ischiade rheumatica c. nota catarrhali. Connubium: c. Tartaro emetico, in bronchitide catarrhali c. nota biliosa (dec. Gramin. c. Sal. ammon. scrup. 2, et T. emet. gr. 3); in bronchitide catarrhali simplici:

Rec. Dec. Althaeae ex unc. una per $\frac{1}{4}$ hor. parati unc. decem.

Refrigerato adde:

Aq. dest. Laurocerasi *drachm. duas*

Sal. ammoniac. depur. *drachm. semis*

Tartari emet. *granum unum*

Succi Liquirit. depurat. *drachmam unam.*

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Cum pulpa Tamarind., in febri catarrhosa - nervosa; cum Cassia in diarrhoa pellagrosa; c. muriate Chininae, in f. intermittente anomala c. hepato - splenemphraxi. In scirro ad pylorum sequens formula incassum ordinabatur:

Rec. Extr. Gramin. liquid. unc. semis.

Solve in:

Aq. dest. Foeniculi *unc. sex*

adde:

Hydrochlorat. Ammoniae depurat. *scrupulum*

Aq. dest. Laurocerasi *drachm. tres*

Syr. simpl. *unc. unam.*

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Externe, pro clysmatibus, et cataplasmate; et quidem in enteralgia flatulenta febrili cum accidente hydrope ascite; persistabant flatus et ructus, sed dolores ventris nulli.

*Rec. Dec. Hordei ex unc. duabus parati unc. quatuordecim
Muriat. Ammoniae depur. unc. semis.
M. D. S. Pro duobus clysmatibus.*

Sed status idem permansit.

In syphilide locali. Bubo suppurans aperiebatur, ope lini carpti ineisio aperta tenebatur, ut prius libera fieret exeretio, et superimponebatur cataplasma emolliens. Exeretio dein puris semper minor, durities quaedam perstabant in margine externo; quare:

Rec. Farin. semin. Lini libram

Coque ad consistentiam cataplasmatis, dein probe agitando admisce:

Muriat. Ammon. dep. drachm. tres.

D. S. Adplicandum supra bubonem incisum.

Durities exinde evanida, et nulla amplius puris exeretio.

Ammonium muriaticum martiatum.

(Flores Salis Ammoniaci martiales Ph. A.)

A granis quinque, deceem, ad scrupulum in solutione vel pilulis. In eatarro pulmonum eum cardiectasi dextra passiva et stenocardia; dupli seopo respondere debebat sequens:

Rec. Fl. Sal. ammon. mart. grana sexdecim

Extr. Taraxaci q. s. ad pil. Nr. XVI.

Consperg. pulv. Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Hepatemphraxin eum lienis hypertrophia a febris intermit., solventia tonica, ac praeceipue dein flores Sal. ammon. mart. tollebant; qui egregie conducebant in aseite diffuso et hepatemphraxy, postquam Tartarus emet. dosi refr., dein Aethiops antim. praecessissent.

Connubia: e. cort. Peruviano in arthrorheuniate e. dyserasia lymphatiae; haec unaeum dyserasia rheumatiae pro parte, per quantum lieebat, corrigebatur; idem connubium profuit in melanehlorosi amenorrhoe, praemissis vero remedii mitioribus; eum sulfate Chinin. in f. intermitt. tertiana e. hepatemphraxy; connubium non inconsuetum initit eum Sapone, extr. Aloës, Rheo, Felle Tauri insp., etc.

Rec. Flor. Sal. ammon. mart. scrupulum

Extr. cort. Peruv.

— Trifol. fibr. \overline{aa} drachm. semis

Pulv. Calami aromat. q. s. ut f. pil. pond. gr. duorum.

Conspurg. eod. pulvere.

D. S. Omni bihorio pilulae tres.

Rec. Fl. Sal. ammon. mart. scrupulum

Muriat. Chinin. gr. decem

Extr. Tarax. q. s. ut f. pil. Nr. X.

Consp. pulv. Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Ex decocto Taraxaci, in intermittente quartana c. hepato-splenemphraxy, cessante febri per Salem ammoniacum, dolor hepatis fere penitus ablatus etiam sub attactu fuit, ope:

Rec. Decocti rad. Taraxac. ex unc. duabus parati libram

Fl. Sal. ammon. mart. grana quindecim

Extr. Gramin. liquid. drachm. tres.

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Amygdalae dulces.

Emulsio, vel simplex, uti pro potu, vel pro medicamine in variis febribus irritativis, in oesophagitiide; vel c. aq. Laurocerasi in haematuria renali; in cordis palpitationibus et insultu epileptico; in nephrocystitide ex usu Cantharidum:

Rec. Amygdal. dulc. excort. drachm. sex

F. l. a. Emulsio c. aq. font. libra una

Col. adde:

Sacch. alb. drachm. sex.

D. S. Epicratice sumend.

Eadem formula cum Nitro, aq. Lauroc. drachm. duabus aut tribus, cum extr. Hyoseyam. granis tribus quatuorve, vel etiam cum mucilag. gummi arab. unc. una, in inflammationibus thoracicis, etc.

In angina faucium optime conduxit:

Rec. Amygdal. dulc. excort. unciam

Tere in mortario vitro, sensim sensimque adjungendo:

Aq. commun. libram

Colatura adde:

Mucilag. g. arab.

Sacch. alb. \overline{aa} unciam.

M. D. S. Omni dimidia hora vascul. coff. semis.

Oleum Amygd. dulc., interne:

Rec. Olei Amygd. dulc. rec. press. unciam unam

Pulv. g. arab. q. s. ad subactionem

Syr. simplicis unciam unam et semis

Perfecte contritis sensim affunde:

Aq. commun. libram unam.

M. D. S. Omni hora vasc. coff. semis.

Eadem formula cum aq. Lauroc., Opio, extr. Hyoso., Nitro, etc. C. acetate Morphii in laryngo - pneumophthisi tuberculari:

Rec. Olei Amygd. dulc. r. pr. unciam semis

Syr. simpl. unc. unam

Mncil. gummi. arab. q. s. ad subactionem

Conterendo adde:

Acetat. Morphii granum semis.

M. D. S. Agitata lagenula, omni bihorio cochl. coff. unum.

Emulsionem spuriam cum oleo Ricini vide sub *Ricinus*.

Interne oleum Amygd. adhibebatur ad illiniendas partes excoriatas et inflammatas. Illinitio instituebatur partis capillatae, in tinea capitidis, eruptionum aliarum scrofulosarum totius corporis, in ichthyosi squamosa, crustarum, quae inter omnes magis siccae sunt, in tinea scutulata, etc.

Amylum.

Pro excipiente in pulvcre Auri, Morphinae, nec non ad pilulas ex Mercurio sublim. corros. consciendas; inserviens quoque in aqua fervida solutum pro clystere. Connubium cum protojodureto Ferri vide.

Angelica.

A drachma una et semis ad drachm. duas in infuso unacum fl. Arnicae, in statu febrium adynamico - nervoso:

Rec. Rad. Angelicae

— Arnicae $\frac{ii}{ii}$ drachm. unam (— duas)

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Camphor. subact. grana tria (— sex)

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. dno.

Addebantur etiam huiccc formulae unciae duae tinct.
Rhei aquos.

Anisum stellatum.

Infusum ex drachmis duabus, unacum Rheo ; scopo purgante,
in affectionibus lentis pituitosis, licet raro :

Rec. Rad. Rhei chin. r. t.

Semin. Anisi stellat. $\overline{u\bar{u}}$ drachm. duas.

F. l. a. infus. ferv. aq. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde :

Elaeosacch. cort. Aurant. drachm. duas

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Aqua communis simplex.

1. Frigida. Interne. Potus aquosus , qualem aegri sitiabant, frigidulus, egelidus etc.; cum nihil obstaret, quod potum alium indiearet, aut cum aegros omnis alterius potus taederet. Affatim in febribus concedebatur.

Externe. Aqua egelida facici aut pectori inspersa, in accessu cardiaco in syncope; injectiones frigidae in vaginam in leucorrhœa a statu pituitoso pendente; eaedem in amenorrhœa cum statu irritativo partium genitalium; lotiones frigidae cum aqua communi, ad genitalia et spinam dorsalem, in tabe dorsali incipiente; clysma, in enteralgia flatulenta febrili. Fomentationes capitis frigidae, in encephalo-meningitide, etiam in statu febrium nervoso, sed non indistinctim; epithemata frigida collo applicabantur in angina, pectori in haemoptysi, abdomini hinc inde in peritonitide (traumatica), lumbis in lumbagine diastatica etc.; fomentationes frigidae, vulnerum ex hirudinibus relictorum, in phlebitide femorali; eaedem, plagae per ferrum candens factae, in spondylarthroceace.

Embrocatio. In kyphosi cum tumore dorsuali (abscessu frigido) e carie vertebrarum probabiliter ob aortae anevrysma nata frigidum embregma tumori gibboque immittebatur, ut sic (pens VS., hirud., Digital.) processus suppurationis restringeretur, resorptio aliqua sollicitaretur, et volumen fors etiam anevrysmatis imminueretur. Multo post, punctione instituta, et pure

sensim evacuato lymphatico, in stillis frigidis continuabatur, ad optatum, quo par erat, esse etum.

Fomenta frigida ad frontem, usque dum sudor febrilis adpareret, in quotidiana biliosa, praesente photophobia et susurru aurium; itidem, in codeni casu, quum paroxysmus a frigore forti horam durante exorsus esset, atque deinceps calor vchmens cum symptomatibus gravioribus congestionis cephaliae succedret, fomenta frigida ad stadium usque sudoris admota tenebantur sedulo. Aqua cum glacie pro pediluvio, in peripneumonia rheumatico-biliosa e. dilatatione arcus aortae.

2. Glacies. Interne. Frustulatim ore sumebatur, in biliosa subcontinua, quum sitis in frigida, anorexia, vomitus ab ingestis, pondus ad scrobum cordis etc. terrorerent; in cholera epidemica; in bronchitide lenta c. nota verminosa, ob vomitum; in haemoptysi pneumo-bronchiali activa e. aortcetasi; in enteralgia flatulenta; in metrorrhitonitide puerperali. In typho intestinali c. exanthemate miliari, aqua frigida e. glacie potui inserviebat.

Semicroupia, post etiam syp honi smus et quidem primo semel, serius ter de die in tabe dorsali cum flente epilepsia, quum post medicamina sumta et balnea adhibita status idem maneret.

3. Aqua tepida. Epithemata calida supra abdomen, quum diarrhoea cum doloribus iliacis pro exulceratione intestinali non iniquc deponchat; fomenta tepida (et elysmata), vix finito crustularum cornearum lapsu, dolor hypogastri adventans, sub defaecatione et mictu acerbior haud aliis remediis depulsus est, in varioloide.

Balneum universale tepidum. In nevrorheumate femoris hypoplectico, sub sinem curac; in zosterie scmicircinato trunc; in scabie sicca, scabie herpetica, herpete papuloso, ichthyosi squamosa, pellagra, cezemate chronico; in paresi agitante mercuriali; in prurigine scuili (practer diactam blandam balnea simplicia prae aliis utilia comprehendebantur); in syphilide locali; in syphil. universali, sub schemate dolornm osteocoporum, condylomatum et mentagrac pustulosac; in tabe dorsuali incipiente balneum ad gradum R. 15; in statu febr. nervoso; in febri gastrico-rheumatica e. praevalente affectione spinae dorsalis, superveniente metastasi ad cerebrum ad statum nervosum trans-

eunte; ad cutim madidam reddendam atque diaphoresin promovendam. Cum tamen latens tubi gastro-enterici inflammatio in aliquo casu adesset, sub usu horum balneorum, quae ab auctori-bus Raimann et Hildenbrand valde convenientia in febri ad nervosum characterem tendente praedicantur, cautela opus erat, nec 24 gradus Réaum. superandi. In quotidiana intermit-tente atonica, ad stadia febris complenda, et quidem ad sudorem provocandum, balnea universalia tepida horis apyrexiae quotidie ordinabantur. De balneis electricis vide articulum. Alia balnea, artefacta dicenda, patebunt penes singula remedia cum illis adhibita, uti est Sapo, Sulfur, etc. Vide *Electricitas*, quae aegro in bal-neo universalis applicabatur.

Pediluvia tepida. In dysmenia, in menstruorum molimini-bus v. primitiis, in pneumonorrhagia, etc. (de pediluviis compositis valent, quae nunc de balnacis universis dicta sunt).

Balnea vaporis. In arthrorheumate, in chronicum decursum vergente, accidente catarrho bronchiali. Quum omnia abs-que ullo fructu tentata essent, major utilitas palliativa e cerato Opii et balneis vaporis habebatur, quae cooperante vel maxime vernali tempestate, sudores procurarunt, dolores lenierunt, tus-simque sugarunt. Apparatus adhibebatur qui delineatur et de-scribitur in opusculo: F. W. Lippich, Beschreibung eines Wärme- und Dampfbadapparates etc. Laibach, 1831. Vaporum in-halatio, in pneumophthisi tuberculari obveniebat simplex, com-posta, c machina Mudgeana aut ope coni chartacei rigidi.

Aquae sulfureae Aponenses.

1. Aquae thermales (Ad scaturiginem + 65° R.). In arthro-rheumate in chronicum recursuni vergente; postquam multum emendata foret aegra 62 annor., et per quantum licuit, dyscra-sia lymphatica et rheumatica, correcta, tandem tum a dyscra-sia, quam a diuturnitate mali domi contraxit, tum ab omni fere dolore sub aestatis finem egregie liberata est. In herpete papu-loso, quum post usum aquarum Rainieri, carburectum Ferri, balnea simplicia, lotiones ex Nicotiana, cutis etsi tensa, tam-en minus arida tangretur atque aspera, sudorque semper ad-esset, praesertim de nocte:

*Rec. Aquarum thermalium Aponens. q. s. nt aequali aquae
Inviatilis portione commixtum sufficiat pro balneo uni-
versali instituendo temperie 28° R.*

Ab hooeee balneo cutis actio intendebatur, unde sudor copiosus. Pluribus exinde progredientibus diebus linea phasi decrescente, diligente instante eura, corporis superficies undique ex deedentibus crustis nitida, traetabilis madidaque eveniebat; tensio tamen et durities in corii textu rebellis tangebantur, ita ut Zinei Vitriolum in auxilium voeari debuissest. Hic notandum venit, quod ad praecriptionem pro aegris Nosocomii civilis Patavini, quo et aegri scholarum cliniearum referuntur, quotidie inde a 1. Maji usque ad Septembrem, aqua tum thermalis, tum lutum harum aquarum, Apono advehatur, quod cum ab urbe Patavina aliquot tantum milliaribus italieis distet, tanto adhue calore seatet, ut refrigerari per aliquod tempus, uti et aqua ipsa, debeat.

2. Lutum thermale (Ad locum, ubi provenit + 50° R.). In apoplexia laterali sanguinea (probabiliter effusoria). Aegra 48 annos nata, etiamsi motus et sensibilitas non perfecte illieo in ipso hoc rediret artu, tamen utcumque restituta dimitti potuit, ut coeni thermalis Aponensis usum dein faceret: ex istius virtute paulo post egregie sublevata exstitit. Levissima remanens paresis redeunte aestate coeni ejusdem repetitionem indicavit. Quod ex tumore (alio in easu) ad museulum deltoideum post antiphlogistieam curam manus residuum, luto eodem pro desiderio eessit. Ad emeliorationem anaesthesiae paraplegiae eum nota rheum. contribuere quam maximum Electricitas, lutum Aponense caloris graduum 27 R. de die in diem sensim sensimque augendi, sed et tempus aestivum.

3. Aquae sulf. Rainerianae ad vieum Acosta pone Aponum frigidulae seatuentes adhibebantur potae in pneumophthisi tuberculo - ulcerosa; in lichene; in herpete papuloso, penes usum Graphitis.

Rec. Aq. sulf. Rainerian. libram unam.

S. Sumatur mane.

Dosis Aquarum, quae in adparatum digestionis et in entim quoque egerunt, sensim augebatur ad libram unam et semis, et denuo ad libras duas. Sed thermis Aponensibus adhuc opus erat.

4. *Aqua St. Danielis* proxime ad Aponum frigidae scaturientes adhibebantur in eczematice chronicis universali:

Rec. Aq. St. Danielis libram unam.

S. Sumatur mane ventriculo jejuno.

Serius vero balnea ex liquore hydrosulfuretico in usum tracta fuere. In scrofulosis pulmonum aut glandularum bronchialium tuberculis, praesertim cum statu adhuc aliquo subinflammatorio decurrentibus, aqua S. Danielis, utpote mitior, Rainieriana praeferebatur, haec vero in impetiginibus priori superior erat. Caeterum omnes hae aquae Euganeae, sive thermales callidae; sive frigidæ potabiles, Sulfur minori tenent quantitate, et naphthae, uti Prof. Ragazzini comperit, nuptum, alias vero salem marino similem, Jodo et Bromo mixtum.

Aquae salino - martiales Catullianae (pone Recobarium).

Interne, cum vel sine lacte sumptae; in hepato - splenem - phraxi ex febre intermittente, sub finem curae:

Rec. Aq. Catullian.

Lactis vaccin. $\frac{aa}{aa}$ unc. tres.

M. D. S. Sumat una vice.

Vel: *Rec. Aq. Catullian. unc. tres.*

S. tribus vicibus interne sumendae.

Et quidem in leucorrhœa a statu pituitoso pendente, post evacuatam pituitam, post Myrrham et Calomel, fluxu tamen adhuc perstante. In tertiana duplice cum epigastralgia et oligemia, epigastralgia vero et febri omni ex parte abactis, cruris et totius massae organicae melioris elaborationis augmentum obtinebatur et unacum salus. In amenorrhœa cum fluore albo viciario et incipiente scorbuto in individuo scrofuloso, praemissis purgatis, Rheo, amaris, acidis mineralibus et China. In blennorrhœa syphilitica cum hydrargyrosi, hac vero abacta, contra illam aquarum Catulli libra una quotidie consumebatur. Usus adhuc in melanchlorosi amenorrhœide.

Externe quoque adhibebantur, pro injectionibus primum ex aqua frigida, dein ex parte acqua Catulli et aq. communis, in leucorrhœa superius mentionata: fluxus (penes usum internum) sensim imminuebatur, color cutis leucophlegmaticus

disparere incepit, viribus sese redintegrantibus. Sed cura confirmari adhuc fortioribus debuit.

Aquae acidulo-salino-ferruginosae Recobarienses.

Interne et externe. In eodem casu, quem penes tetigimus, in blennorrhœa syphilitica scilicet, post usum aquarum Catullianarum.

Rec. Aquar. Recobariens. libram unam et semis.

S. Omni mane libram unam, caeteram dimidiam misceat cum aqua frida, pro lotionibus.

Sed blennorrhœa in eodem statu permansit, usque dum ad aquam Goulardi et vesicans recurreremus. Usus internus adhuc: in pellagra jam ad finem curac. In chlorosi secundaria, jam melius valente aegra, et antemissis amaris, aquarum Recobar. libra et mox librae duae quotidie sumtae optime conduxerunt, excepto fluxu menstruo, qui Aloës ope sollicitabatur. In hypertrophia cordis cum dilatatione atriorum, aortectasi et hydrope secundario, penes usum sulfat. Ferri, Digitalem et Juniperum, aquarum Recobar. libra ad mane praescripta non bene ferebatur. In cardiectasi passiva, et congestione hepatis venosa, hirudines ad anum, et aquae Recobar. valetudinem procuravere. Individuum quoddam hystericum ab arthorheumate per tinturam Colchici, et per aquas Recob. liberabatur. In phthisi evoluta, in statum alterum propendente cum phlogosi lenta pulmonis atque indicatio quoque pro hisce aquis erat.

Aqua maris Adriatici.

Admodum conveniens, certis sub conditionibus, suadebatur serofulosis, phthisicis; et quidem balnea ex aqua maris, tepida, frigidiuscula, simplicia aut similiter cum algis Venetarum lacunarum cocta, stillicidia, lotiones etc. ex his thoraci, collo, cum frictionibus, aut sine iis factae. Ad phthisin et serofulam sanandam ope algarum et aquae maritimæ usus, non parum contribuit aër ipse marinus, climatis Venetiarum salutaris influxus; de cuius encomio, circa hoc argumentum plura vide in F. G. Lippich, adversaria med. clin. Ser. II., Fasc. II. pag. 162 et seqq. Singulari modo profuit clima Venetiarum et

balneum maris in aegro milite a scrofula blennorrhœica penitus restituendo.

Per transennam memorandæ adhuc exstant aquæ Bohemiae amarae in haemorrhoidibus, obstructionibus alvi, prosopalgia, etc. (unacum aliis remediis); et in specie aquæ Seidschützen-ses, in scrofula et pulmonum tuberculosi. Selteranae aquæ in catarrho laryngis chronicæ adhibitae sunt, jam puræ, postea lacti unitæ.

Argentum nitricum.

(Nitratas Argenti, Lapis infernalis Ph. Anstr.)

Interne, in epilepsia cum intercurrente quotidiana, quum post usum decocti Taraxaci infuso Chamomillæ nuptum, in epilepsiam directe agendum et quidem fortiter esse censeretur. Adhibebatur nitratas simplex, aut acidulus (binitras):

Rec. Nitrat. Argenti grani ¼ partem

Solve in

*Acidi nitrici diluti guttis duabus
adde:*

Aq. destill. comm. unc. quatuor

Syr. simpl. unciam semis.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Potus largi mucilaginosi sedulo hauriendi suadebantur.

Quum vero de nocte ardorem ex medicamine experiretur aeger, dosis ad dimidium restringebatur.

Dosis Acidi nitrici sensim augebatur ad guttas octodecem, et nitratis Argenti ad granum semis intra diem. Per dies aliquot febri concomitanti opponebatur sulfas Chininae solutus in Acido sulf., sed illico post remedium superius resumebatur. Accessus in decursu hujus medicationis epilepticus ad prodroma potius non nisi accedebat, tum intensitate, tum numero phænomenorum ac duratione, initio per aliquot minuta acerum corripiens, dein vero frequentius, sed tempore minori perdurans, practerea sub plenilunio saevior factus, mitescens contra ratione regrediente. Nullæ lysæ. Aeger oxire optabat. Cum admodum probabile sit, nitratem Argenti in ventriculi succo, in quo vix non semper Acidum muriaticum saltem efficiens, aut liberum adest, destrui, et in muriatem Argenti haud solubilem abire, tentamina potius cum

hydrochlorate Argenti, ope abundantis Acidi hydrochloriei et Ammoniae solubili reddito institui decernebantur*).

Frustulum nitratis Argenti externe adhibebatur ad ustionem ulceris venerei; ad tangenda ulcera luxuriantia, praesertim scrofulosa; ad exstinguendam in primis initia seabiem, et ulteriore evolutionem impediendam. Cura enim scabiei prophylactica consistebat, ut primum aliquae papulae pruriginosae conspiciebantur eorum, qui scabiosos incaute tractarunt, in prompta earum per Lapidem infern. destructione, quo facto, et altera, aut tertia vice iterato, diffusio morbi felieiter praepediebatur. Crustae in tinea scutulata jam magis exsicatae, non dolentes, sed nimia pollentes vegetatione, ope Lapidis infern. sensim sensimque complanabantur:

Rec. Lapid. infernal. drachmam semis.

D. Calamo scriptorio exceptus et charta cerata obvolutus.

In erysipelate lymphatico proserpente eruris et faciei; ut ulterior propagatio arceatur, frusto Argenti nitrici fusi linea ducebatur in eute sana, in aliqua ab erysipelate distautia.

Haec methodus ab etiologia Anglorum aliquorum, qui totam plagam erysipelaceam sic tangunt, satis diversa est.

Arnica.

Infusum aquos. servidum radicis aut florum, interne ex draehma una et semis, sensim ad drachmas tres et semis pro colatura une. oeto, deem. In progrediente statu febrium nervoso, imminenter colliquativo:

Rec. Flor. Arnic. mont. drachm. unam

Inf. s. q. aq. serv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Pedentim.

Eadem formula, in cephalaea rheumatiae feminae hysteriae, dolore aliquid jam imminuto ope vesicantis ad nucham, et Morphii acetici methodo endermatica appliciti. Continuabatur Arnica per dies quatuor, unde emendatio, sed sub ulteriore ad-

*^o) Talia experimenta in Clinico Vindobonensi 1842 contra epilepsiam institui cooperunt.

huc Arnicae usu sensus ponderis ad scrobleulum cordis et conatus ad vomitum: quae symptomata medicamine suspenso et potui limonato cedebant. Dolor vero capitis, Arnica licet iterum sumpta, denuo recruduit. Similis cephalea rheum. fere eodem modo, sed et cum Aconito tractata penitus evanuit.

Connubia. Cum Camphora, in f. gastrica c. nota catarrhali rheum. in nervosam lentam transgressa, cum exanthemate aphthoso in tractu intest. et cavo oris; c. Spir. Aeth. sulf., in febri gastrico-biliosa; c. Senega (ob tussim); c. Valeriana.

Rec. Flor. Arnicae mont. drachm. duas

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Acetat. Ammon. solut. drachm. unam

Elaeosacch. cort. Aurant. drachm. duas.

M. D. S. Omni bihorio coch. 2.

Asa foetida.

Interne, in pilulis. Cum Ipecacuanha et Opio, in gastro-arthralgia nervosa afebrili; in hypochondriasi cum incipiente cordis dilatatione passiva, quum pulveres Doweri non sufficissent ad dolores pellendos:

Rec. Pulv. Gummi-resin. Asae foetid. drachm. unam

— rad. Ipecacuanh.

Opii puri \bar{aa} grana tria

Extr. Taraxaci q. s. ut f. pilulae Nr. XX.

Consperg. pulv. Liquirit.

D. S. Omni trihorio pilulae duae.

Cum Jalappa, in helminthiasi cum congestione menstrua:

Rec. Gummi-resin. Asae foet. drachm. unam

Pulv. rad. Jalapp. grana quindecim

Extr. Taraxaci q. s. ut f. pil. Nr. XXX.

Consperg. pulv. Liquirit.

D. S. Omni hora pilulae duae.

Simili modo parabantur pilulae c. Calomele; c. extr. cort. Chin. reg.; c. extr. Absynth.; c. extr. Valerianae.

Cum fl. Zinci et Hyoscyamo, in asthmate (cum verminatione) nervoso stipato a cordis ectasi ac hypertrophia simul cum pulmonum emphysemate (Vide *Morphium acet.*), magno cum emolumento ordinabatur:

*Rec. Gummi-resin. Asae foet. drachm. unam
 Flor. Zinci scrupulum semis
 Extr. Hyoscyami nigr. grana octo
 — Liquir. q. s. ad formandas pilulas granorum
 trium numero XXX.*

Consp. pulv. Liquir.

D. S. Omni bihorio pilulae quatuor.

Cum extracto Gentianae (vide *Gentiana*). Cum Jalappa, Gummigutt. et extr. Taraxaci, in febre verminosa cum menosymphoresi incipiente, febre jam deliteseente.

Forma emulsionis, in convulsionibus propter simulationem suspectis, qua medicina sumptu ingratissima (penes diaetam austera et severum regimen):

*Rec. Gummi-resin. Asae foetid. drachm. unam
 Subige cum vitello Ovi; bene subactis sensim sensimque
 affunde:*

*Aq. commun. unc. octo
 adde:*

Sal. ammoniac. depur. drachm. unam

Mucilag. gummi arab. unc. duas.

M. D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Externe, forma clysteris; in statu nervoso, quum alvus non mota esset:

*Rec. Decociti Hordei l. a. parati unc. decem
 Gummi-resin. Asae foetid s. q. vitell. Ovi subact.
 drachmam unam
 Aceti Vini optimi unc. semis.*

M. exactissime.

S. Clyisma.

Quum alvus adhuc nulla secessisset, sequens:

*Rec. Gummi - resin. Asae foetid. drachm. tres
 Vitell. Ovor. q. s. ad subactionem,
 affunde:*

*Aceti Vini optimi. unc. unam
 adde:*

Mell. commun. unc. duas.

M. exactissime.

S. Pro duobus clysteribus intervallo unius horae.

Sub initio curae encephalo - meningitidis c. nota verminosa:

Rec. Gummi-resin. Asae foetid. drachm. unam

Subige c. vitello Ovi, et suspende in:

Aq. calid. commun. unc. sex

adde:

Mell. commun. unc. unam.

M. D. S. Enema tepide injiciendum.

In pleurodynia cum nota verminosa, simplex enema ex gummi-res. As. f.; præmisso jam incassum enemate ex Lacte, et secessis inde lumbricoidibus :

*Rec. Gummi-res. Asae foetid. vitello Ovi unius subact.
drachm. unam*

Suspende in:

Aq. calidae unciis octo.

M. D. S. Ut supra.

Aurantium.

Succus Mali Aurantii potui grato, resistenti inserviebat in variis febribus irritativis, ac statim præprimis tempore :

Rec. Aq. commun. libr. duas

Succi Mali Aurant. unc. unam

Sacch. alb. unc. unam et semis.

M. D. S. Potus.

Infusum cort. Aurant. parabatur ex drachmis tribus, quatuor; c. g. in scorbuto :

Rec. Flaved. cort. Aurant. drachm. tres

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Elixir acidi Halleri drachm. semis.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Idem infusum unacum Rheo locum habuit, in febri gastrica, ad firmandam convalescentiam, ut ex innocentia illo stimulo quamdam recreationem et quoddam alacrioris vitae incitamentum nervi vegetationis animalis persentirent; itidem in catarrho intestinorum aphthoso egregie se præstítit inf. Rhei et cort. Aurant.: ex quo diarrhoea et aphthæ disparuerunt, et urinæ sedimentum lateritium mucosumque deposuerunt.

Syrupus cort. Aurant. in infusis nec non decoctis, e. g. ex infuso Rhei, in cholera orientali, ob symptomata dyspepsiae, etc. etc. (Vide *Cascarilla*)

Elaeosaccharum cort. Aurant. quammaxime diversis in pulveribus, in infusis, mixturis, ad drachm. semis, unam, duas.

Extractum cort. Aurant. ad drachm. scmis, c. g. in chlorosi primaria:

Rec. Infusi rad. Rhei chinens. ex *[drachm. una et semis parati unc. decem]*

Col. adde:

Extr. cort. Aurant. *drachm. duas.*

M. D. S. Omni hora cochl. cib. tria.

Aqua florum Naphae. Vide *Baryta muriatica*. In tibe mesenterica, cum debilitate summa, pulsibus frequentibus, debilibus, febrilibus, summum insequutum est levamen ex:

Rec. Aq. dest. fl. Naphae *unc. quatuor*

Elixir acid. Halleri *gutt. viginti*

Syr. Rubi Idaei *unc. unam.*

M. D. S. Omni hora cochl. cib. unum.

Addebat quoque huic mixturae tinctura robor. *Whyttii*.

Auripigmentum.

Profuit in catarrho laryngis cum hydrargyrosi in epileptico (ex syphilide); praemissis unguento stibiato. Dosis sicut ab initio grani dimidii, deinde sensim aucta ad gran. unum, unum et dimidium de die:

Rec. Auripigmenti *gran. unum*

Sacch. albi *drachm. unam.*

M. f. pulv. div. in dos. sex.

D. S. Omni bihorio p. unum.

Aurum muriaticum natronatum,

s. Murias Auri et Sodaet.

In ostco-adenitide serofulosa cum zostere ligulari; praemissis Rheo c. Magnesia, empl. mercur. c. Cicut., Centaur. min. c. extr. Absynthi., et cort. Peruviano:

Rec. Muriat. Auri et Sodaet *granum semis*

Sacch. alb. *scrupulos duos*

M. exactiss. f. pulv. div. in dos. tres.

D. S. Margini linguae et gingivis intra diem singuli pulveres infricentur.

In syphilide inveterata facici:

Rec. Muriat. Anri et Soda gran. semis

Amyli scrupulos duos.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. quatuor.

D. S. Pro frictione in labii oris superficie interna.

Axungia porci.

Bene abluta, nec rancida unguentorum diversorum corpus constituit, et ad emplastra recipiebatur; hoc pertinet ungumentum simplex, quod penes dec. solventia, diaphoretica suscit ad plagas ulceratas adplicatum, rupiae febrili sanandae.

Ballota lanata.

Herba (et radix) praescribebatur in infuso, vel et in infuso-decocto ex unc. semis, ad colaturam librae. In hydrope ascite, quum post usum ung. neapol., linim. sapon. - camph. et extr. Squillae urinae adhuc parcae fluenter, sudores nulli observarentur, tumorque abdominis augeretur magis tensi duriorisque :

Rec. Herb. Ballot. lanat. drachm. tres.

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. octo detur.

S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Sed nullum inde aeger persensit levamen, uti etiam e sequenti formula:

Rec. Herb. Ballotae lanat. unc. semis.

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.

Residuum coque p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. octo adde:

Roob Juniperi unc. semis

Oxymell. squillit. unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Altera adhuc fuit occasio praescribendi Ballotam in ascite et anasarca post febres intermittentes, sed incassum: nam mors est insequuta. Vix merito credimus hoc remedium a cel. Brera tantis encomiis cumulatum esse.

Balsamum Copaivae.

In catarrho febrili vesicac cum rheumate diffuso (ex blennorrhoea syphilitica), remissa jam febre et secrecione mucosa no-

tabiliter iusfracta. Nubebatur quoque sulfuri aur. Antim., in pilulis.

Balsamum Opodeldoc.

Vide sub *Camphora*.

Bardana.

Decoctum ex semiuncia vel integra radicis, ad colat. librae unius; in impetiginibus variae indolis, in prurigine senili, in syphilide:

Rec. Rad. Bardanae unc. duas

Consc. coq. p. $\frac{1}{2}$ h. Col. librar. duarum adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Pro potu.

Rec. Rad. Bardanae unc. unam

Consc. coque c. s. q. aq. c. f. p. $\frac{2}{4}$ h.

Sub finem coctionis infunde:

Rad. Liquirit. consc. unc. semis.

Stent in digestione p. $\frac{1}{4}$ h.

Colatura librae unius exhibeatur.

S. Omni hora vascul. coff. unum.

Baryta muriatica, seu Murias Barytae.

Solutio et pilulae. A sexta grani unius (vel et minori) parte sensim sensimque ad grana duo, bis terve de die ascendebat, et in casu tabis serofulosa grano uno quotidie augendo dosim, grana tandem undecim intra nycthemeron propinabantur.

Rec. Aq. commun. dest. unc. sex

Muriat. Baryt. granum semis

Mucilag. gummi arab.

Syr. Diacodii \overline{aa} unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Locum habuit Baryta muriatia in serofula rebelli; tabifica (mercuriali); in atrophia cum intercurrentibus inflammationis lentae gastrentericae et mesentericae signis, inflammatoriis symptomatibus utcunque devietis.

Rec. Muriat. Barytae gran. semis

Extr. cort. Peruvian.

— Quass. \overline{aa} scrupul. semis

Pulv. cort. Peruvian. q. s. ut f. pil. Nr. XII.

D. S. Omni bihorio pilula una.

In laryngo - pneumophthisi tuberculari, antemisso Sphaerococco criso, aq. Calcis, ung. ciner. c. extr. Conii methodo endermatica adplicito; doloribus vero in abdomine valde molestantibus:

Rec. Aq. dest. commun.

— fl. Naphae \overline{aa} unc. duas

Hydrochlorat. Barytae gran. unum

Mucilag. g. arab.

Syr. simpl. \overline{aa} unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

Sed mors est insequuta.

Belladonna.

Extractum interne in pulvere, in ictero febrili, praecessis solventibus, Rheo:

Rec. Extr. Belladonn. grana duo (tardius gr. tria)

Sacch. alb. drachm. duas.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. octo.

D. S. Omni bihor. pulv. unum.

Cum sulfure aur. Antim., in tussi convulsiva (ex refrigerio), ope dec. Alth. c. aq. Laurocer. multum mitigata, sed adhuc molestante, sequens cum emolumento ordinabatur:

Rec. Sulfur. aurat. Antimon. grana quatuor

Extr. Belladonu. gran. unum

Sacch. alb. drachm. duas.

M. f. pulv. div. in doses aeq. xij.

D. S. Omni hora pulv. unus.

Pilularum forma. In hepatalgia:

Rec. Extr. Belladonn. grana duo

— Taraxaci grana duodecim

Pulv. rad. Liquirit. q. s. ut f. pil. octo.

D. S. Omni bihor. pil. una.

Ex pilulis extr. Bellad. unacum hydriodate Potass., mox emendatio sequuta est in metroparctamate cum menorrhagia symptomatica. Copulam quoque extractum Bellad. initit cum sulfate Chin., in bronchitide convulsiva.

Solutio extracti ad sanationem theomaniac furiosae, unacum praemisso Tartaro emet. ad saturationem usque porrecto, optime contulit:

Rec. Aq. dest. Lauroceras. unc. unam

Extr. Belladonn. grana quatuor.

M. D. S. Omni bihorio guttae 30 sumenda.

Belladonna multum contribuit ad fugandam nevralgiā plexus hepatici: algema enim hepatis stricte in loco retro cystidem felleam eminebat, per aecessus veniens, interstitiisque perfecte a dolore vaevis, per tres menses jam durans, non obediens curae antiphlogisticæ, derivanti, eeeoproticieæ, Conio maeulato. Pneumo-eatarrhus febrilis chronicus, sed praecunte alia eura; nevralgia braehialis a zoster relieta; et icterus irritativus febrilis remedio huiccessere: disparuit enim in hocce easu cephalica frontalis pulsans, dolor et sensus ponderis in epigastrio, et quum alvus biliosa flavieans visa esset, extr. Bellad. gr. 3, c. Calomel. gr. 6. porrigeantur.

Externe. Litus oris (minus apte linetus), in isthmide eatarrhali rheumatia pustulante, succedente syphilide universalis:

Rec. Mell. despum. unc. unam

Extr. Belladonn. grana tria

Borac. venet. scrupul. unum.

M. f. Litus oris ope penicilli instituendus.

Imminutio inde ruboris et tumoris sequuta (Analoge agit Seapolina). Collyrium in rheumatismo oculorum syphilitico:

Rec. Aq. dest. commun. unc. quatuor

Solve intus:

Mucilag. g. arab. unc. semis

Extr. Belladonn. grana duo.

M. f. Collyrium.

D. S. Frustulum panni linei ex solutione madidum applicetur ad oculos.

Linimentum methodo endermatica applicatum.

Rec. Mucilag. g. arab. unc. semis

Extr. Belladonn. grana octo.

M. f. liniment. S. Ad obducendam plagam vesicante sauciam.

Ex tali medicatione sanatio obtenta est in dolore rheumatico ad regionem lumbarem, in rheumatismo cephalico, thoracico; in nevralgia plexus coeliaci, postquam eeeoproticia et Bismuthini ineassum tentata fuerant. Sed per dies 17 haec methodus curae loeum habuit; et ubi plaga exsiccata fuit, rursus renovabatur. In primo casu vesicans regioni lumbari, in secundo nu-

chae adplicatum fuit. Extracti Bellad. grana quoque duo nonnis quandoque praescribebantur.

Linimentum cum oleo Lavandulae ad mentem *Chevalier* locum habuit, in rheumatismo chronicō :

Rec. Extr. Belladonu. scrupul. unum
Olei dest. Lavandul. drachm. duas.
M. D. S. Linimentum.

Sic ope hujus linimenti spondylorheuma lumbare rebelle, sociisque unguento stibiato, hirudinibus, Acouito, etc. victum fuit, non item opportunitas pro hoc malo. Arthrorheuma vero in chronicum decursum tendens, ab eodem linimento nullum expertum est levamen. Addebantur huicce formulae tinctura Opii et oleum Hyoscyami, in nevrorheumate ischiadicō.

Linimentum cum oleo Hyoscyami, in ictero febrili, penes pulveres supra citatos ex extr. Belladonn., sed absque effectu:

Rec. Olei cocti Hyoscyami unc. semis
solve :

Extr. Belladonn. grana sex (postea gr. 12).
M. f. liniment.

D. S. Fiat nunctio hypochondrii (quia ibi tensio era).

Cum linimento saponato-camph., in nevrorheumate ischiadicō afebrili, praemissis pulveribus Doweri c. Arcano dupl. :

Rec. Extr. Belladonn. scrupul. unum
Liniment. saponato-camphorat. unc. semis.
M. f. liniment.
D. S. Binis vicibus juxta decursum nervi ischiadici illiniendum.

Serius dosis Belladonnae ad gr. 12 imminuta, sed unguenti ciner. drachma huicce formulae eum effectu adjungebatur.

Unguentum methodo endermatica adplicatum, in oophoritide lenta cum hysteriasi :

Rec. Extr. Belladonn. grana decem
Ung. Hydrarg. ciner. unc. unam.
M. exactiss. f. unguent.
D. S. Plagae ex vesicante productae inungendum.

Solutio, epithemati inserviens, in nevralgia coeliaca post encephalitudem traumaticam :

Rec. Extr. Belladonn. grana quatuor
Aq. commun. dest. unc. quatuor.
D. S. Pro epithemate.

Bismuthum nitricum praec.

(Magisterium Bismuthi, Nstras Bismuthi praecipitatus)

In tertiana dupli cum epigastralgie et oligaemia, irritatione vero vasculari e stomachali scrobe exterminata per hirudines, Magisterium Bismuthi Opio nuptum omnem epigastri hyperaesthesiae prompte extinxit; in gastro-scleromate ad cardiam in primo stadio, Bismuthum c. Magnesia carbonica (postea cum Hyosc. junctum), praeter vesicantia ad scrobem cordis, Cassiam et Conium maculatum methodo endermatica adhibitum, cum fructu ordinabatur; in stenosi valvularum semilunarium praecipue aortarum c. hypertrophia et ectasi cordis consecutiva et anevrysmate arcus aortae ex processu lithiaseos, Bismuthum cum acetate Morphii non sine emolumento exstitit. Dosis fuit granorum trium, quatuor, sex vel et ultra de die. Interne, in pulvere:

Rec. Magisterii Bismuth. grana quatuor (quinque, sex.)

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Omni bihorio pulv. unus.

Rec. Magisterii Bismuthi grana sex

Opii puri gran. unum

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. ut supra.

Rec. Magisterii Bismuth. grana sex.

Extr. Aconiti Napelli grana octo

— Liquirit. scrup. unum

Pulv. Liquirit. q. s. ad pil. xij.

D. S. Omni bihorio pil. duae.

Idem medicamen methodo endermatica, aut solum, aut cum Aconito, in pulvere applicabatur in nevralgiis gastricis.

Borax Veneta.

Pro usu interno copulabatur ad drachm. semis-unam infusis fl. Chamomill., Sambuci, Matricariae, nec non decoctis Alth., Hordei, Dulcamar.; sed et simplex in aq. dest. simplici soluta praescribebatur. Ad eursum menstrui sanguinis sollicitandum; in amenorrhoea retentionis; in chorea S. Viti in puella 18 annorum menstruis orbata per duos menses:

Rec. Aq. font. destill. *uncias octo*
Boracis venet. *drachm. semis*
Extr. Taraxaci *drachm. duas.*
M. D. S. Omni bihorio vascul. coff. *semis.*

In bronchitide subconvulsiva cum erythematice rheumatico,
in individuo scrofuloso - amenorrhoeo; in colica catameniali:

Rec. Infus. Matricariae ex *drachm. sex* per $\frac{1}{4}$ h. parati
unc. decem
Boracis venet. *drachm. semis*
Succi Liquirit. *drachm. duas.*
M. D. S. Omni hora vascul. coff. *semis.*

In catarrho febrili chronicō cum diathesi tuberculosa in
puella scrofulosa et chlorotica:

Rec. Dec. Alth. ex *unc. semis* per $\frac{1}{4}$ h. parati *unc. decem*
Col. refrigeratae adde:
Boracis venet. *drachm. semis*
Aq. dest. Lanroceras. *drachm. duas*
Syr. simpl. *unc. unam.*
M. D. S. Epicratice.

Externe, pro illinitionibus aphtharum, vel etiam pro collutoriis et gargarismate. In laryngo-pneumophthisi tuberculari, lingua rubra (aderant enim aphthae cum doloribus et ulcerationibus in cavo oris):

Rec. Inf. hb. Malvae ex *unc. semis* parati *unc. decem*
Boracis venet. *drachm. unam*
Mell. *despum.* *unc. unam et semis.*
M. D. S. Collutorium et gargarisma.

In rheumatismo intercostali febrili cum angina faucium ulcerosa syphilitica, cum suspicione tuberculorum:

Rec. Dec. Malvae ex *unc. una* parat. *libram unam*
adde solvendo:
Boracis venet. *drachm. unam.*
M. D. S. Collutorium.

Litus oris, unacum Belladonna. Vide *hanc.*

Butyrum recens insulsum.

Pro emolliione crustarum in tinea capitis; pro medicatione vesicantis.

Butyrum Cacao.

Subpositoria, in tabe mesenterica, tumore haemorrhoidali rupto :

Rec. Butyri Cacao unc. unam

Extr. Hyoscyami scrupul. semis.

Malaxentur exacte, ut fiant subpositoria Nr. duo.

D. S. Subponantur in anum mane et vesperi.

In eodem casu, loco priorum :

Rec. Butyri Cacao unc. unam

Ceruss. alb. drachm. unam.

Malaxentur iuvicem exacte, ut f. subpositoria Nr. duo.

S. uti supra.

Connubium cum Cera citrina et spermate Ceti, vide *hoc* ; illud cum Mercurio praecip. rubro, vide.

C a i n c a.

Interne, decoctum ex unc. semis, una, ad colat. librae unius; in ascite diffuso, post tot paracenteses non aliter sanato, ac peritonitide traumatica :

Rec. Cort. rad. Caincae unc. semis

Ruditer tusum digere in aqua frig. per 4 horas.

Dein coque per $\frac{1}{2}$ hor. Col. unc. octo adde :

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Reliqua vide in *Ballota lanata*. Vix plus ista praestitit.

Calamus aromaticus.

(Acorus Calamus Bot.)

Pulvis, ad complendam formam pilularum, c. extr. Trifol. fibr.; c. Ferro sulf.; c. extr. malatis Ferri et extr. Absynth.; c. extr. Quass. et extr. eort. Peruv.; c. extr. Trifol. fibr. et Rheo; c. Camphora et extr. Chamom.; c. sulf. aur. Antim., Squilla et extr. Dulcamar.; c. pulv. fl. Arniae; porro cum extractis diversis.

Infusum, ex draclim. duabus ad col. une. oeto; in quotidiana lenta cum catarrho chronicō, parcsi rheumatica et incipiente hydrope, quum adesset summa debilitas, febri vero per Chimonum sulf. jam sugata:

Rec. Radicis Calami aromatici *drachm. duas*
Iuf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Col. unc. octo detur.
S. Epicratice sumendum.

Calcaria chlorica, Chloras Calcis.

Usus externus magis placuit. In residuis psorae siccae a methodo anglicana relictis; in tinea scutulata:

Rec. Aq. commun. *libr. unam*
Chlorat. Calcis *drachm. unam.*
M. D. ad lagenulam probe clausam.
S. Pro lotionibus.

Injectiones ex inf. cap. Papaveris ac hb: Malvae, instituebantur in scrofula cum ozaena et saniosa rhinorrhoea; sed magis profuit Scopolina atropoides. In pemphigo scorbutico, praemissionis in cura cortice Peruviano et Graphite:

Rec. Chloratis Calcis *unc. semis.*
D. in vitro probe clauso.
S. Balneo admisceatur.

In stomachace scorbutica, ad foetorem oris corrigendum; forma rotularum:

Rec. Chlorat. Calcis *scrupul. unum*
Amyli *drachm. unam et semis*
Olei dest. Caryophyllor. *gutt. quatuor*
Mucilag. gummi Tragacanth. q. s. ut f. l. a. rotulae
quindecim.

D. S. Teneat in ore unam omni bihorio.

Pro fomentis, in febri nervosa parti ex decubitu gangrenescenti adplicabatur sequens:

Rec. Cort. Peruv. fusc. rud. tus. *unc. unam*
Coque c. s. q. aq. comm. per horam
Col. *libr. unius adde:*
Chloratis Calcis drachm. unam.
D. S. Pro fomento.

Fumigationes ex chlorate Calc. instituebantur post singulas alvi depositiones in febribus typhoidcis.

Calcaria hydrochlorica s. Murias Calcis.

Interne nonnisi, in scrofula cum nota gastrico - verminosa, post alia medicamina

*Rec. Aq. dest. Melissae unc. sex
 Hydrochloratis Calcis gran. unum
 Syr. cort. Aurant. unc. semis.
 M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. unum.*

Aqua Calcis.

Internc, ab unc. semis, ad integrum, et ultra, in catarrho febrili vesicae cum rheumate diffuso ex blennorrhœa syphil., quum adesset praeter copiam densi muci puriformis sanguine tineti in urinis graveolentibus, continuus tenesmus; in hepatorrhœac decreimento:

*Rec. Dec. rad. Gramin. ex unc. duabus parati unc. decem.
 Col. refrig. adde:
 Aq. destill. Laurocerasi drachm. duas
 — Calcis rec. parat. unc. semis
 Syr. simpl. unc. unam.
 M. D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.*

In priori casu ordinabatur ex dec. Alth., addito syrupo Dia-codii; et penes dictum medicamen hirudines ad perinaeum, clymma oleos., balsamum Copalvae quoque in auxilium debuerunt vocari. Simili modo haematochesis inflammatoria chronica (fluxus hepaticus improprie sic dictus) post hirudines, cataplasma, Tamarind., Lauroceras., et Malum Granatum, cum aqua Calcis et extr. Myrrhae feliciter oppuguabatur, seu potius haematocheseos e laxitate continuantis residuum auferebatur.

Internus adhuc usus locum habuit, pro diaeta, unacum lacte, in laryugo-pneumophthisi tuberculari, penes inhalationes ex tinctura Jodii et Sphaeroecocco criso:

*Rec. Lactis vaccin. rec. libr. duas
 Aq. Calcis rec. parat. unc. duas.
 M. D. S. Sit pro diaeta.*

Externe, in blennorrhagia vesicali et fluore albo:

*Rec. Aq. dest. commun. unc. octo
 — — Lauroceras.
 — Calcis rec. parat. ~~aa~~ unc. unam
 Mucilag. gummi arab. unc. semis.
 M. D. S. Pro injectionibus in vesicam et vaginalm.*

Calcaria sulfurata, s. Sulfuretum Calcis.
 (Hepar Calcis Ph. Austr.)

Interne. Pulvis, a scrupulo, ad duos sensim aucta ipsius dosi cum saccharo commixtus, in tremore mercuriali:

- Rec. Sulfuret. Calcis scrupul. unum*
- Sacch. alb. drachm. unam et semis.*
- M. f. pulv. aequab.*
- D. ad lagenulam bene clausam.*
- S. In quinque vicibus sumendus.*

Forma pilularum, unacum Scopolina, in blennorrhoea syphilitica cum hydrargyrosi, faucibus enim ulceratis, labiis et ore dolentibus, deglutitione difficulti:

- Rec. Sulfuret. Calcis grana duo*
- Extr. Scopolin. atropoid. grana quatuor*
- Micæ panis alb. q. s. ad pilulas octo.*
- Cousperg. pulvere Liquirit.*
- D. S. Omni dimidia hora pilula una.*

Dosis Scopolinae et sulfureti Calc. augebatur ad $\frac{aa}{aa}$ grana sex. Penes sulfuretum Calcis, liquor hydrosulfureticus in usum lubenter trahebatur.

Liquor hydrosulfureticus pro balneo.

Sic in ultimo hocce casu libra una ejusdem liquoris externe pro balneo adhibebatur quotidie, usque dum convalescens ex hydrargyrosi exstitisset. Hydrargyrotromus cum paresi, praemissis floribus Sulf. e. Magnesia, aliisque sudoriferis, cessit tandem balneis hydrosulfureticis, et sulfureto Calcis, sub sudoribus, urinis largis et hypostaticis. Alter fuit casus pareseos agitantis mereurialis in juvēne anuorum 16, qui in pileis confiendis Mereurium tractavit. In artubus lateris dextri, sensus debilitatis, torporis et recurrentis myrmekismi quandoque etiam motus involuntarii, quibus brachium dextrum et ambae extremitates agitabantur, tremorum adinstar, cum temporaria impotentia standi pedibus, reliquis vero functionibus illaeserat, nisi levem balbutiem excipias. Per dies 17 continuabatur tantummodo in balneis grad. 15 cum liquore hydrosulfuretico, et interne infuso Tiliae omni vespera ordinato. Dic 20. curae ordinabatur fl.

Sulf. drachma $\frac{1}{2}$ pro die, balneorum temperatura sensim ad gradus 25 — 26 adaueta. Sudavit aeger moderate post quodvis balneum, sed et noctu, rarius reeurrebat sensus ille torporis et myrmekismi, non amplius terrebant extremitatum inferiorum tremores. Sub usu denuo sulfureti Caleis ad grana quatuor quotidie (a die 28. eurae) facto, et balneis interea continuatis aeger saluti perfecte restitutus, post dies 39 commorationis in Clinico, domum rediit. Optime adhuc quadravit liquor in tinea favosa cum residuis syphilidis, sub finem eurae; itidem in eezemate chronico universali, post usum hydriodatis lixivae et aquarum S. Danielis, quum status idem adhuc perstaret.

*Rec. Liquor. hydrosulfuret. pro balneo libr. unam.
S. Aquae pro balneo uniatur.*

C a m p h o r a .

Interne. Pulvis ad grana tria, sex, decem, duodecim, sexdecim pro die.

*Rec. Camphor. ras. grana tria
Sacch. alb. drachm. unam.
M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.
D. S. Omui bihorio pulv. unus.*

Praeseribeatur haec formula in f. gastrico-nervosa, itidem in tabe dorsuali cum siente epilepsia; dosis sensim augebatur ad grana sexdecim.

Cum Nitro, in hepatide typhoidea:

*Rec. Camphor. ras. grana octo
Nitri puri drachm. semis
Sacch. alb. drachm. unam.
M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.
D. S. Omui bihorio pulv. unus.*

Ita quoque in f. gastrico-typhode, jam vero conciliata maiore sensibus tum externis tum internis promptitudine, motibus tamen languentibus, tum voluntariis, tum involuntariis; hi cum pauxillo aurae camphoratae cum Nitro leniter augebantur. Sie aura Camphorae conveniebat in metastasi ad cerebrum, non qua stimulans, sed uti diaphoresin promovens et systema nervosum sedans.

Cum Ipecacuanha, in pneumo - et entero-phthisi sensibilitas in hypogastrio imminuebatur; adjuvabatur natura in expellendo extra pectus morboso producto, in pneumo - bronchitide catarhalis (penes dec. Seneg., muriat. Ammon. c. Oxymell. squill.):

Rec. Pulv. rad. Ipecacuanh. *grana decem*
Camphor. ras. *grana sex*
Sacch. alb. *drachm. unam.*
M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.
D. S. Pulvis sumatur omni altera hora.

Cum Calomele, quando pulsus jam concitabantur a Camphora, hac ipsa vero adhuc opus erat; in hepatitide typhoidea:

Rec. Calomel. laevig.
Camphor. ras. *aa grana sex*
Sacch. alb. *drachm. unam.*
M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.
D. S. Omni bihorio pulv. unus.

Cum Castoreo et extr. Hyoscyami, in blennorrhagia vesicali:

Rec. Camphor. rasa
Castorei moscovit.
Extr. Hyoscyami *aa grana sex*
Sacch. alb. *drachm. unam.*
M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.
D. S. Omni bihorio pulv. unus.

Cum extracto Chamomillae, in febre gastrica cum nota catarrhalis rheumatica transgressa in nervosam lentam cum exanthemate aphthoso in tractu intest. et cavo oris:

Rec. Camphor. ras. *grana quatuor*
Extr. Chamomill. *scrupulum unum*
Pulv. Calami aromatici q. s. ut formentur pilulae
Nr. octo.
D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Forma pilularum, in tabe dorsuali incipiente:

Rec. Camphor. ras. *grana sexdecim*
Extr. Hyoscyami *grana octo*
— Liquirit. *scrupul. unum.*
Pulv. Liquir. q. s.
M. f. pilulae Nr. XXIV.
D. S. Omni hora pil. unam.

Ex infuso Ipecacuanh., in f. nervosa, ad grana sex, serius dosi aucta; in bronchitide psorica c. peripneumonia succedanea in decursum lentum vergente, alvo profusa et symptomatibus aliis nervosis praesentibus:

Rec. Infus. rad. Ipecacuanh. ex granis viginti quinque parat. unc. octo

Camphor. s. q. mucilag. g. arab. subact. grana duo

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio vasc. semis.

Simili modo et in similibus morborum formis, ex infuso Angelicac, Melissae, Arnieae, etc., etiam ex decoeto Senegae (unacum Nitro), uti in pneumonitide et meningitide cum apathia, euti sicea, expeectoratione nulla.

Ex emulsione spuria, iu blennorrhagia vesicali:

Rec. Olei Amygdal. dulc. rec. pr.

Syr. Diacodii aa unc. unam

Pulv. g. arab. q. s. ad perfectam olei subactionem.

Bene subactis adde:

Aq. commun. unc. octo

Extr. Hyoscyami grana sex

Camphor. muc. g. ar. subactae grana quatuor.

M. D. S. Omni bihorio vascul. coſſ. semis.

Externe. In substantia; contra anaesthesia paraplegicam c. nota rheumatica:

Rec. Camphor. in toto drachm. semis.

S. Pro usu externo. Leviter obducatur linteum, quod tefactum imponatur extremitatibus inferioribus.

Sie Camphorae lueidae drachmae duae consumebantur ad obducendum pannum laneum, et ad involvendas extremitates inferiores usque ad partes pudendas, iu hypertrophia cordis cum dilatatione atriorum, aortectasi et hydrope secundario, anasarea.

Oedema erysipelaceum seroti et cruris sanabatur absque aliis, cum solo decoeto Graminis, externe cum farina Fabarum, et quum eresceret flacciditas, cum:

Rec. Farin. Fabarum libr. semis

Camph. ras. grana sex.

M. S. Pro usu externo, adspersione scilicet in scroto et crure.

Pulvis sacculo inclusus, in tabe dorsuali incipiente:

Rec. Camphor. ras. drachm. unam

Contere cum:

Furfur. Tritici unc. una.

S. Sacculo inclusus pulvis adplicetur regioni perianaei.

Linimentum saponato - camphoratum.

(Balsamum Opodeldoc Ph. A.)

In ascite diffuso:

Rec. Liniment. saponato-camphorat. unc. duas.

S. Ungatur abdomen bis in die, ad magnitudinem uicis.

Cum tinct. thebaica, in statu f. nervoso, abdomine meteoretico, dolente:

Rec. Liniment. saponato-camphorat. drachm. sex

Tinct. thebaicae drachm. unam et semis.

M. S. Pro frictione ad abdomen.

Cum oleo coct. Hyoscyami, in gastro - arthralgia nervosa afebrili; myorheumate febrili; in rheumatismo articulare inflammatore:

Rec. Liniment. saponato - camphorat.

Olei cocti Hyosc. aa unc. semis.

M. S. Fiant unctiones in regione scrobiculi et ad genua (in secundo casu, ad partem dolentem; in tertio casu, dosi Camphor. ad dr. duas restricta, in numero, et imponatur stupa cannabina).

Unacum oleo Hyoscyami et tinctura Opii, in anevrysmate aortae thoracicae.

Cum oleo Hyosc. et extr. Conii macul., in hepato-splenem-phraxi:

Rec. Liniment. saponato-camphorat.

Olei cocti Hyosc. aa unc. semis

Extr. Conii maculat. drachm. unam.

M. D. ad lageuml. bene clausam. S. Innungatur mane et vesperi pars affecta ad magnitudinem dimidii cochlearis cibarii.

Sie in hypertrophia lienis, linimentum sapon.-camphor. unacum extr. Conii suscepit.

Cum unguento Hydrargyri einerei; in peripneumonia rheumatica, persistente adhuc affrietu.

Cum eodem unguento et Belladonna, in nevrorheumate ischiadico afebrili:

Rec. Liniment. sapon.-camph. *unc. semis*

Ung. cinerei *drachm. unam*

Extr. Belladonn. *grana duodecim.*

M. exactiss.

D. ad lagen. bene clausam.

S. Ungendum per decursum nervi ischiadici lateris sinistri.

Cum eodem ung. et extr. Conii maeul., in hepatitide phlegmonosa, duritie quadam adhuc perstante indolente sub attactu, in hypocondriis:

Rec. Liniment. sapon.-camphorat. *unc. unam*

Ung. Hydrarg. ciner. *drachm. tres*

Extr. Conii maculat. *drachm. unam.*

M. D. S. Pro unctione regionis hypochondriacae dextrae.

In hydrope aseite:

Rec. Liniment. sapon.-camphor.

Ung. Alth. *aa unc. unam*

— Hydrarg. ciner. *unc. semis.*

M. D. ad vitr. probe clausum.

S. Pro illinitione abdominis.

Vide adhuc econnubium e. tinetur Cantharidum, oleo dest. Juniperi, tinet. Opii.

Cannabis sativa.

Interne. Emulsio, in haematuria renali, blennorrhagia vesicale, urethrali, stadio scilieet inflammatorio, eum vel absque Amygdalis, extr. Hyoscyami:

Rec. Semin. Cannabis contus. *unc. unam et semis*

F. I. a. Emulsio, c. s. q. aq. comm. ad Col. libr. unius
adde:

Syr. simpl. *unc. unam.*

D. S. Epicratice.

*Rec. Semin. Cannabis**Amygdal. dulc. excoart. \overline{aa} unc. unam**Contritis affunde sensim sensimque**Aq. commun. unc. decem**Col. adde :**Extr. Hyoscyami grana quatuor**Sacch. albi unc. unam.**M. D. S. Epicratice.*

Praeter ejusmodi medicamina ad perfectam sanationem contulere: potus ex semin. **Lini**, fomenta ex **Malva**, ex **Lino**, **Hyose.** et **Lacte**, clysteres ex oleo sem. **Lini**; linimenta ex ung. **neapol.**, extr. **Belladonn.** et oleo cocto **Hyoseyami**.

Stupa cannabina externe obvolvendis articulis, rheumatismo eorreptis inserviebat; et fraeta jam phlogosi, stupa cannabina cum tinetura **Opii** adspergebatur, si dolor residuus erat.

Cantharides.

Emplastrum Cantharidum ad normam Ph. Austr. paratum supra linteum extensem adplicabatur nuchae, in tromophrenesi bibonum in characterem nervosum abeunte; in hemierania rheumatica, in encephalitidem suppurantem versa, aut in hemierania simpliei, postquam hirudines ineassum adplicitae fuerant. Adplicatio ad sternum, in pneumobronchitide catarrhali, febre in nervoso-colliquativam abeunte, unde tussis et respiratio libiores evadebant; in pneumonitica typhode; in catarrheumate thoracis, quum post plures iteratas hirudines dolor rheumaticus denuo recrudesceret:

*Rec. Empl. Cantharid. sec. Ph. A. parati unc. unam.**Extende super linteum magnitudine pollicum trium, in marginibus cerato adhaesivo inunitum.**S. Adplicetur ad partem dolentem.*

Adplicatio ad regionem intraseapularem, in pneumonia, febre in characterem nervosum abeunte; in phthisi tuberculari exulcerata. Adplicatio ad collum, in isthmotide phlegmonosa, tonsilla dextra leviter tumente. Vesicantibus ad mammas applicatis, praeter exspectationem eito victa sicut menorrhagia a nimio coitu cum ophoritide lenta decurrens antiphlogisticis resistens. Ad serobum cordis, in gastro-seleromate ad cardiam in

primo stadio. Ad abdomen, in ascite diffuso; in febre nervosa paraholerode, cum parenteritide ulcerante; ad epigastrium, in epigastralgia; in diarrhoea pellagrosa; circa umbilicum, in febris gastrico-nervosis cum parenteritide mucoso-folliculosa symptomatica. Supra pubem, in nephro-urocystophthisi; ad plantas pedum, in f. gastrico-rheumatica e. praevalecente affectione spinae dorsalis. Ad brachia, vesicantia perpetua in pneumophthisi tuberculari ponebantur.

Sequens emplastrum, *Cantharidinæ dictum a clar. Patavino Professore Steer inventum*, adhibebatur in blennorrhagia vesicali:

Rec. Pulv. Cantharid. unc. semis

In frusto panni linei ligatum coque cum olei Olivar.

unc. tribus

Sub continua agitatione adde:

Cerae alb. q. s. ad consistentiam Emplastri.

S. Empl. cantharidinæ.

Adhibebatur dr. una, duae ete. pro re nata.

Tinctura Cantharid. in formam linimenti redacta, in hydrope ascite:

Rec. Tinctur. Cantharid. drachm. unam

Liniment. saponato-camphorat.

Olei dest. Jnniperi

Ung. Hydrarg. cinerei ॥ drachm. tres.

M. D. S. Pro frictione abdominis.

Pulvis Cantharid. ad vim irritantem emplastri vesie. acuendam quandoque sumebatur. Vesica ex emplastro Canth. producta, aperta aut sanationi spontaneae; prout medentis seopus, aut cum butyro rec. insulso, aut unguento simp., aut unguento Plumbi acetici lino exceptis tegebatur, secretio vero sustinenda erat per digestivum unguentum. Methodo endermatica variae substantiae plagae sauciatae resorbendae tradebantur: mercurialia, Conium macul., sulfas Chinin., Morphium aeet., extr. Squillæ, etc. etc.

Capilli Veneris.

Syrupus ad unc. unam, unam et semis, sed raro, decocto Sphaeroecœci crispi addebatur; vide Cassia.

Carex arenaria.

In decocto ex unc. una, vel drachmis sex, ad colat. librae unius; in syphilide:

Rec. Rad. Caricis arenar. *unc. semis*

Coque c. s. q. aq. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. libr. unius adde:

Syr. simpl. *unc. unam.*

D. S. Epicratice.

Caryophylli.

Oleum destill. Caryoph. in connubio c. chlorate Calc. forma rotularum adhibebatur, ad foetorem oris tollendum.

Cascarilla.

Extractum ipsius ad drachm. semis, vel scrupulos duos, praescriptum in febri intermittente cum catarrho chronicō:

Rec. Flaved. cort. Aurant.

Rad. Rhei chin. r. t. $\overline{\text{aa}}$ drachm. *unam et semis*

Inf. s. q. aq. c. font. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Extr. Cascarillae *drachm. semis.*

M. D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Cassia.

Ipsius *Pulpa* ab uncia una, una et semis, sola pro una vice, aut ad unc. duas et ultra in diversis decoctis emollientibus et solventibus, addito Sale cathartico, aut in solutione in aqua quadam dest. aromaticā, aut in electuario. In oophoritide lenta cum hysteriasi:

Rec. Pulpa Cassiae *unc. unam et semis.*

S. Pro una vice sola.

In diarrhoea pellagrosa; sub initium curae:

Rec. Aq. font. libr. *unam*

Pulp. Cassiae *unc. unam*

Sal. ammon. depur. *drachm. unam*

Succ. Liquir. *drachm. unam.*

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

In biliosa febri:

*Rec. Dec. Gramin. ex unc. duabus parati unc. decem
solve :*

Pulpae Cassiae *unc. duas.*

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

In f. rheumatio-gastria in hysterica:

*Rec. Pnlp. Cassiae unc. unam
solve in :*

Aq. dest. Foeniculi *unc. quatuor
adde :*

Syr. simpl. *unc. unam.*

M. D. S. Duabus vicibus sumatnr.

In febribus gastricis deliciorum, etc.:

*Rec. Fruct. Tamarind. enucl. *unc. duas*
Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.*

Col. unc. octo adde solvendo :

Pnlp. Cassiae *unc. unam*

Sal. Seignett. *unc. semis*

Syr. Capillor. Veneris *unc. unam et semis.*

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Eleetuarium, in rheumatismo articulari febrili :

*Rec. Pulpae Cassiae *unc. duas*
Cremor. Tartari drachm. sex.*

M. f. Electuarimm.

D. S. Epicratice.

Pulpae Cassiac usus quoque erat in influentia catarrhali,
isthmhitide catarrhali, in eolepatitide ex colica spastica, etc.

Castoreum.

Interne, pulvis, eum Magnesia, sub insultu hysterico :

Rec. Castorei moscovit. grana sex

Magnes. carbon. drachm. semis

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. novem.

S. Omni bihorio pulv. unus.

Cum extr. Belladonn., in oophoritide lenta cum hysteriasi :

Rec. Extr. Belladonn. grana duo

Castorei moscovit. grana sex

Magnes. carbon. scrupul. unum

Sacch. alb. drachm. unam.

M. exakte f. pulv. div. in doses aeq. Nr. sex.

D. S. uti supra.

Cum Opio, in eodem casu:

Rec. Castor. moscov. grana sex

Opii puri grana duo

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. quatuor.

D. S. Unus pulvis omni hora ad vesperam.

Cum extr. Conii macul., et fl. Zinci, in pneumophthisi tuberculari in secundo stadio, quum Morphium aceticum nullam ostendisset vim tussim sedandi, et summa exaltatio esset systematis nervorum, in semina hysterica:

Rec. Castorei optimi

Fl. Zinci

Extr. Conii macul. aa grana octo

— Liquirit. q. s. ut form. pil. xij.

D. S. Ounci bihorio pilula una.

Postea, quum vomitus ex remedio productus esset, aa grana quatuor Castor. et fl. Zinci nonnisi praescribebantur.

Eodem modo ordinabatur Castoreum cum pulv. Rhei, fl. cort. Aurant., Camphora, extr. Hyosc., Calomele.

Pilulae, in chlorosi juncta cum hysteriasi:

Rec. Castorei moscovit.

Extr. malat. Ferri aa grana quindecim

— Hyoscyani nigr. grana sex

— Centaur. min. drachm. semis

Pulv. Calami arom. q. s. ut f. pil. XXX.

Consperc. pulv. Lycopodii.

D. S. Ounci bihorio pilulae duae.

Tinctura Castorei, ad gutt. 7 — 25, ter, quater de die ordinabatur; e. g. in helminthiasi cum congestione menstrua et erethismo nervoso:

Rec. Tinctur. Castorei drachm. semis

Aq. dest. Lauroceras. drachm. sex.

M. D. S. Guttæ 15 — 20 sub insultu doloroso haurienda cum aqua.

Centaurium minus.

Infuso-decoctum ex drachmis tribus, ad col. unc. sex; in osteodenitide scrofulosa cum zoster ligulari praemisso Rheo c. Magnesia:

Rec. Herb. Centaur. min. drachm. tres

Fiat infusum aq. serv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl., dein coque per
quinque minuta; Col. unc. sex adde:
Extr. Absynth.

— cort. Peruvian. *āā scrupulum unum.*

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. unum.

Decoctum herbae ex une. semis, ad col. unc. octo — dceem
paratum, cui pro re nata aliud pharmacon addebatur; in amen-
orrhoa c. fluore albo:

Rec. Herb. Centaur. min. unc. semis

Consc. coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. octo adde:

Elixir acidi Halleri *scrupul. unum.*

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Ipsius *extractum* in pilulis qua constituens, cum sulf. Chinin., fl. Sal. ammon. mart., Felle Tauri, eortice Peruv.; porro in diversis mixturis cum tintura Rhci aquosa, liquore anod. min. Hoffm., Spir. Aether. nitrici, et aqua quadam aromaticata, etc.

Cera alba.

Ad emplastra recipiebatur; vide *Pinus*. Cum tela cerata ob-
ducabantur extremitates inferiores, in anaesthesia paraplegica
cum nota rheumatica.

Cera citrina.

Vide connubium cum Cetaceo et butyro Cacao; unacum resina Pini et Cerussa..

Cerasus nigra.

Aqua destillata Cerasorum nigr. ad uncias quatuor sexve
aliquoties addebatur aliis medicamentis saporis et odoris gratia;
sed quum ad cognitionem perventum esset, hanc aquam destil-
latam Patavii usitatam non esse, et illius loeo, si quis medieo-
rum eam praescriberet, Spiritum Cerasorum nigrorum substitui,
ab ulteriore ejusdem praescriptione desistebatur.

Cetaceum.

(Sperma Ceti)

Emplastrum, in tinea scutulata, crustis faciei valde pru-
cientibus et dolentibus:

Rec. Cetacei unc. semis

Cerae citrin.

Butyri Cacao \overline{aa} drachm. duas.

Confric. ad ignem candelae; massa extendatur in frusto
panni linei magnitudinis palmae manus.

S. Adplicandum supra crustas faciei.

In orchitide traumatica:

Rec. Cetacei unc. quatuor

Pulv. hb. Cicutae drachm. duas

Axung. suill. unc. semis.

Funde super ignem leniorem, sub continua agitatione.

S. Extens. adplicetur ad partem omni dimidia hora de die.

Chamomilla vulgaris.

Interne. Infusum in catarrho intestinali choleroide; in chlorosi, praesertim primaria; in quartana cum hepatosplen-cmphraxi consequente, durante stadio frigoris fortis et prolongati, in tertiana cum catarro suspecto in individuo scrofuloso, ob leniendam tussim; in epilepsia thea Chamomill. assatim hauriebatur; ad convalescentiam firmandam ex pneumobronchitide in individuo cardiaco; in leucorrhoea a statu pituitoso pendente (c. tint. Rhei, et elaeos. cort. Aurant.).

Rec. Flor. Chamomill. unc. semis

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. librae unius detur.

S. Epicratice.

Addebat quoque nonnunquam uncia syrapi simpl., aut Diacodii, tintura Opii simpl.; occurrebat infuso-decoctum cum Alth., Trifolio fibr., Absynth.: cui colato addebat extr. Gentian., Absynth., Centaur. min., etc. Connubium cum Boracc sovendis mcnstruis bene prospexit. In quotidiana cum affectione gastrica et tumore licnis in haemorrhoidario, infusum cum syr. Aurant. frigoris tempore epicratice sumebatur. Frcquens connubium cum Senna vide.

En formulam, in rheumate intercostali, morbo jam aliquatenus fracto, febre vero intermittente ex intemperie atmosphaerica denuo recrudescente, quum febrisfugo mitiori opus esset:

Rec. Rad. Taraxaci unc. unam

Consc. coque c. s. q. aq. p. 1/4 h.

Sub finem coctionis infunde:

Chamomillae vulgaris unc. semis.

St. adhuc in digest. ferv. p. 1/4 hor. vase clauso.

Col. fortiter expressae unc. decem adde:

Sal. amari unc. semis

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.

M. D. S. Omni dimidia hora vascul. coff. semis.

Pulveris q. s. ad electuaria recipiebatur.

Externe. Infusum eum hb. Malvae ad lavandum oculum dolorosum cum amblyopia, in pleuropneumonitide rheumatico - catarrhalis. Pro elystero, in hypochondriasi, haerente alvo; in insultu cataleptico e gastralgiae summo gradu:

Rec. Fl. Chamomill. unc. unam

Inf. s. q. aq. p. 1/4 h. v. cl.

Col. librae unius adde:

Olei Lini unc. duas.

S. Clyisma.

Idem enema addita une. semis Sal. eulinaris, in f. biliosa quotidiana, urgentibus symptomatibus cephalicis, nee non sub paroxysmo forti hujusee febris ad intermittentem tendentis, cum alvus obstipa esset.

Extractum aliis pilulis, e. radice Rhei, praeparatis Ferreri etc., vel solutionibus addi solebat.

Chelidonium majus.

Succus herbae externe in syphilide pustulosa ad illiniendas faciei crustas adhibebatur; ab *extracto* ejus herbae et radieis hepatitis lentae conseptaria, in seleromate collocanda multum emendata fuere.

China flava, s. Cortex regius.

Interne. Decoetum ex une. semis, una. In quotidiana eum gastrismo irritativo, silente febre ex irritatione gastrica abaeta, detersoque tubo eibario, quo tutior sit erga febris recursum prae-munitio, quum non sine delassatione extra lectum versari aeger posset; in tertiana duplici anomala c. hepatemphraxi, praemissis solventibus et emesi praevie inducta; in eonvalescentia ex febre

nervoso-colliquativa; in amenorrhoea c. fluore albo et incipiente scorbuto in serosulosa, post usum Rhei et acidorum mineralium, in pellagra progressa, post Sennam, Rheum, hirud., sinapism., emeticum, et ante Ferrum sulfuricum; in atrophia, devictis symptomatibus inflammatoriis, et ope Barytae muriaticae molliori reddito abdome; in serofula, in gratiam olei Jecoris Aselli bene proceedente; in amenorrhoea c. fluore albo; in plurimis casibus, ubi Chinini sales accessus febris intermittentis vel non fugarunt, vel nisum ad relapsus non satis praecavebant.

Rec. Cort. Chin. reg. rwd. tus. unc. semis

Coque c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$ h.

Col. unc. decem d.

S. Omni bihorio vascul. semis.

Rec. Cort. Chin. reg. rwd. tns. unc. semis

Acid. sulf. dilnt. drachm. semis.

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$ h.

Col. unc. octo adde:

Syr. cort. Anrant. unc. unam.

M. D. S. Omni hora vasc. coff. semis.

In f. quartana, organis digestionis bene jam constitutis, chinacea jam concedentibus:

Rec. Cort. Chiae reg. rwd. tus. unc. duas

Coque c. s. q. aq. comm. f. p. h.

Col. unc. decem adde:

Syr. cort. Aurant. unc. unam.

D. S. Omni hora vasculum semis.

Residuum ex decoeto servetur pro futura decoctione, die altero.

Rec. Residuum hesternum Corticis cocti

Cort. Chin. reg. r. t. drachm. tres

Coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$ h., ad libraun unam
adde:

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Sed pulvere ejusdem Corticis, et postea sulfate Chin. opus adhuc erat.

Connubium eum sulf. Chin. et Alumine, in amphimerina gastrico-rheumatica, in nervosam versa:

Rec. Cort. Chin. reg. r. tus. drachm. sex

Acid. sulf. dilut. drachm. semis

Coque c. s. q. aq. c. f. p. 1/2 h.

Col. nnc. octo adde:

Sulfat. Chinin. grana decem

Alumin. crndi drachm. semis

Syr. cort. Aurant. unc. unam.

M. D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

Decocto, extracti Trif. fibr. drachma, vel et tinctura Cinnamomi. subjungebatur.

Externe. Idem decoctum cum radice Ratanh. collutorium in scorbuto efficax praebuit; in connubio cum chlorate Calcis ad partes gangraenescentes applicabatur.

Infusum, cum Absynthio in scrofula, generali statu jam optimo:

Rec. Cort. Chineae reg. r. tus. drachm. tres

Coq. c. s. q. aq. c. per 1/2 hor. Snb fin. coct. inf.

Summitat. Absynth. drachm. tres.

St. in dig. ferv. per 1/4 h. v. cl.

Col. unc. decem detur.

S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Pulvis ejusdem Corticis ad unciam semis, unam de die praescribebatur; postquam decoctum Chin. reg. effectu caruerat:

Rec. Pulv. cort. Chineae reg. alcoh. unciam unam.

Div. in dos. aeq. Nr. octo.

D. S. Omni bihorio pulvis unns.

Uplurimum sub hac formula pulveris unciae tres febribus anomalis quartanis irregularibus (prævia præparatione cum Rheo, Taraxaco, Sale ammon.) opponebantur et truncandis non sufficerunt, ad methodum vero **Tortianam** consugiendum erat, quae sequens est:

Rec. Pulv. alcohol. cort. Chin. reg. drachm. duas.

Div. in dos. aeq. duas.

S. Sumat pulverem unum sub primis pandiculationibns, imminentे paroxysmo, et post 1/4 hor. pulverem alternum, prævia maceratione in aqua.

Proximus inde paroxysmis quidem fugatus, sed alii non-nunquam redierunt, quibus fugandis nec Cortex Peruvian. ante paroxysmum porrectus par evadere poterat. In uno casu quartanac simplicis, prævia præparatione per dec. Taraxac. c. sale

ammon., et sexto ita transacto die, instantem proxime febris accessum methodo *Tortii* praevenire eum in modum licuit, ut altera pulvisculi *Chinæ* dosis hora ante paroxysmum, altera sub ipsis primis prodromis exhibita, accessus ille mitigatus fuerit, et administratione repetita, qui inde sequi debebat accessus, penitus emanserit. Intermediis vero et posteris diebus continuatum est in decocto Tarax. c. Sale ammoniaco.

Pulvis cort. Chin. reg. electuaria ingrediebatur ex praeparatis aliis chinaceis.

Cortex Peruvianus, s. *China fusca*.

Interne. Decoctum cum florib. Sal. ammon. mart., in arthro-rheumatis in chronicum decursum vergentis e. dyscrasia lymphatica cura finali; dyscrasia enim lymphatica et rheumatica pro parte, quantum licuit corrigebatur. Idem dec. cum sulfate Ferri convalescentiam ex ephidrosi chronica cum adenophymate collifirmavit. En, formulam cum Acido nitrico diluto, in pemphigo scorbutico:

Rec. Cort. Peruv. rud. tūs. drachm. sex

Coq. c. s. q. aq. p. 1/2 h.

Col. unc. decem adde:

Acidi nitrici dilut. scrupulos duos

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vascui. coſſ. semis.

Itidem et in eodem casu decoctum cum elixir acido Halleri ordinabatur.

Extractum Cort. Peruv. in pilularum formam redigebatur cum extr. Quass.; cum hoc et extr. malat. Ferri; cum sulfate Ferri et pulv. Squillae; cum pulv. ejusdem Cort. et sulfate Chinin.; cum hoc et Opio; cum extr. Absynthii. Lubet adducere formulas praecipuas.

In tābe mesenterica, sub finem quasi medicationis:

Rec. Extr. Cort. Peruv. scrupulum unum

— Trifol. fibr.

Sapon. medic. \overline{aa} drachm. semis

Extr. Cicutae grana octo

Pulv. Liquirit. q. s. ad pilul. XXX.

Consperg. eod. pulv.

D. S. Omni tertia hora pilulae quinque sumenda:

Köstl. Observ.

Febris quartana irregularis superveniente splenemphraxi, quam pulveri Chin. reg. ad mensem *Tortii* exhibito, nec sulfati Chin. c. extr. cort. Peruv. non cessisse supra diximus, nec sequenti obedivit electuario:

Rec. Muriatis Ammon. *drachm. semis*
Extr. Cort. Peruv. *scrupul. quatuor*
Pulv. cort. Chin. reg. *drachm. unam*
Roob Sambuci q. s. ut f. electuarium.
D. S. Epicratice sumendum intra diem.

In febre erratica:

Rec. Extr. cort. Peruvian. *drachm. semis*
Pulv. Arcani dupl. *drachm. unam*
 — sulfat. Chinin. *grana octo*
Roob Sambuci *drachm. tres.*
M. f. l. a. electuarium.
D. S. Omni bihorio cochl. coll. duo.

Pulveris cort. Peruv. q. s. ad pilulas chinaceas conficiendas recipiebatur.

Tinctura Chinae fuscae composita,
s. Elixir roborans Whyttii.

In melanchlorosi anacmorrhoides:

Rec. Summitat. Absynth. *drachm. tres*
Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Col. unc. octo adde:
Elixir roborant. *Whyttii drachm. tres*
Syr. cort. Aurant. *unc. unam.*
D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

Sulfas Chininae.

Pro usu interno, forma pilularis communissima erat, et quidem praescriptio simplicissima illa, cum extr. Taraxaci. Quartana cum pleurodynia rheumatica, abolita affectione gastrica et rheumatica, sulfatis Chin. granis 90 sensim consumitis disparuit septimestris. Quartana c. cephalalgia continua, praemissis tonico-purgantibus, et sub eorum usu frigore jam restricto, cum duodecim Chinin. sulf. granis fugabatur. Sic paucis jam granis quartanae aliac, modo simplices, duplices modo, et triplices obediebant, abacta insimul residua nota verminosa. Idem valet

de tertiana, fuerit gastrica, aut cum helminthiasi, aut duplex; minus de tertiana irregulari, dupli anomala cum complicatiōnibus; minus in quotidiana incompleta, aut pertinacissima in gravidis, ubi Chin. sulf. nil aliud effecit, quam quod frigus et sudorem abigeret, caloris stadio relicto et tussi sieca. Simplex vero rheumatica quotidiana, praeviis Lichenina et methodo *Tortiana* votis omnino melius respondebat. Votis respondebat idem praeparatum in dupli aestiva c. nota biliosa, hac antea dcrelieta; in amphimerina catarrheumatico-gastrica, in synocha legitima in intermittentem tertianam abeunte; in residua intermittentium morem manifestante ex febribus irritativis, inflammatoriis, ex rheumate, catarrho, gastro-enteritide; ad praecavendum paroxysmum, qui jam siluit, scopo prophylactico; in intermitt. dupli, febre puriore facta; ad firmandam curam, chinaceorum ope febre jam fracta.

Rec. Sulfat. Chinin. grana octo

Extr. Taraxaci q. s. ut f. pil. sex.

Consperg. pulv. Cinnamom.

D. S. Omni bihorio pil. una.

Rec. Sulfat. Chinin. grana duodecim

Extr. Trifolii fibrin. scrup. unum

Pulv. Calami aromat. q. s. ut f. pil. xij.

Consperg. eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilula una.

Dosis saepe aucta fuit ad grana XX, vel et pilularum omni hora una, vel et duae omni bihorio sumebantur.

Simili modo praescribebantur pilulae cum extr. Gentian., Absynth., Valerian., Corticis ipsius. Pro singuli casus necessitate adjungebantur massae pilulari flores Sal. ammon. martiales, in tertiana dupli anomala cum hepatempliraxi; Ferrum limatum cum Felle Tauri et extr. Cort. Peruv., in tertiana erratica; Ferrum malicum, in quartana cum hypertrophia lienis insigni, imminuto vero per curam adaequatam tumore (inde non saltem febris illico decepsit, sed et ingens illa lienis hypertrophia prompte et penitus soluta est); sulfas Ferri, quando praecipue hypertrophia lienis a febribus intermittentibus orta est; Opii extractum aquosum, in quotidiana incompleta cum asthmate atque dysuria spastico - catarrhalibus (cum fecr. plenaria aegri in salutem re-

stitutione); extractum Belladonnac, in bronchitide sub-convulsiva cum erythematice rheumatico in serofulosa amaenorrhoeia, ad symptomata quoque mitiganda:

Rec. Sulf. Chinin. grana duodecim

Extr. Belladonn. grana tria

— *Trifol. fibr. scrup. unum*

Pulv. Liquirit. q. s. ut forment. pil. xvij.

Consperg. eod. pulvere.

D. S. Omni bihorio pilulae duas, usque ad febris ingressum.

Sed febre quidem regrediente, mitigationem symptomatum quamdam nonnisi conciliabant boli:

Rec. Extr. Cort. Peruv. drachm. duas

Sulfat. Chinin. grana octo

Pulv. cort. Peruvianus q. s. ad bolos Nr. decem.

D. S. Sumat quatuor vesperi, reliquos sequenti die, tempore apyrexiae.

Electuarium, in febri erratica cum nota gastrica:

Rec. Extr. Tarax. liquid. drachm. tres

Arcani dupl. drachm. duas

Sulfat. Chinin. grana sex

Pulv. fl. Chamomill. q. s. ut f. electuarium.

D. S. Omni hora vascul. coff. semis tempore apyrexiae.

In quartana irregulari, superveniente splenemphraxi, post usum frustraneum Chinae ad mentem *Tortii* sumtae:

Rec. Extr. Cort. Peruv. scrupul. quatuor

Sulfat. Chinin. scrupul. unum

Pulv. Chin. reg. q. s. ut f. electuarium.

D. S. Omni bihorio cochl. coff. unum.

Postea ordinabatur electuarium ex muriate Ammon. et Chininae; sed febris nonnisi fugabatur ope sequentis:

Rec. Sulfat. Chinin. grana quatuordecim

Extr. Cort. Peruv. drachm. semis

Pulv. ejusd. Cortic. q. s. ad electuarium.

D. S. Uti supra.

Solutio, in Aecto sulfurico diluto, secundum recentiores, praeeunte *Confani* admodum arrisit in intermittentibus; ad prae-cavendas recidivas, in febribus praecipue tertianis biliosis:

Rec. Sulfat. Chinin. grana quatuor

solve in:

Acidi sulfur. diluti guttis octo,

adde:

Aq. font. dest. unc. quatuor

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Omni hora cochl. cib. unum.

Vel pro syrupo simpl. addebatur une. semis syr. Cichor. c. Rheo.

Eadem solutio sulfatis Chinin. et sulfatis Ferri, in quotidiana intermitte eum incipiente pellagra, febre per sulfatatem Chininae abacta, iterum vero comparente:

Rec. Sulfat. Chinin.

— Ferri aa grana quatuor
solve in:

Acidi sulf. dilut. guttis sexdecim
adde:

Aq. commun. dest. unc. quatuor

Syr. simpl. unc. semis.

M. D. S. Omni hora cochl. cib. unum.

Febris vero rebellis exposcebat aa grana sex sulfat. Chinin. et Ferri, postea sulfatatem Chinin. cum massa pilularum *Valleti* (martialium).

Eadem solutio, ope mieae panis in pilulas redacta, ordinabatur quoque in tabe dorsuali ineipiente c. fiente epilepsia:

Rec. Sulfat. Chinin. grana octo

Acidi sulfur. dilut. gutt. sexdecim
Miae panis albi scrupul. unum.

M. f. pilul. Nr. octo.

Consperg. pulvere Liquirit.

S. Omni bihorio pil. una.

Quid de sulfatis Chininae interno usu in febri lenta cum affectione topica inflammatoria dicendum? Illum a reeentioribus quibusdam in ejusmodi casibus admodum laudatum, nocere potius quam juvare, exemplum addueere volo. Agebatur enim de bronchitide suspecta ob tubercula cum febre lenta et nota verminosa. Quum febris fere intermitteret, tussis esset mitissima, respiratio facilius ac libera, ad sulfatatem Chininae confugiebatur, potius experimenti gratia, quam juvaminis. Quid inde sequebatur? Cephalea gravior solita, aurium tinnitus, Icipothymia, ardor in fauibus, anorexia, polydipsia, nausea, vomitus, etc.

Audiamus, quid in alio casu Chininac sulfas efficere potuerit. Agitur de pneumo-laryngo-phthisi tuberculari in stadio

secundo versante. Morbus sensim sensimque ulteriores progressus fecerat, ut prae aliis testimonium dabat adiecta aegri emaciatio cum stethoscopicis pectoris signis. Verum est, febrem sulfate Chininae tractatam per dies aliquot fere omnem siluisse, pristinam vero deinde magnitudinem recepisse, quod mirum non erat, persistante in pulmonibus, ex qua procedebat, causa. Non credendum ergo, hanc febris imminutionem, morbi imminutionem fecisse; suppressa enim fuit, uti supprimuntur dolores, tussis, diarrhoea, sudor opiatis, quin tollatur morbus, a quo repetunt fontem. Patet tamen ex iis necessitas certis sub rerum adjunctis etiam in ipsam febrim, pneumophthiseos sequelam, therapiam instituendi symptomaticam, qualem quoque in alia symptomata urgentia instituimus; cavendum tamen, ne nimia sulfati Chininae fides habeatur, veluti medici quidam moderni solent, existimando, illius ope pneumophthiseos sanationem se obtinere posse, quod non siet. Quin imo sicuti cauta manu palliativa pharmaca porrígenda sunt, ita quoque sulfas Chininae, ne aliqua fors fallaci opinione de hujusce remedii vi ducti, dum morbum sanare credimus, lethalem potius ipsius exitum acceleremus.

Sulfas Chininae *methodo endermatica* quoque applicitus fuit. Fuit tertiana duplex cum epigastralgia et oligaemia. Non ferebatur nec extr. Cort. Peruv., nec sulfas, nec citras Chinin., sed dolores atroces et vomitus excitabantur. Quapropter loco cutis in scrobiculo cordis epidermide per vesicans spoliato sulfuricus Chinac sal vehiculo suspensus fluido adplicabatur; nihilominus et epigastrii dolor et hyperemesis exasperari pergebant, quare pro endermico tractamine aptior locus in brachiis seligerbatur, feliciore coronatus eventu.

In eodem casu, idem sal forma unguenti, cui extractum Hyoscyami tantillum addebatur, adplicabatur, cum brachia sauciata dolerent, et paroxysmi novitus evigilantes prolongarentur.

Citras Chininae.

In eodem casu, quem penes derliquimus, hic sal Opio nuptus nil laudabilis effecit; imo potius exasperabatur febris, veluti accidit in quotidiana incompleta cum hepato-splenemphraxy, postquam intra dies sex, 74 grana citratis partim, partim sulfatis Chin. cum aliquot Opii granis absumpta fuerant. Efficax

vero magis fuit in hepatitide peritonaea eum rh umate diffuso et helminthiasi, succedente febre intermittente, primo quintana larvata gastralgio-eataleptica, dein tertiana duplii genuina. Ex Opio, dein ex hoc eum eitrato Chininae porrecto sudor comparuit eritus et eum hoc apyrexia octo dierum intravit; septimo tamen peracto recidivae istius paroxysmo, eitras Chininae eum Opio subministratus et per hebdomadam continuatus convalescetiam firmavit.

Rec. Citrat. Chinin. grana duodecim

Opii puri grana duo

Pulv. rad. Ipecacuanh. granum unum

Sacch. alb. drachm. un.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Omni bihorio pulv. unns.

Murias Chininae.

Forma electuarii, una cum muriate Ammoniac, in qua ratione irregulari superveniente splenemphraxy, postquam omnia in easum tentata fuerant remedia chinacea, de quibus sermo fuit:

Rec. Muriat. Ammon. drachm. semis

— *Chinin. grana sex*

Extr. Cort. Peruv. q. s. nt f. electuarium consistentiae spissioris.

D. S. Epicratice ad cochlearia coffeana.

Murias Ammoniae et Chininae solutus in Acido hydroehl. dil., in f. intermittente anomala cum hepato-splenemphraxy, post usum deocti Tarax. c. Sale ammon. Sed post febris absentiam, quae inde sequuta, continuabatur in diete medieamine, jam propter imperfectam infaretus resolutionem.

In aseite et anasarea, quum post punetionem urinarum quantitas non augeretur, ordinabantur hydroehloratis Ferri ammon. et hydroehlorat. Chinin. \overline{aa} grana 4, cum extr. Aloës aq., et extr. Trifol. fibr. et Squilla. Post haec et alia adhuc adjuvantia externa salus restituta fuit.

In febri tertiana cum diarrhoea biliosa et splenemphraxy, postquam omnia vergerent in melius ope sulfat. Chinin. c. extr. Cort. Peruv. :

Rec. Hydrochlorat. Chinin.

— Ferri ammon. *āā grana sex*
solve in :

Acidi hydrochlorici diluti *guttis viginti quatuor*
adde :

Aq. destill. commm. *unc. quatuor*
Syr. cort. Aurant. *unc. unam.*

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. dno.

Cichoreum.

Usum cundem admittit, ac Taraxacum, licet rarius praescriberetur, cui saepe jungebatur, addito sale quodam cathartico aut solvente. Decoctum, in atonia gastrica:

Rec. Rad. Cichorei unc. duas
Consc. coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$ h.
Col. ftr. expr. librae unius adde :
Extr. Trif. fibr. *drachm. semis.*
D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Simili modo et scopo praescribebatur cum extr. Absynth., Centaur. min., etc. Unacum Dulcamara, in rheumate chronicō:

Rec. Rad. Cichor. unc. unam
Canl. Dulcam. *unc. semis.*
Consc. coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$ h.
Col. ftr. expr. librae unius detur.
S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Taliter cum rad. Ononid. spinos., hb. Centaur. min., et aliis amaris.

Extr. Cichorei forma pilularum, in aphthis:

Rec. Extr. Cichor. drachm. unam
Snlf. anrat. Antimon. *grana sex*
Pulv. Rhei chinens. *drachm. semis.*
M. f. pilnl. pond. gran. trinm.
Consp. pulvere rad. Iridis florent.
D. S. Omni bihorio pilnla una.

Syrupus Cichorei cum Rheo frequenter addebatur decoctis, infusis purgantibus, etc.

Cicuta vulgaris,

s. Couium maculatum.

Herba, in infuso c. furf. Tritici externe, in herpete papulo-
loso, exanthemate vero per curam adaequatam jam pallescente,
penes usum aquarum Rainerianarum:

Rec. Furfur. Tritici libr. duas

Herb. Cicut. unc. unam

Aq. fervid. libr. quatuor.

Steut per $\frac{1}{4}$ hor., deinde exhibe pro balneo.

Pulvis herbae cataplasmati forma, in orchitide traumatica.
Post hirudines, ad regionem adfectam cataplasma humido - ca-
lida ex semin. Lini et pulv. hb. Cicutae, ad relaxandam partem,
adfectionem solvendam et avertendam tali modo indurationem:

Rec. Farin. sem. Lini unc. duas

Pulv. hb. Cicutae unc. semis.

Misce exacte, coque ad consistent. pultis, extende supra
linteum.

S. Adplicetur tepidum parti omni dimidia hora, de die.

Ne vero somnus turbaretur, suspendebantur de nocte cata-
plasma, et adplicabatur sequens:

Rec. Spermatis Ceti unc. quatuor

Pulv. hb. Cinctae drachm. duas

Axung. suill. unc. semis.

M. exacte, supra leuem ignem agitando continuo; ex-
tende supra liuteum.

S. Adplicetur de nocte, et emplastro adhaesivo figatur.

Sed postea recurrebatur adhuc ad ung. Hydrarg. c. extr.
Conii macul. Modo supra citatum cataplasma hypochondriis ap-
ponebatur sensibilibus summopere, in hepato - splenemphraxi,
postquam multa alia tentata fuerant.

Extractum, forma pilularum, c. extracto Taraxaci, in ictero
irritativo:

Rec. Extr. Conii maculat. grana quindecim

— Taraxaci scrupul. unum.

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. XX.

Consp. pulv. eodem.

S. Omni bihorio pulv. unus.

Eadem formula aut c. Sapone, et extr. Trifol. fibr., in febri
intermittente cum hepatemphraxi, cum signatura autem »quatuor
pilulas ante febris paroxysmum, et quatuor postea,« ascendendo

ad grana 7, 8 — 9 extracti Conii mac., et addendo gummires. Asae foetid., Ammoniaci, etc. Idem ob stases hepatis capillares, eum Calomele, et Belladonna ordinabantur pilulae. Per easdem pilulas cum Calomele sensibilitas et residua inflammatio, multum imminuebantur in oophoritide lenta:

Rec. Calomel. laevig. *grana sex*
Extr. Conii maculat. *grana quatuor*
 — Taraxaci *scrupul. unum*.
 Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. dnodecim.
 Consperg. pulv. eodem.
 D. S. Omni bihorio pilula una (pil. duae).

Cum sulfure aurat. Antimon., in hepatitide phlegmonosa penes externam applicationem Cicutae:

Rec. Sulf. aur. Antimon.
Extr. Conii macul. *aa grana octo*
 — Liquirit. *scrupul. unum*
 Pulv. Liquirit. q. s. nt f. pil. dnodecim.
 Consperg. pulv. eodem.
 D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Cum Aethiope antimoniali, in orchitide traumatica, quum dolores obtusi in regione funiculi multum vexarent:

Rec. Aethiop. antimon. *grana decem*
Extr. Conii macul. *grana quinque*
 — Taraxaci *scrupul. unum*
 Pulv. Liquirit. q. s. ad pil. XII.
 Consperg. eodem pulv.
 S. Omni bihorio pilulae dnae.

Cum extracto Myrrh., in oophoritide lenta cum hysteriasi, e genitalibus fluere continuante humore tenace:

Rec. Extr. Conii macul. *grana octo*
 — Myrrh. aq. *scrupul. unum*
 Pulv. Liquirit. q. s. nt f. pil. decem.
 Consperg. eod. pulv.
 D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Cum Aethiope min., in ichthyosi squamosa; magna cutis tensione, sub finali morbi regressu:

Rec. Aethiop. miner. *grana quindecim*
Extr. Conii macul. *grana duodecim*,
 — Liquir. q. s.
 M. f. pil. xij.
 Consperg. pulv. Liquirit.
 D. S. Omni bihorio pilulae duac.

Sic occurrebat connubium cum Castoreo et fl. Zinci; cum Cortice Peruv., in tabe mesenterica; cum Kali hydriodico, in metro- oophoritide lenta :

Rec. Extr. Conii maculati *grana decem* (sensim 12, 14, etc.)

Kali hydriodici *grana duo* (sensim 3, 4, 6, etc.)

Pulv. et extr. Liquirit. q. s. nt f. pil. Nr. decem (12, etc.)

Conspurg. pulv. Liquir.

S. Omni bihorio pilula una, tempore afebrili.

Solutio, in hepato-emphraxy cum febri intermittente :

Rec. Decocti rad. Gramin. (v. Taraxaci) ex unc. duabus parati unc. *decem*

Extr. Conii macul. *gran. octo*

Salis ammoniac. depur. *drachm. semis*

Succi Liquirit. dep. *drachm. duas.*

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Extr. Conii macul. *methodo endermatica* applicabatur forma limimenti, in spondylo - peritonitide chronicæ traumatica, antemissis antiphlogisticis, quum observatum fuisset, adesse affectionem nervosam, i. e. hystericalm :

Rec. Extr. Conii maculat. *grana viginti quinque*

Mucilag. gummi arab. *drachm. tres.*

Mixta exhibe.

S. Adplicetur mediante lino carpto supra plagam vesicantis posito, bis de die.

Sic prosperrimo cum eventu tali methodo endermica, in hepato - splenemphraxy symphoretica ex febre intermittente; et per eminentiam in casibus oophoritidis lentae, chronicæ applicabatur extraetum Conii cum Kali hydriodico, semper vero præmissis nonnisi antiphlogisticis, et proligatis fractisque symptomatis febrilibus ac inflammatoriis, quae sustinebant organorum hypertrophiam.

Extractum forma quoque unguenti, utplurimum cum unguento Hydrargyri ciner. endermatio more vasis obsorbentibus tradebatur, in nephro - uroeystophthisi cum indurationibus colli uteri superveniente pneumo- et gastro-enterophthisi in individuo scrofuloso - pellagroso; postquam tot et tanta, et unguentum ipsum mercuriale cum Cicuta incassum experiebatur medens. Supra pubem autem vesicans emplastrum ponebatur. Haec praxis locum habuit in oophoritide chronicæ, vesicante vero inguini.

sinistro imposito; non minus in gastro - scleromate ad cardiam versante in primo stadio. Post usum Magisterii Bismuthi vesicantis emplastrum ad scrobum cordis ponebatur, ex quo relictae plagae diebus subsequis unguentum ex drachm. una Conii macul., et drachmis tribus adipis suillis paratum applicabatur; quamquam lente, tamen bene res procedebant, melius adhuc et optime, quum plagae vesicatae adspergeretur Magisterium Bismuthi unacum pulvere Conii maculati.

Extractum in linimento, quod in splenemphraxi minuebat dolorem et tumorem; ad vineendam lienis hypertrophiam multum contribuit:

Rec. Extr. Conii maculat. drachm. unam

Olei cocti Hyoscyami

Liniment. saponato-comphorat. aa drachm. tres.

M. f. linimentuu.

S. Inungenda regio lienis.

Rheumatismum iuflammatiorum fixum emendavit:

Rec. Ung. Hydrarg. ciner. drachm. tres

Olei cocti Hyoscyami unc. unam

Extr. Conii macul. drachm. semis.

M. f. linimentum.

D. S. Regio dolens bis de die iuungenda magnitudine nucis avellan., deindeque c. stupa canuabina involvenda.

Forma unguenti, in quartana irregulari superveniente splenemphraxi:

Rec. Unguent. neapol. drachm. unam

Extr. Cicutae drachm. semis

Axung. porci unc. unam.

M. exact. f. unguent.

D. S. Inungeendum hypochondrium sinistrum, mane et vesperi magnitudine nucis avellanae.

In orchitide traumatica, epididymide cum teste quidquam acuminata:

Rec. Uug. Hydrarg. ciner. drachm. duas

Extr. Conii macul. drachm. semis

Axung. porci drachm. unam et semis.

M. exact. f. uug.

D. S. Immngatur scrotum bis in die magnitudine fabae.

Inde sanus aeger exivit. In hepatitide phlegmonosa recipiebatur scrupulus unus extr. Conii, pro drachm. semis ung. neapol.

pol. et drachmis duabus adipis. Perstans vero exinde durities quaedam sub attaetu, indolens, auferebatur ope:

Rec. Linimenti saponato-camphorat. *unc. unam*

Ung. Hydrarg. ciner. *drachm. tres*

Extr. Conii maculat. *drachm. unam.*

M. exact. f. ungneutum.

D. **S.** Innungenda regio hypochondriaca.

Emplastrum Cieutae unaeum empl. Mercurii, in rheumatismo articulari afebrili genu dextri in transudationem tendente, post usum pulverum ex sulf. aur. Antimon. et Calomele; in rheumatismo articulare, quum post limimenta ex oleo Hyosc. eum linim. sapon. - eamphor., et ex unguento neapol. e. oleo Hyose., tumor jam redderetur mollis et pastaceus (tumor inde per absorptionem evanuit); in tumoribus glandularum, scrofulosis; in orchitide ex parotitide.

Rec. Emplastr. mercur.

— de Cienta \overline{aa} *unc. semis.*

Malax. invicem ad ignem, in massam uniformem; exten-
datur supra pannum lineum ad flammarum candelae ca-
lefactum.

S. Adplicetur magnitudine nummi imperialis (vel secun-
dum extensionem partis affectae), ad tumorem.

Quantitas ingredientium variat pro magnitudine partis ad-
fectae; et emplastrum quamplurimum noctis tempore adplicabatur
substituendum unguentis aut cataplasmatibus emollientibus de
die impositis.

Idem emplastrum quoque ex partibus anatieis, unacum empl.
adhaesivo, opponebatur hepatitidi phlegmonosae; et unacum em-
plastro de Galbano crocato, in hepato-splenemphraxy, et orchitide
blennorrhoeica.

Cicuta virosa.

Externe in usum traeta fuit; et quidem pulvis, forma cata-
plasmatis, in hepatemphraxy:

Rec. Farin. semin. Lini libr. *quatuor*

Pulv. hb. Cicutae viros. *unc. duas*

Sal. ammon. depur. *unc. semis.*

Coq. c. s. q. aq. ad consistent. cataplasmatis.

D: **S.** Adplicandum hypochondrio dextro.

Hniecc cataplasmati addi quoque solebat uncia fl. Chamomillae. Infusum pro injectione, in blennorrhagia genito-vesicali :

Rec. Hb. Cient. viros.

— Malvae off. *āā unc. duas*

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo refrig. adde:

Aq. destill. Lanoceras. *unc. semis*

— *Calcis unc. unam.*

M. D. S. Pro injectione in vaginam et vesicam.

Cinnamomum.

Pulvis adhibebatur in pulveribus, et ad pilulas conspergendas; e. gr. cum extr. Quassiae in verminosa, cum menosymphoresi incipiente, ac si pro coronide eurae; in metro-oophoritide lenta cum residuis bronchitidis convulsivae in individuo serosuloso amenorrhoeo, itidem sub finem medelae:

Rec. Extr. Quassiae drachm. semis

Pnlv. Cinnamomi q. s. ut f. pil. Nr. XV.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Aqua destill. Cinnam. in diversis mixturis; e. g. in pemphigo scorbutico, ut gratior esset sapor olei Ricini:

Rec. Olei sem. Ricini rec. press. unc. duas et semis

Pnlv. g. arab. q. s. ad perfectam subactionem

Syr. simplicis unc. duas

Bene subactis sensim sensimque affunde:

Aq. commun. *unc. quatuor*

— destill. Cinnamom. simpl. *drachm. duas*

M. D. S. Quatnor vicibus sumatur intra 3 horas.

In metroperitonitide puerperali, pro cura vitali:

Rec. Aq. dest. Menth. piper.

— — Cinnamomi simpl. *āā unc. duas*

Syr. simpl. *unc. unam.*

M. D. S. Ad cochlearia cib. omni $\frac{1}{2}$ hora.

In chlorosi:

Rec. Aq. destill. Cinnam. simpl. unc. quatuor

Tinct. malatis Ferri *scrupul. unum*

Syr. Kermes *unc. semis.*

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Huie mixturae tardius addebantur quoque extr. Aloës grana duodecim.

C i t r u s.

Succus Citri expressus aqua et debita quantitate Sacchari commixtus ad unc. semis, vel unam exhibebatur; occurrebat etiam in decoctis Hordei, Graminis, Salep, etc., infusionis fl. Tiliae, Verbasci, sem. Santonici, etc. In potu Riverii loco Acidi tartrici praescribebatur. Communissimus potus febricitantium, praesertim aestatis tempore, sistebat potus aquos. succo Citri et Saccharo conditus (aqua limonea, s. limonata), tum simplex, tum tartarica.

In febre typhoidea enterica et pneumonica:

Rec. Aq. font. libr. tres

Succi Citri unc. unam

Acidi sulfur. dilut. drachm. semis

Sacch. alb. unc. unam et semis.

M. D. S. Potus.

In hydrope:

Rec. Limoneae tenuis libr. tres

Cremor. Tartari drachm. tres

Oxymell. squillit. unc. duas.

M. D. S. Potus.

Aut vero:

Rec. Decocti Hordei ex unc. duabus parati libr. duas

Succi Citri unc. unam

Cremor. Tartari

Roob Sambuci \overline{aa} unc. semis

M. D. S. Potus.

In ietero febrili; cum decocto Graminis. Vide *Soda bicarbonica*. Vide *Tartarus emeticus*.

C o l c h i c u m.

Extractum Colchici, in hydrope universali ex cardiectasi hypertrophica, e rheumatismo et endocarditiide, persistente illo, hac reerudescente:

Rec Aq. font. commun.

Oxymellis squill. \overline{aa} unc. duas

Extr. Colchici autumnal. grana quatuor

Roob Juniper. unc. unam.

M. D. S. Sumat omni biorio cochl. duo.

Tinctura, ex infuso Tiliae ad guttas X — XV — XX — XXX,
in catarrheumate thoracis febrili, quum adesset sudor, catarrhus
minor, sed dolores vagantes hue et illue; dolores iude imminuti
sed aliis in locis adparuere, quare sulfur aur. Antimon. e. Col-
chico ordinabatur et prospero cum effectu. Rheumatismus capitis
et colli cum congestione febrili, febre vero jam evanida, dolori-
bust ad genua insistentibus, imminutis in capite sub sudore, non
cessit :

Rec. Inf. Tiliae ex drachm. duabus parati unc. octo
Tincturae Colchici autumnal. gutt. viginti
Syrup. simpl. unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

In syphilide cum rheumatismo et prurigine suffecerunt guttae
viginti, addito quoque roob Sambuci.

Ex decocto Ononidis spinosae, in hydrope:

Rec. Rad. Ononid. spinos. unc. duas
Coque c. s. q. aq. comm. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Col. librae unius adde:
Tincturae Colchici autumnal. scrupul. semis
Roob Juniperi unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Vinum Colchici ad grana 15-drachm. un. pro dic, in Aq. dest.
f. Tiliae ordinabatur in lichene diffuso in individuo hysterico
arthritico, pluries autem in arthrorheumate, et quidem optatis-
simo cum successu:

Rec. Aq. dest. flor. Tiliae unc. sex
Vin. semin. Colchici drachm. unam
Syr. simpl. unc. semis.

M. S. Omni bihorio coch. 2.

C o l o m b o.

Decoctum rad. Colombo, adfirmavit convalescentiam ex dysen-
teria rheumatico-gastrica. Praescribatur quoque prospero cum
effectu in f. tertiana e. diarrhoea biliosa et splenemphraxi, omni-
bust vero symptomatibus in melius vergentibus, silentie febre,
alvo nonnisi ter mota intra diem, pro cura ergo confirmatoria
erga laxitatem.

Rec. Rad. Colombo *drachm. duas*

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. octo adde:

— Hydrochlorat. Ferri et Ammon. *grana duodecim*

Syr. cort. Aurant. *unc. semis.*

D. S. Omni hora vasc. coff. semis.

Rec. Dec. rad. Colombo ex *drachm. duabus parati unc.*
decem

Hydrochlorat. Chinin. *grana sex*

— Ferri et Ammoniae *grana duodecim*
solnta in:

Acidi hydrochlorici diluti *guttis viginti quatuor*

Syr. cort. Aurant. *unc. unam.*

D. S. ut supra.

Corallina corsicana.

(s. *Fucus Helminthochorton*)

In synochis gastricis verminosis Corallina corsicana Italorum medicorum plurimis dilecta, tamquam e diversis et inaequali modo agentibus marinis algis contexta, haud adeo activa tutaque deprehendebatur. Exhibebatur decoctum, vel infusum e drachma una vel tribus, ut plurimum cum sale quodam cathartico; vel electuarium in connubio cum aliis substantiis vermes pellentibus. Reliqua vide sub articulo *Sphaerococcus*. Sequens haec formula indicata fuit duplici, imo triplici scopo, in f. verminosa, accedente pneumophthisi tuberculari cum tabe mesenterica:

Rec. Corallinae corsicanae *drachm. unam*

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. decem adde:

Syr. Cichor. c. *Rheo unc. unam.*

D. S. Omni dimidia hora vasc. coff. semis.

Rec. Fuci Helminthochort. *drachm. semis*

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Arcani duplicati *drachm. duas*

Syr. simpl. *unc. duas.*

D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

Rec. Pulv. Fuci Helminthochort.

— rad. Valerian. \overline{aa} *drachm. unam*

— — Jalapp. *drachm. semis*

Mell. despumat. q. s. ut f. electuarium molle.
 D. ad flctile.
 S. Omni hora cochl. coss. unum.

Utraque ultima hacc formula in febri verminosa ad expellendos vermes in infantibus, quodam cum successu adhibita fuit.

Creosotum.

Interne, ad guttas duas, tres, decemve ex vehiculo quodam; in amenorrhoea cum scorbuto et fluore albo, post purgantia, amara, acida mineralia, Chinam, aquas Catull.:

Rec. Aq. commun. dest. unc. quatuor
Creosoti puriss. grana sex
Mucilag. gummi arab. unc. semis
Syr. cort. Aurant. unc. unam.
M. exactiss. *D.* *S.* Omni bihorio cochl. cib. duo.

Imminuebatur dosis ad grana 4, 3, 2, sed serius iterum ad gr. 6, 8 aucta.

In blennorrhagia vesicali:

Rec. Amygdal. dulc. excort. unc. unam
F. l. a. emulsio c. aq. font. q. s. ad Col. unc. decem
 adde:
Mucilag. g. arab. unc. unam
Creosoti purissimi gutt. quatuor
Sacch. alb. unc. unam et semis.
M. *D.* *S.* Omni bihorio cochl. cib. duo.

Creosotum in nephrocysto-phthisi cum indurationibus colliuteri, superveniente gastro - entero - et pneumophthisi in subiecto scrofuloso-pellagroso, frustra tentabatur interne.

Externe, in scrofula inveterata:

Rec. Aquae Creosoti unc. tres.
S. Applicetur ope lini carpti ad ulcera.

In crysipelate gangraenoso, Creosotum externe adhibitum etsi non everterit gangraenam, moderavit tamen, et foctorem superavit:

Rec. Creosoti purissimi drachm. semis
 Aquae destill. comm. unc. decem.
M. *D.* *S.* Fomententur saepius de die partes gangraena affectae.

C r o c u s.

Interne. Pulvis, in subcontinua tertianaria cum congestione menstrua in puella amenorrhoea, sed non absque hirudinibus ad femora, et sinapi confectis pediluviis, menstrua molimina obsecundavit:

Rec. Croci oriental. *grana sex*

Sacch. alb. *drachm. unam.*

M. f. p. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

In eodem casu, ob cardialgiam (cardialgiae enim cum uteri affectione facile combinari possunt):

Rec. Magisterii Bismuthi

Croci orientalis *aa grana quatuor*

Sacch. alb. *drachm. semis.*

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Omni bihorio pulv. unus.

In enterite lenta cum f. intermittente quotidiana symptomatica et nota pellagrosa, abdomine jam expanso, tumente, dolente, et praesentibus maniae symptomatibus:

Rec. Pulv. Croci oriental. *grana tria*

— rad. Ipecacuanh. *scrupul. semis*

Sacch. alb. *scrupul. duos.*

M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.

D. S. Omni bihorio pulv. un.

Dosis Croci augebatur ad grana quatuor, et sensim ad quatuordecim usque; delirio inde imminuto, borborygmis, torminibus perstantibus, alvo bis deposita liquida:

Rec. Extr. Quassiae *scrupul. unum*

Croci oriental. *grana sex*

Pulv. rad. Rhei q. s. ad pilulas formandas decem.

Consperg. pulv. Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Rec. Sulfat. Ferri

Croci oriental. *aa grana octo*

Extr. Quass. *scrupul. unum.*

F. l. a. c. pulv. Liquirit. pilulae duodecim.

D. S. Ut supra.

Rec. Sulfat. Ferri
Croci oriental.
Extr. Aloës aa *grana decem*
— Quass. *grana sexdecim*
Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilulae XVI.
Conspurg. eodem pulvere.
D. S. Omni bihorio pilulae duas.

Hisee omnibus sumtis salus restituta fuit.

Extractum Croei, in pilulis, Choremam S. Viti, menstruo fluxu restituto, sanavit; salutiferum quoque fuit in chlorosi secundaria:

Rec. Extr. Croci scrupul. semis
— Taraxaci drachm. unam.
Pulv. rad. Liquirit. q. s. ut f. pilulae pond. granor.
duorum.
Conspurg. eod. pulvere.
D. S. Omni bihorio pilulae duas.

Externe. Decoctum, pro cataplasmate in pseuderysipelate eruris critieo. Affectio jam erat minor, phlyctaenas tamen relinquentes, ex quibus ruptis exulcerationes fieri et propagari cernebantur. Neque cutis hujus loci sana, utpote quae ab anni clapsi priori consimili affectione in tubera quaedam elata fuerat, postquam exitum sero dedisset haud medioeri. Utile tum deprehendebatur:

Rec. Farin. semin. Lini libram semis
Croci oriental. scrupul. unum
(Tardius addebatur Salis ammon. depurati uncia semis)
Coqne c. s. q. aq. ad consistentiam pultis.
D. S. Externe, tepide adplicetur.

Croton Tiglium.

Oleum e graniis Tiglii pressum, ad gutt. 1, 2 in pilulis, pulvere vcl et mixtura olcosa in segnitie alvina rebelli rarius praeseribebatur; sie in aseite diffuso et hepatemphraxi nullum effectum salutarem prodidit, incassum tentatis jam prius Aloë et Gummi - Guttae; itidem usus erat Crotonis Tiglii interpolatim cum alio remedio, in melanchlorosi amenorrhoidc.

Rec. Olei Croton. Tiglii gutt. duas
Micae panis alb. grana octo
Amyli q. s. ut f. pilulae quatuor.
D. S. Mane et vesperi pilulae duas.

Externe. Scopo revellente ad promovendam eruptionem mi- liarem aut eczematicam ; in pneumophthisi tuberculari, tabe me- senterica , arthrorheumate chronicō , arthritide anomala :

Rec. Olei Croton. Tiglia drachm. semis.

D. sigillo munitum.

S. Pro tribus frictionibus intra diem.

Post primam unctionem rubor in cute comparuit , in quo , post secundam unctionem aucto , scabrities apparuit , ex qua post tertiam unctionem vesiculae formabantur grani papaveris , post quartam milii magnitudine ; serius , si frictio continuabatur , majores , pustulosae , confluentes . Hinc inde et cicatrices relin- quebantur. Adhibebantur hae frictiones praeprimis , ubi suspicio sientium tuberculorum recentium (tuberculoseos acutae ut ajunt) aderat. — Rarius adhibebatur formula composita sequens :

Rec. Olei Croton. Tiglia scrupul. unum

Tartari stibiatii scrupul. duos

Axung. suill. unc. semis.

M. exactissime.

D. S. Pro repetitis frictionibus ad sternum.

Nunquam ab oleo Crotonis externe adhibito vomitus aut alvus ciebatur. Erat puella tuberculis glandularum bronchialium laborans , in qua plures unciac hujus olei cuti per duas hebdomas illinitae ne minimam quidem vesiculam efficiebant. Cutis fere emortua erat.

Cucurbita.

Cucurbitularum in genere rarer erat usus. Epistaxis in febri nervosa increscentem virium prostrationem inducens cucurbitulis ad nucham positis , etc. cohiebatur. Cucurbitulae in hepatoperi- tonitide cum diaphragmitide ac pleuritide , et hepatonco saepius applicitac majorem quasi ac ipsis competeteret , exercebant vim ; et revera stupendum erat , quod mox ab illarum prima applica- tione tumor planior et minor evaserit , atque oculis fere se eripuerit. Cucurbitulae ad epigastrium , post hirudines , admotae , immi- nuere dolorem. In affectionibus spinac dorsi frequentius locum habuerunt.

Cuprum sulfuricum.

Agebatur de anevrysmate arcus aortae. Quum post sulfatcm Chininae ob intermittentiam quamdam observatam , una alterave

vice accessus duobus aut tribus diebus tardius accederent, sulfati Ferri nubebatur Cupri sulfas; sed vix emendatus acger finito anno clinico dimittebatur.

Cydonia vulgaris.

Tumor haemorrhoidalis ex ano egrediens et dolens liniebatur linimento ex mucilag. sem. Cydoniorum et olei Hyoscyami \overline{aa} uncia una.

Digitalis purpurea.

Interne. Pulvis ad gr. 3, 6 — 12, in hydrope ascite, ana-sarca et hydrothoracc.

Addebatur quoque Squilla, Nitrum, Ipecacuanha, sulfur a. Antimonii, Kermes mineralis, etc. Ordinabantur pulveres cum sulfure a. Antim., cum Ipecacuanha, in pneumo-bronchitide rheumatico-catarrhali, praesertibus cardiopalmo, carotidum pulsatione; cum sulfure a. Antim. et extracto Hyoscyami, in haemoptoë pulmonali activa succedente ob infarctum haemoptoicum, sive pneumonitide legitima, sive evoluta e tuberculis jam praesertibus pneumophthisi, praesertim florida, molestante praepri-mis titillatione ad fauces, et quam maxime in variis cordis orga-nicis affectionibus activis. In his plurimumque Digitalis sola prac-scribebatur. Compositiones erant:

Rec. Pulv. Fol. Digital. purp.

Calomel. laevig. \overline{aa} grana tria

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. Nr. sex aeq.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Rec. Pulv. fol. Digital. purp. grana quatuor

— rad. Ipecacuanh. grana duo

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Ut supra.

Rec. Sulf. aur. Antimon. grana octo

Extr. Hyoscyami

Pulv. fol. Digital. purpur. \overline{aa} grana sex

Sacch. alb. drachm. duas.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Ut supra.

Infusum ex granis quindecim, usque drachmam semis, in plerisque morbis jam dictis.

Rec. Fol. Digital. purp. grana quindecim

Inf. s. q. aq. c. serv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Cum Acido sulfurico diluto, vel cum aqua Laurocerasi, vel cum utroque remedio facilius tolerabatur Digitalis, atque diutius. Sic e. gr. in haemoptoë cum tuberculis sientibus, aut in cardiectasi hypertrophică :

Rec. Fol. Digital. purp. grana sextdecim

Inf. s. q. aq. c. serv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Acidi sulf. diluti drachm. semis

(cum vel sine Syrupo).

D. S. Omni bihorio vascul. coff. unum, vel cochl. cib. unum (quod metallicum non sit).

Idem valet de connubio cum Elixir acido Halleri; ita dabatur in metrorrhagia activa paraphlogistica, fracta jam phlegosi; cum Nitro puro, in hydrope searlatinoso cum respiratione difficulti; cum acetatis Lixivae solut. drachmis tribus, et Oxymell. squill. uncia una, in hydropericardio aut hydrothorace recenti; cum grano Tartari emet. et Oxymell. squill. uncia una, in codem hoc easu, minante suffocatione, postquam vero fuerat praemissa venaesectio: talis miscelæ sumebatur omni hora quarta pars. Exhibebatur quoque ex decocto Seolopendrii, aut Polygalæ Senegae cum aqua Laurocerasi, etc. in pneumonia phthisica, etc. unacum infuso Sphaeroecocci conservoidis, in trachco-broncho-pneumonitide lenta tuberculari.

Externe. Pulvis in unguentum redactus methodo endermatica applicitus, in hydrothorace aut hydropericardio incipiente, quem etiam adesset hepatosplenemphraxis, sed et hypochondria valde sensibia:

Rec. Pulv. fol. Digital. purp. drachm. unam

Unguenti Hydrargyri ciner. drachm. duas

Adipis porcin. rec. drachm. tres

M. exactissime, f. unguentum.

D. S. Mediante carpo lino adipicetur plague a vesicante
relictæ (ad hypochondria) ter de die.

In codem casu, postea:

Rec. Pulv. fol. Digital. purp. *scrupul.* *duos*

Sacch. alb. *drachm.* *duas.*

Bene contritus pulv. d. S. Adplicetur loco vesicantis.

Tinctura Digital. purp. externe, forma linimenti, post ad-
plicationes praemissas supra dicti pulveris et unguenti:

Rec. Tinct. Digital. purp. *scrupulum* *unum*

Mucilag. g. arab. *drachm.* *tres.*

M. exactissime, f. linimentum.

D. S. Ope lini carpti imponatur plague vesicante factae
bis de die.

In ipso superius memorato hydropericardio, ante pulveris
adapplicationem:

Rec. Unguent. digest.

— Hydrargyri ciner. $\bar{a}\bar{a}$ *drachm.* *duas*

Tinctur. Digital. purp. *scrupul.* *unum.*

M. exactissime in unguentum.

D. S. Ope lini carpti ad locum vesicantis ter de die po-
nendum, emplastro adhaesivo munitum.

In hydropo ascite:

Rec. Tinct. Digital. purp. *drachm.* *unam*

Olei Terebinth. *drachm.* *duas*

Unguent. Hydrarg.

— Althaeæ $\bar{a}\bar{a}$ *unc.* *semis.*

M. exactissime in unguent.

D. S. Inungendum abdomen bis in die magnitudine nucis
juglandis.

Extractum Digital. purp., in unguentum redactum, in he-
patemphraxi:

Rec. Extr. Digital. purp. *drachm.* *unam*

Unguenti Hydrarg. ciner. *drachm.* *duas*

— Althaeæ *unc.* *unam.*

M. exactiss. in unguent.

D. S. Inungatur unguento calefacto hypochondrium de-
xtrum, et superimponatur fomentum calido-
siccum.

Tandem extractum cum mucilagine g. arab., aut adipe unum scopo endermatico adhibebatur ad plagas saucias.

Digitalis non parum contribuit ad vim cordis infringendam in febribus enormitate actionis aut structurae cordis complicatis. Praecipuas inter morborum formas, quibus opponebatur, fuere sequentes: pneumonitis ambidextra, accidente pleuritide; congestione inflammatoria abacta, sed crescente fere adhuc pulmonum plastico et impermeabili infarctu, ope Tartari emet. et postea ope unctionis ad pectus institutae cum unguento neapol. et tinctura Digital. in melius vergebatur. Sic placuit usus internus Digital. in pleuropneumonia neglecta, incipiente jam laudabili resolutione per Tartarum emet. inducta. Ex usu interno infusi Digital., et externa adplicatione tincturae Digital. et Cantharidum emelioratio visibilis erat pleuritidis recidivae in hypoclepsin abeuntis. In pneumophthisi tuberculosa progressa seponi Digitalis utplurimum debuit ob inducti gastrismi et narcoseos symptomata. Valde vero conducebat ejus cum sulfure aur. Antimonii usus in nevrorheumate femoris hypocleptico. Experimenti gratia nonnisi Digitalis exhibebatur in cardiectasi passiva (absque simultanea hypertrophia) cum splenemphraxi: Digitalis enim generatim non fertur a cardiectasi passiva laborantibus. Et revera mox dira cephalaea, constrictiones cardiacaे adauctae, horripilatio frequens, symptomata turbatae digestionis, vertigo, et vomendi conatus exoriebantur. Magis vero conveniebat et melius tolerabatur in cardiectasi activa, cum serosa imprimis alicubi colluvie manifesta; attamen et hic pulsum saepe fecit irregularem, imo intermittentem, aut saltem non rarum. Imo quandoque pulsus frequentior efficiebatur, praesertim non praegressa VS., in morbo cordis activo. Generatim vero magis in his casibus sanguinis nitus in cor erat infringendus, quam renitus cordis in sanguinem: quae regula practica summi momenti *Albertinio* debetur. In hypertrophia cordis dilatati, arterolithiasi et varicibus, intercurrente synocha, febre vero soluta, et superstite quamvis lenita adfectione locali, Digitalis quamvis porrecta post intervalla, diu non ferebatur absque vomitu, phaenomenis cardiacis ipsis auctis. In cardiectasi hypertrophica cum broncho-pneumonitide lenta, instituta venaesctione, infusum Digital. e granis quindecim quotidie paratum per dies duodecim absque in-

commodo ferebatur, quin imo potius effectum prius diureticum, ac serius sedantem exscrutit; sed et per omnem curac decursum transpirationem laudabiliter adauxit. In alio vero casu, in quo praevalebat magis dilatatio, quam hypertrophia cordis, et simul aderat pneumonia lenta, amara magis respondebant, Digitali. Infusum Digitali, praemissac VSS. cardiectasim hypertrophicam cum valvularum vitio, intercurrente pericarditide ad minorem aberrationis gradum detruscere. In casibus, ubi cardiectasis, successu curae debilitantis hypertrophia superior evasit, omnino nequaquam fausto, praeprimis in bibonibus, et si cordis majus robur ad superandum circuli impedimentum requirebatur, Digitalis minus bene toleratur, imo circulum fere constanter conturbat. In casu quodam ad dissipandam seri intra pleuras copiam, Digitalis in pulvere grana viginti, in infusione grana nonaginta consumpta sucrunt absque incommodo ac gri. In casu haemoptyses activae a cardiostenosi, indeque pendente cordis auxesi, venaesectiones bene serebantur, a Digitali vero mox vnenata phaenomena visa sunt, contra quae Opium utile non inveniebatur adeo, uti a quibusdam stabilitur.

Dulcamara.

Interne. Decoctum ex drachmis duabus, uncia scmis, in rheumatismis, praesertim chronicis, cum suspicione residuorum syphilitis; in impetiginibus, uti tinea, pemphigo, eczematice chronicis, prurigine senili, in aphthis, in syphilide larvata, impetigine scabida, in pneumo-bronchitide catarrhali lenta cum suspicione tuberculorum pulmonalium, febre vero et locali irritatione potenter restrictis; in catarrho chronicis.

Rec. Stipit. Dulcamar. drachm. tres

Coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. unum.

Addebatur tali decocto acetatis Ammoniac solnt. drachma, cum roob Sambuci, vel Salis ammoniaci scrupulo uno altero (in catarrho chronicis praeprimis senes molestante), unacum extracto Taraxaci, vel Liquiritiae etc. Dabatur quoque insimul cum Ononidis spinosae, Polygalae, Bardanae, Sarsaparillae, Gua-

jaei et Lichenis islandici decocto. Idem valet de *extracto Dulcamarae*, quod vel in solutione, pilulis, vel, qui rarer, in pulvere ordinabatur:

Rec. Lichen. islandici drachm. duas

*F. l. a. infuso-decoctum p. $\frac{1}{4}$ h. (vide *Lichen*)*

Col. unc. octo adde solvendo:

Extr. Dulcamar. scrupul. unum.

D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

Decoctum ad col: librarum duarum ut plurimum in morbis supra dictis pro potu subministrabatur.

Pilulae eum Aethiope antimoniali, cum Ferri sulfate et extracto Digital. purp., cum Strychnina, etc. lubenter occurabant.

Electricitas.

Eleetro-punctura exercebatur, sed sine aliquo levamine, in aseite diffuso, peritonitide vero traumatica (per paraeenteses indueta) sanata.

Praesto erat easus anaesthesiae paraplegicae eum nota rheumatica, in quo post usum Ipecacuanhae, Aeoniti, Ammoniae, Solani tuber., Strychninae, vesicantium, Morphinae, Camphorae adplieabatur Eleetrieitas. Continuavit vero tune temporis dolor lancinans artus inferioris sinistri, et quidem tota die molestans noctuque; caput solite doluit, sed minus intense, tussis aderat per diem, alvus mittebatur eum sanguine mixta, eum tenesmo expressa. Adplieatio Eleetrieitatis galvanicae, et praecise poculorum XIV., 7. mensis (ut deuersus morbi, atque in eundem directae medelae pateat ratio). Die 14. m. observabantur in loeo adplieitae Eleetrieitatis, ustiones, sed status aegri melior, temperatura artuum inferiorum quidquam aucta, accusati dolores fere nulli, aliquae lieet minimae adhuc sensibilitatis redeuntis gloria ac gri. Nova applicatio poculorum Nr. VIII., et die 17. m. poculorum Nr. XII. locum habet. Die 19. reversi sunt dolores lancinantes artuum inferiorum et capitis, vagantes, et medioeris intensitatis; quare Opium cum Ipecacuanha et Nitro porrigebatur. Die 27. m. Eleetrium adplieabatur per $\frac{1}{2}$ horae, posito aegro in balneo universali simpliei. Die mensis proxime subsequentis Junii 4. permanent in statu omnia; pro Electrico

ordinatur lutum Aponense, pilulae *Valleti* subministrant medicamen, unde visibilis quacdam commendatio erat mense Augusti, ac stati vero fors magis tribuenda, quam aliis. Patebat, nam Electricitatis adplicatae effectuum dijudicandorum gratia scitu est necessarium, patebat in hocce casu origo rheumatica; patebat affectio praecipua nervorum spinalium, et quidem in eorum radibus posterioribus sita, ex qua illa sensibilitatis jactura; patebat affectio duplex, una originis antiquac (ex tribus annis), galeac aponeuroticae musculorum colli, uer non hymenis nervorum, has partes, faciem providentium affectio recens altera. Nil igitur mirum, si parum levaminis exsurgeret a mediis invocatis. Revera, et quid medicus agere valet, qualem instituere curam in partes sensibilitate destitutas, laxas, debiles, qualis cutis in hujusce casus subjecto notabatur? Exorta paralysi minimorum surculorum nerveorum minus secernebatur sebi, ipsiusque sudoris, qui prae aliis secretionibus utilis evadere debuit. Docuit vero praesens casus, Electricitatem, quae diffunditur per superficiem corporis, hinc per cutim et per nervos, qui per eam distribuuntur, actionem suam primam dirigere ad encephalum, ex qua functiones organicae majori cum aactivitate percipiuntur, accelerare circulationem et respirationem; reddere secundum excretiones magis abundantes frequentioresque; sed et materiales in humano organismo inducere mutationes, id quo pustulae exortae omnino confirmant.

Casum adduco paraplegiae in villico 27 annorum, fortissimae compagis. Pedibus nudis in aqua diu stetit, et aliis sese exposuit potentissimis. Dolor obtusus, quasi gravitans, profundus, qui ab ultima vertebra dorsali ad primam usque saeralem decurrebat, et per pollicis spatium extendebat, in utrumque latus, sub pressione rudiori nil, maxime vero sub trunci reflexione aut motu rotatorio exasperandus; apophyses spinosae ibi paulisper prominebant. Alius dolor descripto similis in regione vertebrarum dorsalia, qui vix occupans duarum vertebrarum spatium, magis acutus magisque superficialis sub tactu et atmosphaerae vicissitudinibus exasperabatur. Artus ab omni sensatione dolorosa penitus liberi cum sensibilitate et temperatura quasi normalibus. Sub incessu opere baculi tantum concesso aeger articulationes femorales tantummodo exercuit, articulationibus genuum immotis.

Aderat adhuc sensus ponderis in epigastro. Alvis segnis, per dies octo etiam haerens. Urinæ difficulter nec non cum levi dolore emissæ erant plerumque turbidae. Sanguis prius jam evacuatus erat, sed sine fructu. Cura inchoata cum aqua laxat. Viena., cum Strychnina et cum adapplicatione fonticulorum ad latera columnæ vertebralis, sed incassum. Confugiebatur ideo demum ad adapplicationem Electro-magnetismi ope machinae ab ingenioso Viennensi Professore de *Ettinghausen* inventae. Adplicabatur polus negativus inter plantas pedum aut suras, positivo columnæ vertebrali lumbari adposito. Inde ratione polis tum et quando inversis adplicatio per $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ horae, serius per horam integrum bis in die continuabatur. Aeger ad plantas et suras sub diuturniori adapplicatione paulatim percepit sensum formicationis et caloris, nil vero talium ad columnam vertebralem, quae tantummodo succussions persensit productas conductoribus in crucem positis et invicem se tangentibus. Poli manibus exceptis eandem sensationem inducebant, quam quisque sanus experitur. Eventus autem per mensem et dimidium quasi adpliciti Electro-magnetismi continuati is erat, quod aeger observaverit motum extremitatum inferiorum paulisper, sed parum faciliorem. Anni scholastici finis ulteriore talis praxeos effectum amplius observandum non permisit.

Proferre quoque in animo mihi est, casum paralyseos nervi facialis sinistri cum anaesthesia nervi acustici sinistri et paresi artuum lateris dextri (procedente ex causa mechanica, i. e. ab exostosi, syphilidis reliquia, in apophysi petrosa ossis temporalis et in meatu auditorio lateris sinistri). Electro-magnetismus variis regionibus applicitus et inversis polis, nullum fecit attulit juvamen; quare diagnosis causae organicae confirmabatur, et cura tantummodo continuabatur antisyphilitica.

Ope galvanicac Electricitatis applicabatur hydriodas Potassæ, sed et Mercurius sublimatus corrosivus.

Equisetum arvense.

Decoctum ex uncia semis, integra paratum, in hydrope ascite locum invenit:

*Rec. Herb. Equiseti arvens. unc. semis
Coque c. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h.
Col. unc. octo adde :
Oxymell. squillit. unc. unam.
D. S. Pro potu.*

Euphorbium.

Emplastrum gummi-resinae Euphorbi (s. cmplastrum Cantharidum resinosum, emplastrum vesicans perpetuum, seu Janini) in usum tractum fuit, ubi scopus exigebat, inflammacionem localem, secretionem vicariam vel ulcerationem artificiales diutius constantes sustinendi. Sic in cephalea sclero-meningea rheumatica, praeter Calomel cum Jalapa, hirudines ad nucham, et:

Rec. Emplastri gummi-resin. Euphorb. q. s. ut extendatur supra pannum lineum pollicis unius et dimidii.

S. Calore emollitum adplicetur ad regionem posteriorem superiorem colli.

In blennorrhagia syphilitica ad universalem jam vergente non bene curata idem emplastrum apponcbatur cum fructu utriusq; femorum faciei.

Faba.

Farina Fabarum, externe. In erysipelate oedematoso ordinabatur compressio tumoris farina Fabarum conspersi, et antigastrica interna; quibus auxiliis brevi tempore et tumor immuncbatur, et gastrismus. Quaedam tamen intumescentiae sparsae duriusculae in tela cellulosa femoris dextri remanebant, quac unguenti neapolitani exigebant opus.

Rec. Farin. Fabarum libr. semis.

S. Pro adspersione locali scroti et cruris.

Quum haec farina sola non sussecisset, eadem adspersio prosecit ex farina Fabarum et Camphora rasa (vide Camphora).

In parulide erysipelacea:

Rec. Flor. Sambuci

Farin. Fabarum aa unc. duas.

M. redige in pulverem homogenenm.

S. Sacculo inclusus lepidus adplicetur parti affectae.

Ferrum carbonicum.

(*Crocus Martis aperitivus Ph. Austr.*)

Optime praescribitur in pilulis, a scrupulo ad drachmam semis; in chlorosi:

Rec. Carbonat. Ferri

Extr. Aloës aquos.

— *Myrrh. ॥ ॥ scrupul. unum*

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilulae XXX.

Consp. pulvere Lycopodii.

D. S. Omni bihorio pilulae duas.

Sensim augebatur dosis carbonatis Ferri ad grana XXV, ad drachmam semis, ad scrupulos duos, et quidem optimo cum successu; addebat extractum Absynthii, Chamomillae, Gentianae, Quassiae, etc.

In febri intermittente:

Rec. Carbonat. Ferri

Sulfat. Chinin. ॥ ॥ scrupul. unum.

Extr. Taraxaci q. s. ut f. pilulae XXX.

Consperg. pulvere Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae duas.

Augebatur dosis ad drachmam semis, addito Felle Tauri inspiss., in hydrope ascite, peracta jam paracentesi; sed et connubium quoque celebrabatur cum extracti cort. Peruv. drachma dimidia.

Pulvis, in nevralgiis quoque adhibitus fuit magno cum levamine et quidem nevralgiae intercostalis a zosteri semicircinato trunci relictæ; itidem prosopalgiae:

Rec. Carbonat. Ferri drachm. unam

Pulv. cort. Ciunamomi drachm. semis.

M. D. S. Sumatur in duabus vicibus, interpolata omni quarta die aquae Seidschützensis, vel Püllensis libra semis — una.

Melius exinde valuit aeger, sed dolendum, quod domum redire debuerit.

**Ferrum carbonicum oxydulatum,
Massa pilularum ferruginosa Valleti.*)**

Earum praecipua pars est carbonas Ferri oxydulati, s. carbonas protoxydi Ferri, praeparatum stabile sistit ob mcl aut saccharum, altiorem oxydationem Ferri cohicns, et remedium praestans, ob faciliorem in secundas vias susceptionem; in chlorosi, ctc., digestionem cacterum non adeo offendens. Dosis hujus massae pilularis ab una usque ad pilulas decem de dictis: pilula autem singula continet granum 1,3 carbonatis Ferri = gr. 0,8 protoxydi.

In febri subcontinua cum residuis chloroseos, post usum tincturae, et extracti malatis Ferri:

Rec. Pilularum Valleti Nr. quinque.

S. Omni biliorio pilula una.

Consumtis deinceps pilulis Nr. novem de dictis, sanatio obtinebatur. In quotidiana intermitente, cum incipiente pellagra, febre per sulfatē Chininae et sulfatē Ferri jam abacta, sed denuo recurrente, earumdem pilularum Nr. sex in die consumebantur optimo cum successu. Benc confirmarunt hae pilulas curam in scrofulae et pellagracis casibus quibusdam. In anaesthesia paraplegica nil plane fausti effecerunt (vide *Electricitas*).

In chlorosi primaria, post usum Rhei cum Aurantio, post Absynthium et Quassiam, pilulae Valleti Nr. decem in dictis summatae nondum procuravere menstrua, quare confugiebatur, ad:

Rec. Pilular. ferruginos. Valleti Nr. octo

Extr. Aloës aquos. grana decem

Pulv. Liquirit. q. s. ad pilulas Nr. duodecim.

Consperg. eodem pulvere.

D. S. Omni biliorio pilulae duea.

Hac pilulas ab initio produxerunt incommoda gastrica, quacum tamen, dosi imminuta, cessarunt.

Laudanda erat combinatio sequens, in hypertrophia licnis,

*^o) Extrait du rapport de M. Soubeiran, sur les pilules ferrugineses de Vallet, fait à l'Académie royale de Médecine, et approuvé par elle dans sa séance du 8. Mai 1838. Paris, 1838.

post usum solventium tonicorum, muriatis Ferri ammoniacalis et globulorum martialium in balneo:

Rec. Massae pilular. Valleti Nr. sex

Sulfat. Chinin. grana octo.

Malaxentur invicem, et f. l. a. pilulae Nr. sex.

D. S. Omni bihorio pilula una.

Extractum malatis Ferri.

(*Extr. Ferri pomatum, s. Extr. Martis cum succo pomorum*)

Pilulae, in chlorosi:

Rec. Extr. malat. Ferri scrupulos duos

— Trifol. fibrin. scrupul. unum

Pulv. rad. Valerian. q. s. ut f. pilulae XXX.

Consperg. pulvere Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

In eodem morbo eadem formula cum extracto Aloës aquoso, Chamomillae, Valeriana, Absynthii, Gentianae praescribebatur; ubi vero adfuit sensibilitas notabilior, addebantur Hyosciami extracti grana sex.

Pilulæ ex extracto malatis Ferri unacum sulfate Chininae, in quartana simplici cum insigni lienis hypertrophia, hac vero per methodum curae aptam jam imminuta, non saltem febrim illico decrescere, verum et ingentem illum lienis tumorem prompte et penitus solutum reddidere.

Felix utique praescriptio fuit in amphimerina rheumatica cum irritatione systematis uropoëtici in chlorotica, post usum pilularum ex Quassia et cortice Peruviano, et abacta jam febre, omnique irritatione :

Rec. Extr. malatis Ferri

— cort. Peruviani

— Quassiae āā scrupulum unum

Pulv. Acori q. s. ut f. pilulae XXX.

Consperg. pulvere Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

In pellagrae stadio secundo, post aliorum medicaminum usum:

Rec. Extr. malat. Ferri grana duodecim

— Gentianae luteae scrupul. unum

Pulv. rad. Calami arom. q. s. ut f. pil. xij.
 Consperg. pulv. rad. Irid. florent.
 D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Tinctura malatis Ferri.

In chlorosi:

Rec. Flor. Chamomill. *unc. semis*
Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Col. *unc.* octo adde:
 Tinct. malat. Ferri *scrupul. unum*
 Extr. Absynth. *drachm. unam.*
 D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

In ascite atonico:

Rec. Quinque radicum aperientium *unc. duas*
Consc. coq. p. $\frac{1}{4}$ h.
Col. libr. unius adde:
 Tinct. malat. Ferri *drachm. semis*
 Roob Juniperi *unc. unam.*
 D. S. Omni bihor. vascul. coff. semis.

Augebatur serius tincturae dosis ad drachmam integrum.

Ferrum muriaticum.

In diarrhoea pellagrosa:

Rec. Rad. Rhei chinens. *drachm. semis*
Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Col. *unc.* sex adde:
 Muriat. Ferri solut. *grana quindecim*
 Syr. cort. Anrant. *unc. unam.*
 D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Murias Ferri ammoniacalis.

Vide *Ammonium muriaticum marliatum.*

Ferrum limiatum.

Pulvis, vel pilulae ad grana 6, 9, 12; e. gr. in tremore mercuriali; ad finem curae:

Rec. Ferri limati alcoholisat. *grana duodecim*
 Extr. Quassiae *drachm. unam*

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilulae pond. gran. duorum.
Consurg. eodem pulvere.
D. S. Omni bishorio pilulae quatuor.

Connubium cum Felle Tauri et sulfate Chininae, in febri tertiana erratia eum splenemphraxy insigni; postquam solventia, flores Salis ammon. mart., et balnea ferrata fuerant adhibita.

Ferrum sulfuricum.

Pulvis, sed raro, sequenti formula:

Rec. Ferri sulfur. cryst. drachm. semis
Sacch. alb. [drachm. unam] et semis.
M. f. pulv. div. in dos. aeq. **Nr.** duodecim.
D. ad chart.
S. Nr. I.

Rec. Bicarbonat. Sodaæ drachm. semis
Sacch. alb. drachm. unam et semis.
M. f. pulv. div. in dos. aeq. **Nr.** duodecim.
D. ad chart.
S. Nr. II.

Sumat aeger omni bishorio unum ex' pulveribus **Nr. I.**, et
paulo post e' pulveribus **Nr. II.**, hauriendo
desuper dimidium poculum aquae.

Pilulae, cum extr. Taraxaci, in febri quartana eum hepato-splenemphraxy eonsequente, seopo prophylactico, ad eonvalentescentiam firmandam; itidem ut vires redintegrentur, in leucorrhœa jam eoualescecente, in chlorosi, in pellagra:

Rec. Sulfat. Ferri grana sex
Extr. Taraxaci scrupul. unum
Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pilulae decem.
Consurg. pulvere Lycopodii.
D. S. Omni bishorio pilula una.

Vel sulfatis Ferri grana octo, divisa in pilulis octo — duodecim; pro pulvere vero Liquiritiae sumebatur Acori pulvis.

Cum extracto Trifolii fibrini, in pellagrae primo stadio, post usum Rhei, et penes diaetam laeteam:

Rec. Sulfat. Ferri grana decem
Extr. Trifol. fibrini drachm. unam

Pulv. Acori q. s. ut f. pilulae XX.
 Consperg. pulvere eodem.
 D. S. Omni bihorio pilulae tres.

Haud pauci erant casus pellagrae vel recentis, vel progressae, et veteris, in quibus hae pilulae ad mentem cl. Professoris *Federigo* praestantissimum non exstitissent remedium. Ut plurimum hebdoma curae suscepit ut observari posset symptomatum omnium luculenta remissio. Communiter hocce remedium alternabat cum *Rheo*. Non minus laudanda fuit earum virtus in leucochlorosi.

Curae confirmatoriae, in catarrho bronchiali chronicō cum febre lenta inserviebat:

Rec. Extr. Trifol. fibrini drachm. duas
— Hyoscyami nigri
Sulfat. Ferri aa scrupulum unum
Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. pond. gr. trium.
Consperg. pulvere eodem.
D. S. Omni bihorio pilulae tres — quatuor.

Cum Aloës extracto, roboris addendi gratia, in amenorrhœa cum fluore albo vicario et incipiente scorbuto in scrofulosa.

In chlorosi secundaria, versus finem faustae curae:

Rec. Sulfat. Ferri grana decem
Extr. Absynth.
— Valerian. sylv. aa scrupul. unum
Pulv. Absynth. q. s. ut f. pilulae XX.
Consperg. pulvere Lycopodii.
D. S. Omni bihorio pilulae tres.

In cardiectasi passiva:

Rec. Sulfat. Ferri grana duodecim
Extr. cort. Peruv. q. s. ut f. pil. X.
Consperg. pulv. Lycopodii.
D. S. Omni bihorio pilulae duae.

In simili casu:

Rec. Sulfat. Ferri grana octo
Pulv. fol. Digital. purp. grana sex
Extr. Taraxaci drachm. unam
Pulv. rad. Liquirit. q. s. ut f. pil. pond. granor. dñorum.

Consp erg. pulvere eodem.

D. S. Omni trihorio pilulae tres.

In hypertrophia cordis cum dilatatione, et hydrope secundario cura nonnisi palliativa institui potuit:

Rec. Sulfat. Ferri

Extr. Digital. purp. *aa grana duo*

— Dulcamar. *grana quindecim*

Pulv. baccar. Juniperi q. s. ut f. pilulae decem.

Consp erg. eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Ob conatus vomendi, Digitalis seposita, emendatio nulla hydrops magis evolutus, hinc:

Rec. Extr. cort. Peruvian. drachm. semis

Sulfat. Ferri grana decem

Pulv. Liquirit. q. s. ad pilulas formandas XX.

Consp erg. eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilulae quatuor.

Multum inde emendatus domum abiit, ut continuaret curam: pulsationes cordis et aortae imminutae, morbus tamen secundarius inversa ratione progrediebatur, viresque aegri magis magisque frangebantur. Quod magna cum fortuna contra cardiectasin passivam (absque simultanea hypertrophia) pugnavit, Ferrum sulfuricum sine multo fructu dabatur in anevrysmate aortae.

Connubium cum Pigmento indicō, vide sub *Pigment. ind.*

Solutio, interne, ad curam confirmandam, in ephidrosi chronica:

Rec. Decociti cort. Peruviani ex unc. una per horam parati unc. decem

adde solvendo:

Sulfat. Ferri grana octo

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Solutionem Ferri sulfurici et Chinini in Acido sulfurico vide sub *Chininum sulfuricum*.

In pellagra:

Rec. Rad. Taraxaci unc. duas

Consc. coque c. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{2}$ h.

Col. fortiter expressae librae unius adde:

Sulfat. Ferri *scrupul. semis*

Extr. Gramin. liquid. *drachm. tres.*

M. D. S. Omni bishorio vasc. coſſ. *semis.*

Sic propinabatur ex deeoeto Ononis spinosae, et corticis Peruviani, addito, pro re nata, extracto Aloës aquoso.

Ingrediebatur quoque mixturam ex aqua Rosarum, etc.: quod vide sub *Rosa*.

Protojoduretum Ferri.

Interne. Pilulae, in metro - oophoritide lenta cum residuis bronehitidis eonvulsivac in serofulosa (amenorrhoea), post usum extraeti Hyoscyami, emulsionis amygdalinae:

Rec. Protojodureti Ferri *grana duo*

Extr. Taraxaci *grana octodecim*

Pulv. Liquirit. *q. s. ut f. l. a. pilulae decem.*

Consperg. pulvere eodem.

D. S. Omni bishorio pilula una; excepto tempore febrili; postea pilulae duae omni bishorio.

Externe. Pulvis, methodo endermatiae:

Rec. Protojodureti Ferri *grana quinque*

Pulv. Amyli *scrupul. duos.*

M. exactissime, fiat pulvis aequabilis.

D. S. Adplicetur per tres vices, ad plagam ex vesicante relictam.

Sed dolor idem permansit, ita ut ad alia, i. e. ad pilulas ex Conii extracto eum Kali hydriodie eonfugeretur.

Idem protojoduretum Ferri adplicabatur in duobus serofulac casibus; sed melior inde in ulecribus quam tumoribus esse-ctus visus est. In hypertrophia lienis, quae non cessit muriati Ferri ammon. cum sulfate Chiminæ, balncis martialibus et pilulis Valleti, hydriodatis Ferri ab initio granum $1\frac{1}{2}$, postea grana $2 - 2\frac{1}{2}$ de die eonsumta, et balnea cum globulis martialibus adhibita tumorem imminuebant lienis. Emphraxes autem sanguineae lienis non tolluntur remediis solventibus, quae magis relaxarent, sed potius illis, quae majorem tonum vasis absorbentibus nee non venosis et ipsi lienis textui tribuunt: praeparatis ergo martialibus, notis jam Romanis in lienis hypertrophia hie praeceipue opus est. A mitioribus vero praeparatis ferricis ine-

piebat cura, non negligendo subministrationem purgantium tonicorum interpolatam; Chininae sulfas dabatur, quando a febris intermittentibus orta erat lienis hyperaemia, et optime conduxit. Caeterum omnis genuina inflamatio abesse debet, ut Ferrum toleretur.

Prussias Ferri.

Pilulae, in cardiectasi hypertrophica sinistra cum incipiente hydrothorace et accidente parulide; post adaequatam curam antiphlogisticam, pacato systemate nervoso:

Rec. Prussiat. Ferri grana quindecim

Extr. Taraxaci q. s. ut f. pilulae quindecim.

Consp erg. pulvere Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilula una.

Sub earumdem pilularum usu molestiae cardiacae sensibili-
ter imminuebantur, sed cephalicae potius increvere.

Globuli tartratis Ferri et Lixivae, s. Globuli martiales.

Externe, in solutione pro balneo, in splenemphraxy:

Rec. Globulos martiales Nr. duos.

*S. Globulus unus coquatur in aquae fontis libra per horam,
atque dein aquae pro balneo addatur.*

Tales globuli martiales cocti ctiam cum decocto Saponis
aquac pro balneo addebantur.

Filix Mas.

Decoctum ex uncia semis, vel drachmis sex, ad colat. unc.
octo paratum; etiam pulvis a scrupulo uno ad drachmas duas.
In febri verminosa:

Rec. Rad. Filicis Maris unc. semis

Coq. c. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h.

Sub finem coctionis infunde:

Semin. Santonici drachm. duas

Stent in digestione p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.

M. D. S. Omni hora cochl. cib. duo.

Augebatur dosis radicis Filicis ad drachmas sex. Decocto quandoque subjungebatur Absynthium, Tanacetum.

Foeniculum.

Infusum, in enteralgia flatulenta febrili cum accedente ascite:

Rec. Semin. Foeniculi drachm. duas

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

. Sal. ammoniaci depur. drachm. semis

Succi Liquirit. drachm. unam.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Elaeosaccharum Foeniculi in pulvere, cum Rheo et Magnesia et aliis pulveribus ad drachm. duas; in infuso Arnieae cum spir. Aetheris sulfuriei, in febri gastrico-biliosa, etc.

Aqua destillata Foeniculi, ad corrigendum olei Jecoris Aselli saporem:

Rec. Aquae destill. Foeniculi unc. duas.

S. Cochlearia cib. duo illico post sumtum oleum Jecoris Aselli.

In febri gastrico-biliosa, cum nota nervosa:

Rec. Aquae destill. Foeniculi unc. tres

Spirit. Aether. sulf. gutt. triginta

Syr. Diacodii unciam unam.

M. D. S. Omni hora cochl. cib. duo.

Ex aqua Foeniculi pulpa Cassiae lubenter sumebatur et tormina praeceavebat. In aqua dest. Foenic. solvebatur extractum Graminis, et addebatur hydrochloras Ammoniae, in scirro ad pylorum.

Fumaria.

Usus ejus rarus erat.

Rec. Herb. Fumariae unc. semis.

Consc. coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$, h.

Col. fortiter expr. unc. decem adde:

Tinctur. Rhei aq. unc. unam

Elaeosacch. cort. Aurant. drachm. unam.

M. D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

G a l b a n u m.

Emplastrum de Galbano crocatum, ad furunculos, tumores diutius suppurantes cum successu applicabatur:

Rec. Empl. de Galbano crocati unc. duas.

S. Adplicetur ad furunculos.

Unacum Theriaca Andromachi, in anevrysmate aortae thoracicae, ad dolores ex attritu vertebrarum sedandos:

Rec. Empl. de Galbano crocati unc. duas

Theriaceae Andromachi unc. unam.

Malaxentur invicem leni igne, f. emplastrum.

S. Adplicetur ad decursum affectionis dolorificae.

Unacum emplastro mercuriali et Cicutae ex partibus anatomicis; in hepato - splenemphraxyi.

G e n t i a n a l u t e a.

Pilulae, in pneumonia rheumatico - biliosa, cum dilatatione arcus aortae; ad finem morbi acuti:

Rec. Extr. Gentian. drachm. semis

Pulv. semin. Lycopod. q. s. ut f. pil. decem.

Conspurg. pulvere eodem.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

In porrigine larvali Willani:

Rec. Extr. Gentian. grana duodecim

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. sex.

Conspurg. eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilula una.

Rec. Extr. Gentian.

Gummi-resin. Asae foet. ॥ grana duodecim

Pulv. Liquirit. q. s. ut formentur inde pilulae duodecim.

Conspurg. eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilula una.

In hepato - splenemphraxyi subinflammatoria febrili, accedente hydropericardio et hydrothorace, post plura alia medicamina:

Rec. Extr. Gentian.

Saponis medicinal. ॥ drachm. semis

Pulv. rad. Calami arom. q. s. ut f. pil. XXX.

Conspurg. pulvere eodem.

D. S. Sufficiant pro duabus diebus, sumendo pilulas, in vicibus tribus de die, quinque.

Gramen.

Decoctum Graminis ex uneia una, vel duabus, aut solum, aut cum Acido tartrico, aut succo Citri inserviebat potui permultis in febribus, praeprimis gastricis, biliosis, etc. Decocto addebatur pro medicamine, Cremoris Tartari, Tartari tartarisati uncia semis, Sal ammoniacus depuratus et succus Liquiritiae, vel granum unum alterumve Tartari emetici, vel Manna clecta. Gramen coquebatur cum Ononide spinosa, cum fructibus Tamarindorum, addito Tartaro boraxato, vel liquore Terrae sol. Tartari; cum Nitri puri drachma, et Oxymelle squillitico quoque praescriptio placuit.

In hydrope, et plerisque febribus:

Rec. Rad. Gramin. unc. duas

Consc. coque c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$, h.

Col. librar. duarum adde:

Cremor. Tartari

Syr. simpl. \overline{aa} unc. semis.

D. S. Pro potu.

In febri quartana cum emphraxibus:

Rec. Rad. Gramin. unc. duas

Consc. coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$, h.

Col. fortiter expr. librae unius adde:

Salis ammon. depur. drachm. semis

Succi Citri r. pr. drachm. sex

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Extractum Graminis liquidum ad unc. semis eum aliis remediis solventibus, uti in ultima formula loco succi Citri, uncia semis extracti Graminis occurrebat, in serofulis cum helminthiasi.

Gratiola.

Ultimum melancholiae residuum, alvo ex infuso Gratiolae aliquoties mota, dispellebatur.

Graphites,
s. Carburetum Ferri nativum.

Pulvis. Interne, in pemphigo scorbutico, decrescentibus per apta medicamina, praeter corticem Peruvianum cum Acido nitrico diluto, symptomatibus scorbuti et decrescente eruptione, bulla vero magna perstante in gena:

Rec. Pulv. Graphitis elutriati *scrupul. duos*
Sacch. albi *drachm. unam.*
M. exacte, div. in pulv. aeq. Nr. sex.
D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Postea:

Rec. Pulv. elutriat. Graphit. *drachm. unam*
 — Aethiop. antimon. *grana duodecim*
Sacch. alb. *drachm. semis.*
M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.
D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Per duas hebdomadas continuabatur Graphites, sed absque vel exiguo cum effectu, ita ut ad corticem Peruvianum demum confugeretur, optimo cum successu.

In lichene, post usum aquarum Rainerianarum, et penes has, Lac, balnea simplicia, et cum Tritico et herba Cicutae:

Rec. Carbureti Ferri nativi *drachm. unam*
Sacch. alb. *drachm. unam et semis.*
M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. octo.
D. S. Omni bihorio pulv. unus.

Jam die altero exanthema pallescere incepit; Graphites augebatur ad scrupulos quatuor, postea ad draehmain unam et semis. Desquamatio magis magisque pallida: Graphites ad draehm. duas. Cutis etsi tensa, tamen minus arida et tensa; sudor enim semper adfuit, praesertim de nocte. Sed adhiberi debebant dein adhuc aquae thermalcs Aponencs, et unguentum Jasseri.

Idem remedium ad drachmam semis, cum elacosacchari cort. Aurant. drachmis duabus, penes balnca ex Tritico lichenem emeliorarunt.

Guajacum.

Decoctum *rasurae ligni Guajaci*, ex uncis duabus, ad colat. unciarum decem paratum, praeterea cum Sarsaparilla; item in deeoeto speierum lignorum, adversus luem (serofulam) medorrhoicam eum arthro - rheumate. In syphilide universalis cum diathesi scorbutica:

Rec. Rasur. ligni Guajaci *unc. duas*

Coq. c. s. q. aq. p. horam

Col. unc. octo adde :

Acidi nitrici diluti *drachm. semis*

Mucilag. g. arab.

Syr. simpl. *āā unc. unam.*

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Resina, in pilulis ad grana duodecim et ultra, in podosterrite serofulosa - medorrhoiea:

Rec. Resin. ligni Guajaci

Aethiop. antimon. *āā grana duodecim*

Extr. Aconiti *grana quatuor*

— Liqnirit. q. s. ut f. pil. XVI.

Consperg. pulvere eodem.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

In adenophymate serofuloso :

Rec. Gummi-resin. Guajaci *grana duodecim*

Extr. Quassiae

— cort. Peruvian. *āā drachm. semis*

Pulv. rad. Acori q. s. ut f. pil. XXX.

Consperg. pulvere Cinnamomi.

D. S. Omni bihorio pil. duae.

Gummi arabicum.

Mucilago addita infusis et decoctis ad unciam unam; adhibebatur etiam pulvis ad subactionem oleorum et Camphorae.

Linctus, ad leniendam tussim:

Rec. Mucilag. g. arab.

Syr. Althaeae *āā unc. unam*

Extr. Hyoscyami *gran. quinque.*

M. f. linctus.

D. S. Ad parva cochlearia imminentे tussi.

Rec. Mucilag. g. arab.

Syr. Diacodii $\overline{\alpha\alpha}$ unc. unam.

M. f. linctus.

D. S. Ut supra.

Huic linctui addi solebat aqua Laurocerasi, tinctura Opii simplex, acetum Morphii vel et alia.

Mucilago g. arab. serviebat suspensioni sulfatis Chinini, extracti Scillae, aliarumque usui endermatico destinatarum substantiarum.

Collyrium, in ophthalmia rheumatica:

Rec. Aq. destill. commun. unc. sex

Extr. Hyoscyami grana sex

(vel: Aq. dest. Laurocerasi drachm. unam)

Mucilag. g. arab. unc. unam.

M. D. S. Collyrium.

Gummi Guttae.

Pilularum forma, pro necessitate adjunctis Calomcle, rad. Scillae marinac, resina Jalappae: ad grana octo — decem. In hydrope atonico:

Rec. Pulv. Gummi Guttae grana octo

Extr. Taraxaci scrupul. unum

Pulv. Calami aromat. q. s. ut f. pil. X.

Consperg. pulvere eodem.

D. S. Omni hora pilula una.

Solutio, in enteralgia flatulenta febrili, accidente hydrope ascite; urinae parcae, sudores nulli, tumor abdominis auctus, magis tensum duriusque ipsum:

Rec. Gummi Guttae grana sex

Cont. solve in:

Aq. comm. dest. unc. sex

adde:

Carbonat. Lixivae alcal. solut. drachm. tres

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Medicamentum vero vomitum produxit et alvum restrinxit.

Helleborus albus.

Ingrediens unguenti Sulfuris compositi. Vide *Sulfur.*

Hordeum.

Decoctum porrigebatur instar potus in omnibus fere febrilibus morbis, quamvis non in omnibus casibus, nominatim in febri biliosa et intermittente (cum Acido tartrico, Cremore Tartari et Oxymelle simplici); in chlorosi (cum elixir acido Halleri); in scorbuto (cum Acido sulf. dil.); in inflammationibus praesertim pulmonum (c. Nitro, Tartaro emetico). Potus largus, in febribus nervoso-eatarrhoso-gastricis cum parenteritide folliculosa; in nevro - cystide ex usu Cantharidum, etc.

In adfectionibus febrilibus, generatim:

Rec. Hordei mundati unc. duas.

Coq. c. s. q. aq. c. ad crepaturam granorum usque

Col. librarium duarum adde :

Sacch. alb. unc. unam.

D. S. Potus.

Collutorium, cum mucilagine g. arab., in angina faucium.

Rec. Dec. Hordei ex unc. duabus l. a. parati libr. unam

Mucilag. g. arab. unc. duas.

D. S. Collutorium.

Externe, cum Sale ammoniaco, vel cum oleo Lini et Sale culinari :

Rec. Decociti Hordei l. a. parati unc. decem

Olei Lini unc. duas

Salis culinaris unc. semis.

M. D. S. Clysm.

Hirudines.

Lateri dolenti adplieabantur, in pleurodynia rheumatica, in pleuritide hypocleptica. Ad regionem temporalem, in febri rheumatico-eatarrhali, cum oculorum injectione et illaerimatione, cephalaea rebelli, coryza et narum obstipatione. Retro aures, in statu delirii, in encephalo-symplochesi; in meningitide peripherica (sed etiam ad nucham et in narices). Ad mneham, in cephalaea-selcro-meningea; in statu delirii in febri nervosa. Repetitae applicationes hirudinum ad cervicem (et unguenti Antenriethi) intra dies 19 sanarunt perfecte paraplegiam artuum superiorum, ex apoplexia sanguinea congestiva relictam, cum accidente ne-

vralgia cervicali continua atque subinflammatoria incidentem. Idem valet de apoplexia sanguinea, et paresi rheumatica; sie in tromophrenesi bibonum, infra oeciput ad applicabuntur sanguisugae. Ad collum anterius, in isthmite. Ad latus colli, in stomatite, ac syphilitica faucium ulceratione. Ad manubrium sterni, in isthmo-tracheitide, in eatarrho bronchiali residuo ex alio morbo. Ad mammas, ad sternum, in dolore rheumatico mammilari (vel recurrente ex processu interno tuberculoso). Juxta fistulam spiritalem, in broneho-tracheitide eatarrhali lenta. Ad cartilaginem xyphoideam, ubi aereusabatur dolor, in eatarrho bronchiali. Ad elavicularis, in oesophagite, et parotitide rheumatica. In parulide, parti adfeetae non nimis vicine hirudines locum habebant. Circa tumoris peripheriam, ad praecordia, in anevrysmate areus aortae, post hirudinum applicationem eum epithemate frigido aut ex aqua Goulardi fomentando. Cirea locum gibbi, in cyphosi cum tumore dorsuali. Ad latera chordae inflammatae, in phlebitide femorali (praemissa venaesectione). Ad latera columnae vertebralis, in notaeo-myelitide lumbari, malactica. Ad lumbos, in spondylorheumate lumbari. Ad genu, in arthrorheumate inflammatorio, in tumorem mali moris abeunte. Ad partem internam tibiae, in nevrorheumate erurali hypoeleptico. Supra bubonem syphiliticum. Ad epigastrum, in epigastralgie. Ad abdomen, in peritonitide transeunte in hypoclesin, in aseite et anasarea ex searlatina, in aseite ob peritonitidem. Ad genitalia, in puerpera, ob lochia suppressa. Ad labia pudenda et faciem internam femorum, in oophoritide chronicā. Ad partem femorum internam, in congestione menstrua in puella amenorrhoeia, in metro-oophoritide lenta in amenorrhoeia, in hepatitide peritonaea, in metastasi encephalicia, decursu diarrhoeae seroso-lymphaticae. Ad perineum, in metro-pareetamate lente inflammatorio, in haematuria renali, menstruationi et haemorrhoidum fluxui viearia, in orchitide. Quatuor digitis procul a cursu arteriae, in arteritide lenta erulari; in aliqua distantia a scroto (ne pars adfeeta nimis irritetur, et evitetur inflammatio erysipelacea unaenin gangraena), in orchitide traumatisca, sed praemittebatur venaeseccio; sic quoque in tumoribus et congestionibus haemorrhoidalibus, in aliqua ab istis distantia admovebantur hirudines. Maxima vero extensio et felicissimo eventu gaudebat iterum iterumque commendanda

hirudinum ad applicatio ad anum; et quidem in: febribus sive intermittentibus, sive continua remittentibus, gastricis, nec tantum biliosis, verum et subruralibus, si irritatio gastrica major esset; in splenalgia; in hepato- et splenemphraxi; in synoehis gastricas; in nervosis parentericis; in colica hepatica; in hepatide; in colitide lenta; in colepatitide; gastro-enteritide; enteritide; ietero; in diarrhoea serosa-rheumatica; in paraphlogosi peritonaea circa hepar, circa splen; in enteralgia flatulenta febrili; in diarrhoea pellagrosa; in pellagra cum gastrica irritatione, stadio primo; in cardiectasi cum congestione hepatis aut lienis venosa. Hirudines No. 38 ano admotae solae absque aliis remedii febrem intermittentem tertianam irregularem eum nota gastrico-venosa sugarunt; sed alium adhuc similem casum proferre valeo. Quis non sequeretur naturae venerabilis nutum, quando febres biliosae fluxu haemorrhoidalii judicatae essent: id quod revera, de quo loquo r in Clinico solemniter accedit! Numerus applicatarum hirudinum in gravioribus et pertinacioribus inflammationibus (quae sine magna febre in Italia saepe ocurrunt) quandoque sat insignis erat. Tales easus fuere praeterea aliis a peritonitide, mesenteritide, tumore rheumatico genu. In nullo tamen horum numerus 160 hirudinum, intra tres menses, excedebat. In praxi privata et nosocomiali medici Patavini longe majoribus numeris delectantur.

Hydrargyrum sulfuratum nigrum,
Sulfuretum Hydrargyri,
(Aethiops mineralis.

Pulvis, a granis tribus, ad serupulum de die:

Rec. Aethiop. mineral. grana novem

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Remedium praebuit in blennorrhagia vesicali in individuo pellagroso. Dosis serius augebatur ad grana duodecim.

Sequens formula, in psora sicca:

Rec. Aethiop. mineral. grana viginti quatuor

Flor. Sulfur. lot. drachm. duas

Sacch. alb. drachm. tres.
M. f. pulv. aequabilis.
D. S. Omni bihorio cochl. coff. unum.

Dosis Aethiopis serius ad drachmam semis aucta fuit.

Pilulae, ut plurimum cum extracto Taraxaci (ad mentem *Hufelandi*), ad totalem syphilidis localis et scabiosi contagii cxstirpationem; in tinca capitum; in ichthyosi squamosa, post usum Picis, unguenti anglicani, nova efflorescentiarum eruptione, et cuti tensa adeo, ut fere ad indurationem accederet; in condylomatibus ad annum.

Rec. Aethiop. mineral. scrupulum unum
Extr. Taraxaci q. s. ut f. pilulae X.
Consperg. pulvere Liquirit.
D. S. Omni bihorio pilula una.

Rec. Aethiop. mineral. grana quindecim
Extr. Conii macul. *grana duodecim*
— Liquirit. q. s. ut f. pil. XII.
Consperg. pulvere Liquirit.
D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Cum extracto Dulcamarae, in tinea capitum, habito sub finem respectu ad diathesin erethisticam scrofulosam.

Hydrargyrum stibiato - sulfuratum, Aethiops antimonialis.

Eadem forma, eadem dosis, fere in iisdem morborum formis, ut praecedens Hydrargyri praeparatum adhibebatur. Solenne remedium fuit in tinca curanda, et generatim in eruptionibus cutancis chronicis, cum primis eczematice chronicis, priori praeferebatur.

Unguentum Hydrargyri cinereum.

Hujus unguenti ope frictions instituebantur ad pectus, in pulmonis processu inflammatorio in hepatisationm transgrediente, aut jam exerto producto inflammationis pulmonis aut pleuræ; ad partem dexteram colli, in isthmide phlegmonosa; in tumoribus scrofulosis; in pleuride, peritonide hypocolecticis; in hepatide peritonaca diffusa, cum signis effusionis scrosac; in hepato-

et splenemphraxi; ad resolutionem tumoris residui in paraphlogosi hepatis; in tinea capitis unctiones partis capillatae; in nevrorheumate hypoleptico, in notaceo-myelitide lumbari, malactia, infraeta diathesi phlogistica, frictiones mercuriales ad spinam dorsi; in spondylectosi cervico-dorsali (syphilitica), monxae e latere tumoris ponebantur, et plagae ustae, ad imitationem *Asthley - Cooper* cum unguento neapolitano tractatae; in erysipelate oedematoso, tumore in erure rubro, modice calente, pastaceo, sed jam imminuto, intumescentiis sparsis duriusculis pugni magnitudine in tela cellulosa femoris remanentibus; in apoplexia sanguinea, frictiones ad sedem affectionis; in bubone; in syphilide universalis, sub schemate dolorum osteocoporum, condylomatum et mentagrac, inunctiones artuum quotidie instituebantur. In syphilide inveterata prima inunctio instituebatur in braehio sinistro, altera in erure dextro, quarta in erure sinistro, eligendo semper faciem internam horum artuum; quinto die nulla inunctio, sed balneum universale; sexto die inunctio iterum incipiebat a braehio sinistro, et frictiones pro necessitate et tolerantia per eundem eyelum continuabantur, vel et per plures cylos. Continuabatur haec methodus usque ad incipientem salivationem, et haec per congruam methodum (*vide Scopolina*) fugata, quandoque iterabatur.

Vulgatior eaeteris formula erat:

Rec. Unguenti Hydrarg. ciner. drachm. tres.

Divide in dos. aeq. Nr. duas.

S. Vespere portio una inungenda.

In emphraxibus viscerum:

Rec. Unguenti Hydrarg. ciner. drachm. tres

Adipis suill. rec. unc. semis (— unam).

M. exactiss. in unguentum.

D. S. Hypochondrium (ubi pars tumens, affecta) ad magnitudinem nucis avell. bis in die vel pro re nata omni secunda die) inungendum.

Cum oleo, vel unguento Juniperi, oleo Terebinthinae, in ascite; cum Ammonia pura liquida, ad solvendos tumores sic dietos frigidos; cum linimento sapon.-camphorato, in pleuro-pneumonia rheumatica, persistente adhuc affrietu; cum tintura Digital. purp. et Cantharidum, in pleuritide recidiva, abeunte

in hypoclepsin; cum extracto Cicutae in pyoblenorrhoea vesico-genitali; cum Digitali, in ascite; cum oleo cocto Hyoscyami, in febre rheum.-catarrhali, insurgentibus gravibus symptomatibus, cephalaea rebelli, coryza et narium obstipatione:

Rec. Unguenti neapol. drachm. unam

Olei cocti Hyoscyami drachm. duas.

M. S. Pro frictione regionis frontalis et temporalis saepius de die.

Sumebantur drachmae sex olei Hyoscyami, et unguenti neapolitani drachmae duae, in rheumatismo articulari afebrili genu in transudationem tendente. Drachma una unguenti dicti et drachmae sex olei H. in rheumatismo articulari inflammatorio sumebantur usui.

In podosteritide scrofuloso-medorrhoica; in rheumatismo capitis et colli:

Rec. Unguenti Hydrarg. ciner. drachm. duas

Olei cocti Hyoscyami unc. semis

Laudani liquid. Sydenhami drachm. semis.

M. f. Linimentum.

S. Illiniuntur (in priori casu) partes adfectae in diebus tribus, et ligentur post singulam unctionem panno laneo; (in secundo casu) illiniatur bis de die regio auris et nuchae.

Cum extracto Conii maculati, in orchitide traumatica, jam sub finem medclae, epididymide cum testibus quidquam magis accuminatis. Vide *Cicuta*.

Cum tinctura Digital. purp. methodo endermatica, in pleuro-pneumonia rheumatico - catarrhali, ad producta (hepatisationem et exsudatum) discutienda:

Rec. Unguenti Hydrargyri ciner. drachm. duas

Tinct. Digital. purp. scrupul. unum

Adipis suill. unc. semis.

M. f. unguentum.

S. Adplicandum bis de die plagae ex vesicante relictæ.

Cum olei Hyoscyami uncia una, et extracti Conii macul. drachma dimidia, pro unguenti neapol. drachmis tribus, in rheumatismo inflammatorio fixo, bis de die inungebatur magnitudine nucis avellanae. In casibus similibus partes unctae stupa cannabina involvebantur.

Emplastrum mercuriale.

In iisdem fere morborum formis locum habuit, ac mercuriale unguentum, et pro hoc noctis tempore suspenso, applicabatur, e. gr. in syphilide universalis cum doloribus osteocopis:

Rec. Empl. mercur. unc. semis.

Extende supra pannum lineum.

S. Adplicetur ad tumorem, cursu noctis.

Frequentissimum vero connubium celebrabatur cum emplastro Cicutae, in tumoribus, quibus interdiu cataplasma apposita essent.

Hydrargyrum oxydulatum nigrum purum, Mercurius niger Moscati.

Raro adhibebatur. Occurrebat pulvis, sed forma pilularis praeplicavit a grano, ad scrupulum unum; ita in phthisi complicata cum syphilide:

Rec. Mercurii nigri Moscati scrupul. semis

Extr. Dulcamar. scrupul. unum.

F. l. a. pilulae quindecim.

Consperrg. pulvere rad. Liquiritiae.

D. S. Omni bihorio pil. una.

Hydrargyrum oxydatum rubrum, Mercurius praecipitatus ruber.

Pro usu interno massae pilulari et pulveri cum saccharo ad quartam grani partem, imo addebatur ad granum unum. In rheumatismo chronicō ob syphilidem inveteratam:

Rec. Mercurii praecipitati rubri gran. unum

Aethiop. antimon. grana octo

Extr. Aconiti grana sex

Sacch. albi drachm. unam et semis.

M. f. pulv. aequabilis, div. in dos. Nr. octo.

D. S. Omni bihorio pulv. unus.

Unguentum, e. gr. in syphilide pustulosa faciei, in parte ali eruptione devastata:

Rec. Mercur. praec. rubri scrup. unum

Axung. porci drachm. tres.

M. exactiss. in unguentum.

D. S. Inungendum magnitudine nucis avellanae.

Pro varia partium inungendarum sensibilitate diversa requiebatur Mercurium inter et adipem animalem ratio, ita ut in ulceribus syphiliticis penis modo sumerentur grana quatuor aut sex Mercurii pro adipis drachmis tribus, uncia semis.

In serofula inveterata, ulcere praesente ex tumore aperto saniosum humorem plorante:

Rec. Butyri Cacao unc. semis

Mercurii praecip. rubri drachm. semis.

M. exactiss. in unguent.

D. S. Adplicetur ulceribus, munitum emplastro adhaesivo.

Cum pulvere frondum Sabinae, in ulcere venereo, et ad destruenda condylomata:

Rec. Mercurii praec. rubri

Pulv. frond. Sabin. ॥|| scrupul. duos

Axung. porci drachm. duas.

M. f. l. a. unguentum.

D. S. Inungeuda ulcera (aut condylomata) magnitudine pisi, bis in die.

Hydrargyrum oxydulatum muriaticum, Hydrargyrum muriaticum mite, Calomel.

Interne in pulvere, rarius in pilulis, dosi singulari secundum scopum adtingendum, a grano dimidio ad grana quatuor, unacum aliis substantiis; scopo alvum evacuandi:

Rec. Calomel. laevig. grana octo

Sacch. albi drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. duas.

D. S. Horam interpolando sumantur.

Ordinabantur de die grana duodecim, in febri nervosa cum encephalitide; grana octo in meningitide peripherica; grana viginti quatuor intra triduum, in hepatide peritonaca cum tumore ad superficiem hepatis, post venaesectionem, hirudines, et diaphoretica; grana octo, in pulveres sex divisa, de die, in

verminosis febribus; vel grana quatuor aut sex, in doses quatuor; in metastasi ad cerebrum grana deceem in doses quinque omni hora sumebantur; in syphilide locali grana sex, in doses sex, omni hora. Calomelanos usus in synochis gastrieis verminosis magis circumseribi debuit, primis earum eurae diebus oleum Ricini conveniebat; adhibebatur Mercurius duleis in emphraxibus viscerum abdominalium; in pyo-blennorrhoea vesico-genitali, quum in membranam vesicae mueosam inque totam diathesin lymphaticam debuisset agi; in notaeo-myelitide lumbari, infracta diathesi phlogistica; in metritide cum ophoritide; in laryngo-tracheitide lenta; in ulcere syphilitico cum bubone sympathico; in pneumo-bronchitide; in erysipelate lymphatico; in colitide lenta, qua purgans; in ascite; in ephidrosi chronica cum adenophymate eolli, Calomel experimenti gratia dabatur, quia est inimicus sudori, vermium vero aderat suspicio. A paucis Calomelanos granis salivatio exorta est, quum contra syphilitici dosim majorem (ad grana usque 66) tolerassent absque incommode.

Sequentia celebrabantur connubia. Cum Jalappa, seopo purgante, in cephalea sclero-meningea. Cum Rheo, seopo dieto, in serofula; in febre pituitosa cum syphilide (Rheum ad dr. $\frac{1}{2}$, Calomel ad gr. 6 de die); in anasarea ex hepato-splen-emphraxy; in hac sola, hypochondriis valde sensibilibus (Calomel. gr. 10, pulv. Rhei scrup. 1, div. in dos. 6, cum signatura: omni hora pulvis 1); in febri gastrico-verminosa (Calomel. gr. 8, pulv. Rhei gr. 16, div. in dos. 4, cum sign.: omni bih. pulvis 1).

In leucorrhœa a statu pituitoso pendente:

*Rec. Pulv. rad. Rhei chinens. drachm. semis
Calomel. laevig. grana octo
Sacch. alb. drachm. duas.
M. div. in dos. aeq. Nr. octo.
D. S. Omni bihorio pulvis unus.*

Cum Gummi Guttæ et aliis drasticis, licet raro, ad pellendos vermes. Cum Seilla et Digitali aliisque diureticis, in hydrope. Cum Digitali, in pleuropneumonia rheumatico-catarhalis, decrescente morbo; cum sulsure aurato Antimonii, in hepatemphraxy, in rheumatismo articulare; itidem cum Kermete

minerali, in phlogosibus, venaesectione fractis. Cum Conio maculato, in ictero irritativo, ob stases hepatis capillares; in ophoritide lenta, febre jam abacta, perstante adhuc magna ovarii sensibilitate:

Rec. Calomel. laevig. grana sex

Extr. Conii macul. grana quatuor

— Taraxaci q. s. ut f. pil. decem.

Consperg. pulvere Liquiritiae.

D. S. Omni biorio pilula una.

Simili modo praescribebantur pilulae cum **Gummi - resina Ammoniae**, et extracto **Myrrae**, in leucorrhœa a statu pituitoso pendente. Cum pulvere **Doweri** et **Aconito**, in rheumatismo tendente in transudationem, morbo jam per aliquod tempus in statu perstante:

Rec. Sulfur. anr. Antimon.

Calomel. laevig.

Extr. Aconiti $\ddot{a}\ddot{a}$ grana quatuor

— Taraxaci scrupul. unum

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. XX.

Consperg. pulv. eodem.

D. S. Omni biorio pilulae duae.

Cum **Camphora**, in hepatitide typhoidea:

Rec. Calomel. laevig.

Camphor. ras. $\ddot{a}\ddot{a}$ grana sex

Sacch. alb. drachm. duas.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Omni biorio pulv. unus.

Cum **Opio**, in diarrhoea et dysenteria, cum aphthis:

Rec. Calomel. laevig.

Opii puri $\ddot{a}\ddot{a}$ grana quatuor

Sacch. alb. scrupul. quatuor.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. octo.

D. S. Ut supra.

Cum acetato **Morphii**, in ictero sympathico, ab ictibus capitis, in lactante:

Rec. Calomel. laevig grana decem

Acetat. Morphii gran. semis

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. quinque.

D. S. Omni tercia hora pulvis unus.

Primo jam hujus curae die exorta est febricula, quae cum ad sudationem duxerit, critica esse videbatur; unde et altero die curae exanthematis evolutio urticariae analogi, sed nec prurientis nec adeo inconstantis, ab urticaria itaque distinguendi, et praesente etiam odontalgia et subsequis stomaeace et ptyalismo, idiosyncrasiac erga assumtum Mereurium potissimum atribuendi.

Cum Belladonna (gr. 3) et Calomele (gr. 6), in ietero irritativo, et eum Ipecaeuanha (gr. 6 et gr. 4, in dos. 6.), in metastasi ad cerebrum uniebatur.

Pulvis, externe quoque praescribebatur, in febri rheumati eo - catarrhali, symptomatibus gravibus, cephalaea rebelli, coryza et mueso spiso in naribus coagulato :

Rec. Pulv. Calomel. grana quindecim

Sacch. alb. drachm. duas.

M. exactiss. f. pulvis sternutatorius.

D. S. Saepius de die in nares attrahatur (penes vapores calidos ex Malva).

Pulvis alterans Plummeri.

Locum habuit in herpete, lichene, prorigine, erysipelate lymphatico, catarrheumate, pneumo-bronchitide, ad molendum anaetharsiu, etc.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum,

Mercurius sublimatus corrosivus.

Praeplacuit forma pilularis a gr. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ ad grana 3, 4 de die adseendendo, in syphilide universalis inveterata, ejusque diversis larvis:

Rec. Mercurii sublimat. corros. grana duo

solve in Spirit. Vini s. q. et f. cmm

Micae panis albi scrupul. uno

Sacchari q. s. massa bene subacta pilulae decem.

Consperrg. pulvere Amyli.

D. S. Omni mane et vespere pilula una.

Rec. Mercurii sublimat. corros. granum unum

solve in:

Spirit. Vini q. s.

Malaxa cum:

Micae panis albi et

Sacch. albi aa q. s. ut f. pilulae decem.

Consperg. pulvere Liquiritiae.

D. S. Ut supra.

Rec. Mercurii sublimati corros. *gran. unum*

Solve iu s. q. Alcoholis, cui adde:

Micae panis albi *scrupul. unum*

Sacchi. albi q. s. ut f. pil. sexdecim.

Consperg. pulvere semin. Lycopodii.

D. S. Quater de die pilulae duae; vel pilulae duae ante meridiem, et tres post meridiem.

Syphilitieis, praesertim inveterata ossium lue laborantibus, cum et sine tophis uleereque vario Mereurius sublim. corros. cauta manu porrectus profuit, et paregoricum vespertinum ostealgiae nocturnae prospexit. Hinc inde et inunctoria cura combinabatur. Salivatio saepius jam tertio ex Sublimati usu die, sed suspenso remedio illo, et in censum voeatis diaphoretieis et alvum laxantibus, praeceipue vero extraeto Seopolinae, intra tres communiter dies profligabatur. In diathesi seorbutiea circumspetio maxima, et non sine debita præparacione et tutela adhibebatur. Vide *Hydrargyri Cyanuretum*, quod in tali easu eligebatur.

Externe. Lotiones instituebantur ex Sublimati corrosivi solutione in impetigine seabiosa cum syphilide.

Aqua phagedaenica,

s. Liquor mercurialis Ph. Austr.

In osteadenitide serofulosa eum zoster ligulari;

Rec. Aq. destill. *unc. octo*

— phagedaenicae *unc. duas.*

D. S. Pro usu externo.

Hydrargyrum ammoniato-muriaticum,

s. Mercurius praecipitatus albus.

Externe nonnisi cum pinguedine animali in unguentum redactum ad drachmam semis, vel unam ex uncia una axungiae porcinae. In herpete squamoso, papuloso:

Rec. Mercur. praecipit. albi drachm. semis

Axung. porci unc. semis.

M. exacte f. unguentum.

D. S. Magnitudine nucis avellanae bis in die inungendum.

Unguentum **Graefeanum**, quod e Mereurii praecipitati albi serupulo, fl. Sulfuris drachma una et semis, et axungiae porci recentis draehmis confectum, in scabie sicca cum sublatente syphilide, penes balnea simplicia, saponata, etc., cum fructu adhibebatur.

Cyanuretum Hydrargyri.

Interne. Pulvis ad granum unum et semis, duove pro nycthemero :

Rec. Cyanureti Hydrargyri gran. unum

Sacch. albi drachm. unum.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. sex.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

In syphilide universali cum diathesi seorbatica hooee praeparatum seligebatur, sed a granis jam perpaueis, duobus ut plurimum salivatio, et pernoleta ulcera in conspectum veniebant: symptomata, quae unacum syphilide, extracti Seopolinae ope auferebantur. Fuit casus proctaedo-blennorrhœae suspectae in individuo hysterico. A granis jam paucis cyanureti Hydrargyri sensim assumptis vomitus, diarrhoea et dolores oris foetentis surrexere: quae cuncta symptomata remedii illius sepositione et emollientium ac diapnoicorum usu paullo post fugabantur, sed die 20. curae etiam blennorrhœa tum analis, tum genitalis perfecte siluit.

Deutojoduretum Hydrargyri.

In lue medorrhoica cum arthritide rheumatica, post usum Guajaci, Sarsaparillæ, hydriodatis Potassæ, olei jecoris Aselli, post adapplicationem quoque Electricitatis, glandulis colli volumine quidem minoribus, sed duris semper persistentibus. Ordinabatur gr. $\frac{1}{4}$ pro die, dosim sensim ad gr. $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ augendo. Sanatio inde obtinebatur; sed satendum, externe salem

culinarem pro lotione et emplastrum **Cicutae** et **Galbani** crocati, et quum glandulae sese inflammassent, hirudines et cataplasma in usum quoque vocata fuisse.

Alter adhuc traetabatur easus blennorrhocae syphiliticae ad luem universalem vergentis, non bene curatae, ovario etiam in passionem dueto, ex tumore sub attactu patente:

Rec. Deutojodureti Hydrargyri gran. semis

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.

D. S. Mane et vesperi pulvis unus.

Et posito supra regionem ovarii sinistri, emplastro vesicante:

Rec. Deutojoduret. Hydrargyri gran. semis

Adipis suilli unc. semis.

M. exactiss. f. unguent.

D. S. Inungatur plaga ex vesicante reicta, magnitudine nucis, mane et vesperi.

Fluor albus continuat, dolores vagantur per abdomen (glandulae mesaraiae et peritonaeum affecta erant). Tunc emplastrum **Euphorbii** adplieabatur, ex quo sanatio obtinuit.

Hyoscyamus niger.

Interne. *Extractum*, in pulvere, pilulis, mixturis, etc., a gr. $\frac{1}{2}$ — 3 — 6 — 8 de die.

Qua paregoricum, e. g. in syphilide, cum ostealgia nocturna:

Rec. Extr. Hyoscyami nigri grana quinque

Magnes. carb. scrupul. unum

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. quinque.

D. S. Vesperi, omni hora pulvis unus, donec somnum capiat.

Alias quoque ad majorem dosim praescribebatur.

Cum sulfure aurato Antimonii, in catarrho bronchiali, catarrheumate thoracis febrili, rheumatismo articulari febrili, fracta vero pro maxima parte phlogistica diathesi, extraetum Hyoscyami expectorationem emiuenter promovit, tussim domavit, procreatis sudoribus lenivit dolores.

Eodem modo cum Kermete minerali, in bronchitide catarhalis; cum Magnesia et Nitro, in tabe dorsuali; in codem easu, cum Camphora; cum sulfure aur. Antimonii, et pulvere Digital. purp., in haemoptoë pulmonali activa :

*Rec. Extr. Hyoscyami nigri grana sex
Kermet. mineral. grana quatuor
Sacch. Lactis drachm. unam et semis.
M. f. pulv. div. in dos. aeq. Nr. octo.
D. S. Omni bihorio pulvis unus.*

Pilulae, in herpote papuloso, ad somnum conciliandum, ne vires aegri labefierent, qua pharmacon mite :

*Rec. Extr. Hyoscyami nigri' grana tria
Pulv. Liquirit. q. s. ut f. Pilulae tres.
D. S. Sumantur vesperi.*

Eodem modo praescribebantur pilulae cum sulfure aur. Antimonii, cum Camphora, etc.

Addebatur aliis decoctis, infusis, mixtulis oleosis; e. g. in catarrho chronicō :

*Rec. Lichen. islandici drachm. duas
Coq. c. s. q. aq. f. p. $\frac{1}{4}$ h.
Col. unc. octo adde :
Extr. Hyoscyami grana quatuor (serius gr. 8)
Syr. Diacodii unc. semis.
D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.*

Ex infuso fl. Chamomillae, in hysteriasi; ex mixtura oleosa cum oleo Ricini, in enteralgia flatulenta; in emulsione cannabina, in haematuria renali; in emulsione amygdalina, in affectionibus pectoris febrilibus.

Linctus, cum syrupo Althaceae, vel mucilagine g. arabici; in phthisi tuberculosa :

*Rec. Syrupi Althaeae unc. unam.
Extr. Hyoscyami grana sex
M. exacte, f. linctus.
D. S. Sumatur paulatim.*

*Rec. Mucilag. g. arab. unc. tres
Extr. Hyoscyami grana tria
Syr. Althaeae unc. unam.
M. D. S. Sumat ad parva cochl., de nocte.*

Externo, forma linimenti, in otalgia hemiplegica:

Rec. Extr. Hyoscyami scrup. semis.

Olei Amygdal. dulc. rec. pr. unc. unam.

M. f. linimentum.

D. S. Auri imponendum ope gossypii.

Addebatur extractum Hyoscyami unguento neapolitano, cum extracto Belladonnac, in haematuria renali; ejusdem tantillum salsati Chininae pro cura endermatica.

Herba pro cataplasmate, fomentationibus, etc. coquebatur cum seminibus Lini et speciebus emollientibus, cum, vel sine lacte, in haematuria renali:

Rec. Semin. Lini libr. duas

Herb. Hyoscyami nigri unc. duas

Lactis vaccini q. s. ut coquatur in pultem.

D. S. Adplicetur tepide loco affecto, renovando saepius de die.

Eodem modo cum herba Malvae, et farina secalina, ex partibus anaticis.

Vel pro collutorio, in salivatione, quae diapnoicis non cessit:

Rec. Herb. Meliss. unc. unam

— Hyoscyami drachm. unam

Coque c. s. q. aq. p. $\frac{1}{4}$ h. ad col. libr. unius.

D. S. Collutorium.

Pro injectione, in metrorrhagia puerperali:

Rec. Herb. Malvae unc. tres

— Hyoscyami nigri drachm. unam

Coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. librar. duarum detur.

S. Pro injectione in vaginam.

Ope cucuphae ex herba Hyoscyami lenibantur dolores in hemicrania rheumatica, praemissis vero derivationibus; cum pulvere herbac Hyoscyami cataplasma et emplastra conspergebantur.

***Oleum coctum* Hyoscyami, in otalgia:**

Rec. Olei cocti Hyoscyami drachm. duas.

S. Instilletur guttatum auri (vel ope gossypii auri immittetur, in odontalgia).

Cum eodem ungebatur genu dolens in gastro - arthralgia nervosa ascribili. Adplicabatur methodo endernatica, in nevro-rheumate crurali, vesicante ad locum doloris posito :

Rec. Olei cocti Hyoscyami unc. semis.

S. Unctum frustum panni linei imponatur plagae vesicantis.

Cum oleo cocto Hyoscyami solo, vel cum hoc et mucilagine sem. Cydoniorum tumores haemorrhoidales dolentes illiniebantur.

Linimentum cum extracto Conii macul., in entero-peritonitide rheumatica - biliosa, abdomine voluminoso, dolente :

Rec. Olei cocti Hyoscyami unc. unam

solve intus:

Extr. Conii macul. drachm. unam.

M. D. S. Inungatur regio hypochondrii dextri.

Cum olci cocti Hyoscyami uncia $\frac{1}{2}$, et extracti Belladonnae granis 2, in ictero febrili, hypochondrium tensum mane et vesperi inungebatur; cum oleo Olivarum (ex \overline{aa} part. acq.), in seroto inflammato; cum linimento saponato-camphorato (unc. $\frac{1}{2}$, et olei cocti Hyosc. dr. 3), in podosteritide scrofulosa; in enteralgia flatulenta (linim. sap.-camph. dr. 2., olei c. H. unc. $\frac{1}{2}$); cum linimento saponato-camphorato (dr. 6.), et Opii tinctura simplici (dr. 2, et olci H. unc. $\frac{1}{2}$), in anevrysmate aortae thoracicae; cum tinctura Opii simplici (dr. 1, et olei c. H. unc. 1), in eodem casu; cum unguento Hydrargyri cinereo (dr. 3), et laudani liq. Sydenli. (dr. 1, et olci c. H. unc. 1), in podosteritide scrofulosa; unguentum, in eodem casu (cum ung. neapol. libr. 2, et olci H. unc. 1); cum linimento saponato-camphorato (et oleo H. ex \overline{aa} unc. $\frac{1}{2}$), et extracto Conii macul. (dr. 1), in hepato-splenemphraxi.

Ichthyocolla.

Vide *Tragacantha*, quacum unicibatur.

Ipecacuanha.

Pulvis ad vomitum producendum, ad grana decem, ad vingtiquatuor praescribebatur, cui ad virtutem ipsius emeticam augendam, Tartari emetici granum addebat. Dabatur cum

einolumento, in febri quartana, ad quartum paroxysmum praecaeendum (tertio jam leviore facto per Tartarum emeticum); scopo et methodo confundente:

Rec. Pulv. rad. Ipecacuanh. scrupul. unum

Sacch. albi drachm. semis.

M. div. in dos. aeq. Nr. duo.

D. S. Sumat pulverem unum circa horam decimam, et alterum post dimidiam horam.

In febri tertiana eum nota gastrica -- biliosa, quum eomperatum esset, febres vernales methodo saepe confundente sanari:

Rec. Pulv. rad. Ipecacuanh. scrupul. semis

Tart. emet. gran. unum

Sacch. albi drachm. unam.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. tres.

D. S. Pulvis unus omni quarta hora, superbibendo decoctum Hordei.

Cum Opio, qua pulvis Doweri, e. gr. qua paregoricum; ex partibus aequalibus, nee ne:

Rec. Pulv. rad. Ipecacuanh.

Opii puri $\frac{1}{2}$ grana duo

Sacch. albi drachm. unam et semis.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Cum sulfure aurato Antimonii, et Opio, in rheumate chro-nico; eum Areano duplieato et Opio, in rheumatismo articulare in helminthiaco; in gastralgie nervosa:

Rec. Pulv. rad. Ipecacuanh.

Sulf. aur. Antimonii $\frac{1}{2}$ grana tria

Opii puri grana duo

Sacch. albi drachm. duas.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. octo.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Addebatur huic formulae Calomel laevigatum, in pneumonia catarrhalis, sed fraeta jam phlogosi:

Rec. Pulv. rad. Ipecacuanh

Opii puri $\frac{1}{2}$ grana tria

Arcani dupl. drachm. duas.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. octo.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Cum Calomel, in metastasi ad cerebrum, in statu febris nervoso cum hypostasi pulm. (ex \overline{aa} gr. 8, vel ex gr. 6 Ipecac. et gr. 4 Calomel. divis. in dos. 6); cum Camphora, qua expectorans, penes usum decocti Senegae, etc.:

Rec. Pulv. rad. Ipecacuanh. grana decem

Camphor. ras. grana sex

Sacch. alb. drachm. unam et semis.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.

D. S. Omni bihorio, alternatim cum decocto, pulv. un.

Secundum necessitatem addebatur extractum Aeoniti, Acethiops antimon., sulfas Chininae.

Infusum, a granis deceem, ad scrupulos duos, cum aquae comm. servidac unciiis quatuor sexve cochleatim sumendum; e. gr. in febris ex statu inflammatorio in nervosum transcutibus, nec non in delirio tremente potatorum:

Rec. Rad. Ipecacuanh. rud. tus. grana sexdecim

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. sex adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Cum Tartaro emetico, et Cremore Tartari, in febri gastrico-biliosa ad adynamiam proclivi:

Rec. Rad. Ipecacuanh. rud. tus. gran. sexdecim

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Tartari emetici gran. unum

Cremor. Tartari unc. unam

Syr. simpl. unc. semis.

D. S. Omni bihor. cochl. cib. tria.

Unacum infuso Rhei ex \overline{aa} granis xv, ad col. unc. 8, in diarrhoea pellagrosa; cum infusis Chamomillae, Melissae, eort. Aurant., etc. Addebatur infuso Camphora, Sal ammoniacus, in febre typhode pneumonitica, in febri gastrico-biliosa cum leucorrhoea, lingua et cuti aridis, doloribus in iliei regione, cum pulsu parvo, celeri; in bronchitide psorica cum peripneumonia sucedanca in decursum lento vergente, cum sputis nullis, tussi perrara, etc.

Rec. Rad. Ipecacuanh. r. t. grana quindecim

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Sal. ammon. depur. drachm. semis

Extr. Gramin. liquid. drachm. duas

Syr. simpl. unc. duas.

D. S. *Omnī hora vasc. coff. semis.*

Cum Acido sulfurico diluto, in febre typhoidea enterico-pneumonica; in typho intestinali cum exanthemate miliari:

Rec. Rad. Ipecacuanh. r. t. scrupul. unum

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Acidi sulf. dil. scrupul. unum

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. *Omnī bihorio vasc. coff. semis.*

Vel idem infusum ex granis XXV, ad Col. unc. 6, cum
Acidi sulfurici drachma $\frac{1}{2}$.

Cum Alumine, in eodem ipso casu typhi intestinalis:

*Rec. Infusi Ipecacuanh. ex gran. viginti quinque l. a. parati
unc. sex*

adde:

Aluminis crudi drachm. semis

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. *Omnī bihorio vascul. coff. semis.*

Ex decocto Tamarindorum, in febre gastrico-nervosa:

Rec. Fruct. Tamarind. enucl. unc. duas

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Sub finem coctionis infunde:

Rad. Ipecacuanh. r. t. grana sexdecim.

Stent in infusione calida per $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.

M. D. S. *Omnī bihorio cochl. cib. tria.*

Iris florentina.

Adhibebatur pulvis ad conspergendas pilulas.

Köstl. Observ.

Jacea,
s. Viola tricolor.

Decoctum ex drachmis duabus, vel semiuncia paratum, locum habuit in impetiginibus scrofulosis, praesertim in diversis tineac formis:

Rec. Herb. Jaceae drachm. tres

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. decein' adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

Praescribebatur quoque unum Sarsaparilla. Pences usum Jaceae adhibebantur Bardana, Dulcamara, Aethiops antimonialis, etc.

Jalapa.

Pulvis, pilulae, electuarium. Dosis refracta a granis sex ad octo, plenaria ad scrupulos duos. *Resina* ipsius etiam iisdem formis, sed dosi multo minori. Locum habuit hocce remedium, ut plurimum cum aliis consimilibus, in verminosis febris, in hepato-splenemphraxy anaemorrhoidi, etc.; contra quas morborum formas mitiora incassum pugnarunt.

Remedium alvum purgans:

Rec. Pulv. rad. Jalapae scrupul. unum

Calomel. laevig. grana sex

Sacch. alb. drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. tres.

D. S. Sumantur intra tres horas.

In helminthiasi cum congestione menstruorum chlorotica, chlorosi jam emendata:

Rec. Resinae Jalapae

Gummi Guttæ $\overline{\alpha\alpha}$ grana quindecim

— resin. Asae foet.

Extr. Taraxaci $\overline{\alpha\alpha}$ drachm. semis

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil XXX.

Consperg. eod. pulvere.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Jodum,
s. Jodium.

Interne. Linetus, in pneumophthisi tuberculari in secundo stadio, penes usum decocti Sphaerococci conservoidis:

Rec. Jodi purissimi gran. semis

Sacch. albi scrupul. duos

Mueilag. g. arab. drachm. unam.

M. f. linetus.

D. ad lagenulam bene munitam.

S. Frictionis ope adplicetur margini dextro et sinistro linguae; consumendo totum in vicibus quatuor de die.

Hydriodas Lixivae,
s. Kali hydriodicum.

Interne. Pulvis et pilulae a grano uno ad quatuor de die; in oophoritide chronica:

Rec. Kali hydriodiei grana duo

Gummi-resin. Ammon. drachm. unam

Extr. Conii macul. scrupul. unum.

M. f. l. a. pilulae XXX.

Consperrg. pulv. Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

In eodem morbo Kali hydriodicum, dein forma pulveris dosi gradatim aucta ad grana sex intra nychthemeron propinabatur; pariter etiam in hydrope ascite.

In metremphraxy, cum vermis:

Rec. Kali hydriodiei grana quatuor

Extr. Taraxaci drachm. semis

Pulv. rad. Liquirit. q. s. ut f. pil. XII.

Consperrg. eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilula una.

Unguentum, in individuo scrofuloso, glandulis colli tumidis:

Rec. Kali hydriodiei scrupulum unum

Axung. porci unc. unam.

M. exacte, f. unguent.

D. S. Mane et vesperi iugendum magitudine nucis avellanae.

Ex drachma semis autem paratum, inungebatur regioni hypogastricæ, in metremphraxi cum vermis.

In similius morborum casibus, glandularum scilicet hypertrophicarum, *endermatica* arrisit methodus, applicandi Lixivam hydriodicam:

Rec. Lixivae hydriodicae scrupul. unum

Axung. rec. porci drachm. tres.

M. f. unguentum.

D. S. Adplicetur ad locum vesicantis.

Tinctura Jodii, seu Jodinae inserviebat inhalationibus, in laryngo - pneumophthisi tuberculari, moderata vero per methiodum antiphlogisticam:

Rec. Tinctur. Jodii drachm. unam.

S. Pro iuhalationibus.

Juniperus.

Interne, infusum baccarum Juniperi, in ascite diffuso:

Rec. Baccar. Juniperi drachm. sex

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. libr. unius adde:

Oxymell. squill. unc. unam.

D. S. Epicratice.

Rec. Baccar. Juniperi unc. semis.

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Acetat. Lixivae solut. drachm. tres

Oxymell. squill. unc. unam

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Oleum Juniperi, in linimentis, et unguentis; sed etiam interne, in ascite et anasarca, praesente debilitate summa:

Rec. Olei essentialis Juniperi scrupul. semis

solve in:

Spirit. Aetheris sulfurici drachm. semis.

D. S. Sumat guttas quinque saccharo instillatas, omni dimidia hora.

In linimentis et unguentis occurrit oleum destill. Juniperi; in hydrope universalis:

Rec. Unguenti Hydrarg. cinerei drachm. duas

Olei destill. Juniperi drachm. unam

Adipis suilli drachm. quinque.

M. f. unguentum.

D. S. Inungendum abdomen.

Ingrediebatur quandoque hoc unguentum linimentum saponato - camphoratum.

Roob Juniperi, ad unciam unam, in decoctis, mixturis.

Spiritus Juniperi, ad drachm. duas, unciam semis, unam, in decoctis, mixturis, etc. In hydrope ascite atonico :

Rec. Aq. font. libr. duas

Spirit. Juniperi unc. unam

Sacch. albi unc. duas.

M. **D.** **S.** Hauriendum pro libitu.

Ad drachmas duas, unciam semis addebatur decoeto Pyrolae umbellatae.

Pulvis baccarum Juniperi, ad q. s. in pilulis conficiendis ex sulfate Ferri, extraeto Digitalis purp. et extraeto Duleamarae.

Lixiva fusa,

s. **Lapis causticus** Ph. A.

Externe. Solutio, ad medicationem fontieuli, propter ejus torporem:

Rec. Kali caustici scrupul. unum

solve in:

Aq. destill. unc. una et semis.

D. in vase probe obturato.

S. Externe.

Lotiones quoque ope solutionis aquosae, draehmam semis ad draehmas duas Lixivae causticae continentis, instituebantur ad regiones a miliaribus crystallinis obsessas; post lotiones vero repetitas eruperunt vesiculae consertae, et decursus brevior reddebatur.

Acetas Lixivae solutus,

s. **Liquor Terraee soliatae Tartari** Ph. A.

A drachma una, ad duas decoctis addebatur solventibus et eccoproticis; c. gr. in infaretibus et hydrope:

Rec. Rad. quinque aperientium unc. unam

Coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. librae unius adde:

Acetat. Lixiv. solut. drachm. duas.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

In febrium diversarum stadio critico:

Rec. Decocti Gramin. ex unc. duabus parati unc. decem

Acetatis Lixivae solut. drachm. duas

— Ammon. solut. drachm. unam

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

In morbis rheumaticis erisi vicinis:

Rec. Flor. Tiliae unc. semis

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. decem adde:

Liquor. Terrae fol. Tart. drachm. duas

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Eodem modo praescribebatur ex decocto Tamarindorum,
Ononidis spinosae, ex infuso Digitalis purpureae.

Sulfas Lixivae, Arcanum duplicatum Ph. A.

Ad alvum reserandam Arcanum dupl. solum raro in usu erat, sed potius cum Calomele, Jalapa; dein in decoctis solventibus ad draehm. duas, vel uneiam unam exhibebatur; obvenit quoque in electuario antihelminthico, in pulveribus cum Opio et Ipccacuanha, etc.

Lac vaccinum recens.

Pro diaeta salubri ordinabatur in pellagra lac solum; in hepatemphraxi, ad partes anaticas cum aquis soteriis; in eachexiis scrofulosis, eum aqua quadam destillata praedita principio quodam volatili; sie et in syphiliticis, enterophthysi ulcerosa, pneumophthysi tuberculari ulcerante, diarrhoea pellagrosa, isthmide phlegmonosa catarrhosa, herpete papuloso laborantibus. In angina faucium aposyphilitica, eum suspitione tuberculorum potus erant sequentes duo:

Rec. Lactis vaccini rec. unc. duas.

Misce cum decocto Dulcamarae.

D. S. Epicratice.

Rec. Decocti Hordei libr. duas

Lactis vaccini rec. unc. duas

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Potus.

In laryngo - pneumophthisi tuberculari:

Rec. Lactis vaccini rec. libr. duas

Aq. Calcis rec. paratae unc. duas.

M. D. S. Epicratice.

Vomitus in gastro-scleromate ad pylorum et pancreas, sub diaeta lactea, quam pellagrosus praediligebat, adventabat minus crebro.

Externe. Instillatio Lactis tepidi cum aqua destillata, in ototide. Enema (ad libr. 1), in febri verminosa, in taeniae solii casu.

Laurocerasus.

Interne. Ex emulsionibus, decoctis et infusis, a drachmis duabus, ad unciam semis ordinabatur *aqua destillata Laurocerasi*, et quidem e. gr. in haematuria renali menstruationis et haemorrhoidum fluxui vicaria; in angina faucium ulcerosa apophysilitica cum tuberculorum suspicione:

Rec. Amygdal. dulc. exhort. unc. unam

Tere in mortario vitro, sensim sensimque affunde:

Aq. commun. libram unam.

F. I. a. emulsio, Col. adde:

Aq. destill. Laurocerasi drachm. duas

Mucilag. g. arab.

Sacch. albi ॥॥ unc. unam.

D. S. Omni dimidia hora vasc. coſſ. unum.

In hysteriasi:

Rec. Fol. Digital. purp. grana viginti quinque

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. refrig. unc. octo adde:

Aq. destill. Laurocerasi drachm. duas

Acetat. Lixiv. solut. drachm. unam et semis

Oxymell. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio coch. cib. tria.

Eodem modo ex decoctis Graminis, Althaeae, Liehenis, Sphaeroeocci, Seolopendrii, Senegae, ex infusionibus Chamomillae, Melissae, etc. subministrabatur; et quidem per eminentiam in hyperremesi ex epigastralgie, cardiopalmo, hypertrophia cordis, insultibus eardialgicis ex cordis vitiis, in catarrhis viarum respirationis suspectis, haemoptysi activa, haematoehesi inflammatoria, haematuria renali, nephritis, nephro - cystitide, hysteriasi, etc.

In cephalea rheumatica in hysteria:

Rec. Aq. destill. Laurocerasi *drachm. tres*
Extr. Hyoscyami *grana sex.*

M. D. S. Guttæ decem momento doloris exacerbati.

Linctus:

Rec. Mucilag. g. arab.
Syr. Althaeæ *aa unc. unam*
Aq. dest. Laurocerasi *drachm. unam.*
M. f. linctus.
D. S. Ad parva cochlearia.

Externe. Collyrium:

Rec. Aq. destill. comm. *unc. sex*
 — — Laurocerasi *drachm. sex*
 Mucilag. g. arab. *unc. duas.*
M. D. S. Collyrium.

In metrorrhagia activa, inflammatoria, fluxum excepiente erethismo; in blennorrhagia colpo - cystiea:

Rec. Herb. Malvae *unc. duas*
Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.
Col. refrig. *unc. decem adde:*
 Aq. destill. Lauroceras. *unc. semis.*
D. S. Pro injectione in vaginam quatuor vicibus in die.

Lavandula.

Oleum destillatum Lavandulae. Vide *Belladonna.*

Lichen islandicus.

Decoctum, vel et infuso - decoctum ex uncia semis, vel integræ, ad eol. librae unius; in aphthis dysentericis:

Rec. Lichen. islandici unc. unam

F. I. a. infuso-decoctum c. aq. f. p. $\frac{1}{2}$ h.

Col. unc. decem adde:

Extr. Trifol. fibr. drachm. unam

— Opii aquosi grana duo.

M. D. S. Omni bihor. vascul. coff. semis.

Rec. Lichen. island.

Caul. Dulcamar. \overline{aa} drachm. tres

Consc. coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. refr. unc. octo adde:

Aq. dest. Lauroceras. drachm. tres.

D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

Simili modo paratur decoctum Liehenis, unacum Althaea, Colombo, Senega, Cortice Peruviano, Sarsaparilla, etc.

Decocto-infusum eum **Melissa**, in hepatide typhoidea:

Rec. Lichen. island. unc. semis

Coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Sub finem coctionis infunde:

Herb. Melissae drachm. tres

Stent in digestione p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem detur.

S. Omni bihorio vascul. coff. duo.

Lichenis usus utplurimum firmandae convalescentiae ex scrofula tabifica, tabe mesenterica, aliisque morbis consumtivis, pneumo-bronehitide bene prospexit. Lichen islandicus, vi cryptogamarum plautarum medicatrie praeditus praesidium erat haud spernendum in phthisi initia, praeprimis si phthiseos initia non derivarentur a manifesto morbi iugressu eum phlogosi latente juncto, verum si ad ejusdem prodroma, ad tubercula pauca, minima mollia, cruda, qualia habitui phthisico, individuo eatarrhis frequenter obnoxio sunt familiaria, sola limitantur. Praesente vero eongestione aut inflammatione ad peetus, nusquam in auxilium vocabatur Lichen. Vide *Scolopendrium*, *Sphaerococcus*.

Lichenina.

Experientia facta fuit eum Lichenina in quotidianis quibusdam intermittentibus, scopo febrisfugo, sed nihil inde profici observatum. Aliac quacdam duplices autumnales tertianae nec Licheninae, nec Chininae, sed decocto Corticis cum Acido sul-

furioe potius cesserunt. Neque quartanis Lichenina satisfecit. Sed experimenta continuari non poterant ob nimis parvam remedium quantitatem ab inventore clargitam.

Linum.

Interne. Decoctum potui inserviebat, in haematuria renali.
Externe. Decoctum, pro enemate purgante:

Rec. Semiu. Lini rud. tus. unc. duas

Coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$ horae

Col. libr. unius adde:

Olei Olivarum (vel olei Lini)

Sal. culinaris $\overline{\text{aa}}$ unc. unam.

D. S. Clyisma.

Idem decoctum, cum oleo Lini, absque sale, cum tinctura Opii. Cum oleo Rieini:

Rec. Decocti semin. Lini ex unc. duabus parati libr. unam

Col. adde:

Olei Ricini unc. duas

Sal. culinaris unc. semis.

M. D. S. Enema.

Oleum seminum Lini, pro clysmate, ex decoeto sem. Lini, sem. Ricini, Hordei, Althaeae, surfurum; ex infuso Chamomillae; vel solum, e. gr. in haematuria:

Rec. Olei semin. Lini libr. semis.

S. Pro clysmate.

Vide **Hordeum**. In febri pituitoso-biliosa, valde molestanti-bus abdominis doloribus:

Rec. Decocti Hordei l. a. parati unc. decem

Olei semin. Lini unc. unam

— cocti Hyoscyami drachm. unam.

M. D. S. Pro clysmate.

Farina seminum Lini, pro cataplasmate emolliente, eui subinde herba Hyoscyami, Cicutae, farina seealina, Species emollientes, Sal ammoniacus quandoque addebantur.

Rec. Fariu. semin. Lini libr. unam

Contus. coq. c. s. q. aq. ad consistentiam cataplasmatis.

D. S. Adplicetur supra bubonem.

In haemoptoë pulmonali activa, succedente phthisi florida:

Rec. Semin. Lini cont. libr. unam

Herbae Hyoscyami unc. unam

Coque c. s. q. aq. c. f. ad consistentiam pultis.

D. S. Adplicetur omni quarta hora, *ad* regionem cordis,
supra emplastrum theriacale.

In pneumophthisi tuberculari, propter dolorem in pectore:

Rec. Farin. semin. Lini unc. duas

*Coq. c. s. q. aq. ad consistentiam cataplasmatis
adde:*

Olei semin. Lini unc. tres

Pulv. herb. Hyoscyami unc. unam.

D. S. Cataplasma.

Telae lineae fila carpta tenebant apertam incisionem bubonis suppurantis, ut puris libera fieret excretio. Superimponebatur cataplasma ex farina sem. Lini, cum Sale ammoniaco. Eadem fila applicabantur ad moderandam suppurationem, et cicatricem promovendam, post laesionem artificialem per Ferrum eandens, etc.

Liquiritia.

Pulvis recipiebatur ad constituendam massam pilularum, et ad pilulas conspergendas. *Extractum* et *Succus* ad drachmam unam alteramve adjungebatur decoctis Sale ammoniacum praecipue, vel Boracem continentibus, et massae pilulari. Radix in decocto, vel decocto-infuso, ad drachmam unam, vel duas, diversis cum pharmacis, Taraxaco, Guajaco, etc. Infusum Liquiritiae gratum subministravit potum in catarrhis bronchiorum, vesicac, etc.

Lycopodium.

Pulvis seminum Lycopodii inserviebat conspergendis pilulis.

Magnesia carbonica.

Cum Saccharo, in pulvere Magnesia alba a scrupulo uno, ad drachmas duas, tresve exhibebatur. Jungebatur saepissime cum Cremore Tartari, in haemorrhoidibus; cum Rheo, in scrofularum diversis formis, tinea, chlorosi; cum floribus Sulfuris,

in haemorrhoidibus, hydrargyrotromo cum paresi, in seacie; cum Magisterio Bismuthi, in gastralgia; cum flavedine cort. Aurant., pulvere sem. Foeniculi, extracto Hyoscyami, Aconito, Belladonna, cum Castoreo.

In haemorrhoidibus:

Rec. Magnes. carbon. drachm. unam
Cremor. Tartari drachm. duas
Pulv. rad. Rhei elect. drachm. semis
Sacch. alb. drachm. tres.
M. f. pulv., detur ad scatulam.
S. Omni bihor. cochl. coff. unum.

In pyrosi, cum adpetitu prostrato (qua symptomate alius affectionis):

Rec. Magnes. carbon.
Sacch. albi ॥ ॥ drachm. duas.
M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.
D. ad ch.

In chlorosi secundaria:

Rec. Magnes. carbou. drachm. duas
Pulv. rad. Rhei electi drachm. semis.
M. div. in dos. aeq. octo.
D. ad ch. S. Omni bihorio pulv. unus.

Magnesia pura, s. M. usta.

Pulvis, in splenemphraxi cum seacie:

Rec. Flor. Sulfur.
Magues. ustae
Sacch. albi ॥ ॥ scrupulos duos.
M. div. in pulv. aeq. sex.
D. S. Omni bihorio pulvis unus.

In febri gastrica cum nota verminosa in puella (10 ann.) serofulosa, post usum Salis amari:

Rec. Pulv. rad. Rhei chineus. scrupul. unum
Magues. ustae scrupul. semis.
Sacch. alb. drachm. unam.
M. div. in pulv. aeq. quinque.
D. S. Omni hora pulvis unus.

**Magnesia sulfurica ,
s. Sal amarus.**

Uncia una, vel duac in aqua solutae, aut ex decocto solvente praescribebantur, addito extracto amaro, syrupo Cichorei cum Rheo.

Potio laxans mitior :

Rec. Sal. amari unc. unam

Aq. font. *unc. sex.*

D. S. Duabus vicibus sumatur.

Potio laxans priori efficacior altera, et saporis gratioris, unacum Acido sulfurico diluto, quod Salis amari vim acuit, ad mentem *James Henry* :

Rec. Aq. font. unc. decem

Sal. amari unc. semis

Acidi sulfurici dil. drachm. unam

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Sumatur quatuor vicibus.

Alvus immorigera, post febres preeprimis intermittentes, reserabatur solutione Salis amari in aqua, cum Acido sulfurico parata, et quidem secundum *Henry* et *Troschel*. Solutio ab hisce auctoribus proposita, et a *Juttmann* *) (piae memoriae) Austriae Pharmacopoeae accommodata, seu liquor Salis amari acidus (scopo blande purgandi) sequeus est:

*Rec. Salis amari crystallisati unc. unam et dimidiam cum
granis quadraginta octo*

solve in:

Aq. commun. destill. tepidae unciis duabus

dein adde:

*Acidi sulfurici diluti (Ph. Austr.) drachm. tres et
grana triginta sex.*

Mixta filtrantur.

Dentur ad vitrum embolo vitro clausum.

S. Liquor Salis amari acidus.

Sumatur cochlear unum (tenens drachm. unam et semis Salis amari) semel bisve intra horam tempore matutino.

*) Med. Jahrb. d. k. k. öst. St. XXIV. Bd. S. 523.

In febri quartana, cum hepato-splenemphraxi, alvo tarda:

Rec. Aq. commun. unc. octo

Sal. amari unc. unam

Extr. Taraxaci unc. semis.

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Praescribatur ex decoeto Graminis, Taraxaci, infuso Santouiei, Senuae, Ipecacuanhae, etc., et locum habuit in intermittibus, viscerum emphraxibus, vernicatione, febribus gastricis saburralibus.

Connubium cum Rheo, in pellagra, ad mentem *Fr. ab Hildenbrand*, vide sub articulo *Rheum*.

Enematibus quoque addebatur ad unciam dimidiam.

Malva vulgaris.

Infusum ex uncia semis ad libram, pro collutorio; e. gr. in isthmite phlegmonosa, in exuleerationibus oris dolentibus:

Rec. Herb. Malvae vulg. unc. duas

Coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. librar. duarum adde:

Mell. despum. unc. unam.

D. S. Collutorium.

Addebatur quoque grana octo extracti Hyoseyami, vel Boraeis venetae drachma una, inserviendo sic gargarismati et collutorio.

Pro fomento:

Rec. Herb. Malvae vulg. unc. duas

— Chamomill. unc. unam.

F. l. a. decoctio, inde infusio Col. libr. duarum.

D. S. Fomentum tepidum applicandum parti dolenti.

Fomenta ope spongiae applicabantur, e. gr. ad hypochondrium, in haematuria. Ita in ischuria, antequam ad catheterem recurreretur.

Pro vaporibus (quandoque unacum decocto capitum Papaveris) ab aegro inhalandis, mediante cono papyraceo, in eozryza, inuenientur naribus spisso coagulato; in pneumophthisi tuberculari.

Adhibebatur pro cataplasmatibus cum Cicuta, Hyoscyamo, Lino, etc.; vel pro injectione, in infuso cum Althaea, capitibus Papaveris, etc.

Malum Granatum.

Succus recenter expressus Mali Granati colles prope Patavium Euganeos laete adornantis, propinari potuit ad uncias duas sufficienti quantitate aquae dilutus; et quidem in fluxu hepatico, ad mentem immortalis *Petri Frank*:

Rec. Succi Mali Granati unc. duas
Aq. commun. libr. duas
Sacch. albi unc. unam et semis.
M. D. S. Potus.

Manna.

Praediligebatur electa, aut calabrina. Solutio unciae dimidiæ, vel unciarum duarum in aqua fervida, decocto Althacæ, Tamarindorum, in infusionis variis, praecipue Santonici, Sennac; superaddito non raro sale quodam cathartico.

Rec. Mannae calabr. unc. unam et semis
solve in :
Aq. font. ferv. unc. octo
Col. adde :
Tartari emetici gran. unum
Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.
M. D. S. Omni bihor. cochl. cib. duo.

Huic solutioni adjici nonnunquam solebat Nitrum purum, sal Glauberi, sal Seignetti, Tartarus tartarisatus, etc. In febri c. gr. verminosa :

Rec. Semin. Santonici unc. semis
Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Sub finem infusionis solve :
Mannæ elect. unc. unam
Col. unc. octo adde :
Arcani duplicati drachm. tres
Syr. Cichorei cum Rheo unc. unam.
M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Mannac usus locum habuit in inflammationibus membranac mucosac, bronchitide, haematuria, in amphimericis catarrh-rheumatico-gastrieis, biliosis, in individuis flatibus non subjectis, aut quibus Cassia indicata termina causabat.

Matricaria.

Interne. Infusum, in Icucorrhœa, post Chamomillam, Rheum, Myrrham, gummi-resinam Ammoniac cum Calomelc, fluxu nunc imminuto, nunc adacto, qui erat:

Rec. Herb. florid. Matricariae unc. semis

Inf. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihor. cochl. cib. duo.

Sed fluxus nihilominus perstat.

Addita Boraeis venetae drachma semis, ad adjuvandum in menstrua nisum, in chlorosi.

M e l.

Ad unciam semis, unam, in collutorio, ex decocto Hordei, Malvae; addito quandoque Acido sulfurieo, Borace, in linctu; cum Santonico et Arcano duplicato, in electuario; ad unciam unam, in elysmate, ex gummi-res. Asac foet.; in pasta molli, cum farina secalina, ad emolliendos tumores:

Rec. Mell. commun. unc. tres

Farinae secalinae q. s. ad pastam mollem.

S. Adplicetur supra tumorem.

Oxymel simplex.

Ad unciam unam, duas, in electuariis, in decoctis Graminis, infusis Tiliae, Ipccaeuaniae, etc.

Melilotus off.

Emplastrum Meliloti:

Rec. Empl. Meliloti off. unc. semis.

D. Extensum super pannum linenum magnitudinis pollicum trium, et latitudinis pollicis unius, adpliceatur tumori.

Fuit autem casus metastaseos ad cerebrum, tumescentia, sub pressione non dolens, ad angulum maxillae sinistrum, qui diffundebatur versus glandulam parotideam. Post adapplicationem emplastri evanuit tumor.

Melissa.

Infusum ex drachmis duabus, uncia semis paratum, adhibebatur vel pro potu, vel pro medicamine, additis aliis substantiis medicatis, in febribus nervosis colliquativis, in catarrho intestinali choleroide, cholera orientali, gastro-arthralgia nervosa afebrili in hypochondriaco, cum incipiente cordis dilatatione.

Rec. Herb. Melissae drachm. tres

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. 1/4 h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. *S. Potus.*

Rec. Herb. Melissae unc. semis

Rad. Ipecacuanha. rvd. tns. grana quindecim

Inf. s. q. aq. ferv. p. 1/4 h. v. cl.

Col. nnc. octo adde:

Camphor. s. q. muc. g. arab. subactae grana sex

Syr. simpl. unc. unam.

D *S. Omni bihorio cochl. cib. tria.*

*Aqua destillata Melissae, in scrofula, cum nota gastrico-verminosa, post usum aliorum medicaminum: vide *Calcaria hydrochlorica*.*

Collutorium sat efficax præbuit infusum herbae Melissæ et Hyoscyami, in salivatione ex Mercurii usu:

Rec. Herb. Meliss. unc. unam

— *Hyoscyami nigri drachm. unam.*

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. 1/4 h. v. cl.

Col. librae unius detnr.

S. Collutorium.

Mentha piperita.

Dosis et forma eadem, uti prioris. Infusum herbae unacum diversis aliis occurrebat, cum floribus, e. gr. Tiliae, Chamomillae, Sambuci, Arnicae, etc. In febre typhode enterico-pneumonica, stadio ultimo:

Rec. Herb. Menth. pip.

Flor. Arnicae mont. \overline{aa} drachm. unam

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

Aqua destillata Menthæ pip., in mixturis, cum aqua destillata Cinnamomi, etc. In hysteriasi:

Rec. Aq. dest. Menth. pip. unc. quatuor

Tinct. Castorei scrupulum unum

Elaeosacch. cort. Aurant. drachm. unam.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Eodem modo etiam extracta diversa copulabantur cum aqua Menthæ.

Mezereum.

Frustula corticis Mezerei applicabantur magnitudine scuti imperialis acetо vini prius emollita, in regione insertionis musculi deltoidei; in phthisi ad sustinendam secretionem purulentam, plaga vero cortice Mezerei devastata unguento quadam acri diligabatur. In alio casu pneumophthiseos tubercularis, fonticulus imponebatur illi loco, in quo sub auscultatione percipiebatur rhonchus ad caveruosum accedens. In casu paraplegiae fonticuli duo locum habebant ad latera columnae vertebralis, ubi praecepuus accusabatur dolor. Fonticulus apertus, propter ejus torporem medieationem exigebat ope solutionis Kali caustici. Pulvis corticis Mezerei adspersus eruptioni herpeticae in cruribus (in decursu morbi cardiaci), salutare naturae promovebat eonamen.

Millefolium.

Infusum ex uncia semis, ad col. unciarum octo, vel decem paratum, e. gr. in aphthis cum diarrhoea:

Rec. Herb. flor. Millefolii unc. semis

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. libr. unius adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Potus.

Idem infusum cum tintura quadam aromaticâ, et cum herba Althaeæ; porro cum Acido sulfurico dil., in lichene diffuso in hysterica et arthritica ordinabatur.

Morus.

Syrupus Mororum, ad aliquot uncias; e. gr. in isthmite phlegmonoso-catarrhosa, continuo molesto deglutiendi nisu:

Rec. Syr. Mororum unc. duas.

S. Epicratice.

In angina faucium, cum urticaria:

Rec. Syr. Mororum

Roob Sambuci \overline{aa} unc. semis.

M. D. S. Paulatim deglutiendus.

Cum mucilagine g. arabici, in variola genuina confluenta tussicula molesta, pruritu pustularum in fauibus hacrentium.

In potu, cum Acido hydrochlorico diluto et aqua fontis.

Moschus orientalis.

Pulvis, a granis sex, usque duodecim de die:

Rec. Moschi oriental. optimi grana duodecim

Sacch. albi drachm. unam et semis.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Rec. Moschi orientalis optimi grana duodecim

Pulv. rad. Ipecacuanh. grana octo

Sacch. albi drachm. unam et semis.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.

D. S. Omni hora pulv. unus.

Rec. Moschi oriental. opt. *grana sex*
Pulv. Aluminis crudi *scrupulum unum*
Sacch. albi *drachm. unam et semis.*
M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.
D. S. Ut supra.

Omnis hae formulae in uno eodemque casu, typhi abdominalis eum convulsionibus, tendinum subsultibus, collapsu notabilis et diarrhoea eruenta eum prospere eventu ordinabantur. Parcissimus, nisi forte hunc casum excipias, Moschi usus fuit.

Myrrha.

Extractum aquosum, vel in solutione, vel in pilulis, ad scrupulum, et drachmam semis usque. In haematochesi inflammatoria chronica, pro cura confirmatoria; en formulam:

Rec. Rad. Gramin. *unc. duas*
Consc. coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$, h.
Col. refrig. librae unius adde:
 Aq. destill. Laurocerasi *drachm. duas*
 — *Calcis rec. paratae unc. semis*
Extr. Myrrhae aquosi *scrupul. unum*
Syr. simpl. *unc. unam*.
M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

In leucorrhœa a statu pituitoso pendente, evacuata prius pituita per Rheum cum Calomele:

Rec. Gummri-resin. Ammon.
Extr. Myrrh. aquosi $\overline{\text{aa}}$ *scrupul. unum*
Calomel. laevig. *grana quatuor*
Pulv. Liqnirit. q. s. nt f. pilulae XX.
Consperg. pulvere eodem.
D. S. Omni bihorio pilulae duae.

In catarrho pulmonum chronicō, stadio blennorrhœico:

Rec. Extr. Myrrh. aquosi *drachm. semis*
Sulf. a. Antimonii *grana sex*
Pulv. Liqnirit. q. s. nt f. pil. XX.
Consperg. pulvere eodem.
D. S. Omni bihorio pil. quinque.

Sed symptomata sere eadem permanebant, nisi excipias cessationem ardoris et constrictiois in trachea, et sputorum sanguineorum.

Uniebatur Myrrha cum extracto Conii, cum carbonate et sulfate Ferri; eum aqua Rosarum.

Nicotiana.

Externe, pro lotionibus, decoctum, in herpete papuloso, post usum aquarum Rainerianarum, Graphitis, balneorum ex Cicuta et Tritico:

Rec. Herb. Malvae unc. tres

— *Nicotianae unc. semis*

Coq. c. s. q. aq. c. p. ¼ h. v. cl.

Col. librae unius detur.

S. Pro lotionibus vicissim et alternatim in extremitatibus instituendis.

Imminucbatur exinde sensus pruritus; cutis etsi tensa, minus tamen arida tangebatur.

Nitrum depuratum.

Interne. Pulvis, solutio, a drachma semis, ad drachmas duas. In perturbationibus criticis individuorum sensibilium:

Rec. Nitri purissimi drachm. unam

Castorei moscovitici grana quatuor

Lapid. Cancrorum scrupulos duos

Sacch. alb. scrupul. quatuor

M. f. pulv. div. in dos. aeq. octo.

D. S. Omni bihorio (vel omni hora) pulvis unus.

In cardiectasi hypertrophica:

Rec. Nitri puriss. drachm. unam

Pulv. fol. Digital. purp. grana sex

Sacch. albi drachm. duas.

M. f. pulv. etc., uti supra.

Nitrum cum Cremore Tartari constituit pulverem temperantem, et exhibebatur nonnunquam eum Tartaro emetico, Magnesia carbonica, cum Camphora, Ipecacuanha et Opio.

Solutio ex decocto Althacae, Graminis, Hordei, Tamarindorum, Senegac, etc., emulsione amygdalina, mixtura oleosa, addita uncia una salis Glauberi, vel grano Tartari emetici, etc.

Rec. Limoneae tenuis libr. tres

Nitri puri drachm. unam

Sacch. albi unc. unam.

M. D. S. Potus.

Cum Acido nitrico, imminuta vero Nitri dosi, in pneumonitide :

Rec. Rad. Althaeae unc. semis

Consc. coque c. s. q. aq. c. p. 1 $\frac{1}{4}$ h.

Col. refrig. unc. octo adde:

Aq. destill. Laurocer. drachm. unam et semis

Nitri depurati scrupul. duos

Acidi nitrici diluti scrupul. unum

Syr. simpl. unciam unam.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Externe, cum Sale ammoniaco pro fomentis Schmuckerianis sumebatur, capiti impositis.

Nux juglans.

Putaminum viridium decoctum, pro usu interno, ad unciam semis ordinabatur. In syphilide :

Rec. Putamin. Nuc. jugland. virid. unc. semis.

Consc. coq. c. s. q. aq. c. p. 1 $\frac{1}{2}$ h.

Col. librae unius adde:

Syr. simpl. unc. duas.

D. S. Pro potu.

Extracti draelma una, in aquae destill. libra soluti, pariter in syphilide; oleum pressum pro illinitione crustarum faciei adhibebatur.

Nux moschata.

In pulvere, ad grana deem pro dosi. In adenophymate serofuloso, pulvis sequens, *Kortumii* dietus ordinabatur :

Rec. Pulv. Nucis moschat.

— baccar. Lauri tostarum

— Cornu Cervi usti \overline{aa} drachm. unam

Sacch. albi drachm. tres.

M. f. pulv. aeqab.

D. ad scatulam.

S. Omni bihorio cochl. coff. unum.

Elaeosaccharum Macis, qua corrigens cum Rheo, Chlna, Magnesia, ad drachmas duas, licet rarissime, praescribebatur.

Nux vomica.

Agebatur de paraplegia ex malaxi medullae spinalis, in qua indicatione causali, aut pro antiphlogistica cura, nulla praesente, *Strychnina* empirice magis tentari debuit:

- Rec. Strychniae pur. gran. semis*
- Sacch. alb. drachm. unam et semis.*
- M. f. pulv. div. in dos. aeq. octo.*
- D. S. Omni trihorio pulvis unus.*

Post quos pulveres sumtos, sudor, quies, et somnus. Strychninae dosis aucta gr. $\frac{1}{4}$ omni fere die ita, ut grana duo et dimidium in die consumpta fuerint. Ob vertigines, vomituritiones, vomitus, pupillam dilatatam, saporem oris amarum, linguam rubellam, et pulsus celeres suspendi debuit Strychnina, iterum vero resumta, sed nullo cum juvamine.

Alter fuit casus paraplegiae, in quo Strychnina ad granum unum intra dies tres porrecta, atque eadem per dies 50 continuata, interpolato quasi omni 3.—5. die infuso laxat. Viennensi ob alvum pigram, nullum attulit levamen. Nec ullum plane esse cunctum narrare possum ex Strychnina, in anaesthesia paraplegicam cum nota rheumatica directa, et per menses duos et ultra continuata.

Ordinationes vero erant sequentes:

- Rec. Strychnin. pur. quintam partem grani*
- Pulv. rad. Ipecacuanh. grana quatuor*
- Sacch. albi drachm. unam.*
- M. exactiss., ut f. pulv. sex.*
- D. S. Omni biborio pulv. unus.*

- Rec. Strychnin. puriss. quartam grani partem*
- Extr. Dulcamar. scrupul. semis*
- Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. quatuor.*
- D. S. Omni trihorio pilula una.*

Oleum jecoris Aselli.

Interne , aut solum , aut aqua destillata exceptum , ad unciam semis pro dosi , et unciam unam pro integro die. In scrofula inveterata:

Rec. Olei jecoris Aselli unc. unam.

S. Cochlear unum mane , et alterum vesperi.

Quum oleum bene non ferreretur, superbibebatur aqua Foeniculi destillata. Hoece medieamen unacum cortice Chiae reg., Ferro et aliis externis sanationem procuravit. Bene quoque conducebat in catarrho laryngis chronicō , aliquid adhue, quantum potuit, statum emelioravit in laryngo-pneumophthisi tuberculari. Experientia quoque faeta fuit cum eodem oleo in lue serofuloso-medorrhoea cum arthralgia rheumatode, postquam Guajacum, Sarsaparilla, Aeonitum et hydriodas Potassae in censem vocata fuissent. In articulationibus exinde dolores penitus evanuerunt, tumor arthriticus non amplius cernendus, et aeger jam per Clinicum deambulare potuit, glandulae vero colli volumine crevere, sed moliores factae sunt. Loeus dein cedebatur hydriodati Potassae in unguento prius, dein in solutione ope Electricitatis adplicito.

In pneumophthisi tuberculari cum tabe mesenterica, cum vomitu continuo, ventre tumido dolente, emaciacione notabili :

Rec. Olei jecoris Aselli unc. semis

Aq. destill. unc. decem.

M. D. S. Epicratice.

Ejecto et hoc medicamine, idem per clysmia intrudebatur, sub formula:

Rec. Olei jecoris Aselli unc. duas

Vitellum Ovi unius

Subige exacte, addendo:

Mell. despum. unc. unam

dein assunde:

Aq. commun. unc. tres.

M. D. S. Pro clysmatibus duobus.

Oleum Olivarum.

Addebatur, veluti oleum Lini, clysmatibus. Pro illinitione cutis, et condylomatatum dolentium adhibebatur.

Ononis spinosa.

Decoctum ex uncia una, vel duabus, ad col. librac unius;
in hydrope ascite:

Rec. Rad. Ononid. spinos. unc. unam

Coq. c. s. q. aq. c. p. 1/4 h. v. cl.

Sub finem coctionis infunde:

Fol. Digital. pnrp. scrupul. uuum

Stent in infusione calida p. 1/4 h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Acetat. Lixiv. solut. unc. semis

Roob Juniperi unc. uuam.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

Unacum Taraxaco, et Polygala Senega praescribebatur,
addebatur insuper Oxymel squill., vel acetas Ammoniae, Tar-
tari emet. gr. unum. Quoad effectum, hunc melius exseruere
Squilla et Aloë, quam Ononis.

Ovum gallinae.

Interne. In phthisi ulcrosa pulmonum:

Rec. Vitellum Ovi rec. unius

Sacch. albi unc. unam

Tere simul, sensim addendo:

Lactis vaccini libr. unam.

M. D. S. Epicratice.

In quotidiana lenta cum incipiente hydrope, etc., praesen-
tibus summa virium declassificatione, et calore urente universalis:

Rec. Vitellum Ovi rec. unius

Aq. Menth. pip. unc. semis

Tere simul, sensim sensimque addendo:

Lact. vaccin. rec. tepidi libr. unam.

M. D. S. Epicratice.

Adhibebatur etiam ad subactionem Asae foet., Myrrhae,
olei Terebinthinae, olci jecoris Aselli, etc., tum interne, tum
in clystere. Vide *Alumen*.

Papaver album.

Capsulae, s. capita Papaveris albi. Externe, in decoctis eum Malva, Althaea, Cicuta, ad injectiones, ubi in ozaena serofulosa, ad partes inflammatas alluendas, aut pro fomentationibus et cataplasmatibus; e. gr. in anaesthesia paraplegica eum nota rheumatica:

Rec. Capit. Papaveris albi

Herb. Malvae aa unc. tres

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. libr. duarum detur.

S. Calefiat liquidum, quoties imponatur. -

Syrupus capitum Papaveris albi, seu Diacodii. Ad unciam unam decoctis et infusis sedantibus, etc. solebat addi, etiam linetui cum mucilagine g. arab. ad partes anaticas admiscebatur. In amphimeriuia gastrico-rheumatica, in nervosam versa:

Rec. Muçilag. g. arab.

Syr. Diacodii $\text{aa unc. unam et semis}$

Aq. dest. Foeniculi drachm. sex.

M. D. S. Epicratice ad parva cochlearia.

Opiu m.

Interne, a grano $\frac{1}{2}$ — 1 — grana 3, etc. eaute adseendendo. In tromophrenesi bibonum incipiebatur a grano uno, granis tribus, vel quatuor, adseendendo ad grana 16 de die, ita ut intra oetiduum grana CVIII Opii consumta fuerint. Post inductam vero inde crisim per somnum et sudorem, Opii dosis imminuebatur. Opium vero in haeee peculiari forma morbi, quae in Italis tam facile cum capitis congestionibus et phlogosi encephalo-meningea decurrit, non tam frequenter locum invenit, ac apud medios in septentrionalibus regionibus praxiu exerceentes. In hocce ipso morbo Opium lubenter combinabatur cum Tartaro emetico, de quo suo loco. In rheumatismo lento qua paregoricum vespertinum, ifidem in doloribus osteocopis:

Rec. Opii puri grana duo

Sacch. albi scrupul. quatuor.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. quatuor.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Connubium imivit cum Calomele, in diarrhoea dysenterica, aegro jam notabiliter emaciato. Pulvercs ex Calomelano granis 4, et Opii granis duobus aliquoties repetiti tenesmum et evacuationum frequentiam restrinxere, et relativam copiam auxere.

Cum sulfate Chiniae, in intermittentibus erethisticis, cum epigastralgia incidentibus, quibus aut suberat, aut quas sequebatur spasmatica nervorum contentio:

Rec. Opii puri grana tria

Sulfat. Chinini grana viginti

Extr. Taraxaci q. s. ut f. pil. XVIII.

Consperg. pulvere Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae tres.

Cum pulvere Ipecacuanhae, in rheumatismis, doloribus nevralgicis, quibus poculum oblivionis et per inductam diapneum non raro unica salus erat. Uniebatur cum Scilla, extracto Hyoscyami, Magisterio Bismuthi, etc. Quoad diarrhoeas, praembris sub epidemicae cholerae dominio regnantes, hisce, quo magis hypercatharsis aliqua, obstaculis aliis non praesentibus, ad rheumaticam et serosam accedebant formam, eo citior et tutior in pulveribus Doweri, inque ipso Opio salus erat. Solo Opio, penes balnea alcalina sic dicta *Stuetziana* paucos intra dies plena salutis restitutio obtenta est a juvete tetano traumatico detento, contra quem sanguinis evacuationes et reliqua antiphlogistica nul proficiui agere valuerint. Contra intoxicationem ex Digitali, Opium non adeo utile deprehendebatur. In catarrho pulmonum cum cardicctasi dextra passiva et stenocardia, accessum stenocardiacum multum mitigavere pilulac:

Rec. Opii puri grana duo

Extr. Liquirit. grana quindecim

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. X.

Consperg. pulv. eodem.

D. S. Omni $\frac{1}{4}$ hora pilula una.

In anaesthesia paraplegica cum nota rheumatica, doloribus lancinantibus capitis et artuum, vagantibus:

Rec. Opii puriss.

Pulv. rad. Ipecacuanh. $\overline{\text{aa}}$ grana duo

Nitri puri drachm. semis.

Roob Sambuci q. s. ut f. pil. XII.

D. S. Omni hora pilulae duae.

Pulvis, externe. In otide rheumatiea, dolor residuus ope frictionis pulveris Opii propria eum saliva institutae fugabatur.

Extractum Opii aquosum. Interne, a gr. $\frac{1}{8}$ — 1, in pilulis; e. gr. in syphilide, qua paregoricum:

Rec. Extr. Opii aquosi grana duo

Medull. panis q. s. ut f. pil. quatuor.

D. S. Omni hora pilula una.

Forma emulsionis, in febri intermittente eum cardiopalmo; in enterophthisi.

Ex decocto Salep, in diarrhoea eum probabili exuleeratione intestinali; ex deeoeto Liehenis isl., in eatarrho chronico:

Rec. Lichen. island. unc. semis

F. l. a. infuso-decoctum.

Col. unc. decem adde:

Extr. Opii aquosi grana duo.

D. S. Omni bihor. cochl. cib. tria.

Forma mixturae oleosae, in pneumo-phthisi tuberculari, ad somnum provocandum, et diarrhoeam sistendam, euthanasiae gratia:

Rec. Olei Amygdal. dulc. r. pr. unc. unam

Pulv. g. arab. q. s. ad perfect. olei subactionem

Syr. simpl. unc. unam et semis.

Intime subactis, sensim sensimque affnnde:

Aq. commun. unc. decem

adde:

Extr. Opii aquosi grana tria.

M. exacte. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Externe, pro unguento, quod eonstituebant grana duo, vel tria extraeti Opii, et uncia una adipis.

Tinctura Opii simplex, s. *tinct. thebaica*, s. *tinct. anodyna*. Interne, ad guttas XV — XX, ad sumnum XXXV. In delirio tremente potatorum:

Rec. Decociti Gramin. ex unc. duabus parati libr. unam
adde:

Tartari emetici grana tria

Tinctur. Opii simpl. gutt. viginti

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Omni bihor. vascul. coff. semis.

Cum infuso Melissae, in catarrho intestinali choleroic, in cholera orientali; itidem cum infuso Ipecacuanhae, Melissae, et Ammoniae acet. solutac; cum aqua dest. Cinnamomi, et spir. Aetheris sulfurici, ad guttas XXXV.

Collutorium, in irritatione gingivarum:

Rec. Herb. Malvae off. unc. unam

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. octo adde:

Tincturae Opii simpl. scrupul. unum.

D. S. Collutorium.

Eadem formula pro clysmate inserviebat.

Ad scrupulos duos, usque drachmam, in infuso Pyrethri Parthenii, in odontalgia utilis deprehendebatur.

Externe, pro linimento, a drachma una, ad duas; e. gr. in arthrorheumate:

Rec. Tinct. Opii simpl. drachm. duas

Linimenti saponato - camphorati

Olei Amygdal. dulc. r. pr. \overline{aa} unc. semis.

(vel olei cocti Hyoscyami)

M. f. linimentum.

D. S. Pro usu.

Tinctura adhibebatur ad adspergenda cataplasmata, in accessibus phlebiticis, in ichthyosi elephantina dolentibus et tumentibus articulis, ad fomentationes, injectiones, illinitiones.

Laudanum liquidum Sydenhami, s. *tinct. Opii composita*. Externe, in linimento ad drachmam unam, unacum unguento Hydrargyri cincrei (drachm. 3), et oleo cocto Hyoscyami (unc. $\frac{1}{2}$), in inflammatione ossium metatarsi et maleolorum.

Morphium, s. Morphina.

Interne a gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —1 cum cautela adscendendo. In phthisi pulmonali, ad lenientiam tussim:

Rec. Syr. simpl. unc. unam

Mucilag. g. arab. unc. semis

Morphin. puriss. gran. semis.

M. f. linctus.

D. S. Sumat epiceratice.

Morphium aceticum, s. *Acetas Morphii*. Interne, in pulvere, pilulis, solutione, ad gr. $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ — 1.

Forma pulveris, qua paregoricum, in rheumatismo articulorum et residuis syphilitidis:

Rec. Acetat. Morphii gran. semis

Sacch. albi drachm. semis.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. tres.

D. S. Omni bihorio pulv. unus.

Pilulae paregoricac, in doloribus osteocopis:

Rec. Acetat. Morphii gran. semis

Extr. Taraxaci scrup. unum

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. sex.

D. S. Pilulae duae vesperi, spatio horarum duarum intermedio.

Mixtura, in pneumophthisi:

Rec. Acetat. Morphii gran. semis

Aceti Vini optimi drachm. semis

Aq. destill. unc. tres

Syr. simpl. unc. semis.

M. D. S. Cochl. coff. unum omui $\frac{1}{4}$ hor.

In laryngo-pneumophthisi tuberculari:

Rec. Olei Amygdal. dulc. r. pr.

Mucilag. g arab.

Syr. simpl. \overline{aa} unc. semis

Acetat. Morphii gran. semis.

M. D. S. Agitata lagenula, omni bihorio cochl. coff. unum.

Internus hujuscem praeparati usus locum habuit quoque, unicum Calomele, in iectero sympathico; cum acetate Plumbi, in anevrysmate arcus aortae; cum bicarbonate Soda, etc.

Externe, secundum methodum endermaticam, in forti capititis dolore, rheumatismo capititis et colli, praemissis aliis remediis:

Rec. Acetat. Morphii gran. unum

Sacch. albi drachm. unam.

M. f. pulv.

D. S. Ad insersionem in locum ex vesicante relictum, pro duabus vicibus.

Rec. Acetat. Morphii gran. semis (unum)

• *Mucilag. g. arab. drachm. unam* (tres).

M. D. S. *Adplicetur plague ex vesicante relictæ (e. gr. in cephalea rheumatica, adplicabatur ad nucham; in anaesthesia paraplegica, super plexus cervicales).*

Intoxicationis symptomata nata ex Morphio acetico, methodo endermatica adplicito, in puella annorum 16, laborante hemi-crания rheumatica, potibus acidulis intra paucas horas omnia composita fuere.

Simplex unguentum, in nevralgia intercostali, a zosteræ relicita quoque praescribatur:

Rec. Acetatis Morphii grana quinque

Butyri Cacao unc. duas.

M. f. *unguentum.*

D. S. *Inungatur pars dolens.*

Papaver Rhoeas.

Infusum ex uncia semis, una paratum, propter ejus colorem vinum, a delirante bibone avide desideratum, mentientem.

Rec. Flor. Papaver. Rhoeados unc. semis

Inf. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. librae unius adde:

Succi Citri r. pr. unc. unam

Syr. simpl. unc. duas.

D. S. *Potus.*

Idem infusum obvenit cum Elixir acido Halleri, et Tartaro emetico.

Petroleum.

In hepato-splenemphraxi cum febri intermittente, et vermicinatione:

Rec. Petrolei drachm. duas.

S. *Inungenda regio umbilicalis, quater de die.*

Sensibilitate abdominis multum inde imminuta, in eodem casu:

Rec. Unguenti neapol. drachm. unam

Petrolei drachm. tres.

M. f. linimentum.

*D. S. Ter de die magnitudine nucis avellanae innungatur
regio umbilici.*

In febri gastrico-verminosa, quum post eccoprotica, purgantia, anthelminthica vermis nullus secessisset:

Rec. Petrolei

Olei Olivarum \overline{aa} drachm. tres

Unguenti neapol. drachm. semis.

M. exactiss. f. linimentum.

*D. S. Mane et vesperi innungatur abdomen, sumendo pro
vice una, quartam partem.*

Scd nullus inde secessit vermis, eorum vero depulsi ope Calomelanos.

In tabe mesenterica, sed jam conclamata, nec inunctio cum adipe, Felle Tauri, vitello ovorum et Petroleo boni quid efficere poterant.

Phellandrium aquaticum.

Pulvis, ad scrupulum, augendo dosim ad drachmam semis, scrupulos duos.

Rec. Pulv. semin. Phellandrii aquat. scripul. unum

Sacch. alb. drachm. unam

M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.

*D. S. Omni bih. pulv. unus, alternatim sumendus cum
decocto Lichenis.*

Adhibebatur cum emolumento in catarrho chronicō. Nil vero juvit in pneumophthisi tuberculozo-ulcerosa; obvenit quoque cum pulvere Rhei, in pilulis, et cum Saccharo Saturni, in pulvere.

Pigmentum indicum.

Experimentum factum est in epilepsia. Cura incepit cum Ferri sulfuriei granis 6, et Pigmenti indiei drachma $\frac{1}{2}$, una-eum Valeriana, in iisdem dosim Ferri sensim ad grana 8, et Pigmenti ind. ad drachmam unam augendo, et ita per mensem

continuando. Sed prius ac prosperi quid ex hac praxi potuisset proferri, aeger deseruit Clinicum. In alio epilepsiae casu ex hocce remedio effectus valde laudabilis non obtinebatur. Medicinae studiosus ab hoc morbo remedii dicti ope penitus liberatus est.

Pinus sylvestris.

Emplastrum, in arthralgia chronica:

Rec. Resin. Pini

Cerae citrinae

Sebi ovilli aa unc. unam

Leni igne liquefactis admisce:

Camphor. ras.

Opii puri aa drachm. unam.

F. l. a. ceratum.

D. S. AdPLICANDUM loco dolenti.

In scrofula, ope emplastri resinae Pini, cum Cerussa alba, Sebo ovilli et Cera citrina, cicatrisatio ulcerum prompte succedit. Sic emplastrum ex resina Pini, cum Cera alba, Sebo ovilli, et axungia porci, in variola confluente, dolorem et duritiem in abscessu mammarum, post evacuationem puris foentis dissipavit.

Pix navalis liquida.

Adduco casum ichthyoseos squamosae a sex annis jam persistantis. Nil prorsus juvit; novac semper semperque efflorescentiae prorupere. Arrisit, methodum scqui Willani:

Rec. Picis navalis liquid. drachm. unam

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. granorum quatuor.

Consperge pulvere eodem.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Aqua communis inserviebat potui. Post singulum balneum universale commune, illiniebatur corpus integrum oleo Amygdalarum dulcium. Picis dosis sensim sensimque augebatur ad drachmam $1\frac{1}{2}$, drachmas 2, 3, $3\frac{1}{2}$ — 4. Pilulac suspendeban-

tur ob febrem per refrigerium contractam, sed renovabantur de-
nuo, ut sequuntur:

Rec. Picis naval. liquid. unc. semis

Aethiop. antimon. grana quindecim

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. granorum quatuor.

Conspurg. pulvere eodem.

D. S. Omui biorio pilulae duae.

Sed necessitas urgebat, ut consigeretur adhuc ad unguentum
ex Sapone nigro, pulvere Sulfuris crudi et Helleboro, etc. Ef-
fectus parum laudabilis erat.

Plumbum aceticum acidum,

s. Acetas Plumbi acidulus siccus,

s. Saccharum Saturni.

Interne. Pulvis a gr. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$; in phthisi tuberculari incre-
scente, praesente, una cum sputis largis, diarrhoea copiosa:

Rec. Acetat. Plumbi aciduli siccii granum unum

Pulv. rad. Ipecacuanh. grana quatuor

Sacch. albi drachm. unam et semis

M. f. pulv. aeq. div. in dos. octo.

D. S. Omni trihorio pulvis unus.

Parum emelioratus aeger abiit domum.

In alio casu phthiseos pituitosae:

Rec. Pulv. semin. Phellandrii aquat. drachm. unam

Sacch. Saturni gran. semis

Sacch. albi drachm. duas.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. X.

*D. S. Omui biorio pulvis unus, alternatim cum decocto
Lichenis island. sumendus.*

Spatio dierum octo, grana totidem Plumbi consumpta fuere
non sine aliquo fructu.

Sub usu Saechari Saturni in connubio cum Morphio acetico
tumor anevrysmaticus arcus aortae delitescebat, pulsatio minue-
batur, et omnia symptomata generatim mitigabantur, nec alvus
a continuata tali cura reddebat styptica. Ast non multo post
tumor fortius pulsans rursus elevabatur cum suffocationis peri-
culo, quod demum intravit. Alter quoque casus similis, licet ab

initio pulveris Sacehari Saturni, et Opii (*aa* grana duo de die) usus spem aliquam admittere videretur, in morte terminavit.

Externe, forma linimenti:

Rec. Olei commun. unc. tres

Sacch. Saturni drachm. *semis.*

M. f. linimentum.

D. S. Illiniantur plagae ex diurna sinapismorum applicatione exulceratae.

Et, quum dolores in iisdem plagis persentiri continuarent:

Rec. Olei commun. unc. duas

— cocti Hyoscyami *unc. unam*

Sacch. Saturni *scrupul. unum.*

M. D. S. Uti supra.

Unguentum, in scrofula, labio tumente ac dolente:

*Rec. Sacch. Saturni *scrupul. unum**

Adipis snilli *drachm. tres.*

M. f. unguentum.

D. S. Inungatur labium, magnitudine pisi.

Solutio. In syphilide locali, post unctionem ulceris, cum Argento nitrico:

Rec. Aq. destill. unc. octo

Sacch. Saturni *grana viginti quinque.*

M. D. S. Pro lotione.

Aqua vegeto-mineralis Goulardi.

In blennorrhœa postuma urethrali post tot et tanta medicamina adhibita, eodem tenore perstante:

Rec. Aq. commun. destill. libr. unam

— vegeto-mineral. Goulardi *unc. unam.*

M. D. S. Pro injectione in urethram.

Eadem lotio, imminuta vero dosi Aquæ destill. comm. ad libram semis, locum habuit in variola, propter nimiam pustularum adhaesionem ad cutim.

In hydrope universali, scroto valde inflammato:

Rec. Aq. destill. commun. unc. sex

— vegeto-miner. Gonlardi *unc. unam*

Mucilag. g. arab. *unc. duas.*

M. D. S. Lavacra scroti.

Vide *aqua Rosarum*. Epithemata ex aqua Goulardi adpli-
cabantur illico post hirudines, in anevrysmate arcus aortae.

Plumbum carbonicum,
s. Carbonas Oxydi Plumbi,
s. Cerussa alba.

Subpositoria, in tabe mesenterica, praesentibus tumoribua
haemorrhoidalibus :

Rec. Butyri Cacao unc. unam
Cerussae alb. drachm. unam.
Malax. exacte, ut f. subpositoria Nr. duo.
D. S. subpouantur mane et vesperi.

Emplastrum, in scrofula, ad ocyus obtinendam ulcerum
cicatrisationem :

Rec. Ceruss. alb.
Sebi ovill. $\frac{aa}{aa}$ drachm. duas
Cerae citrin. unc. semis
Resin. Pini drachm. unam.
Confunde ad lenem ignem.
F. emplastrum.
D. S. Adplicetur ulceribus colli.

Emplastrum Diachylon simplex.

Obtegcbantur hoecc emplastro bullae et plagac ruptae in
pemphigo seorbuto; exoriationes et ulcerationes in cute ex
crustis delabentibus; in variola; tumor scrofulosus apertus, etc.

Polygala Senega.

Decoctum ex uncia semis, in catarrho chronicō cum atonia
pulmonum :

Rec. Rad. Senegae unc. semis
Consc. coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{4}$ h.
Col. unc. octo adde :
Tartari emet. gran. unum
Oxymell. squill. unc. semis.
D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

In pneumo-bronchitide catarrhali, hacente expectoratione; in pneumonia notha Sydenhami, in statum nervosum tendente:

Rec. Rad. Polygal. Seneg. drachm. tres

Consc. coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. octo adde:

Sal. ammou. dep. drachm. unam

Succi Liquirit. drachm. duas

Oxymell. squill. unc. duas.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

In bronchitide, cum pneumonia succeedanea, cum sputis nullis, tussi perrara, vertigine, cephalaea, aurium susurru, facie collapsa, inquietudine, doloribus artuum, delirio, virium debilitate:

Rec. Rad. Polygal. Seneg. unc. semis

Consc. coque c. s. q. aq. p. $\frac{1}{4}$ h.

Dein infunde:

Rad. Ipecacuanh. rud. tus. scrupul. unum

Stent in digestione p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Camphor. ras. mucilag. g. arab. subactae grana tria

Syr. simpl. unc. unam

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

Praescribebatur quoque et quidem lubentissime cum Liehene island., Ononide spinosa; addebatur deocto aqua Laurocerasi, Cremor Tartari, acetas Ammoniae, Nitrum.

Potassa carbonica neutra.

Unguentum, ad tumorem lienis in quartana, hac vero abacta

Rec. Carbonat. Potassae neutr. drachm. unam

Axung. porci unc. unam.

M. f. unguent.

D. S. Ad inungendam regionem iliacam sinistram ter de die magnitudine nucis juglandis.

Tumor exinde imminuebatur, sed ad sovendam plenariam tumoris resolutionem contulit Sal ammoniacus in deocto Taraxaci.

Potassa hydrochlorica.

In ascite diffuso, sed nullo eum effectu experimentum factum fuit cum infuso baecar. Juniperi, et Potassa hydrochlorica, ad drachmam $1\frac{1}{2}$, dosi serius aueta de die drachma $\frac{1}{2}$.

Prunus domestica.

De coctum ex unciis duabus, ad col. librae unius paratum, simulque subjunctis Gramine aut Hordeo, quibus ut plurimum sal quidam eccoproticus solebat addi; e. gr. in scribris aestivis:

Rec. Prunor. siccatae. enucl.

Rad. Graminis consc. \overline{aa} unc. duas

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$ h.

Col. libr. unius adde:

Cremor. Tartari drachm. tres

Syrr. simpl. $\frac{1}{2}$ unc. unam.

D. S. Omni hora vasculum coff. semis.

Pyrethrum.

(*Anthemis Pyrethrum.*)

Externe, pro collutorio, in odontalgiis:

Rec. Rad. Pyrethri drachm. tres

Consc. inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. sex adde:

Tinct. Opii simpl. drachm. unam.

D. S. Collutorium.

In individuo scorbutico, omissa serius, dolore dentium cyanido, tinctura Opii, addebatur drachma $\frac{1}{2}$. Acidi sulf. diluti, et uncia 1 Mellis.

Pyrola umbellata,

s. Chimophila umbellata.

In ascite diffuso, postquam extractum Squillae methodo endermatica tentatum suisset:

Rec. Fol. et stipitum Pyrolae umbellat. unc. semis

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.

Postea coq. p. $\frac{1}{4}$ h. col. fortiter expr. unc. decem, adde:

Syrr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

De cocto Pyrolae addebantur quoque spiritus Juniperi drachmac 2, augendo dosin ad unciam semis.

Quassia.

Extractum Quassiae, forma pilularum, in chlorosi:

Rec. Extr. ligni Quassiae *drachm. unam*

Pulv. cort. Cinnamomi q. s. ut f. pilulae XXX.

Conspurg. eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilulae duae — tres.

Eadem formula cum extractis amaris tonicis, et extracto Aloës aquoso, serius cum extracto malatis Ferri, vel carbonate, et limatura Ferri; connubium non insuetum initit cum Croco, Baryta muriatica et extracto cort. Peruviani, Ferro sulf., pilulis Valleti. Adhuc in chlorosi:

Rec. Extr. Quassiae

— cort. Peruv. *āā grana quindecim.*

Pulv. rad. Acori q. s. ut f. pil. XV.

Conspurg. pulvere Lycopodii.

D. S. Omni bihorio pilulae tres.

Vide *Absynthium.*

Cum rasura ligni Guajaci; in chlorosi primaria:

Rec. Extr. Quassiae *scrupul. unum*

Rasur. ligni Guajaci q. s. ut f. pil. X.

Conspurg. pulvere Cinnamomi.

D. S. Omni bihorio pilula una.

Quercus.

In scrofula, coffea ex glandibus Quercus tostis inserviebat potui:

Rec. Glandium Quercus tostarum *libr. unam*

Redige in pulverem.

D. S. Pro infuso arabico.

Ratania.

Decoctum, interne, a drachmis duabus, tribus ad col. unc. octo; in oophorite lenta, cum fluxu uterino perstante, sub finem curac, seculo adstringente; in leucorrhœa a statu pituitoso:

Rec. Rad. Ratanh. *drachm.* *duas (tres)*

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$, h.

Col. fortiter expr. unc. octo adde:

Syr. simpl. *unc. unam.*

D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Externe, pro collutorio; in stomachac scorbutica :

Rec. Rad. Ratanh.

Cort. Chinae reg. rud. tus. $\overline{\text{aa}}$ *drachm. tres*

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$, h.

Col. unc. octo adde:

Aluminis crudi *drachm. unam*

Mell. Rosarum *unc. unam.*

D. S. Collutorium.

R h e u m.

Recipiebatur in pulvere cum salibus diversis, cum substantiis drasticis; in pilulis, cum Quassia, Fellc Tauri, Trifol. fibr., Sapone, etc. Infuso addebatur syrupus Cichorei c. Rhco, extractum Absynthii, extractum eort. Aurantiorum, Salia diversa. *Tinctura Rhei aquosa* uniebatur cum deoctis et mixturis amaris tonieis, purgantibus. Dosis refracta a granis duobus, ad decem; plena dosis a draehma una vel duabus. Tincturae dosis uncia una, vel duae addebantur mixturis.

Rec. Pulv. rad. Rhei chinens. *drachm. semis*

Sacch. albi *drachm. unam.*

M. f. pulv. aeq. div. in dos. octo.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

In osteadenitide serofulosa, cum zosteri ligulari :

Rec. Pulv. rad. Rhei chinens.

Magnes. carbon.

Elaeosacch. cort. Aurant. $\overline{\text{aa}}$ *drachm. unam.*

M. f. pulv. div. in dos. aeq. X.

D. S. Ut supra.

In tinea scutulata :

Rec. Pulv. rad. Rhei chinens.

Magnes. alb. $\overline{\text{aa}}$ *drachm. semis*

Elaeosacch. Foeniculi *drachm. unam.*

M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.

D. S. Ut supra.

In pyrosi:

- Rec.* Carbonat. Magnes. *drachm. semis*
- Pulv. rad. Rhei chinens. *grana quindecim*
- Elaeosacch. cort. Aurant. *drachm. semis.*
- M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.
- D. S. Omni bihorio pulvis, usquedum evanescat pyrosis.

Cum Calomele, in febre gastrico-verminosa; in hepato-splenemphraxy subinflammatoria:

- Rec.* Calomel. laevig. *grana octo (decem)*
- Pulv. rad. Rhei chinens. *grana sexdecim (scrup. unum)*
- Sacch. albi *drachm. unam.*
- M. f. pulv. aeq. div. in dos. quatnor (sex).
- D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Infusum, in chlorosi primaria:

- Rec.* Rad. Rhei chinens. rud. tus. *drachm. unam et semis*
- Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.
- Col. unc. decem adde:
 - Extr. cort. Anrant. *drachm. semis*
 - Elaeosacch. cort. Aurant. *drachm. duas.*
- D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.
- Rec.* Rad. Rhei chinens. rud. tus. *drachm. duas*
- Inf. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h.
- Col. unc. decem adde:
 - Sal. amari *unc. semis*
 - Syr. Cichor. c. Rheo *unc. unam.*
- D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

Haec fuit formula eum fructu adhibita, ad mentem cl. Prof.

Fr. ab Hildenbrand; et quidem in pellagra.

In affectionibus pituitosis:

- Rec.* Rad. Rhei chinens. rud. tus.
- Semin. Anisi stellati $\overline{\text{aa}}$ *drachm. duas*
- Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.
- Col. unc. octo adde:
 - Elaeosacch. cort. Aurant. *drachm. duas.*
- D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

In erysipelate lymphatico decrescente, cum nota pituitoso-verminosa, ad digestionem magis excitandam:

Rec. Rad. Cichorei unc. unam et semis

Coq. c. s. q. aq. c. p. 1/4 h.

Sub finem coctionis adde:

Rad. Rhei chinens. drachm. duas.

Stent in infusione ferv. per 1/4 h. v. cl. •

Col. unc. decem adde:

Syr. Cichor. c. Rheo unc. semis

M. D. S. Quatuor viciibus absumatur, interpolando horam.

De innumeris, quas initit Rheum, combinationibus non lo-
quor, nee de morborum formis, quibus opponebatur, haec ani-
ma hepatis.

Tinctura Rhei, in affectionibus pituitosis:

Rec. Tinctur. Rhei aqnos. unc. quatuor

Aq. destill. Menthae pip. unc. duas

Elaeosacch. cort. Anrant. drachm. unam.

M. D. S. Omni bihor. cochl. cib. duo.

In leueorrhœa, pendente a statu pituitoso:

Rec. Flor. Chamomill. vulg. unc. semis

Inf. s. q. aq. ferv. p. 1/4 h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Tinctur. Rhei aqnos. unc. unam

Elaeosacch. cort. Aur. drachm. unam.

D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.

Ricini oleum et emulsio seminum.

Semina ab uncia una, ad duas in emulsione; oleum ab un-
cia semis ad uncias duas pro singula dosi, vel merum, vel cum
potu arabico, aut juseulis carnium tenuium, aut in mixturae
oleosae forma. Interue:

Rec. Semin. Ricini probe excorticatorum et pellicula in-
terior spoliatorum unc. duas

Contrit. adfunde sensim

Aq. font. tepidulae unc. sex

ut f. l. a. emulsio.

Col. adde:

Syr. simpl. drachm. sex.

M. D. S. Intra duas horas absumendum.

In helminthiasi, cum magna simul nervorum agilitate:

Rec. Olei Ricini rec. press. unc. duas

Pulv. g. arab. q. s. ad perfectam olei subactionem

Syrupi Diacodii *unc. unam.*

Bene contritis sub continua subactione sensim affuude:

Aq. commun. *unc. duas*

— destill. Lauroceras. *drachm. tres.*

M. D. S. Intra tres horas absumatur.

In enteralgia saburrali :

Rec. Olei semin. Ricini rec. press.

— Amygdal. dulc. rec. press. \overline{aa} *unc. unam et semis*

Pulv. g. arab. q. s. ad perfectam olei subactionem.

Bene contritis sub continua subactione sensim sensimque
affuude:

Aq. commun. *unc. octo*

— destill. Laurocerasi *drachm. duas.*

M. D. S. Omni hor. vascul. coff. semis.

Eadem formula (cum extr. Hyoscyami) valuit in metritide peritonaeali, in enteralgia flatulenta.

Olei puri recenter pressi amplius fuit usus in verminatione, synochis gastricis verminosis, stimulum aut nullum, aut minimum, blandum exigentibus, in peritonitide, enteritide, colepatitide, oophoritide, nepliritide, oesophagitide, etc., dysenteria.

Externe, pro elysmate, ad *unc. duas*, cum oleo Lini, addito quandoque sale culinari.

R o s a.

Aqua destillata Rosarum, qua vehiculum, tam interne, quam externe; e. gr. in catarrho pulmonum chronicō stationario facto, cessatis vero ardoris sensu et constrictionis ad diaphragma, sputis sanguineis, aliisque irritationis signis, secretionē itaque nunc dependente a majori nonnisi vasorum relaxatione. Ita in mixtura *Griffithii*:

Rec. Aq. destill. Rosarum unc. sex

Extr. Myrrhae aquosi scrupul. unum

Sulfat. Ferri grana duodecim

Syr. simpl. unc. unum.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Rec. Aq. destill. Rosarum

— — communis $\bar{a}\bar{a}$ unc. duas

Sulfat. Ferri *grana sex*

Extr. Myrrh. aquos. *scrupul. semis*

Aq. destill. Lauroceras. *drachm. duas*

Syr. simpl. *unc. unam.*

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. unum.

Externe, in tabe dorsuali incepiente cum fiente epilepsia:

Rec. Aq. destill. Rosarum unc. sex

— vegeto-mineral. Goulardi *unc. tres.*

M. D. S. Pro frictionibus ad lumbos ei genitalia.

Rec. Aq. destill. Rosarum unc. sex

— vegeto-mineral. Goulardi *unc. tres*

— destill. Laurocerasi *unc. unam.*

M. D. S. Ut supra.

Mel Rosarum, cum decoeto Hordei, vel infuso Salviae, addito quandoque Alumine; pro collutorio.

Rubus Idaeus.

Syrupus Rubi Idaei, in mixturis ex aqua aliqua destillata, cum elixir acido Halleri, tintura robor. Whyttii, etc., ad unciam unam, grati saporis et coloris amoeni gratia.

Sabina.

Interne. Infusum a draehma semis, ad scrupulos duos, ad drachm. unam sensim adseendendo; in amenorrhœa chlorotica, erasi sanguinis prius correcta per martalia:

Rec. Frond. Sabinae drachm. unam

Consc. inf. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. sex adde:

Extr. Aloës aqnos *grana quindecim*

Aq. destill. Menth. piper.

Syr. simpl. $\bar{a}\bar{a}$ unc. unam.

M. D. S. Omni bihorio cochl. cib. duo.

Externe. Pulvis, ad conspergenda condylomata, uleera syphilitica, quandoque addito Mereurio praecepitato rubro:

Rec. Pulv. frond. Sabinae unc. duas.

S. Externe, ad ulcera syphilitica adspergendum.

S a l e p.

Decoctum, ex scrupulo uno, vel duobus, ad col. librae unius, librarum duarum; in diarrhoea:

Rec. Rad. Salep rwd. tns. scrupul. unum

Coque c. s. q. aq. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. libr. unius adde:

Tinctur. Opii simpl. gutt. quindecim

Syr. Diacodii unc. unam.

D. S. Omni hora vasc. coff. semis.

Huic decocto addebantur aquae Laurocerasi drachmae tres, in blennorrhoea vesicali, vel etiam pro re nata, cum Nitro et Oxymelle, addebatur syrpus Diacodii, extractnm Hyoscyami. Sub finem coctionis addebantur grana quindecim rad. Ipecacuan-hac. Idem decoctum cum uncia una succi Citri, vel drachma una Acidi tartrici subministrabat potum acidulum. Decoctum Salep adhibebatur quoque in catarrho laryngis chronicō.

Salvia officinalis.

Externe. Infusum, ad unc. semis, vel drachmas sex, ad col. librae unius, pro collutorio.

Rec. Fol. Salviae off. unc. semis

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. libr. unius adde:

Boracis venet. drachm. duas

Mell. despum. unc. unam.

D. S. Collutorium.

Eadem ratione parabatur collutorium cum Acido sulf. dil., spiritu Cochleariae, tintura Myrrhac, Mellc rosato, cortice Peruviano, etc.; c. gr. cum Alumine, in scorbuto, in stomatitide propter laxitatem partium a morbo relictam; item in angina fau-cium, stadio quasi convalescentiac:

Rec. Fol. Salviae off. unc. semis

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Alum. crudi drachm. semis.

D. S. Collutorium et gargarisma.

Talis formula in usum tracta fuit contra isthmum idem phlegmonosam, abscessu sponte rupto, et copiosa inde plorante suppuratione. Addebatur quoque Melli rosati uncia una.

In phaenomenis oris mercurialibus, post Sublimati usum:

Rec. Fol. Salviae off. drachm. tres

Inf. s. q. aq. c. serv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. deceim adde:

Boracis venet. drachm. unam

Mell. despum. unc. unam.

D. S. Collutorium.

In febre nervosa cum exanthemate aphthoso in cavo oris; cum Acido mur. dil., et Melle despum. Vide *Acidum muriaticum*.

Sambucus.

Interne. Infusum florum S. ex uncia semis; e. gr. in febri catarrheumatica:

Rec. Flor. Sambuci unc. semis

Inf. s. q. aq. c. serv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. librae unius adde:

Acetat. Ammon. solnt. drachm. unam

Syr. simplic. unc. unam.

D. S. Omni hora vasc. coff. semis tepidale sumendum.

Infusum fl. Samb. sumebatur etiam e decoctis Althacae, Graminis, Dulcamarae, porro cum infusis Chamomillae, Tiliae, etc., addito sale quodam cathartico, vel roob Sambuci.

Roob baccarum Sambuci addebatur mixturis, infusis diaforeticis, ad unciam semis, unam, uncias duas.

Externe. Infusum florum S. pro fomentis, et pulvis flor. S. pro cucuphis, utraque forma vel simplici vel in unione cum Chamomilla, herba Hyoscyami, Arnica, Tritico, etc.

In parulide crysiplacea, crysiplate oedematoso:

Rec. Pulv. flor. Sambuci

Farin. Fabarum unc. duas.

M. redige in pulverem aequabilem.

S. Sacculo inclusus tepide adplicetur ad partem adfectam.

Santonicum.

Interne. Infusum, ex drachma una, vel duabus, ad col. unc. sex, vel octo, cum Senna; in helminthiasi:

Rec. Semin. Santonici unc. semis

Fol. Sennae alexandr. drachm. duas

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. 1/4 h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Uniebatur frequenter cum sale amaro, Arcano duplicato:

Rec. Semin. Santonici drachm. tres

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. 1/4 h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Sal. amari unc. semis

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. unum.

Unacum infuso Foeniculi, in doloribus flatulentis verminosis; cum infuso Rhei, in intermitte cum helminthiasi:

Rec. Semin. Santonici drachm. tres

Rad. Rhei chinens. drachm. unam et semis

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. 1/4 h. v. cl.

Col. unc. sex adde:

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam et semis.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Ingrediebatur etiam electuarium *Stoerckii*, unacum Valeriana, Jalapa, Arcano duplicato, et Melle:

Rec. Pnlv. semin. Santonici

— rad. Valerian. sylv. \overline{aa} drachm. unam

— rad. Jalap. scrnpul. unum

— Arcani duplicati drachm. duas

Roob Sambuci unc. unam.

M. f. electnarinni.

D. S. Omni bihorio cochl. coff. unum.

Sapo alcalinus seu medicinalis.

Pilulae, ad drachmam, cum Felle Tauri, pulvere Rhei, extracto Cicutae cum Calomele, cum extracto Trifol. fibr., Cicutae, cortieis Peruviani, etc.; e. gr. in tabe mesenterica, glandulis mesentericis duris et quasi lapideis:

Rec. Sapon. medicinal.

Extr. Trifol. fibr. \overline{aa} drachm. semis

— Conii macul. grana octo

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. XXIV.

Conspurg. pulvere eodem.

D. S. Omni bihorio pilulae tres.

In melanchlorosi anaemorrhoides:

Rec. Sapon. medicinal. *drachm. unam*

Extr. Cicutae *grana duodecim*

Pulv. rad. Rhei chinens. q. s. ut f. pil. XXXVI.

Conspurg. pulvere Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae tres.

Rec. Sapon. medicinal. *drachm. unam*

Extr. cort. Peruv.

— Trifol. fibr. \overline{aa} *drachm. semis*

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. pond. gran. trium.

Conspurg. pulvere eodem.

D. S. Uti supra.

Sapo domesticus, et Sapo venetus.

In solutione, balneis ad libr. unam alteramve addebatur, in scabie, tinea, porragine larvali, etc.

Rec. Sapon. commun. *unc. semis*

solve in:

Aq. font. ferv. *libr. una*.

D. S. Pro lavacro capitis.

In hypertrophia lienis:

Rec. Sapon. commun. *unc. unam*

Coq. c. aq. font. *libr. una*.

D. S. Unacum decocto globulorum martialium misceatur aquae pro balneo.

Clysmata ex:

Rec. Saponis commun. ras. *unc. semis*

solve in:

Aq. font. ferv. *unc. octo*

adde:

Olei Lini *unc. duas*.

M. D. S. Clyisma.

Rec. Decociti Hordei l. a. parati *unc. decem*

solve intus:

Saponis commun. *drachm. sex*

Mell. commun. *unc. duas*.

M. D. S. Clyisma.

In ototide rheumatico - lymphatica lenta:

Rec. Sapon. veneti *scrupul.* *unum*
solve in:

Aq. font. ferv. *unc.* *tribns.*

M. D. S. Ad depurandum meatum auditorium externum.

Sapo niger.

Solummodo externe in psora sicca; omni enim die unciae duae adhibebantur ad cutim depurandam: quae lavacra continua-
bantur per dies sex consecutivos, dein vero balneo universali
sumto.

Saponaria.

Decoctum, in infaretu hypochondriorum:

Rec. Rad. Saponar. *unc.* *unam*
Consc. coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$ horae
Col. fortiter expr. libr. unius adde:
Acetat. Lixiv. solut. *drachm.* *tres.*
D. S. Epicratice sumatur.

Sarsaparilla.

Decoctum ex uncia semis - duabus, pro colatura librarum
duarum. Praescribebatur communissime in syphilide, cum de-
cocto Dulcamarae, in complicationibus rheumaticis, arthriticis;
cum Jacea, in complicationibus exanthematicis scrofulosis; cum
ligno Guajaci, unacum Acido nitrico.

Rec. Rad. Sarsaparill. *unc.* *semis*
Caul. Dulcamar. *drachm.* *duas*
Consc. coq. c. s. q. aq. p. $\frac{1}{2}$ h.
Col. libr. unius adde:
Syr. simpl. *unc.* *unam.*
D. S. Omni hora vascul. coff. semis.

Rec. Rad. Sarsaparill. *unc.* *unam*
Consc. coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{3}{4}$ h.
adde:
Herb. Jaceae rec. *drachm.* *unam*
Continetur coctio per alium quadranteum horae

Col. libr. duarum adde:

Syr. simpl. unc. uram.

M. D. S. Sumatur ad manu.

Decoctum *Zittmanni* in inveterata lue, prae scriptim impetigino-sa, mercurialibus jam nimis tractata:

Rec. Rad. Sarsaparill. unc. duas

Aq. font. libr. quatuor

Adde sacculo includenda:

Aluminis saccharati drachm. duas

Calomel. laevig. scrupulos duos

Cinnabaris Antimonii drachm. semis

Coque per horam integrum

Sub finem coctionis infunde:

Fol. Sennae alexandr. drachm. tres

Rad. Liquirit. drachm. duas

Semin. Anisi scrupel. duos.

Stent in digestione per $\frac{1}{2}$ horac, et detur colatura libra-rum duarum.

S. Decoctum *Zittmanni* fortius.

Intra nycthemeron consumatur.

En, decoctum *Zittmanni* mitius, quod die altero ordinabatur:

Rec. Residnum decocti *Zittmanni* heri parati

Radic. Sarsaparill. consc. unc. se. nis

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$, h.

Sub finem coctionis infunde:

Cort. Aurant. (Citri) drachm. se. nis

Rad. Liquirit. drachm. unam

Col. libr. duarum de(n)r.

S. Epicratice.

Aut simpliciori modo, colatura decocti addebantur elaco-sacchari cort. Aurant. (Citri) drachmac duac.

Scilla marina.

Internc. Pulvis, et pilulae, ad grana decem; in hydrope ascite:

Rec. Rad. Scillae marin. ras.

Pulv. fol. Digital. purp. $\overline{\text{aa}}$ grana decem

Sacch. albi drachm. duas.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. decem.

D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Addebatur his pulveribus etiam Kermetis mineralis grana sex, etc.

Pilulae in hydrope ascite:

Rec. Rad. Scillae marin. ras. scrupulum unum

Extr. Aloës aquosi drachm. semis

Pulv. Acori q. s. ut f. pil. XXIV.

Consperg. pulvere eodem.

D. S. Omni bithorio pilulae duae.

Sed majores doses Scillae minus urinam movebant quam minores.

Oxymel Squillae ad unc. unam, uncias duas, in mixtulis diureticis, unacum remediis expectorantibus, etc., in decoctis Graminis, Althaeae, Cichorei, Duleamarae, Ononidis spin., et aliis.

Externe, forma unguenti; in hydrope:

Rec. Unguent. aromat. unc. unam

Extr. Scill. marin.

Tinct. Cantharid. \overline{aa} drachm. semis.

M. f. unguentum.

D. S. Pro frictione in regione renum.

Pulvis, methodo endermatica adplicitus:

Rec. Pulv. Scillae marin. grana sex

Sacch. alb. scrupul. duos.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. duas.

D. S. Pro usu externo.

Adspergatur plaga ex vesicante relicita, mane et vesperi

(vesicans autem positum fuit in quaestio[n]is casu, infra umbilicum, sinistrorum magis).

In casu ascitis et anasareae, ex adplicatione Scillae endermatica, urinae fluxus potenter adauetus est, quum ad grana 44 interdiu ore sumta, lotium parcissima stillasset copia. Sed memorari decet, hanc rationem adplicandi Scillam adeo dolorificam fuisse aegro, ut febrim quoque excitasset.

Scolopendrium.

Herba Scolopendrii, s. Linguae cervinae, s. Lonchitidis, s. Phyllitidis, si ea, quae de Lichene islandico dixi, comprehendenteris, commendari secundum experientias in Clinico factas,

valde meretur in casibus, ubi congestio aut inflammatio ad pectus Lichenis isl. adhibitionem vetat. Hocce remedium clarissimi Doctores Galiciani *Stransky*, *Babel* et *Kellermann* ex oblivionis quasi sepulero eripuerunt *). Profero casum evolutae phthiseos tuberculosae in stadium alterum propendentis eum phlogosi lenta pulmonis atque pleurae, in quo decoctum Scolopendrii, quotidie ex uncia semis-una paratum, praemissis venaesectionibus, et penes usum aquarum Reeobariensium eum laete, purgantia interpolata, et revulsiones eum unguento stibiato et emplastro vesicante, symptomatum morbosorum tantam effecit imminutionem, ut aegra triginti annos nata, melius jam nutrita et menstruis novitus salutata domum redire potuerit. Villium quoque addueere valerem, qui ex pneumophthisi tuberculosa convaluit, ni fausti hujus eventus partes Sphaerocoeco serius adhibito magis, quam Seolopendrio forent attribuendac. In tertio vero pneumophthiseos tubularis exulecrantis casu nec decoctum Scolopendrii efficere quid valuit.

Scopolina atropoides.

Hacce planta ob analogiam, quam cum Atropa Belladonna et Hyoscyamo habet, in memoriam *Scopoli*, detectoris ejus, qui plures annos in Carniolia degebat, Atropa aut *Hyoseyamus Scopoli*, nunc Seopolina atropoides appellatur (tolkrautfähnliche Scopoline. *Schultes*, österr. Flora. *Reichenbach*, Flora germ. excurs. Lips. 1830. *Röhling J. C.*, Deutschlands Flora, bearb. v. *Mertens u. Koch*, Bd. II., Frankf. a. M., 1826).

Alia synonymia: Seopola carniolica (*Jacquin*, obs. I., tab. 20); Atropa caule herbaceo foliis ovatis integris, calycibus erectis, fructu capsulari (*Scopoli*, Flora carniolica. Ed. prima, pag. 288); Hyoseyamus Scopoli (*Linné C.*, Syst. veg. Ed. 14. cur. *J. A. Murray*, Gotting., 1784, p. 221. — *Scopoli*, Flora carniol. Ed. II., Tom. I., p. 158. — *Host*, Flora austr. Vol. I., p. 293); Solanum somniferum alterum (*P. A. Mattioli*, edit. germ.

*) Med. Jahrb. d. k. k. öst. St. XVI. Bd. 2. St. S. 304. — *Lippich*, Annal. schol. med.-clin. Patav. Ser. II. Fasc. 1. p. 138; et Ser. II. Fasc. 2. p. 70. 160. 161. — *Jos. Brenner Ritter v. Felsach*; praktische Heilkunde. Salzburg, 1842. p. 31.

cur. *G. Handsch.* Venet., 1563, p. 466, cum Icone. — Syst. nat. 3., p. 235. — *Solanum somniferum bacciferum Bauh.* pimx. 166); *Scopolia trichotoma* (*Mönch*).

Classificatio. Pentandria, Monogynia. Familia naturalis: Blattariae *Scopoli*. — Luridae *Linn.* — *Jussieu*, Class. VIII., Ordo 41. Solanaeeae. — *Decandolle*: Exogenae, Subclassis III., Corolliflorae, Ordo 99. Solanaeeac. — Solanaeeae, I. Capsuliferae. Conspect. method. plant. natur. *Dr. C. J. Perleb*, pag. 23. — Synpetalae; Ordo II., Lobiflorae, Fam. Solanaceae, A. Datureae, *Reichenbach* l. cit.

Descriptio plantae, secundum *Scopoli*. Radix perennis, transversa, nodosa, crassa, ramosa, flexuosa, pollieis crassitie. Caulis tripedalis, herbaceus, teres, glaber digitii crassitie, trifidus et bisidus, ramis dichotomis. Folia ovata, oblonga, digitii longitudine; ima integrerrima, superiora non raro sinuata aut repanda. Pedunculi uniflori, penduli, ex axillis et alis, debiles, biunciales. Calyx pendulus, glaber, quinquedentatus, persistens, amplior fruetu, et quasi inflatus. Corollae color et figura eadem ut in *Atropa Belladonna*. Stamina attenuata, villosa. Antherae bilocularis, luteolae. Stylus deciduus, staminibus longior; stigmate capitato, subbisido, pulvinato, et in apice trigona foveola notato. Germen sessile, ovatum. Capsula tenuis, diametro quinque linearum, calyce minor, difficulter dehisceus; operculo signato lineis duabus eruceiformibus. Semina in singulo loculo 20—24, reeptaculo orbiculato adfixa. Majo floret, et Junio fert fructum (in supracitato opere *Mattioli* depictum). Crescit in montibus Carnioliae, ad Auersperg, in montibus Mokriz et Krim prope Labacum, et per totam hujus Ducatus partem, ad Goritiam usque, ubi *Mattioli* eam collegit.

Hucusque *Extractum* non nisi, et quidem omnium primum a *Lippich* in usum medicum tractum fuit. Librac 48 pond. civ. Vienn. herbae recentis cum radieibus ad normani Ph. Bor. rec. expressae dederunt libras 22, 25 sueci (inspissati). Hoc vero cocto, et eliminato, cuius pondus erat librae unius et semis, albunine vegetabili, liquida residua evaporata largiebantur extracti uneias 8, 25. Hujus praeparati color est valde obscurus, solutio aquosa turbida, odor haud inamoenus, neque qualis virosis

plantis adhaeret; sapor valde amarus. Exactior analysis chymica adhuc desideratur.

Herbae recentis et extraeti copia considerabilis sine damno cerebatur in eunieulis, qui alias plantas aeres, hominibus, canibus ac felibus infestas, uti *Stramonium*, *Hyoscyamum*, *Belladonnam* impunes ferunt.

Lippich, qui experimentum in se ipso instituit, ex grano uno extraeti *Scopolinae* sumto, praeter alia expertus est ariditatem et faucionem dolorem eum continuo deglutiendi nisu, imminutionem salivae, mentis aliquam exaltationem, quamdam animi hilaritatem, spectrorum lucidorum visionem, aquae taedium et potulentorum aliquantum arduam deglutitionem, somnoleutiam, citionem debita hora somnum, initio tamen scintillis igneis in oculo visis, et electricis quasi succussionibus interruptum. In nonnullis aliis etiam delirium ipsum, faueum non levem phlogosim, pupillae insignem dilatationem et exanthema fugax, scarlatinæ simile, in tota cute erumpens, produxit. Ex analogia et effectuum similitudine, quas *Belladonna* producit, supra laudatus Auctor omnibus illis in casibus, quibus *Belladonna* esse a inventa fuit, *Scopolinam* tentavit; ideoque primum qua prophylactieum in scarlatinam adhibuit. Nec spes fecellit, si e 13 casibus puerorum contagio scarlatinæ expositorum, qui tamen sub usu hujus remedii salvi manserunt, firme jam argumentari licet. Talia pericula *Lu-beanae* faeta sunt.

Sed vocat sebola clinica *Patavina*. Ulteriora experimenta instituit idem Auctor in morbis cum excedente salivatione, et postea in faucionem ulcera et quasi semper stupendo cum effectu direxit. Salivationem ex *Mereurii* usu intra dies tres communiter profligare lieuit; idem remedium etiam contra aphthas mereuriales, quamvis minori quoad tempus praestantia, proficuum erat. Idem valet de *Seopolinae* eximiis dotibus in tollendum oris foetorem ex uleere, in sananda uleera ipsa in fauncibus residentia, sive ab hydrargyrosi, sive ab indole syphilitica dependeant. Sed et solum hocce remedium eosdem salubres prodidit effectus, quin alia adhicerentur adminicula. Cito et tuto tulit isthmitudem et stomatitudem cum ptyalismo; sanavit scrofulosam ozaenam et saniosam rhinorrhœam, egregiam itaque sibi vindicans virtutem, serosas mueosae tunicae membranae seeretiones immi-

nuendi, inspissandi et exsiccandi; valuit ad penitus proligandum morbum, qui mensem jam duraverat, sequelam nimirum diutius remanentem influentiae exantlatae catarrhosae, turgorem tonsillarum insignem atque ruborem dilutum: consumta vero erant in hocce casu grana sex intra septem dies, donec dilataretur pupilla. In casu syphilidis universalis, salivatio ex paucis eyaureti Hydrargyri granis exorta, brevi unacum syphilide e solius Scopolinae usq; devicta fuit. In altero simili, sed terribiliiori adhuc casu non tantum salivationem, remediis solitis ac regimia non cedentem, et dolores osteocopos sat cito sustulit, sed ulcera intra tres dies sanavit. Absque Mercurio, et cum sola Scopolina, penes decoctum Sarsaparillae, et hirudines ad latera colli positas, syphilitica saucium ulcera, et dolores osteocopi penitus evanuerunt. Et alium haud levem syphilidis casum proferre valerem, qui sat abunde probaret egregiam Scopolinae insanandas certas syphilidis formas, praecipue cum ulceratione devastante incedentis, virtutem.

Extractum Scopolinae atropoidis praescribebatur in pulvere:

Rec. Extr. Scopolin. atropoid. grana tria

Sacch. alb. drachm. duas.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. novem.

D. S. Omni bihorio pulv unus.

Sed majoris in assumendo facilitatis gratia, lubentius praescribebatur pilularum forma:

Rec. Extr. Scopolin. atropoid. grana quatuor

— Liquirit. scrupul. semis

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. decem.

D. S. Omni bihorio pilula una.

Rec. Extr. Scopolin. atropoid. grana quatuor

— Taraxaci scrupul. unum

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. XVI.

D. S. Omni bihorio pilulae duae — tres.

Ordinabatur quoque cum mercurialibus, ut diutius praecaveatur salivatio; quin imo, non obstante salivatione, Mercurius sublim. corros., extracto Scopolinae, tanquam antisialagogo nuptus, dari adhuc aliquo tempore continuabatur. En, formulam:

Rec. Mercurii sublim. corros. grana duo

Extr. Scopolinae atropoid. grana sex

Micæ panis albi drachm. semis

Sacch. albi q. s. ut f. pil. XVI.
 Consperg. pulvere Liquirit.
 D. S. Omni bihorio pilula una (consumenda igitur quatuor in die).

Non conticendus est casus isthmitidis catarrhalis rheumati-
 cae pustulantis succidente syphilide universalis, in quo praeter
 usum externum Mercurii sublimati corrosivi, extractum Scopolinae
 atrop. interne dabatur. Vix erant hujus remedii consumata
 grana duo, quum in conspectum venirent capitis obnubilatio, pu-
 pillae dilatatio, eruptio exanthematis in pectore scarlatinae simili-
 lis, intra noctem penitus evanescens, faucium siccitas, eorum
 profusam seeretionem restringens. Penes continuatum Sublimati
 usum, sanatio perfecta, licet lente obtinebatur *).

Sebum ovillum.

In emplastro, cum Cerussa alba.

Secale cornutum.

Pulvis a scrupulo semis, ad duos; in metrorrhagia:

Rec. Pulv. Secalis cornut. scrupul. unum
Sacch. alb. drachm. unam.
M. f. pulv. div. in dos. aeq. quatuor.
D. S. Omni bihorio pulvis unus.

Farina secalina.

In cataplasmate, cum farina semin. Lini; cum herba Malvae
 et Hyoscyami; cum Melle; in sinapismis, cum farina sem. Sinapis.

*^o) Plura de hocce remedio scripsit *Lippich* in fastis medicis austriaca-
 cis „Med. Jahrb. d. k. k oest. St. XX. Bd. 4. St. S. 582 sg.“ —
 Adeundae quoque forent paginae 149. 150. 151. 152. Annal. cit.
 ejusdem auctoris Ser. II., Fasc. 1., et paginae 50. 51. 58. 59.
 115. 147. 148. 150. eorumdem Annal. Ser. II. Fasc. 2. — *Joan-
 nes Sterzinger*, Dissertatio inauguralis de Scopolina atropoide.
 Patavii, 1837. — *Dr. Franciscus Koesl*, Speculum pharmacologicum.
 Patavii, 1839. — *Dr. Brenner* in op. et pag. cit. ita se
 exprimit: „Das von Prof. *Lippich* in Padna empfohlene Extr.
 Scopolinae that auch hier von mir angewendet gegen Mercurial-
 salivation gute Dienste, indem ich sie damit in der Hälfte Zeit
 als durch andere Mittel bezwang.“

S e n n a.

Infusum ex drachma una, ad unc. semis, in connubio eum salibus diversis:

Rec. Fol. Sennae alexandrin. drachm. tres

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Sub finem infusionis solve:

Mannae elect. unc. unam

Col. unc. octo adde:

Sal. Seignett. unc. semis

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.

M. D. S. Tribus vicibus sumatur, interpolando horam.

Eadem formula eum Sale amaro, Cremore Tartari, Tartaro tartarisato, etc., loco Salis Seignetti.

Cum infuso Chamomillae, ad evitanda tormina:

Rec. Fol. Sennae alexandr. drachm. tres

Flor. Chamomill. unc. semis

Inf. s. q. aq. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Syr. Cichor. cum Rheo unc. unam.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Eodem modo eum infuso Foeniculi praescriptio placuit.

Aqua laxativa,

et Eleetuarium lenitivum Ph. Austr.

Ad unciam unam, unam et semis, uncias duas pro singulo haustu lubenter ordinabantur.

S i n a p i s.

Usus externus farinae Sinapis, pro sinapismis seopo revellente et epispastico. Adplieabatur pasta Sinapis ad plantas pedum, in statu febrium nervoso; pro necessitate, in variola, ad cutis activitatem sollicitandam; in arthragra, eo seopo, ut languens et aegro alias solita arthragra pedalis suscitaretur, aut ut medens eam imitaretur; ad adjuvanda menstrua; in apoplexia cum comate somnolento; in cholera orientali; in quotidiana cum affectione gastrica tumoreque lienis (sub stadio frigoris). Ad suras, in cholera quoque orientali; in statu febrium nervoso magis adhuc urgente.

Rec. Farin. semin. Sinapis

— secalinae \overline{aa} uac. quatuor

Aceti vini opt. q. s. ut f. pasta mollis.

D. S. Pro sinapismo ad plantas pedum.

Rec. Farin. semin. Sinapis uac. duas

— secaliuae uac. quatuor

Aceti vini opt. q. s. ut f. pasta mollis.

S. Sinapismus.

Cum Acido nitrieo-muriatico diluto: in hepato-splenemphraxi subinflammatoria febrili aceedente hydropericardio incipiente et suspicione hydrothoraeis:

Rec. Farin. semin. Sinapis unc. quatuor

— secalinae libr. naum

Acidi nitrico-muriat. dil. uac. semis

Aq. comm. q. s. ut f. pasta mollis.

D. S. Adplicetur a mediis suris, usque ad integras pedum plantas.

Cum Conio maeulato, forma eataplasmati, in eodem casu, hepate tumido et sub attaetu dolente:

Rec. Herb. Conii macul. unc. semis

Farin. semin. Sinapis

— secaliuae \overline{aa} libr. semis

Aq. commun. q. s. ut f. cataplasma.

D. S. Adplicetur regioni hepatis, tepidum ouni dimidia hora.

Pediluvia sinapata, ubieunque scopus erat, humorum congestiones ab organis nobilioribus ad partes remotiores derivandi, suppressa menstrua revoeandi. Farina sem. Sinap., aut sola, aut cum Aeeto vini opt., ad une. duas, tres, etc. aquae calidae pro pediluvio addebatur; e. gr. in haemoptysi eum aortectasi:

Rec. Farin. sem. Sinap. contus. drachm. duas

Aceti vini optimi libr. duas.

D. S. Infudatur aquae pro balneo pedum.

Maniluvia sinapata non spernenda suhsidia erant sub accessibus ex eordis vitiis.

Soda acetica, s. Terra soliata Tartari.

Ad drachnam unam alteramve ex decocto Althaeae, cum aqua Laurocerasi; in amenorrhoea retentionis locum habuit.

Bicarbonas Sodaæ.

Potus *Riverii* praescribebatur:

Rec. Bicarbonat. Sodaæ

Acidi tartrici $\frac{aa}{aa}$ drachm. unam

Sacch. albi drachm. duas.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.

D. S. Sumat pulverem unum sub conatu ad vomitum,

Reliqua vide sub titulo *Acidum tartricum*.

Cum succo Citri:

Rec. Bicarbonat. Sodaæ drachm. unam.

Div. in dos. aeq. sex.

S. Nr. I.

Rec. Succi Citri rec. press. unc. unam.

S. Nr. II.

Fiat potus limonatus cum parte una pulveris Nr. I., et
sacch. albi s. q., cui mox ante haustum ad
datur sexta pars Nr. II.

Cum acetate Morphii, in bronchitide lenta cum nota verminosa; quum post sorbillos glaciales vomitus adhuc et majori intensitate persisteret, tussis etiam valdopere sese exasperasset, ut mitigaretur nunc et altera:

Rec. Acetat. Morphii gran. semis

Bicarbonat. Sodaæ drachm. semis

Sacch. albi drachm. unam.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.

D. S. Nr. I.

Rec. Succum Citri unius

Sacch. albi unc. unam.

M. D. ad lagennlam.

S. Nr. II.

Pulvis ex Nr. I., immittatur vitro cochlearibus tribus aquae replete, soluto pulvere superaddatur cochlear unum ex Nr. II., bibatur sub effervescencia, omni bihorio.

Soda muriatica,

s. Sal communis.

Interne. Salis culinaris uncia semis jusculis admiscetur, ubi taenia solium suberat.

In tertiana duplici cum nota gastrica et splenemphraxi:

Rec. Decocti Taraxaci ex unc. duabus parati unc. decem
adde :

Sal. culinaris drachm. sex

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.

D. S. Epicratice.

In haemoptysi inflammatoria cum tuberculis et amenorrhoea emulsionis (vide Acidum hydrocyanicum).

Rec. Sal. culinar. drachm. sex

solve in :

Aq. commun. unc. tribus.

M. D. S. Sumatur illico , in vicibus duabus.

Externe. Pro elysmate (ad une. semis - unam) ex decoeto Hordei, Lini, etc.; pro pediluviis (ad une. duas) ad sollicitanda menstrua. In indurationibus glandularum colli frictiones ope solutionis aquosae concentratae Salis culinaris, nee non balnea tepida eundem salem continentia, et in hypertrophia testium residua ex orehitide blennorrhoea , balnea et fomenta similia valde proficia erant. Praeterea ingrediebatur unguenta, e. gr. unguentum Roncalli contra scrofulas.

Soda sulfurica, s. Sal mirabilis Glauberi.

Ubi simul alvus movenda erat, ex decoctis solventibus, ad unc. unam; eum Manna , in solutione.

Rec. Aq. font. libr. duas

Succi Citri unc. unam

Sulf. Sodaee unc. semis

Sacch. albi unc. duas.

M. D. S. Pro potu.

Solanum tuberosum.

Externc, in anaesthesia paraplegiae :

Rec. Rad. Solani tuberosi libr. unam

Decortica, conscinde in frustula minima, et coque in pultem.

S. Addatur aquae calidae, pro pediluvio.

Species aromaticae.

Externe. In enteralgia flatulenta febrili cum accidente hydrope ascite:

Rec. Specier. arom. libr. unam et semis

Furf. Tritici libr. unam.

M. claude in sacculum.

S. Adplicetur ad abdomen.

In myositide traumatica intercostali cum nota catarrhali, quum post hirudines et epithemata frigida, dolores eodem persistarent tenore: epithemata humida ex libra semis specierum arom. cum aq. communis et Aceti vini opt. uneis quatuor adplicabantur regioni affectae. Sed fomenta sicca ex iisdem Speciebus magis conduxerunt.

Species pro decocto lignorum.

In syphilide:

Rec. Speciem pro decocto lignorum unc. duas

Consc. coq. c. s. q. aq. c. p. horam

Sub finem coctionis infunde:

Rad. Liquirit. consc. unc. unam

Stent in infusione calida p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. libr. unius exhibeatur.

S. Pro potu.

Sphaerococcus confervoides, et Sphaerococcus crispus.

Sphaerococcus erispus, s. Fucus crispus Linn., s. Lichen (improprius) Carageen (krauser Tang) dictus, nuper ex maris hybernici allatus, et Sphaerococcus confervoides, venetarum lacunarum alga, contra phthisin tubercularem, et quidem magis initiatam, ubi congestio aut inflammatio ad pectus Lichenis islandie usum vetat, prospero et in singulis quibusdam casibus prosperrimo eum eventu adhibiti fuerunt. Ut qui majorem Jodi, Bromi salisque marini copiam tenet, Sphaerococcus confervoides praeferebatur illis in casibus, ubi, uti in phthisi tuberculari, non adeo exulcerata evenit, scopus erat praecepius, materiam tuber-

eularem pro possibili resolvendi absorbendique. Resarcendae vero substantiae deperditae, ergo nutriendo magis conveniebat Sph. erispus, gelatina magis dives. Prostant exempla pneumo-phthiseos tubercularis ope unius alteriusve algae sanatae, sed adeant lectores cit. Annal. schol. med.-clin. Seriem II, Fasc. 2, pag. 160 et 161, et Ser. II, Fasc. 1, pag 138; ne nimis, aut obscuri quid dicam. Quadriennii eursu (ab anno scilicet 1837/38, — 1840/41) quatuor alios insuper, vi plures numeravi casus similes, felieis eventus, ad quem consequendum Sphaerococeus conservoides praeprimis egregiam suam eontulit operam. Sed illicis in terris balsamum vitae, pulmonibus manna. aër dulcis spirat, temperatusque.

Sphaerococeus crispus praescribebatur sequenti modo :

Rec. Sphaerococci crisi drachm. unam

Coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. libr. unius adde :

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Epicratice sumatur.

Vel, praesertim in haemoptysi inflammatoria, etc.

Rec. Sphaerococci crisi drachm. unam

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. libr. unius refrig. adde :

Aq. destill. Laurocerasi drachm. duas

Syr. simpl. (s. syr. capill. Vener.) unc. unam.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

Sphaerocoecus conservoides:

Rec. Sphaerococci conserv. drachm. unam

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. decem adde :

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Epicratice sumatur.

Rec. Sphaerococci conservoid. drachm. quatuor

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. decem refrig. adde

Aq. destill. Laurocerasi drachm. duas

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Vel cum infuso Digitalis purpureae; e. gr. in tracheo-bronchopneumonitide lenta tuberculari:

Rec. Sphaerococci conservoid. drachm. unam

Coque c. s. q. aq. p. $\frac{1}{8}$ h.

Infunde:

Fol. Digital. purp. grana quindecim

Stent in infusione ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. octo adde:

Syr. Diacodii unc. unam.

M. D. S. Omni biliario cochl. cib. duo.

Leguntur apud *Dioscoridem*, *Galenum*, *Plinium* Musci marinii et algarum in genere virtutes laudatae in podagra. Saeculo decimo sexto innuit Corallinae et marini Musci vis vermisuga, licet et antea vulgo non fuerit ignota et anno 1770 prima experimenta fuerunt tentata circa speciem ad oras insulae Corsicae communem, cui Corallina corsicana seu Fucus Helminthochorton per eminentiam tribuebatur nomen. Per Franciam, Germaniam et per alias terrarum ditiones merita divulgata, ad sidera usque ferchantur. Sed ignorantia in causa fuit, aut fraud, quod loco Fuci Corsicani in commercium introduceretur convolutum illud impurum ex algis marinis, uti ex Sphaerococco coronopifolio, musciformi, et centenis aliis, nonque ex diversis zoophytis et zostera constans. Quid insuper, quando corsicanum litus paupertate Corallinac suae famosae laboret, exhaustum: quales voices audiuntur? Id quod medicorum quis suspicabatur, virtutem anthelminthicam Fuco non solum corsicano, verum et omnibus marinis algis inhaerere, assiduus naturae scrutator et eminens algologus Venetus Dr. J. D. Nardo experimentis cum iisdem institutis comprobavit, ut itaque consultius esset, usui medico accommodare algas lacunarum venetarum recentes, loco illius Fuci corsicani, quasi semper impuri, decompositi, male conservati. Idem medicus ab anno 1828 ulteriores circa hoc argumentum indagines instituens, anno 1832 Eruditorum Congregationi, quae Viennae locum habuit, proposuit algarum marinorum oleum empyreumaticum, adhibendum guttatum, solutum in oleo Ricini, propinandum etiam in gelatina algarum carundem, vel in bolos redactum; quod in casibus verminationis pertinacis, in individuis praecipris cum infaretibus scrofulosis salutare inventum fuit.

Veluti ex variis algis gelatina formatur, cibo inserviens populis septentrionalibus, ita et quasi omnes venetarum algae, uti Fuci, Sphaerococci, etc. gelatinam largiuntur, qua Sphaerococ-

cus acicularis omnium ditissimus est. Haec vero alga a medicis venetis utilissima deprehendebatur in phthisi pulmonali indolis scrofulosae, in quibusdam diarrhoeis cum infarctibus abdominalibus, in tenellorum verminatione, tabe mesenterica et aliis.

Fucus, seu Sphaerococcus crispus ex Hibernia adveniens quoad gelatinæ copiam multo inferior est Sphaerococco aciculari lacunæ venetae, qui et illo majorem vim exserit antiscrofulosam; magis vero adhuc inferior est quoad Jodii et Bromi copiam, Sphaerococco conservoide, Fuco vesiculoso, Fuco spirali, Ulva Lac-tuca et aliis, quae veneto ex mari depromuntur, et a venetis praesertim medicis variis scrofularum formis, phthisi tuberculo-sae, verminationi, ulceribus scrofulosis, etc. plaudibili cum suc-cessu opponuntur.

Formae pharmaceuticae, sub quibus adhiberi possunt algæ, forent, uti jam dixi, decoctum, pulvis simplex, vel unacum Melle in electuario, gelatina vel simplex, vel cum syrupo, vel pro cly-smate in solutione. Oleum empyreumaticum unacum oleo Ricini, vel in bolis, guttatum, ad drachmam unam de die. Cataplasma. Stragula et pulvinaria algis siccis farcta phthisicis utique sunt grata, mare redolentia. Pulvis nonnisi ex algis bene exsiccatis obtineri potest; decoctio exigit tempus plus minusve protractum, secundum textum qui algam componit, et pronti plus aut mi-nus calori resistunt: ita ut pro nonnullis simplex infusio cum aqua fervida requiratur, pro aliis iterum digestio per integrum diem, alterumve protrahi debeat. Nuper clar. *Nardo* balnea ma-rina algis impregnata summopere commendavit.

Nosse vero oportet, algas momento fructificationis, quo ma-xima efficacia praeditae sunt, debere colligi, dein lavari ab im-mundicie, luto aliisque corporibus eisdem adhaerentibus. Lava-tae in aqua marina, et antequam ineant aliquem corruptionis gradum, aëri² ut exsiccentur, committuntur; siccatae vasis in-cluduntur. *)

*) Circa haec remedia adeant lectores cit. Annal. Ser. II. Fasc. 1. pag. 159. 160. 162. — Domenico Dr. *Nardo*, Considerazioni generali sulle alghe, loro carattere, classificazione, composi-zione chimica e applicazione alla medicina, etc. Venezia, 1835. — Dr. Fr. Koestl, op. cit. pag. 116 seq. — De Fuco criso-

**Stibii oxydulum hydro - sulfuratum aurantiacum,
s. Sulfur auratum Antimonii.**

Pulvis, et pilulae, in quibus a quadrante grani ad granum integrum, tria, sex, octo dose singula, juncta simul cum Calomele, extractis diversis narcoticis, Scilla, Guajaco subministrabatur; e. gr. in catarrho inveterato:

*Rec. Sulfur. aur. Antimonii grana sex
Calomel. laevig. grana tria
Pulv. rad. Rhei chinens. scrupul. unum
Sacch. albi drachm. unam
M. f. pulv. div. in dos. aeq. sex.
D. S. Omni bihorio pulvis unus.*

Ita quoque in hepatemphraxi; absque Rheo, in peripneumonia, fracta jam prius congestione; in rheumatismo chronicō, cum Guajaco; in hydrope, cum Squilla.

In arthritidis accessu ad finem vergente:

*Rec. Sulf. aur. Antimonii
Extr. Hyoscyami \overline{aa} grana quinque
— Taraxaci q. s. ut f. pil. XX.
Consperg. pulvere Liquirit.
D. S. Omni bihorio pilula una.*

In catarrho pulmonum chronicō, cum sputo tenaci, haud copioso, difficiili:

*Rec. Sulf. aur. Antimon.
Extr. Hyoscyami \overline{aa} grana quatuor
Roob Sambuci q. s. ut f. pil. sex.
Consperge pulvere Liquirit.
D. S. Uti supra.*

Cum Ipecacuanha, in rheumatismo; cum Belladonnac extracto, in broncho-pneumonitide convulsiva; cum Aconito, in rheumatismo, in hydropericardio cum catarrho; cum Conio macul., in hemicrania rheumatica; etc.

versantur paginae 347 — 350 operis intitulati: Die neuern Arzneimittel, ihre physischen und chemischen Eigenschaften, Bereitungsweisen, Wirkungen auf den gesunden und kranken Organismus und therapeutische Benützung. Von Victor Adolf Riecke, Dr. Med. etc. Zweite Aufl. Stuttgart, 1840.

**Stibii oxydulum hydro - sulfuratum rubrum ,
s. Kermes mineralis.**

Pulvis, et pilulae , uti praeparati praecedentis :

Rec. Kermet. mineral. grana tria

Sacch. albi drachm. unam.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.

D. S. Omni bihorio pulv. unus.

Eodem modo cum extracto Hyoseyami , Dulcamarae , cum Calomele.

In catarrho chronico et asthmate (emphysemate) :

Rec. Kermet. mineral. grana octo

Extr. Trifol. fibr. drachm. unam

Pulv. Calami arom. q. s. ut f. pil. pond. gran. duorum.

Conspurge pulvere Liquirit.

D. S. Omni bihorio pilulae tres.

In bronchitide catarrhalis , ad pacandam tussim , et promovendam expectorationem :

Rec. Kermet. mineral.

Extr. Aconiti Napelli \overline{aa} grana quinque

— Liquirit. scrupul. unum

Pulv. rad. Liquirit. q. s. ut f. pil. quindecim.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Rec. Kermet. mineral. grana sex

Roob Sambuci scrupul. unum

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. XII.

Conspurg. pulv. eodem.

D. S. Omni bihorio pilula una.

**Tartras Lixivae stibiatus ,
s. Tartarus emeticus.**

Pulvis emeticus :

Rec. Tartari emet. grana tria (quatuor)

Sacch. albi drachm. semis.

M. f. pulv. div. in dos. aeq. duas.

D. S. Sumat aeger pulverem unum , et vomitu per $\frac{1}{4}$ horae non inseguito , alterum.

Alterans, in pneumoniis, delirio tremente potatorum, mania, etc. etc.

Rec. Tartari emet. grana quatuor (octo)

Sacch. albi drachm. duas.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. octo.

D. S. Omni hora pulvis unus.

Augebatur sensim sensimque dosis Tartari emet. ad gr. 5, 6, 8, 12 et ultra optimo cum effectu. In tromophrenesi subinde cum Opio dabatur.

Solutio, scopo vomitorio:

Rec. Aq. commun. unc. sex

Tart. emet. grana tria (~ quatuor)

Oxymell. sqnill. unc. unam.

M. D. S. In quatuor vicibns, spatio horae unius interposito absnatur.

Diversis in decoctis, nec non infusis emollientibus, dia-
pnoicis et solventibus uuacum salibus mediis diversis, ad gr.
unum alterumve porrigebatur.

Unguentum, in inflammationibus chronicis, scrofulis, etc.

Rec. Tartrat. Lixiv. stibiati drachm. unam (~ duas)

Axung. porcin. unc. unam.

M. exactiss. f. unguent.

D. S. Mane et vesperi magnitudine nucis avellanae in-
ungendum, donec prorumpant pustulae.

Ita et solutio concentrata.

Aethiopem antimonialem vide sub mercurialibus.

Sulfur crudum.

Unguentum simplex, in seacie:

Rec. Axung. porcin. unc. unam

Sulf. crudi pulverisati drachm. duas.

M. in unguentum.

D. S. Innagatur cum quantitate dimidia primo die, cum
altera quantitate die subsequatur. Inunctio institueba-
tur primum in extremitatibus superioribus, et post-
ea in inferioribus. Post singulas binas innunctio-
nes, mane et vesperi institutas, balnum institue-
batnr universale.

Rec. Sulfur. crudi pulveris.

Sapon. nigri aqua emolliti $\bar{a}\bar{a}$ unc. *semis*

Axung. porci *unc. unam.*

M. in unguentum.

D. S. Inungatur dimidia pars hodie mane totis extremitatibus, et post inunctionem stragulo laneo involutus aeger per horas 12 quietus maneat, dein sudore abstero, recenti indusio lecto componatur.

Sed hacce methodo tractati aegri omnes nou sudarunt, quare ad infusum Tiliae cum roob Sambuci recurrebatur. Hinc ad imitationem methodi anglicanae aut rossicae, in scabie inveterata, degenerata:

Rec. Adipis porcin. rec. unc. duas

Pulv. Sulf. crudi *unc. unam*

Sapon. nigri *unc. semis*

Pulv. rad. Hellebori albi *drachm. unam et semis.*

Sapone aqua emollito misce exacte in unguentum.

D. S. Inungatur totum corpus binis vicibus intra horam, dein denudetur aeger involutus stragulo laneo et altero simili cooperiatur, maneat in tali positione per horas 20, dein vestimentis induatur.

Pauuis horis post factam inunctionem, in tota corporis superficie adparuit copiosa eruptio cutanea, cuius forma erat prius papularum, inde pustulosa, sed observabantur et nonnullae vesiculae prurientes. Ordinabatur decoctum Graminis, et Sapo probalneo, quod continuabatur per 4 dies, unde sanus exstitit.

Cum Mercurio praccip. albo, in psora sicca cum sublatente syphilide:

Rec. Pulv. Sulf. crudi drachm. tres

Mercurii praec. albi *scrupulum unum*

Adipis suilli *rec. unciam unam.*

M. exacte in unguentum.

D. S. Ter de die innungendum.

**Sulfur depuratum,
s. Flores Sulfuris loti.**

Interne, pulvis:

Rec. Sulfur. depur. drachm. duas

Sacch. albi *unc. semis.*

M. f. pulv. aeq.
D. ad scatulam.
S. Omni bihorio cochl. coff. duo.

In haemorrhoidibus :

Rec. Sulf. depur.
Magnes. carbon. \overline{aa} drachm. unam
Cremor. Tartari drachm. tres
Sacch. albi unc. semis.
M. f. pulvis aeq.
D. ad scatulam.
S. Saepius de die cochl. coff. unum.

Absque Cremore Tartari, in tremore mercuriali; cum Aethiope antimoniali, in morbis cutaneis.

In scabie papulo-vesiculari:

Rec. Flor. Sulf. lot. drachm. duas
Cremor. Tartari
Sacch. albi \overline{aa} unc. semis.
M. f. pulv. aeq.
D. ad scatulam.
S. Absundendus intra duos dies.

Externe. Unguentum, in eodem casu:

Rec. Flor. Sulfur. loti unc. semis
Axung. porci rec. unc. duas.
M. f. unguentum.

Symphytum off.

In stadio blennorrhico catarrhi chronicus:

Rec. Rad. Symphyti off. unc. unam
Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.
Col. libr. duarum adde:
Syr. simpl. unc. unam.
D. S. Potus.

Excreata cum tussi aliquid imminuebantur, imo et tussis serius fere evanuit.

Tamarindus.

Decoctum, ab uncia una ad duas, aut solum aut cum Gramine, Hordeo, Taraxaco, etc., aut addito sale quodam cathartico.

tieo, valde frequens ac gratum et salubre suppeditabat medicamen, in febribus gastricis, gastrico-biliosis, intermittentibus, fluxu hepatico, hepato-splenemphraxy symphoretica, haematuria diarrhoea, pellagra, etc.

Rec. Rad. Graminis consc.

Fruct. Tamarind. enucl. \overline{aa} unc. duas

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. octo adde:

Cremoris Tartari drachm. tres

Tartari emet. gran. unum

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Omni bihorio vascul. coff. semis.

In haematuria renali:

Rec. Fruct. Tamarind. enucl. unc. duas

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Sub finem coctionis solve:

Mannae elect. unc. unam

Col. refrig. libr. unius adde:

Aq. destill. Laurocerasi drachm. unam

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Ut supra.

Eadem formula, omissa Manna, in haematochesi; cum acetate Ammoniae solut. drachm. tribus; vel etiam eum Nitro; Salis Seignetti uneia semis, vel integra; Tartari emet. grano uno alterove; Cremoris Tartari uneia semis, una; etc., etc.

In febre gastrico-biliosa decoctum Tamarind., eum infuso Ipecacuanhae ordinabatur.

Pulpa Tamarindorum, a drachmis sex, ad unciam unam, in diversis mixturis et electuariis loeum habuit.

Taraxacum.

Decoctum ex unc. una, vel duabus, additis diversis pharmacis solventibus; in gastrismo:

Rec. Rad. Taraxaci unc. duas

Consc. coque c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Sub finem coctionis infunde:

Rad. Rhei r. t. drachm. tres

Stent in inf. serv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. libr. unius adde :

Elaeos. cort. Annaut. *drachm. duas.*

M. D. S. Omni bihor. vascul. coff. semis.

Eodem modo praescribebatur decoctum Tarax., cum infuso Chamomillae :

Rec. Rad. Taraxaci unc. duas

Consc. coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$ h.

Sub finem coctionis infunde :

Flor. Chamomill. vulg. *unc. semis*

Stent in inf. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde :

Sal. amari *unc. semis*

Syr. simpl. *unc. unam.*

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Decoctum T. ut plurimum ordinabatur cum salibus catharticis, et Sale ammoniaco, et quidem in febribus intermittentibus.

Extractum Taraxaci liquidum, in pilulis, electuario, vel solutione, ad drachmas duas, vel unciam semis.

Rec. Extr. Taraxaci liqnid. drachm. tres

Arcani dupl. *drachm. duas*

Snlfat. Chinin. *grana sex*

Pulv. fl. Chamomill. q. s. ut f. electuarium.

D. S. Tempore apyrexiae omni hora cochl. cib. duo.

Tartras Lixivae acidulus, s. Cremor Tartari.

Pulvis, et electuarium, ad movendam alvum, a drachmis sex ad unc. duas; ut solveret et adjuvaret secretionem, ad drachmas duas, quatuorve exhibebatur.

Rec. Cremor. Tartari

Magnes. carbon. *aa drachm. duas*

M. f. pulv. aeq.

D. ad scatnlam.

S. Omni bihorio cochl. coff. unum.

In febri gastrico-saburrali lenta :

Rec. Cremor. Tartari drachm. sex

Pulv. Rhei chinens. *drachm. duas*

Extr. Taraxaci liqnid. unc. unam et semis.

M. f. electnarinn.

D. S. Ter quaterve in die cochl. coff. duo sumenda.

Cum Nitro ad drachm. unam alteramve, qua diureticum, practerea cum Tartaro stibiato, floribus Sulfuris: in pulvere.

Ad unciam semis potui admiseebatur, constanti vel ex simplici aqua, vel ex succo Citri.

Scopo eecoprotico, ad unciam unam, unam et dimidiam praescribebatur:

Rec. Hordei mundati unc. duas

Coq. c. s. q. aq. ad crepatur. granor. usque

Col. libr. unius adde:

Cremor. Tartari

Syr. simpl. \overline{aa} unc. unam.

D. S. Omni bihorio vaseul. coff. semis.

Tartras Lixivae et Sodaet, s. Sal Seignetti.

Ex decoctis variis, praeprimis solventibus, ad unc. semis, unam propinabatur.

Rec. Mannae electae unc. duas
solve in:

Aq. font. ferv. libr. una

Col. adde:

Sal. Seignetti unc. unam

Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam et semis.

M. D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Tanacetum.

Herba, flores et semina a drachmis duabus, ad unc. semis, in infuso, ad col. unc. sex, octo adhibebantur; e. gr. in helminthiasi:

Rec. Summitat. Tanaceti

Fol. Sennae alexandr. \overline{aa} drachm. tres

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. unc. decem adde:

Syr. Cichor. cum Rheo unc. unam.

D. S. Omni bil. vasc. coff. semis.

Sub finem, in infusione Manna solvebatur, vel etiam loco foliorum Sennae, Rheum electum, herba Centaurii min., vel alia addebantur.

In synochis gastricis verminosis Tanacetum Santonico, si id non agebat, ut plurimum praeferebatur.

Tauri Fel.

Inspissatum Fel tauri forma pilularum, ad drachmam semis, vel integrum, cum extractis aliis amaricantibus, aut salibus. In hepatemphraxi:

Rec. Fell. Tauri inspiss.

Sapon. medic. \overline{aa} drachm. unam

Pulv. rad. Liquirit. q. s. ut f. pil. pond. gran. duorum.

Consperge eodem pulvere.

D. S. Omni bihorio pilulae quatuor.

In splenemphraxi, addebatur adhuc carbonas Ferri.

In hepato-splenemphraxi, praemissis solventibus tonicis:

Rec. Fell. Tauri inspiss. drachm. semis

Flor. Sal. ammon. mart. grana octo

Pulv. rad. Liquirit. q. s. ut f. pil. XVI.

Consperge pulvere rad. Iridis flor.

D. S. Omni bihorio pilulae duas.

In ictero febrili, post multa adhibita alia:

Rec. Fell. Tauri inspiss. drachm. unam

Sapon. medicin. drachm. semis

Flor. Sal. ammon. mart. grana sexdecim

Pulv. Liquirit. q. s. ut f. pil. XXX.

Consperge pulvere eodem.

D. S. Omni bihorio pilulae tres.

In eodem casu, nullo secedente alvo:

Rec. Fell. Tauri inspiss. drachm. unam

Sapon. medicin. drachm. semis

Flor. Salis ammon. mart.

Extr. Aloës aquosi \overline{aa} grana quindecim

Pulv. rad. Liquirit. q. s. ut f. pil. XXX.

Consperge pulvere eodem.

D. S. Ut supra.

Externe. Forma linimenti, unguenti; in tabe mesenterica:

Rec. Fell. Tauri recent. unc. unam

Salis culinaris in pulverem subtilissimum triti
drachm. tres

Saponis domest. aqua emolliti unc. semis.

M. f. Iinimentum.

D. S. Innngendum quovis die quatuor vicibus.

In tumoribus glandularum colli :

Rec. Fell. Tauri recent. drachm. duas

Mnriat. Sodaee drachm. tres

Adipis porcin. unc. unam.

M. f. unguentum.

D. S. Innngantur tumores colli.

Cum Felle Tauri, Petroleo, adipe et viteilo Ovorum inunctionio instituebatur in tabc mesenterica.

Terebinthina.

Oleum Terebinthinae destillatum. Interne, in easu taeniac solii:

Rec. Olei Terebinth. destill. grana duodecim

Vitelli Ovi q. s. ad perfectam olei subactionem. Bene subactis, adsunde:

Aq. commun. font. unc. quatuor

Syr. simpl. unc. unam.

M. D. S. Sumat aeger vesperi intra horam tribus vicibns.

Sed taenia non secessit.

Adduco easum iehthyoseos squamosae (elephantinae), in quo Terebinthina interne adhibebatur. Primis curae diebus Terebinthinae grana XV pro die ordinabantur. Urinac copia inde aucta, tumorque artus imminutus, licet parum adhuc. Die 12. curae Terebinthinae grana XX; abhinc prorupit in artu adfecto sudor copiosus, quem subsequuta est crustarum quaedam desquamatio. Die 17. curae diligatur ope fasciae mucilagine gummi Tragacanthae et Iehthyocollae illinitae. Remota post sex dies fascia, cum hae decadebant crustae maxime in dorso pedis. Instituitur postea altera adhuc diligatio, cui hac vice glacies superimponitur; cadit et iterum magnus crustarum numerus. Quum demum die curae 30. ope immunctionum cum oleo Amygdalarum ultimae crustae cecidissent, tumorque artus totius valde imminutus esset, permansit dolor ad articulationem tarso-tibialem et myrmecismus in pollice pedis, anodynorum externe applicitorum usu fugati. Tumor artus semper adhuc deere seebat, praesertim post

pediluvia ex decocto surfurum Tritici, Terebinthina vero interim continuo propinabatur. Licet cutis eruris et pedis hypertrophia quaedam residua esset, aegra deserere Clinicum voluit, ut familiaribus rebus prospiceret.

Theriaca Andromachi.

Adplicabatur ad locum doloris thoracici, in pneumophthisi tuberculari; in gastro - scleromate ad cardiam; ad scrobiculum cordis, in haemoptoë pulmonali, propter dolores ad scrobiculum cordis. Emplastrum hoc leviter extendebatur supra telam magnitudinis prout necessitas fuit, palmae manus, etc. Cum Galbano quoque jungebatur. Interne non dabatur.

Tilia.

Infusum ex drachmis duabus, uncia semis, additis aliis, ut plurimum diaphoreticis; e. gr. Tartaro emetico, etc.

Rec. Flor. Tiliae unc. semis

Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. unc. decem adde:

Roob Sambuci unc. unam.

D. S. Epicratice.

Tragacantha.

Sub articulo *Terebinthina* locum invenit.

Trifolium.

Infusum, vel decoctum, ab uncia semis, vel drachmis sex; in statu torpido viarum digestionis:

Rec. Herb. Trifolii fibr.

Rad. Rhei chineus. r. t. \overline{aa} drachm. tres

Inf. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. librae unius adde:

Elaeosacch. Menth. pip. drachm. duas.

D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.

Decoctum, cum tinctura Rhei aquosa, vel cum Elixir acido Halleri occurrebat.

Extractum, in vehiculo quodam, decoctis solventibus, vel in pilulis, a drachma semis ad integrum; e. gr. in chlorosi:

Rec. Extr. Trifolii fibr. drachm. unam

Pulv. Calami arom. q. s. ut f. pil. pond. gran. trium.

Consparge pulvere eodem.

D. S. Omni bihorio pilulae duae.

Hanee formulam ingrediebantur quoque extracta Absinthii, malatis Ferri, pulvis florum Chamomillae, etc.

Pro necessitate easum Cortex Peruvianus, Millefolium, sulfas Chininae, Quassia, carbonas Ferri connubium inivere.

Triticum.

Furfures Tritiei, forma pulveris sacculo inelusi. In tumore temporali, exorto in encephalo-meningitide, tumore vero ope eataplasmatum jam imminuto:

Rec. Furf. Tritici

Pulv. rad. Acori

— flor. Arnicae mont. \overline{aa} unc. unam et semis.

M. Sacculo lineo pulvis inclusus adplicetur tumoris.

In dolore glandulae parotideae, et odontalgia:

Rec. Furf. Tritici unc. quatuor

Pulv. flor. Sambuci unc. duas.

Collige in saccum linenum.

S. Adplicetur calidus ad locum.

Itidem cum speiebus aromaticis, eum Camphora.

Decoetum pro balneo universalis; e. gr. in lichene:

Rec. Furf. Tritici libr. semis

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. libr. quatuor detur.

S. Addatur balneo universalis, quod sit gradum R. 28.

Idem decoctum ex libris duabus, pro libris octo balneo universalis inserviebat, in pemphigo scorbutie.

Cum Arnica et Sambueo, pro fomento, in supra notato casu exorti tumoris temporalis:

Rec. Flor. Arnicae mont.

— Sambuci

Furf. Tritici \overline{aa} unc. tres

Coque c. s. q. aq. c. p. 10 minuta.

D. S. Pro fomento tepide adplicando, et renovando omni $\frac{1}{2}$ hora.

Cum herba Cicutae, pro balneo, in herpete papuloso :

Rec. Furf. Tritici *libr. duas*

Herb. Cicut. *unc. unam*

Aq. serv. *libr. quatuor.*

Stent in digestione p. $\frac{1}{4}$ h.; dein exhibe pro balneo.

Pro clysmate :

Rec. Furf. Tritici *unc. duas*

Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. librae unius adde :

Olei Lini *unc. duas*

Sal. culinar. *unc. semis.*

D. S. Pro enemate.

U l m u s.

Decoctum, in pemphigo chronicō ex habituali pedum sudoris suppressione; in scabie cum sublatente syphilide :

Rec. Stipit. Dulcamar.

Cort. Ulmi interioris *āā unc. semis*

Coq. c. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.

Col. librae unius et semis adde :

Syr. simpl. *unc. unam.*

D. S. Epicratice.

Eidem decocto parato ex drachmis duabus ad col. libr. unius, addebatur drachma semis Acidi nitrici :

Decocto-infusum ; in syphilide larvata :

Rec. Cort. inter. Ulmi *unc. unam.*

Coq. c. s. q. aq. c. f. p. $\frac{1}{4}$ h.

Sub finem coctionis infunde :

Stipit. Dulcamar. *drachm. unam.*

Stent in infusione per horam

Col. libr. duarum adde :

Syr. simpl. *unc. duas.*

M. **D.** **S.** Potus.

U v a U r s i.

Decoctum foliorum arbuti Uvae Ursi, ex drachmis duabus, ad col. unc. octo cum emolumento praescribebatur ad confirmandam convalescentiam ex blennorrhagia vesicali, haematuria renalī :

*Rec. Folior. Uvae Ursi drachm. duas
Coq. c. s. q. aq. c. p. $\frac{1}{2}$ h.
Col. unc. octo adde:
Syr. simpl. unc. unam.
D. S. Omni bihorio cochl. cib. tria.*

Valeriana.

*Infusum, pilulae, electuarium a drachma una ad duas, tres;
c. gr. in statu febrium nervoso:*

*Rec. Rad. Valerian. sylv. unc. semis
Consc. inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Col. refrig. unc. octo adde:
Aether. acetici drachm. semis
Mucilag. g. arab. unc. semis
Syr. cort. Aurant. unc. unam.
D. S. Omni bihorio vasc. coff. semis.*

In helminthiasi:

*Rec. Rad. Valerian. sylv. consc.
Semin. Santonici $\overline{\text{aa}}$ drachm. tres
Fol. Sennae alexandr. drachm. duas
Inf. s. q. aq. c. ferv. p. $\frac{1}{4}$ h. v. cl.
Col. unc. octo adde:
Arcani dnpl. drachm. duas
Syr. Cichor. c. Rheo unc. unam.
M. D. S. Omni hora vascul. coff. semis.*

Eodem modo praescribebatur in infuso eum Absynthio, Tannaceto. Absque illo ingrediente, vel addito syrupo Ciehorei e. Rheo, etc., in epilepsia, in chlorosi.

Electuarium, in febri gastrico-eatarrhali eum nota verminosa:

*Rec. Pulv. rad. Ipecacuanh. scrupul. unum
— — Valerian. sylv.
— semin. Santonici
Arcani dupl. $\overline{\text{aa}}$ drachm. semis
Mell. despum. q. s. ut f. electuarium.
D. S. Quantitas ad magnitudinem nucis avellanae pane
ecclesiastico involuta omni trihorio sumenda.*

In helminthiasi:

*Rec. Pulv. rad. Jalap. grana quindecim
— — Valerian. sylv.
— semin. Santonici $\overline{\text{aa}}$ drachm. unam*

Arcani dupl. drachm. tres

Oxymell. simpl. unc. unam et semis.

M. f. electuarium.

D. S. Omni bihor. cochl. coff. dimidium.

Exiguae quaedam pro singulo easu in praescribendo tali ele-
ctuario *Stoerckii* intercurrebant modificationes.

Verbascum.

Infusum, a drachmis aliquot, vel ultra paratum:

Rec. Flor. Verbasci unc. semis

Inf. s. q. aq. f. p. $\frac{1}{4}$ h.

Col. libr. unius adde:

Syr. simpl. unc. unam.

D. S. Pro potu.

Idem infusum pro collutorio, eadem formula cum Manna,
Oxymelle simplici, syrupo Rubi Idaeи, infusis florum Papaveris
Rhoeados, florum Tiliae, addito sueeo Citri, etc. in usu erant.

Zincum oxydatum, s. flores Zinci.

Pulvis, interne, in bronchitide subconvulsiva:

Rec. Flor. Zinci grana quatuor

Sacch. albi drachm. unam.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.

D. S. Omni bihorio pulvis unus, tempore apyrexiae.

In delirio tremente potatorum nervoso:

Rec. Flor. Zinci scrupul. semis

Sacch. albi drachm. unam.

M. f. pulv. aeq. div. in dos. sex.

D. S. Omni bihorio pulv. unus.

Praesto erant epilepsiae, quae oxydo Zinei cesserunt.

Oeeurrebant et pilulæ cum Castoreo, et extracto Conii ma-
culati; cum Castoreo et extracto Hyoscyami; cum gummi-resina
Asae foetidae.

Unguentum, in psora herpetica:

Rec. Oxydi Zinci drachm. unam

Saponis aqua emolliti

Adipis porc. rec. \overline{aa} unc. semis.

M. exacte, f. unguentum.

D. S. Mane et vesperi inungendæ partes defoedatae.

Sulfas Zinci artefactus ,
s. Vitriolum Zinci.

Unguentum, in scabie degenerata:

Rec. Adipis porc. rec. unc. unam

Vitrioli Zinci drachm. semis

Flor. Sulfuris drachm. tres.

M. exacte in unguentum.

D. S. Bis de die totum corpus inungendum.

Errata.

Pag. 1 lin. 3 pro *intermittit*. corripe *intermitt.*

- „ 5 „ 1 „ *mucosae* „ *submucosae*
 - „ 13 post lineam 16. omittebatur *Sacch. albi drachm. unam*
 - „ 11 lin. 27 pro *Whythii* corripe *Whyttii*
 - „ 16 „ 2 „ *myrmekysmus* „ *myrmecismus*
 - „ 68 „ 2 „ *amaenorrrhoica* „ *amenorrhoeica*
 - „ 68 „ 35 „ *drachm. duas* „ *drachm. unam*
 - „ 117 „ 30 „ — *unam* „ — *semis*
-

