

農桑輯要

農桑輯要卷四

元司農司撰

養蠶

論蠶性

齊民要術春秋考異郵曰蠶陽物大惡水故蠶食而不飲士農必用蠶之性子在連則宜極寒成蛾則宜極暖停眠起宜溫大眠後宜涼臨老宜漸暖入簇則宜極暖

收種

齊民要術收取繭種必取居簇中者

近上則絲薄近地則子不生也

務本新書養蠶之法蘭種爲先今時摘蘭一概並堆箔
上或因繅絲不及有蛾出者便就出種罨壓熏蒸因熱
而生決無完好其母病則子病誠由此也今後蘭種開
簇時須擇近上向陽或在苦草上者此乃強良好蘭農
要旨云蘭必雌雄相半簇中在上者多雄下者多另摘
雌陳志宏云雄蘭尖細緊小雌者圓慢厚大
出于透風涼房內淨箔上一一單排日數既足其蛾自
生免薰罨鑽延之苦此誠胎教之最先若有拳翅禿背
焦腳焦尾薰黃赤肚無毛黑紋黑身黑頭先出末後生
者揀出不用止畱完全肥好者匀稀布於連上擇高明
涼處置箔鋪連箔下地須洒掃潔淨蠶連厚紙爲上薄
紙不禁浸浴野

語云連用小
灰紙更妙

候蟻生足移蟻下連屋內一角空處豎立

柴草散蟻于上至十八日後西南淨地掘阤貯蟻上用

柴草搭合以土封之庶免禽蟲傷食

蓋有功于人埋當如此農桑要旨

云將蟻作三阤埋種田地內
能使地中數年不生刺芥

士農必用蠶事之本惟

在謹于謀始使不爲後日之患也

眠起不齊由于變生之不一變生不一由

于收種之不得其法故曰惟在謹于謀始

擇繭者

出種

取簇中腰東南明淨厚實繭蟻第一日出者名苗蟻不

可用

屋中置柴草
上放不用蟻

次日以後出者可用每一日所出爲

一等輩

各于連上寫記後來下蟻時各爲一等輩二日

相次爲一輩猶可次三日者則不可爲將來成

蠶眠起不能齊極爲患害另作一輩養則可末後出者名末蛾亦不可用鋪連于棟箔上雄雌相配當日可提掇連三五次去其尿也至未時後款摘去雄蛾放在苗蠶一處將母蛾于連上勻布稀稠得所所生子如環成堆者其蛾與子皆不用其餘者生子數足更當就連上令覆養三五日不覆養則氣不足然後將母蛾亦置在雄蛾苗蛾末蛾處十八日後埋之

浴連

收貯蠶連附

歲時廣記集正歷凡浴蠶種了小繩子搭挂上元日浴畢挂一七日卻收于清涼處著一甕盛貴得清涼令生遲也又臘日取蠶種籠挂桑中任霜露雨雪飄凍至立春收謂之天浴蓋蠶蛾生子有實有妄者經寒凍

後不復狂生唯實者
生蠶則強健有成也

務本新書農家自蛾在連直至

臘月內三八日浴連三次比及此時蛾溺毒氣先薰汙
八九月甚違胎養之方今後自蛾在連卽于無煙通風
涼房內桑皮索上單挂不得見日若遇天氣炎熱于午
未間將連鋪在涼房淨地上申時卻挂起至十八日後
遇天色晴明日未出時汲深井甜水浴連約一頓飯閒
浸去便溺毒氣依上單挂孕婦並未滿月產婦不得浴
連勿用厚衣絲絮包裹勿近銅鐵鹽灰不得用麻繩繫
挂如或不忌後多乾死不生本草陳藏器云苧麻近
蠶種則蠶不生當遠之
伏內再浴至秋高時兩連用線長繕通作一連索上搭

挂庶免秋風磨擦七八月不宜收起早收蠶子不旺至
十月天晴收卷桑皮索繫懸之冬至日臘八日依前浴
挂長流水爲上
井花水次之及月望數連一卷桑皮索繫定庭前
立竿高挂以受臘天寒氣又採辰精月華至歲除夜用
五方草同桃符木粗以水同煎放冷元日五更浴連辟
諸惡解厭魅宜蠶五方草者馬齒莧是也五月五日于
牆頭並屋上或人迹少到處採者佳
若春早遲生至天社日重九日採亦同立春後無煙屋內置淨囊一隻細
切乾茅草襯底另貯黑豆一二斗上立一絲囊慢卷蠶
連三紙桑皮繫之遠囊豎立以紗蓋囊每十數日將連
取出略見風日又蛾連大忌煙薰農家少有避煙房舍日值煙氣薰蒸胎先蘊熱乘春必變爲

見桑葉未生多以土豆埋壓蟻遭困苦後必消耗審此
病源決合多方救護謂如一村十數家蠶連各自封記
社長斂集于無煙處
寄放庶免薰埋之苦

士農必用浴畢挂時須蠶子向

外恐有風相磨損其子冬至日及臘八日浴時無令水

極凍浸二日取出水極凍則不能出連年節後甕內豎連須使玲

瓏每十數日須日高時一出每陰雨後即便曬曝恐傷

濕潤

然見風亦不可多時

收乾桑葉

務本新書秋深桑葉未黃多廣收拾曝乾擣碎于無煙
火處收頓春蠶大眠後用

士農必用桑欲落時捋葉

未欲落捋來年桑眼已落者短津味泥封收固

至臘月內搗磨成麪

臘月內製者能

消蠶熱病甕器內可多收銅
蠶餘剩作牛料牛甚美食

製豆粉米粉

務本新書臘八日新水浸菉豆

每箇約半升

薄攤曬乾又淨

淘白米

每箇約半升

控乾以上二物背陰收頓

野語云臘月造油蠶房內

點燈諸蟲不入

收牛糞

務本新書冬月多收牛糞堆聚

春月旋拾恐臨時關少

春暖踏成

整子曬乾苦起燒時香氣宜蠶

士農必用臘月曝乾

至春碾搥碎一半收起一半用水拌勻杵築爲整

收蓐草

務本新書臘月刈茅草作蠶辱則宜蠶

收蒿梢

士農必用收黃蒿豆稽桑梢

其餘梢乾勁不
臭氣者亦可

修治苦薦

士農必用穀草黃野草皆可

但必令緊密一頭截齊一
頭畱梢者爲苦兩頭齊截

者爲薦也

野語云苦用

茅草上簇輕快又不蒸熱

治蠶具

蠶種

齊民要術崔寔曰三月清明令蠶妾治蠶室

按齊民要

術作令蠶妾治蠶室塗隙穴具槌持箔籠

士農必用蠶具及繅絲器皿務

要寬廣槌箔樣切刀鎌斧鉗等熱絲則釜宜大冷絲則釜宜小盆欲大其釜臨時治之

春

磨米麪

蠶忙時不及也

蠶室

齊民要術修屋欲四面開窗紙糊厚爲籬

崔寔曰三月清明治蠶室

塗隙

務本新書蠶屋北屋爲上南屋西屋次之大忌

東屋

爲西照日色又酉非長養之氣

至穀雨日先須泥補薰乾暨槌

了畢勿透風氣若逼蠶生旋泥者牆壁濕潤多生白醭

貼沙之病蠶屋正門須重挂葦簾草薦

簾外不必以簾攔夾令時通風

日故也

屋內東閒另用席箔擣夾一閒于內生蟻留小門

出入上挂蒲簾蓋屋小則容易收火氣停眠前後拆去

蟻或于小屋內生之熟火易爲烘暖停眠後移入寬快屋內

蠶屋須要寬快潔淨通

風氣映日陽屋前不宜有大樹密陰南北屋相去宜遠
宜安南北窗大忌西窗南北窗上各糊捲窗一眠之後
但遇白日晴明若是南風卻捲北窗若有北風卻捲南
窗蓋倒潘風氣宜蠶故也假有一家蠶屋三閒止養蠶
十數箔雖無北窗亦不須糊開蓋爲蠶少屋寬必無太
熱若至二十箔以上決當糊開北窗近下安置但是窗
上須挂葦簾草薦南簾外先架立搭棚檻柱大眠時搭
蓋以隔臨簷熖熱西山牆外另搭起棚今時多用
薑黍稽壁以避
滿牆西照蠶屋西南角從柱向南高壘牆壁四五步或
夾厚籬障以泥泥飾防大眠之後翦開窗紙恐有西南

風起此風大傷蠶陝西河南尤甚趙地以北頗暖

要旨
蠶

屋地基須高一尺擇地不必以陰陽形勢爲法
陳志宏云屋基新土墳乾于上用泥重覆

士農

必用修屋宜高廣

低則鬱遏多熱

勿接擣廈

南擣隔陽氣
北擣助陰氣

蠶生

前一月泥飾

厚則耐寒熱

除正門外每周圍可徧安窗無西

窗不防宜高大

每間開壁更好如壁內有通山柱者一
壁上分安兩座力不及者勻立直柴枝

亦可櫟擣之間每一閒內各開三照窗

長闊皆六寸許

兩山壁

窗近上亦各如擣上開照窗

大窗先用故紙全糊外各
用草薦密封蓋了照窗亦

糊捲窗
密封

窗臺高不過二尺五寸每一閒附地透開三風

眼竅

卻用磚坯蓋塞了泥封固密

火倉

齊民要術屋內四角著火

火若在一處冷熱不均

務本新書生

蠶有小屋者四壁挫壘空龕

或六

頗類參星樣一高一

下頓藏熟火庶得火氣勻停如大屋內生蠶一邊難就

壁龕當于箔笪外挫壘土臺或釘木櫩上安火盆益外

另夾帷箔收拾火氣蠶小時將牛糞擊子燒令無煙移

入龕內頓放如無壁龕等止于槌箔四向約量頓火

近兩

眼則止若寒熱不均後必眠起不齊又今時蠶屋內素無

禦寒熟火止是旋燒柴薪煙氣薰蒸太甚蠶蘊熱毒多

成黑焉士農必用治火倉屋當中掘一阤闊狹深淺

量屋大小

謂如一二間四椽屋四方一面可開四尺隨屋大小加減阤周圍磚坯接

壘高二尺黏泥泥了通計深四尺細碎乾牛糞院底上

鋪攤一層厚三四指

臘月所收
槌碎者

帶根節麤乾柴于糞上

鋪一層

五寸以上徑者凡桑榆槐等堅硬者皆可

柴上又鋪糞一層于柴空隙處築得極實

慎不可虛虛則火燄起傷屋又熟火不能久

糞柴相間椿院

滿上復用糞厚蓋了約蠶生前七八日糞上熑熟火黑

黃煙五七日于蠶蛾生前一日少開門出盡煙即閉了

恐暖氣出

其柴糞陷下已成熟火

蠶小喜暖怕煙不可用生火又生火或驟或歇不能

均勻此火既熟絕無烟氣

一兩月不減不動便如無火

用柴枝剔撥便暖氣薰騰也

上必壘高二尺者欲使火氣上騰至空中散布均勻又防夤夜人行誤陷入也

其屋乾透其壁皆暖黑婆等

諸蟲盡薰了牛糞熏屋大宜蠶也

蠶喜牛糞

沙糊窗窗上

故紙御用浮白紙替換糊了外莫捲草薦旋扯故紙糊新紙不使熱氣出去了

每一窗嵌四大捲窗密宜

安梔

齊民要術比至再眼常須三箔中箔上安蠶上下空置
下箔障土氣 上箔防塵埃

土農必用上下二箔上皆鋪切碎稈草

中一箔用切碎擣軟稈草爲蓆鋪案平勻仍須四邊畱

箔楂五七寸揉淨紙黏成一段可所鋪蓆大鋪于中箔

蓆上揉紙極軟如棉 要旨云底箔須鋪二領蠶蛾生後每日日高捲出一領曬至日斜復布于生蠶箔

底明日又將底箔撤出曬曝如前翻覆襯藉使受自然陽和之氣停眠起食然後撤去

變色

務本新書清明將甕中所頓蠶連遷于避風溫室酌中處懸挂太高傷風
太下傷土穀雨日將連取出遍見風日那表爲裏左捲者卻右捲右捲者卻左捲每日交換捲那捲罷依前收頓比及蠶生均得溫和風日生發匀齊要旨云
清明後種出變紅和肥滿再變尖圓微低如春柳色再變蛾周盤其中如遠山色此必收之種也若頂平焦乾及蒼黃赤色便不可養此不收之種也士農必用蠶子變色惟在遲速由已不致損傷自變視桑葉之生以定變子之日須治之三日以色齊爲準農語云蠶欲三齊子齊蛾齊蠶齊是也其法桑葉已生自辰巳閒于風日中將甕中連取出舒卷提掇舒時連背向日曬至溫不可熱凡一舒捲時將元捲向外者卻捲向裏元向裏者卻捲向外橫者豎捲豎者橫捲以至兩頭捲來中間相合舒捲無

度數但要第一日十分中變灰色者變至三分收了次

二日變至七分收了此二日收了後必須用紙密糊封

了如法還甕內收藏至第三日于午時後出連舒捲提

掇展連手提之凡半日十數編須要變十分第三次必須至午時後出連者恐第一次先變

者先生蟻也蟻生在巳午時之前過午時便不生

桑蠶直說欲疾生者須舒

捲捲之須虛慢欲遲生者少舒捲捲之須緊實

生蟻

士農必用生蟻惟在涼暖知時開指得法使之莫有先後也生蟻不齊則其蠶眠起至老俱不能齊也其法變灰色已全以兩連相合鋪于一淨箔上緊捲了兩頭繩束卓立于無烟淨涼

房內第三日晚取出展箔蛾不出爲上若有先出者雞
翎掃去不用名行馬蠅雷則蠅不齊每三連虛捲爲一卷放在新
暖蠶房內越匝下隔箔上候東方白將連于院內一箔上單鋪
如有露于涼房中或棚下待半頓飯時移連入蠶房就地一箔上單
鋪少閒黑蛾齊生並無一先後者和蛾秤連記寫分兩

下蛾

齊民要術蠶初生用荻掃則傷蠶 博聞錄用地桑葉
細切如絲髮摻淨紙上卻以蠶種覆于上其子聞香自
下切不可以鵝翎掃撥 務本新書農家下蛾多用桃
杖翻連敲打蛾下之後卻掃聚以紙包裹秤見分兩布

在箔上已後節節病生多因此弊今後比及蛾生當勦

鋪蓐草

蓐宜
擣軟

塘火內燒棗一二枚先將蠶連秤見分兩

次將細葉摻在蓐上續將蠶連翻搭葉上蛾要勦稀連

必頻移生盡之後再秤空連便知蠶蛾分兩依此生蠶

百無一損今時如下蛾三兩往往止布一席重疊密壓

不無損傷今後下蛾三兩決合勦布一箔

若分兩多少
驗此差分

又慎莫貪多謂如已力止合放蛾三兩因爲貪多便放

四兩以致桑葉房屋椽箔人力柴薪俱各不給因而兩

失士農必用下蛾惟在詳款稀勦使不致驚傷而稠

疊是時蠶母沐浴淨衣入蠶屋蠶屋內焚香又
將院內雞犬孳畜逐向遠處恐驚新蛾也

蛾生既

齊取新葉用快利刀切極細有津若鈍刀預切下則查上津無用篩子篩于中箇尋紙上務要勻薄須用篩子乃食偏篩用竹編葦子亦可秫黍麴亦可如小椀大篩底方眼可穿過一小指也將連合子葉上蛾自緣葉上或多時不下連及緣上連背翻過又不下者並連棄了此殘病蛾也一箔尊上一尺三兩蠶至老蠶一箔也係長一丈闊七尺之箔如箔小可減蛾下蛾多則蠶稠爲後患也養蠶過三十箔者可更加下蛾箔養蠶少者用筐可也尊如前法

涼暖總論

齊民要術調火令冷熱得所熱則焦燥冷則長遲務本新書春蠶時分一晝夜之間比類言之大概亦分四時朝暮天

氣頗類春秋正晝如夏深夜如冬既是寒暄不一雖有
熟火各合斟量多寡不宜一體自蟻初生相次兩眠蠶
屋內正要溫暖蠶母須著單衣以身體較若自身覺寒
其蠶必寒便添熟火若自身覺熱其蠶亦熱約量去火
一眠之後但天氣晴明巳午未之間暫捲起門上簾簾
以通風日免致大眠起後餉罷三頓投食翦開窗紙時
陡見風日乍則必驚後多生病古人云貧家悟得養子
法蓋是多在露地慣見風日之故蠶亦如此至大眠後
蠶長十分葉增十倍蓐廣沙多自然發熱加之天氣炎
熱蠶屋內全要風涼三頓投食罷宜捲起簾薦翦開窗

紙門口置甕旋添新水以生涼氣倘遇猛風暴雨或夜

氣太涼卻將簾薦暫時放下士農必用加減涼暖成

蛾時宜極暖是時天氣尙寒大眠後宜涼是時天氣已

暄又風雨陰晴之不測朝暮晝夜之不同一或失應蠶

病卽生惟蠶屋得法則可以應之屋之制周置捲窗中

伏熱火謂如蠶欲暖而天氣寒閉苦窗捲火則外寒不

入和氣內生若遇大寒屢撥熟火不能勝其寒則外燒

糞鑿絕烟置屋中四隅和氣自然薰蒸寒退則去餘火

蠶欲涼而天氣暄閉火而捲苦窗則火氣內息而涼氣

外入若遇大熱盡捲苦窗不能解其熱則去其窗紐上

捲照窗下開風眼窗外捲下灑潑新水涼氣自然透達

熱退則糊補其窗閉塞風眼使其蠶自初及終不知有

寒熱之害病少繭成一室之功也然寒不可驟加暖熱

當漸漸益火寒而驟熱則黃轉多疾熱不可驟加風涼

當漸漸開窗熱而驟風涼則變殼此又不可不知也又

正熱猛著寒便禁口不食卽用鏹子盛無烟熟牛糞火

用杈托火鏹于梃箔下往來辟去寒氣蠶自食葉也

飼養總論

務本新書蠶必晝夜飼若頓數多者蠶必疾老少者遲

老二十五日老一箔可得絲二十五兩二十八日老得絲二十兩若月餘或四十日老一箔止得絲十餘兩

絲二十兩若月餘或四十日老一箔止得絲十餘兩

飼蠶者慎勿貪眠以懶爲累每飼蠶後再宜遠箔巡視

若有薄處必再摻令勻若值陰雨天寒比及飼蠶先用

去葉稈草一把點火遠箔四向照過逼去寒濕之氣然

後飼蠶蠶不生病一眠後十分眠纔可住食至十分起

方可投食若入九分起便投食直到蠶老決都不齊又

多損失停眠至大眠蠶欲向眠若見黃光便合擡解住

食直候起時慢慢飼葉宜輕摻若蠶白光多是困餓宜

細細飼之猛則多傷若蠶青光正是蠶得食力勿令少

葉急須勤飼

今時農家停眠至大眠眠蠶大半蠶母猶自摻葉直候都眠或有起者纔方住食不知先眠之蠶被葉卷蓋多時以漸不能退皮至大眠起後多是往來遊走直到入簇決都不齊葉忌濕

忌熱蠶食濕葉多生瀉病食熱葉則腹結頭大尾尖

當蓋小星或起棚頓放雨露濕

葉控去濕潤然後飼蠶

士農必用飼養之節惟在

隨蠶所變之色而爲之加減厚薄

後繫黑及三眠條內隨色加減食法具此

條註使無過不及也

蛾生色黑三日後漸變白則向食少加厚變青則正食宜益加厚雖

飽亦不傷復變白則慢食宜少減變黃則短食謂之向

眠宜愈減純黃則任食謂之正眠眠起自黃而白白白

而青自青復白自白而黃又一眼也凡眠起變色例如此時當減食飼之過則傷傷則禁口不食生病而眠遲

時當正食飼之不及則餒餒則氣弱而生病亦眠遲而又薄也

用葉

蠶不可食之葉有三一承帶兩露既濕又寒食則變褐色生水濕臨老則浸破絲囊

不可抽繅製之之法芟葉實積苦席覆之少時內發蒸熱審其得所啓苦覆而攤之濕氣隨化葉亦不寒即可飼之也二爲風日所薦乾者生腹結三泥臭者即生諸疾斯二者無可製之法棄之可也

韓氏直說抽飼斷眠法蠶向眠時量黃白分數抽減所

飼之葉漸次細切薄摻頻飼

如十分中有三分黃光者卽十分中減葉三分此尋

常稍宜細切薄摻頓數亦宜稍頻如十分中有五分黃光卽減五分比先次又細切薄摻其頓數便宜加頻如十分中有八分黃光卽減去八分比先次切令極細摻令極薄其頓亦令極頻候十分黃光不

問陰晴早晚急須擡過

豫備箔蓆

擡過時住食起齋時

投食此爲抽飼斷眠之法謂抽減眠蠶之葉不致覆壓

專飼未眠之蠶使之速眠不惟眠起得齊且無葉菴燠
熱之病前人謂學取抽創斷眠法年年歲計得絲蠶不
可不知也

分擡總論

務本新書擡蠶須要眾手疾擡若箕內堆聚多時蠶身
有汗後必病損漸漸隨擡減耗縱有老者簇內多作薄
皮蠶沙宜頓除不除則久而發熱熱氣熏蒸後多白殼
每擡之後箔上蠶宜稀布稠則強者得食弱者不得食
必達箔遊走又風氣不通忽遇倉卒開門暗值賊風後
多紅殼布蠶須要手輕不得從高摻下如或高摻其蠶

身遞相擊撞因而蠶多不旺已後簇內懶老翁赤鵠是

也

要旨云蠶有白殼是小時陰氣蒸損天晴急用簾簾三四具轉蠶中庭使日氣煦照擣一箔則復布一箔得日氣則盡解矣

野語云蠶燠乾鬆者其蠶無病蠶

燠成片濕潤白積者蠶爲有病速宜擣解如正可擣卻遇陰雨風冷則不敢擣用茅草細切如豆每一箔可用

一斗或二斗匀撒蠶上上再摻葉移時蠶因食葉沿上

其茅草能隔燠熱天晴再擣如無茅草稈草次之

土農必用分擣之便惟在

頻款稀勻使不致蒸濕損傷也

蠶滋多必須分之沙燠厚必須擣之失分則不

勝稠疊失擣則不勝蒸濕故宜頻蠶者柔軟之物不禁

觸弄小而分之猶能愛護大而擣之莫能顧惜也未免

久堆亂積遠鄉高拋生病損傷

實由于此故宜安款而稀勻

或有不齊頻飼以督其

後者使之相及而各取其齊也

蠶眠不齊病原于初今既然矣當從此治之如

于純黃之中雜見其退白而向黃者是與純黃不相懸遠頻飼以督之則猶得相及飼頻則可速其眠故爾如

已見純黃又多青自此與純黃既遠雖飼之之頻則亦莫及蓋蠅之變色爲變之小其眠則絕食退膚爲變之大也爲蛹爲蛾則變之尤大而至于化也凡至純黃則結嘴不食而眠如人之大病周身之氣血一爲變換一晝夜靜安不擾則眠爲得所今以青白者尙多飼而亂之動而躁之則眠者失其所矣比其青白者變黃而向眠則此已過眠而動起動起之初欲得少食亦如人之病起欲得少食以接氣血也以後者方眠勒其食而不投以困以餓又必待後者動起而飼之多病少絲端爲可惜故蠅經云眠起不齊絲滅半良謂此也

初飼蛾

務本新書初飼蛾法宜旋切細葉微篩切刀宜快快則麤細匀停不住頻飼一時辰約飼四頓一晝夜通飼四十九頓或三十六頓懶者頗疑煩冗予曰新蛾止食桑葉脂脈若頓數不多譬如嬰兒小時失乳後必羸弱病生蛾初生須

隔夜採東南枝肥葉甕中另頓旋取細切

士農必用

飼蛾之法

當宿澆其桑旋摘其葉宿澆則多液旋摘則不乾利刃以細切之疏篩以薄布之非利刃則無液非細切則蓋蛾非篩則不匀非匀則偏食然葉

植之微液不能久存少頃之間即成枯乾故須旋切而頻篩

第一日飼一復時可至四十九頓第二日飼至三

十頓

葉微加厚

第三日飼至二十餘頓

又稱加厚宜極暖宜暗大

初蛾宜暗眠宜暗將眠及眠起
宜微明向食宜明後皆倣此

擘黑

士農必用擘黑法第三日巳午時間于別槌上安三箔

如前初微帶燠薄揭蛾款手擘如小棊子大布于中箔安槌法

可盈滿不留不畱也可漸漸加葉飼早晴可捲東窗苦蠶喜及

當日背風窗自此後常日宜如此天陰早暮且不宜至夜則閉凡迎風窗苦及西照窗戶不可開蠶畏風也後皆倣此雖大眠後喜涼亦可以避其猛風也漸漸變色隨色加減食至純黃則不飼是謂頭眠不以早晚擡過

頭眠擡飼

士農必用擡頭眠

蠶眠結嘴不食皮膚退換蠶之一變也

別槌上鋪四箔

上下隔塵潤中二箔安蠶用蓐如前

薄帶沙燠揭蠶分如大棊子大布滿

中二箔沙燠厚則蒸蠶生病

一復時可六頓次日可漸漸加葉可

開捲窗一半初向黃時宜極暖眠定宜暖起齊宜微暖

擡頭眠飽食

正食時擡飽食名

分如小錢大布滿三箔

辨色加減

食

停眠擡飼

士農必用擡停眠分如小錢微大布滿六箔起齊頭食宜薄一復時可四頓次日可漸加葉辨色加減或全開捲窗

惟適當風窗

初向黃時宜暖眠定宜微暖起齊宜溫 擡停

眠飽食

如前

蠶可撥可摻不須分搗可布滿十二箔然不

可高拋遠擲恐損蠶身辨色加減食法

大眠擡飼

務本新書大眠起燠宜頻除蠶宜頻飼或西南風起將門窗簾薦放下此際不宜擡解箔上布蠶須相去一指布蠶一箇取臘月所藏菜豆水浸微生芽曬乾磨作細

麵

臘月所藏白米蒸熟作粉亦可

第四頓投食拌葉勻飼解蠶熱毒絲

多易練堅韌有色

如葉少去秋所收桑葉再擣爲末水灑新葉微濕摻末拌勻接闕飼蠶比

食豆麴豆麴係本食之物又萬首亦可接闕

蠶屋南簷外先所架立搭棚檼柱

此時搭蓋士農必用擡大眠分如折二錢大布滿二

十五箔起齊投食一復時可三頓第一頓宜薄

但可覆自此三頓食

二頓比前又薄

不覆第三頓如第一頓覆如不短則其蠶

至老次日可漸加葉

辨色加減頓數可全開捲窗照窗過熟則

食慢窗紙但不至熱則不拘此例

初向黃時宜微暖眠定宜溫起齊宜涼

落蓐

大眼起投食後第六七頓可落蓐全去沙燠蓐草也即是擡飽食可分至三十

箔

辨色加減食

正食時每餉後可挾葉筐遠梶巡之但見箔

上有斑黎處卽摻葉補合

蠶至大眠後正食時闊一分葉卽減一分絲也但見有斑

黎處是蠶先食透葉也卽當補

合不如此則後來多有薄繭也

拌米粉

臘月內成造者

至第

七八頓食後于巳午時間將切下葉攤在箔上新水灑

拌極勻待少時細羅白粉子拌令極勻

每葉一筐用新水一升粉子四

兩如無止用新水

一筐可飼一箔

所有之蠶皆可飼一頓

拌葉麵

令蠶體充

實爲繭堅厚爲絲堅韌也

切葉灑拌新水極勻羅桑麵拌匀于大眠

後閒飼三五頓

假令每頓飼葉二筐今止用一筐減葉

亦無妨蠶食不闕不可用

擣沙于大眠後飼食第十二三頓閒可

擣擣如前法全去沙燠不如此則

蠶欲老飼之宜細薄

宜頻

養老如養小亦如人老頓食則傷若不如此則食葉不淨其葉蒸濕帶葉入簇所結繭亦濕潤如經

鹽水此名簇宜微暖如人老不禁寒涼然亦可相度當汗繭難抽繰如天氣涼暖消息斟酌大意比大眠後未老時宜微暖也依按其法蠶自蛾至老不過二十四五日過此日數愈多桑愈費而絲愈少也

韓氏直說蠶自大眠後十五六頓卽老得絲多少全在此數日葉多則絲多不足則絲少見有老者依抽飼斷眠法飼之候十蠶九老方可就箔上撥蠶入簇如是則無簇汗蒸熟之患繭必早作硬而多絲養蠶無巧食足便老

養四眠蠶

蠶桑直說此蠶別是一種與養春蠶同但第三眠止擡開十五箔擡飽食二十箔大眠擡三十箔

種蠶之利

韓氏直說種蠶疾老少病省葉多絲不惟收卻今年蠶又成就來年桑種蠶生于穀雨不過二十三四日老方是時桑葉發生津液上行其桑斫去比及夏至夏至後一陰生津液不可長月餘其條葉長盛過于往歲至來年春其葉生又早矣積年既久其葉愈盛蠶自早生

晚蠶之害

韓氏直說晚蠶遲老多病費葉少絲不惟晚卻今年蠶又損卻來年桑世人惟知婪多爲利不知趨早之爲大利壓覆蠶連以待桑葉之盛其蠶既晚明年之桑其生也尤晚矣

務本新書寒熱飢飽稀密眠起緊慢

謂飼時
緊慢也

三光

蠶經白光向食青光厚飼皮皺爲飢黃光以漸住食

入宜

韓氏直說方眠時宜暗眠起以後宜明蠶小并向眼宜暖宜暗蠶大并起時宜明宜涼向食宜有風避迎風窗
開下風窗宜加葉緊飼新起時怕風宜薄葉慢飼蠶之所宜不可不知反此者必不成矣

三稀

蠶經下蛾上箔入簇

五廣

蠶經一人二桑三屋四箔五簇

謂苦席
蒿稍等

雜忌

務本新書忌食潔葉 忌食熟葉 蠶初生時忌屋內
掃塵 忌煎燙魚肉 不得將煙火紙燃于蠶屋內吹
滅 忌側近春擣 忌敲擊門窗槌箔及有聲之物
忌蠶屋內哭泣呼喚 忌穢語淫辭 夜閒無令燈火
光忽射蠶屋窗孔 未滿月產婦不宜作蠶母 蠶母
不得頻換顏色衣服洗手長要潔淨 忌帶酒人切桑

飼蠶及擣解布蠶 蠶生至老大忌煙熏 不得放刀
于竈上箔上 竈前忌熱湯潑灰 忌產婦孝子入家
忌燒皮毛亂髮 忌酒醋五辛羶腥麝香等物 士
農必用忌當日避風窗 忌西照日 忌正熱著猛風
驟寒 忌正寒陡令過熱 忌不淨潔人入蠶室 蠶
屋忌近臭穢

簇蠶

齊民要術蠶老時值雨者則壞繭宜于屋內簇之薄布
薪于箔上散蠶訖又薄以薪覆之一槌得安十箔 務
本漸書簇蠶地宜高平內宜通風勻布柴草布蠶宜稀

密則熱熱則繭難成絲亦難繹東北位并食六畜虛樹

下阨上糞惡流水之地不得簇

野語如天氣暄熱不宜日午簇蠶老不禁日

氣曬暴故也

士農必用治簇之方惟在乾暖使內無寒濕

簇中繭病有六一簇汗二落簇三遊走四變赤蛹五變
殼六黑色簇汗之病蠶老食葉不淨其葉蒸濕帶葉入
簇故繭亦濕潤此爲簇汗其蠶欲老可簇地盤燒令極
餘五病皆地濕天寒所致

乾除掃灰浮于上置簇

韓氏直說安圓簇于阜高處

打成簇腳一簇可六箔蠶十分中有九分老者宜少摻

葉名上馬桑

就箔上用簸箕般去宜款手摻于簇上自東南起頭不

令落地

務令稀勻上復覆蒿梢

或豆

復摻蠶如前至三箔

復稍倒根在上如此則簇圓又穩

自後蠶可近上摻至六箔覆

蒿令簇圓上用箔圍苦繳簇頂如亭子樣防雨至晚又用

苦將簇從下繳至上苦相接日出高時捲去至晚復繳

三日外繭成不用

馬頭簇亦依上苦繳柴薪要廣簇又玲瓏中間宜架杆蠶多宜馬頭簇簇

南北腳宜

曬簇上蠶後第三日辰巳時間開苦箔日曬至

未時復苦蓋如前如當日過熟上捲單箔遮日色

翻

簇上蠶時被雨霑濕雨纔止纔晴卽選一簇地盤

如雨濕了

則取乾牆土厚覆治簇之法如前

不以成繭不成繭翻騰遷移別簇封

苦如前小雨則不須但可曬曝

又有二法臨簇有雨只于蠶屋中本棟下地面

上安簇開了門窗使透風氣早夜或陰雨變寒則閉門窗添牛糞火比翻簇之法又爲妙也又一法撻箔上虛

撒蒿稊周圍簇梢與蒿箔苦圍之蠶
自作繭猶勝于雨中簇也擗音友

擇蘭

務本新書爾宜併手忙擇涼處薄難蛾自遲出免使抽
繩相逼

繩絲

士農必用繩絲之訣惟在細圓勻緊使無褊慢節核

接頭

爲節疣癰惡不匀也

生蘭繩爲上如人手不及殺過蘭

疽爲核疣癰惡不匀也

慢慢線殺蘭法有三一日曬二鹽

浥三蒸蒸最好人多不

會日曬損蘭鹽浥者穩

亦可但不如冷盆所繩

者潔淨

光瑩也

盞要大置于竈上盞上大益飯接口添水至飯

中入分滿飯中用一板攔斷可容二人對繩也蘭少者

止可用一小飯水須熱宜旋旋下蘭

多下則繩不及煮損

冷益

卷四

可繰全繳細絲中等繭可繰雙繳比熱釜者
有精神而又堅韌雖日冷盆亦是大溫也 益要大必

須先泥其外

口徑二尺五寸之上者豫先翻過用長黏
泥泥底並四圍至唇厚四指將至唇漸薄

日曬乾名爲串盆

用時添水入九分滿

水宜溫暖常匀無令乍寒乍熱

釜要小

口徑一尺以下者小則下蘭少

蘭直孔樣下則煮過又不匀也

突竈半破壞坯圓壘

一遭中空

直孔樣其高比繰絲人身一半其圓徑相益之

大小當中壘一小臺

徑比益底小

坐串盆于小臺上其益要

比圓壘高一唇靠元壘安打絃頭小釜竈比圓壘低一

半揜火透圓壘

竈子後吸烟過處名揜火

與揜火相對圓壘匝近上

開烟突口做一臥突長七八尺已上先于安突一面壘

一臺比突口微低又相去七八尺外安一臺高五尺

或就

用牆或用木爲架子用長一丈椽二條斜磴在二臺上二椽柱去

閣一埠坯許用埠坯泥成一臥突

二椽土平鋪埠坯一層兩邊側立上復平

蓋泥了便成一臥突也須與竈口相背謂如竈口向南突口向北是也緣盆居中火衝盆底與盆下臺烟焰遠

盆過烟出臥突中故得益水常溫又勻也又得烟火

與緣盆相遠其緣絲人不爲烟火所逼故得安詳也

轆車牀高與盆齊軸長二尺中徑四寸兩頭三寸

用榆槐木

四角或六角臂通長一尺五寸

六角不如四角軸角少則絲易解臂者輻條也

或雙輻或單須腳踏又繅車竹筒子宜細

細似織絹穗標筒子

條子串筒兩樁子亦須鐵也

兩豎樁子上橫串鐵條鐵條穿筒子既輕又利也不

如此則不能成絕妙好絲古人有言

工欲善其事必先利其器餘如常法打絲頭用一小

釜內添水九分滿竈下燃麤乾柴

柴細旋添火不勻停候火大熱

下繭于熱水內

下繭宜少不宜多
多則者過練絲少

用筋輕剔撥令繭滾

轉盪勻挑惹起囊頭

纏絲頭名囊頭

手捻住于水面上輕提撥

數度復提起其囊頭下卽是清絲摘去囊頭

如重手攬

攬囊頭又

于手拐子纏數遭可長五七尺將繭上好絲十分中去

了二三分實爲可惜如輕手剔撥起囊頭長不過一尺

也一手撮捻清絲一手用漏杓綽繭送入溫水盆內

杓底上多鑊眼子爲漏杓漏瓢更好

將清絲挂在盆外邊絲老翁上

盆邊釤插

一板子名絲老翁

繅絲用一

人將絲老翁上清絲約十五絲之

上黃絲纏減繭數

總爲一處穿過錢眼

錢下繭攢聚名絲窩又名絮盤

繳過當

頭織着杖子上兩繳杖子下兩繳挂于軒上又取絲老

翁上清絲如前挂于軒上

兩箇絲窩其頭齊行

右腳踏軒右轉

裹

兩箇絲窩其頭齊行

右腳踏軒右轉

切照覲撥掠兩絲窩于內有繭絲先盡蠶子沈了者繭
絲斷了繭浮出絲窩者其絲窩減小卽取清絲約量添
加務要兩絲窩大小長均

眼轉覲手頻撥頻添添不過三四絲失添則細了多添則
麤了如或手添不迭腳慢踏軒其絲較爭麤如或手添
得多了腳緊踏軒其絲較爭細手腳相應亦可取勻也

添絲搭在絲窩上便有接頭將清絲用指面喂在絲窩
內自然帶上去便無接頭也此名全繳絲圓緊無疣痘
上等也中作紗羅上等匹綬如蛾眉杖上只兩繳名雙
繳絲不甚圓緊有小疣痘中等也不中紗羅中中等綬
匹如蛾眉杖上只一繳名單繳絲又名歇日絲禡慢有
大疣痘不中匹綬只中絹帛亦不堅壯此單絲歇日絲
多只是熱釜中練也

蒸餾繭法

韓氏直說如蠶成繭硬紋理纖者必練快此等繭可以
蒸餾練冷益絲其繭薄紋理細者必練不快

不宜蒸餾此止

其蒸餾之法用籠三扇用軟草札一圈

加于釜口以籠兩扇坐于上其籠不論大小籠內勻鋪

繭厚三四指許頻于繭上以手背試之如手不禁熱可

取去底扇卻續添一扇在上亦不要蒸得過了過了則

軟了絲頭亦不要蒸得不及不及則蛾必鑽了如手背

不禁熱恰得合宜于蠶房槌箔上從頭合籠內繭在上

用手微撥動如箔上繭滿打起更攤一箔候冷定上用

細柳梢微覆了其繭只于當日都要蒸盡如蒸不盡來

日必定蛾出釜湯內用鹽一兩油半兩所蒸繭不致乾

了絲頭

如餾齒多油
鹽旋入

夏秋蠶法

齊民要術淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王者
法禁之爲其殘桑也務本新書凡養夏蠶止須些小
以度秋種慮恐損壞萌條有悞明年春蠶桑葉今時養

熟蠶以紙糊窗因避飛蠅遮盡往來風氣天晴罨熱病

生陰則濕生白醭陰晴俱不便當以紗糊窗陳稈草作

幕紙條先貼紗邊餘紙就糊窗上中間以線繫或用荻
糸在窗檻上蠶罷以水潤紙揭下明年再用簾繫織當窗繫定遮蔽飛蠅透脫風氣另闢一房不

令雜人出入決安南以翦翦葉旦暮擡分兼夜頻飼

秋蠶初生時去三伏猶近暑氣仍存蠶屋多生濕潤正

要四通八達風氣往來蓋初生卻要涼快以陳稈草作
蓐勿用麥稍一日一擡失擡多生白醭一眠宜溫再眠
如春門窗俱挂薦簾屋內須用無烟熟火大眠全要暄
暖大忌北風寒氣勿飼雨露冷葉春秋蠶法首尾顛倒
深宜體測 簇蠶時相次秋高恐值夜寒風冷不能作
繭可于簇西北埋柱繫椽箔遮禦北風寒氣三兩夜之
間便可作繭 士農必用夏蠶此別是一等俗謂三生
蠶春養出夏種夏養出秋種秋養出來春種不可開關關則絕其種
自蛾至老俱宜涼忌蠅蟲先于蠶生前用麥糠擁于蠶房壁腳燒之去濕氣及孽黑後
諸蟲子須一日早晨一擡其餘並與養春蠶同止欲收秋蠶種

多則損葉然只可科
採桑中冗條取葉也

秋蠶

一名原蠶 捀葉不無傷桑
春蠶不幸遇天災不得已

養之以補歲計然
不宜種宜穢也

初宜涼漸漸宜暖與養春蠶正相反

其閒體候須欲得所

初可摘葉蠶大則捋葉初用紗糊窗漸漸天

寒上復用紙糊畱捲窗簇與繅絲法如前

要旨熟蠶槌底亦宜用麥

糠麥薰燒之又大路上踏踐起乾塵土收三四石生蠶
日于槌底攤平可避暑濕簇秋蠶多于簇心用熟火或
致焚燒不若止于映北風處爲簇簇底用麥薰均鋪簇
則用乾桑柴爲梢新乾桑薰爲草得自然溫暖之氣不
須用火矣經雨則倒簇

人教新课标

第四

農桑輯要卷五

元 司 農 司 撰

瓜菜

種瓜

黃瓜
附

齊民要術收瓜子法常歲歲先取本母子瓜截去兩頭止取中央子本母子者瓜生數葉便結子子復早熟用後輩子者蔓長足然後結子子亦晚熟種早子熟速而瓜小種晚子熟遲而瓜大去兩頭者近蒂子瓜曲而細近頭子瓜短而直又收瓜子法食瓜時擇美者收取良卽以細糠拌之日曝向燥接而簸之淨而且速也田小豆底佳黍底次之刈訖卽耕頻翻轉之二月上旬種者爲上時三月上旬爲中時四月上旬爲下時五月

六月上旬可種藏瓜凡種瓜法先以水淨淘瓜子以鹽

和之

鹽和則
不能死

先臥鋤穫卻燥土

不穫者阤雖深大常
雜燥土故瓜不生然

後培

蒲溝切

阤大如斗口納瓜子四枚大豆三箇于堆旁

向陽中瓜生數葉掐去豆

瓜性弱苗不能獨生故須大
豆爲之起土瓜生不去豆則

豆反芻瓜不得滋茂但豆斷汁出更
成良潤勿拔之拔之則土虛燥也

多鋤則饒子不鋤

則無實

五穀蔬果蓏之屬皆如此也蓏即果反

黃瓜

一名胡瓜四月中種之

宜豎柴木令引蔓緣之

按黃瓜一條原本誤入治
瓠籠法中據目錄小詩考之當在此條之末今校正

治瓜籠法

齊民要術旦起露未解以杖舉瓜蔓散灰于根下後一
兩日復以土堆其根則永無蟲矣

又摘瓜法在步道上
引手而取勿聽浪人

踏瓜蔓及翻覆之若無芟面種瓜者地雖美好正得長
苗直引無多槃岐故瓜少子若無芟處豎乾柴亦得凡
瓜所以早爛者皆由腳蹣及摘時不慎翻動其
蔓故也若以理慎護及至霜下葉乾子乃盡矣

區種瓜法

齊民要術六月雨後種菉豆八月中犁掩殺之十月又
一轉卽十月終種瓜率兩步爲一區坑大如盆口深五
寸以土壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令
其保澤以瓜子大豆各十枚徧布坑中瓜子大豆兩物爲雙藉其起土
故也以糞五升覆之亦令均平又以土一斗薄散糞上復以足
微躡之冬月大雪時速併力推雪於坑上爲大堆至春
草生瓜亦生莖葉肥茂異於常者且常有潤澤旱亦無

害五月瓜便熟

其指豆鋤瓜之法與常同若瓜子盡生
大穢宜指去之一區四根卽足矣

又法冬天以瓜子數枚納熟牛糞中凍卽拾聚置之

陰地

量地多少以足爲限

正月地釋卽耕逐畠布之率方一步下

一斗糞耕土覆之肥茂早熟雖不及區種亦勝凡瓜遠

矣有蟻者以牛羊骨帶髓者置瓜科左右待蟻附將棄

之棄二三則無蟻矣

按此條首行原本脫去齊民要術書名今校增

崔寔曰

十二月臘時祀炙薺

所甲切

樹瓜田四角去薺

胡濫反瓜上謂之蟲

龍魚河圖曰瓜有兩鼻殺人 博聞錄種花藥最

忌麝瓜尤忌之臘栽數株蒜薤遇麝不損

西瓜

新添西瓜種同瓜法科宜差稀多種者熟地垡頭上漫
擲擗平苗出之後根下壅作土益欲瓜大者一步留一
科科止留一瓜餘蔓花皆掐去瓜大如三斗栲栳

冬瓜

齊民要術種冬瓜法傍牆陰地作區圓二尺深五寸以
熟糞及土相和正月晦日種二月三月亦得既生以柴木倚牆
令其緣上旱則澆之八月斷其梢減其實一本但留五
六枚多畱則不成也十月霜足收之早收則爛冬瓜越瓜瓠子十
月匯種如種瓜法冬則堆雪著土上爲堆潤澤肥好乃

勝春種

瓠今名葫蘆
古通瓠

齊民要術氾勝之書曰區種瓠法收種子須大者若先受一斗者得收一石受一石者得收十石先掘地作坑方圓深各三尺用蠶沙與土相和令中半若無蠶沙生牛糞亦得

著坑中足躡令堅以水沃之候水盡卽下瓠子十顆復以前糞覆之旣生長二尺餘便總聚十莖一處以布纏之五寸許復用泥泥之不過數日纏處便合爲一莖畱強者餘悉掐去引蔓結子子外之條亦掐去之勿令蔓延畱子法初生二三子不佳去之取第四五六區畱三子卽足旱時須澆之坑畔周匝小渠子深四五寸以

水停之令其遙潤不得坑中下水 家政法曰二月可種瓜瓠 四時類要種大葫蘆二月初掘地作坑方四五尺深亦如之實墳油麻菜豆蕷皆及爛草等一重糞土一重草如此四五重向上尺餘著糞土種十來顆子待生後揀取四莖肥好者每兩莖肥好者相貼著相貼處以竹刀子刮去半皮以刮處相貼用麻皮纏縛定黃泥封裹一如接樹之法待相著活後各除一頭又取所活兩莖準前刮去皮相著一如前法待活後唯留一莖四莖合爲一本待著子揀取兩箇周正好大者餘有旋旋除去食之如此一斗種可變爲盛一石物大此莊子

魏惠王大瓠之法

芋

齊民要術氾勝之書曰種芋區方深皆三尺取豆萁音豆
莖內區中足踐之厚尺五寸取區上濕土與糞和之內
區中萁上令厚尺二寸以水澆之足踐令保澤取五芋
子置四角及中央足踐之旱數澆之萁爛芋生子皆長
三尺一區收三石 又種芋法宜擇肥緩土近水處和
柔糞之二月注雨可種芋率二尺下一本芋生根欲深
剷其旁以緩其土旱則澆之有草鋤之不厭數多治芋
如此其收常倍 列仙傳曰酒客爲梁使愁民益種芋

三年當大飢卒如其言梁民不死

芋可以救饑饉度凶年今中國多不以此爲意後生至有耳目所不聞見者及水旱風蟲霜雹之災便致餓死滿道白骨交橫知而不種坐致泯滅悲夫

務本新書芋宜沙白地地宜深耕二月種爲上時相

去六七寸下一芋芋羞三月眾人來往眼目多見并聞

刷鍋聲處多不滋息比及炎熱苗高則旺頻鋤其旁秋

生子葉以土壅其根芋可以救饑饉蟲蝗不能傷霜後

收之冬月食不發病其餘月分不可多食霜後芋子土

芋自擘下以滾漿水燂過曬乾冬月炒食味勝蒲筍

區芋區長丈餘深闊各一尺區行相間一步寬則透風

滋息

葵

齊民要術

葵廣雅曰蘿邱葵也廣志曰胡葵其花紫赤

之種

按今世葵有紫莖白莖二種種別復有大小

之殊又有鴨腳葵也

臨種時必燥曝葵子

葵子雖經歲不浥然地濕種者劣而不肥也

不厭良故墟彌善薄卽糞之不宜妄種春必畦種水澆

春多風旱非畦不得且畦者省地而菜多一畦供一日

畦長兩步廣一步

大則水難均又

不容人足入深掘以熟糞對半和土覆其上令厚一寸鐵齒

耙耨之令熟足踢使堅平下水令徹澤水盡下葵子又

以熟糞和土覆其上令厚一寸餘葵生三葉然後澆之

澆用晨夕日中便止每一招輒耙耨地令起下水加糞三招更種

一歲之中凡得三輩

凡畦種之物治畦皆如葵法不復條列繁文早種者必

秋耕十月末地將凍散子勞之一

畝三升正月人足踏
未散子亦得

踰之乃佳

踏者

未生

菜肥

地釋卽生鋤不厭數五月初更種之

者

既多秋葉未生

故種此相接

六月一日種白莖秋葵

白莖者宜乾紫

莖者乾則黑而

澀

秋葵堪食仍畱五月種者取子

春葵子熟不均

故須畱中輩

於此

時附地翦卻春葵冷根上

柄音

生者柔軟至好仍供常

食美于秋菜

畱之亦中爲榜簇

指秋葉必畱五六葉

不掐則莖

孤留葉則

其不翦早生者雖高

數尺柯葉堅破全不

科大凡掐葵必待露解

該日觸露不掐葵日中不翦韭

八月半剪去

畱其岐岐

多者則去地一二寸獨莖者亦可去地四五寸

柄生肥嫩比至收時高與人膝

等莖葉皆美科雖不高菜實倍多

其不翦早生者雖高

數尺柯葉堅破全不

中食所可用者唯有葉心附葉黃澀少收待霜降

傷早黃爛傷晚

黑榜簇皆須陰中見日亦澀其碎者割訖卽地中尋手糺之
澀而糺待萎而糺者必爛

崔寔曰六月六日可種葵中伏後可種冬

葵九月作葵菹乾葵

茄子

齊民要術種茄子法茄子九月熟時摘取擘破水淘子
取沈者速曝乾裏至二月畦種治畦下水一如葵法
四五葉雨時合泥移栽之若旱無雨澆水令徹澤夜栽
之白日以席蓋勿令見日著
十月種者如區種瓜法推雪著區中則不須栽其春種
不作畦直如種凡瓜法者亦得惟須曉夜數澆耳務
本新書茄初開花斟酌窠數削去枝葉再長晚茄秋深

老茄煮軟水浸去皮以鹽拌勻冬月食用旋添麻油爲
上

蔓菁

齊民要術種不求多惟須良地故墟新糞壞牆垣乃佳
若無故墟糞者以灰爲糞令厚一寸灰多則燥不生也
耕地欲熟七月初種之一
畝用子三升從處暑至八月白露節皆得早者作菹晚者作乾
用濕濕則地堅葉焦既生不鋤九月末收葉晚收則黃落仍留根取
子十月中黎麌畇力輟反耕田起土也拾取耕出者若不耕畇則
實不繁也其葉作菹擬作乾菜及釀友亮菹者醃菹者次年正月始作耳
須畱第一割訖則尋手擇治而瓣並善之勿待萎萎而後瓣

則爛挂著屋下陰中風涼處勿令烟熏

烟熏則苦

燥則上在廚

積置以苦之

積時宜候天陰潤不爾

多碎折久不苦則澀也

春夏畦種供食者

與畦葵法同翦訖更種從春至秋得三輩常供好菹取

根者用大小麥底六月中種十月將凍耕出之

一畝得數車早

出者

又多種蔓菁法近市良田一頃七月初種之

六月

種者根雖麤大葉復蟲食七月未者葉

雖膏潤根復細小七月初種根葉俱得

漢桓帝詔曰橫

水爲災五穀不登令所傷郡國皆種蔓菁以助民食然

此可以度凶年救饑饉乾而蒸食既甜且美

若值凶年一頃可活

務本新書耕地宜加糞往復勻蓋秋初可種自破

百至結子皆可食十月初採苗煤作和菜餘者曬過畱

根在地或慮河朔地寒凍死可于十月終以牛隔兩犁耕一犁拾去菜根之後卻將陽土擺勻據先耕出之數曬過冬月蒸食甜而有味春生薹苗亦菜中上品四月收子打油陝西惟食菜油燃燈甚明能變蒜髮比芝麻易種收多油不發風武侯多勸種此菜故川蜀曰諸葛菜油臨時熬用少摻芝麻煉熟卽與小油無異

蘿蔔

胡蘿蔔
葛附

齊民要術種菘蘆菔

蒲北
反

法與蔓菁同

菘菜似蔓菁而
大方言曰蕪菁

紫花者謂之蘆菔根實麤大其角及根葉並可生食取子者草覆之不則凍死

四時類要種

蘿蔔宜沙軟地五月犁五六偏六月六日種鋤不厭多

稠卽小閒拔令稀至十月收窖之 新添種蘿蔔先深
斸成畦杷平每畦可長一丈二尺闊四尺用細熟糞一
擔勻布畦內再斸一徧卽起覆土再糲平澆水滿畦候
水摻盡撒種于上用木杖勻撒覆土苗出兩葉旱則澆
之每子一升可種二十畦水蘿蔔正月二月種六十日
根葉皆可食夏四月亦可種大蘿蔔初伏種之水蘿蔔
末伏種皆候霜降或醃或藏皆得用如要來年出種深
窖內埋藏中安透氣草一把至春透芽生取出作壠或
畦下糞栽之旱則澆須令得所夏至後收子可爲秋種
胡蘿蔔伏內畦種或壯地漫種

蜀芥芸薹芥子

齊民要術蜀芥芸薹取葉者皆七月半種地欲糞熟種

法與蕪菁同既生亦不鋤之十月收蕪菁訖時收蜀芥

中爲鹹淡二菹
亦任爲乾菜

芸薹足霜乃收

不足
卽溫

種芥子卽蜀芥

芸薹取子者皆二三月好雨澤時種

二物性不耐寒經冬則死故須春種

旱則畦種水澆五月熟而收子

芸薹冬天草覆亦得
取子又得生茹供食

務本新書芥子菜宜秋前種大槩雖不及蔓菁餘亦頗

同子作芥花芥末如近城郭芥菜宜多種蓋冬月醃藏

家家用度曬乾于無煙雨處架起三年亦可食

齊民要術蜀芥芸沙地少與糞和熟耕如麻地不厭熟縱橫七徧尤善三月種之先種耬耩牽莖下薑一尺一科令上土厚三寸數鋤之六月作葦屋覆之不耐寒故熱故九月掘出置屋中

中國多寒宜作窖以穀得合埋之得奴勒反穀穠

中國土不宜

薑僅可存活勢不可滋息種者聊擬藥物小小耳崔

寔曰三月清明節後十日封生薑至四月立夏後蠶大

食芽生可種之九月藏茈將几反薑其歲若溫皆待十月

生薑謂之茈薑

四時類要種薑闊一步作畦長短任地形橫

作壠相去一尺餘五六寸壠中一尺一科帶芽大如三指關蓋土厚三寸以蠶沙蓋之糞亦得芽出後有草卽

漸漸加土已後壠中卻高壠外即深不得併上土鋤
不厭頻

菌子

四時類要三月種菌子取爛構

一名格

木及葉于地埋之

常以泔澆令濕三兩日即生 又法畦中下爛糞取構
木可長六七寸截斷砸碎如種菜法于畦中勻布土蓋
水澆長令潤如初有小菌子仰杷推之明日又出亦推
之三度後出者甚大即收食之本自構木食之不損人

蒜

齊民要術蒜宜良輒地

白輒地蒜甜美而利大黑軟次之剛強之地辛辣而瘦小也

三偏熟耕九月初種種法黃鶯時以穀耩逐壠手下之

五寸一株

諺云左右通鋤一萬餘株

空曳勞二月半鋤之令滿三偏

勿以無草而不鋤鋤不鋤則科小

條拳而軋之

不軋則獨科堅

葉黃鋒出則瓣於

屋下風涼之處柘之

早出者皮亦科堅可以遠行晚則皮皴而易碎他骨反皮壞也

冬寒取穀得布地一行蒜一行得

不爾則凍死

收條中子種

者一年爲獨瓣種二年者則成大蒜科皆如拳又逾于

凡蒜矣

瓦子壠底置獨瓣蒜于瓦上以土覆之蒜科橫

闊而大形狀殊別亦足以爲異

今并州無大蒜朝歌取種二歲之後還成百子蒜矣其瓣麤細正與條

中子同蕪菁根其大如碗口雖種他州子一年亦變大

蒜瓣變小蕪菁根變大二事相反其理難推又八月中

方得熟九月中始刈得花子至于五穀蔬果與餘州早

晚不殊亦一異也并州豌豆度井陘已東山東蒜子入壺擗上黨苗而無實皆余目所親見非信傳疑蓋土地

之異
者也

種澤蒜法預耕地熟時採取子漫散勞之澤蒜
可以香食吳人調鼎率多用此根葉作菹更勝葱韭此
物蕃息一種永生蔓延滋蔓年年稍廣閒區斬取隨手
還合但種數軌用之無窮種者地熟美于野生崔寔
曰布穀鳴收小蒜六月七月可種小蒜八月可種大蒜
四時類要種蒜作行下糞水澆之務本新書蒜畦
栽每窠先下麥糠少許地宜虛春暖則鋤拔薹時頻澆
剝麥時人多食解暑毒

薺
薤同

齊民要術薤宜白軟良地三轉乃佳二月三月種八月
九月

種亦率七八支爲一本諺曰葱三蒜四移葱者三支爲得本種薤者四支爲一科然支多者科圓大故以七八爲率薤子三月葉青便出之未青而出者內燥曝接去莖餘切卻殼根畱殼根而濕者卽未滿令薤瘦也先重糲耩

地壟燥培而種之

耩燥則薤肥耩重則白長

率一尺一本葉生卽鋤

鋤不厭數

薤性多穢荒則羸瘦

五月鋒八月初耩

不耩則白短

葉不用

剪剪則損白供常食者別種

九月十月出賣

經久不佳也

搗種子至春地

釋卽曝之

崔寔曰正月可種薤韭七月別種薤矣

四時類要正月上辛日掃去薤畦中枯葉下水加糞

葱

齊民要術收葱子必薄布陰乾勿令浥鬱葱性熱不喜浥鬱浥鬱則

不其播種之地必須春種菜豆五月掩殺之比至七月

耕數徧一畝用子四五升

良田五升
薄地四升

炒穀拌和之

葱子
性澀

不以穀和下不均調
不炒穀則草穢生

兩穫重耩竊瓠下之以批反

蒲結
契

蘇結

繫腰曳之七月納種至四月始鋤鋤徧仍翦翦與

地平

高畱則無葉
深翦則傷根

翦欲旦起避熱時良地三翦薄地再

翦八月止

不剪則不茂翦過則根跳若
八月不止則葱無袍而損白

十二月盡掃去

枯葉枯袍

不去枯葉春
葉則不茂

二月三月出之

良地二月出
薄地三月出收

子者別留之葱中亦種胡荽尋手供食乃至孟冬爲菹
亦不妨 四時類要種葱炒穀攬匀塞穰一眼於一眼
中種之他月葱出取其塞穰一眼之地中土培之疏密

恰好又不勞移

韭

齊民要術收韭子如葱子法

若市中買韭子宜試之以銅鑄盛水于火上微煮韭

子須臾芽生者好芽不生者是浥鬱矣

治畦下水糞覆悉與葵同然畦欲

極深

韭一翦一加糞又根性上跳故須深也

二月七月種種法以升蓋合

地爲處布子于圍內

韭性內生不向外長圍種令科成

薅令常淨

韭性多穢

數薅爲良高數寸翦之止

初種歲一翦至正月掃去畦中陳葉凍解

以鐵杷耧起下水加熟糞韭高三寸便翦之翦如葱法

一歲之中不過五翦

每翦杷耧下水加糞悉如初

收子者一翦卽留

之若旱種者但無畦與水耳杷糞悉同一種永生

諺曰韭者

頗人菜以其不須歲種也聲
類日韭者久也一種永生

崔寔曰正月上辛日掃

除韭畦中枯葉七月藏韭菁

菁韭花也

四時類要九月收

韭子種韭第一番割棄之主人勿食韭不如栽作行令
通鋤割一徧以杷糲之令根不相接爲佳如此當葉闊
如薤博聞錄韭畦若用雞糞尤好

胡荽

齊民要術胡荽宜黑軟青沙良地三徧熟耕樹陰下得
禾豆處亦
得春種者用秋耕地開春凍解地起有潤澤時急接澤
種之種法近市負郭田一畝用子二升故概種漸鋤取
賣供生菜也外舍無市之處一畝用子一升疎密正好

六七月種先燥曬欲種時布子于堅地一升子與一掬
濕土和之以腳踏令破作兩段多種者以墮瓦踏之亦
有兩仁仁各著故不破兩段則疏密水裏而不生著
土者令注入穀中則生疾而長速種時欲燥此菜非雨
不生所以不求濕下也於且暮潤時以耬搘作壟以手散子卽勞

令平

春雨難期必須藉澤蹉跎失機則不得矣地正月中凍解者時節既早雖浸芽不生但燥種之不須

浸子地若二月始解者歲月稍晚恐澤少不時生失歲計矣便于暖處籠盛胡荽子一日三度以水沃之二三日則芽生子旦暮時接潤漫擲之數日悉出矣大體與種麻相似假令十日二十日未出者亦勿怪之尋自當出有草乃萊生二三寸鋤去穢者供食及賣十月足霜令拔之

乃收之取子者仍畱根閒古竟反拔令稀穢即以草覆上

覆者得供生食又不凍死又五月子熟拔取曝乾勿使令濕則浥鬱格柯打

出作蒿筍盛之冬日亦得入窖夏還出之但不濕亦得
五六 年停一畝收十石都邑糶賣石堪一匹絹若地柔
良不須重加耕墾者於子熟時好子稍有零落者然後
拔取直深細鋤地一徧勞令平六月連雨時櫓音生者
亦尋滿地省耕種之勞秋種者五月子熟拔去急耕十
餘日又一轉入六月又一轉令好調熟如麻地即於六
月中旱時穫耩作壟蹉子令破手散還勞令平一同春
法但既是旱種不須耩潤此菜旱種非連雨不生所以
不同春月要求濕不種後米遇連雨雖一月不生亦勿
怪麥底地亦得種止須急耕調熟雖名秋種會在六月

六月中無不霖遇連雨生則根強科大七月種者雨多亦得雨少則生不盡但根細科小不同六月種者便十倍失矣大都不用觸地濕生高數寸鋤去穢者供食及賣作菹者十月足霜乃收一畝兩載載直絹三匹若畱冬食者以草覆之得竟冬食其有春種小小供食者自可畦種畦種者一如葵法播子沃水生芽種之晝用箔
蓋夜則去之晝不蓋熱不去
生夜不去蟲棲之凡種菜子難生者皆水沃令芽生無不卽生矣博聞錄胡荽必用月晦日晚下種

菠蘿一名赤根

博聞錄菠菜過刀剝乃生須二十七八閒種之月初卽

生 新添菠菜作畦下種如蘿蔔法春正月二月皆可
種逐旋食用食不盡者滾湯內掠熟曬乾遇園枯時溫
水浸軟調食甚良秋社後二十日種者可於窖內收藏
冬季常食青菜如欲出子十月內種訖至地凍時水渰
過來年夏至後收子可爲秋種

萐苣

新添萐苣作畦下種如前法但可生芽先用水浸種一
日于濕地上鋪襯置子於上以盆榼合之候芽微出則
種春正月二月種之可爲常食秋社前一二日種者霜
降後可爲醃菜如欲出種正月二月種之九十日收

同蒿

新添同蒿作畦下種亦如前法春二月種可爲常食秋社前十日種可爲秋菜如欲出種春菜食不盡者可爲子

人莧

新添人莧作畦下種亦如前法但五月種之園枯則食如欲出種畱食不盡者八月收子

藍菜

務本新書二月畦種苗高剝葉食之剝而復生刀割則不長加火煮之以水淘浸或炒燶或拌食或包酸餡或

捲餅生食頗有辛味五月園枯此菜獨茂故又曰主園
菜食至冬月以草覆其根四月終結子可收作末比茶
根又生葉又食一年陝西多食此菜若中人之家但能
自種三兩畦藍菜并一二畦韭周歲之中甚省菜錢

薯蓮

新添薯蓮作畦下種亦如蘿蔔法春二月種之夏四月
移栽園枯則食如欲出子畱食不盡者地凍時出於暖
處收藏來年春透可栽收種

蘭香香菜

附

齊民要術

蘭香羅勒也中國爲石勒諱故改今人因以
名焉且蘭香之目美于羅勒之名故卽而用

之三月中候棗菜始生乃種蘭香

早種者徒費子治畦耳天寒不生

治畦

下水一同葵法及水散子訖水盡筭熟糞僅得蓋子便

厚則不生
弱苗故也
晝日不見日

生卽

晝日不用見日
夜須受露氣

去箔常令足水六月連雨拔栽之中

指心裁泥中亦活

作菹及乾

者九月收

晚卽作乾惡

者天晴時薄地刈取布地曝之乾

乃採取末糞中盛須則取用

拔根懸者裏爛又
有雀糞肆土之患

取子者

十月收

自餘雜香菜不列
種法悉與此同

博物志曰燒馬蹄羊角成

灰春散著濕地羅勒乃生 博聞錄香菜常以洗魚水

澆之則香而茂溝泥水米泔尤佳

荏蓼

齊民要術

荏蓼紫蘇薑芥薰葉
與荏同時宜畦種

三月可種荏蓼

荏子白者良黃

者不

荏性甚易生蓼尤宜水畦種也荏則隨宜園畔漫

擲便歲歲自生矣荏子秋末成可收蓬於醬中藏之蓬

角也實

其多種者如種穀法

雀甚嗜之必須

收子壓取

油可以煮餅

荏油色綠可愛其氣香美煮餅亞胡麻油

而勝麻子脂膏麻子脂膏並有腥氣然荏

油不可爲澤焦人髮研爲羹臚美于麻子遠矣又可以爲燭良地十石多種博穀則倍收諸田不同爲帛

煎油彌佳

荏油性淳塗帛勝麻油

蓼作菹者長二寸則翦縮袋盛

沈於醬甕中又長更剪常得嫩者若待秋子成而落莖

取子者候實成速收之

性易彫零晚則落盡

五月六月中蓼可爲

薹以食莧

芹藻

其呂反苦藻江東呼苦賈

齊民要術芹藻收根畦種之常令足水尤忌潘漸米泔也灌及鹹水澆之則死性易繁茂而甜脆勝野生者白
蘿尤宜糞歲歲可收

甘露子

務本新書白地內區種暑月以麥糠蓋之承露滋息

豆豉

四時類要六月造豆豉黑豆不限多少三三斗亦得淨淘宿浸漬出瀝乾蒸之令熟于簞上攤候溫如人體蒿覆一如黃衣法三日一看候黃衣上徧卽得又不可太

去黃曝乾以水浸拌之不得令太濕又不得令太乾但以手捉之使汁從指間出爲候安甕中實築桑葉覆之厚可三寸以物蓋甕口密泥于日中七日開之曝乾又以水拌卻入甕中一如前法六七度候好顏色卽蒸過攤卻火氣又入甕中實築之封泥卽成矣

麩豉

四時類要六月造麩或麥麩不限多少以水勻拌熟蒸攤候溫如人體蒿艾罨取黃衣徧出攤曬令乾卽以水拌令浥浥卻入缸甕中實捺安于庭中倒合在地以灰圍之七日外取出攤曬若顏色未深又拌依前法入甕

中色好爲度色好後又蒸令熟及熟入甕中築泥卻以
冬取喫溫暖勝豆豉捺乃過切搗也

果實

種梨

招梨

附

齊民要術種者梨熟時全埋之經年至春地釋分栽之

多著熟糞及水至冬葉落附地刈殺之以炭火燒頭二

年卽結子

若櫧生及種而不栽者則著子遲每

梨有十許子惟二子生梨餘皆生杜插者彌

疾插法用棠杜

棠梨大而細理杜次之棠梨大惡棗石櫧上插得者爲上梨雖治十收得一二

也杜如臂已上皆任插

當先種杜經年後插之至冬俱

也杜樹大者插五枝小者或三或二梨葉微動爲上時

將欲開萼爲下時先作麻紉

汝珍

纏十許匝以錦截杜

令去地五六寸

不纏恐插時皮披畱杜高者梨枝繁茂遇大風則披其高畱杜者梨樹早成然

宜作蒿簾盛杜以土築之令沒風時以籠盛梨免披耳

斜攢

所咸反

竹爲籤刺皮木

之際令深一寸許折取其美梨枝陽中者

陰中枝

則實少長五

六寸亦斜攢之令過心大小長短與籤等以刀微剗梨

枝斜攢之際剗去黑皮

勿令傷青皮青皮傷則死

拔去竹籤卽插梨

令至剗處木邊向木皮還近皮插訖以縣莫

纂同杜頭封

熟泥於上以土培覆令梨枝僅得出頭以土壅四畔當

梨上沃水水盡以土覆之勿令堅固百不失一

梨枝甚脆培土

時宜慎之勿使掌撥則折其十字破杜者十不收一

所以然者木裂皮開虛燥

故也梨既生杜旁有葉出輒去之

不去勢分
梨長必遲

凡插梨園中

者用旁枝庭前用中心

旁枝樹下易收
中心上聳不妨

用根蒂小枝樹

形可喜五年方結子鳩腳老枝三年卽結子而樹醜

吳氏

本草曰金創乳婦不可食梨梨多食則損人非補益之物產婦蓐中及疾病未愈食梨多者無不致病欬逆氣上者尤宜慎之

凡遠道取梨枝者下根卽燒三四寸亦可行數

百里猶生

藏梨法

齊民要術初霜後卽收

霜多則不得經夏也

於屋下掘作深窖坑

底無令潤濕收梨置中不須覆蓋便得經夏

摘時必令好接勿令傷

擗凡醋梨易水熟煮則甜美而不損人也

按此條首行原本脫

卷之三
要術
名今校增

桃 櫻桃蒲
葡萄附

齊民要術種法熟時合肉全埋糞地中

直置凡地則不
生生亦不茂桃
若仍處糞中則
實小而味苦

性早實三歲便結
子故不求栽也

至春既生移栽實地

若離本
實小而味苦

栽法以鋤合土掘移之

桃性易種難栽
土率多死故須然矣

又種

法桃熟時於牆南陽中暖處深寬爲阬選取好桃數十

枚擘取核卽納牛糞中頭向上取好爛糞和土厚覆之

令厚尺餘至春桃始動時徐徐撥去糞土皆應生芽合

取核種之萬不失一其餘以熟糞糞之則益桃味

桃

性皮急四年以上宜以刀豎剗其皮

不剗者皮急則死

七八年

便老

老子細則

十年則死

是以宜歲歲常種之

又法候其子細便附土斫去桺上生者便爲

少桃如此亦無

窮也桺巢同

櫻桃二月初山中取栽

陽中者還種

是以宜歲歲常種之

又法候其子細便附土斫去桺上生者便爲

陽地

陰中者還種陰地

若陰陽易地則難生生亦不實

陽中故多難得生宜堅

此果性生陰地既入園圃便是

實之地不可用虛糞也

葡萄蔓延性緣不能自舉作

架以承之葉密陰厚可以避熱

十月月中去根一步許掘

近枝莖薄安黍穰彌佳無穰直安土亦得不宜濕濕則

冰凍二月中還出舒而上架性不耐寒不埋則死其歲

久根莖龐大者宜遠根作坑勿令莖

折其坑外處亦掘土并穰培覆之

博聞錄葡萄宜

棗北地皆如此種
葡萄長塞滿竅子斫去蒲萄根托棗根以生其肉實如

李

齊民要術李性耐久樹得三十年老雖枝枯子亦不細
嫁李法正月一日或十五日以磚石著李樹岐中令
實繁 又法臘月中以杖微打岐間正月晦日復打之
亦足子也 李樹桃樹並欲鋤去草穢而不用耕墾耕
肥而無實樹
下犁機亦死桃李大率方兩步一根
大槩連陰則子
細而味亦不佳

梅杏

齊民要術栽種與桃李同 作白梅梅子酸核初成時
摘取夜以鹽汁漬之晝則日曝凡作十宿十浸十日便
成矣調鼎和羹所在多入也 作烏梅亦以梅子核初

成時摘取籠盛於突上熏之令乾卽成矣烏梅入藥不任調食也 作杏李麩法杏李熟時多收取益中研之生布絞取濃汁塗盤中日曬乾以手磨刮取之可和水爲漿及和米麩所在多入也 四時類要熟杏合肉埋糞土中至春旣生三月移栽實地旣移不得更於糞地必致少實而味苦移須含土三步一樹穢卽味甘服食之家尤宜種之

柰林檎

齊民要術柰林檎不種但栽之種之雖生而味不成取栽如壓桑法此果根不浮蕊裁故難求是以須壓也 又法栽如桃李法 林檎樹

以正月二月中反斧斑駿椎之則餽子

棗
附 楠棗棗

齊民要術常選好味者畱栽之候棗葉始生而移之

棗

硬故生晚栽早地不耕也欲令牛馬履者堅也生遲也

耕也

則不耕荒穢則

踐令淨

棗性堅強不宜苗稼是以不耕荒穢則蟲生所以須淨地堅饒實故宜踐也

正月一

日日出時反斧斑駿椎之名曰嫁棗

不推則花而不無實研則子萎而落也

候大蠶入簇以杖擊其枝閒振去狂花

不打花繁實不成

全赤

卽收 收法日日撼而落之爲上

半赤而收者肉未充

將赤味亦不佳全赤不收久則皮破復有烏鳥啄之

楔

軟音滿乾則色黃而皮皺

少實足霜色殷然後收之早收者澀不任食也 作酸

棗麩法多收紅軟者箇上日曝令乾大釜煮之水僅足淹一沸卽濾出益研之生布綃取濃汁塗盤上或盆中盛暑日曝使乾漸以手摩挲取爲末以方寸七投於一椀水中酸甜味足卽成好漿遠行用和米麩飢渴得當也

栗附

榛

齊民要術栗種而不栽栽者雖生尋死矣栗初熟時出殼卽於

屋裏埋著濕土中

埋必須深勿令凍徹若路遠者以韋囊盛之停二日已上見風日者則不

復至春二月悉芽生出而種之旣生數年不用掌近

栽之樹皆不用掌近凡

近栗性尤甚也三年內每到十月常須草裹至二月

乃解不裹則凍死大戴禮夏小正曰八月栗零而後取之

不言剝之 棱齊民要術栽種與栗同 周官注曰棱似栗而小說文曰棱似梓實如小栗衛詩曰山有榛詩義疏云榛栗屬或從木有兩種其一種大小枝葉皆如栗其子形似杼子味亦如栗所謂樹之榛栗者其一種枝莖如木蓼葉如牛李色生高丈餘其核中悉如李作胡桃味膏又美亦可食歟漁陽遼代上黨皆饒其枝莖生樵爇燭明而無烟

柿

齊民要術柿有小者栽之無者取枝於棗根上插之
如插梨法

安石櫛

齊民要術栽石槽法三月初取枝大如手大指者斬令長一尺半八九枝共爲一科燒下頭二寸不燒則漏汁矣掘圓阤深一尺七寸口徑尺豎枝於阤畔環圍布枝令均調也置枯骨礓石於枝閒骨石是樹性所宜下土築之一重土一重骨石平坎止其土令沒枝頭一寸許也水澆常令潤澤旣生又以骨石布其根下則科圓滋茂可愛若孤根獨立者雖生亦不佳十月中以蒲藁裹而纏之不裹則凍死也二月初乃解放若不能得多枝者取一長條燒頭圓屈如牛拘而橫埋之亦得然不及上法根彊早成其拘中亦安骨石其斂根栽者亦圓布之安

骨石於其中也

木瓜

齊民要術木瓜種之及栽皆得壓枝亦生栽種與桃李同務本新書木瓜秋社前後移栽至次年率多結子遠勝春栽

銀杏

博聞錄銀杏有雌雄雄者有三稜雌者有二稜須合種之臨池而種照影亦能結實 新添春分前後移栽先掘深坑下水攪成稀泥然後下栽子掘取時連土封用草或麻繩纏束則不致碎破土封

橙

新添西川唐鄧多有栽種成就懷州亦有舊日橙樹北
地不見此種若於附近地面訪學栽植甚得濟用柑
與橙同

橘

新添西川唐鄧多有栽種成就懷州亦有舊日橘樹北
地不見此種若於附近地面訪學栽植甚得濟用

楂子

新添西川唐鄧多有栽種成就北地不見此種若於附
近地面訪學栽植甚得濟用

諸果

齊民要術崔寔曰正月自朔暨晦可移諸樹雜木唯有
果實者及望而止望謂十日過十五日則果少實食經云
種名果法三月上旬斫取直好枝如大拇指長五尺類要云
云一尺五寸內著芋頭中種之無芋大蕷菁根亦可類要云
得勝種核核三四年乃如此大耳可得行種類要云蘿蔔亦
正月一日雞鳴時把火徧照其下則無蟲矣博聞錄
柳子厚郭橐駒傳所種樹或移徙無不活且頌茂早實
以蕃有問之對曰凡植木之性其本欲舒其培欲平其
土欲故其築欲密既然已勿動勿慮去不復顧其時也

若子其置也若棄則其天者全而其性得矣他植者則不然根拳而土易其培之也若不過焉則不及苟有能反是者則又愛之太恩憂之太勤旦視而暮撫已去而復顧甚者爪其膚以驗其生枯搖其本以觀其疎密而木之性日以離矣雖曰愛之其實害之雖曰憂之其實讎之故不我若也 凡木皆有雌雄而雄者多不結實可鑿木作方寸穴取雌木填之乃實以銀杏雄樹試之便驗社日以杵舂百果樹下則結實牢不實者亦宜用此法果木有蟲蠹者用杉木作釘塞其穴蟲立死樹木有蟲蠹以荒花納孔中或納百部葉 歲時廣記遜齋

開覽凡果木久不實者以祭社餘酒灑之則繁茂倍常
用人髮挂枝上則飛鳥不敢近結實時最忌白衣人過
其下則其實盡落

接諸果

四時類要正月取樹本大如斧柯及臂者皆堪接謂之
樹砧砧若梢大卽去地一尺截之若去地近截之則地
力大壯矣夾煞所接之木梢卽去地七八寸截之若砧
小而高截則地氣難應須以細齒鋸截鋸齒麤卽損其
砧皮取快刀子於砧緣相對側劈開令深一寸每砧對
接兩枝候俱活卽待葉生去一枝弱者所接樹選其向

陽細嫩枝如筋麤者長四寸許陰枝卽少實其枝須兩節兼須是二年枝方可接接時微批一頭入砧處插砧緣劈處令入五分其入須兩邊批所接枝皮處插了令與砧皮齊切令寬急得所寬卽陽氣不應急則力大夾薰全在細意酌度插枝了別取本色樹皮一片長尺餘闊三分纏所接樹枝并砧緣瘡口恐雨水入纏訖卽以黃泥泥之其砧面并枝頭并以黃泥封之對插一邊皆同此法泥訖仍以紙裹頭麻纏之恐其泥落故也砧上有葉生卽旋去之乃以灰糞擁其砧根外以刺棘遮護勿使有物動撥其枝春雨得所尤易活其實內子細

類者林檎梨向木瓜砧上栗子向櫟砧上皆活蓋是類
也