

S2653

673<6
十六冊

卷拾壹

癰毒

陰道

陰道治驗

癰毒諸症

陰道治法

備用諸方

癰毒雜治

陰道諸症

銅人圖說

癰毒諸勢

陰道諸方

用藥大畧

驗方新編

陸



驗方新編卷十一目錄

癰毒

癰疽論

癰毒諸症

肺癰

肚癰

懸癰

發背

魚口便毒

筋骨疼痛潰爛生瘡

雞毒治法

腸癰

齊癰

對口

搭手

遍身肢節生瘡

身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢

身上疙瘩如塊如核

疔瘡

頭面諸疔

紅絲疔

刀鎗疔

羊毛疔

羊毛疔癌

疔瘡出血不止

疔瘡走黃

拔疔根法

楊梅瘡

避楊梅瘡法

瞎眼瘡

貓眼瘡

天蛇毒

蛇形瘡

纏蛇瘡

腰龍

名經

驗

魚脊瘡

魚臍瘡

蜘蛛瘡

螞蟻毒

葡萄毒

瘰疬瘡

黃水瘡

漆瘡

小兒乳癰

疥瘡

大麻瘋

蜂窠瘡

蚯蚓毒

蠅蛆瘡

瓜藤瘡

天泡瘡

熱瘡

癰瘡

皮瘡

凍瘡

遊風丹毒

血風瘡

疖子

音費

斑症

疹子

白癩風

紫癩風

卽汗斑

血瘤

粉瘤

出血不止

漏瘤

虱瘤

腋下癰瘤

肉核

疣瘻

肉瘻

血瘻

鵝掌瘻

癰毒雜治

癰毒宜戒

瘡痛不寐

瘡自走動

瘡毒腫痛不減

瘡肉飛落

瘡中生管

諸物入瘡

瘡口堅硬疼痛

瘡不收口

瘡毒腹脹如鼓

毒氣攻心

瘡癢難忍

趕移瘡毒

瘡口出血

瘡生芻肉如飯如菌

瘡中生蛆

驢馬糞入瘡

瘡毒潰爛不堪

瘡愈復發

增補治諸瘡毒久爛方

癰毒諸方

隔蒜灸法

桑木灸法

火頭

葱熨法

魚頭

糯米膏

膏頭

麻油飲

頭

護心散

小頭

菊花飲

頭

鳳仙膏

頭

馬荳膏

頭

隔蠟灸法

豆豉灸法

不見

蒸蜜膏

人參

神燈照法

火頭

茶油飲

肉頭

瓜蒂散

血頭

冰仙膏

頭

芙蓉散

頭

大蒜膏

頭

肥皂膏

大戟膏

銀花飲

石灰散

苦根

牛牙散

雞腰膏

雞蛋油

鯽魚膏

蝦蟆膏

蜈蚣膏

赤荳散

遠志膏

糞坑土

松香散

牛糞散

雞蛋飲

燕泥散

蝦蟆散

紅膏藥

蝦蟆拔毒法

白膏藥

綠雲膏

黃明膏

銀青散

金素丹

洞天膏

洞天救苦丹

三黃丸

五寶散

神仙棗

綠膏藥

綠蠟膏

紫蘆散

玉紅膏

金花散

洞天嫩膏

醒消丸

五通丸

珍珠散

愈瘡棗

大棗丸

代刀散

細藥

藥線

降癱活命飲

托裏解毒湯

四物保元湯

四物湯

黃連消毒飲

橘皮竹茹湯

山蓮散

咬頭膏

麻藥

仙方活命飲

黃芪湯

千金內托散

保元湯

二陳湯

化堅二陳丸

摩風膏

二味拔毒散

貝葉篇

蘆薈散

卷之九

皮金膏

生軍散

梅花點舌丹

蟾酥丸

陰疽

陰疽論名

陰疽諸症

石疽

失榮

惡核
瘰癧

癧癰卽瘻子也

落頭疽

遮腮

內骨槽風

乳巖

井泉疽

甲疽

脫骨疽

背疽

少腹疽

小腸疽

多骨疽

附骨疽

咬骨疽

剩骨疽

鶴膝風

橫痃

流注

小金丹

陰疽諸方

陽和湯

犀黃丸

小金丹

拔毒法

真君妙貼散

風溼灸法

陰疽治驗

陰疽無價活命仙丹

增補膏藥良方

內外備用諸方

觀音救苦膏

回生再造丸

太乙紫金錠

青金錠

平安萬應丸

金絲萬應膏

萬應神麴糕

金剛丸

大還丹

彭祖接命丹

無價保真元

延壽丹

蒸臍補氣散

陰虛無上妙方

人乳膏

來復丹

斑龍散

草靈丹

五香丸

三黃寶丸

扁鵲玉壺丸

九製硫磺丸

七製故紙丸

九製黃芪

七製香附丸

代參膏

附桂膏

黃瓜霜

甘露茶

羊腎酒

七味鴨

故紙鴨

種子兜肚方

土熨法

天然透邪丹

仙拈散

補中益氣湯

十全大補湯

逍遙散

金匱腎氣丸

左歸丸

右歸丸

六味地黃湯

八味地黃湯

元麥地黃湯

涼血地黃湯

藿香正氣散

六一散

益元散

甘桔湯

荆防敗毒散

黃連解毒湯

龍胆瀉肝湯

五苓散

經絡圖註

內景圖註

十二經用藥大略

驗方新編卷之十一

癰毒

癰疽論

王洪緒曰癰疽二毒由於心生蓋心主血而行氣氣血凝滯而發毒毒借部位而名藥宗經治而誤患盤而踰徑寸者紅腫稱癰癰發六腑若其形止數分乃言小癰按之陷而不卽高頂雖溫而不甚熱者膿尙未成按之隨指而起項已軟而熱甚者膿已滿足無膿宜消散有膿勿久留醒消一品立能消腫止疼爲療癰之聖藥白陷稱疽疽發五臟故疽根深而癰毒淺根紅散漫者氣虛不能拘血繫附

也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內
也紫黯不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色濃厚者
氣血旺也膿色清淡者氣血衰也未出膿前癰有腠裏火
毒之滯疽有腠裏寒痰之凝既出膿後癰有熱毒未盡宜
托疽有寒凝未解宜溫既患寒疽酷暑仍宜溫暖如生熟
毒嚴冬尤喜寒涼然陰虛陽實之治迥別閱古書總未詳
因立其旨備覽焉諸疽白陷者乃氣血虛寒凝滯所致其
初起毒陷陰分非陽和通腠何能解其寒凝已潰而陰血
乾枯非滋陰溫陽何能厚其膿漿蓋氣以成形血以華色
故諸疽平塌不能化毒者陽和一轉則陰分凝結之毒自

能化解血虛不能化毒者尤宜溫補排膿故當潰膿毒氣
未盡之時通其腠裏之藥仍不可緩一容一縱毒卽逗留
一解一逐毒卽消散開腠裏而不兼溫補氣血虛寒何以
成膿猶無米之炊也滋補而不兼開腠僅可補其虛弱則
寒凝之毒何能覓路行消且毒盛者則反受其助猶車粟
以助盜糧矣滋補不兼溫暖則血凝氣滯孰作釀膿之具
猶之造酒不暖何以成漿造飯無火何以得熟世人但知
一槩清火以解毒殊不知毒卽是寒解寒而毒自化清火
而毒愈凝然毒之化必由膿膿之來必由氣血氣血之化
必由溫也豈可涼乎况清涼之劑僅可施於紅腫癰癤若

遇陰寒險穴之疽溫補尙虞不暇安可妄行清解反傷胃氣甚至陽和不振難潰難消毒攻內腑可不畏歟蓋脾胃有關係生死故首貴止痛次宜健脾痛止則惡氣自化脾健則肌肉自生陽和轉盛紅潤肌生當投補氣養血之劑仍以犀角羚羊連翹等性寒之藥始終咸當禁服
癰之與疽截然兩途陽症爲癰陰症爲疽治法迥別世人以癰疽連呼並治貽害無窮古今方書雖有陰陽虛實之分治法難期盡善惟王洪緒先生別號林屋山人所著外科全生一書乃其世傳秘本剖析陰陽虛實之理至精且備不施昇降不用刀針經歷四十餘年用藥從無一誤開卷瞭於指掌可

以不學而能書只前後兩集其價甚廉板存江南省城湖南湖北坊間亦有賣各自購置一部不惟自便亦可濟人留心瘍醫者尙毋忽諸

癰毒治法

凡患色紅腫痛根盤寸餘者是癰毒發三四日尙未作膿以洞天嫩膏貼之內服醒消丸熱陳酒送下三錢卽止其痛夜間得睡次日皮卽起皺再服全消如過四五日將要作膿亦服醒消丸腫消痛止如作膿腫脹未破者用代刀散酒服卽穿外貼洞天膏數日收功如根盤數寸者在背心腦後腰腹肚腋陰囊等處險要之地用五通丸醒消九

早晚輪服一次用敗毒湯送下皮皺痛息若已穿破用托毒散醒消丸早晚輪服自有奇效如根盤不滿一寸亦紅腫者名癧用蟾酥丸梅花點舌丹卽愈此林屋山人經驗方也

癧毒諸症

肺癧

方見肺部

腸癧

腸癧有生於腸內者腹內脹急大小便牽痛如淋轉側搖之如水聲潰後則膿從大便出有生腸外者肚臍腫痛作脹或一足彎曲口有臭氣或膿自臍出甚則腸穿有虫自

臍中出勢難爲計初起宜用牡丹皮散以消之潰爛則用參芪內托之劑

牡丹皮散

丹皮

五錢

苡仁

壹兩

桔梗仁

去油

桃仁

去皮

尖研

貳十
粒

水煎服

此孫真人千金方也

又方

多服六一散

見內外備
用諸方

腰血從大便出

腰盡卽愈至神

至穩之方也

又方 鬆角刺

壹兩至少

酒煎至七分溫

服腰血從大小

便出而愈不飲酒者水煎亦可

又方 大黃

炒朴硝各

錢丹皮 白芥子 桃仁

各貳錢

空心煎服小腹堅硬而

熱接之則痛肉色不變或紅赤微腫出汗畏寒小便亦多

脈緊實而有力服此神效

卷之二
四
十一
肚癰

肚腹生癰卽腸癰也照上腸癰各方治之

臍癰

方見肚腹部

懸癰

方見海底部

對口

方見頸項部

發背

均見背部

魚口便毒

方見陰疽門橫痃症

遍身肢節生瘡

此名瘡蝕因風寒所搏氣血凝滯故也用蠶繭每繭一個

入白礬五分火煅過之後每礬一兩另加陀僧五錢白芷

一錢研末用蜜調敷

筋骨疼痛潰爛生瘡

此因誤服輕粉及丹石諸藥以致毒凝筋骨日久不愈查

解救諸毒門輕粉毒方治之

身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢

此丹毒也照後遊風丹毒各方治之

身上疙瘩如塊如核

此流注也與上遊風丹毒忽然而發者不同照陰疽門流注方治之

疔瘡

凡疔瘡好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根深難治有拔疔根法見後

疔瘡發之最速有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死至一月半月而終死者其毒最烈或發寒熱或發麻木或嘔吐或煩燥或頭暈眼花或舌硬口乾或手足青黑或心腹脹悶或精神沉困或言語顛倒此皆生疔之症其形或大或小或長或圓其色或白或黃或紅或紫或有紅絲

名色甚多治法則一倘辨別不清以生黃豆令本人嚼之
如無豆腥之味卽是疔瘡

疔瘡多生暗處或痛或不痛或癢或不癢發時人多不覺
若不早治最易誤事有發寒熱數日而後生者有當時生
者初起如粟米大或大小不一如發寒熱及麻癢嘔吐等
症卽於遍身留心尋認凡鬚髮眼耳口鼻肩下兩腋手足
甲縫糞門陰戶等處更宜細看一日須看數次有則照方
醫治若前心坎後背心有紅點者卽照後羊毛疗方法治之
如尋覓不見取瓶中氣垢少許納口中必有一處痛甚卽
知疔瘡所在須急宜刺出惡血以見好血而止諸瘡及刀

鎗疔忌用刀針餘疔不忌如毒重者急服護心散

見瘡毒諸方

或菜子油一碗

真麻油亦可

以免毒氣攻心若服菊花飲亦可

蜘蛛拔毒法

先將疔頭用磁片刺破尋活蜘蛛一個

越越好放疔瘡上蜘蛛一見自能奔往吸拔其毒少時蜘蛛

不動卽取放冷水中自活如疔未愈可用蜘蛛再行吸

拔或另取蜘蛛用之以毒盡爲止無論疔在何處雖毒

重痛極不省人事命在垂危立可回生此急救第一良

法凡手指生蛇頭瘡及毒蛇毒虫咬傷皆可照此拔毒

菊花飲

白菊花葉

連根用

搘取自然汁一茶鍾滾酒兌服

用酒煮服亦可

不如生汁爲妙

毒重者宜多服渣敷患處留頭不敷蓋

被睡臥出汗其毒自散無論生在何處雖欲氣絕亦可
起死回生至穩至便至靈諸方皆不及此不可遲疑自
誤無葉用根如無卽用藥店中乾白菊花四兩少則不效甘草
四錢酒煮溫服亦可

大戟膏

見癰毒
諸方

敷之卽愈再發再敷無不神效

地丁飲

紫花地丁

壹兩

白礬

甘草

各參錢

銀花

參兩煎服

各疗俱效有人生紅絲疔已走至乳旁服之立愈真神

方也

葱礬散

明礬

參錢研細

葱白

七個

二味共研爛分作七塊每

塊以熱酒一鍾送下服完卽睡蓋被取汗如無汗再服

葱頭湯一鍾少頃汗出如淋其病若失此方不但治一切惡症皆治初起未成膿者更妙

烟油膏用烟桿中烟油厚敷四圍留頭不敷少刻疔破出水而愈奇效如有紅絲者用烟油離絲三分處敷之絲卽不走又方黃色塘雞糞厚敷四圍將疔頭挑破極效又方生黃豆嚼爛敷之極效

頭面諸疔

用救唇湯紫花地丁金銀花各一錢白蘂十兩桔梗生甘草知母各三錢水煎服至重三劑必愈此方治頭面口角疔毒俱效唇疔更妙又方一人唇口生疔七個

頭腫如斗心悶神昏百藥不效後有人云此名七星趕月
用蛔虫搗爛敷之頃刻瘡口流出黃水腫消神清次日全
愈如無蛔虫以五穀虫一錢瓦上焙研白礬三分蟾酥三
分以燒酒溶化共調勻敷疔上少刻疔亦破流毒水而愈
又方 凡口唇生疔看大龍灣中如有紫筋用銀針刺出
血即愈有人不知疔在何處但唇內癢極須臾半面腫硬
痛甚見腮後起有紫筋刺之立效又方至雄雞冠血點
上其效如神又方取大蝦蟆壹個取肝貼之立消兼治
面上生疔對口瘡等症又方 生蜆去壳 搗融敷卽消
又方 烏色草魚去鱗取皮切片貼之隨貼隨乾乾則另

換換至數十次卽破口而愈矣

紅絲疔

此疔流走最快生於足者其紅絲漸長至臍生於手者紅絲漸長至心生於唇面者紅絲漸長至喉至則不可救矣手足兩處可用頭髮離絲一二寸遠繫繫捆住並將絲頭刺破或用燈火或用艾火在絲頭燒之絲卽退散而愈不散再燒以散爲度其效如神或照各前方治之甚驗

刀鎗疔

疔形如韭菜寬長一二寸肉色紫黑者是忌用針刺用前葱薑散服之並溏雞糞敷之卽愈遲則毒歸心腑致命

羊毛疔

初起頭痛身發寒熱前心坎後背心有紅點如疹子形先用針挑破取出羊毛再用明雄末一錢青布包札蘸熱燒酒於前心坎瘡上一二寸外四圍團團擦之漸漸擦入瘡眼其毛卽奪至後背心再於背心照前擦之其羊毛俱拔於布上卽埋入土中內服菊花飲或葱白飲地丁飲俱見前護心散諸方見痘毒俱可

羊毛疔瘤

此症忽起一泡其形如瘤內有羊毛亦名羊疔初起或頭痛或發寒熱卽是用黑豆蕎麥各等分研末挑破敷之毛

驥方集卷一
落卽愈內服菊花飲亦可

疔瘡出血不止

飲真麻油一大碗卽止或飲茶子油更妙

疔瘡走黃

凡疔毒腫痛神昏甚至不省人事謂之走黃急用芭蕉根
搗汁服之立可回生或照前菊花飲地丁飲服之均妙
拔疔根法 疮毒重者好而復發此疔根未出故也若不
急治再發則根愈深而難治矣 草麻子壹粒去油乳香壹分去油
共搗爛用飯和爲餅貼之少時疔根自出 又方 葱白
煉蜜搗融將疔刺破敷之如人行五里其根自出又癰毒

諸方 紅膏藥方拔疔最效

楊梅瘡

此瘡最毒治不得法多致纏綿不救且最忌服輕粉服則
毒留筋骨難以斷根抑且不能生子如已服者可用解輕

粉 方

見解救
毒門

治之

紅棗

紅棗三枚以杉木作柴煮之煮熟剝皮去核多

取燒過杉柴枯炭磨細末和棗肉搗勻爲丸如彈子大每

日任意食之不可間斷雖瘡毒滿周身或服過輕粉及一

切丹石隱藥致成結毒穿頭穿鼻潰爛不已多年不愈者

服之大有奇效至穩至靈此治楊梅結毒第一方也愈後

再服一兩月斷根紅棗能解丹石之毒杉木專祛溼熱之
侵是以奏功如反掌也忌醋與辣椒又名青椒及一切發物半

年外用蝦蟆散

又方

用土茯苓

壹兩

木通

白蘇皮

防風

各壹錢

宣木瓜

薏苡仁

金銀花

各貳錢

皂角子

四分

水煎服每日服一劑以愈爲度外用蝦蟆散

見瘡毒諸方

敷之

無論久近輕重潰爛穿頂屢試如神百發百中忌食茶
不服藥並忌醋與辣椒及一切發物半年終身戒食蝦蟆
則不忌如不服藥卽服前紅棗丸外用蝦蟆敷之亦可
又方

大黃

壹兩

川山甲

炒

川厚朴

白芷

大楓子仁

花椒

甘草

各叁錢

水煎兌酒服毒氣從大便出七日全愈忌食一

切與上同惟

不忌茶與蝦蟆無論輕重屢試神驗不可輕視

又洗藥方

生甘草

金銀花

蒼朮

白芷

藿香

槐花

各貳錢

共

煎水洗輕者內服前方外用此藥洗之卽愈

避楊梅瘡法

凡生楊梅瘡在傍伺候親近之人難免傳

染用

雄黃

川椒

去子各五錢研末

杏仁

百粒蒸熟去皮尖炒研末

燒酒

打麪糊爲丸梧桐子大

每服十五丸開水下於病人初發時服即可免也

瞎眼瘡

上高下深顆
顆纍垂如瞎眼其中帶青頭上各露一舌者
是也用回陽玉龍膏真君妙貼散
見陰疽
敷之必效如仍
諸方

不愈用蝦蟆散

見惱毒
諸方門

治之或後陰疽方更妙

猫眼瘡

瘡似貓兒眼有光采無膿血痛癢不常飲食減少名曰寒瘡照上瞎眼瘡治之

天蛇毒

有人遍身潰爛似癩非癩呼號不已一僧視之曰此天蛇毒非癩也用秦皮又名檉皮又名檉皮又名石櫟又名苦樹又名苦櫟煮汁一斗日服十餘碗三日全愈又草花間蜘蛛螯人爲露水所濡乃生此瘡者亦名天蛇毒瘡可以此方治之天蛇大如箸而扁長三四尺色黃赤人遭其螯不治必死

蛇形瘡

一人生瘡如蛇長數寸外用雄黃麻油調敷內用雄黃沖酒飲卽愈

纏蛇瘡

又名纏
腰龍

此丹毒也生腰下長一二寸或碎如粟或紅腫堅硬用燈火向兩頭燒五次並用雄黃外敷內服極效又方陳石灰麻油調敷卽愈又方 舊糞桶箍燒灰麻油調敷其效尤速或照遊風丹毒各方治之

魚脊瘡

多生筋骨之間堅凝作痛初起白泡漸長狀如魚脊破流

黃水此陰症也初起時無論已潰未潰宜用隔蒜灸法見痘門以通陽氣外用回陽玉龍散真君妙貼散見陰疽門敷之或用後陰疽諸方更妙

魚臍瘡

窄而長腫而黑者是

此因風毒蘊結或氣血凝滯或誤食人汗所致用螺猪頭骨燒枯研末生雞蛋白調擦數日卽愈

蜂窠瘡

不拘何處形如蜂子窠者是

用罐鑿一小孔納碎布數團火燒取烟從小孔出向患處熏之二三次卽愈又方用愈而復發者用鉛粉硃砂和蜜調敷神效

蜘蛛瘡

形如蜘蛛網癢不可忍用豆腐衣

又名豆腐皮

燒枯存性香油

調搽

蚯蚓毒

此症鬚眉皆落形似痺風或夜間身上有蚯蚓聲用食鹽數筋熬湯洗身數次內服淡鹽水一二碗極效不可誤爲痺風如真是痺風令病人姑立打銅鐵之風爐火傍望其臉紅者是痺風驗綠者非也

兩手大工指合攏處肉下燭者亦是

螞蟻毒

形如珠顆成片成串或紅或白破則流水好而復發用穿山甲

瓦上焙枯研末

香油調敷雖多年不愈者無不神效

馬一介編
卷一
三
螺螻瘡

螺螻又名搔甲子俗名偷油婆又名驟螂其瘡初如粟米漸大如豆更如火烙漿炮疼痛至甚者以春茶葉研末麻油調搽極效又方燕子窠泥和豬胆加酒調搽或照後療疽毒各方治之

葡萄毒

一小兒年五六歲額上忽起一顆紫色光亮形如葡萄頃刻周身皆有一老醫見之云此乃葡萄疔毒一見鼻血卽死因小兒飲食言笑如故病家不信至夜半忽鼻中血如湧泉而死又一男子手腕上忽起一粒如紫葡萄半日

亦見鼻血而死俱無藥救附錄於此以俟博識者立方施治又一女子年十四手腕軟處生物如荳半在肉中紅紫色痛甚百方不效後用汞四兩白紙二張將水銀採熱擦之三日自落合而觀之前症似可照此施治再前症既名疔毒又見鼻血其爲熱毒內蘊無疑水銀擦之如不見效應急照前癰毒諸方門內菊花飲菜油飲二方治之或可救也並用吳萸末熟醋調敷兩腳心一日一換此引熱下行至妙法也

瓜藤瘡

一身十齡個部是

尖尾芋

茄子葉

五月艾

葱

姜

共搗爛醋煮

敷

癰疽瘍

手足肩背纍纍如豆如米大者如梅如李或赤或黑或白
或青初生有痂一層痂內有核核有深根能爛筋骨毒入
臟腑卽死此熱毒也先將痂挑破用醋和微溫淘米水洗
淨以芙蓉散見癰毒治之自流毒水內服真菜子油麻油亦可

極效

又方

燕子窩連泥帶糞和初生百日內男孩糞

調擦或真菜子油或麻油亦可極效此孫真人千金方也

又方 猪胆汁敷之流出毒水極效

又方

鯽魚長三寸者一條亂髮一團如雞蛋大猪油半觔同煎膏用罐裝好

放水中拔其火氣三日後敷之極效

又方

男子尿桶

中白霜敷之立刻清涼止痛乾則再敷 又方 鍋黑烟
以燒草者佳燒炭者不可用桐油麻油菜油均可調搽卽愈

又方 照遊風

丹毒門防風升麻湯

至穩

芥子油

六安州茶葉各方治之

至效

天泡瘡

形如水泡者是用蓮蓬

卽蓮房

燒枯研末井泥調敷神效或

用荷花瓣貼之或照後黃水瘡各方及癰毒諸方門松香
散雞腰膏治之更妙

又遍身生燎泡

如甘棠梨破水流復生內有小石一片方見卷十六奇病

黃水瘡

初如粟米癢而兼痛破流黃水浸滯成片流處卽生由脾
胃溼熱外受風邪相搏而成發於心下者若不早治難救

宜用青蛤散

蛤粉

毒兩
帶

真青黛

三錢

熟石膏

貳兩

輕粉

黃柏

各五
錢

共研細末先用香油

調成塊次用涼水調稀

塗之神效並治鼻中生蟲

又方

蠶豆殼

瓦上焙枯研末

加黃

丹少許以真菜油調敷麻油亦可乾則再敷三日卽愈屢

試如神

又方

紅棗燒炭

八
錢

飛黃丹

松香

枯礬

各四
錢

錢右共爲末麻油調擦立效

又方

輕粉

樟腦

各貳
錢

大楓子

去壳川椒各四十
九粒

杏仁

壹
錢

共爲細末和柏油

燭搗勻

各貳
錢

敷之功效如神柏油又名捲油又名柏油卽烏柏子油也

或用癰毒門松臘散蘆薈散燕泥散雞腰膏均極神效

熱瘡

其色紅而作痛者是用男子尿桶中白霜敷上立刻清涼
止痛乾則再敷或照上療痘瘡各方治之亦可

漆瘡

杉木屑煎水洗用活螃蟹黃 滑石 和蜜調敷甚效此
林屋山人方也有漆之處先嚼川椒敷鼻孔可免漆瘡
又方 買眾研末培枯香油調敷或用韭菜搗汁敷或用白羊
乳搽之均效 又方 白蘿蔔葉煎水洗立刻消三次全
愈或用新荷葉煎水洗亦極神效 又方 活螃蟹搗汁
滴入使毒水流出自愈如已腫爛取生蟹黃塗之其爛更
甚數日卽愈若再不效用生大黃參枳壳錢水煎服二

駢刀新編 卷十一
劑腹泄而愈不泄加芒硝一錢以泄爲度緣漆瘡火盛則重非泄不能愈也

癬瘡

凡癬內有虫治好復發非藥不靈虫未盡也發後再治無不愈矣頭面生癬如入眼內卽成大麻瘋矣宜急治之新鮮皂角刺一二動搗爛熬至將成膏時加好醋熬稠將癬刺破敷之日剃日敷自有毒水流出流盡再敷十日雖數十年陰頑惡癬無不斷根此林屋山人屢試神方 又方斑蝥五分生半夏末壹錢雞蛋油調搽數次則痛必愈再發再搽雖多年惡癬無不斷根取雞蛋油法見癬毒諸方

又方 青礬

炒成塊

研細末加猪胆汁和融再炒再研用老

姜一塊切開蘸藥擦之大痛即愈再發再搽雖多年頑癬

亦可除根

又方

大蜂窠

壹個

以白礬末填孔內火煅

以礬融化爲度研勻將癩抓破以牙硝水調搽一二次痛

則必愈再發再搽必能除根

又方荔枝核磨醋將癩抓

破搽之雖痛不妨數日即愈再發再搽斷根

又方 用

新綿花扯成如紙薄一層量癩寬大將綿花鋪貼用火向

花上一點頃刻燃盡當即止癢而且並不焦痛不須用藥

極簡易極效驗只須一次全愈次年再發照治一回斷根

又方 珠蘭花葉時時搽之半月斷根

小兒乳癬

小兒初生症類疥癬先起手足次遍腹背纏綿不已先用
蠭蠶不拘多少去嘴研末煎湯浴之或一日一次或一日
二次毒出再用 真青黛 黃柏 枯礬 雄黃 百藥
煎硫黃各等分 研末溼則乾擦乾則香油調擦以愈爲度名
換形散

皮疣

杏仁去皮尖 炒黑研如醬擦上卽愈或照癬瘡各方治之

疥瘡

疥有五種乾疥溼疥虫疥砂疥膿疥俗名膿泡瘡是也由

各經蘊毒日久生火兼受風溼而成數日延及遍身最易傳染或癢或痛癢者內必有虫不獨虫疥然也治法雖多有效有不效有此用之而效彼用之而不效者後列各方五種疥瘡皆治古方有熏藥一法瘡雖易愈然毒盡歸腹定成鼓脹危症切宜戒之如已成鼓脹查癰毒雜治門本方治之

黃香散

硫黃

川椒

各五錢

共研末加姜葱頭各五錢和

生豬板油搗融用布包好烘熱時時擦之其效甚速

又方 整塊川厚朴以真香油磨濃如醬加枯礬少許擦

之數日退盡此膿窠疥瘡神方也

合掌散

硫黃

壹兩

鐵繡

壹錢

紅砒

六分

共研極細

如灰麪細

葱汁調敷大碗內周圍敷勻勿厚勿薄以碗覆瓦上取艾放碗下燒
熏熏至藥乾敲之如空碗聲爲度取藥再研細每藥一錢
可敷數次臨時以右手中指粘滿香油再粘藥擦入左手
心合掌摩擦常以鼻嗅之止有藥氣不見藥形然後以兩
手擦瘡每日早晚二次三日掃光再擦三四日卽不發矣
屢試如神並治陰囊溼癬

二美散 吳茱萸 硫黃 各等分研細如麵粉照上合
掌散法摩擦每日二次愈後再擦三四日專治膿瘍神效
此方與上合掌散均林屋山人經驗方也 又方 油胡

桃核又名紅棗肉

各壹兩

水銀

五分

水片

不拘多少

真小磨麻油

豬油

名參四錢

共搗融用紬包裹擦之擦過卽能止癢止痛時

向鼻中聞之數日卽愈屢試神驗

又方

田螺煮熟酒

炒食可除一身疥瘡

又方

松香

參錢枯礬

五倍子

各壹錢以上共研末加頭髮

參錢

生豬板油

五錢

用青布包

好向燈火上燒之有油用碗接住候冷用針挑破疥瘡將
膿擠出用茶洗淨勿沾生水候乾取油搽抹不過三日全
愈永不再發 又方 硫黃

整塊

放銅器內燒燃存性倒

在地上候冷搗碎

忌鐵石器

加水銀麻油拌勻用布包好烘熱

時時擦之

三日

卽愈簡便而極效驗

又方

核桃仁

蓮皮用膏兩

人楓子仁

五錢

水銀

參錢

共搗極融爛先用

又名胡桃

炒食可除一身疥瘡

又方

松香

參錢枯礬

五倍子

各壹錢以上共研末加頭髮

參錢

生豬板油

五錢

用青布包

此藥壹貳錢不可過多放在手心中擦勻將左手心在肚臍眼

上順着摩擦不可倒擦擦至手心發熱即止再用此藥壹

貳錢放右手心中擦勻在肚臍眼上照前摩擦擦至肚腹

滾熱即止每日一次瘡上不擦輕者二日即愈至重三日

斷根有人遍身膿疥時發時愈纏延三載百藥不效用此

三日而愈從此斷根此治五種疥瘡第一神方一切溼熱

瘡疾皆治珍之寶之愈後宜食愈瘡棗見後瘡以補脾上

或另服健脾之藥亦可如恐水銀入腹爲害病愈體壯之

後每早用真川椒要開口的七粒滾水空心吞服連服三日其

水銀自入椒內由大便而出或用真川椒研末鋪床上被

蓋睡臥水銀卽由毛孔而入椒內矣此法最妙

凍瘡

橄欖核燒灰存性研末加輕粉少許香油調搽神效

又方 以蚶子殼煅研極細以麻油調搽溼則乾慘數日

全愈此秘傳也

又方

陽和解凝膏

見陰疽門貼

一夜卽愈

潰爛者貼三張收功此林屋山人方也

又方

白芨磨

敷卽愈

又方

蘿

薺菜橘皮煎湯先洗用蟹殼燒灰研麻油調敷

又方

暑伏時搗大蒜爲泥敷在上半生過凍瘡之處過一日一

夜洗去遲三四日再敷一次若連日敷之則內土起泡破

皮矣本年冬雖極寒亦不再生凍瘡凡小兒手足處雖未凍過亦敷兩次可以耐寒此法可傳船夫腳夫亦一德也

大麻瘋

此症各方凡殺蛇治愈者務戒殺放生方能全愈

麻瘋者身上必有麻木之處針之不痛然後發現於外若不麻木則非麻瘋偏身雖麻木數月卽發現於外雖重易治若年久病深壞形變貌鼻塌肉崩手指脫落足底穿爛則難治矣江西蕭曉亭著有麻門全書二本專治麻瘋所論病源最爲透徹其治法亦極神妙板存廣東省城雙門

底刻字店

麻瘋謬云正報似非妄談若自信罪愆難逃果能矢念爲

善人力可以回天卽自信並無過惡亦當力行善事所謂
善事者守禮守法常存善念見善必爲尤宜謹戒殺生並
須放生果能如此不但病易愈且爲後嗣種福所益多矣
曾克廣五服方 昔在萬安縣甫嘉地方遇一良醫善治
瘋癲惡疾活人甚衆余甚奇之具金百餘求得此方歸家
後適鄉鄰有一此症者依方用之數月而愈頻年以來遠
近用此方者十愈八九屢試屢驗真神妙方也

初服方

羌活

蒼朮

荆芥

防風

銀柴胡

黃元參

赤芍

黃芩

白蘚皮

枳殼

銀花

甘草

水煎服四劑

次服方 羌活 細辛 白芷 生地 防風 知母

黃芩 川芎 甘草 水煎服二劑

甘草

三服方 大黃 朴硝 銀花 桃仁 枳殼 黃連

大麻仁

黃柏 元參 水煎服二劑

大麻仁

四服方 荆芥 防風 川烏童便浸後白附子姜汁蒸

大麻仁

天麻 疟蠶姜汁蒸蒺藜水洗淨獨活

元參

炒苦參 赤芍 黃柏 銀花 甘草 枳殼

大楓子

水煎服十劑以上依次空心服俱不加引

五服方 元參 枳殼 白芷各一錢赤芍 銀花各一錢

大楓子

火麻仁 藜藜 各壹兩 獨活 貳錢

製川烏壹個

北防風

十兩

以上共研細末

斬蛇

十貳兩

斬蛇去頭尾用

熱酒浸二三日秋冬浸五六日浸鬆後去骨蒸熟焙乾研

末和前藥蜜爲丸每日早午晚三次各服四錢茶送下

皂刺散

一人有麻風惡疾雙目風盲眉髮俱落鼻梁倒

塌遇一異人傳方用

皂角刺

參斤

燒枯蒸一時久曬乾

爲末每日飯後服二錢

大黃煎濃湯調下半月後眉髮

再生目明肌潤

白花蛇丸

丹陽上舍得麻瘋疾一僧療之而愈以數百

金求方不肯傳館賓袁生窺藏納衣領中因醉而竊錄焉

用者多效

白花蛇

壹條

烏梢蛇

壹條並去

防風

頭尾生用

蟬蛻

去泥

生地

川芎

苦参

枸杞

槐花

銀花

以上各
武兩

白蒺藜全蝎

醋浸一日去鹽味

北細辛

蔓荆子

威靈仙

何

首烏

胡麻仁

炒香

金毛狗脊

川牛膝

烏藥

天花粉

川連

黃芩

梔子

黃柏

連翹

牛蒡子

以上各
壹兩炒

漏蘆

半斤洗淨四兩去苗

芥穗

壹兩五錢

頭面者加白芷一兩肌膚潰

爛者加大皂角一兩共研末米糊爲丸桐子大每服五六

十丸茶送下午後臨臥各一服

白鹿洞方 治大癩瘋眉毛脫落手足拳攣皮骨潰爛唇

翻眼綻口歪身麻肉不痛癢而生紫斑並治如神

真蘄蛇

八兩去皮骨酒浸焙乾

獨活

蘇薄荷

全蝎

洗去蟬蛻足鹽

殭蠶炙去足

赤芍

以上各六兩

楓子肉

去淨油

天麻酒浸

防風

酒浸

金毛狗脊

去毛酒浸

白芷

以上各四兩

當歸酒浸

苦參以上各四兩

金頭蜈蚣炙去足

穿山甲

燒大川芎

共爲末酒糊爲丸梧子大每

服七八十九空心用好酒送下臨臥再一服忌氣怒房事

油膩煎炒雞魚蝦蟹芋頭山藥糟魚肉鴛生冷酸食冬月

亦不可烘火宜綿煖淨室坐定保守性命節飲食斷妄想

服藥時宜仰臥令藥力遍行有功如不守禁忌徒勞心力

亦無效也服此藥只宜食鴨鯽魚牛肉俱宜淡食

秘傳漆黃蟾酥丹

鮮螃蟹四個

真生漆一斤

算蟾酥

以上各二錢

白蘚

以上各二錢

白蘚

以上各二錢

白蘚

以上各二錢

白蘚

以上各二錢

白蘚

明雄黃各兩先將磁鐸裝蟹次入漆封口埋在土中十四
日足方取開看二物俱化成水去渣淨將水入鍋慢慢火
煮焙乾爲細末方入雄黃蟾酥二味末攬勻磁罐收之每
日空心臨臥各一服好酒送下二錢不過一月其瘡全好
除根妙不可言治大癩瘋如手取之妙尤所費不多莫輕
忽修合亦勿妄傳匪人秘之

癰風方 鎮江丁叅領得此秘傳治之全愈又以醫治多
人無不取效如神但患此症者眉毛若盡脫落其症難治
若眉毛未脫雖手足節骨有壞損者皆可取效若初起未
深之症百試百效也先用湯藥四劑每日一劑服完再服

丸藥每丸一錢加楓子膏春秋八釐夏六釐冬一分

湯藥方

陳皮 白芷 苦參 天麻 秦芄

川續斷

防風

荆芥 羞活

海藤

薏米

牛膝

當歸

海桐皮

蒼朮 木香 桂枝 連翹

甘草各一錢

黑棗

二枚生姜一片水二碗煎至一碗服渣再煎二次服

丸藥方

大胡麻 小胡麻

白蒺藜

各一錢

苦參

壹斤

防風

荆芥

各八兩

當歸

蒼朮

各六兩

薏米 繢斷

牛膝

各四兩

共研細末水泛爲丸每日早午晚三服每服三

錢或二錢照數加楓子膏然攪攬和以細茶送服

如頭上

楓子膏

大楓子去壳取仁銅鍋內炒至三分紅色七分

黑色爲恰好太過無力不及傷眼炒後研成細膏如紅沙
糖一樣用銅鍋器盛向火上熬四五滾倒在紙上放地上
面以物蓋之聽用如上面霉變拭去仍照常用一年內切
忌房事切忌食鹽犯之不愈並忌醬醋酒及一切雞魚發
氣動風等物

則利

又方 滅蛇急條要粗如酒盃大竹刀破去腸雜切寸段起放瓦
上以火炙之蛇假跌倒者無毒取炙存性不倒者勿用磨
成粉拌入飯內與一隻身白毛鴨食之次日鳴毛盡脫以
鴨殺之砂鍋內煮爛分作四五日食初食其腫更甚食至
二三日後漸漸平愈雖潰爛不堪食之亦效此林屋山人

經驗方也

又方 明淨松香數斤取甘淡泉水用淨鍋煮化不住批
批卽傾冷水內用手分扯俟凝冷另換清水再煮再扯幾
十次只以松香潔白水色極清不苦方可陰乾研極細用
每料貳斤日以白米作粥候溫入藥末和匀服飢則再食
不可更吃硬飯忌一切油鹽葷酒菓菜糖麵第一渴勿吃
茶以滾水候半冷調藥飲每日數錢半月後作嘔胸中嘈
逆難過大便下毒必須多服不可中止遠年者壹料全愈
初起只須壹斤生鬚眉舒筋骨矣一生忌食發物神效非
常較前方尤簡便奇驗也

又方 桑皮 大黃 芒硝 各一撮水煎於無風處日洗二三次如有虫如鴿糞同煎如爛用琥珀末擦患處此神方也

遊風丹毒

名天火又名流水俗謂風疣癰瘍是也此症身上忽然紅腫或大或小或痛或癢甚至遍身皆有遊走無定有初起白斑漸透黃色光亮皮中恍如有水脹墜破流黃水溼爛多痛爲水丹又名風丹多生腿膝屬脾肺有熱而夾溼也又色赤而乾發熱作癢形如雲片爲赤遊丹屬血分有火而受風也又遍起小白泡無熱無痛遊走不定爲冷

瘍卽冷丹由火毒未發肌膚外受寒鬱而致也 又有腰

間紅腫一道名繩腰丹又名繩蛇瘡

方見瘧毒
諸症門

又有雞

冠丹茱萸丹兩種丹名雖多總屬心火正焦風邪而成其發甚速自胸腹起於四肢者順而易治從四肢起於胸腹者宜急治之遲則難治

防風升麻湯

防風

升麻

梔仁

麥冬

荆芥

木通

乾葛

薄荷

元參

牛蒡子

甘草

各壹錢

燈心十莖水煎服大便閉者加大黃枳壳

各壹錢

水煎服忌

魚腥雞鵝動風煖血之物犯則難治丹毒重者攻入心胃難救先服此藥以解內毒次用磁針刺去惡血則毒隨而

散至神至捷百發百中磁針刺法 取磁器輕輕敲破取
鋒利者 小塊用竹筷將筷頭破開橫夾磁片露鋒於外
將線紮緊以磁條正對丹毒之處另用筷於磁鋒筷上輕
輕敲之其血自出不可刺深傷肉未愈不妨再刺以紅消
腫敷之皮毒輕者不必刺

又方 如眼上防風升麻湯不效卽用四物消風飲

生地 參錢當歸 豉錢荆芥 防風各錢半 赤芍 川芎 白
蘇皮 蟬蛻 薄荷各壹 獨活 柴胡各七 紅棗貳枚

水煎服必能見功此消風毒要藥也

又方 清涼膏

見湯火傷門

數之極爲神效

又方 馬蘭膏治新生小兒紅赤游風丹毒百不失一並
治大人丹毒或兩腮溼熱伏於經絡皮面上不紅不腫其
疼異常病者只叫腿熱他人按之極冷者此膏擦之立愈
屢試皆效 馬蘭頭謂之馬蘭頭他省不知呼爲何名
拘多少冬季無葉取根亦可浙人用水洗去泥擣爛絞汁以雞毛蘸汁擦之乾則再換或調
飛淨六一散搽之亦可

又方 蚊蠅數條又放碗中加白糖用碗蓋住半日後至
曉即化爲水藥之極效無蚊蠅用蠅蛆俗名鼻涕虫亦可

血風瘡 疹子 痘子音普
均見遍身搔癢門

斑症

人有一時身熱卽便身冷而滿體生斑如疹者乃火從外泄而不得盡泄於皮膚故鬱而生斑人盡以爲熱也用寒涼泄火之藥不效有斑不得消而死者亦可傷也用元參
麥冬各壹錢白芥子
丹皮五錢水煎服一劑斑勢減二劑斑紋散三劑斑影盡消矣此方妙在用元參麥冬以消斑尤妙在升麻多用服
參劑升麻宜減半引元參麥冬以入於皮膚使羣藥奏功而斑無不消也又傷寒門蝦蟆燕泥二方亦極效驗又週身發斑眼赤鼻脹氣喘毛髮硬如銅鐵方見卷十六奇病門

白癩風

又名白駁風多生頭面白如雲片者是

用白鱠油擦之無則取白鱠晒乾煎枯取油擦之卽愈

又方

土蒺藜子

六兩

生磨爲末

忌鐵器

每服二錢一日二

次開水送下外用小麥攤石上燒鐵物壓出油擦之半月

後白處現有紅點一月後斷根

又方

豬肝一副白煮不用鹽一頓食盡忌房事一月漸

漸自愈並治紫癩風春季豬肝有毒勿用

紫癩風

卽汗斑

硫黃

輕粉

蜜陀僧

斑蝥

製有性

樟老各等分共研極

細末俟出汗時用老姜蘸擦患處兩三日洗去卽除根神

效或用蜜陀僧爲末黃瓜蒂擦之亦效

又方 陀僧 乾葛 疏黃 海螵蛸 川椒 共研細末先用老姜切片擦患處後以藥擦之永不復發再用浮小麥煎水洗滌一次更妙

癰癧

漸長漸大軟而不硬方書云其種有五肉色不變爲肉癰筋脈現露爲筋癰筋脈交絡色紫赤者爲血癰隨憂惱消長爲氣癰堅硬不消爲石癰有大如碗者有長而下垂者又有粉瘤漏瘤虱瘤各種 又有羊毛疔形亦如瘤者

治法見前疔瘡門

消癰五海飲

海帶

海藻

昆布

海蛤

海螵蛸

各
五

錢煎湯當茶飲甚效

又方

櫻桃核好醋磨敷卽消初

起者甚效

又方

石榴樹上寄生醋磨擦之極效

各壹

生頸上共爲細末收貯

王者更效

又方

川黃柏

兩

海藻各壹

每用五分放手心上以舌餌之一

日三五次卽消生頸上

者更效

又方

黃藥子

十兩

好燒酒各一斤共入瓶中封

口用糠火煨一週時

或鑄內蒸半日亦可

將瓶放冷水中過七日後

每日隨時少少飲之務使酒氣不斷無論生在何處皆效

如神飲後時時照鏡消卽勿飲飲多恐頸項細小也黃藥

子又名黃藥以江西萬州產者爲佳廣西慶遠府亦有

肉瘤

每夜將睡時用新熟熱飯敷上冷則另換每晚連敷三次久而自愈凡新起肉瘤如小彈子者治之屢見功效

不可輕視

血瘤

甘草熬膏用筆蘸圈瘤四圍又用 芫花 大戟 甘遂等分爲末醋調另用新筆蘸塗於甘草圈內務須離甘草一寸不可太近蓋藥性相反切勿悞相攪和塗後次日瘤當縮小再如前法塗三四次卽愈愈後須請名醫服藥消散以免復發

粉瘤

用蜘蛛網纏住瘤根次日又換新蛛絲再纏約換四五次
則瘤俱消內有結實小白粉用手取去不腫不痛又方
天花粉壹兩陳壁土五錢穿山甲一錢川貝母各參錢共爲
末和勻糁膏藥上不論
何處貼之卽穿出粉渣而愈

漏瘤

時出黃水好而復發癢不可忍查腿部臙瘡白油膏方治
虱瘤

此瘤其癢徹骨破開有虱無數內有極大一虱用針挑盡
外貼玉紅膏見瘧毒
諸方自愈

腋下癰瘤

長鞞音霸壺蘆燒枯研末油調敷以消爲度一人腋下生瘤如長壺蘆樣久而破爛用此敷之出水消盡而愈

肉核

真烏梅去核燒存性研末搽數日即消 又方 生蘿蔔

皮貼之連貼數次卽愈如再不愈照陰疽門惡核方治之

又遍身肉出如錐痛而且

癰方見卷十六奇病門

疣瘻又名瘊子拔之則絲長三四寸

姜汁和好醋時時搽之有人生疣瘻屢治屢發照此治之三日斷根 又方 地膚子 白礬 煎湯洗數次卽消

立效 又方 松香 柏樹枝上油和勻敷之過夜卽落

又方 苦菜折之有白汁山點之自落 又方 牛口涎
時時塗之卽落

肉癰 小黑者是

用針挑破以鹽水泡石灰點之卽消

血癰

初起如癰色紅漸大如豆觸破時流鮮血用 黃鱠音善血
同蒜汁好墨汁頻塗之血出甚者內服涼血地黃湯



癰毒雜治

癰毒宜戒

一戒走泄 凡患癰毒紅腫潰爛或已生管無論久近大小最忌走泄真元如有遺精及房事不謹醫治最難見功必先將遺精病症醫治全愈仍令夫婦分臥蓮戒房事然後按方施治自易收功

一戒污穢 凡大癰惡毒一經汚穢腫痛更甚難以收功婦女產後及行經時切戒近前以免污穢若婦女自患癰疽瘡癧遇行經時醫治鮮效必俟行經後始能見功
一戒煙罨 諸瘡有煙罨一法瘡雖易愈然毒盡歸腹定

成鼓脹難治惟神燈照法不忌

一戒沐浴 凡溼熱諸瘡膿血淋漓或癢或痛莫不以沐浴爲快然浴則溼氣更重難以速痊惟有溫泉之處不忌
毒氣攻心

凡患瘡毒心中難過或欲嘔吐或神昏不語此毒氣攻心也急用護心散見癰毒諸方時時服之服至大半嘔止神清再服醒消丸見同前以平其勢護心散如製不及急服白沙糖三四兩亦可 又方 瘰蝦蟆破開蓋心口上亦妙無
癩蝦蟆用鷄亦可終不如蝦蟆之妙

瘡痛不寐

有人遍身生瘡疼痛手足尤甚並粘着衣被不能安睡用
菖蒲二三斤晒乾爲末移臥席上仍以被蓋臥且不粘衣又能得
睡五六日卽愈 又方 大蒜膏糞坑土見避毒諸方 均效

瘡癢難忍

金銀散

專治惡瘡癢極

硫黃

壹兩

入銅器內在燈火

上溶化

切忌放火上及火爐上

加頂上銀硃

五錢攬勻離火倒油紙

上候冷研極細

如香灰細不好醋調敷其癢立止如破爛

孔內癢極者用白蜜調此藥敷之神效

白花膏

專治惡瘡癢極見骨者

香油

壹斤

青槐枝

壹

假陸續入油熬極枯黑去槐枝瀝盡渣加黃蠟

兩半

鉛粉

兩半離火微溫再下 製乳香 製沒藥

製法見藥物備要門

白花

蛇

無則用烏梢蛇亦可

兒茶

各參錢

白花

潮腦

壹兩

真麝香

壹錢少

共研極

細末加入攪匀成膏浸水中三日拔去火氣再聽用以上

二方乃林屋山人秘法如一時製藥不及切忌手抓用鹽

連瘡頭薄薄敷之已破者用鹽敷於四圍

又方

皂角

要整片的

火上烘熱熨之卽止已破者艾葉煎濃

湯洗之甚效

瘡自走動

硃砂

壹塊

研末取倒回虫數條共放手心研如泥敷瘡上

卽時收回原處倒回虫多生舊瘡甚鹹土中穴如蠅蟻穴

其虫倒行名爲倒回虫撒土尋之自見此方傳之西域老僧屢試屢驗

趕移瘡毒

移山過海散 治毒生於致命處用此移於無害部位甚效 雄黃 小麥麪 新鮮蚯蚓糞共爲末用好醋調勻漸漸敷於致命處半邊自能移過不致命處

移毒散 凡毒發於骨節間用此藥移之或上或下使無

殘疾之患屢試屢驗 白芨青兩錢六錢紫花地丁八錢烏雞骨

煅硃砂 雄黃 輕粉各壹錢 五棓子一錢 大黃貳錢 猪牙

皂角八分 共爲末用好醋調敷毒之上截卽移至下半截

仍照人虛實內服藥餌

趕毒散

又名沖和散

凡大腿內外及兩膝貼骨等處漫腫無

頭皮色不變微覺酸痛攀曲乃感受風溼所致若不急治
變生貼骨等症難以收功須用此藥祛寒逐溼透出外絡
提移他處出毒卽有成管成漏亦能逐漸收功此方與移
毒散相等屢用皆效

紫荆皮

五兩炒

赤芍

貳兩炒

香白芷

壹兩

晒乾切

獨活

壹兩五錢

石菖蒲

壹兩五錢晒

以上其磨爲末

乾切忌火炒

節細以好酒和葱頭五個煎滾調搽不必留頂一日一換

以消腫不痛爲度

瘡毒腫痛不破

隔皮取膿法 凡患瘡毒腫脹不穿疼痛難受而患處難
以用刀或畏懼開刀者俟膿熟時用 驢蹄皮 壹兩要腳底剔下者
用砂 蕎麥麪 壹兩 草烏 四錢去皮研 共爲末和勻加食鹽五錢
水糊作薄餅瓦上炙微黃色再研細以醋調攤紙上貼之
其膿水從毛孔而出或瘡旁好肉之處自會穿破出膿最
爲奇驗

又方 公老鼠糞 兩頭尖者是 和紅糖搗融敷卽破口出膿而
愈極效 又方 蠶蛾繭 卽出過子之繭 一個燒灰存性用酒
調服瘡頭自破切不可多用如用二三個卽生二三口矣
又紅膏藥代刀散咬頭膏 均見總治毒諸方 俱效

瘡口出血

蟻螂

查藥物備要便知

燒枯研末用油調搽極效此孫真人千金

方也

又方

飲眞麻油一大鍾甚妙眞菜子油更佳或

用黃芩

酒炒

一二錢煎服亦可

瘡肉飛落

此因艾火炙瘡痂落瘡內肉片如蝶飛出痛不可言是血
肉俱熱怪症也 朴硝 大黃各五錢爲末水調服一泄
卽愈體虛忌服飲眞麻油一碗並用吳萸末醋調敷腳心

瘡生努肉如飯如菌

黑龍丹 治一切惡瘡怪毒因擠膿用力太過以致弩肉

突出小或如飯粒大或如梅如菌翻花紅赤久不縮入此
名毒根乃損傷氣脈使然人多用降藥爛去其痛異常體
弱難受且爛去復生經年累月終不痊愈用 大熟地切片
烘乾炒枯壹兩真烏梅肉炒成炭叁錢烏梅多有以李假充用之不效必以自製爲佳 共研勻
碾極細繆膏藥上不論何項膏藥貼之不過三五日弩肉自收用
收口生肌藥完功屢試神效凡陰虛脫肛諸藥不效者用
此丹以防風升麻各一錢煎湯調搽立卽收上再服補腎
之藥後不再發亦奇驗也永戒食鵝

又方 先用平安餅貼上再以陽和解凝膏見陰疽諸方 加上
貼之無此膏不可貼亦可一日一換輕者二三日重者六七日不癢

不疼毒根自落較前方更佳貼餅時內服千金托毒散俟
毒根落後服保元四物二湯收功

平安餅 真烏梅肉壹錢輕粉五分和研不見粉亮爲

壹錢

五分

研末候冷敷之不加陽和解凝膏亦可或只用烏梅肉燒存性

研末候冷敷之過夜卽愈更爲捷速

又方 馬齒莧燒枯研末以猪油調敷輕者甚效

永戒食鵝

瘡中生管

退管丸 廟宇內陳年舊琉璃底叁錢麪皮辰砂小飛人

另炒透

另研人

指甲 麵皮真象牙末各壹錢

另炒透

五分

退

壹錢五

製乳香

製沒藥

製法見藥物備要

枯礪各八分

各研細末

共和勻用黃蠟三錢鎔化

入藥攪勻乘熱作速作丸如棗豆大初服十粒逐日漸加一粒加至十六粒以後不必再加酒送下患上身者加川芎六分患下身者加牛膝六分遠年者服一料全愈近年者半料收功雖患至二十年者亦效屢試如神忌食葱與有管之物百日並戒走泄杳前癰毒宜戒便知

又方 鱉甲炒爲末麻油調敷其管卽出甚效管生年久者其功稍遲 又方 京城礦砂膏貼之淺者七八日卽出深者半月卽出無論久近皆效

瘡中生蛆

此方先用濃茶洗淨再用麻油腳汁敷上甚效

諸瘡因蒼蠅飛聚而生蛆者用寒水石細末移之
不細移上作痛如無蒼蠅而生蛆者係陰溼所化也
用海參燒枯研極細末移之或用皂礬飛過爲末移之其蛆卽化爲水
極效

諸物入瘡

驢馬汗入瘡或毛或尾入瘡或聞駢馬汗氣而發者同治急宜刺出紫血以真
烏梅嚼爛塗之若腫悶發熱則宜防毒入腹以致不救急
用真菜子油或真麻油飲之或用醋酒煎馬齒莧飲之盡
醉爲效但莧性寬滑凡瘡潰未合氣血未復而又受以汗
毒必量人壯弱用一兩或五錢切勿太過或用護心散金

蟾散

見翫毒諸方

治之

粟米梗燒灰淋汁洗之出盡

白沫卽愈極效

又方

冬瓜皮曬乾研末敷並熬湯

洗之

驢馬糞入瘡

照驢馬汗入瘡各方施治或用蝦蟆散紅膏藥

見同上

各方更妙

竹木刺及雜物入瘡

用蟾螂散

見銅鐵竹木刺入內門內

或紅膏藥均效

瘡口堅硬疼痛

宜興縣愁出音多苦寒小腸

凡瘡毒久不收功瘡口堅硬疼痛名曰翻花起肛取癩蝦

蟆

目紅腹無八

破腹刺數孔

連腸雜用

蓋瘡口輕者日換一次

重者日換兩次內服醒消丸

見癰毒
諸方

止其疼痛每服三錢

陳酒送下倘口硬孔深取生牛蒡子草連根

無則取紫花
地丁嫩草亦可

搗爛敷之其效如神

宜興馮悠也

右足背連小腿彎

處初起不過瘡毒而成爛腿三十餘年瘡口四圍堅硬小

腿與足腫如斗爛孔可容大拳有時出血所流臭漿滿室

難聞自以布包如磚一塊以填孔內否則空痛時年七十

有四雍正六年延余治余以老蟾

即癩
蝦蟆

破腹蟾身刺數孔

以腸雜填入孔內蟾身覆蓋孔外每日煎葱椒湯俟溫早晚各洗一次換蟾再貼內用醒消丸早晚二服三日後取

生牛蒡子草

又名大
力子草

及生紫花地丁草搗爛填孔外仍以

醒消丸早晚與服瘡口皮中有清水出以洞天嫩膏加五
美散敷內有發癰者以白花膏貼之內有塊硬如石者以
生商陸搗爛敷之因胞內常有血出先以三七末撒入次
用生紫花地丁生牛蒡各葉根搗爛填入如此二十餘日
腫消瘻上而硬口及硬塊皆平皮色退黑內肉鮮紅瘡口
亦收小平淺以五寶散撒上因老翁精神不衰飲食不減
始終不補收功此林屋山人經驗秘法也

瘡毒潰爛不堪

凡諸瘡潰爛不堪難以收功者用洞天救苦丹見瘡毒諸方每
服三錢陳酒送下蓋被取汗隔兩日再服一次再隔兩日

再服一次所空隔之日以醒消丸見同 每日一服服後毒

水流盡七日後再服醒消丸兩次接服大棗丸見同

每日

各進五錢最危險者可奏奇效此林屋山人經驗方也

又方 拔毒法

見陰疽
諸方

連敷數日漸漸平愈或用蝦蟆散

見後 敷滿瘡口亦可或用玉紅膏見後 亦效

又前瘡口堅硬疼痛各方應參看

瘡不收口

與後瘡愈復發各方參看

一切瘡毒久不收口內必有虫照後各方治之必愈如再不愈瘡內必有細骨照多骨疽各方治之若百藥不效者恐是中邪用乾狗糞白色者燒烟熏之或流毒水或出別

物自愈

石灰水 整塊石灰一觔放盆內以清水八觔燒滾傾入
盆內待石灰化開用棍攪勻候水澄清將水輕輕傾出別
器石灰不用再用細布濾清收貯瓶內聽用凡瘡毒日久不能
收口或不能生肌量瘡大小剪新白布一塊浸入水內一
刻卽起卽貼患處俟一二時辰再換一塊一日換二三次
數日收功神效莫測此西洋秘方也

地龍水 白頸蚯蚓又名地龍不拘多少放磁碗內加白
沙糖一把蓋好一二日化成清水挑少許入瘡內數日收
口 又方 蟑螂一條焙乾爲末麻油調敷數日收口止

驥方 卷之二
痛如神

又方

鱉甲瓦上焙枯存性研細末繆之卽收

口生肌神效之至

又方

鯽魚破去腸雜用羯羊糞焙

枯填滿魚肚瓦上焙枯爲末乾摻上瘡口自收有人生發

背瘡口深大不能收口照此治愈

又方

龍眼肉

男用女人口嚼女用男人口嚼先須將口漱淨務使融爛成膏

貼上無論久近皆效

又方

當歸一枝以香油熬枯研

爲細末用真生香油調勻填入瘡口漸長漸愈而且止痛
神效 又方 五棓子焙枯研末好醋調勻攤布上貼之

用細布糊紙壹層以免出氣

神效

又方

鉛粉繆上卽愈有人耳下

生瘡瞼血淋漓數年不愈後用此方三日收口

又癰毒

諸方內凡生肌收口諸法均極效驗內水仙膏蝦蟆膏
蟆散蜈蚣膏更有奇功又腿部白油膏亦神效也 又瘡
口堅硬疼痛見前及瘡愈復發見後各方均應參看

瘡愈復發

有人頭上生瘡好而復發名千層瘡不能斷根後用鮮橄
欖核燒灰和雞蛋油見製雞蛋油法擦之永不復發各項瘡
毒時愈時發者或亦可治 又有人兩足生瘡冬月則愈
夏月則發臭爛疼痛久不斷根一道人云是蛇毒用 活
蝦蟆搗爛敷之日換三次後見一小蛇在瘡中取出而愈
又生瘡出水好而復發不能收口恐是蟻毒照癰毒諸

痘門螞蟻毒方治之 又瘡形如蜂窠者亦時愈時發照
癰毒諸症門蜂窠瘡治之

瘡毒腹脹如鼓

此名瘡鼓由患瘡疥熏罨之後其毒歸腹而成宜戒沐浴
用 白僵蠶 紅棗各四五錢先用水煮棗一二滾取棗湯將
僵蠶洗淨將棗去皮核搗爛取淨肉二兩以僵蠶晒乾爲
末二兩共搗爲丸仍用紅棗湯送服服完全愈倘鼓脹危
急不及待藥與服用大活蟹四五隻約重一斤餘蒸食飲酒蓋暖
睡下半日後身上發瘡更甚而鼓全消然後將瘡治愈夫
瘡鼓死症也瘡可易愈也 又方 鼓脹如不能愈照卷

五鼓脹門內蝦蟆巴豆方及病後浮腫蝦蟆方治之必效

增補治諸瘡毒久爛收口驗方

先用豆腐渣絞乾水數處拔淨膿水後

再用此

藥貼之

甘石

六兩

龍骨

四兩

赤脂石

參兩

白蠟

貳兩

黃蠟

貳兩

黃丹

貳錢

五分

掃盆

貳錢

枯礬

壹錢

上

四六冰片

五分

共研細末

磁瓶貯

存黃蠟

封固

凡有瘡毒潰爛

日久不收口者

或常出膿流

水量瘡口

之大小酌用

公猪生板油

些微搗藥用油紙攤

貼患處先煎陳茶

銀花薄荷艾葉

甘草各等分水洗淨瘡

口後隨貼之每日早晚各揭開看一次卽用藥水洗淨瘡口若揭下藥上見有膿輕輕刮去將原藥刮攏如瘡口大

照原貼上此藥初貼一二日換一次後則三四日方換藥
一次倘上此藥半月二十日仍不收口宜加珍珠五分放
豆腐上煮三柱香久螃蟹鬚三錢和入藥內搗和勻照原
用公猪生板油搥貼卽愈預先煎就桃仁紅花歸尾薄
荷荆芥防風蟬退銀花大黃黃柏黃芩黃梔子連翹赤芍
甘草各等分水俟煖甘石龍骨赤石脂三味七次將上藥
水淬七次

水淬七次

癰毒諸方

隔蒜灸法。一切癰疽腫毒惡瘡初起卽用此法使毒氣解散用藥施治亦易見功輕者灸過卽愈。

大蒜頭

去皮又名老蒜切片如三文錢厚無蒜用煮熟雞蛋白或生姜亦可究竟不如蒜好

大則約用壹分豆子大

安瘡頭上用艾一團

小則如豆子大

於蒜上燒之

蒜壞另換若難辨瘡頭先以溼紙貼瘡上先乾處卽是瘡頭或有十數頭生一處將蒜搗爛貼瘡頭上鋪艾燒

之艾火不論次數或十數次數十次或百餘次總以痛者燒至不痛不痛者燒至痛惟頭不宜灸宜向足三里穴

穴在膝下三寸腿骨外兩筋內

灸多者宜先服護心散見後

防火毒入內 一陰瘡色白不痛又不作膿或頑瘡久
不收口灸之最妙倘灸後血出不止手冷欲絕者照癰
毒雜治門瘡口出血各方治之一痘疔毒氣使諸痘
不能起發或麻木疼痛安蒜片於痘疔上灸之毒隨火
散若紫血出後腫痛不止者尤當用灸 一跌打損傷
破口傷風牙關緊閉腰背反張命在頃刻攤蒜於傷處
多灸更灸百會等穴立甦 一凡蛇蝎蜈蚣以及瘋犬
咬傷各毒攤蒜於傷處鋪艾多燒之至不痛爲度拔出
其毒以免內攻 本草綱目載史源記蒜灸之功云母
氏背脾作癢有赤暈半寸白粒如黍用蒜片艾火灸二

七壯其赤隨消次日有赤暈流下長二寸舉家歸咎於
灸後用艾火灸四旁赤處每一壯燼則赤隨縮入數十
餘炷赤暈收退至夜則大焮滿背比曉色黑腫高三四
寸上有百數小孔調理而安蓋腫者毒外出也小孔多
毒不聚也色黑皮內壞也非艾火出其毒於壞肉之裡
則內逼五臟而危矣

隔蠟灸法

治一切癰疽腫毒發背對口等瘡甚效

先看毒聚處水調麪作圈依腫處大小圍圈高寸餘實
貼皮上勿令滲泄本人安身勿動圈內鋪極好黃蠟片
屑上以炭火灸至黃蠟溶化毒淺者皮上覺熱痛不受

灸便止毒深者全不覺熱痛再下黃蠟隨化隨添至圈滿仍前熱火灸至蠟沸初覺癢後覺痛久之不可忍乃去火以少水微澆滾蠟上俟冷揭去蠟近皮者俱帶青黑色此毒隨蠟拔去淺者一二灸便內消深者三四灸亦立解或瘡口雖破而皮尚堅硬膿未出者不必用刀針惟灸之膿出腫消或膿出而瘡口潰爛者卽於瘡口下圈再灸蠟氣從口而入愈深愈妙

桑木灸法 治一切癰疽疔瘍並治療癰流注頑瘡久不愈者俱有神效

乾桑木 劈碎紮作小把燒燃一頭吹熄持近患處灸

之每灸片時日三五次以瘀肉腐動爲度大抵未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘毒生肌肉若陽症腫痛或重負如山用此法出毒水卽內消日久者用之雖潰亦淺且無苦楚陰疽不起者一灸卽起豆豉灸法 法一切癰疽旣潰不斂瘡色黑黯

淡香豆豉壹升入熱水搗成泥照瘡大小作餅厚三分安瘡上鋪艾灸之但使溫溫覺熱痛急去之患當減快一日灸三次如瘡有孔留孔勿覆剝艾其旁灸之聽其出膿爲妙

葱懸法 治虛怯人肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲

經絡肢體疼痛或四肢筋攣骨痛又治流注及婦人乳
吹乳癰及便毒初起

葱白 捣爛炒熟布包熨患處冷則易之再熨再易之
數次腫痛卽止而愈永戒食龜肉

葱蜜膏 治無名腫毒初起腫痛尙未成膿者極效

葱頭 灰麪 白蜜各等分搗融烘熱敷之

糯米膏 凡腋肋臂膊腰腿等處忽如火熱腫硬如石痛
不可忍百藥不效者一二次卽愈

熱糯米飯少加葱與鹽共搗融敷過夜卽鬆或用熱糯
米酒糟亦可其渣務傾魚池或入河內

神燈照法

治發背對口乳癰乳巖魚口便毒及一切無

名瘡毒不論已成未成已破未破破者尤妙

明雄

硃砂

真血竭

沒藥

各一錢

麝香

貳分

共爲細

末用綿紙裹藥捲成燃約一尺長每燃入藥三分以真

麻油潤透燒燃離瘡半寸許自外而內周圍緩緩照之

瘡毒隨藥氣解散不致內攻初用三條漸加至五七條

瘡勢漸平又漸減之每日照一次重者不過六七次大

畧腐盡新生卽不必再照外貼膏藥內服托裏之劑收

功凡陰瘡不能起發又頭面等處難用艾灸者用此照

之有起死回生之力真神方也

麻油飲

治癰疽疔瘻一切大毒

真麻油

壹觔

砂鍋內煎數十滾傾出兌酒二碗隨口熱

飲一二碗少頃再飲急則一日飲盡緩則分二日飲無

有不愈打獵者凡中毒藥急飲麻油藥毒卽消其效如

菜油飲

治發背對口乳癰疔瘻及一切無名瘡毒重症

陳久菜子油三大杯一時飲盡並以菜油煎葱白至黑色趁熱圍塗患處止痛而愈

護心散

凡患疔瘻及一切大癰大毒神昏嘔吐此毒氣

攻心急用此藥服之神效

葵豆

研成粉壹兩

乳香

五錢用炒枯去心同炒

去心不用

壹錢分

燈心炭

用活竹一

段留兩頭節中開壹眼以燈心填滿竹內眼用竹塊塞緊加泥封好放穀壳火內燒至竹成一炭取竹內燈心用參錢共研末用甘草一兩煎水送下分數次服輕者卽

愈重者再服醒消丸

見後

以平其勢或用蝦蟆拔毒法

見後更妙

又方 飲真麻油一大杯

真芥子油亦可

或用白

沙糖三四兩開水調服亦可

瓜蒂散

治癰疽大毒及一切無名惡症並治乳巖

陳年老南瓜蒂燒成炭酒沖服再用麻油調此炭敷之立愈如治乳巖每服瓜蒂炭一個重者四五次立愈幸

勿泛視

菊花飲

此乃治療毒聖藥有起死回生之功凡對口發

背一切無名紅腫熱毒亦極神效陰疽色白平塌者用
白菊花葉連根用搗取自然汁一茶鍾滾酒沖服用酒
煮服亦可不如生汁爲妙毒重者多服蓋被睡臥出汗
其毒自散並用渣敷患處留頭不敷無葉用根無根用
藥店中乾白菊花四兩甘草四錢酒煮溫服亦可

水仙膏 治對口發背乳癰魚口便毒及一切惡毒無論
已破未破均極神效凡懸癰及諸瘡久不收口者立能
止痛生肌百發百中

水仙花兜用黃糖紅沙糖亦可和搗如泥敷之此物鮮者平
時難得乾則力緩須存放陰溼之處不可入土以備急

鳳仙膏

治對口發背魚口便毒及一切無名惡毒並癰

癰初起其效如神

鳳仙花

俗名指
甲花

速根洗淨風乾搗取自然汁入銅鑄內

忌鐵器

不用加水儘原汁熬稠敷患處一日一換諸毒初

起雖腫大如碗二三次卽消已破者勿用

芙蓉散

一切癰瘍疔瘻熱毒皆治瘡色白者勿用

秋芙蓉葉或生研或乾研加蜂蜜調敷周圍留瘡頭不
敷乾則隨換或取汁和酒飲之更妙初起者卽消已成
者易穿已穿者易敷或用花或用根皮俱奇效再加真

赤小豆末

查藥物備要便知

錢其效更速但無蜜則粘緊難揭

馬莧膏 治瘡毒日久體小不止腫痛不已次有神效初
起未久敷之反不見功

馬齒莧

又名瓜子菜

搗爛厚敷數日卽愈

大蒜膏

治惡瘡腫痛叫號不眠

獨頭蒜數顆搗爛麻油拌和厚敷瘡上乾又換敷毒消
痛止無不神效

肥皂膏

治一切無名惡毒

生肥皂

去子弦與筋

搗爛好醋和敷立愈不愈再敷奇驗無比

赤荳散

治一切瘡毒未成卽消已成卽愈

真赤小荳

查藥物備要便知

十九粒爲末加野荳麻根末和

雞蛋白調敷一日一換

大戟膏

治一切惡瘡及疔毒痛不可忍者其效如神不

痛者敷之亦愈陰疽尤屬相宜

真紅芽大戟

查藥物備要便知

用整枝的溫茶洗淨去心嚼融

敷之立刻止痛而愈再發再敷收功暫時藥汁不可吞下

遠志膏

治一切癰毒初起屢試神驗

遠志肉

貳兩去心

酒煮搗爛如泥敷之用油紙隔布扎定過

夜即消

銀花飲

治對口發背魚口便毒及一切無名腫毒大有

奇功

忍冬藤

即金銀花藤

生採五兩忌鐵器搗爛加甘草節一兩

同入砂罐內水二碗慢火煎至一碗入無灰酒一碗再
煎十數沸去渣分爲三服一日夜服盡重者一日二劑
以大小便通利爲效再將藤上花葉摘取一把搗爛少
入白酒調塗四圍中留一孔洩氣

糞坑土

治發背及諸惡毒瘡疼痛

糞坑土

治發背及諸惡毒瘡疼痛

石灰散

治一切瘡毒無論已破未破並治跌打損傷無

不奇效

石灰

要陳一年者
愈陳愈妙

韭菜各等分於端午日午時或六月

六日同搗極爛爲餅陰乾凡遇一切瘡毒或乾敷或油
調均可

松香散 治小兒胎毒並蠟梨頭瘡及男婦一切溼瘡有
人施送四十餘年神效無比

老松香炒貳兩黃丹壹兩微炒鉛粉五錢炒淨勿留鉛氣真青黛壹兩白
礬貳兩入頭髮少許同燒以枯爲度其研細末溼則乾敷乾則用麻油
調搽

牛牙散 治一切癰毒大瘡初起並治蠟梨頭瘡及腳丫

破爛神效

取已死黃牛門牙數枚以三錢爲度將牙燒紅浸醋內

燒三次浸三次研末候冷如病人有一斤酒量者用酒二斤將牙灰冲入飲之蓋破睡一夜卽出大汗次日全消或腹瀉再用敗毒散服之立愈初起三日內俱可治活人無算若治蠟梨禿頭瘡並腳子爛多年者用真麻油或雞蛋油見後調敷

牛糞散

治溼熱諸瘡毒水淋滴久不收口並小兒痘瘡破爛百藥不效者用此如神

黃牛糞炒熱敷冷則隨換數次卽愈且無疤痕

取糞面上尖頭用

雞腰膏

治小兒胎毒及頭面耳前耳後一切溼瘡並羊

鬚瘡屢試如神

大雞腰子

壹對蒸熟去皮

枯礬參共搗融加冰片

壹貳分敷之

雞蛋飲

凡腸癰發背臓毒魚口等症初起三天之內照

服一方卽行消散如毒蛇狂薈接連三服無不盡消真
神方也皮色不變者勿服

雞蛋一個傾入碗內攪勻入芒硝二錢蒸服用好酒下送

雞蛋油

此油最能殺蟲諸瘡破爛癩不可忍或不收口

者搽之大有神效

雞蛋數個整個煮熟去白用黃乾煎枯焦以滾開水半
茶鍾沖入油浮水面取出冷透火氣聽用

燕泥散

治一切熱瘡惡毒腫痛及小兒胎毒甚效皮色

不變及先白後紅者勿用

燕子窩連泥帶糞研細麻油調敷瘡色赤色者加黃柏末調敷小兒胎毒先用米湯油卽米鍋內浮面油洗淨再敷

鯽魚膏

治諸瘡腫毒潰破流膿並治腳生雞眼俱極神效乳癰及一切色白陰疽忌用

淨巴豆肉六兩

草麻子六兩

去壳

香油一斤半

蝦蟆

兩個每個
鄉人髮壹

圍

活大鯽魚五條

先將巴豆肉草麻子入油內浸三日

再將蝦蟆浸二宿臨熬時入活鯽魚其熬枯去淨渣慢火熬油滴水成珠離火傾於淨鍋內再加鉛粉二斤半

乳香末五錢不時攬動冷定爲度用時重湯炖化薄紙

攤貼

永戒食
蝦幕

蝦

幕散

治一切無名腫毒惡瘡久不收口凡陰疽鼠癧

楊梅結毒等症百藥不效者惟此最宜

硫黃

參錢貳錢
八字紋

胡椒

其研細末調勻取

癩蝦幕

壹個眼
紅膜無

者勿用將藥納入口內用線將口捆緊外用黃泥包裹

入炭火中燒之俟泥團紅透取出用碗蓋住候冷去泥

取蝦幕磨爲細末

忌器鐵

調真小磨麻油用淨鴨翎

舊筆亦可

蘸敷候瘡出毒水數日毒盡而愈百發百中寶之重之

永戒食蝦幕

蝦蟆膏

治一切無名腫毒大小瘡癰或腿腫溼氣俱貼

患處並治大人小兒食積痞塊疾身瘦肚大俱貼肚
臍上痞塊貼患處百發百中其效如神瘡毒無論已成
未成俱效

貞小磨麻油

拾兩

槐樹枝

青而肥嫩者

參尺

參寸

鉛粉

四兩

臨用

須晒極乾

過

大癩蝦蟆

壹個

癩多者佳

小則貳個

要數月前

五月

五日午時

配合

平時

預取

陰乾眼紅腹無八字文者勿用

五月

亦可先將麻油熬滚卽下蝦蟆熬枯將

渣撈起必要撈淨不然則貼之作痛次下槐枝煎枯亦

須撈淨然後下鉛粉用大槐枝二根順攬微火慢熬俟

滴水成珠爲度取起用磁器收貯

臨用攤貼若瘡毒痛

滴水成珠爲度取起用磁器收貯

臨用攤貼若瘡毒痛

滴水成珠爲度取起用磁器收貯

臨用攤貼若瘡毒痛

甚不及熬膏卽剝取癩蝦蟆皮不用貼足皮貼上皮自粘緊卽能拔膿生肌止痛聽其自落不必揭動此簡便法也終不如熬膏之妙永戒食蝦蟆又背部背癰方內及陰疽門內各有蝦蟆拔毒之法亦極效驗

蝦蟆拔毒法 治一切心腹脹悶或痧症氣閉或傷寒煩燥或發斑發疹或生癰毒氣內攻嘔吐等症俱極神效應看背部及陰疽門 **蝦蟆拔毒法**

取活癩蝦蟆一隻眼紅腹無入字紋者勿用破開去腸雜貼心坎上腹脹者並貼肚臍或取蝦蟆肝煎水服之更妙輕者不服亦可
永戒食蝦蟆

蜈蚣膏

治一切已破無名惡毒無論久近輕重貼之數

日卽能拔毒生肌有起死回生之妙並治毒蛇瘋犬及

百蟲咬傷俱極神效

大蜈蚣

長四五寸者入絲小者用蟲十條

土木鱉子

貳十個

真小磨麻油

壹斤

將蜈蚣木鱉放麻油內泡三日用文武火熬起清

烟將渣撈淨

不淨貼之作痛

加入黃丹四兩用柳枝不住手攪

動熬至滴水成珠用罐收貯浸冷水中數日拔去火毒

用時以布攤貼

紅膏藥

專治疗瘡瘍

音子卽癰

及一切無名腫毒並銅

鐵竹木瓦石入瘡入肉屢試如神

銀硃

冰飛晒
乾壹錢

草麻仁

貳錢

嫩松香

五錢

黃丹

水飛晒
乾壹錢

輕

粉

五分

其搗如泥

如治療瘡

以銀針將疔頭挑破用此

藥作

一小

丸如黃豆大安別膏藥上

不論何項膏藥

當中貼之

疔即拔出

或畏疼者不必挑破即以此膏

攤開如錢大

貼之亦可

凡無名腫毒已破未破

不必挑動均照拔疔

之法用之

自能拔毒收功銅鐵等物入瘡

入肉亦用此

紅藥一小丸加別膏藥上貼之

自出瘍

音子未破者用

此藥一小丸加別膏藥貼在最大之瘍子上

或貼羊子上

未破者用

亦貼後癢而微疼至第三日

啟去另換此藥丸與膏藥

貼上換至數次後皮自微破用瘦豬肉煮湯洗之

不用鹽

或用金銀花煎水洗亦可再換此藥丸與膏藥貼之每
二日一洗一換貼至數日瘍子之根卽粘在膏藥上矣
根淺者易出
根深者功緩出後仍用肉湯洗之其餘鄰近未破之瘍
子仍用此藥丸與別膏藥貼在已破出之瘍子原口照
前治之可以一一從此而出如未破瘍子相隔尚遠或
有筋膜隔住卽在未破之處貼之俟各瘍子拔盡另用
生肌膏藥貼緊數日收口而愈此藥初貼稍覺作痛煩
燥亦屬無妨宜忌發物勿受風熱爲要

白膏藥

治一切無名腫毒並小兒胎毒黃水溼瘡功能
拔毒生肌屢試神驗凡溼瘡無皮紅肉現露日久不愈

者更效

頂上蘆甘石

以輕能浮
水面者佳

炭火內燒三五炷香久研末攤

地上一日冷透

火氣用生豬板油和勻搗融攤貼

綠膏藥

又名紫
霞膏

治諸色頑瘡溼痰溼氣並新久杖傷及

一切無名腫毒未成卽消已成卽破卽愈又瘍音
子卽癰初起未成者貼之自消已成未破者貼之自破

已破其根核尙存者貼之核自拔出其效如神

松香

壹斤入葱管內煮兩日夜取放冷水中扯拔數百
下再煮壹個時辰不用放葱取放冷水中再扯拔

百餘次爲度

真小磨麻油

銅綠各四

先將麻油熬

起清烟加入松香熬至將要成膏再加銅綠熬至滴水

成珠用罐收貯浸水中拔去火毒用時薄攤紙上加頂
上牙色梅花冰片二三厘研極細移膏上貼之不細貼
之作痛

綠雲膏

治鱗拱頭時發時愈者並治療瘡已破膿尙未
盡及一切無名腫毒貼之立能拔膿散毒消腫止痛屢
試如神

真麻油

參兩以草麻子四十九粒入麻油內熬枯製松
子不用要淨渣不淨貼之作痛製松

香膏

藥製法八兩照上綠

大猪胆汁

參個

銅綠研細

先將松香放

銅鍋內火上鎔化再下各藥熬勻搗千餘下烘融放水

中用手扯拔百餘遍愈拔其色愈綠收瓦鉢內用時以

油紙攤貼若治蟬拱頭毒用細布攤貼一次全愈不必再換此毒多屬陰症膏內所用諸胆大不相宜而用之屢著神效或不盡爲陰症也

綠蠟膏

治已破一切無名腫毒日久不愈者敷之數日

即能生肌收功百發百中

黃蠟

六錢

白蠟

四錢

銅綠

五錢

真小磨麻油

貳兩

先將

麻油熬至滴水成珠再將各藥加入攪勻熬一二滾用罐收貯浸水中拔去火毒用紙攤貼少刻膠粘爾紙起去再換日換數次自愈

黃明膏治對口發背魚口便毒及一切癰疽腫毒未成

卽消已成卽拔膿生肌最爲神效此人世傳秘方也

牛皮膠

壹兩

入銅器內好醋和煮用筷子時時攪動煮

好加鉛粉黃丹各二錢攪勻收入罐內放水中拔去火

毒用布攤貼

紫蘆散

治小兒胎毒肉赤無皮或膿血淋漓及胎中受

父母楊梅瘡毒並治婦女爲丈夫梅瘡所過結毒之氣
漸至陰戶肛門腫硬破爛膿血不乾疼痛不止此藥搽
之最妙如小便將藥衝出須要勤搽漸漸自愈極驗如

神若毒勢重者務加配珍珠

七分

西牛黃

叁分

其效更速

輕白蘆甘石

壹兩

煅淬入黃連汁內再煅再淬共三

次又煅淬入童便內再煅再淬共四次厚

川黃柏

七錢以猪胆汁塗炙七次

紫甘蔗皮

五錢燒存性取淨末

粉口兒茶

五分

錢菜豆

研末七錢

赤石脂

五錢煅

項上梅花冰片

五分研細

末另用真麻油二兩入鷄蛋黃一個煎黑去黃候油冷透一日調此藥敷上自能止痛而愈油不冷透搽之反

作痛也

銀青散

治男子陰頭生瘡腐爛疼癢女子陰戶兩旁生

瘡溼爛腫痛發癢並治小兒痘疤腫爛並痘後餘毒不

清滿頭黃泡等瘡用此皆效

白螺殼

取牆頭上泥火煅存性取淨末

兩

橄欖核

火煅有性研

取淨末貳錢

頂上牙色梅花冰片

臨用時有藥

貳錢配冰片

寒水石

另研極細取淨末

貳錢

項上牙色梅花冰片

臨用時有藥

貳錢配冰片

壹其研勻以磁瓶盛貯勿使出氣臨用時以麻油調搽
溼處乾搽神效無比

玉紅膏

治一切癰疽發背對口大毒腐去孔深洞見膜

膈者用此填塞瘡口自能生肌長肉收口誠外科聖

藥也

當歸

貳兩

白芷

五錢

紫草

貳錢

甘草

壹兩

用真麻油壹

觔將前藥浸五日煎至藥枯瀝淨渣將油再熬至滴水

成珠下血竭細末

四錢

攬勻再下白蠟

貳兩

溶化離火

微冷再下輕粉

四錢

待成膏蓋好放水中三日拔去火

氣聽用愈陳愈佳凡瘡口深陷以新棉花蘸塗此膏

之

塞

金素丹

又名黃靈丹

治一切癰疽大毒發背對口腰疽臂

癰腐肉黑暗死肌堅硬臭穢難聞用此繆之膏藥蓋上
過夜卽周圍裂縫與好肉分界膿流肌活黑色轉紅疼
痛稍緩其腐肉自化自脫不用刀鉗剪割並無穢氣神
效無比凡牙癰潰爛齒欲脫落用此亦效

生白礬

六錢

枯白礬

叁錢

明雄黃

壹錢

共研極細篩過

再碾千餘下愈碾其色愈美裝磁瓶內臨用取出勿使
染塵凡去腐肉儘可用之若新長肉上繆之要痛片刻
一見膿水溼氣卽不痛矣如良腐間混須先將金花散
繆好肉面上再用金素丹繆腐肉止自不痛也否則其
痛難受

金花散

治爛腿臙瘡連年不愈臭爛不堪並治一切癰

癰瘡毒功能去腐生肌

熟石膏

壹斤
極細

飛淨黃丹

壹兩

和勻再篩再研用真香

油調搽上蓋油紙一日一換不可用茶水洗如有膿水流開隨用藥敷水流之處以免爛開若婦女一見月信雖愈復發發後再搽自有功效

洞天膏

治一切紅腫熱毒癰瘡其效如神此林屋山人

經驗方也以下十七方皆同

先用壯年頭髮

壹觔

菜子油

叁斤

入鍋熬至髮枯去渣

聽用再用活牛蒡草

又名大
力草

生菊花連根

活蒼耳草

連根

生金銀藤

生馬鞭草

又名龍芽草

生仙人對半草

各壹斤各草如雞尋覓少壹貳樣亦可尋

入菜子油

十兩

熬至草枯瀝淨渣

再加

白芷

甘草

五靈脂

當歸各半斤

入錙熬至

藥枯瀝盡渣俟油冷將前熬頭髮之油合共稱過効

每油壹効用炒透黃丹

七兩

入油內攬勻再熬熬至滴水成珠以不粘指爲度離火冷透收貯聽用

洞天嫩膏

治遍腮及小兒遊風丹毒並治紅腫癰癤初

起尙未作膿者均極效驗

照前製法每効油內入炒透黃丹

四兩

熬黑收起聽用

不必熬至滴水成珠以嫩爲度太稠則不嫩也

洞天救苦丹

治乳癰乳巖及瘰癧破爛神效

露天有子蜂窠

無子不效

雄鼠糞

兩頭尖者是佳

青皮

苦棟子

立冬

後者各放新瓦上焙存性各等分研末和勻每服三錢

陳酒送服隔兩日再服不可日日連服也

醒消丸

治療瘡及一切大熱癰毒腫痛不已立能消腫

止痛乃療癰之聖藥也孕婦忌服

製乳香

製沒藥

各壹兩

製法見藥物備要

麝香

三分

雄精

五錢

共研細用黃米飯壹兩和搗爲丸如粟米大晒乾

忌火

每服三錢熟陳酒送服蓋被取汗爲妙

三黃丸

治懸癰紅腫並熱毒大癰楊梅結毒火毒疼痛

等症孕婦忌服

熟大黃

參兩磨汁酒

製沒藥

製乳香各一兩

製法見同上

雄精五錢

麝香

犀牛黃

各參錢

共爲末和大黃汁搗融爲丸如梧

子大

每服五錢

子大

每服五錢

黃柏

各一錢

大如針

止血各兩

五通丸

治大癰生於緊要穴道將欲大發之時服此甚

效如與三黃丸間服更妙

廣木香

五靈脂

麻黃

製乳香各一錢

製沒藥共爲末

各等分

用飯搗和爲丸如梧子大

每服五錢另用

川

芎

當歸

赤芍

連翹

甘草半錢

煎湯送下

五寶散

用此生肌藥屢用有效

甲以靈

正靈丹

人指甲五錢用紅棗去核包甲以長髮五錢將棗捆紮

同象皮簿片五錢放瓦上炭火內炙溶成團存性加射

香七分

止冰片

各分

共研細如香灰收貯聽用

珍珠散

香治口瘡牙根紅腫實火喉痛各症每用一二分

吹入神效

黃柏

川連

兒茶

人中白

項上牙色

真硼砂

雄精

川連

兒茶

人中白

項上牙色

梅花冰片

薄荷

黃柏

各壹錢

大破珍珠

五分

各研極

細末

如香灰細不細

搽之作痛

和勻收入磁瓶不可洩氣

神仙棗

凡生瘡毒日久體虛瘡極重者內服外敷大有

奇效

紅棗

貳斤

銀花

歸身

各壹兩

甘草

叁錢

殭蠶

白芷

乳香末

五倍子

黃芪

各五錢

水六碗煎半倒出再如

前煎半共煎湯六碗去藥留棗再煎分作四五日連棗

與湯喫完全愈

愈瘡棗

治與神仙棗功同

紅棗

叁斤

豬板油

壹斤

陳酒

叁斤

共入砂鍋內煮乾加水

叁斤

煮至半乾時時取食食完瘡愈若暑天分作數日

食

大棗丸

專治諸瘡潰爛久不收口大有神效

山羊糞晒乾炒成炭存性磨成細粉用大棗去皮核搗如泥再入前粉搥成丸每用四錢黑棗煎湯送服

山達散

治瘡毒潰爛不堪內腑止隔一膜者撒上立見

奇功

大活鱈魚壹條破腹去腸雜以山羊糞塞滿魚腹放瓦

上慢火焙乾存性加麝香壹錢研極細如灰收貯聽用

代刀散

治瘡毒腫脹疼痛服此卽破

皂角刺

生黃芪

炒各
壹兩

生甘草

乳香

各五
錢

共爲末每

用三錢酒服

咬頭膏

專治瘡毒腫脹不破甚效

銅綠

松香

製乳香

製沒藥

製法見藥物備要

杏仁

生

木鱉

研末

草麻子

去壳各
壹錢

巴豆

貳錢不
去油

白砒

壹分
共搗

成膏爲丸如棗豆大每用壹粒放瘡頭上另用不拘何項膏藥蓋上破卽用茶洗淨分別症候另用藥治孕婦胎前產後忌用

紫藥

專治瘡毒紅腫作痛極效

蕎麻子

去壳

搗如泥鋪舊絹上

照瘡毒大
小鋪之

又取一絹蓋

上然後繫瘡毒上拔毒止痛惟紅腫非常者用之痛止卽去凡皮色不變陰疽並孕婦胎前產後忌用以上

共十五方均林屋山人屢試屢驗方也

小文真火氣
毒

麻藥 凡割毒瘡或取箭頭鎗子敷之麻木不痛

川烏尖

草烏尖

生半夏

生南星

草撥

各貳錢半蟾

酥貳錢

胡椒

細辛各五錢

共爲細末酒調搽

又方

公麻雀糞者是

尖而鑿

胡椒

各七粒

研末燒酒調敷

藥線

治齒上生踞並癰瘍癰頂大蒂小之症及尾脊

之處生尾突出神效

芫花

蠶錢壁錢

要有一子者壹錢卽壁上蠶

白絲細綿

錢

半用水一碗慢火熬至水乾爲度取線陰乾小者用線一根大者用線二根繫蒂根上雙扣捆紮留出線頭每日漸漸收緊

仙方活命飲

專治一切癰疽初起一服卽消已成易潰

此外科之良方也

穿山甲

參大
片炒

皂刺

分

防風

七
分

貝母

生甘草

乳香

沒藥

焰去油

花粉

白芷

各壹錢

陳皮

去白半錢

歸尾

各錢

銀花

各藥用淡陳酒三茶鍾煎好溫服瘡生上身飯後

服瘡生下部空心服

降癰活命飲

治一切無名腫毒無論陰症陽症初起能

益氣和血解毒托裏破後能排膿去腐生肌長肉瘡科

始終之聖藥功在仙方活命飲之上產後生癰毒者

更妙

大當歸

八錢

生黃芪

金銀花

各五錢

甘草

參錢

酒煎膿

汁服服後睡臥出汗即愈

毒在上加川芎

貳錢

在中

加桔梗

貳錢

在下加牛膝

貳錢

泄瀉加蒼白朮

各貳錢

嘔

吐惡心加陳皮半夏

各一錢

不思飲食加白朮

各一錢

陳皮

一錢

氣虛加黨參生芪

各五錢

陰疽肉白色淡無論冬夏加

陳皮麻黃

各六分

肉桂泡姜

各半錢

斷不可妄行加減

排

膿加白芷

各三錢

欲破加皂刺

各半錢

黃芪湯

治搭手發背對口癰疽及一切大小無名腫毒

未成者散已成者潰已潰者易收口輕者一服重者兩

服全愈此方得自仙授大有功效小兒減半孕婦忌服

生黃芪

歸身

甘草

白芍

穿山甲

各五錢

上部加

川芎

五錢

中部加杜仲

五錢

下部加牛膝

五錢

各藥用淡陳

酒

一茶碗水一碗煎至一

碗熱服避風蓋被煖睡汗出

卽愈未出汗時忌一切冷熱湯水汗出一時後不忌

托裏解毒湯 治一切紅腫癰毒

金銀花

參錢

當歸

五錢

生芪

三錢

花粉

連翹

黃芩

赤芍

各錢半
五分已破者不用

大黃

牡蠣

生甘草

各壹錢

枳壳

捌分

梔刺

分皂刺

子金內托散

治同上

白黨

生芪

各四錢

防風

厚朴

川芎

各錢半

白芷

桔梗

桔梗

當歸

各錢半

肉桂

生甘草

各壹錢

水煎服

四物保元湯

白芍

酒炒半錢

川芎

名錢半

生地

白黨

生芪

各五錢

當歸

錢五錢

當歸

錢 炙草 壹錢 水煎服

保元湯

肉桂

貳錢

生芪

四錢

生甘草

壹錢

水煎服

四物湯

治同上

白芍

酒炒

川芎

各錢

生地

生芪

各錢

當歸

白芷

各

錢雲苓

台黨

各

參

五味

入分

肉桂

六分

水煎服

二陳湯

治同上

橘紅

五錢

半夏

白芥子

研各

雲苓

錢半

甘草

壹錢

水

煎服

黃連消毒飲

治喉外生癰並治耳疔俱效

黃芩

黃柏

防已

藁本

桔梗

各五分

防風

知母

獨活

連翹

生地

歸尾

各四分

黨參

甘草

各三分

蘇

木

陳皮

澤瀉

各二分

羌活

壹分

黃連

壹錢

生黃芪

貳錢

水

煎食遠溫服

化堅二陳丸

治眼胞癰核甚效

陳皮

製半夏

各二兩

生甘草

川連

名叁

白僵蠶

貳兩

白茯苓

兩半

共研細末

荷葉熬濃汁爲丸如梧子大

每

服二錢

白滾水下外用生南星和醋磨濃汁擦之

橘皮竹茹湯

治一切瘡毒已破胃火上逆氣衝時時呃逆身熱口渴唇焦此熱呃也服之最效

橘紅

竹茹

各貳錢

生姜

黨參

各壹錢

黃連

入分錢

柿蒂

七

個

水煎空心服

摩風膏

治面上或身上風熱浮腫癢如蟲行肌膚乾燥時起白屑次後極癢抓破時流黃水或破爛見血痛楚難堪此膏抹搽十日必愈屢試如神此風熱作癢第一

方也

麻黃

五錢

羌活

壹兩

升麻

壹錢

白檀香

白芨

防風

歸身

各壹錢

用香油

五兩

將各藥浸泡五日慢火熬枯去

藥用紬瀝盡渣加黃蠟

五錢

再熬數滾啟起冷透火毒

聽用

二味拔毒散

治一切毒蟲咬傷無論腫痛瘻癰敷之卽

止其效神速

雄黃 枯礬

各等分爲末先用姜汁洗淨用茶調敷

貝葉膏

治對目發背魚口一切潰爛癰毒與腿部白油

膏功同屢試神效

淨麻油

壹斤

亂髮

雞子一個

大將髮入油中以文火熬化去

渣再入白蠟二兩鎔化用紙浸油內取起再浸再起以油盡爲度紙要張張隔開放在風前冷透一日用貼患處少刻膿粘滿紙日換十餘次數日膿盡生肌

蘆薈散

治諸瘡毒水淋漓不乾並治坐板瘡甚效

馬刀瘡

蘆薈

壹兩

甘草

五錢

共研細末先用店中做豆腐之水洗

淨將藥敷上數日即愈此西域老僧方也

生軍散

治一切未破大小火熱瘡癤紅腫焮痛神效此

葛仙方也

生大黃

好醋磨汁敷乾則隨換皮色不變者忌用

礬蠟丸

此托裏消毒固臟腑止疼痛妙藥凡一切癰毒

潰爛之後最宜服此若腸肺生癰及遍身生瘡狀類蛇

頭者更有排膿托裏之效

白礬

參兩研細末

黃蠟

貳兩

先將蠟鎔化離火加入礬末攪

勻用多人趕急撲作丸如桐子大遲則堅凝難撲每日

服一百九分三次空心酒送下忌食雞三月
皮金膏 治撲跌擦損或鞋底墊傷脚板或刀傷破爛紅
腫光皮潮溼或瘡癩將愈新肉易破或疼痛腫爛皆效
廣東羊皮金紙 以金而貼傷處三日必愈聽其自落
爲妙或用包銀硃白金紙亦可其功稍緩

梅花點舌丹 治疔瘡及紅腫癰癤一切無名熱毒初起
並實火牙疼喉痛喉蛾喉風口舌諸瘡又治小兒急驚
風俱極效驗若慢驚風及陰疽陰虛口舌牙喉等症萬
不可用孕婦尤忌服

製乳香 製沒藥物製法見藥備要 真硼砂 明雄 真熊胆

真血竭 莖薢 真沉香 項上梅花冰片

各壹錢

麝香

要當門子硃砂

各貳錢

犀牛黃

各貳錢

以上其爲細

末另用真蟾酥

貳錢

以人乳化開和勻搗融作五百丸

如大萊豆大金箔爲衣蟾壳收好每用一丸入葱白內打碎酒送服睡臥益破癰取汗三個時辰毒消而愈或

敷亦可

蟾酥丸 功與梅花點舌丹同孕婦忌服

真蟾酥

貳錢

輕粉

酒化

銅綠

胆礬

枯礬

寒水石

煅

製乳香

製沒藥

物

製法見藥

備要

雄黃

各壹錢

麝香

七分

硃砂

參

錢

蠍牛

貳十壹個有壳

者是

各藥於端午日午時

若要急用

隨時可製

在淨室先將蝸牛研爛同蟾酥和研稠粘再入各藥搗勻爲丸如菉豆大每服三丸用葱白五寸病者自己嚼爛吐入手心男用左手女用右手將藥丸裹入葱內用陳熟酒一茶鍾送下蓋被睡臥約人行五六里病者出汗爲度重者再服一服必效如若外用將丸作餅隨症用之修合時忌婦人雞犬見

萬應紫金膏此膏能治百病凡男婦大小瘰癧痰癰對口發背乳癰魚口便毒瞼瘡熱癆手足腰背疼痛閃挫傷損及一切無名腫毒俱貼患處哮吼喘嗽貼心窩膈刺貼瞬眼百發百中功效無窮

赤芍

當歸

紅花

黃芩

防風

荆芥

連翹

黃柏

僵蠶

蟬蛻

白芷

甘草

胎髮

大黃

銀花

蜈蚣

川鳥

草鳥

羌活

蒼朮

細辛

川椒

秦艽

乳香

沒藥

骨碎補

首烏

蛇牀

子

木鱉子

大風子

生南星

生半夏

以上各用五錢

用

豬油 麻油 桐油 各半觔 將前藥浸入油內 如春夏天浸三日 秋冬浸七日 倾銅器內 文武火熬至藥色焦黑 取起 濾渣 再熬加炒黃丹十兩 用槐枝不住手攬動 熬至滴水成珠 再加白蠟五錢 隨卽取起 用槐枝攬勻 收入瓦罐 浸水中 拔去火毒 用時以布攤貼 文火炭火也 武火 大火也

毒陰疽

陰疽論名

與癰毒門 瘡疽論參看

王洪緒曰陰毒之症皆皮色不變然有腫與不腫者有痛與不痛者有堅硬難移有柔軟如綿者不可不爲之辨矣腫而不堅痛而難忍者流注也腫而堅硬微痛者貼膏鶴膝橫痃骨槽等類也不腫而痛骨骱麻木手足不仁者風溼也堅硬如核初起不痛者乳巖瘰癧也不痛而堅形大如拳者惡核失榮也不痛不堅軟而漸大者癰瘤也不痛而堅堅如金石形大如升斗者石疽也此等症候盡屬陰虛無論平塌大小毒發五臟皆曰陰疽如其疼痛者易消

重按不痛而堅者毒根深固消之不易則治之尤不容緩也

陰疽治法

王洪緒曰初起之形寬大平塌根盤散漫不腫不痛色不明亮此陰疽最險之症倘誤服寒涼其色變如隔夜猪肝毒攻內腑神昏卽死夫色之不明而散漫者乃氣血兩虛也患之不痛而平塌者毒瘀凝結也治之之法非麻黃不能開其腠裏非肉桂炮姜不能解其凝結此三味雖酷暑不能缺一也腠裏一開凝結一解氣血能行行則凝結之毒隨消乃一定而不可移之法後列陽和湯陽和膏犀黃

丸小金丹諸方均爲陰疽要藥照方治之萬無一失如若

增減定無功效

又曰小孩如患各種陰疽不能服藥初起以小金丹化服至消乃止如已成膿亦須日日服之可使不痛而穿俟毒去盡用保元湯見癰毒門加肉桂五分水煎日服收功

又曰凡患一應色白大小等疽忌用洞天膏又膏藥熬太嫩者貼則寒凝愈結又膏藥有巴豆草麻萬不可貼貼則被其提拔成功每見橫痃乳巖貼至致命孕婦貼則墮胎凡諸陰疽潰後宜貼陽和解凝膏爲妙

陰疽諸症

石疽

初起一核漸大如拳堅硬如石急以陽和湯犀黃丸每日早晚輪服可消如遲至大如升斗者仍如石硬不痛日久現出紅筋則不能治若生斑片潰爛在卽潰後卽放血三日而死若現青筋可治內服陽和湯外用活商陸根搗爛加食鹽些少敷之數日作瘡半月皺皮日敷日軟有膿袋下垂以銀針穿破用千金托裡散加熟地生芪各一兩煎服十劑後用陽和解凝膏貼上空出針穿之眼膏外用布捆繫務使皮膜相連內服十全大補湯或保元湯參芪俱生用服至收功爲止

各方見後如毒氣未盡忌服補劑此林屋

出入秘法也

又方蛇皮貼之亦效

惡核

大者稱惡核小者痰核與石疽初起相同然其寒凝甚結
毒根最深却不易潰未潰之前忌貼涼膏忌服涼藥內服
陽和犀黃丸可消亦有以大田螺搗爛敷塗消之者大忌
開刀如已開刀瘡口堅硬卽照癰毒雜治門瘡口堅硬疼
痛各方治之仍內服溫補托毒消瘀之劑犀黃丸儘可收
功屢試神效丸內有麝香孕婦忌服各方見後此林屋山人秘
法也

失榮

此患多生肩甲以上初起微腫皮色不變日久漸大堅硬如石推之不移按之不動其症與石疽相同急照石疽各方法治之

瘰癧

卽瘍子也瘍音羊

小者爲瘰大者爲癧名色甚多項前爲瘰項後爲溼瘰左右兩側形軟遇怒卽腫爲氣癧堅硬經縮爲筋癧若連綿如貫珠者爲瘰癧又有馬刀長形者是子母重台蛇盤鎖項蜂窩惠袋燕窩瓜藤痕瘍流注單窠蓮子門門及風石鼠癰癰癰卽俗云鼠瘡形名各異受病固不外瘀溼風熱氣

毒而成然必兼志音患怒忿鬪憂滯謀慮不遂而致者也初起者用烟桿中黑烟油或鳳仙膏見癰毒諸方敷之三日剖消屢試神效

凡瘰癧未破者用子龍丸見後每服三分淡姜湯送下每日三次至消乃止倘小孩不善服丸每日用小金丹一丸見後布包放石上隔布搗細入杯冷陳酒化開用銀器研臨睡以熱陳酒沖服蓋被取汗以消爲度數年內忌食香椽橙橘食則復發

凡瘰癧內有潰爛間有成膿未潰者亦有未成膿者宜服犀黃丸見後止其已潰之痛鬆其成膿未潰之脹消其未

成膿之核已成膿者用咬頭膏見癰毒貼之卽穿內服溫

諸方

補祛痰通腠活血壯氣之藥外貼陽和解凝膏見後而愈

凡瘰癧延爛至肩胸脇下不堪之極者用洞天救苦丹見

毒諸方三服犀黃丸六服此丸須隔兩日一服完丸藥後皮色變白

見癰毒

孔內紅活接服大棗丸見

諸方

肌肉漸長用生肌散收功

凡瘰癧爛至咽喉如飲熱湯外覺熱痛者乃危險至極稍遲則爛穿咽喉不救急取柴心一根量本人中指量其三

指其積一柴心上隨其長短男左女右就手之左右卽在

手下之脚骨正中骨項之處定準一直量上盡頭以墨點

記用艾圍

如豆大

燒三次

隔蒜燒

或

可以膏藥蓋住

不論何項

藥

可保咽喉不穿內仍照前服洞天犀黃大棗各丹丸外用
荆芥煎湯洗之並用樟腦雄黃研細調敷未成膿者燒之
卽消已潰爛者卽易收口以上各條乃林屋山人秘法屢
試如神萬無一失

銀勑膏 治癩癰及一切無名腫毒無論已破未破並治
腰痛俱極神效先用 真麻油一斤慢火熬開再下 銀
勑幼音四兩用桑枝不住手攬動俟清烟起時再下 黃丹
五兩熬至滴水成珠放水中一二月拔去火氣隨症用布
攤貼 又方 用銅錢一枚和蠅蛆虫卽無壳蠅牛糞融以銅化爲止敷之卽愈其效無比 又方 黑鉛參兩炒

醋和勻攤舊布上貼之一日一換半月之後不痛不破內消而愈 又方 頸好陳醋熬至滴水成珠加生半夏末

壹錢調勻敷之過夜再換兩日即消神效

又方

夏枯草

金銀花

蒲公英

各五錢

酒水煎時時當茶服之

名三妙散

治結核瘰癧

遍滿脖項服之十日即消如若再發

卽於肩頸

穴在肩端兩骨間

曲池

穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱胸取之二穴用

艾火各燒七次在左燒左在右燒右左右俱病俱燒斷根

神效 又方 元參

蒸牡礪

煅醋炒

貝母

去心蒸各四兩其爲末煉

蜜爲丸每服三錢開水下每日二服服之卽消屢試奇效

又方 凡瘻癰已破者將先破處麪糊作餅貼上用小砂

壺二個燒酒煎滾去酒以熱壺口覆於麪餅上熏瘡如拔火壺一樣壺冷再換一壺如此數次將毒氣拔盡即愈。後用猪胆熬成膏貼瘡口。奇效。又方：青黛成白玉丹。

專治瘰癧破爛連及胸腋臭穢難聞十數載不愈者藥到病起其效如神。新出窑石灰一塊滴水化開成粉用真

生桐油調勻乾溼得中先以花椒葱煎湯洗淨以此敷之。又方：荆芥要近根下壹段須向藥店買回自取爲真剪碎煎湯溫洗良久看爛破處紫黑針刺去血再洗三四次用樟腦雄黃等分爲末麻油調勻上出水次日再洗再掃以愈爲度。凡瘰癧延至胸前腋下及兩肩頸項不能轉動四五年不愈者皆治

其效如神

又方 水蠍散

大田螺

五個去壳

穿晒乾

白砒

壹錢

裹煨熟項上牙色梅花冰片

壹分

真硝砂

貳分

各爲細末和勻

再研磁瓶收貯以蠍封口不可洩氣先將癰癰用隔艾灸

法

見癰毒

灸七次候灸處起泡用小針挑破將此藥一二

釐口水調成餅貼上用膏藥蓋之

不論何

項膏藥

一日一換七

日後四邊裂縫再貼七日其核自粘膏藥而出矣癰形長

者及根大頭小者忌用並治癰頭大根小者亦效

又方 滲紅膏綠膏藥

見癰毒

未破能消已破能出拔出

根核均極神效

又方

瘻癰破爛見有黑筋如鐵線者

名鐵線瘻

音最難醫治用物鏗出筋頭緩緩扯出長二

尺或數尺不等總要筋根拔盡方可斷根

鼠癰

此症瘡口已合旁邊有眼出膿不止卽是又有頸項生之
不已復從腳底而生俗謂鼠子打洞其症尤惡用老鼠壹
去毛揭爛亂髮壹用火腿肥肉煎出油入鼠髮一個物熬至消盡
爲度以一半敷瘡眼一半酒冲服神效之至永遠戒食鼠
鷄兔肉再無後患 又方 蝦蟆散見離毒諸方 敷之極效

又方 用老貓頭骨火煅爲末麻油調搽效或用蛇音蛇
油搽之亦效 又方 白鮮皮煮汁服一二碗當吐惡物
如鼠子雖已破出膿亦效此葛仙翁方也

九子瘍

音羊

生頸上一連九個者是用雞蛋

壹個

淨水煮熟破爲兩邊

去黃以真麝香

壹分

冰片

五分

梅在瘍子上

從初

生第

將雞蛋

一邊蓋上外以乾艾一大團燒蛋外總以瘍子

壹

分

梅在瘍子大痛爲度

如痛不可忍則將艾暫除痛止又燒蛋乾又換每日夜納

燒五六次次日又換新水

麝仍用新蛋照前法燒之再用

蒲公英

夏枯草

金銀花

各貳錢

甘草節

半錢

水煎服數

劑效驗非常

落頭疽

方見頭部

遮瞼

方見面部

骨槽風

方見齒部

乳癰

方見乳部

井泉疽

方見心部

甲疽

脫骨疽

方見手足各部

背疽

方見背部

少腹疽 小腸疽

方均見腹部

多骨疽

一人疽內生一大骨用舊燒棺木底板研末紙捲燒烟熏之而愈或用乾狗糞燒熏亦妙

諸瘡出膿後久不收口內必有多骨也宜用推車散

蟇

俗名推車虫
又名推屎虫

炙研極細末每一錢入乾姜細末分要細

如灰麪入瘡孔內次日自有骨出骨盡自愈或用蜣螂腦和灰麪敷亦效此林屋山人經驗方也 又方 烏母雞

一隻去肉取生骨燒成炭再取鄰佑三家所用甌底及砧

案各刮下垢屑一兩俱燒枯共研爲細末納入瘡口其碎骨卽盡出而愈 又方 蜜陀僧研末桐油調稠攤布貼之甚效 又方 大癩蝦蟆壹個亂髮如雞蛋大圍猪油半斤熬枯去渣再熬成膏先以桑根皮烏頭煎湯洗淨用龍骨末撒瘡口四邊再以此膏貼之一日一換俟骨出盡卽愈

附骨疽

生大腿外側又名貼骨疽又名縮脚疽初起不熱不紅甚則錐痛難以屈伸轉動不便久則寒鬱爲熱熱甚作膿而無頭皮色不變漸透紅亮一點則爲內膿已成潰則收功甚難用 白芥子研末燒酒調敷或以大戟甘遂研末

白蜜調敷內服陽和湯每日一劑四五服可消消後再服
子龍丸或小金丹以杜患根大忌開刀開則定成縮脚損
疾此林屋山人秘方也

各方見後

峻骨疽

生大腿裡側治法與附骨疽同

剩骨疽

此症一名朽骨疽多生腮膀牙床眼炮頭下手足腿膀等
處其症與附骨疽大約相同亦陰症也又初生小兒身內
即有如脆骨者其人長大後是處突腫生疽潰後骨脫其
口方收 生附子爲末調作餅如二個錢厚貼瘡上以艾

絨一團四五分燒之但令微熱勿令疼痛如餅乾則再換藥餅燒之務以瘡口紅活爲度餘照附骨疽及陰疽各方治之

臘入鶴膝風

氣赤風火

著者

本草綱目卷一百一十五

通

方見腿部

本草綱目卷一百一十五

著者

本草綱目卷一百一十五

通

橫痃

梅

瘻

方

參看

又名魚口便毒又名外癰生小腹兩旁大腿縫中形如腰子皮色不變按之堅硬而微痛者是也每日用皂角刺六錢研末布袋裝好同糯米

貯

合

煮粥時時服之三四日全消或用子龍丸

見後

每服三分日服三次全愈乃止大忌

開刀開則惟出白漿三百日內而死此林屋山人秘法也
紅腫者查癰毒諸方治之內鳳仙膏黃明膏尤爲神妙
又方 五倍子新瓦上焙乾研末好陳醋調勻攤布貼之紙一層加布上加
過夜卽消潰爛久不收口貼之亦效屢試如神

流注

流注發無定處如塊如核漫腫無頭皮色不變或痛或不
痛久則破而流走是也若忽然身生疙瘩紅腫遊走名遊風丹毒與此不同不可誤認此

症毒發陰分因痰塞清道氣血虛寒凝結一日寒痰一日
氣毒初起用二陳湯見備用諸方加陽和丸同煎數服全消消
後接服小金丹七丸以免復發如皮色稍變極痛難忍者

須服陽和湯以止其痛使已成膿者不痛而破此乃以大疽變小之法如患處稍軟可用針刺破膿多白色以陽和膏貼之但此症破後毒痰流走患者不一故初破之後五日內仍服小金丹十九以免後患卽用犀黃丸陽和湯每日早晚輪服使毒痰消盡不補可必收功屢試屢驗

倘

小孩不能服煎劑者初起以小金丹化服至消乃止如已成膿者亦須日日服消可使不痛而穿俟其毒氣去盡用

保元湯

見癰毒門

加肉桂

五分

日服收功神效莫測

如係孕

婦患之當問胎懷月數倘未滿六個月犀黃丸有麝香不可

服防墜胎當以陽和湯愈之愈後再服三四劑以代

小金丹免致流走至穩至靈均林屋山人秘法也

陰疽諸方

後有增補
仙方參看

陽和湯

治乳巖失榮石疽惡核痰核癰瘍

流注橫痃並

治一切色白平塌陰疽等症此爲陰疽聖藥萬應萬靈

從無一失珍之寶之

熟地

壹兩

真鹿角膠

叁錢

上肉桂

甘草

各壹錢

炮姜

麻黃

各五分

水煎服服後再飲好酒數杯謹戒房事服至

病愈爲止無論冬夏皆宜不可妄行增減體虛極者肉桂炮姜可加一二倍用或加附子更妙又癰毒諸方內降癰活命飲亦治陰疽方內肉桂炮姜各用至錢半之

多誠以陰寒凝結非此不爲功也宜參看酌用
陽和解凝膏 治一切已破陰疽惡毒效若仙丹萬金難
得不可輕視並治瘧疾凍瘡皆效

新鮮大力子根葉梗

參勑又名牛蒡子

活白鳳仙花梗

四兩又名指甲

花用麻油

十斤

將二味熬枯去渣次日以附子

桂枝

大黃 當歸 肉桂 官桂 草烏

川烏

地龍又名

蚯蚓又名土蟻蠶

赤芍 白芷 白蘇

白芨

各貳兩

川芎

四兩續斷 防風 荆芥 五靈脂

木香

香圓

陳皮

各壹兩

共入油熬枯瀝渣過夜油冷稱過斤兩每油

一斤加炒透黃丹七兩攪勻文火漫熬至滴水成珠

越老越好以油鍋移放冷處取製過乳香沒藥末

各貳兩製

法見法製蘇合油

四兩

麝香

壹兩

研細入膏攪和半月

後攤貼一應爛潰陰疽神效凍瘡貼一夜全消潰者三

張全愈癰疾貼背心此方惟麝香最貴如無力製配熬

膏時不用俟用膏時每張加麝香數厘貼之亦可

犀黃丸

治石疽惡核失榮瘰疬乳巖流注橫痃肺癰小

腸癰一切腐爛陰疽屢試神驗百發百中之仙方也

製乳香

製沒藥

各壹兩製法

麝香

要當

犀牛黃

各參

共爲細末取黃米飯一兩搗爛與各藥末和勻爲丸如

粟米子大晒乾

火烘

每服參錢熱陳酒送下患生上部

臨睡時服下部空心服

小金丹 治流注惡核痰核癧癰乳巖橫痃及一切無名
陰疽初起屢試如神萬無一失真仙丹也內有五靈脂
不可與人參高麗參黨參同日而服

白膠香

卽楓樹油香

草烏

五靈脂

地龍

卽蚯蚓又名曲蟮

製木

鱉

各淨末一兩五錢

製沒藥

製乳香

製法見藥物備要

歸身

各淨末七錢五分

分麝香

壹錢

陳墨

壹錢

用糯米粉

壹兩貳錢煮稠和

入各藥末搗千搥爲丸如芡實大一料約爲二百五十

丸晒乾

忌火烘

磁瓶收貯以蠟封口勿令洩氣臨用取一

丸布包放平石上隔布敲碎入杯內

以好酒浸入用小

杯蓋住一二時以熱陳酒送服盡醉蓋被睡卧取汗卽
愈患生下部空心服上部臨睡服一切陰疽初起服至
消散爲止如流注等症成功將欲潰爛及潰爛日久者
以十丸分作五日早晚服之以免流走若小孩不能服
煎劑及丸藥者服此最妙

子

龍丸

卽陳無擇三因方中之控涎丹也

治頸項胸肋背腰筋骨牽引鈞

痛流走不定手足冷木氣脈不通此乃痰涎在胸膈上

下不可誤認爲風癱也並治喉中結氣似若梅核時有
時無冲喉悶絕又遍身或起筋塊如榴如栗皮色不變
不疼不痛但覺酸麻或自潰串爛流水如涎經年不愈

有若管漏此乃痰滯經絡所致又治瘰癧魚口便毒貼

骨一切陰疽屢試神效

製甘遂

製法見藥物備要

大戟

煎透去骨晒乾忌火炒

白芥子

炒各等分

爲末煉蜜爲丸梧子大每服三分淡姜湯下忌與甘草之藥同日而服此乃治痰之本痰之本水也溼也得氣與火則結爲痰大戟能泄臟腑水溼甘遂能行經隧水溼直達水氣所結之處以攻決爲用白芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用能收奇效也

拔毒法 治陰疽惡毒瘡口潰爛久不愈者神效

活潑蝦蟆

眼紅腹無入眼紋者勿用

破腹刺數孔

連腸維用

貼葢瘡口輕

者日換一次重者日換二次數日平愈
以上各方乃林屋山人歷代家用陰疽良法爲千古獨
得之秘藥到病除應手奏效真有起死回生之功古今
諸家所立陰疽各方皆不及此存心濟世者加意寶之
不可忽視

回陽玉龍膏 治一切陰疽惡毒敷之痛者能止不痛者
卽痛而速愈已破亦能收功凡遇各項陰疽如前陽和
等膏製之不及或貧寒力不能製者此膏與後真君妙
貼散皆有奇功如乳巖及各陰疽險惡之症不能收功
者仍用陽和等膏爲妥

生草烏

參兩

生姜

貳兩
煨

白芷

炒
各壹兩

生南星

各壹兩

肉桂

五錢
不見

火其爲末用頂好燒酒調敷

真君妙貼散

與上玉龍膏功同

好硫黃

參兩

蕎麥

貳兩

灰麪

壹兩

共爲細末水和捏作

小餅晒乾收之用時研細新汲水調敷破者麻油調敷
鐵熨法 治乳巖流注失榮瘰癧惡核痰核一切陰疽初

起未成者

用敲火所用鐵鎌

兩參塊

在石上敲令極熱在患處時時

輪流熨之

宜順熨
倒熨

初熨微痛久則痛止毒消無論何

項陰疽無不神效

風溼灸法 治一切陰疽初起神效

方見筋骨門

趕毒散 治腿膝貼骨等處初起漫腫無頭皮色不變微
覺酸疼或日久成管成漏等症

方見癰毒雜治門 趕移瘡毒內

陰疽治驗

王姓媳頸生瘰癧數個兩腋生惡核三個大腿患一毒不
作疼癢百餘日後日漸發大形大如斗按之如石皮現青
筋常作抽痛經治數人皆稱曰瘤余曰瘤乃軟者世無石
硬之瘤耳此是石疽陰症也問可治否答曰初起時皆可

消日久發大上現筋紋雖按之如石然其根下已成膿矣
如偶作一抽之痛乃是有膿之證也上現青筋者其內已
作黃漿可治如上現小塊高低如石巖者不治三百日後
主發大痛不潰而死如現紅筋者其內已通血海不治倘
生斑點卽自潰之證潰卽放血三日內斃今患所現青筋
醫其至軟爲半功潰後膿變濃厚可冀收功也外以活商
陸搗塗內服陽和湯十日則止一抽之痛十三劑裏外作
癢十六劑項軟十八劑通患軟其頸項之癰塊兩腋之惡
核盡行消散一無形跡止剩石疽立起內膿袋下令服參
一錢因在筋絡之處先以銀針刺穿後以刀潤其口以紙

針塞入孔內次日兩次流水斗許大劑滋補托裏刪去人
參倍增生芪連進十劑相安已極適有伊戚亦行外科道
者令其芪草換炙服不三日四圍發腫內作疼痛復延余
治余令以照前方服又服二十餘劑外以陽和膏隨其根
盤貼滿獨留患孔加以布綑綁人間因何用膏貼又加綑
綁答曰凡屬陰疽外皮活內膜生故開刀傷膜膜爛則死
所出之膿在皮裏膜外僅似空衝又不能生肌藥放入故
內服溫補滋陰活血之劑外貼活血溫暖膏藥加之以綑
使其皮膜相連易於膿盡且又易於連接生肌果綑後數
日內膿濃厚加參服兩月收功

閨門龔姓腰生一疽根盤寬二尺餘前接腹後接背不紅
不腫不痛不軟按之如木初延余治以肉桂炮姜書於方
首後另延三四名家衆視余方皆曰酷暑安可用此熱藥
大以爲非議用攻托清涼之劑連治五六日病者神昏胃
敗復延余治患仍不痛色如隔夜猪肝言語不清飲食不
進余日能過今晚再議是夜卽死不久伊戚亦患此症延
余治以陽和湯服下次日覺鬆再服疽消小半纔以犀黃
丸與陽和湯逐日早晚輪服服至第五日全愈後有背疽
相同者亦照治而愈

木瀆鎮譚姓婦背生一疽如碗初起色白後轉紅痛甚時

正參伏余以陽和湯服旁人云此暑天伺用麻黃發表及
姜桂熱藥余曰此陰症也彼云色既轉紅陰已變陽余曰
無妨服後不一時痛止接服四劑不痛而破五日收功
宜興徐姓子年歲半太陽一毒背上心劑對處二毒頸後
對口一毒腰腹二毒兩腿五毒皆皮色不變其大腿二毒
已經別醫開刀割破延余往治因孩小不能服藥用小金
丹日服二次第五日消去九毒又以小金丹日服一次並
添一乳母十日後所破二孔皆紅潤以保元湯加肉桂參
分煎一杯另水煎參六分兌服服至半月後將芪草炙過
用之一月收功

興邑路姓子年七歲項門上寸許大連生三疽潰爛久不收口孔如棋子大淺而無膿乾而色灰人倦無神飲食少進因服涼藥過多所致延余往治余曰色似香灰氣血兩盡乾枯無膿精神已絕何能治之次日而天

山塘姚姓婦年二十九小產月餘左肩手搭處先發一毒週圍尺五半月後背脊添生一毒自上至下長一尺三寸皆色白低陷十日後始請余治勢甚危險連服陽和湯三劑人能起坐五劑自能大小便十二劑以後發者全消先發之搭手四圍皆消止其項膿足不痛而穿四日收功復言背上如負一板舒轉不快以小金丹十九日服二丸全

愈

一人身患楊梅瘡又患魚口余思魚口乃陰虛之症藥宜溫補楊梅係火毒之症藥宜涼解二症相反必兩相宜之藥非犀黃丸不可令其每日空心時酒送參錢十服二症全愈後一人患亦相同因毒重二十服收功

程姓母年七十膝下患一流注陰疽潰爛數月患下及旁接連又起硬腫二塊延一醫以新發之毒認爲舊患旁腫不識流注竟以消毒之劑與服以致新發者被托發痛始延余治余以陽和湯服三劑新發二毒皆消接服小金丹十九後進滋陰溫補以杏仁散敷半月膿厚服保元湯加

肉桂十餘劑而愈

一婦頸生痰核三處年久生管余以拔管藥挿入日換一次半月已愈兩處有一處管已醫淺不意伊夫遠歸兩日管深如舊余曰此刻治定無功效俟伊夫出外半月方可收功數日後婦回母家延余往治而愈

洞庭秦卜年頸上及兩腋生惡核十二處破爛三載不愈余以陽和湯犀黃丸輪服半月十日已愈八喜甚帶藥而回路遇涼粉買食歸家又食冷水過麪次日大小便閉第五日死此其自不惜命故記以爲病者之戒

楓鎮閔姓年十七患瘰癧爛成一片延爛耳腋及腰如手

掌大者數處瘦弱異常初以洞天救苦丹服之毒水大流
十日後以陽和湯醒消丸每日早晚各服一次十日頸項
卽能舒轉飲食日增外貼陽和膏內服大棗丸始終用荆
芥湯洗以山蓮散敷九十四日收功因未服子龍小金二丸
毒根未除後腋復生惡核仍以子龍丸消之

陰疽孽報

凡落頭對口發背腰花人面等疽及一切陰疽惡毒如果
醫治無效恐係冤孽所侵偶憶王漁洋池北偶談內載歙
人胡半菴順治丙午兩膝患人面瘡延醫一百三十餘人
瀕死者數矣瘡忽人言曰汝前生將我害死今日報汝醫

何能爲詣佛懺悔可耳胡郎書誦經卷而愈他書所載似此甚夥可見虔心懺悔自能立起沉疴報應分明捷如影響急宜恐懼修省或可延年却病也

陰疽無價活命仙丹

增補

此丹通治落頭疽耳後銳毒遮腮骨槽風陰對口陰發背乳岩惡核石疽失榮鶴膝風魚口便毒瘰癧流注一切陰疽內不必服藥病重者仍服前陽和湯更妙外不必敷藥惟用此藥一丸放于心中緊緊握往用布帶將手指捆攏不緊不鬆免使藥丸移動捆至六個時辰將藥丸埋入土中不可使鷄犬悞食則死必再換一丸照前捆好日夜不斷不論如何腫痛潰爛用

至數丸自能收口生肌輕者一二丸立見功效忌食鷄鵝
魚蝦發物已愈不忌惟女色宜謹戒半年道光二十年間
京都孫姓腦後生一落頭疽百藥不效頭已下垂勢將待
斃後用此藥數日而愈又一婦人亦生此疽潰爛生蛆頭
低不起亦用此藥而愈其餘各種陰疽照此治愈不一而
足此方補造化陰陽所不及實上下古今所罕聞傳自蒙
古名醫貴重無價較之林屋山人陰疽諸方尤爲簡便神
效見者宜抄方傳佈功德無窮若藉以居奇必有奇禍

方用

項上真麝香

壹錢此藥真者最貴或三四分或五六分均可如不見效乃用壹錢爲要

火硝參錢白礬參錢淨黃丹參錢胡椒壹兩

以上共研細

末用熱蜜和爲兩丸病在左放左手病在右放右手病在中男左女右病在腰以下放脚心仍分左右中爲要孕婦忌用陰疽多屬險症必須早治方效或潰爛太甚或誤服涼藥或患處色如隔夜猪肝神色昏迷語言不清飲食少進已成敗症雖有此丹亦難見效若瘡內生蛆查癰毒門瘡中生蛆方將疽治盡一面用此丹治之瘡內有骨查本門多骨疽方將骨治盡一面用此丹治之

膏藥方

係異人傳授治背發屢見奇功第
一良方也治諸瘡毒俱皆效驗

一大生地

六兩切片

二黃芩

貳兩切片

三大粉草

壹兩錢切片

四鬱金

貳兩

五黃蠟

貳兩切片

六白蠟

壹兩

七藤黃

五錢切片

八冰片

叁錢

九牙色香

味清

幽碎小者爲佳白色大片香味

濁者係樟腦煉成切不可用

買公猪板油二觔微火煉熟去渣後按上各藥次序逐一
炸枯去渣至藤黃止俟冷定將凝凍時再下冰片末調勻
將藥缸放涼水鉢內浸之面上蓋好夜晚放外露之次早
抬回放陰涼處浸露三夜之後則退盡火氣矣先熬陳
茶艾葉甘草銀花四味洗淨瘡隨用舊棉絮或厚軟棉紙
開膏貼患處每早一換生肌一線久則自愈不可急燥真
仙方也

中興立文古錄出類拔萃不如脚注附卷全缺中醫秘傳
未印數種脉訣兩大部亦未刻書目缺首古耳目五

內外備用諸方

觀音救苦膏 此膏能治百病或貼或服應驗如神外治者用布攤貼內服者作丸如葵豆大每服七粒切不可多孕婦忌用

大黃

甘遂

研

木鱉

研

蕓麻子

研各

生地

貳兩

川烏

草

烏

三稜

莪朶

各壹錢

巴豆

研

羌活

查藥物備要便知

黃柏

白芷

各八錢

麻黃

皂角

肉桂

枳實

真紅芽大戟

查藥物備要便知

大戟

查藥物備要便知

厚朴

查藥物備要便知

杏仁

研

錢香附

芫花

厚朴

研

杏仁

研

穿山甲

查藥物備要便知

防風

天

花粉

獨活

全蝎

枳榔

研

桃仁

研

細辛

研

五倍子

元參

各七錢

蛇脫

黃連

各五錢

當歸

壹兩

蜈蚣

十條

右藥

合三十六天罡之數預先齋戒將麻油五六斤浸五日後用火熬熬藥時忌婦人鷄犬並忌污穢齋戒沐浴於淨室內供觀音大士神位默誦大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩寶號一千遍用柳棱攪勻熬至滴水成珠再加水飛黃丹二斤四兩蜜陀僧四兩不老不嫩收入磁罐放水中拔盡火氣聽用○一偏正頭風左患貼左右患貼右正患貼印堂兼捲條塞鼻孔中口含甘草湯咽之○一眼科七十二症腫病將耳上角針刺血出貼之星脹翳膜捲毛倒睫迎風流淚等症捲條左患塞左右患塞右鼻孔中常飲甘草湯○一

牙疼貼牙上○一喉嚨三十六症單蛾雙蛾喉閉喉風俱貼喉上口含甘草水如要速效開水送服七丸不可飲甘草水○一咳嗽哮喘吐痰貼前後心勿吞服○一噎隔貼胃口並服七丸○一吐血鼻血貼兩脚心並服甘草湯○一中風用磁調羹掘開口滾水灌下七丸○一鼓脹貼臍下丹田並服七丸○一癆病有虫貼背脊尾間肚腹飲甘草湯七日癆蟲盡死○一瘧疾一二三等日俱貼肚臍飲甘草湯如發過四五次者早辰時服下七丸飲熱酒數盃卽日便止○一傷寒葱白湯服七丸一汙而愈○一大小便閉俱貼肚臍飲甘草水自通

如數日不通危在旦夕開水送服七丸小腹用葱汁甘草汁調敷立下勿服甘草水。○一各種痢疾俱貼胃口肚臍四五日不愈者紅痢用荔枝壳核七個打碎煎湯送下七丸如白痢用荔枝壳核七枚打碎煎湯送七丸赤白兼者用龍眼荔枝壳核各七枚打碎煎湯送七丸○一便血腸風夢遺白濁俱貼肚臍○一痔漏內則捲條挿入外則貼之○一婦人難產逆生胞衣不下作丸熱酒送下七丸立刻便產產門小腹煎甘草水頻洗不可服○一婦人赤白帶下貼肚臍下及丹田常服甘草湯○一血塊癥疾貼患處體壯者服七丸卽瀉出矣○

一小兒驚風作條塞鼻並服七丸○一小兒諸般疳症

貼肚臍口疳貼牙牀

回生再造丸

治男婦中痰中風口眼歪斜手足拘攣言

語不清左癱右瘓筋骨疼痛半身不遂步履艱難初起氣絕者服之即可回生久病者平復如常功同再造故

名孕婦忌服

真水安息

四兩
末四

人參

貳兩

真蘄蛇

小者爲佳去骨並頭尾三寸酒浸炙取淨

當歸

兩

川芎

川連

羌活

防風

元參

以上酒炒

藿香

白芷

茯苓

麻黃

天麻

川草薢

子

姜

黃芩

以上

甘草

多

肉桂

研不首烏料豆水

水

并

白蔻仁

研不見火

西琥珀

研

黃耆蜜大黃

酒蒸

草蔻仁

研

雄鼠糞

兩頭尖

熟地

以上二十三味各貳兩

穿山甲

前後四足各用伍錢酒浸炙其貳兩

全蝎頭

足尾靈仙

酒炒

葛根

炒桑寄生

烘乾各貳兩五錢

北細辛

赤芍

炒烏藥

酒炒

青皮

麪炒於芷

土僵蠶洗

炒乳香

去油沒

藥

辰砂

骨碎補

酒炒香附

酒炒去皮毛

天竺黃

製附片

生龜板

火炙熬過者不用

沉香

母丁香

胆星

以上十七味各壹兩紅

花

酒浸烘乾

犀角尖

各八錢

厚朴

地龍多乾

松香

煮九次

木香

四錢不見火

梅花冰片

犀牛黃

各貳錢五分

血竭

八分

廣虎

脛骨

炙酥壹對

共爲末

煉蜜和勻

搗數千

搘爲丸每九重一

錢金箔爲衣蠟壳

封固每服一丸

生姜湯下

太乙紫金錠

此藥能治百病效驗如神凡居家遠出不

可無此

山慈姑

去皮洗極淨焙貳兩

五倍子

沈刮焙貳兩

千金子仁

白者研細去油壹

兩紅芽大戟

去蘆洗焙壹兩半

麝香

叁錢

以端午七夕重陽或

天德月德黃道上吉日預先齋戒虔心製藥爲末陳設
拜禱過重羅令勻用糯米濃湯和勻入木臼內杵千下
作一錢一錠病重者連服數錠瀉一二次隨食溫粥卽
止矣○治一切飲食藥毒蠱毒癰氣河豚土菌死牛馬
等毒並用涼水磨服一錠或吐或痢卽愈○一癰疽發
背疔腫楊梅等一切惡症風疹赤遊痔瘡並用溫水或

酒磨日塗數次立消○一男婦陰症傷寒狂亂瘧疫喉
痺喉風並用冷水入薄荷汁數匙化下○一心胃及一
切氣痛用淡酒化下○一泄瀉痢疾霍亂絞腸痧用薄
荷湯下○一中風中氣口緊眼歪五癲五癇五邪鬼胎
筋攀骨節痛並緩酒下○一自縊溺水心頭溫者冷水
磨灌下○一傳尸癆瘵涼水化服取下惡物虫積爲妙
○一久近瘧疾將發時東流水煎桃枝湯化服○一婦
女經閉紅花酒化服○一小兒驚風五疳五痢薄荷湯
下慢驚忌服○一頭風頭痛酒研貼兩太陽上○一諸腹鼓
脹麥芽湯化下○一風虫牙痛酒磨塗之亦吞少許○

一打撲傷損松節煎酒下。一湯炮火傷毒蛇惡犬咬
傷並冷水磨塗仍服之。
青金錠 治男婦風痰瘓厥牙關緊閉不能開口難以服
藥並乳蛾不能言者以及小兒驚風痰迷將此藥一錠
取井水磨開將藥滴入鼻孔卽進喉內痰卽吐出立刻
得生效驗如神

元胡索 貳錢 **青黛** 六分 **牙皂** 大蠟十
壹分 再研清水調成錠每錠五分陰乾用

平安萬應丸 此卽唐棲痧藥治法見後孕婦忌服

茅山蒼朮 米泔水浸軟切丁 **丁香** 不拘公母六錢 **麝香** 參蟾酥各一
片焙乾參兩

甘草

去皮炒熟

大黃

切片焙熟

明天麻

切片焙乾

麻黃

去節細剉

黃

研細兩四錢水飛

硃砂

研細水參兩六錢

共研細末

糯米漿爲丸如梧

桐子大硃砂爲衣磁瓶裝貯以蠟封口不可洩氣每服三丸日久味薄者或加倍服亦可。一瀉痢以滾水送下三丸立止如神。一寒暑痧脹肚疼頭眩眼黑以三丸放舌尖上閉口候舌微麻咽下。一受寒受暑痧脹甚重絞腸肚痛心口閉悶不省人事以三丸研細吹入鼻內再以三丸放舌尖上候少頃溫水送下如不愈再用卽愈。一中寒中暑痧脹吐瀉手足厥冷並吐瀉不出先以三丸研末吹入鼻內再以三丸放舌尖上候微麻咽

下如昏迷不能咽下卽研末溫水灌下卽愈。一山嵐
瘴氣夏月途行空心觸受穢氣口含三丸使邪氣不能
侵入。一感冒風寒惡心頭痛或肚腹飽脹及風痰等
症以三丸放舌尖上微麻咽下卽愈。一胃口疼痛氣
痛以三丸放舌尖上微麻咽下卽愈。一鼓脹膈隔以
三丸放舌尖上微麻咽下卽愈。一癰疽疔毒蛇蝎蟲
諸虫咬傷俱以數丸研末好酒調敷卽愈。一小兒急
驚風牙關緊閉不能服藥以四五丸研末吹入鼻內卽
醒隨以三丸溫水調灌卽愈若慢驚風萬不可服。一
跌打至死驚死熱死麅魅氣悶至死瘞厥冷厥等症凡

有微氣急以數丸研末吹入鼻內灌口可望復醒遇自
縊之人勿割斷繩輕輕解下卽以數丸研末吹入鼻內
若胸口畧有微氣者皆可活也

金絲萬應膏 治一切風寒溼熱手足拘攣骨節疼痛男
子痞積女人血癥及腰痛諸般疼痛結核轉筋頑癬頑
瘡積年不愈腫毒初發楊梅腫塊未破者俱貼患處肚
腹疼痛瀉痢瘧疾俱貼臍上痢白而寒者尤效咳嗽哮喘
喘受寒惡心胸悶脹悶男婦面色痿黃脾胃虛寒等症
及心疼俱貼前心負重傷力渾身拘痛者貼後心與腰
眼諸疝小腸氣等症貼臍下無不神效

木香

川芎

牛膝

生地

細辛

白芷

枳壳

秦艽

獨活

防風

歸尾

大楓子

黃芩

南星

羌活

半夏

赤芍

貝母

杏仁

草麻子

白斂

蒼朮

艾葉

川烏

內桂

良姜

續斷

兩頭尖

連翹

甘草節

藁本

丁香

青皮

藿香

烏藥

荆芥

蘇木

元參

僵蠶

桃仁

山梔

紅花

牙皂

威靈仙

苦參

茅香

文蛤

蟬蛻

草烏

蜂房

鱉甲

全蝎

金銀花

麻黃

白芨

大黃

青風藤

以上各

貳兩

蜈蚣

貳條

白蘚皮

五加皮

川山甲

降真節

骨碎補

蒼耳頭

以上各

蛇蛻

參兩

桃榔榆

有微氣急以數丸研末吹入鼻內灌口可望復醒遇自
縊之人勿割斷繩輕輕解下卽以數丸研末吹入鼻內
若胸口畧有微氣者皆可活也

金絲萬應膏 治一切風寒溼熱手足拘攣骨節疼痛男
子痞積女人血瘕及腰痛諸般疼痛結核轉筋癩癬
瘡積年不愈腫毒初發楊梅腫塊未破者俱貼患處肚
腹疼痛瀉痢瘧疾俱貼臍上痢白而寒者尤效咳嗽哮
喘受寒惡心胸膈脹悶男婦面色痿黃脾胃虛寒等症
及心疼俱貼前心負重傷力渾身拘痛者貼後心與腰
眼諸疝小腸氣等症貼臍下無不神效

木香

川芎

牛膝

生地

細辛

白芷

枳壳

秦艽

獨活

防風

歸尾

大楓子

黃芩

南星

羌活

半夏

赤芍

貝母

杏仁

草麻子

白欵

蒼朮

艾葉

川烏

內桂

良姜

續斷

兩頭尖

連翹

甘草節

藁本

丁香

青皮

藿香

烏藥

荆芥

蘇木

元參

僵蠶

桃仁

山梔

紅花

牙皂

威靈仙

苦參

茅香

文蛤

蟬蛻

草烏

蜂房

鱉甲

全蝎

金銀花

麻黃

白芨

大黃

青風藤

以上各
貳兩

蜈蚣

貳條

白蘚皮

五加皮

川山甲

降真節

骨碎補

蒼耳頭

以上各
壹兩

蛇蛻

參兩

桃榔榆

槐桑棟楮

七色樹枝各
貳尺壹寸

各藥切爲粗片用真麻油十二

斤浸藥在內夏浸三宿春五宿秋七宿冬十宿方用火
熬以藥枯油黑爲度去藥瀝淨滓貯磁器內另以片子
松香不拘多少先下淨鍋鎔化後方加藥油量香二斤
用油四兩試水軟硬仍瀝入水缸中令人抽扯色如黃
金卽成膏矣每製一料計膏七十觔約用銀數兩量攤
中大膏藥一萬有餘可濟數千人所費者少所濟者衆
此膏功效如神屢用不爽蓋不止於百試百驗矣

萬應神麴糕

此麴能搜風解表開胸快膈調胃健脾消

積進食解酒止瀉利水並治四時不正之氣感冒發熱

頭眩咳嗽及傷食腹痛痞滿氣痛嘔吐泄瀉痢疾飲食
不進不服水土等症大人每服參錢小兒壹錢多則錢
半水煎服外感發熱咳嗽癰疾嘔吐俱加生姜同煎泄
瀉加真烏梅同煎痢疾大人用四五錢小兒用二三錢
加陳茶葉同煎效驗非常屢試不爽此福建泉州府秘
方也

前胡 大黃 良姜 蒼朮 巍朮 防風 姜黃
山楂 柴胡 厚朴 紫蘇 豆蔻 葛根 槟榔
苡米 黃芩 荆芥 麻黃 青皮 使君子 甘草
黃柏 百合 梔子 薄荷 羌活 陳皮 蒲黃

扁豆

杏仁

車前

砂仁

澤蘭

獨活

木香

益母草

麥芽

烏藥

桔梗

荊子

腹毛

猪苓

茯苓

王稜

芡實

草菓

半夏

懷藥

木通

枳實

藿香

建瀉

香茹

菖蒲

黃連

木瓜

香附

枳壳

小豆

花椒

以上各四兩共爲細末

又用鮮青蒿四觔

鳳尾草貳觔

蒼耳草叁觔

大

蓼草貳觔

小蓼草叁觔

以上五味同煎濃汁

又

用小麥十五觔

洗淨畧蒸晒乾酒麴粉六兩

五月五日

或六月六日

或七夕重陽

或天德月德黃道吉日均可

製配臨時先將藥與麴粉同拌勻入草藥水拌揉作成

塊子外用荷葉包好以些麻扎緊上籠蒸一個時辰取出
難涼三四時以冷爲度裝入桶內一層稻禾草一層
神麴蓋密須十二天取出晒過月餘極乾然後刷去荷
葉再露七夜晒七日乾透收藏聽用每月亦須晒數次
以免霉壞

金剛丸

專治腎虛骨瘦不能起床服此神效

草薢有紅點者佳杜仲姜炒去絲肉蔻酒洗去鱗甲焰乾兌絲上各等分共爲細末用酒煮猪腰子搗爲丸桐子大每服貳錢
大還丹此丹水火兼補服之壯元陽暖丹田益精神飲
食加增筋力強健百病不生功效難以盡述

淫羊藿

剪去邊尾羊油炒十兩

地黃

灌泡九蒸酒浸十貳兩

金櫻

去心毛破故酒浸

紙

酒浸酒透各八兩

仙茅

酒透各八兩

當歸

酒浸六兩

石斛

酒浸各六兩

菟絲子

酒洗

玉麥冬

去心炒八兩

白菊花

各四兩

杜仲

鹽水炒六兩

肉苁蓉

筋膜去

酒洗

龍山萸肉

酒浸酒透各四兩

枸杞子

酒浸四兩

萸肉

續斷炒各三兩

青鹽

壹錢

巴戟肉

藜

炒砂鍋各四兩

沙苑蒺藜

炒續斷各四兩

遠志

水炒各四兩

石菖蒲

炒各三兩

天

白茯苓

牡丹皮炒四兩

小茴香

酒浸四兩

楮實子

酒浸四兩

覆盆子

酒浸四兩

天

酒浸懷牛膝

酒浸遠志肉各四兩

遠志肉

甘草炒各四兩

澤瀉

炒各四兩

石菖蒲

炒各三兩

天

冬

晒乾參五錢

北五味

炒貳兩

葫蘆巴

酒浸貳兩

核桃肉

壹兩

名胡桃

腰子

十貳個

羊腰子

十貳個

各藥磨成細末

末將腰子切開以

桑塞滿繩縛定放蒸籠內蒸熟晒乾連腰子搗成細

末用白蜜六七斤煉熟和藥爲丸如梧子大每早晚用
貳參錢淡鹽湯送下腰子內藥末以塞滿爲度不必盡
入其中也

彭祖接命丹 此丹最能添精補髓固精不泄善助元陽滋潤皮膚壯筋骨理腰膝下元虛冷五勞七傷半身不遂或下部虛冷膀胱氣痛脚膝酸麻陽事不舉男子服之行走康健氣力倍添奔走如飛女人服之能除赤白帶下血崩兼通二十四道血脈功效無窮難以盡述

何首烏

白茯神

赤茯苓

菟絲子

去灰淨

牛膝

當歸

破故紙

覆盆子

以上每味十兩

不犯鐵器

用石臼杵爲細末煉蜜調黃酒爲丸如梧桐子大每服貳錢空心黃酒送下早午晚進三服七日後每服叁錢忌服芸薹卽油菜廣西呼爲菜花 茄子油卽油菜子油 蕃蘿蔔

無價保真丸

治一切勞損諸疾服至六月面目光潤半

年後返老還童飲食房事無異少年百病不生冬月手足不冷夏月身體不熱男子鬚髮不白婦人能多生育
益精補髓功效無窮

九製熟地

忌鐵

全當歸

酒浸貳

川芎

酒浸炒

杜仲

姜汁炒去

絲壹

白茯苓

人乳拌蒸

甘草

酒炒

金櫻子

酒沒去毛子

金

兩半

白茯苓

壹兩半

甘草

壹兩

金櫻子

壹兩

石斛

參兩酒製

淫羊藿

去邊梗鹽炙

或

以上各藥俱用項好

燒酒製惟服藥不拘何酒杜仲另研爲末同各藥末加入生白蜜共搗一千杵丸如桐子大每服參錢空心服酒下昔四川一刺史年方壯患五勞七傷四肢無力沈困瘦軟面目無光交合之時陽痿不舉下元虛冷夜夢遺精得此方合藥未及服而病卒有院工戈禹年七十六亦患此症卽以此藥與之服至十日舊症若失每夜房事不絕後戈禹以淫行被主處死折骨視之果然骨髓充滿方信此藥效驗

延壽丹 此方久服添精補髓健脾養胃烏鬚延壽體健身輕返老還童中陽復興少陽復起痔漏瘡毒服之卽

愈能調婦人經水緩下安胎專治赤白帶下妙不可言
治藥時忌婦人僧道雞犬見並忌食牛馬肉此方內可
皮當歸
加熟地棗

更妙

姜升

姜升

姜升

微

白术 土炒 青皮

生地 厚朴

炒

杜仲

姜升

故紙

炒

廣皮 去澤 白川椒

青鹽 黑豆

貳升

巴戟肉

去心

白茯苓

炒

小茴香 肉蓴蓉

竹刀剖淨鱗黃酒洗晒乾

以上各壹兩製好入銅

鍋或砂鍋亦可用

水二十小碗

桑柴文武火煎至十小

碗將水盛出復煎藥渣用水十小碗煎至五小碗去渣
不用惟用兩次藥水十五碗將黑豆放鍋內用火緩緩
煎至水乾盛起俟冷入磁罐裝貯每早空心服參錢開

水送下不可間斷婦人受胎之後不可再服恐受雙胎

蒸臍補氣散此藥治氣虛體倦肚腹畏寒下元虛冷等

症極效

五靈脂

夜明砂

枯礬各一兩

共爲細末分四包存貯

聽用每逢春分秋分夏至冬至先一日用溫水避風先
將臍眼洗淨納麝香五厘於臍內將蕎麴爲圈烘微溫

安臍上用藥一包鋪圈內以斬艾茸作團每團重壹分

或六七釐放藥末上用香火燒燃若干歲卽燒若干團
燒完用蕎麴作餅蓋圈上俟藥冷緩緩取下忌茶七日
麴圈深寸許橫逕一寸六七分麴餅如圈大如無蕎麴

卽麥麯亦可久久行之不可間斷受益無窮切忌婦女
經手相傳恐非良藥土制藥命醫醫難不忌茶日日
陰虛無上妙方藥末一撮香火搗搗苦干細嚼散于口
天一生水命曰真陰真陰不能制火以致心火上炎而
慾肺金咳嗽者火刑金吐痰者腎水虛泛而爲痰如鍋
中之水熱甚則騰溼也豈區區草木之功所能濟哉必
須取華池之水頻頻吞嚥以靜治於無形然後以湯丸
佐之庶幾水升火降而成地天交泰之象耳主方在呑
津液華池之水人身之金液也敷佈五臟洒陳六腑然
後注之於腎而爲精腎中陰虧則真水上泛而爲痰將

並華池之水一擁俱出痰愈多而肌愈瘦病誠可畏今處一法二六時中常以舌舐上腭令華池之水充滿口中乃正體舒氣以意用力送至丹田日復一日數十乃止此所謂以真水補真陰同氣相求必然之理也每見今之治陰虛專主六味地黃等味以爲滋陰壯水之法未爲不善而獨不知於本源之水取其點滴以自相灌溉是舍真求假不得爲保生十全之計此余諱諱爲是言也衛生君子尙明聽之

天乳膏

血虛火旺消補兩難者服此神效

人乳

男用女胎乳

藕汁

白蜜

甜酒原汁各等分同

煎加童便熬至滴水成珠每日空心服半盞病深者多
服全愈若服寒涼藥則不效

來復丹 治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水霍亂嘔
吐不止六脈隱伏如無遍體冷如冰鐵飲湯難受姜附
熱藥難投急服以此丹立效如神

太陰元精石

取龜背形者佳研細水飛各壹兩與硫黃同研爲末放磁碟內微用火炒用

五靈脂

黃土黃

各壹兩與硫黃同研爲末放磁碟內微用火炒用柳枝攪匀火勿太過再研細末

洋硫

陳皮

去白各貳兩

青皮

先將陳皮青皮研細末再入硫黃
硝石元精石各末再研于餘下好醋煎滾爲丸如梧子
大每服三十丸開水送下

班龍散

治精血耗涸耳聾口渴腰痛自濁上熱下寒不

受峻補者

鹿茸

壹兩酒泡透炙酥研末此味要整架者非片多假查藥物備要便知

真烏梅肉煮成

膏和搗爲丸梧子大每服五十丸米湯調下

草靈丹

此藥益壽延年添精補髓烏鬚髮固齒牙強筋

骨壯氣血服之一月乃見其效如要試驗拌飯與白犬
食之一月變成黑犬此其驗也老人服至十日便不夜
起服藥者不可因此多行房事返致耗精損神忌食黑

羊肉鵝鴨桃李

真川椒

去子炒出升

茅山蒼朮

各四兩浸培乾

茴香

鹽水炒

白茯苓

各貳兩

去皮炒川鳥膽

炙甘草

各壹兩

熟地

酒浸真山藥

各兩

共爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸至四十五丸空心溫酒送下服後以乾食物壓之

五香丸 此方仙傳秘於道藏善能消食消積消痞消痰
消氣消滯消腫消痛消血消癩消蟲消隔消脹消咽藥
料尋常功效甚大並治痰迷心竅每服七八分或壹錢
姜湯送下臨睡先一服次早一服其效如神

五靈脂

壹斤

香附子

去淨毛壹斤

黑丑

貳兩

白丑

貳兩

共研細末以一半微火炒熟以一半生用和勻醋糊爲丸如蘿蔔子大此藥費小功夫大願同志者修合濟人功

德無量再黑丑白丑性雖猛烈然服之不多並不碍事
三黃寶蠟丸 治跌打損傷刀傷箭傷鎗傷一切刑傷破
皮瘀血奔心及癲狗咬傷蛇虫毒物咬傷墜馬跌傷瘀
血凝滯及女人產後惡露不盡痰迷心竅致生怪症危
在頃刻其效如神真濟世良方也

藤黃

四兩

天竺黃

明雄黃

紅牙大戟

水粉

即官粉

劉寄奴

真血竭

乳香

兒茶

各二兩

歸尾

朴硝

各壹錢

兩

血珀

水銀

麝香

各參錢

共爲末

加項淨黃蠟二

十四兩將銅鍋裝蠟下滾水面浮其銅鍋待蠟溶化隨

下前藥末攪勻半冷能作丸輕者一丸若遇久有瘀血

凝滯可服數丸多飲酒幾盃蓋被取汗卽愈外敷者用
香油隔滾水開化敷之如久病勢重者服數丸甚能舒
筋活絡去瘀生新有起死回生之功忌食生冷及生菓
發物三日

扁鵲玉壺丸 玉壺指人身而言道書曰金精滿鼎氣歸
根玉液盈壺神入室元壽先生曰硫是礮之液礮是鐵
之精生於溫泉產於山旁有水火既濟之妙本草止治
陰寒惡疾不言治鼓今人用治火衰陽氣暴絕寒水鼓
脹卻有神功獨是難於製配余得異授並諸製法以廣

硫黃

八兩

配真香麻油

八兩

以硫打碎入冷油內放爐上

炭火宜微

以桑枝緩緩攪動候硫溶盡卽傾入水缸內

急攪去面上浮油取缸底淨硫稱過若干

雨再配真麻油若干雨照前火候再溶再傾連前共製三次第四次

用真棉花子油

自取棉花子搾坊製油爲真

配硫若干雨照前火

候再溶再傾入水缸內急攪去面上浮油第五次用肥

皂四兩水中同煮六時第六次用皂莢四兩放水中同

煮六時拔盡油氣第七次用爐中炭火淋

檢音

水製六

時第八次用水豆腐同煮六時拔淨皂莢之性第九次

用田字草搗汁

田字草出水荒稻田中葉如田字秋天採

和水煮六時晒乾

卷之二

內外備用諸方

七

研細如香灰凡淨硫壹兩配炒糯米粉貳兩煮汁爲丸
每服八分漸加至參錢開水送下硫黃以外洋者爲佳
土硫黃斷不可用

九製硫黃丸 凡人一身以命門先天真火爲主火旺則
脾土及五臟強壯爲人一家之主人富強則百事俱强
也此火一虛則脾胃虛弱飲食少進無精液以養臟則
五臟自弱以致百病易生且老尤甚年老之人大火必衰
久服附桂至無效故有耳聾眼花齒落髮白等症是非
此丸難除此症此丸專補先天本元能健脾胃壯筋骨
治虛弱齒落陽痿卻百病久服面如童顏老當益壯惟

藥性云硫磺爲純陽之物與鹿茸並功但其性大熱有
毒又云硫磺性雖熱而疎利大腸與燥滯者不同又云
熱藥多秘惟磺暖而能通寒藥多泄惟磺連肥腸而止
渴人多謂服之久必發毒皆因藥店製之不精如自製
得法自然無碍磺用外洋者良若土磺斷不可用

一製用老白豆腐將磺研末用淨沙鍋以竹籬夾鍋底
籬上蓋豆腐一層鋪磺一層疊疊鋪好入水煮至豆腐
黃黑色爲度用清水漂淨腐渣再煮三次每磺壹觔豆
腐壹斤或黑豆拌煮亦可二製用大個蘿蔔挖空將
磺末入內蓋緊縛好漫火煮至蘿蔔黃黑爛爲度清水

漂淨復煮二次或蘿蔔切片拌亦可一礪二荀三製
將紫背鮮浮萍洗淨拌礪末煮至萍腐爛爲度但萍根
鬚葉最多清水漂淨或打爛取汁拌煮亦可一礪三萍
四製用新綠豆揀淘洗淨以礪末拌煮至豆爛爲度
清水漂淨一礪二豆五製用石菖蒲或菖蒲洗淨切
小段拌礪末入水煮至爛爲度取汁拌煮更妙六製
松柏葉各半洗淨去枝用葉剪碎拌礪煮至葉爛爲度
清水漂淨七製或藕或梨或藕梨各半切片同礪煎
至藕梨爛爲度八製肥壯豬大腸洗淨氣味將礪末
研細漂淨裝入大腸兩頭紮緊勿令走漏煮至大腸熟

爛爲度用清水泡過夜澄出陰乾

九製地黃

貳兩

全

歸

天冬麥冬

各壹兩

川芎

陳皮

枸杞

杜仲

茯

芩

炙草

前胡

防風

澤瀉

蛇床子

五加皮

全

各五錢

每磧壹斤用藥一料照磧遞加用清水煎濃將磧

末投入煎至藥汁乾取出陰乾用糯米煮粥拌爲丸如

綠豆大陰乾用磁餅裝收每早用鹽湯送服一月用三

分第二月四分三分四月八分五月壹錢每月遞

加至貳錢爲度如恐服久發毒病愈則止自無妨碍忌

一切牲畜血及細辛

全

七製散紙丸 治命門火虧下元虛損耳聾眼花腰痛腿

軟腎冷精流陽痿不舉小便過多筋骨疼痛肚腹畏寒
脾胃虛弱飲食難消夜多盜汗精神疲倦時愛躊躇等
症功能補火壯陽固精種子保真元壯筋骨健脾胃長
精神除疾病功效不能盡述無論男婦皆治每早空心
服壹錢淡鹽水送下每服至一月後加參分加至貳錢
爲止忌食羊血油菜又名芸薹廣西呼爲菜花菜油即油菜子所出之油若陰
虛水虧者早服此藥晚服六味地黃丸則水火兼補不
致偏枯服至半年後方效

故紙十觔 一製淘米水泡一夜晒七日 二製黃柏
貳斤熬濃汁泡一夜晒七日 三製杜仲貳斤照前

四製生鹽貳斤照前

血五製魚鱗叁斤照前

六製核

桃肉六斤

又名胡核

照前

粥將故紙磨細末

器忠鐵

和勻搗融爲丸如梧子大

精服

七製香附丸

專治心血虧虛火不下降水不上升以致

心腎不交夜夢遺精百藥不效者服此大有奇功

香附

壹斤洗淨

一製淘米水泡一夜石上擦去毛晒乾

二製陳酒泡一夜晒乾

三製童便照前

四製鹽冰

照前

五製牛乳照前

六製小扁黑豆煮水照前

七製真荻神六兩去皮去木心二味共爲末

煉蜜爲丸

如彈子大每早空心服一丸

九製黃芪 此藥製後可與人參同功氣虛者服之最佳

婦人體虛血崩及產婦虛症服之更妙

頂上綿箭芪壹斤

洗淨切片烘乾

第一次用

木通

貳兩煎水

泡

一夜晒乾

二次

升麻

壹兩

照前

三次

丹皮

貳兩

四錢照前

四次沙參

參兩五錢

照前

五次玉竹

四兩六錢

照前

貳兩

前六次附子

壹兩製

照前

七次五味

貳兩

照前

八

次防風

貳兩

照前

九次蜜糖

參兩

拌炒製完蒸過七

日可服每用貳錢水一杯飯上蒸好臨食對酒少許服

渣再煎服

代參膏 此膏大補氣血可代參用

嫩黃芪

壯嫩而箭樣者用剉片

白歸身

截去頭尾酒洗淨泥各五錢

肥玉竹

壹兩

化州橘紅

參錢如無真者用新會陳皮去淨白亦可

共入砂鍋內用天泉水

熬成膏每早開水調服

湧泉膏

又名海龍膏

專治男婦下元虛損五勞七傷咳嗽痰

喘氣急左癱右瘓手足麻木遍身筋骨疼痛腰脚軟弱
肚腹受寒男子遺精白濁婦人赤白帶下等症貼至半
年步履如飛下身不甚畏冷貼至一年氣貫泥宮雖老
年亦能種子可免雜症並除風溼真神方也

大海龍一對

雄黑雌黃長尺餘者佳無則用海馬亦可終不如海龍之妙

大生附子

叁錢要大

壹個重壹兩五錢切去蘆頭

零陵香

大穿山甲

叁錢要大

童便甘草水各浸一日洗淨

內外補益方

片鎖陽

卷一
錢

各藥切碎用真香麻油壹觔四兩將藥浸入

春五日夏三日秋七日冬十日然後木炭火熬至藥枯

去淨渣將油再熬至將要滴水成珠時稱準分兩每油

壹觔加飛淨黃丹

六兩
五錢

用小火熬至滴水成珠

火不要
大膏不

要太稠切用槐枝不住手攪動再下製真陽起石末

貞麝香末

各五
錢

冬虫夏草末

各五
錢

好野高麗參末

真川

橄末

母丁香末

各三
錢

攬極勻埋入土內七日去火毒

每用膏三分攤如錢大貼兩足心十日一換不可間斷

此膏五十歲內外貼之方見功效若少年無病者貼之

足心作癢起泡反無益也

附桂膏 治感受風溼手足麻木筋骨疼痛等症貼之神

效肚腹畏寒者更妙

真香麻油

叁斤

柏枝尖

松毛心

各五斤

生大附子

切片

肉桂

研極細末各半斤

黃丹

鉛粉

各十兩

先將麻油入鍋燒滾

下柏枝松毛附子次第入油鍋熬枯去渣下肉桂末再
熬下黃丹鉛粉不住手攪至滴水成珠入瓦器內浸水
中拔去火毒用布攤貼肚腹畏寒者貼肚臍用大張連
臍眼貼並貼背後腎俞穴其餘筋骨麻木搜痛俱

貼患處

法製陳皮 善能消痰化氣止渴生津

陳皮

壹斤清水泡

白薑

甘草

各六兩

同煮一日去參草

留陳皮加川貝母兩半
研細青鹽參兩拌勻再用慢火煮
一日夜以乾爲度

黃瓜霜 治急心痛最爲神效並治實火牙疼喉痛皆效
因寒心痛及牙喉虛火忌用

黃瓜一條破兩邊去肉去子入生白礬末填滿合住線
捆懸掛有風無日之處陰乾候皮外起白霜取下研細
收磁瓶內用蠟封口如急心痛欲死者日有微氣用此
霜點眼四角立愈喉痛者吹入牙痛者用霜擦之
神仙粥 此方專治感冒風寒頭痛骨疼並四時疫氣流
行等症初得病兩三日服此即愈

糯米叁合生姜五大片河水貳碗於沙鍋內煮二滾次
入帶鬚葱白五七根或煮至米熟再加米醋小半盞入
內和勻乘熱吃粥或止吃粥湯蓋被睡卧謹避風寒以
出汗爲度屢驗非尋常表藥可比

甘露茶 此茶疎風清熱去滯逐邪治一切感冒時氣頭

痛腹脹不服水土等症

陳皮四錢水洗 鹽一錢 穀芽壹兩炒 神麴壹兩 山楂五十粒炒 烏藥一錢 厚朴一錢 枳壳各八錢 陳茶葉參兩 共爲粗末每服貳錢 生姜湯

煎服

羊肉湯 治寒勞虛羸及產後受寒心腹疝痛諸症甚效

馬
肥羊內壹斤水煮入當歸五兩黃芪八兩生姜六兩再
煮分四服此張仲景方也

羊腎酒此酒能種子延齡烏鬚黑髮強筋骨壯氣血添
精補髓返老還童有七十老翁腿足無力寸步難移將
此甫服四日卽能行走如常後至九旬筋力不衰其方
秘而不傳董文敏公重價得之凡艱於嗣續者服之卽
能生子屢試如神百無一失

生羊腰壹對沙苑蒺藜四兩隔紙微炒真桂元肉四兩淫羊藿
四兩用鋼刀去邊毛羊油拌炒仙茅四兩要真者用淨糯米汁泡去赤汁薏仁四兩用滴花燒酒二十斤浸三七日隨量時時飲之

烏雞湯

治男婦虛弱或病後或產後或瘡毒久不收口

脾胃不健一切諸損

白毛烏骨雞

又名太和雞
藥物備要便知

不論雌雄去毛破腹去腸

雜洗淨大生地

酒洗四兩
即麥芽米糖

俱納腹內瓦鉢裝

好放銅鍋內忌鐵鍋隔水蒸爛食之

一月兩次爲妙

七味鴨

治陰虛勞傷咳嗽痰喘神效

生地

熟地

歸身

茯神

白朮

各三錢
土炒

川貝母

各一錢

地骨皮

四錢

用老鴨一隻去毛原湯洗淨去肚雜不可

再見水將前藥加陳年酒一碗生晒醬油三酒盃同入

鴨肚內縫緊用瓦蓋盆盛貯盆內不可放水蓋好以棉

紙將盆蓋縫封固放在鍋內亦不可放水鍋蓋蓋好稻
草叁斤打成小草結對鍋臍慢慢燒之如鍋太熱少停
再燒草完鴨爛可吃能飲再加老酒送服 雍正二年
客自江西回廣有弟兄二人弟患虛損垂危卽到城鎮
不能停泊延醫又無方藥可服惟有待斃而已客憫之
出此方令其兄照法製與服之竟得平愈

神仙鴨 治勞傷虛損無病者食之亦能健脾益精功效
甚大甚大

烏骨鴨一隻去淨毛破開去腸雜不可用
水或用白毛老鴨亦可白棗卽南棗四十
九個去壳建蓮四十粒去心人參壹錢陳甜酒叁大
酒盃好

醬油

貳酒杯

各放鴨肚內不用放水瓦鉢裝好封緊蒸爛

陳酒送服無人參用玉竹西錢九分加姜汁少許亦可
故紙鴨治腎虛吐血及腎虛咳嗽氣喘並一切虛不受

補者效驗如神有人腎虛吐血三年百藥不效連食此

鴨三隻斷根

老鴨壹隻

去毛與腸雜洗淨用故紙卷錢先用黃柏六分煎水泡

用鹽水炒核桃肉

名胡桃卷錢又

陳甜酒

壹茶碗陳紹

好醬油

卷酒盃

其入鴨肚內以線縫好放瓦鉢內不用放水蓋好加紙
封口放鍋內蒸極融爛去藥連湯食如不見效卽用七

製故紙丸

見前

蒸鴨食必有奇驗

種子兜肚方

此方能調經種子並治赤白帶下腰腿酸

疼子宮寒冷男子肚腹畏寒遺精白濁偏墜疝氣一切

下部虛冷等症

附子

壹個重貳兩切片燒酒煮過晒乾聽用

大茴

炒

小茴

炒

丁香

五味

子

以上各壹兩

升麻

木香

甘草

甘遂

各四錢

沉香

壹錢

共爲末用新蘄艾四兩搓融晒乾將前藥放在艾中間
用線密縫兜肚置丹田上外用手帕包固晝夜縛定不
可換動一二月後則去之或加麝香二三分更妙

開關散

治硃砂砂症並治感冒風寒及各項痧症凡脈散

牙緊發慌手足麻木閉目不能睜眼腫心痛醫多不識此

症誤認爲喉風此名爲硃砂症又名心經疔用此藥三分先吹入鼻孔內再將藥秤足壹錢姜湯沖服服後用紅紙捻照心窩背心二處見有紅點發現用針挑破內有紅筋挑出方保無事此方神效不可忽視

牙皇

細辛

各三錢半明雄黃半錢

法夏

廣木香

各三錢

陳皮

藿香

桔梗

薄荷

貫眾

白芷

防風

甘草

各一錢

枯礬

五分

各藥共研細末磁瓶收貯用蠟封口不

可洩氣

土熨法

治身受寒熱心腹疼痛醫家辨症不清涼熱混

投或鄉僻之地無藥調理漸至飲食不進大便閉塞小

便短澁上下關格不通揮身擗繫或六脈沈伏或繫數之極甚至手足腰膝彊硬不省人事此危篤之症急用陳乾土磚搗成粗末約貳升許以鍋炒大溫熟用青布包好以半揉熨胸腹腰背等處冷則另換一半周流揉熨約半時久自覺胸腹氣流通而愈或再用皂角末少許吹入鼻中得噴嚏則氣隨通暢

天然透邪丹

治感受風寒暑溼及四時不正之氣以致

頭痛脹悶鼻塞不通胸膈不舒等症

鴦不食草

查藥物備要便知

晒乾研細末磁瓶收貯以蠟封口

每用少許吹鼻中卽刻打嚏氣通而愈功同痧藥冬月

用之尤妙

獨拈散 治男女遠年風溼血風皮蛀寒溼浸淫流水發

癢搔之疼痛兩腿黑腫似爛非爛或時熱烘麻木等症

寒水石

另研飛

滑石

另研

白芷

百部

熟炒乾

白蘚皮

各三

桂枝

兩蛇床子

地膚子

東白薇

各四兩

炙鱉甲

大黃

酒炒

各五樟腦

臨用時加少許同研

其研細末

如香灰細

麻油調敷一日一

換不可洗浴

一月卽愈至遲三月

斷根神效無比

十全大補湯 治氣血俱虛並老弱人癰疽等症

白黨

炙耆

熟地

各四錢

白芍

酒炒

焦丸

茯苓

上

桂枝

研末當歸

名貳

川芎

錢半

炙草

壹錢

水煎服

補中益氣湯 治陽虛自汗或癰瘍脾虛久不能愈並一切清陽下陷中氣不足之症

炙甘草

錢半
高麗參 貳錢

炙草 壹錢

焦朮 錢半

陳皮 留白

壹錢

當歸 五分

升麻 升麻

柴胡 各叁分

姜 壓片

棗叁枚

水煎服

逍遙散

治血虛肝燥骨蒸勞熱咳嗽寒熱口乾便澀月

經不調等症

柴胡

當歸

白芍

酒炒焦朮

雲苓

各壹錢

炙草

五分

煨姜

叁片

薄荷

叁分

水煎服

金匱腎氣丸

治腰痛脚腫小便不利嘔吐腹痛四肢虛浮痰重喘急脾腎虛弱水泛爲痰非此不救此仲景神

方也風溼重者須先去風溼然後服此以免關門殺賊之患

熟地

四兩

茯苓

參兩

牛膝

肉桂

澤瀉

車前

茱萸

黃連

葛根

萸

山藥

丹皮

各壹兩

附子

五錢

爲末煉蜜丸如桐子大

每服八十九丸空心米飲下急病分作數劑煎服亦

可臨卧服補中益氣湯可收全功

歸元丸

葛根湯

左歸丸 治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食或喘或渴或陽虛自汗或氣虛不能攝血或瘧痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足等症

蜜芪

錢半

台黨

壹錢

炙草

壹錢

白朮

土炒

陳皮

當歸

各五升

麻

柴胡

各參分

姜參片棗

貳枚

引小兒照服大人分兩倍加

石歸丸

治元陽不足，陽衰陰盛，益火之劑

熟地

八錢

山藥

炒四錢

棗皮

卷錢

枸杞

鹽水炒四錢

鹿膠

酒服四錢

錢

菟絲

四錢

杜仲

四錢

當歸

酒炒三錢

肉桂

去皮研末三錢

桂

兌眼貳錢

桂

六味地黃湯

治肝腎不足，真陰虧損，精血枯竭，腰痛足酸，自汗盜汗，遺精便血，消渴淋瀝，舌燥喉痛，虛火牙痛

下部癰疽等症

中藥一

正統本草

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

九製熟地

十

山茱萸

真山藥

真雲苓

丹皮

澤

漏水煎服

中藥一

正統本草

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

八味地黃湯

中藥一

正統本草

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

本草綱目

卷一百一十五

照上六味地黃湯加附子 肉桂 水煎服

元麥地黃湯 治陰虛心火狂燥腎水不足此卽六味地

黃湯之變方也 加麥冬元參降火益水

熟地

八錢

雲苓

參錢

丹皮

參錢

建獨

參錢

懷藥

四錢

元

參

貳錢

麥冬

去心
貳錢

山萸肉

四錢

涼血地黃湯

治胃火熱盛吐血衄血咳血便血畜血如

狂嗽水不欲嚥及陽毒發斑等症

生地

四錢

白芍

貳錢

丹皮

壹錢

犀角

壹錢

要

黃芩

貳錢

甘草

五分

梔子

炒貳

黃連

壹錢

川柏

貳錢

藿香正氣散

治上吐下瀉霍亂急症及各項痧症並四

時不正之氣以及不服水土脾胃不和飲食停滯惡心

胸滿等症

藿香

貳錢

白芷

桔梗

法夏

紫蘇

焦朮

大腹

皮

川朴

姜汁炒

陳皮

茯苓

各壹錢

炙草

五分

姜

叁片

棗

貳枚

煎服

六一散 治中暑煩燥口渴小便不通鴟痢熱瘧霍亂吐

瀉等症

滑石

水飛淨六兩

甘草

壹兩

爲末每服三四錢涼水調下

益元散

治與上同

照上六一散加辰砂少許

甘桔湯 治喉痛喉痺肺癰吐膿乾咳無痰火鬱在肝等

症

金銀花

貳錢

甘草

壹錢

桔梗

入分半錢

水煎服

荆防敗毒散

治腫腮漏腮

荆芥

防風

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

枳壳

桔梗

茯苓

各壹錢

甘草

五分薄荷

三分

煎水服

黃連解毒湯

治一切火熱表裏俱盛狂燥煩心口燥喉

乾大熱乾嘔吐血衄血熱甚發斑等症如非實火不可

輕服

黃連

黃芩

黃柏

梔子

名等水煎服

水煎服

龍膽瀉肝湯

治肝胆經實火溼熱腸痛耳聾等症

龍胆草

酒炒

歸尾

各錢半

黃芩

酒炒

澤瀉

木通

車前

子

生地

酒炒

生甘草

各錢半

水煎服

五苓散

治腹滿水飲水腫小便不通等症

猪苓

茯苓

白朮

各錢半

澤瀉

錢半

肉桂

五分研末兌入不見火

水煎服

歸脾湯

蜜芪

焦朮

台黨

聚仁

炒志肉

去心甘草水泡

當歸

雲苓

龍眼肉

廣陳皮

炙草

生姜紅棗

煎服

手太陰肺經絡圖

起於中府穴

通中
期太陰

終於少商穴

通中
期太陰



手太陰肺經絡歌

手太陰肺十一穴中府雲門天府接俠白尺澤孔最存列
缺經渠太淵結更有魚際與少商一一數之非浪說

中府

乳上三肋間動脈應手

雲門

巨骨下

天府

腋下三寸臂內廉

俠白

天府下去肘助五寸

尺澤

肘下紋中

孔最

腕上七寸

列缺

腕側上二寸五分

經渠

寸口動脈陷中

太淵

掌後內側橫紋頭動脈中

魚際

大指本節後內側白肉際陷中


少商

大指內側去爪甲角如薤葉

手陽明大腸經絡圖

起於商陽穴

終於迎香穴



手陽明大腸經絡歌

手陽明穴起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷溫溜接下廉上廉三里長曲池肘髎迎五里臂臑肩髃巨骨當天鼎扶突禾髎接終於迎香二十穴

商陽

次指內側
爪甲角

二間

本節前內側陷中

三間

本節後內側陷中

合谷

大指次指岐骨間

陽谿

腕中上腕筋陷中

偏歷

腕中後三寸

溫溜

腕後五寸間

下廉

輔骨下去上廉二寸

上廉

三里下二寸

三里

曲池下二寸

曲池

別名輔骨窟之中

肘髎

大骨外肘曲骨之中

五里

肘上三寸脈中

臂臑

肘上七寸

肩髃

肩端兩骨間

巨骨

肩端上行兩父骨間

天鼎

缺盆直上後二寸

扶突

氣舍上二五分七

禾髎

鼻孔下來


迎香

禾髎上鼻孔旁

足陽明胃經絡圖

起於頭維穴

終於騰兒穴



足陽明胃經絡歌

四十五穴足陽明頭維下關頰車行承泣四白巨髎時地
倉大迎與人迎水突氣舍缺益去氣戶庫房屋翳屯膺窗
乳中乳根涉不容承滿梁門建關門太乙滑內下天樞外
陵大巨存水道歸來氣冲次脾關伏東陰市臨梁丘犧鼻
足三里上巨條口下巨尋豐隆解谿中陽符陷谷內庭屬
兌程

頭維

額角處
髮際

下關

上關下合
口有空

頰車

耳下垂頰
脣陷中

承泣

目下七分直
瞳子

四白

目下二寸
直瞳子

巨髎

來鼻孔旁
三分

地倉

火口旁
方四分

大迎

曲頤前二
寸三分

大迎

一寸五分
來結喉旁

水突

頸大筋前
直人迎

氣倉

天突旁
直人迎外

缺益

肩下橫
骨陷中

氣戶

巨骨下

庫房

氣戶下一寸六分

屋翳

庫房下一寸六分

膺窗

屋翳下一寸六分

乳中

當乳中是

乳根

乳中下一寸六分

不容

鴻門旁相去各一寸五分

承滿

不答下一寸

梁門

承滿下一寸

關門

梁門下一寸

太乙

關門下一寸水乙下

天樞

肓俞旁二寸五分

外陵

天樞下一寸

大巨

外陵下一寸水乙下三寸

水道

大巨下三寸

歸來

水道下一寸

氣冲

歸來下一寸

髀關

伏兎後交分中

伏兎

膝上六寸起內處

陰市

膝上三寸伏兎下

梁丘

膝上二寸兩筋頭

獮鼻

膝脣下膚骨上

三里

膝下三寸膚骨外裏

上巨

三里下三寸

條口

下巨虛上一寸

下巨虛

上巨虛下三十寸

豐隆

外踝上八寸

解谿

沖陽後二寸五分

冲陽

足蹠骨上五寸

陷谷

次指本筋後指中

內庭

次指外踝指中

屬兌

次指端爪甲角

足太陰脾經絡圖

起於隱白穴

終於大包家



足太陰脾經絡歌

二十一穴太陰脾隱白大都太白隨公孫商丘三陰交漏
谷地機陰陵坳血海箕門沖門上府舍腹結大橫竅腹哀
食竇連天谿胸鄉周榮盡大包

隱白

足大指端內側爪甲角

大都

足大指本節後陷中

太白

足內側核骨下陷中

公孫

足大指本節後一寸

商丘

足內踝下微前陷中

三陰交

內踝上三寸

漏谷

內踝上六寸

地机

膝下五寸陰股內動脈

陰陵泉

膝下內側輔骨下

血海

膝臍上內廉白肉際

箕門

魚腹上起筋間陰股內動脈

冲門

府舍下二寸

府舍

腹結下二寸

腹結

大橫下二寸三分

大橫

腹哀下二寸五分

腹哀

日月下二寸五分

食竇

天谿下二寸六分

天谿

胸窪下一寸六分

胸鄉

周榮下一寸六分

周榮

中府下一寸六分

大包

淵腋下三寸九肋間

手少陰心經絡圖

起於極泉穴

大筋內廉

六尺五寸

一節

中指不正

七寸

終於少冲穴

尺端

一節

中指不正

八寸

九寸

極泉

青靈

少冲

少府

少澤

少海

少陰

少陽

少陰



手少陰心經絡歌

九宮原屬手少陰極泉青靈少海深靈道通里陰郄神
門少府少冲尋

極泉

臂內腋下筋間動脈入胸

青靈

肘上三寸

少海

肘內廉節後陷中

靈道

掌後一寸五分

通里

腕後一寸

陰郄

掌後脉中去腕五分

神門

掌後兌骨端

少府

手小指爪節後陷中直旁官

少冲

小指內刺爪甲角

手太陽小腸經絡圖

起於少澤穴
終於聽宮穴



手太陽小腸經絡歌

手太陽穴一十九少澤前谷後谿偶腕骨陽谷養老行支
正小湧肩貞走臑腧天宗及秉風曲垣肩外肩中剖天容
天窗上顴膠耳中聽宮成淵竅

少澤

小指端外側爪甲節

前谷

小指外側本節前陷中

後谿

小指外側本節後陷中

腕骨

手外側腕前起骨下陷中

天容

陽谷

手外側腕中銳骨下陷中

養老

手踝骨前上

支正

腕後五寸

小海

肘外大骨外

肩貞

肩胛胛下兩骨解間

臑腧

夾肩膠後大骨下

天宗

秉風後大骨下

秉風

天髎外肩上

曲垣

肩中央曲脾陷中

肩外俞

肩胛上廉

肩中俞

肩脾內廉

天窗

頸下大筋前曲頸下

天容

耳下曲頸後

顴膠

面頰骨下廉兒骨端陷中

聽宮

耳中珠子大如赤小豆

足太陽膀胱經絡圖

起於睛明穴

終於至陰穴



足太陽膀胱經絡歌

足太陽經六十七晴明目內經內藏攢竹眉冲與曲差五
處寸半上承光通天絡卻玉枕昂天柱後際大筋外大椎
背部第二行風門肺俞厥陰四心俞督俞鬲俞強肝膽脾
胃俱挨次三焦腎氣海大腸關元小腸到膀胱中膂白環
仔細量自從大椎至白環各各節外寸半長上髎次髎中
復下一空二空腰髎當會陽陰尾骨外取附分夾脊第三
行魄戶膏肓與神堂諒譎鬲關魂門九陽網意舍仍胃倉
育門志室胞肓續二十椎下秩邊強承扶醫橫紋中央殷
門浮鄰到委陽委中合陽承筋是承山飛陽課附陽崑崙

僕參連申脈京門京骨東骨忙通谷至陰小指旁

睛明

目內眞

攢竹

眉頭陷中

肩冲

直眞頭上

曲差

夾神庭旁一寸五分

五處

夾上星旁

五分承光

五處後

通天

承光後

絡卻

通天後

二寸五分

玉枕

落郤後

天柱

夾項後

大椎

頸後第二椎

風門

二二椎下

肺俞

三椎下

厥陰俞

四椎下

心俞

五椎下

督俞

六椎下

鬲俞

七椎下

肝俞

九椎下

膽俞

十椎下

脾俞

十一椎下

胃俞

十二椎下

三焦俞

十三椎下

腎俞

十四椎下

氣海俞

十五椎下

大腸俞

十六椎下

關元俞

十七椎下

小腸俞

十八椎下

膀胱俞

十九椎下

中膂俞

廿椎下

白環俞

廿一椎下

上髎

第一空腰

次髎

二空

中髎

三空

卜髎

四空

會陽間

附分

三寸

二椎下

去膚

魄戶 三椎下

膏肓俞

四椎下

神堂

五椎下

譴語

六椎下

隔關 七椎下

魂門

九椎下

陽網

十椎下

意舍

十一椎下

胃倉 十二椎下

育門

十三椎下

志室

十四椎下

胞肓

十五椎下

秩邊 廿一椎下

承扶

尻臀下附

殷門

浮郄下三

浮郄

委陽

承扶下六寸

委中

膕中約紋中

合陽

約紋下三

承筋

膕腸中央

承山 腿踝下分肉

飛陽

踝骨上七尋

附陽

外踝上三

崑崙

足外踝後

僕參 足跟骨下陷中

申脉

外踝下陷中

東門

外踝下

京骨

足外踝大骨下

東骨 足小指外側本節後凹中

通谷

足小指外側本節前凹中

至陰

足小指外側

足少陰腎經絡圖

起於湧泉穴

終於肺府穴



足少陰腎經絡歌

足少陰腎二十七湧泉然谷太谿溢大鍾照海通水泉復

溜交信築賓集陰谷橫骨大赫連氣穴四滿中注立肓俞
商曲石關蹲陰都通谷幽門畔步郎神封靈墟存神藏或
中腧府既

湧泉

足心陷中

然谷

足內踝前大
骨下陷中

太谿

足內踝後跟骨
上動脈陷中

大鍾

足蹠後踵
中

通谷

幽門下寸

靈墟

神藏下寸

照海

足內踝下

水泉

太谿下二寸

復溜

足內踝上二寸

交信

內踝上寸

橫骨

大赫下寸去
腹中行寸

大赫

氣穴下寸

築賓

內踝上膕
分中

陰谷

膝內輔骨後

橫骨

大赫下寸去
腹中行寸

大鍾

氣穴下寸

通谷

幽門下寸

靈墟

神藏下寸

商曲

石關下寸

陰都

陰都下寸

通谷

通谷下寸

幽門

夾巨闕下寸

步郎

神封下寸

靈墟

神藏下寸

神藏

或中下寸六分

或中六分

手厥陰心包經絡圖

起於天池穴
終於中冲穴



手厥陰心包經絡歌

心包九穴手厥陰天池天泉曲澤深郄門間使內闕下太
陵勞宮中冲盤

天池腋下三寸乳後一寸

天泉曲腋下二寸

曲澤

肘內廉陷中

郄門

掌後去腕五寸

間使

掌後三寸兩筋間陷中

內關

掌後去腕二寸

太陵

掌後骨下兩筋間陷中

勞宮

掌中央動脈

中冲

手中指端爪甲角

手少陽三焦經絡圖

起於關沖穴

終於耳門穴



手少陽三焦經絡歌

二十三穴手少陽關冲液門中渚旁陽池外關支溝上會
宗三陽四瀆藏上連天井清冷淵消滌臑會肩髎強天髎
天牖同翳風痏脈顚息角孫中從髮下耳行三穴耳門和
髎絲竹空

關冲無名指外側承甲角

液門

少指無名指歧骨間陷中

中渚腕間下一寸

陽池

手表腕上陷中

外關腕後二寸

支溝

腕後臂外三寸

會宗腕後三寸掌中一寸

三陽絡

支溝上一寸

四瀆肘前五寸外廉陷中

天井

肘上一寸陷中

清冷淵

消潔肩下臂外間

膚會 肩前廉去肩頭三寸

肩髎 肩端膩上陷中

天髎 脣銀盆中上慄骨際陷中

天牖

翳風 耳後尖角陷中

耳本雞足青豚中

顱息耳後青脉中

角孫 耳廓中間開口有空穴

絲竹室

和髎耳前發鬚陷中

耳門 耳前起肉當耳根者指中

中華書局影印

足少陽膽經圖

起於董子
膠案

終於竅陰穴



足少陽膽經絡歌

足少陽膽童子髎四十三穴行迢迢驅會客主顙歷集縣
顱懸釐曲鬓翹率谷天沖浮白次竅陰完骨本神通陽白
臨泣到目窗正營承靈腦空彰風池肩井淵腋穴軒筋日
月京門當帶脉五樞維道續居髎環跳髀樞曲中賣陽關
與陽陵陽交外邱下光明陽輔懸鐘入邱墟臨泣地五俠
谿臨還有一穴名竅陰無名足指甲邊終

童子髎

目外眴五分

聽會

耳前陷中

客主人

耳前骨上開口有稜

領壓

曲周下頸顙上頭

懸顱

顱顫中廉

懸厘

顎顫下廉

曲鬓

耳上髮際

率谷

耳上入髮際寸半

天冲

耳後入髮際二寸

浮白

入髮際二寸

竅陰

完骨上

完骨

入髮際四分

本神

曲差旁二寸
五分

陽白

眉上一寸直
瞳子

臨泣

日上直入髮
際五分

目窗

臨泣後坐
寸

正營

目窓後一寸

承靈

正營後一寸半

腦空

一名顙顫
承靈後寸半

風池

腦空下髮際
陷中

肩井

眉上一寸

淵腋

腋下三寸宛
中

輒筋

腋下三寸復
前行一寸

日月

期門下十五
寸

京門

監骨下腹
中季助

帶脉

季肋下一寸
八分

五樞

帶脉下三寸
寸

維道

章門下五
寸三分

居髎

章門下三寸
六寸三分

環跳

髀脣中

中賣

髀骨外膝
上五寸

陽關

陽陵泉上
三寸

陽陵泉

膝下三寸
外廉陷中

陽交

足外踝上七
寸

外邱

外踝上六
寸

光明

外踝上五寸
外側

陽輔

外踝上四寸
外廉陷中

懸鐘

外踝上三寸
外廉陷中

邱墟

外踝下如前
去端泣三寸

臨泣

足無名指
本節前節中
陷凹外側

地五會

足無名指
本節後

俠谿

無名指歧骨間
本節前節中

絞陰

無名指外
甲角

足厥陰肝經絡圖

起於天敦穴



足厥陰肝經絡歌

足厥陰肝十三穴大敦行間太冲接中封蠡溝中都行膝
關曲泉陰包俠五里陰廉井章門終於乳下期門穴

大敦

足大指端
三毛中

行間

足大指端間
內踝上五寸

太冲

足大指本節前一寸
後寸半

中封

足大指本節前一寸
內踝骨下

膝關

猶鼻下二寸
旁陷中

曲泉

膝股下三寸
側輔骨下

陰包

膝上四寸股
內廉兩筋間

五里

氣冲下三寸
陰廉

章門

去氣冲一寸
大橫外直季

期門

直乳二寸
竅

督脈圖

起於長強穴
終於斷交穴



督脉歌

督脉直尋背中行二十七穴起長強腰俞陽關越命門懸樞脊中筋縮堂至陽靈臺上神道身柱陶道大椎量癰門風府連腦戶強間後頑百會掌前頑會上星列神庭素髎水溝藏數至兌端廿六穴斷交八口是其鄉

長強

脊脈骨端

腰俞

廿一椎下宛中

陽關

十六椎下

命門

十四椎下

懸樞

十三椎下

脊中

十一椎下

筋縮

九椎下

至陽

七椎下

靈臺

六椎下

神道

五椎下

身柱

三椎下

大椎

一椎上陷中

風府

項後入髮際一寸

強間

後頭後寸半

百會

前頭後寸半

顙會

上星一後一寸

神庭

直鼻上八髮際五分

水溝

鼻柱下人中

斷交

唇內齒上齶縫中

陶道

一椎下

腎門

項後入髮際五分

腦戶

枕骨上強間後寸半

後項

百會後寸半

前項

顙會後寸半

上星

神庭後入鬚際一寸

素髎

鼻柱上瑞淮頭


兌端

唇外端

任脈圖

起於會陰穴

終於承漿穴



任脉歌

任脉之穴二十四起於會陰上關骨中極關元到石門氣海陰交上神闕水分下腕循建里中腕上腕巨闕起鳩尾中庭入膻中玉堂紫宮樹華蓋璇璣天突及廉泉上頤道入承漿內

會陰

兩陰間

中極

關元下一寸

曲骨

橫骨上毛際陷中

關元

臍下三寸

右門

臍下二寸
一名丹田
一名角田

氣海

臍下半寸

陰交

臍下一寸

神闕

臍中

水分

下腕下一寸

下腕

臍上二寸

建里

臍上三寸

上院

臍上五寸

鳩尾

兩岐骨下一寸

膻中

玉堂下一寸六分

紫宮

華蓋下一寸六分

璇璣

天突下一寸六分

廉泉

頸下結喉上

中院

臍上四寸

巨闕

鳩尾下一寸

中庭

膻中下一寸六分

玉堂

紫宮下一寸六分

華蓋

璇璣下一寸六分


天突

頸結喉下四寸宛宛中


承漿

唇稜下四寸


銅人正面全圖



銅人反面全圖



內景圖



十二官說

靈蘭祕典論云心者君主之官也神明出焉肺者相傅之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣按此以脾胃合爲一官恐錯簡耳刺法遺篇云脾者諫議之官知周出焉胃者倉廩之官五味出焉採此補入方足十二官之數

心說

心火臟身之主神明之舍也小篆嘗言心字篆文只是一倒火字耳蓋心火也不欲炎上故顛倒之以見調燮之妙也祝無功曰庖氏一畫直斂之則爲十左右倚之則爲人爲人縮之則爲人曲之則爲乙乙圓而神一一人方以直世間字變化浩繁未有能外一人人結構之者獨心字欲動欲流圓妙不屑出之乎一人人之外更索一字與作對不得正以心者新也神明之官變化而日新也心主血脉血脉日新新新不停則爲平人否則病矣心居肺之下隔膜之上附着脊之第五椎

是經常少血多氣其合脉也其榮色也開竅於舌心象
尖圓形如蓮蕊其中有竅多寡不同以導引天眞之氣其
有四系以通四藏心外有赤黃裹脂是爲心包絡心下有
膈膜與脊腸周迴相着遮蔽濁氣使不得上薰心肺也
午時氣血注於心

肝說

肝木臟魂所藏也肝者幹也以其體狀有枝幹也又位於
東方而主生氣時醫昧其理反云肝無補法宜涼宜伐只
泥木尅土之一說而不知後天八卦配河圖之象三八爲
木居東卽後天震巽之位巽上坤下則爲觀易由觀天之

神道而四時不忒上坤下震則爲復易曰復其見天地之心乎爲義大矣哉 肝居膈下並胃着脊之九椎 是經多血少氣其合筋也其榮爪也開竅於目 肝凡七葉左三右四 丑時氣血注於肝

脾說

脾土臟藏意與智居心肺之下故從卑又脾者裨也裨助胃氣以化穀也經云納穀者昌其在此乎 是經多氣少血其合肉也其榮唇也開竅於口 巳時氣血注於脾

肺說

肺金臟魄所臟也肺者沛也中有三十四孔分布清濁之

氣以行於諸臟使沛然莫禦也內經曰肺惡寒又曰形寒飲冷則傷肺勿祗守火魁金之二說也是經多氣少血其合皮也其榮毛也開竅於鼻肺凡八葉六葉兩耳附着於脊之第三椎寅時氣血注於肺

腎說

腎水臟藏精與志華元化謂爲性命之根也又腎者任也主骨而任周身之事故強弱係之甲乙經曰腎者引也能引氣通於骨髓后言曰腎者神也妙萬物而言也腎附於脊之十四椎下是經少血多氣其合骨也其榮髮也開竅於二陰酉時氣血注於腎

心包絡

心乃五臟六腑之大王其包絡爲君主之外衛相火代君主而行事也所以又名乎心主何以繫之以手蓋以手厥陰之脉出屬心包手三陽之脉散絡心包是手與心主合五臟加此一臟實六臟也 灵蘭秘典十二官論有膻中無心包絡今攷心包絡居膈上經始胸中正值膻中之所位居相火代君行事實臣使也此一官卽心包無疑矣 戌時氣血注於心包絡

胃說

胃屬土脾之腑也爲倉廩之官五穀之府故從田田乃五

穀所出以爲五穀之市也又胃者衛也水穀入胃游腋精氣上出於肺暢達四肢布護周身足以衛外面爲固也是經常多氣多血辰時氣血注於胃

膽說

膽屬木肝之腑也爲中正之官中清之府十二經皆取決於膽人之勇怯邪正於此詹之故字從詹又膽者擔也有膽量方足以擔天下之事肝主仁仁者不忍故以膽擔膽附於肝之短葉闊仁者必有勇也卮言曰膽者膽也清淨之府無所受輸淡然者也子時氣血注於膽

大腸小腸說

大腸屬金爲肺之腑小腸屬火爲心之腑入納水穀脾氣化而上升腸則化而不降蓋以腸者暢也所以暢達督中之氣也腸通暢則爲平人否則病矣 大腸經多氣多血卯時氣血注之小腸經多血少氣未時氣血注之 脾土一寸爲水分穴當小腸下口至是而泌濁別清水液滲入膀胱津穢流入大腸

三焦說

三焦者上中下三焦之氣也焦者熱也滿腔中熱氣布濩能通調水道也爲心包絡之府屬火上焦不治則水泛高源中焦不治則水留中脘下焦不治則水亂三便三焦氣

治則脉絡通而水道利故曰決瀆之官 是經少血多氣
亥時氣血注之

膀胱說

膀胱屬水爲腎之腑經云膀胱者州部之官津液藏焉氣化則能出矣言其能得氣化而津液外出滋潤於皮毛也若水道之專司則在三焦之腑故經云三焦者決瀆之官水道出焉言其熱氣布濩使水道下出而爲溺也內經兩出字一爲外出一爲下出千古罕明其旨茲特辨之又膀胱者勞也膀胱者光也言氣海之元氣足則津液旁達不窮而肌腠皮毛皆因以光滑也 膀胱有下口無上口 是經

多血少氣申時氣血注之

命門說

越人指右腎爲命門諸家非之余考內經太陽根於至陰
結於命門命門者目也靈樞結根篇衛氣篇素問陰陽離
合論王說俱同後讀黃庭經云上有黃庭下關元後有幽
門前命門方悟其處凡人受生之初先天精氣聚於臍下
當關元氣海之間其在女者可以手捫而得俗名產門其
在男者於泄精之時自有闢闢知覺此北門鎖鑰之司人
之至命處也又考越人七衝門之說謂飛門唇也戶門齒
也吸門會厭也竇門胃之上口也幽門太倉下口也闢門

小腸下口也魄門肛也便溺由氣化而出又增溺竅爲氣門凡稱之曰門皆指出入之處而言也况身形未生之初父母交會之際男之施由此門而出女之受由此門而入及胎元既足復由此門而生故於八門之外重之曰命門也若夫督脈十四椎中有命門之穴是指外輪而言非謂命門即在此也

十二經補瀉溫涼藥品大畧

手少陰心經

補

龍眼當歸柏仁霜熟地黃茯神棗仁遠志

瀉

黃連木通連翹生地黃竹葉麥冬犀牛角

溫

桂心乳香元胡索

涼

丹參辰砂紫草菖

手厥陰心包絡經

補

兎絲子肉桂

平瀉

大黃山梔炭

溫

川芎川姜炭

涼 牡丹皮牛黃

手太陽小腸經

補 巴戟天益智仁

瀉 車前木通赤茯苓海金沙砂防已

溫 小茴香天台烏

涼 滑石赤小豆

足厥陰肝經

補 當歸川芎阿膠續斷棗皮首烏棗仁荔枝

瀉 羚羊角胆草青黛黃芩青蒿草蘆薈赤芍

溫 內桂吳萸香附木香砂壳

涼 白芍木賊生地黃槐花地榆秦皮薄荷

足少陽膽經

補 當歸棗仁龍骨

瀉 胆草青黛青蒿

溫 杞仁半夏

涼 黃芩竹茹

足太陰脾經

補 黃耆大參白朮山藥茯苓米仁芡實蓮子東子

瀉 石斛白芍山楂麥芽枳實萊菔子六麯竹茹大黃

溫 砂仁白蔻肉蔻陳皮半夏丁香木香炮川姜

涼 連翹梔炭石膏

足陽明胃經

補 黃耆人參白朮山藥米仁芡實蓮子糯米

瀉 大黃貝寶朴硝川朴射干

溫 砂仁白蔻川姜丁香肉桂藿香

涼 石膏知母竹葉麥冬乾葛

手太陰肺經

補 黃耆人參沙參北五味阿膠百合桑白皮

瀉 荸榔貝母桔瓣黃芩杏仁枇杷葉

溫 炮姜砂仁

涼 天冬麥冬元參桔梗牛夢

手陽明大腸經

補 豆蔻詞子粟殼蓮子苡仁芡實

瀉 大黃朴硝白頭翁枳榔枳實黃連苦參生牛

溫 炮姜吳萸肉桂當歸

涼 黃芩槐花地榆桑豆

足少陰腎經

補 人參白朮附子鹿茸菟絲枸杞巴戟肉蔻容杜仲

熟地

瀉 黃柏知母元參防己車前丹皮澤瀉

溫

肉桂炮姜故紙沉香胡巴蛇床子丁香韭子

涼

泉地皮懷牛膝生地黃

足太陽膀胱經

補

故紙益智肉桂北沙苑

鴻

猪苓澤鴻車前木通滑石瞿麥扁蓄

潤

小茴香橘核沉香荔枝核

涼

黃柏川棟子

手少陽三焦經

補

黃耆人參白朮當歸附子枸杞菟絲故紙

瀉

生地黃梔炭黃芩胆草石膏青黛大黃朴硝丹皮

溫

炮姜肉桂

涼

連翹竹葉黃柏知母

卷之三

海國圖志

卷之三

海國圖志