

幼科輯粹大成一

(明)馮其盛 編

幼科輯粹大成

國家科學技術部資助項目

據日本國立公文館內閣
文庫藏明萬曆二十三年
乙未（一五九五）刊本
影印板高一九〇毫米寬

一三〇毫米

中醫古籍孤本大全選編工作委員會

中醫古籍孤本大全

中醫古籍出版社

江澤民主席題寫書名

《中醫古籍孤本大全》選編工作委員會：

主任：王永炎

副主任：姚乃禮 梁菊生

委員：（以姓氏筆畫爲序）

伊廣謙 李經緯 余瀛鰲 馬繼興

陳珞珈 黃龍祥 路志正 鄭金生

劉國正 劉從明 薛清錄

顧問：（以姓氏筆畫爲序）

于生龍 王雪苔 王綿之 李輔仁

余瀛鰲 施奠邦 唐由之 高輝遠

馬繼興 張燦玗 盛國榮 董建華

傅世垣 焦樹德 裴沛然 鄧鐵濤

劉渡舟

選編組組長：薛清錄

選編副組長：劉國正 王樹芬

選編組成員：符永馳 裴 儉 畢俊英

劉振遠 劉培生 李 斌

蔡德英 陳 静 程 英

前 言

中醫藥學是我國古代科技寶庫中的一枝奇葩，它以博大精深的醫理，神驗奇效的醫術，濟世活人，相傳數千年，屹立于世界醫學之林。這份寶貴的醫藥學遺產，保存在歷代流傳下來的醫藥典籍中，雖歷盡滄桑，歲月磨蝕，存留至今的仍不下萬餘種，其中淪為孤本者亦逾千種。這些孤本醫書中不乏稀世之珍品，如宋元以來歷代精刻之善本、名醫手稿、名家批校本、精寫本、刻書底稿、手繪本草圖、經絡圖等等。這些珍貴的醫藥典籍，由于多年的自然侵蝕和保管條件不善，不少已面臨絕本危險，搶救、保存這些珍貴的文化遺產已成爲當務之急。鑑此，國家中醫藥管理局決定選編影印出版《中醫古籍孤本大全》一書，并責成[全國中醫藥圖書情報工作委員會]具體承擔選編任務。本書的選編基本遵循以下原則：一、經考查各家書目，證實已成爲孤本的醫書；二、內容有較高的學術價值與實用價值者；三、在理論和實踐上有獨特的見解。

和經驗，具有參考價值者；四、書品較好，無重大殘缺者。根據以上選編原則，預計人選孤本醫書將有三百種左右。

孤本醫書收藏單位遍及全國各地，本書的編輯出版，得到許多藏書單位的通力合作，使我們的選編出版工作得以順利進行。為確保這套叢書的選編質量，國家中醫藥管理局和全國中醫藥圖書情報工作委員會聘請了全國二十多位知名學者、中醫專家為該書的學術顧問。

本書的選編出版，是弘揚我國古代科技成就，搶救民族文化遺產，繼承發揚中醫藥學術的一件大事，得到國家、部、局各級領導的重視和支持，江澤毛主席親筆為本書題寫書名，這對本書編輯出版工作是一個很大的鼓舞。我們相信，在各級領導重視、社會各界的關懷與支持，和有關專家學者的參與指導下，我們一定能够克服各種困難，勝利完成這部劃時代的大型系列叢書的選編出版工作。

編者

內容評介

鄭金生

明·馮其盛所編《幼科輯粹大成》十卷，不見于中國明清書目記載。該書的明萬曆二十三年（一五九五）序刊本（存五卷），今國內無傳，收藏于日本國立公文書館內閣文庫，屬於江戶醫學館舊藏。該書內容頗為豐富，但因流傳不廣，見者甚少，加之著錄時的某些失誤，使此書難于為世人所知。今依據從日本內閣文庫復制回歸的明刊本，對與該書相關的問題解說如下。

一、關於作者

該書之前有五篇序文，綜合各序所言，當知其作者為明代萬曆年間的馮其盛。馮氏字躬甫，又字安予，明代吳門（江蘇吳縣）人。馮氏家世業醫，長于幼科。其早年習儒，但久而不第，遂弃儒而繼承家業，于萬曆二十三年將家傳方術及個人經驗，匯集而成《幼科輯粹大成》十卷。

因過去很少有人親見該書，因此有些記載不免出現錯誤。例如《中國分省醫籍考》根據光緒時《桃源縣志》藝文所收的江盈科《幼科大成·引》，遂將《幼科大成》及馮躬甫置于湖南省。《幼科大成》即《幼科輯粹大成》，其作者馮躬甫也就是馮其盛。所謂《幼科大成·引》，就是前述萬曆乙未（一五九五）楚桃源江盈科為該書所作的序。江氏雖然是湖南桃源人，但馮氏並不與其同里。僅據江氏序言而將馮氏也作為湖南人，顯然是錯誤的。

鑒于日本丹波元胤《中國醫籍考》中曾著錄了馮其盛《幼科輯粹大成》，《中國分省醫籍考》又有了馮躬甫《幼科大成》，故而此後的《中國醫籍通考》將二者兼收，于是就出現了馮其盛《幼科輯粹大成》與馮躬甫《幼科大成》并載之誤，實則是同一人寫的同一書。借助回歸的該書原本，我們解決了這一著錄上的疑誤。

二、《幼科輯粹大成》的傳承

雖然《幼科輯粹大成》不見于明清間書志的記載，但這並不等於說該書在中國從未流傳過。前述《中國分省醫籍考》從光緒時《桃源縣志》發現了該書的江盈科序，說明其時該書的確有過流傳。

另檢視《幼科輯粹大成》原書，其上有王來儀的藏書印章。王氏曾經發刊過《痘疹慈幼津柵》，可知該書曾經經過王氏之手，後來才傳到日本。據書上的日本藏書印記，可知該書曾經被日本著名醫家多紀元簡收藏，經江戶醫學館、大學東校，最後入藏于內閣文庫。

今所見該書，為明萬曆二十三年（一五九五）序刊本。原十卷本，今殘存前五卷。版式為左右雙邊，白口，上魚尾，刻工甚佳。卷首題名：「吳門安予馮其盛躬甫纂輯／弟熙東馮曙升甫校正」，其後還有同校之門人姓氏，但各卷門人姓氏不同，可見馮氏之弟子甚多。

三、《幼科輯粹大成》的主要內容

由於該書祇有前五卷存世，故難知全書內容。不過從前五卷的

內容，也可以窺知其大略。

該書卷一主要涉及小兒的生理、診斷，乃至初生兒的調護等內容，從標題可知作者對望診情有獨鐘。馮氏認為：「小兒虛實，非系肥瘦，系乎氣色。何也？蓋有肥而氣怯，瘦而氣壯。氣怯則色必嫩，其爲虛可知；氣壯則色必盛，其爲實可知。由是論之，五臟之氣形于面部」。因此，馮氏主張在「男女十歲已前，凡有病觀其面。」

卷一的『訓醫論』，是討論爲醫的一些基本準則。如謂『凡爲醫者，遇有請，不擇高遠近必赴。一到其家，須先問曾請醫否，曾進何藥，已，未經下，可得虛實也。如曾經下即虛矣。更可消息則無誤。又必明南北稟受之殊，察土地寒溫之異，不可一概施治。』這裏既有醫德的內容，但更多的是教導醫生如何通過各種方法了解病情，并掌握一些治療的大法。

第二卷的前一部分仍然主要是診斷和理論方面的內容，後半部

則開始集中討論具體的病症。此後的三卷，均爲病症內容，如卷三爲風、寒；卷四爲暑、濕、吐（嘔噦附）、瀉、吐瀉、霍亂；卷五爲驚。根據前五卷的內容，可以想見已經失傳的該書後五卷，應該是以病症爲主要内容。作者爲具有豐富臨床經驗的兒科醫生，因此該書主要的學術價值在於通過論病及施治，表現作者與衆不同的見解，給後人以啓迪。

在這方面，《幼科輯粹大成》有比較多的個人一得之見。例如該書在《血氣論》中反復強調血氣之間的關係，以及臨床治療如何顧及血氣：『人生之初，具此陰陽，則亦具此血氣，所以得保全性命者，氣與血也……然氣又血之帥也，氣行則血行，氣止則血止，氣溫則血滑，氣寒則血凝。病出于血，調氣猶可導達。病原於氣，調血又何益焉。故人之一身，調氣爲上，調血次之。先陽後陰也。若血有敗瘀，泥滯諸經，壅遏氣之道路，經所謂去其血而後調之，此又不可不通變

矣。然調氣之劑，以之調血，則兩得；調血之劑，以之調氣，則垂（乖）張。如木香、官桂、細辛、厚樸、烏藥、香附、莪術、三棱之類，治氣可也，治血亦可也。若以當歸、地黃輩施之血症則可，然其性纏滯，有虧胃氣。胃氣虧則五臟六腑之氣亦餒矣。善用藥者，必以助胃藥助之。」這一段關於使用氣藥、血藥的論述，即便是在當代，也有其參考價值。

作者對小兒疾病的診治經驗是比較豐富的。例如他在討論『小兒伏暑』時指出：『小兒伏暑，祇緣脾胃虛弱，腠理開疏。暑氣乘虛而入故也。大抵暑月小兒最要調理，脾胃安和則風邪暑未易攻也，夫暑者在天爲熱，在地爲火，在人爲心，是以暑氣先人心。蒙蔽心竅，則搖搦不醒，此名暑風症也。古今暑風一症，書多不載，但診其脉浮而虛者是也。蓋浮爲風、虛爲暑，此症似驚非驚，若誤以驚風治之，必不救。』這一段見解可以說是作者經驗所得。

驚風是古代兒科的四大症之一。《幼科輯粹大成》用了一卷的篇幅專門討論「驚」。該卷涉及胎驚、急慢驚風。其中驚風又分四證八候。所謂四證指『驚、風、痰、熱』，八候指『搐、搦、掣、顫、反、引、窜、視』。馮氏對四症的用藥有過細的辨析。云『四證相須，不可留一。若理得驚風定，隨便下了痰熱，則驚風不復作，此理爲至妙也。』然後不厭其煩地介紹用藥時如何顧及四症。在遇到驚風時，作者有自己一套經驗。他認爲：『凡小兒驚搐，不可驚擾，但扶持，不得擒捉。蓋風氣方盛，恐拘持流入筋脉，多致手足拘攣。』這些經驗之談至今值得中醫臨床工作者借鑒。

該書有幸在一十一世紀初回歸故國，今將其影印出版，希冀爲中醫兒科的發展提供參考。



幼科輯粹大成序

余觀太史傳越人烏鵲稱

其所受禁方本之長桑陽

慶慎戒勿泄而倉公親奉

宣問對狀為詳既而不列

其方剗世靡得而述也豈真
神奇秘悟書不能盡言不
得盡意耶母亦挾術擅名
高自標置而鮮公天下利萬
物之心耶蓋古之人三折肱而

更求方曰以濟來者此其仁心
可仰已余友馮躬甫平工博
士業廩于庠久而不第自以
家世名醫不欲墮先業則
時為人治病良已所藉


方書皆奇驗因彙錄成帙
名曰幼科輯粹大成且欲付
剞劂以公之同志者蓋不欲以禁
方自秘而以濟世利物為亟真
仁人志士後有傳貽甫者考

其書知其人當與越人倉公爭

列矣

萬曆乙未春三月吉休之居

士申時行



卷

中



幼科輯粹大成序

今天下有幼無老老老者非必及人之老老吾老足矣吾每見人得一甘餌必曰以飼幼子以飼孫而不口大產羹嬰孺膝上伺其軒渠喫悅而不聞嬉

戲以娛其親故曰有幼無老
老吾友馮君躬甫至孝顧不錫
類爲老書而幼科是輯何居
蓋有深意焉人之壽考在元氣
輔以美食老者夫亦在人子
養志爲先溫清定省令其起居

甚適而竭力以備甘旨若平日
不此之務逮父母有疾第迎醫
問藥欲以湯熨鍼石奏功不知
老人之不可藥猶弱國之不可
戰也雖然其要又在老者自老
其老其心澹然無事如此則安

用方書為乃嬰兒則不然苟非
夭札其血氣向盛可投劑安全
此馮氏世業專幼科而躬甫所
為輯書意也昔扁鵲名聞天下
所受長桑禁方其為帶下醫為
老人醫為小兒醫隨俗而變靡

所不治故天下以扁鵲能生死
人今躬甫不云乎隨南北察冬
春不執一鷃之見嗚呼安知他
日不有悉取禁方予躬甫輯大
成者

陽羨新主人徐顯卿書

卷



幼科輯粹大成引

躬甫馮君蓋儒流之俊也髫時
用制舉業鵠起膠庠中儕偶期
君旦夕脫穎去迺坐數奇屢躡
棘院君稍厭之輒取先世所
遺幼科諸方術研窮探索久乃

遂窺其與以治里中小兒無不
應手起者衆驚爲神君旣已收
其功於身又欲廣其傳於人
也於是博采精校彙爲一書題
曰幼科輯粹大成云予觀君爲
人真實醇萬較然不欺其妙於

小兒醫也 非獨方術勝也 所謂
心誠求之 雖不中不遠矣 不佞
於此邪 元々 厚父母之託然坐
視凋瘵委頓而不能起 將方術
短淺耶 抑其誠有未至耶 以躬
甫觀之 當繇求民者未盡誠耳

不然六經語孟具言子民之方
不啻詳矣獨不佞試之未必效
何也藉令躬甫異日握一命之
寄吾知其收効於民也猶小兒
矣蓋吾不信躬甫之方術而信
躬甫之誠之必能中也後世用

躬甫書者或有效有不效可以
思矣

萬曆乙未冬楚桃源江盈科題



船南



想秦事不
信船南之方
而信
織造局
官史參贊
織造事

幼科釋疑大成序

夫醫之難言也久矣況者理苟二
醫難於老人醫少小之難於帶下
醫凡謂婦人不盡三男難少次而能
尤難即多友馮君躬用家世
業醫三十中歸 稍幼科專門而

与蘇氏陳氏相頽頽者也乃解甫
少生而頽柔小肩世之業佑得
弱冠日為指掌之使者為弟弟子
無多而處於官且將大至極物產
國之用亦試棘闈報辟於毫
以抑而始以世之累小試之試輒驗由

是臣門凡少次病無設甲族家巷
多延躬省隨庭之核古方而損
益產之多是祥至於臣卑又少涉
鮮多且嘵無以仍多傳也故之纂
而淺帙易之曰幼科輯錄大成卷
凡十類凡六十有奇彙羣羣既疊諸

方少極於略擗綱領采精奧於欲秀
頤九年大宋之云匝僭也久奉亡年之
研少至憑而益造立業之該可明激也
友以經甫之明考史張以窮經之緒
解捨而知少史鹽必弘以少史鹽之
易通者捨而為第六鹽為老人鹽

他時脫鈿棄杖持笏通籍又距不
能搔吾而焚於墮者老幼起
民疾而蹠之亦生之域哉毫無
以祀彷彿銘恩鑄者尚更早
在下獨是猶之私不傳也予窮
有聖人焉是為序

長洲張金葉伯起書



幼科輯粹大成序

人之所貴於萬物者以其有禮義也然必養之以至於成而不夭閑於幼小然後禮義可得而行焉否則生且不保於禮義乎何有而曰貴於物不其謬與由斯以言則夫所以審疾處方保護其幼小而期於成者其所係甚重而其術誠不可不精也知其係之重而必欲精其

術其躬甫馮先生乎躬甫少壯時刻意
博士業其廩於醫而馳譽於棘闈者久
矣一旦念志之難遂而思以仁幼之術
傳於時也乃以其先世所素業者而更
擴之上探索難博及諸名家以迨錢仲
陽氏靡不研究其淵微而操執其旨要
由是出以療疾其取效若符之合而響
之答也蓋羣然遐邇爭赴矣然躬甫以

幼穉無言說察之不易而柔肌弱臟藥
之尤不易也每投劑懷^上若所謂九折
肱而稱良者吾於躬甫有取焉嗚呼此
躬甫之所以為儒醫與夫儒之道視保
小民若保已之赤子而心誠求之躬甫
視人之赤子亦猶已之赤子也安得不
心誠以求之乎則其療之當而效之神
也其亦宜矣躬甫猶以濟一時一方之

幼其及有限而思欲廣之於無窮也於
是整齊其所為書成一家言以行諸遠
以垂諸後其卷十其類六十有奇名之
曰幼科輯粹大成嗚呼何其用心之弘
而立志之遠也其殆仁及於天下萬世
矣夫人所患無其心耳其所以遇之不齊
乃時為之無足論也若躬甫之仁心懇
惻真若有固結於中而不容解者倘其

獲任民社其功業豈眇小哉然即躬甫
今日之所就有以躋天闕於康壽以行
夫禮義而貴乎物固亦足以助王道之
所不及而默相天地生成之功矣其平
日未遂之志夫亦有所寄而不虛也哉

長洲王敬臣以道撰



幼科輯粹大成目錄

一卷

訓醫論

血氣論

初生調護諸法

鶩口重齶重齦懸癰重舌木舌

蓐瘡

小兒與大人不殊

小兒醫難于大人論
相夭壽法

病症賦

面部圖

看形色論

觀形氣論

五臟標本論

初受氣諸論

臍風撮口口噤

卷之二

諸家色証歌論

二卷

虎口三關絞形圖

脉息三關手形圖

諸家脉理論

五臟証治論

五臟相生克論

五臟病四時所不宜論

諸家死症歌

變蒸

五氣弱論

行遲語遲
鶴膝鮮顫

頤門腫陷

手脚拳

龜胸背

天柱倒

滯頤

諸啼

胎黃肥弱

三卷

風

四卷

暑

吐見嘔

歲附

吐瀉

霍亂

濕瀉

寒

五卷

驚

幼科輯粹大成目錄終

幼科輯粹大成卷之一

吳門安子馮其盛躬甫纂輯



第 熙東馮 曙升甫校正
門人省吾吳 俊秀甫全校

訓醫論

凡爲醫者性存溫雅志尚謙虛動遵禮節舉協柔和無自妄尊不可矯飾廣收方論博通義理明氣運曉陰陽善診切精察視辨虛實分寒熱審標本識輕重疾小不可言大事易不可言難貧富用心皆一貴賤使藥無別斯于道庶幾不然爲生靈之巨寇

凡爲鑒者遇有請不擇高下遠近必赴一到其家須先問
曾請鑒否曾進何藥已未經下可得虛實也如曾經下
卽虛矣更可消息則無誤又必明南北稟受之殊察土
地寒溫之異不可一槩施治

○五臟標本

肝在天之風 在地爲木 在人爲肝 在時爲春 腎
水爲母 心火爲子 肺脾土 王筋 王藏魂 其
聲呼 其液淚 其味酸 主應眼 外應爪甲 其
色青 青欲如青玉光澤不欲如藍 肝主風 風喜傷
肝 痘主驚風 憤怒氣逆則傷肝氣 痘王水疱

燥氣盛則病

面白則逆

金邪剋木

肝病面白

多怒目痛目閉不欲見人臍左動氣

肝實目赤多怒

頭眩痛引兩脇小腹之下

肝虛目昏腎痛筋縮拘攣

恐懼如人將捕

肝絕唇腮反青四肢多汗

平脉春

旺七十二日春則弦緩而長春弦者端直之狀細弱而

長賊脉浮濶而短金尅木

危脉弦如張弓弦

心在天之熱 在地爲火 在人爲心 在時爲夏 肝

木爲母 脾土爲子 脙肺金 主血 主藏神 其

聲言 其液汗 其味苦 上應舌 外應掌 其色

赤赤欲如帛裹朱不欲如赭 心主熱 热則傷心

病主驚熱 憂愁思慮則傷心 痘主紅班 寒氣勝

則病

面黑則逆

水剋火

心病

面赤

喜笑

心煩掌熱

口乾開眼妄語瞬上動氣

心實

口乾喜笑身熱汗血

筋脇胷背痛滿

心虛

恍惚多驚憂煩少色咳嗽舌強

腰背酸疼

心絕

搖頭直視形如煙薰

平脈夏旺七

十二日夏洪緩夏洪者浮大而散來疾去遲

賊脈沉

濡而微

水剋火

危脉鈎如操帶鈎

脾在天之濕

在地為土

在人為脾

在時為四季

心火為母

肺金為子

剋腎水

主肌肉

藏意智

其聲歌

其液涎

其味甘

上應口

外應四肢

其色黃黃欲如羅舉雄黃不欲如土 脾主濕 濕

則傷脾 痘主濕熱 乳食饑飽則傷脾 痘主疹

風氣勝則病

面青爲逆

木剋土

脾病面黃善思善

嗜體重卵痛四肢不收怠惰

脾實肢體重着而不舉

腹脹尿秘而苦饑

脾虛吐逆泄痢乳食不消腫脹腸

鳴四肢無力 脾絕脣突唇反環口黧黑柔汗發黃

平脈土之脈溫厚氣行臟腑之間平和不得見其衰則

見焉 四季之月各旺十八日 賊脈弦長而緊土剋

危脈狀如雀啄止而復來

肺在天之燥 在地爲金 在人爲肺 在時爲秋 脾

土爲母 腎水爲子 剋肝木 主氣 主藏魄 其聲哭 其液涕 其味辛 上應鼻 外應皮毛 其色白白欲如白玉光澤不欲如墨 肺主燥燥則傷肺病主嗽 形寒體冷則傷肺 痘主膿疮 热氣勝則病面白火邪乘金 其病面白悲愁嘆哭吐衄喘咳寒熱、肠右動氣 肺虛呼吸少氣、鼻涕嗌乾喘乏咳血 肺實喘促咳嗽上氣、鼻塞脰股肩疼痛滿肺絕汗出髮潤、喘而不休、毛髮氣出 平脉秋旺七十二日秋脉浮、秋毛者稀軟之狀、輕虛以浮 賊脉浮大而牢火剋金 危脉毛如風吹

腎在天之寒 在地爲水 在人爲腎 在時爲冬 肺

金爲母 肝木爲子 勅心火 主骨 主藏精與志

其聲呻 其液唾 其味鹹 上應耳 下應腰腎

其色黑 黑欲如漆 不欲如炭 腎主寒 寒則傷腎

其病疝 淫慾則傷腎 痘主黑陷 濕氣勝則病

面大黃則逆土邪乘水 其病面黑 恐欠足寒逆氣腹

痛、飧泄後重、脣下動氣 腎實、腹脹、體重少氣不言、

骨疼、飧泄小便少 腎虛、心懸如饑、胃痛引脊、厥逆耳

鳴 腎絕反目直視、狂言、遺尿、腰折骨枯 平脉、冬旺

七十二日、冬脉沉濡、冬石者沉濡滑舉指來疾 賊脉

緩而大土剋水 危脈石如奪索去如彈石

血氣論

人生之初具此陰陽則亦具此血氣所以得全性命者氣與血也氣血人身之根本乎氣取諸陽血取諸陰血爲榮榮行脈中滋榮之義也氣爲衛衛行脈外護衛之義也然脾胃者氣血之父也心腎者氣血之母也肝肺者氣血之舍也脾納水穀其悍氣注于腎而爲氣腎舍于肺而爲衛以溫分肉充皮毛肥腠裏司開闔也其精氣注于心而爲血心舍于肝而爲榮以走九竅注六經朝百脉也榮衛旣行周流不息一日一夜脈行五十度平

日復會于氣口。陰陽相貫，氣血流通，何病之有。一有窒
焉，百病由生。且氣之爲病，發爲寒熱，喜怒憂懼爲積痞。
疵瘕癥癩，上爲頭旋，中爲胷膈，下爲脅間，動氣或喘促。
或咳噫聚，則中滿逆，則足寒。此皆氣使然也。血之爲病，
妄行則吐衄，衰涸則虛勞，蓄之在上，則人喜忘，蓄之在
下，則人喜狂。逢寒則筋不榮，而掣急；挾熱則毒，而發
黃。在小便爲淋痛，在大便爲腸風。婦人月事進退漏下，
崩中，病症不一，皆血使然也。然氣又血之帥也。氣行則
血行，氣止則血止。氣溫則血滑，氣寒則血凝。病出于血，
調氣猶可以導達，病原于氣，調血又何益焉？故人之一

身調氣爲上、調血次之。先陽後陰也。若血有敗瘀泥滯諸經壅遏氣之道路，經所謂去其血而後調之。此又不可不通其變矣。然調氣之劑以之調血，則兩得。調血之劑以之調氣，則乖張。如木香官桂細辛厚朴烏藥香附丸術三棱之類，治氣可也，治血亦可也。若以當歸地黃丸施之，血症則可，然其性纏滯，有虧胃氣，胃氣虧，則五臟六腑之氣亦餒矣。善用藥者必以助胃藥助之。凡治病當識本末，如嘔吐痰涎，胃虛不食以致發熱，若與涼劑，則胃氣愈虛，熱亦不退。宜先助胃止吐爲本，其熱自退。縱熱不退，但得胃氣已正，旋與解熱，又有傷寒大熱。

累用寒涼疎轉其熱不退但與調和胃氣自然安愈
心爲血之主肝爲血之藏肺爲氣之主腎爲氣之藏人但
知血之出于心而不知血之納于肝知氣之出于肺而
不知氣之納于腎往往用藥南轍而北轍矣假如血痢
以五苓門冬等劑行其心巴豆大黃逐其積其病猶存
者血之所藏無以養也必佐以芎歸則痛自止假如喘
嗽以枳殼桔梗紫蘇桂乾姜橘等劑調其氣以南星半
夏細辛豁其痰而終不升降者氣之所藏無以收也必
佐以補骨脂葷則氣歸元矣病有標本治有後先綱舉

而目斯張矣

小兒初受氣諸論

兒在母腹受其精氣一月坯二月胎三月血脈四月形體五月能動六月筋骨成七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月百神備而生生後六十日瞳子成孩子能笑語識人百日任脉生能反覆一百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能握物三百日髀骨成能獨倚三百六十日爲一期膝骨成能移步此特語其常也

又曰一月如露珠二月若桃花三月形象成四月男女分五月臟腑具六月筋骨全七月魂生而動左八月魄生

而動右九月三轉身此未知其所出

其始有謂之妊者以其陽始而陰任之也謂之坯者以其未成器而猶坯也謂之胞者以其已爲正陽而陰包之也謂之胎者以其食于母而爲口呂也謂之娠者以其有時而動也謂之懷者以其有身而依也原夫此衆者皆陽始陰任在有形之先次由五行而後化成也故曰陰陽具而五行立矣

聖濟經源化篇曰木火土金水爲序者以其相生有母子之道也水火金木土爲序者以其相克有夫婦之義也相生所以相繼相克所以相治人生未有不相克以有

成者陰之所任者壬也一陽始壬肇生命門喻主氣之原精所藏焉壬陽水也合丁之陰火而生丙故有命門然後生心心主血神所藏焉丙爲陽火合辛之陰金而生庚故有心然後生肺肺主皮毛魄所藏焉庚爲陽金合乙之陰木而生甲故有肺然後生肝肝主筋魂所藏焉甲爲陽木合己之陰土而生戊故有肝然後生脾脾主肉意所藏焉戊爲陽土合癸之陰水而生壬故有脾然後生腎腎主骨志所藏焉故腎與命門一也此陰陽五行夫婦化生自然之理

張渙論兒在腹診其母脉左手沉實爲男右手浮大爲女

又母若南行從背後呼之左回首是男右回首是女

初生調護諸法論

兒纔出母腹便以衣絮包裹置大人懷中雖暑月亦不可遽令赤體蓋爲乍出腹不可令冒風寒也包護法

兒在胎中口有惡物纔生候啼聲未出急以左手托兒肩背右手提兩足令兒倒啼一聲吐出口中惡血又用軟帛或綿裹手指蘸預備黃連甘草汁拭去口中惡物嗣更以黃連甘草汁多與之服益穢吞胸膈吐以甘草穢入腹中利以黃連皆所以除穢也少加牛黃硃砂末鎮心安神解毒免瘡痘之患妊婦臨月預備之然兒體赤

卷之二
壯者可多服

拭穢黃連
甘草汁法

千金方云牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟邪除百病

初生氣欲絕不能啼者必是難產或胃寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶將胞衣置炭火上燒之仍燃大紙脚蘸油點火于臍帶上往來遍帶燎之以臍帶連臍得火氣由臍入腹則生矣更以熱醋湯洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴斷帶此法甚良救活者甚多

回氣法

凡浴兒當調和湯水若不得其宜令兒水驚卽成疾冬寒不可多浴浴時亦不可久恐冒風寒夏亦不可久浴浴

時宜護頭背不然風邪入之能令發熱成癟若不浴又令兒毛落皮皴生瘡新生時將浴以猪膽汁入湯中浴兒永無瘡疥之患勿以雜水浴之

浴兒法

兒斷臍帶須隔單衣咬斷不可用刀將緩氣呵七遍斷當留六寸若太短則中寒令兒腹中不調太長則傷肌令兒皮枯鱗起又中寒或成內釣既斷後當用軟絹綿等謹護臍不可令受風寒水濕若緩氣少寒氣多則成臍風又臍帶中多有穢蟲當急剔去免令入腹成疾

斷臍法

又一方用桃柳梅桑槐根各一兩洗淨切碎水煮去滓加猪胆一枚候水溫洗兒免生瘡疥

兒癰帶落、下隨以炭火新瓦上炙之煙盡爲度、取出用碗
令在地去火氣研爲末、用當歸生地各斯須煎濃汁、再
入硃砂一些調勻與兒呷盡、次日大便去穢物能令痘
疹稀少。灸癰帶法

兒出胎時被風吹臭塞、用大南星爲末、生薑自然汁調成
膏貼額上自愈。貼額法

兒出腹輒死不作聲、急看口中上齶有泡或如蘆籜盛水
名曰懸癰、可以綿纏長針留尖處如粟米許刺之令洩
去青黃赤血汁一刺不止再刺、不過三刺自消、用一字
散蜜調敷之、凡治方見後鷺口門。刺泡法

初生無穀道皆因妊娠恣情所慾過食炙博所以有此患急用銀簪看其端的刺透用油擦紙潤塞之此亦不得已之術或萬一可救耳刺便法

初生大小便不通腹脹欲絕者乃胎中熱毒之氣鬱閉所致也此名鎖肚證急令婦人以溫水漱口吸啞兒前後心并膝下手足心共七處每處凡五七次取紅赤爲度須臾氣散則自通不爾無生通便法

初生遍身無皮通是紅肉宜速以白早米粉乾撲之候生皮方止

初生遍身如魚泡又如木鼎碎則水流用蜜陀僧研細羅

末乾穆仍服蘇合丸方見後

兒生七日腎縮乃受寒所致用硫黃茱萸各五錢研末搗爛大蒜調塗其腹仍以蛇床子微燒薰之

初生眼閉者由母食熱毒之物致成斯疾用犀角地黃丸初生不飲乳者不但生熱毒在口難乳亦有兒在胎時母取冷過度冷氣入胞令兒生腹痛夜多啼不吃乳此則胎寒亦名難乳也

兒初生肌肉未實不可用新帛絮過煖能令筋骨緩弱襁褓中宜用舊衣絮值天和煖時當抱出日中嬉戲則血氣凝肌肉固可耐風寒若重帷厚衣不見風日譬如陰

地草木嫩脆易于損傷也薄衣之法當從秋習之量時
加減若頓減又易令兒中風寒

凡兒于春時不得覆頭裹足致陽氣不得泄則發熱

凡兒生百日之外稍與爛粥一二匙以助穀氣健腸胃同
長稍稍增益但養兒者多務過惜往往二三歲尚未與
食致脾胃虛體力怯平生多病然亦不可過與痛忌生
冷油膩葷腥粘滯甘甜等物

凡兒乳哺既有常劑然忽却食惡乳此是腹中不和便當
微微下之不爾則生寒熱或爲吐痢及爲積癥臍大者
發癟皆不早治之故也欲下之紫霜丸見變門最妙不可

行駛利藥

巢氏曰養小兒衣不可太煖令兒汗出虛風易入乳不可太飽令兒傷胃積滯難化故云若要四時小兒安必須一分饑與寒

千金方云夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去冷乳令兒咳痢葛氏云乳者妳也哺者食也乳後不可與食食後不可與乳綠小兒脾胃怯弱乳食重傷初成積久成疳癬也又云嘔熱嘔軟嘔少則不病嘔硬嘔冷嘔多則生病忍三分寒吃七分飽頻揉肚少潔洗

兒欲吐下之于立夏後不可輕舉蓋春末至夏俱發泄時

若誤行轉瀉則使下焦虛而上焦熱變成大病也

臍風撮口口禁門

自初生至七日左右忽然面青啼聲不出口撮唇緊不能哺乳蓋由剪臍不定傷動兼以風濕所乘甚則毒流心脾二經輕則病在皮膚而爲臍瘡不差重則病入臟腑而爲臍風撮口亦如大人破傷風則牙關緊而口撮不能進食此最惡候甚則口青色吐白沫四肢逆冷百無一生然又不能坐視有一法極驗但世罕知凡遇此患看兒齒齦上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸熟綿子裹手指輕輕擦破卽口開便安不用藥又方于擦破處

以蜈蚣末敷之又有諸方具後

聖惠方云初生兒有三病一口禁一撮口一臍風皆是急病禁口尤甚過一臍方免此症

兒初生七日內外忽口禁不乳與撮口相似但口禁面赤多啼口不吐白沫與撮口面青啼不出口吐白沫者異先撮口而生驚若臍邊青黑撮口不開是爲內搐不治爪甲青黑卽死

兒初生多有熱在眉堂伸引弩氣抑入根本之中能令臍腫突宜服龍胆湯若入經絡多變爲癆

凡臍風肚脹青筋弔脇卵疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通

致之治法貴乎疎利

大抵臍風等症多主鬱結不通並用所下胎毒如天麻丸

奪命丹藥

並見驚門

錢孔純云臍風撮口若兩眉青色臉赤腹脹不可用藥

凡下胎毒用淡豆豉煎濃汁與三五服其毒自下又能助

脾氣消乳

小兒口禁牙關緊者用生天南星去皮臍研爲細末龍腦
少許合和用指蘸生姜汁藥末于大牙根上擦之立開
定命散 治臍風撮口

赤足蜈蚣半條酒

川烏尖生三箇

射香少許

又方 亦治前症

蛇皮微炒

釣簾

乾蝎稍各一分

先爲末

麝香五分

另研

硃砂一錢

另研

牛黃

半錢
另研

一方加直僵蚕尤妙

右未並一處

再研勻每服一字取竹瀝同乳汁調灌一方止蛇蛻

硃砂麝香三味爲末每用半字津調口中日五七次

龍膽湯 治熱入胷堂引伸入臍因令臍突

龍膽草

釣簾

柴胡

黃芩炒

桔梗炒

赤芍炒

茯苓

甘草

大黃

一錢
裹煨熟

蟬蠅

一箇去足
足灸

水煎服如客忤胞病加人參當歸

三豆散 治躰突

赤小豆

豆豉

天南星

白歛各一錢

右爲末每用半錢搗芭蕉自然汁調敷躰四傍一日
一次次日再敷若得小腸下白卽安

封躰散 治躰諸病

醜帶灰 髮灰 白薑灰 紅綿灰 南星 白歛

當歸頭

血竭

赤小豆

五倍子

龍骨

百草霜

赤石脂

煅

臘脂

海螵蛸

右合研爲細末濕乾敷乾清油調塗忌生水浴
又方 止用白礬龍骨二味煅爲末乾繆

又方 治臍瘡濕腫久則成瘍

黃連

末龍骨
研

血餘灰

韶粉

研各等分

敷患處油調亦可

瓜蒂散

治臍風撮口

瓜蒂

赤小豆 全蝎

右三味煎服吐之卽安

立聖散

治口禁

乾蜘蛛

一箇去足口竹
瀝浸一宿炙焦

膩粉

一錢

乾蝎梢

七箇

右同研爲末每服一字

乳汁滴兒口中時時用之

又方 亦治前症 生甘草一分細剉水煎六分去渣放溫分數次灌兒口令吐出痰涎穢物後取猪乳汁點兒口中差亦治撮口取猪乳汁法候小猪哺乳時急提後

脚倒之其口中乳遂出能進猪乳且可免驚癇

安臍散 治臍中汁出或赤腫

白石脂 煅 髮灰 當歸末 並爲末日敷三度

齧口重齶 懸癰重齶 重舌木舌門

兒初生七日内外口中及舌上生白屑如齧之口謂之齧

口若發于齶上作腫如兩重之狀謂之重齶又謂之懸

癰懸癰見前初生調護法中若發于上下齒齶如重齶者謂之重齶

若發于舌上腫起如舌下更生一舌謂之重舌又有舌

腫脹塞滿口中木強謂之木舌不治卽塞殺人又有舌
下有膜如石榴子狀此皆在母胎中受熱毒流入心脾

二經蓋心候于舌而主血、脾之脈絡又出舌下。若心脾有熱則血氣俱盛故冲發于口舌而有已上諸症並宜用銀刀或指甲刺摘出血不愈再循此法取愈隨各用後方調治若指摘刀刺出血不止用髮灰敷之卽止。凡小兒重舌切不可用手去按按之則舌根損長大語不正。

錢孔純云小兒生齧口及重齧若左拳緊握面白腮赤啼無淚不可用藥如無此樣速投青金丸。

保命散 治齧口

白礬一錢 馬牙硝半兩 研細 硫砂一分 研細

右同研勻每用一

字取白鷺糞以水攬取汁調之先以手指纏亂髮醸

井花溫水拭兒舌上口中垢淨然後傅之令遍卽愈

錢氏一方 治鷺口重齶

天竺黃三錢

人中白一錢

黃連二錢

乳香三錢

水片五分

右爲末每用少許先將溫米泔湯拭去穢後吹入立愈

烏鰡骨散 治重齶重齦重舌等症

烏鰡骨

一兩

乾蟻蟎

五錢燒灰

枯白礬

研一兩

蒲黃

研五錢

右諸細

末研勻每用五錢以鷄子黃調塗腫上嚥下亦不妨

又方 治前症 蛇蛻皮燒灰研細傅之

又方 治前症 生蒲黃爲末敷之

又方 治前症 用竹瀝浸黃柏點之亦好

又方 治前症 用黃丹煅之出火氣繆之舌上

一字散 治懸癰

硃砂 騞砂 龍腦 朴硝各五分研

右爲末用蜜調少許刺血後用鶯翎刷入

如聖散 亦治懸癰

鉛霜研 牛黃研 太陰玄精石研 硫砂各一分研

右各細末同研勻入白龍腦細末半錢相和每用一
字或五分繆兒口中

天南星散 治齧口

天南星去皮臍爲細末用醋調男左女右塗脚心用紙貼乾時再醋潤之

川硝散 治重舌木舌

川朴硝五錢真紫雪一分白鹽五分同研每用半錢入竹瀝三兩點井花水調塗舌上嚥下無妨絳雪散鵬沙散 綠袍散皆可用

蓐瘡

兒生一臍內外因胎毒攻發身生瘡者名曰蓐瘡雞黃煎治之用雞子五枚去白取黃以亂髮如雞黃大者同入銚中熬取汁塗之更用苦參末敷之甚奇據本草云亂

卷之二
七
髮合雞子黃煎水療驚熱下痢註云去痰熱百病又云
療熱瘡用之効如神二味入銚熬初時甚乾髮焦遂有
液液出旋取置磁器中用之以液盡爲度

小兒鑿難于大人論

夫鑿之道誠爲難矣故治小兒尤爲難理寧鑿十丈夫莫
鑿一婦人何也丈夫榮氣壯婦人血脈相衝兼產難治
寧鑿十婦人莫鑿一老兒何也婦人血氣尚盛老兒元
陽枯竭氣血皆衰寧鑿十老兒莫鑿一不語小兒何也
老兒雖衰猶能言語若不語小兒語不得其病之由脈
不能診其必然之理所以難也

小兒病與大人不殊

千金云、小兒之病與大人不殊、惟用藥有多少爲異。
又一括云、小兒不與大人同、得病多因驚熱風先治心神
次除熱、脈宜緊數及浮洪

惠眼觀證云、自一歲至十五歲、皆以小方脉治之、

相初生小兒夭壽法

兒纔離母腹、觀其形體卽知端的、骨大而肉瘦、聲清而目
正、其子少疾而壽永、若胎肥而骨細、聲淒而目無神光、
其子多病而不壽

兒生下身不收、魚口、股間無主肉、汗血、願下破

囊下白或赤 隅不起 身如凝血若無皮 已上俱死

兒生下頭四破 脣小 脣高 聲絕而復揚急 啼聲
散或深 身軟如無骨 汗出不流 小便凝如脂膏
常搖手足已上俱不成人

兒生枕骨不成能言而死 尿骨不成能踞而死 掌骨
不成能扶伏而死 跖骨不成能行而死 腘骨不成
能立而死

歌曰身軟陽痿頭四破 脣高 脣小肉不就 髮稀色脆短聲
啼遍體青筋俱不壽 尿踵 膻骨若不成能踞能行能立
死臍深色老性尊持 方是人家長命子

兒初生陰大而與身同色者成人 脘中無血者成人

啼聲相連屬者成人壽 卵下縫通達而黑者壽 身體鮮白而長大者壽

兒生額上有旋毛者早貴主妨父母 目視不正數動或哭而駙聲者非佳人 髮稀少者不聰人教 早坐早行早語早齒生皆惡相非佳人

小兒病症賦

入門觀色青必驚而白必冷啟關察脈赤乃熱而黑乃寒寒必傷于肺腑熱則蘊于心腎寒能作癟熱極生風夜啼不止皆因孕母胎驚驚哭聲高乃是受胎不足胎中

受寒生下則面白青而啼哭不乳胎中受熱生下則驚口
口瘡而重舌內傷于寒者不吐則漏外傷于熱者有風
必驚驚哭夜啼當以鎮心爲要多啼不出宜當緩胃爲
先面白青紅定是肝心受熱面白黃慘白乃知脾肺痰生
吐而不食涼胃口而飲食自進糞下而臭去積熱而腸

胃自通

面部圖



風池正眉氣池泡臂頭上下太陽太陰山根皆屬肝部位
顴面頰臉氣池下法令傍食倉上高骨取之一寸二分皆

屬心部位

承浆上人中下法令內食倉旁合卽唇開卽口合屬脾開
屬心皆屬脾部位

隼頭至山根兩孔并中梁年壽及內外通息皆屬肺部位
耳花及輪廓文臺山林頤髮際及地閣四維如海岸皆屬
腎部位

天中與天庭司空及印堂額角方廣處有病定存亡青黑
驚風惡體和滑澤光不可陷兼損純黑病難當青則宜

卷之三
憂急昏黯亦堪傷此是命門地墜工可較量

看形色論

先賢言嬰兒有病、肌膚未全、血氣未定、或變蒸未足、寸關莫辨、實難診切。惟在觀其形色、乃知病之所以在其。觀視之法、須要定神安志、勿令情意惑亂、不得于睡起之際、哭方斷之時、恐色不正、須于辰時後已時前、夏卽未熱、冬卽未寒、外色不雜、內氣閑雅、迺可向明而觀察。

觀形氣論

小兒虛實、非係肥瘦、係乎氣色何也？蓋有肥而氣怯、瘦而氣壯、氣怯則色必嫩、其爲虛可知、氣壯則色必盛、其爲

實可知由是論之五臟之氣形于面部肝青心赤肺白腎黑脾黃是其五體肝旺于春心旺于夏肺旺于秋腎旺于冬各七十二日脾寄旺于四季後一十八日是其本位然有時乎不春不冬而面變青黑者非肝之與腎也不秋不夏而面變赤白者亦非心之與肺也蓋五臟之氣層見疊出隨証流行忽然青者主乎痛忽然赤者主乎熱忽然白者主乎冷忽然黃者主乎積此其氣之開闔非係乎時非拘乎位又如心主額肝主眼并左臉脾主唇之上下肺主右臉腎主耳前頰外其形或見于位或露于他部所謂不可一端取也且脾主唇之上下

爲吐瀉或痢日久然其色黑則腎之乘脾水反克土名
爲強勝其臟或敗耳肝主眼并左臉其色青木色也主
驚風是謂順症若見白色乃肺之克肝卽爲逆症以此
推考變而通之存乎其人

五色主病歌

積黃青色是驚風熱赤傷寒紫淡紅黑痛白爲虛冷嗽更
須隨部用神工

又云紫氣紅傷寒青驚白色疳黑時因中腎黃卽是脾端
面部位色証總現

青色者驚積不散欲發風候 紅色者痰積壅盛驚悸增

進 黃色者食積癥瘕癆痞或作癰候 白色者肺氣
不順大傷滑洩水穀不分欲作吐利 黑色者傳不順
症變卽逆候表裏有虧臟腑欲絕其血不榮其氣不衛
面部逐位色証各現

正口常紅無病 乾燥脾熱 白虛

人中黑腹痛虫動 點點黑吐痢

山根紫傷乳食驚 青人叫驚 黑危

印堂青驚 紅驚熱 白無病

額青驚 紅熱

兩眉紅夜啼燥熱

兩眼黑睛黃傷寒 白睛黃積 赤心熱 淡紅心虛熱

青肝熱

太陽紅血淋 青驚 兩紋青第二驚 赤傷寒 右青

驚 紅驚 青惡危

風池紅熱多啼 黃吐逆

金匱青筋驚

兩頰熱赤啼哭

顴紅熱

年上年上頭近乘 黃與赤俱吐痢

腮紅紫痰氣 青驚

承漿黃吐 青驚

已上各有歌具載文繁大抵赤則熱青驚黃積或吐
痢白虛冷黑非赤則危証也

定四季色各歸部位

春 左頰微青者平深青者病白色者絕

夏 額上微赤者平深赤者病黑者絕

秋 右頰微白者平深白者病赤者絕

冬 下頰微黑者平深黑者病黃者絕

季 鼻上微黃者平深黃者病青者絕

四季月各十八日
土旺脾

○嬰童寶鑑觀五臟各部色

心屬火其色赤、南方之應、王在夏、外應于面之左頰、故左
頰上赤色如繭絲之亂者、有餘熱亦有風熱。

肺屬金其色白、西方之應、王在秋、外應于面之右頰、故右
頰上白色如馬尾者、爲肺之氣盛。

肝屬木其色青、東方之應、王在春、外應于兩目、故目內青
色如靛者、謂肝有風、或云驚癇欲發。

脾屬土其色黃、中央之應、王在四季、外應于口、故口四畔
黃色如橘者、脾有積熱。

腎屬水其色黑、北方之應、主在冬、外應于耳、故耳流膿水、
若耳前黑色如烏絲垂于水中者、主腎有疾。

又云

凡赤色如在左顴者心熱、右顴者肺熱、在兩目者肝熱、目周也在耳前後者腎熱

凡白色在右顴者肺氣盛、在左顴者微邪干心、口四畔者脾氣不順

凡黃色上口及人中、并左右兩邊者、脾有痰、黃色微者胃氣不和

凡青色在兩眼白中者驚、又在眼坑者亦同是驚欲發、在左顴上者心多悸、右顴上者風入肺爲咳嗽而喘

凡黑色滿面者、腎冷必下黑糞、此皆辨五藏病色更識春秋冬四季斷其病狀須

在詳審勿
令誤可也

凡色春青夏紅秋白冬黑四季而黃此爲正色若春得黃色夏得白色秋得青色冬得赤色此爲微邪雖有病不治而自愈亦或欲瘥之候若春得白色夏得黑秋得赤色冬得黃色四季得青色此爲鬼色雖無患而亦凶

百上五臟部分相乘色

肝色青者本色也赤者心乘肝也黃者脾乘肝也白者肺乘肝也黑者腎乘肝也

心色赤者本色也青者肝乘心也黃者脾乘心也黑者腎乘心也

脾色黃者本色也青者肝乘脾也赤者心乘脾也白者

肺乘脾也黑者腎乘脾也 肺色白者本色也青者肝乘肺也赤者心乘肺也黃者脾乘肺也黑者腎乘肺也
腎色黑者本色也青者肝乘腎也赤者心乘腎也黃者脾乘腎也白者肺乘腎也

面五藏四時相乘色

經言青赤見于春赤黃見于夏黃白見于長夏白黑見于秋黑青見于冬是謂五藏之生五行相繼也爲病輕若肝色見青白心色見赤黑脾色見黃青肺色見白赤腎色見黑黃是謂真藏之色五行相尅也爲病重

面目死生色

內經云凡病面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑者皆不死聖濟經云脾真爲本而面黃必生者以真氣外榮故也若面青目赤面青目白面青目黑面黑目白面赤目青者皆死謂無脾色外榮而真氣已絕故也

面土五藏生死色

經云滋榮者其生色青如翠羽赤如雞冠黃如蟹腹自如豕膏黑如烏羽枯夭者其死色青如春草赤如血黃如枳實白如枯骨黑如哀棋

金匱死生

凡小兒病者有黑色滿面或繞口入口或沿眉繞目或暗

人中者皆死有青色延面連目入耳者死目無睛光睛中有物如橫紅針者死

外臺死色

男女十歲已前凡有病觀其面上有青黑色如紗蓋定從髮際至印堂者不論疾之淺深六十日內死至鼻柱者一月死至人中者十日死滿面者卽日死雖虛扁不能療

嬰童寶鑑年上色

鼻準頭上微微高處名曰年上看年吉凶更上一位亦有微起處名曰壽上看夭壽

嬰童寶鑑四墓色

從兩眉間直上至髮際左爲父墓右爲母墓口吻直下爲
男女墓四墓上皆四季正色者平春得青平白在四墓
七日死夏得赤平黑在四墓四日死秋得白平赤在四
墓四日死冬得黑平黃在四墓者死四季黃平青在四
墓者死而有五色不常不澤者死

幼科輯粹大成卷之一終

幼科輯粹大成卷之二

吳門安予馮其盛躬甫纂輯

第 熙東馮 曙升甫校正

門人潤吾姚光德佑昌同校



虎口

關三

手紋



男左女右叉手處名曰虎口自虎口而上第一節名曰氣
關有紋過者方病諸病既生則氣不調順故名氣關也

第二節名曰風關有紋過者須發驚風漸加困重故名風關也第三節名曰命關有紋過者則病極而命危殆故名命關也氣關易治透過風關漸難過三關多死候男女左右雖爲定理然男女均具此陰陽左右兩手亦當參驗左手之紋病應心肝右手之紋病應肺脾於此消息尤得變通之意假如左有紅紋定知發熱右有雙紋如左亦知脾傷熱積餘可意推

魚刺形 主初驚在氣關主壯熱吐瀉在風關主驚
癇發在命關驚重難治

歌曰形如魚刺是初驚遍體如湯面色青或瀉或煩

宜此斷消痰調氣便惺惺

一垂針形主瀉痢在氣關主發熱吐瀉在風關瀉傳驚
風在命關驚傳慢驚惡候

歌曰形如懸針瀉利多發驚身熱定違和此病若變
驚風慢三關通度是沉疴

水水字形主肺驚在氣關涎痰咳嗽虛積在風關發
驚喘痰涎在命關不治

歌曰形如水字肺家驚虛積相傳面白青膈上有痰
須與治命關若過更無寧

乙乙字形又曰中曲主食驚在氣關主食傷吐痢在風關傳

變驚風

乙形主肝
刑于脾

在命關傳慢脾風不治

歌曰形如乙曲病因肝眼慢驚啼癲癇偏令積爲傷傳變此慢脾風已度三關

上是去蛇形主內實外虛
下是來蛇形主外實內虛

中卷蛇形主
內外俱虛

三樣皆曲

蛇形又曰曲虫形在氣關主疳積在風關主疳勞帶驚在命關不治

歌曰形如蛇曲病因深脾積疳勞又帶驚未過二關宜早治三關若過莫須論

長者弓形
短者環形主疳積在氣關吐逆疳熱愛吃泥土在

風關疳極羸瘦在命關不治

歌曰形如環弓疳氣當好食泥土是尋常此病早求能者治三關已到命飛揚

○糞亂紋形主虫痛在氣關主氣不和有虫積食諸生物在風關主虫咬心痛在命關病重不治

歌曰紋亂縱橫虫上尋曉夜啼號不可禁神佛遍求都莫應安虫取積始平寧

○流珠形死候此候不拘三關上下見者皆爲死候歌曰流珠忽覩在三關孩子相辭命已難醫者返魂求妙藥雖逢扁鵲也應閑

大抵紋勢彎曲入裏者病雖重而證順猶可用力若弓反
出外駸駸靠于指甲者斷不可回其有三關如流珠流
米三五點相連或形于面或形于身危惡尤甚
又其間指紋不見有病者必于面部上見面部上不見有
病者必于脈息主之更宜參酌

諸紋總歌曰魚刺初驚候懸針瀉痢多水紋驚肺積乙字
是肝訛虫曲疳將甚環弓可嘆呵亂紋虫咬甚珠現作
沉疴

錢孔純辨虎口三關紋色

紋有五色紫者風邪在表驚則紋青淡紅則寒熱在表深

紅必發傷寒症疹青紅者驚熱紋亂則病久紋細則腹
痛多啼乳食不消紋粗直射指甲必主驚風惡候紋黑
如墨大抵困重難治

寸開尺



圖形手關三息脈

卷之二
諸家脈理論

小兒脈諸家所言甚衆今擇其當者具載于後不出數條可總括也

歌曰小兒有病須憑脈一指三關定其息
以分三關以一指診之

浮洪風熱數爲驚虛冷沉遲實有積

浮脈爲風秋得之曰平餘時主傷風寒頭疼壯熱或夜熱晝涼咳嗽噴嚏鼻塞清涕嘔逆不食

浮者按之不足輕手乃浮如急管之狀故曰浮

洪脈爲熱夏得之曰平餘時主風熱壅盛身體溫壯發驚

瘡瘍血泄

洪者輕手脈來大重手脈來亦大散大滑部狀如浮脈故曰洪

數脈爲驚春得之曰平餘時主驚風抽掣脉數小者多睡

惕跳直視恐怖盜汗夢中咬牙吐舌喘吐脈數大者一

二日間必發搐搦

數者脉來急疾故曰數

沉遲爲虛冷四時得之主脾胃虛弱滑瀉脫肛吐痢不止

日漸尪羸以成脾困或作疳勞

輕手全不見重手按至骨脉來沉弱細小故曰沉遲

實脈爲積滯久得之曰平餘時主食傷積聚面黃腹脹或

痛髮堅吐痢緩治卽成疳勞丁奚哺露候若肥實者宜

與稍涼藥取積後補若羸瘦者臟腑虛薄可與性溫藥

取積後補

實者輕手脉不見重手來大故曰實

寶鑑論四時脈春弦夏洪秋浮冬沉四季緩各推其旺相表裏以察其病假如春得弦而浮者病在表在肺爲陽

爲順易治若得弦而沉者病在裏在臟爲陰爲逆難治
餘於此

王叔和脈歌曰小兒乳後輒吐逆更兼脉亂無憂慮弦急
之時被風纏脉緩卽是不消乳緊急細缺亦少苦虛濡
邪氣驚風助痢下宣腸急痛時浮大之脉歸泉路

通真子歌曰小兒三歲至五歲呼吸須將八至看九至不
安十至困短長大小有邪干又曰小兒脈緊是風癧沉
緩須知乳化難腹痛緊弦牢實秘沉數有熱在骨間

錢氏脉理論云小兒病不能言惟在虎口三關并一指脉
雖王叔和猶云小兒三五歲診八至脈又云一歲變蒸

已足方有脈自寸口而生不知小兒初生未滿一月手
掌高骨之際亦有脈息吸收而動脈者血氣之波瀾既
生成人必有血氣焉得無脈只不比大人察其端詳之
意也診小兒脉洪則爲實濡則爲虛緊則爲風緩則爲
積數則爲熱遲則爲寒

諸般病脉 弦爲風寒 數爲瘧 急爲氣不和或爲客
忤 緊爲痛 緊數者驚癇 浮爲風 浮緊驚風
浮大傷寒 浮虛盜汗 浮數風熱 伏爲氣滯 緩
與細皆爲冷爲乳不化 虛與濡爲虛弱爲驚 虛濡
慢驚 虛緊伏熱 沉重有積 沉數骨間熱 沉遲

虛冷 沉緩傷食 牢緊癥聚 牢實脇秘 心脈滿
大肝脈小急驚癇 心脈數小疳淋 數急者熱 寸
口脈直上直下者爲驚 寸口脈大小不勻亂者變蒸
左寸口無脈心痛中熱嘔逆口瘡或咳嗽喉中哽
頭出而熱此乳母食冷以乳兒所致也又脈亂者吐逆
右寸口無脈胃滿短氣吐逆噫噦喉中響此乳母抱
兒衝冒風寒所致也 凡脈如雀啄而緊者風癇 凡
脈大小不依部次者惡候 凡小兒脈虛者病亦虛輕
得脈實者病亦實重手得也故急驚脈促急慢驚脈虛微
凡小兒三歲已上七歲已下其脈一息七八至爲平過之

者曰大過爲陽盛不及者曰不足爲陰盛

浮爲風

沉爲冷 洪爲熱

浮沉洪三脉

微爲寒

指下往來細如亂絲重手卽無

輕手乃得故曰微

緊爲實

亦曰痛緊者如絲而急挑之有力曰緊

沉細爲乳結

亦言其脉細小而沉也

弦數爲瘡

脉弦如筆通度帶快

弦急爲客忤

弦急如琴上之弦

大小不勻爲中惡

言其脉或大或小不依其部也

脈虛病亦虛

虛脉輕手得之

重手卽無只因頻丁或久漏故

變蒸之脉寸口亂

亂爲大脉

小不勻伏爲氣脉

筋下左寸無脉右寸無脉

註見心脉滿大肝脉小急

並

爲癰癧癰之病尺寸脉俱浮直上直下督脈連腰脊

強不治三部脉俱緊急其癰可知

吐乳呢乳脉浮

者可治弦急者氣痛弦緊牢強爲癰癧隨其左右

尺寸脉俱浮直上直下督脈連腰脊

上見三部脉沉爲乳食不消化緩亦同 脉如雀啄
若緊者風癇 脉浮大者宜發汗

小兒脉數多風熱沉伏原因乳食結弦長久動肝臟風弦
數爲驚四肢掣洪浮腎中似火燒若兼腹痛好添愁息
數和平八九至此箇分明不可憂

凡傷寒急驚疹痘之候此爲腑病浮洪易安沉細難療且
與回陽兩日至第三日再論之如得陽脈方許調理然
陽脈取之在輕手如捻葱管乃有滿部重按卽無是也
若中慢驚吐瀉瘡痢之候此爲臟病沉細易安浮洪難
療蓋陰病脉行于內不可行于外然陰脉輕手按之不

顯尋之至骨沉沉應手是也凡一切病覺脈來三點六
又三點細此爲難治大抵小兒只看陽脈大陰脈細

○王叔和立脈體註脈訣

七表脈

浮脈不足舉有餘芤脈中空兩畔居滑體如珠中有力實
形幅幅與長俱弦如始按弓絃狀緊若牽繩轉索初洪
舉按之皆極大此名七表不同途

浮爲中風芤失血滑吐實下分明別弦爲拘急緊爲痛
洪大從來偏主熱

八裏脉

微來如有又如無沉舉都無按有餘遲緩息間三度至濡
來散止細仍虛伏須切骨沉相類弱脉沉微指下圓濶
脉如刀輕刮竹分明八裏坦如途

遲寒緩結微爲痞濶因血少沉氣滯伏爲物聚濡氣虛
弱則筋痿湏審記

九道脉

長脉流利通三部短脉本部不及湏虛脉遲大而兼軟促
脉來數急促歟結脉時止而遲緩代脉不還真可吁牢
脉如弦而更實動脉鼓動無定居細脉雖有但如線九
道之形乃自殊

恆臍

雀啄連來三五啄、屋漏半日一點落。彈石硬來尋卽散、搭指散亂真解索。魚翔似有一似無、蝦遊靜中方知覺。

治幼心法小兒臍賦

五歲人將一指診、十歲始將兩指決。十五纔將三指看、脈與大人每懸絕。大人五至爲平和、小兒七至始無病。四至五至冷危困、十至十一熱爲多。三遲二敗死、脈訣十二十三魄欲滅。臟腑三部脈未分、但以浮沉遲數別。風痰疾喜遲而浮急、大洪數兒不瘳。緊大邪氣風癇作、弦急寒邪風冷求寒瘡。脈弦而帶遲、熟瘡脈弦而帶數。下刀斗昇華大成

病之脈喜沉微浮大現時難用藥吐瀉順脈小而微乳後輒吐脈亂宜中暑霍亂喜浮大最嫌沉細與沉遲急驚之脈弦數喜慢驚之脈宜沉細疳積診時洪大宜沉細必然無藥治水腫浮大脈方吉沉細何常得安寧吐衄腹疼沉細吉浮數弦長藥未靈繫數細快無他疾沉緩不能消乳食氣喘身熱宜滑瀉脈濶四肢寒者厄四時各有一脈優春弦夏洪秋脈浮冬實季緩正邪病賊微虛實亦宜求假如春間得冬脈從後來者虛邪迫夏天見是從前來我去生子實邪逆秋脈見兮賊邪形鬼來克我我不勝脾家脈見微邪病夫克妻兮總病輕虛

邪須還補其毋能令子實而可實邪渴子奪其母爲
子能令母虛故賊邪渴補本經微邪不治何湏驚名
使相平無勝負夏冬春秋脈類能評

審脈順逆

驚搐

浮數順體溫順肢冷逆

汗後

沉細順洪緊逆困睡順狂燥逆

咳嗽

滑浮順沉細逆身溫順肢冷逆

吐噦

浮大順細沉逆身溫順身冷逆

諸痢

沉細順浮大逆身涼順身熱逆

諸腫

浮大順沉細逆臟實順泄爲逆

夜啼

微小順洪大逆體溫順肢冷逆

傷寒

洪弦順沉細逆洪大順微伏逆

溫病

洪大順沉細逆身熱順腹痛逆

霍亂

浮洪順虛微逆緩小順浮大逆

泄瀉

身溫順肢冷逆緩小順浮大逆

諸渴

洪數順細微逆身溫順肢冷逆

瘓喘 滑大順 沉細逆

痺勞 累數順 沉細逆

逆

寒熱

累數順 沉細逆

逆

腹脹

浮大順 虛小逆

逆

黃疸 浮大順 沉細逆

逆

虫痛

身溫順唇青逆

逆

心腹痛 沉細順浮大逆

逆

火瘧

浮大順 沉細逆

逆

中惡腹脹 累數順浮大逆

逆

諸失血

沉細順浮數逆

逆

死証脈 脈來三動而止不見者死

逆

直者死

脈來聳然不見者死

逆

凶速硬如弦勁在弓聳然至而反不見皆爲死脈定其

又論死脈 傷寒身大熱體黃脈沉細者死

逆

中惡脈緊

細者死

黃疸脉沉細腹滿者死

附三指看法

小兒初生半歲前有病者湏于額前眉上髮際下以無名指中指食指重按之若三指俱熱者其外證必感寒鼻塞氣粗三指俱冷爲吐瀉候若食指熱必胞膈不寬無名指熱必乳食不消

別一本五指歌

五指二節冷驚來不可安忽然中指熱必定是傷寒中指稍頭冷疹痘有多般女右男逢左八片錦中看

五臟症治論

肝主風實則目直叫哭呵欠頓悶項急治當瀉肝瀉青丸之

虛則咬牙多欠口中氣熱則外生風氣溫則內生風治當補肝肝氣熱則擣衣捻物熟甚則目直不擣風主動又風淫末疾熟則風動于四末故手擣衣捻物也熟入于目牽其筋脈則兩臂俱緊不能轉視故目直也治當瀉心肝肝有風則目連劄風甚則身反折強直不擣凡病新久皆引肝風風動生于頭目目屬肝風動入于目則目上下左右如風之吹不輕不重兒不能任則目連劄也風甚則入筋脈筋脈緊急故身反強直也治當瀉肝補腎肝有熱有風甚則皆兼驚症不擣者謂未得心熟故也若心熱乘于肝則子母俱有實熱風火相搏而

發搐其抽掣之勢如風蕩火也

治見驚門

若肝熱搏衣捻物

壯熱飲食喘悶者肺乘之也治當瀉肺肝在四時冬相

春王夏衰秋絕若在春肝旺之時

早晨亦同

反見肺病乘肝

者是肺強肝怯也治當瀉肺補腎肝虛補腎者虛則補

其母母能令子實故也甚則肝階兼補輕者肺病退則

愈重者目中淡青必發驚若更有搐者當發赤也謂怯

則目淡青色有心熱則赤故當發搐肝虛實皆主風若

外感生風者則呵欠頓悶口中氣熱治當發散若飲水

能食不止者當微下之餘不可下

心主驚實則叫哭發熱飲水驚悸竄搐治當瀉心虛則卧

而悸動不安手足搖縱治當補心心病虛實皆主熱心
實則喜仰卧益氣實合面卧則氣不通故喜仰卧使氣
得通治當瀉心心熱則視其口中氣溫或合面卧而就
冷及上竄咬牙也蓋心熱則胞亦熱兒雖不能言有就
冷之意故合面卧也治當瀉熱若邪熱乘心則爲驚啼
治當安神心于四時春相夏王秋衰冬絕若在夏心王
之時日中^{亦同}反見腎病乘心者是水勝火腎强心弱也治
當補其肝心瀉其膀胱蓋腎主虛無實不宜瀉膀胱爲
腎之腑瀉其腑則臟自不盛也輕者腎病退則愈重則
悸動不安當發搐也

脾

胃附

脾主困實則困睡身熱飲水能食治當下之虛則

身溫四肢冷吐瀉生風治當補之脾寒者夜啼脾屬陰
冷則夜間發痛故啼哭治當溫中脾熱者弄舌脾熱則
舌絡緊故時時舒吐也或時飲水熱則津液少故也治
當分解其熱不可用涼藥下之醫者多疑其飲水爲熱
便以涼藥下之如面黃肌瘦五心煩熱則爲疳也治見
脾門

若不因脾熱大病未已弄舌者凶也又脾臟冷熱皆主
吐瀉困倦若瀉色黃者熱色青者冷秋冬春冷多惟夏
暑熱多胃附吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也吐瀉昏睡不
露睛者胃實熱也胃久虛熱多生瘧病胃虛冷吐痰沫

白綠水不食腹痛或瀉青白刷完穀不化若胃虛怯有
汗者但上至頸下至腰若面㿠白無精光口頻撮口中
氣冷不思飲食者脾胃不和當補脾胃凡小兒血氣未
全自小多啼哭者胃啼也脾胃二者腑臟表裏人之司
命故同病脾于四時王在四季月若干王時反見他臟
病乘脾者是脾弱也如春季木位土王之時見肺來乘
之秋季金位土王之時見心來乘之之類是也餘倣此
治當補弱爲強隨証治之輕者所乘之藏病退則愈重
者而目亦黃脾怯也

肺主喘實則悶亂喘促有飲水有不飲水者治當瀉之虛

則哽氣長出氣治當補之肺熱則手搃眉目鼻面甚則
吐稠涎及咯血者久則肺虛治當補之若虛熱則唇深
紅色治當解熱若實則涎痰潮吐治宜下涎肺氣盛而
熱又復有風冷者則短氣悶亂胷滿喘嗽上氣當先治
肺後散風冷若肺只傷風者不曾滿也但只散風又肺
有虛實寒熱咳嗽者並干咳嗽門見之肺于四時夏相
秋王冬衰春絕若在秋肺王之時日西^{時同}反見肝病來乘
肺者是肝強肺怯也肺怯則唇白謂肺脾病久脾爲肺
之母母子皆虛不能相榮故名曰怯其病悶亂氣呃喘
促哽氣難治爲肺虛損也治當補肺而瀉肝輕者肝

病退則愈重者唇枯白者死白澤者尚吉

腎主虛腎病無實惟痘瘡腎實則變黑陷餘無實症虛則身冷無精光畏明體骨重盈腎氣不足則下竄而骨重惟欲墜于下而縮身也又腎屬水陰也虛則畏明若因他病致腎虛者非也又腎虛謂本怯由胎氣不成精神不足目中白睛多而胱白無光多鮮顧此皆難養縱長不成人若恣色慾多致夭亡治並常補腎于四時秋相冬主春衰夏絕若在冬腎王之時夜半同反見心病來乘腎者是心強腎弱也治當瀉心補腎輕者心病退則愈重者下竄不語腎怯虛也

凡病必視其新久虛實假令肺病又見肝症若咬牙多欠者則易治謂肝虛不能乘肺也若目直叫哭項急頭悶者則難治謂肺病久則虛肝強而實反勝其肺也虛則補其母實則瀉其子

又病必視其五臟衰王時侯考其相乘勝負虛實其順則易治微邪是也逆者難治賊邪是也五臟相反隨病之凡病先虛或已經下之有合下之者必先實其母後下其子也假如肺虛而痰實此可下之證當先益其脾後乃瀉肺也諸病倣此

凡病有熱者或踈利解化之後無虛症者勿用溫補不然

熱必隨生

○漢東王家寶論五臟相生克

肝屬東方木、木生火、金能克之、旺在春三箇月、能克土、見秋而衰、以脾爲婦、木爲陽、土爲陰也。心屬南方火、火生土、水能克之、旺在夏三箇月、能克金、見冬而衰。脾屬中央土、土生金、木能克之、旺在四季月、四立前後各十八日、能克水、三月七月九月十二月亦是旺也。肺屬西方金、金生水、火能克之、旺在秋三箇月、見夏而衰、能克木。腎屬北方水、水生木、土能克之、旺在冬三箇月、見夏而衰、能克火。所言肝屬木、肺屬金、肝却見水

沉肺却見水浮者何也肝者謂水所生又行其陰道被水土所瘀故見水而沉及至煮熟還其本性却又浮也其肺屬金所謂心之相近又行其陽道所以被火抽見水權虛浮及至煮熟復還其本性而却沉矣

○茅先生論小兒五臟病四時所不宜

心臟不宜夏

瀉後變爲痢血黑渴難當

心主渴心絕則血黑虛煩故發渴

肌瘦難行

坐虛舌不能藏

心主舌心絕則舌不收

兩臉如脂赤

病久面當無色今反如脂

陽上發也無語口生瘡

心主聲絕則不能語

此病夏中得何湏

更忖量

卷之二
肝臟不宜春

眼目頻頻澁渾身似醉人時時貪睡卧心煩又好嗔肝目絕則不能開故澁而只要睡又肝主筋力絕則唇白如醉人不能舉也又肝主怒絕則多怒不止也唇白

眼胞腫狂躁足啼聲東方應此候此病不宜春

脾臟不宜四季

面色常黃好不可見相傳肢弱增寒甚亟行覓食糧

脾主

四肢絕則體弱又脾絕則胃逆乘之故發增寒肝絕則胃熱故更不安而上出吃乳唇無力齒露蓋時難脾主唇絕則不能啟掩其齒又不能吃乳眼屬脾

不久在人間

肺臟不宜秋

肺侯應白色莫使見絕形鼻青孔燥黑脰脹眼胞傾肺
鼻絕則肝逆乘之而色青又肺絕則無涕故孔燥里肺主眼胞絕則脰脹項直喘氣促胸凸
沒廻聲肺主氣絕則喘急項直以引氣也絕則胞中滿口但有出氣而無廻聲也秋間逢此
候一命定難生

腎臟不宜冬

冷汗時時有尿多夜裏驚腎絕則陰陽相離故冷汗出而小便不禁精者神之合絕則精神離故夜裏多驚
腎屬陰夜亦屬陰故也支交接故也遍身生粟疥手足冷如冰陽盡不能
項倒頭難舉面黑沒精神腎絕則天柱骨倒面故也目皆黑無精神也此
候應壬癸冬得殞其身

諸家死證歌

○王叔和小兒外證一十五候歌

眼上赤脈下貫瞳人

赤脉屬心瞳人屬腎乃心火勝腎水水乾則不生木致肝腎絕頤門

睡起兼及作坑

則陰皆執候也

鼻乾黑燥火克肚大青

筋木克目多直視覩不轉睛

經曰迴則不轉是也

指甲青黑忽作

鴉聲

肺肝已絕虛舌出口

齒咬人

魚口張而不合也是謂脾絕急作喘哭而無聲是謂肺絕

氣蛔虫生于胃中籍穀食以養

胃絕而穀食不入更故出也用藥速救十無一生

○雜症二十四種死候歌

太衝無脉直視看人魚口自動滿口黏津時時惡吐身色
黑形五心高腫舌出虛伸或縮或尸伏熱如薰喉中空

響瀉出異形面多火燥吐瀉無停兩眼半開驚叫咬人
指甲青黑齒落辨疔顫腫或瘍瀉止復增丹毒遍體啼
作鶴聲久際不白豈曰再生二十四症必是死形

○漢東王家寶小兒形證歌

小兒形證卒難測、滿口頑痰喉中塞、

此是風癆閉其九竅
頭於方出口中也

吐瀉無時加咳嗽、

此爲脾胃虛而不能化其穀食、
故無時吐瀉也咳嗽即是胃生風、身

上皮膚無血色、

即是血脫不應也

汗出如油頭嶢峻、

其汗出者
即是陰陽

相離榮衛相別津液爲汗故如油撒其
頭嶢峻即是顛門崩是心絕即死也

目無光彩鼻中

黑、

其鼻中黑即是肺絕鼻是肺之外應目無光彩

浮胸

即是腎絕腎主眼之瞳人腎絕即日無光彩也

心口牽撮口肺脹脈絕手足如冰脚面直

胃絕則手足拘直也

搐

搦睛斜連唇口其筋絕卽搐、其筋搐上故抱、將手抱頭難可救、其筋搐。

千頭此大頭快眼、眼眶青色多焦渴、即是肝絕也、肝主東方甲乙木其色青虛卽渴矣、飲

水百盃猶未歇其胃苦直卽水不能廢也、臉腫眼浮脈不來、心絕則

王血血脈不能廢故臉腫、是物粘身將口呷、脾腎絕狀如魚口、啼哭

無淚如鴟聲肝主淚肝絕則無淚肺主聲、往往如呷水相似、如嚦喉中牽錫口

吹沫竈被痰閉氣出入不能故如牽錫之聲其沫即是衛氣出不返、此疾誠難可療之

免被時人道鑒殺

○漢東王家寶小兒一見生死訣

幼童肺氣辨何形、二十五種甚分明、抱着遍身不溫煖、提

絕四肢不動也、四肢垂彈哭鴟聲四肢垂彈者胃絕也、肺主四肢既絕不能管也、鴟聲解見前

鼻乾黑燥目直視

鼻乾黑燥見前目直視者志絕也脾主志故直視

啼哭無淚

瀉延清絕

是肝

擗眉摘眼爪甲黑

即是筋絕筋痺

故擗眉摘其眉泥塗腫

起或爲坑

其頰或腫或陷也

將口咬人魚口急

即是兩日角垂如魚吸水之狀

脚直肚大有青筋

即是筋絕不能散脚肚脹即是氣絕也

上視似觀于高

物

目直故上視也

長噓出氣

黑文行氣欲絕出而不迴

肺吃乳不

妝舌出口

孔不妝胃絕舌出口心絕

唇不蓋齒眼眶傾

脾主肌肉外應唇脾絕故

唇肉不益齒眼眶亦屬脾

瀉刺多變黑黯血

心主血心絕故下黑色也

沒心情

一邊搐也虛笑不止顏

不論貴賤及男女救療

十人無一生

錢乙死證

瀉不定精神好

大渴不定止之又渴

吹

鼻不嚏 病重口乾不睡 時氣唇上青黑點 頰深赤如塗胭脂 鼻孔開張 喘急不定 而有五色不常不澤

諸般死證 病困汗出如珠不流 頭毛上逆 唇口乾枯 口鼻氣冷頭低不舉 卧正如縛 四肢垂弊 手足冰冷

通貞子死候歌 顚陷唇乾目直視 口中氣冷卧如痴 身形強直手足軟 掌冷頭低盡莫醫

○對證用藥賦

夫人之深愛莫過其子醫學之難無如小兒痛楚不能言

說憑醫診察方知醫乃精通妙理當知萬法千機一方
一藥一病莫令毫髮差殊且如初生嬰兒躄風撮口天
麻丸保命丹胎驚同用夜啼腹痛鈎藤膏當歸散參用
能堅咳嗽傷風痰熱抱龍丸則可便青呢乳驚瀉暖驚
餅何疑驚癇急慢長生餅保安丹速效惺惺散治變蒸
發熱參蘿飲療停食感胃羞活散發散四時風寒化滯
丸疎利三焦消導紫霜丸化乳癖堅癥定命丹治胎風
天吊吐瀉俱作霍亂之症炎天中暑玉液五苓甘露脾
虛吐瀉補脾助胃香橘布袋丸治癰積腹大痃癆過脾
散療痞癧四肢瘦瘁褐丸子消腹脹脾疳萬金丸治癰

黃久積眼赤肝熱漏青丸亦治急驚目竄心神驚悸鎮
心丸療發熱驚啼下痢赤白弓看新久而用梅連導
氣躁通轉下弓量大小宣風通膈相宜臟冷脫肛弓服
豆蔻丸托赤石脂散小便秘瀉弓導赤散入正散葱艾
熨、瞬丹瘡毒痛服化毒丹用針砭血重舌喉閉吹喉散
絳雪丸奇平旦忽發驚搐切防瘡疹無事懵然驚叫是
祟物客忤于兒頭面瘡癬弓貼金華散服消毒飲鼻疳
停耳弓紅綿散月蝕散等藥扶持牙疳齒腐青金散蟾
酥散瘻漿漱洗疳積腹痛五疳丸長生丸和胃磨脾胃
傷虫動安虫丸化虫丸慎食肥膩肺寒痰嗽鳳髓散半

夏丸服而自愈。感冒傷寒清解散涼肌解表和解攻裏
柴胡湯用有日期。咳嗽痰涎鈞齡化痰丸。南星丸服之
卽止。馬脾風風喉肺脹奪命散無價。散涎喘皆除。痰食
俱作白玉餅。葱頭湯下口瘡糜爛倒聖散敷貼脚底。頸
隆鼻塞通關膏貼顙卽通驚風牙禁定搐散可審安危。
昇發瘡疹先使升麻葛根透肌活血當用柴草參耆裏
實者氣勻紅活裏虛者助裏涼肌用溫藥又防咽喉之
燥塞施涼劑恐怕裏晚而寒虛天麻防風丸善療驚風
胎熱心驚青州和蘿合能盤吐瀉後而生慢脾若下風
痰礞石奪命丹乃爲珍劑。痢頻無度水煮木香丸神效。

不非脑冷鼻淵弓吹二黃散服辛夷散疳眼雀目弓炎
鼻準服夜明砂丸顯耀良醫行遲五軟鹿茸丸強筋補
髓鮮顱頸咽地黃丸填腦滋基龜胸肺壅百合丹疎痰
定喘蛇腰龜背灸肺俞而脊點龜尾驚狂神亂猪心丸
寧心膏安神定志癲癇健忘寧志膏蝎虎丸待用無違
妙法奇方起嬰孩之痼疾俗言俚句請賢明而改諸

變蒸論

嬰孺始生有變蒸者以體具未充精神未壯尚資陰陽之
氣水火之濟甄陶以成亦由萬物之生非陰陽氣蘊熟
蒸無以榮變也每三十二日一變六十四日一蒸變者

易也。蒸者熱也。自生日始三十二日爲第一變屬腎。又三十二日再變。且蒸屬膀胱。爲表裏。共六十四日也。其變則耳與骭骨俱冷者。腎爲水。水數一。故爲變蒸之始也。又三十二日爲第三變。屬心。又三十二日爲第四變。且蒸屬小腸。心與小腸爲表裏。共一百二十八日也。其變則汗出而微驚者。心爲火。火數二。故爲變蒸之次二也。又三十二日爲第五變。屬肝。又三十二日爲第六變。且蒸屬膽。肝與膽爲表裏。共一百九十二日也。其變則目不開而并者。肝爲木。木數三。故爲變蒸之次三也。又三十二日爲第七變。屬肺。又三十二日爲第八變。且蒸

屬大腸肺與大腸爲表裏共二百五十八日也其變則皮膚熱或汗或不汗者肺屬金金數四故爲變蒸之次四也又三十二日爲第九變屬脾又三十二日爲第十變且蒸屬胃脾與胃爲表裏共三百二十日也其變則不食腹痛而吐乳者脾爲土土數五故爲變蒸之次五也又心包絡爲臟三焦爲腑此一臟一腑但無形狀故不變蒸前十變五蒸乃天地之數以生成之後又六十四日復一大蒸計三百八十四日又六十四日爲二大蒸計四百四十八日又六十四日爲三大蒸計五百一十二日又六十四日爲四大蒸計五百七十六日變蒸

數足見方成人變者變生五臟蒸者蒸實六腑所以成人每經一變一蒸體態卽異其變蒸之候輕則發熱微汗似驚耳聧俱冷上唇端有白泡起如珠重則壯熱脈亂而數或吐或不食或煩燥渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似但傷寒耳聧俱熱上唇無白珠此爲異耳其治用和平之劑微表微利之或不治而自愈可服紫霜丸黑散子柴胡湯吐瀉多啼者當歸散調氣散之類又有不熱不驚暗變者氣實故也

紫霜丸 治變蒸壯熱及傷寒乳哺失節宿滯癰癧腹滿吐瀉亦治食癪先寒後熱

代赭石

火煅十次

赤石脂各

巴豆

三粒去皮心油

杏仁

五十粒去皮尖

右上二味爲細末下二味搗成膏相和更杵二千下
若硬加蜜同杵作劑收磁器中蜜固之三十日兒服
麻子許乳送下伺小利卽熱除若未除明日更一服
百日兒小豆許以此準量加減夏月多熱喜冷發疹
每二三十日輒一服甚佳

黑散子

治變蒸熱不解及挾時行瘟病

麻黃

去根節二分

大黃

一分

杏仁

一分一小半去皮

右三味燒存性研末每服半錢水半盞煎服抱兒于
暖處取微汗身涼卽愈

惺惺散

治變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

人参

茯苓

白朮

桔梗

甘草

川芎

細辛

天花粉

姜薄苛煎服

柴胡湯

見寒門

當歸散

當歸

二錢

木香

辣桂

人参

甘草

各一錢

姜棗煎

調氣散

治變蒸吐瀉不乳多啼

木香

香附

炒

人参

厚朴

姜製

藿香

陳皮

甘草

各一錢

姜棗煎

人參辛梗散

治變蒸發熱傷寒咳嗽

卷之二
甘草 枳殼 桔梗 川芎 細辛 人參 白朮

茯苓 薄荷 半夏 黃芩 花粉 姜煎

○五氣弱論

兒稟五行而分五臟故自五氣以生五態然母氣有盛衰之異故生子有剛柔之別又經云心氣虛而語晚肝氣微而行遲脾氣弱而肉瘠肺氣怯而皮敗腎氣衰而顚鮮如此之類聖人亦製方以補養之

心氣 盛者早言笑多髮怯者性癡語遲髮不生生不黑蓋心繫舌心怯則語遲心主血髮爲血餘心怯血不榮髮也

菖蒲丸 治胎中母卒有驚怖驚氣乘心生子心神不足
故語遲

人參 石菖蒲 麥門冬 遠志 川芎 當歸
乳香 右爲末蜜丸菉豆大硃砂爲衣米湯食遠服十
餘丸量大小增減日進二三服

菖勝丹 治髮不生

當歸 生地 芍藥各一
右前三味並爲細末入后二味末同研勻蜜丸黍米
大每服十丸煎黑豆湯送下兼化塗頭上

香薷膏

香薷一兩

胡粉五錢

豬脂二錢

用水一鍾煎香薷汁三分入胡粉脂油調勻塗頭上
日三次

又方以鯽魚燒灰研末和醬塗之卽生 又方以羊屎燒
灰淋汁同豉汁洗之三日一次不過十次卽生

肝氣 盛者躊躇發行立怯者長不能行甚而肉瘦骨節
露名曰鶴膝行遲肝兼腎病肝主筋筋弱不能行又腎
主骨腎弱膝骨不成故不能行兼治腎肝錢氏地黃丸
加鹿茸牛膝五加皮散治之筋骨生則漸漸能行又或
眉不生眉屬肝肝氣不榮故不生何以知之蓋五臟皆

有毛髮屬心心爲火火炎上故髮上搶鬚屬腎腎爲水
水潤下故鬚順下是以女人無外腎故無鬚毛屬肺肺
在五臟上而主外故毛生皮膚之外眼睫毛屬脾眼輪
亦屬脾脾在右故睫毛斜生輪上眉屬肝肝在左故眉
斜生睫上左爲上右爲下所以眉在上而睫在下

錢氏地黃丸

熟地四錢

山茱萸

乾山藥各一錢

澤瀉半錢

牡丹皮

白茯苓各一錢半

右爲末蜜丸菉豆大量兒

大小加減外加五加皮牛膝鹿茸

酥炙

虎骨丸

又名鹿
丹

治行遲

虎脰骨

酥灸

酸棗仁

當歸

生地

黃芪

防風

鹿茸

酥灸

桂少許

牛膝

茯苓

川芎

除桂各等分

五加皮散 治行遲

五加皮 牛膝 木瓜 各等分

右爲末每用一錢五

分粥飲調化入好酒二點再調食前服

烏麻散 治眉不生七月採烏麻花陰乾爲末以生烏

麻油浸每夜擦之

脾氣盛者肉厚怯者肌虛而多汗肉瘠蓋脾主肌肉怯則肌虛肌虛則榮衛衰故汗多而肉瘠

丁香散 治脾怯多汗

陳皮

一兩

青皮

調子肉

甘草

各半兩

丁香

二錢

右爲末每服二錢水一鍾煎六分食前服兒小分之

杏瓜丸 治兒汗

大黃瓜

一箇

川大黃

濕紙裹煨

柴胡

青皮

黃柏

胡黃連

鱉甲

醋炙

蘆薈

各等分

右將黃瓜去頂去穰以諸藥爲末納瓜內將頂蓋口
杖子簽定慢火煨熟取藥并瓜研之如皮不爛去之
乾却入麵糊和丸菉豆大每服二三丸乳後溫湯下
兒大加之

肺氣盛者肌膚瑩潤皮毛鮮滑怯則肌膚沮敗若無皮毛而血凝此病多不育治以龍膽湯方見臍風撮口門腎氣盛者顙小早合牙齒早生怯者顙開解顙不早合牙久不生生又不固面慘目睛多白面白光白色蓋腎主骨髓腦爲髓海怯則腦髓不成故顙解而顙難合百病交攻極難將護雖越千日終成廢人然亦不可束手宜常服錢氏地黃丸見前肝氣下仍用天南星微泡爲末米醋調傅于紺帛烘熱貼之亦良法也

玉乳丹 治解顙

鍾乳粉

依法鍊

熟地

柏子仁

當歸

各半

防風

補骨脂

黃芪

茯苓各一

右爲末入鍾乳粉

柏子仁拌勻蜜丸黍米大每服十九曲香湯乳

後下

柏仁散 治顛不合

柏子仁

白芨各一

防風半

一兩

右爲末乳汁調塗顛上日一易之十餘日取効

辛桂散 治顛不合

細辛

桂心各五錢

乾姜半

七錢

右爲末乳汁調傅顛上乾卽敷面赤卽愈

芎黃散 治齒遲

川芎五錢

乾山藥 當歸炒

白芍藥炒

甘草炙

熟地黃各二錢半

右爲末白湯調食後服隨用末擦牙根卽生

又方用雄鼠糞三十枚日一枚拭齒根卽生

兩頭尖者雄鼠糞也

調元散 通治解顱內瘡行遲語遲鶴膝齒遲

人參 茯苓 茯神 白朮 熟地

當歸

炒芍藥炒

黃芪

蜜炙各二錢半

山藥

五錢

川芎

各一錢半

甘草

蜜炙各一錢半

石菖蒲

姜棗煎不拘時服乳母同服

○顎門腫陷

兒有顎門者由藏氣未充骨髓未完滋養未備故也臟腑皆以脾胃爲養兒自生後得穀氣所滋則臟氣充而骨

髓完所以兒至能食則顛門合也是顛門原于脾胃脾
胃不和冷熱不調或怒啼飲乳或喘急咳嗽致陰陽氣
逆上衝而顛腫也熱則腫而軟冷則腫而硬熱則涼之
寒則溫之又有顛陷者或因瀉痢或曾服利藥皆使臟
虛而不能上榮于顛故令顛陷也當用地黃丸

平顛散 治顛腫

牛骨髓五錢

黃雞糞倍乾三錢

半夏

醋炒四錢

右爲末陳

醋調貼胃口下二寸週時愈用醋者酸以散之也

瀉青丸 治肝氣盛風熱交攻致令顛凸

方見後風門

當歸地黃丸 治顛陷 即六味地黃丸加當歸

又方亦治頸陷用黃狗頭骨炙黃爲末雞子清調塗頸

卽蒲

○手拳腳拳門

此病皆由母懷胎之時臟虛爲風冷所乘兒生之後肝腎之氣不足致筋脈攣縮故手脚拳而不展

龜胸龜背

此病皆由妊娠好食辛辣炙燭熱物致生嬰兒胷高背凸如龜之狀此肺經受熱也又有生下嬰兒不能護背客風吹入脊骨或坐太早亦致背高如龜行動喘乏但遇風寒或多飲食則痰嗽氣喘致體僵瘦悴久而不治將成疳勞之症治法灸肺俞膈俞穴取龜尿點脊中常

服平肺潤燥之劑。肺俞穴在第三椎骨下兩傍各一寸半。膈俞穴在第七椎骨下兩傍各一寸半。以兒手中指中節爲一寸。取龜尿法。將龜放于青荷葉上。候其出頭四顧以鏡照之。其尿自出。磁器收之。用針點脊俞。

百合丸 治龜腎

大黃煨三分

桑皮炒

天冬

百合

木通

朴硝

杏仁炒去皮尖

枳殼炒

甜葶苈隔布炒各五錢

右爲末。蜜丸如菉豆大。每服十五丸。食後滾湯下。

松蓋丹 治龜背

松花焙

枳殼炒

防風

獨活各一錢

麻黃去根節

太黃 榞 前胡 桂心 各半

兩

右爲末蜜丸黍米大每服十丸粥飲下量兒加減

五軟五硬

五軟者頭項手脚肌肉口是也無故不舉頭此爲項軟難
收腎肝之病治雖暫瘥年必再發四肢垂乃慢脾風候
尚堪醫治肌肉寬緩飲食不長若漏痢變作醫難治療
口軟只是虛舌出口此陽盛之病宜先治膈若唇青氣
喘難治總而言之俱不治症錢孔純治法今列于後
一方治頭軟用牛膝根一握釜黑一分知母五錢孩兒茶
一兩同爲末用猪膽汁及蜜調塗委曲骨立見安和

一方治項軟用鯉魚尾二兩灸乾人參一兩乳浸晒乾當歸身二兩酒浸一刻炒同爲末水調敷患處白紙立效

一方治手軟用人肝膝三兩真珠五錢意苡仁一兩大黃一兩熟地二兩自然銅三兩同爲末醋調塗患處見效
一方治腳軟用鬼督郵木瓜蒼耳草肉桂牡丹皮硃砂各二兩研細葱汁調傅之立效

一方治遍身軟用赤石脂三兩巴豆二十粒去皮心烏骨雞頭足羽共十兩狗頭骨九兩乾葛一兩半共爲末蜜丸重二錢人參湯化下空心服數日愈已上俱錢方
五硬者頭項手脚心背是也仰頭取氣難以動搖此爲風

症胎中受濕熱兒生之後又被風邪所乘手如冰冷而硬母取涼過度風入胞中生兒所以脚硬心硬者日夜啼哭無淚狀如腹痛但臉赤唇紅故知心硬背硬者亦爲風邪所干也先儒亦總謂不治痘瘍孔純亦各有治方列後

加減愈風丸 治頭硬

川烏

五兩

白芍

馬膽星

各二兩

防風

羌活

各二兩

鉤藤

白附子

炮去皮臍各三兩

右爲末蜜丸重一錢三分金箔爲衣姜湯下不拘時
祛邪丹 治手硬

漢防已

五兩

丹參

獨活

生地

兩頭尖

灸焦各一兩

荆芥三兩

五加皮

炒一兩
二錢

薄荷兩半

扁豆一兩

右爲末飯糊丸白湯下每丸重二錢空心服

加減調心散 治心硬

天麻

酒炒

茯神

各一兩

當歸

酒洗半兩

丹參

熟地

紅花

各兩
二錢

牛黃

一錢

射香

三分

天門冬

二兩

右爲末蜜丸重二錢燈心姜湯調化臨卧服

消風散 治脚硬

何首烏

酒蒸

赤芍

炒

獨活

防風

川芎

各二兩

白花蛇

一條酒浸宿晒乾

連翹

草烏

各一兩

右爲末

米粉糊

爲丸如芡實肉大每服五丸一日兩服竹葉湯送下

○天柱骨倒

兒容體不爲瘦瘁忽然項倒此名下竄皆因肝腎虛客邪
襲風府傳于筋骨蓋肝主筋腎主骨筋骨俱弱故成斯
疾與五軟相類又云天柱倒有三病一吐瀉口久羸瘦
成者一肝膽伏熱熟盛生風致令筋緩而成斯疾面赤
唇紅忽變青者是其驗也一傷寒不及發表而成者吐
瀉者當調胃氣肝熱者急與祛風退熱服瀉青丸並用
強筋藥貼項惟傷寒天柱倒者難療

金錢膏 治痢后天柱倒

知母

盐炒

當歸

酒洗

滑石

炒

黃柏

補骨脂

薏苡仁

膝

檳榔

續斷各二
兩

黃芪

肉蓯蓉

槐花炒

地榆炒

砂仁各三
兩

乾蟾

炙去焦
六隻

右爲末，蜜丸重二錢，空心生姜湯化下。

瀉青丸

治肝熱項倒方見後風門

天柱丸 治項軟或倒前後

蛇含石

一大塊火燄
醋淬七次

川鬱金少許

右爲末，入麝香和勻，用白糯米飲丸龍眼大，每服一丸，荆芥湯下，或又入生姜汁一二滴，或用薄荷湯下。

五加皮散 治項軟用五加皮爲末，酒調金頸骨上。

健骨散 治諸病後天柱骨倒，醫者不識，謂之五軟，用白

僵蚕爲末三錢兒半錢薄苛酒調下後用生筋散貼

生筋散 治前病

木鱉子六箇去殼

草麻子六十箇去殼

右研細先摩頂上令熟津唾調貼之

貼項散 治前疾

附子一錢 天南星二錢

右爲末生姜汁調貼患處

滯頤

滯頤者涎流出而瀆于頤間此由脾冷涎多也脾之液爲涎脾氣冷不能收制其津液故流出瀆于頤間也治用

益黃散見脾胃門治脾丸亦可，亦有脾熱流涎，蓋熱則流通故也。不可專用溫藥。

溫脾丸 治滯頤

半夏泡 木香 丁香各半兩 白姜 煥 白朮 青皮
陳皮各二錢半 右爲末糊丸，麻子大，每服二十丸，米飲下。

○諸啼

小兒有夜啼、驚啼、廻啼。夜啼者，臟冷腹痛也。夜則陰氣盛，與冷氣相感，痛甚于晝，故夜啼。鈎藤散主之。若眼白青色，唇紫不治。驚啼者，睡裏忽然驚覺而啼。由風熱邪氣乘于心，心臟主熱，則精神不定，故睡卧不安而爲驚啼。

鈎藤散去當歸木香加辰砂木通。腹啼者兒在胎時其母將養傷于風冷邪氣入胞傷兒臟腑故兒生之後邪猶在兒腹中作痛故身體仰而偃不乳大便青晝夜啼不歇諸藥無效此名廻啼三樣啼惟驚啼屬熱啼而不哭是痛故直聲來往無淚哭而不啼是驚故連聲多淚。

鈎藤散

鈎藤 茯神 茯苓 川芎 當歸 木香 各一錢

甘草 五分

姜棗煎熱啼如前加減

益脾散 夜啼脾臟冷也當用溫中藥故用益脾散

白朮 人參 茯苓 厚朴 木香 甘草 陳皮

養臟湯

治夜啼

當歸

沉香

丁香

白朮

桂心

川芎

水姜煎

白芍藥湯

治夜啼

白芍藥

甘草

乾姜

白朮

澤瀉

桂心

當歸

又方火膏

燈花七箇

硃砂少許

同研蜜調

塗乳與吃

金箔鎮心丸

治驚熱啼

片腦

麝香

紫河車

人參

甘草

茯苓

馬牙硝

乾山藥

右爲末蜜丸龍眼大硃砂金箔爲衣薄苛姜灯心

湯下

猪苓湯

亦治前症

猪苓

澤瀉

白朮

赤茯苓

甘草

寧心膏

亦治前症

茯神

羌活

白朮

人參

茯苓

片腦

麝香

乾山藥

甘草

右爲末蜜丸龍眼大硃砂金箔

爲衣每服一丸薄苛灯心姜湯下

三解散

亦治前症

卽三解散牛黃散

人參

防風

姜桑

全蝎

黃芩

白附

天麻

赤芍

欒金

大黃

茯神

枳殼

甘草

牛黃

牛黃丸

治腰啼

牛黃

另研一分

冰片

另研一分

麝香

另研半分

全蝎

薄苛

僵蚕

炒去絲嘴

天麻

防風

天竺黃

各一錢

胆星

三錢

雄黃

三分另研

右爲末蜜丸員眼大硃砂金

箔爲衣每服一丸灯心薄苛姜湯下

理中丸

卽調中丸

亦治前症

人參

白朮

甘草

乾姜

胎黃胎肥胎弱

嬰孩百問胎黃候小兒生下遍體面目如金壯熱大便秘
小便如施汁乳食不思啼呴不止皆因母受熱而傳于
胎也有此症乳母可服生地黃湯忌食熟毒之物胎肥
生下肌肉厚遍身色紅滿月後漸漸羸瘦眼粉紅五心

熱大便難時生涎胎弱生下面無神氣肌肉薄大便
白水時時硬氣多喊目無睛光肥弱並用浴體法
又先醫有曰胎實面紅目黑睛多者多喜笑胎怯面黃目
黑睛少者多愁哭

生地黃湯 乳母服亦與兒服

浴體法 生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 天花粉 各等分 水煎
白芍 青黛 各三錢 蝎稍 去毒 砧砂 五分 麝香 一字
烏蛇肉 三錢 酒浸 烧為末 右同研勻每用
三錢水三碗桃枝一握葉四五葉同煎十沸溫浴勿
浴背

幼科輯粹大成卷之二終