

陳九芝
手稿本
舉草述鈞光



本草述鉤元藥目

卷二十九 介部

龜版

龜肉

龜溺

龜甲

龜肉

鼈頭

鼈頭血

牡蠣

真珠

海蛤

海蛤粉

文蛤

蚌粉

田螺

田螺殼

白蝸螺殼

魁蛤殼

卽瓦鼈子

璣瑁

卷三十 禽部

黑雌雞

黃母雞

烏骨雞

雞冠血

雞脆脰

雞內金

雞矢白

雞蛋

雞子清

雞子黃

鴨肉

鴨血

鴛膽

雁肪

鵝鷄肉

卷三十一

白鴿肉	鴿蛋	鴿糞	雀卵	白丁香
黃胆窠	蝙蝠	夜明砂	淘鷺油	五靈脂
馬陰莖	馬脰骨	馬懸蹄	白馬通	黃牛肉
霞天膏	霞天麴	牛乳	牛骨髓	牛膽
水牛喉	牛角鰓	牛黃	酪	
羊內	羊乳	羊腎	羊肝	羯羊膽
羊脛骨	猪臍	猪脾	猪心	猪心血
猪尾血	猪膽	猪肝	猪肺	猪腸
猪腎	猪膏	猪乳	猪膚	狗肉

狗膽

狗陰莖

驢乳

驢陰莖

驢溺

阿膠

虎骨

虎睛

虎賭

犀角

象膽

象皮

象牙

熊膽

羚羊角

鹿茸

麋茸

鹿角

麋角

鹿角膠

鹿角霜

鹿髓

麝香

刺蝟皮

牡鼠

牡鼠膽

牡鼠糞

牡鼠

卷三十二 人部

髮

人屎

人中黃

金汁

童便

人中白

秋石

人乳

紅鉛

月經衣

紫河車

胞衣水

坎炁

藝
目

本草述鈎元卷二十九 介部 武進楊時泰貞頤手輯

龜甲

一名敗龜板。格物考云。天有先春之震。山多自死之龜。龜聽雷音。則口中所含以蟄者。便吐而昂首。時令尚早。無蟲可食。多致餓死。血肉腐爛。滲入下甲。此真敗龜板也。土材 取水龜者。當用下甲。

味鹹甘。氣平。中濕者有毒。不中濕者無毒。氣味俱陰。入足少陰經。惡沙參。補陰。主陰血不足。續筋骨。補心腎。主瘀血。止血痢。破癥瘕。瘧瘧。治五痔。陰蝕。濕瘻。四肢重弱。及血麻痺。除驚恚氣。心腹痛。骨中寒熱。並治女子漏下。赤白。小兒顛不。

合燒灰傳濂瘡久服益氣敗龜板屬金而有水陰中陽也

丹溪

方家多入補心藥用以得水火既濟之義借其氣以相

通實非補心正藥

仲淳

龜鹿皆靈而有壽龜首常藏向腹能

通任脈故取其甲以補心補腎補血皆以養陰也鹿鼻常反

向尾能通督脈故取其角以補命門補精補氣皆以養陽也

瀨湖

按龜首常藏向腹能通任脈使會督會督而後任脈通

是陰中有陽也鹿鼻常反向尾能通督脈使會任會任然後

督脈通是陽中有陰也抑結不散龜下甲酒炙

五兩側柏

葉炒一兩半香附童便浸炒一兩爲末米糊丸梧子大每空

心溫酒服百丸胎產下痢龜甲一枝醋炙爲末每服一錢

驟瘡朽臭生龜取殼醋炙黃更煅存性出火氣入輕粉麝
香葱湯洗淨搽敷之 痛風證氣虛者主方加朮參龜板

論 任督二脈同源而分歧。龜鹿能使分者常合。此其所以
壽。龜板補陰所補者陰氣爲其陰中含陽也。觀於能治兒顚
不合。其不合者由於腎氣之不足。夫腦爲髓海。足太陽入
絡於腦。而督脉固附足太陽之脈者。則其能治解顚非任之
合於督以爲腎氣者乎。至於破癥瘕、瘀血、續筋骨、益勞倦。皆
其益陰氣之功。丹溪所謂陰足而血氣調和。則瘀血癥瘕自
消。崩帶血痢自治。筋骨自健。蓋不必借陽以行陰之滯。乃可
卽陰而達陽之用。此所以爲大能補陰也。

妊娠不宜用病人虛而無熱者不宜用

仲淳

辨治 陽龜殼圓板白陰龜殼長板黃陰人用陽陽人用陰

鋸去四邊石上磨淨灰火炮過塗酥炙黃用亦有酒炙醋

炙猪脂炙燒灰用者

瀨湖

凡入藥須研極細不爾留滯腸胃

能變癩瘻也

仲淳

龜肉 味甘酸氣溫 釀酒治風痛緩急四肢拘攣或年久

癱緩不收皆效 筋骨疼痛烏龜一個分作四脚每用一脚

入天花粉枸杞子

各一錢

二錢雄黃

五分麝香

五分槐花

三錢

水一椀煎服

論 龜肉爲治痛風要藥丹溪於陰火痛風必用之蓋因是

證多屬血虛而血臟卽風木之臟也然實取其能益陰氣本經云治濕痺乃陰氣不足之濕以成痺者也若屬於感受之濕以是搜治可乎不觀其更治食積而肩腿痛者乎經曰陰之所生本於五味陰之五宮傷於五味夫五臟之傷屬於味之陰矣不從陰氣之所生者以爲治而漫然冀其益血也不同夢夢哉

龜溺 以猪鬃或粉葉刺其鼻卽出 滴耳治聾點舌下治大人中風舌瘡小兒驚風不語摩胸背治龜胸背摩之久乃瘥染髭髮 岷嶧神書言龜尿磨瓷器能令軟磨墨書石能入數分卽此可推其走竅透骨之用矣

味鹹氣平足厥陰血分藥也。主治益陰補氣除老瘧瘧母

療勞瘦骨熱骨節間勞熱結實壅塞除心腹癥瘕堅積寒熱

血瘕腰痛勞復女勞復小兒脇下堅及驚癇斑痘煩喘婦人

產後陰脫去瘻肉陰蝕痔核惡肉。方書更治脚氣嗽血盜

汗中風痞證咳嗽不得卧消癰小便不禁。虛勞證多用之

但不可過劑

宗

鼈色青入肝故所主瘧勞寒熱癥瘕驚癇。

經水癰腫陰瘡皆厥陰血分病水龜色黑入腎故其甲所主

陰虛精弱腰脚痠痠陰瘡瀉痢皆少陰血分病

瀉

鼈甲味

鹹潤下益陰何疑本經之主癥瘕堅積瘻肉痔核殆本於益

陰而鹹以軟堅之故

仲淳

瘧疾類病於陰虛之人暑邪深

入陰分出併於陽而熱入併於陰而寒至元氣虛羸邪始內

陷而結爲瘧母鼈甲益陰除熱而能消散故爲治瘧要藥卽是退勞熱及陰虛寒熱往來之上品

又

得牛膝當歸橘皮

首烏知母麥冬治久瘧同知母石膏麥冬貝母竹葉治溫

瘧熱甚渴甚無肺熱病者加人參若發時指甲黯狀若欲死熱甚渴甚又寒甚汗多并加桂枝有神去桂枝治瘧良

得青蒿麥冬五味地黃牛膝枸杞治骨蒸勞熱甚則加銀柴

胡地骨皮胡黃連陰虛夢遺不禁九肋鼈甲不拘多少去

裙襡淨洗燒灰存性研細每用清酒童便各半盞陳葱白七

八寸同鼈甲末煎至七分去渣晡時服須臾得粘臭汁爲度
次日進粟米粥忌食他物 奔豚氣痛上冲心腹鼈甲醋炙
三兩 三稜煨二兩 桃仁去皮尖四兩 湯浸研汁三升煎二升

入末煎良久下醋一升煎如餳以瓶收之每空心酒服半匙
血瘕癩癖鼈甲琥珀大黃等分作散酒服二錢少時惡血
卽下若婦人小腸中血下盡卽休服 漏下鼈甲醋炙研末
清酒服方寸七日二又方乾薑鼈甲訶黎勒皮等分爲末糊
丸空心下三十丸日再 難產鼈甲燒存性研末酒服方寸
七立出 沙石淋痛九肋鼈甲醋炙研末酒服方寸七日三
服石出瘥 吐血不止鼈甲蛤粉各一兩 同炒色黃熟地一

兩半曬乾爲末每服二錢食後茶下 斑痘發喘小便不利者鼈甲二兩燈心一把水升半煎六合分二服凡大小便有血者中壞也黑曆無膿者死不治

論 鼈甲益陰丹溪更云補氣夫氣有陽氣陰氣之殊其說本於內經經曰陰虛則無氣無氣則死蓋惟是真陰之氣有化乃有生有生卽有化故本經首主癥瘕堅積而別錄甄權日華子並以溫瘡血瘕宿食冷塊痃癖癥結爲言也丹溪掲出補陰補氣而言可謂探其要矣本經不言治勞然虛勞多用之蓋勞雖五臟皆有而心腎爲多心主血腎主精精竭血燥則勞生焉所以清骨扶羸之除蒸熱必用而麥煎散又以

治少男室女骨蒸黃瘦口臭盜汗七情爲病也。又虛勞發熱未有不由瘀血者。瘀血未有不由內傷者。凡心下引脇俱痛皆滯血不消。新血無以養。故麥煎散中用鼈甲。并同於乾漆以化積者。由茲味能以通壅爲滋補也。鼈甲之治瘧尤專於瘧母。瘧母卽邪之結爲癥瘕者。可見諸本草無不以血瘕癥塊爲言。固有見於茲味陰氣之專。卽化以爲生矣。其次更治腳氣。腳氣之起惟是陰不升而陽不降耳。足爲三陰所起之地。卽三陽所歸之地。陰爲陽之原如三陰不足不能上而召陽之歸。則三陽失守不能下而和陰之滯。故陰壅於下。陽逆於上。脚氣所由病也。陰不足而不能升。致陽失守而不能降。故大

鼈甲湯以鼈甲之補陰者爲君。又鼈甲散、木香散皆治腳氣心腹脹滿。一則并治小便不利。一則云治堅硬不消。夫心腹脹滿非陰不升以致陽不降乎。小便不利非陽不得陰以歸而達於下乎。堅硬不消非陰不得陽以化而暢於上乎。二證皆用鼈甲以和陰陽之升降。則其專精於陰氣可知矣。至於積聚之治。靈樞言喜怒不節則傷臟。臟傷則陰虛。虛則風雨襲之。病起於上而生積。清濕襲之。病起於下而生積。此積所由生之要領也。方書治肝積肥氣鼈甲丸心積伏梁乾漆丸及半夏散脾積痞氣又鼈甲丸統以鼈甲爲之君。則積之本於陰虛而生者固不能舍。專於陰氣之味。以奏效也。又次而治嗽血黃芪鼈甲散人

參黃

芪散

盜汗麥煎散
青蒿散

凡虛勞之有客熱者再如男子遺精女子

漏下皆用鼈甲療之却又以行瘀血總由此味專補陰氣如漏則陰氣虛而不能固也瘀亦陰氣虛而不能流貫於經絡也但就女子經血一證以推所治即可知其要以盡其變矣簡誤云妊娠禁用凡陰虛胃弱泄瀉產後泄瀉飲食不消不思食及嘔惡等證咸忌

辨治 凡使要綠色九肋多裙重七兩者爲上用六一泥固瓶子底待乾安甲於中以物揩起若治癥塊定心藥用頭醋入瓶內大火煎盡三升乃去裙肋骨炙乾入用若治勞去熱藥不用醋用童便煎盡一斗二升乃去裙畱骨石臼搗粉以

鷄膽皮裹之取東流水三升盆盛閣於盆上一宿取用力有
萬倍也

雷公

以煅竈灰一斗滔五升浸一夜煮令爛如膠漆

用更佳桑柴灰尤妙

衛生寶鑑

鼈肉 氣味甘平 主治傷中益氣補不足去血熱益陰補虛作丸服治虛勞痃癖脚氣婦人帶下血癥腰痛

鼈頭 主脫肛

蟬皮散治肛門脫出不收蟬皮磁石桂心

鼈頭爲細末服

伏龍肝散治陰證脫肛

陽證另用他藥

伏龍肝鼈

頭骨百藥煎爲末紫蘇湯溫洗清油調塗

鼈頭血 治風中血脉口眼喎僻塗脫肛療小兒疳勞潮熱

千金方目瞞唇動口喎皆風入血脉急服小續命湯外用

鼈血或鷄冠血調伏龍肝散塗之乾則再上甚妙蓋鼈血之性急縮走血故治口渴肛脫之病 小兒疳勞潮熱往來五心煩躁盜汗咳嗽鼈血丸主之黃連胡黃連各二兩以鼈血一盞吳萸一兩同二連浸經宿去萸血炒乾研末入柴胡川芎蕪荑各一兩人參五錢使君子二十個爲末煮粟米粉糊和丸如粟米大每用熟水量大小日三服

龜鼈甲合論 龜鼈二甲所主大畧相似第鼈甲走肝益腎以除熱。龜甲通心入腎以滋陰其用實有不同者龜能旋轉任脉以會督猶人身任脉之用不離乎元陽。龜之運陰以會陽是還乎真陰之元也。鼈無耳以眼觀精專肝竅其膽味太

辛亦異於衆之頤。所謂金互木交以肝胆相表裏。肝之喜辛爲其從陰而升陽也。鼈甲爲肝胆血分之氣藥。是達乎真陰之用也。經曰一陰爲獨使。昔賢云任脉附足厥陰爲生化之元之二語者可參。龜鼈之用焉。夫任脉司人身生化之元。然不會於督。則陰非真陰而陰無以化。故龜之補陰者爲其本於真陰之元也。任司生化之元而附於足厥陰以行其化。所以三陰之脈惟足厥陰與督脉會於巔。經所謂一陰爲獨使也。故鼈之益陰者爲達其真陰之用也。知乎此則體用動靜大有區別。審證察脈隨所宜以授之。庶不致槩言益陰而奏效少耳。

牡蠣

海旁皆有初生假水沫傍石向日者漸結成形至數十丈磈
礧如房房多左顧隨潮開闔納小蟲以充腹房中有肉如馬
蹄如指面名曰蠣黃海人欲取其肉鑿房火迫得之

味鹹平氣微寒氣薄味厚陰也降也入足少陰厥陰少陽經
益腎清熱固精收濤治氣虛崩帶歛虛汗止虛渴除煩滿
心脇下痞熱堅滿祛畱熱在關節營衛虛熱去來不定利水
濕化老痰軟積氣之痞消疝瘕積塊癰疾結核方書更治
遺精赤白濁小便數及不禁溲血消癰脇痛癲癇瘧
單生無偶而左顧者當屬一陽故本經所主皆少陽所生病

復

啟閉候潮誠應開闔之關鍵陰陽之樞紐者

之頭

收斂

浮越之正氣又益精氣蓋入腎而能收濇不泄之功

無已

病

虛而多熱者宜同地黃甘草用之

權

入足少陰爲要堅之

劑以柴胡引之能去脇下硬以茶引之能消項上結核以大

黃引之能消股間腫以地黃爲使能益精收濇止小便腎經

血分藥也

海藏

以貝母爲使能消積癥痰結同麻黃根作散

歟陰汗共杜仲煎湯固盜汗和澤瀉爲劑主髓疽日深嗜卧

述

同生地黃芪龍眼棗仁麥冬五味白芍茯神黃檗當歸

治心腎虛盜汗

同黃檗五味地黃山萸枸杞車前沙苑蓮

鬚杜仲治夢遺洩精加牛膝兼治赤白濁

同地黃黃檗阿

膠木耳炒黑香附白芍地榆麥冬續斷青蒿鼈甲蒲黃止婦

人崩中及赤白帶下牡蠣地黃丸生地

三兩

牡蠣煅

一兩

天冬

二兩半

人參

一兩半

當歸童便浸一宿燒

二兩半

車前

子

三兩

桔梗

一兩

爲細末薑汁糊丸梧子大每空心服五十

丸

如足腫

炒

亭

藜

湯

下

腹痛

苦

藥甘草湯間服飲食少無味人參湯下此海藏

湯

下

腹痛

苦

藥

甘草湯

間服

飲食少

無味人參

湯下此海藏

醫壘

元戎士也

凡補陽虛而投牡蠣者頗多其人

於補陰劑

中殊不數

據其立論主治固在滋陰追熱矣然又有行瀉

之義存焉

同車前可見

所云脾胃積瀉塞其水路

肝臟血少以漬

腎臟故熱也

數語見濕之爲病

不獨病乎陽亦能病乎陰然

則此味益精不徒以純陰爲功。蓋有妙於化陰者矣。增損

理中丸治結胸服大小陷胸不效者人參

三兩

白朮

二兩炮

薑

五錢

甘草

栝蔞

牡蠣

各三兩

枳實

二十四個

黃芩

一兩

爲細末。煉蜜丸。彈子大白湯半盞煎服。不歇復與之。不過五

六胸中豁然矣。

本方渴加栝蔞根。不渴者除之。汗者加牡蠣。

不汗者勿用。按結胸服大小陷胸而不效者緣下傷胃氣不

能任祛邪之劑而邪熱仍結也。故用參术乾薑理中而以牡

蠣栝蔞黃芩導邪下行。要知胃之三脘皆在任脈。牡蠣補腎

中之陰氣者也。用此於理中內助陽得至陰以召之而歸元。

丸虛勞之猪肚九可與相參。小便淋閉服血藥不效者牡蠣粉黃檗炒

等分爲末每服一錢小茴香湯下取效 小便數牡蠣五兩燒灰小便三升煎二升分三服神效按淋閉用黃檗牡蠣滋陰除熱是矣至便數却止同小便煎此可見有召陽歸陰之義特借小便以調水化而出之原耳至如大病後水氣仲景有牡蠣澤瀉散百合病渴不瘥又以牡蠣栝蔞根主之同一牡蠣或引以益水之原或更以導水之壅其功可思

論 牡蠣爲鹹水結成塊然無情之物也然其房因潮來而開潮不至則合是在化機中無情而大有情者夫潮汐之消長應月月屬陰陰生於陽日者衆陽之母也潮固依於月而亦附於日是故盈於朔望消於朏魄朔後月未成明曰朏魄後月始生魄曰魄虛

於上下弦息於輝朏。月將漸圓曰輝朏而月見東方曰朏而潮有大小焉。使牡蠣之結不屬於潮氣。何以開合俱應於潮歟。天左旋日月亦因潮而結者也。故牡蠣之其應陰精之月而假無成有泡幻立堅則所得陰氣最厚。得陰凝之厚仍隨潮以爲開合。則其陰附於陽。陽化於陰之氣機宛然在矣。海中有魚獸取其皮懸盛而類應有不知其所以然者。繆氏謂其味鹹屬水屬陰而潤下善除一切留熱爲腎經血分藥試本其所以然者暢言之。蓋因潮而結者緣於陰中有陽陰固資生於陽也。開合復應於潮者質雖屬陰却由陰能召陽而歸於陰者卽能化其陰以清陽也。本召陽歸陰之功而能收能濬。本化陰清陽之功而能奠堅消。

結清熱除濕陰召陽以歸復得陽以化而陽卽由陰而清是

以病於陽虛者

遺濁波寫自汗盜汗小便數及不禁之類

投益陽之味或兼除濕

卽以茲味之召陽而歸陰者使陰化於陽病於陽實者

洩血消癉

癥證之類

投清陽之味或兼滋陰卽以茲味之化陰而清陽者使

陽宅於陰又或宜補陽而陰亦虛補陽恐其益燥則若虛勞

之猪膾丸卽以其化陰者而歸陽宜補陰而陽亦虛補陰慮

其滋滯則若惡寒之巴戟丸卽以其召陽者而化陰若是之

變化舉二方可以類推也人生本於天一之水陰陽固爲互

根而潮具有依陰附陽之氣化此味秉其氣化以爲人身氣

化之治卽以療夫水液痰血之病其根陰而和陽卽之頤不

離水相之義也

歷觀方治多有益陽之虛以是召之歸陰而爲益陰地者卽止言益陰尙未悉其所以然

也若於收濇而止以固脫言之於開結而止以軟堅言之則

試卽收濇與裏堅破結參其不相謀之功亦知茲味之召陽

歸陰

所以能收濇

化陰清陽

所以能裏堅

乃其所以超於海水之諸凝

結者歟

凡病虛而多熱者宜用

仲淳

卽虛寒諸證用補陽之劑而投此

不忌以其召陽歸陰尤爲療虛寒者之所先也

辨治 取殼以頂向北腹向南視之口斜向東者爲左顧尖

頭大者勝先用鹽水煮一時後入火煅紅研粉用

出南北海川蜀西路女瓜河北塘濱江南湖泖間亦時有之

廣東廉州珠池四雷州一實皆海而島嶼環圍故稱池也

南

珠蚌中陰精也牡蠣蛤蚌無陰陽牝牡須雀蛤以化故蚌

之久者能生珠專一於陰也

陸佃

珠者陰之陽也故勝火玉

者陽之陰也故勝水其化若神

管子

鼈孕乳以夏蚌孕乳以

秋聞雷聲則寢其孕珠若懷妊然故謂之珠胎中秋無月則

無胎

味甘微鹹氣寒入手少陰足厥陰經清心安魂魄明目去

膚翳障膜除小兒驚熱解痘疔毒主難產下死胎胞衣方

書更治中風熱癰目淚耳聾別錄塗面及手足月各有

望惟中秋主維四氣之樞鍵處三秋之正中交兩弦之噓隙烹金水之華藏時也海蚌食其光而孕珠此以坎填離比於

神丹金液之頤

心虛有熱則神氣浮越

肝虛有熱則目生障

障

眞珠稟太陰精氣除二經之熱仲淳

同丹砂牛黃犀角天

竺黃茯神遠志鈎勾琥珀金箔治小兒驚癇風熱大人失志
癲狂等證

同爐甘石龍腦香硼砂空青人爪點目去翳障

同鍾乳石象牙末牛黃冰片白僵蚕紅鉛天靈蓋蛀竹屑
樟皮灰沒藥明礬治廣瘡結毒及陰蝕瘡有奇效

同人中

白黃檗青黛硼砂和冰片少許治口瘡加入雞內金膩粉治
下疳難產眞珠末一兩酒服立出胞衣不下眞珠一兩

研細苦酒服。子死腹中真珠末二兩酒服立出。

論 蛥珠與月盈虧而月之盈虧又係於日淮南子云月死而螺蚌瞧正指陰不得陽之故然則珠爲陰中之陽當如管子所云矣本至陰之精乃分至陽之光麗至陽之光乃凝至陰之質所治中風熱癰諸證類有轉陽入陰而神其溌化者豈徒取其純陰如草木中苦寒之味哉卽如治驚不正於鎮怯有因肝虛而內受風邪卧則寬散不收似乎驚悸者真珠母丸主治目不止於去翳有因肝臟虛寒目茫茫不見物者又有目風淚出因於肝虛者真珠煎真珠散治之細推諸治之益謂非由陰育陽卽由陽揚陰有合於厥陰之屬陰中少陽者乎蓋五行

惟金能合水火之氣俾陰陽交媾明珠胎於秋月烹金水之華以媾陰陽之精所謂木始之更得金終之乃爲金木之交媾而大益肝臟是猶得謂之純陰乎不然彼療肝臟虛寒而目昏者固不得用純陰之味以相對待矣

修治 凡入藥不用首飾及見尸氣者 用豆腐一塊入珠於內紮定煮一炷香取出將洗淨白棉布包二三重置石上擊碎研如膩粉方堪服食不則傷人臟腑

海蛤

海中諸蛤爛殼之總稱不專一蛤也總之海中蛤蚌名色雖殊性味相類功用亦同又文蛤或另是一種

氣味苦鹹平 主治咳逆上氣喘息煩滿痰飲胸脇脹急胸

痛寒熱腰痛及傷寒血結療十二水滿急痛水氣浮腫止消

渴潤五臟利膀胱大小腸治項下瘤癰五痔疝證婦人血結

胸並崩中帶下 別錄療陰痿斯味爲補腎歸陽要藥 傷寒血結胸

脹痛不可近仲景無方宜服海蛤散并刺期門穴海蛤滑石

甘草各一兩 芒硝五錢爲末每服二錢雞子清調服更服桂

枝紅花湯發其汗則愈益膻中血聚則小腸壅小腸壅則血不行服此則小腸通血流行而胸膈利矣

論 海蛤在本經治咳逆上氣喘息煩滿等證皆陰氣虛而上逆者夫腎乃氣之元氣陽也出於陰中陰者陽之守也陰

不能爲陽之守故有如上諸證卽別錄之療陰痿則知其能
歸陽於陰矣唐本草又主十二水滿急痛甄權並治水氣浮
腫其意云何蓋凡病於陰之不爲陽守而陽乃上逆其至陰
之生水液者不得陽以爲正亦卽隨陽而汎濫四出耳

經曰腎者

牝藏也地氣上者屬於腎而生水液也又日出地者陰中之陽陽子之正陰爲之主

雖然在本經已

包舉而言之如曰陽明所謂上喘而爲水者陰氣下而復上
上則邪客於臟腑間故爲水也所謂胸痛少氣者水氣在臟
腑也水者陰氣也陰氣在中故胸痛少氣也卽此參之在本
經所主治不已悉其未言之證乎顧何以又止消渴而潤五
臟曰茲味導邪水而益真陰以還其生水液之原真陰益則

陽不孤行而消渴除五臟潤矣陽不孤行卽附於陰而膀胱大小腸之所謂氣化斯出者先受其益且并陰之已成血者亦得陽化而不病於孤行如傷寒血結之類胥治矣推之水液所結如痰飲胸膈脹急血之取結如癰瘤類何莫非陰陽之不孤行以奏厥效乎至於婦人崩帶固亦以陽不孤行者守之婦人血結並又以陰不孤行者化之矣

海蛤粉 此海中諸蛤之粉以別於江湖之蛤粉蚌粉也近世獨取蛤蜊粉入藥大抵海中蚌蛤蚶蠣味鹹性散功用畧同非若江湖蚌蛤無鹽水浸漬但能清熱利濕而已肆中更有一種狀如線粉者謂之海粉得水則易爛出海中沙石間

其功亦能化痰軟堅

味鹹氣平腎經血分藥

治喘息咳逆

肺燥鬱悶

化痰飲解結

氣軟堅積

熱痰能降 濕痰能燥 塊痰能更 頑痰能消

愈心脾疼痛消水腫利小便

止遺精白濁療癩瘻核散腫毒治婦人帶下血病油調塗

湯火傷

主濕嗽腎滑之疾

好古

治濕痰爲要藥以腎主水

液而痰爲水液所化病於濕者更切也

石水肢瘦其腹獨

大者海蛤丸主之海蛤粉防已

各七錢半

葶苈赤芍桑白

皮各一兩

陳皮郁李仁各半兩

爲末蜜丸梧子大每米飲下

五十九日二次

氣虛水腫大蒜十個搗如泥入蛤粉丸如

梧子每食前白湯下二十九服盡小便下數桶愈此方垂死

皆治 心氣疼痛真蛤粉炒過佐以香附未等分白湯淬服
白濁遺精潔古云陽盛陰虛故精泄也真珠粉丸主之蛤
粉一片黃檗炒一片研細白水丸梧子大每服百丸空心溫
酒下日二次 血痢玉粉散海蛤粉研細每用二錢蜜水調
服能解臟腑積熱之毒按此味同氣於腎陰之清化故也
附案 戊戌冬深歲氣寒濕相合肺主受邪陽不施化而水
中陽化更微致濕痰聚胃愈覆其陽熱鬱口燥上焦不爽且
移於所合之大腸是宜麻杏散寒薑术除濕第恐薑术適增
熱鬱之勢乃入蛤粉於二陳加南星中以歸陰僭而散陽鬱
其痰漸化而熱亦行徐用乾薑枳术理中愈

論 用蛤粉者不究其合於人身元陰之氣更不究其能於
陰中歸陽遂於丹溪所謂能降能消能悞能燥者槩以爲寒
則降鹹則軟耳試問消且燥者更屬何說夫元陰之氣非偏
於寒者也陰中有陽故陰氣所至而陽之浮者自還其宅如
喘息嗽逆之治是曰降也真陰得歸則陽亦歸於陰凡陰邪
之所聚以成形者自由有形而化無形如浮腫之類是曰消
也陰邪之所鬱者畜陽於中陽卽依陰以爲堅核爲積塊陰
邪消則陽不得畜故曰喪也陰邪漸歸消化則陽卽行其化
而水濕之氣皆淨如治水腫白濁之類故曰燥也由是參之
則可知其主治諸證之故矣如徒以爲氣寒味鹹而已彼嗽

血洩血者曾何堅之待軟而必取於此氣之寒乎彼風熱上攻眩暈者何又入此味於諸除風熱藥中乎是蓋取夫真陰之原爲陽守者以化陽耳至參硃丸之療風癘與人參硃砂同用取其配真陽於真陰以化陽狂之邪也化水丹之療消癰用此治兩陰之渴取其真陰之氣化也又與穿山甲同療滯下之裏急後重者是取元陰之化氣以暢大腸之收氣也大凡治熱之法可以寒藥直折者惟實熱爲然至於虛熱鬱熱不若從真陰以化陽之爲得也尤不若從陰中有陽者以歸失守之陽爲得也如執寒鹹以定蛤粉之功卽用治痰飲尙未得其肯綮况投之各證哉且本經於海蛤尙曰鹹平而殼用火煅反

得鹹寒抑又未信矣

凡脾胃虛寒者須與益脾胃藥同用

仲淳

修治 不入煎劑

丹溪

凡治燥痰取紫口蛤蜊殼炭火煅成

以熟栝蔞連子同搗和成團風乾用最妙

吳球

餘痰之治不必

然至療他證更宜專用

文蛤 其形一頭大一頭小有花斑

氣味鹹平 主咳逆胸痺腰痛脇急利小便止煩渴化痰軟

堅療口鼻中蝕瘍鼠癰大孔出血女人崩漏 鹹平入血除

熱能消散上下結氣

仲淳

傷寒外寒鬱熱者文蛤散主之文

蛤 五兩爲末每服方寸匕沸湯下甚效

論 傷寒在陽當以汗解乃因煩燥誤以水噀及灌之遂使
寒轉鬱而鬱中增熱所以更益煩熱皮上粟起此外寒鬱熱
之徵欲飲水者中有熱也不渴者非真熱乃鬱而成也文蛤
散主之蓋蛤粉能開鬱熱俾陽鬱於陰中者藉同氣之陰引
之歸下而所結之陽亦逐之以散然則此味豈但能降能消
能耬能燥其功僅在痰飲而已哉

繆氏言氣虛有寒者慎用

蚌粉

長者通曰蚌圓者通曰蛤混稱非是

瀕湖

味微鹹氣寒 主反胃心胸痰飲用米飲解熱燥濕化痰消積

止白濁帶下 其治要只在清熱行濕而已日華子更言治
疳 反胃吐食真正蚌粉每服二錢搗薑汁一盞入米醋同
調下 痰飲咳嗽終夕不寐面浮如盤真蚌粉新瓦炒紅入
青黛少許用淡蘿水滴麻油數點調服二錢得睡嗽止面腫
亦消 痰涎結於胸膈間心腹疼痛不止或乾嘔噦食者炒
粉丸主之蚌粉一兩以巴豆七粒同炒赤去豆醋和粉丸梧
子大每服二十九薑酒下丈夫臍腹痛苟香湯下女人血氣
痛童便和酒下

論 蚌不分江湖俱應月而胎珠夫月以至陰之精借光於
日是至陰之中固有至陽也應氣以生諸蚌則其殼粉詎不

卷二十一
因至陰之氣以清熱而陰中有陽者以利濕乎蓋江湖蚌粉其味亦有微鹹第其收陰歸陽之功實不及海粉投劑宜酌之

田蠃肉

前蚌蛤海產與江湖所產但少有異此田蠃則指水田及湖濱之蠃其用迥殊於海蠃未可例視也

味甘氣大寒 主去腹中結熱利濕熱 捣爛貼臍間引熱下行開噤口痢並治小便不通小腹急硬及水氣浮腫 取其汁治下消渴肝熱目赤大腸脫肛痔漏疼痛及黃疸 禁水土之陰氣解一切有餘之熱仲淳 噤口痢大田螺二枚搗

爛入麝

三分作餅烘熱貼臍間半日熱氣下行卽思食甚效

小便不通腹脹如鼓田螺

一枚鹽半七生搗傅臍下一寸

三分卽通

水氣浮腫大田螺大蒜車前子等分搗膏攤貼

臍上水從便旋而下

消渴飲水不止小便數者糯米二升

煮稀粥一斗冷定入田中活螺三升在內待食粥盡吐沫出

乃收飲之立效此方惟治下消

渴而小便數者

而不槩治中上則其

化於至陰之氣也可思

肝熱目赤

非關風熱者弗用

大田螺

七枚

洗淨新汲水養去泥穢換水一升浸洗取置淨器中着少鹽

花於甲內承取自然汁點目逐個用了放去之

脫肛墜下

三五寸者大田螺

二三枚

井水養三四日去泥用雞爪黃連

研細入甲內待化成水以濃茶洗淨肛門將雞翎蘸掃之軟帛托上自不再發 痔漏疼痛田螺一個入片腦一分在內取水搽之先以冬瓜湯洗淨

田蠃殼 氣味甘平 心脾痛不止者水甲散主之田蠃殼以松柴片層層疊上燒過火吹去松灰取殼研末以烏沉湯寬中散之類調服二錢神妙 小兒驚風有痰遠年白蠃殼燒灰入麝少許水調灌之此乃田蠃白殼者與下條白殼蛔蠃有別 反胃吐食田蠃殼黃蜆殼小蛤也皆取久在泥中者各等分炒成白灰每二兩入白梅肉四個搗和爲丸再入砂盒子內泥固煅存性研細每服二錢人參縮砂湯下或陳米飲調服亦可凡覺心

腹脹痛將發反胃卽以此藥治之

總論羸蛻蚌 田羸殼甘平蛻殼則鹹溫蚌殼粉又鹹寒功用雖彷彿而不無少殊用者宜審病因

白螺螄殼

非溪湖中所生或屋上牆壁上年久者良

氣味甘寒 主痰飲積及胃脘痛治反胃膈氣痰嗽 濕痰心痛白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服方寸匕立止 膔氣疼痛白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效痘瘡不收牆上白螺螄殼洗淨煅研摻之

論

田羸產於水田中

非海

其殼旋文其肉視月盈虧

王充云

毀於天螺
消於淵

夫月乃水之精故海潮與月相應而茲物又應於

月是亦乘至陰之精氣以化生者觀治噤口痢等病皆搗爛和他藥貼臍上下非取其乘至陰之化者用以化陰中之氣而開陽結歟至蚌蛤蜺之殼與田螺大同小異惟丹溪所用白螺殼乃不生泥水中而陳朽粘於牆屋者蓋其感地中陰濕之氣以生乃上升於牆屋或又乘於他氣以化凡用諸殼本皆取其金氣以破痰結而此殼色白更得金氣之專以濕土始而以燥金終宜爲痰飲積及胃脘痛之的對矣夫痰飲皆因濕化而畜其正氣此白螺殼似當止治濕痰之結不比於蛤蚌田蠃之殼能開濕熱之痰也

魁蛤殼

魁蛤卽今之蚶其殼名瓦壘子狀如小蛤而圓厚背上溝文似瓦屋之壘浙東種於近海田謂之蚶田肉味極佳得水中之陽氣味甘氣平可糟其肉爲侑酒之物鮮有入藥者

瓦楞子

味甘鹹氣平

主消血塊化瘀積

燒過醋淬醋

丸服治一切血氣冷氣癥癬

連肉燒存性研傅小兒走馬

牙疳有效

論 蚶之肉甚甘甘能和血殼甘而兼以鹹平其效當更甚於諸殼之但鹹味者

修治 取陳久者炭火煅赤米醋淬三度出火毒研粉用

璫

入藥必用生者性味全也既經湯火卽不堪用與生熟違義同

甲氣味甘寒 主解嶺南百藥毒 日華子破癥結消癰腫止驚癇 陳士良主心風解煩熱行氣血利大小腸 又能解痘毒神效 玳瑁龜類稟水中至陰之氣故氣寒而解一切熱毒其性最靈凡遇飲食有毒必自搖動然須生者乃靈嶺南人中蠱毒者惟用活璫瑁刺其血飲或生者磨濃汁服之可解仲淳 預解痘毒未發內消已發稀少生玳瑁生犀角各磨汁一合和勻溫服半合日三服 痘瘡黑陷乃心熱血

凝也生玳瑁生犀角同磨汁一合入猪心血少許紫草湯五
匙和勻溫服按是物療病惟用生者在邊海之地容或有
之遠海諸郡絕不能獲猶之不得其用也故未詳論
繆氏痘瘡虛寒不起發者不宜服

武進門生伍恂

儀徵後學汪廷儒

全校

本草述鈎二十九終

本草述鉤元卷三十 禽部 武進楊時泰貞頤手輯

雞

總論

雞屬土而有金木火其性補又屬巽能助肝火及濕

中之火

本丹溪

觀於毛羽各具一色是中土得兼四氣隨其偶

合之一以賦形也然則雞豈專稟風木者乎

瀕湖謂專稟風木

先哲

又云雞在卦屬巽在星應昴兌見而巽伏合而繹之是以風

木爲土之主而效金之用者

星應于昴者由金而木每于丑寅司晨

金爲木主則巽之伏于

兌可思

夫人身臟腑之病由脾胃之行氣於三陰三陽者或苦

於土不得木爲之主更或患於木之不爲金用耳如土得木
主而木爲金用則中宮運化之氣無不宣暢而盈溢卽謂之

補虛羸可也 雞之肫名肫脰肫內黃皮爲雞內金是雞臟
也參其對治諸證亦取中土之臟得木爲主而木隨爲金用
者以至土而益腎豈得力於單行之風木哉卽此可以推全
雞之用矣 三年羹雞常食治虛損養血補氣

吳琳

黑雌雞肉

味甘酸氣溫平

黑屬水牝象陰所主皆血分

病 附方

治男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼少氣

喘慄盜汗或小腹拘急心悸胃弱多卧少起漸至瘦削

若年深五

臟氣竭則難治 用烏雌雞一頭治如食法以生地黃切

一斤 餡糖一升

納腹內縛定銅器貯於甌中蒸五升米熟取出食肉飲汁勿
用鹽 一月一作神效

黃雌雞肉 氣味甘酸鹹平 附方 消渴小便數以黃雌
雞煮汁冷飲并作羹食肉 脾虛滑痢用黃雌雞一隻炙以
鹽醋塗煮熟食之 產後虛羸黃雌雞一隻去毛背上開破
入生百合三枚 白粳米半升 縫合加五味汁中煮熟開腹取
百合并飯和汁作羹食之并食肉

論 雞稟木火氣較勝服食必取烏色黃色之雌者以水土
賦形而歸其氣於水土更屬於雌之陰以爲補益也烏骨雞
是另一種

烏骨雞肉雞舌黑則骨肉俱烏入藥更良 氣味甘平 补虛勞羸弱治女
子崩中帶下虛損一切病涼補溫行皆可爲主

論 雞屬木而骨反烏巽變坎也專得水木之精氣故肝腎血分病如陰虛發熱暮勞崩帶宜用之

修事 男用雌女用雄煮爛和藥或并骨研

雞冠血

三年老雄雞者良更貴丹雄雞

氣味鹹平

療經絡間風熱塗頰

治風中血脈口渴不正

丹雞者治白癩風入熱酒中飲

之暖卧取汗治陰毒卒痛

同牛蒡子荆芥穗研末和酒服

發痘升頭而漿

繆氏云雞冠血性溫天行痘瘡虛寒者可資起發倘因血熱而乾枯焦黑誤用轉劇

雞肫脭

男用雌並

雞內金 氣味甘平

肫脭主洩痢小

便頻遺小便淋瀝止泄精及尿血治反胃消癰女子崩帶

雞內金亦治消癰

論 脾腎卽雞之脾消化水穀猶人身脾臟脾爲太陰腎爲常相因凡欲補脾腎之陰者茲味每爲投劑之主至陰二臟之病

爲金用以致土化而歸於腎是其脾臟獨受三陰具足之氣故小便遺失者治之卽淋瀝最痛者亦治之至於消癰反胃瀉痢諸證總以三陰具足之氣其爲功有出於寒治熱治之

外者

雞矢白

雜雞矢乃有白膿月收之白雞烏骨者更良

氣味微寒

主治中風失

音及白虎風賊風痺破血

和黑豆炒酒浸服之療破傷

中風及心腹鼓脹並轉筋入腹下氣利小便破石淋 附方

反胃吐食取烏骨雞勿與食止與水飲四五日將五蒲蛇

二條 竹刀切飼之待下糞取起陰乾爲末水丸粟米大每服

一分桃仁湯下五七服愈 雞矢醴治鼓脹中滿旦食不能

暮食其脈沉實而滑用臘月乾雞矢白半斤袋盛以酒醅一

斗漬七日溫服三盃日三或爲末服二錢亦可

此治精氣不得滲入膀胱

別走于腑溢於皮裏膜外爲脹滿而小便短澁故用雞矢寒利小便

破傷中風醫脊反張牙緊口噤四肢強直用雞矢白一升 大豆五升 炒黃以酒沃之

微烹令豆澄下隨量飲取汗避風 角弓反張四肢不隨煩

亂欲死雞矢白

一升 清酒五升

搗篩合揚干遍乃飲大人服

一升少小五合日二服 轉筋入腹其人背脚直其脈上下

微弦用雞矢白爲末水和方寸七溫服 陰毒腹痛雞矢白
烏豆地膚子各一把亂髮一團同炒煙起傾入好酒一盃浸
之去渣熱服卽止 石淋疼痛雞矢白晒半乾炒香爲末以

酸漿湯和服方寸七日二當下石出 心腹鼈瘕及宿癥并

猝得癥以飯飼白雄雞取糞同小便於瓦器中熬黃爲末每

用溫酒服方寸七日四五服或雜飯食之以消爲度 耳聾

不聽雞矢白炒

半升烏豆炒

一升

以無灰酒

二升

乘熱投入

服取汗耳如鼓鼙勿訝

諸方所治是皆本巽木之氣而爲

土致其用却由巽伏於兌更得致木之用於土也故取其腸

胃轉化而出者色白屬金任之且矢獨雄雞有白即可明於氣化
之義氣屬陽故也

論 素問以雞矢醴治鼓脹非止爲通利而用其本有在通利之先者夫肝屬風木其所勝者脾之土也所不勝者肺之金也雞矢自治心腹鼓脹轉筋入腹是肝木侮其所勝之土而所不勝之金不能爲之主也其治石淋疼痛小水不利是肝木不得脾土以爲用并不得肺金以爲主還病於肝臟之血也其治宿癥鼈瘕是脾土不得肝木血臟之化更不得沛金氣臟之化也至於中風失音白虎賊痺破傷諸風之治又豈止歸其責於風木哉總因主氣肺統血脾之臟宿有不爲

風木之主之用者雞雖微物具有土木交爲用金木互爲化之元機是治療之本也其矢白乃正木爲土主更爲金用以致脾臟轉化而出者故還取爲氣戾血眚之治也若不探其本而謂矢白遂爲氣血轉化之權輿有是理乎抑木爲金伏卽矢之用白亦可覘其微義矣

雞卵黃雞者爲上
烏雞次之 氣味甘平 卵白象天其氣清其性微寒

卵黃象地其氣渾其性溫故白能清氣治伏熱黃能補血全卵則合而有之 附方 小兒疳痢腹脹用雞子開孔入巴

豆一粒 輕粉一錢 用紙五十重裏飯上蒸三度放冷去殼研入麝香少許糊和丸米粒大食後溫湯下二丸至三丸 癪

疽發背初作及經十日以上腫赤焮熱日夜疼痛百藥不效者
蝦雞子一枚新狗糞如雞子大攬勻微火熬令稀稠得所
捻作餅子於腫頭上貼之以帛包抹時時看覺餅熱卽易勿
令轉動及歇氣經一宿定如日多者三日貼之一日一易至
瘥乃止此方穢惡不可施之貴人但諸方皆不能及

雞子白 味甘氣微寒 主治目熱赤痛除心下伏熱止煩
滿欬逆 和赤小豆塗一切熱毒丹腫頸痛神效 湯火燒
燙雞子清和酒調洗勤洗生肌或生敷之亦可 產後血閉
不下取白一枚入醋一半攬服 產後血暈身癰直口目向
上牽急不知人取雞子清調服荆芥末二錢卽安烏雞子尤

良 橫生倒產雞子白同人參湯加乳香丹砂研末入薑汁

服 反胃嘔吐雞子白同人參加粟米薤白煮粥食 胃寒

氣喘不能傳化水穀者人參爲君同雞子清加生附生薑服

蟄蟲攻心口吐清水用雞子去黃納好漆入殼中和合仰

頭吞之蟲卽出也 咽塞鼻瘡及乾嘔頭痛食不下用雞子

開孔去黃着米醋白中糠火燉沸取下更燉如此三次乘熱

飲之不過一二度卽愈

論 雞子白象天其氣清每用之以清氣及觀治產後血閉

血暈諸証又覺清氣不足概其功且此味與人參同用方殊

不少如霍亂噉血上氣喘急其脈無力消渴三證且止二味相對而不

上氣喘急其脈無力

及他藥此何以故。蓋因雞屬翼木出地升天之氣。但翼木受之最先。雞子清象天舉清陽之上。浮庶與人參之化潤陰而下濟。考可奏升降調氣之效而不徒以清熱爲功。所以倒產橫生亦能奏效於危急之際也。至於清熱二字又當本清陽上浮之火推之所治。諸熱湯火等證。蓋取其陽之最清者。以散熱依稀乎從治之義。非取其寒也。知此則可明產後之治。

卵黃

氣味甘溫 兹味爲陰中之陰。功能補血

附方

妊娠下痢絞痛用烏雞子開孔去白留黃入黃丹

一錢 在

內厚紙裹定泥固煨乾爲末。每服三錢米飲下。胎漏不止。血盡則子死。用雞子黃十四枚以好酒二升攬勻同煮如餳。

服之未瘥再作以瘥爲度 鼠瘻已潰雞子一枚米下蒸半
日取黃熬令黑先拭瘻令乾以藥納孔中三度卽愈
雞子膏治孩子熱瘻用雞子五枚煮熟去白取黃亂髮如雞
子大相和於鐵鎗中炭火熬之初甚乾少頃髮焦有液出旋
取置椀中以液盡爲度取塗瘻上卽以苦參末粉之神效

鴨家爲鷺野爲鳧

肉 氣味甘冷微毒

嫩者有毒老者良

補虛除客熱和臟腑利水道

治水利小便用青頭雄鴨取水木生發之象治虛勞熱毒

宜烏骨白鴨取金水寒肅之象也 附方 大腹水病小便
短少用青頭雄鴨煮汁飲厚蓋取汗 又方用白鴨一隻治

淨以豉半升同薑椒入鴨腹中縫定蒸熟食之 白鳳膏治久虛發熱欬嗽吐痰欬血火乘金位者用黑嘴白鴨一隻取血入溫酒量飲使直入肺金以酒補之卽將鴨乾擣去毛腸下開竅去腸拭淨入大棗肉二升參芩平胃散末一升綽定用甕盛貯炭火慢煨將陳酒一瓶作三次入之酒乾爲度食鴨及棗頻作取愈葛可久

血氣味鹹冷 用雞血者取其陽用鴨血者取其陰 鮮中砒毒 猝中惡死或先病痛或卧而忽絕並取雄鴨向死人口斷其頭瀝血入口外以竹筒吹其下部極則易人氣通卽活

論 鴨肉甘冷用治久虛歎血須太有佐使非徒取其冷也
惟療大腹水病則用之單行河間以利水爲氣相感亦有未
盡試卽血之解中毒中惡者思之大抵能達夫氣之塞而欲
絕又解夫毒惡之結而未散者彼大腹水病非卽氣之欲塞
而戾之欲結者乎血爲水所化可以通於茲義矣

鵝

膽 氣味苦寒 主解熱毒 痘瘡初起頻塗抹之自消

附方 痘瘡有核白鵝胆二三枚 取汁入熊胆二分片膾半

分研勻薑器密封勿令洩氣用則手指塗之立效 冰珍膏
善治痔瘡冰片一分 珍珠一分 共研細用鵝胆二箇 取汁入

盃內攬勻將雞毛搽敷患處 噴食病白鵝尾毛燒灰米湯

每服一錢

雁

肪雁脂也 氣味甘平 主治風攣拘急偏枯血氣不通利經又

治熱結胸痞嘔吐更療耳聾 和豆黃作丸補勞瘦

心鏡

治癆急偏枯用肪四兩 煉淨每日空心煖酒服一匙

鶡

無斑者鶡也此則有斑

鶡始以化成蝦蟆得瓜化爲鶡交州記 南海有黃魚九月變爲鶡終以卵生故四時常有之

肉 氣味甘平 補五臟益中續氣實筋骨耐寒暑消結熱

小兒患疳下痢五色旦旦食之有效 和小豆生薑煮食
止瀉痢 酥煎食令人下焦肥 濕熱臌脹腹大四肢骨立
不能貼席穀食不下者取鶉肉食之昏暈少頃雨汗莫能言
但有更衣狀扶而圍小便哭出自白液凝如鵝脂數次下盡遂
起此中焦濕熱積久所致也

論 鶉乃蛙化氣性相同蛙與蝦蟆皆解熱治疳利水消腫
鶉之功用約略似之本草謂其益中續氣者毋亦水土合德
之微此物實有合焉故能爲中土之益而中焦濕熱積久致
成疳痢臌脹者食之輒愈也

白鵠 入藥惟白者

肉氣味鹹平解諸藥毒

毒藥性熱得水之氣故解

鵝卵

解瘡毒痘毒

預解痘毒方用白鵝卵一對入竹筒

封置廁中半月取出以卵白和辰砂

三錢

丸綠豆大每服三

十丸三次飲下毒從大小便出永不發痘卽出亦稀

左盤龍

卽鵝屎野鵝者尤良

氣味辛溫

附方

陰證腹痛面青甚

者鵝糞

一合

炒研末極熱酒一錘和勻澄清頓服卽愈

反

花瘡毒

初生惡肉如米粒破之血出內隨生及出於外

用鵝鴨糞

三兩

炒黃爲末溫

湯洗後傅之

破傷中風病傳入裏用野鵝糞江鰓白僵蚕

各炒半錢雄黃一錢爲末蒸餅丸梧子大每服十五丸溫酒

下取效

論 鴿肉鹹平其糞乃辛溫方書用治破傷風入裏之證蓋其所鬱之風已化熱而傷陰非可表散止宜下之是物爲鹹平之辛溫轉化而出能從陰中化導陽邪其用每同江鯀者以鰣出水中亦陰中之陽也

雀

卵 氣味酸溫

雀屬陽其性特淫故暖腎而強
陰其肉氣味甘溫功不及卵

主治下氣

男子陰痿不起強之令熟多精有子女子帶下便溺不利除

痼疾

附方

雀卵丸菟絲子末

一斤

於春二三月取麻雀

卵

五百個

去黃用白和丸梧子大每八十丸空心鹽湯或酒

下腰痛加杜仲四分之一下元冷加附子六分之一當預製

成末遇有雀卵不拘多少丸之

白丁香

卽雀矢

氣味苦溫微毒

方書治水腫癰風癧證滯

下目中胬肉赤脈貫瞳子者

和首生男子乳點之卽消神

效

非風熱外邪者勿用

和蜜丸服治癩瘕久痼諸病

瘻癧不潰者

點塗卽潰

論雀卵之用在老人臟腑虛損陽氣乏弱藉此爲壯陽益氣之助亦何可少若腎中陰不配陽者卽在所忌求嗣者云精清薄主雀卵丸是則氣化生精固人身生育之本也別錄所謂強之令熱多精有子者義固不妄第酸溫之味多矣惟性之淫者乃陽氣有餘之徵而益腎有專功耳雀糞又陽

氣所轉化而出所治水腫癟風癘證滯下皆人身之真陽氣化虛乏以爲病者

繆氏云凡服术者忌雀肉及卵

修事 雀兒口黃未經淫者其屎勿用凡底坐尖在上者是雄糞兩頭圓者雌男用雌女用雄臘月采得去兩畔附着者研細以甘草水浸一宿去水焙乾用 取白法用漆桌一張將水打濕桌面濕紙略搌去水留些水氣却將雀糞滿桌鋪開以筷頭展轉抄之其白粉俱粘桌上掠去黑糞移桌日中晒乾用鵝翎掃下白用

巧婦 即鵝翎俗名黃脰

窠 主治膈噯以一枚燒灰酒服或一服三錢神驗

伏翼 卽蝙蝠

氣味鹹平性能瀉人觀治金瘡方皆致下利其毒可知 附
方 治癰證大蝙蝠 一個 以硃砂 三錢 填入腹內新瓦盛火

炙令酥候冷爲末分作四服氣弱及幼年分五服空心白湯

下此藥慄悍勿輕用 多年瘰疬不愈用蝙蝠 一個 貓頭

個 俱撒上黑豆燒至骨化爲末摻之 乾者油 調傳之 內服連翹湯

夜明砂 卽天鼠矢 氣味辛寒 惡白微白微 主治腹中血氣破寒熱

積聚治目盲障翳明日 屎中出細砂皆所食蚊蚋未化眼也 除驚悸治瘧有

效炒服治瘰疬 附方 青盲不見夜明砂同糯米炒黃

一

兩 柏葉炙 一兩

爲末牛膽汁和丸梧子大每夜卧時竹葉湯

下二十丸至五更米飲下二十丸瘥乃止 一切疳毒夜明

砂 五錢 精豬肉薄切

三兩

入瓦瓶內水煮熟以肉食兒飲其

汁取下腹中胎毒次用生薑

四兩

和皮切炒同黃連末一兩

糊丸黍米大米飲服日三次

論 夜明砂治目盲障翳固以氣類相從至於療兒疳下胎
毒與本經所治腹中血氣寒熱積聚相合夫血氣積聚何獨
取於茲物蓋蚊蚋之至夜而出者其眼固夜明也今入於天
鼠之腹仍不消化則是遇陰翳而能破除由血化而致氣化
有不爲血氣之陰邪所轉者先聖察物之精投之應證不爽

也

修事 以水淘去灰土惡氣取細砂曬乾焙用

鵝油 即淘鵝

油剝取其油熬化掠起卽以其嗉盛之則不滲漏他物卽透走 味鹹氣溫性滑能引諸藥透入病所 塗癰腫治風痺透經絡通耳聾 附方 耳聾用淘鵝油半匙磁石一小豆腐香少許和勻以綿裹成挺子塞耳中口含生鐵少許用三五次卽效

五靈脂

寒號蟲所遺也。先冬噙集柏實穴居南向餐已而遺遺已而餐轉展化道形若凝脂氣甚臊惡。

味甘氣溫氣味俱厚陰中之陰濁陰歸下降也入足厥陰手

少陰經

惡人參
損人

通利氣脈

治男女一切心腹胃脘脇肋少

腹諸痛身體血痺刺痛及血痢腸風腹痛疝痛血凝齒痛並

肝瘡寒熱反胃消渴痰涎挾血成窠血貫瞳子治女子血閉

並經水過多赤帶不絕胎前產後血氣諸痛及小兒五疳潮

熱又主損傷接骨殺蟲

諸痛皆屬於木

治蛇蟲皆生於肝

治蛇蟲皆生於肝

風木乃從濕土以化蟲靈脂通氣

脈行血絡所以除風皆能殺蟲

方書治脹滿中風中暑

痰飲痛痺瘧厥泄瀉痔

生者行死者止

欲一行一止須半

生半熟相合用之

凡血崩過多者半炒半生酒服

丹溪

濁

陰有歸下之功兼能降火

土材

同澤蘭牛膝益母草生地丹

皮赤芍紅花延胡山楂治產後惡露不盡腹中作疼加桃仁其效更遠但勿過劑 同番降香紅麴川通草紅花延胡韭

菜童便治胃脘瘀血作痛 同木香烏藥治周身血氣刺痛

附方 失笑散治男婦一切心腹少腹小腸疝氣諸痛百

藥不效者。若婦人妊娠心痛及產後心痛少腹兒枕塊痛尤

妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調末熬成膏入水

一盞煎至七分連藥熟服未止再服或以酒代醋或以醋糊

和丸童便酒服 產後喘急痰與血雜涌而上用失笑散主

以六君

此合靈脂爲之化導正以妙於補也

靈脂散治脾積氣痛婦人血崩

諸痛飛過五靈脂炒烟盡研末每服一錢溫酒下

此藥氣惡乃燒存性

妙或以酒水童便煎服名抽刀散能散惡血治產後心腹脇

肋脣跨痛如心煩口渴者加炒蒲黃減半露憲酒下腸風下

血者煎烏梅柏葉湯下中風麻痺痛者加草烏半錢同童便

水酒煎服 產後血暈不知人事五靈脂二兩半生半炒爲

末每服一錢白水調下口噤者挖開灌之入喉卽愈 胎衣

不下惡血沖心五靈脂半生半炒研末每服二錢溫酒下

血崩不止用五靈脂十兩研末水五盞煎三盞去渣澄清再

煎爲膏入神麴末二兩和丸梧子大每服二十丸空心溫酒

下便止極效 吐血嘔血不止五靈脂一兩黃芪半兩爲末

新汲水服二錢 痰血凝結紫芝丸用五靈脂水飛半夏湯

泡等分爲末薑汁浸蒸餅丸梧子大每飲下三十丸 中風

癱緩追魂散用五靈脂研末水飛去上面黑濁下面砂石取淨末每服二錢熱酒下日一服繼服小續命湯 風冷氣血

閉手足身體疼痛冷麻五靈脂 二兩 没藥 一兩 乳香 半兩 川

烏頭 一兩半 炮去皮爲末滴水丸彈子大每用一丸生薑酒

磨服 治下消竹籠散用五靈脂黑豆二味服之 如止通利
腎消當熟 何以能愈思其功矣 五疳潮熱肚脹髮焦不可用大黃黃芩損傷脾

胃五靈脂水飛 一兩 胡黃連 半兩 爲末雄猪胆汁和丸黍米

大每服一二十丸米飲下

論 寒號鳥至冬而毛羽脫落夏月則五采乘陰陽出入之

氣以徹於表裏。既如是其不爽而腸胃所食所化之物又復出入數數。竟以臭腐爲神奇。故能通和氣脈而於血能行且能止也。能行能止可知非破血只是和血。凡血有滯泥於諸經者。氣道未免壅遏。當審所先而導之化之。經所謂先去其血而後調之。不然氣終不得調也。凡病經多日療治不痊須當爲之調血血之外候如痰嘔燥渴昏憒迷忘常喜湯水。激口皆是五靈脂之用。世謂其奏功強半在血。不知氣爲血之先。血不能爲氣之帥。繹開竇通利氣脈一語。氣不離於脈而言。是肺謂陰氣帥血中之氣也。方書於此味主治行痺較多。沉重走注疼痛此濕熱相搏而風熱鬱不得伸附着於有形者。行痺之走注屬風。雖風臟卽血臟。然不有血中之氣能調風以和血而幾其血之與風並。

育不相害其可得哉然則李仲南所云靈脂治崩非止治血之藥乃去風之劑義固先得我心矣凡崩下或衝任經虛被血滯本自生風此味去風與荆芥防風治崩同義蓋此禽用遺作食出入數數轉展化導其化導之氣有陰化於陽陽化於陰者此風之所以能調而血之所以能和也風調而後氣平氣平而後血和非謂其不入血分第爲和血之先導非直入血中而與跪壅決滯之血藥等耳且斯藥治療多證不必盡屬血病其不治血病而實爲和血之先導者有血中之氣可以通營衛而滑經絡也精研及此庶乎善用此藥矣

凡閉痛單屬血虛者當忌過用則飽脹傷胃非止爲製不淨

也觀失笑散之主以六君義可知矣

辨治 色黑如鐵多夾沙石以餧心潤澤者爲眞其未化者
不堪入藥 生用者酒研飛去沙石曬乾收用熟用者飛後
沙令煙起另研

武進門生伍恂

儀徵後學汪廷儒

全校

本草述鉤元卷三十終

本草述鈎元卷三十一 獸部 武進楊時泰貞頤手輯
馬

產西北者勝入藥以純白色爲良。

白馬陰莖 氣味甘鹹平 主治傷中絕脈益丈夫陰氣強

腎志生子長肌肉

五畜以馬爲金十二辰午爲馬謂陰始生於午六陽之化太
陰之屬也是主手太陰肺足太陰脾藏眞濡於脾脾藏肌肉
之氣也故長肌肉而肥健臟真高於肺以行營衛陰陽也故
主傷中絕脈而益氣若強志有子爲水臟事水以金爲母土
爲制制則化生耳願 陰乾同肉蓯蓉等分爲末蜜丸梧子

大每空心酒下四十丸日再

白馬脛骨 氣味甘寒 蝦過存性降陰火中氣不足者用之可代芩連

懸蹄

赤白
俱用

氣味甘平 療腸癰下瘀血殺蟲 燒灰入

鹽少許摻走馬瘡餌甚良 附方 腸癰腹痛其證兩耳輪甲錯腹痛或遼臍有瘡如粟下膿血用馬蹄灰和雞子白塗卽拔毒氣出 損傷瘀血在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸七日三夜一血化爲水 蟲餌肛爛見五臟則死以豬脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘥

白馬通 馬屎曰通水研絞汁服燒灰溫酒或水服 氣味

微溫 止渴止吐血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中 炙火

養一切藥 治吐血不止柏葉湯用柏葉乾薑各二兩

艾三

把以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服

凡吐血不已則

氣血皆虛虛則生寒柏葉稟兌金之氣而生可制肝木木主升金主降升降相配夫婦之道合則血得歸藏於肝矣故用以爲君乾姜性熱守而不走艾葉之溫入內走絡而不炎於上使陰陽之氣反歸於裏以補其虛寒用以爲佐馬通主降火消停血引

領而行爲使

論 十二辰馬居午顧五畜不以屬火而屬金

六陽之極而生陰取其進

氣也凡用以療疾須識此義

屬火者其畜羊蓋卽羊之無瞳人則稟於火

氣居多而水氣少也以是推馬之無胆

非無胆之形質諒少胆无耳與犬無胃同

義因其火極化土土盛而金之生氣旺矣金旺而木之生氣

微故首出之甲木無氣然有肝者乙木生於午也然則素問以火歸羊以金歸馬誠爲察物之精歟

牛

有犧牛水牛二種牛卽黃牛

黃牛肉 氣味甘溫 安中益氣養脾胃 補氣與黃芪同

功

韓愈

倒倉湯

出自西城異人

用肥嫩牡黃牛肉二十斤洗極淨長

流水煮成糜去渣取液再熬成琥珀色

卽名霞

收之

每飲一

鍾旋至數十鍾寒月溫而飲病在上則令吐在下則令利在

中則令吐利

在人活變

吐利後必渴卽服其所出之洩一二盃

亦可

餘垢

睡二日乃食淡粥養半月精神強健沉疴悉亡須五年

蕩滌

忌牛內凡人七情五味有傷中宮停痰積血互相糾纏發爲癱瘓勞瘵蟲脹成形成質爲窠爲白以生百病而中宮愆和自非丸散所能去也此法以牛屬坤土黃爲土色肉者胃之藥也熟而爲液無形之物也服後由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自利而除有如洪水泛漲陳莝皆順流而去盎然渙然潤澤枯槁而有精爽之樂也

丹溪

霞天膏 氣味甘溫 主治中風偏廢口眼歪斜痰涎壅塞五臟六腑留痰宿飲癖塊手足皮膚中痰核 胃爲水穀之海胃病則水穀不能以時運化羈留而爲痰飲壅塞經絡則

爲積痰老痰結痰等證。陰虛內熱生痰，則爲偏廢口眼歪斜。
留滯腸胃，則爲宿飲癥塊。隨氣上涌，則爲喘急迷悶。流注肌
肉，則爲結核。惟霞天膏以脾胃所主之物治脾胃所生之病。
實能搜剔一切。留結無遺也。又陰虛內熱之人，水涸火熾，煎
熬津液，往往凝結爲痰膠，固難散。亦須以此和竹懸貝母橘
紅蘇子枯萎根枸骨葉之類消之。仲淳

霞天麴 以橘皮白茯苓蘇子白蔻仁半夏蒼朮爲麴治脾
胃濕痰 以橘皮貝母蘇子枯萎根及仁蓬砂爲麴治積熱
痰結

牛乳

黃牛者佳
黑牛更勝

味甘氣微寒

凡服乳必煮一二沸停溫

啜之熱食卽壅生飲令人利熱

飲令人口乾

頓服亦易壅與酸物相反令

人腹中癥結合生魚食作瘕

生飲令人利熱

與酸物相反令

人腹中癥結合生魚食作瘕

人腹中癥結合生魚食作瘕患冷氣人忌服器

藏器

主治補虛

羸養心肺鮮熟毒下熱氣治反胃熱曖潤大腸

反胃噎膈大便燥結宜牛

羊乳時時咽之弗用人乳

有飲食之毒七情之火也

治氣痢

同草芨煎服一寒一熱能和陰陽

除疽黃

老人煮食有益老人因血枯而上熱除卽致上熱下虛此味

潤枯而上熱除卽能下行以補虛矣

同

人乳羊乳梨汁蘆根汁蔗漿熬膏時時飲之治反胃噎膈大

便燥結兼止消渴

氣痢用牛乳半斤

草芨三錢

同煎減半

空腹頓服下虛消渴心脾中熱下焦虛冷小便多者牛羊

乳每飲三四合

此合於冷補下熱氣之說

病後虛弱取七歲下五歲上

黃牛乳一升水四升煎取一升稍稍飲至一日止

牛髓

黑牛黃牛
塗牛者良

氣味甘溫

補中填骨髓續絕傷平胃氣

通十二經脈

治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服

補精潤肺壯陽助胃用煉牛髓

四兩胡桃肉四兩杏仁泥四

兩山藥末半斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服

一匙空心服之

牛膽

臘月取黃牛青牛者

味苦氣大寒

臘月釀槐子服明日

非風熱者

不宜用治疳濕彌佳

釀南星末陰乾治驚風有奇功

釀黑

豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目

脾胃虛寒者忌之

白水牛喉

療反胃吐食

取一具去兩頭節并筋膜脂肉

及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾

淬之再炙再淬醋盡爲度研末厚紙包收或遇陰濕時微火
烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲下輕者一服立效

名正胃散

此病至七八日大便不通必死服此十痊八九

牛角鰓

卽角尖中堅骨一名角胎

味苦甘氣溫

主下閉血瘀血疼痛

女人帶下血燔之酒服

本經

黃牛者燒之主血崩大便下血

血痢

水牛者燒之止血崩赤白帶下冷痢瀉血

附方

妊娠下惡血不止龍骨散用龍骨當歸地黃炒芍藥地榆乾

薑阿膠艾葉蒲黃以牛角鰓爲君服之 大便下血黃牛角

鰓

一具 煅末煮豉汁服二錢日三神效

赤白帶下牛角鰓

燒令烟斷附子以鹽水浸七度去皮等分爲末每空心酒服

二錢七

論 牛角本筋之粹骨之餘而鰓又角之精也乃厥陰少陰血分之藥血爲眞陰之化醇腎主至陰肝爲血臟牛屬土而益太陰之脾其角之精者燒而用之可以和三陰之氣更藉其堅凝上出者療精之下陷乃得血之行止咸宜焉

牛黃

出隴西及晉地凡牛生黃則夜視其身有光皮毛潤澤眼如血色或云病乃生者非也時復鳴吼恐懼人以盆水置牛前伺其吐出喝迫墮水取出陰乾百日無令見日月光如雞黃大重疊可揭若干層輕虛氣香磨甲色透置舌上清涼透心是曰生神黃

最貴其殺死從牛角得者曰角中黃病死從心中剝得者曰心黃初在心中如黃漿取得便投水中乃硬似碎蒺藜及豆瓣者是也一從肝胆中得者曰肝黃胆黃皆不及生黃又斬牛黃堅而不香駱駝黃極易得能相亂不可不審

味先苦後甘氣平涼入足厥陰少陽手少陰經益肝胆清心化熱利痰定神治驚癇寒熱盛狂瘲入肝治筋病中風失音口噤瘻小兒癇熱百病見稟純陽之氣其病皆胎毒痰熱所生肝心二經所發此藥化痰除熱清心養肝有起死回生之力痘瘡紫色發狂譫語者可用必用牛雄腦麝之劑入骨透肌以引風出若中腑及中血脈者用之反引風邪入於骨髓莫之能出東垣牛以土畜凝結

精氣而爲黃猶人身之有內丹也故能解百毒而消痰熱散心火而療驚癇爲世神物諸藥莫及仲淳 凡中風清心化痰

熱中臟昏冒不語者此味當爲主藥 同犀角琥珀天竺黃

鉤藤鉤茯神真珠金箔麝香丹砂治小兒驚癇百病 同犀

角地黃丹皮麥冬竹葉治小兒五色丹毒 入外科內服藥能解疔腫癰疽諸毒又傳藥止痛散毒如神 同鐘乳石真

珠象牙猪牙皂角末白殭蚕紅鉛片腦明礬沒藥蛀竹屑天

靈蓋爲丸土茯苓湯下治結毒有神 小兒七日口噤牛黃

爲末以淡竹瀝化一字灌之更以猪乳滴之 驚癇嚼舌迷

悶仰目牛黃一粒許研和蜜水灌之 小兒積熱毛焦睡語

欲發驚者牛黃

六分硃砂五錢

同研以犀角磨汁調服一錢

痘瘡黑陷牛黃

二粒硃砂一分研末蜜浸臙脂取汁調搽

一日一上

論 牛爲土畜在卦爲坤坤陰也陰承陽氣以生物是陽在

陰中也而陽卽得陰之氣以化物故中土味甘無所不生又

無所不化舉戾氣所鍾之物并人身爲患之戾氣無不藉之

以化焉牛以坤質更萃氣血之精明而凝結爲黃是以土德

而具生化之體用藥中之貴莫過於此第在肝心二臟專致

其用者何也夫木固爲土之主而又必基土以爲命故木變

風皆有土氣以歸之則風平若心火則土之母也有土之子

氣以宿之則母自趨子而火熄矣此所謂益肝胆清心化熱而水火原同並以清心者益腎也總之以氣血之物專賦土德而萃其精英凝諸形質繆氏謂其爲世神物功能起死回生信然

又云小兒傷乳作瀉脾胃虛寒者不當用

酪

牛羊馬駝之乳皆可作入藥以黃牛酪爲勝酪有乾濕乾者更良

氣味甘酸溫 水牛馬駝之酪冷療牛羊乳酪溫 治熱毒止煩渴除胸中虛熱生精血補虛損

造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳熬數十沸常以杓縱橫攪之傾出罐盛待冷掠取乳皮以爲酥入舊酪少許紙封放之卽成 乾酪法以酪曬結掠去浮皮再曬至皮盡却入釜中炒少時器盛曝令可作塊收用

酥
酪之浮面所成

牛酥味甘氣微寒 補五臟益虛勞寒血脈除心熱胸中客熱止渴利大小腸能除腹內塵垢又追毒氣發出毛孔間 牛酥不離寒病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼寒者宜之辨酥雖勝難得山石

造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再

煎油出去滓入鍋卽成酥油。凡入藥微火溶化濾淨用之。
羊 牡日殺亦曰瓶

肉 味甘氣溫性大熱 補中益氣療虛勞寒冷治產後虛羸脾胃冷氣作痛及寒疝 得火土之氣以生故能補有形肌肉之氣凡味同羊肉者皆補血虛陽生則陰長也。 附方 治寒勞虛羸及產

後心腹痛羊肉湯用肥羊內一斤水一斗煮汁八升入當

歸五兩黃芪八兩生薑六兩煮取二升分四服金匱

產後虛

羸腹痛冷氣不調及中風汗自出自白羊肉一斤治如常調和

食之 崩中垂死肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地

一斤乾薑當歸各三兩煮三升分四服 治虛勞天眞丸精

羊肉七斤用當歸十二兩山藥十兩
天冬一斤烘

作末安羊肉內酒水煮至糜再入黃芪末五兩人參末三兩

白术末二兩蒸餅搗和丸如梧子日二次服三百丸溫酒下

天行熱病後溫瘧熱痢後食之必致發熱難療妊娠食之令

子多熱瀕癰腫瘍消渴吐血嘈雜等證咸不宜服

仲淳

煮

時切忌銅器

乳白者佳氣味甘溫補寒冷虛乏潤心肺和小腸氣利大

腸治乾嘔反胃小兒噦喎及舌腫

羊腎氣味甘溫補腎氣理精枯陽敗附方治陽氣

衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖

枸杞葉一斤同五味煮成汁下米作粥食之老人腎臟虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊腎一對杜仲長二寸同煮熟空心食之能令內腎柔軟然後服補藥

羊肝青羖羊者良

氣味苦寒亦云溫補肝治肝風虛熱目赤

暗痛熱病後失明

並用子肝七枚作生食神效

附方

目病失明青羖

羊肝

一斤去膜切片新瓦炕乾

同決明子

半升

蓼子一合炒爲末以白蜜漿服方寸七日三服三料目明至一年能夜見

文字不能遠視羊肝一具去膜細切葱子一勺炒爲末以水煮熟去滓入米煮粥食

羊膽去勢青羯者良

羊者良

氣味苦寒主治青盲明目點赤障白翳

主治療白翳

風淚眼

膽汁減則目暗故諸膽皆治目病

大便閉塞羊膽汁灌入卽通

附

方 痘後失明羊膽點之日二次 碧雲膏治爛弦風赤眼
流淚不可近光及一切暴赤目疾臘月收羯羊膽十餘枚以
蜜裝滿紙套籠住懸簷下待霜出掃下點之神效

羊脰骨

氣味甘溫性熱

有宿熱人弗食

治虛冷勞弱白濁健胥

脚療筋骨攀痛

酒浸服之

須用之

附方

秘真丹治思

想無窮所願不協意淫於外作勞筋絕發爲筋痿及爲白淫

爲勞弱羊脰炭燒紅窖殺厚朴薑製

各三兩

硃砂一兩爲細

末酒煮糊和丸梧子大每空心溫酒下五十丸

論 羊爲火畜蘇頌言其齒骨五臟皆溫平惟肉大熱夫人

與獸賦形如脾之主肉諒無大異是則火之生土其首及者而別錄補中益氣之說是也

其治虛勞寒冷則必如天眞丸之合諸藥方爲得當

夫稟

乎火者心也心與腎一氣上下故腎卽用之補腎氣而肝下合於腎水上合於心火又卽用之補肝蓋神水照物乃先天之氣所生後天之氣所成氣固火之靈也試觀目病失明與不能遠視多用羊肝爲主緣不能遠視者病於無火不能近視者病於無水補氣所以益火也又如羊脰骨之療齒痛用於寒證爲多若寒熱兼者卽有相濟之味可見此味之用腎氣爲本而寒熱爲標也更參白濁勞弱及筋骨攀痛諸治則益明矣大抵是物之所稟者火其於血氣之倫有得於氣化

之陽以爲扶助虛羸之功者如用之得宜豈不勝於草木無情之品乎

豕

猪脂 味甘氣微溫 補中益氣止渴斷暴痢虛弱 釀黃

糯米蒸搗爲丸治勞氣並小兒疳蛻黃瘦病 猪水畜而胃

屬土爲補脾胃要品 附方 補益虛羸用猪脂一具入人

參五兩 蜀椒一兩 乾薑一兩半 葱白七箇 糯米半升 在內密

縫煮熟食 水瀉不止用鱖猪去勢脂一具 同蒜煮爛搗膏

丸梧子大每米飲服三十丸或每日五更水瀉一次百藥不

效者更入平胃散末三兩 同丸服

猪脾

俗名聯帖

味濟氣平

脾胃虛熱同陳橘紅人參生薑葱

白陳米煮羹食之

脾積痞塊猪脾

七個

每個用新針刺爛

以皮硝

一錢

擦之盛瓷器七日鐵器中焙乾又用水紅花子

七錢

同搗爲末無灰酒調空心下一年以下者一服愈五年

以下者二服十年以下者三服

凡六畜脾人一生莫食之

孫真

猪心

氣味甘鹹平 治驚邪憂恚虛悸氣逆婦人產後中

風血氣驚恐

豬水畜故心可以鎮恍惚

附方心虛自汗不睡用豬猪心

一個帶血破開入人參當歸

各二兩

煮熟去藥食之數服愈

多食傷心不可合吳茱萸食

蘇頌

心血

調硃砂末治驚癇癲疾及痘瘡倒臘

以心歸心以血導血之意得

龍腦直入心經

附方 心病邪熱用猪心血

一個

靛花末

一匙硃砂末

一兩

同研丸梧子大每酒服二十九

痘瘡黑

陷臍月收積猪心血瓶乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒

服須臾紅活神效無乾血用生血

尾血 用此者取其動而不息又當治下也

與雞冠血治上相對

豬爲

水畜其血性寒能解毒制陽

猪胆 氣味苦寒 清心臟涼肝脾療大便不通

與醋相合內穀道中

酸苦益陰潤燥瀉便 治或瀉或止久而不愈

二聖丸

通小便

熱酒和服殺疳蟲

治目赤目翳 附方 二聖丸用黃連黃檗末

各一兩

以猪

膽煮熟和丸如綠豆大量兒大小每米飲服之

有以猪膽汁炒黃連柴胡

治或瀉或止嘔應者以能和陰而令肝之血和風靜也

傷寒五六日斑出猪胆雞子

湯用瀆猪胆汁苦酒

各三合

雞子

一個

合煎三沸分服汗出

卽愈

小便不通外治用猪胆連汁籠住陰頭一二時汁入

自通

消渴無度雄猪胆

五個

定粉

一兩

同煎成丸芡子大

每含化二丸咽下日二

猪肝 氣味苦溫 補肝明目止休息痢 方用瀆猪肝

具切片杏仁一兩炒於淨鍋內一重肝一重杏仁入童便二升文火煎乾取食日一次痢自止

餌藥人不食猪肝

瀝

猪肺

味甘氣微寒

得大
仁良

療肺虛欬嗽竹刀片切麻油

炒熟同粥食

治肺虛嗽血煮肺蘸薏苡仁末食之

猪腸

味甘氣微寒 潤腸治燥調血痢臟毒去大小腸風

熱

附方 腸風臟毒用猪臟入黃連末煮爛搗丸梧子大

每米飲服三十丸

又方入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗

丸梧子大每服二十丸溫酒下

多食動冷氣

猪腎

氣味鹹冷

腎有虛熱者宜之腎氣虛寒者忌方藥

用治腎痛腎虛借其引導而已若以爲補腎而常食之誤

附方

心氣虛損猪腰子

一枚水二盞

煮至極半切碎入人

參當歸各半兩

煮至八分喫酒子以汁送下未盡者同渣作

丸服 久泄不止猪腎

一個

批開摻骨碎補末煨熟食之

久食傷腎

孟詭

令人少子

日華子

猪脂 味甘氣微寒性滑澤 潤肺散風熱利血脈腸胃通

大小便

同滾水大飲之能通燥結

附方

關格閉塞猪脂薑汁

各二升

微火煎至二升下酒

五合

和煎分服

肺熱暴喑猪脂

煉過入白蜜

一斤

再煉少頃濾淨冷定不時挑服一匙卽愈

無疾常服亦潤肺

臘月煉淨收用

母猪乳 味甘鹹氣寒

治小兒驚癇

初生至滿月以猪乳頻滴之可免驚癇痘

疹之小兒口噤不開猪乳飲之甚良 月內胎驚同硃砂牛
乳少許抹口中甚妙

患一取法須馴猪待兒飲乳時提後腳急以手捋而承之非此不得

猪膚卽皮

氣味甘寒 治足少陰下利咽痛胸滿心煩者有猪

膚湯用猪膚一斤

水一斗煮五升取汁入白蜜一斤

白粉五

合熬香粉服

取其氣先入腎解少陰客熱也

論 犀爲水畜十二辰亥乃六陰之極也而犀應之在卦屬

坎則茲物之充乎水用以療疾也明矣水以土爲主以火爲用以肝胆爲子以肺爲母如猪膚之補中益氣爲補益脾之

陰氣也水土合德脾腎相資故能止渴斷暴痢虛弱而消癰
小便數亦用之爲主矣其心治驚邪憂恚虛悸氣逆又心血
同硃砂鶡花治心病邪熱是有麗於心火以盡其用者至是
物之肝多補肝中陰氣之不足不同羊肝之能補陽何以明
之此畜無筋經曰肝主筋又曰陽氣者精則養神柔則養筋
筋之不備卽明爲陽之不配陰矣其治休息痢亦或用肝氣
之陰以化熱積乎第水之旺氣在胆以甲木生於亥而肝則
否以乙木死於亥生於午也肺能補肺治肺虛嗽血而大臟
治下血皆取其有餘之陰以爲補益耳豕爲水畜專氣在腎
腎固諸臟腑之原也時珍謂其性寒不能補命門精氣觀方

書但療消癰而不及他用非其明徵乎哉

猪一身除脂膏外餘皆有毒發病仲淳患外感者食之增劇瘡

愈食之寒熱復來患金瘡食之血液衰涸肥人多食動風發
痰瘦人多食助火作熱是皆助其有餘之邪而犯不戒之過

也

嘉謨

狗

卷尾有懸蹄者本草所用惟食犬非獵犬及守家吠犬也

肉

黃犬爲上
黑白次之

味鹹酸氣溫

同蒜食
損人

補胃氣壯陽道暖脣

膝益氣力

陰虛病多不宜食

虛寒瘧疾黃狗肉煮臚入五味食之

狗膽

黃犬白者良

氣味苦平有小毒

瘡鼻齷及瘻肉納耳中

治聾耳能破血除積

凡血氣痛及損傷者熟酒服半個瘀血盡下

治反胃殺蟲

魏志

一女子左膝瘡痒華陀視之用繩繫犬後足斷腹取胆向瘡口須臾有蟲若蛇着瘡上出長三尺病愈

附方

反胃吐食不拘男婦老少遠年近日用五靈脂末黃狗胆

汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服三服效 瘡塊

疳積五靈脂炒煙盡真阿魏去砂研等分用黃雄狗胆汁

丸黍米大空心津嚥三十丸忌羊肉醋麪

狗陰莖 氣味鹹平 主治傷中陰痿不起令強熟大等

其性專補命門相火

除女子帶下十二疾

鹹溫入下焦補緩衝任二脈虛寒故

同菟絲

覆盆車前子魚膠巴戟茺蔚鹿角鹿茸沙苑子山萸能鬱

暖精使人有子

陽強易舉者忌內熱多火弗服

仲淳

修事 六月上伏日取陰乾百日

論 狗爲陽畜在內經屬木在易卦屬艮木與土將誰爲主乎夫土繼水之後所以止水也木卽繼土之後所以妙水木相生之化而達陽也艮卦兼之造化元機以進氣爲先犬之應於木者此也應於木故犬得三數以生

孕三月生

本草謂其肉

補陽誠非臆說或曰狗肝如泥土臭味亦然安能舍土而但言木乎曰是蓋土爲木用猶運氣司天其年何氣爲主而有從之以化者卽所云犬無胃非無形質也其胃氣少耳胃氣者土非又土從乎木之一證乎微獨肝爲然卽以胆言之五

畜膽俱無化血散結之主治惟狗胆有此因肝及膽以致土爲木用之氣化乃能化血能殺蟲方書用治反胃固不止於化滯血也總之是物屬木之陽有中五之土成之如胆得陽木之氣以化陰土之血所以異於諸畜之胆耳

繆氏云犬肉助陽陽勝則發熱動火生痰發渴凡陰虛內熱多痰多火者忌之天行病後尤爲大忌

驢

乳 氣味甘酸冷利 治煩熱氣鬱解小兒熱毒不生痘疹
浸黃連取汁點風赤眼

驢陰莖 氣味甘溫 能強陰壯筋

驢溺

氣味辛寒有小毒

主反胃

因稍有毒服時不可過多須熱飲之病深者七

日 壽病

用四物加驢
尿防其生蟲

殺蟲治狂犬咬傷癬癩惡瘡

並多飲取瘥

阿膠

東阿井乃濟水之伏者所注其水清而重其色正綠煮膠

法必取烏驢皮牡者刮淨急流水

浸狼溪水
中爲合法

中浸七日入大

鍋七口內漸增阿井水煮至化化後每日遞減一口聚其融

化之極者止得一口熬時入鹿角一片卽成膠

羣陰必得一

陽以化也膠

成搭於架上任其順下而亦不斷

冬月易乾其色深綠且明燥輕脆味淡而

甘亦須陳久方堪入藥

甘淡溫平氣味俱薄可升可降陽中陰也

緣水性之下趨協皮革之外藉火

汚辱廢也

力以成土化從下入手太陰少陰足少陰厥陰經

主治虛

者上從外者內矣

主治虛

者上從外者內矣

勞羸瘦陰氣不足療虛勞欬嗽喘急肺痿吐膿血并吐血衄血血淋尿血血痢及女子血痛血枯崩漏經水不調無子並

胎前產後諸疾更男女血涸血污四肢痠痛

風淫木旺肢體偏疼者能駁之

勞極灑灑如瘧除風潤燥化痰清肺利小便

調猪苓湯服

調大腸

聖藥也阿井乃濟水之眼濟水爲天地之肝

烏驢皮合北

方水色順而健行之物故入肝入腎多功水充則火有制火

熄則風不生凡木旺風淫火盛金衰之證應手輒效

土材

膠用攬濁水則清故人服之下膈疎止吐治諸淤濁及逆

上之痰也瀕

凡治喘嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿

湖

膠以安肺潤肺。肺虛損極。欬唾膿血。非阿膠不能補。痢疾多因傷暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥。有熱毒。留滯者。能
躁導無熱。毒留滯者。能平安。同蜜蠟黃連用

正者以阿膠倍人參煎服最良。阿膠育神人參益氣也。

以上士瀛

小兒驚風後瞳人不

同天冬麥冬生地。枯萎根。白藥子。五味。枸杞。蘇子。桑皮。百部。白芍。治肺腎俱虛。咳嗽吐血。

同杜仲枸杞白芍山藥麥

冬地黃黃芪人參青蒿續斷黃檗。治崩中漏血。

同白芍炙

甘草地黃麥冬。白膠當歸枸杞杜仲續斷治婦人胎痛或胎漏下血。月水不調阿膠一錢。蛤粉炒成珠研末。熱酒服。

月水不止阿膠炒焦爲末。酒服二錢。妊娠血痢。阿膠二兩。

酒一升半煮一升頓服 妊娠下血不止 阿膠三兩酒一升

半煎化服卽愈

此四證不調與不止有異血痢與下血亦殊然皆主阿膠益陰而用酒以和血行氣其相

合之功用可思

癱緩偏風及諸風手脚不遂腰脚無力者阿膠微

炙熟先煮葱豉粥一升別以水一升煮香豉二合去渣入膠

更煎七沸烊如餳頓服之乃暖吃葱豉粥

若冷服令人嘔逆

如此三

四劑卽止 老人虛秘阿膠炒

二錢

葱白

三根

水煎化入蜜

二匙溫服

妊娠胎動阿膠炙研

二兩

香豉

一升

葱

一升水

三升煮取一升同膠化服

此三證

癱緩與胎動

皆用葱豉宣

氣達陽以化陰氣之或濤或戾便

秘止用葱者借陽氣以行陰而已要非本於阿膠以益陰不能成功

吐血不止

用阿膠炒

二

兩蒲黃六合生地黃

三升

水五升煮三升分服

大衄不止

口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞生地黃汁

一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳

此二證皆主阿膠益陰氣而入包絡蒲黃和中

土之血使陰能化生地冷血助阿膠之益陰而退熱也

產後虛秘阿膠炒枳殼炒各

一兩滑石二錢半爲末蜜丸梧子大每服五十丸溫水下未

通再服觀諸方佐使所以用阿膠者可類推矣

論阿膠以阿井水煎烏驥皮而成取其質於皮而化其質

之氣於水故命名在阿夫皮毛者肺之合人物一也烏驥皮

合北方水色猶人身腎至於肺之義阿水清而重其性下趨

合火化以成其順下而返於所始所以入手太陰足少陰益

肺元而不病於僭陽調肺氣而不類於耗散也抑氣陽也此

味益陰。又言補肺氣不足義似相戾。不知肺貫心脈而行呼。
吸氣者火之靈。心乃火之主也。因離中有坎。故腎脈之直者。
上貫肝膈入肺中。而其支者。又從肺出絡心。注胸中。是肺脈
貫心而心脈更藉肺陰以下注也。肺陰卽腎脈之貫膈而入
蓋肺爲陽中之少陰。猶肝爲陰中之少陽。陽中之陰。陰中之
陽。尤陰陽關捩子也。肺氣獨重肺陰所云陰從陽出者。益陰
卽以裕陽正屬關捩子之義也。凡肺受六淫七情之侵。則肺陰傷而心火亢。
火亢則金愈衰。而離中之坎不能合於金。以化血。則真氣愈
不足。如肺陰下降。以入膻中。是爲生血之化原。舉火亢金衰。
腎能平之。所以療諸血證。陰裕而陽乃得化。陰降而陽卽隨
之。俾歸命門。以神三焦之用者。皆不越此。所以由血而至於

氣舉益虛勞羸瘦等功悉皆歸之也大抵滋陰之味多傷氣
益氣之味類并陰惟此味雖以益陰爲功獨其陰從陽出者
益陰卽以裕陽所謂膏肓之上中有父母又所謂上焦合而
營諸陽心肺是也潔古首云入手少陰海藏首云入手太陰
其義不可互參乎至俱言其入足厥陰者緣心包絡主血與
肝相表裏肝固藏血之臟也由肺陰之下降而主血者不病
入心生血則火息風平而金媾於木卽藏血者亦不病矣抑
血病有順逆而此無不治者由能和腑中之氣化以歸命門
又達真陽之化醇以歸血海舉生血和血之功皆其從金生
水以爲還元之助卽從陰益陽以爲化生之地耳阿膠由益

化故益氣不同於參芪。仁齋謂其陳利積熱誠頑至其除風
其所始也。至於枯滯乃其質如是耳。非性味也。
本於益肝之陰氣而金能媾以平之。非槩治天癸之風其化
痰本於陰氣之潤下能逐炎上之火所化者非槩治濕滯之
痰其治喘但治炎上之火屬於陰氣不守者非槩治風寒外
束及濕滯上壅之喘其治血痢止如傷暑熱痢之血非槩治
濕盛化熱之痢其治四肢痠痛乃血涸血污之痛非槩治外
滯所傷之痛卽治吐衄亦止奏功於虛損若暴熱爲患或外
感鬱抑及怒氣初盛者俱弗混投。

辨治 陳阿膠光如瑩漆色滯油綠折之卽斷不作臭氣夏
月亦不甚濕軟者爲真 調經丸藥中用宜入醋重湯燉化

和藥 胃弱作嘔者弗烊化服打碎同蛤粉蒲黃牡蠣粉炒

隨宜

虎骨

氣味辛微熱而平

酸其肉

主治筋骨毒風攣急屈伸不得走

注疼痛追風健骨並止驚癇療溫瘡

方書治中風虛勞瘡

瘻鶴膝風譖妄腰痛脚氣

風所以從虎者風木也虎金也

木受金制焉得不從

庚宗

西方金獸而反司東方甲腫乙木

此所謂制則化也無制則亢亢則害矣

之顧

凡辟邪疰治驚

癰溫瘡瘍疽頭風當用頭骨手足諸風用

脛骨

虎之强悍賴於脛雖死而屹立不仆故治脚脛無

湖瀕

力用之

石山

同牛膝木瓜地黃山藥山萸黃檗枸杞麥冬五

味治腰膝無力筋骨疼痛或痿弱不能步履

同草薢獨活

防己蒼朮牛膝首烏薏仁木瓜刺蒺藜治風寒濕邪着於經絡以致偏痺不仁同當歸白芍甘草續斷牛膝白膠麥冬

地黃治偏身骨節痛治白虎風痛走注兩膝熱腫用虎脰

骨酥塗炙黃黑附子炮裂去皮各一兩爲末每服二錢溫酒

下日再歷節痛風虎脰骨酒炙三兩沒藥七錢爲末每服

二錢溫酒下日三服筋骨急痛虎骨和通草煮汁空腹服

半升覆卧少時汗出爲效切忌熱食搘齒小兒不可與食恐齒不生肝腎氣血不足足膝痠痛步履不隨虎脰骨一兩

醋炙沒藥乳香另研各五錢附子炮去皮尖二兩
川牛膝木瓜天麻各一兩半餘爲末將木瓜蕊搗如膏加

酒糊丸梧子大每服七八十九空心鹽湯下
休息痢經年

不愈虎骨炙黃蕉搗末飲服方寸七日三取效
閱上方治

不盡屬風當益明於金木相媾之義經云至陽盛則地氣不足惟虎骨能奏厥功蓋金媾於木則風升之陽際於天表者陽中有陰此正升中有降而地氣還足也

論虎司風木厥肖惟寅其氣特鍾肅殺得金之專而風木并從之以化取其骨味辛散通行治諸風證宗奭謂木受金制之頤謂木從金化夫制者金猶爲木用化則木俱從金用

是以風之太過不及。投此咸宜。蓋靜木之風者。必藉於金。非漫取其相制也。人身如肝木從陰而達陽於天。不有肺金從陽而致陰於地。何以裕肝之陰。令其右旋僅返於所始而升降不息乎。經曰。升降息則氣立。孤危。此可以悟金木相媾之義矣。

中風危篤之證。只因升降息耳。

此義最爲吃緊。前人俱未及發。

虎骨之功似乎專在氣分。而就氣分卽有爲益血之主者。以從肺而媾於肝。肝固血臟也。方書如中風虛勞。癲癇。脚氣。腰痛之用。此皆以療筋爲治。夫筋固肝所主。而於益血之義尤切。血正。肝以養筋也。至於行痺。有風毒。風虛之異。一皆以虎骨主之者。緣人身風木之初氣。稟於陰中之陽。有升卽應有降。而陰却御陽。以爲升。

降如風毒之走注。固由陰微不能爲陽之化。而風虛之走注亦以陰微不能爲陽之使也。惟虎骨有能爲陽之化且使者。此木從金化之實際也。卽彼不病於風。若腰痛着痺痠證。非亦如風毒之治。暢陰以和陽乎。卽彼主療脚氣。非又如風虛之類藉之育陰。而更助氣以達陽乎。總之肝司地氣之升。肺司天氣之降。由升而得降。以運育於地者。肺爲肝之用也。由降而得升。以還暢於天者。肝又爲肺之用也。肺爲肝之用。故陽和於陰。以化血。肝爲肺之用。故血和於氣。以化精。正內經所云。金木者生成之終始也。如不思風木爲元氣出地之始。不悉其履端於始者。乃能升降相因。以妙於生化。而漫然止。

謂其治風不幾同於說夢乎。

辨治 凡虎身數物俱用雄虎者良虎頭及頸骨色黃白者佳前掌腕中骨形圓扁似棋子者力最勝虎力在掌故也

藥箭毒死者其毒侵漬骨血間反傷人不可服 先用狗肉包裹一夜投所嗜以回其靈諸骨並搘碎去髓塗上酥或酒或醋柳灰火炙黃脆研如飛塵否則粘着腸間爲癥積

虎睛 凡虎夜視一目放光一目看物獵人候而射之弩箭纔及目光卽墮入地記其處掘下尺餘方得狀如白石子琥珀此其精魄淪入地下者 主治癲疾瘧病鎮心安神療小兒驚癇啼悸客忤疳氣 附方 虎睛丸治癲疾發作涎潮

搐搦時作譖語虎睛一對微炒犀角屑大黃遠志肉各一兩

梔子仁

半兩爲末

煉蜜丸綠豆大每溫酒服二十丸

地龍

散通治小兒諸癇發遏無時乾地龍

半兩

焙虎睛一對炙人

參二錢半

金銀箔三十斤

天竺

黃硃砂代赭石煨醋淬鐵粉

各二錢半

雄黃一錢半

輕粉半錢爲末

每服半錢紫蘇湯調

不拘時服

論虎睛治癇屬於肝心二臟者居多此正木從金化之義
及雖專於氣分而卽有爲益血之主也裏也

修治多僞作須自獲者乃真入藥酒浸炙乾用

虎睛治反胃吐食取生者弗洗存滓穢新瓦固煅存性入

平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效

湖瀨

犀角

犀似牛舌上有刺好食棘刺出西番南番滇南交州諸處有

山犀

居山林易得

水犀

出入水中最難得並有二角鼻角長而額角短

兜犀

亦作兜卽沙

犀止有一角

在項爲獨角犀其文理細膩斑白分明作器用佳不堪入藥

三種又有毛犀似之

卽旄牛

味苦酸鹹性甚走散氣寒可升可降陽中之陰也入足陽明

兼入手少陰經

升麻爲之使惡烏頭烏喙

清胃解毒瀉肝涼心治百毒

辟中惡毒氣解瘟疫寒熱諸毒氣鎮心神療時疾熱如火煩

毒入心狂言妄語主風毒攻心眊眊熱悶中風失音治吐血

衄血傷寒蓄血

上焦蓄血用地黃湯及發狂斑黃療小兒風熱驚癇

犀角地黃湯

並瘡疹稠密內熱黑陷或不結痂亦化瘡腫癰疽膿血 方
書治卒中暴厥與中蠱毒欬嗽諸兒血證痰飲消癰耳鼻唇
舌面病癩瘻攀瘻行痺痛痺頭痛眩暈淋及溲血滯下脚氣
犀屬南方獸似得火化之正令者飲則汚濁清之也食則
毒棘消之也故曰犀利頤 小兒驚癇不知人嚼舌仰目者
濃磨犀角服之立效 痘瘡稠密不拘大人小兒用新汲木
磨生犀於濱器中冷飲濃汁 同丹砂琥珀金箔天竺黃牛
黃鉤藤鉤羚羊角真珠麝香治大人小兒風熱驚癇 磨汁
同生地紅花子麥冬紫草白芍鼠黏子治痘瘡血熱初見點
紅艷壯熱躁渴狂語多服可保無虞 磨汁同鬱金童便生

地麥冬甘草白芍蘇子丹參白藥子治吐血衄血 入紫雪
治大人小兒顛狂溫疫蠱毒邪魅 一切煩熱爲病 入抱龍
丸治小兒恍惚驚悸疾涎壅塞 入至寶丹治中風不語中
惡氣絕 一切神魂恍惚狂亂等證 下利鮮血犀角地榆銀
花各一兩 升麻五錢爲末煉蜜丸彈子大每服一丸水一升
煎五合去渣溫服此熟毒伏於心經故也宜加丹砂滑石未
以金銀藤花熬汁煎藥更效 鼻衄犀角磨汁生地芍藥丹
皮水煎服熱多者加黃芩脈大來遲腹不滿自言滿者無熱
也不用黃芩 潟血亦用上方但空心服心繫於肺而小腸爲心之腑以行水

化故二證
可用一方

故惟因心火而散以發胃
經。猶如君之有勁臣
主。臣在胃而先君之火
反歸還於入心。

論 犀角百毒食衆棘。凡毒入此獸之胃而悉化其角屬陽

性走散潔古謂爲陽中之陰大抵入胃而效心之用者

觀其能涼

心解熱療煩毒治謫狂可見

夫心爲陽中之太陽又爲手少陰經以其火

中宅水也此味屬陽而氣寒寒在陽中陽至寒化其酸苦涌

泄不同苦寒之降抑所以散毒氣者在此所以散火結者卽

在此心原不受邪凡受邪者皆包絡也

包絡與胃口蒸相應皆能散包絡之熱毒故治種種血證以包絡固主

血者故又能治中風蓋風火陽也心爲火主風逐火焰火散

而風自平且肝脾之系俱連繫於心是以風毒風熱驚癇斑

黃遇之而悉瘳至於瘡腫化膿特療血分熱毒之餘事耳

方書用茲味主治中風證居多

皆見恍惚悶亂昏煩不語及蹇澁謬顛倒舌強失音等

證夫風屬肝所司而子母禪受絕無等待且風火相煽類屬
熱毒非屬陽中之陰如此味都不克靜受病之主臟也觀於
治風之次卽屬治驚其義不更顯然乎惟血虛而有火者最
宜酌投是以孕婦多服則損胎氣大約火實欲空者宜之火空欲實者仍
忌之耶

痘證氣虛無大熱者不宜用仲淳或以血虛而燥熱發者用之
禍至丹溪傷寒陰證發躁勿誤用妊娠多服能消胎氣仲淳

辨治 文如魚子形謂之粟紋紋中有眼爲粟眼黑中有黃
花者爲正透黃中有黑花者爲倒透花中復有花者爲重透
並名通犀乃上品也花如椒豆斑者次之烏犀純黑無花者

爲下

瀕湖

未經湯火煮製者爲生犀始可用角尖尤勝以紙

裹置懷中一宿則易研

人氣入丸散屑之尋常湯藥磨汁冲粉犀

服

象

瞻

氣味苦寒微毒 主明目

能去塵膜與熊膽同功

治疳能殺疳蟲

癆蟲兼除臟腑

一切熱結

入肝脾二經鬱熱則成疳積苦寒除二經之熱

故主諸證

同獫肝蘆薈乾漆胡連青黛鬼臼丹砂入滋腎藥內

治傳屍癆瘍

內障目翳用象膽

半兩

鯉魚膽

七枚

熊膽

分牛膽

半兩 膜香一分

石決明一兩

爲末糊丸綠豆大每茶

下十九日二

膽極苦寒凡瘡證脾弱者目病血虛者不宜多服仲淳

辨治 其乾者上有青竹文斑光膩須細識之其味微帶甘入藥須先搗成粉乃和衆藥

象皮 治下瘖燒灰和油敷之又主金瘡不合入膏散爲長肉合口之要藥性易收斂以鉤刺皮其瘡旋合

象牙 氣味甘寒 主心肝風癇迷惑邪魅之疾宜生屑入藥拔以善其蛻長肉生肌 同明礬黃蠟牛角鰓鉛花金頭蜈蚣猾皮猪懸蹄治通腸漏去管 瘡疹不收象牙屑銅銚炒黃紅色爲末每服七八分或一錢白水下

熊膽

春近首夏在腹秋在左足冬在右足

埤雅

色通明者佳

氣味苦寒

涼心平肝爲手少陰足厥陰陽明藥

點眼去

醫開盲塗惡瘡痔瘻療蟲牙蛇痛治小兒風熱驚癇殺疳蟲
療時氣熱盛黃疸暑月久痢
附方
赤目障醫每以膽少

許化開入冰片一二片銅器點之絕奇或淚癢加生薑粉些

須

賜風痔瘻熊膽

半分牛乳

入片腦少許研和諸膽汁塗之

小兒鼻蝕熊膽

半分

湯化抹之

驚癇癲癎以竹瀝化兩豆

許服之去心中涎甚良
諸疳羸瘦熊膽使君子末等分研

勺瓷器蒸溶蒸餅丸麻子大每米飲下二十丸

論
熊爲陽獸繆氏謂其性溫能通行經絡凡諸膽皆苦寒

而熊膽之用較殊者或此之故試以半粒投水旋轉如飛
亦轉但緩耳

水面有凝塵者豁然而開可知此味點目去翳與

久痔固不徒以苦寒清火見效或亦秉陰中之陽陽中之動

故能開啟其氣血之爲邪結者

熊每升木引氣或墮地自快俗呼跌膽卽莊子所謂熊徑

鳥串也冬月蟄時不食飢則舐其掌觀比引氣并發時亦能食氣是熊之於氣也有殊性殊功所謂得陰中之陽陽中之動者當方書又每以治喉痺夫喉痺本毒熱結閉治之之故

正與此義相合凡清肝膽之味而能暢肝膽之用者則周身氣血皆可通其經絡而開其結邪明者嘗識之

有痼疾者食熊肉則終身不愈戒之

仲淳

用膽總論 凡膽皆極苦寒能走肝膽二經瀉有餘之熱小

兒疳積多致目生翳障者以肝脾邪熱壅滯二臟之氣血日虛閉塞日甚故也用此散肝膽脾家之熱則內邪清而外障去矣如不因疳證而目生翳障及痘後蒙閉者多因肝腎兩虛宜滋陰養血清熱爲急諸膽皆不得用仲淳

羈羊角

秦隴龍蜀山中皆有之其角細而圓銳長四五寸多節帶黃色者良 羚羊羱羊卽山羊 山驢三種相似羱似羊而青色毛粗角短小羝似吳羊角長大山驢驢身羚角但角大而節疏慢耳

味鹹氣寒入厥陰肝經甚捷羊火畜也而羚羊則屬木同氣相求也 並入手太

陰少陰經 主治明目益氣起陰安心氣定肝魂療驚邪魘

寐癲癇狂亂治一切熱毒風攻注及濕風注毒伏在骨閒中

風筋攀骨痛去惡血注下並熱毒血氣疝氣小兒卒熱驚搐

婦人產後惡血攻心煩悶子癟瘡疾 糜之性靈而筋骨之

精在角故又能辟邪惡解諸毒碎佛牙而燒烟走蛇虺也

湖

羚羊角具二十四節內有天生木胎者此角有神夫節合

二十四氣而胎木宛如從甲而乙起陰之氣以轉生陽所以

益氣也之頤 同犀角丹砂牛黃琥珀天竺黃金箔茯神遠志

鉤藤竹瀝治驚邪癲癇及癲癇狂亂等疾 同杞子甘菊決

明子穀精草生地五味黃檗密蒙花木賊女貞治肝腎虛而

有熱以致目昏生翳。產後煩悶汗出不識人。羚羊角燒末東流水服方寸匕未愈再服。墮胎腹痛血出不止。羚羊角燒灰三錢豆淋酒下。

論瀕湖悉數羚角之功五未能暢其所以然要知人畜之臟腑不甚相歧角乃骨之餘而腎之所含者骨也經曰腎在體爲骨在氣爲堅。羚角稟於骨之至堅本經首言明目而卽繼之以益氣起陰者以腎雖陰中之至陰然坎中有離實爲腎氣陰陽有一之或戾則腎氣便不足不足者不能致其氣於肝而肝亦不能爲腎行其化是物具體於腎致用於肝。肝本陰之真足者以升陽卽由陽之真足者以弭陰如瀕湖所

數去醫、舒筋、安魂、散瘀、降火、五者之所以然。當在是也。抑所謂益氣起陰者，固腎與肝之體而所謂五能者，肝還行腎之用也。惟茲物於肝之體用俱全，故於厥陰爲要藥。經曰：「一陰爲獨使。」厥陰之生化無閼，而心肺脾皆在此托始矣。

凡肝心二經虛而有熱者，宜之。無熱不宜用。仲淳入厥陰伐生
生之氣，不宜久用。士材

修治 凡單用不復有驗，須不拆原對以繩縛之。鑿取旋用，勿犯風鑿。末盡處須紙重裹，恐力散也。一說密裏藏懷中，取去搗易碎。

鹿
麋

小者鹿大曰麋昔之大小以此別麋似鹿而色青黑肉蹄目下有二竅爲夜目 牯者有角而無齒無上齦齒若下齦則牡咸有其無角有齒者牝也

麋鹿茸角總 凡含血之物內差易長其次角難長最後骨難長故人自胚胎至成人二十年骨髓方堅惟麋鹿角自生至堅無兩月大者重二十餘斤其堅如石計一日夜須生數雨凡骨之生長神速無過於此此骨血之至强者 夏至鹿角解乘陰氣之始以生茸冬至麋角解乘陽氣之始以生茸皆怒長而爲角革故所以鼎新也故角之力用最專而茸爲最 鹿孕子於仲秋而生於春受氣於陰而長於陽故爲揅

陰之陽。麋孕子於仲春而生於秋。受氣於陽而長於陰。故爲
挾陽之陰。其以二至解角者。緣所受之精氣與陰陽之逆氣
相應耳。鹿體陽其內食之燒。以陽爲體者。以陰爲末。麋體陰其肉。
食之以陰爲體者。以陽爲末。角末也。本經言鹿角補陰。麋角
補陽。是以二至日節氣所進者爲云。萬物乘天地之氣以爲
進退。方來者進是乘其生氣也。鹿陽也。卧則其鼻反向尾
間。能使陽得交於下之陰。而督脈通麋陰也。其首每向腹而
閉息。能使陰得交於下之陽。而任脈通。是皆稟靈於造化者
也。麋鹿皆角。俱以杜仲爲之使。畏大黃忌桃李。

鹿茸 味甘鹹酸氣微溫氣薄味厚陽中之陰入手厥陰少

陰足少陰厥陰經走命門心包絡及腎肝之陰分

經曰胞脈者屬心而

絡於胞中胞中爲精血之所聚而其脈固絡於心心胞絡主血會所以能療男子洩精尿血及女子崩漏也

峻

補陰氣

與麋茸之甘熱而專補命門真陽者有異

生精益髓強志健骨療虛勞灑

灑如瘧一切虛損羸弱四肢疲疼腰脊痛脚膝無力或耳聾

目暗虛眩頭暉男子洩精溺血女子崩漏赤白帶下散石淋

癰腫疽癰及骨中熱久服耐老附方精血耗涸耳聾口

渴腰痛白濁上燥下寒不受峻補者鹿茸酒蒸當歸酒浸各

一兩焙爲末烏梅肉煮膏搗丸梧子大每米飲服五十丸

虛痢危困因血氣衰弱者鹿茸酥炙一兩爲末入麝香五分以燈心

煮棗肉和丸梧子大每空心米飲下三五十丸室女白帶

因衝任虛寒者

鹿茸酒、蒸焙

二兩

金毛狗脊白斂各一兩爲末用艾

各一兩爲末用艾

各一兩爲末用艾

煎醋打糯米糊丸梧子大每溫酒下五十丸日二頭中眩暈甚則屋轉眼黑或如物飛或見一爲二用茸珠丹甚效或用鹿茸半兩無灰酒三盞煎一盞入麝香少許溫服

辨治

茸初生一茶之頃已成茄形遲半日便如馬鞍歧起

愈小愈嫩雖綿帛觸之亦損破也破則力大減

紫茄茸太

嫩血氣未具其實少力堅者又太老惟長四五寸形如馬鞍

鹿茸收時陰乾

茸端如瑪瑙紅至破之肌如朽木者最善

鹿茸收時陰乾

易臭惟破之火乾大好

先以酥勻塗茸上毛烈焰中灼之

不則火燒傷茸候盡再以酥塗微炙或酒炙及酒蒸焙用

麝
茸

氣味甘熱

性熱補陽

較鹿茸之微溫而多補陰者爲異

健骨扶陰

療治丈夫冷氣及風筋骨疼痛老人骨髓虛竭補益尤妙

可作粉常服煎

膠亦妙

論夫麋屬陰而茸角屬陽乃陰中之陽也峻補陽氣當先入腎之命門先哲多言功勝鹿茸者以其助陽益氣易於見功耳須知麋鹿茸角其所以分者在一至陰陽之殊氣而其所以分而合者在陽質而必應乎陰之氣陰質而必應乎陽之氣是以鹿茸非不益陽但陽中之陰以陰爲主而益陰者自能健陽麋茸非不益陰但陰中之陽以陽爲主而強陽者亦自能益陰也人身陽中之陰雖陰生於陽然必陰爲先

卷三
導而火乃得交於水。因陰之降以引陽也。其陰中之陽雖陽生於陰。然必陽爲先導而水乃得交於火。因陽之升以引陰也。總妙於陽降陰升而生化。因之以不息。明乎此然後以陰陽之分治陰陽之偏勝而輔佐得宜可耳。

麋茸功效雖宏。然須按脈沉細相火衰弱者始宜用。其角亦然。修治同鹿茸。

鹿角 生用則散熱行血消腫辟邪。熟用則入腎補肝益陽和血。至凍霜熬膏則專於滋補。氣味鹹溫。補陰氣與茸同而功力少緩。故之革不如鼎之新也療骨虛勞極補絕傷秘精髓除腰脊痛女子妊娠腰痛下血。又活瘀和血大勝於茸。治留血在陰中及少

腹血急痛除女子胞中留血不盡欲死或墮胎血瘀或胎死腹中更主血

閉無子諸惡瘡癰腫熱毒磨醋傅之

附方

骨虛勞極面

腫垢黑脊痛不能久立髮落齒枯甚則喜唾用鹿角酒浸焙

二兩牛膝酒浸焙

一兩半爲未煉蜜丸梧子大每服五十丸

空心鹽酒下 腎虛腰痛如錐刺不能動

鹿角屑三兩炒黃

研末空心溫酒服方寸匕日三 妊娠下血不止

鹿角屑當

歸各半兩水三盞煎減半頓服不過二服 妊娠腰痛鹿角

截五寸長燒赤投一升酒中又燒又浸如此每次細研空心

酒服方寸匕

論 夫腎主骨主髓者骨之充也鹿角乘至陰之初氣而

精血隨之以怒生。是其爲骨之充者無過此獸。所以能秘精。
髓腰者腎之府。人身之髓腎主之。由脊骨甲相貫。故能除
腰脊之痛。其能活瘀散惡者。以鼎新而革故之氣應於時也。
生者無瘀血停留不得服。

辨治 要黃色堅重尖好者。生角屑同他藥煎服。散瘀行
血。醋磨汁塗瘡瘍癰腫。熱毒或水磨汁服。治脫精尿血。酒浸
焙或炒黃補虛和血。或燒灰酒服。治血虛而滯。瀕湖 寸截泥
裹於器中。大火燒一日如玉粉也。

麋角 氣味甘熱。補陽道絕傷益氣。補髓緩腰膝。治丈夫
冷氣及風痺。功勝鹿角。煮膠亦勝白膠。

論 犀角強陽之功亦差緩於首與鹿角但分陰陽而補髓之功不異以腎中之任不外於督也犀角較大於鹿角爲陽能生陰耳其活瘀和血不及鹿角者因補陽屬氣不似補陰之入血故丈夫冷氣及風痺者宜之

陽盛陰虛者忌服

鹿角膠本經名白膠

味甘鹹氣溫平氣薄味厚降多升少入足

厥陰少陰手少陰厥陰經

主治傷中勞絕羸瘦補中益氣

婦人血閉無子本經

男子損臟氣氣弱勞損吐血下血女子崩

中不止漏下赤白安胎去冷治男女肝腎虛損腰痛並腰膝痠軟及痛甘緩能通血脉又治尿精尿血同牛膝丹皮麥冬地黃

蘇子鬱金白芍當歸童便續斷治勞傷吐血。同地黃山藥
山萸鹿茸杞子五味車前麥冬杜仲骨脂巴戟蓮鬚治腎虛
陽痿精寒無子。加入當歸紫石英治婦人血閉子宮冷服之
受孕。虛勞尿精白膠二兩炙爲末酒二兩和溫服。虛損
尿血白膠三兩炙水二升煮一升四合分服。妊娠下血以
酒煮白膠二兩消盡頓服。

論 鹿角生與熟并熬膠俱應入腎以角亦骨類爲骨之合
也。卽六極審屬骨虛止用鹿角牛膝二味則其可知生
者活血勝於補虛熟者補虛勝於活血若熬成膠則一於補
矣。鹿以陽質而挾陰之氣其角膠因烹煉之久俾陰氣鎔化

於陽中。於人身氣血生化之原。裨益良多。本經故主傷中勞。

絕羸瘦也。然更云補中益氣。又似專功於氣者。蓋人身之胃

屬陽。

經云陽者胃之陽也。

而胃之三脘皆在任脈。是至陽原本於至

陰也。鹿角之勃生怒長。正屬陽中陰氣。其稟專其進銳。更經

烹煉。則由陰溫陽之氣化。乃得致於中氣。以爲天地升降之

樞。是滋味之補中益氣。正其能療勞絕羸瘦者。爾

生角本爲陽中之陰

氣熟膠乃達陰中之陽化。蓋取腎氣最厚之品。煉而成膠。則氣化濃密。還歸於補元精。不止於元氣之勃然而上行也。是誠爲補先天要藥。經日氣歸精。又日精化爲氣。可以合此味之用。

東垣藥性主男子損臟氣

氣弱勞損吐血。與本經所治互相發明。夫臟氣者。卽經所云五臟皆有陰氣也。氣弱者。卽經所云陰傷則無氣也。五臟陰

氣爲人身中元氣如病於陰氣不足卽謂之勞至陰氣大傷謂之勞損甚則遂云勞絕矣諸書獨以血證爲言者以陰氣乃後天營血之母陰氣傷卽先病於血安因是悟諸血證之治悉以救陰氣爲主陰氣係精血之真元救精血之損者舍是將焉取諸或曰血逆類由火僧何以致慎於苦寒之投曰以苦寒反能亡陰耳凡因六淫七情之侵損傷五臟陰氣陰氣損則元氣乃化爲火而眞陰之化醇者不能尋其天度以循經絡而歸血海如櫻寧子所說血因熱逆妄行或挾風或挾濕或挾氣亦庶幾近之第未明於六淫七情之損其陰氣者却在火之先其平火而令血不妄逆者止爲標之治如探

本則必圖完其陰氣以爲營血之母而善守之然則平火猶
非損陰氣之的治况以苦寒絕陽之生化初不爲陰之化原
地乎至慎苦寒而投參芪其失卒亦相等蓋卽白膠之能補
陰氣尙難投於炎焰以冀有功矧可倒行逆施以助方張之
焰乎凡此總未究於血之生化乃原於水而成於火耳惟鹿
角陽中挾至陰如人身元陽所自始卽血原於水之義也角
膠煉陰以合陽如人身元陰所由化卽血成於火之義也取
此味以完陰氣乃於血證爲能救本耳觀治尿精尿血及身半以下痠痛則知其火熱之對待也其有陰盛遏陽而患血逆者傷寒有之又有勞倦傷其衛氣致營氣不得入於經而血錯行者是乃陽之不

足可以投參芪也。若傷於陰氣，卽當屬化火而論的然不可投參芪矣。第火有虛實之分，實火者傷及後天之氣，虛火者傷及先天之氣。後天之氣乃陽中陰生，先天之氣乃陰中陽化。如先天之氣傷，固及於後天經所謂至陰虛天氣絕是已。然後天之氣原根於先天。如腎脈從肺絡心注膻中，脾脈從胃注心中，而肝脈亦絡膻中。故傷其後天之氣者必及於陽中之陰。傷其後天陽中之陰者亦累於先天之陰經。所謂至陽盛則地氣不足也。此味主勞損吐血，雖舉先後天而胥治之。但先天之陰傷虛火也，陰虛而火無所歸，經以是補之後天之陰傷本於陽以及之，實火也。清天氣之陽，乃可補地氣之陰。其先後之時殊也。若麥

節而投白膠則又誤矣

修治

取解角鋸半寸長置長流水中浸三日削去黑皮入

砂鍋內以清水浸至不露角桑柴火煮從子至戌時止旋旋

添水勿令火歇如是者三日角軟取出曬乾成霜另用無灰

酒入罐內再煎成膠陰乾待用

麋角性本甘熱更經火煉

則偏於補陽不如鹿膠之補而不僭故截角製膠須擇其小

者勿使麋角混之致藥方不精用時或炒成珠或酒化服

得火良畏大黃

鹿角霜卽鹿角煮爛成粉者膠則取所煮之汁久熬而成

者霜似枯質膠乃精液古方或各用之或合用之必其皆有

補益。但恐霜遜於膠耳。有療男子陽虛與下小便頻數同方。可知腎經氣虛者。此能益氣而強腎矣。小便頻數。鹿角霜白茯苓等分爲末。酒糊丸梧子大。每服三十丸。鹽湯下。小便不禁。上熱下寒者。鹿角霜爲末。酒糊丸梧子大。每服三四十九丸。空心溫酒下。凡病便數皆腎經氣虛。若不禁則虛更甚矣。

鹿髓

氣味甘溫

治丈夫女子傷中絕脈筋急痛 同地

黃汁煎膏服填骨髓壯筋骨補陰強陽

白蜜煮服令人有

子鹿一牡能御數牝

凡滋補藥用其脊髓和酒熬膏丸藥大妙白

飛霞法取鹿腦及猪骨髓煉成膏每一兩加煉蜜二兩煉匀

瓷器密收用和滋補丸藥

治肺虛毛悴有酥髓湯

方刪繁

鹿髓煎治肺痿欬嗽傷中脈絕用鹿髓生地黃汁

各七合酥

蜜

各一兩

杏仁桃仁去皮尖

各三兩

酒

一升

同搗取汁先煎

杏仁桃仁地黃汁減半入三味煎如餳每含一匙咽下日三

麝香

出陝西河東秦益諸州諸蠻夷中尤多形似麞麋而小食柏葉夏月多噉蛇蟲至冬香滿生陰莖前皮內別有膜袋盛之入春滿甚便自剔去是爲生香最不易得其次捕得殺取者名臍香

味苦辛氣溫通諸竅開經絡透肌骨治中風中氣中惡痰厥驚癇積聚癥瘕及婦人產難納子宮緩水臟止冷帶下殺臟腑蟲能蝕一切癰疽膿水濟生治食瓜果成積作脹者

及飲酒成消渴者以果得麝則壞酒得麝則敗也 同犀角
牛黃琥珀龍齒遠志丹砂鉛丹金箔菖蒲真珠茯神天竺黃
治心氣虛怯驚邪癲癇或夢寐紛紜鬼交鬼疰及小兒急驚
大人中惡等證 同白及白斂紅白藥子雄黃烏骨雞蝦乳
香沒藥冰片爲末傅一切癰疽疔腫有神

繆氏云諸證之屬於虛者概弗施用芳烈輕揚能泄衛氣
穿射走竄又能泄營如不得已借以開通關竅亦宜少用孕婦不宜佩帶勞性人亦
忌之不可近鼻有白蟲入腦患癲久帶其香透關令人成異
疾

辨治 取香劑中當門子撚之如血線搗之如桃花瓣燥甚

者始真然多僞造雖膜囊完固弗信但破看一片毛其在裏中者爲勝 凡使勿近火日微研不必苦細如欲細入醇酒少許則不損香氣 忌大蒜

猾

猾鼠類屬水其皮毛戟刺如針屬金見鵠則仰腹受喙火煉金其氣相制也

皮 氣味苦平有小毒 主治五痔陰蝕下血不止痔痛有

頭多年不瘥止腸毒下血療腹痛疝積並燒灰酒服之

療反胃燒灰酒服或煮汁或五味淹炙食此物開胃氣有功其字從胃深有理 治胃逆

論 犧皮之用專於大腸故療痔病爲多夫痔所受病者燥

氣爲病者濕氣也或又曰胃熱也何以明之蓋陽明燥金以其陽盛趨陰而陰氣不能與之合故爲燥人身身半以下屬地陰氣主之或因房勞勞力虛其腎陰則燥者益燥更由胃中酒食積毒歸於大腸以乘其陰虛之燥則燥隨化火以傷血是謂收氣不得職致經脈橫解濁氣汚血流注肛門其始本燥與熱合也而熱因與濕合所謂濕氣者由陽不得真陰以收既滯而爲熱卽陰不得真陽以化更滯而爲濕以故痔初起顯燥證有便濘作痛之情漸顯濕證有腫痛堅塊之患然則燥者病之本濕者病之標而熱則病於標本之中也夫熱之合於燥也爲氣傷其合於濕也爲血傷如腸中止有濕

熱止病於下血而已惟濕熱本於燥腸頭斯有堅塊至於作痛者熱因燥乘風因熱化而更畜於濕以不得達故大痛也

久之破而爲漏亦此之由耳

苦寒益用寒過劑則真陽益病而濕愈不行

方書云痔初成漸大便滯作痛者宜

潤燥及滋陰嗣如肛門下墜便血而疼痛堅硬者宜清火滲

濕或紫色疼痛大便虛閉作癢宜涼血祛風踈利濕熱又或

腫痛堅硬後重墜刺便難者外宜薰洗內宜宣利合而參之

初起之治緩而先本後此三證熱勝則腫痛濕勝則堅硬下

墜皆當急而救標本標之治節次不爽乃免穿腸潰決之患

矣猾皮於諸痔無不逐羣劑以奏功繆氏謂蝟屬水其皮得

濕圍其燥熱風之氣則潰腸以出治之宜兼破氣藥又忌過用

堅金之氣而和血於大腸故治五痔陰蝕有專功

凡食其肉當去骨誤食令人瘦劣諸節漸小

仲淳

辨治 猪蹄者良鼠脚者次取皮入藥燒灰或炙黃或炒黑
或水煮任入湯丸

鼠

牡鼠

牝者不入藥

氣味甘微溫亦曰涼

日華

煎膏治諸瘡瘻

因善穿之性而爲用

附方

鼠瘻潰爛鼠

一枚

亂髮

一雞子大

以三

歲臘猪脂煎令消盡以半塗之以半酒服神妙

鼠膽

鼠肝有七葉膽在肝之短葉閒大如黃豆正白色貼

而不垂

衛生家寶又言紅色

纔死便消不易得也

主治點目愈青盲

雀目不見物滴耳治聾

三十年老聾取活鼠一枚繫定

熱湯潑死破喉取膽用川烏頭一個

炮去皮華陰細辛二錢

膽礬

半錢

爲末以膽和勻再焙乾研細入麝香

半字

用鷺翎

管吹入耳中口含茶水日二次十日效永除根

衛生家
寶方

青

盲不見雄鼠膽鯉魚膽

各一枚

和勻滴之立效

癸水之位在子氣通於腎開竅於耳注精於瞳子其標爲齒
鼠屬子宮癸水其目夜明在卦屬艮其精在膽故膽治耳聾
青盲睛能明目而骨能生齒也

瀨

牡鼠糞

兩頭尖者

氣味甘微寒有小毒

食中誤食令人目黃成疸

主傷寒

女勞復陰易通女子月經下死胎治吹奶乳癰

方書療中

風積聚及癘風蠱毒

附方 男子陰易及女勞復猖鼠屎

十四枚 韭根一大把 水二盞煎一盞溫服得粘汗爲效未許

再服 婦人吹奶鼠屎

七粒 紅棗

七枚

去核包屎燒存性入

麝香少許溫酒調服

乳癰初起雄鼠屎

七枚

研末溫酒服

取汗卽散 乳癰已成用新濕鼠屎黃連大黃各等分爲末

以黍米粥清和塗四邊卽散

論 鼠稟至陰之氣五臟俱全其矢更由腸胃轉化而出凡

陰氣受邪者借其轉化而使之不留陰氣大虧者亦借其轉化而使之不竭是以陰易女勞復所因迥異而皆得用之他如中風積聚風濕諸方用此以導陰氣而使之化而吹奶乳

癰又皆藉陰氣之能化爲流通精血地然則觸類通之可以
盡臭腐之神奇矣

武進門生伍恂

儀徵後學汪廷儒

全校

本草述鉤元卷三十一

本草述鈎元卷三十二 人部 武進楊時泰貞頤手輯

髮

髮髮 取男子二十已來無疾患顏色紅白於頂心剪下者

氣味苦溫 主五癰關格不通治小兒驚大人瘡本經止血

悶血暈金瘡傷風 合雞子黃煎之化爲水療小兒驚熱百

病

亂髮

梳櫛下者用代髮髮

氣味苦微溫

補陰之功甚捷消瘀血丹溪

方書用治傳尸勞洩血下血淋證并前陰諸疾與痔 附方

諸膏藥內能消毒止痛長肉生肌 鼻衄血餘燒灰入

吹之立止 黃疸尿赤亂髮灰水服一錢日三服 女子漏

血亂髮洗淨燒研空心溫酒服一錢 吐血髮灰一錢米醋

二合白湯一盞調服

二錢

尿血髮灰

二錢

醋湯服

二錢

血淋苦痛

亂髮燒存性

二錢

入麝少許米飲服

半兩

大便瀉血血餘

半兩

燒灰雞冠花柏葉

各一兩

爲末卧時酒服

二錢

來早以溫酒

一盞投之一服見效

女勞黃疸用猪膏

半斤

亂髮

雞子大

三枚和煎髮消藥成矣分再服病從小便中出

破傷中風

亂髮如雞子大無油器中熬焦黑研以好酒一盞沃之入何

首烏末

二錢

灌之少頃再灌

疔腫惡瘡亂髮鼠屎等分燒

灰針入瘡內大良 瘡口不合亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存

性一錢用溫酒食前調服神妙

論

血之榮以髮

精之榮以鬚髮

屬心稟火氣而上生

鬚屬氣之榮以眉髮

水氣而下生眉屬肝稟木氣而側生男子腎

氣外行故有鬚婦寺則無鬚而眉髮不異也

丹溪謂其補陰

之功甚捷以補陰參於稟火氣而上生則所補者乃陽中之陰也夫血生於陽中之陰本其所生以上榮於髮而卽還返

於陽中故其補之之功捷然更能消瘀血者以此味之補非益其所本無乃還其所本有不凌節不造次故補卽爲行耳人身氣血生與化其機合而有之卽丹溪云捷亦屬强名也本經首主五癃關格其義奚若蓋水與血是二是一以補爲行復何疑於水道之利乎至治小兒驚大人痘與補陽中之陰義正相合

驚與痘皆由陽中陰虛

卽血悶血暈金瘡傷風等治病機

亦不越於陽中陰虛其微義可類參也

繆氏云經熬煅後氣味不佳胃弱者勿宜

修治 取無病人髮不拘人已新剪舊落或童男胎髮並好用皂角水洗淨入罐內燒存性用入外科藥煎膏用

人屎

氣味苦寒 治時行大熱狂走解諸熱毒療反胃惟結熱者及痘

瘡黑陷傳癰腫發背瘡漏新者封疔腫一日根爛

人中黃

卽多年廁坑中甄上所凝結黃漿也

性治約與人屎同解胃家熱毒

又法臘月截淡竹一段去青留上下二節上節發竅納大甘草於中以木塞上竅插浸下節一頭於糞中經月取出曬

乾待用除瘟疫熱
毒宜用此

糞清俗名
金汁

取法寒冬月將竹籜閣盆上用櫻皮綿紙鋪籜

底上鋪黃土五寸澆糞汁淋土上濾取清汁入新甕內碗覆口埋土中一年取出清若泉水全無穢氣年久者彌佳比竹筒滲進法更妙 苦寒能除辛熱解諸毒治時行大熱狂走痘瘡紫黑乾枯陰虛燥
熱尤宜傳一切熱毒癰腫瘡漏

金汁濁陰歸下有降無升入土既久去濁留清身中諸火逆上仍用身中降火之品治之此亦竹破還將竹補法也士材

附方 热病狂走如見鬼神久不得汗及不知人事者人中黃入大罐內用泥固濟煅半日去火毒研末新汲水服三錢

未退再服 大熱狂渴乾陳人屎爲末於陰地淨黃土中作
五六寸小坑將末三兩匙置坑中以新汲水調勻良久證清
與飲卽解世俗謂之地清 噘膈反胃諸藥不效真阿魏一
錢野外乾人屎三錢爲末五更以薑片蘸食能起死人 蟲
毒百毒及諸熱毒時氣熱病口鼻出血用人屎尖七枚燒灰
水調頓服溫覆取汗卽愈神驗 諸毒猝惡熱悶欲死者新
糞汁水和服或乾者燒末漬汁飲名破棺湯 凡熱毒傷人
臟腑卽解以臟腑所轉化之苦寒較他藥自更親切而善於
脫化也

人屎

名還元湯 輪迴酒

取十二歲以下童子者。膀胱無龍火也。先禁食五辛熱物多與米飲以助水道。法當熟飮於中。尚存真氣其行自速。冷則惟存鹹味寒性矣。

氣味鹹寒。滋陰降火。肺腎有火者所必須治勞熱骨蒸欬嗽鼻洪吐衄瘍熱狂及中暎。產後敗血攻心。血暈悶絕並撲損瘀血。

人喉有竅則欬血殺人喉不停物毫髮必欬血既滲入愈滲愈欬愈欬愈滲。惟飲洩溺則百不一死。若服寒涼則百不一

生。諸諸虛吐衄咯血惟用童便每一盞入薑汁或韭汁少

許徐徐服之日進二三服自效寒天則重湯溫服不徒降火且消瘀血。凡產後溫飲一盃可免血暈至三日後止之。

同澤蘭荆芥白芷續斷延胡牛膝蘇木黑豆治產後血暈虛者加人參 同枇杷葉天冬麥冬蘇子桑皮沙參五味生地欵冬百部治陰虛咳嗽聲啞喉間血腥氣 同蘇木番降香續斷牛膝丹皮蒲黃治內傷吐血或瘀血停留作痛 久嗽涕唾肺痿時時寒熱頰赤氣急用童便去頭尾少許五合取大粉甘草一寸四破浸之露一宿去甘草平旦頓服或同甘草末一錢服亦可一日一劑 折傷跌撲童便入少酒飲之推陳致新其功甚大凡一切傷損不問壯弱及有無瘀血俱宜服此若脇脹作痛或發熱煩燥口渴惟服此一甌勝似他藥萬無一失軍中屢試有驗 赤目腫痛自己小便乘熱抹

洗卽閉目少頃此以真氣退去邪熱也

論 人溺滋陰降火世多未悉其所以然夫欲究人身之水化當先明於氣化次明於血化而氣化血化之元機總不外升降勿失其職清濁無或相干耳所謂水化者坎水氣也兌澤形也一陽陷於二陰爲坎坎以水氣潛行地中爲萬物受命之根本一陰徹於二陽爲兌兌以有形之水普施於萬物之上爲資生之利澤是水化之說也氣化者三焦爲元氣之使乃水中之火根於腎際於肺升降於脾故下焦治在腎中焦治在脾上焦治在肺合之經云少陽屬腎腎上連肺又云二陰至肺其氣歸膀胱外連脾胃則可以思氣化之所至更

合於經云三焦者中瀆之府也水道出焉則可以思水化氣化之無二矣血化者血生於心化於胃統於脾藏於肝歸於血海此可以思血化之所至更合於經云肺之濁氣下注於經內積於海更可以思氣化之所至卽血化之所至矣再所云升降不失其職清濁無或相干者蓋清濁卽陰陽之別名如氣根於腎腎至陰也而陽生焉陽主升者也不升則清陷於濁中並陰不得化矣血生於心心太陽也而陰化焉陰主降者也不降則濁亂於清中並陽不得布矣人身止是水火合化以爲氣血而心腎卽水火之匡廓水火之互根互宅乃先天合一之神機第人生以後全賴後天以完先天所謂脾胃

司升降之樞者。正爲其藉此以合於先天神機耳。試以人氣之清濁言之。經曰受穀者濁。受氣者清。清者注陰。濁者注陽。此陰陽以臟腑言也。又曰濁而清者上出於咽。清而濁者則下行清濁相干。是謂亂氣。又曰氣之大別。清者上注於肺。濁者下走於胃。胃之清氣上出於口。肺之濁氣下注於經。內積於海。此言清濁原非判然爲兩。惟是濁中元有清。而卽於濁中升其清者。俾上行以達天。清中元有濁。而卽於清中降其濁者。俾下行以至地。此後天氣血不離胃肺爲之爐冶也。

水化而氣化。由氣化而血化。此手少陽三焦爲主。卽俾陽之中陰降而陽隨之。由血化而氣化。由氣化而水化。此手太陽小腸爲主。惟胃肺乃升降濁之地。卽裕有滋陰降火之神。蓋陽

升而陰隨者是謂滋陰陰降而陽歸者是謂降火其大爐冶已具於此卽下而便溺之出舉不越此矣。腎脈至於肺而少陽屬腎是少陽亦至於肺也。第陽必藉脾胃水穀之陰以至肺而脾胃亦藉少陽之氣以上達其陰於肺然後能通天氣通天者生之本故陽化而陰生焉是經所謂雲霧精而後上應白露下也經曰傷肺者脾氣不守胃氣不清經氣不爲使是卽雲霧不精而上應白露不下也蓋三焦元氣因脾胃受穀氣以泌糟粕蒸津液而清氣上注於肺者此地氣上爲雲也肺中之清氣因脾胃穀氣所注還下其濁於胃以致津液變化爲血營衛通而糟粕以次傳下者此天氣下爲雨也。

然升降必由中土始之終之皆不離於陰也統繹斯義則可
明於坎水爲始兌水爲終而三焦爲水穀道路氣之所終始矣
抑便溺皆從氣化經云胃大腸小腸三焦膀胱此五者

天氣之所生也

其氣象天故瀉而不藏

此受五臟濁氣故瀉而不藏與

經所云諸陽皆濁之義合何以又云手太陽獨受陽之濁乎

曰心與小腸爲表裏心爲火主氣固火之靈也第心實主血

而小腸爲心氣化之府必其血化行而後氣化乃達於極下

血化行者津液和調變化而赤爲血也氣化下達者
穀氣津液已行營衛大通乃化糟粕以次傳下也

若是則

手太陽獨領氣化而卽神於血化舉下而大腸膀胱無不承

其氣中之血化以傳道焉經故謂其獨受陽之濁也夫小腸

經脈上會諸陽於督下會諸陽於任則豈非上而承陽以司
心之氣化下而接陰以通腎之血化者乎內經謂手少陽之
正指天由陰而升陽 手太陽之正指地由陽而降陰 陽升而陰固隨之
陰降而陽亦歸之是氣化血化水化斯二經可思也然則小
腸豈可止以受盛盡之又豈止膀胱爲津液之藏氣化則能
出乎哉 便溺之下固爲糟粕然其歸於大腸膀胱者足以
徵陰之下降而陰之下降卽以徵陽之下歸於元也經故曰
視病必求其下又云出入廢則神機化滅升降息則氣立孤
危然則人身便溺其可忽乎哉 氣血與便溺之相分在上
中二焦本於陰而化於陽至便溺之相分則在中下二焦化

於陽而分於陰故任之水分穴分別清濁以出焉

繆氏云其性稍寒不利於脾胃虛寒溏瀉及陽虛無火食不消者

溺白塗

卽人中白便溺澄結所成又藉塵埃沒溺所集也物入陰中色剝爲白陰中之陰矣入手太陰肺足太陰脾因精與氣原從肺脾氣化之中遊溢轉輸是以仍歸脾胃也

氣味鹹平而涼 治鼻衄傳尸熱勞肺痿心膈熱羸瘦渴疾及膚出汗血並口齒生瘡走馬牙疳 能瀉肝火三焦火並膀胱火從小便中出行其故道 同鰻魚食之爲烏龍丹 大衄

久衄及諸竅出血並用人中白一兩如雞子大綿五兩燒研
每服二錢溫水服 鼻衄五七日不住及膚出汗血者並用
人中白新瓦煩乾入麝香少許溫酒調服立效 痘瘡倒陷
臘月收人中白火煅爲末溫水服三錢陷者自出 走馬牙
疳取下溺盆內白屑入瓷瓶鹽泥固濟煅紅研末入麝香少
許貼之又用婦人尿桶中白垢火煅一錢銅綠三分麝香二
分和勻貼之尤神 鼻中瘻肉人中白瓦焙每溫湯服一錢
口舌生瘡溺桶近七分枯礬三分研勻有涎拭去數次卽
愈

論 人溺主治之義已悉於前矣。溺之與白近原是一物。但

經言外徑

溺則經達下而不留。自近性稍留於肺所生病可徐而致其功。故用之微有異。經曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾。脾氣散精上歸於肺。通調水道下輸膀胱。是飲之精氣由胃而脾由脾而肺以達其清陽於上。卽少陽屬腎。腎上連肺之義。陰中之陽致於上。則陽中之陰達於下。故能化血歸經。經所謂肺之濁氣下注於經也。血化歸經。是謂營氣。是乃謂之通調水道也。後天之水皆根氣化。氣固肺所主。而氣化之能通調水道者。以其清陽之能化。而濁陰之化乃行。則凡濁陰不化如血證當首及。而更於治肺爲切當。亦亟治止。血證皆就清陽之能化以化濁陰耳。卽痘瘡倒陷。及清陽之不化以

致病於濁陰者。若止以鹹能入血而散爲言。則亦不究其本矣。

修治 壽久溺器有厚寸餘者。取置瓷盤內。露高潔處。越一二載。中外皆白。絕無臭氣。乃可用。研極細。水飛數過。再研。萬匝。如仍有惡臭。隨泡隨飛。約數百遍。以無臭爲度。煅淬者。精粹盡失。轉增火毒。不堪用。

秋石

製煉法。秋月用人尿二三石。入鍋內。桑火緩煎。勿使鍋岸生近。有則竹刀掠下。或沸泛以竹枝頻攬定。俟乾。或宜去薪緩火焙燥分置陽城罐上空二寸許磁盞蓋封固罐口養火一

周其藥漸升輕盈如雪或成五色或象物形此屬上乘宜密貯銀瓶藏陰靜處不則風化成水復須升養仍結如霜但少堅實耳之頤又製既濟元黍法選端潔童男女各認溺器各陸續取溺煎煉成滓各升取上乘秋石各取溺器白近曬焙令乾先置女近於銀釜之底次置男秋石於女近之上次置女秋石於男秋石之上次置男近於女秋石之上安置定上餘二寸六一泥封固三方火溫養七日則粒粒丹紅交結釜頂此更屬無上乘藏貯亦如秋石法

氣味鹹溫滋腎水養丹田返本還元歸根復命安五臟潤二焦消痰欬退骨蒸軟堅塊明目清心延年益壽

論 難經曰三焦者水穀之道路氣之所終始也然內經謂三焦爲水府而腎屬水膀胱行水與腎合故又曰三焦者足少陰太陽之所將然則小水之出也固根於氣化然實爲氣之所終由陽而歸陰以出也原其所始固亦本於至陰氣者水所生第氣之所終由陽歸於陰者較氣之所始由陰達於陽者爲何如哉是以人溺雖降火有功還以較於秋石從水之降而轉爲火之升之頤謂緣潤下水藉火大既濟而允升自秋石尤有滋益矣試觀養火一周則其藥漸生輕盈如雪視洩溺竟何如乎此藥要常近火或時復養火三五日則功效更大

人乳

味甘鹹氣平涼無定性

其人和平飲食冲淡其乳必平其人暴躁飲酒食辛或有火病其乳必熱

榮五臟明眼目安養神魂滑利關格

治瘦悴澤皮膚並筋

攀骨痠腸胃秘滯

又能益心氣補腦髓止消渴治風火證

養老尤宜

又治痰火上升虛損之證及中風不語左癱右

緩手足疼痛動履不便飲食少進諸證

攝生
衆妙

地黃當歸草

木之流得天地偏氣用治血病力固有餘用補血衰力猶未

及不如頻服人乳匪但補血且病因血成者亦由調養滋達

而自愈 入四物湯共補精血入四君子同益元陽 月經

不通日飲人乳三合 猝不得語人乳半合美酒半升和服

失音不語人乳竹瀝各二合溫服 虛損勞瘵用無病婦

人乳三酒盃將磁碟曬極熱置乳於中次入麝香末少許木
香末二分調勻服後飲濃茶一酒盞卽陽敗次日服接命丹
方用乳三酒盃如前曬碟盛乳并人胞末一具調服服畢面
膝俱赤如醉思睡只以白粥少少養之 眼熱赤腫人乳半
合古銅錢十文銅器中磨令變色稀稠煎成瓶收日點數次
或以乳浸黃連蒸熟洗之

論 乳汁由血所化故滋血者還以乳夫婦人之乳資以衝
脈因衝與胃經通故也衝爲血海而胃爲血液化生之府安
得不責其本乎凡男子以氣爲主究氣之所生所生者腎也
女子以血爲主則當究血之所生所生者心也血赤火也女

子之乳白男子之精亦白皆從金也女子氣盛合於心包絡
血卽就血所生處而化乳男子氣盛合於衝脈之血卽就氣
所生處而化精乳與精俱從血化而血化俱由於氣但分上下者分於血與氣所生之處也化不離生生亦不離化上之血生爲氣化下之精生爲血化耳但男女之化乳化精者皆不離於

脾胃以其爲升降鼓煽運化精微之地也然則乳汁固不徒
少陰血主之所化實由肺胃氣化之所成矣第血化之乳化
原固在氣一離乳房則徒存陰質而氣化已散故取以療病
者必審病之所宜如血虛有熱燥渴枯涸乃其的對卽用以
培養者亦必審體之所宜如質瘦無痰臟陽胃強乃見資益
不則槩投止以取累耳至方書謂宜於虛火及中風證夫虛

火類有燥痰而風證之屬陰虛者亦不能攝痰歸元卽此宜投之證猶當爲乳汁地以佐使爲功可也

屬陰性冷若臟寒滑泄及胃弱脾虛者並不宜服

仲淳

修治 凡服須熱飲欲使流行經絡加醇酒調若曬曝爲粉入藥尤佳 曬乳粉法遇有乳汁卽下銀鍋煎成膏用大磁盤盛日下曬之必以水浸盤下不則久曬不乾此乃未濟之妙也

紅鉛

此童女首經內含至藥如不可得卽未經殘破女子者亦堪服食 采服家擇貌好端潔處子生辰在仲秋者

稟太陰金水之一炁

俟其蒸變已足黃道已歸采取合宜服之能接延壽命卽女子未經殘破或生辰在四季餘月者如法取服亦堪却病

氣味鹹平 主治男婦氣血衰弱痰火上升虛損左癱右瘓中風不語肢體疼痛飲食少進女子經閉等證服之神效與河車人乳皆以人補人之品然須緩心和氣人可用

論 素問謂月經爲天癸指最初之精氣也女子二七天癸

至任脈通太衝脈盛月事以時下夫天謂太一之天眞太一

之氣升而爲壬降而爲癸

此卽天一生水之義 第壬陽而癸陰耳

女子坤道屬

陰故以天眞之元氣專屬癸也人身陰陽與天地合月盈則虧常以三旬爲期女子屬陰故象之 男女眞陰俱稱天癸

第女子任脈通大衝脈盛月事以時下夫男女之脈在衝任無二也何以女子月事獨屬衝任而言哉蓋衝任皆起於胞中若女子胞固所謂藏而不瀉者胞居兩腎之間出納腎臟之精血以行坤土之化坤土不自司其職司其職者乃衝任二脈所以二脈於女子生化之元更爲關切就二脈中任爲陰脈之海而衝屬陰中之陽又爲任行其化者夫先天乾坤之位後天以坎離代居之乾主闢坤主闔而闔闢實互爲根以致其用此離中有坎坎中有離之義也坎水屬坤之用故曰水土合德離火屬乾之用故曰火金合德坎離而致乾坤之用不惟水火互藏卽闔闢亦已互運也有如男子屬陽而

陽中之陰以陽爲主還歸於陰之靜者以厚其氣是由闡有闡之義

故二八腎氣盛天癸至其能化血爲精者正由氣之盛也女子屬陰而陰中之陽以陰爲主不能化血但卽乘於陽之動者以運其血是由闡有闡之義故二七天癸至月事以時下又能化

血爲乳者以切近於肺胃之陽也卽此參之則月事之下正至陰根於至陽而其盈虧之數有與天之太陰符合而不爽者內經又云女子月事不來者胞脈閉也由於心氣不得下更云胞脈者屬心而絡於胞中又云前有廣明後有大衝凡此皆陰根於陽之的證至於腎夾任脈從陽交貫肝經藏血之室統會胃經生血之源乃男女之所同然又不必言矣

一法用紅鉛

三兩

先以陽起石

四兩

研細置銀釜之底次置

紅鉛於陽起之上封固溫養七日後丹生其中色如桃花僅得百釐每用一釐重綿裹護子寅二時納左鼻孔行數百息

卽隨息入腦盡此百釐爲返老還童長生不死之至寶

欲識神異

以死人脛骨鑊一小孔置數釐於孔內仍埋土中過宿起視枯骨如生或置分許於盞盤內覆盞盆於丹上水和麥麪封固其口四圍緩火炙之至麥麪焦黑俟冷開視其丹盡滲盞內擊碎其砂都成丹色仍以盞研細入盞溫養丹復提出毫末不減

天眞接命丹用無病室女月經

首行者爲最二次者爲中四五次爲下如

急用但未點者俱可先打鉛具如黃衣月牙冠俟經信動卽以此具騎

置胯下用絹幅兜住接取入磁器中再取俟經將衰已過大半而止澄底如硃砂子乃真母氣其面上黃色浮者挹去却

用白雲苓極細淨末熟水浮去木屑取沉底曬乾搗入紅鉛
中如和麴然多寡軟硬以意消息打作薄薄餅子陰乾待用
不可犯鐵旣乾研末以麻黃洗淨濃煎濾汁和丸如綠豆大
以真辰砂飛過爲衣銀罐盛之黃蠟封口每服三四十丸靜
坐無風處見微汗爲驗藥性流行充溢四肢經絡皮毛之間
如發熱躁渴此元氣虛藥性到也須服乳汁數盞止之服後
三日內蔬食勿食油膩此藥進二三次或越三五年又進二
三次立見氣力煥發精神異常草木千百不如此藥一二緣
采於人身非若金石一切藥物有偏勝之害功力到處自然
外邪不侵內神愈旺養生者宜加珍重

顧惠岩宗伯采服法

至藥歌 先積陰功貯世間後選賢良美少年五千四十莫遲延緊看印堂光潤鮮至藥初生五彩形霞光萬道繞眉生唇如血珀目瞳瑩五心煩熱藥將盈緊守真金五七九鼎分厚薄先天有石榴火棗日輪紅一日一粒週天可首男乳服最相宜閉目澄心妄念除靜室焚香守齋戒防危慮險要扶持切忌腥羶戒淫愛時時退火身康泰旁門栽接不爲奇惟有此方功力大

進藥歌 微哉一點落丹田攢動身中天地旋衝開夾脊過三關一氣氤氳布腎間汗從頭面淋胷前頭重足蒸達涌泉

趕出真陽足底升衝過元宮至頂門入骨穿皮處處尋思量
往日六淫侵得遇元陽總是春取坎填離第一乘功隙立地
災殃生服時七日暉如醒只宜安睡莫動行三食薄粥淡明
心二七安然始出庭

接藥法 取猪尿泡一個制度極淨用軟鐵線圈起口來如
碾槽樣繫帶二條兜住候至景象現方用追攝法取藥此藥
屬陽奇數上等鼎器九粒中等七粒下等五粒取下藥不可
與孝服女尼猫鼠見之

分藥訣 勿以漆器盛之銀甕二器可用得時急以真童便
一甕傾入雙手捧起旋轉不定童便與經俱挹出少停其藥

沉淀在底不動銀匙取起收貯聽用內水銀四兩薄荷葉洗淨待乾蓋於藥上四季通用水銀塵穢不染

服藥訣 此藥取出異香爲上每至子丑寅三時可進用乳一酒盃入藥一粒先用乳香嫩口淨後乃捧起吞之閉目靜坐片時但丹田火熱五心煩躁渾身微汗病者有大汗腹中如雷鳴身上如蟲行弗得驚異乃此藥靈驗也煩渴須服乳數盃五六度以退火煩渴卽解此藥一進人事昏沉身體重墜要人扶持切勿動念勞碌次日依法又進一次

擇乳訣 必擇二十上下初生男乳母其乳雪白如銀香濃者爲上先預備乳母然後服藥如乳稀黃腥穢此婦有病不

可用

驗藥訣 鼎器有厚薄十四歲乃仙方所謂五千四十開黃庭是也氣厚者十三歲卽至氣薄者十五六始至但是先天不分遲早三十時中計取紅鉛不前不後看歌中景象天機妙用卽是藥候有何難哉凡人得一度服者可延七七之壽
非人勿授

古法五千四十八日如得年月日符應者乃真正至寶爲接命之上藥如前後不等只作得首鉛初次金鉛二次紅鉛三次以後皆屬後天紅鉛
只宜配合藥用不宜單服食

製首經至寶法 將取的五千四十八日真正初經或器或帛以一盃新鮮童便洗下對清水十盞磬一錢攬百十轉澄

定漏去水再換清水十盞仍打澄清漏去水淨加首生男嬌乳一鍾同入金器內綏糊三四遭放日中曬三日或用泥封口入灰缸內小火養三日取出爲末再用乳熬膏子爲丸一個鼎器分作九丸或十五丸辰砂爲衣擇甲子庚申日清靜身心於子時更衣焚香服三丸以無灰酒或乳送下服後存神定意坐寄如覺身熱取頭生乳一鍾服下靜坐卽解

製靈鉛法

靈鉛卽所云前後不等年月日不能應時者只作首鉛金鉛紅鉛以爲服食之用也

其法

或器或帛將鉛取下量多少用燒酒一大盞洗下旋轉百遭置靜處待酒澄清慢慢漏去酒存住紅鉛加酒一盞仍打轉澄清漏去酒始加清水逐去酒味待水清漏水盡將鉛傾入

大瓷盤內曬乾

其鉛胎色不變如牛黃樣
不泄元靈之炁者爲佳

用金乳粉配合成

丸丹每日五更酒服五分自覺身輕體健效不可述

丹書云
先補炁

後補血補得丹田溫溫熱上至頂門泥丸宮下至脚板涌泉穴一身四大俱補通致使精神無露泄誠哉是言也

製金乳粉法

先擇美鼎看嬰童肥白有精神者此是氣血

盛而乳可用亦須頭生年方二八三七纔可取下一盃或半

盃對露水均平攢百遭過夜其乳自分撇去水將乳入磁盤

曬乾研細成粉積得半斤聽用

月經衣 治熱病勞復女勞黃疸霍亂困篤小兒驚癇 附

方 勞復丈夫熱病後交接病發卵忽縮入腸痛欲死燒女人月經赤衣爲末熟水服方寸匕卽定 女疽氣短聲沉用

女人月經和血衣燒灰酒服方寸匕 霍亂百方不效者用
童女月經衣和血燒灰酒服方寸匕 驚癇發熱取月候血
和青黛水調服一錢入口卽瘥量兒加減

人胞

一名河車其色有紅有綠有紫紫者良 置酒內覆者男胎
也首胎重十五兩以上

氣味甘鹹溫 主治男女一切虛損勞極其形質得男女坎
陽兩虛者服之有離之氣而成故陰
反本還元之功 癲癇失志恍惚安心養血益氣補精 凡
虛勞羸瘦形臟化薄者宜以人身之本元補助人身之血氣
投之女子更育胎孕凡無子或多生女或難產小產者服之

無不捷效 以側柏葉烏藥葉俱酒灑九蒸九曝同之爲丸

大能補益名補腎丸

丹溪

大造丸

吳球

用首生男胎人胞米消

洗淨淡酒蒸熟搗曬研末敗龜板童便浸三日酥炙黃

二兩

黃檗杜仲

各一兩半

牛膝

一兩二錢

地黃

二兩半

入砂仁

六

錢白茯苓

二兩

絹袋盛入瓦罐酒煮七次去茯苓砂仁不用

杵地黃爲膏聽用天冬麥冬人參

各一兩二錢

夏月加五味

子七錢俱忌鐵器爲細末地黃膏加酒米糊丸小豆大每服

八十九丸空心鹽湯下女人去龜板加當歸

二兩

以乳煮糊

爲丸若男子遺精女人漏下並加牡蠣粉

一兩

去人參

世醫用陽

藥補益往往爲害蓋邪火只能動慾不能生物龜板黃檗爲河車之佐加以杜仲牛膝通爲足少陰經藥古方加陳皮卽

名補腎丸也地黃涼血滋陰得茯苓砂仁黃檗則走少陰白
飛霞以此爲天一生水丸也二冬保肺不爲火炎使肺氣下
行生水然其性有降無升得人參則鼓動元氣有升有降故
同地黃卽爲固本丸也又參麥五味名生脈散皆爲肺藥此
方配合大抵以金水二臟爲生化之原加河車以成大造之功也

補天大造丸專培元氣

延年益嗣壯陽光溫坎水降離火爲天地交泰若房勞過度
人五心煩熱服之神效常人四十以後常宜服此接補真元
以躋上壽

紫河車一具

取首生男胎者如無得壯盛婦人

者亦好先用鮮米泔將河車輕輕擺開換米泔洗五次不動
筋膜只洗淨有草屑輕輕取去將竹器盛於長流水中浸一
刻以取生氣提回小瓦盆盛於木甑內用文火緩緩蒸至六
時止極爛如糊取出先傾自然汁在藥末內略和勻後置河

車石臼內木杵搗千下如糊樣通前藥汁末和勻再杵千餘集衆手爲丸此法全天元真氣世所少知若用火焙酒煮去

筋膜大誤入龜板尤誤

此語必有所見
不用便爲穩妥

外用厚川黃檗去粗

皮酒炒

一兩川杜仲去粗皮酥炙斷絲

一兩五錢川牛膝去

蘆酒浸

一兩五錢當歸身酒洗

一兩懷熟地酒蒸九次

二兩

天冬去皮心

一兩半懷生地酒浸

一兩半枸杞

一兩麥冬

一兩白术

兩五錢已上四味另用酒煮爛搗膏陳皮去白

七錢半

七錢小茴香炒

七錢乾薑炮黑

一錢側柏葉

炒

一兩五味子

七錢

小茴香炒

七錢乾薑炮黑

一錢側柏葉

取嫩枝隔紙炒乾

二兩骨熱加丹皮地骨皮皆去以知母酒

炒

各一兩血虛加當歸地黃倍用氣虛加入參黃芪蜜炙

各一兩

一兩婦人去黃檗加川芎香附條芩俱酒炒各一兩

上藥精

製稱淨末不犯鐵器用前蒸河車搗爛并汁和爲丸若河車

肥大量加藥末不必用蜜丸如梧子大每服百丸空心米湯

下有病一日二服

此比古方更效若稟氣虛或斬喪太過太早者尤宜

種子三益膏

治斬喪真元中年無子婦人血虛不孕製一料夫婦齊服服

盡卽孕

如婦人經准氣血壯而無病者不宜服

大肉蔻蓉

酒洗去浮甲

何首烏

用竹刀切黑豆上九蒸九曬

懷生地

切片酒拌九蒸九曬

山

萸肉枸杞子沙苑蒺藜

真者炒香

菟絲子

酒浸一宿搗成餅

曬乾炒

杜仲

去皮鹽酒炒斷絲

麥冬

各四兩

柏子仁白茯苓

人乳拌曬

補骨脂

鹽水炒

川牛膝

與何首烏同蒸各二兩

以

上藥取淨末用鮮紫河車一具頭胎者佳白酒洗淨隔瓶煮爛搗和前末加龜膠鹿角膠各八兩以酒化開同前藥和勻

如乾加蜜爲丸如梧子大每服三錢好酒下氣虛加人參二

兩忌葱蒜蘿蔔煎燙等物合時宜二三九十月淨室精修弗

令婦人雞犬見之心血不足用胞衣焙乾爲末飯爲丸如

小豆大辰砂爲衣每用二錢清米湯下

經云胞脈者屬心而絡於胞中則以此味

補心血誠爲中肯夫胞爲男子藏精女子畜血之地又屬命門之真氣所攝人生命門既成卽生心心與命門一氣即可知其又補

心氣矣

論 經云命門者男子藏精女子繫胞卽此胞也其元始自

心下系貫七節之旁其系則屈曲下行接兩腎之系

兩腎之系接心

下系以繫胞故經曰胞之絡繫於

於

又曰胞脈者屬心而絡於胞中

下

尾閨附腎腸之右通三

路

陰之間前與膀胱下口洩溺處並行而出乃精氣所泄之道
路若女子則子戶胞門亦自腎腸之右胞外與膀胱下口相
並此受胎處也又脈經以右腎爲命門其府則胞門子戶介
賓曰子戶胞門男女之通稱也特男子以藏精女子以蓄血
男女交會之際男子施由此出女子攝由此入故卽在此中
結胎胎元旣足亦復由此而出爾夫腎中之元陽卽爲命門
原與臍對而胞宮子戶乃在腎腸之前膀胱之後者固經所
謂相火之下水氣承之也

木是三才之祖

精爲元氣之根

人身一點元靈聚於臍下自爲呼吸呼則接乎天根吸則接乎地根此卽命門

真氣自有命門真氣便且上際下蟠況於最初之合同而化者乎又按天一生水配丁之陰火而生內爲命門然後生心是則心與命門一氣也經旣云胞脈屬心又安能外於命門乎然則女子結胎在胞宮而實受氣於命門方胎孕時兒之臍繫於胞胞繫母脊實爲督之命門以氣食兒呼吸胎息轆轤任督真元氣之所鍾也其色紅黑相間紅屬火爲陽黑屬水爲陰陰陽兩氣並具而不雜可知是物雖成後天之形實稟先天之氣但兒在母腹則形充於氣兒離母腹則氣盡於形之願故謂先天之郛廓主培後天形臟而丹溪謂氣虛則加氣藥血虛則加血藥誠善於用河車者也

繆氏云此補陰陽兩虛之藥若陰虛精涸水不制火發爲熱
嗽吐血骨蒸盜汗等證此屬陽盛陰虛法當壯水以制之不
宜陰陽並補以耗將竭之陰也胃火齒痛亦忌之

修治 最好如補天大造丸製法惟取極爛如糊然必得河車時恰
有諸藥合之乃可若欲預製待用宜照前法蒸以熟爲度不
必極爛便置銅鑊內重湯煥乾可也此不用酒煮火焙又可
留貯亦妙

胞衣水

此久埋地下化爲水者 氣味辛涼 治小兒丹毒諸熱毒
發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮監虛痞等證天行熱病

飲之立效 反胃久病飲一鍾當有蟲出

繆氏云埋久得地中陰氣其氣必寒辛寒而走足陽明經故
主如上諸證

坎炁

卽初生臍帶 胎在母腹臍連於胞胎息隨母故臍者人之

命蒂也

以其當心腎之中前直神闕後直命門故謂之臍言齊也

臍蒂乃真氣聚會之所

今世卽以食兒用解胎中一切毒及免驚風痘患亦取裨補

眞元耳

附方

預解痘毒兒生十三日以本身剪下臍帶

燒灰乳汁調服或入砂少許可解胎毒

本草述鉤元卷三十二終

武進門生伍恂
儀徵後學汪廷儒
仝校