

卷十四



浙江圖書館



浙江圖書館

醫學綱目卷之十四

肝膽部

脇痛

脇泄 氣逆

附 痰腫

肝實則脇痛善怒

丹肝木氣

肝火盛而脇痛者當歸龍薈丸

肝火盛故也

藥龍薈丸方見治法門肝也

脇痛甚者用生姜自然汁吞下龍薈丸肝火盛故也

經云肝氣實則怒又云肝病者兩脇下痛引少腹善

怒龍薈丸治肝實脇痛其人氣壯者善怒者是也甚

則用姜汁吞下者經云風木淫勝治以辛涼是也

壽四即右脇痛小便赤少脈小弦不數此內有陳久積

痰飲目外為風寒所遏不得宣散所以作痛與龍薈丸

三十五粒保和丸三十粒細嚼姜片以熱湯下之服後



脇痛已安小便尚赤少再與

白朮 三升

芍藥 各二升

木通 一升半

条芩 一升

甘梢 半升

陳皮

姜三片煎熱飲之

婦人脾痛帶脇痛口微干問已多年時尚秋熱二陳湯

加川芎干 葛青皮木通下芩薈丸二十粒

章宅張郎氣痛自右氣時作時止脉沉而弦小飲時有

赤色吞酸喜嘔出食此濕痰脾肺間所肝喜之小柴胡

湯去黃芩加川芎白朮木通芍藥滑石生薑煎湯下保

和丸三十五粒

婦人氣痛

脇胸背皆痛口干

青皮

半夏五分

白朮

黃芩

芍藥三分

木通半斤

陳皮

桔梗三分

炙甘草

分六帖並執服

脇下有積食一條扣起用茱萸炒黃連

本事治因驚傷肝脇骨裏疼痛不已桂枝散

枳殼

一升小者

桂枝半斤

右細末每服二分姜枣調下

潔勻氣散治脇痛

山梔

熟地黃

浙茯苓

細辛

桂

川芎各等分

右為末羊脂並服

本事治脇下疼痛不可忍煎治脚弱芎藭湯

川芎 干葛 桂枝 細辛 枳殼

人參 芍藥 麻黃 防風各半 甘草

右麤末每服五分水二盞生姜三片同煎至七分去滓

溫服日三服有汗避風

治脇下風氣作塊寒疝發則連少腹痛撲心其積厲肝

在右脇下故病發則右邊手足頭面昏痛不思飲食以頭

干葛 一升 麻黃 三分 側子 一个 川芎 防風

當歸 枳實 芍藥 桂枝 羌活

甘草 各四分

右麤末每服一盞半生姜三片同煎至七分去

查通口服 四服有汗避風

治脇痛如前黃去手足枯悴薏苡仁丸

薏苡仁 一升

石斛 三分

附子 半升

牛膝

生地黄 各等

細辛

人參

枳殼

柏子仁

川芎

當歸

各半升

甘草

書

枳仁 各一升

右細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸酒吞下空心

食前日三服丸子可食前黃散食後相並服為佳

治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊腰脚重滯兩

股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊屬攣急此藥大

治脇痛枳殼煮散

枳殼

細辛

桔梗

防風

川芎 各四升

葛根 一升半
甘草 二升

右粗末每服四升水一盞半姜棗同煎至七分去滓空
心食前温服

寒实 热实
右肝虚脇痛经所谓木不及病中清眩脇痛是也中
清谓中有寒也热实脇痛当归龍薈丸是也

仲脇下偏痛发热其脉弦紧此寒也以温药下之宜大黄
附子湯

大黄 三升

附子 三枚炮

细辛 二升

右三味以水五升煎取二升分温三服若强人煎取二
升半分温三服後如人行四五里进一服

垣神保丸治

痛腹痛、腎气脇下痛大便不通气

噎宿食不

木香

二分半

胡椒

二分

巴豆

十枚去皮心膜研

干蝎七枚

右四味為末湯浸蒸餅為丸麻子大朱砂為衣用三分
每服五丸心痛柿蒂灯心湯下腹痛柿蒂湯煨姜湯
下血痛炒姜醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通
蜜湯調檳榔末一分下氣噎木香湯下宿食不消茶酒
漿飲任下○許學士云沈存中良方載頃在建康醫者
王琪言諸氣唯膀胱脇下痛最難治謂神保丸能治之
熙寧中病項筋痛諸醫皆作風治之數月不羸乃流入
背齋久之又注右臂攣痛甚若憶琪語有此一証乃合
服之一服而差再服又一服差神効

積痰滯

潔者黃丸治脇下痞癰痛如神方見內傷飲食

丹控涎丹治一身氣痛及脇走痛挾死血加桃仁泥丸

脇痛有痰流注二陳加南星川芎蒼朮實者控涎丹下之

本事治男子兩脇疼痛枳實散

枳實 一升 白芍藥 炒黃 雀腦芎 人參各半升

右細末姜棗湯調二升酒亦得食前日三服

垣調中順氣丸治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香 一升 白豆蔻 去壳 一升 青皮 炒一 升 京三稜 炮一 升 陳皮 一升

大腹子 二升 半夏 湯炮七 次二升 縮砂 去壳 半升 檳榔 半升 沉香 半升

右細末煮麵糊為丸如梧子大每服三十丸漸加至六十

丸食後陳皮湯送下

沉香導氣丸治一切氣不升降脇肋痞塞

沉香二斤

人參五斤

枳榔二斤

白朮一斤

烏藥一斤

麥蘗

神曲炒一斤

紫蘇葉一斤

大腹皮炒一斤

厚朴制一斤

訶子皮炮半斤

香附子炒一斤半

姜黃四斤

橘紅一斤

甘草四斤

京三稜二斤

廣茂炮二斤

益智二斤

紅花四斤

右為細末每服二斤食前沸湯點服

汚血

丹溪云脇痛有死血者桃仁紅卷川芎之類若跌撲脇痛者亦為汚血流歸脇下而痛東垣傷元活血湯之類是

也治法見攔撲傷損門

運氣

木助肝實脇

痛宜清

運氣脇痛者鄉境皆病脇痛也其証有二其一風木助肝氣實而痛

燥攻肝虛脇
痛宜濕

針灸上
膽痛
黃少腹痛者
取以間三里
惡血

經云厥陰所至為脇痛又云厥陰在泉風木所勝民
病兩脇裏急支滿又云少陽司天之政初之氣風勝
乃揉候乃大溫其病脇痛治以涼劑得痊也
其二燥金攻肝虛而痛經云陽明所至為脇痛又云
陽明司天燥火氣下臨肝氣上從脇痛又云少陰司
天地乃燥凄滄數至脇痛善大息又云歲木不及燥
乃大行民病中清眩脇痛治以溫劑得痊也
丹咳嗽脇痛方二陳湯加南星多香附青皮青代姜汁
內經灸刺脇痛有三法
其一取肝經云肝病者兩脇痛下痛引少腹善怒取其
經厥陰與少陰又云邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在

惡血在肝則兩脇中痛寒中惡血在

黃不吐息

汗者取膽

針灸下

集成脇痛

行善掣節時月腫取之行間以引脇下補三里以溫胃
中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其掣是也
其二取膽絡經云邪客足少陰之絡令人脇痛不得息
欬而汗出刺足小指爪甲上與肉交者各一瘡不得息
立忌汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右、刺左
病立已不已復刺如法是也
其三取心經云心手少陰脈所生病者目黃脇痛視虛
實熱寒陷下施補瀉疾留灸之法也

漸

懸鍾竅陰

此二穴左右取右少
取左竅陰出血也

外關三里

此二次正取

脇痛

支溝 章門 中封

行間

傷肝 怒氣

期門

治傷寒後痛

陽陵泉

治閃倒

治胸脇痛不可忍

期門 四分

章門

六分 灸七壯 至七七壯

行間 丘墟 湧泉

東陽 胸脇痛

期門 治皮 二寸

支溝

膽俞

治皮 一寸半

胸脇脹滿痛

公孫 三里 太冲 三陰交

腰脇痛

環跳 至陰 太白 陽輔

撮要 脇助痛

手足少陰

支溝

透間

外關

透內關如取支溝不必再取外關

通玄脇痛

陽陵泉

甲脇下摺蒲嘔吐逆陽陵泉主之 摺之移切

腹中氣腹噎、不嗜食脅下滿陰陵泉主之 噎音盍

仲寸口脉弦者即脇下拘急而痛其人畜、惡寒也

合腋張脇者肺下肺下則居奔迫肝善脇下痛青色粗

理者肝大、則逼胃迫咽、則苦膈中且脇下痛

全文見診下同

脇偏舉者肝偏頃肝偏頃則脇下痛

揭唇者脾高脾高則眇引季脇而痛

針灸

腋月

董缺盆腫者
取膽

其手心熱者

主

脇滿氣逆 見喘條

附腋腫腋氣

內經灸刺腋腫有二法

館

其一取膽經云膽足少陽脈所生病者缺盆中腫痛腋
下腫也

其二取心主經云心主手厥陰脈是動則痛手心熱腋

腋腫皆視虛實熱寒陷下施補寫疾留灸也

丹腋氣神效方

蜜陀僧

一升

白丸

七升

硃砂少許

射香少

右為末先用皂角煎湯洗後付上

又方

銅青 蜜陀僧 辰砂 白丸

硃砂 白附子

如前法搽之

本事治腋氣

夜明砂 不拘多少為末

右用豆豉調塗立效

圖

又方

銅青 好者不以多少米醋調成膏

右前淨洗腋下用輕粉搽過却使上件塗之立效

經驗治狐臭用生姜塗腋下絕根本

三目治胡臭大蜘蛛一个以黃泥入少赤石脂搗羅極細

入鹽少許杵担成一窠藏包蜘蛛在內以炭火燒令通紅放冷剖開將蜘蛛研細臥臨入輕粉一字用護醋調成膏貼腋下明日登廁必瀉下黑汁臭穢不可聞於遠僻處傾埋之免致染人神良

世治腋氣先用刀削去腋毛淨用白定粉水調搽付患處六七月時去一夜次日早看腋下有一黑点如針孔大用筆点定即用艾炷灸七個灸過頁心中疼痛當用後藥服下之

青木香

檳榔

丁香

檀香

麝香

大黃

右並服以下為度

右並服以下為度

陰谷

撮要小便閉數不通

陰谷灸

陰陵泉瀉之

標幽又法

偏瀝

集成小便閉不通

陰谷陰陵泉三陰交氣海關元已灸五十壯刺二寸半不取下穴

大溪陰交

東陽熱淋尿黃腹滿

陰陵泉關元各二寸

氣冲 二七壯

石淋不得小便

漸江氣海關元

關元 三十壯

氣門大敦 各二十七壯

血淋

氣海丹田 刺灸二十七壯
伏溜灸

小腹熱痛 目赤尿始血

列缺 二寸 治皮
大陵 承漿 各五分

又法

曲骨 灸二七壯
陰陽三凌泉 各二寸

甲少腹中滿 熱閉不得溺 足三里取之

溺難痛白濁 卒疝少腹腫 欬逆嘔吐 卒陰跳腰痛不可
以悅仰面里 熱腹中腹滿 身熱厥痛 小便難而白 期門
三間主之

肝穴

大法

諸疝少腹痛同一治

癰疝 狐疝 產少腹痛

疝病屬足厥陰肝經也少腹亦肝經也故疝痛與少
腹痛同一治法所謂疝者臯丸連少腹痛也其痛有
獨在臯丸者有獨在少腹偏於一邊者有臯丸如升
斗者癰疝是也有立出卧入注來者狐疝是也

丹疝病之甚者也臯丸連小腹腹痛也有痛在臯丸者有痛
在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或有形或無形或有
聲或無聲有形如瓜有聲如蛙

素問以下歷代名醫皆以為寒蓋寒主收引經終得寒收
引不行所以作痛理固然也有得寒而無疝者又必有
說而通之可也予嘗曰屢門戶雪上有霜沒臍之水踢

亦曰外感之
暴寒束內
鬱之濕熱

水徒涉不曾病此以予素無熱在內也曰時鬼之此証
始於濕熱之經鬱而至久又得寒氣外束濕熱之邪不
得素散所以作痛苦只作寒論恐為未備或曰厥脈一
經其道遠其位卑鬱積濕熱何由而致予曰大勞則火
起於筋痺飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火
起於本經火積之久母能生子濕氣便盛厥脈屬木係
於肝為將軍之官其性急速火性又暴為寒所束宜痛
之而大暴也愚見有烏頭枳子等分作湯用之其効亦
敏後曰此方隨証與形加減用之無有不應然濕熱又
須分多少而施治但濕者腫多癩病是也又有挾虛而
發者當以參朮為君而疏導佐之診其脈不甚沉緊而

歷治狂治
東之寒

大謬無力者是也然其痛亦輕惟覺重墜牽引耳

恒酒煮當歸丸治男子七疝痛不可忍者婦人瘕聚帶下

皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一

當歸

去芦
剉碎

附子

炮去皮
剉

川練子剉

茴香

右四味各一两剉碎以好酒三升煮酒盡為度焙干作

細末每秤末一两入下項藥

丁香半斤

全蝎十三

玄胡五斤

木香

半斤

右件四味同為細末入前項當歸等末內拌勻酒糊為

丸如梧子大每服三十九至百丸温酒空心送下一方

無當歸木香名苦練丸大効

凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖也川練茴香皆

入小腸經當歸玄胡和血止痛疝氣帶下皆積寒邪於
小腸之間故以附子佐之丁香木香為引導也溲匠韓
提控疝氣痛每發痛不可忍則於撮兩末各置其枕往
來伏之以愛如是者三年不已服此藥三劑良愈
丁香疝氣丸治臍下撮急疼痛并臍下周身一遭皆急
痛小便頻數清其五脉急洪緩澀沉按之皆虛獨腎脉
按之不急皆虛無力名曰腎疝

當歸半斤 茴香半斤 甘少梢半斤 麻黃根節一斤

丁香半斤 錫十三斤 玄胡半斤 羌活梢三分

肉桂一斤 防己三分 川烏半斤

右為細末酒糊為丸如雞頭仁大每服五十九丸淡鹽

右為細末酒糊為丸如雞頭仁大每服五十九丸淡鹽

湯送下空心宿食消盡之

羅當歸四逆湯治男子婦人疝氣臍下冷痛相引腰膝而疼

當歸梢七分 附子炒 官桂 茴香炒各五分

芍藥四分 玄胡三分 川練子 茯苓各三分

澤瀉二分 柴胡五分

為粗末都作一服水空心下

玄胡苦練湯治臍下冷撮痛陰冷大寒

肉桂三分 附子三分 熟地黃一分 炙甘草梢羊分

苦練子二分 玄胡二分 黃柏一分引用

右都作一服水四盞至一盞依法食前

此四方桂附治寒玄胡當歸川練茴香丁香木香和

血調氣蓋寒疝挾汚血滯氣者宜之

胡芦芭丸治大人小兒小腸氣蟠腸奔豚氣疝氣偏墜水腫小腹有形如卵上下来去痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔吐悶亂並皆治之

胡芦芭 炒一斤

川練 炒一斤

大巴戟 炒六斤

川烏 炮去皮六斤

吳茱萸 湯洗七次一斤

茴香 炒二斤

麩

右為細末酒煮熬糊為丸如梧子大每服十五丸至二十丸空心温酒送下小兒五丸茴香湯送下食前

衍義葫芦芭本經得茴香桃仁治膀胱氣甚効嘗合惟桃仁麩炒各等分拌以酒糊丸半為散每服五七十九空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與丸子相同空心服

日各一二服

丹腎氣

茴香

破故紙

吳茱萸

鹽炒半斤

木香

三斤半

胡椒

七斤半

○恐胡芦芭

右蘿蔔子汁鹽湯下

右方胡芦巴破故紙戟為君蓋疝而元敗素虛少者宜之

本事治小腸氣痛不可忍者

烏藥

搗碎好日酒浸一宿

高良姜

制

茴香

舶上者二味各一斤

青皮

二斤去白

右為末每服二升遇發熱酒調下

治遠年小腸氣眾醫不瘥者

硫黄

舶上茴香

炒令黄不可犯
铜铁各等分

右为末每服五分用热酒调空心服永除根本

川苦練散

木香 一刃

茴香

一刃 盐一匙 一交
炒黄色不用盐

川練子

一刃 剉细用巴豆一十个打
破一处炒黄色不用巴豆

右为细末每服二分空心食前调下

恒天台烏藥散

烏藥 五分

木香 五分

茴香

炒五分

良姜

炒五分

槟榔 三个

川練子 十个

巴豆

七十个

青皮

半刃

右八味先以巴豆打破同練實用麩炒候黑色去巴豆

麩不用外为细末每服一分温酒调下痛甚炒生姜热酒下

楚不用外為細末每服一合溫酒調下痛甚炒生姜煎酒下

竹木香練子散治小腸疝氣膀胱偏墜久恙藥不効者服

此藥其効如神燕同知秘傳

川練子

三十个巴豆二十个同炒黃赤色去巴豆不用將練子碾為末

草薺半斤

石菖蒲

一刃炒

青木香

炒一刃

荔枝核

二十个炒

右為細末每二合入射香少許空心炒茴香鹽酒調下

右巴豆炒藥例許學士云大抵此疾日虛得之不可以

虛驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故先

滌去所蓄之邪然後補之是以諸藥多借巴豆氣者蓋

謂此

仲寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能

治抵當烏頭桂枝湯注之

手足厥冷脈沉細弦者大抵劑抵之

烏頭

右一味以蜜二升煎減半去渣以桂枝湯五合解之
令得一升後初服二合不知即服三合又不知復加
至五合其知者如醉狀得吐者為中病桂枝湯方見傷寒門海藏
以附子建中湯加蜜煎治疝即此法也

腹痛脉弦而緊弦則氣不行即惡寒緊則不欲食邪
正相傳即為寒疝、繞臍痛若發則白汗出手足
厥冷其脉沉弦者大烏頭煎主之脉經云邪正作弦緊

烏頭大者五枚炒去皮不吐咀

右以水三升煎取一升去渣內蜜二升煎令水氣尽
取二升強人服七合弱人服五合不差明日更服不

可一日再服

海姬提領目目疾服涼劑數日遂得除病脐腹下大痛
幾至於斃與姜附茅劑雖稍踈痛不已遂於本方內倍
芍藥服之愈

羅疝氣治驗○癸丑歲奉詔至六盤山上命治小兒赤細
憐久病疝氣復自七月間飢飽勞役遇飲灌乳所苦甚
於初面色青黃不澤脐腹陣痛擗不可忍腰屈不能
伸扱物熨之稍緩脉得沉小而急于思難經有云任之
為病男子內結七疝皆積寒於小腸之間所致也非大
熱劑即不能愈遂制一方名之曰沉香桂附丸每服一
百凡空心温酒下間服天台烏藥散旬日良愈明年秋

王命班師即遠迎拜精神如故上大悅輒錄於此

况香桂附丸治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調

和退陰助陽除歲府積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷

鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦臥虛及療

七疝痛引少腹不可忍腰痛不能伸喜熱熨稍緩

沉香 附子 炮去皮 川烏 炮去皮 干姜 炮

良姜 剉炒 桂 去皮 茱萸 湯洗 茴香 炒各一斗

右為細末醋煮麩糊為丸如梧子大每服五十丸至七

八十九空心食前挑米飲湯下日三服忌冷物

丹治疝劫痛方

川烏頭 細切 槐仁 去壳

丹溪蒸治
內鬱之挑

右等分煎湯服之神効濕多癩腫者烏頭為君蓋川
烏治外束之寒梔子治內鬱之熱也

羅陰疝足厥陰之脈環臍抵小腹或痛腎虛寒水涸竭
瀉邪補肝為治蒺藜湯主之治陰疝小腹痛諸厥疝即
陰疝也喜欲勞痛不可忍蒺藜湯

蒺藜

炒去尖

附子

炮去皮

山梔

仁

各半升

右為末每服三分水一盞半煎至七分去渣食後溫服

丹又方

橘核

桃仁

梔子

茱萸

川烏

亦得

右研並服

治疝而作急痛

或嘈或吞酸
或噫或痞或
心痛者食積
死血

鹽炒蒼朮

鹽炒香附

炒茴香

酒炒黃柏

青皮

玄胡索

桃仁

益智

鹽炒附子

甘少

右作湯服後一服過後再不作矣

治諸疝方大槩諸疝因寒鬱濕熱而作即是痰飲并食

積死血此方主之

定痛神效

此方或兼嗜雜或吞酸或噫或痞或心痛

用此方或兼嗜雜或吞酸或噫或痞或心痛

枳實

九粒炒

桃仁

十四個

山梔

九粒炒

吳茱萸

七粒

山查

十四粒炒

生姜

如指大

右同入搗盆內搗細取順流水一中蕩起入瓶內微

沸帝查服如濕勝癩病者加荔枝核如痛甚者加鹽

淋瀝查服如濕勝癩病者加荔枝核如痛甚者加鹽

炒茴香二分如痛處可按者加薄荷少許

又方治疝痛

炒山揔二分 炒山查官 炒枳核二分 炒茴香二分

柴胡 牡丹 桃仁炒 八角茴香炒一分 炒茱萸羊分

治陽明受濕熱傳入太陰惡寒發熱小腹連毛際結核

問痛不可忍



揔仁炒 桃仁 枳實 山查各等分

右以沙鉢內同研細入姜汁半合用水一小中盪起煎

令沸服之



楊淳三奇曰旧有腎氣上引乳边及右肋痛多吐痰有

時鬲上痞塞大府祕結平時少汗脉弦甚與保和温中

各二柳青~~毒~~研桃仁 郁李仁吞之

本事治膀胱痛茴香散

茴香

金鈴子肉

蓬莪朮

京三稜

各一兩

甘草

半斤炙

右細末每服二分熱酒調下強幻安云每發痛甚連

日只二三服立定

治膀胱氣金連散

巴豆

百粒 去壳

川練子

二十四個湯浸去薄皮切作片子

右二味用麩二升同炒令黃赤去麩與巴豆不用只

將川練子一味為末每服三分溫酒空心下予閱古

今一切名方無如此奇特有效一方川練子不用巴

今一切危方無如此奇特有效一方川練子不用巴

腸寒胃熱
按之不痛

虛

豆炒亦妙

靈胃中熱腸中寒則疾飢小腹脹

師傳篇曰疾飢知胃
熱痛脹寒也

丹諸疝痛交用手按之不痛者屬虛必用桂枝炒山拖細

切川烏頭等分為細末生姜自然汁打糊丸如梧子大

每服三四十九丸空腹白湯下

疝不可按者並於歷代獨治外寒余下求之

疝脉大而虛

豁者亦虛宜

參朮

丹溪云疝有挾虛而發者其脉不甚沉緊而大豁無力者

是也然其痛亦輕惟覺重墜牽引耳當以參朮為君疏

導藥佐之蓋疏導藥即桃仁山查枳實梔仁茱萸川練

玄胡丁香木香之類以佐參朮之補劑也

仲寒疝腹中痛及脇痛裏急當歸生姜羊肉湯主之

當歸 三升
生姜 五升
羊肉 一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒

多者加生姜成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮

一兩加生姜者亦加水五升煎取三升二合服之

衍義云仲景治寒疝用生姜羊肉湯服之無不驗有一婦人產當寒月寒氣入產門脘下脹滿手不敢犯

此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血當日非其治也可服張仲景羊肉湯二服遂愈

按之大痛

丹諸疝痛愛用手按之大痛者為實

羅疝氣痛及脚膝無力控羣証○至真要大論云小腹控

羣引腰脊上冲心唾出清水及為噦噫甚則入心善忌

善悲甲乙經曰邪在小腸也小腸病者小腹引腰脊貫

肝肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥之

肝肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥之

証上衝肝肺客冷散於胞絡結於臍控引羣丸上而下
痛而入復甚則衝於心胸蓋其經絡所係從也啟玄子
云控引也羣陰丸也

控引羣丸治小腸痛結上而不下痛引心臍即東垣苗
香練實丸

也按之痛為實此方有茱萸等剛劑本不可入此條緣
芫菴有利性故入之

川練子炒 茴香炒 山茱萸 食茱萸 吳茱萸湯洗

青皮 陳皮 芫花醋炒 馬蘭花醋炒各一丸

右細末醋糊為丸如梧子大每服三十九丸温酒送下食

前量虛實加減以利為度

本事治小腸氣痛撞腹面青唇黑欲死者

木香 茵陳 芫花 甘遂 各等分

右件為末每服二分水一盞至七分去渣溫服、
此藥後應犯甘少藥皆不得吃恐與甘遂相反故也
其藥甚妙緣要有理屢有驗効

硃砂丸

木香

沉香

巴豆

全者各一分

青皮

二分不
去皮

銅青 半斤研

硃砂 一分研

已上二香青皮三味細剉同巴豆慢火炒令紫色為
度去巴豆為末入銅砂二味同研勻蒸餅和丸如梧
子大每服七丸至十丸鹽湯吞下日二三服空心食
前服也

子和律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃瓜每發繞腰急

痛不能忍裁人先以舟車丸及猪腎散下四五行覺藥
繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎散下四五行覺藥
以寒治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾
物以寒本是水故也即日病減八分食進一倍又數日
以舟車丸百餘粒通經散四五服之利下候三四日
又服舟車丸七八十粒猪腎散三服乃健步如常也
近穎尾一婦人病卒之疝赤腫大痛數日不止諸藥水
投石予以導水丸一百五十九令三次咽之次以通經
散三服空腹淡酒調下五更下臍府二三十行痛腫皆
去不三日平復如故

右治實疝利大便形氣實脈有力者宜之

杜案三十七太尉忽患小腸氣痛翰林醫官及京城醫家用藥皆不效每一發幾死過貴宮中上下不得安召杜至進藥每服不驗太尉曰我命不久致良醫不能治上召杜問曰所以杜對曰臣用古方書皆不獲愈今日撰一方未訖容進方繼時進上杜曰撰方以成未敢進先合藥以進太尉一服十愈八九再服全愈然後進方名曰救命通心散川烏頭一兩用青鹽一升酒一盞浸一宿去皮尖焙干川練子一兩用巴豆二十一粒同炒候黑色去巴豆茴香半兩石燕一對土狗五枚芥子一升六分為末每服三升入羊石脂內濕帛煨香熟夜半時用好酒半升入鹽細嚼食了以酒嚥下不得作聲小

時用好酒半升入鹽細嚼食了以酒嚥下不得作声小
便大利其病遂去 曹五家今秘此方

本事頃在徽城日歛尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍醫者
以剛劑與之痛愈甚小便不通三日矣臍下虛脹心悶
予因候之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過臥臥
痞塞氣不得通為之奈何宋醫尚手持四神丹數粒云
醫謂不止更服此予曰若服此定斃後無悔渠求治予
適有五苓散一兩許分三服易其名用連鬚葱白一莖
茴香一撮鹽一匙水一盞半煎七分令接續三服中夜
下小便如里汁一二升臍下寬得睡翌日診之脉以平
矣續用礪砂丸與之數日瘥

右利小便治疝常治謝人妻少腹痛小便不通先灸

少腹手不可
近脉如循刀
刃責、畜血

三陰交以茴香丁香青朮桤榔桂茱萸玄胡查肉枳
實信用黃柏並湯服之愈

丹赤岸朱同道年十四歲八月泄後兩後得涼半夜後腹
痛甚汗如雨兩脚踏破壁痛在小腹手不可近六脉沉
弦而細實重取則如循刀刃責、然問之云於六月大
熱時於深潭投水取魚意者病或起於此與大承氣湯
大便微利痛遂頓止至次日酉時其痛復作痛在小腹
堅硬手不可近又與大承氣加桂兩服研桃仁並大便
下紫黑血升餘而痛頓止至次日酉時痛復作如初脉
雖稍減而責、然猶在與大承氣湯加附子兩帖研桃
仁同並下太便五行得紫黑血如破絮者二升許痛

仁同益下太便五行得紫黑血如破絮者二升許痛

雜方

遂頓止一夜得睡次日酉時痛復如初詢知小腹和軟
痛在脐腹間六脉赤和似若無病但呻吟如舊詢知乃
食蘿蔔菜苗羹兩頓與小建中湯一帖而愈

世一嬾人少腹痛百藥不効一醫用杉木節童便煎服之
下血而愈

外臺治膀胱氣急宜下氣薑黃又和食鹽末二物等分以
綿裹如棗大內下部或下水惡汁并下氣街

斗門治小腸氣用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤
淬入醋中以淬竭為度搗羅如麵用湯調下一大盃即

差如神矣血師代赭也

聖惠治寒疝小腹及陰中相引而痛白汗出欲死丹參二

兩杵為散每服熱酒調下二升

丹治諸疝發時

海石

香附

二味為末生薑汁湯調亦能治心疼

行義木賊細剉微炒搗為末沸湯点二升食前服治小

腸膀胱氣緩服必効

本事治疝氣

青礬 一升

白丸 一升各為齋末

右用小瓦甌子一隻入藥甌內用麻皮縛緊鹽泥如法
堅牢固濟炭五斤煨令通紅尽炭為度取出入地穴內
出火毒二宿醋糊為丸如菜豆大每服十九空心鹽湯

出火毒二宿醋糊為丸如菜豆大每服十九空心藍湯

下或白湯亦得

運氣

肝受邪小腹

引脇痛

風助肝盛而

痛者寫肝

燥攻肝虛而

痛者補肝

小腸受邪小

腹引臍丸痛

熱助小腸盛而

痛者寫小腸

運氣少腹痛有三一曰肝其病少腹引脇痛是也經云

厥隤之復少腹堅滿裏急暴痛者是風氣助肝盛而然

治法當瀉肝也又云歲金太過民病兩脇下痛少腹痛

又云歲木不及燥乃大行民病中清眩脇痛小腹痛又

云歲土不及風乃大行復則胸脇暴痛下引少腹者是

燥邪攻肝虛而然治法當補肝瀉金也又氣客於厥隤

之脉則血泣脉急故脇肋與少腹相引痛者治法亦同

也 經文見諸痛門

漸

二曰小腸其病少腹引臍丸腰脊痛是也經云少隤之

勝心下熱善飢臍下反痛又云小隤之復燠熱內作少

膀胱受邪

少腹痛不便

濕攻膀胱虛

而痛者補膀胱

針灸上

膀胱

肝病少腹引

脇痛取足厥

陰少陰

腹絞痛者是火熱助小腸盛而然治法當瀉小腸也又

太陰在泉風淫所勝與太陰之復皆病少腹控辜引腰

脊上衝心痛太陰司大寒且至病少腹者是寒邪攻小

腸虛而然治法當補小腸瀉寒邪也

三曰膀胱其病少腹痛腫不得小便是也經云太陰在

泉病少腹痛腫不得小便者是濕邪攻膀胱虛而然治

法當補膀胱瀉濕土邪也已上經文並見運氣類註

內經刺灸少腹痛共四法一曰肝經曰肝病者兩脇下痛

引少腹取其經厥陰與少陰全文見灸刺又云邪客足

厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉交者

各一痛男子立已女子有頃已左取右、取左者是也

各一痛男子立已女子有頃已左取右、取左者是也

全文見灸刺門六府條○爪甲上大敦穴也

二曰小腸經云小腸病者小腹痛腰脊控暈而痛時窘

之後取巨虛下廉又云小腹控暈引腰脊上衝心邪在小腹

取之盲原以散之散太陽以予之取厥陰以下之巨虛

下廉以去之按其所過之經以調之者是也針灸門六

府條○盲原氣海穴也又心疝暴痛取足太陰厥陰盡

刺其去其血絡盧樞也心疝即小腸病經云心

三曰膀胱經云膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即

欲小便而不得取委中央又云小腹痛腫不得小便邪

在三焦約取之足太陰大絡者是也全文見針灸門六

委中穴也府條○太陰大絡

四曰督任衝脉經文見如左也

素病在少腹、痛不得大小便病名曰疝得之寒刺少腹

兩股間刺腰踝骨刺而多之盡是病已長刺節論者氣

街穴也衝脉起於氣街故也腰踝骨間王註謂腰房俠脊平立陷中者按之有骨如是也

督脉生病從小腹上衝心而痛不得前後為衝疝骨空

任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚

摘英元歲若動睛下痛不可忍

氣海 三陰交 立食左取右、取左下全

玉龍疝氣少腹偏痛

大敷 一分治皮向後三分寫之 三陰交 一寸寫十吸

撮要大法

大敦水道小海

栞君又法

中極

印腎

摘英卒疝少腹痛不可忍

大敦

三分留六呼灸七壯

陰市

三分灸五壯

照海

三分灸七壯已上皆左取右取左

疝癰小腸膀胱腎餘疝氣圖

氣海五區

各有燭針五分灸百壯

三里三陰交刺之

栞君疝

陰交三里足三間

漸

摘英疝

行間

三里

集成又法

關門關元水道三陰交

取不已再

海底歸來

摘英少腹痛

關元

三里

書

肝膽穴

甲陰跳遺溺小便難而痛尿上下入腹中寒尿赤挺出偏

大腫腹臍痛腹中悒、不樂大敦主之

腹痛上搶心、下滿癰莖中痛怒腹不欲視泣出長大

息行間主之

環臍痛尿騫兩丸縮腹急不得卧大充主之

疝癰臍少腹引痛腰中痛中封主之

尿跳腰腹痛實則挺長寒熱攣尿暴痛遺溺使人虛則

脉跳腰痛实则短长寒热脉暴痛遺溺便人虚则

暴痒气逆腫暈卒疝小便不利如癰狀數噫恐悸气不
足腹中悒、小腹痛益中有热有瘕肉状如首欲出背
擊不可倪仰蟲溝主之

右取臑经厥陰

男子陰疝两丸上下小腹痛五枢主之

大疝腹堅丘虛主之



右取府經少陽

小腸穴

少腹痛飡泄出糜吹指热若脉陷寒热身痛唇干不渴
汗出毛髮焦肢肉少气内有热不欲動搖泄膿血腰引
中腹痛暴驚狂言非常巨虛下廉主之

少腹痛热控掌引腰脊疝痛上衝心腰脊強溺黃赤口

乾小腸踰主之

疝瘕髀中急痛循脇上下搶心腹痛積聚府舍主之

腹痛疝積聚上衝心雲門主之

右巨虛下廉小腹踰者取本府也府舍云門者取太

陰以予之

淋瀝自閉疝至陰主之

疝疝繞臍痛衝胸不得息灸臍中

陰疝引辜陰交主之

少腹卧善驚氣海主之

疝疝繞臍痛石門主之

暴疝痛小腹大熱關元主之

膀胱冗
任脉冗

暴疝痛小腹大熱關元主之

雜取

少腹痛溺難陰下縱橫骨主之

男子陰端寒上衝心中脹、會陰主之

癰疝然谷主之

卒疝少腹痛照海主之病在左取右、取左立已

陰暴起疝照海主之千金云四支

脐下積疝瘦胞中有血四滯主之

脐疝繞脐而痛時上衝心天樞主之

氣疝煩嘔面腫奔脉天樞主之

陰疝氣疝天樞主之

陰疝委莖中痛兩丸騫臑不可仰卧刺氣街氣疝衝作

衝門主之

診
疝脉皆滑

寒疝下至腹湊膝腰痛如清 大腫諸疝按之下至膝
上伏兔主之

寒疝痛腹脹滿痿厥少氣陰布市主之

素厥陰滑則病狐疝風少陰滑則病肺風疝太陰滑則病

脾風疝少陽滑則病心風疝太陽滑則病腎風疝少陽

滑則病肝風疝口時刺逆從論

肝脉滑甚為癰疝 全見文法下全

心脉微滑為心疝引臍小腹鳴

垣夫滑脉關已上見者為大熱蓋陽與少陰併也故大熱脉

滑尺部見為大寒生癰疝滑脉者命門胞絡之名也為

丙丁熱火併于下蓋丙丁不勝壬癸從寒水之化也故

丙丁熱火併于下蓋丙丁不勝壬癸從寒水之化也故

脈急亦為疝

生癩疝

素帝曰診得心脈而急此為何病、形何如岐伯曰病名

心疝小腹當有形也帝曰何以言之岐伯曰心為牡藏

小腸為之使故曰少腹當有形也精微論

心脈搏滑急為心疝肺脈沉搏為肺病大奇論

腎脈大急沉肝脈大急沉皆為疝

脈來中央堅實經至闕者衝脈也動若小腹痛上搶

心有瘕疝絕孕遺溺脇支滿煩也

丹臍下忽大痛人中如黑色者死

子和七疝圖○寒疝其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控

辜丸而痛得於坐臥湿地或寒月涉水或置雨雪或坐

少腹痛中
黑身死
診七疝形
狀

寒疝疝囊

冷痛水疝疝囊腫痛

筋疝疝莖腫脹

血疝如便瘻

卧磚石或風冷處使內過勞宜下温劑下之久而無子
水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或
囊痒而搔出黃水或少腹中按之作水声得於飲水醉
酒使內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多
令人為卒疝宜以逐水之劑下之有漏針去之者人多
不得其法

筋疝其狀疝莖腫脹或潰或膿或痛或痒囊急筋縮或莖
中痛、極則痒或挺縱不收或白物如精隨波而下久
而得於房室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下之
血疝其狀如黃瓜在少腹內兩旁橫骨兩端約中俗云
便癰得於重感春夏大燠勞於使內氣血流溢滲入脬

便癰得於重感春夏大燠勞於使內氣血流溢滲入脬

囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑下之
和血謂四物湯調胃承氣湯各半服之是也

氣疝或脹或散

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱
之而脹怒哭號罷則氣散者是也有治法以針出氣
而愈者然針有得失宜以散氣之藥下之或小兒亦有
此疾俗曰偏氣得於父已年老成年少多病陰痿精怯
強力入房因而有子胎中病也此疝不治惟築賓一穴
言之

狐疝卧入立出

狐疝其狀如瓦卧則入小腹立則出小腹入囊中狐則
昼出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出入上下往來正
與狐相類也與氣疝大同小異今人帶鉤鉗是也宜以

癩疔囊如斗
如斗

逐气流经之藥耳之

癩疔其状陰縱如升如斗不痒不痛者是也得之氣卑

濕所生故江淮之間湫澹之处多感此疾宜以去濕之

藥下之女子陰戶突出雖亦此類乃熱則不禁固也不

可便謂虛寒而澀之燥之補之本名曰癩宜以若下之

堅之王水云跌氣下墜臥氣上爭上爭則寒多已上七

疔下去其病之後可調則調可補則補各量病勢勿拘

俗法經所謂冰盛則腹脹不通者癩疔也不可不下

右疔圖雖七然寒疔即疔之總名水疔即癩疔之屬

氣疔即狐疔之屬血疔即癩疔之屬惟筋疔罕見之

蓋下疔瘡之屬也

蓋下疳瘡之屬也

癩疔 癩與瘡同

臍囊腫大如升如斗是也

癩氣不痛

難治

丹不部癩氣不痛之方細思非痛斷房事與厚味不可用

藥惟保其壽若蒼朮神曲白芷山查川芎枳實半夏皆

要藥視其藥皆鄙賤之物以啓其慢心又不能斷欲以

愛欲護其根本反陷其被陳彥正禍得罪多矣且其藥

逐時月景既更換君臣佐使 典戴原禮書

癩疔屬濕方

蒼朮

神曲

白芷散水

山查

川芎

枳實

半夏

南星

右神曲糊為丸有枳實加山查一兩腎硬加朴硝半兩

秋冬加吳茱萸二升半

癩疝

南星

山查

蒼朮二升

白芷

半夏

枳核

神曲一升

海藻

昆布半升

玄明粉

茱萸

三升

又方治木腎不痛

南星

半夏

酒洗黃柏

蒼朮鹽炒

枳橘

唐求

白芷

曲炒

滑石炒

茱萸

昆布

無擇香附散治癩脹

香附子不拘多少

香附子不拘多少

右為末每服酒一盞並海藻一升至半盞先撈海藻

嚼細用所並湯調香附末二升服

垣又方治偏墜初生

川山甲 苗香

右為細末酥酒送下以干物壓之

丹木腎以楮木葉雄者晒干為末酒糊為丸空心鹽湯送

下楮雄雌出本事方蓋無實者雄也

潔海蛤丸治癩疔

海蛤醋淬 當歸 海金沙 膩粉 硃砂各一升

海藻 粉各半升 水蛭廿个 青黛 滑石

乳香各一升 朱砂二升 地膽二十一个

潔便利惡物

綿包取汗

癩氣痛者
易治

右為細末鹽煮麵糊為丸如小豆大朱砂為衣每服十
丸煎灯少湯空心服之小便下冷濃惡物乃效却以黃
連紫荷車板藍根各二分煎湯漱以收牙齒去藍板根
加管仲

世治偏墜大者用干姜桂各一升為末以綿一兩水三大
椀同煮二十餘沸起晒干又煮以水尽為度晒綿干以
包陰丸汗出愈逐次漸而愈

海地黃膏子丸治男子媚人膝下奔豚氣塊小腹疼痛卵
痛即控辜相似或漸腫陰、痛上衝心腹不可忍者宜
服此藥

血竭

沉香

木香

廣茂

玄胡

血竭 沉香 木香 廣茂 玄胡

蛤蚧 人參 當歸 川芎 川練麩炒

芍藥 續斷 白朮 全蠍 茴香炒

柴胡 沒藥 已上分兩不定隨証加減用之

氣多者加青皮 陳皮

血多者加肉桂 吳茱萸

右同為細末地黃膏子丸梧子大空心溫酒下二十九

日加一丸至三十九

竹安息香丸治陰氣下墜腫脹卵核偏大堅硬如石痛不

能忍者

玄胡索 炒去殼 海藻 昆布 洗 青皮 去白 茴香 炒

川練子 去核 馬蘭 已上各一及炒 青木香 半及見火

大戟 酒浸三宿切片焙干秤二分半

右為細末另將硃砂真阿魏真安息香三味各二分
半用酒一盞醋一盞將硃砂阿魏安息香淘去沙石
用酒醋二和熬成膏子再入射香一分沒藥二分半
俱各另研細入薑藥一同和丸如菉豆大每服一十
丸至十五丸空心用綿子反調酒下

本事治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍念珠丸

乳香

硃砂各三分

黃蠟

右乳香研細硃砂同研勻溶蠟和丸分作一百單八
以線穿之露一夕用蛤粉為衣旋取用乳香吞下

頃年有人貸疝氣藥肩上擔人我二字以為招日日貨

執鬱內者
陳導之

寒束外者
溫服之

數千有一國醫多金得之用之良驗

丹鄭子敬曰吃酒後飲水其水果腎偏大時作蛙声或作
痛炒枳實一两茴香鹽炒、梔子三斤研荳下保和丸
昌四官膀胱氣下墜如蛙声臭橘子炒十斤桃仁廿个
蘿蔔自然汁研下保和丸七十

是兄年十三左腎核腫痛此飲食中濕墜下成熱以臭
橘核五枚桃仁七枚研順流水一盞研荳沸執下保和
典典

本事治膀胱腫硬牽引痛疼及治小腸氣陰囊腫毛間水
出宜服金鈴丸

金鈴子肉 五斤

茴香 炒

馬蘭花 炒

兔絲子

海蛤

破故帛

海帶 各三斤

木香 一斤

丁香 一斤

右細末糊丸如梧子大每服二三十丸温酒鹽湯空心食前服

無擇大戟丸 治陰癩腫脹或小腸氣痛

大戟 去皮剉炒

黃羊 炒四斤

木香 一斤

附子 炮去

舶上茴香

呵子 煨去核

檳榔 各一斤

川練 皮入

射香 羊子另研

右為末獨川練以好酒二升菘白七枚長三四寸煮

川練軟去皮核取肉和上件藥杵丸梧子大空心温

酒下十丸潮昔疼痛炒姜热酒下十五丸

抵聖丸治陰癩腫滿赤腫大便秘欲飲水按之臍腹疼

續隨子 薏苡仁 郁李仁 苜蓿 白羣牛 各一斤

右為末滴水丸如梧子大每五丸用博濟生方香姜

按之臍腹痛者下之

石為末滴水丸如梧子大每五丸用博濟生方香美

散嚥下黃昏眼五更利下惡物効

子和汝南司侯李審言曰勞役王事飲冰水坐湿地乃濕

氣下行流入臍囊大腫痛不可忍以金鈴川練子等藥

不効求治于裁人曰可服洩水丸審言感之又數日痛

不可堪竟從裁人先以舟車丸瀆川丸下青綠沫十餘

行痛止茴香丸五苓散以調之旬日而腫消至老更不作

世綿包取汗法 方見癩疔不痛条

丹水腎以枇杷葉野紫蘇葉蒼耳葉水晶蒲萄葉濃煎湯

董洗

無擇雄黃散治陰腫大如斗核痛不能治

雄黃 一兩研

礬 二兩研

甘草 生半兩

綿包取汗去
洗法

右劉散以水五升煎洗之

潔失笑散治腎腫

荊芥穗一升

朴硝二升

右為粗末蘿蔔葱同煎湯淋洗

塗付法

梅師治奔外腎腫疼痛大黃末醋和塗之干即易之

集驗治男陰腫大如升核痛人所不能治者搥馬鞭草塗之

男子陰腫如斗大核痛人所不能治者蔓菁根搥付之

運氣

運氣癩疔有一經云改明司天燥淫所勝丈夫癩疔

婦人少腹痛又云陽明之勝外發癩疔者是燥邪攻肝

癩疔

氣虛而然治法當補肝寫燥金也 全文見運氣類註

藏府

素厥陰所謂癩疔婦人少腹痛者厥陰者辰也三月陽中

小腸膀胱

針灸上

癩疔不痛者
鉞針取囊中
穢液

之陰邪在中故曰癩疔少腹腫也所謂癩瘡疔膚脹者

曰陰亦盛而脈脹不通故曰癩瘡疔也

三陽為病發寒熱下為癰腫及為痿厥喘瘖其傳為

癩疔 全文見診病傳變。王註云喘瘖瘖瘖瘖瘖也

靈黃帝曰刺節言去爪夫子乃言刺關節肢絡戛卒聞之

岐伯曰腰節者身之大關節也肢胫者人之骨以趨翔

也莖垂者身中之機陰精之候津液之道也故飲食不

節喜怒不時津液內溢乃下留於臑血道不通日大不

休倪仰不便趨翔不能此病榮然有水不上不下鉞石

所取形不可匿常不可蔽故命曰去爪帝曰善

內經刺灸癩疔共四法其一即此篇經文所為鉞石

諸疝皆取足厥陰

卒疝陰暴腫者刺蠱溝

積疝蠱轉筋

取畢囊中水液者是也其法今世人亦多能之凡畢囊大如斗者中藏穢液必有數升信知此出古法也
鉞針如刀狀

其二取肝經云肝足厥陰之脉是動則病丈夫癩疝婦人少腹腫是也是於足厥陰肝經視盛虛熱寒陷下而施補瀉疾留與灸也全文見針灸門十二經條

其三取肝之絡經云足厥陰之別名曰蠱溝去內踝五寸別走少陰其別者經脛上畢結于莖其病氣逆則畢腫卒疝取之所別是也是於內踝上五寸貼脛骨後近肉處蠱溝穴取之也全文見針灸門十五絡條

其四取足陽明筋經云足陽明之筋聚於陰器上腹

腫筋急者

火針取筋痛

如

針灸下

肝穴

腎穴

其病轉筋髀前腫癢疝腹筋治急在燔針劫刺以知
為數以痛為輸是也是以轉筋痛處用火針刺之也
全文見筋門

桑君治偏墜當外腎縫泌皮針透即消

集成本腎紅腫如升大不痛

大敦三陰交

海底圖

歸來

在水道下二寸針入二寸半灸七壯

本腎紅腫陰肝偏墜

闡門

在毛際玉莖傍開二寸針入二寸半灸二十七壯

三陰交

甲癩疝大巨及地機中却主之

癩疝陰暴痛中封主之

千金云癩疝癰暴痛痿厥身不仁

氣癰癩疝陰急股樞膈內廣痛交信主之

診

癩疔為熱
在外寒在
內

丈夫癩疔陰跳痛引墓中不得溺腹肢脇下楮滿閉癰
陰痿後時泄四支不疼寒則身疼痛汗不出目瞢然
無見怒欲殺人暴痛引下體下節時有熱氣筋掌膝痛
不可屈伸狂如新發不食喘呼少腹痛引噫五厥痛
湧泉主之

撮要本腎紅腫疼痛

然谷半寸為之

世灸關元可愈蓋灸之早可愈也

垣前脈分大寒大熱囊垂縮口陰陽別論云三段為病發
寒熱下為癰腫及為痿厥腦痛其傳為索澤其傳為癩
疔夫熱在外寒在內則累垂此丸夏之氣也寒在外熱

孤夫熱在外寒在內則累垂此丸夏之氣也寒在外熱

在內則拘縮此三冬之氣也足太陽膀胱之脈上迎手

太陽小腸之脈下行致足厥陰肝之脈不得伸其任脈

並厥陰之脈逆則巨川之水致陽氣下墜是風寒濕熱

下出囊中致兩臑腫大謂之曰疝大甚則為癰足厥陰

之脈與足太陽寒水之脈同至前陰之末傷寒家說足

厥陰肝經為病煩滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大

熱靈樞經云足厥陰肝經、筋中以為寒則筋牽如縮

為大寒前說囊縮為大熱此說囊縮垂下引癰疝脚氣

為大寒風濕盛下垂為寒與上二說不同以平康不病

人論之夏暑大熱囊如累垂冬天大寒忽縮上收與前

三說不同何也是相乖耶不相乖也答曰傷寒家囊如

厥冰

縮大寒在外亦是熱在內與傷寒同故再引平康人以証之冬天陽炁在內陰炁在外人亦應之故寒在外則皮急、則囊縮夏月陰炁在內陽氣在外人亦應之故熱在外則皮緩、則囊垂此癩疝之象三說文殊皆理一也用藥詳而審之

狐疝

卧則入腹立則出腹入囊中是也

海仲景療陰狐疝氣偏有大小時、上下者蜘蛛散主之

狐夜伏而晝見以其疝處厥冰之分即人之

蜘蛛散隱粵之所晝下而夜上故以狐疝各為

蜘蛛十四个桂半斤要入厥冰取其肉厚者

右為散每服一匙七蜜丸亦可○雷公云凡使勿用五

雜方

針灸

肝

脾

色者蕪丈身上有刺毛者并薄小者已上並不堪用凡用須屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研如膏投藥中用此余方之法若仲景燉炒用全無疑

一法治水癩偏大上下不定疼痛不止牡砺不以多少鹽泥固濟炭三斤煨令火尽冷取二兩干姜一两炮為細末二味和勻冷水調得所塗病處小便大利即愈

內經刺灸狐疝但取足厥陰一經、云肝足厥之脉所生病者狐疝是也隨其經盛虛寒熱陷下取之也甲狐疝太衝主之

陰股內痛氣癰狐疝走上下引大腹痛不可倪俯上下

任脈

雜取

診

針灸

商丘主之

狐疝驚悸少氣巨缺主之

心術嬾人疝瘕結核疼痛發作無時日出穴夜入穴或負

重即下稍輕即上狐疝也

天井 五分

肘尖

五分小片汗出立効

氣海

三寸又豆橫四息二二白病所各進三寸寫之

中極 三寸五分

耳後陷者腎下

則腰尻痛不可悅仰為狐疝

全文見診

產後少腹痛併見產後腹痛門

閉癰遺溺

淋閉癰分二病

胎前淋閉小便不通

產後淋閉遺溺

小便數

產遺尿小便黃赤

遺溺者溺出不自知覺也閉癰者溺閉不通而淋瀝点

肝脉督脉
循脉器

三焦約下焦

膀胱藏溺

滴也惟肝與督脉三焦膀胱主之

肝脉督脉主之者經云肝足厥阴之脉過脉之脉

又云督脉者女子入繫庭孔其孔溺孔之端也其男子

循莖下至篡與女子等其生 病瘡痔遺溺故遺溺閉

癰皆取厥阴俞穴及督脉俞穴也

三焦主之者經云三焦下俞在于足太阴之前少阴之

後出於膈中外廉名曰委陽是太陽絡也三焦者足少

陽太陽之所將太陽之別也上踝五寸別入貫膈腸出

子委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉瘡虛則

遺溺、則補之閉瘡則瀉之是也

膀胱主之者經云膀胱不利為瘡又約為遺溺是也然

診

閉者暴病
癰者久病

寒熱

遺溺閉癰不取膀胱俞穴者蓋膀胱但藏溺其出溺皆從三焦及肝督脉也

閉癰分二病

閉癰合而言之病也分而言之有暴久之殊蓋閉者暴病謂溺閉点滴不出俗名小便不通是也癰者以病謂溺淋瀝点滴而出一日數十次或百次俗名淋病是也今分其病立為二門

小便不通

恒小便不利在氣在血之異。夫小便者是足太陰膀胱所主長生於申、者西方金也。金能生水。金者肺也。肺中伏熱水不能生是絕小便之源。人補相天地膀胱

渴而小便不利
熱在氣分

之源自頭項下至於足故曰陽中之陰如渴而小便不通者不得降是也治法皆用清燥金之正化氣薄之藥茯苓猪苓澤瀉琥珀灯心通草車前子瞿麥扁蓄之類皆為淡滲之藥能泄肺化而清肺金滋水之化源也若不渴熱在下焦是熱其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之藥治之二者之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易分別耳

清肺散治渴而小便閉或黃或澁邪熱在氣分也

茯苓 二分

猪苓 三分

澤瀉 五分

琥珀 半分

灯心 二分

木通 七分

通草 二分

車前 炒 一分

瞿麥

半升

篇蓄七分

白朮三分

桂半升

右為細末每服五分水二盞煎至一盞帶熱服一盞

劉如豆作湯煎服亦可正散亦宜用之

仲猪苓湯治脉浮黃熱渴而小便不利方見傷寒

五苓散治煩渴飲水過多或水入即吐心中澹、小便

不利方見傷寒

茯苓戎鹽湯方

茯苓 半斤

白朮 二分

戎鹽

彈丸大一枚

右三味

百一小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分三服

垣滋腎丸治下焦陰虛膝脚軟無力陰汗陰痿足熱不能

不渴而小便不利或在血分

履地不得而小便閉者邪熱在血分也

黃柏

二升酒洗焙

知母

二升酒洗焙

肉桂 一分

內經云熱者寒之又云腎惡燥急食辛以潤之以黃柏之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱寒曰熱用也

右為細末熟水為丸如雞頭大每服百丸加至二百丸益湯沸下空心服

昔富長安有大賈王善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石塞壅之極腿脚堅腫破伺出黃水双睛凸出昼夜不得眠飲食不下痛若不可名狀其親趙謹甫輩求予治隨往病家果知病人之苦平昔未嘗見目回受

病之始、病不渴、近添嘔噦、輒以大鹽菜貼示之、遍視
名題治中滿利小便滲泄之藥、悉備、急難措手、乃辭歸、
微夜至旦、臥不寐、窮究其理、忽記素問有云、無陽則
水無以生、無水則陽無以化、又云、膀胱者、州郡之官、津
液藏焉、氣化則能出矣、此病小便癰閉、是無水而水氣
不化者也、凡利小便之藥、皆淡味滲泄、為陽止、是氣藥
陽中之陰、非北方寒水、水中之水、所化者也、此乃奉養
太過、膏粱積熱、損北方之陰腎、水不足、膀胱腎之室、久
而干涸、小便不化、火又逆上、而為嘔、非噦、高上所生也、
獨為閔、非格病也、潔古老人曰、熱在下、佳、噦寒不便、是
怡、閑以稟北方寒水、所化大苦寒、氣味俱者、黃柏知

母桂為引用丸如栢子大沸湯下二百丸少時未報服
藥頃更如力利前陰火燒之痛溺出如瀑泉湧出則具
皆濕床下成流頭眩之間腫脹消散予驚喜以手加額
曰大哉聖人之言豈可不遍覽而執一者也其証小便
閉塞而不渴時見燥者是也凡諸病居下焦皆不渴也
潔黃適丸治曰服此藥過多小便不利諸藥莫能效者或
時下胸痛不忍也

黃連炒

黃栢炒

甘草各等分

右以咀水煎溫飲之食前

如晝不通加知母此藥助陰使氣得他則通矣

羅白芍散治小便不通膀胱有執

通治

朴硝不以多少為細末每服二分煎茴香湯調下食前

茴香方用茴香酒調

垣導氣除燥湯治小便不通乃血濕致氣不通而竅澁之

知母三分細剉酒洗

黃柏四分細剉酒洗

滑石二分炒黃色為細末

澤瀉三分為細末

茯苓二分去皮為細末

右伴和勻每服秤半兩水二大盞煎至一盞去滓稍

空心服如急閉小便不拘時服

斗門小便不通用蚯蚓杵以冷水漚過濃服半椀立通

大解熱疾不知人事欲死服之効

仲小便不利者有水氣其人若渴括萎瞿麥丸主之

菴萋根二分

茯苓

署預各三分

附子一枚炮

渴而腹冷者為水氣

瞿麥 一升

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三九日三服不知
增至七八丸以小便利胸中温為知

氣血

氣鬱於下

微者香以散

之

甚者吐以提

之

保小便不通腹下疼狀如覆枕痛悶難忍者乃賜胃干涸
臆中氣不下故徑所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣
化則能出然故臆中者聖史之官三焦相火下合右腎
為氣海也王註曰膀胱津液之府胞內居之少腹要間
毛內藏胞蓋若得氣海之氣施化則漫住注下氣海之
氣不及則隱秘不通故不得便利也先用木香沉香各
三升酒調下或八正散甚則宜上湧之令氣通達便自
通利所謂病在下上取之王註曰執攻于上不利于下

氣盛於上則溫辛散之若以利之

一方益陳皮茯苓湯調木香沉香未服之空心

丹小便不通吐之以提其氣升則水自下蓋氣承載其水也

氣虛參芪升麻等先服後吐或參芪藥中探吐亦可

血虛四物先服後吐芎歸湯探吐亦可

痰多二陳湯先服後吐皆可探吐

痰氣閉塞二陳加木通香附探吐

丹案治一男子小便不通用吐法小便如注論見治虛實

法病在下取之上条

仲小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主

之蒲灰髮灰本草言皆滑汚止得石

蒲灰散方

血鬱於下
微有輕劑行之
其者峻劑
伏之

蒲灰 七分恐節
即蒲黃粉

滑石 三分

二味杵為散飲服方寸七日三服

滑石白魚散方

滑石 二分

亂髮 三分

白魚

二分
衣魚也

三味杵為散飲服半升日三服

無擇髮灰散治臍不下急滿小便不通

亂髮灰

研細每服二升米醋二合調服一法與葵子等分為

末飲服二升訖即炒黑豆葉存其上則通 丹溪云髮

灰補陰之功甚捷

本事桃仁益治婦人血積頃年在毗陵有一貴官妻小便

不通臍腹脹痛不可忍衆醫皆作淋治如八正散之
類數種皆治不通痛愈甚予診之曰此血瘕也非眩暈
藥不可去予用此藥更初服至日午大痛不可忍遂卧
少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆沫一二升痛止
得食此藥猛烈大峻氣虛血弱宜斟酌之

桃仁

大黃

川朴硝上各一升

蟲臣

半升炒黑

四味為末以醇醕二升半銀石器中慢火煎取一升
五合下大黃桃仁蟲臣等不住手攪良久出之丸如
梧子大前一日不晚食五更初温酒吞下五丸日午
取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣狀未下再作如鮮
血即止續以調血氣藥補之此方出千金

此方不可妄用

虛笑

脈洪且滴為

虛

小腹痛滿
覆椀為實

雜方

右四治汚血小便不利前三方輕劑可用後一方峻劑須認得今晚用之

丹呂仲年六十六歲病傷寒得汗熱退後脈尚洪此洪脈作虛脈論與人參黃芪白朮淡甘草當歸芍藥皮數日其脈仍大未收欽此氣血仍未回復又小便不利小腹下妨悶頗為所苦但仰臥則且滴而出予曰補藥服之未至於前藥倍加黃芪人參大劑與兩日小便方利

少腹痛脹如覆椀為實其法有二氣壅塞於下者用吐法以授之血汚於下者用桃仁蠶之類以破之

二方並見
氣血條

世治小兒悶用大田螺生去壳搗細封臍上即通

治傷寒後小便不通生姜八九塊杵碎水十餘碗麻皮

布五六尺同煮數沸用桶盛置俟通手以布頻熨小腹
良久恰用紅苧米一七江茶二七井花水調服神効小
便如注

本事治小便難小腹滿不急治殺人

右用葱白三斤細剉炒令熟以帕子裹分作兩段更替
熨臍下即通

玄珠一朶陔闕格前後不通利大便小水自行中有轉胞
之証請藥不効無救則脹滿悶亂而死予曾以甘遂末
水調付臍下內以甘少節傷飲之藥汁至臍二藥相反
而胞自轉矣小水未如薄泉此救急之良法也

聖惠治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦芫一两去苗

小便難腰膝滿心不覺瘵之殺人用秦芫一兩去苗

以水一大盞並取七分去渣每於食前作二服差

世治小便卒不通用大杏仁二十三枚研水調分作二服

効杏仁紫若利小便蓋解肺鬱肺則行降全而小便去、矣

千金治婦人卒不得小便紫花末以井花水服三撮便通

小便血服五撮立止

外臺若小便不通數而微腫方取陳久芫頭一枚燒為灰

和水服之此方未詳

經云腎合膀胱膀胱者津液之府也少陽屬腎、上

連肺故將兩藏三焦者中瀆之府也水道出焉屬膀胱

是孤之府也又云膀胱者州都之官津液藏焉氣

化則能出矣由是言之膀胱藏水三焦出水治小便

藏府

膀胱藏水

三焦出水

運氣

溫改三焦小腹
痛腫不利

風改脾澹

瘕泄不利

燥熱癰閉

不利故刺灸法且取三焦穴不取膀胱也少陽屬腎
肺故東垣用清肺飲于滋腎丸利小便也

運氣小便不利有三

其一屬濕邪改三焦經云太陰在泉濕淫所勝病小腹
痛腫不得小便 又云水不及曰涸流涸

流之紀上宮與正宮同其病癰閉是也

其二屬風邪改脾經云厥冰司天風淫所勝病澹瘕泄

水閉日也

其三屬燥熱經云陽司天之政天氣急地氣明民病癰

閉初之氣其病小便黃赤甚利淋又云少冰司天之政

地氣肅天氣明二之氣其病淋是也

針灸上

少腹滿寒

熱不利者

取屏厥

少腹痛腫

不利者

三焦

取足跟衝

大鍾

內經刺灸小便不利法有五

其一取肝經云肝足厥陰之脈所生病者癰閉又云小
腹滿身寒熱小便不利取足厥陰又云癰取陰蹻及三
毛上及血絡出氣是也

其二取三血經云三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小

便窘急溢則水留即為脹候在足太陽之外大絡大絡

在足太陽少陽之間亦見予脈取委陽又云小腹痛腫

不得小便邪在三焦約取之太陰大絡大絡即委陽視

其絡脈與厥陰小絡結而血者當有取子二子是也

其三取腎絡經云足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟

別走太陰其病實則癰閉取之所利也

澹瘕泄不利

足太陽

甚者雜取

針灸下

其四取脾經云脾足太陽之脈所生病者澹瘕泄水閉
視虛實寒熱陷下而施補瀉疾留灸也

其五雜取經云以閉不得瀉刺足少陽大陰與鼈上以
長鍼氣逆則取其太陽少陰明厥明動者
之住也

經驗治小便淋瀝或有血以赤根樓菴近根截一寸許灸
臍中上以艾灸七壯

羅治小便淋瀝不通鹽不以多少炒熱放溫填滿病人臍
中却用筋頭大艾莖灸吐七其小便自出

摘英刀冰各出密語

關元

八分令病人覺淋瀝三五次為度別使揉小腹
却取下

腎穴

膀胱穴

三焦穴

脾穴

小腸穴

督穴

癰遺溺鼠鼯痛小便難而白期門主之

小腹中滿不作痛小便不利湧泉主之

陰胞有寒小便不利扶不主之

筋急身熱少腹堅腫少腹時滿小便難尻股寒脾樞痛

外引季脇內控八竅委中主之

癰中竅主之



胸滿彭、然實則癰閉掖下腫虛則遺溺脚急競、然

筋急痛不得大小便腰痛引腹不得悅仰委陽主之

小腹脹急小便不利厥氣上頭巔漏谷主之

勞痺小便赤難谷可主之

氣癰溺黃関元及陵主之

千金云寒熱不節
腎病不可悅仰

虛實
血受傷者
血行滲血凝
氣

氣癰小便黃氣滿虛則溺石門主之

小便難竅中熱實則服皮痛虛則痒癢會陰主之

癰則淋病

丹朱即小便淋病脈左大右湧此為勞傷經血勿作淋治

可補血行肝經滯血自愈

生地黄一分 歸頭一分 赤芍一分 芍三分

条苓三分 甘梢三分 陳皮半斤 木通半斤

炒柏三分 紅花豆大 杜牛膝一分

每桃仁九個碾滑石並待淋病退去滑石桃仁杜牛

膝木通入川牛膝代木通分兩借之

金華申明於年七十自壯年踏冷患腎氣疝痛常服蒼

木烏附等藥二十餘年疝氣少正却患小便淋痛十有
三年其間又服朴硝大黃諸治淋之藥古方俱試並無
一効至是年春頤頤右边發一疽延及缺盆可尺許不
能食淋痛益加又頤叫號其疼淫潰膿血淋漓精神用
億時正六月診其脉兩手澁短左微是弦伏輕重皆近
五至予謂此瘡皆前烏附等藥積毒所發此淋亦目前
燥烈之藥凝積血畜於膀胱况瀉脉為攻血短脉為血
耗遂令於溺後視之有初出如敗膿者否視之果然思
之忍痛則血傷叫號則傷氣遂先治淋今取杜牛膝根
莖葉閉煎取膿汁却實四物湯作大料与服三日後痛
漸減前所謂敗血者至是漸少五七日淋病全愈此時

瘡勢亦定蓋四物能生血也但飲食減少瘡未收斂
耳遂用參芪當歸白朮四藥大利於危器熬為膏以陳
皮半夏縮砂木香並取清汁調膏藥飲之遂漸能食及
一月而瘡安

一方名血餘散治血淋內崩吐血舌上出血便血用亂
髮以皂角水洗淨晒干燒灰為末每服一匙以茅根車
前少煎湯調下

斗門治五腫淋用芎麻根兩莖打碎水一椀半並半碗頻
服即通大妙丹溪云芎麻補隊行治血

博治濟五淋赤芍藥一兩檳榔一個麩裹煨為末每一匙
匕水一盞並至七分空心服

氣虛者重

氣虛淋八物湯加黃芩並牛膝汁並服老人氣虛亦能

淋參朮中加木通山梔

仁八姪淋病脉沉而大此主勞苦傷血下焦蘊結

人參

歸尾

白芍

香附五分

条芩

木通三分

山梔炒一分

芩半斤

生甘少楸半斤

分六帖杜牛膝湯兩盞並取淺盞食並執飲之

胡云六朝奉七十餘日擲後誤與京芥大黃等藥傷正

氣以致要血結聚今則小便如淋中滿食少此治之

生芪三分

人參三分

歸頭

白朮

陳皮一分

作一帖

又生氣藥

縮砂 三分
海金沙
細曲 二分
檀香 二分

木香
白豆蔻 一分
丁香 一分

分六占 桃仁 十四个 入生氣散

死血作淋牛膝膏妙但虛人能損胃不食

元氣虧者
味行汚血

本事治婦人諸般淋苦杖根俗呼杜牛膝多取淨洗碎之
以一合用水五盞煮至一盞去渣用射香乳香少許研

調下

鄞縣武尉耿斐得其內人患砂石淋者十三年矣每於
痛楚不可忍溺器中小便下砂石剝、有聲百方不効
偶有此方服之一夕而愈目所見也

千金方用牛膝以酒煮服治小便淋痛肘後方并用牛
膝根莖葉亦以酒煮服小便不利莖中痛欲死及治婦
人血結堅痛如神蓋牛膝治淋之聖藥也但虛人當用
補劑盪之宜

世茄樹散治放尿有內帶血綠童子便並茄樹根汁服之効
羅琥珀散治玉淋澁痛小便有膿血出

琥珀研

海金沙研

沒藥研

蒲黃

各一兩研

右研為細末每服三匙食後並萱草根湯調下日二服
中統三年六月間黃明之小便淋莖中痛不可忍相引
脇下痛制以茯苓琥珀湯主之

川練子

去核炒

生甘草

各一兩

人參

五兩

玄胡索

七兩

茯苓四分 琥珀 澤瀉 當歸 柴胡各三分

右吹咀都作一服長流水三盞並至一盞去渣溫服

空心食前服數大効

瑞竹治諸砂石淋琥珀二分研細空心用葱灯濃煎湯調

下無問諸狀淋证一二服立効丹溪云琥珀古今用者

有反受其慘急之甚耳本草云琥珀消血極驗

無擇鹿角膠丸治膏淋

鹿角膠 白茯苓 枳實各等分

石為末糊丸梧子大每服五十丸米湯下

圖經治石淋道水用蜚蛭一枚鹽二兩同於新瓦上鋪蓋

焙干研末溫酒調下一分七服之即愈

真執一

靈苑治五種淋漓血淋氣淋熱淋勞淋石淋及小便不通
至甚者透鬲散用硝石一兩不夾泥土雪白者亦研為
細末每服二錢諸淋各依湯使如後勞倦虛損小便不
能小腹痛莖子並湯下通後更次服補虛丸散血淋小
便不出下血疼痛並用冷下調下氣淋小腹滿急尿後
常有餘瀝木通並湯下石淋莖內痛尿不能出內引小
脛膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚子內
隔帛炒至帛焦為度再研令細用冷水調下小便不通
小麥湯下卒患諸淋並只以冷水調下並空心米調使
藥消散如水即服之更以湯使送不眠諸藥未効者服
此立愈

子和栢亭劉十三之子年六歲病行石淋截人以苦劑三
涌之以益腎散三下之立愈

鹿邑一閩閩家有子二十三歲病膏淋後三年矣鄉中醫
不能治往京師扁訪多作虛損稍以溫燥灼之針艾無
少減聞裁人僑居隱東見裁人口惑蠱之疾也亦曰白
淫實由少腹宛熱非虛也可以涌之法其人以時暑掉
其法峻細次者三日浮屠一僧曰予亦有暑病近覺頭
痛裁人曰亦可痛願與君同之母畏也於是涌痰三升
色如黑礬汗內布死血并黃綠水又瀉積穢數行尋覓
病去方此未時而無人色及治畢次日面如醉裁人慮
其暑月路遙又憂數方便歸以自備云

屈村張氏小兒年十四歲病約一年半矣得之夏秋發
則小腸大痛至握其腹跳躍旋轉號呼不已小渡數日
不能下、則成砂石大便秘混肛門脫出一二寸諸醫
不能治聞裁人在朱葛寺避暑乃負其子而哀請裁人
裁人曰今日治今日動時日在辰巳聞矣以調胃承氣
僅一兩加牽牛頭末三分汲河水煎之令作三五度咽
之又服苦末丸如芍子許六十粒日加晡上漏下泄一
時引引出有膿有血涌瀉既覺定令飲新汲水一大中小
渡已利一二次矣是夜允飲新水二三十遍病去九分
止笑一次明日困卧如醉自晨至暮猛然起走索食於
毋歆笑自得頓擇所苦繼與太白散八正散等調一日

諸淋皆屬熱

大喜恐暑天失所養留五日而歸裁人曰此下焦約也
不吐不下則下焦何以開不令飲水則小便何以利大
抵源清則流清也 若未丸未考

丹溪云諸淋皆屬於熱余每服黃柏滋腎丸每百丸用四
物湯加生甘草梢杜牛膝木通桃仁滑石本者宜腹吞
服並灸三陰交如鼓應桴累試累效也

保淋問有涼膈散加滑石四兩茯苓一兩 涼膈散方見治發熱

羅石韋散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋混不豈出
少起數脬腹急痛或尿如豆汁或便沙石並皆治之

木通 一升
石韋 二升
滑石 三升
炙甘草 一升

王不晉行 二升
當歸 一升
白朮
瞿麥

芍藥 葵子各三升

右為細末每服 二升 小麦粥湯調下空心一方

加沉香陳皮無滑石瞿麥白朮木通

本事治驚熱小便澀及治五淋火府丹

生地黄 三升 木通 書 苦參 各一升

右為末煉蜜杵丸梧子大每服三十粒木通煎湯下

此藥治淋澁睛下滿痛

前二方解熱利小便兼補

無擇石燕丸治石淋多目憂鬱氣注下焦所結食醎氣而

成令人小便磳痛不可忍出砂石而後小便通

石燕子

燒令通赤水中淬一二次搗研水飛焙干

滑石

石韋 去毛

瞿麥穗 各一升

右為末糊丸梧子大益瞿麥灯心湯下十丸食前服

日二三

羅海金沙散治小便淋澀及下焦濕熱氣不施化或五腫

淋注瘙用不通

海金沙研

木通

瞿麥穗

滑石

通少 各半升

王杏仁湯洗去皮尖夫炒一升

右為細末入灯心同煎空心服

八正散治小便赤澀或淋閉不通及熱淋並宜服之

大黃

麩果

木通

瞿麥穗

滑石

篇蓄

車前子

山梔子

甘草各一斤

甘寒

右為末入灯心同煎小兒少與之

潔荜花散治小便淋澁經驗荜花根一味洗淨剉水煎五

七沸服之立効 味甘寒

世屬朴丸治男女淋病疼痛効速勿輕忽之

葛粉

沙糖 本少云治心肺大腸熱

和丸如格子大井花水化開一二顆

血石淋楊樹蛀稍烏棲一棗子大三水一盞煎服

酸寒

靈苑 治卒患諸淋遺澁不止小便赤澁疼痛三葉酸漿草

人家園林亭檻中着地開黃花味酸者是取嫩者淨研

絞自然汁一合酒一合攪湯煖令空心服之立効 三葉

酸漿少即布谷飯詳見白帝門

無擇葶少汁治膏淋及尿血葶少搗汁二升醋二合和空

腹脹一盞又濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

葶少俗草名辣母藤又名葛勒

曼延、篤籜上有之

胞移熱於膀胱則癰溺血

全文見診病傳變胞謂女子胞也

羅痺論云胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澁於小

便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能

出矣今以風寒濕邪氣客於胞中則氣不能化出故飽滿

水道不通其小腹膀胱按之內痛若沃以湯瀦於小便

以足太陰經交巔上入絡腦氣下貫於鼻竅則為清涕

也治胞痺小便不利腎着湯千金方河間方同

胞移熱於膀胱

脫

胞痺似淋

屬寒

按之痛若沃

小便澁多

涕焉胞痺

赤茯苓

去皮

白朮各四升

甘草

各三升

干姜

炮一升

右為末每服三升水二盞煎至一盞去渣溫服日三

茯苓丸治胞痺小便內痛

赤茯苓

防風

細辛

白朮

附子

澤瀉

官桂

各半升

瓜蒌根

紫苑

牛膝酒浸

黃芪

芍藥

甘草

各二分

生地黄

山茱萸

山芎

獨活

半夏

湯浸各一分

右十八味為細末煉蜜為丸如梧子大每服十丸溫酒

送下食前

巴戟丸治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟

去仁

桑螵蛸

麩炒

遠志

去心

生地黄

山芋

附子炮

續斷

肉從容

酒浸各一升

杜仲灸

石斛

鹿茸酥炙

龍骨

兔絲子

酒浸

五味子

山茱萸

官桂

十六味為細末煉蜜丸如梧子大溫酒下三十九空

心會前

腎澁湯治胞痺小腹急小便不利

桑白皮炒犀角屑

杜仲炙去絲

五加皮

麥門冬志木通

桔梗

赤芍藥五升

八味為粗末每服五升水一中半羊腎一个切竹瀝少許

同煎去渣溫服

諸淋皆屬於熱古方有冷淋蓋千百之一也今日

胞痺屬風寒濕故立此寒條

無擇瞑眩膏治諸淋疼痛不可忍受及沙石末大麥蘗切
一指厚四五片好白蜜淹少時安淨鉄鏟上慢火炙干
則又蘸蜜取盡二兩蜜番覆炙令香軟不可焦候溫細
嚼以鹽湯一盞送下立効

聖惠治冷淋小腸不利莖中急痛用斛葉搗末每服二升
水一中菘白七寸並六分去澤食前溫服

崔元亮療石淋便中有石子者胡桃肉一升細米煮漿
粥一升相和頓服即愈

胡桃性熱

運氣小便淋閉及針灸淋閉法並見小便不利門

仲淋家不可發汗發汗則必便血

運氣針灸
禁診

淋脉滑数

淋身热喘颈
脉盛手脉细
者不治

虚

血虚胎墜
水道不通
手托

淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中

腎脉滑實為癰瘻 全文見治虛實法下合

脾脉滑甚為癰瘻

脉少冰脉数煩人則陰中生瘡男子則氣淋

素有隆者一日數十渡此不是也身热如炭頸膺如格人

迎澤盛喘息气逆此有餘也太冰脉細微如髮者此不

是也其病安在名為何病岐伯曰病在太冰其盛在胃

頗於肺病名曰厥死不治奇病論○癰病脉細不治

胎前淋閉

丹轉胞病胎婦人之稟受弱者憂悶多者性急躁者食味

厚者大率有之方皆用滑利疎導藥鮮有作効目思胞

水通不通手托

醫者大率有之方皆用滑利疏導藥鮮有作效目思胞

為胎所壓展在一邊胞系自不通耳胞若舉起懸在中
 失胞系得踈水道自行然服之墜下必有其卧一日吳
 宅寵人患此脉之两手似瀉重取則弦然左手稍和予
 曰此得之憂患瀉為血少氣多弦為有飲血少則胎弱
 而不能自舉氣多有飲中焦不清而溢則胎前所避而
 就下故喜墜遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘少生
 姜空心飲隨以指探喉中吐出藥汁候少頃須氣定又
 與一帖次日亦然如是與八帖而安此法果為的確恐
 中偶耳經有數人歷、有效未知果何耶仲景云嬾人肌
 盛豆舉目痛滿令及羸瘦豆舉空減胞系了戾亦致胞
 轉其義未议必有知之者 胞嬾轉胞议

一婦人四十一歲妊孕九十月轉胞小便不出三日矣
下急脚腫不堪存活未告予急視之見其形悴脈之
右瀋而左稍和此飽食而氣傷胎系弱不能自舉而不
墜壓省膀胱偏在一邊氣急為其所困所以水竅不能
出也轉胞之病大率如此予遂製一方補血養氣血氣
既正胎系自舉則不下墜方有安之理遂作人參當歸
身尾白芍藥白朮帶白陳皮灸甘草半夏生姜濃煎湯
與四帖任子叫噉至次早天明吞以四帖藥查作二帖
並令頓飲之探喉吐出此藥湯小便立通皆黑水後就
此方加大腹皮枳殼青葱葉礞砂仁與二十帖與之以
防產後之虛果得就葶平安產後亦健

防產後之虛果得就等平胎產後亦德

輕者利之

一婦人妊娠七八個月患小便不通百醫不能利轉加
急脹診其脉細弱予意其血氣虛弱不能承載其胎故
胎重墜下壓住膀胱下口此溺不得出若服補藥升扶
胎起則自下藥力未到愈加急滿遂令一老婦用香油
塗手自產門入扶起其胎溺出如注脹急頓解一面却
以人參黃芪升麻大劑煮服或少者急滿仍用手執放
取溺如也三日後胎漸起小便如故

仲問曰婦人病飲食如故煩熱不得卧而及倚息者何也

師曰此名轉胞不得溺也滋以胞系子戾故致此病但利

小便則愈宜腎氣丸主之詳見八味丸治法酒下十五丸
如至二十九日再服

產書療小便不通及胞轉藥蠹蜻榘末米飲服方寸匕

日三服

仲姪娘有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩葵子

茯苓散主之

葵子一斤

茯苓三斤

右二味杵為散飲服方寸七日三服小便利則愈

姪娘小便難飲食如故歸母苦參丸主之

當歸

貝母

苦參各四斤

三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸男子

加滑石半斤

外臺治姪娘惠子淋猪苓五斤一味為末以白湯三合服

方寸匕漸至二七日三夜二

肺鬱

雜方

針灸

大全治妊娠卒不得小便杏仁一味去皮尖搗丸如大

灯心湯吞七粒得利

丹朱宅婦人三十餘歲四個月肺大小便秘因典通利冬
葵子等藥已通但氣未順此性急以血耗氣亂瀆和其
氣滋其血乃愈

陳皮 青皮 芍藥 人參 歸身尾

川芎 地黃 白朮 茯苓 木通 三分

甘草 二分

甲小便難水服溺出小胞轉不得溺曲骨主之

胞轉不得小便少腹滿関元主之

產後淋閉

活血氣

無擇治產前後淋其法不同產前當芩胎產後當去血瞿
麥蒲黃最為產後要藥

茅根湯治產後諸淋悉主之

白茅根八分

瞿麥穗

白茯苓

各四分

葵子

人參各二分

蒲黃

桃膠

滑石

甘草各一分

紫貝炒

石首魚頭中石

二十个燒

右列為末並服四分水一中半姜三片灯心二十莖並

至七分去渣溫服亦可為末末通並湯調下

大全療產後小便不通

陳皮去白

右為末空心溫酒調下分一服便通

灸

產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒用鹽填於臍中與
臍手却用葱白利簾皮十餘根作一縛切作一指厚安
鹽上用火艾炷滿葱餅大以火灸之覺熱氣入腹內即
時便通神驗不可甚述

小便數

書

虛寒

數而少為

寒

羅仲書右承合刺合孫病小便數而又昼夜約二十余行
腹臍填滿脚腰况疾不得安卧至元癸未季春下旬一
日奉敕治之遂往診視脈得沉緩時、帝亟常記小便
不利有三不可一緊而論津液偏滲於脇胃大便洩瀉
而小便澁小者一也宜分利而已執搏而也津液則濕
熱不行者是也必滲泄則愈脾胃暑氣澁不能通調水道

下輸膀胱而化者三也可順氣令施化而出右承平素
膏梁濕熱內藥不得施化膀胱竅澁是以起頻而見少
也非滲泄分利則不能決利遂更一方名曰茯苓琥珀
湯內經曰甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍腹脹滿當須
緩之泄之必以甘淡為主故以茯苓為君滑石甘寒滑
以利竅澁猪苓琥珀之淡以滲泄利水道以枳三味為
臣脾裏濕之氣內蓄則脾氣不治益脾勝濕必以甘為
助故以甘少白朮為佐醎入腎醎以瀉泄為水澤瀉之
醎以泄伏水腎裏燥急食辛以潤之津液不行以辛散
之桂枝味辛散濕以潤燥此名目用故以此味為使並
長流甘瀾水使不助其腎氣大作湯劑令宜達於下而

急速也兩服減半旬日良愈

茯苓琥珀湯

茯苓

琥珀

各半

官澤瀉

一升

猪苓

半升

滑石

七升

白朮

半升

甘草

炙

右為細末每服秤五升並長流甘潤水一盞調下空

心食前待少時以美饌壓之

食醫主下焦虛冷小便數損無力生薯蕷半斤刮去皮

以刀切碎爛於鐘中煮酒飲下薯蕷不得攪待熟者鹽

葱白更添酒空腹飲三盞妙

羅水芝丸治下焦真氣虛弱小便頻數日夜無度

蓮肉

去皮

蓮肉

入肚

中多少

用多少

為度

水煮

熟取

出將

蓮肉切焙干

為而為虛

石為末醋煮麵糊為丸如雞頭子大每服五十九溫
米湯下食前

世治夜多小便

益智二十四人

右為末鹽半升水一盞煎八分溫服

本事衛真湯治丈夫婦人元氣憊榮衛怯弱真陽不固三
佳不和上盛下虛夜夢鬼交覺未盜汗面無精光唇口
干燥耳內蟬鳴腰背倦痛心氣虛弱精神不寧驚悸健
忘飲食無味日漸瘦悴外腎溫痺夜多小便腰重冷疼
牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不
調或过期不至或一月兩來赤白帶下漏分五色子宮

感寒久而不成孕並皆治之此藥大能生氣血遇夜未
子時腎水旺極之陰償腎收操男子攝血化精實丹田
填五藏諸病未萌之前皆能制治使不復為梗是此藥
也每服多寡具列在後

川當歸三月酒浸一宿 人參一兩 金釵石斛五

白茯苓 木香 肉豆蔻

山藥已上各三兩 生干地黄二兩半 丁香一兩

熟干地黄溫水洗三月 青皮一兩去皮 川牛膝二兩童子小便酒各半蓋浸一宿

右為細末每服三大匙溫酒調下鹽湯亦得空心食前

一服婦人諸疾童便同煎調空心下

又方治男子婦人一切虛冷之疾活血駐顏減小便除

盜汗治婦人久不生產似帶疾而非時有遺瀝並皆治
之功驗不可具述

蒼朮 切焙

川練子

苗香

吳茱萸

湯浸洗去子閉目者

破故布

胡蘆芭

已上各一
斤並炒

川姜

川烏

少烏 已上各
半斤炮

山藥 二斤

右各精細炮治如法同為細末米醋糊為丸如梧子
大每服十五丸空心溫酒鹽湯任下婦人艾醋湯下

日二服耳目永不昏聩髮不白

衍義鄰家有一男子小便日數十次如調米泔色赤尚心
神恍惚瘦瘵食減以女勞得之令服此藥蝶蛸散未終
一劑而愈安神魂足心志治健忘小便如補心氣藥蝶

恍惚怔忡者
澁

蛸散遠志菖蒲龍骨人參伏神當歸龜甲醋炙已上各
一兩為末夜以人參湯調下二升

海上姜附石脂神砂丹治小便數而不禁怔忡多忌方帝見下

東垣云曰看盧氏醫鏡見此一藥味數分兩同惟丹砂用
伏火者乃治病有差所治者小便數而不禁怔忡多忌
魘夢不已同耳見其不同審而詳之乃得此三治法不
差且沒論之經言右腎主小便淋瀝難經云小腸為赤
腸是面赤七及便溺色赤皆幽小腸南方色見於外也經
言下焦如燄者正謂大小便必大便為冰為有形可下
之者也腎藏病為腎主大便不言大腸者明子行父之
道小便為氣所化下焦之高者謂肝主小便淋瀝亦是

子行父之道為正病諸無形氣化者皆府病所主諸有形血化者皆藏病所主此府言膀胱病此二証俱在下焦則同藥有形無形及在府在藏有殊俱是衰敗不言心火者以其相火如行君之政令也細不之則膀胱壬水勝丙火小腸者不傳入膀胱改為泄血泄血利不禁為有形質病且不傳膀胱而膀胱不病何為有形病此為膀胱之體也為而之用也天地水火互為體用以期互見是五藏者六府所用六府者為五藏所用明矣是有形皆為傳膀胱也大小便不禁是膀胱不禁為遺溺此不傳膀胱也是丹田胞絡受寒為壬所克大抵諸府皆成有形物有形病皆府責所未皆在藏也用伏火丹砂者去其寒性

移病皆府責所未皆在藏也用伏少丹砂者去其寒性

耳治法同者以其俱在下焦補無形火同在胞絡耳以

其胞無腎相對有渠相通故也腎主大便肝主小便所

治安得不殊經曰腎肝同歸一治又曰少陽所主骨所

主病膀胱所主筋所生病亦可知也小便不禁茯苓

湯下大便不禁米飲下

運氣小便數皆屬火經云少陽之復便數省風是也

小便數惟二藏有之

一屬肺經云肺手太陰之脈氣盛有餘則餘則肩背痛

風寒汗出便數而欠是也以利言之寫手太陽則愈

一屬肝經云足厥陰之瘡令人如癢狀非癢也數便又

云肝病有夜卧則驚多飲數小便是也視虛實補寫

運氣火

針灸上

數而欠屬

肺

數而卧則

驚屬肝

針灸下

之則愈

東陽小便數腹痛

尿胞

在土泉下寸屈骨端

玉龍小便多

命門

通手壯灸

腎金

一合及白外六分補六呼

集成小便滑數

中極灸

腎命陰陵泉下已取

氣海陰谷三陰交

溺赤

寒熱

諸病水液渾濁皆屬於熱全文見診

小便黃者少腹中有熱也全文見水腫

小便黃無如黃柏知母

脉溢胫冷

为寒脉

藏府

热病者属

肝

消穀者胃

实

为肺肾

虚

運氣

風

尺脉濡豆胫逆冷小便赤宜附子四逆湯針之太衝補之

藏府小便黃有四

一属肝热经云肝热病者小便先黃是也

二属胃实经云胃足陽明之脉气盛则身已前皆热其有餘於胃則消穀善飢溺色黃是也

三属肺虚经云肺手太陰之脉气虚则肩背痛寒少气不通以息溺色变是也

四属肾虚经云冬脉者肾脉也冬脉不及令人眇清脊痛小便变是也

運氣小便黃有二

一属風经云厥脉之勝眩脇气并化而為热小便黃赤是也

浙

針灸

二屬熱經云少陽司天熱淫所勝病溺凡赤又云少陽之勝溺赤善驚又云陽明司天燥氣下臨暴熱至土乃暑陽氣鬱發小便變是也蓋暴熱謂地氣少陽之熱也邪之所在水為不足中氣不足溲更烏之變補足外課下留之全文見刺虛寔法

甲小腸有熱溺赤黃中管主之

溺黃下廉主之

小便黃赤完骨主之

小便黃腸鳴相逐上廉主之

遺溺

垣小便遺失者肺氣虛也宜要臥養氣禁勞役以黃芪人

上虛少氣
下虛

參之類補之不食當責有執加黃柏生地黃

甲乙云肺脈虛則少氣不

且以息卒遺失無度

下虛治膀胱下焦虛經云水泉不止者是膀胱不藏也

仲景云下焦竭即遺溺失便其氣不能自禁制不須治久

則金又云下焦不歸則遺渡○世用桑螵蛸雞脬脰之

類治之是也



丹治遺溺桑螵蛸酒炒末之姜湯下二升妙

無擇雞心金散治溺床失禁

雞脬脰

一具并腸洗淨燒為灰男用雌男
女用雄即是雞脬內黃皮

右研為末每服二升酒飲調服妙

又方用羊肚系盛水病線紵兩頭煮熟取中水頓服之善

澁可去脫

山居大人遺水不知薔薇根細研酒下
丹鹿茸丸治久虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸

柘紅

桂

附子

牡蛎

補骨脂

石斛

肉苁蓉

雞陛屋

沉香各一兩

桑螵蛸三分

右為末酒糊丸梧子食前酒下三十九

此方有沉香解諸
澀故丹溪取之

又方鹿角削屑炒黃末之溫酒下二升

本少云鹿角逐
味中和氣栗

鹿茸丸

方見虛條

河間熱甚客于腎部干於足厥臥之經而延孔鬱結極甚

而氣血不能宣通者則痿痺而神無所用故液滲入膀胱

而旋溺遺失而不能收禁也是以經曰目得血而能

虛寒

寒

寒鬱結

視耳得血而能聽手指得血而能攝掌得血而能握足
得^血而能步藏得血而能液府得血而能氣然血所通流
則氣亦然也氣血宣行則其中神自清和而應機能為
用矣故經曰血氣者人之神不可不謹養也故諸所運
動時習之則氣血通利故為用之善能也閉塞之氣血
行微而其道不得通利故劣弱也若病熱極甚則鬱結
而氣血不能宣通神無所用而不遂其機也隨其鬱結
之微甚而有不用之大小烏是故目鬱則不能視也耳
鬱則不能聽也鼻鬱則不能聞香臭舌鬱則不能知味
如今筋痿骨痺諸所出不能為用皆鬱結之所致也
丹千金翼白薇散治尿出不知時

白薇 本草云
氣大寒

白芍藥 各等分

右為末温酒調下方寸七日三食前服

嘗治一男子遺溺不覺脈洪盛以黃柏知母杜牛膝

為君青皮甘少當歸為臣木香為佐桂葉小為佐服數

帖大効此法三益白薇散皆河間所謂熱甚延孔鬱

結神無所用不能收禁之意也

淫氣遺尿痺

胃在腎

滲泄

世神芎導水丸治遺尿有實熱者每百丸空心白湯下若

服利止後服

此法即河間所謂延孔鬱結不能收禁也
謂淫氣遺溺痺聚在腎痺謂氣血不宣通也

無擇滲泄茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁及

遺泄白濁

赤茯苓

白茯苓

雜方

嚙下

右為末新汲水接洗澄去新沫按干削形地黃汁同與好酒銀石器內熬成膏樓和為丸如彈子大空心煎酒

世用薏苡仁鹽炒並湯服之効方見小兒

本事燕蓍草主睡中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦

主噦氣此燕窠中草也



膀胱効者効而遺溺全文見効

針灸遺溺法有四

其一取肝其二取督脉其三取三焦並見前遺溺閉癰

其四取肺經云手太陰之別名曰列缺其病虛則欠缺

小便遺數取之去腕半寸別起陽明者是也

針灸上
肝督三焦
肺

効遺溺

針灸下

東陽餘尿失禁

陰陵泉

陽陵泉 二寸半

大敦 七壯

又法

曲骨灸

陰陽二陵泉 各二寸半

甲遺溺関門及神門委中主之

氣癰小便黃氣滿虛則遺溺石門主之

肝脉微滑為遺溺 全文見治法

大舍白薇散治妊娠遺尿不則出時 方見前熱條

產書一味桑螵蛸治妊娠小便數不禁 方見前下虛條

又方用雞尾毛燒灰末酒調方可也

產遺溺尿

診

熱

虛 雜方

虛
胞產毒傷尿

無擇嬾人產毒產理不順致傷膀胱遺尿無時

丹嘗見尿胞目取生者不謹以致破損而得淋瀝病為癢

疾一日有餘嬾年壯得此目思肌肉破傷在外者且可

補完胞雖在腹恐亦可治遂診其脈虛甚曰難產之曰

多是氣虛難產之後血氣大虛誠與峻補目以參朮為

君芎歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐而並以猪羊胞

中湯極飢時飲之但劑率用一兩至一用善安之氣吐

驗長其胞自完恐稍遲緩亦難成功

喬町嬾人產後尿不禁面微浮暑發挑見於午後此膀胱

為生淡取傷

黃芪三分

歸身尾分半

芍藥一分

白朮一分

澁可去脫

人參 陳皮 半夏 炙甘草

煎食前飲之

云岐桑螵蛸散治產後小便數及遺尿

桑螵蛸 三十个 鹿茸 酒炙 黃芪 各三月 杜斫 煨

人參 赤石脂 厚朴 各二月

右為細末空心米飲調下三錢

又方

桑螵蛸 半斤 龍骨 一斤

右為細末米飲調下二錢空心

前陰諸疾

陰縮 尿從

陰痿 尿汗 尿冷 尿痒 尿臭 陰腫 尿痛 尿吹

肝督脉

前陰所也之脉有二一曰肝脉二曰督脉經云肝足厥

所過

陰之脉陰入毛中過陰器抵少腹是肝脉所過也督脉者起於少腹以下骨中央女子入繫庭孔循脉治男子循莖下至篡與女子等是督脉所過也

陰縮陰縱

陰縮謂厥陰受寒縮入腹內也陰縱與前脉受熱挺長不收也經云足厥阴之筋傷於寒則陰縮入傷於熱則挺不收治在行水清陰氣是也

寒熱
肝筋寒則
縮入
肝筋熱則
陰挺出

丹鮑兄二十餘歲前脉五變挺長腫而癢皮塌常潤磨股不能行兩脇氣上手足倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其濕熱次又畧加黃柏降其逆上之氣其挺腫漸取漸減及半但莖中有一堅塊未消遂以青皮一味為君

針灸

挺長

溝外縮灸臍下

診

縮而任妄不

正者死于秋

縮舌卷喜溺

者肝已溷

位以散風之劑內服外以絲瓜汁調五味子抹之而愈

肅平江王氏子三十歲忽起挺長腫而痛脈數而實

用朴硝荊芥煎湯浸洗又用三十承氣湯大下之愈

內經刺灸前陰挺長之法有一經云是厥陰之別名

曰蠃蟲溝舌內躁五寸別走少陽其病實則挺長取之

所別是也

圖

明堂外陰入腹

臍下六寸兩旁各一寸六分灸三七壯

內經診脈縮而死者皆屬肝傷經云肝悲哀動中則傷

魂、傷則狂妄不精、則不正當肝縮而掌筋兩

傷骨不舉毛悴色天死于秋又云厥脈終者喜溺舌卷

肝

陰痿目傷

筋

冰厲痒屬

酒濕

卵上縮是也

陰痿陰汗陰冷陰痒陰臭

陰痿皆耗散過度傷於肝筋所致經云足厥冰之筋其病傷於內則不起是也

垣陰痿陰汗臊臭論曰一陰者前陰間常聞躁臭又曰連

日飲酒腹中不和予虞之曰夫前陰者足厥冰之脉絡

陰器出其挺末夫臭者心之所主散入五方為五臭入

肝為躁臭此其一也當於肝經中瀉其行間是治其本

沒於心經中瀉少衝乃治之標其要針當用藥陰之治

法當其求其連日飲酒夫酒氣味俱厚能生裏濕熱是

風濕熱合作下焦為邪故經云下焦如瀆又云在下者

引而竭之酒者是濕熱之水亦宜決前陰以去之是合
下焦二法之治

清震湯治陰部時復濕痒有臊臭

柴胡梢一分 澤瀉一分 車前子半分 木通半分

生地黃一分 當歸梢三分 草龍膽三分

右剉如麻豆大作一服水三大中並至一中去滓稍
熱服空心宿食消尽服之便以美饌壓之柴胡入肝
為引用澤瀉車前子木通真淡滲之味利小便亦降
臊氣是名在下者引而竭之生地黃山龍少之苦寒
瀉酒濕熱更蕪車前子之類以徹肝中邪氣主用
當以肝中血不足也

口真湯治兩丸冷前陰痿弱陰中如水小便後有餘滴
臊氣尻醫并前陰冷惡寒而喜熱膝冷正月內此方

升麻梢

柴胡梢

羌活梢 各一分

炙甘草

澤瀉 各一分半 草龍膽

知母 黃柏 各二分

右剉如麻豆大水三升中煎至一中去渣稍熱空腹服
之以美膳壓之



溫腎湯治面色痿黃身黃脚軟弱無力尿汗尿莖有夭
色二月定此方

麻黃 六分

防風根 一分

白木 一分

蒼朮 一分半

澤瀉 二分

猪苓

白茯苓

酒黃柏

升麻 各一分

柴胡梢 六分

右件分作二服每服水二大中去薑至一中去滓稍煎
服食前天晴明服之候一時辰許方食

補肝湯治前陰如冰冷并陰汗兩脚痿病無力

黃芪七分 人參一分 葛根三分 炙甘草五分 升麻四分

柴胡二分 羌活二分 陳皮二分 當歸身三分 黃皮一分

炒黃柏二分 白茯苓三分 澤瀉三分 蒼朮半斤 曲米二分

猪苓四分 知母一分 防風三分

右以咀水二大中去薑至一中去滓稍煎服食前忌酒麪

龍膽瀉肝湯治溺黃臊臭淋瀝兩丸如冰陰汗浸及兩

股尿頭亦冷正值十二月天寒凜冽雪霰交集寒極矣

升麻半斤 柴胡五分 羌活根一斤 酒黃柏一斤 蒼朮三斤

防風根三分 炙甘草二分 藁本二分 紅蒼一分 當歸身三分

猪苓三分 澤瀉 黃苓 麻黃根三分

劉如豆大都作一服水 二大 中 煎至一中 去 查 臨 卧 服

大忌酒麪

柴胡勝濕湯治腎冷兩痺樞冰汗前陰痿弱陰囊濕痒

臊氣

圖

澤瀉半斤 羌活梢半斤 升麻梢半斤 生甘少梢

柴胡梢 草龍膽一分 酒黃柏二分 紅蒼少許

當歸梢 麻黃根 浙 漢 防 已 茯苓各一分

五味子 二十个

吹咀水三大 中 煎 至 一 中 去 滓 稍 煎 服 食 前 忌 酒 麪 房 交

腎診

運氣

雜方

垣仲景八味丸治陽事多痿不振冬依全方夏減桂附半

春秋三停減一

疾去精足全減桂附只服六味
地黃丸〇八味丸方見治法

腎脉大甚為陰痿全文見診

運氣陰痿皆屬濕土制腎經云大冰司天濕氣下臨腎
氣二從陰痿氣大衰而不起是也

枳粉散治前陰兩丸濕痒痛秋冬尤甚夏月減

麻黃一分 黑狗子半斤 班猫二个 猪苓三分

肉桂二分 當歸梢三分 輕粉少許 紅卷少許

蛇床子半斤 小枳二分

為細末干搽上避風寒濕處坐卧

丹腎囊濕痒先以吳茱萸煎湯洗之後用吳茱萸半兩寒水

陰暴冷

三升黃柏二升半獐腦蛇床子各半兩輕粉十盞白
凡三升硫黃二升椒柳三升白芷三升為末搽之

千金有人陰冷漸、冷氣入陰囊腫滿恐死日夜痛悶不
得眠取生樹擇之洗淨以帛布裹為丸囊冷厚半寸泊
更熱氣大通日且易之取虫差

本草曾有人陰冷漸冷吹氣入陰囊腫滿恐死夜冷悶不得
眠煮大蓊根汁服之差也

內經灸刺陰暴疝補足厥陽之别名曰蠹溝上內踝五
寸是也 全文見針灸門

撮要陰痿

關元補

陰濕

陰谷 一寸半 寫灸

怪穴 陰中濕痒外腎生瘡

海底 在臍囊底十字文隆中 灸寫二七壯

腎氣

獨陰 在足第二指節下橫紋灸 寫二七壯

丹頰人陰腫堅痛枳實半斤切碎炒熱布包熨之冷即易秘錄

交按勞復陰

交按勞復陰 卯痛見勞復 臥臥易

仲胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也骨髮並導之方見黃痺

潔一男子臥頭痛女子陰中痛

針灸

雜方

大敦

集成陰莖虛痛

中極太溪三陰交復溜

不已取血都陰陵泉関元海底

甲婦人陰中痛少腹堅急痛冰凌泉主之

女子陰中冷婦未主之

筋 轉筋 霍亂轉筋

靈足太陽之筋起于足小指一結于踝邪二結于膝其下

循足外倒結于腫上循跟結于腓其別者結于腓外上

腓中內床與腓中并上結于臂上揆脊上項具支者別

入結於舌本其直者結於枕骨上頭下顏結于鼻其支

者為目上綱下結于頰其支者從腋後廉結于肩髃其

經筋診
治

燔針劫刺筋
病以知為
以痛為愈

支者入腋下上出缺盆上結于完骨其支者出缺盆邪

上出于頰其病小指支踵痛脰掌脊反折項筋急肩不

舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔針劫刺以知

為數以痛為輸名曰仲春痺經脈篇曰以知為為少痛

之法但以知覺所針之病在通筋之痛處非如邪經脈去

有淺子淺及有之定數也但通筋之痛處非如邪經脈去

取經脈法有井榮俞經合之定穴也

足少陽之筋起于小指次指上結外踝上循胫外廉結

于膝外廉其支者別起外輔骨上走髀前者結于伏兔

之上後者結于尻其直者上乘眇季脇上走腋前廉繫

于膺乳結于缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循

耳後上額角交巔上下走額上結于頰支者結于目眥

足陽明筋
寒急則目不
合
熱緩則自不
開
寒則引頰
口僻宜射
熱則頰不
能收且鈎

為外推其病小指次指支轉筋引膝外轉筋不可屈伸
腓筋急前引髀後引尻即上乘眇季脇痛上引缺盆膺
乳頸維筋急從左之右右目不開上過右角并驕脉而
行左絡于右故傷左角右足不困命曰推筋相交治在
燔針剗刺以知為數以痛為輸名曰孟春痺也

足陽明之筋起于中三指結于跗上邪外上加于輔骨
上倍于膝外廉直上倍于髀樞上循脇屬脊其直上循
髀結于其支者結于外輔骨合少陽其直者上循狀
兔上結于髀聚于陰器二腹而布至缺盆而結上頸上
挾口合于頰下結于鼻上合于太陽為目上綱陽明為
目下綱其支者從頰結于耳前其病足中指支胫胫

轉筋脚跳堅伏兔轉筋髀前腫腹筋急引缺盆及頰卒

口辨急若目不合熱則筋縱目不用頰筋有寒則急引

頰移口有熱則筋施縱緩不勝收故僻治之以為膏、

其急有以白酒和桂以塗其緩者以桑鈎鈎之即以主

桑灰置之坎中高下以坐茅以膏熨急頰且飲美酒噉

美炙肉不飲酒者自強也為之三附而已治在燔針刺

刺以知為數以痛為輸名曰季春痺治在燔針之上當

宜如足是厥敗筋行水清氣之緩者則不宜蓋燔針但

口拊方武切擊也拍也蓋治口喝僻之法以火烘馬之

脂膏熨其半也急者以白酒調和桂去塗其半也緩者

又以桑鈎鈎其口吻之偏僻復於頰塗之以收其復

蓋其桑鈎之別用線繫縛於頰之皮使勿走使也復

飲酒噉肉使筋脈柔和以助外之塗熨不飲酒者則自

強其筋骨使正以手拊拍其處取之也張子云和左
偏於右者左寒右熱偏於右者右寒左熱夫寒不可徑
用辛熱之劑蓋左中寒則逼熱於右、中寒則逼熱於
左腸氣不得
豈行故也

足太陰之筋起於大指之端內側上結於內踝其直者
終于膝內輔骨上循胫股結于髀聚於陰器上腹結于
臍循腹裏結于肋散于胸中其內者着于脊其病足大
指支內踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引髀而痛陰器
痛下引臍兩脇痛引膺中脊內痛治在燔針劫刺以
知為數以痛為輸命曰孟秋痺也足少陰之筋起于小
指之下並之太隄之筋邪走內踝之下結于踵與太隄
之筋合而上結于內輔之下並太隄之筋而上循陰腹

足太阴筋急
則腰反折不能
足少阴筋急
則不能仰

结于踝者循脊内挟脊上至项结于枕骨其之太阴之
筋合其病足下转筋及所过而结者皆痛及转筋病在
此者主痠痿及瘕在外者不能倪在身者不能仰故跌
病者腰及折不能倪阴病者不能仰治在燔针刮刺以
知为效以痛为输在内者熨引饮药此筋折纽、黄甚
者死不治名曰仲秋痺也



足厥阴之筋起于大指之上上结于内踝之前上循胫
上结内辅之下上循踝股结于踝器络诸筋其病足大
指处内踝之前痛内辅痛阴股痛辅筋踝器不用伤於
内伤於内则不起伤於寒则踝缩入伤於热则挺挺不
收治在行水清踝气其病转筋者治在燔针刮刺以知

骨其支者入耳中
直者出耳上下結
于頷上屬目外瞤
其病小指支肘肉
銳

為數以痛為輸以痛季秋痺也

手太陽之筋起于小指之上結于腕上循臂內廉結于

肘內銳骨之後彈之應小指之上入結于腋下其支者

後廉廉上繞肩脾循頸出走大腸之前結于耳後完

骨後廉痛循臂入腋下腋後廉痛繞肩脾引

頷而痛應耳中鳴痛引頷目瞑良久乃得視筋急則

為筋痿頸腫寒熱在頸者其痛當所過者支轉筋治在

燔針劫刺以知為亟以痛為輸名曰仲夏痺也寒熱在

下有衍文四十一字令不剛入也中有甚者其為腫者復而銳之八字當移在名曰仲夏痺之上

手少陽之筋起于小指次指之頷結于腕上循臂結于

肘上繞臑外廉上肩走頷合手太陰其支者當曲頰入

繫舌本其支者上曲牙循耳前屬目外眦上乘頷結于
角其病所當過者即支轉筋舌卷治在燔針刮刺以知
為返以痛為輸名曰季夏痺也

手陽明之筋起于大指次指之端結于腕上循臂上結
于肘外上臑結于髀其支者繞肩脾挾脊直者從肩髀
上頸其支者上頰結于頰宜者上出手太陰之前上左
角絡角頭下右額其病當所過者支痛及轉筋肩不頤
舉不可左右視治在燔針刮刺以知為數以痛為輸名
曰孟夏痺也

手太陰之筋起于大指之上循指上行結于緩行寸
口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結肩

前髑上結缺盆下結胸散貫貫合貫下抵季脇其病當
所過者支轉筋痛甚成息責脇急吐血治在燔針劫刺
以知為數以痛為輸名曰仲冬痺也

手心主之筋起于中指與太隤之筋並行結于肋內廉
上臂隤結腋下散前後挾脇其支者入腋散胸中結于
臂其病當所過者支轉而前及胸痛息責治在燔針劫
刺以知為數以痛為輸名曰孟冬痺也

手少隤之筋起于小指之內側結于銳骨上結肘內廉
上入腋交太隤挾乳裏結于胸中循臂下繫于腋作臂者
其病內急心承伏梁下為肘痠其為當所過者支轉筋

筋痛治在燔針劫刺以知為數以痛為輸其成梁伏喙

羊少隤筋成
伏梁喙膿
而不治

筋寒急用燔

針
熱從不用燔

針

筋
宜耐引

筋病在節
屈而不伸

肝

肝主筋

而膿者死不治名曰季冬痺也

經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛從不收陰痿不用

臥急則反折臥急則腕不伸灸刺者刺寒急也熱則筋

從不收無用燔針

是臥明之子之太臥筋急則口目為癖昔急不能卒視

治皆如右方也

刑樂志苦病生於筋治之以熨引全見治法

諸筋病屬於前節治之以熨皆屬於節又云手屈

而不伸者病在筋是也

肝主諸筋經云肝主筋又云在藏為肝在體為筋又

云酸生肝、生筋、生心是也

禁忌

筋病忌食酸
忌辛忌遠行

血熱

雜方

筋病忌風忌食酸辛忌久行經云風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸又云酸走筋無病多食酸又云多食辛則筋急而爪結又云少行傷筋是也

轉筋

丹轉筋皆屬血熱四物加黃芩紅芍蒼朮南星
大指轉上未至大腿近腰結了奉養厚曰酒感寒而作
四物加芩紅芍蒼朮南星

聖惠治肝虛筋轉用赤蓼莖葉切作三合水一盞酒三合
芎藭四合去渣溫分二服

孫尚治脚轉筋疼痛掌急松節一兩細剉如米粒乳香
一系右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留一分性出

轉筋入腹

火毒研細每服一匙至二匙熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

外臺治轉筋取故綿以醱酸浸甑中蒸及熟用綿裹病人脚冷更易勿停差止

仲轉筋之為病人其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹者雞屎白散主之

雞屎白

右一味為散取方寸匕以水六合和溫服

丹轉筋偏身入脇不忍者作極醜鹽湯於槽中暖浸之

靈轉筋于跌治其跌轉筋于跌治其跌皆焯刺之四時氣

即徑取論以痛為輸之法蓋用火燒燭針刺刺轉筋之時當察轉筋之痛在何處轉筋之痛在跌刺在跌刺

針灸下

診

六經霍亂

轉筋皆作

虛治

身熱脈長

屬少陰

頭疼脈浮

屬太陽

脇痛脈弦

屬少陰

臥隨其所痛之處刺之故曰以痛為痛為輸也若一次亦
知竟其効則再刺之以知竟其効初為度故曰以知為効也
實轉筋而疼灸下山面可治

足太陽之下血氣皆少則喜轉筋踵下痛全之見治法

霍亂轉筋

海吐瀉轉筋身熱脈長陽明本病也宜和中四君子湯平

胃散建中湯四君子湯方見治虛定法虛氣條

每服一兩水三中生薑五片煎至一中去滓溫服

如吐瀉轉筋自汗脈浮者四君子加桂五苓主之

如吐瀉轉筋頭痛自汗脈浮者四君子加麻黃五苓主之

如吐瀉轉筋下痛脈弦者宜建中加木瓜柴胡湯平

胃散加木瓜五苓亦可也

腹痛脈沉細
屬太陰

四支拘急脈
沉遲屬少
陰

桂枝二升 芍藥三升 甘草一斤 膠飴半升

生薑半斤 大棗一斤 木瓜五升 柴胡五升

別如麻豆大每服一兩水三升首至一中半去渣下膠

飴兩匙煎化服

如吐瀉後小便不通胃中實痛者四君子湯加大黃兩主之

如吐瀉轉筋腹中痛體重脈沉而細者宜四君子加芍

藥高良姜湯

四君子湯四味各一斤 芍藥良姜各五升同煎服

如吐瀉霍亂四支拘急脈沉而遲者宜四君子加姜附

厚朴湯

四君子四味各一斤 生薑附子厚朴炮制各三升同煎服

四支厥冷
脉微缓属
厥阴

寒热

渴为热

吐瀉轉筋四支厥冷脉微緩者宜建中加附子當歸

桂枝 一尺

當歸 三斤

芍藥 二尺

甘草 半尺

膠飴 半斤

生姜 一尺

附子 三斤

大棗 六斤

同前煎服

活香薷散治非時霍亂吐瀉煩燥汗出轉筋疼痛不可忍

方見傷風吐利門

圖

丹治六官霍亂泄多吐少口渴脚轉筋

滑石 三斤

白朮 二斤

蒼朮

厚朴

干薑

陳皮 各一斤

炙甘草

木通 一斤

姜 二片

下保和丸四十粒

本草霍亂轉筋香薷煮汁飲之無不差者

不渴為寒

肘收治霍亂心腹脹痛煩短氣未得吐下若轉筋燒梔子

二七枚研末熟水調下

保霍亂轉筋不止吐利不正宜半夏湯

半夏曲

茯苓

白朮各半斤

甘草炙

淡桂

二斤

為末渴者涼水下不渴溫水下無時

如吐瀉不止身無汗者可與瀉痢門漿水散並桂枝湯

又可與白朮湯

直指木瓜湯治霍亂吐瀉轉筋擾悶

木瓜 二斤

茴香炒 二斤半

甘草 炙 二斤

吳茱萸

洗 焙 七 二斤

以咀每服四升水中半夏五片烏梅少許煎溫服

活霍亂轉筋者理中湯去朮加附子一枚生用

理中湯方見傷寒

諸藥不效
者寒熱
並施

本事治霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不効者一立治一人
青金丹

硫黃

研

水銀

八分

二味銚子內炒柳木篦子不住手攪勻更已柳枝蘸
冷醋頻洒候如鉄色法也青金塊方成刮下再研
如粉留小半為散餘以粽子尖三個醋約中半研稀
稠得取成膏和丸如雞頭大朱為衣每服一丸並丁
香湯磨化下熱服散丁香調下一分傷寒臥臥乘伏
用龍腦冷水磨下日二三服

梅師治霍亂轉筋皂角末吹一小豆許入鼻中得嚏便差
古今銀治霍亂轉筋取蓼一手把去兩頭以水二十半煎

雜方

取一升半頓服之

食療治吐後轉筋者木瓜汁飲之甚良

外臺治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生姜三兩搗破以

酒一升煎三四沸頓服

世霍亂之証輕則上吐下瀉兩脚轉筋甚者遍體轉筋腹
肚疼痛手足厥冷若欲絕者倉卒之際宜於臍中灼艾
及用蓼一把煎湯炮洗次投以姜附理中湯之類其脈
洪大者易治脈微腎縮舌卷者不治

世霍亂轉筋灸承山二七壯神效

又法中封山水

東陽霍亂轉筋在兩臂及胸堂中者筋拘不及動搖

肝熱忌

亶中、府巨關胃腕天澤 大陵七壯

甲霍亂轉筋金門僕參承山承筋主之

爪

肝之合筋也其榮爪也 全之見五藏

肝熱者色蒼而爪枯 全之見痿

多食辛則筋急而爪枯 全之見五藏

浙江

浙江圖書館




浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲 登記號：010762

一九 年 月 日

浙 江 圖 書 館




卷十四



浙江圖書館



浙江圖書館



Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TIFFEN Color Control Patches © The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black