本草備要　完

特1
847

ガラス使用

本艸備要

附壹医方湯頭歌括

完

特1
847

27.7.11

醫方湯頭歌訣目錄

補益之劑（十首附方七）

四君子湯　六君子湯　異功散　香砂六君子湯
升陽益胃湯
黃耆鱉甲散
秦艽鱉甲散
秦艽扶羸湯
紫菀湯

醫方湯頭歌訣目錄

補益之劑（十首附方七）

四君子湯　六君子湯　異功散　香砂六君子湯
升陽益胃湯
黃耆鱉甲散
秦艽鱉甲散
秦艽扶羸湯
紫菀湯

白井氏藏書

百合固金湯
補肺阿膠散
小建中湯　黄芪建中湯　八味大建中湯　黄芪五物湯　十四味建中湯
益氣聰明湯

發表之劑　十四首附方八

麻黄湯
桂枝湯　各半湯
大青龍湯

特1
847

小青龍湯
葛根湯　桂枝葛根湯
升麻葛根湯
九味羗活湯
十神湯
神朮散　太無神朮散　海藏神朮散　白朮湯
麻黄附子細辛湯
人參敗毒散　敗毒散（消風敗毒散）

再造散
麻黃人參芍藥湯
神白散　葱豉湯
攻裏之劑　七首附方四
大承氣湯
小承氣湯　三化湯
調胃承氣湯
木香檳榔丸
枳實導滯丸　木香導滯丸
温脾湯　减味温脾湯
蜜煎導法　猪膽汁導法
涌吐之劑　二首附方六
瓜蒂散　三聖散　參蘆散　梔豉湯　燒鹽方　烏附尖
稀涎散　通關散
和解之劑　九首附方五
小柴胡湯

四逆散
黄連湯
黄芩湯（黄芩芍藥湯　芍藥甘草湯）　芍藥湯　黄芩加生薑半夏湯
逍遥散（八味逍遥散）
藿香正氣散
六和湯
清脾飲
痛瀉要方

表裏之劑（八首附方五）

大柴胡湯（柴胡加硝芒湯　桂枝加大黄湯）
防風通聖散
五積散（熟料五積散）
三黄石膏湯
葛根黄芩黄連方
參蘇飲（芎蘇飲　香蘇飲）
茵陳丸

大羌活湯

消補之劑　七首附方六

平胃散　平陳湯　胃苓湯　柴平湯　不換金正氣散

保和丸　大安丸

健脾丸　枳朮丸

參苓白朮散

枳實消痞丸

鱉甲飲子

葛花解酲湯

理氣之劑　十一首附方八

補中益氣湯　調中益氣湯

烏藥順氣湯

越鞠丸　六鬱湯

蘓子降氣湯

四七湯　七氣湯　四七湯

四磨湯　五磨飲子

代赭旋覆湯
紺珠正氣天香湯
橘皮竹茹湯（金匱橘皮竹茹湯）
丁香柹蒂湯（濟生丁香柹蒂湯　丁香柹蒂竹茹湯）
定喘湯

理血之劑十三首附方六

四物湯（八珍湯　十全大補湯　胃風湯）
人參養榮湯

歸脾湯
養心湯
當歸四逆湯（四逆吳茱生薑湯）
桃仁承氣湯
犀角地黃湯
咳血方
秦艽白朮丸（蒼朮防風劑　秦艽蒼朮湯　秦艽防風湯）
槐花散

小薊飲子
四生丸
復元活血湯
祛風之劑　十二首附方四
小續命湯
大秦艽湯
三生飲　星香散　易簡星香飲
地黄飲子
獨活湯
順風勻氣散
上中下通用痛風方
獨活寄生湯　三痺湯
消風散
川芎茶調散　菊花茶調散
青空膏
人參荊芥散

祛寒之劑　十二首附方二
理中湯（附子理中湯）
真武湯
四逆湯
白通人尿猪膽汁湯（白通湯）
吳茱萸湯
益元湯
回陽急救湯
四神丸
厚朴溫中湯
導氣湯
疝氣方
橘核丸
祛暑之劑　五首附方十一
三物香薷飲（黃連香薷飲　五物香薷飲　六味香零飲　十味香薷飲　二香散　藿薷湯　香葛湯）
清暑益氣湯

縮脾飲　大順湯
生脈散
六一散　益元散　碧玉散　鷄蘇散

利濕之劑　十三首附方八

五苓散　四苓散　猪苓湯
小半夏加茯苓湯　茯苓甘草湯
腎着湯　甘薑苓朮湯　黄耆防已湯
舟車丸
疏鑿飲
實脾飲
五皮飲
羌活勝濕湯　羌活除濕湯
大橘皮湯
茵陳蒿湯　栢皮梔子湯
八正散
萆薢分清飲　縮泉丸

當歸拈痛湯

潤燥之劑十二首附方二

炙甘草湯
滋燥養榮湯
活血潤燥生津飲
韭汁牛乳飲　五汁安中飲
潤腸丸
通幽湯　當歸潤腸湯
搜風順氣丸
消渇方
白茯苓丸
猪腎薺苨湯
地黃飲子
酥蜜膏酒
淸燥湯

瀉火之劑二十七首附方九

黄連解毒湯　三黄石膏湯　巵子金花丸
附子瀉心湯　大黄附子湯
半夏瀉心湯
白虎湯　人參白虎湯
竹葉石膏湯
升陽散火湯
涼膈散
清心蓮子飲
甘露飲　桂苓甘露飲
清胃散
瀉黄散
錢乙瀉黄散
瀉白散　加減瀉白散
瀉青丸
龍膽瀉肝湯
當歸龍薈丸

導赤散
左金丸　戊己丸　連附六一湯
普濟消毒飲
清骨散
清震湯　升麻湯
桔梗湯
清咽太平丸
消斑青黛飲
辛夷散
蒼耳散
妙香散

除痰之劑　十首附方五

二陳湯　導痰湯　溫胆湯　潤下丸　二賢散
滌痰湯
青州白丸
清氣化痰丸

順氣消食化痰丸
滾痰丸
金沸草散（局方金沸草散）
半夏天麻白朮湯
常山飲
截瘧七寶飲

收濇之劑（九首附方二）

金鎖固精丸
茯菟丹
治濁固本丸
訶子散（河間訶子散）
桑螵蛸散
眞人養藏湯
當歸六黃湯
柏子仁丸
牡蠣散（撲汗法）

殺虫之劑　二首
烏梅丸
化虫丸
癰瘍之劑　六首附方二
真人活命飲
金銀花酒　蠟礬丸　雄礬丸
托裏十補散
托裏温中湯
托裏定痛湯
散腫潰堅湯
經產之劑　十二首附方二十二
妊娠六合湯　表虛六合湯　表實六合湯　柴胡六合湯
石膏六合湯　茯苓六合湯　巵子六合湯
風濕六合湯　升麻六合湯　膠艾四物湯
朴實六合湯　附子六合湯　大黃六合湯
温六合湯　連附六合湯　熱六合湯
寒六合湯　氣六合湯　風六合湯
膠艾湯　婦人良方膠艾湯　婦寶丹
當歸散

黑神散
清魂散
羚羊角散
當歸生薑羊肉湯（千金羊肉湯）
達生散（紫蘇飲子）
參朮飲
牡丹皮散
固經丸
栢子仁丸

便用良方

望梅丸
骨灰固齒牙散
軟脚散
附稀痘神方（一首附方三）

藥有湯頭前賢所製某方某藥各有成規雖加減稍有變通而治療難逾正則舊本歌訣頗涉鄙俚時輩師心不遵

古法均非盡善。先生考方按韻括病搜源辭雅義明言近指眞湯頭學心傳端在於此讀者審之

還讀齋謹識

附補遺

醫方湯頭歌括

休寧汪　昂訒菴編輯　男汪　端其兩較

補益之劑　十首附方七

助陽補氣

四君子湯中和義。參朮茯苓甘草比。（人參白朮茯苓各二錢甘草一錢氣味中和故名君子）益以夏陳（半夏陳皮）名六君（子湯）祛痰補氣陽虛餌。（二陳除痰四君補氣脾弱陽虛宜之）除却半夏名異功（散錢氏）或加香砂胃寒使。（加木香砂仁行氣溫中名香砂六君子湯）

升陽益胃

升陽益胃湯（東垣）參朮耆黃連半夏草陳皮苓瀉防風羌獨

勞熱

活柴胡白芍棗薑隨。黃耆二兩人參半夏炙甘草各一兩羌活獨活防風白芍炒各五錢陳皮四錢白朮茯苓澤瀉柴胡各三錢黃連二錢每服三錢加薑棗煎。六君子助陽補脾除痰重用黃耆補氣固胃柴防羌獨除濕升陽澤瀉茯苓瀉熱降濁加芍藥和血斂陰少佐黃連以退陰火按東垣治療首重脾胃而益胃又以升陽爲先故每用補中上升下滲之藥此方補中有散發中有收脾胃諸方多從此昉也

黃耆鱉甲散（羅謙甫）地骨皮艽菀參苓柴半知地黃芍藥天冬桂甘桔桑皮勞熱宜。治虛勞骨蒸晡熱咳嗽食少盜汗黃耆鱉甲天冬各五錢地骨秦艽茯苓柴胡各三錢紫菀半夏知母生地白芍桑皮炙草各二錢半人參肉桂桔梗各錢半每服一兩加薑煎。鱉甲天冬知芍補水養陰參耆桂苓甘草固衛助陽桑桔瀉肺熱菀夏理痰嗽艽柴地骨退熱升陽爲表裏氣血交補之劑

秦艽鱉甲散（羅謙甫）治風勞地骨柴胡及青蒿當歸知母烏梅合止嗽除蒸斂汗高。鱉甲地骨皮柴胡各一兩青蒿五葉秦艽當歸知母各五錢烏梅五箇治略同前汗多倍黃耆此方加青蒿烏梅皆斂汗退蒸之意

補勞

秦艽扶羸湯（直指）鱉甲柴地骨當歸紫菀偕半夏人參兼炙草。肺勞蒸嗽服之諧。治肺痿骨蒸勞嗽聲嗄自汗體倦柴胡二錢秦艽鱉甲地骨當歸人參各錢半紫菀半夏甘草炙各一錢加薑棗煎按黃耆鱉甲散蓋本此方除當歸加餘藥。透肌解熱柴胡秦艽乾葛爲要劑故骨蒸方中多用之此方雖表裏交治而以柴胡爲君

肺勞（氣極六極之一）

紫菀湯（海藏）中知貝母參苓五味阿膠偶再加甘桔治肺傷咳血吐痰勞熱久。治肺傷氣極勞熱久嗽吐痰吐血肺痿肺癰。紫菀知母貝母阿膠各一錢人參茯苓甘草桔梗各五分五味十二粒一方加蓮肉。以保肺止嗽爲君故用阿膠五味以淸火化痰爲臣故用知母貝母佐以參苓甘草扶土以生金使以桔梗上浮而利膈

肺傷咳血

百合固金湯（趙蕺菴）二地黃玄參貝母桔甘藏麥冬芍藥當歸配喘咳痰血肺家傷。生地二錢熟地三錢麥冬錢半貝母百合當歸白芍甘草各一錢玄參桔梗各八分。火旺則金傷故以玄參二地助腎滋水麥冬百合保肺安神芍藥當歸平肝養血甘桔貝母淸金化痰皆以甘寒培本不欲以苦寒傷生發之氣也

補肺阿膠散（錢乙）馬兜鈴鼠粘甘草杏糯停肺虛火盛人當服順氣生津嗽哽寧。阿膠兩半馬兜鈴焙鼠粘子炒甘草炙糯米各一兩杏仁七錢。牛蒡利膈滑痰杏仁降氣潤嗽李時珍曰馬兜鈴非取其補肺。取其淸熱降氣肺自安也其中阿膠糯米乃補肺之正藥

溫中散寒

小建中湯（仲景）芍藥多即桂枝加芍藥湯再加飴糖名建中。桂薑甘草大棗和更加飴糖補中藏虛勞腹痛服之瘥。芍藥六兩桂枝生薑各三兩甘草一兩棗十二枚飴糖一升。增入黃耆名亦爾（再加黃耆兩半名黃耆建中湯金匱若除飴糖則名黃耆五物湯不名建中矣今人用建中者絕不用飴糖何哉）表虛身痛效無過又

聰耳明目

有建中十四味。陰斑勞損起沉疴。（亦有陰症發斑者淡紅隱隱散見肌表此寒伏于下逼其無根之火薰肺而然若服寒藥立斃）十全大補加附子麥夏蓯蓉仔細哦。（即十全大補湯加附子麥冬半夏肉蓯蓉名十四味建中湯十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟地肉蓯蓉名八味大建中湯治同）

益氣聰明湯（東垣）蔓荊。升葛參耆黃柏并。再加芍藥炙甘草。耳聾目障服之清。（參耆各五錢蔓荊子葛根各三錢黃柏白芍各二錢升麻錢半炙草一錢每服四錢。人之中氣不足清陽不升則耳目不聰明蔓荊升葛升其清氣參耆甘草補其中氣而以芍藥平肝木黃柏滋腎水推）

寒傷營無汗

風傷衛有汗

發表之劑　十四首附方八

麻黃湯（仲景）中用桂枝杏仁甘草四般施。發熱惡寒頭項痛。傷寒服此汗淋漓。（麻黃去節三兩桂枝二兩杏仁七十枚去皮尖甘草炙一兩傷寒太陽表症無汗用此發之。麻黃善發汗恐其力猛故以桂枝監之甘草和之不令太發也按桂麻二湯雖治太陽症而先正每云皆肺藥以傷寒必自皮毛入而桂麻又入肺經也）

桂枝湯（仲景）治太陽中風。芍藥甘草薑棗同。（桂枝芍藥生薑各三兩炙草二兩大棗十二枚治太陽中風有汗用此解肌以和營衛中猶傷也仲景傷寒論通用）桂麻相合名各半（湯）。太陽如瘧此爲功。（熱多寒少如瘧狀者宜之）

風寒兩解

太陽行水發汗

大青龍湯（仲景）桂麻黄杏草石膏薑棗藏。（麻黄六兩。桂枝炙草各三兩。杏仁四十枚。石膏雞子大。生薑三兩。大棗十二枚。）太陽無汗。兼煩躁。（煩爲陽爲風。躁爲陰爲寒。必太陽症兼煩躁者。方可用之。以杏草佐麻黄發表。以薑棗佐桂枝解肌。石膏質重。瀉火。氣輕。亦達肌表。義取青龍者。龍興而雲升雨降。鬱熱頓除。煩躁乃解也。若少陰煩躁而誤服此則逆。）風寒兩解此爲良。（麻黄湯治寒。桂枝湯治風。大青龍兼風寒而兩解之。陶節菴曰。此湯險峻。今人罕用。）

小青龍湯（仲景）治水氣。喘咳嘔噦渴利慰。（太陽表症未能。心下有水氣者用之。或喘或咳。或嘔或噦。或渴或利。或短氣或小便秘。皆水氣內清所致。）薑桂麻黄芍藥甘。細辛半夏兼五味。（乾薑。桂枝。麻黄。芍藥酒炒。炙草。細辛各三兩。半夏。五味子各半升。○桂麻解表。徒水從汗泄。芍味斂肺以收喘咳。薑夏細辛潤腎行水以止渴嘔。亦表裏分消之意。）

太陽無汗惡風

陽明升散

葛根湯（仲景）內麻黄襄。二味加入桂枝湯。（桂枝。芍藥。炙草各二兩。薑三兩。棗十二枚。此桂枝湯也。加葛根四兩。麻黄三兩。）輕可去實因無汗。（中風表實。故汗不得出。十劑曰。輕可去實。葛根麻黄之屬是也。）有汗加葛無麻黄。（名桂枝加葛根湯。仲景治太陽有汗惡風。）

升麻葛根湯錢氏。（錢乙）再加芍藥甘草是。（升麻三錢。葛根芍藥各二錢。炙草一錢。○輕可去實。辛能達表。故用升葛發散陽明表邪。陽邪盛則陰氣虛。故加芍藥斂陰和血。升麻甘草升陽解毒。故亦治時疫。）陽明發熱與頭疼。無汗惡寒均堪倚。（及目痛鼻乾不得臥等症。）亦治時疫與陽斑。痘疹已出慎勿使。（恐升散重虛其表也。）

国立国会図書館　タイトル『增訂本草備要4巻醫方湯頭歌括1巻』 請求記号 特1-847　ガラス使用

解表通劑

九味羌活（湯張元素）用防風細辛蒼芷與川芎黃芩生地同甘草三陽解表益薑葱（羌活防風蒼朮各錢半白芷川芎黃芩生地甘草各一錢細辛五分加生薑葱白煎）陰虛氣弱人禁用加減臨時在變通（潔古製此湯以代麻黃桂枝青龍各半等湯用羌防蒼細芎芷各走一經祛風散寒爲諸路之應兵加黃芩泄氣中之熱生地泄血中之熱甘草以調和諸藥然黃芩生地寒滯未可槩施用時宜審）

時行感冒

十神湯（局方）裏葛升麻陳草芎蘇白芷加麻黃赤芍兼香附時行温疫感冒效堪誇（葛根升麻陳皮甘草川芎紫蘇白芷麻黃赤芍香附等分加薑葱煎治風寒兩感頭痛發熱無汗惡寒咳嗽鼻塞。芎麻升葛蘇芷香附辛香利氣發表散寒加芍藥者斂陰氣于發汗之中加甘草者和陽氣于疎利之隊也吳綬曰此方用升麻乾葛能解陽明温疫時氣若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發斑矣愼之）

散風寒濕

神朮散（局方）用甘草蒼細辛藁本芎芷羌（蒼朮二兩炙草細辛藁本白芷川芎羌活各一兩每服四錢生薑葱白煎）各走一經祛風濕（太陰蒼朮少陰細辛厥陰少陽川芎太陽羌活藁本陽明白芷此方與九味羌活湯意同加藁本除黃芩生地防風較羌活湯更穩）風寒泄瀉總堪嘗太無神朮散（太無丹溪之師）即平胃散加入菖蒲與藿香（陳皮爲君二錢蒼朮厚朴各一錢炙草菖蒲藿香各錢半治嵐瘴温瘧時氣）海藏神朮散蒼防草太陽無汗代麻黃（蒼朮防風各二兩炙草一兩用代仲景麻黃湯治太

（陽傷寒無汗）若以白朮易蒼朮。太陽有汗此湯良。（名白朮湯用代桂枝湯治太陽傷風有汗二朮主治畧同特有止汗發汗之異）

少陰表症

麻黃附子細辛湯（仲景）發表溫經兩法彰。（麻黃細辛各二兩附子一枚炮○麻黃發太陽之汗附子溫少陰之經細辛為腎經表藥聯屬其間）若非表裏相兼治。少陰反熱曷能康。（少陰症脈沉屬裏當無熱今反發熱為太陽表症未除）

暑濕熱時行

人參敗毒（散活人毒即熱濕也）茯苓草。枳桔柴前羌獨芎。薄荷少許薑三片。時行感冒有奇功。（人參茯苓枳殼桔梗柴胡前胡羌活獨活川芎各一兩甘草五錢每服二兩加薄荷生薑煎○羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕除痛川芎柴胡和血升清枳殼前胡行痰降氣甘桔參茯清肺強胃輔正匡邪也喻嘉言曰暑濕熱三氣門中推此方為第一俗醫減却人參曾與他方有別耶）去參名為敗毒散。加入消風（散見風門）治亦同。（合消風散名消風敗毒散）

陽虛不能作汗

再造散（節菴）用參耆甘桂附羌防芎芍叅細辛加棗煨薑煮。陽虛無汗法當諳。（人參黃耆甘草川芎白芍酒炒羌活防風桂枝附子炮細辛煨薑大棗煎○以參耆甘薑桂附大補其陽助羌防芎細散寒發表加芍藥者于陽中斂陰散中有收也陶節菴曰發熱頭痛惡寒無汗服汗劑汗不出者為陽虛不能作汗名無陽症庸醫不識不論時令遂以麻黃重劑劫取其汗誤人死者多矣又曰人第知參耆能止汗而不知其能發汗以在表藥隊中則助表藥而解散也）

內虛感寒

麻黃人參芍藥湯（東垣）桂枝五味麥冬襄。歸耆甘草汗兼補。虛人外感服之康（麻黃 白芍 黃耆 當歸 甘草炙各一錢 人參 麥冬各三分 桂枝五分 五味五粒。○東垣治一人內蘊虛熱外感大寒而吐血法仲景麻黃湯加補劑製此方一服而愈原解曰麻黃散外寒桂枝補表虛黃耆實表益衛人參益氣固表麥冬五味保肺氣甘草補脾芍藥安太陰當歸和血養血）

一切風寒

神白散（衛生家寶）用白芷甘薑蔥淡豉與相叅（白芷一兩甘草五錢淡豉五十粒薑三片蔥白三寸煎服取汗）一切風寒皆可服。婦人雞犬忌窺探（煎要至誠服乃有效）肘後單煎蔥白豉（蔥一握豉一升名蔥豉湯）用代麻黃湯功不慙（傷寒初覺頭痛身熱便宜服之可代麻黃湯）

攻裏之劑 七首附方四

胃府三焦大熱大實

大承氣湯（仲景）用芒硝枳實大黃厚朴饒（大黃四兩酒洗芒硝三合厚朴八兩枳實五枚）救陰瀉熱功偏擅。急下陽明有數條（大黃治大實芒硝治大燥大堅二味治有形血藥厚朴治大滿枳實治痞二味治無形氣藥熱毒傳入陽明胃府痞滿燥實堅全見雜症三焦實熱並須以此下之○胃爲水穀之海土爲萬物之母四旁有病皆能傳入胃已入胃府則不復傳他經矣○陶節菴曰傷寒邪熱傳裏須看熱氣淺深用藥大承氣最緊小承氣次之調胃又次之大柴胡又次之蓋恐硝性躁急故不輕用）

胃府實滿

小承氣湯（仲景）朴實黃（大黃四兩厚朴二兩薑炒枳實三枚麩炒）譫狂痞鞕（音硬）上

胃實緩攻

一切實積

焦強（熱在上焦則滿在中焦則鞕胃有燥糞則譫語不用芒硝者恐傷下焦真陰也）益以羌活名三化湯中風閉實可消詳（用承氣逼二便加羌活治風中風體實者可偶用然止虛者多不可輕投）

調胃承氣（湯仲景）硝黃草（大黃酒浸芒硝各一兩甘草炙五錢）甘緩微和將胃保（用甘草甘以緩之微和胃氣勿令大泄下）不用朴實傷上焦（不用厚朴枳實恐傷上焦氤氳之氣也）中焦燥實服之好

木香檳榔（丸張子和）青陳皮枳殼栢連稜蒁隨大黃黑丑兼香附芒硝水丸量服之一切實積能推蕩瀉痢食瘧用咸宜（木香檳榔青皮醋炒陳皮枳殼炒黃柏酒炒黃連吳茱萸湯炒三稜莪蒁並醋煮各五錢大黃酒浸一兩香附牽牛各二兩芒硝水丸量虛實服○木香香附青陳枳殼利氣寬腸而牽牛檳榔下氣尤速氣行則無痞滿後重之患矣連柏燥濕清熱稜莪行氣破血硝黃去血中伏熱並為推堅峻品濕熱積滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通因通用之意也）

濕熱食積

枳實導滯（丸東垣）首大黃芩連麴术茯苓勷澤瀉蒸餅糊丸服濕熱積滯力能攘（大黃一兩枳實麩炒黃芩酒炒黃連酒炒神麴炒各五錢白术土炒茯苓各三錢澤瀉二錢蒸餅糊丸量虛實服大黃枳實蕩熱去積芩連佐之以清熱苓瀉佐之以利濕神麴佐之以消食又恐苦寒力峻故加白术補土固中）若還後重兼氣滯木香導滯（丸）

加檳榔。

溫藥攻下

溫脾湯（千金）參附與乾薑。甘草當歸硝大黃。寒熱並行治寒積。臍腹絞結痛非常。（人參附子甘草芒硝各一兩。大黃五兩。當歸乾薑各三兩。煎服。日三。本方除當歸芒硝。亦名溫脾湯。治久痢赤白。脾胃冷。實不消。硝黃以蕩其積。薑附以祛其寒。參草當歸以保其氣血。按古人方中。多有硝黃柏連與薑茱桂附寒熱並用者。亦有參术硝黃補瀉並用者。亦有大黃麻黃汗下兼行者。今人罕識其指。姑錄此方。以見治療之妙。不一端也。）

潤結便祕

蜜煎導法通大便。（仲景用蜜熬如飴。捻作挺子。摻皂角末。乘熱納穀道中。或摻鹽。）或將猪膽汁灌肛中。（用猪膽汁醋和。以竹管插肛門中。將汁灌入。頃當大便。名猪膽汁導法。仲景）不欲苦寒傷胃府。陽明無熱勿輕攻。（胃府無熱而便秘者。為汗多。津液不足。不宜用承氣妄攻。此仲景心法。後人罕知。故錄二方于攻下之末。）

湧吐之劑（二首附方六。汗吐下和。乃治療之四法。經曰。在上者湧之。其高者因而越之。故古人治病。用吐法者最多。朱丹溪曰。吐中就有發散之義。張子和曰。諸汗法古方多有之。惟以吐發汗者。世罕知之。今人醫療。惟用汗下和。而吐法絕置不用。可見時師之缺畧。特補湧吐一門。方藥雖簡。而法不可廢也。若丹溪用四物四君引吐。又治小便不通。亦用吐法。是又在用者之圓神矣。）

痰食實熱

瓜蒂散（仲景）中赤小豆。（甜瓜蒂炒黃。赤小豆。共為末。熟水或虀水調。量虛實服。）或入藜蘆鬱金湊。（張子和去赤豆。加藜蘆防風。一方去赤豆。加鬱金韭汁。俱名三聖散。鵝翎探吐。並治風痰。）此

吐實熱與風痰（瓜蔕吐實熱藜蘆吐風痰）虛者參蘆散一味勾（虛人痰壅不能服瓜蔕者參蘆代之或加竹瀝）若吐虛煩梔豉湯（仲景梔子十四枚豉四合治傷寒後虛煩）劇痰烏附尖方透（丹溪治許白雲用瓜蔕梔子苦參藜蘆屢吐不透後以漿水和烏附尖服始得大吐）古人尚有燒鹽方一切積滯功能奏（燒鹽熱湯調服以指探吐治霍亂宿食冷痛等症千金曰凡病宜用大勝用藥）

吐中風痰

稀涎散（嚴用和）皂角白礬班（皂角四挺去皮弦炙白礬一兩爲末每服五分○白礬酸苦涌泄能軟頑痰皂角辛鹹通竅專制風木此奪門之兵也風初中時宜用之）或益藜蘆微吐間風中痰升人眩仆當先服此通其關（令微吐稀涎續進他藥）

通關散

用細辛皂角（爲末）吹鼻得嚏保生還（卒中者用此吹鼻有嚏者可治無嚏者爲肺氣已絕）

和解之劑　九首附方五

半表半裏和解

小柴胡湯（仲景）和解供半夏人參甘草從更用黄芩加薑棗少陽百病此爲宗（柴胡八兩半夏半升人參甘草黄芩生薑各三兩大棗十二枚治一切往來寒熱胸滿脇痛心煩喜嘔口苦耳聾咳渇悸利半表半裏之症屬少陽經者但見一症卽是不必悉具○膽府清淨無出無入經在半表半裏法宜和解柴胡升陽達表黄芩退熱和陰半夏袪痰散逆參草輔正補中使邪不得復傳入裏也）

陽症熱厥

四逆散（仲景）裏用柴胡芍藥枳實甘草須。（柴胡芍藥炒枳實麩炒甘草炙等分）此是陽邪成厥逆。（陽邪入裏四肢逆而不溫）斂陰泄熱平劑扶。（芍藥斂陰枳實泄熱甘草和逆柴胡散邪用平劑以和解之）

升降陰陽湯

黃連湯（仲景）內用乾薑半夏人參甘草藏。更入桂枝兼大棗。寒熱平調嘔痛忘。（黃連炒乾薑炮甘草桂枝各三兩人參二兩半夏半升大棗十二枚治胸中有熱而欲嘔胃中有寒而作痛或丹田有熱胸中有寒者仲景亦用此湯○按此湯與小柴胡湯同意以桂枝易柴胡以黃連易黃芩以乾薑易生薑餘藥同皆和解之意但小柴胡湯屬少陽藥此湯屬太陽陽明藥也）

太陽少陽合病

下利

黃芩湯（仲景）用甘芍并。二陽合利棗加烹。（治太陽少陽合病下利黃芩三兩芍藥甘草各二兩棗十二枚○陽邪入裏故以黃芩徹其熱甘芍大棗和其太陰）此方遂爲治痢祖。後人加味或更名。（利泄瀉也痢滯下也仲景本治傷寒下利機要用此治痢更名黃芩芍藥湯潔古治痢加木香檳榔大黃黃連當歸官桂名芍藥湯）再加生薑與半夏。（名黃芩加生薑半夏湯仲景）前症兼嘔此能平。單用芍藥與甘草。（炙等分名芍藥甘草湯仲景）散逆止痛能和營。（虞天民曰白芍不惟治血虛兼能行氣腹痛者營氣不和逆于肉裏以白芍行營氣以甘草和逆氣故治之也）

散鬱調經

逍遙散（局方）用當歸芍。柴苓朮草加薑薄。（柴胡當歸酒拌白芍酒炒白朮土炒茯苓各一錢甘草炙五分加煨薑薄荷煎）散鬱除蒸功最奇。（肝虛則血病歸芍養血平肝木

辟一切不正之氣

盛則土衰朮草和中補土柴胡升陽散熱茯苓利濕寧心生薑煖胃祛痰薄荷消風理血醫貫曰方中柴胡薄荷二味最妙蓋木喜風搖寒即摧萎溫則發生木鬱則火鬱火鬱則土鬱土鬱則金鬱金鬱則水鬱五行相因自然之理也余以一方治木鬱而諸鬱皆解逍遙散是也

調經八味丹梔着（加丹皮梔子名八味逍遙散治肝傷血少）

藿香正氣散（局方）

大腹蘇甘桔陳苓朮朴俱夏麴白芷加薑棗感傷（外感內傷）嵐嶂並能驅

藿香大腹皮紫蘇茯苓白芷各三兩陳皮白朮土炒厚朴薑汁炒半夏麴桔梗各二兩甘草一兩每服五錢加薑棗煎○藿香理氣和中辟惡止嘔蘇芷桔梗散寒利膈以散表邪腹朴消滿陳夏除痰以疏裏滯苓朮甘草益脾去濕以輔正氣正氣通暢則邪逆自除

調和六氣

暘瘧

六和湯（局方）

藿朴杏砂呈半夏木瓜赤茯并朮參扁豆同甘草薑棗煎之六氣平

藿香厚朴杏仁砂仁半夏木瓜赤茯苓白朮人參扁豆甘草加薑棗煎能禦風寒暑濕燥火六氣故曰六和○藿朴杏砂理氣化食參朮陳夏補正匡脾豆瓜袪暑赤茯行水大抵以理氣強脾為主脾胃既強則諸邪不能干矣

或益香薷或蘇葉傷寒傷暑用須明（傷寒加蘇葉傷暑加香薷）

清脾飲（嚴用和）

用青朴柴苓夏甘芩白朮偕更加草菓薑煎服熱多陽瘧此方佳

青皮厚朴醋炒柴胡黃芩半夏薑製甘草炙茯苓白朮土炒草菓煨加薑煎瘧不止加酒炒常山一錢烏梅二個大渴加麥冬知母○瘧疾一名脾寒蓋因脾胃受傷者居多此方

ガラス使用

痛瀉

乃加減小柴胡湯從溫脾諸方而一變也青柴平肝破滯朴夏平胃祛痰苓芩清熱利濕朮草補脾調中草菓（散太陰積寒除痰截瘧）

痛瀉要方（劉草窓）陳皮芍防風白朮煎丸酌（白朮土炒三兩白芍酒炒四兩陳皮炒兩半防風一兩或煎或丸久瀉加升麻）補土瀉木理肝脾（陳皮理氣補脾防芍瀉木益土）若作食傷醫便錯（吳鶴皋曰傷食腹痛得瀉便減今瀉而痛不減故責之土敗木賊也）

表裏之劑（八首附方九）

大柴胡湯（仲景）用大黃枳實芩夏白芍將煎加薑棗表兼裏妙法內攻併外攘（柴胡八兩大黃二兩枳實四枚半夏半升黃芩芍藥各三兩生薑五兩大

表裏實熱

棗十二枚治陽邪入裏表症未除裏症又急者○柴胡解表大黃枳實攻裏黃芩清熱芍藥斂陰半夏和胃止嘔薑棗調和營衛按本方次方治少陽陽明後方治太陽陽明爲不同）柴胡加芒硝湯義亦爾（小柴胡湯加芒硝六兩仲景）仍有桂枝加大黃湯（仲景桂枝湯內加大黃一兩芍藥三兩治太陽誤下轉屬太陰大實痛者）

防風通聖散（河間）大黃硝荊芥麻黃梔芍翹甘桔芎歸膏滑石薄荷芩朮力偏饒表裏交攻陽熱盛外科瘍毒總能消（大黃酒蒸芒硝防風荊芥麻黃黑梔白芍炒連翹川芎當歸薄荷白朮各五錢桔梗黃芩石膏各一兩甘草二兩滑石三兩加薑葱煎○荊防麻黃薄荷發汗而散熱搜風梔子滑石硝黃利便而降火行水芩桔石膏

清肺瀉胃。川芎歸芍養血補肝。連翹散氣聚血凝。甘朮能補中燥濕。故能汗不傷表。下不傷裏也。

發表温裏

五積散（局方）治五般積。（寒積食積氣積血積痰積）麻黃蒼芷芍歸芎。枳桔桂薑甘茯朴陳皮。半夏加薑葱。（當歸川芎白芍茯苓桔梗各八分。蒼朮白芷厚朴陳皮各六分。枳殼七分。麻黃半夏各四分。肉桂乾薑甘草各三分。重表者用桂枝。○桂麻解表散寒。甘芍和裏止痛。蒼朴平胃。陳夏行痰。芎歸養血。茯苓利水。薑芷袪寒濕。枳桔利膈腸。一方統治多病。惟善用者變而通之。）除桂枳陳餘略炒。（三味生用。餘藥微炒。名熟料五積散。）熟料尤增温散功。温中解表袪寒濕。散痞調經用各充。（陶節菴曰。凡陰症傷寒。脉浮沉無力。均當服之。亦可加附子。）

發表清裏

三黃石膏湯芩柏連。梔子麻黃淡豉全。薑棗細茶煎熱服。（寒因熱用）表裏三焦熱盛宣。（石膏兩半。黃芩黃柏黃連各七錢。梔子三十箇。麻黃淡豉各二合。每服一兩。薑三片。棗二枚。茶一撮。煎熱服。治表裏三焦大熱。譫狂斑衂。身目俱黃。○黃芩瀉上焦。黃連瀉中焦。黃柏瀉下焦。梔子通瀉三焦之火。以清裏。麻黃淡豉散寒發汗而解表。石膏體重。能瀉肺胃之火。氣輕亦能解肌也。）

太陽陽明解表清裏

葛根黃芩黃連湯（仲景）甘草四般治二陽。（治太陽桂枝症。醫悞下之。邪入陽明。協熱下利。脉促喘而汗出者。葛根八兩。炙草黃芩各二兩。黃連三兩。）解表清裏兼和胃。喘汗自利保平康。（成無己曰。邪在裏。宜見陰脉。促爲陽盛。知表未解也。病有汗出而喘者。爲邪氣

（外甚令喘而汗出爲裏熱氣逆與此湯散表邪淸裏熱○脉數而止日促用葛根者專主陽明之表）

內傷外感

參蘇飮（元戎）內用陳皮枳殼前胡半夏宜乾葛木香甘桔茯內傷外感此方推（人參紫蘇前胡半夏薑製乾葛茯苓各七錢半陳皮枳殼麩炒桔梗木香甘草各二錢每服五錢加薑棗煎治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰眩風瀉外感重者去棗加葱白蘇葛前胡解表參苓甘草補中陳皮木香行氣破滯半夏枳桔利膈祛痰）參前若去芎柴入飮號芎蘇治不差（去人參前胡加川芎柴胡名芎蘇飮不服參者宜之）香蘇飮（局方）僅陳皮草感傷內外亦堪施（香附炒紫蘇各二錢陳皮去白一錢甘草七分加薑葱煎）

汗吐下兼行

茵陳丸（外臺）用大黃硝鱉甲常山巴豆邀杏仁梔豉蜜丸服汗吐下兼三法超時氣毒癘及瘧痢一丸兩服量病調（茵陳芒硝鱉甲炙梔子各二兩大黃五兩常山杏仁炒各三兩巴豆一兩去心皮炒豉五合蜜丸梧子大每服一丸或吐或汗或利不應再服一丸不應以熱湯投之○梔子淡豉梔豉湯也合常山可以涌吐合杏仁可以解肌大黃芒硝承氣湯也可以蕩熱去實合茵陳可以利濕退黃加巴豆大熱以祛藏府積寒加鱉甲滋陰以退血分寒熱此方備汗吐下三法雖云劫劑實是佳方）

傷寒兩感

大羌活湯卽九味巳獨知連白朮暨（卽九味羌活湯加防巳知母獨活黃連白朮生地川芎知母各一兩餘藥各三錢每服五錢）散熱培陰表裏和傷寒兩感差堪慰（兩感傷寒一日太陽與少陰俱病二日陽明與太陰俱病三日少陽與厥陰俱病陰陽表裏同時俱

ガラス使用

病欲汗則有裏症欲下則有表症經曰其兩感于寒者必死仲景無治法潔古爲製此方間有生者○羌獨蒼防細辛以散寒發表芩連防己知母芎地以清裏培陰白朮甘草以固中和表裏

消補之劑 七首附方六

利濕散滿

平胃散局方是蒼朮朴陳皮甘草四般藥（蒼朮泔浸二錢厚朴薑汁炒陳皮去白甘草炙各一錢薑棗煎）除濕散滿驅瘴嵐調胃諸方從此擴（蒼朮燥濕強脾厚朴散滿平胃陳皮利氣行痰甘草和中補土泄中有補也）或合二陳（名平陳湯治痰）或五苓（名胃苓湯治瀉）硝黃麥麴均堪着（加麥芽神麴消食加大黃芒硝蕩積）若合小柴（胡湯）名柴平（湯）煎加薑棗能除瘧又不換金正氣散即是此方加夏藿（半夏藿香）

飲食輕傷

保和（丸）神麴與山查苓夏陳翹菔（音卜）子加麴糊爲丸麥（芽）湯下亦可方中用麥芽（山查去核三兩神麴茯苓半夏各一兩陳皮菔子微炒連翹各五錢○山查消肉食麥芽消穀食神麴消食解酒菔子下氣制麪茯苓滲濕連翹散結陳夏健脾化痰此內傷而氣未病者故但以和平之品消而化之不必攻補也）大安丸內加白朮（二兩）消中兼補効堪誇

補脾消食

健脾（丸）參朮與陳皮枳實山查麥蘖（芽）隨麴糊作丸米飲下消補兼行胃弱宜（人參白朮土炒各二兩陳皮麥芽炒各一兩山查兩半枳實麩炒三

補脾　補脾消痞

（兩。陳皮枳實理氣。化積山查消肉食。麵麥消穀食。人參白朮、益氣強脾。）枳朮丸（潔古）亦消。兼補。（白朮上蒸、枳實麩炒等分。）荷葉燒飯上升奇。（荷葉包陳米飯煨乾爲丸、引胃氣及少陽甲胆之氣上升。）

參苓白朮散　扁豆陳、山藥甘蓮砂薏仁、（毉藥利氣強脾。）桔梗上浮（載藥上行。）兼保肺。（恐燥藥上僭。）棗湯調服益脾神。（人參茯苓白朮土炒陳皮山藥甘草炙各一斤。扁豆炒十二兩。蓮肉炒、砂仁、苡仁炒、桔梗各半斤。共爲末。每服三錢。棗湯或米飲調下。）

枳實消痞丸（東垣）　四君全、麥芽夏麴朴薑連、蒸餅糊丸消積滿。清熱破結補虛痊（枳實麩炒、黃連姜汁炒各五錢。人參白朮土炒、麥芽炒、半夏麴、厚朴）

瘧母　酒積

（薑汁炒、茯苓各三錢。甘草炙、乾薑各二錢。○黃連枳實治痞君藥。麥夏薑朴溫胃散滿。參朮苓草燥濕補脾。使氣足。脾運。痞乃化也。）

鱉甲飲子（嚴氏）治瘧母（久瘧不愈。中有結癖。）甘陳耆朮芎歸偶、草菓檳榔厚朴增、烏梅薑棗同煎服、（鱉甲醋炙、黃耆、白朮土炒、甘草、陳皮、川芎、白芍酒炒、草菓麵煨、檳榔、厚朴等分。薑三片、棗二枚、烏梅少許、煎。○鱉甲屬陰入肝。退熱散結爲君。甘陳耆朮、助陽補氣。川芎白芍養血和陰。草菓溫胃。檳榔破積。厚朴散滿。甘草和中。烏梅酸斂。薑棗和營衛。）

葛花解醒湯　香砂仁、二苓參朮蔻青陳、神麴乾薑兼澤瀉、溫中利濕酒傷珍。（葛花、砂仁、豆蔻各一錢。木香一分。茯苓、人參、白朮炒、青皮、陳皮各四分。神）

（麯炒。乾薑猪苓澤瀉各三分。專治酒積。及吐瀉。痞塞。○砂蔻神麯。皆能解酒。青陳木香乾薑。行氣溫中。葛花引濕熱從肌肉出。苓瀉引濕熱從小便出。盖以參术固其中氣也。）

理氣之劑十一首附方八

補氣升陽

補中益氣（湯東垣）耆术陳。升柴參草當歸身。（黄耆蜜炙錢半人參甘草炙各一錢。白术土炒。陳皮留白。歸身各五分。升麻柴胡各三分。加薑棗煎。表虛者升麻用蜜水炒用。○東垣曰。升柴味薄性陽。能引脾胃清氣。行于陽道。以資春氣之和。又引參耆甘草上行。充實腠理。使衛外爲固。凡補脾胃之藥。多以升陽補氣名之者。此也。）虛勞內傷功獨擅。亦治陽虛外感因。（虛人感冒。不任發散者。此方可以代之。或加辛散藥。）木香蒼术易歸术。調中益氣暢脾神。（除當歸白术。加木香蒼术。名調中益氣湯。前方加白芍五味子。發中有收。亦名調中益氣湯。俱李東垣方）

中氣

六鬱

烏藥順氣（湯嚴用和）芎芷薑。橘紅枳桔及麻黄。殭蠶炙草薑煎服。中氣厥逆此方詳。（厥逆痰壅。口噤脈伏。身溫爲中風。身冷爲中氣。中風多痰涎。中氣無痰涎。以此爲辨。許學士云。中氣之症。不可作中風治。喻嘉言曰。中風症多挾中氣。烏藥橘紅各二錢。川芎白芷枳殼桔梗麻黄各一錢。殭蠶去絲嘴炒。炮薑炙草各五分。加薑棗煎。○麻黄桔梗芎芷。發汗散寒。以順表氣。烏薑陳枳。行氣祛痰。以順裏氣。加殭蠶清化消風。甘草協和諸藥。古云。氣順則風散。風邪卒中。當先治標也。）

越鞠丸（丹溪）治六般鬱。氣血痰火濕食因。（此六鬱也。）芎蒼香附兼

梔麯氣暢鬱舒痞悶伸（吳鶴皐曰香附開氣鬱蒼朮燥濕鬱撫芎調血鬱梔子清火鬱神麯消食鬱各等分麯糊爲丸又濕鬱加茯苓白芷火鬱加青黛痰鬱加星夏栝蔞海石血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山查挾寒加吳茱萸）又六鬱湯蒼芎附甘苓橘半梔砂仁（蒼朮川芎香附甘草茯苓橘紅半夏梔子砂仁○此前方加味兼治痰鬱看六鬱中之重者爲君餘藥聽加減用之）

降氣行痰

蘓子降氣湯（局方）

蘓子降氣橘半歸前胡桂朴草薑依下虛上盛痰嗽喘亦有加參貴合機（蘓子橘紅半夏當歸前胡厚朴薑汁炒各一錢肉桂炙甘草各五分加薑煎一方無桂有沉香○蘓子前胡橘紅半夏降氣行痰氣行則痰行也數藥兼能發表加當歸和血甘草緣中下虛上盛故又用官桂引火歸元如氣虛亦有加人參五味者）

開鬱化痰

四七湯（三因）

四七湯理七情氣（七氣寒熱喜怒憂愁恚也亦名七氣湯）半夏厚朴茯苓蘓（半夏薑汁炒五錢厚朴薑汁炒三錢茯苓四錢紫蘓二錢○鬱雖由乎氣亦多挾濕挾痰故以半夏厚朴除痰散滿茯苓蘓葉利濕寬中濕去痰行鬱自解矣）薑棗煎之舒鬱結痰涎嘔痛盡能紓又有局方名四七湯參桂夏草妙更殊（人參官桂半夏各一錢甘草五分加薑煎○人參補氣官桂平肝薑夏祛痰甘草和中併不用利氣之藥湯名四七者以四味治七情也）

七情氣逆

四磨湯（嚴氏）

四磨湯亦治七情侵人參烏藥及檳沉（人參烏藥檳榔沉香等分○氣

痞哽噯氣

順氣調經

（逆。故以烏藥檳榔。降而順之。加參者。恐傷其氣也。）濃磨煎服調逆氣實者枳殼易人參去參加入木香枳（實）五磨飲子白酒斟（白酒磨服。治暴怒卒死。名氣厥。）

代赭旋覆湯（仲景）用人參半夏甘薑大棗臨重以鎮逆鹹軟痞痞鞕（音硬）噫（音噯）氣力能禁（赭石一兩。參二兩。旋覆甘草各三兩。半夏半升。生薑五兩。棗十二枚。○旋覆之鹹以軟堅。代赭之重以鎮逆。薑夏之辛以散虛痞。參甘大棗之甘以補胃弱。）

紺珠正氣天香散香附乾薑蘇葉沉烏藥舒鬱兼除痛氣行血活自經勻（香附八錢。烏藥二錢。陳皮蘇葉各一錢。乾薑五分。每服五六錢。○烏陳入氣分

胃虛呃逆

病後寒呃

而理氣。香蘇入血分。而利氣。乾薑兼入氣血。用辛溫以順氣。平肝。氣行則血行。經自調而痛自止矣。）

橘皮竹茹湯治嘔呃參甘半夏枇杷麥赤茯再加薑棗煎方由金匱此加闢（金匱方。橘皮竹茹各二升。人參一兩。甘草五兩。生薑半斤。棗三十枚。名橘皮竹茹湯。治噦逆。即呃逆也。後人加半夏麥冬赤茯苓枇杷葉。○呃逆由胃火上沖。肝胆之火助之。肺金之氣不得下降也。竹茹麥冬枇杷葉清肺和胃。而降氣。肺金清則肝木自平矣。二陳降痰逆。赤茯瀉心火。生薑嘔家聖藥。久病虛羸。故以參甘大棗扶其胃氣。）

丁香柿蒂湯（嚴氏）人參薑呃逆因寒中氣戕（丁香柿蒂各二錢。人參一錢。生薑五片。）濟生香蒂僅二味（亦名丁香柿蒂湯。加薑煎。○古方单用柿蒂。取其苦溫降氣。濟

哮喘

養血通劑

補氣養血

（生加丁香生薑取其開鬱散痰加參者扶其胃氣也）或加竹橘用皆良（加竹茹橘紅名丁香柿蒂竹茹湯治同）

定喘湯白菓與麻黃款冬半夏白皮桑蘇杏黃芩兼甘草肺寒膈熱喘哮嘗（白菓三十枚炒黃麻黃半夏薑製款冬各三錢桑皮蜜炙蘇子各二錢杏仁黃芩各錢半甘草一錢加薑煎○麻黃杏仁桑皮甘草散表寒而清肺氣款冬溫潤白菓收澁定喘而清金黃芩清熱蘇子降氣半夏燥痰共成散寒疎壅之功）

理血之劑 十三首附方六

四物湯（局方）地芍與歸芎血家百病此方通（當歸酒洗生地各三錢白芍二錢川芎錢半○當歸辛苦甘溫入心脾生血爲君生地甘寒入心腎滋血爲臣芍藥酸寒入肝脾斂陰爲佐芎藭辛溫通行血中之氣爲使）八珍湯合入四君子（參术苓草）氣血雙療功獨崇（四君補氣四物補血）再加黃耆與肉桂（加黃耆助陽固衛加肉桂引火歸元）十全大補湯補方雄（補方之首）十全除却耆地草（除生地黃耆甘草）加粟（米百粒）煎之名胃風（湯張元素治風客腸胃飧泄完穀及瘈瘲牙閉）

人參養榮湯即十全（湯見前四物下）除却川芎五味聯陳皮遠志加薑棗脾肺氣血補方先（即十全大補湯除川芎加五味陳皮遠志○薛立齋曰氣血兩虛變生諸症不問脉病但服此湯諸症悉退）

引血歸脾

歸脾湯（濟生）用朮參耆。歸草茯神遠志隨。酸棗木香龍眼肉。煎加薑棗益心脾。怔忡健忘俱可却。腸風崩漏總能醫。

（人參。白朮土炒。茯神棗仁龍眼肉各二錢。黃耆蜜炙錢半。當歸酒洗。遠志各一錢。木香甘草炙各五分。○血不歸脾。則妄行。參耆草朮之甘溫以補脾。志茯棗仁龍眼之甘溫酸苦以補心。當歸養血。木香調氣。氣壯則自能攝血矣。）

補血寧心

養心湯用草耆參。二茯芎歸柏子尋。夏麯遠志兼桂味。再加酸棗總寧心。

（黃耆蜜炙茯苓茯神川芎當歸酒洗半夏麯各一兩。甘草炙一錢。人參柏子仁去油肉桂五味子遠志棗仁炒各二錢半。每服五錢。○參耆補心氣。芎歸養心血。二茯柏仁遠志泄心熱而寧心神。五味棗仁收心氣之散越。半夏去擾心之痰涎。甘草補土以培心子。赤桂引藥以達心經。）

益血復脉

當歸四逆湯（仲景）桂枝芍細辛甘草木通着。再加大棗治陰厥。脉細陽虛由血弱。

（當歸桂枝芍藥細辛各三兩。甘草炙木通各二兩。棗廿五枚。○成氏曰。通脉者必先入心補血。當歸之苦以助心血。心苦緩。急食酸以收之。芍藥之酸。以收心氣。肝苦急。急食甘以緩之。甘草大棗木通以緩陰血。）

內有久寒加薑茱。（素有久寒者。加吳茱萸二升生薑半升酒煎。名四逆加吳茱萸生薑湯。仲景）發表溫中通脉絡。（桂枝散表風。吳茱生薑細辛溫經。當歸木通通經復脉。）不用附子及乾薑。助陽過劑陰反灼。（薑附四逆在于回陽。當歸四逆在于益血復脉。故雖內有久寒。止加生薑吳茱。不用乾薑附子。恐反灼其陰也。）

膀胱畜血

胃熱吐衄

桃仁承氣湯（仲景）五般奇、甘草硝黃并桂枝、（桃仁五十枚。去皮尖研。大黃四兩。芒硝甘草桂枝各二兩。○硝黃甘草。調胃承氣也。熱甚搏血。故加桃仁潤燥。緩肝。表症未除。故加桂枝。調營解表。）熱結膀胱小腹脹。如狂畜血最相宜、（小腹脹而小便自利。知爲血畜。下焦畜血發熱。故如狂。）

犀角地黃湯芍藥丹、（生地兩半。白芍一兩。丹皮、犀角各二錢半。每服五錢。）血升胃熱火邪干、斑黃陽毒皆堪治、（犀角大寒。解胃熱而清心火。芍藥酸寒。和陰血而散肝火。丹皮苦寒。瀉血中之伏火。生地大寒。涼血而滋水。以共平諸經之僭逆也。）或益柴芩總伐肝。（因怒致血者。加柴胡黃芩。）

咳嗽痰血

血痔便秘

咳血方（丹溪）中訶子收。栝蔞海石山梔投。青黛蜜丸口噙化。咳嗽痰血服之瘳、（訶子煨取肉。栝蔞仁去油。海石去砂。梔子炒黑。青黛水飛。等分。蜜丸。嗽甚加杏仁。○青黛清肝瀉火。梔子清肺涼心。栝蔞潤燥滑痰。海石軟堅止嗽。訶子斂肺定喘。不用血藥者。火退而血自止也。）

東垣秦艽白朮丸、歸尾桃仁枳實攢、地榆澤瀉皂角子、糊丸血痔便艱難、（大腸燥結。故便難。秦艽、白朮、歸尾酒洗、桃仁研、地榆各一兩。枳實麩炒、澤瀉、皂角子燒存性、各五錢。糊丸。○歸尾桃仁以活血。秦艽皂子以潤燥。枳實泄胃熱。澤瀉瀉濕邪。地榆以破血止血。白朮以燥濕益氣）仍有蒼朮防風劑、潤血疏風燥濕安、（本方除白朮當

ガラス使用

血淋

血熱妄行

歸地榆加蒼朮防風大黃黃柏檳榔名秦艽蒼朮湯除枳實皂角地榆加防風升麻柴胡陳皮炙甘黃柏大黃紅花名秦艽防風湯治並同

槐花散用治腸風側柏（葉）黑荊芥枳殼充爲末等分米飲

下寬腸涼血逐風功（槐花柏葉涼血枳殼寬腸荊芥理血疏風）

小薊飲子藕（節）蒲黃（炒黑）木通滑石生地襄歸草（當歸甘草）黑梔

子淡竹葉（等分煎服）血淋熱結服之涼（小薊藕節散瘀血生地涼血蒲黃止血木通瀉心火達小腸梔子散鬱火出膀胱竹葉清肺涼心滑石瀉熱利竅當歸引血歸經甘草和中調氣）

四生丸（濟生）用三般葉側柏艾荷生地協（側柏葉艾葉荷葉生地黃）等分

損傷積血

風痙通劑

生搗如泥煎血熱妄行吐衄（側柏生地補陰涼血荷葉散瘀血留好血艾葉生者性溫理氣止血）

復元活血湯（發明）柴胡花粉當歸山甲俱桃仁紅花大黃草

損傷瘀血酒煎袪（柴胡五錢花粉當歸穿山甲炮甘草紅花各二錢桃仁五十枚去皮尖研大黃一兩每服一兩酒煎血積必于兩脇屬肝膽經故以柴胡引用爲君以當歸活血脈以甘草緩其急以大黃桃仁紅花山甲花粉破血潤血）

祛風之劑（十二首附方四）

小續命湯（千金）桂附芎麻黃參芍杏防風黃芩防己兼甘草

搜風活火降火

六經風中此方通。（通治六經中風喎邪不遂語言蹇澁及剛柔二痓。亦治厥陰風。瀉防風一）錢二分。桂枝麻黃人參白芍酒炒杏仁炒研川芎酒洗黃芩酒炒防巳甘草炙各八分附子四分薑棗煎麻黃杏仁麻黃湯也治寒。桂枝芍藥桂枝湯也治風。參草補氣芎芍養血防風治風淫防巳治濕淫。附子治寒淫黃芩治熱淫。故爲治風套劑。劉宗厚曰此方無分經絡不辨寒熱虛實雖多亦奚以爲。昂按此方今人罕用然古今風方多從此方。損益爲治。

大秦艽湯（機要）羌獨防芎芷辛芩二地黃石膏歸芍苓甘朮風邪散見可通嘗（治中風風邪散見。不拘一經者。秦艽石膏各三兩。羌活獨活防風川芎白）芷黃芩酒炒生地酒洗熟地當歸酒洗白芍酒炒茯苓甘草炙白朮土炒各一兩。細辛五錢每服一兩。○劉宗

卒中痰厥

厚曰。秦艽湯愈風湯雖有補血之藥。而行經散風之劑居其大半。將何以養血而益筋骨也。昂按治風有三法。解表。攻裏。行中道也。初中必挾外感。故用風藥解表。散寒。而用血藥氣藥。調裏活血降火也。

三生飲方局用烏附星三皆生用木香聽（生南星一兩生川烏附子去皮各五錢木香二錢）加參對半扶元氣（每服一兩加參一兩）卒中痰迷服此靈（烏附燥熱。行經逐寒。南星辛烈。除痰散風。重用人參。以扶元氣少佐木香。以行逆氣。醫貫曰。此行經散痰之劑斬關擒王之將。宜急用之。凡中風。口開爲心絕。手撒爲脾絕。眼合爲肝絕。遺尿爲腎絕。鼻鼾。爲肺絕。吐沫直視髮直頭搖。面赤如粧。汗綴如珠者。皆不治。若服此劑。間有生者。）

星香散亦治卒中體肥不渴邪在經（中藏中府者重。中經者稍輕。胆星八錢散痰。木香二錢。行氣。爲末服。易簡加薑煎服。）

ガラス使用

瘖厥風痱

名星香飲

地黃飲子（河間）山茱斛。麥味菖蒲遠志茯。蓯蓉桂附巴戟天。少入薄荷薑棗服（熟地山茱肉石斛麥冬五味石菖蒲遠志茯苓肉蓯蓉官桂附子炮巴戟天等分每服五錢。加薄荷少許煎。）瘖厥風痱能治之（口噤身冷。爲瘖厥。四肢不收爲風痱。）火歸水中水生木（熟地以滋根本之陰。桂附蓯蓉巴戟以返真元之火。山茱石斛平胃溫肝。志苓菖蒲補心。通腎。麥味保肺。以滋水源。水火既交。風火自息矣。劉河間曰。中風非外中之風。良由將息失宜。心火暴甚。腎水虛衰。不能制之。故卒倒無知也。治宜和藏府。通經絡。便是治風。醫貫曰。痰涎上湧者。水不歸元也。面赤煩渴者。火不歸元也。惟桂附能引火歸元。火歸水中。則水能生木。木不生風。而風自息矣。）

瘛瘲昏

喎僻偏枯

獨活湯（丹溪）中羌獨防。芎歸辛桂參夏菖。茯神遠志白微草。瘛瘲（許熾　縱）昏憒力能匡。（羌活獨活防風當歸川芎細辛桂心人參半夏菖蒲茯神遠志白微各五錢。甘草炙二錢半。每服一兩。加薑棗煎。○肝屬風而主筋。故瘛瘲爲肝邪。二活防風治風。辛桂溫經。半夏除痰。芎歸和血。血活則風散也。肝移熱于心。則昏憒。人參補心氣。菖蒲開心竅。茯神遠志安心神。白微退熱止厥。風靜火息。血活神寧。瘛瘲自已矣。）

順風勻氣散朮烏沉。白芷天麻蘇葉參。木瓜甘草青皮合。喎僻偏枯口舌瘖。（口眼喎邪。偏枯不遂。皆由宗氣不能周于一身。白朮二錢。烏藥錢半。天麻人參各五分。蘇葉白芷木瓜青皮甘草炙沉香磨各三分。加薑煎。○天麻蘇芷以疏風氣。烏藥青沉以行滯氣。）

上中下痛風

參朮炙草以補正氣。氣勻則風順矣。木瓜伸筋。能于土中瀉木。

黃柏蒼朮天南星。桂枝（橫行）防已（下行）及威靈（仙上下行）。桃仁紅花龍膽草（下行）羌芷（上行）川芎（上下行）神麴停。痛風濕熱與痰血。上中下通用之聽。

（黃柏酒炒。蒼朮泔浸。南星薑製。各二兩。防已。桃仁去皮尖。胆草。白芷。川芎。神麴炒。各一兩。桂枝。威靈仙。紅花。羌活。各二錢半。麵糊丸。名上中下通用痛風方。丹溪。○黃柏清熱。蒼朮燥濕。龍胆瀉火。防已利水。四者治濕與熱。桃仁紅花活血去瘀。川芎血中氣藥。南星散風燥痰。四者治血與痰。羌活去百節風。白芷祛頭面風。桂枝威靈去臂脛風。四者所以治風。加神麴者。消中州陳積之氣也。症不兼者。加減爲治。）

風寒濕痺

消風散熱

獨活寄生湯（千金）艽防辛。芎歸地芍桂苓均。杜仲牛膝人參草。冷風頑痺屈能伸。（獨活桑寄生秦艽防風細辛。川芎酒洗。當歸酒洗。白芍酒炒。熟地。桂心。茯苓。杜仲薑汁炒斷絲。牛膝。人參。甘草。等分。每服四錢。）若去寄生加耆續（黃耆續斷）湯名三痺古方珍。（名三痺湯。治風寒濕三痺。喻嘉言曰。此方用參耆四物。一派補藥。加艽防勝風濕。桂心勝寒。細辛獨活通腎氣。凡治三氣襲虛成痺者。宜準諸此。）

消風散內羌防荊。芎朴參苓陳草并。殭蠶蟬蛻藿香入。爲末茶調或酒行。頭痛目昏項背急。頭麻癮疹服之清。（人參。防風。茯苓。川芎。羌活。殭蠶炒。蟬蛻。藿香。各二兩。荊芥。厚朴薑汁炒。陳皮去白。甘草炙。各五錢。每服三錢。茶調下。）

瘡癬酒下。○羌防芎荊治頭目項背之風。殭蠶蟬蛻散咽膈皮膚之風。藿香厚朴去惡散。參苓苓甘橘輔正調中。

頭目風熱

川芎茶調散（局方）荊防辛芷薄荷甘草羌。目昏鼻塞風攻上。正偏頭痛悉平康。

薄荷八錢。川芎荊芥各四錢。防風錢半。細辛一錢。羌活白芷甘草炙各二錢爲末。每服三錢茶調下。○羌活治太陽頭痛。白芷治陽明頭痛。川芎治少陽厥陰頭痛。細辛治少陰頭痛。防風爲風藥卒徒。薄荷荊芥散風熱而清頭目。以風熱攻上。宜于升散巔頂之上。惟風藥可到也。加甘草以緩中。加茶調以清降。

方內若加殭蠶菊。菊花茶調散用亦臧。

菊花清頭目。殭蠶去風痰。

頭痛濕熱

清空膏（東垣）芎草柴芩連。羌防升之入頂巔。爲末茶調如膏服。正偏頭痛一時蠲。

川芎五錢。甘草炙兩半。柴胡七錢。黃芩酒炒。黃連酒炒。羌活防風各一兩。每服三錢。○風痰濕熱上攻頭腦則痛。頭兩旁屬少陽。偏頭痛屬少陽相火。芩連苦寒。以羌防芎柴升之。則能去濕熱于高巔之上矣。

婦人血風勞

人參荊芥散（婦寶）熟地防風柴枳芎。歸比酸棗鱉羚桂。朮甘。血風勞作風虛治。

血脉空疎。乃感風邪。寒熱盜汗。久漸成勞。人參荊芥熟地柴胡枳殼棗仁炒。鱉甲童便炙。羚羊角白朮各五分。防風甘草炙川歸川芎桂心各三分。加薑煎。○荊防柴羚以疎風平木。地黃鱉甲以退熱滋陰。芎歸桂枳以止痛調經。參朮炙草棗仁以斂汗補虛。除煩進食。

寒客中焦

濟火利水

祛寒之劑　十二首　附方二

理中湯（仲景）主理中鄉。（仲景曰。理中者。理中焦。）甘草人參术黑薑。（白术土炒。二兩。人參。乾薑炮。甘草炙。各一兩。治太陰厥逆。自利不渴。脉沉無力。○人參補氣益脾。爲君。白术健脾燥濕。爲臣。甘草和中補土。爲佐。乾薑溫胃散寒。爲使。）嘔利腹痛陰寒盛。或加附子總扶陽。（名附子理中湯）

真武湯（仲景）壯腎中陽。茯苓术芍附生薑。（附子一枚炮。白术二兩炒。茯苓。白芍炒。生薑各三兩。）少陰腹痛有水氣。悸眩瞤惕保安康。（中有水氣。故心悸頭眩。汗多亡陽。故肉瞤筋惕。瞤音純。動貌。○苓术補土利水。以療悸眩。薑附回陽。益火以逐虛寒。芍藥斂陰和營。

陰症厥逆

陰盛格陽。

以止腹痛。真武北方水神。腎中火足。水乃歸元。此方補腎之陽。壯火而利水。故名。）

四逆湯（仲景）中薑附草。三陰厥逆太陽沉。（附子一枚生用。乾薑一兩。甘草炙二兩。冷服。專治三陰。厥逆。太陽初症。脉沉。亦用之。）或益薑蔥參芍桔。通陽復脉力能任。（音仁。面赤格陽于上也。加蔥白通陽。腹痛。加芍藥和陰。咽痛加桔梗利咽。利止脉不出。加人參補氣復脉。嘔吐。加生薑以散逆氣）

白通加人尿猪胆汁（湯。仲景。尿音鳥。去聲。小便也。俗讀平聲。非。）乾薑附子兼蔥白。（附子一枚炮。乾薑一兩。蔥白四莖。此白通湯也。蔥白以通陽氣。薑附以散陰寒。加人尿五合。猪胆汁一合。）熱因寒用妙義深。陰盛格陽厥無脉。（陰寒內甚。格陽于外。故厥逆無脉。純

與熱藥。則寒氣格拒不得入。故于熱劑中加尿汁寒藥以爲引用。使得入陰。而回陽也。

吐利寒厥

吳茱萸湯（仲景）人參棗。重用生薑溫胃好。陽明寒嘔（太陽熱嘔忌用）少陰下利厥陰頭痛皆能保。（吳茱萸一升泡。人參三兩。生薑六兩。棗十二枚。〇薑茱參棗補土散寒。茱萸辛熱能入厥陰。治肝氣上逆而致嘔利腹痛）

戴陽煩躁

益元湯（活人）艾附與乾薑麥味知連參草將。（附子炮。艾葉。乾薑。麥冬。五味。知母。黃連。人參。甘草。〇艾葉辛熱能回陽）薑棗葱煎入童便（冷服）。內寒外熱名戴陽（症。此陰盛格陽之症。面赤身熱。不煩而躁。但飲水不入口。爲外熱內寒。此湯薑附加知連。與白通加人尿猪胆汁同意。乃熱因寒藥爲引用也。按內熱曰煩。爲有根之火。外熱曰躁。爲無根之火。故但躁不煩及先躁後煩者。皆不治。）

三陰寒厥

回陽救急（湯節菴曰即四逆湯）用六君桂附乾薑五味群。（附子炮。乾薑。肉桂。人參各五分。白朮。茯苓各一錢。半夏。陳皮各七分。甘草三分。五味九粒。薑煎。）加麝三厘或猪胆汁。三陰寒厥見奇勳。（薑桂附子。祛其陰寒。六君溫補。助其陽氣。五味人參。以生其脈。加麝香者。以通其竅。加胆汁者。熱因寒用也。）

腎虛脾瀉

四神（丸）故紙吳茱萸。肉蔻五味四般須。大棗百枚薑八兩。（破故紙四兩。酒浸炒。吳茱萸一兩。鹽水炒。肉豆蔻二兩。麪裹煨。五味子三兩。炒。棗生薑同煎。棗爛去薑。搗棗肉爲丸。臨臥鹽湯下。若早服。不能敵一夜之陰寒也。）五更腎瀉火衰扶。（由腎命火衰。不能生。

ガラス使用

虛寒脹滿

寒疝

脾土故五更將交陽分陽虛不能鍵閉而泄瀉不可專責脾胃也故紙辛溫能補相火以通君火火盛乃能生土肉蔻煖胃固腸吳茱燥脾去濕五味補腎濟精生薑溫中大棗補土亦以防水也

厚朴溫中湯陳草苓、乾薑草蔻木香停、煎服加薑治腹痛、虛寒脹滿用皆靈、厚朴陳皮各一錢甘草茯苓草豆蔻木香各五分乾薑三分加薑煎○乾薑草蔻辛熱以散其寒陳皮木香辛溫以調其氣厚朴辛溫以散滿茯苓甘淡以利濕甘草甘平以和中寒散氣行痛脹自已矣

寒疝痛用導氣湯、川楝茴香與木香、吳茱煎以長流水、散寒通氣利小腸（疝亦名小腸氣川楝四錢木香三錢茴香二錢吳茱一錢湯泡同煎○川楝苦）寒入肝舒筋能導小腸膀胱之熱從小水下行為治疝君藥茴香煖腎散寒吳茱溫肝燥濕木香行三焦通氣

寒濕疝氣

癩疝

疝氣方（丹溪）用荔枝核、梔子山查枳殼益、（荔枝雙結狀類睾丸能入肝腎辟寒散滯梔子瀉火利水枳殼行氣破癥山查散瘀磨積睾音臯腎子也）再入吳茱煖厥陰（疝乃厥陰肝邪非腎病以肝脈絡陰器也）長流水煎疝痛釋、（等分或為末空心服）

橘核丸（濟生）中川楝桂、朴實延胡藻帶昆、桃仁二木酒糊合、癩疝痛頑鹽酒吞、（橘核川楝子海藻海帶昆布桃仁各二兩桂心厚朴枳實延胡索木通木）香各五錢酒糊為丸鹽湯或酒下○橘核木香能入厥陰氣分而行氣桃仁延胡能入厥陰血分而活血川楝木通能導小腸膀胱之濕官桂能祛肝腎之寒厚朴枳實行結水而破宿血昆布藻帶寒行水而鹹軟堅

散暑和脾

祛暑之劑　五首附方十一

三物香薷（飲局方）豆朴先、（香薷辛溫香散。能入脾肺。發越陽氣以散蒸熱。厚朴除濕散滿。扁豆清暑。和脾。）若云熱盛加黃連、（名黃連香薷飲、活人治中暑熱盛。口渴心煩。）或加苓草（茯苓甘草）名五物（香薷飲、）利濕祛暑木瓜宣、（加木瓜、名六味香薷飲。木瓜茯苓治濕盛。）再加參耆與陳朮、兼治內傷十味全、（六味加參耆陳皮白朮、名十味香薷飲）二香（散）合入香蘇飲、（五味香薷飲、合香蘇飲香附紫蘇陳皮蒼朮、名二香散。治外感。內傷身熱腹脹。）仍有藿薷（湯）香葛（湯）傳、（三物香薷飲合藿香正氣散名藿薷湯、治伏暑吐瀉。三物香薷飲加葛根、名香葛湯、治暑月傷風）

補肺生津燥濕清熱

溫脾消暑

清暑益氣湯、（東垣）參草耆當歸麥味青陳皮、麴柏葛根蒼白朮升麻澤瀉棗薑隨、（人參、黃耆、甘草炙、當歸酒洗、麥冬、五味、青皮麩炒、陳皮留白、神麴炒、黃柏酒炒、葛根、蒼朮、白朮土炒、升麻、澤瀉、加薑棗煎。○熱傷氣。參耆益氣斂汗。濕傷脾。二朮燥濕強脾。火旺則金病。而水衰。故用麥味保肺生津。黃柏瀉火滋水。青皮理氣而破滯。當歸養血而和陰。麴草和中而消食。升葛以升清。澤瀉以瀉濁也。）

縮脾飲用清暑氣、砂仁草菓烏梅暨、甘草葛根扁豆加、吐瀉煩渴溫脾胃。（砂仁、草菓煨、烏梅、甘草炙、各四兩、扁豆炒研、葛根、各二兩。○暑必兼濕。而濕屬脾土。故用砂仁草菓利氣溫脾。扁豆解暑滲濕。葛根升陽生津。甘草補土和中。烏梅清熱止渴。）古人治

保肺復脉

暑多用温（如香薷飲大順散之類）暑爲陰症此所謂（潔古曰中熱爲陽症爲有餘中暑爲陰症爲不足經日脉虚身熱得之傷暑）

大順散 杏仁薑桂甘散寒燥濕斯爲貴（先將甘草白砂炒次入乾薑杏仁炒合肉桂爲末每服二錢吳鶴皐曰此非治暑乃治暑月飲冷受傷之脾胃耳）

生脉散 麥味與人參保肺清心治暑淫氣少汗多兼口渴病危脉絶急煎斟（人參五分麥冬八分五味子九粒○人參大補肺氣麥冬甘寒潤肺五味酸收斂肺並能瀉火生津葢心主脉肺朝百脉補肺清心則氣充而脉復將死脉絶者服之能令復生夏月火旺爍金尤宜服之）

清暑利濕

行水總劑

六一散 滑石同甘草解肌行水兼清燥統治表裏及三焦熱渴暑煩瀉痢保（滑石六兩甘草一兩燈心湯下亦有用薑湯下者○滑石氣輕解肌質重降火滑能利竅淡能行水故能通治上下表裏之濕熱甘草瀉火和中又以緩滑石之寒滑也）**益元散**

碧玉散 與雞蘇散砂黛薄荷加之好（前方加辰砂名益元散取其清心加青黛名碧玉散取其涼肝加薄荷名雞蘇散取其散肺也）

利濕之劑十三首附方八

五苓散（仲景）治太陽府（太陽經熱傳入膀胱府者用之）白朮澤瀉猪茯苓膀胱化氣添官桂利便消暑煩渴清（猪苓茯苓白朮炒各十八銖澤瀉一兩六

ガラス使用

行水消痞

銖桂半兩每服三錢○二苓甘淡利水澤瀉甘鹹瀉水能入肺腎而通膀胱導水以泄火邪加白朮者補土所以制水加官桂者氣化乃能出也經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣除桂名爲四苓散無寒但渴服之靈（濕勝則氣不得施化故渴利其濕則渴自止）猪苓湯（仲景）除桂與朮加入阿膠滑石停（猪苓茯苓澤瀉阿膠滑石各一兩○滑石瀉火觧肌最能行水吳鶴皐曰以諸藥過燥故加阿膠以存津液）此爲利濕兼瀉熱疸黄（小）便閉渴嘔寧（五苓治濕勝猪苓兼熱勝）

小半夏加茯苓湯（仲景）行水散痞有生薑（半夏一升茯苓三兩生薑半斤除茯苓名小半夏湯）加桂除夏治悸厥茯苓甘草湯名彰（加桂枝甘草除半夏名茯苓甘草湯仲景治傷寒水氣乘心厥而心下悸者先治其水却治其厥○火因水而下行則悸眩止而痞滿消矣）

濕傷腰腎

腎着湯（金匱）內用乾薑茯苓甘草白朮襄傷濕身痛與腰冷亦名甘薑苓朮湯（乾薑炮茯苓各四兩甘草炙白朮炒各二兩○數藥行水補土此濕邪在經而未入府藏者）黄耆防已（湯金匱）除薑茯朮甘薑棗共煎嘗此治風水與諸濕身重汗出服之良（黄耆防已各一兩白朮七錢半甘草炙五錢加薑棗煎○防已大辛苦寒通行十二經開竅行水黄耆生用達表白朮燥濕強脾並能止汗加甘草者益土所以制水又以緩防已之峻急也）

燥實陽水

陽水

虛寒陰水

舟車丸（河間）牽牛及大黃。遂戟芫花又木香。青皮橘皮加輕粉。燥實陽水却相當。（口渴。面赤。氣粗。便秘。而腫脹者。爲陽水。黑牽牛四兩炒。大黃二兩酒浸。甘遂麵裹煨。芫花醋炒。大戟麵裹煨。青皮炒。橘紅各一兩。木香五錢。輕粉一錢。水丸。○牽牛大黃遂戟芫花行水厲藥。木香青陳以行氣。少加輕粉以透經絡。然非實症不可輕投。）

疏鑿飲　檳榔及商陸。苓皮大腹同椒目。赤豆艽羌瀉木通。煎益薑皮陽水服。（檳榔商陸茯苓皮大腹皮椒目赤小豆秦艽羌活澤瀉木通等分。加薑皮棗煎。○艽羌散濕上升。通瀉瀉濕下降。苓腹薑皮行水于皮膚。椒豆商檳攻水于腹裏。亦上。下。表。裏。分。消。之意）

實脾飲（嚴氏）苓朮與木瓜。甘草木香大腹加。草蔻附薑兼厚朴。虛寒陰水效堪誇。（便利不渴。而腫脹者。爲陰。水。茯苓。白朮土炒。木瓜甘草木香大腹子。草豆蔻煨。附子炮。黑薑厚朴炒。加薑棗煎。○脾虛。補以苓朮甘草。脾。寒。溫以蔻附黑薑。脾濕。利以茯苓大腹。脾滯。導以厚朴木香。又土之不足。由。于。木。之。有。餘。木瓜木香皆能平肝瀉木。使木。不。尅。土。而。脾。和。則土。能。制。水。而。脾。實。矣。經曰。濕。勝。則。地。泥。實。土。正。所。以。制。水。也。）

脾虛膚腫

濕氣在表

五皮飲（澹寮）用五般皮。陳茯薑桑大腹奇。或用五加（皮）易桑白。脾虛膚脹此方司。（陳皮茯苓皮薑皮桑白皮大腹皮。脾。不。能。爲。胃。行。其。津。液。故水腫半身以上宜汗。半身以下。宜利小便。此方于瀉水之中。仍寓調補之意。皆用皮者。水溢皮膚。以。皮。行。皮。也。）

羌活勝濕湯（局方）羌獨芎。甘蔓藁本與防風。濕氣在表頭腰

水腫泄瀉

重痛發汗升陽有異功。風能勝濕升能降（氣升則水自降）。不與行水滲濕同（濕氣在表宜汗。又風能勝濕。故用風藥上升。使濕從汗散。羗活獨活各一錢。川芎甘草炙。藁本防風各五分。蔓荆子三分。加有寒濕。加附子防巳。）若除獨活芎蔓草。除濕湯升麻蒼朮充。（除獨活川芎蔓荆甘草。加升麻蒼朮。名羗活除濕湯。治風濕身痛。）

大橘皮湯治濕熱。五苓六一二方綴。陳皮木香檳榔增。能消水腫及瀉泄。（用五苓散。赤茯苓一錢。猪苓澤瀉白朮桂各五分。用六一散。滑石六錢。甘草一錢。加陳皮錢半。木香檳榔各三分。每服五錢。加薑煎。小水併入大腸。致小便不利。而大便泄瀉。二散皆行水瀉熱之藥。加檳榔峻下。陳皮木香理氣。以利小便而實大便也。水腫亦濕熱爲病。故皆治之。）

黃疸

茵陳蒿湯（仲景）治疸黃。陰陽寒熱細推詳。陽黃大黃梔子入（瘀熱在裏。口渴便閉。身如橘色。脉沉實者。爲陽黃。茵陳六兩。大黃二兩酒浸。梔子十四枚。○茵陳發汗利水。能泄太陰陽明之濕熱。梔子導濕熱出小便。大黃導濕熱出大便。）陰黃附子與乾薑（主如寒濕陰黃。色暗便溏者。除梔子大黃。加乾薑附子。以燥濕散寒。）亦有不用茵陳者。仲景柏皮梔子湯。（黃柏二兩。梔子十五枚。甘草一兩。按陽黃胃有瘀熱者。宜下之。如發熱者。則勢外出而不內入。不必汗下。惟用梔子黃柏清熱利濕。以和解之。若小便利。色白。無熱者。仲景作虛勞治。用小建中湯。）

淋痛尿血

八正散（局方）木通與車前。扁蓄大黃滑石研。甘草稍瞿麥兼

梔子煎加燈草痛淋（一方有木香治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿○木通燈草瞿麥降心火入小腸車前清肝火入膀胱梔子瀉三焦鬱火大黃滑石瀉火利水之捷藥萹蓄利便通淋草稍入莖止痛雖治下焦而不專于治下必三焦通利水乃下行也）

膏淋白濁

萆薢分清飲　石菖蒲甘草稍烏藥益智俱（甘草稍減半餘藥等分）或益茯苓鹽煎服（加鹽少許）通心固腎濁精驅（遺精白濁○萆薢能泄厥陰陽明濕熱去濁分清烏藥疏逆氣而止便數益智固脾腎而開鬱結石菖蒲開九竅而通心甘草稍達腎莖而止痛使濕熱去而心腎通則氣化行而淋濁止矣此以疏泄為禁止者也）

縮泉丸　益智同烏藥（等分）山藥為糊丸便數需（鹽湯下治便數遺尿）

[illegible]瘍

當歸拈痛湯（東垣）羌防升豬澤茵陳芩葛朋二朮苦參知母草瘡瘍濕熱服皆應（當歸酒洗羌活防風升麻豬苓澤瀉茵陳黃芩酒炒葛根蒼朮白朮土炒苦參知母並酒炒甘草炙○羌活通關節防風散留濕苦參黃芩茵陳知母以泄濕熱當歸以和氣血升葛助陽而升清苓瀉瀉濕而降濁參甘二朮補正固中使苦寒不傷胃疏泄不損氣也劉宗厚曰此方東垣本治濕熱腳氣後人用治諸瘡甚驗）

潤燥之劑（十三首附方二）

虛勞肺痿

炙甘草湯（仲景）參薑桂麥冬生地大麻仁大棗阿膠加酒服虛勞肺痿效如神（甘草炙人參生薑桂枝各三兩阿膠蛤粉炒二兩生地一斤麥冬麻仁研

血虛風燥

內燥血枯

反胃噎膈

各半升、棗十二枚、水酒各半煎。仲景治傷寒脉結代、心動悸。及肺痿唾多。千金翼用治虛勞。寶鑑用治呃逆。外臺用治肺痿。○參草麥冬益氣復脉。阿膠生地補血養陰。棗麻潤滑。以緩脾胃。薑桂辛温。以散餘邪。

滋燥養榮。湯兩地黃芩甘歸芍及艽防、（艽防風藥潤劑。）爪枯膚燥。兼風秘火燥金傷血液亡。（當歸酒洗二錢、生地熟地白芍炒、黃芩酒炒、秦艽各一錢、防風甘草各五分。）

活血潤燥生津飲（丹溪）二冬熟地兼栝蔞、桃仁紅花及歸芍、利秘通幽善澤枯。（熟地當歸白芍各一錢、天冬麥冬栝蔞各八分、桃仁研、紅花各五分。）

韭汁牛乳飲（丹溪）反胃滋、養榮散瘀潤腸奇、五汁安中（飲張任候）薑梨藕三般加入用隨宜、（牛乳半升、韭菜汁少許、滚湯頓服名韭汁牛乳飲、牛乳六）分、韭汁薑汁藕汁梨汁各一分、和服、名五汁安中飲。並治噎膈。○反胃噎膈由火盛。血枯或有瘀。血寒、痰阻滞胃口。故食入反出也。牛乳潤燥養血爲君。韭汁藕汁消瘀益胃。薑汁温胃散痰。梨汁消痰降火。聽審症用之。或加陳酒亦佳。以酒乃米汁也。

風秘血秘

潤腸丸（東垣）用歸尾羌桃仁麻仁及大黃、（歸尾羌活大黃各五錢、桃仁大麻仁各一兩、蜜丸。○歸尾桃仁、潤燥活血。羌活散火、搜風。大黃破結。通幽。麻仁滑腸。利竅。）或加艽防皂角子、（風濕加秦艽防風、皂角子燒存性研。皂子得濕則滑。善通便秘。艽防治風。）風秘血秘善通腸。（風燥血燥。致大便秘。）

噎塞便閉

風秘腸風

通幽湯（東垣）中二地俱、桃仁紅花歸草濡、升麻升清以降濁（清陽不升、則濁陰不降、故大便不通。生地熟地各五分、桃仁研、紅花當歸身甘草炙、升麻各一錢）噎塞便閉此方需、有加麻仁大黃者、當歸潤腸湯名殊、（上藥皆潤燥通腸）

搜風順氣丸大黃蒸、郁李麻仁山藥增、防獨車前及檳枳、兔絲牛膝山茱仍、中風風秘及氣秘、腸風下血總堪憑、

大黃九蒸九晒五兩、大麻仁郁李仁去皮、山藥酒蒸、車前子牛膝酒蒸、山茱肉各三兩、兔絲子酒浸、防風獨活檳榔枳殼麩炒、各一兩、蜜丸、○防獨潤腎、搜風、檳枳順氣。破滯大黃經蒸晒。則性稍和緩。同二仁滑利潤燥通幽、牛膝車前下行利水、加山藥山茱兔絲固本益陽。不使過于攻散也。

胃熱消渴

腎消

消渴方（丹溪）中花粉連、藕汁生地汁牛乳研、（粉連研末、諸汁調服）或加薑（汁）蜜爲膏服、瀉火生津益血痊、（黃連瀉心火。生地滋腎水。藕汁益胃。花粉生津。牛乳潤燥益血。）

白茯苓丸治腎消、花粉黃連萆薢調、二參熟地覆盆子、石斛蛇床膍胵要、（音皮鴟、雞肫皮也、）茯苓花粉黃連萆薢人參玄參熟地黃覆盆子各一兩、石斛蛇床子各七錢半、雞膍胵三十具、微炒蜜丸、磁石湯下、○黃連降心火。石斛平胃熱。熟地玄參生腎水。覆盆蛇床固腎精、人參補氣。花粉生津。茯苓交心腎。萆薢利濕熱。膍胵治膈消、磁石色黑屬水。假之入腎也。

解毒治腎消

消渴煩躁

猪腎薺苨湯（千金）參茯神知芩葛草石膏因磁石天花同黑豆強中消渴此方珍（下消之症，莖長興盛，不交精出，名強中。緣服邪術熱藥而毒盛也。猪腎一具，大豆一升，薺苨、人參、石膏各三兩，磁石綿裹、茯神、知母、黃芩、葛根、甘草、花粉各二兩。先煮豆腎，去滓，下藥，分三服。○知芩石膏以瀉邪火，人參甘草以固正氣，葛根花粉以生津。薺苨黑豆最能解毒。磁石猪腎引之入腎也。）

地黃飲子（易簡）參耆甘二地二冬枇斛叅澤瀉枳實疏二府燥煩消渴血枯含（人參、黃耆、甘草炙、天冬、麥冬、生地、枇杷葉蜜炙、石斛、澤瀉、枳實麩炒，每服三錢。○參耆甘草以補其氣，氣能生水。二地二冬以潤其燥，潤能益血。石斛平胃，枇杷下氣，澤瀉瀉膀胱之火，枳實宣大腸之滯，使二府清，則心肺二藏之氣得以下降，而渴自止。）

氣之聲嘶

燥金受濕熱之邪

寒水膀胱也

酥蜜膏酒（千金）用飴糖二汁百部及生薑杏棗補脾兼潤肺聲嘶氣憊酒溫嘗（酥蜜、飴糖、棗肉、杏仁細研、百部汁、生薑汁，共煎一炊久，如膏，溫酒細細嚥服之。）

清燥湯（東垣）二术與黃耆參苓連柏草陳皮猪澤升柴五味麴麥冬歸地痿方推（治肺金受濕熱之邪，痿躄喘促，口渴便赤。黃耆錢半，蒼术炒一錢，白术炒、陳皮、澤瀉各五分，人參、茯苓、升麻各三分，當歸酒洗，生地、麥冬、甘草炙、神麴炒、黃柏酒炒、猪苓各二分，柴胡、黃連炒各一分，五味九粒，煎。○肺為辛金，主氣；大腸為庚金，主津。燥金受濕熱之邪，則寒水生化之源絕，而

疫癘喘渴諸症作矣參耆苓朮陳草補土以生金麥味保金而生水連柏歸地瀉火滋陰猪澤升柴升清降濁則燥金肅清水出高原而諸症平矣此方不盡肺藥因有清燥二字故附次于此然東垣所云清燥者蓋指肺與大腸爲燥金也

瀉火之劑 二十此首附方九

三焦實熱

黃連解毒湯（毒即火熱也）四味黃柏黃芩梔子備（等分）躁狂大熱嘔不眠吐血衄（鼻血音女六切）斑黃均可使若云三黃石膏湯再加麻黃及淡豉（見表裏門）此爲傷寒溫毒盛三焦表裏相兼治梔子金花丸（加大黃）（黃芩黃柏黃連梔子大黃水丸）潤腸瀉熱眞堪倚

傷寒痞滿

附子瀉心湯（仲景）用三黃（寒）加熱藥以維陽（芩連各一兩大黃二兩附子一枚炮恐三黃重損其陽故加附子）痞乃熱邪寒藥治（傷寒痞滿從外之內滿在胸而不在胃多屬熱邪故宜苦瀉若雜病之痞從內之外又宜辛散）惡寒加附始相當（經日心下痞按之軟關脈浮者大黃黃連瀉心湯心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯）大黃附子湯同意溫藥下之妙異常（大黃細辛各二兩附子一枚炮金匱陽中有陰宜以溫藥下其寒後人罕識其指）

半夏瀉心湯（仲景）黃連芩乾薑甘草與人參大棗和之治虛

肺胃實熱

肺胃虛熱

火鬱

痞法在降陽而和陰。（半夏半升黃連一兩乾薑黃芩甘草炙人參各三兩大棗十二枚治傷寒下之早胸滿而不痛者爲痞身寒而嘔飲食不下非柴胡症凡用瀉心者多屬誤下非傳經熱邪。否而不泰爲痞瀉心者必以苦故用芩連散痞者必以辛故用薑夏欲交陰陽通上下者必和其中故用參甘大棗）

白虎湯（仲景）用石膏煨。知母甘草粳米陪。（石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合）亦有加入人參者。（名人參白虎湯）躁煩熱渴舌生胎。（白虎西方金神此方淸肺金而瀉胃火故名。然必實熱方可用之或有血虛身熱脾虛發熱。及陰盛格陽類白虎湯症誤投之不可救也按白虎症脉洪大有力類白虎症脉大而虛以此爲辨又當觀小便赤者爲內熱白者爲內寒也）

竹葉石膏湯（仲景）人參。麥冬半夏與同林。甘草生薑兼粳米。

暑煩熱渴脉虛尋。（竹葉二把石膏一斤人參三兩甘草炙二兩麥冬一升半夏粳米各半升加薑煎治傷寒解後嘔渴少氣。竹葉石膏之辛寒以散餘熱參甘粳麥之甘平以補虛生津薑夏之辛溫以豁痰止嘔）

升陽散火湯（東垣）葛升柴。羌獨防風參芍儕。生炙二草加薑棗。陽經火鬱發之佳。（柴胡八錢葛根升麻羌活獨活人參白芍各五錢防風二錢半炙甘草三錢生甘草二錢每服五錢加薑棗煎。火發多在肝膽之經以木盛能生火而二經俱挾相火故以柴胡散肝爲君羌防以發太陽之火升葛以發陽明之火獨活以發少陰之火加參甘者補土以泄火加白芍者瀉肝而益脾且令散中有補發中有收也）

膈上實熱

涼膈散（局方）硝黃梔子翹。黃芩甘草薄荷饒。竹葉蜜煎療膈上。（葉生竹上。故治上焦。）中焦燥實服之消。（連翹四兩。大黃酒浸芒硝甘草各二兩。梔子炒黑黃芩酒炒薄荷各一兩。為末。每服三錢。加竹葉生蜜煎。○連翹薄荷竹葉。以升散于上。梔芩硝黃。以推瀉于下。使上升下行。而膈自清矣。加甘草生蜜者。病在膈。甘以緩之也。潘思敬曰。仲景調胃承氣湯。後人加味一變而為涼膈散。再變而為防風通聖散。）

心火淋渴

清心蓮子飲（局方）石蓮參地骨柴胡赤茯苓。耆草麥冬車前子。躁煩消渴及崩淋。（石蓮人參柴胡赤茯苓黃耆各三錢。黃芩酒炒地骨皮麥冬車前子甘草炙各二錢。○參耆甘草。補虛瀉火。柴胡地骨。退熱平肝。黃芩麥冬。清熱上焦。赤茯車前。利濕下部。中以石蓮交其心腎也。）

胃中濕熱

甘露飲（局方）兩地（生熟）與茵陳。芩枳枇杷（黃芩枳殼枇杷葉）石斛倫。甘草二冬（天麥）平胃熱。（等分煎。○二地二冬甘草石斛。平脾腎之虛熱。清而兼補。黃芩茵陳。折熱而去濕。枳殼枇杷。抑氣而降火。）桂苓犀角可加均。（加茯苓肉桂。名桂苓甘露飲。本事方加犀角。通治胃中濕熱口瘡吐衄。）

胃火牙痛

清胃散（東垣）用升麻黃。連當歸生地牡丹全。或益石膏平胃熱。口瘡吐衄（口血鼻血）及牙宣。（齒齗出血。○黃連瀉心火。亦瀉脾火。丹皮生地。平血熱。當歸引血歸經。石膏瀉陽明之火。升麻升陽明之清昜。按古人治血多用升麻。然上升之藥。終不可輕施。）

胃熱口瘡

脾胃鬱火

肺火

瀉黃散 甘草與防風。石膏梔子藿香充。炒香蜜酒調和服

胃火口瘡並見功。防風四兩甘草二兩黑梔子一兩藿香七錢石膏五錢。○梔子石膏瀉肺胃之火藿香辟惡調中。甘草補脾瀉熱重用防風者能發脾中伏火又能于土中瀉木也

錢乙瀉黃散 升防芷芩夏石斛同甘枳亦治胃熱及口瘡

火鬱發之斯爲美。升麻防風白芷各錢半黃芩枳殼半夏石斛各一錢甘草七分。○升防白芷以散胃火芩夏枳殼以清熱開鬱石斛甘草以平胃調中。

瀉白散（錢乙） 桑皮地骨皮甘草粳米四般宜。桑白皮地骨皮各一錢甘草五分粳米百粒○桑皮瀉肺火地骨退虛熱甘草補土生金粳米和中清肺李時珍曰此瀉肺諸方之準繩也

肝火

肝經濕熱

參茯知芩皆可入。（參茯苓知母黃芩聽加名加減瀉白散）肺炎喘嗽此方施。

瀉青丸（錢乙） 用龍膽梔下行瀉火大黃資羌防升上芎歸潤

火鬱肝經用此宜。龍膽草黑梔子大黃酒蒸羌活防風川芎當歸酒洗等分蜜丸竹葉湯下○羌防引火上升梔膽大黃抑火下降芎歸養肝血而潤肝燥

龍膽瀉肝湯（局方） 梔芩柴生地車前澤瀉偕木通甘草當歸

合肝經濕熱力能排。膽草酒炒梔子酒炒黃芩酒炒生地酒炒柴胡車前子澤瀉木通當歸甘草生用。○龍膽柴胡瀉肝膽之熱黃芩梔子瀉肺與三焦之熱以佐之澤瀉瀉腎經之濕木通車前瀉小

腸膀胱之濕以佐之歸地養血補肝甘草緩中益胃不令苦寒過于泄下也

肝火

當歸龍薈丸（宣明）用四黃龍膽蘆薈木麝香黑梔青黛薑湯下一切肝火盡能攘

當歸酒洗胆草酒洗梔子炒黑黃連酒炒黃柏酒炒黃芩酒炒各一兩大黃酒浸青黛水飛蘆薈各五錢木香二錢麝香五分蜜丸薑湯下。肝木爲生火之原諸經之火因之而起故以龍胆青黛入本經而直折之而以大黃芩連梔柏通平上下三焦之火也蘆薈大苦大寒氣臊入肝恐諸藥過于寒瀉故用當歸養血補肝用薑湯辛温爲引加木麝者取其行氣通竅也然非實熱不可輕投

肝火

左金丸（丹溪）茱連六一丸肝經火鬱吐吞酸

黃連六兩薑汁炒吳茱萸一兩鹽湯泡亦名茱連丸。肝實則作痛或嘔酸心爲肝子故用黃連瀉心清火使火不尅金則金能制木而肝平矣吳茱能入厥陰行氣解鬱又能引熱下行故以爲反佐寒者正治熱者反治使之相濟以立功也左金者使肺右之金得行于左而平肝也

再加芍藥名戊己丸熱瀉熱痢服之安

戊爲胃土己爲脾土加芍藥伐肝安脾使木不尅土

連附六一湯治胃痛寒因熱用理一般

黃連六兩附子一兩亦反佐也

心小腸火

導赤散（錢乙）生地與木通甘草稍竹葉四般攻口糜淋痛小腸火引熱同歸小便中

等分煎。生地涼心血竹葉清心氣木通瀉心火入小腸草稍達腎莖而止痛。

骨蒸勞熱

清骨散用銀柴胡胡連秦艽鱉甲符地骨青蒿知母草骨

蒸勞熱保無虞。（銀柴胡錢半。胡黃連。秦艽。鱉甲童便炙。地骨皮。青蒿。知母各一錢。甘草炙五分。○地骨胡連知母以平內熱。柴胡青蒿秦艽以散表邪。鱉甲引諸藥入骨。而補陰。甘草和諸藥而瀉火。）

大頭天行

普濟消毒飲（東垣）芩連鼠。玄參甘桔藍根侶。升柴馬勃連翹陳。殭蠶薄荷爲末咀。（黃芩酒炒。黃連酒炒。各五錢。玄參。甘草生用。桔梗。柴胡。陳皮去白各二錢。鼠粘子。板藍根。馬勃。連翹。薄荷各一錢。殭蠶。升麻各七分。末服。或蜜丸噙化。）或加人參或大黃。（虛者加人參。便秘加大黃。）大頭天行力能禦。（大頭天行。親戚不相訪問。染者多不救。○原交曰。芩連瀉心肺之熱爲君。玄參。陳皮。甘草瀉火補氣爲臣。連翹。薄荷。鼠粘。藍根。殭蠶。馬勃。散腫消毒定喘爲佐。升麻。柴胡。伸陽明少陽二經之陽。桔梗爲舟楫。不令下行爲載。李東垣曰。此邪熱客心肺之間。上攻頭面爲腫。以承氣瀉之。是爲誅伐無過。遂處此方。全活甚衆。）

雷頭風

清震湯（河間）治雷頭風。升麻蒼朮兩般充。（三味局方名升麻湯）荷葉一枚升胃氣。邪從上散不傳中。（頭面腫痛疙瘩。名雷頭風。一云頭如雷鳴。東垣曰。邪在三陽。不可過用寒藥重劑。誅伐無過。處清震湯。升陽解毒。蓋取震爲雷之義。）

肺癰欬吐膿血

桔梗湯（濟生）中用防已。桑皮貝母栝蔞子。甘枳當歸杏薏仁。黃耆百合薑煎此。（桔梗。防已。瓜蔞。貝母。當歸。枳殼。苡仁。桑皮各五分。黃耆七分。杏仁。百合。甘草各三分。薑煎。）肺癰吐膿或咽乾。便秘大黃可加使。（一方有人參。無枳殼。○黃耆補肺氣。杏仁。薏仁。桑皮。百合。保肺清火。栝蔞。貝母。潤肺除痰。甘桔開提氣血。利膈散寒。防已散腫除風。）

瀉濕清熱當歸以和其血枳殼以利其氣

肺火咯血

清咽太平丸薄荷芎柿霜甘桔及防風犀角蜜丸治膈熱。。早間咯血頰常紅。（兩頰肺肝之部早間寅卯木旺之時木盛生火來尅肺金薄荷十兩川芎柿霜甘草防風犀角各二兩桔梗三兩蜜丸○川芎血中氣藥散瘀升清防風血藥之使搜肝瀉肺薄荷理血散熱清咽除蒸犀角凉心清肝柿霜生津潤肺甘草緩炎上之火勢桔梗載諸藥而上浮）

胃熱發斑

消斑青黛飲（陶節菴）梔連犀知母玄參生地齊石膏柴胡人參甘草便實參去大黃躋（去人參加大黃）薑棗煎加一匙醋。陽邪裏實此方稽。（發斑雖由胃熱亦諸經之火有以助之青黛黃連清肝火梔子清心肺之火玄參知母生地清腎火犀角石膏清胃火引以柴胡使達肌表使以薑棗以和榮衛熱毒入裏亦由胃虛故以人參甘草益胃加醋者酸以收之也）

肺熱鼻瘜

辛夷散（嚴氏）裏藁本防風白芷升麻與木通芎細（川芎細辛）甘草茶調服。鼻生瘜肉此方攻。（肺經濕熱上蒸于腦入鼻而生瘜肉猶濕地得熱而生芝菌也諸藥等分末服三錢○辛夷升麻白芷能引胃中清陽上行頭腦防風藁本能入巓頂燥濕祛風細辛散熱通竅川芎散鬱疏肝木通茶清瀉火下行甘草甘平緩其辛散也）

風熱鼻淵

蒼耳散（陳無擇）中用薄荷辛夷白芷四般和。蔥茶調服疏肝。。肺。。清升濁降鼻淵瘥。（蒼耳子炒二錢半薄荷辛夷各五錢白芷一兩末服○凡頭面之疾

皆由清陽不升濁陰逆上所致濁氣上爍于腦則鼻流濁涕爲淵數藥升陽通竅除濕散風故治之也

驚悸夢遺

妙香散（王荊公）山藥與參耆甘桔三茯遠志隨少佐辰砂木香麝驚悸鬱結夢中遺（山藥二兩薑汁炒人參黃耆蜜炙茯苓茯神遠志炒各一兩桔梗甘）草各三錢辰砂二錢木香二錢半麝香一錢爲末每服二錢酒下○山藥固精參耆補氣遠志二茯清心寧神桔梗木香疏肝清肺丹麝鎭心散鬱辟邪甘草補中協和諸藥使精氣神相依邪火自退不用固澁之藥爲遺良劑以其安神利氣故亦治驚悸鬱結

除痰之劑十首附方五

一切痰飲

二陳湯（局方）用半夏陳益以茯苓甘草臣（半夏薑製二錢陳皮去白茯苓各一錢甘草五分加薑煎）利氣調中兼去濕一切痰飲此爲珍（陳皮利氣甘草和中苓夏除濕氣順濕除痰飲自散）導痰湯內加星枳頑痰膠固力能驅（加胆星以助半夏加枳實以成衝墻倒壁之功）若加竹茹與枳實湯名溫胆可寧神（二陳湯加竹茹枳實名溫胆湯治胆虛不眠）潤下丸（丹溪）僅陳皮草利氣袪痰妙絕倫陳皮去白八兩鹽五錢水浸洗甘草二兩蜜炙蒸餅糊丸薑湯下或將陳皮鹽水煮晒同甘草爲末名二賢散不可多服恐損元氣

中風痰

滌痰湯（嚴氏）用半夏星甘草橘紅參茯苓竹茹菖蒲兼枳實痰迷舌強服之醒（治中風痰迷心竅舌強不能言半夏薑製胆星各二錢半橘紅枳實茯苓）

各二錢人參菖蒲各一錢竹茹七分甘草五分加薑煎此即導痰湯加人參扶正菖蒲開竅竹茹清金

風痰驚痰

青州白丸星夏并白附川烏俱用生晒露糊丸薑薄引風痰癱瘓小兒驚

半夏水浸生衣七兩南星白附子各二兩川烏去皮臍五錢四味俱生用爲末袋盛水擺出粉再擂再擺以盡爲度磁盆盛貯日曬夜露春五夏三秋七冬十日糯米糊丸薑湯下癱瘓酒下驚風薄荷湯下。痰之生也由于風寒濕星夏辛溫祛痰燥濕烏附辛熱散寒逐風浸而暴之殺其毒也

順氣行痰

清氣化痰丸星夏橘杏仁枳實栝蔞實芩苓薑汁爲糊丸氣順火消痰自失

半夏薑製膽星各兩半橘紅枳實麩炒杏仁去皮尖栝蔞仁去油黃芩酒炒茯苓各一兩薑汁糊丸淡薑湯下。氣能發火火能生痰陳杏降逆氣枳實破滯氣芩栝平熱氣星夏燥濕氣茯苓行水氣水濕火熱皆生痰之本也故化痰必以清氣爲先

酒食生痰

順氣消食化痰丸（瑞竹堂）青陳星夏菔（卜）蘇攢麴麥山查葛杏附蒸餅爲糊薑汁摶

半夏薑製膽星各一斤陳皮去白青皮蘓子沉水者炒萊菔子生用麥芽炒神麴炒山查炒葛根杏仁去皮尖炒香附醋炒各一兩薑汁和蒸餅爲糊丸。痰由濕生星夏燥濕痰因氣升蘓卜杏仁降氣痰因氣滯青陳香附導滯痰生于酒食麴葛解酒查麥消食濕去食消則痰不生氣順則喘滿自止矣

頑痰怪病

滾痰丸（王隱君）用青礞石大黃黃芩沉水香百病多因痰作祟頑痰怪症力能匡

青礞石一兩用焰硝一兩同入瓦罐鹽泥固濟煅至石色如金爲度

大黄酒蒸黄芩酒洗各八兩沉香五錢爲末水丸薑湯下量虛實服。礞石慓悍能攻陳積伏匿之痰大黄蕩熱實以開下行之路黄芩凉心肺以平上僭之火沉香能升降諸氣以導諸藥爲使然非實體不可輕投

咳嗽多痰

金沸草散（活人）前胡辛半夏荆芥赤茯因煎加薑棗除痰嗽肺感風寒頭目顰。旋覆花前胡細辛各一錢半夏五分荆芥錢半甘草炙三分赤茯苓六分。風熱上壅故生痰作嗽荆芥發汗散風前胡旋覆消痰降氣半夏燥痰散逆甘草發散緩中細辛温經茯苓利濕用赤者入血分而瀉丙丁也局方（金沸草散）不用細辛茯加入麻黄赤芍均。治同

小腸爲丙火心爲丁火

痰厥頭痛

半夏天麻白术湯（東垣）參耆橘柏及乾薑苓瀉麥芽蒼术麯太陰痰厥頭痛良。半夏麥芽各錢半白术神麯炒各一錢人參黄耆陳皮蒼术茯苓澤瀉天麻各五分乾薑三分黄柏酒洗二分。痰厥非半夏不能除風虛非天麻不能定二术燥濕益氣參耆瀉火補中陳皮調氣升陽苓瀉瀉熱導水麯麥化滯助脾乾薑以滌中寒黄柏以瀉在泉少火也

痰瘧

常山飲（局方）中知貝取烏梅草菓檳榔聚薑棗酒水煎露之劫痰截瘧功堪詡。常山燒酒炒二錢知母貝母草菓煨檳榔各一錢烏梅二箇一方加穿山甲甘草瘧未發時面東温服。知母治陽明獨勝之熱草菓治太陰獨勝之寒二經和則陰陽不致交爭矣常山吐痰行水檳榔下氣破積貝母清火散痰烏梅斂陰退熱須用在發散表邪及提出陽分之後爲宜

劫痰截瘧

截瘧七寶飲（易簡）常山菓檳榔朴草青陳夥水酒合煎露一

宵陽經實瘧服之妥（常山酒炒草菓煨檳榔厚朴青皮陳皮甘草等分水酒各半煎露之發日早晨面東溫服○常山吐痰檳榔破積陳皮利氣青皮伐肝厚朴平胃草菓消膏粱之痰加甘草入胃佐常山以引吐也）

收濇之劑　九首附方二

夢遺滑精

金鎖固精（丸）芡蓮鬚龍骨蒺藜牡蠣需蓮粉（爲）糊丸鹽酒下濇精秘氣滑遺無（芡實蒸蓮蕊鬚沙苑蒺藜炒各二兩龍骨酥炙牡蠣鹽水煮一日夜煅粉各一兩蓮子粉爲糊丸鹽湯或酒下○芡實固精補脾牡蠣濇精清熱蓮子交通心腎蒺藜補腎益精龍骨蓮鬚皆固精收脫之品）

遺精消渴

茯菟丹（局方）有精滑脫菟苓五味石蓮末酒煮山藥爲糊丸亦治強中及消渴（強中者下消之人莖長興盛不交精出也菟絲子十兩酒浸五味子八兩白茯苓石蓮各三兩山藥六兩酒煮爲糊丸漏精鹽湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴米飲下○菟絲強陰益陽五味濇精生水石蓮清心止濁山藥利濕固脾茯苓甘淡而滲於補正中能泄腎邪也）

濕熱精濁

治濁固本（丸）蓮蕊鬚砂仁連柏二苓俱益智半夏同甘草清熱利濕固兼驅（固本之中兼利濕藥蓮鬚黃連炒各二兩砂仁黃柏益智仁半夏薑製茯苓各一兩豬苓二兩甘草炙三錢○精濁多由濕熱與痰連柏清熱二苓利濕半夏除痰濕熱多由鬱滯砂智利氣兼能固腎強脾甘草補土和中蓮鬚則濇以止脫也）

寒瀉脫肛

便數健忘

訶子散（東垣）用治寒瀉。炮薑粟殼橘紅也。（訶子煨七分。炮薑六分。御米殼去蒂蜜炙。橘紅各五分。末服。○粟殼固腎濇腸。訶子收脫住瀉。炮薑逐冷補陽。陳皮升陽調氣。）（河間訶子散）木香訶草連。仍用朮芍煎湯下。（訶子一兩半生半煨。木香五錢。黃連三錢。甘草二錢。爲末。煎白朮白芍湯調服。久瀉以此止之。不止加厚朴二錢）二方藥異治畧同。亦主脫肛便血者。

桑螵蛸散（寇宗奭）治便數。參苓龍骨同龜殼。菖蒲遠志及當歸。補腎寧心健忘覺。（桑螵蛸鹽水炒。人參。茯苓一用茯神。龍骨煆。龜板酥炙。菖蒲鹽炒。遠志。當歸等分爲末。臨臥服二錢。人參湯下。治小便數而欠。補心安神。○虛則便數。故以人參螵蛸補之。熱則便欠。故以龜板滋之。當歸潤之。菖蒲茯苓遠志並能清心熱而通心腎。使心藏清。則小腸之府自寧也）

數頻也欠短也

虛寒脫肛久痢

自汗盜汗

真人養藏湯（羅謙甫）訶粟殼肉蔻當歸桂木香朮芍參甘爲濇劑。脫肛久痢早煎嘗。（訶子麪裹煨一兩二錢。罌粟殼去蒂蜜炙三兩六錢。肉豆蔻麪裹煨五錢。當歸。白朮炒。白芍酒炒。人參各六錢。木香二兩四錢。桂八錢。生甘草一兩八錢。每服四錢。藏寒甚加附子。一方無當歸。一方有乾薑。○肛脫由于虛寒。參朮甘草以補其虛。官桂豆蔻以溫其寒。木香調氣。當歸和血。芍藥酸以收斂。訶子粟殼濇以止脫。）

當歸六黃湯治汗出。（醒而汗出曰自汗。寐而汗出曰盜汗。）耆柏芩連生熟地。（當歸黃柏黃連黃芩二地等分。黃耆加倍。）瀉火固表復滋陰。（汗由陰虛。歸地以滋其陰。汗出

陰虛盜汗

陽虛自汗

汗爲心液

（火擾黃芩栢連以瀉其火○汗由表虛倍用黃耆以固其表）加麻黃根功更異●（李時珍曰麻黃根走表能引諸藥至衛分而固腠理）或云此藥太苦寒●胃弱氣虛在所忌●

栢子仁丸人參朮麥麩●牡蠣麻黃根●再加半夏五味子●陰。虛盜汗棗丸吞●（栢子仁炒研去油二兩人參白朮牡蠣煅●麻黃根半夏五味各一兩麥麩五錢棗肉丸米飲下○心血虛則臥而汗出栢仁養心○寧神●牡蠣麥麩涼心收脫●五味斂汗半夏燥濕麻黃根前走肌表引參朮以固衛氣）

。陽虛自汗牡蠣散●黃耆浮麥麻黃根●（牡蠣煅研黃耆麻黃根各一錢浮小麥百粒煎○牡蠣浮麥涼心止汗黃耆麻黃根走肌表而固衛）撲法芎藁牡蠣粉●（撲汗法白朮藁）

蚘厥

（本川芎各二錢半糯米粉兩半爲末●袋盛遍身撲之●）或將龍骨牡蠣捫（龍骨牡蠣爲末合糯米粉等分亦可撲汗●）

殺蟲之劑 二首

烏梅丸（仲景）用細辛桂●人參附子椒薑繼●黃連黃栢及當歸●溫藏。安蚘。寒厥。劑●（烏梅三百箇醋浸蒸●細辛桂枝附子炮●人參黃栢各六兩黃連一斤●乾薑十兩川椒去汗●當歸各四兩●治傷寒厥陰症寒厥吐蚘○虫得酸則伏●故用烏梅●得苦則安●故用連栢●蚘因寒而動○故用附子椒薑●當歸補肝●人參助脾●細辛發腎邪●桂枝散表風○程郊倩曰○名曰安蚘實是安胃○故仲景云併主下痢）

腸胃諸虫

一切癰疽

金銀花一名忍冬籐

化蟲丸　鶴虱及使君。檳榔蕪荑苦楝群。白礬胡粉糊丸服。腸胃諸虫永絶氛。（鶴虱檳榔苦楝根東引者胡粉炒各一兩使君子蕪荑各五錢枯礬二錢半麪糊丸亦可末服。○數藥皆殺虫之品。单服尚可治之。彙萃爲丸。而虫焉有不死者乎。）

癰瘍之劑六首附方二

真人活命飲　金銀花。防芷歸陳草節加。貝母天花兼乳沒。穿山角刺酒煎嘉。（金銀花二錢當歸酒洗陳皮去白各錢半防風七分白芷甘草節貝母天花粉乳香各一錢沒藥五分二味另研候藥熟下皂角刺五分穿山甲三大片剉蛤粉炒去粉用好酒煎服恣飲盡醉○忍冬甘草散熱解毒癰瘡聖藥花粉貝母清痰降火防風白芷燥濕排膿當歸和血陳皮行氣乳香

補裏散表

托裏護心沒藥散瘀消腫山甲角刺透經絡而潰堅加酒以行藥勢也）一切癰疽能潰散。（已成者潰未成者散）潰後忌服用毋差。大黃便實可加使。鐵器酸物勿沾牙。

金銀花酒加甘草。奇瘍惡毒皆能保。（金銀花五兩生者更佳甘草一兩酒水煎一日一夜服盡）護膜須用**蠟礬丸**。（黃蠟二兩白礬一兩溶化爲丸酒服十丸加至百丸則有力使毒不攻心。一方加雄黃名雄礬丸蛇咬尤宜服之）二方均是瘍科寶。

托裏十補（散即局方十宣散。）參耆芎。歸桂白芷及防風。甘桔厚朴酒調服。癰瘍脉弱賴之充。（人參黃耆當歸各二錢川芎桂心白芷防風甘草桔梗厚

寒瘍內陷

內托止痛

朴各一錢。熱酒調服。○參耆補氣。當歸和血。甘草解毒。防風發表。厚朴散滿。桂芷桔梗排膿。表裏氣血交治。共成內托之功。

托裏温中（湯孫彥和）薑附羌茴木丁沉共四香陳皮益智兼甘草寒瘍內陷嘔瀉良（附子炮四錢。炮薑羌活各三錢。木香錢半。茴香丁香沉香益智仁陳皮甘草各一錢。加薑五片煎。治瘡瘍變寒。內陷。心痞便溏。嘔呃。昏聵。○瘍寒內陷。故用薑附温中。以羌活通關節。炙草益脾元。益智丁沉。以止呃進食。茴木陳皮以散滿除痞。此孫彥和治王伯祿臂瘍盛夏用此。亦捨時從症之變法也。）

托裏定痛（湯）四物兼（當歸地黃川芎白芍）乳香沒藥桂心添再加蜜

消堅散腫

炒罌粟殼潰瘍虛痛去如拈（罌粟殼收濇能止諸痛。桂心四物活血托裏充肌。乳香能引毒氣外出不致內攻。與沒藥並能消腫止痛。）

散腫潰堅（湯東垣）知柏連花粉黃芩龍胆宣升柴翹葛兼甘桔歸芍稜莪昆布全（黃芩八錢。半酒炒。半生用。知母黃柏酒炒。花粉胆草酒炒。桔梗昆布各五錢。柴胡四錢。升麻連翹。甘草炙。三稜酒炒。莪蒁酒洗炒。各三錢。葛根歸尾酒洗。白芍酒炒。各二錢。黃連一錢。每服五六錢。先浸後煎。○連翹升葛解毒升陽。甘桔花粉排膿利膈。歸芍活血。昆布散痰。稜蒁破血行氣。龍胆知柏芩連。大瀉諸經之火也。）

經產之劑

（十二首附方三十二。○婦人諸病與男子同。惟行經姙娠。則不可以例治故立經產

一

門

妊娠傷寒。

海藏妊娠六合湯。四物爲君妙義長。（當歸地黃川芎白芍）傷寒表虛地骨桂。（表虛自汗。發熱。惡寒。頭痛。脉浮。四物四兩。加桂枝地骨皮各七錢。二藥解肌。實表。名表虛六合湯）表實細辛兼麻黃。（頭痛身熱。無汗。脉緊。四物四兩。加細辛麻黃各五錢。二藥溫經。發汗。名表實六合湯）少陽柴胡黃芩入。（寒熱。脇滿。心煩。喜嘔。口苦。脉弦。爲少陽症。加柴胡解表。黃芩清裏。名柴胡六合湯）陽明石膏知母藏。（大熱。煩渴。脉大而長。爲陽明症。加白虎湯清肺瀉胃。名石膏六合湯）小便不利加苓瀉。（加茯苓澤瀉利水。名茯苓六合湯）不眠黃芩梔子良。（汗下後不得眠。加黃芩梔子養陰除煩。名梔子六合湯）風濕防風與蒼

术。（兼風兼濕。肢節煩痛。身熱。脉浮。加防風搜風。蒼术燥濕。名風濕六合湯）發斑升麻連翹當。（胃中濕熱發斑。加升麻解毒。連翹散熱。名升麻六合湯）胎動血漏加膠艾。（傷寒汗下後。胎動漏血。加阿膠艾葉益血安胎。名膠艾四物湯）虛痞朴實頗相當。（胸滿痞脹。加厚朴枳實炒。散滿消痞。名朴實六合湯）脉沉寒厥亦桂附。（身冷拘急。腹痛。脉沉。亦有不得已而加附子肉桂散寒回陽者。名附子六合湯）便秘畜血桃仁黃。（大便秘。小便赤。脉實數。或膀胱畜血。亦有加桃仁大黃潤燥通幽者。名大黃六合湯）安胎養血先爲主。餘因各症細參詳。後人法此治經水。過多過少別溫涼。溫六合湯加芩术。（加黃芩白术。治經水過多。黃芩抑陽。白术補脾。脾能統血）色黑後期連附商。（加黃

（連清熱。香附行氣。名連附六合湯）熱六合湯梔連益。（加梔子黃連。治血熱妄行。）寒六合湯加附薑。（加炮薑附子。治血海虛寒。）氣六合湯加陳朴。（加陳皮厚朴。治氣鬱。）（經卽）風六合湯加芃羌。（加秦芃羌活。治血虛風痙。）此皆經產通用劑。說與時師好審量。

胎動漏血

膠艾湯（金匱）中四物先。阿膠艾葉甘草全。（阿膠川芎甘草各二兩。艾葉當歸各三兩。芍藥地黃各四兩。酒水煎。內阿膠烊化服。○四物養血。阿膠補陰。艾葉補陽。甘草和胃。加酒行經。）婦人良方單膠艾。（亦名膠艾湯）胎動血漏腹痛痊。膠艾四物加香附。（香附用童便鹽水酒醋各浸三日炒）方名婦寶丹調經專。

養血安胎

當歸散（金匱）益婦人姙。朮芍芎歸及子芩。安胎養血宜常服。產後胎前功効深。（婦人懷姙。宜常服之。臨盆易產。且無衆疾。當歸川芎芍藥黃芩各一斤。白朮半斤。爲末。酒調服。○丹溪曰。黃芩白朮。安胎之聖藥。蓋懷姙宜清熱涼血。血不妄行。則胎安。黃芩養陰退陽。能除胃熱。白朮補脾。亦除胃熱。脾胃健。則能化血養胎。自無半產胎動血漏之患也。）

消瘀下胞

黑神散方（局）中熟地黃。歸芍甘草桂炮薑。蒲黃黑豆童便酒。消瘀下胎痛逆忘。（瘀血攻衝。則作痛。胞胎不下。亦由血滯不行。諸藥各四兩。黑豆炒去皮半升。酒童便合煎。○熟地歸芍。潤以濡血。蒲黃黑豆。滑以行血。黑薑官桂。熱以動血。緩以甘草。散以童便。行以酒力也。）

産後昏暈

清魂散（嚴氏）用澤蘭葉。人參甘草川芎協。荊芥理血兼祛風。産中昏暈神魂帖。（澤蘭人參甘草炙各三分川芎五分荊芥一錢酒調下。○川芎澤蘭和血。人參甘草補氣。外感風邪。荊芥能疏血中之風。肝藏魂。故曰清魂。）

子癇

羚羊角散（本事方）杏薏仁。防獨芎歸又茯神。酸棗木香和甘草。子癇風中可回春。（羚羊角一錢杏仁薏仁防風獨活川芎當歸茯神棗仁炒各五分木香甘草各二分半加薑煎治妊娠中風涎潮僵仆口噤搐掣名子癇。○羚羊平肝火。防獨散風邪。棗茯以寧神。芎歸以和血。杏仁木香以利氣。苡仁甘草以調脾。）

蓐勞

當歸生薑羊肉湯（金匱當歸三兩生薑五兩羊肉一斤）產中腹痛蓐勞匡。（産後發熱自汗身痛名蓐勞。腹痛者。瘀血未去。新血不生也。）亦有加入參耆者。（氣能生血。○羊肉辛熱。用氣血之屬。以補氣。血當歸引入血分。生薑引入氣分。以生新血。加參耆者。氣血交補也。）千金四物甘桂薑。（千金羊肉湯芎歸芍地甘草乾薑肉桂加羊肉煎。）

易産

達生散（丹溪。達。小羊也。取其易生。）紫蘇大腹皮。參朮甘陳歸芍隨。再加葱葉黃楊腦。孕婦臨盆先服之。（大腹皮三錢紫蘇人參白朮土炒陳皮當歸酒洗白芍酒洗各一錢甘草炙二錢青葱五葉黃楊腦七箇煎。○歸芍以益其血。參朮以補其氣。陳腹蘇葱以疏其壅。不虛。不滯。産自無難矣。）若將川芎易白朮。（名）紫蘇飲子（嚴氏）子懸宜。（胎氣不和。上衝心胸。名子懸。）

姙娠轉胞

姙娠轉胞參朮飲（丹溪轉胞者。氣血不足。或痰飲阻塞。胎爲胞逼壓在一邊。故臍下急痛。而小便或數或閉也。）芎芍當歸熟地黃。炙草陳皮（留白）兼半夏。氣升胎舉自如常。（此即八珍湯除茯苓。加陳皮半夏以除痰。加薑煎。）

血瘕

牡丹皮散（婦人良方）延胡索。歸尾桂心赤芍藥。牛膝稜莪酒水煎。氣行瘀散血瘕削。（瘀血凝聚。則成瘕。丹皮延胡索歸尾桂心各三分。赤芍牛膝莪蒁各六分。三稜四分。酒水各半煎。桂心丹皮赤芍牛膝以行其血。三稜莪蒁歸尾延胡兼行血中氣滯。氣中血滯。則結者散矣。）

經多崩漏

固經丸（婦人良方）用龜板君。黃柏樗皮香附群。黃芩芍藥酒丸服。漏下崩中色黑殷。（治經多不止。色紫黑者。龜板炙四兩。黃柏酒炒。芍藥酒炒。各二兩。樗皮炒。香附童便浸炒。各兩半。黃芩酒炒二兩。酒丸。陰虛不能制胞絡之火。故經多。龜板芍藥滋陰壯水。黃芩清上焦。黃柏瀉下焦。香附辛以散鬱。樗皮濇以收脫。）

血少經閉

栢子仁丸（良方）熟地黃。牛膝續斷澤蘭芳。卷栢加之通血脉。經枯血少腎肝匡。（栢子仁去油。牛膝酒浸。卷栢各五錢。熟地一兩。續斷澤蘭各三兩。蜜丸米飲下。經曰。心氣不得下降。則月事不來。栢子仁安神養心。熟地續斷牛膝補肝益腎。澤蘭卷栢活血通經。）

附便用雜方

生津止渴

望梅丸（訒菴）用鹽梅肉。蘇葉薄荷與柿霜。茶末麥冬糖共擣。

旅行賁服勝瓊漿。（鹽梅肉四兩。麥冬去心。薄荷葉去梗。柹霜。細茶各一兩。紫蘇葉去梗五錢。爲極細末。白霜糖四兩。共搗爲丸。雞豆大。旅行帶之。每含一丸。生津。止渴。加參一兩尤妙。）

骨灰固齒散（豕猪羊骨。臘月醃成。煆研之。骨能補骨。鹹補腎。）堅牙健啖老尤奇。（用臘月醃猪羊骨。火煆細研。每晨擦牙。不可間斷。至老而其效益彰。頭上齒骨亦佳。）

遠行健足

軟脚散中芎芷防。細辛四味研如霜。輕撒鞋中行遠道。足無箴疱汗皆香。（防風白芷各五錢。川芎細辛各三錢半。爲末。行遠路者。撒少許于鞋內。步履輕捷。不生箴疱。足汗皆香。）

終

湯頭歌括後

附小兒稀痘方

稀痘神（米以功）丹三種荳。粉草細末竹筒裝。臘月厠中浸洗淨。風乾配入梅花艮。絲瓜藤絲煎湯服。一年一次三年光。（用赤小飯豆。黑豆。菉豆。粉草各一兩。細末。入竹筒中。削皮留節。鑿孔入藥。杉木塞緊。溶蠟封固。浸臘月厠中一月。取出洗淨風乾。每藥一兩。配臘月梅花片三錢。以雪中花片落地者不着人手。以針刺取更妙。如急用。入紙套中𭟻烘即乾。兒大者服一錢。小者五分。以霜後絲瓜藤上小藤絲煎湯。空腹服。忌葷腥十二日。解出黑糞爲驗。每年服一次。一次可稀三次永不出矣。）

又方蜜調忍冬末。（顴驤字）不住服之效亦强。（金銀）

ガラス使用

（花爲末糖調不生服之）更有玄參兎絲子（妻江王相公）蜜丸如彈空心嘗白酒調化日二次（兎絲子半觔酒浸二宿煮乾去皮玄參四兩共爲細末蜜丸彈子大白湯調下）（毎日二次）或加犀麥生地黃（又方加生地麥冬四錢犀角一兩）此皆驗過稀痘法爲力簡易免倉皇

經絡歌訣小叙

古云不熟十二經絡開口動手便錯如審病在某經必用某經之藥以治之庶乎藥病相當成功可必而不然者病源莫辨部分差訛舍此有辜伐彼無過其不貽致邪失正之禍者幾希矣靈樞經脉一篇爲證治之綱領柰其文句參差繁複諷誦不易記憶尤難讀者苦之偶閱東垣醫宗起儒書中有經絡歌訣十二首煆爲七言以便誦習良爲盡善第其中詞句音韻未盡諧暢不揣愚瞽僭爲增潤復

加奇經歌訣四首補所未備其經脉所行病症所發下爲詳註使攻者無煩鉤索讀者不復聱牙昔日蠶叢今成坦道適口爽心詎不快歟此醫家必讀之書特爲梓之以公同好

康熙三十三年歲次甲戌秋月休寧八十老人汪昂題

經絡歌訣

休寧汪　昂訒菴編輯　男汪　端其兩較

十二經脉歌（增潤古本加註詳釋）

手太陰肺脉中焦起下絡大腸（肺與大腸相表裏）胃口行（胃之上脘即賁門）上膈屬肺從肺系（即喉管）横從腋下臑內縈（肘下對腋處名臑音柔）前于心與心包脉（行少陰心主之前）下用循臂骨上廉（臑盡處爲肘肘以下爲臂）遂入寸口上魚際（關前動脉爲寸口大指後肉隆起處名魚魚際其間穴名）大指內側爪甲根（少商穴止）支絡還從腕後出（臂骨盡處爲腕）接次指交陽明

經。大腸。此經多氣而少血。是動則爲喘滿欬。（肺主氣。）膨膨肺脹。缺盆痛。（肩下橫骨陷中名缺盆。陽明胃經穴。）兩手交瞀（音茂）爲臂厥。肺所生病欬上氣。喘渴（金不生水）煩心（心脈上肺）胸滿結。（脈布胸中）臑臂之內前廉痛。爲厥或爲掌中熱。（脈行少陰心主之前。掌心勞宮穴屬心包。）肩背痛是氣盛有餘。（絡脈交于手。主肩背）小便數而欠（便頻而短）或汗出。（肺主皮毛）氣虛亦痛。肩背（寒病）溺色變。（母病及子）少氣不足以報息。（肺虛）

手陽明經大腸脈。次指內側起商陽。（本經穴名）循指上廉出合谷。（俗名虎口穴）兩骨（兩指岐骨間）兩筋中間行。（手背外側。兩筋陷中陽谿穴。）循臂入肘（外廉）行臑外。（廉）肩髃（音隅肩端兩骨）前廉柱骨傍。（上出膀胱經之天柱骨會于督脈之大椎）會此（六陽經皆會于大椎。故經文云。上出于柱骨之會上）下入缺盆內。（肩下橫骨陷中）絡肺下膈屬大腸。（相爲表裏）支從缺盆上入頸。斜貫兩頰下齒當。挾口人中（鼻下溝洫）交左右。上挾鼻孔盡迎香。（本經穴終。交足陽明）此經血盛氣亦盛。是動齒痛頸亦腫。是主津液病所生。（大腸主津）目黃（大腸內熱）口乾（無津）鼽衄動。（鼽音求。鼻水。衄鼻血）喉痺（金燥）痛在肩前臑。大指次指痛不用。（不隨人用。皆經脈所過）

足陽明胃脈。鼻頞起。（山根）下循鼻外入上齒。環脣俠口交承

漿（下唇陷中）頤後大迎頰車裏。（腮下爲頷。頷下爲頤。耳下爲頰車。大迎頷下穴名。）耳前髮際至額顱。支循喉嚨缺盆入。下膈屬胃絡脾宮（相爲表裏）。直者下乳俠臍中。支者。起胃口循腹裏。下行直合氣街逢。（卽氣衝）遂由髀關抵伏兎下膝臏。（挾膝兩筋爲臏。一曰膝蓋。）循脛外廉下足跗。（足面）中指通。支從中指入大指。厲兌之穴經盡矣。（交足太陰）此經多氣復多血。振寒呻欠（呻吟。呵欠。）而顏黑。病至惡見火與人。（血氣盛而熱甚。）忌聞木聲心惕惕。（陽明土。惡木也。）閉戶塞牖欲獨處。甚則登高而歌棄衣而走。賁（奔）響腹脹（脉循腹裏。水火相激而作聲。）爲骭厥（足脛爲骭）狂瘧溫淫及汗出（陽明法多汗）。鼽衄口喎并脣胗（音軫。脣瘍。脉挾口環脣。）頸腫喉痺（循頤循喉）。腹水腫（土不制水）。膺乳（膺窗。乳中。乳根。皆本經乳間穴。）膝臏股伏兎（膝上六寸肉起處）。骭外足跗上皆痛。氣盛熱在身以前（陽明行身之前）。有餘消穀（善飢）溺黃甚。不足身以前皆寒。胃中寒而腹脹壅。

太陰脾（脉）起足大指。循指內側白肉際。過核骨後（孤拐骨。張景岳曰非也。卽大指後圓骨。）內踝前（脛旁曰踝）。上腨（音善。足肚也。一作踹。音短。足跟也。然經中二字通用。）循脛膝股裏。股內前廉入腹中。屬脾絡胃（相爲表裏）。上膈通。俠咽連舌本（舌根也）。散舌下。支者從胃上膈注心宮。此經血少而氣

眩、是動即病舌本強。（上聲）食則嘔出胃脘痛。心中善噫。（噫即噯）而腹脹。得後與氣（大便噯氣）快然衰。（病衰）脾病身重。（脾主肌肉）不能動搖。瘕泄。（瘕積泄瀉）水閉及黃疸。（脾濕）煩心心痛。（即胃脘痛）食難消。（食不下）強立股膝內多腫。（脾主四肢）不能臥因胃不和。

手少陰心（脈）起心經。下膈直絡小腸承。（相為表裏）支者挾咽繫目系。直者（從心系）上肺騰。下腋循臑後廉出。太陰（肺）心主（心包）之後行。（行二脈之後）下肘循臂（內後）廉。抵掌後銳骨之端。（掌後尖骨）小指停。（少沖穴交手太陽）此經少血而多氣。是動咽乾（少陰火脈俠咽）心痛。應目黃脇痛。（繫目出脇）渴欲飲。臂臑內（後廉）痛。掌熱蒸、

手太陽經小腸脈。小指之端起少澤。（穴本經）循手（外側）上腕（臂骨盡處為腕）出踝中。（掌側腕下銳骨為踝）上臂骨（下）廉出肘內側。兩筋之間臑外後廉。出肩解。（脊旁為膂膂上兩角為肩解）而繞肩胛。（肩下成片骨）交肩之上入缺盆。（肩下橫骨陷中）直絡心中循嗌咽。下膈抵胃屬小腸。（小腸與心為表裏）支從缺盆上頸頰。至目銳眥入耳中。（至本經聽宮穴）支者別頰復上䪼。（音拙目下）抵鼻至于目內眥。（內角）絡顴交足太陽接。嗌痛頷腫。（循咽循頸）頭難回。（不可以顧）肩似拔兮臑似折。（出肩循臑）耳聾

国立国会図書館　タイトル『增訂本草備要4巻醫方湯頭歌括1巻』 請求記号 特1-847

ガラス使用

目黃腫頰間（皆上頰）入耳至。是所生病爲主液。（小腸主液）頸頷肩臑肘臂外（廉）痛。此經少氣而多血

足太陽經膀胱脉。目內眥上額交巔。支者從巔入耳（上角）。直者從巔絡腦間。還出下項循肩膊。（肩後之下爲膊）挾脊（去脊各一寸五分，行十二俞等穴）抵腰循膂旋。（脊傍爲膂）絡腎正屬膀胱府。（相爲表裏）一支貫臀入膕傳。（從腰脊下中行，行上中下髎等穴，入膕委中穴。膝後曲處爲膕）一支從膊別貫胛（膂肉爲胛）挾脊（去脊各三寸，行附分魄戶膏肓等穴）循髀（髀樞，股外爲髀）合膕行。（與前入膕者合）貫腨（足肚）出踝（脛傍曰踝）循京骨。（本經穴，足外側赤白肉際）小指外側至陰（穴）全。（交足少陰）此經少氣而多血。頭痛脊痛腰如折。目似脫兮項似拔。膕如結兮腨如裂。痔（脉入肛）瘧（太陽瘧）狂癲疾並生。（癲狂篇亦有刺太陽經者）鼽衄（太陽經氣不能循經下行，上沖于腦而爲鼽衄）目黃而淚出。顖項背腰尻（苦高切）膕腨病。若動時皆痛徹。（以上病皆經脉所過）

足腎經脉屬少陰。斜從小指趨足心。（涌泉穴）出于然骨（一作谷。足內踝骨陷中）循內踝入跟。（足後跟）上腨膕內廉。尋上股內後廉直貫脊。（會于督脉長强穴）屬腎下絡膀胱深。（相爲表裏）直者從腎貫肝膈。入肺挾舌本。循喉嚨。支者從肺絡心上。注于胸（膻中）交手厥

特1
847

（病同于衝任者）任病男疝（內結七疝）女瘕帶（帶下瘕聚即婦人之疝）衝病裏急氣逆冲（○血不足故急氣有餘故逆此段出素問骨空論○督者督領諸經之脈也衝者其氣上衝也任者女子得之以任養也）

（陰蹻蹻脈）乃少陰（腎）之別脈起于然骨（足內踝大骨之下照海穴）至內踝直上陰股入陰間上循胸入缺盆過出人迎前（胃經頭旁動脈）入頄顴眥（目內眥睛明穴）合于太陽陽蹻和（陽蹻脈始于膀胱經之申脈穴足外踝下陷中此段出靈樞脈度篇）此皆靈素說奇經（任脈衝脈督脈帶脈陽蹻陰蹻陽維陰維謂之奇經八脈）帶及二維未說破（帶脈約束一身如帶陽維陰維周維一身之脈內經俱未言其行度）

終

特 1
847

帝國圖書館藏

ガラス使用