

W415
33

增補
重訂

內科撰要

卷二

W415
33

增補重訂內科撰要

目錄

卷四

諸氣篇第八

風氣痞滯諸症 風氣腹脹

腹鳴 氣疝 游走痛

黃疸篇第九

註 **欸** 衝 肝壅塞硬腫

膽液敗黑病篇第十

壞液鬱憂病

增補重訂內科撰要

目錄

卷四



89W50014

煩悶篇第十一

卷五

疝篇第十二 附 **增註**

水腫篇第十三

卷六

微毒篇第十四 **增補**

增註 包皮狀衝

下疳

陰頭狀衝

畢丸腫

淋疾

附 **增註**

便毒

附 **增註**

註 貌像屈

增補重訂内科撰要卷四

遠西 玉函涅斯垓我爾德兒 著

津山 宇田川 玄隨 晉 譯

加賀 藤井 方亭 俊 增譯

諸氣篇第八

羅旬名「アラタス和蘭名「ウーデン」○氣腫。風氣痞滯。子宮衝逆。風氣腹脹。腹鳴。氣疝。游走痛。是ニ屬ス

諸氣ノ大較ヲ論ス

身體何レノ部ニテモ腫脹スル處アリテ是ヲ按ス片

第五章

ハ陷塌^{シホ}シ放テバ起脹シテ復故ノ如ク。宛モ氣ヲ囊ニ充テ外ヨリ切按スル如クナル片ハ風氣其中ニ在リト稱シテ是ヲ風氣ニ屬シ。或ハ噎氣若クハ放屁ヨリシテ許多ノ氣ヲ發泄スル片ハ俱ニ風氣ノ患ナリト稱シテ是ヲ風氣ニ屬シ。或ハ腹中雷鳴スル片ハ輒チ風氣ノ致ス所ナリトシテ是ヲ風氣ニ屬シ。或ハ肉中及ビ肢節ニ痛アリテ走注游移スルヲモ亦風氣ノ所爲ナリトシテ是ヲ風氣ニ屬シ。或ハ風寒ヲ冒^{オカ}シテ歩行シ若クハ賊風^{ヒシ}アル處ニ坐臥シテ痛ヲ發スルモ亦是ヲ風氣ノ病トスルナリ此諸證ヲ察ノ風氣ノ所爲ナリトスルハ世上一般ノ

第三章

說ナリ然レハ各差別アリテ察視スヘカラザル義ノ發明ノ詳ニ後ニ載ス。斯ニハ尤モ其普通ノ說ニ從テ風氣トスル所ノ諸症ヲ舉ルナリ

諸氣ノ病因ヲ論ス

凡ソ風氣ノ名アル病ノ類。甚ダ多キニ由テ其因。衆多ナルノミナラス治法モ亦大ニ差別アリ。故ニ唯一種ノ風氣ノミヲ標準トシ概シテ其他ヲ治セントスル片ハ錯誤ヲ致ス^{アツマリ}ト多シトス。○是ヲ以テ予其風氣ニ屬スル諸病ニ就テ最モ彰著ニシテ必ズ識^シベキ者ヲ左ニ舉テ其種類ヲ辨セシム

風氣腫ノ症治ヲ論ス

第三章

凡ソ物ノ體質ニ於テ曾テ氣ヲ含蓄スルナキ者ト雖モ諸般ノ腐敗或ハ泡釀或ハ煮沸スルヨリシテ必ズ許多ノ風氣ヲ生スルナリ泡釀ハ羅旬名ハルメシ他ノ果汁ニテモ泡釀セシメテ精氣ヲ出シ酒ト爲シ或ハ乾固ノ物ハ水或ハ他ノ液ニ浸シ泡熱セシメテ精氣ヲ出スノ類是ヲ總テ泡釀ト云ス如キ類ハ或ハ火氣ヲ假リ或ハ太陽ヲ受テ浸シ置キハ其物ニ含メル鹽氣ト外ヨリ受ル温暖氣トニ因テ其物ノ體質融化疏解シテ自ラ蒸氣ヲ升發シ此ニ就テ外氣其體ニ滲入スルニ由テ其中ニ運動ヲ起シ漸次ニ泡釀化熟シテ其物ニ含蓄セル精氣出ルナリ然レバ曾テ氣ヲ含ムナキ物ト雖モ右ノ如キ泡釀ニ因テ氣ヲ生スルモスルナリ諸般ノ腐敗及ビ煮沸ニ因テ氣ヲ生スルモ是ニシテ體中ノ諸液ハ自己ノ性ヨリシテ腐壞シ是ヨリ能ク風氣ヲ生スルガ故ニ
諸液自性ヨリ腐壞スル
說第十九章第二十一章

ニ出 風氣腫ヲ發スル處ニ於テハ必ラズ腐壞液或ハ其他ノ汚液アリト知ルベシ其腐壞ヲ假ズシテ直チニ氣ニ因テ腫ヲ發スルハ唯胸部ノニ肺ハ氣ノ囊籥ヲ合テ縮張ス凡ソ諸因アリテ胸膈ノ筋膜弛弱スル處アルキハ肺ノ縮張ニ因テ胸腔内ノ氣其處ニ竄入シテ能ク氣腫故ニ其腐壞液ヲ除カズ其腐敗ニ進ム勢ヒヲ遏止スルコト能ハザル間ハ方法百計シテ其腫ヲ治スト雖モ徒ニ勞シテ功ナキナリ○是ヲ療スルノ法其腫既ニ潰口アル者ハ水銃ヲ用テ藥ヲ沃ギ入レ其内ヲ淨滌スベシ其方燒酒ニ乳香ヲ調和シ是ヲ沃ギ入テ甚キ痛ヲ發スルナク堪忍ブベキ程

ニ水ヲ加テ稀クスベシ○其腫ノ潰口ナキ者ハ是ヲ
截開テ亦前法ノ如ク療スベシ。又創口ヲ封合スベキ
ニ至ラバ寒涼ノ地ニ於テハ燒酒ニ乳香ヲ調和シテ
熨劑トシ施スベシ。熱國ニ於テハ醋ヲ以テ外敷スル
ヲ宜シトス右ノ風氣腫ハ漫腫ニシテ頭ナク是ヲ按
囊ニ充テ按ガ如シ世
外科是ヲ流注ト云
風氣發泄ノ症治ヲ論ス

雜考

曾患者ニ就テ異ムベキ一症ヲ目撃セリ。其症頃刻ノ
間ニ多ク噎氣ヲ發シ或ハ直腸ヨリ多ク風氣ヲ發泄
ス。果實ノ屬或ハ粉麩ノ類ニテ製造セル食物ヲ喫ス

ル後ハ殊ニ甚ダシ○然レ是ヲ以テ奇異ナリトスル
者ハ是レ事物ヲ實驗ノ考徵スルノ精覈ナラザル
ナリ。何トナレバ何ヲ以テ斯ノ如ク風氣ヲ生ズト云
トヲ推索シ。是ヲ事實ニ驗シテ考察スレバ膏ニ領解
シ易キノミナラズ治療ニ於テモ亦適當ノ法ヲ得ベ
キナリ○凡ソ果實若クハ粉麩ニテ製シタル食物ニ
津唾ヲ混和スル片ハ甚ダ速ニ泡釀シテ其中ニ許多
ノ氣ヲ生スルヲ以テ微トスベキノミ。故ニ右ノ食餌
胃中ニ入テ風氣ヲ發泄スルヲアテバ輒チ其泡釀ヨ
リシテ是ヲ發スト知ルベシ。或ハ肉類ニテ製造シタ

ル食物ヲ喫シテ此症ヲ發スル者ハ是レ腐敗ヨリシ
 テ發スト知ルベシ此二症共ニ前章ノ腐敗ト泡釀ノ義ヲ述ブ○壯健無病
 ノ人ハ右ノ如キ風氣ヲ生スル患ヒナシ。是レ胃及ビ
 諸腸ノ元化元運生氣全フシテ健運シ其泡釀沸騰ノ動腐
 敗變壞ノ舉ヲ制止スレバナリ○故ニ右ノ如キ風氣
 發泄ノ患アル人ハ胃ト腸トノ元化虛弱ニシテ其泡
 釀ト腐壞トヲ制止スルヲ能ハザルノ致ス所ナリト
 知ルベシ○是故ニ噯氣或ハ直腸ヨリ風氣ヲ發泄ス
 ル患ヒニ罹リ或ハ腹中風氣鬱蓄膨脹スル症ハ是ヲ
 治スルニ燒酒少許ヲ取テ橙皮モモ若クハ枸櫞皮ヲ浸シ

或ハ自餘ソノほか香料ノ藥品假令桂丁子肉豆蔻益智山柰迷迭香ノ如キヲ總稱スルナリ
 ヲ浸シ與レバ咽ニ下リテ即チ風氣ノ逆散消亡スル
 一ヲ知ルナリ。故ニ是ヲ破氣驅風ノ劑ト名ク。此藥特
 ニ胃及ビ諸腸ノ運化ヲ強健ニシ。夫ノ泡釀沸騰ノ勢
 ヲ遏止スルナリ○胃中ニ腐敗ノ物アルヨリ風氣ノ
 症ヲ發スル者ハ枸櫞汁ニ列レ印イ設セ酒ヲ加ヘ用テ速ニ
 治スルナリ○此論ヲ讀ム者胃ト腸トノ風氣ハ概シ
 テ皆夫ノ泡釀沸騰或ハ腐敗變壞ニ因テ生スト思フ
 コト勿レ。曾テ食物ニ因ラズシテ亦大ニ風氣ヲ發泄
 スル症ヲ患ル者多ケレバナリ。此症ハ是レ胃及ビ腸

ノ自然ノ常調ニ逆戻スル運動ヨリ發スト知ルベシ
 ○夫レ生人ノ身體ニ就テ歷試考究スルニ。生氣ノ運
 行調順ナレバ能ク風氣ヲ消散シ。逆戻スレバ忽チ風
 氣ヲ發現ス。其精詳ノ論ニ於テハ予ガ此略説ノ能ク
 悉ス所ニ非ルナリ。○其胃ト腸トノ運動。自然ノ常調
 ニ逆戻スル者ハ假令ハ婦人。子宮衝逆ノ病和蘭名、
ルスベル
 世ニ婦人ノ積聚衝逆ト稱スル症。皆此病ニ屬ス。如
 第百四十三章ニ略其病症ヲ論ス併考フベシ。
 キ。纒ニ心意ヲ鬱悶擾動スル片ハ胃腸ニ許多ノ風氣
 ヲ生シ或ハ是ヲ發泄スルナリ。○治法ハ香料ノ藥品
 前ニ催睡藥第四十一
注ス少許ヲ加テ與レバ其胃腸ノ

自然ニ逆戻スル運動。速ニ靜止スルナリ。故ニ阿芙蓉
 劑ハ此症ニ用テ破氣驅風ノ一良藥トス。○又左ノ方
 尤モ良驗アリ

破氣驅風劑ノ方 驅風飲

- 薄荷水 各 八勺
- 的里亞加 各 一錢半
- 沒藥丁幾去爾 各 二錢
- 橙皮油 各 五滴
- 阿芙蓉液 十五滴

急製礪砂精 一錢
 製法第五十章ニ出

白罌粟舍利別

一

右件合シテ調勻ス○先、橙皮油ニ沙糖少許ヲ研和
 スベシ然ラザレバ衆藥ト調和シ難シ○若シ沒藥
 ノ丁幾去爾ナキ片ハ是ニ代ルニ沒藥ノ末一錢ヲ
 加フベシ○若シ稍温暖ノ功アランコトヲ要セバ消
 疝露氣疝ヲ治スル 二錢ヲ加フベシ○右ノ劑ヲ四
 分分時時或ハ半時毎ニ一匙宛服シ病差ルヲ度トス

聖章

風氣腹鳴ノ症治ヲ論ス

腹鳴ハ風氣腹中ニ鬱蓄シテ運動スルノ症トスルコト
 世人一般ノ通論ナレトモ予ハ是ヲ淺陋ノ説トス。大抵

衆人オモヘラ以爲ク氣ハ能ク運動スト。然レ氣ヲシテ胃及ビ
 腸ノ如キ密閉セル處ニ遠隔シテ充塞セシムル片ハ
 毫モ自ラ運動ヲ爲スカナキコトヲ察セザレバナリ○
 何トナレバ試ニ死體ノ胃腸ニ風氣ヲ充ルト雖モ運
 動セズ。腹鳴ヲ作スコトナシ。唯生活ノ身體ノニ特リ是
 ヲ發スレバナリ○故ニ腹鳴ハ胃ト腸トノ自然ノ常
 調ニ逆戾セル運動ヲ發シテ其中ニ在ル所ノ氣ヲシ
 テ腸ノ迂曲詰盤セル屈伸襍積ノ中ヲ回轉推盪セシ
 メテ其聲ヲ生スルナリ○斯ノ如ク自然ニ反スル運
 動。其氣ヲ推盪シテ腹鳴ヲ作スノコトナラズ是ヨリ亦

能ク風氣ヲ生スルナリ。故ニ其運動頑固ニシテ休ギサ
 レバ假令タトヒ許多ノ風氣ヲ外泄スト雖モ其腹痛ハ依然
 トシテ去ラザルナリ。然レ胃疝ト名ル腹痛胃疝ノ症
 十二章二百四ハ風氣ヲ發泄スレバ其痛大ニ減スルナリ。是
 ニ出 一ニハ胃及ビ腸ノ纖維ノ痙攣拘急自ラ能ク寬縱
 ヲ爲ス候トシ。一ニハ其自然ニ反スル運動ヨリ作ホムリ
 タル風氣ノ發泄スルニ因テ其部ノ牽引急張スルモ
 亦減スレバナリ。○其治法前章ニ説ク如クシテ能ク
 治ス。是レ其自然ニ反スル運動ヲ靜止スレバ風氣自
 ラ散泄シ。痛自ラ休ム。其餘ノ風氣ハ諸藏ノ自然常調

ノ運化ニ從テ消散シ治スレバナリ。○是ヲ以テ予胃
 疝。腸疝。此疝ノ諸症第二百四十八ト稱スル症ヲ療ス
 ルニ風氣ノ發泄ナク又下劑ヲ用ヒズシテ多クハ治
 スルナリ。○然レ若シ萎黃病ノ症候第十七ヲ發スル
 ニ因テ腸中壞液アリテ侵刺シ風氣及ビ疝症ヲ發ス
 ルトヲ察セバ先ツ其壞液ヲ滌除スルヲ緊要トス。便
 チ左ノ方ヲ用フベシ
 疝ヲ治スル下劑ノ方

梅醫治疝飲

梅那葉 二錢

葛縷子 各

諸厄利斯瀉利鹽

橙皮 各一錢

右件合シテ水六弓ニ浸シ。藥氣ヲ出シ。漉過シテ左ノ藥ヲ加フ

白罌粟舍利別 一弓

右調和シ一頓ニ温服ス

白罌粟舍利別ハ予數諸篇ニ載セ且讀者ヲシテ自ラ製造セシムルヲ便利トスルガ故ニ。左ニ製法ヲ録ス。世ニ用ル尋常ノ製ヨリハ簡ニシテ精ナリ。白罌粟球二十顆ヲ取リ莖ト子ヲ去リ剉ニ水ニ淹

第六章

ス一ト一夜煮テ脆熟スルニ至リ。絞テ滓ヲ去リ。沙糖一坵ヲ加テ調和シ。更ニ煮テ舍利別ノ稠ト爲ス。稠トナルヲ云。但シ是ヲ煮ル間ニ上面ノ浮沫ヲ抄ヒ去ルベシ。○右製法ノ舍利別ハ用ル一少許ニシテ罌粟一顆ヲ服スルヨリハ其効多シトス

風氣游歷ノ症治ヲ論ス

風氣ノ游歷走注スト云ノ說第五十五章ニ云。肉中及游移スルヲモ風氣ノ所爲ナリトシテ是ヲ世ニ通シ風氣ニ屬スト是ナリ。漢人所謂歷節痛ナリテ論スル所ナレ也。予カ前ニ說ク所ノ確證アルニ若ハナシ傷冷毒篇第四十七章。痛風何トナレバ全身ノ

筋肉中ニハ必ず風氣ノ游歴スベキ空隙無ク又風氣ノ游歴スト思ヘル部ニ於テ毫モ氣ノ充脹セル候ヲ見ハストナク。唯倏忽ノ間ニ處ヲ移易スル疼痛ヲ發スルノ云。然レバ是レ實ニ風氣ノ游歴セル徵ニアラズシテ唯酷厲液アリテ走注ヲ爲ス症候トス。○然レ衆人ニ在テハ其酷厲液何ヲ以テ斯ノ如ク速ニ流移游走スト云フ。甚タ領解シ難キ所ナリ。○夫レ神經線ハ寒熱痛痒凡百ノ感觸ヲ知覺スルヲ主リ。且ツ皆數條會撮叢束ノ一箇ノ室中ニ在テ其所在ニ隨ニ諸所ヨリ相分レテ全身ノ諸藏衆器ニ循行ス。室ハ其叢束セル神

神經線ノ外圍ヲ包裹セル膜ヲ云。神經線、神經室、共ニ四十六章、第四十七章ニ出。○神經線ハ其諸部ニ循行スル支別ニ於テ故ニ第四十七章ニ説ク如キ神經液モ皆此膜室アリ。中ニ酷厲毒アリテ其初メ唯一神經線ニ著キ夫ヨリ稍轉移シテ其線ト近ク相接比スル他ノ神經線ニ著クキハ其線各相分レテ循行スル所ヲ異ニスルガユエニ其毒モ亦コレニ循ヒ相分レテ各部ニ流注スルナリ。是ヲ以テ其疼痛モ亦速ニ甚タ遠ク相隔チタル部ニ轉移スルヲ領解スベクシテ毫モ疑怪スルヲ無ルベシ。○然レバ茲ニ所謂ル風氣ノ症ハ傷冷毒第四章ニ并ニ痛風第五十二章ニ出。酷厲液ヨリ發スルヲ以テ

第三章

治法モ亦各其門ニ從テ施スベキナリ

風氣游歷寒冷ニ因ルノ症治ヲ論ス

人動モスレバ輒チ風氣ノ發動ヲ患フル性ナル者多シ。假令^{タトヘ}バ屋外敞豁ノ地ニ居リ或ハ牖間戸隙ノ處ニ坐シ或ハ風寒ヲ犯シテ往來シ或ハ纒^{ワツカ}ニ冷地ヲ步履スト雖モ忽チ風氣腹中ニ充テ所謂ル氣疝^{第二章百四}風氣ニ因ル疝痛ヲ發スルノミナラス。總身各部ニ風氣ノ走注游移スルガ如キヲ覺ル等ナリ。○是ニ於テ患者自ラ以爲^{オモヘラ}ク是レ外來ノ風寒身體ニ襲入シ内蓄シテ遍^{トク}ク竄行游走スト。乃チ賊風ヲ避^{サケ}ニガ爲ニ風氣

ノ由リ來ル所ヲ屏障シ。身ニハ巾帽ヲ被リ。又巾ヲ以テ其口ヲ蔽^{オホ}ヒ風氣ヲシテ襲入スル所無ラシムベシト。○此皆不學未熟ニシテ其病原ヲ覈知セザルガ故ナリ。何トナレバ其體中ニ覺ル風氣ハ是レ口鼻ヨリ吸入シ或ハ皮膚ヨリ感受セル等ノ外來ノ風氣ニ非ズ。唯寒涼ナル外氣ヲ以テ身體表發ノ蒸氣ヲ壅遏シテ其體中ニ滯止セル無用ノ老廢液并ニ其廢液ノ鬱聚シテ酷厲液トナル者。即チ其風氣ノ游走セル如キ疼痛ヲ發スルノ原由ナリ。○其内鬱セル廢液。專ラ神經液中ニ宿^ヤリ。腸間膜ノ神經ニ浸淫スルハ則チ其

部ニ疝痛ヲ發シ。又夫ノ自然ノ常調ニ逆戾スル運動
 ヲ發シテ腸中ニ許多ノ風氣ヲ生シ。或ハ四肢ノ神經
 ニ轉移スル片ハ歷節痛第五十一章ニ出。ヲ發スルナリ。○治
 法ハ第四十九章ノ藥劑ヲ用テ其廢液ヲ皮表ニ發遣
 シ是ヲ外洩シテ治スベキノミ

第五章

黃疸篇第九

羅甸名イクトルス
和蘭名ゲールヒクト

附 肝藏壅塞硬腫

黃疸ノ大較ヲ論ス

膽液ハ常ニ肝膽ノ二藏ヨリ膽液管ニ流通シテ胃ノ
 下口ニ連續スル所ノ十二指腸ニ輸イタシ注クナリ膽液
 肝膽ヨリ膽液ヲ受テ十二指腸ニ注ク諸管ヲ總稱ス。
 醫範提綱ニ所謂肝管膽管總管ヲ云。諸腸ノ名義肝膽
 諸管○膽液ノ平人ニ於ル其色常ニ黃ナリ。然レ
 腐敗スルニ至テハ變シテ一ナラズ。或ハ灰白或ハ綠
 色或ハ鉛色或ハ黒色トナル。○唯其膽液ノ變スルト
 變セザルトト問ハズ常例ノ如ク十二指腸ニ通泄セ
 ザルニ因テ逆流シテ靜血脉ニ滲入シ血ニ混濁スル

肝ハ 膽液管閉塞スルハ 膽液自ラ肝ニ逆流シ肝中
幹ニ出テ全身ニ 膽液ノ自家ノ黄色總身ノ皮膚。眼ノ
白膜及ビ小便ニ見ハレ。是ニ布帛若クハ紙ヲ浸セバ
其黄色ニ染漬スルヲ甚フシテ灌漑スレハ 燥雪スル
能ハズ。○大便モ亦黄色ナルヲ常トス然ルニ此症
ニ於テハ變シテ白色ヲ帶ビ或ハ灰色トナル。是レ膽
液平常ノ如ク腸中ニ輸シ來ラズシテ大便コレニ染
ルヲ無レバナリ。○唯其黄色ノ皮表ニ發見スルヲ以
テ黄疸ト名ク。膽液腐敗シテ疾ヲ發スルガ如キハ更
ニ此病ト差別アリ。前ニ云膽液ノ平人ニ於ル其色常
ニ黄ナリ。然レ腐敗スルニ至テハ

第二章

變シテ一ナラス。灰白綠色。鉛色。黑色トナル。是
ナリ。次篇ノ膽液敗黒病ヲ參考シテ知ルベシ
黄疸ノ病因ヲ論ス

凡ソ膽液ノ十二指腸へ通泄スルヲ阻遏シ。膽液ヲシ
テ流通スル處ナク。自ラ逆流シテ靜血脉ニ溢入セシ
ムル所ノ諸因ハ皆黄疸ヲ發スル因ナリト知ルベシ。
然レバ其因一樣ナラザルガ故ニ診法并ニ治法ニ於
テモ大ニ區別アリ。○予左ニ其較著ナル諸因ヲ舉テ
各治方ヲ附スルナリ

第三章

黄疸。膽液管ニ小石結成スルニ因ノ症治ヲ論ス
肝ヲハ屬黃疸ヲ發シ。毎次治療ヲ俟ズシテ自然ニ愈

ル者アリ。其症種々ノ色アル大便ヲ通ス。然レ多クハ
 白色或ハ灰色ニシテ粘稠。胸中ハ下ニ當テ數苦煩シ
 全身黄色ヲ發ス。○此症ハ小石。膽液管中ニ生シテ梗
 塞シ。膽液ノ十二指腸へ通泄スル道路ヲ遏絶スルヨ
 リ發スト知ルベシ。然レ其小石自ラ其處ヲ閉開シテ
 脱スル片ハ膽液常道ニ流通シテ此病漸ク愈ルナリ
 右ノ如キ患者ノ死體ヲ解剖シテ觀ル片ハ膽及ビ
 膽液管中ニ必ズ小石アリ。○若シ大便ニ一二ノ小石
 ヲ通シ是ヲ取テ火ニ投スレバ焚燒シルハ膽液結成
 スル微ニシテ膽液管ヨリ或ヒハ黄色ニシテ粘稠ナ
 脱出セル結石ナルヲ證ス。

ル汚液ヲ下利スルハ此病治スルノ徵トス。○故ニ此
 類ノ黃疸ハ其小石ヲ溶解消化シ且ツ大便ヲ通利ス
 ル藥劑ヲ用フベシ

結石ヲ消化シ大便ヲ利スル丸子ノ方 銷石丸

瓦爾拔奴謨

勿搦祭亞石檢 各二錢

酒石鹽 半錢

大黃末 一錢

越栗失爾剥祿布利恒 名 適

右件合シテ調勻シ。每一錢十五丸トシ。四丸宛服ス。

第三章

ルナ日ニ三四次○此患者ハ專ラ蔬菜ヲ食セシム
ルヲ佳トス。諸油膩粘稠ノ物ヲ禁スベシ

黄疸。搐掣。急ニ因ルノ症治ヲ論ス

搐掣。急ニ患ル人或ハ子宮衝逆ノ病アル者搐掣ハ和蘭名

ス。トイフテシキニ百三十八章ニ出。子宮衝逆ハ和蘭名

和蘭名ヲステイギンクノ第五十八章ノ註及ビ第百十三章ニ

略載ス。或ハ心意ヲ勞苦シテ感觸擾動スルナリ。太甚キ片ハ速ニ

急是皆内部諸藏ヲ以テ。是皆内部諸藏ヲ以テ膽液管ヲ攣縮スルナリ。甚フシテ

テ膽液已。得ズ逆流シ。靜血脉ニ滲入シテ血ニ混濁シ

濁シ。總身ニ彌漫スレバナリ。故ニ其膽液管ノ攣縮

セル間ハ黄疸治スルナシ。唯其攣縮ノ弛解スルニ

從テ漸ク消散スルナリ。是レ其膽液ノ混淆セル血ヲ

肝藏ニ於テ復悉ク滲過泌別シ。膽液ハ十二指腸へ通

泄シ去リ。身體ノ血。是ニ於テ始テ純潔トナレバナリ

○是ヲ以テ發歇往來アル黄疸ニ於テハ諸家ノ說ク

如キ膽中ニ小石アルノ確徵ヲ見スナシ往來アル

ノ結石ノ症ニ非スシテ此章ニ論スル。故ニ此症ハ膽液管ノ攣急ヨリ起ル症ナルヲ云

尋常ノ黄疸ヲ治スル方法ヲ施スト雖モ曾テ功ヲ得

ルナシ。唯第五十八章ニ舉ル搐掣。急ニ靜止スル

藥劑ヲ用レハ必ス治スルナリ。是レ自然ノ常調ニ反

劑ニシテ所謂ル破氣驅風劑ナリ。第五
 十九章ノ白罌粟舍利別モ此ニ同シ。何トナレバ其
 牽縮學急。弛解スレバ膽液自ラ常道ニ循行シ是ニ從
 テ肝藏モ亦能ク膽液ヲ血中ヨリ分利スレバナリ。便
 子顔面及ビ小便ノ黄色減スルヲ觀テ是ヲ徵スベシ
 ○故ニ小便黄色ナルハ此病治スルノ徵ニ非ズ。其色
 ノ濃キホド逾險重ナリト知ルベシ

第三章

黃疸嘔吐ニ因ルノ症治ヲ論ス

劇ク嘔吐ヲ爲ス後卒ニ發黃スル者予屢見ルヲアリ。
 是ヲ研究スルニ膽液ハ稍々ニ膽ヨリ膽液管是レ醫
ニ所謂膽管ナリ。膽ヨリ總管ニニ循行シテ漸次ニ十
連リ膽液ヲ十二指腸ニ注入スヲ循行シテ漸次ニ十

二指腸ニ注入スルヲ常トス故ニ膽中ニ膽液滿盈ス
 ル時膽液盈虚アルノ說適嘔吐ヲ發スル氏ハ是レヲ
第二章百十四章ニ出以テ緊ク膽ヲ壓搾スト雖モ嘔吐スレバ胃腸大ニ學
急シテ膽ヲ壓其中ノ膽液ヲ一頓ニ多ク十二指腸へ傾瀉スルヲ能
 ハズ且嘔吐スレバ腹筋緊攣絞急シ。十二指腸モ共ニ
 絞急スルヲ殊ニ甚フシテ膽液ノ斯ニ注入スル管口
 窒塞ス。是ニ因テ膽液劇ク壓搾セラレテ他ニ衝ク處
 ナク皆肝中ノ膽液管ニ逆行シ肝藏中ニ微細ノ膽液
管多シ此管ハ肝藏ニテ製造セル膽液ヲ受テハ輸是ニ連ル肝中ノ靜血
膽管ニ輸リ一ハ肝管ニ輸ル脈ノ支別ニ濫入シ。血ニ混淆シテ黃疸ヲ發スルナリ

○但シ此症ハ長ク暫留セズ。且ツ藥セズシテ自ラ愈
 ヲ。其故ハ嘔吐休之。胃腸ノ攣急弛緩スル片ハ肝藏ノ
 官能ヲ以テ復^テ其膽液ノ混淆セル血ヲ盡ク分泌スレ
 バナリ。然^レ凡通例是ニ治療ヲ加ヘ自然ノ治愈ヲ以テ
 藥劑ノ功トスル^ト多シ。○此症ハ後ニ載ル所ノ治法
 ヲ以テ嘔吐篇第二
百八章ニ出其劇^分キ嘔吐ヲ治スル^ト肝要ナリ。
 是ニ由テ黃疸モ亦自ラ治スレバナリ

第三章

黃疸熱病ニ因ルノ症治ヲ論ス

凡ソ熱病ニ黃疸ヲ發スル者其診法及ビ治法ニ於テ
 古今諸家ノ說大ニ紛錯ヲ致シテ一定ナラズ。故ニ其

藥劑ヲ處スルモ甚ダ異同アリ。○爰ニ悉ク是ヲ舉レ
 バ甚ダ浩繁ニシテ此略冊子ノ能ク備フベキニ非ズ。
 且、初學ノ輩ニ在テハ辨スル^ト能ハザルガ故ニ今其
 多岐ニ涉ラズシテ辨シ易キニ症ヲ舉テ左ニ示ス。○
 若シ人他病ヲ夾ム^トナキ純一ナル暫留熱第三章
ニ出ツヲ
 患ヒ。初發ヨリ第四日或ハ第七日頃ニ當テ其熱ニ因
 テ自然ノ常調ニ逆戻スル運動ヲ膽液管ニ發スル片
 ハ。膽液。腸ニ流通セズ逆流シテ自ラ膽中ニ聚リ。其失
 常ノ運動ニ因テ是ヲ肝ニ輸シ。肝中ノ膽液管ヨリ肝
 ノ靜血脉ニ驅逐シ血ト相混シテ黃疸ヲ發スルナリ

モ肝焮衝ノ如クナルニ因テ亦黃疸ヲ兼發スルヲア
リ。此症ハ刺絡ヲ施シ。且ツ第十二章ニ舉ル清涼ノ下
劑。并ニ清涼飲ヲ用テ其發熱太過ノ運動ヲ降鎮スベ
シ。是ニ由テ其熱解スレバ黃疸自ラ消散ス焮衝ハ一
テ内外ノ別アリ。其外部ニ發スル者ハ肢體各部所在
ニ拘ラズ。形狀大小ヲ論セズ。一切焮熱腫痛シテ未ダ
膿ヲ成サズ。潰破セサル症ヲ惣テ外部ノ焮衝ト名ク。
故ニ其症狀ヲ以テ言フキハ焮腫及ビ焮痛ナリ。其焮
衝ニ消散セズ。膿ヲ成シ或ハ潰破スレバ是ヲ膿瘍潰瘍
ト名ク。○内部ノ焮衝ハ凡ソ内部諸器各藏ニ於テ醜
厲性ノ血液留結シテ侵入スル處アレバ其部ニ於テ
焮熱刺痛ヲ發スル。猶外部ノ焮衝ノ如シ。是ヲ内部
ノ焮衝ト名ク。此症多クハ壯熱煩渴等凡ソ熱病ノ諸
症ヲ兼ス。是ヲ焮衝熱ト名ク。然レモ患部ニ從テ其症亦
同ジカラズ。假令焮衝ハ腦ノ焮衝ハ烈キ頭痛。不寐譫語狂
躁ヲ兼テ咽喉焮衝ハ咽喉焮腫疼痛。肺焮衝ハ效劇

モ肝焮衝ノ如クナルニ因テ亦黃疸ヲ兼發スルヲア
リ。此症ハ刺絡ヲ施シ。且ツ第十二章ニ舉ル清涼ノ下
劑。并ニ清涼飲ヲ用テ其發熱太過ノ運動ヲ降鎮スベ
シ。是ニ由テ其熱解スレバ黃疸自ラ消散ス焮衝ハ一
テ内外ノ別アリ。其外部ニ發スル者ハ肢體各部所在
ニ拘ラズ。形狀大小ヲ論セズ。一切焮熱腫痛シテ未ダ
膿ヲ成サズ。潰破セサル症ヲ惣テ外部ノ焮衝ト名ク。
故ニ其症狀ヲ以テ言フキハ焮腫及ビ焮痛ナリ。其焮
衝ニ消散セズ。膿ヲ成シ或ハ潰破スレバ是ヲ膿瘍潰瘍
ト名ク。○内部ノ焮衝ハ凡ソ内部諸器各藏ニ於テ醜
厲性ノ血液留結シテ侵入スル處アレバ其部ニ於テ
焮熱刺痛ヲ發スル。猶外部ノ焮衝ノ如シ。是ヲ内部
ノ焮衝ト名ク。此症多クハ壯熱煩渴等凡ソ熱病ノ諸
症ヲ兼ス。是ヲ焮衝熱ト名ク。然レモ患部ニ從テ其症亦
同ジカラズ。假令焮衝ハ腦ノ焮衝ハ烈キ頭痛。不寐譫語狂
躁ヲ兼テ咽喉焮衝ハ咽喉焮腫疼痛。肺焮衝ハ效劇

呼吸不利。促迫ヲ兼子。胸肋焮衝。ハ胸肋刺痛。呼吸ニ牽引スル等ナリ。其他肝脾橫膈胃腸腎膀胱子宮等皆其部位ニ焮熱刺痛ヲ發スルト。其兼症ト。就テ其處ノ焮衝タルヲ知ル。此内部焮衝ト。消散セザレバ。終ニ膿ヲ成ス。是ヲ内瘍トス。即チ肺瘍腸瘍ノ如シ。或ハ膿ヲ成サズ。變壞シテ壞疽トナル症アリ。其症治皆内科諸書ニ詳ナリ。

黃疸

肝ノ壅塞。硬腫ニ因ルノ症治ヲ論ス。

肝藏ニ壅塞及ビ頑硬結腫ヲ生スル片ハ是ヲ以テ膽液ノ腸ニ通スル道路ヲ阻遏スルニ因テ最モ險惡ナル一種ノ黃疸ヲ發スルアリ。○此症ハ先ツ其肝ノ壅塞ヲ疏通シ。膽液ノ道路ヲシテ障碍ナク通利セシムルニ非レバ黃疸モ亦治スルヲ能ハス。然レモ容易

ニ是ヲ疏通スベカラザルガ故ニ此症最モ險惡ナル

所以ナリ。○其症。上腹鳩尾ヨリ其兩側短肋ノ下ニ於

テ痞脹硬滿シ。殊ニ右肋ノ下。肝藏ノ部位ニ於テ甚シ

○總テ肝藏壅塞スル片ハ悉ク黃疸ヲ發スト思フ

勿レ。唯其壅塞ニ就テ膽液ノ道路ヲ阻遏スル片ハ輒

チ黃疸ヲ發スルナリ。○此肝藏ノ壅塞及ビ硬腫。長ク

替留シテ去ザレバ膽液モ久ク鬱滯シテ漸ク腐敗シ

宛モ諸般ノ液汁久ク鬱滯ノ腐敗スルガ如ク是ニ因

テ黃疸モ漸次ニ險重ト爲リ。膽液モ終ニ變シテ黑色

ト爲ルナリ。○此症ハ其鬱滯セル膽液ヲ通泄スル療

法ヲ施スト雖モ必ズ効ナク。又幾許イカホ黃色ノ小便ヲ通
 スルヲ多シト雖モ曾テ治スルヲナクイラク逾險重ナリト
 知ルベシ。其故ハ腎ハ小便ヲ分利スル器ナレバ膽液
 ヲ血中ヨリ分泌スルコト能ハズ。唯肝藏開通シテ膽
 液ヲ分泌スルニ非レバ治セザレバナリ。○是故ニ意
 ヲ用ヒカヲ竭トクシテ方藥ヲ處シ。其肝藏ノ壅塞ヲ開達
 疏通スルヲ肝要ナリ。然凡其壅塞ノ因。一ナラザルガ
 故ニ爰ニ盡ク歷舉スルヲ能ハズ。唯此症通例粘稠液
 ヲリ發スルヲ多キガ故ニ特ニ其方劑ヲ示スノニ其
 他ハ其壅塞ノ因ニ從ヒ諸書ニ載ル所ノ各異ノ治法

ヲ考索シテ療スベシ

凝結ヲ疏解スル熨劑ノ方

解凝熨方

蒲里阿尼亞 一握

亞爾鮮葉 二握

接骨木花 一握

胡盧巴子 末 二握

右件水ト葡萄酒ト等分ヲ用テ煮テシツ布ヲト爲シ

温ニ乘シテ肝ノ部ニ貼ス。更換スルヲ日ニ二次。先

ヅテ的列竝底那油。少許ヲ用テ患處ニ摩擦シ。然シテ

貼スベシ

凝結ヲ疏解スル散劑ノ方

盧沒解凝散

盧會 半錢

沒藥 二錢

酒石鹽 各一錢

乳香 各一錢

右件散劑トシ。分テ十二服トシ。一服宛用フル。日ニ兩三次

凝結ヲ疏解スル膏藥ノ方

石鹼解凝膏

謨失刺及尼蒲私膏 各一錢

石鹼膏 各一錢

右件合シテ調和シ。軟革ニ攤テ拔爾撒謨。字露ヲ適宜ニ塗り患部ニ貼ス。○前ニ記ス熨劑ヲ施ス。能ハザル者ハ此膏ヲ貼スベシ。○若シ右ノ膏兩種ヲ得ル。能ハザル者ハ其中ノ一種ノニ用テ。可ナ

膽液敗黑病篇第十 羅旬名メラシコリア和蘭名スワルトガルニキテ

附 壞液鬱憂病

第五章

膽液敗黑病ノ大較ヲ論ス

膽液敗黑病ハ患者故ナクノ鬱憂悲悶シ又神志知覺常ノ如ク爽明ナラスノ疑惑迷罔シ事ニ臨テ思慮錯謬スル症ヲ發スルナリ是レ元來膽液腐敗シ變ノ黒色トナルヨリ發スルガユエニ爾ナカ命ナクト雖モ他ノ因ヨリノ右ノ症ヲ發スルヲモ亦概ノ此名ヲ命スルナリ○此病今人通シテ依イ剝ホ昆コン堙デル兒ル一稱ス然レ依イ剝ホ昆コン堙デル兒ルハ元來上腹痛ト名クベキ者ニシテ此病ノ名ニ

適當セザルナリ短肋ノ下。腹ノ上邊ノ部ヲ總テ依剝
 困重ノ心思鬱憂病ト異ナレハ依剝昆垚兒ト名ク。是其
 病因ハ膽液敗黒病以テ今人通ノ此病 ○予意ニ敗黒セル膽液ノ病ハ多
 ノ名トスルヲ云
 少ハ鬱憂悲悶シテ神識知覺ノ差常ニ違ヘル症ヲ發
 スル下恰モ依剝昆垚兒ノ病ノ如ク又短肋ノ軟骨下
 ノ短肋ノ下端腹ニ向所謂依剝昆垚里亞ノ部ニ當テ其
 諸症候ヲ發スルガ故ニ爾ク是ヲ依剝昆垚兒ト名ル
 ナルベシ ○凡ソ神志知覺迷罔シテ鬱憂悲悶ヲ發ス
 ル病。概シテ是ヲ膽液敗黒病ニ屬シ。又コレニ依剝昆
 垚兒ノ名ヲ命スルガユエニ。治法ニ就テ大ニ紛亂ヲ

第三章

致スナリ。何トナレバ予。世ニ通シテ依剝昆垚兒ト稱
 スル所ノ意思ノ常態ヲ變易セル病ヲ見ルニ。少シモ
 膽液敗黒ノ徵ナキ者數コレアリ。然レバ此症ニ膽液
 敗黒ノ治法ヲ施ス片ハ逾險重ニ進ムナリ ○故ニ予。
 世ニ依剝昆垚兒ト稱スル病ニ二種ノ區別アルヲ
 左ニ記ス。其二種ハ神志痴迷昏惑シ。多クハ熱ナク
 必ズ鬱憂悲悶ヲ兼ルナリ

膽液敗黒病ノ因ヲ論ス

夫レ人ノ事物ヲ辨知シ道理ヲ識別スル所以ノ者ハ
 皆ニ腦ノ機關。平全健康ナルノミナラズ。又其灌溉ス

此言此和攝藥

精氣ハ和蘭名

ル所ノ精氣ノ常性ヲ爽ハガルニ因ル
活的ノ精氣ニシテ即チ醫範提綱ニ所謂靈液ナリ是
痛痒ヲ知リ生シ神經ニ流通シテ全身ニ灌漑普達シ寒熱
神氣ヲ含メリ生シ故ニ神識ノ妙用ヲ主ル此中ニ靈妙ナル
章ニ論スルガ如シ假令バ酒或ハ斯ノ如キ醞釀セ
ル飲液或ハ性氣ノ慄悍ナル藥ヲ服スレバ精氣是ガ
為メニ變化セラレテ常性ヲ失ヒ其醜陋セル者ト平
人ト思慮言動ノ同ジカラズシテ情態大ニ徑庭アル
ト是レ其較著ニシテ領解シ易キ所ナリ○膽液敗黑
病モ亦斯ノ如ク其敗黑ノ膽液腦中ニ運輸スル片ハ
精氣是レニ變化セラレテ必ズ鬱憂悲悶ノ症ヲ發ス

第三章

ルナリ凡ク酒ノ類慄悍ノ飲液ヲ服シテ血ニ入リ上
ノ性ニ從テ神識思想ノ常態ヲ變セシム敗黑膽液モ
亦斯ノ如ク腦ニ運行シ靈液ニ混スレバ其敗黑液ノ
自性ヲ以テ活潑爽明ナル精神ヲ○然レ虛弱ノ人ニ
抑壓蔽塞シテ憂悶ヲ生スルナリ
於テハ膽液敗黑ニ非スシテ唯壞液ヨリ此病ヲ發シ
淹滯シテ經年治セザル者ヲ見ルアリ○右ノ二種
ノ病治法ヲ一ニシテ治スベキ者ナラバ予豈敢テ研
究覃思シテ差別ヲ爲サンヤ唯此差別治法ニ於テ工
夫ヲ爲スノ一大綱要タレバナリ

膽液敗黑病ノ症治ヲ論ス

敗黑膽液ヲ生スル諸因ヲ悉ク舉ント欲スレバ甚ク

冗長ナルガユエニ爰ニ只其症治ヲ示スノ云○敗黒
セル膽液ハ門脉中ニ鬱積シテ大抵上腹ノ部ニ在リ
是レ依剥昆垓里亞故ニ此部ニ當テ苦煩痞悶シテ冷
ノ部ナリ前ニ註スル故ニ此部ニ當テ苦煩痞悶シテ冷
ル等ノ症ヲ發ス若シ治セスシテ久ヲ經其敗黒液漸
次ニ靜血脉大幹ニ入り腦ニ上行スル片ハ其敗黒液
肝中ノ門
脉ヨリ肝ノ靜脉ニ入り夫ヨリ靜脉大幹ニ入り
心肺ヲ經テ動脉大幹ニ入り腦ニ上行スルヲ云神識
知覺始テ守操ヲ失テ痴疑迷罔シ故ナクシテ鬱憂悲
悶シ間室無人ノ處ニ獨居スルヲ好ムナリ○患者
ノ皮色平常ニ比スレバ黯楮ニ見ユルヲ多シ○此症
ハ衆人以為少刺絡シテ其意思ノ變動ヲ鎮定スベシ

ト。若シ果シテ刺絡スル片ハ必ス困篤ニ進ムナリ。是
レ其敗黒液。虚ニ乘シテ逾多ク門脉ヨリ靜血脉大幹
ニ濫入スルノ象ヲ開ケバナリ○是ヲ以テ此ヲ治ス
ルニ唯其敗黒液ヲ大便ヨリ驅除スルヲ良法トス。是
レ腸間膜ノ靜血脉ハ能ク其敗黒液ヲ門脉ヨリ腸中
へ通泄スレバナリ腸間膜ノ靜血脉ハ即チ門脉ノ支
別ニシテ門脉幹ニ連ル故ニ門脉
ノ敗黒液ヨリ腸ニ通泄スルナリ第二章ニ
云。屍ニ就テ試ニ水銃ヲ以テ蠟ヲ門脉ニ灌入スル片
ハ亦其諸支ヨリ腸中ニ通泄スルナリト○故ニ能ク意ヲ用テ其敗黒液
ヲ少シ宛漸次ニ泄除スベキガ爲ニ。數日ノ間。大便。平
常ヨリハ多ク通利セシムルヲ緊要トス○此病ハ予。

甘乳清ニ瀉利塩。少許ヲ和シテ數日用ルナリ。若シ是
 ヲ用テ適意ニ通利セザルハ梅那葉ヲ加テ泡劑トシ
 用ベシ。若シ稍清凉ノ効ヲ増ント欲セバ答末林度少
 許ヲ加フベシ。○若シ乳清ノ缺ルニ遇バ稀キ大麥煮
 汁ニ右ノ藥ヲ加ヘ用ベシ

第五章

鬱憂病。壞液ニ因ルノ症治ヲ論ス

予屢見ルニ或ハ長病ノ後。或ハ衰弱虚損ノ後。或ハ大
 ニ失血シ。若クハ婦人産後等ニ於テ鬱憂悲惋シテ精
 神痴迷狂錯ノ症ヲ發スル者アリ。○予是ヲ熟察スル
 ニ衰弱虚損。及ビ亡血。脱液ノ入ニ於テハ體中ノ諸液

其自性ヨリ變壞シテ更ニ平全ノ常性ヲ違フ遠キニ
 至リ。其變壞セル血液ヨリ精氣ヲ分泌シ出スヲ以テ
 精氣モ亦其常性ニ違フテ意思ノ變動ヲ致スナリ。○
 此症ニ刺絡ヲ施シ或ハ下劑ヲ用レバ逾日ニ困篤ニ
 進テ救ハレザルニ至ルヲ予屢目撃セリ。然ルニ予前
 コ著ス自性ノ壞液壞液篇ニ出ルニ於テ講明セル治
 法ヲ專一ニ施シ持モトホ久シテ變セス用テ調養スル片ハ
 遂ニ全ク治スルナリ。○自性ノ壞液ハ甚ダ久ヲ經テ
 漸ク治スベキガ故ニ此依イホ剥コシ昆シ堉デ兒ルノ種類ハ速ニ治
 スベシト思フヲ勿レ

煩悶篇第十一

羅甸名アシキニタス
和蘭名ベナウドヘイジ

聖章

煩悶ノ大較ヲ論ス

煩悶ハ意識ノ疾ナリト釋スルノミニテ其症狀ヲ説
 キ示シ難ク或ハ次ニ説ク如キ内藏ニ係ル病ナリト
 云ノ外ニ復是ヲ説クコト能ハズ。然ル所以ハ患者煩
 悶スト雖^レ定テ何ノ症ヲ以テ何レノ處ニ發スト云
 一ヲ自ラ言ガタケレバナリ。然^レ是レ大抵痛痒及ヒ
 斯ノ如キ觸覺ル^レアリテ發スルナリ○然レバ凡ソ
 疾患ニ就テ其厭ヒ苦ム所ヲ覺エ。百般計較シテ自ラ
 其耐忍^スフベカラザル所ノ苦惱ヲ免^ニン^クヲ營求スル

此言外和推論

醫學堂藏

か故ニ其肢體ヲ動搖シテ須臾モ休ス。轉展反側シテ起臥安カラザル所。即チ是レ煩悶ナリト知ルベシ

第七章

煩悶ノ所在ヲ論ス

夫レ煩悶ト四肢關節ニ發スル疼痛トハ各、其所在ヲ異ニス。煩悶ハ唯内部ノ諸藏ノミニ在テ必ズ肢體外部ノ筋肉ニ在ル者ニ非レバナリ。故ニ疼痛ト煩悶トハ其患部ヲ異ニスト知ルベシ。○元運生氣ノ全身一般ニ公行シテ運營ヲ爲スノ外ニ更ニ又各自一箇ノ運營ヲ爲ス諸器ニ於テ此煩悶ヲ觸覺ルヲ發明セリ。コレ即肺。胃。子宮等ノ如シ。○故ニ其各自ノ運營ヲ

第七章

障碍セラル、コアルキハ必ズ煩悶ヲ發スト知ルベシ

煩悶ノ病因ヲ論ス

煩悶ノ諸因ヲ悉ク舉ント欲スレバ甚々繁冗ナルカ故ニ爰ニ是ヲ略セリ。○若シ夫ノ外部四肢ノ疼痛、其所在ヲ轉移シテ内部ニ陥入スルキハ輒チ煩悶ヲ發ス。故ニ諸疼痛ヲ發スル因ハ即煩悶ノ因ナリト知ルベシ。○疼痛ノ諸因ハ予ガ著ス所ノ瘍科精選ニ載ス

第七章

煩悶ノ治法ヲ論ス

若シ人。外部四肢等ニ疼痛ヲ患ル、有テ偶、消散シ。或ハ皮上ニ發出セル瘡瘍。潜伏内陷シテ煩悶ヲ發スル

か如キハ第四十九章ニ出ス發汗劑ヲ用テ其毒ヲ復
 外表ニ驅發スベシ○或ハ第十五章ニ説ク如キ腐敗
 毒。所謂ル腐敗ノ膽液。夥ク胃中ニ鬱積シテ煩悶ヲ發
 スル者ハ同章ニ出ス吐藥ヲ用テ湧泄シ是ヲ治スベ
 第_{十五}章ニ云所ノ腐敗ノ汚物ハ即チ腐敗膽液十
 リ又腐敗膽液ノ説。痲篇。第_{二百四十五}章。霍亂篇。第
 二_{百七十一}章。惡心篇。第_二○第_{十二}章ニ論スル如キ
 百_六章ニ詳ナリ併考ベシ○第_{十二}章ニ論スル如キ
 熱病ノ大過強盛ナル運行ニ因テ煩悶スル者ハ一次
 刺絡シテ後。清涼劑ヲ用テ是ヲ治スベシ方。第_{十二}
 章ニ出

增補重訂内科撰要卷四終

增補重訂内科撰要卷五

遠西 玉函涅斯垓我爾德兒 著

津山 宇田川 玄 隨 晉 譯

加賀 藤 井 方 亭 俊 增譯

非篇第十二 羅甸名「バラレイシス」和蘭名「ラムミフヘイ」

非ノ大較ヲ論ス

夫レ人常ニ其意ノ欲スル所ニ隨テ運轉舉動ヲ爲ス
 所以ノ者ハ諸筋其職掌ヲ失ハズシテ能ク運營ヲ爲

セバナリ。然ルニ若シ諸筋ニ於テ多少部分ヲ問ハズ。其運動スル精力敗失スル片ハ其筋痿弱シテ運轉セズ。其部癱瘓シテ舉動セズ。唯傍人はヲ扶テ屈伸セシムルノミ。是ヲ名テ非トスルナリ。○其非ヲ發スル處ハ寒熱痛痒ヲ知覺スルノ機。減シテ麻痺スルナリ。然レ其部ニ於テ生氣ノ運行モ共ニ廢絶スル片ハ即チ其部死壞スルガ故ニ是ヲ非病ニ屬スルナシ。死壞バ所謂壞疽ニシテ非ニアラザルヲ云

癰疽

癰疽ノ病因ヲ論ス

全身ノ諸筋。各自ノ運動ヲ爲ス所以ノ者ハ夫ノ神經

線ナル者。腦ト脊髓トニ起リテ諸筋ニ循行彌蔓シ常ニ精氣ヲ其中ニ流通スルヲ以テナリ。故ニ腦ト非ヲ發スル諸筋トノ間ニ於テ精氣ノ流通ヲ障遏スル諸因ハ皆非ヲ發スル因ナリト知ルベシ。脊髄ニ於テモ雖モ寡少ナルガ故ニ常ニ腦ヨリ精氣ヲ脊髄ニ流通シテ其不足ヲ補フナリ。故ニ爰ニ唯腦ト非ヲ發スル諸筋トノ間ニ於テ精氣ノ流通ヲ障遏スル云テ別ニ脊髄ヨリ流通スル精氣ノ障遏ヲ言ハザルナリ。○精氣ハ第七十○其精氣ノ流通ヲ障遏スル諸因一ナラズ。是ヲ略舉スレバ其一ハ精氣ノ性ニ係ル。假令バ水銀ヲ誤用シ或ハ諸金坑ノ毒氣ヲ吸入スル等ニ因テ精氣ノ活潑銳靈ナル常性ヲ損敗シテ全身ニ流通普

達スルノ便宜ヲ失ハシムルガ如キ是ナリ○其二ハ
 神經線ニ係ルカク假令タトヘバ神經室ノ中ニ神經液鬱聚凝滯
 シ或ハ神經室攣縮シテ狭窄トナリ或ハ外ヨリ神經
 室ヲ壓迫スル等ニ因テ神經線是ガ爲ニ壓迫セラレ
 テ精氣ヲ其筋ニ流注スルニ足ラザルガ如キ是ナリ
 ○或ハ神經室ノ元運衰弱ナル者亦非ノ原由トス
神經線神經室神經液共ニ第四章第四十七章ニ出神經
 室ノ元運トハ神經室中自然ニ具ル所ノ生活ノ運
 動ニシテ是ヲ以テ神經線ニ流通スル精氣ヲシ
 テ健運セシムルナリ生氣ノ說第七章ニ註ス其故
 ハ動血脉ノ血常ニ腦中ニ升騰シ其健運推盪ノ勢力
 ニテ精氣モ亦能ク活潑健運ヲ致スト雖モ是レ唯神

第

經線ノ原本ノミニ在ル事ナレバ其神經室ノ生氣ノ
 元運ヲ以テ是ヲ資輔スルニ非レバ精氣ヲシテ爾ニカク
 纖細ナル神經線ヲ流通シテ皮表四末ノ遠ク相隔チ
 タル諸部マデモ普達セシムルニ足ラザレバナリ
 非ノ分別ヲ論ス

全身ノ諸筋固ヨリ其種類ノ一ナラザルガ故ニ設使タトヒ
 其病因ハ異ナラズト雖モ其發スル所ノ非ニ於テハ
 許多ノ種類アリ然レニ外敷藥ヲ用ルニ至テハ其患部
 ノ筋ニ循行スル所ノ神經ノ起原ニ施スヲ緊要トス
 直ニ其非スル處ニ施ス片ハ毫モ効驗アルナシ是

其病原ハ筋ニ在ラズシテ神經ニ在レバナリ○凡ソ
 非ヲ發スルヲ我意ニ隨テ運轉舉動スル部ノ諸筋ニ
 於テスルカ眼、口、舌、手足、腹、頸、項、陰、莖、等我意ニ隨テ自
 範提綱ニ所謂意識神經ノ循行スル諸部ナリ或ハ生氣ノ元運ニ係ル部ノ
 諸筋ニ於テ發スルカ腦或ハ心藏ヲ云、是レ我意ニ隨
 一リ、是レ醫範提綱ニ所謂運或ハ各自政ヲ異ニスル
 化神經ノ循行スル諸部ナリ或ハ各自政ヲ異ニスル
 ノ運營ヲ爲ス部ニ於テ發スルカヲ能ク診察シテ分
 別スルヲ肝要ナリ○假令タトヘバ心藏ニ於テ精氣ノ灌注
 ヲ失テ非ヲ發スルガ如キハ心藏其血ヲ一身百體ニ
 循環スルノ機廢絶シテ其人卒ニ死ス是レ非ヲ生氣
 ノ元運ニ係レ

第八章

部ニ發スル者ニシテ世ニ云卒中風ナリ各自異政ノ運營ヲ爲ス部ニ發
 スルガ如キハ假令タトヘバ肺藏ニ非ヲ發スレバ喘息氣急
 ヲ患ヒ、胃或ハ腸ニ發スレバ飲食、尿等ノ諸物。皆轉送
 セズシテ腸ニ滯積ス。是ニ於テ人オモヘテ以爲ク胃腸ニ一箇
 ノ壅塞セル處アリテ然リト是レ胃腸ノ閉塞スル處
 アルニ非ズ、唯頑痺シテ
夫ノ腸ノ蠕動機轉○斯カクノ如キ諸作ヲ悉ク斯ニ歷舉
ヲ廢失スルナリセント欲スレバ甚ダ浩博ニ渉ルガ故ニ予唯、非ヲ治
 スル一種ノ藥方ヲ舉ゲテ幾多ノ非モ亦是ヲ以テ療
 スベキヲ示スノミ

非ノ治法ヲ論ス

ヲ扶助スルナリ。良能常道ノ説第四章第七章ニ出ツ
云。是ヲ以テ其汚液ヲ驅除スルノミナラズ其振蕩衝
動ノ營爲ニテ自然良能ノ元運ヲ誘起喚發シ以テ神
經液ノ凝聚ノ神經中ニ壅滯鬱積スルヲ驅逐解散セ
シムルナリ。○誘嚏藥ハ昏睡篇第百八章ニ出ヅ吐劑
ハ熱病篇第十第三解疑劑ナリ。是ヲ以テ神經液ノ凝
聚鬱結ヲ解釋ノ流洩セシムルナリ。此劑ハ粘稠凝結
流メ壅滯ナカラシムルナリ。是ハ温煖解疑ノ効アリ
テ瀉下ヲ兼ル劑ヲ云。假令バ盧會蕪甘沒拊謨約邪心
藤黃等ノ劑ニ甘汞或ハ石鹼ヲ加ルカ如シ。或
ハ萎黃病篇第二十章ノ健胃丸ヲ用ルモ亦良。○是ヲ
以テ次ニ列スル摩油方良驗アリ
非ヲ治スル摩油ノ方 散非摩油方
老利兒油 一多半

的列竝底那 四錢

拔爾撒謨字露 四錢

礪砂精 各二錢

右件調勻シ神經節ノ結腫アル處ニ摩擦スル。日
ニ二三回。○預シメ能ク内景解剖術ニ精通シテ患
部ノ諸筋ニ循行スル神經ノ起原ヲ覈知スベシ。假
令ハ腕臂。痺スル片ハ右ノ藥ヲ兩肩胛ノ中央ニ直
ル處ノ脊推ニ擦リ。或ハ脚。痺スル者ハ是ヲ腰部ノ
脊推ニ擦ル等ナリ。

○東方諸國ニ於テハ一種ノ痺。所謂痿弱ノ症ヲ患ル

コト甚々多シ。其地ニ是ヲ白栗ベリベリト云。此病多クハ神經液。殊ニ神經節ニ在リ。其故ハ患者炎熱ヲ冒オカシ或ハ慄悍熱性ノ酒漿ヲ過飲スルニ因テ神經液甚々稀薄散渙スル後。忽チ寒涼ノ氣ニ値チテ假令タトヘハ露天ニ睡臥シ或ハ寒冷ナル石上ニ眠ル等ニテ神經液卒ニ凝泣シテ行カラズ其處ニ滯著シ。是ヲ以テ神經線ヲ壓塞シ精氣ヲシテ諸筋ニ灌注セザラシム。是ニ因テ其人肢節痿弱シテ動作ニ力ナク。其意ノ欲スル所ニ隨テ運轉舉動スルヲ能ハサルナリ。神經液ノ說第四十六章ニ出ツ。○但其凝結セル神經液腐壞セズシテ久ク其

處ニ滯著スルクハ患者其病ヲ齎イナガラ多年死セズシテ世ニ在ル者儘コレアリ○治法前ニ説ク所ニ異ナラズ。唯其摩油方中ニ於テ香竈ノ油的列底那ヲ稍増加ヘテ其温煖ノ性ト刺戟衝動ノカトニ頼テ凝固底著スル神經液ヲシテ更ニ稀釋流渙セシムベキ

増註遠西名醫斯ト萬兒屈ノ内科書菲篇ニ云。此病形貌憔悴セズ患部稍觸知アリ肢體温煖ナル者ハ法ノ如ク療スレバ半バ治シ或ハ回復スル者アリ。否ル者ハ治シ難シ○凡ソ菲ハ靈液精減耗シ若クハ

凝滯シテ知覺活動ノ機轉ヲ失フ病タルニ論ナシト雖モ唯其衰弱ノミヲ的識シ概ノ辛熱香竅ノ神經劑ヲ投スレバ害ヲ致ス者居多故ニ先ツ患者ノ稟賦體質ノ強弱ヲ察シ諸症ニ蹤蹟ノ病原ヲ考索スルヲ專務タリ○大抵脉強實ニモ較著ノ虛候ナク或ハ多血ノ症アル者ハ速ニ刺絡ヲ施シ其症ニ隨テ左ニ舉ル清涼和解劑ヲ選ニ用フベシ

蘆根涼解飲

蘆根 一匁

發原根 四錢

右到水適宜煮ルコト四分時コト瀘過シ其液二比ヲ取リ
左ノ藥ヲ加フ

消石 一錢

覆盆子舍利別 名 二匁

右調和シ一時ニ一碗宛服ス

遏爾託亞涼解飲

遏爾託亞根 名 一匁

遏爾託亞葉 二握

右到水適宜煮ルコト四分時コト瀘テ其液一比半ヲ取リ
左ノ藥ヲ加フ

消石 一錢

屋施蔑兒ヲシノル 二弓

右調和シ一時ニ一碗宛微温ニノ服ス

接骨涼解飲

接骨木傑列ハレ 二弓

接骨木花水ヲ 八弓

橙汁舍利別ヲ 一弓

消石 一錢

右調和レ一時ニ二匙宛服ス

李實涼解飲

李肉 乾者 二弓

大麥 一弓半

酒石英ヲ 二錢

右剉水適宜煮ルコハンキ下四分時。漉テ其液一匕半ヲ取リ

左ノ藥ヲ加フ

消石 一錢

覆盆子舍利別ヲ 一弓半

右調和シ一時ニ一碗宛服ス

答末林度涼解飲

答末林度 二弓

過爾託亞根 アルタ 一弓

右剉水適宜煮ルコシ八分時。瀝コシテ其液一匕半ヲ取リ
左ノ藥ヲ加フ

消石 一錢半

橙汁舍利別 一弓

右調和シ半時若クハ一時ニ一碗宛服ス

○大便秘結スル者ハ左ノ劑ヲ擇ニ用テ通利ヲ取
ルベシ

旃那酒石飲

旃那葉剉 四錢

酒石英 名 二錢

滿那 名 一弓半

右搗碎キ磁罐ニ入レ。沸湯半匕ヲ加ヘ蓋閉シ浸ス
一四分時。瀝過コシノ滓ヲ去リ一服トス

酒石散

酒石英 末 一錢

右一服トシ半時毎ニ用フ大便利スルヲ度トス

雙酒石散

酒石英

孕礬酒石 名 各半錢

右調和シ一服トス

○右件諸劑其症ニ隨テ適宜ニ擇ニ怠ラズ連服スレバ患處刺痛ヲ覺エ或ハ流走痛ヲ發メ此病全治スル者此カラス其痛ヲ發スル時ニ於テ毛布ヲ以テ頻ニ患部ヲ摩擦スベシ○其脉強實ナラズ衰弱ノ候多ト者ハ遂ニ揮發竄透ノ神經劑ヲ試ムベシ其症ニ隨テ左ニ舉ル藥劑ヲ選ニ用ベシ

護謨壯神丸

瓦爾按奴謨

護謨安沒尼亞幾 各一錢半

龍腦

葛私多儂謨 各十五瓦

律比丸料 半錢

琥珀丁幾生爾 適宜

右調和シ三瓦ヲ一丸トシ每服三丸日ニ三四回芸香湯一碗ヲ以テ送下ス

芸香湯

芸香

默栗薩葉

捲埵兒 各一握 迷迭香ノ條ニ出

右剉泡劑トス

石鹼壯神丸

勿搦祭亞石鹼 各二錢

越謨安沒尼亞幾 各二錢

沒藥 半錢

律比丸料 二刀

琥珀丁幾生爾 適宜

右調和シ三氏ヲ一丸トシ每服三丸日ニ用テ三次

失鳩答壯神丸

失鳩答越幾斯劑 各一錢

勿搦祭亞石鹼

越謨安沒尼亞幾 各一錢

律比丸料 半錢

越栗失爾剝祿布利怛 適宜

右調和シ三氏ヲ一丸トシ每服三丸日ニ用テ三次

○以上三方ノ丸劑脾病子宮病ノ肝脾等ニ於テ壅

塞硬腫ヲ兼ル諸症ニ良効アリ

龍腦壯神丸

龍腦 三錢

燒酒 再餽者適宜

此言以和排藥 卷五 三 后雪堂

右二味研和ノ固^{カタ}キ泥ト爲シ三瓦ヲ一丸トシ每服二丸。日ニ三次用フ。効アレハ漸ク其量ヲ加フ

雙鸞壯神散

雙鸞^{トリカフ}菊^{エキ}越^ス幾斯劑^{半瓦或ハ一瓦} ○此草ノ莖葉ヲ取テ越幾斯劑ト爲ス。

製法^出 出ツ

沙糖 十五

右研和シ極細末ノ一服トシ日ニ二服或ハ三服ヲ用フ
○右ノ丸劑ヲ用ル間ニ芸香湯^出前ニ或ハ左ニ舉ル湯液ヲ擇ニ用フベシ

默栗薩湯

默栗薩葉^{一握}

白芷

羌活 漢種者 各一錢

右剉磁罐ニ入レ。沸湯ヲ加ヘ蓋閉シ浸ス^{コハントキ}テ四分時。濾テ其液一匕半ヲ取リ左ノ藥ヲ加フ

覆盆子 舍利別 一弓半

密涅刺爾鎮痛液^{十五滴}

右調和シ一時毎ニ一小茶碗ヲ服ス

額草湯

額草根 二錢

增訂外科集要 卷五 一

右到磁罐ニ入レ。沸湯ヲ加ヘ蓋閉シ浸ス。四コハシトキ分時。濾テ其液一匕ヲ取り左ノ藥ヲ加フ

橙皮舍利別名 一匕

右調和シ一時ニ一小茶碗宛服ス

○香竈ノ露精ヲ以テ頻ニ患部ニ擦スベシ左ノ方尤効アリ

散痲水

茉沃刺那水名 十勺

山芥菜精名 一勺

的列竝底那精名 二錢

右調勻ス

○右ニ列スル神經劑ヲ用テ患者頭胸焮熱シ或ハ内部煩熱ヲ覺エ。脉駛數ニノ血液沸騰ノ候アル者ハ芸香湯。默栗薩湯。纈草湯ノ如キ香竈ノ飲液ヲ休テ過爾託亞涼解飲出ニ或ハ乳清名ヲ用ヒ或ハ左ノ劑ヲ用フベシ

過爾託亞煎

過爾託亞根名 一勺

過爾託亞葉名 一握

右到水適宜。煮ル。八分時。濾テ汁ヲ取り左ノ藥ヲ

加フ

遏爾託亞花 一握半

甘草 四錢

右浸ス一八分時。濾テ其液ニ北ヲ取り微温ニシ。一時毎ニ一小茶碗ヲ服ス。○大便秘スル者ハ前ニ舉ル下劑ヲ擇ニ用フベシ

○患者多血ノ候ナク寒性或ハ粘稠液過多ニノ肢體瘰然タル者ハ左ニ記ス劑ヲ擇ニ用フベシ

董薺昆設爾弗

紫董昆設爾弗

碎米薺昆設爾弗 各一多
霸王鹽 三錢

右調和シ一時或ハ一時半ニ一小匙宛用フ

菴薺昆設爾弗

山菴菜昆設爾弗

碎米薺昆設爾弗 各一多半

右調和シ一時半ニ一小匙宛與フ

海葱昆設爾弗

海葱蜜 四多

葯刺巴 末

霸王鹽

纈草根 末 各一錢

右調和シ大人ハ每服一匙。日ニ四次。小兒ハ一時ニ一小匙宛服ス

此症。右ノ劑ヲ長服ノ全治セザル者ハ前說ノ神經劑ヲ用テ効アリ○患部ニ發泡膏圈ヲ貼シ或ハ茉沃刺那水圈ヲ以テ日ニ兩回。患部ニ擦スベシ
○肺藏粘液過多ニノ喘急或ハ效ヲ發シ肢體各部非ヲ發スル者ハ解凝劑ヲ用テ痰ヲ吐セシムベシ其肺病ノミナラズ非モ亦隨テ治ス此症ハ過爾託亞涼解飲^{上ニ}出ツ或ハ左ノ數方ヲ擇ニ用ベシ

解凝屋施茂兒

屋施茂兒 各一多半

麗春花 舍利別 各一多半

消石

安質沒扭若波列 不洗者 各一錢

右調和シ一時ニ二匙宛過爾託亞涼解飲^{上ニ}出ツ或ハ左ノ接骨木湯一碗ヲ以テ送下ス

接骨木湯

接骨木花

錦葵葉 各一握半

右剉沸湯ニ泡シ茶湯ノ如ク用フ

解凝舍利別

海葱[㊦] 二匁

麗春花舍利別[㊦] 一匁

苗香水[㊦] 八匁

消石 半錢

安質沒扭若波列[㊦] 不洗者 一錢半

右調和シ一時ニ二匙宛[㊦]過爾託亞涼解飲^{上ニ}或ハ接骨木煎湯一碗ヲ以テ送下ス

解凝化痰散

結爾蔑斯密涅刺列[㊦] 一匁

沙糖 十匁

右研和シ極細末ノ一服トシ一時或ハ一時半ニ一服宛用フ

水腫篇第十三 羅甸名「ヘイドロプス」和蘭名「ワトルヒク」

第三章

水腫ノ大較ヲ論ス

夫レ平全ノ身體ニ在テハ諸腔中ニ蒸氣アリテ發出
 之脂膜中ニハ脂肪アリテ焉ニ充ツ 諸腔ハ頭胸腹ノ
 三腔其他諸器ノ
 空間ヲ爲ス處ヲ云其腔ノ裏面周圍ヨリ常ニ蒸氣ヲ
 發出スルナリ惣身ノ皮ト肉トノ間ニ周ク脂膜アリ
 テ脂肪充ツ或ハ内部然ルニ水液若クハ粘稠液其諸
 諸藏ニモ亦コレアリ モ
 腔或ハ脂膜中ニ聚リ或ハ水脉ニ於テ水液若クハ粘
 稠液アルヲ過多ナルルハ其部腫脹ヲ爲ス是ヲ名テ
 水腫ト曰フ○其腫或ハ滿肢體ニ發シ或ハ各部ニ發
 スルヲ以テ其名稱多端ニシテ多クハ其部位ト病症

增訂外科集要 卷五 第十七 廣雲堂

トニ適當スベカラザル許多ノ瀝名ヲ設ケ。毎ツ子ニ次彼此相混シテ記憶シ難キニ至ル

水腫ノ病因ヲ論ス

水腫ノ諸因ハ予ガ撰スル所ノ簡易方中ニ歴舉セリ。甚ダ繁長ナルガ爲ニ爰ニ復マ接引セズ。唯其常ニ多ク患ル所ノ諸症ヲ舉ゲ。治方ヲ附シテ斯マニ示スノニ

水腫。靜血脈及ビ水脈ヲ壓塞スルニ因ルノ症治

ヲ論ス

歴試考徵スルニ靜血脈或ハ水脈ヲ外ヨリ壓迫スル
一アル片ハ水液阻遏セラレテ懸留滯瀦シ。其部腫起

スルナリ水脈ハ腺ヨリ起リ。腺ニ於テ動脈ノ血ヨリ
ヲ以テ常ニ諸器ヲ滋潤シ。終ニ靜脈ノ血ニ注ニ入ス。故
ニ水脈ノ中ニ充満スル故ニ水液懸留滯瀦シ。其部腫脹ス
滯瀦シテ脈中ニ充満スル故ニ水液懸留滯瀦シ。其部腫脹ス
注入スル一能ハズシテ水液懸留滯瀦シ。其部腫脹ス
ルナリ。外ヨリ壓迫スルハ肢體外部ノ打撲箱搾
或ハ繃帶結縛等ニテ其部ノ靜脈水脈ヲ壓迫スルナ
リ是ヲ區別スルニ靜血脈ヲ壓迫スル片ハ其部青色
ヲ發シ。脈絡黯青ナルヲ恰モ靜血脈破綻セルガ如シ
凡ソ靜脈ハ表ニ在テ皮下ニ見ハル。打撲傷ノ青斑ハ
靜脈破綻ノ其血。皮下ニ泛溢セルナリ。其部斯ノ如ク
青色トナシ。水脈ヲ壓迫スル片ハ其部唯黪澹色ニシテ
水ヲ以テ充ルガ如シ。○孕婦ノ脚腫。胎兒腹部ヲ壓迫
シテ水脈ノ諸液。上行還流シ難ク。或ハ諸藏頑硬結腫シ

テ此ニ屬スル靜血脈。若クハ水脈ヲ壓迫スルヨリ發
 スル水腫モ亦右ノ種類ニ屬スルナリ。頑硬腫ハ第二
 註ス。併考ベシ。諸藏ノ頑硬腫ハ即チ肺或ハ肝脾腸間
 膜腸胃脾腎等ノ諸藏壅塞シテ頑硬結腫スルナリ。其
 部位ト症候トニ由テ何ノ藏ニ在リヲ察ス。然レ概シ
 テ言バ漢人所謂癥瘕積塊ニシテ患者虛羸シ終ニ水
 腫ヲ發スル。○故ニ諸藏及ビ腺ノ諸藏ノ頑硬腫ヨリ發
 如キヲ云。スル水腫タルヲ察セバ唯其頑硬腫ノ療法ヲ用テ
 治スベシ。諸利水ノ劑ヲ用レバ百計スレバ効驗ナケ
 レバナリ。

水腫

水腫。喩尿管ノ障碍ニ因ルノ治法ヲ論ス
 身體ノ諸腔ニハ天資自然ノ蒸氣即チ湛露アリ。其實

清稀ニシテ水ノ如ク日常動血脈ノ端末ト神經ノ端
 末ヨリ滲出ス。○其諸腔ニ滲出セル湛露ハ平全ノ人
 ニ在テハ常ニ喩尿管ニテ喩收シテ是ヲ水脈ト靜血
 脈トニ分輸シ去ルナリ。故ニ其湛露隨テ聚レバ隨テ
 喩收シ。滲利便捷。曾テ濡滯アルナシ。周身ノ皮層並
 諸空隙ヲナス處ハ淺深廣狹ヲ論セズ。生氣血液運化
 急醸ノ勢ニ由テ自ラ蒸氣ヲ發泄ス。但シ内部諸腔ニ
 於テハ皆密閉セル處ナレハ蒸氣ヲ發泄スルヲ過多ナレ
 ハ凝聚ノ汗トナルガ如シ。○喩尿管ハ靜脈ノ末梢ヲ
 以テ成ル所ノ微細ノ管ナリ。或ハ岐シテ水脈ニ連ル
 是レ諸腔ノ内面ニ遍ク其管口ヲ開キ。常ニ湛露等ノ
 無用ノ廢液ヲ喩收シテ靜脈ト水脈トニ導輸シ去リ
 是ヲ以テ常ニ新陳更代。○若シ喩尿管其喩收ノ運營
 シテ滯鬱敗ノ患ナシ。

ヲ失フアルカ或ハ其管ノ端末閉塞スルカ抑亦其
 嚕収スル所ノ水液甚ダ粘稠ナルカ斯ニ一モアル片
 ハ其蒸出セル水液滲利スル所ナク必ズ其處ニ濡滯
 シテ蓄積シ終ニ其部ニ水腫ヲ發スルナリ○衆人此
 嚕収管ノ嚕収スルカヲ失フヨリ此疾ヲ發スルヲ
 察セズ徒ニ以爲ク每ニ必ズ其部ノ閉塞セルヨリ發
 スルノミト夫レ動血脉ハ能ク其血ヲ健運進輸スレ
 其勢力ヲ以テ其既ニ諸腔ニ蒸出セル露液ヲシテ
 嚕収管ノ細口ニ滲入セシムルヲ能ハザルナリ動脈
ノ勢力其蒸出セル露液マデニ 故ニ平全ノ體質ニ於
届リ達スルヲ能ハザルヲ云

テハ必ズ嚕収管ノ元運ヲ以テ是レヲ嚕収スルヲ彰
 明ナリ然レバ嚕収管ノ運動廢失スル片ハ水液必ズ
 諸腔ニ聚蓄セザルヲ得ズ○凡ソ刺戟衝動ノ諸藥
 ハ動血脉ノ運動ヲ增益スルヲ多シト雖モ靜血脉及
 ビ其嚕収管口ノ運動ヲ增益スルヲ少ナキガ故ニ特
 ニ此疾ニ的當トシ用ルニ足ラズ是ヲ以テ唯左ニ列
 スル所ノ劑ヲ用ヒテ靜血脉ノ運動ヲ扶テ増進セシ
 ムベシ○若シ水腫ノ部ニ琶布ヲ外敷シテ堪ルヲ
 得ル者ハ左ノ方ヲ施スベシ

驅水琶布方

薄荷葉

亞爾鮮葉アールセム 各一握

玫瑰花 二撮

桂

乳香 各一錢

右件合シテ蒸餅ノ中心。軟ナル處ト赤葡萄酒トヲ

加テ琶布パッパニ作り。温ニ乘シテ患處ニ罨貼シ。日ニ再

ビ更換ス

或ハ次ノ散劑ヲ外敷スルモ亦良

驅水散腫ノ外襯散ノ方 **驅水外襯散**

乳香 二錢

格碌波尼亞コラクボニア 四錢

結麗土ケレイト 二錢

玫瑰花 四錢

右件末トシ合和シテ多少適宜ニ取り。小巾ヲ温

乾シテ藥末ヲ其上ニ摻敷シ。患所ニ襯ス。數回更換

スベシ少キモ日ニ兩度ハ關カクヘカラズ。若シ患部廣

クシテ外襯スルモ廣大ニスベキ者ハ是ニ糠ヲ混

和シ布袋ニ盛テ襯貼スベシ

若シ内服藥ヲ用フベキハ小水ヲ利シ且ツ強壯ナ

ラシムル劑ヲ良トス

運行ヲ壯ニシ小水ヲ利スル藥酒方

壯運水楊梅飲

水楊梅根 一弓

良薑 四錢 種小者

杜松實 一弓

刺發斯子 四錢

薄荷葉 二握

右件調勻シ勃的利斯カッテリス圖ニ一箇半ノ赤葡萄酒ヲ以テ浸シ藥氣ヲ泡出シ小ナル爾默兒苴ルイムルチニ一盞宛服スルヲ日ニ四次

第三章

水腫。靜血脉ノ運動衰弱ニ因ルノ治法ヲ論ス

夫レ血ヲ遍身百體ニ流注運輸スルヲ啻ニ心藏コレ

ガ宗源タルノミナラズ。又動血脉ノ元運ヲ以テ是ヲ

扶テ其血ヲ推盪轉輸スルニ因ル。其血液環廻シテ復

心藏ニ還入スルヲ啻ニ心藏及ビ動血脉ノ元運ニ係

ルノミナラズ靜血脉ノ元運モ亦是ヲ資輔スルヲリ

○若シ其靜血脉ノ血液ヲ復行還輸スル元運ノ精力。

甚ダ衰弱スルキハ其復行ノ血液健運セズシテ殊

靜血脉ノ諸末稍纖支別ニ湊積シ。且是ニ連ル水脈ニ

於テ水液滯滯ス。故ニ上ニ説所ノ靜血脉ヲ壓迫スル

症ト其趣ヲ同フスル者ナリ第八十三章ニ出然レバ靜血脉ノ元運衰弱ナル片ハ肢體各部或ハ惣身モ亦能ク水腫ヲ發スルガユエニ此症ニ於テハ靜血脉ノ元運ヲ增益スルニ非ザレバ全ク治セズト知ルベシ○若シ其水液ノ聚ルト太甚ナラザル者ハ治法先ニ第八十四章ニ舉ル藥ヲ用ヒ從テ患者ヲシテ毎日數次ト桂ヲ取テ少許宛咀嚼セシメ又身體ヲ運動シ且ツ數摩擦スベシ是ニ由テ靜血脉ノ運動ヲシテ大ニ能ク强健ナラシムルナリ是レ靜血脉ニハ心藏ニ歸納スル血ヲシテ退轉却行セザラシムルガ爲ニ其尿管中ニ障

膜ヲ節次シ是ニ由テ血液其送迎開闔ニ聽ヒ等ヲ逐ヒ級ヲ拾テ然ノ後前行スルト得ルガユエニ其血速ニ循行シ易カラザレバナリ○其血ヲシテ更ニ逾健輸セシムベキガ爲ニ次ノ薰摩方ヲ施シテ其治ヲ羽翼スルヲ良トス

利水薰摩方

水腫ヲ治スル薰摩方
 乳香モシ若クハツ鵝栗バ拔ス奴ム護固或ハ蘇合香固自餘斯ノ如キ類ヲ熾炭ニ撒シケ毛布ヲ取テ其煙氣ヲ薰シ受テ患處ヲ摩擦ス

水腫粘稠液ニ因ルノ治法ヲ論ス

蓋シ平全良性ノ血液ト雖モ運行流動スルヲ希少怠慢ナル片ハ自ラ相聚テ凝結スル性アリ○體中一切ノ脉管諸道ニハ必ず自然天造ノ滑液アリテ其裏面ニ周布シ是ヲ以テ血液ヲシテ滑脱流利シテ蹇澁凝泣ノ患ナカラシム○若シ良性ノ血液ト雖モ運行流動スルヲ希少怠慢ナルカ或ハ其天造ノ滑液過多ナル片ハ一箇ノ粘液腫ヲ生スルナリ此症ハ先ヅ其粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解スル劑ヲ用ルニ非ザレバ治スルヲ能ハザルナリ

粘稠ヲ稀釋スル藥酒ノ方

解凝驅水酒

亞爾鮮葉 二握
 珊瑚里草 一握
 杜松實 一斗
 酒石鹽 二錢

右件勃的利斯ニ一箇半ノ葡萄酒ニ浸シ藥氣ヲ泡出シ爾然兒苴ニ一盞宛服スルヲ日ニ四次

水腫水液過多ニ因ルノ治法ヲ論ス

若シ右ノ方法ヲ用テ諸液ヲ稀釋スト雖モ其腫速ニ消散セザル者ハ是レ體中水液過多ニシテ元運生氣是ヲ導泄驅逐スルヲ能ハザル候トス○爰ニ是ヲ治

スルノ數方ヲ列ス。宜ク擇ニ用フベシ。○第一ニ吐劑ナリ。方ハ第十五章ニ見エタリ。是レ粘液胃中ニ充塞スルカ或ハ吐シ易キ患者ニ用ヒテ良功アリ。噁心嘔吐云ル否サレバ許多ノ煩悶ヲ生シ。吐シテ後。多ク罷勞スレバナリ。○第二ニ下劑ナリ。左ノ方効アリ。

瀉水丸ノ方

瀉水丸

瓦爾拔奴謨 一錢

蘇非沒扭謨 一錢

葯刺巴華爾斯 各半錢

酒石鹽 一刃

葛縷子油 五滴

右件調勻シ。每一錢。二十丸トシ。三丸宛用ル。一日三次。是ヲ用テ患者。圖ニ上ル。一日ニ三回ヲ度トス。故ニ下利ノ多少ヲ視テ服度ヲ増減スベシ。○患者甚ダ虚脱スルニ非レバ此劑ヲ變ゼズ長ク用ヒテ其剩餘過多ノ水液ヲ多ク驅除スベシ。○若シ患者虚衰スルヲ以テ右ノ劑ヲ用フル間ニ一二ノ強壯劑ヲ交遞シテ用フベキ症ナル片ハ其兩効ヲ兼タル藥劑ヲ用フベシ。左ノ劑良驗アリ。

運行ヲ壯ニシ。大便ヲ利スル飲劑方

壯運瀉水飲

白芷

水楊梅根 各一弓

薄荷葉 二握

旃那葉 半弓

酒石鹽 二錢

右件調勻シ。勃的利斯ニ一筒ノ葡萄酒ニ浸シ。藥氣ヲ泡出シ。爾默兒苴ニ一盞宛服スル。一日ニ三次。患者ノ通利。平常ニ比スレバ稍多キヲ度トシ増減シテ用フベシ。

○第三ハ利尿劑ナリ。是ヲ以テ小水多ク通スル片ハ

最モ良トス。大便ヨリ瀉スルニ比スレバ患者衰弱セザレバナリ。則第八十四章ニ出ス所ノ運行ヲ壯ニシ小水ヲ利スル藥酒方ヲ用ベシ。或ハ上ニ記ス所ノ大便ヲ利スル飲劑中ノ旃那葉一味ヲ除テ用レバ衰弱ヲ強壯ニシテ小水ヲ利スルガ故ニ。病治シテ後再發ノ患ナシ。○右ノ藥酒或ハ飲劑ニ桂ヲ加テ藥氣ヲ出シ用レバ益良効アリ。凡ソ桂ハ此病ニ用ヒテ衰弱ヲ強壯スル一大貴品ナレバナリ。

增補重訂内科撰要卷五終

增補重訂内科撰要卷六

增補

徵瘡篇第十四

羅甸名「リス」ヘ子「ア」和蘭名「ベス」チ「ング」デル「ボッケン」又「ス」バー「ン」セ「ボッケン」又「ベ」ニス「シ」キ「テ」○包皮「焮」衝「陰」頭「焮」衝「下」疳「畢」丸「腫」淋「疾」便「毒」是「屬」ス

章

徵毒ノ大較ヲ論ス

徵瘡ハ徵毒アル人ト交接シテ發スル一種ノ傳染病ナリ。大抵初發其毒ヲ感受セル部ニ於テ其症候ヲ發見ス○和蘭紀元一千四百六十三年本邦寛正五年此病始テ那波里國意太里亞ニ於テ傳染シ是ヨリ諸國ニ蔓延ス○其初小瘡ヲ發シ潰膿シテ白色トナリ常ニ膿汁出テ甚ダ愈ヘ難シ或ハ淋疾白帶下等ヲ兼マ

黴毒ノ症候ヲ論ス

患者黴毒アル人ト交接シテ後陰所ニ諸患症ヲ生ス
假令バ陰頭斑ヲ發シ或ハ堅硬胼胝ノ如ク乾燥シ若
クハ坼裂シ或ハ疥癬ノ如キ小瘡ヲ生スル等ナリ或
ハ頭髮脫落或ハ骨痛等骨ノ諸患ヲ發シ或ハ口中咽
喉腐爛シ鼻ニ潰瘍ヲ生スルガ如キ皆尋常藥劑ノ治
スベカラザル諸症ヲ發ス

黴毒ノ傳染ヲ論ス

凡ソ此病ハ黴毒アル人ニ觸交リテ傳染ス假令バ交
接或ハ口舌相接シテ津唾ヲ受ケ或ハ哺乳小兒是ヲ以テ傳染ス

多シ^{スル}或ハ同床ニシテ睡リ或ハ日夜親ク此患者ヲ
看待シ或ハ父母ノ遺毒ニ因テ發スル等ナリ

黴毒ノ性ヲ論ス

黴毒ノ性タル揮散發越シテ速ニ消化シ去ベキ者ニ
非ズ假令ハ麻疹ノ毒ノ如キハ其性揮沈潜竄匿シテ
頑固滯著ス故ニ生氣運行ノカト雖モ容易ニ是ヲ驅
除スル^ル能ハズシテ長ク體中ニ淹留シ良善ノ血液
モ漸ク是ニ化セラレテ惡厲ノ性トナリ脂肪及ビ洩
餘ノ良液ヲシテ變シテ粘稠酷厲ニシテ腐蝕スベク
嗽衝ヲ發スベキ質トナラシムルナリ

第九十

微毒ノ侵襲ヲ論ス

微毒ニ傳染スレバ陰具ノ液ノ男子ハ尿道。婦人ハ腔皮腺ノ粘液。鼻膜ノ涕液。咽喉ノ滑液。關節液。腱液。靱帶液。或ハ神經液。脂肪。骨髓。乳糜。血等ニ混淆シテ懸留ス

第九十一

上章ノ餘義ヲ申明ス

微毒右ノ如ク諸液ニ浸淫シテ體中諸部ニ滯著スルガ故ニ是ヨリ幾多ノ患症ヲ發ス。假令バ其毒陰莖尿道ニ著ク片ハ陰頭。小瘡潰瘍ヲ發シ或ハ包皮腫脹緊被シテ陰頭ヲ露ハス。能ハス或ハ包皮翻脹シテ短促シ陰頭ヲ被フ。能ハス或ハ陰莖水晶狀ノ腫ヲ生

シ或ハ鶏冠狀ノ息肉羅旬名キリスク和蘭名ハ子カ

贅ヲ生メ鶏冠ノ如ク水棉ノ尿道中息肉ヲ生シ或ハ

淋疾小便艱澀刺痛小便閉ヲ發シ或ハ莖中ノ腱彊急

牽痛シ或ハ精求精嗣ノ用ヲ廢ス○睪丸ニ著ク片ハ

睪丸焮熱腫痛若クハ硬結シ或ハ精系モ共ニ硬腫ス

レバ恰モ肉貌儂屈ノ如シ精系和蘭名サドストレ

ル所ヲ以テ包圍ノ一系ヲ成シ睪丸ニ繫著スル者

屈ト名ク微毒ニテ硬腫スル者肉貌儂屈ト其狀相似

テ粘液膿汁流泄ス但男子ニ比スレバ尿道ニ關ル諸

患ヲ生スルト鮮シト雖モ腔。子宮。卵巢等ニ著テ白帶
 下ヲ發ス○腹腿合縫ノ部ノ腺ニ著ク片ハ便毒ヲ發
 シ唇。舌。斷。過。滿。疔。兒。懸壘垂ノ兩側ニ在ル腺ナリ過滿
 疔兒ハ扁挑ナリ此腺形ナ扁挑ニ
 似タルヲ以咽喉ニ著ク片ハ其部ニ腫瘍潰瘍ヲ生シ
 或ハ齒牙浮動。口蓋腐蝕。口裏ノ皮膚潰爛。聲嘶。嘔。涕。膜
 ニ著ク片ハ鼻中臭穢ノ潰瘍ヲ生シ遂ニ侵蝕シテ鼻
 梁陷凹崩壞ス○皮上ニ在テハ汚斑。小瘡。潰瘍。疣贅ヲ
 生シ或ハ毛髮脫落。疥癬。肉瘤。或ハ肌膚青白或ハ坼裂
 或ハ乾癬ヲ生ス乾癬。羅旬名イムヘチゴ細癩。粟起皮
 屑粗糙白屑揚起シ搔痒ニ堪ヘズ漢
人所謂○骨ニ著ク片ハ骨脆弱。腐蝕破碎シ易ク或ハ
 乾癬也

癰毒

骨塊腫盈長シ或ハ骨端相連著シテ屈伸シ難ク或ハ
 骨痛堪忍ビ難シ其毒骨膜ニ著テ痛ム也○癰毒總身ニ滋蔓スレ
 バ身體衰弱虛損シ或ハ萎黃病ヲ發シ或ハ毎夜各部
 劇痛シ或ハ消耗熱勞瘵熱羸瘦骨立或ハ肢體困倦動作
 ニ懶ク或ハ勞瘵ニ陷ルナリ
 癰毒ノ察法ヲ論ス
 老人小兒此病ニ罹レバ是ヲ壯年ノ人ニ比スレバ治
 シ難シ○虛人或ハ長病劇疾ヲ患ヒタル人或ハ口中
 潰爛或ハ頸ノ腺ノ潰瘍或ハ顛癩アル人ハ水銀劑ノ
 吐涎法ニ堪ルト能ハス○孕婦此病ヲ患レバ動モス

第壹章

レバ墮胎スルコトアリ○乳母此疾アレバ其兒ニ傳染ス○婦人ハ男子ニ比スレバ此諸症ヲ發スルコト少シ

微毒ノ防護法ヲ論ス

此病ハ微毒アル人ニ觸交リテ傳染スルユ且ニ預メ是ヲ防キ仔細ニ戒慎シテ其人ニ觸交ルコトヲ禁シ若シ是ニ觸ルコトアラバ速ニ其部ヲ洗澡シテ淨潔ニスベシ○其傳染ヲ避ル方法多シト雖モ皆効驗ナシ

第陸章

微毒ノ治法ヲ論ス

凡ノ微毒ハ水銀劑ヲ用テ吐涎セシムルニ非レバ切實ノ功ヲ奏シ難シ○其毒肢體彼此ニ滯著シテ發ス

ル諸症ハ水銀劑ヲ外敷シテ治スベシ

註技龍漢斯微旬ハクシ名人多年微毒諸症ニ經驗ノ奇効ヲ奏シ少モ害ヲ貽サズ全功ヲ收ル一方アリ左記ス

斯微旬藥酒方

升汞一 燒酒四十

右件研和ス○大人ハ朝夕一匙宛用フ。多ク與ルモ每服二匙ニ過ベカラス。是ヲ服スル間ハ大麥煎或ハ緩和ノ煎劑葵根甘草土茯苓等煎湯ノ如キヲ云ヲ饒多ニ兼用スベシ○右ノ藥毎日法ノ如ク連服ノ其殘毒餘孽盡ク除治スルニ至ルベシ○此劑ヲ用ル間ハ油膩脂

膏ノ食物鹽藏炮炙ノ肉類ヲ禁シ唯輕キ肉羹汁蒸
 煮ノ蔬菜ヲ用フベシ○格謨緬立百私醫書第五條
 ニ云ス斯微旬此方ヲ徽毒ノ諸症ニ用テ曾テ吐涎ス
 ルヲナク悉ク全治スト云ト雖モ或ハ吐涎スル者
 アリト然レ是レ稀ニアルトニノ大抵吐涎スル者
 鮮ナシ即チ華安人ノ書中ニ論載スルガ如シ

增註遠西名醫傑泄兒ノ瘍科書並ニ遠西徽瘡袖珍
 方所載徽毒ノ症治ヲ採摘ノ左ニ略舉ス

包皮焮衝此症ハ陰莖ノ包皮焮熱腫痛ノ緊脹シ或
 ハ陰頭ヲ包被シテ小便ノ通利ヲ妨ゲ又多クハ下

疳或ハ淋疾ヲ兼又**治法**疏滌汞劑ヲ用テ數瀉下シ

適宜ノ汞劑ニ排毒劑ノ煎湯ヲ兼用シ又蒸溺汞劑

ヲ患部ニ施スベシ疏滌汞劑ハ後ノ下疳ノ條ニ列

舍利別等ヲ云或ハ其症ニ從ヒ汞升汞刺甘汞白降汞

ノ如キ汞劑ヲ以テ盧會蘇甘沒拮謨刺巴大黃消

石瀉利鹽等ノ瀉下ノ品ニ加ヘ丸藥ト微刺藥酒方

之右ノ諸品共ニ名ニ載ス○汞劑ハ薩撒弗刺斯或ハ

遠謨規吉甘汞等ヲ云○排毒劑ハ薩撒弗刺斯或ハ

上茯苓ニ葵根甘草ヲ如ル煎劑等ヲ云○蒸溺汞劑

ハ温湯ニ乳汁或ハ亞刺比亞麴是レ能ク其焮腫

ヲ消散ス以上藥其陰頭ヲ緊被シテ小便閉ヲ爲シ

或ハ包皮ノ裏面若クハ陰頭潰爛ノ下疳トナリ或

ハ壞疽トナルベキ症ハ鉸カテ以テ縱ニ包皮ヲ斷

問シ陰頭ヲ露ハシ療スベシ○包皮焮衝ハ内外
療法ヲ施メ其焮衝ヲ治スベシ患者壯年ニ多血
ナル片ハ刺絡ヲ施シ左ノ劑ヲ用フベシ

消石散 精製者

右分テ十二服トシ半時ニ一服宛用フ或ハ里没奈
堊名飲液ノノ沙糖ト橙汁ヲ以テ製スル者ニテ散劑
ヲ送下メ尤良其焮衝消散スルマデ毎日用フベシ
○甘乳清名ニ葡萄酒ト水ヲ和シ微温ニノ頻リニ
患部ヲ蒸湯スベシ其焮腫寧急速ニ寛解ス○包皮
膨腫ノ陰頭ヲ包被スル症ハ其腫減スルニ隨ヒ徐

クニ包皮ヲ剥脱シテ陰頭ヲ露ハシ右ノ蒸湯法ヲ
施メ其膿穢ヲ淨刷シ赤汞膏或ハ加烏斯膏ヲ貼ス
ベシ共ニ次ノ下○右ノ治法ヲ施メ捷効ナク包皮
陰頭ヲ緊被メ焮腫増劇スル者ハ縱ニ包皮ヲ截斷
メ陰頭ヲ露ハシ前法ノ如ク療スベシ否ザレバ其
潰瘍深ク侵蝕メ陰頭崩壞ス

陰頭焮衝 此症ハ陰頭焮熱腫痛シ多クハ包皮翻脹
メ陰頭ヲ箱笮ス治法刺絡ヲ施シ清涼下劑清涼稀
釋劑前條ノ消石散或ハ熱ヲ用ヒ緩和蒸湯劑或ハ
緩和病編第十二章劑ヲ云綏和蒸湯劑前條
綏和綏和蒸湯劑或ハ温湯綏和蒸湯劑或ハ温湯

外科雜考 卷六 疔毒

ニ乳汁或ハ亞刺比亞蕪^ア溶化ノ蒸湯劑トシ或
 ハ乳汁ニ亞麻子末^ア加ヘ溶化シ蒸
 湯劑トス或ハ亞麻子^ア葉根^ア葉^ア藥品^アヲ水煎ノ蒸湯劑
 トス假令バ亞麻子^ア綫和^ア綫布^アノ綫和^アノ効^アヤル
 等ノ煎劑ノ如シ○綫和^ア綫布^アノ効^アヤル
 藥品ヲ煮熟シ揚ラ糊^アノ効^アヤル
 或ハ乳汁ニ亞麻子^ア粉^アヲ糊^アノ効^アヤル
 煮テ糊ノ如クシ貼スルモ亦綫和^アノ良効アリ
 瘰癧減シ包皮陰頭ヲ箝箝セザルニ至テ汞劑ヲ内
 服外敷ノ全治ニ至ルベシ内服外敷ノ汞劑共ニ
 包皮焮衝ノ條ニ出ツ
 陰頭焮衝消散セス膿潰ノ下疳トナル者ハ汞劑ヲ
 内服シ蒸湯汞劑ヲ患部ニ施スベシ共ニ包皮焮衝
 ノ條ニ出ツ
 下疳 淋疾或ハ包皮焮衝ニ因リ或ハ不潔ノ交媾ニ
 因テ男子ハ陰頭婦人ハ脛唇等ニ小胞ヲ生シ潰破

スレバ稀汁出漸ク滋蔓侵蝕ノ潰爛シ酷厲ノ膿汁
 流泄シ焮熱腫痛ヲ兼子或ハ黦澹色ニノ痛マズ腐
 蝕ス此ヲ下疳トス○此症其他總テ徽毒ノ諸症ハ
 一切辛熱香竇油膩脂膏鹽藏ノ品獸肉魚類葷酒及
 ビ消化シ難キ物ヲ禁シ淡薄ノ食物ヲ與フベシ此
 症ハ嚴ニ飲食ヲ慎リ治法ノ一大緊要トス治法患
 部焮熱腫痛シ或ハ多血ノ者ハ先ツ包皮焮衝ノ方
 法前ニ出ツヲ施シ其焮衝解散ノ後左ニ記ス數方ヲ選
 用シ日ニ三四次瀉下セシムベシ

龍汞散

大黃

錢一

甘汞

三瓦

龍腦

氏二

右各別細末シテ調和シ分テ六服トシ一時ニ一服宛水ヲ以テ送下ス

龍汞丸

大黃 一錢 甘汞 各二錢 龍腦 各二錢

蒲公英根 越幾斯劑 二錢

右調和ノ四十丸トシ半時毎ニ三丸ヲ服ス

梅黃飲

梅那葉 半錢 大黃 末一錢 甘汞 三錢

右梅那ト大黃ヲ沸湯ニ浸ス一半時。瀝テ六弓ヲ取甘汞ヲ調和シ每朝小茶碗ニ二個或ハ三個ヲ服ス

滿黃舍利別 虛人小兒ハ此方ニ宜シ

滿那 二錢 大黃舍利別 一錢 甘汞 二錢

右調和シ卵匙ニ二抄或ハ三抄ヲ用フ

○患部ニ左ノ軟膏ヲ貼スベシ

赤汞膏

赤降汞 一錢 家猪脂 一弓或一弓半

右研和シ棉撒絲ニ塗リ日ニ兩次換貼スベシ○左ノ軟膏亦妙

加烏斯膏

刺必斯加烏斯 六錢 玫瑰蜜 二錢

蓄薇露 六錢

右研和シ棉撒絲ニ蘸シ換貼スル一日ニ三次○又右ノ膏或ハ阿利襪油ヲ以テ患部ノ邊圍ニ塗擦スベシ治スル一逾速ナリ○微温湯六弓ニ醋

或ハ甘乳清一弓ヲ加ヘ巾ニ蘸^{ヒタ}メ頻^{ヒク}リニ其潰瘍ノ傍側ヲ蒸湯スベシ能ク其焮痛ヲ消散ス○此症ハ其毒ノ多少ト患者ノ強弱ニ隨テ治スル^ル遲速アリ○此潰瘍ハ一切酷烈腐蝕ノ外敷藥ヲ禁ス

罌丸腫

治法

罌丸焮熱腫痛ニ發熱腰痛等ヲ兼ル症ハ疎滌汞劑^{包皮焮衝}ノ内服シ消散蒸湯劑^{毒鳥刺}出^{兒變水}ズニ規^{イキス}吉斯麗^{イム}謨^ムヲ加ヘ外敷ノ消散スベシ○

其焮腫消散セス膿ヲ成^サントスル症ハ瀉下劑ヲ禁シ、緩^{ゾツ}和^ブ毳^陰布^頭ヲ貼シ膿ヲ成スニ及テ鉞^ハ鉞^ヲヲ以テ刺破シ膿ヲ泄スベシ此症腐藥ヲ禁ス其潰瘍

ハ輕キ技^バ爾^ル撒^サ謨^ム質ノ愈創劑ヲ外敷シ^{若^カ把^ハ兒^ル麻^膏}

或ハ的^テ列^レ並^ビ底^ヲ加^ルル^{其毒深キ者ハ是ニ汞劑}

如^キ規^ト共^ニ出^スル^{麗^降汞^規吉^ス麗^謨等}

服スベシ^{二劑共ニ}○罌丸腫ハ徽毒淋下疳ヨリ發

シ或ハ是ヲ早ク愈シ其毒内鬱スルヨリ發スル^シ

多シ然^レ疝^疾下疳甚^ク險惡ナラザルハ法ノ如ク

治療ヲ施シ清涼性ノ淡薄ナル飲食ヲ用レバ罌丸

腫ヲ發スル^トナシ○淋疾下疳ヲ患ル^トナク直^ニ

罌丸焮腫シ或ハ焮熱ナクノ唯腫起スル者アリ其

腫或ハ消散シ或ハ膿潰シ或ハ頑硬結腫ノ痛ナキ

者アリ **治法** 罌丸焮熱腫痛或ハ發熱スル者ハ消石散包皮焮條或ハ龍汞散或ハ滿黃舍利別共ニ下ヲ用ヒ或ハ左ノ清涼下劑滿那ヲ内服シ又外敷藥ヲ施セバ大抵其腫速ニ消散ス

滿那糕

滿那

答末林度

各三錢

消石

大黃

各二錢

石調和シ半時或ハ一時每ニ肉豆蔻大ヲ服ス○乳清名或ハ里沒那埵名茶湯等適意ニ日常ノ飲料トスベシ○又左ノ軟膏ヲ以テ患處ニ塗擦スベシ

礪汞膏

礪砂精名

四錢

阿利襪油名

一弓半

右硝子蠟ニ入レ振蕩ノ混和セシメ此液一弓ニ規吉撒爾弗名一弓ヲ研和シ每日肉豆蔻大ヲ取テ其腫及ビ傍側ニ塗擦スベシ此膏微毒一切腫瘍ヲ消散スルニ甚ダ驗アリ○又蒸餅心ニ酪餘名ヲ研和シ名琶布名ヲ作り微温ニシ其腫ニ塗タル軟膏上ニ貼シ更換スル日ニ四次名每朝温湯ニテ是ヲ洗ヒ去ルベシ○右ノ如ク療スレバ其焮赤腫痛大抵三四日ノ間ニ減スベシ○患者ヲシテ肢體ヲ勞動セシムルヲ勿レ○罌丸腫ハ消散スル者多シ然レ膿ヲ成ス者アリ其候患者惡寒ノ内熱ヲ覺エ其焮痛

減ノ腫增長シ是ヲ按ニ軟ニ搏動アリ或ハ膿ノ移動スルヲ覺ユ或ハ凸起スル處アル等ナリ。斯ノ如キ候アレバ刺破ノ膿ヲ排泄シ治スベシ○罌丸腫初メヨリ焮衝ノ候ナク痛ナキ症ハ右ノ如キ焮衝ノ治法ヲ施サズ唯左ニ記ス軟膏ヲ塗テ消散セシムベシ此腫動モスレバ頑硬ニシテ久ク治セサル者アリ是ニ峻攻ノ藥ヲ施メ刺戟スレバ惡厲ノ潰瘍トナル者少ナカラズ

礪鹼膏

礪汞膏

龍腦

ハ子ナア石鹼 水適宜ニ加ヘ溶ス者
勿搦祭亞石鹼 水適宜ニ加ヘ溶ス者

右研和ノ軟膏トシ毎日肉豆蔻大ヲ取り大約四分時ノ間徐々ニ患部ニ塗擦シ瓦爾技奴謨膏ヲ攤テ是ヲ益ヒ貼シ。數日怠ラズ是ヲ施スベシ○又左ノ下劑ヲ兼用スベシ

黃鹽丸

大黃

鐵

酒石鹽

名

刀

薄荷油

滴十

右調和メ六十丸トシ金箔ヲ衣トス。每服五丸。日ニ四次。但シ通利ノ多少ニ隨テ服量ヲ加減シ大抵日ニ四次通スルヲ度トス

徽毒治法括套

凡ソ徽毒凝流ニ體ニ潛伏頑滯ス。諸險症ヲ發スルヲ勝テ算ヘ難シ。然レ左ノ劑ヲ

長服ノ血液中ニ浸染セル毒ヲ排除淨刷スレバ諸
症自ラ回復ス

金龍丸

加羅蔑兒カロメール 甘黍カンホ 或或 金硫黃カネニウ 各一錢

右硝子白ニ入レ搗テ細末シ徐々ニ左ノ品ヲ和ス

亞刺比亞アサヒヤ 越謨エツモ 龍腦リウノウ 十六

越栗失爾エリキシル 剝祿布利ハクラクブ 利怛リタン 適宜適宜

右捏和ノ四十八丸トシ甘草末ヲ衣トシ朝夕一丸

宛左ノ煎劑ヲ以テ送下ス

土茯苓煎

土茯苓 牛蒡根 各二弓

右剉水五百錢許ヲ以テ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去リ服

第三章

ス○肢體各部疼痛ヲ患ル者ハ礪鹼膏ヲ以テ法ノ

如ク患處ニ擦ノ捷効アリ此膏及擦法トノ其疼退

ク片ハ速ニ此膏ヲ休ヤベシ○齒浮搖斷腫痛沾血等

ノ吐涎ノ候ヲ現アラス片ハ速ニ内外ハ末劑ヲ休ヤノ清

涼緩和ノ下劑滿那糕類ヲ用ヒ又水ニ醋四分ノ一ヲ

加ヘ漱藥トスベシ其吐涎ノ候盡ク治メ後前方ノ

加カ羅蔑兒ノ量三分一或ハ半ヲ減シ復タ用フベシ○

患者常ニ厚被シ温煖ニ保護ノ表發ノ蒸氣ヲ發セ

シメ。濕冷氣。夜氣ヲ避サシルト尤モ肝要ナリ綱

淋疾ヲ論ス

淋疾ハ常ニ尿道ヨリ粘液第九十二章ニ説ノ良性ナ
ル者或ハ其腐敗セル者ヲ漏泄スル病ナリ

淋疾ノ分別ヲ論ス

淋疾ノ分別ヲ論ス
畢丸ニ於テ製造スル所ノ精液是レ交媾ノ出ル漏泄
スルヲ真ノ淋疾ト曰フ漢説ノ遺精滑攝護格烏百兒
腺粟多列腺尿道ノ脂胞陰頭後ノ脂胞等ヨリ出ル液
ノ漏泄スルヲ假淋疾ト曰フ攝護ハ尿道中ノ腺ノ名
兒腺ハ尿道中ニアルニ個ノ腺ナリ是ヨリ滑液ヲ滲
出ノ常ニ尿道ニ灌漑シ尿ノ慄悍氣ヲ防護ノ侵刺セ
ザラシム○粟多列腺ハ細小ノ腺ニ輸尿管膀胱尿
道等ノ裏面ニ周布シ是ヨリ常ニ滑液ヲ滲出シ尿
慄悍氣ヲ防護シム其徽毒傳染ヨリ來ルヲ惡性淋ト曰
侵刺セザラシム

淋疾ノ大較ヲ論ス

淋疾ノ大較ヲ論ス
惡性淋ハ徽家ト交媾シテ後稀薄ニシテ酷厲ナル液
ヲ尿道ヨリ漏泄シ尿道微痒侵刺小便淋瀝尿道口焮
弛弱セルヨリ發スル淋疾ヲ總テ善性淋ト名ク
房勞過度或ハ輸泄管上ニ云諸部ノ腺ニ在テ其液ノ
ヲ乾淋ト名ク芫菁或ハ利尿藥ヲ過用シ或ハ騎馬
發シ尿道破腫尿道ヨリ汚液ヲ漏泄スルナキ者是
ヲ陰具諸部ノ疾患ヨリ來ラズノ全身ニ關ル病ヨリ
發スルヲ夾他疾淋ト名ク陰莖緊脹挺彊シテ攣痛ス
ルヲ急弦淋ト名ク徽家ト交媾シテ惡性淋ノ諸症ヲ
發シ尿道破腫尿道ヨリ汚液ヲ漏泄スルナキ者是
ヲ乾淋ト名ク芫菁或ハ利尿藥ヲ過用シ或ハ騎馬
房勞過度或ハ輸泄管上ニ云諸部ノ腺ニ在テ其液ノ
弛弱セルヨリ發スル淋疾ヲ總テ善性淋ト名ク

赤其液漸ク粘稠ニシテ尿道口ニ膠著ス。爾後稍粘稠ナル精樣ノ液漏滴シテ休ズ。陰莖腫痛。小便艱澁不利。尿道中。侵刺狀痛ス。此症増劇スレハ種々異色ノ臭氣アル酷厲液ヲ漏泄シ尿道是ニ觸テ逾々腫劇痛シ會陰ニ當テ疼之陰莖緊脹急ス。此症他ノ病毒ヲ夾ムトナキハ其侵刺劇痛漸ク以テ減除シ終ニ精樣ノ液細線ノ如ク通泄ノ全治スルナリ其液粘リ凝テ絲ヲ牽ガ如キヲ云

淋疾ノ防護法ヲ論ス

第百章

善性淋ハ其病因トナルベキ諸件ヲ避ケ。飲食起居攝生法ヲ慎守ノ預メ是ヲ防グベシ○若シ穢家ト交リ

第百章

觸ルヲアラハ能ク其部ヲ洗淨シテ傳染ヲ避クベシ

淋疾ノ治法ヲ論ス

惡性淋ノ未ダ日ヲ經ザル者ハ疏滌汞劑ニ拔爾撒謨質ノ劑ヲ兼用シ終ニ適宜ノ收斂劑ニ鉛糖名ヲ加ヘ用レバ速ニ治ス既ニ經久頑滯スル者ハ數日水銀劑ヲ内服外敷シ稍吐涎スルニ至テ其服量ヲ減シ。下劑ヲ用テ吐涎ヲ抑制シ輕ク吐涎セシムルト二三週ニシテ終ニ拔爾撒謨質ノ劑收斂劑ヲ用テ全治ニ至ルベシ疏滌汞劑ハ包皮嫩衝ノ條ニ出拔爾撒謨質後ノ増註ニ出ル治淋拔爾撒謨飲列遊攻魂飲桂黃列滋後ノ増註ニ出ル治淋拔爾撒謨飲列後ノ増註ニ出ル治淋拔爾撒謨飲列

皮嫩衝ノ○利尿劑ヲ通用シテ發スル症ハ速ニ其劑
 條ニ出ツ○利尿劑ヲ通用シテ發スル症ハ速ニ其劑
 ヲ休テ潤灌劑ヲ用フベシ。輸泄管前弛弱シテ發ス
 ル症ハ強壯劑ヲ外敷シ武ハ是ヲ尿道ニ灌入スベシ
 潤灌劑ハ和蘭名「フスプレーン」是總テ緩和性ノ飲
 煎湯トシ用フベシ。陰頭嫩衝ニ舉ル緩和蒸溺劑ノ藥品
 壯劑ハ後ノ増註ノ潤灌緩和ノ除ニ治スルナリ○強
 水銃法等ヲ尿道ニ灌入スベシ。或
 水銃ニテ尿道ニ灌入スベシ。或
 増註尿道ノ膜尿道ハ一條ノニハ過ク細腺ヲ布置
 シ陰頭後ヨリ橫骨ノ部ニ至ル間ハ其腺珠ニ居多
 每腺一個ノ輸泄管一名粘ヲ具ヘテ尿道ノ水棉體

ニ連リ其管口ヲ尿道ノ腺ニ開キツ子ニ日常粘滑液ヲ水
 棉體ニ受ケ適宜ニ尿道ニ滲出ノ是ヲ滑利シ以テ
 小便ノ酷厲氣ヲ防護シ尿道ヲ刺戟セザラシム是
 ヲ無病平全ノ常トス水棉體ハ陰莖中ニ在テ尿道
 ノ如シ常ニ滑液ヲ含テ輸泄管ヨリ尿道腺ニ通泄ス○若シ微毒ヲ尿道腺及
 ビ輸泄管ニ感受スルタハ直チニ水棉體ニ浸淫ノ
 潛滯シ是ヨリ其汚液ヲ輸泄ノ絶タガル「宛」毛冒寒
 傷冷毒鼻中ノ涕膜腺ノ輸泄管ニ浸淫ノ刺戟シ涕
 洩夥ク流泄スルガ如シ是ヲ惡性淋或ハ微毒淋ト
 名ク○是ヲ分テ三等トス第一等ノ症ハ不潔ノ婦

人ト交媾ノ直チニ淋疾ヲ發シ或ハ四五日或ハ十日或ハ半月許ニシテ發シ。陰莖腫起セズ唯小便ノ通利スルハ尿道搔痒焮熱攪刺スルヲ覺エ。尿道微腫焮赤。名イ第二章二十二ノ如キ稀液ヲ淋歴ス。**治法**嚴ニ飲食調護ヲ戒慎シ滋潤緩和ノ劑。消石様ノ藥ヲ用テ其毒ノ剌戟ヲ抑制シ勉テ其淋泄ノ液ヲ進輸シ其毒ヲ排泄スルヲ肝要ナリ。滋潤緩和ノ劑ハ陰頭ノ藥品ヲ煎劑トシ用ルナリ。消石劑ハ包皮焮衝ノ條ニ舉ル消石散ヲ用フベシ。又溶石劑ヲ用フベシ其方水銀ヲ消石精ニ溶化シ此液二滴或ハ三滴ヲ過爾託亞根ノ煎湯四多或ハ六多ニ加

ヘ毎日用フベシ。消石精ニ強弱アレ是ニ水銀ヲ加テ焮化シ澄清ノ液トナルノ度トス其製法服量等固水銀ノ條ニ微尙藥酒方主治ノ下ニ出ツ又水鏡ヲ以テ粘滑緩和ノ藥液ヲ尿道ニ注入スベシ。緩和藥品ノ煎汁ナリ陰頭焮衝ノ條ニ○第二等ノ症ハ小便通スルハ尿道焮熱刺痛灼ガ如ク。陰頭包皮焮赤。陰莖腫脹勃起攣痛ニ夜分殊ニ甚シ或ハ時々會陰ニ牽テ痛ニ淋歴ノ液漸ク粘稠ニシテ酷厲トナリ灰色或ハ黃綠色トナリ或ハ血ヲ交ヘ臭氣アリ。此症大抵一週或ハ二三週モ替留ス治法其焮腫刺痛劇キ者ハ刺絡ヲ施シ下劑ヲ用フ。熱病篇第二章果仁乳ニ白罌粟舍利別ヲ加テ毎

日飲料トシ果仁乳ハ扁桃乳罌粟子乳龍腦乳等ヲ云共ニ出清凉性ノ淡
 薄ナル飲食ヲ用ヒ麥及ビ蔬其炊熱刺痛減スルニ
 至テ第一等ノ症ニ説ク所ノ溶汞劑及ビ水銃法ヲ
 施シ或ハ毎日規ネキス吉斯麗イム護罔ヲ尿道ニ注入ノ尤良
 ○第三等ノ症ハ尿道ノ炊熱腫痛攣急等漸ク減シ
 淋瀝ノ液粘稠白色トナリ數週或ハ數月淹留ス○
 此病ハ初メヨリ適當ノ療法ヲ施シ飲食攝養差誤
 ナキ片ハ他症ヲ發セズメ治スベシ然凡療法調護
 其宜ヲ失ヘバ便毒畢丸腫尿道ノ狹窄潰瘍會陰ノ
 炊腫瘻瘡攝護ノ腫脹潰瘍小便艱澁或ハ頑固ノ炊

腫眼其他險症ヲ發スルヲ希ナラズ○第三等ノ症
 ハ動モスレバ荏苒トメ治セズ或ハ尿道ノ諸患ヲ
 生シ小便通利ヲ妨ルト多シ若シ其候アル片ハ速
 ニ瘰捻子ヲ尿道ニ挿テ膀胱マデ内ルベシ是ヲ以
 テ遍ク平等ニ尿道ノ裏面周圍ニ襯著シ尿道ノ腺
 輸泄管ノ弛弱セルヲ強壯ニスルヲ以テ尿道ノ息
 肉腺ノ突起潰瘍ノ癢痕等ニテ小便通利ヲ障碍ス
 ル患ヲ貽ストナシ此捻子ハ數試用シ實功ヲ得ル
 所ニメ久ク諸般ノ技爾撒謨劑或ハ收斂劑強壯劑
 ヲ施ノ寸効ナキ症ニ大効アリ右ノ症ハ凡ソ衰弱

ヲ強壯ニスル藥劑ヲ内服ノ適當ナレバ此捻子ニ
比スレバ其効劣レリ

瘰捻子造法

へ子スカラクチへカールシイ蘭

金密陀

一 鉛粉

二

阿利襪油

半

右密陀ト鉛粉ヲ極細末トシ是ニ油ヲ加テ攪和シ
文火ニ上セ煮テ黑色稠粘硬膏ノ如クナルヲ度ト
ス或ハ其症ニ從テ右ノ膏四錢ニ黃蠟四錢赤降汞
ノ極細末十五分ヨリ加テ一匁或ハ半錢ニ至ル右
ノ膏ヲ取り微火ニ上セ烱シ緞布長一尺許濶一拇
指或ハ一拇指半横徑許ナルヲ取テ其膏中ニ投シ

篋ヲ以テ押入テヨク浹洽セシメ其端ヲ把テ疾ク
引出シ其膏ヲ淋漓セシメ冷テ後其把タル端ヲ上
部トシ斜メニ漸ク狭ク其邊ヲ剪テ下端ニ至リ全
形ヲ長キ三稜ト爲ス是レ下部ハ其膏溜住スル
多クメ自ラ厚ケレバナリ又其下端ヲ截テ偃月形
ト爲スベシ此布條ヲ取テ上端ヨリ捻リ卷テ下端
ニ至リ是ヲ平滑ナル板ニ夾テ旋轉シ固メ一條ノ
捻子ト爲スナリ○多血ノ患者ハ刺絡ヲ施シ數下
劑ヲ用ヒ胃腸ヲ淨刷メ後此捻子ヲ押ベシ但此病
アレバ結石尿道ニ梗塞シ或ハ其他ノ諸因ニテ小

便閉シテ急迫ナル症ハ此捻子ノ治スベキニ非ズ
 先、瀉下ノ劑ヲ用ヒ其急迫ヲ解ノ後各其因ニ從テ
 治ヲ施スベシ○捻子ノ太サハ患者ノ尿道ノ濶狹
 ニ應シ且其通スル小便ノ巨細ト同等ニシ是ヲ挿
 ニ臨テ甘和性ノ油甘扁挑油阿利ヲ是ニ塗テ滑ニ
 シ患者ノ意ニ聽セテ或ハ跪坐セシメ或ハ側臥セ
 シメ醫ノ左指ヲ以テ陰莖ヲ持チ右手ヲ以テ捻子
 ノ中程ヲ把テ徐クニ尿道ニ挿シ陰莖ヲ拽伸シ輸
 内ルベシ斯ノ如クスレバ唯捻子ヲ推送ヨリハ入
 易シ捻子ノ端陰莖ノ根ニ至バ陰莖ヲ揚テ陰頭ト

小腹ト離ル一吋五六分許ニシ其屈曲ノ處ヲ徐
 クニ推送リ左手ノ一指頭ヲ會陰ニ當テ捻子ノ下
 端ヲ押シ扶テ患者ノ觸覺エザル許ニ徐クニ内テ
 膀胱中ニ至ルベシ○是ヲ挿了テ脱出セザルガ爲ニ
 蠟ヲ塗タル線長四尺許ナル者三四條ヲ取其正中
 ノ處ヲ以テ捻子ノ上端ニ固ク結著テ其左右ノ線
 ヲ併セテ陰頭ニ載セ陰頭ヲ過ル處ニテ合セ結ビ
 再ビ其線ヲ左右ニ分シ是ヲ陰莖ニ纏ヒ結ヒ止置ベ
 シ○捻子ヲ尿道ニ留置ク時刻ノ長短ハ每人一様
 ナラズ患者ノ稟賦感動シ易クノ尿道ノ知覺敏ナ

ルカ或ハ膀胱攣急ノ甚キ者ハ日ニ兩回イッモ毎イッモ次一時
 或ハ一時半ヨリ長ク挿シ置カテ能ハズ。但シ知覺ノ鈍
 ナル者ハ一晝夜ニ三時或ハ四五時モ留置カベシ。是
 ヲ留ルカ久キホド逾カ其効速ナリ小便通スル片ハ
 毎イッモ次捻子ヲ拔去レベシ。○是ヲ施ス間ハ飲食ヲ慎シ
 守リ消化シ難キ物。酒。辛熱香竈ノ飲料ヲ禁シ且シ閨
 房ヲ戒ルカ殊ニ肝要トス。蔬菜菜根等。總テ清涼性
 ノ品ヲ用フベシ。○此病ハ利尿ノ藥劑。總テ害アリ
 ○尿道狹窄或ハ息肉。腺腫。癩痕等ヲ尿道ニ生カノ小
 便通利ヲ妨碍スル症ハ排捻子ヲ尿道ニ挿カテ潤開

シ治スベシ。此症多クハ微毒ヲ兼ヌ或ハ失シ苟カ兒ル陪イ
 苦シ其他酷厲毒アルヨリモ發ス。故ニ各其病毒ヲ驅
 除スル藥劑飲食ヲ用ヒテ其捻子ノ功ヲ扶ルカ一
 大專務タリ排捻子ハ右ノ諸症ニ試用ノ驗ヲ得ル
 一勝カテ數カヘ難シ。又是ヲ挿カスニ尿道ヲ侵刺セズ且
 柔ニノ患者殆ト是ヲ覺エザルガ故ニ膠捻子ニ比
 スレバ長ク尿道ニ留ルカ得ルナリ。○尿道狹窄
 或ハ息肉アルニ由テ是ヲ挿カト雖モ支障カ攣阻カノ勝
 脱ニ届カルマデニ數日ヲ經ル者アリ。此症ハ患者カ醫
 者共ニ厭倦シ半途ニ廢スル者多シ。然レカ毎イッモ次

其梗阻スル處マデ挿入レ勉強ノ稍々ニ是ヲ進メ
輸リ。竟ニ膀胱中ニ達ノ全功ヲ收ムベシ。但尿道ノ
潤開スルニ隨テ捻子モ亦漸ク太ク製スベシ

排捻子造法

「フル空イデンデカールシイ蘭

精好ノ軟革甚ダ薄ク兩面平等ニ製シタル者ヲ取
リ。長一尺許。潤一二寸。大抵患者ノ尿道ノ巨細ニ適
ハシメ。是ヲ銜ニ唾ヲ以テ兩面ヲ濕シ。其端ヨリ斜
ニ捻リ卷テ一條ノ捻子ト爲シ。仍數回捻リ固メテ
竟ニ乾クニ至ル。又牛ノ膏腸ヲ取り。水ニ投シ水中
ニテ其層ヲ剥取テ是ヲ幘ニ張テ曝乾シ。縦ニ截テ

潤一二分許ノ條ト爲シ。是ヲ以テ右ノ捻子ノ外面
ヲ纏ヒ被フ。初二三纏ハ環匝シ。夫ヨリ斜ニ半バ重
子捲テ其端ニ至ル。又其端ニハ蠟ノ如キ膠粘ノ物
ヲ塗テ圓滑ニス。是レ尿道ヲ毀傷セザルガ爲ナリ
○其挿ス法及ビ挿留ル時限。脱出ノ防護。飲食藥劑
等。總テ疹捻子ト同シ

○微毒淋ハ其淋瀝ノ液初メ稀ク後漸ク稠クノ膿
ノ如シ。然レ是レ膿ニ非ズ。一種ノ酷厲液ナリ。冒寒
病ノ清涕モ其毒熟スレバ變ノ粘稠或ハ黃綠ニ
膿ノ如クナルト同シ。此夜男子ハ尿道。婦人ハ腔。其

他陰處ノ細腺ヨリ滲出ス○其酷厲液。男子ハ包皮。陰頭。婦人ハ腫唇。其他陰處ニ浸淫メ。焮衝ヲ發シ。遂ニ下疳トナル。アル故ニ。預メ是ヲ防クニ。微温湯十弓ニ醋一弓ヲ加^{ハキリ}頻^ニ患部ヲ洗淨スベシ。治法初發。陰具焮熱腫起。小便通スル片劇痛スル者ハ先焮衝ノ治法ヲ施シ。焮衝解メ後淋疾ノ治法ヲ施スベシ。即患者壯年ニ多血ナル者ハ刺絡ヲ施シ。然メ消石散^{包皮焮衝ノ條}ヲ用ベシ。酪餘^酪或ハ乳清^酪或ハ水ニ醋少許加。微温ニ患部ヲ蒸湯シ。若クハ布片ニ蘸^{ヒキ}ノ貼シ。常ニ浸潤セシムベシ。能ク其焮痛擊急

ヲ緩解ス。婦人ハ是ヲ腫ニ灌入スルモ良○其焮痛劇者ハ乳汁一匕。沸湯二匕調和シ。微温ニ頻^{キリ}ニ多服スベシ。其痛速ニ解ス○陰莖擊急甚者ハ微温乳汁ニ阿芙蓉少許ヲ溶シ。此液一小茶碗ヲ水銃ニテ尿道ニ注入シ。又是ヲ以テ數^{カク}痛處ヲ蒸湯スベシ○此症モ亦下疳條ニ說。如ク嚴ニ飲食ヲ慎^シ守ル。緊要ナリ。其焮衝消散シ。或ハ著^シク減スル片ハ左ニ載ル淋疾ノ治法ヲ施スベシ○熱性酷烈ノ下劑ハ其痛ヲ增劇シ。隨テ其淋瀝ヲ増發ス。但。清凉下劑ハ。啗^{カク}ニ瀉下スルノミナラス。尿道ノ輸泄管ヲ緩弛ノ淋

泄ノ汚液ヲ進輸シ病毒ヲ排除ス。故ニ此症ハ下疳ノ條ニ列スル龍汞散。龍汞丸。梅黃飲。滿黃舍利別。畢丸腫ノ條ニ舉ル滿那糕。等ヲ擇ニ用フベシ。但下劑ノ功。每人一様ナラズ。故ニ右ノ劑ヲ用テ大便日ニ四回通スルヲ度トシ是ヨリ多キハ服量ヲ減シ或ハ兩三日ニ一回用フベシ。○又汞膏ヲ患部ニ外敷ノ良効アリ是レ又其傳染毒ヲ患部ノ嚙收管ヨリ吸收ノ血中ニ混淆スルヲ防止ス。左ノ軟膏尤妙

龍汞膏

水銀 一錢 蒸餾醋ヲ以テ洗フ者
 沙糖 各一錢
 家猪脂 新者

右研和ノ水銀ノ星ナキニ至リ此膏二錢ヲ取四分時ノ間。患部及ビ其傍側ニ擦リ。終ニ是ヲ洗ヒ去ルベシ。是ヲ四日ニ一回施スベシ。○新製ノ阿利襪油或ハ甘扁桃油ヲ取り水銃ヲ以テ尿道ハ腫人ニ注入スル。其症ノ輕重ニ從テ日ニ二次ヨリ六次ニ至ル。乃チ其淋痛速ニ減ス。○右ノ如ク療法ヲ施ス。十日ヨリ二十日許ニ至レバ焮痛淋瀝大ニ減シ其液ノ綠色漸ク黃色及ビ白色トナリ。終ニ粘絲ヲ牽ガ如クナリテ治ス。○斯ノ如ク回復スルニ隨テ漸ク下劑ヲ減シ終ニ三日ニ一次用フベシ。○微毒ハ

根治スル極テ難シ。假令一滴ノ毒ト雖モ血液中ニ遺留スレハ身體生運ノ元カト血液活潑充灌ノ勢ニ因テ日ヲ經ルニ隨ヒ漸ク滋息シ終ニ全身ニ彌滿シ峻効ノ藥劑ト雖モ治シ難キニ至ル。故ニ大抵回復スト雖モ右ノ下劑ヲ怠ラズ用フヘシ。是ニ由テ治スレバ其毒遺滯スルヲナシ○或ハ其毒消スレバ久ク下劑ヲ服スル等ニ因テ男子ハ尿道婦人ハ膾其他陰所諸部ノ輸泄管弛弱虛衰シ粘稠ノ白液滲漏ノ止ザル者アリ。此症ハ三日ニ一次下劑ヲ與ヘ其間ニ左ノ數方ヲ擇ミ用フベシ

治淋拔爾撒謨飲

拔爾撒謨字露

阿利襪油

各四錢

右調和シ每服三十滴ヨリ六十滴マデ日四次用フ

的列竝玫瑰飲

勿擲祭亞的列竝底那

扁桃油

玫瑰昆設爾弗

各一

右調和シ每服一卵匙日ニ四次或ハ六次用フ

桂黃的列竝糕

勿擲祭亞的列竝底那

桂末 各二

大黃 末六錢

勿擲祭亞石鹼

滿那

沙糖 各二錢

右調和シ十氏ヲ一個トシ。甘草末ヲ衣トシ。朝夕六個宛用フ

格碌波丸

格碌波尼亞一名 一弓

右二氏ヲ一丸トシ每服六丸或ハ八丸。日ニ六次用フ。○右ノ劑ヲ用テ功ナキ者ハ左ノ劑ヲ用フベシ

格碌屈私珊崩散

石梅 琥珀 烏賊骨 各二錢

收清格碌屈私末爾扶斯一名 錢半

右研和シ分テ十四服トシ一服宛用ル七日ニ兩次

○右ノ劑ヲ用テ小便通利ニ劇痛シ若ハ血ヲ交者ハ速ニ其劑ヲ休テ乳汁ヲ微温ニシ多飲シムベシ。是ヲ用テ兩三日ニシテ其症仍治セザルハ乳汁ニ

阿芙蓉少許加テ用ヒ。其症治メ後後前方ヲ用ベシ。○右ノ諸劑ヲ用レ此症荏苒トシ減セザル者ハ男子ハ尿道。婦人ハ腔ニ左ノ劑ヲ注入スベシ

列印水銃法

列印設酒一名 水 一弓

右調和シ初ハ微温ニシ施シ。漸次ニ冷シ且其酒ヲ

増加シ一晝夜ニ十二次施スベシ○是ヲ施ス七
日ニノ仍効ナキ者ハ左ノ水銃法ヲ施スベシ

石灰水銃法

石灰水名 六分 玫瑰蜜名 二錢

右調和シ冷メ前法ノ如ク注入スル七日ニ六次

○右ノ療法ヲ施メ殆ト治セザル者ナシ。然レ尿道
或ハ腫ニ潰瘍アル片ハ是ヲ愈スニ非レバ此病モ
亦治スベカラズ。此症ハ二三日ニ一次下劑ヲ用ヒ。
左ノ水銃法ヲ施ス十四日許ニメ治スベシ

汞油水銃法

水銀 二錢 的列並底那 錢四

阿利襪油 二分

右水銀下的列並ヲ硝子臼ニ入レ。研和ノ星ナキ一
至リ。油ヲ和シ。水銃ヲ以テ患處ニ注入スル七日ニ六
次○此症仍頑固ニメ全治シ難キ者ハ右ノ水銃法
ニ左ノ劑ヲ兼用スベシ

治淋幾那飲

幾那細末 三分 血竭 四錢

橙皮舍利別名 桂舍利別名 各一分

右幾那ヲ水二十四分ニ煮テ半ヲ減シ。漚テ滓ヲ去

リ餘藥ヲ調和ス。每服一碗晝夜ニ六次用フ○此症ハ陰處ヲ冷水ニ浴ノ甚ダ効アリ○右ノ劑ヲ用ル症ハ良性ノ肉羹汁。炙肉等。滋養ノ飲食。醇厚ノ葡萄酒ヲ適宜ニ與フベシ圖

○淋疾治ノ後數週或ハ數月ヲ隔テ屢發シ竟ニ宿疾トナル者アリ此症種々ノ淋疾ヨリ發スレハ黴毒淋ヨリ發スルヲ殊ニ多シ。毎1次2連綿シテ休3ズ灰白或ハ黃綠或ハ清稀ノ汚液ヲ淋泄シ。小便通スルニ痛4少5ク灼6カ如キ焮熱ヲ兼ル7稀8ナリ。然レ輕忽ニノ治療ヲ加ヘズ或ハ誤治スレバ甚ダ久ニ彌9テ

治セズ終ニ險重トナル○此症ハ尿道腺ノ弛緩衰弊ニ因リ或ハ尿道潰瘍ヲ生ノ愈1ザルニ因ル。是亦瘳捻子ヲ施ノ患部ヲ強壯ニスレバ必ズ治ス○此症ハ其病因ニ蹤蹟ノ治ヲ施ス2肝要ナリ或ハ房勞過度或ハ黴毒等種々ノ因ニテ陰具諸器大ニ衰弱シ發スル3多シ。斯ノ如キハ強壯劑前說ノ治淋以下治淋幾那飲ニ至ル諸劑ヲ云ニ各自對症ノ藥劑ヲ兼用シ又其病因トナル諸件ヲ嚴ニ戒慎シ滋補培養ノ飲食ヲ用フベシ圖

○淋疾治ノ後數月ヲ經テ屢發シ或ハ毎年發ノ宿疾トナル者アリ然レ其淋痛劇シカラ

ス炊衝ナシ。此症ハ患者天質黴毒ニ感スルト必ク
 或ハ其毒ニ傳染スルト必キニ因ル。治法總テ前件
 ノ如シ。唯炊衝ノ治法ヲ措テ施サバルノミ。故ニ下
 疳ノ條ニ説ク所ノ下劑ヲ擇ニ用フベシ。細
 ○婦人黴毒淋モ男子ノ如シ但其毒尿道腔腔唇其
 他陰所諸部ノ腺ニ著テ其輸泄管ヨリ沍コヒノ如キ
 汚液流泄シ腔唇等腫起ノ搔痒ヲ覺エ其後小便通
 スル片刺痛灼ヤガ如ク小便艱澁淋瀝シ其痛替留ノ
 休マズ。陰處益腫起シ交媾ヲ妨ゲ尿道ノ水棉體漸
 腫起シ淋泄ノ液黃色或ハ綠色ニシ臭氣アリ右ノ

諸症男子淋疾ノ第一等。第二等。第三等ト全同シ。但
 第三等ニ所謂粘白液淋泄ノ歇ヤズ在再タル症ハ婦
 人ニ在テハ白帶下ノ如シ。是ヲ分法。其連綿タル漏
 泄ノ液。月經ノ期ニ於テモ止ガルハ淋疾トシ否ヤル
 ハ帶下トス。然レ經閉ノ者ハ是ヲ以テ分難キ故ニヨ
 ク其體質ヲ察シ諸症ヲ較リテ是ヲ決ベシ又淋疾
 ハ腔唇及陰處ノ外部ノ腫起シ腔中ハ必モ其
 患症ナシ。或ハ手指ヲ以テ診ニ腔ノ外部ノ腫痛
 アリ或ハ酸味ノ液ヲ沃ニ其外部ノ刺痛ヲ覺エ
 腔中ハ必モ疼ヤト無シ或ハ小便通スル片ニ灼ヤガ如

シ易シ。其經久頑固ノ微毒ヨリ是ヲ發スルハ盡ク全
 身ニ彌漫セル毒ヲ驅除スルニ非レバ治セザルナリ
 ○凡、微毒ノ腫瘍ハ規吉撒爾弗イキサルヲ外敷メ良効アリ
 [增註] 便毒ノ消散スベクノ化膿スベカラザル症ハ
 刺絡ヲ施シ疏滌汞劑包皮瘰ヲ用ヒ規吉撒爾弗ヲ
 外敷シ其腫ヲ消散セシムベシ化膿スベキ症ハ緩
 和蒸湯劑或ハ緩和陰瘰及ビ拔實栗膏陰瘰ヲ
 貼シ膿熟スレバ腐蝕藥ヲ施メ潰破セシムベシ。鉞
 鉞ヲ用テ刺破スルキハ創唇繕縮ノ收口ニ妨アリ
 其潰瘍ハ排膿ノ膏藥ヲ貼メ盡ク其膿ヲ排除シ且

汞劑ヲ内服メ全治ニ至ルベシ腐蝕藥ハ刺必斯
必斯加烏斯屈斯ヲ用フベシ其名栗斯或ハ栗斯
出ツ○汞劑ハ包皮瘰瘰ノ條ニ出ツ○便毒ノ
 治法、畢丸腫ト同シ故ニ其消散スベキ症ハ畢丸腫
 ノ消散法ヲ施シ化膿スベキ症ハ軟化蒸湯劑及ビ
 琶布琶布ヲ外敷シ膿熟スレバ其膿ヲ排泄シ治スベシ
軟化蒸湯劑及ビ琶布ハ陰頭瘰瘰ノ條ニ
記ス所ノ緩和蒸湯劑及ビ琶布ナリ補

增補重訂內科撰要卷六終

方言考
卷二
三
風俗考

