

秘傳證治要訣卷五 限目不復開却暈不損熱宜

煎服 關茶 厥痛 散土 之 藥 太醫院使戴元禮述

題諸痛門 藥法 參開 夜 蒸 煎 而 不 燥 燥 濟 宜 尚 風

寒 刺 頭 痛 天 三 五 十 餅 多 者 宜 芎 藭 湯 或 辛 湯 去

諸 頭 痛 有 因 氣 因 痰 因 虛 及 外 感 四 氣 或 酒 食 所 傷

或 作 勞 失 力 以 致 頭 痛 不 問 何 證 疑 似 之 際 並 可 與

如 聖 餅 子 烏 芎 湯 外 有 臭 毒 頭 痛 一 味 吃 炒 香 附 愈

荆 公 解 痛 字 義 云 宜 通 而 塞 則 爲 痛 無 寒 所 失 血 善

有 偏 正 夾 腦 風 服 川 烏 附 不 愈 用 蓮 子 草 烏 而 愈 者

此 乃 毒 攻 毒 之 意 不 可 不 知 藥 附 瓜 甘 蔞 其 味 苦

有上焦熱頭痛宜敗毒散去柴胡加甘菊花如其素有頭風暈眩不可謂其無痛而不以為風切宜詳審未宜遽作虛治若投補劑愈甚別又無疾所失血等患又非諸般病後卒然得此是風暈分曉宜小續命湯加全蝎三四箇風暈不可開眩暈不能擡舉宜有頭風發動頂後兩向筋緊吊起作痛者看其入挾寒挾虛宜大三五七散

頭風用熱藥者多間有挾熱而不勝熱劑者宜消風散通關散茶調散清上之類偏正頭風作痛痛連於腦常如牽引之狀發則目不可開眩暈不能擡舉宜

芎辛湯每服加全蝎五箇間進太陽丹及如聖餅子或用大茶調散八生散追風散大三五七散覺上膈有熱大茶調散并一字散

痰作頭痛其人嘔吐痰多者宜芎星湯或芎辛湯去茶牙導痰湯加芎半錢八生散亦可用有病此發作無時俗名痰飲頭風氣不順停痰上攻頭痛順氣為上二陳湯導痰湯並有加料法對十五錢下來對頭痛挾熱項生磊塊作痛宜都梁丸婦人疔疔大三五七有爛頭風痒而痛者於服頭風藥外用烏醋磨鐵銹塗生姜汁亦可措擦

怒氣傷肝及肺氣不順上衝於腦令人頭痛宜沉香  
降氣湯并蘇子降氣湯下養正丹或用芎附飲  
因虛頭痛此為腎厥頭痛宜用正元散或大三五七  
散入鹽煎服或於正元散入炒椒十五粒下來復丹  
間進黑錫丹有服諸藥不効其痛愈甚宜茸硃丹所  
以用茸者已於虛損門眩暈證詳論之  
感風寒暑濕四氣及傷食頭痛見諸傷門  
中酒頭痛見諸傷門酒食證

作勞失力頭痛見本門身體痛證頸痛因頭痛牽引  
致痛者當於頭痛諸證中求藥若別無處獨在頸者

非是風邪即是氣挫亦有落枕而成痛者並宜和氣  
飲食後服

甚熱眼眶骨痛附眉梁痛

痛有二證眼屬肝有肝虛而痛纔見光明則眼眶骨  
甚宜生熟地黃丸又有肝經停飲一證發則眉稜骨  
痛眼不可開晝靜夜劇宜導痰飲或芎辛湯去茶牙  
或二陳湯吞青州白丸子併於痰飲選藥

牙痛

牙痛有風毒熱壅齩蛀腎虛未辨何證俱用消風散  
搯抹諸證俱宜香附炒黑三分炒鹽一分研均搯用

如常

風毒牙疼用皂角寸節實之以鹽火煨熟湯泡通口  
嗽吐下涎沫風毒及熱壅上攻牙齦痛或齒縫有紅  
肉弩出宜消風散食後臨卧入茶點仍入荆芥防風  
白芷蜂房之屬煎冷頻頻漱口

有牙虫已出其孔穴空虚而痛者此乃不可不知宜  
用乳香少許火炙令軟以實之

若熱壅甚牙腫連頰疼不可忍宜金沸草散去麻黃  
加薄荷如其數

腎虛牙浮而痛甚則增寒壯熱全具如欲脫之狀宜

安腎丸間進黑錫丹

蛙痛用巴豆一粒爛研搓乳香細末丸之塞蛙孔中

咽喉痛

附吐壅

傷寒咽喉痛有陰陽二證已於諸傷門傷寒證詳言  
之今止言諸雜病咽痛宜其桔湯熱毒上攻或有瘡

或無瘡服其桔湯不効者宜於其桔湯加荆芥一錢

半重名如聖湯或如聖湯中更加連翹一分防風半

分或其露飲仍用碧雲散旋旋煎點間用鹽水吞養

正丹兼以薄荷煎鷄蘇丸含化

有咽疼服冷劑反甚者宜用姜汁詳見救門熱嗽證

有內熱熱形於上焦以致咽疼宜用黃柏皮黃連大黃研末水調塗在心與患處此出於葉氏方書  
熱壅咽痛或嗽中帶血者宜金沸草散佐以辰砂化痰丸咽喉痛用諸冷藥不効者宜枳南湯  
喉痺作痛腫滿不能言咽中生物名喉風宜甘桔湯若熱壅上焦咽喉疼痛而吞嚥乾物不若常時之潤  
睡覺口舌全無津液者如聖湯加人參半錢玄參七分或佐以碧雲散鷄蘇丸有上證兼心頭煩燥辰砂  
五苓散凡上壅並宜縮砂殼燒灰存性研末水調服

心膈痛 附心瘥

多因積冷與痰氣而成宜五膈寬中散或四七湯加木香桂各半錢或搗脾湯加丁香膈痛而氣上急者宜蘇子降氣去前胡加木香如數  
痰涎壅盛而痛者宜小半夏茯苓湯加枳實一錢間進半硫丸  
心瘥有痰飲所致俗名飲瘥有胃口熱食易消故瘥素問謂之食瘥亦類消中之狀俗名肚瘥痰氣宜小半夏茯苓湯加枳實一錢胃中熱宜二陳湯加黃連

一錢或五苓散加桂與辰砂中然宜二劑或黃  
膈痛與心痛不同心痛則在岐骨陷處本非心痛乃  
心支別絡痛耳膈痛則痛橫滿胸間比之心痛為輕  
痛之得名俗為之稱耳諸方稱為嘈雜煩躁忪悸痰  
飲證也五苓散利心小腸之熱恐非其對不若用四  
物湯十全大補湯去桂生血而益陰此亦非水制火  
之義亦有病瘧呷姜湯數口或進乾姜劑而愈此膈  
上停寒中有服飲見半熱則消黃中增五四寸熱

臂痛

臂為風寒濕所搏或飲液流入或因提挈重物皆致

臂痛有腫者有不腫者除飲證外其餘諸痛並宜五  
積散及烏藥順氣散或蠲痺湯外有血虛一證血不榮於筋或致臂痛宜蠲痺湯四  
物湯各半貼和勻煎服乳婦如臂枕兒傷於風寒多有臂痛亦宜於此選用  
若坐卧為風濕所搏或睡後手在被外為寒邪所襲  
遂令臂痛宜五積散及蠲痺湯烏藥順氣散審知是  
濕蠲痺湯每服加蒼朮三匙防已四分或用五痺湯  
曾因挈重傷筋以致臂痛宜琥珀散劫勞散或和氣  
飲每服加白姜黃半錢以姜黃能入臂故也

飲流入臂

見諸嗽門停飲伏據証

其人素瘦

肩背痛

以延晉氣流注於此痛如味康

肩背痛未辨何證俱宜和氣飲每服加烏藥半錢

當肩背一片冷痛背脊疼痛古方用神保丸愈者此

有積氣故也

此証宜用神保丸

其人素有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯

下五奎丸更於嘔吐門停飲證選藥

有腎氣不循故道氣逆挾背而上致肩背作痛宜和

氣飲每服加炒茴香半錢炒水椒十粒

有本體虛及病後心膈間痛或牽引乳脇或走注肩

背此乃元氣上逆當引使歸元不可復下疎刷之劑

愈刷愈痛發汗太多人患此者衆惟宜溫補拘於氣

無補法之說誤矣經云汗者心之液又曰陽受氣於

胸中汗過多則心液耗陽氣不足故致疼也

此証宜用神保丸

有近方得病者有病得之已久時發動者不問諸證

並宜異攻散香靈湯仍佐以搥脾湯

若積冷而痛者宜手粘散酒調下於內加官桂等分

仍以搥脾湯鐵刷湯佐之或用蘇合香圓姜汁和酒

調開熱服前後心痛亦可用

若服溫藥不効者痛愈甚宜微利其大便量虛實先  
 進神保丸以利為度繼進加味七氣湯若因飲食冷  
 物而痛者宜調氣散和藪脾湯下太山或宜  
 若因虵作痛虵攻喘心痛有休止其人吐虵或與之  
 湯飲藥餌轉入轉吐蓋緣物入則虵動虵動則令人  
 惡心而吐用川椒十數粒煎湯下烏梅丸  
 有腎氣逆上攻心以致心痛用生韭研汁和五苓散  
 為丸空肚茴香湯下云云  
 脇痛發云云人云云宜云云  
 諸脇痛各有所感若止是冷氣作楚與擷撲閃挫宜

和氣飲及烏藥順氣散或濃煎葱白湯下枳殼散  
 左右脇有氣塊而痛者此是積聚見諸氣門積聚證  
 停飲脇痛本事方面丸最佳中  
 曾有人脇痛連膈進諸氣藥并自大便導者其痛殊  
 甚後用辛熱補劑下黑錫丹方愈此乃虛冷作痛愈  
 踈而愈虛耳脇痛病在肝膽傷寒脇痛屬少陽經命  
 用小柴胡湯痛甚而不大便者於內加枳殼若尋常  
 脇痛不係正傷寒時身體帶微熱者本事方中枳殼  
 羹散用枳殼桔梗細辛芩防風各四分乾葛錢半其  
 草一錢若只是脇痛別無雜証其痛在左為肝經受



邪宜用川芎枳殼甘草其痛在右為肝經移病於肺  
 宜用片姜黃枳殼桂心甘草此二方出嚴氏濟生續  
 集加減在人又有肝膽經停痰伏飲或一過脇痛宜  
 用嚴氏導痰湯痰結成癖間進半硫丸蓋枳殼乃治  
 脇痛的劑所以諸方中皆不可少曾見潘子先說有  
 人脇痛下青龍湯痛止兼嗽得可此其痛必在右脇  
 故也灼然知是寒氣作痛枳實理中湯為宜戴復菴  
 云腹內諸般冷痛一箇枳實理中湯加減作無限用  
 云云腰痛此而論皆此是熱聚泉請梁門熱聚積  
 腰者腎之所附皆屬腎有寒有濕有風有虛皆能作

痛有閃挫勞役而痛者宜生料五積散加炒桃仁五  
 枚本方與吳越縣醫館加大大黃半錢

腰痛如錐刀所刺大便黑小便赤黃或黑由血滯腰  
 間名瀝血腰痛桃仁酒調黑神散與草圓之勝以  
 若寒腰痛見熱則減見寒則增宜五積散每服加吳  
 茱萸半錢此方與血氣凝滯者宜其血氣散

若濕腰痛如坐水中蓋腎屬水久坐水濕處或為雨  
 露所着濕流入腎經以致腰痛宜溼濕湯不効宜腎  
 着湯此方與  
 若風傷而腰疼者或左或右痛無常處牽引兩足宜

五積散每服加防風半錢或加全蝎三箇尤好小續命湯獨活寄生湯皆可選用仍吞三仙丹杜仲姜汁炒研末每一錢温酒調空心服名杜仲酒治腎虛腰疼兼治風冷為患

婦人血過多及素患血虛致腰痛者當益其血見婦人門若腎虛腰痛轉側不能嗜卧疲弱者大建中湯加川椒十粒吞下腰腎圓及生料鹿茸圓之類仍以茴香炒研末破開諸腰子作薄片不令斷層層摻藥末水紙裏煨熟細嚼酒嚥

若因閃肭或擗撲傷損而痛宜黑神散和復元通氣

散酒調下不効則恐有惡血停滯宜先用酒調下蘇合香圓仍以五積散每服加大黃半錢蘇木半錢當歸倍元數若因勞役負重而痛宜用和氣飲或普賢正氣散

腹痛之痛所感不一或因寒熱或因暑濕或因飲食饑飽不問何證皆可用藿香正氣散加水香半錢或正氣散調化蘇合香丸

若腹痛欲得熱手按及喜熱食者此是積冷作痛當用理中湯或治中湯小建中湯等藥若冷痛用温藥

不効痛愈甚大便不甚通常微利之用藿香正氣散  
每服加官桂木香枳殼各半錢吞下來復丹或用蘇  
感丸不利則量虛實用神保丸

有全不喜食其人本體素怯弱而又加以腹冷疼者  
養胃湯以白朮蒼朮仍加桂柴萸各半錢木香三分  
應腹冷痛或心脾疼者生姜均治之

秘傳證治要訣卷五終

秘傳證治要訣卷五終

秘傳證治要訣卷六

諸嗽門

諸嗽門

嗽證

古人云臟腑皆有咳嗽夫嗽屬肺何為臟腑亦皆有

之蓋咳嗽為病有自外而入者有自內而發者風寒

暑濕外也七情饑飽內也風寒暑濕先自皮毛而入

皮毛者肺之合故雖外邪欲傳臟腑亦必先從其合

而為嗽此自外而入者也七情饑飽內有所傷則邪

氣上逆肺為氣出入之道故五臟之邪上蒸於肺而

為嗽此自內而發者也然風寒暑濕有不為嗽者蓋  
 所感者重經傷臟腑不留於皮毛七情亦有不為嗽  
 者蓋病尚淺止在本臟未即上攻所以傷寒以有嗽  
 為經而七情饑飽之嗽久而復見凡諸嗽未審內外  
 所感並宜二陳湯加杏仁五味人參各半錢重飲水  
 一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者冷嗽也  
 治熱嗽以小柴胡湯加五味冷嗽理中湯加五味皆  
 已試之驗此出醫餘

諸嗽皆可佐以應夢觀音散而加喘者以此於食前  
 吞下養正丹每服六

壅嗽聲重痰稠或咳有血以薄荷生胡麻各一撮細

嚼煎蘇子降氣湯送下司前

感風而嗽者惡風有汗或身體發熱或鼻流清涕桂

枝湯加人參杏仁五味各半錢婦人

應嗽多汗體虛而又不勝熱藥者橘蘇散風寒

感寒而嗽者惡風無汗或身體發熱或鼻流清涕宜

杏子湯冒雨

若風寒俱感而嗽者或惡風無汗或惡風有汗頭痛

身疼寒鼻薰眼涕疾稠粘者小青龍湯以二三藥傷

寒太陽經有嗽者皆可用

感暑而嗽者自汗煩渴或帶寒面垢六和湯加五味子一錢

感濕而嗽者身體痛重或汗或小便不利此多乘熱入水或冒雨露或浴後不解濕衣致此宜白木湯熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且濃或帶血縷或帶血腥臭或堅如蠟肉不若風寒之嗽痰清而白宜金沸草散仍以辰砂化痰圓或薄荷煎八風丹含化熱嗽於金沸草散中加五味杏仁茯苓足成十品入棗子一箇同煎功效尤勝名旋覆湯有熱嗽諸藥不效竹葉石膏湯去竹葉入粳米少加

知母多加五味杏仁此必審是伏熱在上焦心肺間可用桑葉杏仁煎如營者因麻者又煎者其類有熱嗽失聲咽痛多進冷劑而聲愈不出者宜以生薑汁調消風散少少進之或只一味姜汁亦得冷熱嗽後失聲者尤宜嗽而失聲者非獨熱嗽有之宜審其證用藥佐以橄欖圓含化仍濃煎獨味枇杷葉散熱服

冷熱嗽因增減衣裳寒熱俱感遇乍寒亦嗽乍熱亦嗽飲熱亦嗽飲冷亦嗽宜金沸草散消風散各一貼和煎或應夢人參散或欵冬花散二母散仍以辰砂

化痰圓八風丹或四和圓含化七情饑飽嗽無非傷  
動臟腑正氣致邪上逆結成痰涎肺道不理宜順為  
先四七湯半貼加桑白皮杏仁五味子人參阿膠各  
半錢

有嗽血痰與食俱出者此蓋飲食失節致肝氣不利  
而肺又有客邪肝濁道肺清道清濁相干宜二陳湯  
加木香杏仁細辛枳殼各半錢一和雙花散合  
有飲冷熱酒或飲冷水傷肺致嗽俗謂之湊肺宜紫  
苑飲勞嗽有久嗽成勞者有因病勞久嗽者其證寒  
熱往來或濁熱無寒咽乾噎痛精神疲極所嗽之痰

或濃或時有血腥臭異常語聲不出者補肺湯半貼  
加杏仁貝母款冬花阿膠百合各半錢煎去渣調鍾  
乳粉咽痛者更加桔梗半錢熱甚者更加秦艽半錢  
嘔者去地黃加半夏如其數氣急者加靈砂丹或三  
炒丹

經年累月久嗽不已服藥不瘥餘無他証却與勞嗽  
不同宜三拗湯仍佐以青金丹  
脾胃如常飲食不妨者加味人參清肺湯參粟湯有  
暴嗽服藥不効者或教之進生料鹿茸丸大兔絲子  
丸方愈此乃腎虛所致有本有標却不可以暴嗽為

治嗽與喘用五味為多但五味有南有北生津止渴潤肺益腎治勞嗽者宜用北五味若風邪在肺宜用南五味不若二者兼用

嘔吐附惡心

嘔與吐之辨已於傷寒論之然証亦不一有寒嘔有熱嘔氣嘔痰嘔吐食嘔吐血吐蚘惡心乾嘔除熱嘔吐血外近世嘔吐二字皆通用然却無甚利害理亦自不妨並小半夏茯苓湯或二陳湯或理中湯多加生姜煎生姜嘔中之聖藥大痛色如青菜葉者死寒嘔中脘停寒飲食喜辛熱物入口即吐出宜二陳

湯加丁香十粒或理中湯加枳實半錢不效則溫中湯甚則附子理中湯或丁附湯並須冷服蓋冷遇冷則相入庶不吐出有痰飲粥藥到口即吐人皆謂其番胃非也此乃痰氣結在咽膈之間宜先以姜蘇湯下靈砂丹俟藥可進則以順氣之藥繼之不論而外有吐瀉及痢疾或腹冷痛進熱劑太驟以致嘔逆宜二陳湯加砂仁白豆寇各半錢甚則入沉香少許寒熱氣食痰血六嘔外有漏氣走哺漏氣者上焦熱食必先吐而後下汗出身胃熱走哺者下焦熱氣逆不續大小便不通嘔吐不禁

熱嘔見諸傷門傷寒嘔吐證凡進熱藥愈增者當於寒嘔中求熱嘔宜二陳湯加黃連一錢氣嘔胸滿膈脹關格不通不食常飽食則常氣逆而吐此因盛怒中飲食而然宜二陳湯加枳實木香各半錢或吳茱萸黃湯不効則下沉透膈湯及五膈寬中湯以理之食嘔多因七情而得有外感邪氣并飲食不節而生大槩治以理中爲先二陳湯加枳實一錢或加南星七分沉香木香各四分亦好或只服枳南湯或導痰湯其原州中縣延平州縣並取今則蓋合此又有中脘伏痰遇冷卽發俗謂之冷癩或服新法半

夏湯或瓜脾湯外有熱痰而嘔者宜小半夏茯苓湯加竹茹如錢大若嘔痰而或致厥者乃寒痰逆悶謂之痰厥宜姜附湯以生附代熟附或以木香代吐蚘乃胃寒所生經云蚘者長蟲也胃中冷則吐蚘成蚘厥宜理中湯加炒川椒五粒檳榔半錢吞烏梅丸惡心乾嘔欲吐不吐心下映漾人如畏舡宜大半夏湯或小半夏茯苓湯或理中湯治中湯皆可用嘔吐諸藥不効當借鎮重之藥以墜其逆氣宜姜蘇湯下靈砂卅須百粒作一服俟藥得効却以養正卅半硫圓導之嘔吐津液既去其口必渴不可因渴而



遽以為熱

又有嘔吐諸藥不効又別無前項痰氣等証乃蛇在胸膈作嘔見藥則動動則不納藥出而蛇不出雖非吐蛇之比亦宜用吐蛇藥或於治嘔藥中入炒川椒十粒蛇見椒則頭伏故也

曾有患人用附子理中湯四逆湯加丁香到口即吐後去乾姜只參附加丁木二香煎熟更磨入沉香藥立吐定蓋虛痰氣凝結丁附既溫佐以沉香則通乾姜白朮則泥耳

吐血見血門

停飲伏痰

飲凡有六懸溢交痰留伏痰飲特六飲之一耳人病此而止曰痰飲者蓋停既久未有不為痰多因氣道閉塞津液不通譬如溝渠壅遏積淹停滯則倒流逆上痰濁臭穢無所不有若不疎決溝渠而欲澄治已壅之水而使之清無是理也

凡為喘為咳為嘔為泄為眩為暈心嘈怔忡驚悸為寒熱痛腫為痞膈為壅閉或胸脇間輓輓有聲或背心一片常如冰冷皆飲食所致此即如水之壅有痰濁臭穢故善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之

津液亦隨氣而順矣並宜蘇子降氣湯導痰湯各半  
貼和煎或小半夏茯苓湯加枳實木香各半錢吞五  
套圓或以五套圓料依分兩作飲子煎服尤好平居  
皆無他事只有痰數口或清或堅宜二陳湯小半夏  
茯苓湯痰多間進青州白圓子和來復丹服來白圓  
如和以八神來復丹即名青神圓此非特治痰飲尤  
甚療喘嗽嘔吐逆番胃若服藥未効者二生湯加水  
香半錢若頑涎隨氣逆上不爲藥解當自下部利之  
宜五膈寬中散加半夏半錢吞破飲圓仍佐以半硫  
圓恐大便復秘飲利不盡半硫圓當常服若大便先

不因藥自利及老人虛人當利其小便宜小半夏  
苓湯改用赤苓而倍之或導痰湯加猪苓半錢  
痰飲暈眩及成飲厥者宜別加木香二生湯吞青州  
白圓子和靈砂丹名青令丹或吞養正丹半硫圓  
痰飲流入四肢令人肩背痠疼兩手軟痺醫誤以爲  
風則非其治宜導痰湯加木香姜黃各半錢  
病痰飲而變生諸証不當爲諸証牽掣妄言作名且  
以治飲爲先飲消則諸証自愈有卒然昏悶口眼喎  
斜似中而實非中四肢戰曳身如浮雲似虛而實非  
虛皆痰飲所爲也又有腎虛寒不能攝水致邪水溢

土故作痰飲宜八味圓

翻胃

翻胃之病所以重於嘔吐者嘔吐食入即吐翻胃則或一日半日食復翻上不化如故腹中非不欲食不肯留胃氣不溫不能消食食既不消不為糟粕而入大腸必隨氣逆上從口而出故番胃人胸膈多為冷氣所痞二陳湯加丁香十粒枳殼半錢或治中湯加枳殼砂仁各半錢半夏一錢入米與生姜同煎若胃寒甚服藥而翻者宜附子粳米湯加丁香十粒砂仁半錢大便秘者更加枳殼半錢

若胸膈痞甚而翻宜谷神嘉禾散生附一錢或丁沉透膈湯五膈寬中散加生附一錢仍以來復丹升降其陰陽通其隧道半硫圓亦可通之隧道久不通名結腸翻胃半硫圓尤宜百藥無効勢危篤者宜桂香青金散以墜之一法用胡椒一味醋浸之晒乾醋浸不計徧數愈多愈好碾末醋糊為圓淡醋湯下十圓加至三四十丸

不喜食

脾運食而傳於肺脾氣不足故不喜食宜故脾丸煮朴丸若脾虛而不進食者當實脾宜鹿茸橘皮煎丸

若脾冷甚而不進食者理中湯未効附子理中湯加砂仁半錢或丁香煮散心腎虛致脾氣不足以運者鹿茸橘皮煎丸脾上交於心下交於腎者也

### 噫氣吞酸

吞酸者宿食所爲故曰中脘有飲嘈有宿食則酸噫氣吞酸噯宿腐氣逆噯酸水亦有每晨吐清酸水數口日間無事者亦有膈間常如酸折皆飲食傷兼中脘所致生料平胃散加神麩麥蘗各半錢或八味平胃散

### 咳逆

其而隨宜谷麻喜木醋主州一錢

胃實卽噫胃虛卽噦逆者胃中虛膈上熱也咳逆爲病古爲之噦近爲之呃乃胃寒所生寒氣自逆而呃上此証最危間有熱呃已見傷寒証其有他病發呃者皆屬寒宜用半夏一兩生姜兩半水一碗煎半碗熱服或用丁香十粒柿蒂十箇切碎白水盞半煎或理中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不効更加丁香十粒

亦有無病偶然致呃此緣氣逆而生重者或經一二日宜小半夏茯苓湯加枳實半夏湯或用煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散乘熱服逆氣用之最佳

若胃中寒甚呃逆不已或復加以嘔吐輕劑不能取  
効宜丁香煮散及以附子粳米湯增炒川椒丁香每  
服各二十粒

中寒吐酸水各半錢半夏一錢不效更吐下  
瀉用丁香十粒研末明國新安吳勉學校梓

寒宜用半夏一兩主美兩半水一搗煎半錢  
上此症最宜聞者然與中寒者殊其有吐酸者  
宜用之

秘傳證治要訣卷六終首胃中虛弱吐酸也

秘傳證治要訣卷七

寒熱門原到昏榮林寒熱具苦香當即宜吐

瘡證不一其名亦殊初得之病勢正熾一二發間未  
宜遽截不問寒熱多少且用清脾飲草果飲或二陳

湯加草果半錢或生料平胃散加草果半錢前胡半  
錢亦有非瘡非勞等疾而自成寒熱乃是痰飲為之

不可不審去痰行飲則愈音宜對照

初發之際風寒在表雖寒熱過後而身體常自疼常

自畏風宜草果飲或養胃湯每服加川芎草果各半錢熱少者進取微汗寒多者宜快脾湯或養胃湯每服加草果半錢服藥後寒仍多者養胃湯每服加熟附官桂各半錢獨寒者尤宜不効則七棗湯熱多者宜驅瘧飲或參蘇飲每服加草果半錢大熱不除宜小柴胡湯渴甚則佐以五苓散入辰砂少許獨熱無寒宜小柴胡湯熱雖劇不甚渴者於本方加桂四分熱多而脾氣怯者柴朴湯寒熱俱等者常服宜如上項二陳湯平胃散加料之法發日進柴胡桂姜湯候可截則截之有獨熱用清脾飲効者內煩增參作一

錢重然恐非特可治獨熱也

食瘧乃是飲食傷脾得之

或瘧已成而猶不忌口或寒熱正作時吃食其人噫

氣吞酸胸膈不利宜生料平胃散每服加草果半錢

砂仁半錢仍佐以紅丸子七香散

暑瘧其人面垢口渴雖熱已退後無事之時亦常有

汗宜養胃湯一貼香薷飲一貼和勻作二服湯甚汗

出多者加味香薷飲間進辰砂五苓散不問未發其

人嘔吐痰食俱出宜多進二陳湯每服草果加之半

錢又恐伏暑纏結為痰宜消暑丸更於暑瘧中求之

有四五發已後應諸證並可截瘧丹未愈再進  
久瘧經年累月名曰瘧母又名勞瘧不宜十分攻之  
所謂久瘧不治者是也進四獸飲間山甲圓瘧愈後  
調理宜生料平胃散每服加人參茯苓各半錢或用  
四君子湯加陳皮一錢半卽異攻散  
外有傷寒往來寒熱如瘧勞病往來寒熱亦如瘧謂  
之如瘧非真瘧也然傷寒寒熱如瘧初必惡風寒發  
熱頭痛體疼自太陽經而來勞病寒熱如瘧初必五  
心發煩熱勞倦咳嗽久乃成寒熱與正瘧自不同諸  
病皆有寒熱如失血痰飲癥瘕積聚小腸癰氣風寒

暑濕食傷發勞瘵瘡毒脚氣已各見本門其餘不  
能盡舉應有不如發瘧之傳爲寒熱者須問其元有  
何病而生寒熱則隨病施治寒熱發作有期者瘧也  
無期者諸病也

近世因寒熱發作見其指甲青黑遂名曰沙或戛或  
挑或灌以油茶且禁其服藥此病卽是南方瘴氣生  
料平胃散加草果檳榔正宜所治豈有病而無藥哉

### 獨寒

有寒而未卽爲熱者或寒一二日後方熱有寒而終  
於無熱者惟傷寒有此爲多他證亦或有之當隨証

施治  
有虛常自畏寒或覺冷在骨肉間或冷從下起經句  
積月宜以果附爲君治之

獨熱

三消諸失血後蓐勞久痢諸虛後發熱者皆非美證  
有當直攻其發者有不當專治其熱者因他病而發  
爲熱者也當隨証用藥中加入退熱藥

外有每遇夜身發微熱病人不覺早起動作無事飲  
食如常既無別証可疑只是血虛陰不濟陽宜潤補  
之參蘇飲二分四物湯一分和勻名茯苓補心湯候

熱稍減繼以養榮湯十全大補湯  
又有服金石辛熱者甘草烏豆湯下火邪者艾湯下  
飲食者乾姜湯下炙燂者枳殼甘草湯下

潮熱

附虛煩

潮熱有二有實而潮熱者有虛而潮熱者惟傷寒日  
晡發熱乃胃實別無虛証

其餘有潮熱者當審其虛實若潮熱大便堅澀喜冷  
畏熱心下愀然睡卧不着此皆氣盛所謂實而潮熱  
者也輕宜參蘇飲重則小柴胡湯  
若潮熱而氣消乏精神憔悴飲食減少日漸危羸雖



病斃去而五心常有餘熱此屬虛證宜茯苓補心湯  
十全大補湯養榮湯之類病後欠調理者八珍散主  
之心下澀然腹中不食此皆深溫而陷實而虛  
有潮熱似虛胸膈痞塞背心疼痛服補藥不効者此  
乃飲証隨氣而潮故熱隨飲而亦潮宜於傷飲中尋  
藥禁食二旬實而飲禁食五日而漸減  
諸汗併霍亂吐瀉後應有滲泄而津液去多五內枯  
燥者皆能虛煩以陰血不足以濟陽陽氣偏勝故虛  
熱而煩宜參蘇飲去蘓倍參加麥門冬半錢煩而渴  
者獨味人參湯加以小便不利者春澤湯加以心經

熱而躁者辰砂五苓散煩而嘔不喜食者橘皮湯煩  
而睡不寧者溫膽湯大煩身熱甚者竹葉石膏湯血  
虛生煩見前諸證者茯苓補心湯外有一得病時節  
即惡寒身不疼頭不痛但煩熱者亦名虛煩內外俱  
不可攻之必遂損竭宜參蘇飲去蘇倍參或更加石  
膏半錢不愈者竹葉石膏湯兼有上項證候者於前  
藥選用其人虛甚不宜專用涼劑者茯苓補心湯

其用其人宜甚不宜專用京師音為各師以  
 骨半粒不愈者以藥可膏滋燕林上即強效首條  
 不可文之必效跡宜參藉炮去積旬卷短夏味可  
 而弱其長不來更不試則取積音亦谷宜臥內竹  
 而甜不聲音則甜春外各師以藥代庫一特取甜  
 而甜不聲音則甜春外各師以藥代庫一特取甜  
 而甜不聲音則甜春外各師以藥代庫一特取甜

秘傳證治要訣卷八

太醫院使戴元禮述

大小腑門

大小便多

小便多者乃下元虛冷腎不攝水以致滲泄宜免絲  
 子丸八味丸玄兔丹生料鹿茸丸

有人每日從早至午前定尿四次一日之間又自無  
 事此腎虛所致亦由脾胃泄早泄而晚愈次日又復

然者也

若小便常急徧數雖多而所出常少放了復急不泄

痛却非淋証亦有小便畢少頃忽再出些小者多因  
自忍尿或忍尿行房事而然宜生料五苓散減澤瀉  
之半加阿膠一錢吞八味丸此丸須用五味子者  
腫着遺尿者此亦下元冷小便無禁而然宜大免絲  
子丸猪胞炙碎煎湯下此遺尿皆屬虛古書云  
實則失氣虛則遺尿  
有咸喜致小便多日夜無度乃喜極傷心心與小腸  
爲表裏宜分清飲四七湯各半貼和煎仍以辰砂妙  
香散吞小免絲子丸或玄免丹

淋閉

古名曰癃者罷也不通爲癃不約爲遺小便滴瀝泄

痛者謂之淋小便急滿不通者謂之閉宜五苓散燉  
心湯調服暑月多有此患止宜本藥閉而不通臍下  
脹爲癃起以燈心湯五苓散或洗慈湯調獨味琥珀  
末仍令其以鹽填臍下更滴之以水

若服涼藥不效審是冷祕宜炒鹽熨其小腹或洗葱  
湯薰洗有腹急而小便若不通用劑愈甚宜以鹽實  
臍中就鹽上灼艾十來壯  
有淋病下諸通便劑愈不通用木香流氣飲或別用  
通氣香劑纔愈者此乃氣淋出於冷熱淋之外  
有似淋非淋小便色如米泔或便中有如鼻涕之狀

此乃精尿俱出精塞竅道故便欲出不能而痛宜大  
絲子圓鹿茸圓之類然此卽膏淋謂其非淋亦不可  
血淋一証須看血色分冷熱色鮮者心小腸實熱色  
瘀者腎膀胱虛冷若的是冷淋及下元虛冷血色瘀  
者並宜漢椒根剉碎不拘多少白水煎候冷進服宜  
小便澁痛常急欲溺及去點滴莖中痛不可忍者此  
五淋病生料五苓散加阿膠七分或五苓散加車前  
子末少許或五苓散和益元散等分或五苓散並可  
吞火府丹佐以導赤散服之宜本藥開而不煎煎可  
若熱極成淋服藥不効者宜減桂五苓散加木通滑

石燈心瞿麥各少許仍令其研麥門冬草連根車前  
草白龍草蜜水調下血淋心腎兩熱下五淋坐不熱  
若淋瀝有血者宜加五苓散或生料五苓飲和五淋  
飲或導赤散仍研地錦草水解服進冷劑愈甚者此  
是冷淋宜地髓湯下附子入味圓有因服五苓散等  
藥不効者用生料鹿茸圓却愈此証病於下元虛冷  
之故  
有小便艱澁如淋不痛而痒者此亦屬虛宜入味圓  
生料鹿茸圓之類若因思慮用心過度致淋辰砂妙  
香散吞威喜圓或妙香散和五苓散

汗多而小便赤澁暑月多有此證盛暑所飲既多小便反澁少而赤緣上停爲飲外發於汗津道不通小腸澁閉則水不運下五苓散一名導逆內有木桂散汗猪苓澤瀉茯苓分水道散在其外者使之內又從而利導焉發者飲之壅者通之義取於此然有虛勞汗多而小便赤澁者却是五內枯燥滋腴既去不能生津故稠澁而赤不宜過用通小便之劑竭其腎水惟當溫養潤肺十全大補湯養榮湯之類自足運用汗者心液心主血養血則心得所養汗止津生不待通溺而自清矣諸失精血及患癰毒人忽有小便便

赤澁之證此亦是枯竭不潤之故

尿血

見諸血門本證

熱者清之寒者溫之香薷香薷

或有氣閉而小便不通至臍下氣癢結痛以五香散間服獨味琥珀末以燈心湯下甚効女人多有此證

白濁

見諸血門本證

有白濁人服玄兔丹不愈服附子八味圓即愈者不可不知  
有小便如常停久纔方淀濁有小便出即如泔若小兒泔病者並宜分清飲加白茯苓半錢  
如服藥未効宜四七湯吞青州白圓子及辰砂妙香

散吞玄兔丹及小免絲子圓山藥圓如白濁甚下流如泥或稠粘如膠頰逆而澁痛異常此非是熱淋此是精濁室塞竅道而結宜五苓妙香散吞八味圓小免絲子圓精者血之所化有濁去太多精化不及赤未變白故成赤濁此虛之甚也何以知之有人天癸未至強力好色所泄半精半血

若溺不赤無他熱證縱雖赤濁不可以赤爲熱只宜以治白濁施之其法若溺赤下濁亦赤口渴時發熱者辰砂妙香散吞靈砂丹或清心蓮子飲發熱不退口渴燥舌乾之甚者此

乃精虧內燥腎枯不潤四物湯吞玄兔丹和八味圓久服乃効

遺精 附遺瀝夢遺

遺精得之有四有用心過度心不攝腎以致失精者有因思色欲不遂精色失位輸瀉而出者有欲太過滑泄不禁者有年壯氣盛久無色欲精氣滿泄者然其狀不一或小便後去多不可禁者或不小便而自出或莖中出而痒痛常如欲小便者並宜先用辰砂妙香散吞玉華白丹佐以威喜圓或分清飲別以綿裹龍骨同煎或分清飲半貼加五倍牡蠣粉白茯苓

五味子各半錢

失精夢泄亦有經絡熱而得者若以虛冷用熱劑則精愈失本事方清心圓用黃皮腦子者最良然亦必恍惚膈熱乃驗其熱証也以此見赤濁亦有自熱而得亦可用此  
若是用心過度得之宜遠志圓用交感湯加蓮子肉五味子吞下仍佐以靈砂丹  
若審是思色欲不遂得之且以四七湯吞白圓子甚者耳聞目見其精即出名曰白淫妙香散吞玉華白丹

若審是色欲過度下元虛憊泄滑無禁宜正元飲如牡蠣粉肉蓯蓉各半錢吞養氣丹或靈砂丹仍佐以鹿茸圓山藥圓大鬼祿子圓固陽圓之類

審是壯盛滿溢者本中法清心圓仍服黃耆六一湯便雖非對緣精髓滿溢姑以白燥之遺瀝比之遺精稍少小便有數點稠粘莖頭微痛或小便已停原時方有二滴沾棍其病不出前所因宜審用前藥

夢遺俗謂之夜夢鬼交宜溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗仁炒茯神各半錢吞玉華白丹固陽圓

夢遺亦傳前肆証宜審其所惑用前藥曰世因  
治小便注裨甘瘡用腦子二錢半鴈瓜黃蓮一錢半  
盧甘石一錢葱頭七箇陳荷葉一片花椒一撮先以  
葱頭荷葉花椒煎湯二碗待溫時留瓶內浸洗小便  
乾淨將前盧甘石用火煨紅於煎至黃蓮水內浸濕  
又燒又浸燒洋爲度安於冷地上以椀壓之候冷研  
末入腦子和勻將前湯洗淨用藥末之妙不過二三  
度卽愈

三消

三消得之氣之實血之虛也久久不治氣儘虛則無

能爲方矣有一僧專用黃耆飲加減其論蓋詳之益  
血爲主三消小便去多上消消心心火炎上大渴而  
小便多中消消脾脾氣熱燥飲食倍常皆消爲小便  
下消消腎腎衰不能攝水故小便雖多而渴然小便  
既多津液必竭久而未有不渴者謂之全不渴未有  
的論諸消不宜用燥烈峻補之劑惟當滋養除消脾  
外心腎二消宜用黃耆飲吞八味圓或玄兔丹或小  
鬼絲子圓又竹龍散皆可又用六神飲亦治腎消惟  
脾消則加當歸去黃耆三消小便既多大便必祕宜  
常服四物湯潤其大腸如加人參木瓜花粉在人仍



煮四倍粥食之糯米泔折二亦可冷進  
三消久而小便不臭反作甜氣在溺桶中滾湧其病  
爲重更有浮在溺面如猪脂濺在桶邊如檣燭淚此  
精不禁真元竭矣  
上消中消心脾既如此熱小便澀少而反無禁蓋燥  
熱在上虛冷在下陰陽不交所以成消渴  
三消久之精血既虧或目無見或手足偏癱如風疾  
非風然此証消腎得之爲多消心之病往往因飲欲  
食過多及食啖辛熱飲引既多小便亦多當抑心火  
使之下降自然不渴宜半夏瀉心湯去乾姜加栝藹

乾葛如其數吞猪肚同或酒連圓仍佐獨味黃連湯  
多煎候冷遇渴恣飲久而自愈或自糯米煮稀粥然  
同穎湯梅花湯二藥於三消有渴者皆可用若因用  
心過度致心火炎上渴而消者宜黃耆飲加蓮肉遠  
志各半錢吞玄克丹仍以大麥煎湯間下靈砂丹  
消脾緣脾經燥熱食物易化皆爲小便轉食轉饑然  
脾消又自有三曰消中曰寒中曰熱中宜用蓮茗飲  
加生地黃乾葛各半錢或烏金散或止用蓮茗飲  
若因色欲過度水火不受腎水下泄心火自炎以致  
渴渴不宜備用涼心冷劑宜堅腎水以濟心火當用

黃耆飲加從蓉五味各半錢吞八味圓及小兒絳子  
圓玄兔丹鹿茸圓加減安腎圓皆可選用或靈砂丹  
消腎爲病比諸爲重古方謂之強中又謂之內消多  
因恣意色欲或餌金石腎氣既衰石氣獨在精水無  
取養故常發虛陽不交精出小便無度唇口乾焦黃  
者飲吞玄兔丹八味圓鹿茸圓加減腎氣圓小兒絳  
子圓靈砂丹皆可選用或未效黃耆飲加從蓉北五  
味山茱萸各四分養籠圓菴蓉圓黃耆丹因用  
又有果木湯因多食果子所致宜麝香之藥神效  
大便祕秘

有風祕冷祕氣祕熱祕又有七人津液乾燥是名虛  
證婦人分產亡血及發汗利小便病後血氣未復皆  
能作祕俱宜麻仁圓風祕之病由風搏肺臟傳於大  
腸故傳化難或其人素有風病者亦多有祕宜小續  
命湯去附子倍芍藥入竹瀝兩蜆殼許實者吞脾約  
麻仁圓虛者吞養正丹冷祕由冷氣橫於腸胃凝陰  
固結津液不通胃道祕塞其人腸內氣攻喜熱惡寒  
宜藿香正氣散加官桂枳殼各半錢吞半硫圓熱藥  
多祕惟硫黃煖而通冷藥多泄惟黃連肥腸而止泄  
氣祕剝氣不升降穀氣不行其人多噫宜蘇子降氣

湯加枳殼吞養正丹或于硫圓來復丹未效佐以木香檳榔圓欲其速通則枳殼生用

熱祕而赤身熱腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡此由大腸熱矣宜四順清涼飲吞順腸圓或木香檳榔圓有氣作疼大便祕結用通劑而便愈不通便有祕氣強飲通之雖通復閉或迫之使通因時下血者此惟當順氣氣順便自通順氣之法又當求溫煖之劑曾有下巴豆等藥不通進丹附却通不可不知老人虛祕反出汗利小便過多一切病後血氣未復而祕者宜蘇子降氣湯倍加歸吞威靈仙圓或肉黃

飲菘蓉順腸圓尤宜

如婦人下血而祕者見婦人門

傷寒陽明經熱實而閉見諸傷門傷寒證

宿食留滯結而不通腹脹氣急胸中痞滿宜感應圓

加巴豆

凡諸祕服藥不通或兼他證不受藥者用蜜皂角兌冷祕生姜兌亦佳

溇泄

冷泄不言而喻熱亦能瀉者蓋冷瀉譬之鹽見火熱則凝冷則復消熱瀉譬之水寒則結凝熱則復化爲

水此外證狀不一疑似之間並用先見分水圓一二服性傷食瀉不可用

寒瀉寒氣在腹攻刺作痛洞下清水腹內雷鳴米飲不化者理中湯或附子補中湯吞大已寒圓宜附子桂香丸畏食者八味湯

五虛者死脉細脾寒少氣前後泄痢飲食不入元是冷瀉因瀉而煩躁飲水轉飲轉瀉者參附湯理中湯加茯苓黃連名連理湯用之多有奇功且如今當暑月若的知暑瀉自合用暑藥的知冷瀉自合熱藥中間有一等盛暑又復內傷生冷非連理湯不可下泄

無度泄後却彈過響肛門熱小便赤澁心下煩渴且又喜冷此藥爲宜若元是暑瀉經文下元虛甚日夜頻併暑毒之勢已然而瀉不已後用暑藥則決不能取効便用姜附輩又以難施疑似之間尤宜用此余生治傷寒協然自利有用白姜黃連對半名金銀湯卽此意也然不若連理湯爲穩如寒瀉服上藥未効宜木香湯或姜附湯六柱湯吞震靈丹養氣丹手足厥逆者兼進礞砂丹藥食方入口而卽下者名曰直腸難治如瀉已愈而精神未復舊者宜十補湯寒瀉腹中大疼於服前藥外間進乳豆圓服諸熱藥以溫

中並不見効登圓不送穢物而出此屬下焦宜桃花  
圓二五粒訶梨勒圓以溢之

熱瀉糞色赤黃彈響作痛壅門焦痛糞出穀道猶如  
湯熱煩渴小便不利宜五苓飲吞香連圓

暑瀉由胃感暑氣或飲啖日中之所晒物坐日中熱  
處証狀與熱瀉畧同宜胃苓飲或五苓散加車前子  
少許兼進來復丹凡瀉津液既去口必渴小便多是  
赤澁未可便作熱論的知熱瀉方用冷劑不然勿妄  
投以致增劇瀉止渴自止小便赤能如常  
氣瀉腸鳴氣走胸膈痞悶腹急而痛瀉則腹下須臾

又急亦有腹急氣塞而不通者此由中脘停滯氣不  
流轉水穀不分所致宜大七香圓入米煎服久而不  
愈者寬中散吞震靈丹仍佐以米飲調香附末  
濕瀉由坐卧濕處以致濕氣傷脾土不克水梅雨陰  
久多有此病宜除濕湯吞戊己圓佐以胃苓湯重者  
宜朮附湯如其人本不甚瀉每日兩三次鴨澹此脾  
家不燥常服平胃散自愈緣內有蒼朮可以燥脾  
傷食瀉因飲食過多有傷脾氣遂成瀉泄俗呼爲傷  
敗腹其人必噫氣如敗卵臭宜治中湯加砂仁半錢  
或七香圓紅圓子雜服

食積腹痛而瀉不可遽用治中兜住先用調脾飲吞  
感應圓或因食一物過傷而瀉後復食之即瀉者以  
脾爲其所傷未復而然宜健脾湯因食冷物停滯傷  
脾脾氣不煖所食之物不能消化瀉出而食物如故  
宜治中湯加乾葛吞酒煮黃連圓於瀉中求之  
有脾氣久虛不受飲食者食畢即腸鳴腹急盡下所  
食物纔方寬快不食則無事俗名錄食瀉經年累月  
宜快脾圓下二五粒因傷於酒每晨起必瀉宜理中  
湯加乾葛吞酒者黃連圓子香圓人米煎粥又而不  
或重而瀉泄頻數者宜沖和湯由中氣散

因傷麵而瀉者養胃湯加蘿蔔子炒研破一錢痛者  
更加木香半錢瀉甚者去藿香加炮姜如其數  
瀉已愈隔年及後期復瀉古論云病有期年而發者  
有積故也宜感應丸

有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無効米飲下五味  
圓或專以杜五味煎飲宜治脾腎泄雖省節飲食大  
段忌口但得日間上半夜無事近五更其瀉復作此  
病在腎俗呼脾腎泄分水飲下二神圓及椒朴圓或  
平胃散下小茴香圓病久而重其人虛甚椒附湯

交腸

交腸之病大小便易位而出蓋因氣不循故道清濁  
混淆宜五苓散調氣散各一錢加阿膠末半錢湯調  
服或研黃連阿膠丸爲末加木香末少許再以煎湯  
送下  
凡瀉血其五色黑冷宜飲熱酒此類皆瀉血大  
瀉血當辨其色色鮮爲熱色瘀爲寒熱血連蒲飲寒  
血理物湯血色鮮紅者多因內蘊熱毒毒氣入腸胃  
或因飲酒過多及啖糟藏炙煇引血入大腸故瀉鮮  
血宜連蒲散吞黃連阿膠丸及香連丸或去味黃連  
煎飲大瀉不止者四物湯加黃連槐花仍取血見愁

草少許生姜搗取汁和米飲服於血見愁草中加入  
側柏葉與生姜同搗汁尤好有毒暑入腸胃下血者  
一味黃連煎湯飲

有腸風下血以香附末加百草霜米飲調服加入麝  
香少許其應尤捷

瀉血色瘀者爲寒血逐氣走冷氣入客腸胃故下瘀  
血理中湯不効宜黑神散米飲調下中用附子者佳  
或用膠艾湯加米煎吞震靈丹

癩撲內損惡血入腸胃下出濁如瘀血者宜黑神散  
加老黃芩爲末酒調下

有風入腸胃純下清血或風濕入腸胃下如豆汁或下瘀血並宜胃風湯膠艾湯

瀉血或淡或濁或鮮或瘀亦宜胃風湯吞駐車丸或獨瀉血或與養俱出當辨其色與所感施治  
有腹痛者乃是血不循理故爾作痛却無裏急後重及纏墜等患不可因痛認爲血痢

婦人因月事不通血不循故道從後分出者當調其經見婦人門

瀉血過多手足厥冷而眩暈者當審其寒熱施治不可因眩暈而使用附子熱藥寒血猶可熱血爲害不

少四

腸風臟毒

附痔漏腸癰

血清而色鮮者爲腸風濁而黯者爲臟毒或在糞前或在糞後並宜米飲湯調枳殼散下酒者黃連圓或枳殼散或烏梅圓此乃因登圓糞中有血却與瀉血不同或用小烏沉湯和黑神散米飲調下糞前後有血皆可用色瘀尤甚捷

臟毒者蘊積毒氣久而始見腸風者邪氣外入隨感隨見此三因方五痔臟毒腸風辨之甚詳臟毒腸風之血出於腸臟間五痔之血出於糞門罅孔處治各



不同無擇翁烏連湯治脉痔外無形而所下血一線如箭或點滴下不能已此由脉竅中來也其方已錄千里鏡以試毒藥之而故良惡風散俱屎後入調風血色清鮮者以瓦松燒灰研細米飲調服宜減桂五苓飲加茅花半錢吞荆梅花圓仍以側柏葉同姜爛搗冷水解下侵世米飲佳登園藥中百血吐與煎血如血色淡濁者胃風湯吞蒜連圓或烏荆圓或棕灰散仍以米飲調香附末或三灰散調毒丸五黃或久而不已面色痿黃漸成虛憊下元衰弱者宜黃耆四君子湯下斷紅圓或十全大補湯或黃耆飲諸

般腸風臟毒並宜生銀杏四十九箇去殼膜爛研入百藥煎末圓如彈子大每兩三圓空心細嚼米飲下痔漏証狀頗多自屬外科不復錄引既血自內出不可全仗外傳宜只落散吞鈞腸圓痔正發而血多者亦宜自裏托之宜千金內補散減桂之半加驚頭血尤妙

腸瘕卽腸中生瘕也腹中疝痛其始發熱惡寒証狀難辨因下膿血乃覺或小腹痛滿或小便澁滯或膿從臍出宜千金內補散太乙膏

痢 附痢後風脫肛

痢疾古名滯下以氣滯成積積成痢治法當以順氣  
爲先須當開胃故謂無飽死痢病也

痢疾不問赤白而知爲冷熱之証若手足和暖則爲  
陽先用粟殼飲調五苓散進感應圓若覺手足厥冷  
則爲陰當用煖劑須常識此

凡痢初發不問赤白裏急後重頻欲登聞及去而所  
下無多旣起而腹內復急宜用藿香正氣散加木香  
半錢吞感應圓或蘇合香圓吞感應圓血自內出不  
赤痢血色鮮紅或如蛇蟲形而間有血鮮者此屬熱  
痢宜藿香正氣散加黑豆三十粒五苓散加木香半

錢粟米少許下黃連圓或黃連阿膠圓茶梅圓熱甚  
服上項藥未効宜白頭翁湯吞入散去積少一錢  
若赤痢發熱者敗毒散加陳倉米一撮煎麻木百散  
若血色黯如瘀服冷藥所下愈多去愈頻者當作冷  
痢宜理中湯或四君子湯加肉豆寇木香各半錢  
若感暑氣而成痢疾者其人自汗發熱面垢嘔逆渴  
欲引飲腹內攻刺小便不通瘀血頻併宜香薷飲加  
黃連一錢佐以五苓散白湯調服不愈則用蜜水調  
感暑成痢疼甚而食不進者六和湯藿香正氣散各  
半貼名木香交加散

白痢下如凍膠或如鼻涕此屬冷痢先宜多飲除濕湯加木香一錢吞感應圓繼進理中湯亦有下如魷色或如腐茶色者亦宜用前白痢藥黃連用蜜水煎赤白雜者宜胃苓飲加倉米一撮煎吞駐車圓凡治痢須先逐去積滯去已多三五日後自可兜澁不問亦白俱宜水煮木香圓或水煮木香飲真人養臟湯或斷下圓如白痢久而虛甚者養臟湯加熟附赤痢加黑豆一小撮白痢加乾姜一錢赤痢亦可加黃連一錢新下者不必加此在人活法禁口痢者有得病即不能進食者或因冷藥并藥過

多不食者却不可拘於赤痢難用熱藥之說當以溫中進食爲先宜治中湯加水香半錢或縮砂一錢

休息痢因兜住大早積不盡除或因痢愈而不善調理以致時止時作宜四君子湯加陳皮一錢木香半錢吞駐車圓只緣兜住積滯遂成休息再投去積却用兜劑因積滯不盡不善調理致成休息痢

勞痢因痢久不愈耗損積血致腸胃虛空變生他證或五心發熱如勞之狀宜積連飲赤多倍連肉白多倍山藥痢後調補宜四君子湯加陳皮一錢半即異攻散惡甜者生料平胃散加入參茯苓各半錢

諸病壞証久不膿血或如死猪肝色或五色雜下頻  
出無禁有類於痢俗名刮腸此乃臟腑俱虛脾氣欲  
絕故腸胃下脫若投痢藥則誤矣六桂飲爲穩或可  
冀其萬一又不愈試肝熱血凝服胃風空變止痢  
痢後風因痢後下虛不善調將或多行或房勞或感  
外邪致兩脚酸軟若痛若痺遂成風痢獨活寄生湯  
吞虎骨四斤丸或用大防風湯或多以生樟即骨碎  
補俗呼爲胡孫姜三分之一同研取汁酒解服外以  
杜仲牛膝杉木節白芷南星葶藶煎湯薰洗一益  
脫肛一證最難爲藥熱則肛門閉寒則肛門脫內用

磁石研末每二錢食前米飲調下外用鐵銹磨湯溫  
洗

下痢、便不通者黃連阿膠丸爲最

明 新安吳勉學校梓

秘傳證治要訣卷八終

五勞者五臟之勞也皆因不量才力勉強運為憂思  
 過度嗜飲無節或病失調理將積久成勞其病頭旋  
 眼暈身疼脚弱心怯氣短自汗盜汗或發寒熱或五  
 心常熱或往來潮熱或骨蒸熱夜多惡夢晝少精神  
 耳內蟬鳴口苦無味飲食減少此皆勞傷之證五臟  
 雖皆有勞心腎為多心主血腎主精精竭血燥則癆

秘傳證治要訣卷九

太醫血氣論而論夫養宜時大醫院使戴元禮述

虛損門體數神強無以廉限無少銷九平日計

五勞者五臟之勞也皆因不量才力勉強運為憂思

過度嗜飲無節或病失調理將積久成勞其病頭旋

眼暈身疼脚弱心怯氣短自汗盜汗或發寒熱或五

心常熱或往來潮熱或骨蒸熱夜多惡夢晝少精神

耳內蟬鳴口苦無味飲食減少此皆勞傷之證五臟

雖皆有勞心腎為多心主血腎主精精竭血燥則癆

雖皆有勞心腎為多心主血腎主精精竭血燥則癆

生治勞之法當以調心補腎爲先不當用峻烈之劑  
惟當溫養滋補以又取効天雄附子之類投之太多  
適足以發其虛陽緣內無精血不足當此猛劑不可  
因有熱純用甜冷之藥以傷腎氣獨用熱藥者猶釜  
中無水而進火也過用冷藥者猶釜下無火而添水  
也非徒無益又害之耳宜十全大補湯或雙和散養  
榮湯七珍散樂令建中湯皆可用間進雙補圓若  
有無故身體瘦軟絕無力氣別無他證此平日作勞  
太過血氣虛而筋失養宜切勞散或和氣湯倍芎歸  
又有言語讀誦過耗神氣致成虛損是爲叫呼走氣

宜於十全大補湯等藥選用

虛人老人病中忽一旦語言不出扣之不應此不是  
啞風又欠藥力到補調功成自復應矣

氣虛人多不得寢亦有痰多膽經伏涎欲寐不得者

不可例作虛治妄補則痰愈盛

有於坐卧之中似欲得人按捺意方始安者此亦虛

証也諸發及有寒熱者已各見本門審知因虛勞得

之並宜用前藥未効用十四味建中湯渴而不勝熱

藥者七珍散加木香五味子各七分熱多黃耆鱉甲

散或人參散獨五心發熱將欲成勞者茯苓補心湯

外雖惡熱內自畏寒盛夏不可單衣大建中湯十四  
味建中湯正元欽參附湯

飲食減少畏食而嘔者難獨用前滯甜藥須斟酌用  
前快脾之劑縮砂陳皮藥却不可少如藥令建中湯  
內有陳皮半夏細辛却可用仍下鹿茸橘皮煎圓如  
不嘔不畏食用前十全大補湯雙和散等藥亦當少  
加快脾之劑以爲之防

有患精血不足明知當補腎方欲一求之歸耆等藥  
其人素減食又恐不利於脾方欲理脾氣則不免用  
疎刷之藥又恐愈耗腎水全一舉而兩得之功莫若

鹿茸橘皮煎圓爲第一故曰精不足補之以味又曰

補腎不如補脾以脾上交於心下交於腎故也道家

交構心腎以脾爲黃婆者卽此意若腎元大段虛損

病勢困篤則腎不容少緩又不拘於此說要知於滋

腎之中佐以砂仁證茄之類於壯脾之中參以比五

味黃耆之屬此又臨時審病用藥之活法勞疾久而

嗽血咽疼無聲此病自下而傳上若不嗽不痛久而

溺濁脫精此爲自上傳下皆死証已

有面色如故肌體自充外看如無病內實虛損俗呼

爲桃花蛙宜看其何証於前藥審而用之





有病後多汗服正元飲諸重補劑不愈惟八珍散宜  
之有別處無汗獨心孔一片有汗思慮多則汗亦多  
病在用心宜養心血只宜一條用藥仍以艾湯調茯苓  
苓末服之名曰心汗青桑第二葉焙乾研末空心米  
飲湯調下最治盜汗返良賦吸常而汗出令香如良  
若陰汗惟蜜陀僧和蛇床子研末撲之立止而黃香  
若服藥汗仍出者小建中湯加熟附子一錢不去皮  
或正元飲仍以溫粉撲之大汗不止宜於諸藥入煨  
牡蠣粉一分并吞硃砂丹或茸硃丹不令坐掛而汗  
常自汗出經年累月者多用黑錫丹久病及大病新

愈汗出者亦可用此若不宜熱補須交濟其陰陽自  
愈當以靈砂丹主之凡此皆非爲他病而止病於汗  
者設非謂有熱病者也取靈砂丹者宜選淨也然有不  
若服諸藥欲止汗固表裏並無效驗藥愈熱而汗愈  
不收可只理心血蓋汗乃心之液心無所養不能攝  
血故溢而爲汗宜用大黃耆湯加炒酸棗仁半錢有  
微熱者更加炒石斛半錢兼下靈砂丹此丹以不  
汗出如膠之粘如珠之凝及淋漓如雨揩拭不逮者  
難治漏風頗汗出諸中門中風證

應汗多而發虛熱者不當泥於熱宜用收斂之劑汗

出而有邪熱者其人若不渴小柴胡湯加桂枝半錢  
最良

治心虛多汗不睡豬心一箇破開帶血用人參二兩當歸二兩槌入心中煮熟去二味藥止吃豬心不滿三四日其病即愈大黃香豉以雞黃二分雞

眩暈眩暈心虛蓋天丸以天麻以無酒養不計脈  
痰飲頭風七氣失血中酒等病皆能眩暈已各見本證今獨舉不兼他病見眩暈者是皆虛損也然有不

時眩暈者有早起眩暈須臾自定日以爲常者正元飲下黑錫丹凡用此者不宜熱煎與交都其全

傷濕頭暈腎著湯加川芎名除濕湯不熱煎藥

有因虛致暈雖暈醒時面常欲近火欲得暖手按之蓋頭面乃諸陽之會陽氣不足故耳

有頭風証耳內常鳴頭上有如鳥雀啾啾之聲切不可全謂耳鳴爲虛此頭腦挾風所爲也有眩暈之甚

擗頭則屋轉眼常黑花觀見常如有物飛動或見物爲兩宜小三五七散或芎附湯生料正元飲加鹿茸

一錢下靈砂丹或用正元飲炒川椒一十五粒下茸硃圓若不効則獨用鹿茸一味每服半兩用無灰酒

三盞煎至一盞去滓入麝香少許服緣鹿茸生於頭

頭暈而治以鹿茸蓋以類相從也曾有頭疼痛不愈服茸殊丹而効

虛炎短乏

虛炎陰陽不升降下虛上盛氣促喘急宜蘇子降氣

湯去前胡下黑錫丹或養正丹氣急甚而不能眠卧者沉附湯或正元飲或四桂散去木香用沉香並以鹽煎下黑錫丹或靈砂丹三妙丹不効則以前藥下

殊砂丹

短乏者下氣不接上呼吸不來語言無力宜補虛四

桂飲木香減半加黃耆山藥各一錢若不勝熱藥及

痰多之人當易熟附子作生附在人活法餘皆倣此藥輕病重四桂飲不足取効宜於本方去木香加炒川椒十五粒更不效則用椒附湯上焦乾燥不勝熱藥者宜於椒附湯加人參一錢尋常病當用姜附面或上盛燥熱不可服者惟此最良

驚悸附健忘

法不特可治虛乏尋常氣暴逆致死者用之良驗

驚悸者因事有所大驚觸忤心神氣與延壽遂生驚

悸此乃心虛膽怯所致宜溫膽湯嘔則以人參代竹  
茹

若驚悸眠多異夢隨卽驚覺者宜溫膽湯加酸棗仁  
蓮肉各一錢以金銀煎下十四友圓或鎮心丹遠志  
圓酒調妙香散

健忘者所過之事轉眴遺忘此乃思慮過度病在心  
脾宜歸脾湯

怔忡怔忡更不效俱用對情等土煎鹽熟不煎  
怔忡久思所愛觸事不意虛耗真血心血不足遂成  
怔忡俗謂心忡脉亂是也宜益榮湯

怔忡卽忪悸也忪悸與驚悸若相類而實不同驚悸  
者因事有所驚而悸忪悸者本無所驚常心忪而自  
悸焉得無辨  
感風寒暑濕閉塞諸經而忪忡各見本門

因痰飲怔忡者導痰湯加炒酸棗仁下壽星圓  
失志者由所求不遂或過誤自咎懊恨嗟嘆不已獨  
語書空若有所失宜溫膽湯去竹茹加人參栝子仁  
各一錢下定志圓仍佐以酒調辰砂妙香散  
有痞塞不飲食心中常有所怯愛處暗或倚門後見  
人則驚避似失志狀比名爲卑慄之卑以血不足故

示谷神嘉禾散加當歸半錢黃耆半錢

五癩癩食以中常言

癩有五馬牛鷄羊猪五者以其病狀偶類之耳無非痰涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足觸榻口眼相引胸背強直叫吼吐沫食頃乃蘇俗止呼爲發猪癩疾發鷄風宜星香散加全蝎三箇下蘇角圓

癩風癩狂附此風諸證而外中各見本門

癩狂由七情所鬱遂生痰涎迷塞心竅不省人事目瞪不瞬妄言叫罵甚則踰垣上屋裸體打人當治痰寧心宜辰砂妙香散加金箔珍珠末雜青州白圓子

末濃姜湯調下吞十四及圓滑石六一湯加珍珠末

白湯調下各半錢

有病癩人專服四七湯而愈蓋痰迷爲顛氣結爲痰

故也如健忘如驚悸如怔忡五癩亦宜用此

如顛狂不定非輕劑所能愈者宜太乙膏及抱膽丸

心風者精神恍惚喜怒不常無語時或錯亂有顛之

意不如顛之甚亦痰氣所爲也宜星香散加石菖蒲

人參各半錢下壽星圓

有心經蘊熱發作不常或時煩燥鼻眼各有熱氣不

能自由有類心風稍定復作參蘇飲加石菖蒲一錢

有婦人狂言叫罵歌笑不常似崇憑依云逸眼與口  
角吊起或作顛治或作心風治皆不效乃是舊有頭  
風之疾風痰作之使然用芎心湯加防風十分數服  
其頓愈此方亦在疾風而治其頓愈香薷散百高散  
少風不寐此方亦在疾風而治喜淚不常無語報五診痛存賦之  
不寐有二種有病後虛弱及年高人陽衰不寐有痰  
在膽經神不歸舍亦令不寐虛者六君子湯加炒酸  
棗仁炙黃耆各半錢痰者宜溫膽湯減竹茹半加  
南星炒酸棗仁各半錢下青靈丹此方亦在疾風而治  
傷寒不寐當於活人書中求之卷六十一愚賦狂和夫

自驚悸以後諸證亦可用溫膽湯加或同金銀煎竹  
茹則隨其寒熱虛實而去取之導痰湯加石菖蒲半  
錢尤治

大抵驚悸健忘愷忡失志不寐心風皆是膽涎沃心  
以致心氣不足若用涼心之劑太過則心火愈微痰  
涎愈盛病愈不減惟當以理痰氣為第一義

明 新安吳勉學校梓

秘傳證治要訣卷九終

證治要訣

卷九

諸病中有渴已各見本證今特舉其無病自渴與病

諸病又損腎虛而渴宜八味丸黃耆飲四物湯加人

或命溫熱食不消對當以野麥屎為第一

大淋瀝熱對飲金中夫去不寐以風者吳銀越天

錢大印

自渴者以八味湯在可出飲散也如同金雞煎

秘傳證治要訣卷十

拾遺門

渴

諸病中有渴已各見本證今特舉其無病自渴與病  
癢後渴者參朮散四君子湯縮脾湯或七珍散加木  
瓜一錢皆可選用生料五苓散加入參一錢名春澤  
湯以五苓散和四君子湯亦名春澤湯尤是要藥更  
兼作四皓粥食之

參木瓜各半錢或七珍飲大補湯去木加木瓜如數  
諸失血及產婦蓐中渴者名曰血渴宜末益血之劑  
已於血門吐血證中論之亦參春有無病或然大渴少頃又定只宜審湯及縮脾湯之  
類折二泔冷進數口亦可飲酒渴者乾葛調五苓散飲全飲其無汗自飲與

疸 附面黃

黃面自疸大略有五黃脾土色也脾臟受傷故病見  
於外通身面目悉黃並宜生料五苓散加茵陳或五  
苓散平胃散各半貼名胃苓飲黃汗因脾胃有熱汗

出入水澡浴所致故汗黃熱染衣只宜前藥黃疸因  
酒食過廣臍膈極熱復爲風濕水博結滯不散濕熱  
鬱蒸故通身眼目悉黃或發寒熱亦宜前藥酒疸因  
飲酒過傷而黃俗名爲酒黃宜乾葛煎湯或梔子仁  
煎湯調五苓散或生料五苓飲加乾葛一錢煎  
有酒疸後變成腹脹漸至面足俱腫及徧身宜藿香  
脾飲加水香三錢或木香麥蘆各半錢煎  
飲酒卽睡酒毒薰肺脾土生肺金肺爲脾之子子移  
病而尅於母故黃又肺主身之皮膚肺爲酒毒薰蒸  
故外發於皮而黃此二說故通法當合脾肺而治宜



藿批飲然文而黃此二結並宜合服而後  
穀疸因失饑傷飽胃氣薰蒸而黃食必即眩暈宜紅  
圓子補氣解毒蕪椒土五胡金胡為與之五十  
女勞疸因色後為水濕所搏故額黑身黃小腹急滿  
大便不利以大麥一撮同滑石石膏末各一錢煎  
諸疸口淡怔忡耳鳴脚軟當作虛治宜四君子湯吞  
八味圓五味子附子者皆可用不可過用涼劑強通  
小便恐腎水枯竭久而面黑黃色不治原藥散因  
傷脾致疸已見之前黃疸證下外有暑毒傷脾小便  
不利亦能成疸煎荊花湯調五苓飲五散藥黃散因

諸失血後多令面黃蓋血為榮面色紅潤者血榮之  
也血去則面見黃色譬之草木春夏葉綠遇秋葉黃  
潤與燥之別也宜養榮湯枳歸湯十全大補湯妨食  
者四君子湯加黃耆扁豆各一錢即黃耆四君子湯  
加陳皮名異攻散加此二味亦得亦有偏身黃者但  
黃不及耳目水濕入脾未如幾許顯惡類皆不問  
病瘡後多黃蓋瘡謂之脾寒脾受病故色見於面宜  
理脾為先異攻散加黃耆扁豆各半錢諸病後黃者  
亦宜

農民黃腫病因飽作勞脾氣不舒宜楊法師勝金圓

眼

醫眼以青桑乾枝就硬炭火上燒取白灰銅筋點二  
三次妙甚不可用水桑黃桑亦不可雜炭灰  
爛病不一爛沿惡泊羞明醫膜澀痛雀目韜針內外  
障等證難以枚舉今獨舉赤眼數種應患眼者不問  
遠年近有上諸證並可用四物湯下生熟地黃圓傳  
洗之劑當求之專科四物湯加入蒸熟大黃一塊如  
粟子大尤妙  
有久視損目肝血不足以致見物不明眼中常見烟  
焰起此當益血宜生熟地黃圓傳洗之劑當求之專科

有因茹素致目少光或成雀目蓋食能生精虧之則  
目無所資而減明用藥無效早時眼以精  
眼疾諸證醫家多用治眼流氣飲此則專門之業也  
尋常赤眼用黃連碾末先用大菜頭一箇切了蓋剗  
中心作一竅入連末在內復以蓋遮住竹簽簽定慢  
火內煨熟取出候冷以菜頭中水滴入眼中  
赤眼有數種氣毒赤者熱壅赤者有時眼赤者無非  
血壅肝經所主蓋肝主血通竅於眼赤眼之病大率  
皆由於肝並黑神散消風散等分白湯調食後睡時  
服仍用豆腐切片傅其上鹽就者可用酸漿者不可

可卽烏豆傳盒之意

風熱赤甚者於黑神散消風散二藥中放令消風頭  
高間以折二泔睡時冷調洗肝散或菊花散服仍進  
四物湯內地黃用生芍藥用赤只須半貼食後作一  
服却加入赤茯苓半錢醉將軍卽酒蒸大黃是也早  
晨鹽湯下養正丹二十三十粒蓋養正丹養正散  
若不便於過涼之劑則不必用洗肝散宜以二錢黑  
神散一錢消風散用合銀煎成湯飲之便專門之業也  
若赤眼久而不愈用諸眼藥皆無效早起則以蘇子  
降氣湯下黑錫丹臨睡則以消風散下三黃圓日中

別以酒調黑神散此數藥不獨治又赤諸眼疾皆治  
之

若眼暈生花則屬肝虛當於虛損門眩暈證求藥

或正坐他病以致病花合就其所得之病隨證施治

又有氣眼纒怒氣則亦痛宜服酒調復元通氣散

又有頭風眼偏正頭痛眼不可開多淚羞明宜決明

散

耳

耳爲腎竅耳病皆屬於腎腎虛故耳中或如潮聲蟬  
聲或暴聾無聞宜鳴聾散或嚼蠟用酒下及黃臘粥

食之  
腎經久虛耳中潮聲蟬聲無休止時妨害聽聞者當  
墜氣補腎正元飲嚙黑錫丹間進安腎圓

風毒攻耳致生膿者名停耳先以綿枝子擦出膿令  
淨次用桃花散吹入或以多年陳皮去白麻油燈上  
燒存性碾末入麝香少許加桃花散法加用乾臙脂  
白礬坐山蘇以煙燻茶合燒其灰哥之

酒查鼻屬肺風有不能飲而自生者非盡因酒酒查  
乃俗呼耳宜一味折二淋食後用冷飲針用碗黃入

大菜頭內碾塗之若鼻尖微赤及鼻中熱生瘡者辛  
夷碾末入腦麝少許綿裹納之或以杜杞葉拭去毛  
不須塗多剉細煎膿湯候冷調消風散食後臨卧進  
鼻塞流涕不止有冷熱不同清涕者腦冷肺寒所致  
宜細辛烏附乾姜之屬濁涕者乃素問所謂膽移熱  
於腦故煩鼻淵是也宜防風甘菊之屬須以清濁別  
冷熱

一方用蒼耳子卽縑絲草子炒碾爲細末食後入藥  
末點服立効  
有不因傷冷而涕多涕或黃或白或時帶血如腦髓

狀此由腎虛所生不可過用涼劑宜補腦散仍以黑錫丹紫靈丹靈砂丹

傷冷熱鼻塞流涕多者通關散  
鼻衄見血門鼻衄證

餘處無恙獨鼻尖色青黃者此其人必爲淋也鼻尖微白者亡血也赤者血熱也  
外有鼻痔辨患不能盡舉外科方論  
不厭口舌附暗瘡  
口舌生瘡皆有上焦熱壅所致宜如聖湯或  
加黃苓一錢仍用杏花散摻之未效則參以四香飲

有聲音不出之人服冷劑愈失聲乃是腎經虛寒投附子之劑數枚方可此不可不識

下虛上盛致口舌生瘡若用鎮隧之藥以降陽湯宜鹽水下養正丹或黑錫丹仍於臨臥熱湯洗足炒探淨吳茱萸小撮拭足了便以炒熱致足心用片紫之男左女右

曾有舌上病瘡久觸成穴累服涼劑不效後來有教服黑錫丹遂得漸愈此亦下虛故上盛也  
外有舌暴腫脹名曰重舌一味真蒲黃末摻之

又有舌無故常自痺者不可作風治由心血不足理

中湯加熟附半錢當歸錢半風引由心下不取  
齒痛見諸痛門齒痛證其他齒患不一自有口齒專

科牙衄見衄門又論丸穴果照京傾不效針來口  
異式文法

新安具勉學校梓  
蓋水不燥五丹造黑證明

祕傳證治要訣卷十終  
下五土滋燥口舌生瘡  
用子之增燥效

祕傳證治要訣卷十一  
發骨之藥又育枚

瘡毒門

癰疽疔毒

發散諸般毒多碾白芙蓉葉入草烏葉少許蜜調傳

重者加入南星末凡諸毒用膏藥欲散搓入麝香欲

潰搓入雄黃

一應毒證已作渴或膿過多防其為渴宜於千金內

補散之外兼進八味圓用五味者佳

發熱惡寒狀如傷寒而痛者其痛處欲為癰疽癰屬

腑故生淺皮薄而腫高疽屬臟故生深皮厚而腫堅  
又有輕於癰疽者名曰癰毒癰壅也疽沮也癰節也  
言氣血壅滯沮節也並威靈仙飲微利之或五香連  
翹散佐以復元通氣散若膿血結成不可發散已潰  
未潰宜小托裏散或千金內補散加木香羌活白芍  
藥烏藥等分渴加括蕪根此數藥皆治陽證若陰證  
宜於千金內補散減防風桔梗之半倍加白朮未効  
更加熟附與諸藥煎服尤佳

外有服金石以助欲至精氣既衰藥毒偏勝金石與  
肺同類肺附於腎所以多成發背之疾又有好驚爲

腫亦至發背蓋驚之陽氣皆聚於上甲所以上甲可  
入藥也治法同前若毒發於陰而未可用附桂諸  
藥劑外疼內寒宜五香湯昔口散出煎發而瀉真  
毒之初發並宜酒調復元通氣散或病在下者酒糊  
圓通氣散却用木香湯吞下

治諸毒方結成者以皂角樹上所生之葦磨烏醋調  
塗此葦須預藏在烟閣頭緩急取用  
患背瘡人及諸毒已潰後血去過多津液少者宜換  
肌散毒初發頭疼體痛乍寒乍熱恐挾外邪宜香蘇  
飲加川芎白芷防風當歸陳皮之類

病消渴之人多生毒此乃津液已耗虛陽外發內外俱虛此爲極病凡消渴愈後生毒毒愈後消渴皆非可治之病也

癰疽疔毒此毒總名亦舉其大槩耳其他證狀不一名稱亦異未潰之際增寒壯熱狂言妄語如見鬼神膿去已多而大熱不休者似爲難治蓋毒之得膿猶傷寒病証之得汗汗已而反大熱則爲壞傷寒矣若淋洗貼傳自屬外科癰疽發背已潰出膿過多而羸瘦者芎歸湯凡所服藥並不可用白朮能生膿故也未潰與初發陰證用之却可

若其人嘔不喜食不可用千金內補散滯其脾恐恐外刑未潰者二陳湯加芎或不換金正氣散已潰者殺神加禾飲

又一方治毒並不喜食於不換金正氣散加白茯苓半夏等分人參木香減半亦名正氣散

患癰毒人膿血已潰所去過多津液枯竭多病於渴縱有發熱燥擾等證不可以治者用益榮生津之劑若大熱不止者難治

腸癰卽腸中生癰也腹中疝痛其始發熱惡寒証狀難辨因下膿血乃覺或小腹腫滿或小便澀滯或膿



從臍出宜吞太乙膏

瘡毒久不乾成漏者忍冬草浸酒常服

瘡毒而大便堅者升麻和氣飲和消毒飲加以身上發熱甚者消毒飲和敗毒散

有火邪逼身及因灸後偏身發爲赤核腫痛旋盤用判防湯浸取洗

露痕名爲羊核生取石菖蒲爛研盒之仍以石首膠

一兩許火煨存性研爲末酒調服

有不傳藥時大痛傳卽不痛有不傳藥時不痛傳之則痛蓋寒熱風濕并憂怒等氣積而內攻則痛不禁

藥拔出之故不痛也血死陰毒在中愈服愈深愈不

覺痛藥發之於外故反痛也

瘡癬疥

附一瘡平立至氣於宜一利蟻黃末

此雖皮膚小疾不足爲害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥

癩瘡膚尤爲煩擾甚至經年累月不能脫洒凡病此者不常專用外傳藥須內宣其毒可也升麻和氣飲

消毒飲四順清涼飲犀角飲皆可用

有紫白癩風酒調消風散飲訖使去浴卽以消風散入皂角末揩洗外以烏白膏傳之浴子以醋調貝母

末筆蘸刷之頻浴頻用爲佳



少不足以發之宜以藥滋養其血血氣既復瘡不患不起宜千金內補散去防風桔梗

癩風

附下疳瘡

精定真衣出三日四日發

癩風固精未調外爲風濕所襲從陰囊濕汗作痒起流注四肢手又白色悉生瘡瘍俗謂之腎臟風四生飲二兩以竹刀細切猪腰二對銀石器中酒漉熟爛研細和藥爲圓如梧桐子大如不可圓入酒醋少許每服五六十圓鹽酒空心下又用花蛇散和消風散酒調服或升麻和氣飲嚙烏頭煮鹽丸及烏荊丸或花蛇圓若癩常濕痒欲得淋洗則以蛇床子一味煎

湯用之

下疳瘡用眼藥珍珠粉乾摻又方用水銀膏貼令水出却以火中白煨研末別煖楓丹等分和勻入麝香少許摻之癩風痒不可忍者薑汁入香油一二滴攪勻塗之

擷撲

附刀傷

仆踣不知曰擷兩下相曰撲其爲損一也因擷撲而迷悶者酒調蘇合香丸或鷄鳴散或和氣飲加大黃入醋少許煎或童便調黑神散不用童便用蘇木煎酒調亦得擷撲傷疼酒調琥珀散極佳再有烏藥順

氣散用以治之風腰疼尤宜有搨撲人服藥并薰洗  
搨藥皆不效自若或教以用白芍藥赤芍藥威靈仙  
乳香沒藥各等分爲細末和勻酒調服之隨卽痛減  
其半不效曰賊兩不腫曰其熱其熱一因賊對面  
刀傷血不止一味白芍藥散白酒調服卽以散搨傷  
處或其血出不透致惡血壅滯傷處赤腫或攻四肢  
頭面並鷄鳴散或煎紅花調黑神散其有血出不止  
勢難遏者用龍骨乳香等分研末室患處蛇魚草搨  
塞尤妙非特可治刀傷撲血不止亦可治骨節令水

惡蟲蛇傷

爲惡蟲蛇所傷用白芷細嚼傅患處仍以酒調芷末  
服蜈蚣用鷄屎塗蟻傷用蕨萁芒燒灰香油調傅大  
傷用虎骨末傅猫傷用薄荷搗蜂蠆傷用人參嚼而  
傅之或用諸瓣殼燒存性研末蜜調傅凡諸惡物傷  
急於傷處灼艾數壯亦佳

發丹

發丹色狀不一痒痛亦異大槩皆因血熱肌虛風邪  
所搏而發然色赤者多以赤故謂之丹宜消風散入  
燒楓樹子存性爲末酒調服有發而色白者謂之冷  
瘡宜消風散雜黑神散酒調此病多緣肌肉踈爲風

邪所襲而成風熱則赤風冷則白則今人呼赤爲丹白爲瘦所以用酒調土硃服之而愈者亦以脾主肌肉土能入脾各從其類古方一名爲癭疹非特分寒熱亦兼備四氣近世方論呼爲白癩瘦赤爲血風赤白二證並可用烏藥順氣散和消風散酒調服白者多用順氣散赤者多用消風散病此者俱宜用煎藿香正氣散有人一生不可食雞肉及獐魚動風等物纔食則丹隨發以此見得係是脾風脾主一身之肌肉藿香正氣散乃治脾之藥而土硃亦入脾之藥此方屢試應驗用白並味調射患處以酒調服

瘰癧

瘰癧之病皆血氣壅結根在臟腑多結於項頸之間累累大小無定發作寒熱膿血潰漏或此沒而彼起宜於隔宿用米飲調下桂末滑石二錢重鍾動時進黑白散必有物如蒲萄肉從小便出其數枚於腫核則愈仍常服四七湯加木香或蘇子降氣湯其匪頸者俗名蠮蛇瘰癧治

先以石菖蒲爛研盒患處微破却以貓狸皮連毛燒灰香油調傅一味白欽末酒調服多多爲上仍以酒一呷搏白欽盒患處掘取生者尤好或用猪膽內水

調雄黃末傅患處亦好

癢

癢証不一疥癬作痒當求之本門瘡疥證血虛皮膚燥痒者宜四物湯加防風七錢半如以四物湯半貼水二盞調消風散一錢重亦可婦人血氣或通身痒或頭面痒如蟲行皮中緣月水來時爲風所吹不然則是產褥中食動風物致之亦宜如前四物湯調消風散有脾虛身痒本無疥癬素非產褥潔然一身痒不可住此乃脾虛所因經云諸痛爲實諸痒爲虛又云脾主身之肌肉宜實脾爲先四獸飲去草加藿香

厚朴川芎當歸各半錢重薑棗煎服名增損資胃飲

明 新安吳勉學校梓

秘傳證治要訣卷十一終



胡索湯然又恐感外邪傷飲食致痛痛不因血尤宜  
詳審和氣飲却能兼治其  
有經事不通血入四肢化爲水遂成腫滿非獨產後  
爲然名曰血分誤作水治其害不少宜調經散因冷  
而節因節而痛宜大溫經湯冷甚者去麥門冬有因  
驚氣上逆致丹不通涎多神昏昏則不知人或妄言  
歌笑似心風似五癩醒時又似正人或病來身如搖  
動手足如擗擗四七湯大溫經湯各半貼和勻服  
有經候失期或過二三月變生諸證者和氣飲真用  
桂枝者性最動血和氣飲加蘇木紅花乾漆各半錢

桃仁一錢或醋或酒煎去查入麝香少許仍以醋湯  
調黑神散因血節而腹內有塊者四物湯去地黃加  
官桂白朮各半錢

因經候不調血不循故道從後糞出腹或疼或不疼  
不可作尋常便血治宜順其經四物湯去地黃加阿  
膠香附子各一錢仍以黑神散和調氣散白湯點服

血疼 附血痔

男子謂之小腸氣婦人謂之脾血疼多因血虛後感  
冷致血氣凝滯小腸疝痛牽引腰脇宿有病根不關  
月事通閉宜和氣飲或玄胡索湯失笑散間進艾附



凡或以鹽一檢置鉄匙上火燒研碎酒調下異攻散大便通則愈若審知血海虛冷而疼宜小温經湯若只瘥不痛常如肚饑此乃血虛胃中枯燥生熱宜益血藥滋之可用四物湯久不治則成消中

血虛者心頭瘥痛四物湯去地黃加香附子如數  
有病後血虛者有本體血虛者其人往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈變生諸疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮湯服之血虛而氣旺宜抑氣湯卽香附末

血虛而腹疼者四物湯  
婦人血虛怒氣用心者如顛狀又如心風或笑歌或妄語月事來及產中多有此證四物湯半貼去厚朴加入麥冬桂芍歸各半錢名增減四七湯

崩中

崩有血熱而成者有氣虛而成者血大至曰崩中或清或濁或純下瘀血或腐勢不可止證狀非一所感亦異甚則頭目昏暈四肢厥冷並宜膠艾湯嘔震靈丹佐以三灰散或以童子小便煎理中湯或以沉香降氣湯加入百草霜米飲調下血崩甚而腹痛人多

疑惡血未盡又見血色瘀黑愈信惡血之說不敢止  
截大凡血之爲患欲出未出之際停在腹內卽成瘀  
色難盡以瘀爲惡又焉知瘀之不爲虛冷乎若必待  
見瘀血之後截之恐併與人無之矣此腹痛更有說  
積而腹痛血通而痛止崩而腹痛血住則止止血芎  
歸湯加乾姜熟附一錢止其血而痛自定仍以刺花  
綉拭黑片燒灰研末米飲調下一方以毛蟹殼燒存  
性米飲下亦有以早黃麻根燒灰爲末米飲下  
赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端大

率下白帶多間有下赤者並宜順氣散吞震靈丹仍  
佐艾附圓或米飲調沙參末帶下不止成疴羸者四  
物湯加煨牡蠣粉半錢吞固陽圓多服取效問宜  
有帶疾愈後一二月或再發半年一發先血而後下  
帶來不可遏停蓄未幾又復傾瀉此名漏帶最難治  
下截之血小腹主之有因血虛而虛熱陷入小腸致  
小便澀痛色白如泔或成沙粒皆不可作淋治用冷  
劑宜以四物湯五苓飲各半貼和煎

### 胎前產後

胎前惡阻見食嘔吐喜啜酸物多卧少起俗謂之病

兒蓋其人宿有痰飲血壅遏而不行故飲隨氣上停滯肝經肝之味酸則必喜啖酸物金尅木以辛勝之小半夏茯苓湯或三陳湯甚者二陳湯若嘔吐不食心虛煩悶宜橘蘇飲加竹茹指犬有服熱藥致膈悶熱成疾宜蒲黃散荷葉散轉胞之說諸論有之以胎漸長且近下逼近於胞胞爲所逼而側令人數洩故名轉胞胞卽膀胱也然子淋與轉胞相類但小便頻數點滴而痛爲子淋頻數出少而不痛爲轉胞間有微痛終是與淋不同並宜生料五苓散加阿膠一錢更於胎前諸方求之五味子丸味圓加當歸亦治轉

胞或更加車前子一味髮灰湯尤好

有胎轉胞用搐鼻藥多打噴嚏或用拳打脚心知痛令病人渾身掣起則臟腑搖動而胞自反上

產後諸病有作寒作熱而亦有獨熱然獨熱亦有三惡血未下者腹痛而發熱感外邪者必有頭痛惡風而發熱惟血虛卽但發熱而無餘証名曰蓐勞宜於前血虛証求藥

產後血虛而煩蒲黃隔紙炒東流水調下產後腹疼惡血不止諸藥不效宜芎歸湯加五味靈脂玄胡索

煎



四物湯婦人要藥於內加吳茱萸半錢或一錢應血氣病無不治  
婦人有一生不破腹而虛者既不破腹何緣有虛大抵婦人以血為主血衰氣旺定無兒正因血虛所以不育婦人懷子服固胎藥太多或正產或半產胎雖下而惡血不即去或經二三月而惡露猶滴此非敗血之比正緣當來有固經藥在內致血滯而不化藥宜順血通氣不宜蓄血閉氣  
彌月俗名滿肚多有恣意食物致傷食發熱有類傷寒食復之證宜先用紅圓十二服却進小柴胡湯

此論蓋有所本

婦人之藥大率皆甜不利於脾胃歸猶滯况於地黃平脾胃實者服之固見有功若素有痰飲及有甜入諸血藥中半夏陳皮自不可少

聚寶丹婦人氣痛血疼或月經來少作疼或來多不止而痛或色瘀或雜以黃泉或血敗而加以泄瀉腹內疼擾並宜川芎當歸炮薑肉桂各一錢白水煎服累用累驗

角弓反張乃婦人急候為諸病之最得此者十存一二荆芥新瓦上微炒末豆淋酒調下二錢或只一味

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下  
獨活為末豆淋酒調下  
獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

獨活為末豆淋酒調下

