

醫聖元祇卷第四

趙州教授進之王好古案次

明監察御史東萊桂亭蔡才翁

兩淮運同西明屠本峻重刊

兩淮運副姚江嚴昌世校正

陽明證 王朝奉集註識語例

謔語無次也凡胃實有燥屎則謔語故經曰實則謔

語虛則鄭聲鄭聲者重語也非輕重之重 謔語

有數種 有胃實謔語可下證也 有合病者謔

語三陽合病腹滿身重口不任面垢謔語遺尿白

虎湯證

有少陽汗譫語少陽不可發汗只宜小

柴胡湯

有火劫譫語以火劫發汗熱氣入胃故

也救逆湯

有汗多亡陽譫語不可下也宜柴胡

桂枝湯和其榮衛以通津液自愈

有下後譫語

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重

不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯有熱入血室

譫語陽明病下血譫語者熱入血室但頭汗出刺

碁門又婦人中風經水適來譫語為熱入血室小

柴胡湯刺碁門穴有肝乘脾譫語傷寒腹滿譫語

寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰橫刺碁門穴有

晝則明了夜來譫語此熱入血室無犯胃氣及上

二焦不治自愈

仲景調胃承氣湯

大黃

酒浸

芒硝

甘草

右咬咀水煎服加生薑亦得

調胃承氣湯與四

物湯各半一名玉燭散

大承氣湯

治大實大滿

枳實

痞瘕

厚朴

滿薑製

大黃

實酒浸

芒硝

燥

小承氣湯

治太陽陽明實而微滿

枳實

炒

厚朴

製

大黃

生

海藏云調胃承氣湯治實而不滿卽正陽陽明是也
大承氣湯治大滿大實卽太陽陽明是也小承氣
湯治實而微滿少陽陽明是也太陽陽明正陽陽
明爲最高之分故大黃但用酒浸從巔而下之也
惟少陽陽明爲窠下之分處三經之內故黃不用
酒浸也非若二經而高爾若最高之分用最下之
藥則耳目昏冒咽頰腫痛神癡不清之病有不免

矣若最下之分用窠高之藥則胸中氣消日久不
復虛損成勞之病有不免矣故仲景三承氣湯各
有主治隨經而異卽不同也 又年老虛人傷寒
可下者大承氣湯調胃承氣湯皆去硝慢火熬成
玄明粉量輕重而下之

煉玄明粉法

朴硝三斤淘淨生好牙者用砂鍋一枚疊實以炭
火十斤煨之徐徐輕沸可住大火令大沸定以炭
蓋之復以炭十五斤緊煨至火盡放冷一伏時出

去明粒後三
陽熱病不注
陰毒可知

鍋中藥放紙上攤勻就地上以盆蓋之一伏時日
晒乾入甘草二兩炒微黃剉碎同搗細末量熟輕
重沸點二三錢亦可愈正經云味辛甘性冷則治
熱病明矣兼味辛又鹹此能潤燥而太堅也非大
便燥結脉滑有力及洪大者不宜服却言煖水藏
女子服之補血脉有失用藥寒熱之本意經云鹹
能勝血豈能補血哉又方治陰毒一句其言又爲
錯矣若與硫黃附子及諸陽藥多寡相佐而行則
可以治陰中有伏陽也若的是陰毒別無伏陽殺
人速矣太清伏煉法云硝能制伏陽精解火石之
毒則不治陰可知用者審詳也

仲景治襍病三物厚朴湯

厚朴

半兩

枳實

五兩

大黃

四兩

右以水一斗二升煎厚朴枳實取五升大黃四兩
再煎取三升溫服一升腹中轉動失氣是也更作
一服下之不効再服易老治消渴在中爲順氣散
調胃承氣湯加葶子寒水石爲細末煉蜜調服

治疫氣大頭病 加當歸爲滌毒散治時氣疔瘡

五發瘡瘍喉閉雷頭 大便軟升麻荷葉湯陽震
之象也 王朝奉舉常器之云有大小便不通氣
結一條 有大便不通連服三承氣湯及諸下湯
不通者多是氣結必效矣可針陰會穴在兩陰之
間此數有救得者因此亦有承氣內兼巴豆下而
通者不可不知加郁李仁佳 蜜導薑鏡二法在
後 氣結會食療云酒服郁李仁四十九粒更瀉
尤良

仲景厚朴七物湯

治腹脹滿

厚朴斤三

大黃兩三

生薑兩五

桂兩二

甘草兩三

大棗兩十

大枳實兩五

右以水一斗煎取四升去滓溫服入合日三服

嘔者加半夏五合 下痢者加大黃 寒多者加

生薑半斤 楊氏治身體腫滿水氣急卧不得郁

李仁一大合爲細末和麩搜作餅子與食入口卽

大便通利氣便差

仲景桃仁承氣湯此下證脈在左手中其熱邪侵盡

無形之氣則入有形血也 調胃承氣湯加桂桃

仁引而入血也

此當在畜血條下

仲景枳實理中湯

煉蜜作丸如桐子大白湯下三

十九

淡師消飲丸

治宿酒停飲胸滿嘔逆目視眈眈腹中水聲痛不思飲食

白木

二兩

茯苓

半兩

乾薑

七錢

枳實

七錢

右細末蜜丸桐子大空心溫水下三十九日三服半月愈

仲景神奇枳實湯治心下水

易老改二味作丸老

年內傷便軟

梅師治痞方

白木

澤瀉

生薑煎服與枳木湯相合四物亦作丸亦可

五苓平胃各半散

生薑調服治心下水 五苓加

石膏寒水石甘草為甘露飲亦治心下水并飲酒

水瀉者生薑調三五錢清濁立分

雄黃銳散

治下部蠱瘡

青箱子

雄黃

苦參

黃連

各三分

莢仁

去皮一分

右為散以生艾搗汁和丸如棗核綿裹內下部扁竹汁更佳冬無艾只用散綿裹內亦得狐惑與蠱皆為蟲證傷寒熱入食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五藏及下部為蠱病其候齒無色舌盡白唇異有瘡忽忽喜眠上唇有瘡食其臧也下唇瘡食其肛也害人甚急治蠱桃仁湯黃連犀角湯雄

黃鏡散

小便不通利

仲景猪苓湯

本少陰之劑以其有五苓味三故列陽明條下又治中脘與臍下有水或小便不通

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠

右每服五錢七水二盞煎至一盞去滓內膠烱盡溫服日三小便不通一切利小便藥不効以其服附子太過消盡肺陰氣所不化師用黃連苓解毒

而得通。又劉子安病腦疽，服內托散後，泄不止，小便大不通，亦消肺陰之過。諸藥不效，郭子明輩用五苓木通導之，愈。祕予用陳皮、茯苓、生甘艸之類，肺氣下行遂通。若正用利小便藥，其不知本甚矣。靈苑治五腫淋疾，勞淋、血淋、氣淋、石淋，至甚者透格散。

滑石

一兩無泥白者研為細末，每服二錢。

虛人宜玄明粉。

諸淋各依湯使于後。

勞倦虛損，小便不出，小腹急痛，菜子末煎湯通後。

便瀕服補虛人參散。血淋，小便不出，時下血，疼

痛滿急。熱淋，小便熱赤，色淋瀝不快，臍下急痛。

並用冷水調下。氣淋，小腹滿急，尿後常有餘瀝。

木通煎湯下。石淋，莖中痛，尿不能出，內引小腹。

膨脹急痛，尿下沙石，令人悶絕，將藥末先入銚子。

內隔紙炒至紙焦，再研細，溫水調下。小便不通。

小麥湯下。卒患諸淋，並宜冷調，並空心先調使。

藥散如水，即服之，更以湯使送下。服諸藥不效者。

服此即愈。三焦熱淋，玄明粉主之。如石膏尤佳。

本艸云玄明粉調下劉禹錫云偏主石林拜五淋
難產 冷淋小腸不利莖中急痛用石斛葉爲末
每服三錢水一盞葱白七寸煎至六分去粗食前
溫服兼治吐血去葱白不用粗冷淋熱淋俱用葱
白根取其潤而膩也

千金翼治淋黃芩四兩袋貯之水五升煮三升分三
服小便卒大數非淋也令人瘦以石膏半斤碾細
水一斗煮五升稍溫飲五合抱朴子 石淋若不
通石在小腸中覓取淋中藥煎呷有神効

在聖散

治五淋小腸不利莖中痛

檳榔

麩畏煨
三錢

赤芍藥

一兩

右吹咀每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服
食前

千金難產經數日不能生出子死腹中母欲歿者瞿
麥煎濃汁服 亦治竹木刺不得出內者服此瞿
麥汁効

八正散

主治修製
並見局方

大黃

瞿麥

木通

扁蓄

滑石

梔子

燈州

甘草

車前子

本証外又治飲食過度前後陰間有瘡諸藥不効
宜服此散兼以馬齒莧及青黛為散上之可得痊

愈出行義本草
馬齒莧條下

瞿麥湯

瞿麥

木通各二兩

甘草三分

茯苓

黃芩

猪苓

滑石

扁蓄

通艸各一分

右咬咀木煎服

渴發熱加瓜蔓根

小便赤加

黃芩

小便少加車前子

小便澀淋加石葦

葵子續隨子

臍下悸動加桂枝石葦

石葦散

石葦二兩

木通二兩

滑石三兩

玉不甯行一兩

甘草一兩

當歸一兩

白木三兩

葵子三兩

瞿麥二兩

芍藥一兩

右為細末湯調服

六一散

滑石六兩

甘草一兩

右爲細末調服 加當歸并泉右爲四血散

治衄血吐血便血 淋者加梔子 莖中痛加蒲

黃 水瀉加車前子米飲調

梔子散治五淋見鈴註

車前子散

治水瀉完穀不化三二年久不愈瘦弱氣脫諸藥

難治

車前子 二兩去沙土炒

陳皮 二兩

甘草 一兩

右爲細末米飲調下

立効散

瞿麥 一兩

甘草 三分

梔子 半兩

右咬咀連鬚葱白燈草生薑同煎加連翹四兩桔

梗一兩蜜丸治癭瘤結核

金鑰匙散

治產後大小便不通腹脹等証

滑石

蒲黃 各等分

右爲細末酒調下

滑石治婦人過忍小便致胞轉滑石爲末葱白湯調

下二錢或三錢

塗臍法治大便不通 甘遂末內臍下白麩糊紙花

子帖仍及臍下近陰處別用甘草湯服之

傷寒類要腹痛滿不得小便及天行病雄黃細末蜜
丸如棗核大內溺孔中雄黃滅癩痕黑髮梅師治
妊娠淋瀝不通水道熱車前子葵根水煎服之
畜血 小便應秘而反自利甚色白

小便自利

腎虛 下焦不收胞有遺溺而頻

楊氏產乳子母二方治婦人妊娠小便不利蕪菁子

末水調服方寸七日二蕪菁即蔓青也

麻仁例 手陽明 太陽經亦可例之太陰津液不
行之根

麻仁丸 脾約丸 神功丸 潤腸丸

三朮丸 五柔丸 三和散 七聖丸

七宣丸 大麻仁丸

風熱燥寒秘用 半硫丸 快活丸

仲景麻仁丸

占方料

治脉實效汗浮芤相搏爲胃熱浮澀相搏爲便難

此三者皆燥而損濕故曰脾約

麻仁二升

芍藥半斤

枳實半斤

大黃一斤

厚朴尺一

杏仁一斤去皮尖
熬研作脂

右六味為細末煉蜜丸如桐子大飲下十九日三服漸加以和為度

活人脾約丸

見料太紙漉
數則大便難

麻仁半斤

芍藥二兩

厚朴二兩

大黃二兩

枳實二合

杏仁半斤

右為細末煉蜜丸桐子飲下十九丸未和益之汗效
胃熱便難三者皆燥而乏液故曰脾約脾約者求
置而不行也

千金翼并范任張文仲崔氏等方前與仲景同許學

士治年老虛人祕

大麻仁

紫蘇子各半
合

右碾細取汁分二作粥食之後不服藥而愈

局方大麻仁丸

主治脩製
並見局方

陳皮

杏仁

木香

潤腸丸蜜丸

陳皮 血加桃仁 丁香

活人五桑丸 主治脩製 並見局方

大黃 前胡 半夏 菴蓉 酒浸 當歸

芍藥 茯苓 細辛 芫蕪

右蜜丸桐子大溫水下二十九

局方中三和湯散

活人神功丸 主治並 見局方

麻仁 五兩 研 大黃 二兩 人參 半兩 訶子皮 二兩

右細末陳蜜丸桐子大溫水下二十九產後祕者

米飲下

局方七宣丸 主治脩製 並見局方

東垣云治在脉則瀦在時則秋

大黃 枳實 木香 訶子皮

柴胡 甘草 桃仁

右煉蜜丸如桐子大米飲下二十九

七聖丸 主治脩製 並見局方

東垣云治在脉則弦在時則春

檳榔 木香 川芎 郁李仁

羌活

桂心

大黃

右煉蜜丸桐子大溫水下十五丸

活人三脫散

主治脩製並見局方

獨活

白朮

陳皮

甘草

木香

大腹皮

紫蘇

木瓜

沉香

川芎

檳榔

右咬咀水煎服

半硫丸

治老弱虛人大便秘者此能利之易簡云此潤劑也

硫黃

半夏

主治脩製並見局方條下

快活丸

治中滿虛痞此燥劑也

良薑

乾薑

枳實

陳皮

木香

吳茱萸

右細末麩糊丸桐子大生薑陳皮湯下

海藏已寒丸

此丸不僭上陽生於下

治陰證服四逆輩胸中發燥而渴者或數日大便

秘小便赤澀服此丸上不燥大小便自利

肉桂

附子炮

烏頭炮

良薑

乾薑

芍藥

茴香 各等分

右細末米糊丸桐子大空心溫水下五七十九或

八九十九食前亦得酒醋糊丸俱得 仲景云跌

腸脉浮而瀉浮則胃氣強瀉則小便數浮瀉相搏

大便則難主病人洩數大便亦難 海藏云已寒

上五味雖熱者芍藥茴香潤劑引而下之陰得陽

而化故大小自通如得春和之陽水自消矣

五燥大便秘

東方

其脉弦風燥也

宜瀉風之藥治之

獨活

羌活

防風

茺藎

地黃

柴胡

川芎

南方

其脉洪熱燥也

宜鹹苦之藥治之

黃芩

黃連

大黃

黃蘗

芒硝

西南方其脉緩土燥也

宜潤溫之藥治之

芍藥

半夏

生薑

烏梅

木瓜

西方

其脉澀血燥也

宜滋血之藥治之

杏仁

麻仁

薏仁

當歸 氣精用木香

檳榔

枳實

陳皮

地黃

郁李仁

北方 其脉遲寒燥也 宜溫熱之藥治之

當歸

肉桂

附子

烏頭

硫黃

良薑

巴豆

仲景吐下之後不大便五六日至十餘日日晡所發

潮熱不惡寒獨語如見鬼狀劇者發則不識人循

衣摸床惕而不安微喘但發熱語者上誠則戲

今慌語也屬大承氣湯

枳實

厚朴

大黃

芒硝

右煎如常法一服利者止不必盡劑千金翼並同

海藏云此治下之後大便澀也循衣摸床者熱

之極也 自氣而之血上而下之至厥陰之分循

衣摸床撮空惕而不安擲手揚視手太陰也此下

而復上也熱而不得出故厥陰復傳于太陰也

地黃黃連湯

治婦人血氣證因大脫血崩漏成前後血因而枯

燥除熱不循衣撮空摸床閉目不省擲手揚視搖

動不寧錯語失神脉弦浮而虛內燥熱之極也氣

龕鼻乾而不潤上下通燥此為難治當服此藥

川芎七錢

當歸七錢

梔子三錢

生地黄七錢

黃芩

二錢

黃連三錢

防風二錢

赤芍藥二錢

右咬咀每服三錢水二盞煎七分取清飲無時徐

徐與之若脉實者加大黃下之 大承氣湯藥也

自內而之外者用之血氣合病循衣撮空其證相

同 自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之也

自血而之氣氣而復之血地黃黃連主之也二

者俱不得大便 東垣先生義論託空證並見難

知 許學生云屬厥陰潔古云屬太陰自下而上

畜血例

衄血畜血上焦心下手不近畜血中焦且臍腹小腫

大痛畜血下焦 畜血上焦或嘔或衄或吐此胸

中手不可近也

活人犀角地黃湯 易老云此藥為龕勝

犀角 如無以升 脉代之

芍藥 生地黄 牡丹皮

右咬咀水煎服 熱多者加黃芩 脉大來遲腹

不滿自言滿者無熱也不用黃芩升麻與犀角性味主治不同以升麻代之以是知引入陽也治瘡疹大盛如元虛人以黃芩芍藥湯主之活人黃芩芍藥湯治虛家不能飲食衄血吐血

白芍藥

黃芩

甘艸

二藥治傷寒衄血吐血嘔血一法加生薑黃耆

地黃散

治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黃 地骨皮 枸杞子

犀角地黃湯右等分焙乾為細末每服二錢蜜湯調下無時

疾 治心經邪熱及言語蹇澀發狂心惕恍惚惑忘之疾

生犀角

硃砂

黃連

白茯苓

生地黃

各一錢半 甘艸

牡丹皮

各一錢

右為釐末水煎

錢氏亦治傷寒少陽陽明合病

必勝散

治男女血妄行吐血嘔血咯血衄血

人參

當歸

熟地黃

小蘗根

川芎

蒲黃

烏梅肉

右等分釐末水煎去滓溫服無時

蘇皮湯

治衄血吐血嘔血皆失血虛損形氣不理羸瘦不能食心忪少氣燥渴發熱

生地黃

甘草

黃蘗

白芍藥

各一兩

右咬咀用醇酒三升漬之一宿以銅器盛米飲下蒸一炊時久漬汁半升服食後時對病增損 肘後用熟地黃水酒煎飲清

著石易

治產後血迷

海浮石

黃蘗

陳皮

甘草

等分

右細末陳米飲調下三五錢纔分晚連三服至差更無產後病 大破血點鷄冠上化水為驗 治室女月露滯澀心煩恍惚

鈆白霜細碾為散每服一錢地黃汁一合調下如無汁生地黃煎亦得 治鼻衄鈆白霜末新水調下一字

畜血中焦

仲景桃仁承氣湯 此即心下手不可近

易老用此獨治中焦以其內有調胃承氣湯也

棗仁

大黃

甘草

芒硝

右治牙齒等蝕數年不愈當作陽明畜血治之此湯細末煉蜜丸桐子大服之好飲者多有此疾屢服有效

畜血下焦 三焦畜血脈俱在左手中

張仲景抵當湯

脩製並見本方

水蛭

三十箇 蝨蟲

桃仁

大黃

右父阻水煎服

許州陳大夫傳張仲景百勞丸方

當歸

乳香

沒藥

蝨蟲

人參

大黃

水蛭

桃仁

右為細末煉蜜為丸桐子大都作一服可百丸五

更用百勞水下取惡物為度服白粥十日

編乃仲景潤水也

抵當丸與湯四味同但分兩減半搗細水調服 前

之百勞丸乃是此抵當丸內加人參當歸沒藥乳

香蜜丸瀾水下

通經丸乃仲景祇當丸內加川山甲廣茂桃仁桂蜜
丸婦人傷寒妊娠不可以此丸下當以四物湯大
黃各半湯下之在厥陰例四物湯調下

四血散 出診治明埋論

治鼻血口血大小便血服時隨病上下食前後

紫蘇

丹參

蒲黃

滑石

右各等分細末調

又方衛州張推官在戲院王公以職醫宿直夜口傳

此方治人勑者不可勝數尋常疑帶其効尤速任
種不謂經閉閉塞漸成癥瘕

蛭虫

麩炒四
十箇

水蛭

炒四
十箇

狂猫

去羽
足炒

當歸

牡牛膝

各二
兩

紅華

各三
錢

滑石

三錢
半

右細末每服一錢生桃仁七箇細研入酒調下如

血未通再服以通為度食前

韓氏微旨方

地黃湯

治病人七八日後兩手沉脉遲細微膚冷臍下滿

或喜或妄或狂或燥大便實而色黑小便自利者

此畜血證具也若年老及年少氣虛弱者宜此方
主之

生地黃 自然汁一升如無生地黃
只用生乾地黃末一兩

生藕 自然汁半升如無藕以薊刺汁半
斤如無薊刺汁用刺薊末一兩

藍葉 一握切碎乾
者末半兩 蛭蟲 三十箇去
足翅炒黃 桃仁 半兩
炒

大黃 一兩到如
散子大 水蛭 十
箇

右同一處水三升半同慢火熬及二升以來放冷

分三服投一服至半日許血未下再投之此地黃

湯此抵當湯也其實甚輕也如無地黃汁與藕汁
言升數亦同煎

生漆湯

病人七八日後兩手脉沉細而數或關前脉大臍

下滿或狂走或喜妄或譫語不大便小便自利若

病人年少氣實即血凝難下恐抵當丸力不能及

宜此

生地黃 汁一升如無汁只用
生薑地黃三兩半 犀角 一兩鎊
為末

大黃 三兩到碎
如散子大 桃仁 三十
箇碎

右作一處用水三升好酒一升慢火熬三升以來

傾出濾去滓再入鍋投點光生漆一兩半再熬之
至二升卽住淨濾去滓放冷作三服每投服候半
日許血未下再投一服候血下卽止服藥如無生
地黃汁更添水一升同煎

海藏云畜血可用仲景抵當湯丸恐庸醫不知藥性
用之太過有不止損血之候老弱虛人之禁也故
立生地黃湯蚘蟲水蛭大黃桃仁內加生地黃乾
漆生藕藍葉之輩也 又云生漆湯一方亦恐其
比之抵當湯則輕用之通則重用之破積消食則
重也食藥內乾漆礪砂非氣實不可用也
活人大黃湯

治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂者

桃仁 二十箇
麩炒黃

官桂 七錢

大黃 一兩

甘草 一兩

芒硝 二錢
半

木通 一兩

大腹皮 一兩

右咬咀每服四錢水一鍾煎至六分去粗溫服無
時此方細末煉蜜丸桐子大溫酒下二三十九治
婦人經閉或不調 右婦人經閉或不通當在此

條下亦在少陽例 經云二陽之病發心脾不得

隱曲女子不月 注云男子少精亦同 若登高

墜下重物撞打箭鏃刃傷心腹胸中停積鬱血不

散以上中下三焦部分分之以易老犀角地黃湯

桃仁承氣湯抵當湯丸之類下之亦有以小便同

酒煎治之者更有內加生地黃當歸煎服者亦有

加大黃者 又法虛人不禁下之者以四物湯加

川山甲煎服妙亦有同花蒞石散以童子小便煎

服或酒調下 此藥與寒藥正分陰陽不可不辯

也若瘀血已去以復元通氣前加當歸煎服亦可

又法筋骨損傷用左經丸之類或用草烏頭棗

肉為丸服之以行諸經者以其內無瘀血改用之

藥劑寒熱溫涼不一惟智者能擇之而不可偏

執也

掌中金丸 治婦人 乾血氣

川山甲 草烏頭 猪牙皂角 各二錢

苦丁香 苦葶藶 川椒 甘草

白附子 巴豆 一錢合用研

右爲細末生葱絞汁和丸彈子大每服一九新綿包定內陰中一日卽白二日卽赤三日卽血神效

五通丸

治婦人月水不通臍腹硬痛寒熱盜汗

乾漆炒

紅花

丁香

牡丹皮

當歸

官桂

廣茂

各半兩

右醋丸桐子大每服三十九當歸酒下米飲亦得
女子不月帝曰何以知其婦人之懷子也歧伯曰身有病而無邪脉若身有病而脉亦病尺亦不

丹毒散通五心煩熱

紅花

當歸

牡牛膝

桃仁

炒去皮

右等分每服三錢溫酒調下

通經丸

治室女經不通或痰痛或癥

桂心

大黃

青皮

乾薑

川椒

川烏頭炮

廣茂

乾漆炒

當歸

桃仁

右爲細末先以四錢米醋熬成膏和餘末七錢丸

桐子大空心醋湯下加至三十九丸溫酒亦得

結胸例

大小陷胸湯丸

主治並見仲景本方

右為細末生葱絞汁和丸彈子大每服一九新綿

包定內陰中一日即白二日即赤三日即血神效

五通丸 治婦人月水不通臍腹硬痛寒熱盜汗

乾漆炒 紅花 丁香 牡丹皮

當歸 官桂 廣茂各半兩

右醋丸桐子大每服三十九當歸酒下米飲亦得

女子不月帝曰何以知其婦人之懷子也歧伯

曰身有病而無邪脉若身有病而脉亦病尺亦不

至是經不調也胞閉亦同

桃華散治室女經閉不通五心煩熱

紅花 當歸 牡牛膝 桃仁炒法

右等分每服三錢溫酒調下

通經丸 治室女經不調或夜喜痛或癥

桂心 大黃 青皮 乾薑 川椒

川烏頭炮 廣茂 乾漆炒 當歸 桃仁

右為細末先以四錢米醋熬成膏和餘末七錢丸

桐子大空心醋湯下加至三十九溫酒亦得

結胸丸 大小陷胸湯丸 主治並見仲景本方

仲景大陷胸湯

大黃 芒硝 甘遂

右先煮大黃至八分去滓下硝一沸止後調甘遂末一字溫服利止後服

小陷胸湯

大黃 黃連 栝蒌實

右水二盞先煮栝蒌實至一盞半下諸藥煎取八分溫服未利再服下黃涎

大陷胸湯

大黃 葶藶 芒硝 杏仁

右上一二味為末下二味研和末如彈子大每服一丸入甘遂末半字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服一宿未利再服

活人大陷胸湯

主治並見本經

桂枝 甘草 人參

各三兩

大棗 三枚

栝蒌實 一枚去皮用四分之一

右剉麻豆大水二盞煎至八分去粗溫服胸中無

堅物者勿服

治結胸聖餅子灸法

黃連七兩

巴豆十四枚通去皮用

右爲細末噉和成膏安填入臍中以艾炷灸其上
候透方止神効 許學士治結胸內藥臍中並見
前活法

本艸治結胸蟻螿一箇碾生絹絞汁并花水調下

後見少陽蠶蟲丸條

王朝奉云大小陷胸湯丸不効宜增損理中丸

乾薑兩

人參

括萋

甘草

牡蠣各三兩

枳實炒二十箇

黃芩去皮括一兩

白木二兩

右細末煉蜜丸彈子大白湯半盞煎服不歇復與
之不過五六胸中豁然矣用藥神速未嘗見也本
方渴加瓜萋根不渴者除之汗者加牡蠣不汗者
勿用

宿食停蓄結胸具見微旨方此非若已病飲水過妙

成水結胸也韓氏茯苓陷胸湯主之

婦人血結胸 海蛤散在少陰仲景大蠶丸後活人

治婦人傷寒血結胸膈而痛不可撫近者宜

海蛤散

治婦人血結胸法當刺碁門仲景無藥此方疑非仲景之言然而頗有理姑有之

海蛤

一兩

滑石

一兩

芒硝

半兩

甘草

右爲細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胸膈血散膈中血裹則小腸壅滯胸中血不流宜此方若便利血行宜桂枝紅花湯治之

仲景文蛤散

治病在陽應以汗解之反以冷水嚥之若灌之其熱蔽卻不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴宜文蛤散若不差者服五苓散寒實結胸無熱證者與三物白散龐安常云小陷胸丸非也文蛤一兩爲散沸湯和服方寸匕

外臺治五蒸五方內有芒硝苦參蜜及青箱艾葉大黃石膏生地黃之類皆不出湯液用者各隨經虛實內外淺淡治之盡矣

古今錄驗解五蒸湯

甘草

一兩

茯苓

二兩

人參

二兩

乾地黃

三兩

竹葉

把

葛根

兩

知母

二兩

黃芩

二兩

粳米

一合

石膏

二兩

知母

二兩

黃芩

二兩

右十味以水九升煮取二升半分為三服亦可以水三升煮小麥一升乃煮藥忌海藻菘菜蕪荑米酪范註同 一方無甘艸茯苓人參竹葉

又五蒸丸

烏梅

鷄骨

紫苑

芍藥

大黃

黃芩

細辛

各五分

知母

四分

礬石

炒

括藹

桂心

各三分

右十一味細末蜜和丸桐子大飲服十九日二忌生薑生菜 一方無桂心自汗者加地骨皮無汗者加紫胡根

五蒸

實熱

黃連

黃芩

黃蘗

大黃

虛熱

烏梅

秦艸

柴胡

氣也

青蒿

鱉甲

蛤蚧

牡丹皮

小麥

血也

肺乾

烏莓

紫苑

天門冬

麥門冬

皮舌白

桑白皮

石膏

膚昏昧

牡丹皮

氣編身氣熱

人參

黃芩

梔子

大腸鼻口孔

芒硝

大黃

脉垂白淡語經絡

當歸

生地黃

心乾舌

黃連

生地黃

血髮焦

地黃

當歸

桂心

童子小便

小腸下唇焦

木通

赤茯苓

生地黃

脾唇焦

芍藥

木瓜

苦參

肉食魚味

芍藥

胃舌下痛

石膏

粳米

大黃

芒硝 葛根

肝眼黑

前胡

川芎

當歸

筋中焦

川芎

當歸

膽眼白失色

柴胡

括萋

三焦作寒作熱

石膏

竹葉

腎兩耳焦

石膏

知母

生地黃

寒水石

腦頭眩

羌活

地黃

防風

髓髓沸骨中集

當歸

地黃

天門冬

骨齒黑腰痛足逆變痺食藏

當歸

當歸

地骨牡丹皮生地黃

肉支細跌腫藏府俱熱

石膏

黃蘗

胞小便黃赤

生地黃

澤瀉

茯苓沉香滑石

膀胱左耳焦

澤瀉

茯苓

滑石

凡此諸蒸皆因熱病後食肉油膩行房飲酒犯之而成久蒸不得除變成疢病即來矣 右二方數條當在前外臺五蒸議論條下

仲景蜜煎煎法外又有猪膽和醋法灌穀道中崔氏

依仲景法亦用猪膽汁灌下部中立通 又有薑

兌一作銳法削生薑如小指長二寸鹽塗之內下部

中立通虛人不可下者宜用以其先結後溏也

崔氏云若胃有燥屎令人錯語宜承氣湯 若大

便利錯語宜黃連解毒湯 又云承氣湯舊有芒

硝以其有毒故去之用之甚安如服湯不得利者

用薑兌法用此又不得利者始可用加芒硝湯下

之 海藏云古人詳細不妄用如此今人好用涼

藥過泄之者宜觀此爲鑒戒也以上諸蒸或臟病
或腑病或臟腑俱病脉絡氣血交經相連用藥皆
當合而用之君臣佐使上下奇偶表裏虛實逆從
通塞汗下吐補俱在其中矣

醫聖元戒卷第四

醫聖元戒卷第五

明監察御史東萊桂學素才幹
趙州教授進之王好古次

兩淮運司四明屠本峻重刊
兩淮運副姚汪嚴昌世校正

少陽證 先足經從湯液 次手經從雜例

海藏論男子婦人傷寒同一法

活人云婦人傷寒治法與男子不同舉男子調氣女
子調血以爲大略舉脉緊脉緩脉洪爲傷寒傷風
熱病爲一證當汗當下不必調血而後行仲景不

分男女良以此歟此論然當猶為未也仲景亞聖也世醫所知仲景不知有是理乎聖人利物賢者述之事可以為天下則聖人已先據之矣何待世人明之乎聖人不言以其男女同診也後人不知湯液之源故立為婦人法則異於男子常人所易曉明眼者肯以此為是乎然以藥考之則可知也假令桂枝芍藥固榮而閉衛非血藥如何麻黃防風雖為之發汗本治乳子餘疾非血藥如何白虎小柴胡中知母則治腎柴胡則調經皆氣中之血

妙論

藥也當歸地黃不言可知為血藥白朮人參皆以為氣劑本草言能利腰臍間血非血藥乎大抵用之在陽便是氣藥用之在陰便是血藥若男子與女人傷寒皆榮衛受病其證一也何必云男先調氣女先調血也此二句雲岐子以為治禱病法之常體非為傷寒設也其所以異者以其任衝盛而有子月事行有期有熱入血室一證不得不異也在妊孕不得不保在經血不得不調表裏汗下何嘗有異也無汗下藥中增損自有調保之義活人

名語
可思

云妊娠不用桂枝半夏桃仁柴胡湯減半夏爲黃龍湯是則是矣必竟畜血極而隣於死須抵當湯丸則安得不用也是減劑從輕可也故黃帝云身重毒之何如岐伯曰有故無損亦無損也大積大聚可輕犯也衰其大半乃生過者死此所以有從輕之義活人注中舉似其言甚當仲景不言男子婦人有異其意蓋由諸此以知桂枝半夏桃仁可用處必用不可全無但當從輕則可以保安丸中有桂枝附牛膝皆墮胎之劑以其數多之中此少

是亦從輕而無妨也又爲引用必須少而不可無也大意如此從之君子更宜詳定保劑多破劑少破者從其保破劑多安劑少安者從其破此理不可不知又寒熱多少例寒者多熱者少熱不爲之熱熱者多寒者少寒不爲之寒

此婦人之病多在經血不調故婦人傷寒一條例少陽條下

仲景小柴胡湯

治往來寒熱胸脇痛而耳聾或欬或嘔尺寸脈俱

浮而弦、

柴胡

三兩

人參

半夏

黃芩

甘草

右咬咀生薑棗煎本經加減七法。此方亦治瘧與襍病中外不相及。襍病寒熱往來經水不調加秦艸芍藥當歸知母地骨皮牡丹皮川芎白朮茯苓去半夏。治婦人虛勞發熱加蛤蚧赤茯苓小柴胡湯與四物湯各半一名調經湯。無渴嘔者加半夏亦可。無汗者加柴胡。惡寒者加桂。有汗者加地骨皮。嗽者加紫苑。通經加三稜廣

茂勞者煎甲

又小柴胡後加法

若胸中煩不嘔者去半夏人參

加括蕒實二枚

若渴者去半夏加人參合前成

四兩半括蕒根四兩

若腹中痛者去黃芩加芍

藥三兩

若脇下痞鞭者去大棗加牡礪四兩

若心下悸小便不利去黃芩加茯苓四兩。若不

渴外有微熱去人參加桂三兩溫覆取微汗愈

若嗽去人參大棗生薑加五味子半兩乾薑二兩

血弱氣盡腠理間邪氣因入與正氣相搏結於

脇下正邪分爭往來寒熱發作有時默然不欲飲
食臟腑相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴
胡湯主之

8
易簡小柴胡湯

治傷寒溫病身熱惡風頭項強胸滿脇痛煩渴嘔
噦小便不利大便秘鞭或過經未解潮熱不除非
汗非下之證並宜服之及產後勞復發熱頭疼往
來寒熱婦人傷寒經水適來適斷發熱發寒晝則
明了夜則譫語此爲熱入血室則血必結故使寒
熱如痛狀此藥主之小兒溫熱悉能療

柴胡二兩

半夏

黃芩

人參

甘草

各二兩

右咬咀每服伍錢水鍾半生薑五片棗一枚煎至
六分去滓食前服 若腹痛去黃芩加芍藥半兩
心悸去黃芩加茯苓一兩 若不渴外有熱者去
人參加桂三分溫服令有汗則解 若咳嗽去棗
加五味子三分乾薑半兩 胸中煩而嘔者去半
夏人參加括萋實半兩 渴者去半夏加括萋根
一兩胸中痞鞭者加煨了牡蠣一兩傷寒十三日

不解胸脇滿而嘔者，晡則發熱，已微利，醫以丸藥利之，非其治也。宜加芒硝一兩，傷寒十餘日，結熱在裏，往來寒熱，或心下急，鬱鬱微煩，或口生白胎，大便不通，或發熱汗出，或胸中滿痛，或日晡發熱如瘥，或六七日，目中不了了，晡不和，無裏證，大便難，身發熱者，實也。去人參，加枳實、大黃一兩，名大柴胡湯。服之以利為度，熱除，不宜遽用補藥。仍忌羊肉、腰子酒，并難化之物，或有所傷，是名食復，難以治療，切宜忌之。

88 逍遙散

並見局方

柴胡

二兩

當歸

芍藥

白朮

茯苓

薄荷

少許

甘草

各半兩

右咬咀生薑煎服

勿謂云治婦人，大人小兒男

女同法

易簡逍遙散

治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忪，頰赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不調，臍腹脹痛，寒熱如瘥，又療室女榮衛不

和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓

白朮

當歸

白芍藥

柴胡

各一兩

甘艸

半兩

右咬咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片煎至六分去滓熱服無時。一方名人飲治婦人血熱虛勞骨蒸兼治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩燥頭目昏疼夜多盜汗補正氣解勞倦用人參白朮茯苓柴胡半夏當歸赤芍藥乾葛甘草黃芩各等分咬咀每服四錢水鍾半生薑四片棗二枚煎

至六分不拘時候應有勞熱證者皆可服之熱退即止但婦人寒熱亦因有經血結閉者致令五心煩熱及骨節間熱或作虛勞治之反以爲害積日既久乃成眞病法當行其經血若月事以時自然平治或以局方大聖散用紅花煎酒調服不能飲者以醋代之仍以紅丸子醋湯嚥下此二藥大治經事不調或腹有血塊若久無子息服之數月其効特異非可數服責其無功。或因下血過多發爲寒熱當用當歸地黃之類如大建中藥令養勞

雙和輩是也。然有痰飲停積之人，則雖用此，蓋當歸地黃與痰飲不得其宜，反傷胃氣，因是不進飲食，遂成真病。至於不救者多矣。痰飲中積，致生寒熱者，宜以二陳湯、參蘇飲等藥療之，應手其効。更有服退熱冷藥太過，因而咳嗽下利，發熱自汗，皆不可用之。惟真武湯增損，名固陽湯，仍以震靈丹服之，病輕者可療，重者當別求治法。

錢氏地骨皮散

秦朮 鱉甲 柴胡 甘草湯

秦朮 青蒿 烏梅 甘草湯

文潞公藥準注李琬方

柴胡 連翹 山梔子 防風 甘草

活人連翹梔子防風甘草湯 連翹飲子

四順飲子 一名清涼飲子 治夜則在血熱而不厥

加荆芥 白木 麻黃 爲洗心散

守真柴胡飲子 便鞭氣血各半 柴胡煮散

錢氏黍粘子荆芥防風甘草湯

局方消毒散 減防風餘三味

舉卿舉敗散

治婦人產後傷寒風痙角弓反張

柴胡桂枝湯小柴胡加桂枝芍藥是也

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡 黃芩 甘草 括蕞根 桂枝 乾薑

牡蠣

柴胡龍骨牡蠣湯小柴胡去甘草加鈆丹桂枝龍骨

牡蠣茯苓大黃

小柴胡加芒硝湯

治十三日過經不解大抵須看少陽不退而臟結

宜用小柴胡加桂湯治瘧疾兼支結

大柴胡湯

主治數條並見本經并活人藥證

柴胡 黃芩 半夏 生薑 大棗 芍藥

枳實 大黃

活人舉伊尹湯液大柴胡湯八味今監本無黃芩脫

落之也

瀟古老人云治表證仍在裏證已急不如此不可用

小柴胡去參艸加枳實大黃如緩治不減人參甘

草

漢師黃芩湯

治傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不利胸脅痞滿微熱而煩

柴胡八錢

半夏八錢

茯苓四錢

桂心三錢

黃芩三錢

右咬咀生薑水煎服之

易簡參蘇飲

治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積發以為熱並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法以被蓋臥連

進數服微汗即愈尚有餘熱更宜徐徐飲食服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進數服以熱退為期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既以枳殼橘紅輩自能寬中快膈不至傷脾兼大治中脘痞悶嘔逆惡心開胃進食無以踰此毋以性涼為疑一切發熱皆能作効不必拘期所因也小兒室女尤宜服耳

前胡加三分

橘紅

紫蘇

乾葛

半夏

茯苓

枳殼

陳皮

甘草

桔梗

木香

各半兩

右咬咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一枚煎至六分去滓不拘時候服素有痰飲者俟熱退以二陳湯或六君子湯間服。本方治痰飲停積中脘閉塞眩暈嘈煩忪悸嘔逆及痰氣中人停雷關節手脚鞣曳口眼喎斜半身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如傷寒者悉主之。一方用此藥三兩加四物二兩合和各茯苓補心湯大治男子婦人虛勞發熱或五心煩熱並治吐血衄血便血并婦人下血過多致虛熱者並得其宜。一亦有用心過度發熱者用之亦有神効往來寒熱尤宜治之。

易簡溫膽湯

治大病後虛煩不得睡兼治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥或異象眩惑遂致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證短氣悸乏或復自汗或四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安悉能主之。

半夏

兩一

枳實

兩二

橘紅

兩二兩半

甘草

兩四錢半

茯苓

錢三

右咬咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一枚竹
茹一塊如錢大煎至六分去滓食前熱服竹茹卽
刮竹青也大治傷寒後虛煩若傷寒後尚有餘
熱并熱在上焦兼汗下後表裏俱虛不可攻者宜
用人參竹葉湯下利者於竹葉湯中去石膏加熟
附名旣濟湯嘔者二陳湯一法治傷寒壞證時
或發熱消渴煩躁用新羅參不拘多少煎湯浸冷
水中俟盛渴之時與之頓服熱則隨去矣大抵傷
寒渴者不可多與水水多積胸中便爲結胸矣然

亦濡沫之可也傷寒之後有吃逆者此證危
其他證有此亦然當用半夏一兩生薑半兩白
煎服一方用丁香十粒柿蒂十五枚煎湯半鍾
乘熱頓服無時

易簡降氣湯

治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛隔塞痰實咽乾
不利咳嗽中滿喘急氣麓臍腹膨脹滿悶虛煩微
渴引飲頭目昏眩腰痛脚氣四肢倦怠此藥專治
脚氣上攻中滿喘急下元虛冷服補藥不差者立

効

前胡

厚朴

甘草

當歸

各一兩

肉桂

三兩

陳皮

三兩半夏五兩

右咬咀七味并紫蘇子五兩緣難得真者不用

紫蘇如前胡之數代之共為八味每服四錢水一

鍾半生薑五片棗一枚煎至七分去粗食後服

凡人中風中氣腫滿及脚氣等患多是虛氣上攻

胸膈不快不進飲食此藥大能降氣真俞山人降

氣湯後加參附五加大腹皮之類却非其真若

素脚氣只是上氣喘急不得卧者宜用橘皮紫蘇

人參五味子桔梗各等分名神秘湯甚者用此調

鍾乳粉下養正丹脚氣入腹大便秘不任冷藥

者宜用養正丹以溫利之一方以八味九加川

芎細辛桔梗茯苓共十二味名大降氣湯治法一

同若尊年人虛氣上壅當開以生附加生薑煎臨

熟磨以沉香服之尤為穩當

許學士地黃丸

此方當在大薯後

生薑

二兩

秦艽

黃芩

各半兩

柴胡

半兩

赤芍藥

牛

右細末蜜爲丸烏梅湯下三十九無時日二服學士云褚澄治寡婦僧尼室女別得其法諺其脉左手關獨出寸口過魚際乃知女子思男而不可得也。或云寡婦師尼不可言僧字然爲當以經勞之二陽病發心脾不得隱曲故女子不月此一條本爲女子而言王淮內復云男子少精是經言女而註言男皆勞也言僧一字亦兼男之義 倉公傳濟北王侍人女病腰膝疼熱倉公曰病得之欲男不可得何以知之診其脉弦出寸口是知之婦人以血爲本血盛所以思男也 褚澄云僧尼則異妻妾學士改僧字爲師字甚當經云女子不月條下王註云男子少精兼之意也又知僧字兼男之義 易老云仲景治婦人經不調盡在小柴胡調治條下以此推之

活人梔子烏梅甘草黃芩柴胡湯

治懊懷煩燥不得眠右五味麤末生薑水煎加竹葉鹽豉三十粒

仲景治少陰心悸不致水火調其中而治本也仲景云少陰證四逆條下言或咳嗽或悸或自便是假令一證並不是上下一條通為一證也或悸而反舉之言姑以四逆散主之若果四逆必不用於此也何以然下文云悸者加桂腹痛不利者加附子即知雲歧子於此正條內去或悸二字并散便用四逆湯下所主甚當

金匱大薯預丸 治虛勞諸不足風氣百病

薯預 三十分 當歸 十分 桂枝 十分 麴 十分

乾地黄 十分 大豆黃卷 十分 甘草 二分

人參 七分 芎藭 六分 芍藥 六分

白朮 六分 麥門冬 六分 柴胡 五分

茯苓 五分 乾薑 三分 阿膠 七分 蛤粉炒成珠

杏仁 六分 白斂 二分 桔梗 五分

防風 六分 大棗 百枚 為膏

右二十一味細末煉蜜丸彈子大空心酒下一丸

一百九劑

外臺秘要仲景病源小品方

太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴胡

湯證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急云嘔不安

鬱鬱微煩者為未解也可與大柴胡湯下之即愈

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半斤
湯洗

大棗二十箇 生薑五兩 枳實四箇
擘破 兩 炙

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取

三升溫服一升日服一方加大黃二兩今不如大

黃恐不名為大柴胡湯也忌羊肉湯兼治天行千

金翼肘後同 海藏云正經嘔家雖多陽明證不

可下大柴胡主治但言嘔不止心下急大柴胡湯

下之不可疑也及點示正方即內無大黃却與本

條相合 注中小字亦作嘔止小安仍未解者即

宜大黃也故注後有加大黃一句若全用有大黃

却是易老法治表證仍在裏證已急者也古人用

藥其精妙如此

龍腦雞蘇丸 增損比之御藥院尤妙

除勞解熱下氣散鬱去肺熱咳血心熱驚悸脾胸

熱口甘吐血肝膽熱氣出口苦腎熱神志不定上

而酒毒膈熱消渴而血利五淋血崩此藥清神爽
氣潤肺開心益志滋肝補腎令人身強體輕耳目
聰明又能利膈化熱痰去膀胱中積熱三焦永無
滯塞

雞蘇葉

龍腦薄荷是也

黃耆

二兩

麥門冬

去心四兩

甘草

一兩半

黃連

一兩

乾地黃

六兩為末

人參

二兩

木通

二兩

新蒲黃

二兩

阿膠

炒焦二兩

柴胡

銀州鼠尾紅色者二兩剉同木通沸湯半升浸

微取汁一日夜

右為細末用西路好蜜二斤餘先煉一二沸然後
下生地黃末不住手攪時時入絞下者木通柴胡
汁慢火熬成膏勿令火緊焦了然後將其餘藥末
和丸如豌豆大每服二十九丸白湯下 虛勞煩熱
梔子湯下 肺熱黃芩湯下 心熱悸動恍惚人
參湯下 唾咯吐衄血去心麥門冬湯下 脾胃
熱赤芍藥生甘草湯下 肝熱防風湯下 腎熱
黃栢湯下以上諸證並食後臨臥 治五淋及婦
人血崩漏下車前子湯下 莖中痛蒲黃滑石各

一錢溫水調下 室女虛勞寒熱潮作煎柴胡人

參湯下 痰嗽者生薑湯下氣逆者橘皮湯下

黃耆膏子煎丸

人參 半一兩 白朮 半一兩 白芷 錢五 柴胡 揀淨一兩

黃芩 兩一 甘草 錢五 鼈甲 一箇半手大者酥炙

右細末黃耆膏子丸如桐子大每服三十九至五

十九百沸湯空心食前下 黃耆半斤鼈末水二

斗熬至一斗去滓再熬不住手攪成膏至半斤入

白蜜一兩再熬令蜜錫熟得膏子十兩放冷丸藥

此為夏劑冬約量用之

地骨皮枳殼散

治骨蒸熱肌肉消瘦力少困夜多盜汗

地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼 知母 當歸

鼈甲 醋炙黃

右等分為末水一鍾桃柳枝頭各七箇薑三片烏

梅一箇每服三錢煎至七分去滓溫服空心臨臥

黃龍湯 治產前

小柴胡法半夏加芍藥是也 一法以四物湯加

蒲黃亦名黃龍湯

柴胡鼈甲散

大便秘者柴胡鼈甲散 大便溏者半氣半血道
逢散

柴胡 知母 具母 地骨皮 鼈甲 醋炙 黃

右細末蒿心七葉烏梅三箇同煎

王氏秦艽散

秦艽 一兩 半 柴胡 二兩 知母 一兩 鼈甲 一兩 半 醋炙

甘草 一兩 炙

右咬咀棗煎服

局方秦艽鼈甲散

局方沉香鼈甲散

局方人參荊芥散 已上三方主治 修製並見局方

孫用和小柴胡治瘴疫久瘡面黃肌瘦不以月日淺

淡悉皆治之

心胸痞不思飲食加陳皮渴者加

括萋根喘者加杏仁便秘加大黃脅痞鞭者加牡

礪三五劑去皮 去半夏加人參括萋根名曰黃

龍湯 虛煩熱竹葉湯此溫熱證與濕熱證與傷

寒稍別。療傷寒一桂枝二麻黃三青龍四白虎五柴胡精當不差立時見効不必須候轉泄其間變壞悔之晚矣。如色脉交亂須辨明白無疑。陽盛熱多則白虎竹葉陰盛寒濕則四逆理中以此思之又豈有三百九十七法耶。雲岐子論正法與此同意。王朝奉舉杜士云凡春夏宜發汗秋冬不宜汗秋冬傷寒只用小柴胡頓服自愈無汗亦愈若未變傷寒疑是風氣痰壅等皆治之若渾身痛小柴胡加桂尤妙也。

犀散

治小兒骨蒸日晚潮熱夜間盜汗能飲食無肌肉病後餘毒傷寒後服熱物發熱不除及食羊肉物

羚羊角

地骨皮

秦艽

枳殼

大黃

麥門冬

赤芍藥

茯苓

柴胡

人參

桑白皮

黃耆

鼈甲

醋炙黃色各等分

右咬咀青蒿水煎去滓溫服

活人姪婦傷寒加減例

姪婦傷寒仲景無治法非無治法也以其有岐伯

有故無損可犯。衰其大半一條更不必云。謂紛紛也。所以不言明者當識。謂如瘧濕暍一篇無藥。仲景豈無治法。而知藥哉。恐後人有所遺耳。活人治婦人傷寒。妊娠服藥。予謹考而詳之。無論有胎無胎。產前產後。主治藥味皆不出。檢聖人意。計云俗方可采者。與其間參用。則知其間亦有達古人意者。何必云以法考之。疑非古方也。發熱惡寒。不離桂枝芍藥。往來寒熱。不離柴胡前胡。大渴。不離知母石膏五味子麥門冬。大便澀者。不

離桂枝白朮附乾薑

大便結。不離大黃黃芩。

經水適來適斷者。不離小柴胡。

安胎。不離人參。

阿膠白朮黃芩。

發汗。不離豆豉生薑麻黃旋覆

花。頭疼。不離前胡石膏梔子。

傷暑。頭痛。不離

柴胡石膏甘草。

滿悶。不離枳實陳皮。

胎氣不

安。不離黃芩麥門冬人參。

發斑變黑。不離黃芩

梔子升麻。

觀此數條。皆不出古人意。豈可云仲

景無治法。不言婦人妊娠之的方也。仲景一書。婦

人小兒兼之矣。

活人論婦人傷寒。但云仲景不

言其意已足不可云仲景無治法以治之藥求之皆仲景本意曷嘗出古人哉活人此言雖失亦急爲後人不知湯液者言之也豈敢云仲景不知也活人之言失之過而不甚的當耳

不老丹例

不老丹

何首烏

蒼朮

桑椹

前如法

並見活法

局方何首烏蒼朮地黃煎

右地黃膏子煎與蒼朮煎合點服氣血全養無上

神藥也

不老丹歌

皇甫敬之作爲德甫服此七十而無白髮

蒼朮四斤泔浸軟

竹刀刮皮切作片

一斤炒以四兩鹽

一斤椒炒黃色變

一斤各用酒醋浸

三味出之以日見

何首赤白各二斤

泔浸竹刮切來勻

棗豆五升同一甌

棗豆爛時曝乾成

地黃二升通搗細

椹汁和之如麴劑

置在盆中手按平

仍澆樾汁高三指

夜取月精晝日華

汲盡樾汁藥乃佳

其藥精乾麩作塊

亦用石臼搗無害

搗之細熟湏細羅

煉蜜為丸桐子大

空心酒服一百丸

此是人間不老丹

又方

何首烏

一斤赤白相半

棗

一升入鍋內用河水煮了却以竹刀切開炒乾去核

同牛膝

酒浸焙乾一兩

防風

用水洗浸去蘆二兩

右為細末石臼杵棗肉丸梧桐子大空心温酒下

五十粒

又方

何首烏

一斤

牛膝

一兩

熟地黄

二兩

蒲黃

一兩

乾桑椹

二兩

右為細末蜜丸桐子大棗蜜各半丸亦得

逐風丹

治風痰通身疙瘩

地骨皮

一兩

何首烏

一斤

黑豆

三升河水煮乾

荆芥穗

四兩

甘草

四兩

右為細末酒調三錢或蜜丸彈子大細煖一丸茶

酒任下

治瘰癧 瘤氣瘦起結疔瘰癧

右用黑熟桑椹二升新布絞汁砂鍋內熬不犯鉄
釜後成膏子沸湯點服

又治瘰癧經年久不差者以玄明粉末傳之日二次

消瘦丸 治結核瘦氣

連翹 梔子 桔梗 甘草 乾柿 防風

牡礪 玄參 丹參 荆芥 續斷 鼠李

海藻 昆布 何首烏 白殭蚕 牛旁子

白頭翁 各等分

治瘰癧氣瘦起

連翹 梔子 瞿麥 防風 乾柿 桔梗

甘草 各等分

右細末蜜丸桐子大服

五香連翹湯

治癰疽瘰癧瘰癧風結腫氣惡瘰癧毒氣瘡氣入腹嘔逆

惡心并皆治之

木香 沉香 獨活 升麻 甘草 麝香 半兩

兩

連翹

乾葛

各二兩

桑寄生

淡竹茹

薑陸香

二兩

雞心香

右咬咀煎成人茹

治瘦鷺鷥丸

海燕

海帶

海蛤

木通

青皮

昆布

訶子

去云連翹

各等分

海蠶沙

款冬花

右細末煉蜜丸雞頭子大每服一九臨卧噲化津

嚥下

孫尚藥方 治小兒盜汗潮熱往來

南蕃胡黃連

柴胡

各等分

右細末煉蜜丸雞頭子大每服二九至三五九鈞

石鈔子內用酒少許化開更入水五分重湯煮二

三十來沸放溫食後和滓服

治傷寒勞復身熱大小便赤血色者

胡黃連

一兩

山梔子

一兩

去殼

右件和炒微焦二味為細末用猪膽汁和丸桐子

大每服生薑三片烏梅一箇童子小便三合浸半

日去粗食後煖小便令溫送下十九臨卧再服妙

青蒿散 治骨蒸便軟渴者

青蒿 烏梅 秦艽 甘草 各等分

右吹咀同小麥煎服

金匱要略瘡病脉證并治證三條方六首

師曰瘡脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小急者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大可吐之弦數者風疾也以飲食消息吐之問曰瘡以月以日發當以十五日愈設若不差當月盡解也如其不差當云何 師曰此結為癥瘕各

日瘡毋急治之宜鼈甲煎丸

鼈甲煎丸

鼈甲 十二分 灸 烏扇 二分 燒 黃芩 三分 柴胡 六分

石葦 二分 去毛 厚朴 三分 瞿麥 二分 紫葳 二分

半夏 一分 泡 人參 一分 牡丹皮 五分 熬 蜜蟲 五分 熬

阿膠 三分 炙 蜂窠 四分 熬 芒硝 十一分 蜣螂 六分 炙

大黃 三分 芍藥 五分 桂枝 三分 去皮 葶藶 二分 熬

桃仁 三分 去皮 炙 鼠 一分 炙

右二十二味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五

斗浸灰候酒盡一半着鱉甲於中煮取泛汎如膠
漆絞取汁內諸藥煎爲丸如桐子大空心服七丸
日三服

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩滿手足熱
而欲嘔名曰痺瘡若但熱不寒者邪氣內藏於心
外舍分肉之間令人消鑠肌肉溫瘡者其脉和平
身無寒但熱骨節煩疼時嘔宜用

白虎加桂枝湯主之

知母六兩

甘草炙二兩

石膏一斤

桂枝三兩

粳米六合

右五味㕮咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至三
升溫服一升日三汗出愈

蜀漆散

治瘡多寒者
各日牡瘡

右杵爲細末未發前以漿水服三錢 溫瘡加蜀

漆半分臨發時服一錢七 一方雲母作雲實

牡礪湯

治牡瘡

牡礪四兩

麻黃四兩

甘草二兩

蜀漆二兩

洗去蘆

右咬咀以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升
內諸藥取二升去粗溫服一升吐則勿更服見外臺
小柴胡去半夏加栝蒌湯見外臺經心
治勞瘵

柴胡八兩 黃芩各二兩 生薑三兩
切片 大棗十二
枚

人參 栝蒌根四兩

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升去粗再煎
取三升日三服

柴胡桂薑湯

治寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神故錄之

柴胡八兩 桂枝三兩
去皮 黃芩三兩 牡蠣二兩
熬

甘草炙二兩 乾薑二兩

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升去粗再煎
取三升溫服一升日三初煩汗出愈出傷
寒論

九轉靈砂丹治瘰

紫河車一錢八研細
和前後二味 鉛一錢 信一錢

右用雄黑豆一百粒水浸一宿去皮透時研如泥
和三味勻末丸桐子大棗豆大黍粒大三等量虛
實老幼大小服之每服一二丸或三丸臨晨日未

出東面無根水下不發日服經曰當其盛必毀因其衰也是必大昌此之謂也

又方治瘡久不愈

右用蒜不以多少杵和鉛丹九雞頭大每服一九
臨晨面東新水下

海藏瘡論

暑之爲病以瘡舍於榮衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑感風寒而得之邪并於陽則發熱冰水不能涼邪并於陰則發寒湯火不能溫并

則病作離則病止故有時而休在氣則發之早在血則發之晏淺則日作深則間之或在頭項或在背巾或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽則一也或在四肢者風搖之所及隨所傷而作不必盡當風火也先寒而後熱者爲之寒瘡先熱後寒者爲之溫瘡二者不當治水火當從乎中治中治者少陽者渴者燥盛也不渴者濕勝也瘡雖傷暑遇秋而發其不應者秋病寒甚太陽多也冬病寒不甚陽下爭春病則惡風夏病則多汗二者手少陽

虛也。其病隨四時而作。異形如此。又有得之於寒而發之於暑。邪舍於腎。足少陰也。有藏於心。居之於內。熱索於肺。少陰也。至於少氣煩冤。首足熱而不寒。爲之瘡癢。足陽明也。治之柰何。當其盛而必毀。因其衰也。是必大昌矣。治法易老。瘡論備矣。

問曰。婦人經痛。大人小兒內熱潮作。并瘡寒熱。其法同否。帝又問曰。病中外何如。岐伯曰。從內之外者。調其內。若盛於外者。先治內而後治外。此言表裏而出之異也。又云。中外不相及。則治主病。中外不

相及者。半表裏也。自外而入者。有之自內而出者。亦有之外入內出。雖異也。在半表裏則一矣。此從外之內者。治其內。若盛於內者。先治外而後治內。中外不相及。爲少陽也。治主病者。治少陽也。帝問大熱之病。惡寒發熱。如瘧。或發一日。或發間日。岐伯對曰。以勝復之氣。會遇之時。有多有少。陰多陽少。其發日遠。陽多陰少。其發日近。此勝復相搏。盛衰之節。瘡亦同法。瘡者。少陽也。少陽者。東方之氣也。逆之則發寒。順行則發熱。故分之氣異。往來之

不定也。婦人經水適來適斷，病作少陽治之，傷寒雜病一體。經云：身有娠而有脉邪，經閉也。又云：月事不來者，胞脉閉也。經閉者赤中不至，胞閉者生化絕源，二者皆血病。厥陰主之，厥陰病則少陽病矣。累及其夫也。小兒外感內傷，若有潮作寒熱等證，並同少陽治之。男女同。已上男子婦人小兒。閨女或實或大熱，或虛變成勞脉，有浮中沉之不同。故藥有表裏和之不一。察其在氣在血，定其行陰行陽，使大小不失其宜，輕重各得其所，逆從緩急，舉無不當，則可以萬全矣。此少陽一治不可不知也。

素問五藏瘕證湯液

脾瘕令人色蒼蒼然，太息其狀若死，者通脉四逆湯。

胃瘕令人病也，善飢而不能食，食而支滿腹大，理中湯理中丸。

心瘕令人煩心，甚欲嘔清水，及寒多不甚熱，桂枝加黃芩湯。

脾瘧令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出小建
中湯芍藥甘草湯

肺瘧令人心寒寒甚熱熱間苦驚如有見者桂枝
加芍藥湯

腎瘧令人洒洒腰脊痛不能宛轉大便難日昃胸
然手足寒桂枝加當歸芍藥湯

素問六經瘧候湯液

少陽^陰令人身體解傷寒不甚熱不甚惡見人見人
心惕然熱多汗出甚小柴胡湯

厥陰令人腰痛小腹滿小便不利如瘧狀非瘧也
數便意恐懼氣不足腸中悞悞四物玄胡苦練附
子湯

陽明令人先寒洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜日
月火光氣乃快然桂枝二白虎一黃芩芍藥加桂
湯太陰令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病
至則善嘔已乃衰小建中湯異功湯

太陽令人腰痛頭暈寒從背出先寒後熱焯焯暍
暍然熱止汗出難已羌活生地黃湯小柴胡加桂

湯

少陽令人悶嘔吐甚之寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已小柴胡加半夏湯

小柴胡湯議論

小柴胡湯不汗不下不利小便故潔古名三柰湯也。後人用六乙涼膈和解之不知何意涼膈氣中之下藥六乙則雜病膀胱中和小便藥也。少陽證當陽明與太陰之間故云半表裏所以小柴胡不汗不下不利小便令六乙涼膈既利而復下之故

有畜血心下痞澀豈可輕用爲哉若以利下之劑爲可用則古人麻黃承氣五苓合而用之也豈爲有失古人之意其言非輕明者當識半在表乃身後之表半在裏非下之半在裏乃身之前之裏則藥不至於差惑

舌胎滑例 王奉朝證治論藏結附

舌上胎滑此丹田有熱也。脉陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥倦卧足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄語也到七八日以來微熱手足温爲欲解或八日

以上皮反大發熱者爲難治設使惡寒者必欲嘔也可以柴胡去半夏加人參括萎湯出小柴胡湯加減法 腹中痛者可理中丸 藏結如結胸狀飲食如故時時下利脉浮關脉小沉細緊名曰藏結舌上胎滑者難治可刺關元穴 藏結無陽証不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌上胎滑者難治也 可刺關元穴服小柴胡湯佳 陽明病脉浮而緊咽燥口舌腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若下則胃中虛客熱熏膈心中懊憹

舌上胎滑者服小柴胡湯 胃氣和汗出而解

三焦熱用藥大例

上焦熱

清神散 連翹防風湯 涼膈散 龍腦飲子

犀角地黄湯

中焦熱

小承氣湯 調胃承氣湯 洗心散 四順清涼

飲 棗仁承氣湯

下焦熱

大承氣湯

五苓散

立効散

八正散

石葦散

四物湯

抵當湯丸

海藏云此內熱之大略也有外熱者當求別法兼此例有輕重氣血之分用者當擇其可焉而已矣