中华古籍保护

脾胃第二十五

補土升陽瀉陰湯　調中益氣湯
木香分氣丸　二朮半夏丸
冲和健脾丸
黃耆人參湯　清神益氣湯　人參芍藥湯
益胃湯　生姜和中湯　温胃湯
和中丸　異功散　木香人參生姜枳朮丸
木香檳榔和中丸　交泰丸　平胃散
散滯氣散　升陽順氣湯　參朮調中湯
寬中進食丸　厚朴温中湯　沉香温胃丸

人參補氣湯　趙術丸　月窟散
內傷第二十六
枳术丸　雄黃聖餅子　木香柹兵椰丸與氣滯條不同
備急大黃丸　神保丸　三稜消積丸
解醒湯　黃著建中湯　導氣枳實丸
大枳殼丸　煮黃丸　橘皮枳實丸
趙蘗枳實丸　半夏枳术丸　木香枳术丸
术香乾姜枳术丸　三黃枳术丸　感應丸
神應丸　大安丸　保和丸
秘方化滯丸　升陽補氣湯　上二黃丸
白术丸　木香見喫丸　導飲丸
蠲飲枳實丸　單方二條
痞滿第二十七
瀉心湯　枳梗湯　平補枳术丸
小陷胸湯　枳梗二陳湯　黃連丸
黃連消痞丸　三黃瀉心湯　順氣導痰湯
吳茱萸湯　枳實理中丸　附子瀉心湯
柴胡桔梗湯　小半夏茯苓湯　桂枝人參湯
十棗湯　半夏瀉心湯　旋覆代赭石湯
小柴胡加乾姜牡蠣湯　甘草瀉心湯　生姜瀉心湯

枳實消痞丸　木香順氣湯
會痞氣法
癇痞氣法
氣滯第二十八
正氣天香湯
三和散
柴陳湯　枳殼煮散
木香化滯湯
十味温胆湯　退熱清氣湯
流氣飲子
人參養榮湯　蘇合香丸　用藥法
烏附湯
木香流氣飲　蟠葱散
木香檳榔丸
快氣湯　木香順氣丸
酒病第二十九
三花益脾丸
雙花下酒丸　列仙散
葛黄丸
消酒毒丹　烏梅丸
又烏梅丸
潔古百杯丸　八仙散
常醒散
傷酒食不藥可愈法二條一方
嘔吐第三十　附暈船吐
荆黄湯　紫沉丸　木香匀氣散
丁胡三建湯　丁半湯　養正丹
四物霍葉湯　大半夏湯　桔梗湯　與咳嗽條方不同
大黄甘草湯　文蛤湯　陳皮湯
生姜汁半夏湯　厚朴麻黄湯　麥門冬湯　與咳嗽條方不同

藿香平胃散　加味二陳湯　丁香安胃湯
茯苓半夏湯　椒茶餅　煨姜秘方
竹茹湯　碧霞丸　生姜人參湯
茯苓澤瀉湯　單方三條
噎膈第三十一
參夏湯　瓜蔞實丸　狗米平胃散
參仁丸　五膈寬中散　人參利膈丸
五噎湯　單附子散　厚朴丸
萸連湯　錢氏白朮散　導滯通幽湯
丁香煮散　五膈湯
飥逆第三十二
橘皮半夏生姜湯　橘皮湯　橘皮乾姜湯
羌活附子湯　猪苓湯　十味柴胡湯
黃柏丸　柿蒂湯　温中散
三香散
乾霍亂附子湯　理中湯　四逆湯
吐利第三十三
茱萸湯　吳茱萸湯　生薑半夏湯
小半夏湯　小半夏加茯苓湯
大半夏湯　橘皮竹茹湯
反胃第三十四
丹溪治反胃方　丹溪治反胃方　丹溪治反胃方

諸證提綱卷之三目錄終

秀水陳文治編
關中秦應禎校

諸證提綱卷之三

脾胃第二十五

諸病之作皆本於脾胃故東垣有脾胃虛實傳變論藏氣法時升降浮沉補瀉論脾胃勝衰論無非發明內經之旨但引喻太繁詞理過深反使人企足宮墻而至廢閣矣茲併三論之大意而摘其要曰飲食入胃陽氣上行津液與氣入於心貫於肺充實皮毛散於百脉脾稟氣於胃溉灌四旁榮養氣血陰陽各安其位故胃中元氣常盛能食而

不饑過食而不傷脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦若食少而肥乃脾實而邪氣盛四肢必不舉食多而瘦乃胃伏火邪於氣分食已則易饑大腸移熱於胃善食而瘦謂之食佚移熱於膽亦謂食佚食佚即消中也至於飲食失節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時顯火上行獨燎其面帝鍼經云面熱者足陽明病也胃既病則脾無所稟受脾爲死陰不主時也故從而病焉形體勞役則脾病脾病則怠惰嗜臥四肢不收大便泄瀉脾既病則胃不能獨行津液亦從而病焉二經既病火邪遂得以乘之濕熱相合由是而陰氣有餘陽氣不足九竅不通然諸陽之氣根於陰血陰血既受火邪則陰盛陽陽道不行不能生發升騰陰火獨炎於上而走空竅以至燎於周身經云至而不至是爲不及所勝妄行所生受病所不勝乘之也所謂至而不至者言心與小腸來乘脾胃脾胃脉浮大而弦其病煩燥悶亂或四肢發熱或口苦咽乾乾緣心主火小腸主熱火熱相乘濕與熱合故致煩燥悶亂脾胃二經俱主四肢火乘其位故四肢發熱脾裹血胃主血熱伏血分津液不行故口苦咽乾忌用五苓散反竭津液也其脾胃不足火不生土之證惟當用白朮爲君人參黃芪爲臣甘草白芍藥桑白皮爲佐黃連爲使其治心

火尤盛乘於土位之證黃連爲君黃栢生地黃爲臣白芍藥石膏知母黃芩爲佐甘草爲使所謂所勝妄行者言心火旺則子能令母實肝木得挾火之勢以妄行則土受其制或身體沉重走注疼痛緣濕熱相搏風熱鬱結故時多恚怒胸脇疼痛口苦舌乾往來寒熱而嘔若風熱陷於肝中則目生肉障蓋目爲肝之竅也或妄見妄想或夜夢顛倒四肢閉滿轉筋淋溲便難或痿或痺或腫或厥或中風或惡瘡或腎痿或上熱下寒或腹中急痛爲邪不一無非風熱不得升發木火遏於有形之故此柴胡爲君防風白芍藥肉桂甘草爲臣羌活獨活白朮白茯苓澤瀉黃栢爲佐升麻爲使猪苓蒺本川芎細辛蔓荆子白芷石膏知母滑石加減用焉所生受病者言脾土受火木之邪土虛不能生金則清肅之氣傷矣肺主氣五臟之氣俱不足或咳嗽氣短氣上胸滿皮毛不能禦寒精神少而渴情慘慘不樂皆陰氣有餘陽氣不足也以人參爲君橘皮黃芪爲臣白朮白芍藥桂枝桑白皮甘草木香檳榔五味子爲佐少用青皮以破滯氣兼用桔梗引經所謂不勝乘之者言木旺運行必越左遷入地助其腎水母得子附乃入脾爲痰涎自入爲唾入肝爲泪爲眵入肺爲涕乘肝木而反尅脾土土火復之致督任衝三脉爲邪足不任身脚心疼痛不能踐

地骨乏無力喜睡腹痛外腎寒冷腰脊背髀皆痛用乾姜爲君白朮川烏頭爲臣蒼朮白茯苓猪苓及少加熟附肉桂爲佐澤瀉爲使以治之其各藥辛甘苦寒温之味皆非獨用或火或酒各隨其製引使至於頭頂復還腎肝乃升降浮沉之道也升發陽氣出於陰分以走九竅若其脉緩而病至於怠惰嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝也從平胃散若脉弦氣弱自汗四肢發熱或大便泄瀉或膚槁髮落從黄芪建中湯脉虚血弱本證藥内摘加四物一二味若眞氣虚弱及氣短脉微從四君子湯或渴或小便閉澁或赤或黄或多或少從五苓散去桂或摘一二味加本證藥内若表虚自汗春夏加黄芪秋冬加桂如腹中急縮或脉弦加防風急甚加甘草腹中窄狹或氣短亦如之腹滿而氣不轉者勿加雖氣不轉而脾胃中不和者勿去但少加厚朴以破滯氣腹中膨悶乃散而不收加白芍藥若肺氣短促或不足加人參白芍藥中焦用白芍藥者蓋升脾中之陽弗使肝胆之邪得犯也若腹中窄狹急縮則忌酸藥腹中痛加甘草白芍藥兼發熱者加黄芩惡寒或腹中寒加桂怠惰嗜臥有濕或胃虚不能食或沉困或泄滯加蒼朮自汗加白朮小便不利加白茯苓渴亦如之氣弱者加白茯苓人參氣盛者加赤茯苓縮砂氣不能轉運有

熱者微加黃連心煩亂亦如之小便少者加豬苓澤瀉汗多勿用不渴而小便閉塞加炒黃栢知母小便澁者加炒滑石小便淋澁加澤瀉若小便不利無惡寒則五苓散中去桂不渴而小便自利妄行妄聞乃瘀血證用黃栢知母以除腎中燥熱竅不利而淋加澤瀉炒滑石若不利而無淋六一散中加木通心臟熱者道赤散中滿腹脹加厚朴氣不順加橘皮氣滯加青皮一橘皮三氣短小便利四君子湯去茯苓加黃芪腹中氣不轉加甘草一半腹中刺痛或周身刺痛或裏急腹中不寬快或虛坐而大便不得皆血虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛俱加歸身頭

痛加川芎少陰苦頭痛加細辛髮脫膚下痛加熟地黃大凡脾胃病則當臍有動氣按之則築築然堅牢如有所積硬則大痛及食後困倦昏冒喜睡有是者則爲脾虛脾弱故諸經諸疾相繼而作其脉證雖有相兼要皆不外乎脾胃也蓋胃爲十二經之源水谷之海授氣於大小腸膀胱三焦胆與本經之六腑復授氣於心肝脾肺腎之五臟以通乎九竅十二經十五絡四肢以滋養周身本體既虛則濕土之氣陷於臍下腎與膀胱俱受其制潤澤之氣自不能行故主津之大腸主液之小腸亦無所受則津液不濡肌膚不潤睡臥之間口燥咽乾且小腸主周身之陽氣胆

經主周身之血氣亦皆不能升發浮散伏留於血脉之中或爲熱病或爲中風不可勝紀其脾之初病也不能食而肌肉削右關脉緩而弱若本證脉中兼見弦脉四肢滿閉淋溲便難轉筋一二證此肝之脾胃病也本經藥內加風藥以瀉之若本證脉中兼見洪大或見肌熱煩熱面赤不能食饑肉消削一二證此心之脾胃病也本經藥內加瀉心火之藥本證脉中兼見浮濇或氣短或上喘咳嗽痰盛皮澁一二證此肺之脾胃病也本經藥中兼瀉肺補氣之藥本證脉中兼見沉細或善恐欠之證此腎之脾胃病也本經藥中加瀉腎之藥及陰火伏熾之藥以上皆三論及別集諸篇反覆辯無非以諸經百絡皆因乎脾胃一陰一陽互爲其根未有脾病而胃不病胃病而脾不病也脾胃既病臟腑無不病及言治法惟先於升舉陽氣使陽道而走空竅次加寒水之藥降其陰火則陰陽氣平火炎水潤諸經既有所稟受何病之有又言將養之法每用飲食熱無灼灼寒無滄滄寒温中適故氣將持乃不致邪僻且腸胃如市無物不包無物不入若風寒暑濕燥火一氣偏勝亦能傷脾損胃觀證用藥者自宜審察

補土升陽瀉陰湯　脾胃各論既已詳明因證用藥亦復悉備諄諄然欲人知百病皆由脾胃喪而不生立此補脾

胃瀉陰火升陽湯宜用於長夏主氣衰而客氣旺之時且戒後學處方當從此法推其立方之意無非欲陽氣升浮故滲泄淡味及滋陰之物皆當大忌若調養病人不過用粥而粥乃滲泄之物亦在禁例寧有舍此而不食者乎惟藥後運食自不相妨至於生冷濕熱之類必當屏絕然世有寧恣嗜欲而不從食禁者蓋不知命者也若腎火旺及督任衝三脉盛則暫用酒洗炒過黃柏知母不宜久服以助陰氣小便赤澁當利大便閉塞宜行惟在從權用勿致反損矣

柴胡 君一錢　炙甘草　黃芪

蒼术　羌活　俱臣各七分　升麻　臣六分

人參　黃芩　臣各五分　黃連　酒製炒佐四分

石膏　少許夏月用

右姜水煎

補中益氣湯　東垣先生內外傷諸辯論之詳矣復爲飲食勞倦論再發明飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷七情至劇勞役過度則脾胃既衰夫然後心火獨盛起於下焦系係於心心不主令相火代之相火者下焦包絡之火與元氣不兩立脾胃既虛下流於腎肝陰火得乘土位其病始作陰火上衝故氣高而喘身熱而煩口渴

頭疼不任風寒調經論云血并於陽氣并於陰乃爲熱中血并於上氣并於下心煩惋喜怒又云其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒又云有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通則胃氣熱熱氣薰胸中故內熱法當温和調養大忌汗吐攻下而立補中益氣湯太陰爲熱所傷且脾土始虛肺氣已絕其生故用黃芪以甘温以益皮毛之氣而閉腠理不令自汗而損其元氣若上喘氣短懶語須用人參以補之心火乘脾須用炙甘草以瀉火熱而補脾胃中元氣用之少者恐資中滿也若脾胃急痛及脾胃太虛腹中急縮最宜多用白朮若甘温除胃中之熱利膿臍之血用升麻柴胡味薄苦平以升胃中下陷之清氣且使黃芪甘草甘温之氣味上升更補衛中之清氣以實其表用橘皮助上升之陽散胸中之滯若兼燥咽乾必用乾葛是方也皆辛甘微温之劑賴之以生陽氣陽生則陰長或曰甘温何能生血曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血更以當歸和之少加黃栢以瀉陰中之伏火則腎水自生矣若虛煩少加生地黃以補腎則水旺而火自能降也若至心亂則用硃砂安神丸以鎮固之至於陰盛生

內寒厥氣上逆寒氣積於胸中而不瀉以致溫氣去而寒獨留血凝泣而脉不通其脉盛大以濇調之寒中則黃芪人參甘草芍藥五味子甘酸之類又不可以槩用也文治竊嘆醫有未知深理者每以參芪爲補火之戒未聞東垣所謂人參黃芪甘草退虛火聖藥之說而丹溪治內傷兼外感必參芪同用又恐性緩難速少加熟附以助成功二公豈誤後世哉若肺中恐有實熱自是不宜輕用今也不分虛實一槩不用此醫之最庸者高明知其必不然也

黃芪 勞役熱甚者五分炙瀉乘土之心火 人參 五分三味除濕熱煩熱之聖藥 甘草 五分炙瀉一錢

升麻 引胃氣上騰復其本位 當歸 和血 白朮 除胃中熱利腰脊間血

柴胡 引清氣行少陽之氣上升 橘皮 導滯益元若獨用瀉脾胃

以上各四分姜棗水煎

四時隨證加減

煩亂或腹中或周身刺痛皆血澁不足加當歸身一錢

精神短少加人參五分五味子二十粒

頭痛加蔓荊子五分痛甚加川芎五分頂痛腦痛加藁本五分細辛三分凡頭痛并用四味若頭痛有痰沉重倦怠者乃太陰痰厥加半夏一錢生姜五分若頭上有熱又非此藥能治以清空膏主之 清空膏方見頭痛條

腹中痛者加白芍藥八分灸甘草四分如惡寒覺冷痛者加去皮中桂五分如惡熱喜寒而痛及不惡寒熱者於已加白芍藥甘草內加生黃芩五分夏月亦然以治時熱天凉時惡熱而痛於三味中少加桂天寒時腹痛去芍藥加半夏益智草豆蔻之類耳鳴目黃頰領腫頸肩膸肘臂外後廉痛面赤脉大者以羌活二錢防風藁本各七分益元氣以瀉火邪（以上另作一服）嗌痛頷腫脉洪大面赤者加黃芩甘草各三分桔梗七分口乾嗌乾者加葛根五分升引胃氣上行以潤之心下痞夯悶者加芍藥黃連各一錢如痞而腹脹加枳實木香砂仁各三分厚朴七分天寒加乾姜或中桂痞而覺有中寒加附子黃連各一錢不能食而心下痞加生姜陳皮各一錢能食而心下痞加黃連五分枳實三分脉緩有痰而痞加半夏黃連各一錢脉弦四肢滿便難而心下痞加黃連五分柴胡七分甘草三分胸中氣滯加青皮三分氣促少氣者去之

脇下痛或縮急俱加柴胡五分甘草三分

脇下痛者加熟地黃五分如不已者乃大寒也加肉桂五分內經言小腹痛皆寒非傷厥陰證之類設有畜血其小便清白大便或黑或閉自是可辨也

身有疼痛者屬濕身重者亦屬濕加去桂五苓散一錢若風濕相搏一身盡痛加羌活防風蔓本根各五分升麻蒼术各一錢除風濕羌活湯內有柴胡五分別作一服與之病去卽止蓋諸風藥能損元氣也脚膝痿軟行步乏力或痛乃腎肝伏熱少加黃栢五分空心服未愈加漢防巳五分脉緩而沉困怠惰無力者加蒼术澤瀉人參白术白茯苓五味子各五分

咳嗽春初猶寒少加辛熱之劑以補春氣之不足益智草豆蔻也春令巳温止加佛耳草款冬花各五分夏月加五味子二十五粒麥門冬五分又宜加山梔黃芩黃連各五分秋月加門冬草豆蔻白豆蔻砂仁各五分冬月加不去根節麻黃及乾姜砂仁草豆蔻各五分若秋深巳寒春初未温亦宜如此如久病痰嗽恐肺中伏火不用人參初病勿忌若舌上白滑胎乃胸中胃上有寒或氣滯加青皮陳皮木香白术小便遺失肺金虛也補以人參黃芪而不愈則是有熱加黃栢生地黃各五分切禁勞役若臥而多驚小便淋漓邪在肝胆宜添柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦風寒合病經云腎胆之病同一治俱在下焦受客邪之濕熱非風藥行經則不宜升

舉而發散之

大便閉澁加當歸稍一錢如不効再用前劑煎成先以一口調玄明粉一錢同藥服得行卽止

調中益氣湯　此亦足太陰陽明藥也故皆以黃芪爲君人參甘草爲臣佐與補中益氣湯少白朮當歸而多蒼朮木香蓋蒼朮能除上焦之濕木香能和胃氣行肝氣散滯氣破結氣逐積年冷氣調中之名因是以立也其治證則專於四肢滿閉懶倦肢節煩疼難以屈伸大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行夏月飡泄米谷不化或便後見膿見血胸滿短氣咽膈不通或痰嗽稠秫沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲熱寒頭目嗜臥不安飲食不思宜用此湯

黃芪　一錢
人參　蒼朮　各五分
柴胡　因脾胃氣下陷用此從陰分引至陽分　各四分
陳皮　升麻　木香　三分

右加姜棗水煎

四時加減法

時煩燥熱是下元陰火上蒸加生地黃五分黃栢四分

大便虛坐不得或了而不了腹中常逼迫屬血虛血澁加歸身八分

身體沉重皆濕也雖小便多數亦加白茯苓五分蒼朮

一錢澤瀉七分黃柏四分此宜從權應病卽止

胃氣不和加半夏一錢生姜一錢有嗽加乾姜生地黃各五分痰厥頭痛屬足太陰所作非半夏不能除兼燥熱加黃柏生地黃各五分春月腹痛宜加白芍藥七分兼惡熱而渴者加生黃芩五分惡寒而痛去黃芩加肉桂五分夏月加白芍藥五分若惡寒惡熱如春月所加冬月腹痛不可用芍藥之寒味只加乾姜五分半夏一錢若至厥逆秋冬之月胃脉四道爲衝脉所逆并脇下少陽脉二道而反上行病名厥逆內經云逆氣上行滿脉去形明七神昏絕離去其形而死矣其證氣上衝咽不得息而喘息有音不得臥加吳茱萸一錢酌量厥氣輕重而爲多寡若夏有此乃爲大熱蓋此證隨時寒熱温凉乃病甚而傳肝腎所至中熱則四肢如水非傷寒之熱深厥亦深之類也至於天熱之時宜用酒炒黃連黃柏知母各等分爲細末熟湯爲丸桐子大每服二百丸多飲熱湯并美食使藥不留於胃直至下元以瀉衝脉之邪凡此等之證惟宜中和以調元氣因熱因寒用藥從權其應如響於其效如再用之則寒熱太過則病而難治矣

木香分氣丸　治一切氣逆心胸痞悶腹脇虛脹

木香　甘松　各一兩　香附一斤
莪术　八兩　甘草　六兩

右爲末麵糊丸桐子大每服三十丸生姜橘皮湯任下冲和健脾丸　此丸益心開胃健脾寬胸順氣進食和中資扶三焦培植五內凡稟賦寡弱者多服有益

白术　四兩炒爲末　乾山藥　人參
陳皮　各三兩爲末二味拌勻飯上蒸一次　白茯苓　山楂肉　各二兩
石斛　鹽湯洗取末一兩與茯苓山楂肉二味拌勻飯上蒸一次　白豆蔻　一兩爲末與白术末拌勻飯上蒸一次　甘草　隔紙炒黃色取末七錢

右各末併爲一處再研勻以大麥芽炒過磨粉打糊丸桐子大每服二十丸白湯送下

二术半夏丸　治氣抑痰倦不思飲食

白术　蒼术　半夏
陳皮　黃連　黃栢　各二兩
香附　白芍藥　各一兩　扁栢　七錢五分

黃耆人參湯　脾胃虛弱上焦之氣不足遇夏橫傷元氣

右爲末姜汁糊丸每服五十丸姜湯下

怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿軟早晚寒厥日高發熱乃陰陽氣血俱不足或熱散陰虛寒厥氣虛口不知味目中流火小便煩數大便結秘胃脘疼痛兩脇

痛急臍下急縮胞中閉塞時煩嘔噦或痰嗽吐沫舌强腰背痛頭痛懶食或全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上乃熱寒肺與大腸當先助元氣而理庚辛

黃芪 一錢自汗多者倍之　升麻 六分　人參

陳皮　麥門冬　白朮 各五分　黃柏 酒洗　蒼朮 無汗倍之

歸身 酒洗　炙甘草 各二分　神麯 炒各三分　五味子 九粒

右水煎服忌酒濕麵大料生冷

加減方法

心下痞悶加黃連二三分　胃脘痛減大寒藥加草豆蔻仁五分

脇下痛加柴胡二三分　頭痛目中流火加黃連二三分川芎三分

頭痛目不清利上壅上熱加蔓荊子川芎各三分蒙本生地黃各二分細辛一分

氣短精神少常如夢寐困乏無力加五味子九粒大便澁滯隔一二日不更解以致食少食不下者乃血中伏火故不得潤也加歸身生地黃麻子仁泥各五分桃仁三粒去皮尖另研大便既通勿再加如大便又不快利不用別藥加熯熟大黃五分如又不利則非血結血秘矣乃熱則生風病人必顯風證不可復加血藥止用黃

著人參湯加羌活防風各五錢以水四盞煎一盞空心用之大便必大走一服卽止胸中氣滯加青皮一二分橘紅倍之去其邪氣此本元氣不足宜補不宜瀉若氣滯太甚或補藥太過人心下有憂滯欝結之事更加木香砂仁各二三分白豆寇仁二分與證藥同煎腹痛不惡寒者加白芍藥五分減五味子

附暑濕漸至厥痿

暑月將理失宜違時伐化必困乏無力懶語氣短弱促似喘非喘骨乏無力形如夢寐朦朧如烟霧中不知身有必大汗泄若風犯汗眼皮膚必搐皮枯毛焦身體皆重肢節煩疼或一身盡痛或渴或不渴或小便黃澁此風熱相搏頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短氣促身心煩亂情思憭慄此陰勝陽之極也病甚則傳腎肝則痿厥四肢如人在火中爲熱厥腹內有熱也四肢寒冷爲寒厥腹中有寒也若肌肉濡潰痺而不仁傳爲肉痿證以上皆有肺疾用藥之人當以此調之凡氣上衝胸皆厥證也厥者氣逆也甚則大逆故曰厥逆厥與痿多相須於前藥中加白茯苓八分澤瀉一錢猪苓白朮各四分如小便不黃澁而快利只加澤瀉五分與二朮上下消其濕

行步不正脚膝痿弱兩足欹側者已中痿邪加酒洗黃栢知母各四五分令二足氣力湧出濡汗大泄津脫也急宜止之加五味子六粒炒黃栢五分知母三分若痿證已成乃濕熱乘腎肝當急去之否則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動心煩燥而不止若身重而不短小便如常及濕熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉茯苓猪苓黃栢知母蒼术白术之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黃栢二三分如清燥之氣大行却加辛温之劑瀉之清神益氣湯　東垣治書辨白文舉年六十二歲素有脾胃虛損病目疾時作身面目睛俱黃小便或黃或白大便不調飲食短少氣短上急怠惰嗜臥四肢不收至六月中目疾大作醫以瀉肝散下數次而前疾增劇蓋牽牛大黃連去濕熱而不能走經絡下咽不入肝經先入胃中大黃苦寒重虛其胃牽牛味辛大瀉肺本嗽復大作蓋標實不去本虛愈甚且值暑雨之際先有黃證是以增劇當於脾胃肺之本臟瀉外經之濕熱故立此方

白茯苓	升麻 各三分	澤瀉	
蒼术	防風 各三分	生姜 五分	

以上六味能走經除濕熱而不守故不瀉本藏補肺與

脾胃乃中氣之虛弱

青皮 二分　陳皮 五分　甘草 二分

白芍藥 八分 炒　白朮 一錢　人參 五分

以上六味能守本而不走經走經者不滋經絡中邪守者能補臟之元氣

黃柏 一分　麥門冬 三分　五味子 三粒去時令皮膚濕熱蒸

右水煎空心服

人參芍藥湯　東垣治一貧士七月中脾胃虛弱氣促憔悴

黃芪　白芍藥　炙甘草 各一錢

歸身　人參 各三分　麥門冬 三分

五味子 五粒

右水煎熟服

益胃湯　治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰燥熱短氣口不知味腸鳴大便微溏黃色身體昏悶口乾不喜食冷

蒼朮 一錢五分　升麻　陳皮

歸尾 各五分　黃芩　柴胡

人參　益智仁　白芍 各三分

黃芪　甘草　半夏 各二分

右水煎稍熱食前服忌生冷硬物酒濕麵

生姜和中湯　食不下口乾虛渴凹肢困倦

生黃芩 二錢　蒼朮 一錢半　羌活 七分
人參　葛根　藁本
白朮 各五分　升麻 三分　酒芩
柴胡　陳皮 各一分　生甘草

右姜五片棗三枚水煎稍熱食前服

溫胃湯　服寒藥過多脾胃虛弱以致胃脘痛

陳皮　黃耆 各七分　白豆蔻
乾生姜　澤瀉　姜黃 各三分

人參　甘草　益智仁
碻砂　厚朴 各二分

右爲末水一鍾煎半鍾食前連楂溫服

和中丸　此名有二而藥品不同故以後方加木香枳椰四字

人參　乾生姜　橘紅 各一錢
乾木瓜 二錢　炙甘草 三錢

右爲末蒸餅爲丸梧子大每服四五十丸食前溫水下

異功散　脾胃虛冷腹鳴腹痛自利不思飲食

人參　白茯苓　白朮

甘草　陳皮　各一錢

右爲末加姜棗水煎食前去楂溫服

木香人參生姜枳朮丸　開胃進食

乾生姜二錢五分　木香三錢　人參三錢五分

陳皮四錢　枳實麩炒黃　白朮一兩五錢

右爲細末荷葉包老米煨飯爲丸梧子大每服五十丸

白湯下

木香檳榔中和丸　久病虛弱淹淹不能食或秘或溏此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

木香二錢五分　枳實麩炒　炙甘草各二錢五分

檳榔四錢五分　陳皮八錢去白　半夏泡七次

厚朴姜製　白朮一兩二錢

右爲末生姜自然汁浸蒸餅爲丸桐子大每服三五十

丸食前溫水下

交泰丸　升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹中除怠惰嗜臥四肢不收沉困懶倦

乾姜泡三分　巴豆霜五分　人參

肉桂去皮各一錢　柴胡　川椒去子并閉口者炒去白汗

白朮各一錢五分　厚朴去皮切炒春夏三錢秋冬七錢　苦練酒煮

白茯苓　砂仁各二錢　川烏頭炮去皮臍四錢五分

知母 四錢酒炒一半乾炒一半秋冬不用 吳茱萸 湯洗七次 黃連 三錢秋冬減半 皂角 水洗煨去皮弦 紫菀 去苗各六錢

右巴豆霜另研餅藥共爲細末與豆霜和勻煉蜜丸梧子大每服十丸溫水下虛實加減

平胃散 脾胃不和少思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色痿黃肌膚瘦弱怠惰嗜臥體重而痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃常服則調氣暖胃化宿食消痰飲避氣寒冷濕

甘草 調胃瀉火和中八錢 厚朴 姜製去滿除濕調中一服 橘紅 和胃消痰濕中一兩四錢

蒼术 調胃除濕寬中二兩

右爲細末每服五錢姜棗水煎

加減法

小便赤澁加白茯苓澤瀉 米穀不化加枳實

胸中氣不快心下痞加枳殼木香 脾胃困弱不思飲食加黃芪人參遇夏加倂條黃芩 遇雨水濕潤時加白茯苓澤瀉 有痰加半夏陳皮 因嗽而飲食減少脉弦細者加當歸黃芪 脉洪大加黃芩黃連 大便硬加大黃三錢芒硝二錢先嚼麩炒桃仁以藥送之

散滯氣散 因憂思鬱結中脘腹皮底微痛心下痞滿不

思飲食雖食不消常常有痞氣

歸身二分　陳皮三分　柴胡四分
炙甘草一錢　半夏一錢二分　生姜五片
紅花少許

右水煎食前熱服忌濕麵酒

升陽順氣湯　因飲食不節或勞役所傷腹脇滿悶短氣
遇春口淡無味遇夏雖熱猶寒不食亦飽不喜冷物乃
益脾胃不足之證故用升麻柴胡苦平味之薄者陰中
之陽引脾胃中清氣行於陽道及諸經生發陰陽之氣
以滋春氣之和又引黃芪入參甘温之氣味上行充實
腠理陽氣得衛外而爲固也凡治脾胃藥多以升陽爲
名者盖以此意也

黃耆一錢五分　半夏七分　草豆蔻三分
神麯四分　升麻　柴胡
歸身　陳皮各二分　炙甘草
黃柏　人參各三分

右加姜三片水煎食前温服

參朮調中湯　瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食內經
云火位之主其瀉以甘故以黃耆甘温瀉熱補氣桑白
皮苦微寒瀉肺火定喘二味爲之君肺欲收急食酸以

收之故以五味子之酸收耗散之氣且止咳嗽脾胃不足以甘補之故用白朮人參炙甘草苦甘温補緩中四味爲之臣地骨皮苦微寒善解肌熱茯苓甘降肺火麥門冬微甘保肺氣四味爲佐陳皮青皮苦辛散胸中滯氣二味爲使

白朮 五分　黃耆 四錢　桑白皮

甘草　人參 各二分　陳皮

麥門冬　青皮　地骨皮

白茯苓 各二分　五味子 二十粒

右水煎去渣食遠大温服服後忌多言

白朮和胃丸　治人病淹淹不能食而臟腑或結或溏此胃氣虛弱也服此則和平理氣消痰去濕和脾胃進飲食

白朮 一兩二錢　半夏　厚朴 姜炙各一兩

陳皮 八錢　人參 七錢　炙甘草 三錢

枳實 麩炒　枳椇 各二錢五分　木香 一錢

右爲末生姜汁浸蒸餅爲丸桐子大每服三十丸食遠温水送下

升陽益胃湯　脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不收值秋燥令時行濕熱少退體重節痛口舌俱乾飲食無味大便不調小便頻數不欲食食亦不消兼見肺病洒淅惡寒慘

慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸宜用服藥後小便利而病加增者是不宜利小便也去茯苓澤瀉雖喜食食不宜恣意亦忌淡味以致助邪降沉須少加運動使藥力升發也方見惡寒條

寬中進食丸　滋形氣進飲食

大麥芽　一兩　半夏　草豆寇仁　神曲　炒各五錢　陳皮　白朮　澤瀉　各二錢　砂仁　一錢五分　甘草　人參

猪苓　去黑皮各七錢　枳實　麩炒四錢　青皮　各一錢

木香　五分

右爲末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服三十丸食後溫米飲下

厚朴溫中湯　脾胃虛寒心腹脹滿秋冬時客寒犯胃時作疼痛皆脾胃不能運化又加客寒聚爲滿痛故散以辛熱佐以苦甘泄之以淡則氣實胃和痛自止矣

厚朴　陳皮　各一錢二分　甘草　白茯苓　草豆蔻　木香　各六分　乾姜　二分

右姜水煎食前溫服

沉香温胃丸　中焦氣弱脾胃受寒氣不調和臟腑積冷心腹疼痛大便滑泄腹中時鳴飲食不美或霍亂吐瀉手足厥逆便利無度或下焦陽虛臍腹冷痛及傷寒陰濕形氣沉困自汗

附子 去皮臍炮　巴戟 酒浸去心　乾姜 炮
茴香 各一兩　官桂 七錢　沉香
炙甘草　當歸　吳茱萸 洗炒
人參　白朮　白芍藥
白茯苓　良姜　木香 各五錢
丁香 三錢

右爲末醋調麵糊爲丸桐子大每服六七十丸空心食前熱米飲下日進三服忌生冷

人參補氣湯　四肢懶惓自汗無力

丁香末 二分　生甘草稍　炙甘草 各三分
生地黃　白芍藥 各五分　熟地黃 六分
人參　防風　羌活
黃芪　知母　歸身
升麻 各七分　柴胡　黃連 一錢五分
全蝎 一個
五味子 三十粒

右水煎空心稍熱服

麯朮丸　治脾氣久虛不進飲食停飲脇痛

神麯十兩炒　白朮五兩　乾姜

官桂各二兩　吳茱萸　川椒各三兩

右爲末薄糊丸梧子大每服三五十丸姜湯下有痰飲

加白朮二兩

月窟散　黃魯直服此飲食大進

兎絲子一味淘淨酒浸曝乾爲丸每早空心挑數匙以

酒下之十日外飲噉如湯沃雪

新增

加味六君子湯　治脾胃不和飲食少進心腹脇肋脹悶

刺痛口不知味嘔逆惡心

陳皮七分　白芍藥炒一錢　人參八分

白朮一錢　半夏七分　茯苓一錢

厚朴八分　砂仁搗碎八分　甘草三分

香附炒八分　蓮肉炒去心一錢

右生姜二片水煎服再滲林檎

內傷第二十六

人之疾病獨外感內傷之似是辯之不確則殺人甚速非惟病家不知悔醫亦不能悟良可慨也故東垣先生有內外傷辯共一十五論可謂詳且盡矣所謂內傷者乃飲食失節勞役四肢也其證大類外感讀東垣論自能分別以脉辯之其病必見於右手右手主裏行陰二十五度關前寸後之間名曰氣口大於人迎者一倍脉得六至則傷於厥陰乃傷之輕也枳實丸主之氣口二盛脉得七至則傷於少陰乃傷之重也雄黃聖餅子木香橘橼丸枳殼之類主之氣口三盛脉得八至九至則傷太陰填塞悶亂則心

胃大痛備急丸神保丸消積丸之類主之凡欲吐不已俗呼食迷風是也經曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死瓜蒂散主之甚則心脉變見於氣口乃心火刑肺金肝木挾火之熱亦來薄肺緣肺受尅而木寡於所畏反侮所不勝也故氣口之脉急大而澁數時或一代澁乃肺之本大爲脾胃不及數爲火來刑金急爲木挾火勢若勞役不甚則爲右關獨大於五脉數中兼緩時亦一代若飲食失節寒温失所右關胃脉損弱甚則隱而不見惟內顯脾胃之大數微緩時一代也若有宿食獨右關沉而帶滑然飲食之傷有二曰飲也食也蓋飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則爲喘咳爲腫滿爲水瀉輕則發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生姜半夏枳實白朮之類是也重而畜積爲滿芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之食者飲物也有形之血也生氣通天論云因而飽食筋脉横解腸癖爲痔又云食傷太陽厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下利腸癖當分寒熱輕重而治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麯乾姜三稜廣茂巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘗黄連大黄之類主之亦有吐者則瓜蒂散之屬主之然不可過劑而致反傷脾胃緣食先傷

氣尚未復藥餌過劑則其氣益傷而不能化食矣其勞倦傷者調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣煙胸內故內熱舉痛論云勞則氣耗則喘且汗出內外者皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則棄其脾土脾主四肢故熱無氣以動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安其脉浮大手足煩熱春夏溫熱時助其邪其病爲劇秋冬寒凉時勝其邪其病少瘥惟當休息靜養以甘寒瀉其熱火酸味收其散氣甘溫補其中氣用黃連建中湯亦溫之之意也王安道曰勞倦傷飲食傷二者雖俱爲內傷然不可混而爲一難經所謂飲食勞倦則傷脾者蓋爲脾主飲食而四肢亦屬脾故飲食失節勞役四肢皆能傷脾非同類而無辯也其因雖與風寒暑濕有餘之病不同然飲食傷又與勞倦傷不同勞倦傷惟不足而已飲食傷又當於不足中分出有餘也蓋饑餓不飲食與飲食太過均爲失節而饑餓不飲食胃中空虛固是不足若飲食自倍而致停滯胃氣受傷亦稱不足然以停滯言則爲有餘矣惟不足故補益惟有餘故消導若物滯氣傷必補益消導兼行物暫滯而氣不甚傷則止於消導若物已自化惟宜補益枳朮丸消導中卽有補

益之意但所滯之物非其力所能去也木香分氣丸導氣枳實丸大枳殼丸之類雖無補益然施之於物暫滯而氣不甚傷者則無不可雖備急丸羌黃丸瓜蒂散潔古東垣未嘗委而弗用也其調經篇所謂陰虛生內熱乃勞動之過陽和之氣皆亢極而化爲火耳水穀之味少入故陽愈盛而陰愈衰非指身中之陰氣與下焦陰分腎水眞陰而言也上焦不行乃清陽不升下脘不通乃濁陰不降不行不通則欝欝則少火皆成壯火壯火食氣故致形氣衰少胃居上焦下脘之間故胃氣熱熱則火上炎煙灼胸間而爲內熱也凡此皆內傷之原也雖變雜出察其本於內傷體悟此意必不至於大懸絕矣

枳朮丸　治痞悶消食强胃此不取其化食但藉之以壯胃氣也

枳實去穰麸炒黃　白朮二兩

右爲細末荷葉包老倉米燒飯爲丸梧子大每服五十丸不拘時白湯下

雄黃聖餅子

巴豆一百粒去油膜　雄黃五錢　白麵十兩炒畢再羅

右二味爲細末與麵和勻新水攪和做餅如手瓜水煮待浮揑作餅子桐子大每服五七餅加至十餅十五餅

若嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

木香檳榔丸　疎三焦寬胸膈破痰飲快氣潤腸

神麯　皂角去皮穰炒　郁李仁去皮
木香　杏仁去皮尖炒　青皮去白
枳殼麩炒　檳榔各一兩

右爲末另用皂角四兩水一碗浸一日揉膏入熟蜜少許爲丸梧子大每服五十丸淡姜湯下

備急大黃丸　治心腹諸痛卒暴百病

大黃　乾姜炮　巴豆去皮各一兩

右擇精品爲末蜜和搗千杵丸小豆大每服三丸忌蘆筍猪肉冷水肥膩之物易水張先生名爲獨神乃急劑也

神保丸　治心膈痛腹痛血痛腎氣痛脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香　胡椒各二錢五分　巴豆十粒去皮心膜油研

乾蝎七個

右爲末湯浸蒸餅丸麻子大硃砂爲衣每服五丸白湯下　腹痛柿蒂煨姜湯下　肺氣心膈痛柿蒂燈心湯下

甚者以白礬蛤粉各二錢黃丹一錢同研煎桑白皮糯米飲下　氣小喘只用桑皮糯米下　血痛炒姜醋湯下　大便不通蜜調檳榔末一錢下　腎氣痛脇下痛

茴香酒下　脇下痛炒茴香酒下　氣噎木香煎湯下

宿食不消茶酒漿任下

三稜消積丸　治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

丁皮　巴豆帶皮米炒焦去米　益智仁　各三錢

茴香炒　陳皮　青皮　各五錢

京三稜炮　廣茂炮　神曲炒　各七錢

右爲細末醋調麵糊爲丸梧子大食前生姜湯下自十五丸起加至二十丸量虛實多寡去後卽止

解醒湯　治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足搖顫飲食減少及小便不利等證

白豆寇　砂仁　葛花　各五分

木香五厘　青皮三分　陳皮

白茯苓　豬苓　人參　各一分五厘

白朮　神曲　澤瀉

乾生姜各二分

右爲細末白酒調下但得微汗酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此縱飲耶方古菴云藥乃氣之偏有病則病當之無病則正氣當之

黃著建中湯

黃著三錢　桔梗

甘草

白芍藥各二錢

右加姜棗入膠飴一小盞水煎服

導氣枳實丸　治傷濕熱之物不得施化而作痞滿悶者宜服此丸

白茯苓　黃芩　白术

黃連　澤瀉各二錢　大黃一兩

枳實　神曲各五錢

右爲末蒸餅糊丸綠豆大每服五七十丸白湯下

大枳殼丸　凡爲酒食所傷胸膈閉悶疼痛飲食不消兩脇刺痛嘔逆惡心病皆治之

蓬莪术煨香熟　厚朴姜製　人參

神曲炒黃　三稜各一兩　枳殼去穰麩炒

青皮　黑丑炒取頭末　檳榔

白茯苓　木香　陳皮

白术　半夏製　麥蘗微炒

右爲末姜汁糊丸梧子大每服三四十丸姜湯下

煮黃丸　治大實心痛

大黃錦紋者各二兩　生姜五錢

雄黃一兩　巴豆五錢　白麵二兩

右爲末研勻水丸梧子大以十二丸在藥水內煮熟濾

入冷漿水內沉冷每一時冷漿水下一丸一日服盡得
利卽止

瓜蒂散卽獨聖散 方見中風條 五苓散 方見中暑條 木香分氣丸 方見脾胃條

橘皮枳朮丸 治元氣虛弱飲食不消臟腑不調心下痞悶此益胃氣之藥久服令人胃氣不復傷

枳實去穰麩炒黃 陳皮 各一兩 白朮二兩

右爲細末製煕俱如枳朮丸法

半夏枳朮丸 治內傷冷氣或食傷寒熱不調以此丸每服雜二黃丸十丸白湯下一方加澤瀉一兩治小便淋

半夏制汞 枳實去穰麩炒黃 白朮各二兩

右爲細末製服如枳朮丸法

木香枳朮丸 破滯氣消飲食開胃進食

木香 枳實去穰麩炒黃 白朮各一兩

右爲細末製服如枳朮丸法

木香乾姜枳朮丸 破除寒熱氣消飲食

木香三錢 乾姜五錢炮 枳實去穰麩炒黃 白朮一兩五錢

右爲細末製服如枳朮丸法

三黃枳朮丸 因食濕麵辛辣厚味以致填塞悶亂

黃芩 二兩　黃連 酒洗　大黃 煨
神麯 炒　陳皮
枳實 麩炒　黃五錢　白朮 各一兩

右爲細末湯浸蒸餅爲丸菉豆大每服六十丸白湯下

感應丸　治胃中積冷氣弱以致停滯不能傳化或因氣傷冷或因饑過食或飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大痛霍亂吐瀉大便頻數重濇久痢赤白或米穀不化愈而復發又治中酒吐噦痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷新產有傷及久有積寒服熱藥不効者又治久病形羸荏苒歲月漸

羊虛弱面黃肌瘦飲食或進或退大便秘或泄不拘久新積冷并皆治之

乾姜 炮製 一兩　南木香
百草霜 二兩　肉豆蔻 去皮 三十粒
杏仁 一百四十粒 浸去皮尖 研碎　巴豆 七十粒 去皮心膜 油

丁香 各一兩五錢

右二香姜蔻各研末拌草霜巴杏研極細然後將好蠟六兩先溶去柤用醇酒三斤煮蠟數沸待酒冷蠟浮淨取四兩又用香油一兩五錢砂銚內熬香熟入蠟化盡方入各藥乘熱拌勻以紙包收用時旋丸菉豆大每服三十丸虛心姜湯下

神應丸　治冷物水及乳酪所傷以致腹痛腸鳴米穀不化

丁香　木香　各二錢　巴豆

杏仁　百草霜　乾姜　各五錢

黃蠟

右二香草霜乾姜爲末黃蠟醋煮去柤巴杏同炒黑烟盡研如泥春夏用小麻油五錢秋冬八錢入鍋煎熱入蠟熔開先投巴杏次投四末研勻搓作錠子油紙包收臨用方丸每服五十丸一日三服俱在食前大有神效

大安丸　脾經消導之藥

山查　白朮　各二兩　神麯　炒

半夏　白茯苓　各一兩　陳皮

蘿蔔子　連翹　各五錢

右爲細末粥糊丸綠豆大每服六七十丸白滾水下

保和丸　治食積酒積

山查肉　一兩　半夏

黃連　炒　陳皮　各五錢

麥芽　炒　各三錢　神麯　炒

右爲末醋糊丸梧子大每服五六十丸臨臥姜湯下

秘方化滯丸　理氣化積奪造化有通塞之功調陰陽有

補瀉之妙久堅沉痼磨之自消暴積乍留導之立去

南木香 堅實者不見火 丁香 去胞不見火 青皮 四花者去穰 橘紅 黃連 京三稜 漫火煨 莪朮 漫火煨各四錢八分 以上俱研細末 半夏 各二錢五分 烏梅 用肉厚者敲碎去核火焙乾爲細末止用五錢以米醋調畧稀些漫火熬成膏和入前藥 巴豆 去殼滾湯泡去心膜先器內好醋浸一宿漫火煎至醋乾止用六錢研細入前藥末和勻再研入烏梅膏內

右通和勻以麵糊丸粟米大每服五七丸五更橘皮湯下

常服磨滯不欲通泄津液嚥下

食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下

停食飽悶枳殼湯下　但有積物取本湯冷下

因食吐不止津液嚥下　赤痢冷甘草湯下

白痢冷乾姜湯下　心疼石菖蒲湯下

赤白痢冷甘草乾姜湯下　諸氣痛生姜橘皮湯下

小腸氣痛茴香湯下　婦人血氣當歸湯下

如欲宣積仍加數丸滾姜湯下未利再服利多飲冷水一口補住蓋此藥得熱則行得冷則止故也小兒量大

升陽補氣湯　治飲食失時或饑飽勞役胃氣不足脾氣下留氣短無力若過食後愈增昏悶怠惰喜睡四肢不

收

厚朴 姜製二分　升麻　羌活
白芍藥　獨活　防風
炙甘草　澤瀉　生地黃 各七分
柴胡 一錢二分

右爲粗末加姜棗水煎食前大温服

上二黃丸　治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩 二兩　黃連 酒浸一兩　升麻
柴胡 各三錢　甘草 二錢　一方加枳實

右爲細末湯浸蒸餅衆豆大每服六七十丸白湯下

白朮丸　治傷豆粉濕麵油膩之物

枳實 炒黃　白朮
神麯 炒黃各一兩　陳皮 去白七錢　半夏 湯浸
白蒺 枯三分　黃芩 五錢

右爲細末湯浸蒸餅衆豆一倍大每服五十丸白湯下

木香見睍丸　治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

神麯 炒黃　京三稜 煨各一兩　石三稜 去皮煨
草豆蔻 麵包裹煨熟取仁　香附 炒香各五錢
柴胡 各三錢　木香 二錢　巴豆 去皮膜油淨五分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸菉豆一倍大每服三十丸溫白湯下量所傷多寡加減

導飲丸　治水飲

吳茱萸三錢　白茯苓一兩　蒼朮二兩　獨活七錢

右爲細末神麴糊丸服

蠲飲枳實丸　逐飲消痰導氣清膈

枳實麩炒　半夏　黑丑取頭末三錢　橘紅各二兩

右爲末糊丸每服五十丸食後生姜湯下

一治食猪肉不消心下堅或腹脹口乾發熱妄語煮蘆根汁飲

一治食魚膾及生肉在胸膈不化必成癥瘕搗馬鞭草汁及生姜水飲之俱効

新增

加味調中補脾湯　治男婦飲食失節神昏勞倦或心脇痛而生大熱口舌乾而不知味多服有效

人參七分　白朮一錢　當歸八分　蓮肉去心炒一錢　芡實炒一錢　茯苓一錢　陳皮七分　半夏七分　柴胡五分

枳殼炒三分　青皮去穰三分　大麥芽炒六分
甘草三分　青升麻五分
右生姜二片水煎再滂相

痞滿第二十七

東垣曰痞者心下滿而不痛也太陰濕土之氣來乘心下而爲痞滿傷寒下之太早亦爲痞乃因寒傷榮血也心主血邪入於本故心痞仲景立瀉心湯數方皆用黃連以瀉心下之土邪經云察其邪氣所在而調之此之謂也至於酒積雜病下之大過亦作痞滿蓋下多亡陰脾胃水穀之陰亡胸中之氣因虛而下陷致心下痞宜升胃氣以血藥治之若全用氣藥其痞益甚至腹下則其氣愈降必變爲中滿鼓脹矣然亦有虛實之殊實則大便秘厚朴枳實主之虛則大便利芍藥陳皮治之若飲食所傷而爲痞滿者或

吐或消導又當隨證施治焉按東垣論下多則亡陰損血用陳皮甘草參朮升柴枳實以升胃氣合四物湯以濟陰血誠開千載之愚懵也復先用枳桔等藥以疏通其氣東垣曰先用枳桔湯者非以治痞也乃審知錯下必成痞證是氣將陷而通於胸中故先用之使不至於痞也此傷寒誤下之痞也其無病之人亦有中氣虛弱不能運化精微而痞者有因飲食痰積不能施化而痞者有因濕熱大甚土來心下而痞者有因雜病邪氣畜於心下而痞者故或用黃連黃芩枳實之苦以泄之或用厚朴生姜半夏之辛以散之者或用人參白朮之甘溫以補之或用茯苓澤瀉之鹹淡以滲之即經之所謂察其邪氣所在調之之意丹溪曰心下痞須用枳實炒黃連如稟受充實面蒼骨露氣實之人而心下痞者宜枳實黃連陳皮青皮枳殼如稟受素弱轉運不調飲食不化如心下痞者宜白朮山查麴蘗根升麻此又因人察證活潑之法也不但稟受素弱之人但係食壅胸中窒塞者二陳湯探吐傷飲食胸滿者枳朮丸食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草豆蔻吳茱萸砂仁或二陳湯加山查麥芽神曲虛寒不散或寬或急常喜

熟物者理中湯加枳實痞稍久以致鬱成濕熱者平補枳
术丸因厚味痰鬱而滯者小陷胸湯或桔梗二陳湯導痰
湯火盛者二陳湯加芩連瓜婁或黃芩利膈丸煎白术陳
皮湯送下或萸連以瀉肝補脾清濕熱開痞結又病者黃
連消痞丸痰火濕熱大甚者方用三黃瀉心湯虛者只宜
上下分消若七情氣鬱成痞食之不散者木香化滯湯有
痰者順氣導痰湯若稟受中虛痞滯不運如饑如徵刺者
六君子湯加香附砂仁若因內傷而致清氣在下濁氣在
上而爲虛痞者補中益氣湯加黃連枳實芍藥便閉加大
黃嘔加黃連生姜陳皮冬月加黃連丁香陰盛生寒腹滿
塡脹常常如飽不欲飲食强食無味者吳茱萸湯食已心
下痞者平補枳术丸停飲中寒者枳實理中丸瘀血結成
窠囊而心下痞者用桃仁紅花香附大黃等分爲末酒調
服而利之或犀角地黃此因證異治之法也若傷寒之痞
又不同凡惡寒者表未解也未可攻痞當先解表以桂枝
湯或小柴胡湯加枳桔若惡寒汗出而痞滿者附子瀉心
湯服後小便不利者五苓散若表未解心下妨悶者乃飲
水過多名曰支結小柴胡加桂湯柴胡桔梗湯小半夏茯
苓湯若表未解而數下之遂挾熱而利心下痞硬乃表裏
俱病桂枝人參湯表證俱無脉皆沉實心下痞硬引脇乾

嘔氣短者十棗湯胸滿而軟半夏瀉心湯旋覆代赭湯小柴胡加乾姜牡蠣湯若下之後心下痞服瀉心湯利不止當治下焦赤石脂禹餘糧湯若下後腸鳴心下仍硬再下之益甚乃虛氣上逆也甘草瀉心湯大抵痞證因下後而成者宜如東垣方法未經下者傷寒從外之內宜以苦泄雜病從內之外宜以辛散飲食痰火之類則消導清降惟在司命者識命之眞斯不至於實實虛虛矣

瀉心湯

黃連

右爲末水調二三分量病人大小與之或煎服

桔梗湯　治結胸痞氣及胸滿不利煩悶欲死不論寒熱通用

枳殼

桔梗

甘草　各等分

右水煎

平補枳朮丸　此方用白朮以開脾氣爲君白芍藥補脾血爲臣陳皮和胃枳實消痰以黃連清熱爲佐人參補元氣木香調諸氣爲使平補氣血消降痰火兼通氣道使病邪日消脾胃日旺平補之名所以稱也

白朮　二兩

枳實　麩炒去穰

白芍藥　酒浸炒　二兩五錢

陳皮

黃連　酒浸各一兩

人參

木香 各五錢

右爲細末荷葉煎濃湯煮老米糊爲丸梧子大每服五十丸漸加至六七十丸食遠米湯下

小陷胸湯　治結胸病證在心按之則痛其脉浮滑

黃連 三錢　半夏 一錢　瓜婁仁 二錢

右姜水煎温服利黃涎沫卽安一方加枳殼桔梗黃芩方意以半夏之辛以散結氣黃連之苦以瀉滿實瓜婁之苦以寬中潤下

枳梗二陳湯　治痞滿寬胸膈化痰

二陳湯加枳殼桔梗

黃連丸

吳茱萸 三兩湯浸煮片時　黃連 八兩

右爲細末粥糊爲丸白米陳皮湯下

黃連消痞丸　治一切心下痞悶及諸積年久不愈

黃芩 炒二兩　黃連 炒一兩五錢　半夏 洗一兩二錢五分

枳實 一兩一錢　陳皮 七錢五分　白茯苓

白朮 焙　甘草 炙

厚朴 製各五錢　砂仁 三錢五分　乾生姜 三錢

片姜黃 一錢五分　澤瀉 一錢

右爲末蒸餅丸梧子大每服一百丸白湯下

三黃瀉心湯　治心下痞硬內實熱而不大便關脉浮者可服惡寒勿服

大黃三錢　黃芩　黃連各一錢五分

右以滾沸湯一盞浸之以物蓋定候一飯之久稍冷去滓心下之痞然痞爲虛熱有惡寒汗出者陽氣升散也加附子以固陽胃爲陽氣之根汗出亡津胃虛氣逆痞而乾嘔食臭不能消穀或挾水雷鳴下利者土弱不能勝也加生姜以益胃之陽氣下利不止穀不化乾嘔痞益甚者胃虛氣上逆也加甘草以補胃之陰氣此瀉心湯用藥之大意如此

順氣導痰湯　治胸膈留飲痞塞不通

半夏四錢　赤茯苓　枳實各一錢　橘紅

南星　香附

烏藥　沉香

甘草各五分　木香

右姜水煎

吳茱萸湯　治胸腹塡脹陰勝生寒常常如飽飲食無味

吳茱萸湯淘炒　厚朴姜製　官桂去皮

乾姜炮各七分　川椒去目　陳皮
白朮各二分

右姜水煎

枳實理中丸　治太陰病誤下寒實結胸及傷寒諸吐利後胸痞欲絕高起而痛手不可近

人參　白朮　乾姜各七錢五分　枳實六錢
甘草　白茯苓各一兩
黃芩二錢五分

右爲末煉蜜丸彈子大每服一丸沸湯化下

附子瀉心湯　治心下痞硬惡寒汗出

附子半枚

右水一盞煎至半盞去柤入三黃瀉心湯內和勻分二次服

柴胡桔梗湯　治胸膈痞滿或痛

卽小柴胡湯去人參合桔梗湯

小半夏茯苓湯　水結胸食少飲多水停心下短氣者宜服此

半夏四錢　赤茯苓三錢

右水煎去柤入姜汁一酒鍾再煎一二沸服

桂枝人參湯　治太陽證未罷數下之遂成脇熱下利而

心痞硬表裏不解者方意以表邪未解而裏氣又虛故加桂枝於理中湯也

人參　白朮　乾姜　各一錢
甘草　桂枝　各二錢
右水煎服

十棗湯　治太陽傷風下利嘔逆鼕鼕汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇下疼乾嘔短氣不惡寒及裏水身涼者宜服方意以下利嘔逆爲裏受邪可下汗出不惡寒發作有時爲表已解不可攻頭痛脇疼心痞乾嘔短氣邪熱內畜而有伏飲是裏未和也故用芫花之辛以

散飲甘遂大戟之苦以瀉水大棗之甘益土而勝水

芫花　甘遂　大戟　各等分
右共爲細末用大棗十枚水一鍾煎至半鍾調末五分服怯弱者減半服後大便利下水以粥補之

半夏瀉心湯　治心痞滿軟而不痛

半夏　二錢五分　甘草　三錢　黃芩
人參　各二錢　黃連
乾姜

右姜棗水煎

旋覆代赭石湯　治乾噫或吐方意以旋覆之鹹而軟痞硬代赭之重而鎮

乾噫或吐下後心下痞硬胃弱虛氣上逆

虛生姜半夏之辛以散痞氣參草大棗之甘以補胃弱

旋覆花 三錢　人參　半夏

甘草 各二錢　代赭石

右姜水煎

小柴胡加乾姜牡蠣湯　治痞而胸滿脇痛

即小柴胡湯加炮乾姜一錢牡蠣一錢五分

甘草瀉心湯　治傷寒傷風醫反下之下利日數十行穀不化腹中鳴心下痞硬乾嘔心煩若再下之痞氣益甚此虛氣上逆也

即半夏瀉心湯加甘草一錢人參一錢五分

生姜瀉心湯　治汗出解後胃中不和心下痞噫氣食臭或脇下有水氣腹中腸鳴泄瀉

生姜　半夏 各二錢

乾姜 各一錢五分　黃連　人參

黃芩 五分　甘草 各一錢

右加棗水煎

赤石脂禹餘糧湯　治心下痞硬服瀉心湯利不止及傷寒下利不止服理中湯益甚者此下焦不均故水穀不分是以用石脂之澁以收禹餘糧之重以鎮故本草云澁可去脫重可去怯若服此不止當利小便方見咳嗽

條

二陳湯　導痰湯　方俱見痰證條　枳朮丸　方見內傷條

補中益氣湯　方見脾胃條　理中湯　方見寒條　黃芩利膈丸　方見喘條

木香化滯湯　方見氣滯條　六君子湯　方見中風條　犀角地黃丸　方見吐血條

桂枝湯　小柴胡湯　方俱見傷寒條　五苓散　方見中暑條

枳實消痞丸　治右關脉浮弦心下虛痞惡食懶倦　開胃進食

枳實　黃連　各五錢　厚朴　四錢

半夏麴　人參　白朮　各三錢

乾生姜　炙甘草　白茯苓

麥芽　各二錢

右爲末水浸蒸餅丸梧子大每服三四十丸溫水下

瓜蔞實丸　治胸痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜蔞實　另研　枳實　去穰麩炒

桔梗　炒各一兩　半夏　製

右爲末姜汁糊丸梧子大每服五十丸淡姜湯下

木香順氣湯　治塡脹心腹滿悶

木香　益智　陳皮

蒼朮　草豆蔻　各五分　厚朴　姜製

青皮　各四分　白茯苓　澤瀉

半夏　各六分　乾生姜　吳茱萸　各三分

當歸　人參　升麻
柴胡各一錢
右水煎

會痞氣法

蘿蔔子二合　生姜二兩　葱白七莖
橘葉一握　白麪半合
右共搗勻炒略温會痞滿之處外用箬葉絹帛縛之俟半日胸中煩熱即解去拭淨復以熱手按之不拘寒熱虛實皆可用此藥

熨痞氣法

橘葉一大握　麥麩半升
右同炒熱以皮紙襯絹包之乘熱運痞滿之處冷則再炒熨至病人覺快方止但凡痞氣初起便宜用之

新增

加味補中益氣湯　治稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者

陳皮　茯苓各七分　人參五分
半夏七分　枳實三分　白朮一錢
山查肉五分　神麯炒五分　藿香五分
砂仁搗碎六分　大麥芽炒七分　甘草三分

芍藥炒七分

右生姜三片水煎温服

氣滯第二十八

人之周流於一身充滿于四肢者莫非氣也當和平之時出之中焦統之肺臟升降有常循環無阻是氣之所以養此身也逮夫七情內傷六淫外感五志之火燻蒸於上而肺獨受之遂不能主氣以致清陽不升濁陰不降諸病生焉劉宗厚曰捍衛冲和不息之謂氣擾亂妄動變常之謂火是火者氣變之名也丹溪曰氣有餘便是火內經曰諸痛皆因於氣諸病皆生於氣故怒則氣逆喜則氣緩悲則氣消恐則氣不行寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂思則氣結勞則氣耗此九氣之分也善攝生者平是氣而已至於

其變始則以辛溫散之稍久以辛平和之辛寒折之內經言治九氣之法曰高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之驚者平之勞者溫之結者散之喜者以恐勝之悲者以喜勝之蓋亦以平爲主而於升降寒熱之用劑未嘗無所分也何諸方之中有以辛熱之藥通治諸氣者若以之暫已而復用鎮墜之劑由是而形質益弱卒至無救是不知調氣者也然有病而至於冷氣上升者昧者卽以爲寒又誤之甚也丹溪曰上升之氣自汗而出中挾相火其熱爲甚自覺其冷非眞冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故有此證認假作眞似是之禍可勝言哉業醫者豈可無聞此語耶至於枳殼利肺氣多服則損胸中至高之氣青皮瀉肝氣多服則損其氣木香行中（下焦）之氣香附之快滯氣陳皮之泄逆氣紫蘇之散表氣厚朴之瀉衛氣梹榔瀉至高之氣藿香上行胃氣沉香之升降眞氣腦射之散眞氣果患人氣實者用之惟可以散氣之標亦不能制氣之本惟驗怒傷肝也則氣上逆甚則嘔血宜枳梗二陳湯正氣天香湯熱者柴陳湯喜傷心也則氣消過則爲狂宜枳殼煮散升歸脾湯悲傷心胞絡也則氣消過則爲狂宜枳殼煮散升

陽順氣湯恐傷腎也則精怯不升過則下焦脹滿宜三和散補中益氣湯寒則腠理密氣斂于中宜五積散入裏則四逆湯加木香驚傷膽也神亂不定過則怔忡失志宜妙香散十味溫膽湯思傷脾也心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結過則痞滿宜退熱清氣湯溫胆湯木香化滯湯木香枳术丸勞則氣耗也必中氣倦怠無力短氣不足以息宜調中益氣湯人參養榮湯自汗喘急者養正丹或云氣無補法但氣虛不運邪著爲病不用補劑氣何由而行故喘嗽氣鳴以枳梗姜橘蘇桂調其氣以星半細辛豁其痰而氣不降者因氣之所藏無以收之也必佐以補骨脂則氣始歸源內經曰結者行之散者益之氣其可以不補乎然氣既變而爲火矣則凡因氣而病者如胃脘腰脇周身之痛甚則翻胃膈噎等證又結而爲五積六聚癥瘕痃氣等證自當各從其證而爲治矣

正氣天香湯　治婦人一切諸氣作痛或上奏心胸或攻築脇肋腹內結塊發渴刺痛月水因之而不調或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後一切氣候並皆治之

烏藥 一錢五分　香附 六錢
紫蘇　乾姜 各六分五厘
右水煎

柴陳湯　治痰氣胸脇不利及痰瘧等證

即小柴胡湯合二陳湯

枳殼煮散　治悲哀傷肝痛引兩脇

防風　川芎　枳殼
細辛　桔梗　甘草
葛根

右用水煎服

三和散　治七情氣結五臟不和心腹脹急大小便秘寢食俱廢不渴者乃痰秘耳未可施以硝黃秘甚再加枳殼蘿蔔子皂角子氣滯腰疼倍木瓜浮腫加車前子葶藶子小便閉加麥門冬澤瀉

沉香　紫蘇　大腹皮
羌活　各四分　木香　白朮
枳橘
川芎　一錢二分　木瓜　二分　橘皮　甘草　各三分

右水煎温服

十味温膽湯　治夢遺驚惕

陳皮　半夏　枳實　各九分
人參　白茯苓　各五分　遠志
熟地黃　酸棗仁　甘草　各三分五厘

五味子 九粒

右姜水煎温服

退熱清氣湯　治氣逆身熱中脘痞滿

柴胡　橘皮　枳殼 各八分　香附 七分

半夏　川芎　砂仁 七粒　甘草 各三分

右姜水煎

木香化滯湯　治因憂氣食濕麵結于中脘腹皮底微痛

心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣

枳實 一錢　當歸 一錢　木香 三錢　白茯苓 各一錢

橘皮 三錢　炙甘草 各五分

半夏 一兩　草豆蔻 五錢　柴胡 四錢　紅花 各五分

右㕮咀每服三錢姜水煎

人參養榮湯　治積虛成損四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色汲汲短氣飲食無味如遺精加龍骨咳嗽加阿膠麥門冬挾火加知母黃柏

白芍藥 三兩　當歸　人參

白朮　甘草　黃耆

肉桂　陳皮 各一兩　熟地黃

五味子　白茯苓　遠志 各五錢

右每服三錢姜煎空心温服虛甚者煉蜜爲丸可以常服

枳梗二陳湯 方見痞滿條　歸脾湯 方見悸條　升陽順氣湯

補中益氣湯　調中益氣湯 方俱見中寒條　黃連香薷飲 方見驚悸條　清暑益氣湯 方俱見中暑條

四逆湯 方見嘔吐條　温膽湯 方見驚悸條　五積散 方見內傷條

妙香散 方見癲條　木香枳术丸 方見內傷條

養正丹 方見嘔吐條

蘇合香丸

沉香　射香 研　訶子 煨用皮

丁香　青木香　香附

安息香 另研用酒一升熬膏　革撥　白术

白檀香　薰陸香 另研

龍腦 研各一錢　硃砂 研飛　烏犀角 各二錢

右爲末和勻用安息膏煉蜜和劑丸櫻桃大空心酒水下四丸水亦可

用藥法

凡痰氣及中風痰涎壅塞喉中有聲不能下者合青州白丸子姜湯化下神効　中風見神鬼者白湯下

脚氣衝心用革麻和丸搗爛貼脚心疼痛立止　心腹絞痛卒痛中滿嘔吐姜湯下　傷風咳嗽姜葱汁白湯下　產婦中風小兒驚風牙關緊硬不省者擦牙即開

然後用風藥灌下　小兒吐瀉驚疳火焙其藥然後以
姜葱汁化開白湯下　兼治傳尸骨蒸肺癆症忤鬼氣
狐狸妖魅霍亂吐瀉時氣瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉疫
癖疔腫等證用緋絹袋盛當心珮之一切邪鬼不敢近
流氣飲子　治憂思太過陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰
又治脚氣腫痛喘急腹脹大便不通及氣攻肩背脇肋
走注疼痛

紫蘇葉　青皮　去白　當歸
白芍藥　烏藥　川芎
半夏　酒洗　桔梗　防風　各五錢
黄芪　枳實　麩炒
炙甘草　陳皮　去白　各七錢
大腹子　連皮一兩　白茯苓　去皮五錢
姜製一宿焙

右㕮咀每服五錢姜棗水煎

木香流氣飲　治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔
吐少食肩背腹脇走注刺痛

半夏　一錢五分　厚朴　陳皮　二錢四分
青皮　甘草　香附子
紫蘇　各一錢二分　人參　赤茯苓
木瓜　白朮　麥門冬

大黃各一錢五分　白芷二分　草果
官桂　蓬朮　大腹皮
丁皮　枳橘　木香
沉香各四分五厘　木通六分　枳殼二分

右姜棗水煎

蟠葱散　治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸膈脇膀胱小腸疝氣及婦人血氣刺痛

玄胡索　肉桂　乾姜
炙甘草　縮砂去皮各五錢　丁皮
枳橘各四兩　蒼朮米泔浸一宿切焙五錢　蓬朮

三稜煨　莪朮　茯苓
右爲末每服二錢葱白一莖煎服

烏附湯　調中快氣又治心腹刺痛

香附子一兩　烏藥五錢　甘草三錢

右爲末每服三錢入鹽少許沸湯調服不拘時候

快氣湯　治一切氣疾心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰涎嘔吐及宿酒不解不思飲食

砂仁　甘草　青皮去白兩　香附子各三錢
桔梗　陳皮各一錢

右水煎

木香順氣丸

木香 五錢　枳殼 麩炒　陳皮
補骨脂　香附子 各一兩　牽牛 炒六兩
大腹皮　蘿蔔子 各五錢

右爲末水丸梧子大每服五十丸溫酒下不拘時

木香檳榔丸　治因氣胸膈痞塞腹脇脹滿

木香　檳榔
當歸　黃連 去鬚
枳殼 去穰 麩炒　青皮 去穰
陳皮 去白　香附子
蓬朮 各一兩　黃芩
牽牛 頭末各一兩

右爲末水丸桐子大每服五七十丸姜湯下

新增

加味蘇子降氣湯　治虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛

蘇子 一錢五分　厚朴 五分　半夏 七分
前胡 五分　青皮 五分　天台烏 五分
大腹皮 酒洗七分　枳殼 四分　青木香 炮七分
桔梗 七分　黃芩 六分　砂仁 搗碎五分
甘草 三分

右生姜三片水煎服

酒病第二十九

酒大熱而有毒入胃則臟氣俱熱故酒醉者其面獨紅脾胃論云胃病則氣短精神少顯火上行獨燎其面是面紅由胃熱所致也且其氣味俱陽脾胃素虛者其氣升之不散降之不下鬱於氣分無形之位非若茶水之全降於腸胃中比也故飲醇酒者小便反少緣氣隨酒氣上升鬱於上而爲痰故溺澁於下也有過飲而傷之者惟宜汗之泄之或有用酒癥丸大熱之藥及牽牛大黃之類下之者東垣謂無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣又有以五苓散利小便者然熱在中焦未入太陽之本小便自利而

清津液已行復與滲利之藥是重涸其腎而酒毒之熱依然不去結於膀胱及至上下不通溺澁而爲發黃熱入血室則爲虛血其害非小蓋縱飲以傷元氣若復瀉之乃損腎水眞陰及有形陰血俱爲不足則陰血愈虛眞水愈弱陽毒之熱太旺陰火益增元氣消亡虛損成病酒勞疸之證作矣金匱要略曰酒疸下之久而爲黑疸用解醒湯其庶幾也但頻醉而頻藥元氣漸索亦非攝生所宜至於醇酒熱飲丹溪論其肺氣傷耗其始病淺或嘔吐或自汗或瘡瘍或鼻齆或自泄或心脾痛尚可發散而去之其久也則病深爲消爲渴爲內疽爲肺癆爲內痔爲膨脹爲失目爲哮喘爲勞嗽爲顛癇皆難明之病自非巨眼未易辨治是傷酒爲暫時之病飲熱則病重者也可不戒諸至於小兒臟腑未實猶宜戒勿與酒醫集載有陳州長史兒熟睡三日不醒諸醫作睡驚治其父求診於戴人兩手脉皆和平乃竊問其乳母爾三日前曾醉飲否渠以夫人賞酒飲答之遂用甘草乾葛葛花碗砂仁貫衆煎汁灌之立醒夫酒味之甘者極能戀膈酒氣入乳猶能使兒昏睡不醒幾至誤藥而殺之矧與之飲乎愛子者宜知愼焉

三花益脾九　飲酒不醉及益脾胃

綠豆花五錢　葛花二兩　小豆花一兩

木香 二錢五分　一方加草豆蔻 去皮 一兩
右爲末蜜丸桐子大葛花湯下十丸或遇飲津液下五丸可使不醉

雙花下酒丸　飲酒令人不醉
葛花　小豆花 各等分
右爲末每服三錢水調服仍進葛汁及枇杷葉飲倍能飲酒

列仙散　飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚强毀手足頑麻胃脘疼痛胸膈滿悶肚腹膨脹嘔吐瀉利及酒食停久致成積聚黃疸熱鼓等證俱宜此

木香　沉香 微炒
檳榔 各一錢　茴香 微炒
麥芽 一兩五錢　大黃 一兩微焙炒
右爲末每服三錢或五錢五更熱酒調下能飲者多飲二三盃以手乂心仰面臥至天明大便下如魚腦小便下如血爲効忌生冷葷腥止食淡粥

葛黃丸　飲酒過度以致精蘊胸膈中吐血衄血脉滑數垂死者
葛花 二兩　黃連 四連
右爲細末另用大黃末水熬成膏作丸梧子大每服百

丸溫水下

消酒毒丹　飲酒過度遍身手足發熱口乾煩渴小便赤少

白滑石 水飛一斤　白粉葛　大粉草 各三兩

右爲末不拘冷水熱湯調服二三錢日進三次

烏梅丸 消酒食

神麯 炒　烏梅肉　麥芽

龍腦葉 各等分

右以甘草膏和丸芡實大每服一丸嚼化

又烏梅丸　治酒毒化痰消食

烏梅 一斤　半夏　白礬 各八兩

右搗爲細末以新瓦二片夾定火焙三晝夜爲度次入神麯麥芽陳皮青皮蓬朮枳殼丁皮大腹子各四兩爲末神麯糊梧子大每服四十丸或五十丸姜湯下

潔古百杯丸　治酒停胸內膈氣痞滿面色黃黑將成癖疾飲食不進日漸羸瘦如欲飲者先服不醉

生姜 一斤去皮切片以鹽三兩淹一宿焙乾　橘紅 三兩　廣茂 炮三錢

乾姜 三兩　益智仁 二十粒　丁香 五十粒

甘草 炒二錢　砂仁 三十粒　三稜 炮二錢

木香　茴香 炮各一錢　白豆蔻 三十粒

右爲細末蜜丸每兩作五丸朱砂爲衣用生姜湯細嚼

一九

八仙散　壯脾進食飲酒不醉宣和初華山貢士張鉄翁採藥山中遇道者八人共酌于石岩令鉄翁坐飲八人各出一物與之歸而製服遂終日不醉

乾葛 嫩白有粉者　白豆蔻仁　縮砂仁
丁香 各五錢　粉草　百藥煎 各一錢
木瓜 二錢　燒鹽 一兩

右細剉凡不能飲酒者以三錢細嚼温酒下此出醉鄉實脣

常醒散　飲酒不醉

綠豆　赤豆　葛根 各等分

右爲末米飲酒前冷水調二匙服之可使不醉

葛花解醒酒湯 方見内傷條

傷酒食不藥可愈法　用塩花擦牙温水漱下不過三次酒食俱消

又小豆花陰乾百日爲末服之能消醉

一方治酒積泄瀉以神麯一兩五錢白酒藥一兩俱爲細末清水和成餅子慢火炙黄復研細每用二錢白湯調下神効

新增

加味葛花湯 治飲酒太過而耗眞之病百生

葛花一錢五分 小豆花一錢五分 黃連蒸二次一錢
猪苓 白朮 茯苓
澤瀉各一錢 葛粉八分 甘草四分

右生姜三片水煎再滂渣

嘔吐第三十 附彙 船吐

有聲有物者謂之嘔吐屬陽明經陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也劉河間曰胃脘熱甚則爲嘔火氣炎上之氣丹溪曰有痰膈中焦食不得下者有氣逆者有寒氣欝於胃口者有食滯心膈之分新食不得下而反出者有胃中痰火而嘔者俱忌用瓜婁杏仁桃仁蘿蔔子山梔其所用雖不止于一端要皆以氣積寒從三焦論治蓋上焦在胃口上通天氣主納而不出凡吐者皆從乎氣其證實已卽吐氣衝胸痛渴欲飲水其脉浮而洪治當降氣和平六君子湯加木香藿香桔梗枇杷葉或七氣湯熱氣冲逆

者荊黃湯加人參甘草枳橘中焦在中脘上通天氣下通地氣腐熟水穀凡吐者皆從乎積食與氣相搏而成積或先吐而後痛或先痛而後吐其脉浮而長治當去積行氣宜紫沉丸消積木香枳橘等分爲末調服行氣尋常以平胃散二陳湯加青皮砂仁白豆蔻山查神麯調之下焦在臍下下通地氣主出而不納凡吐者皆從乎寒朝食暮吐暮食朝吐久則小便清大便不通乃陰氣偏結不與陽和治當温其寒而通其秘復以中焦藥和之附子理中湯木香匀氣散合理中湯四逆湯丁胡三建湯丁半湯養正丹半硫丸此分三焦之證治也若痰膈中焦二陳湯加姜炒芩連或小調中湯脾經濕痰欝滯時時惡心吐出清水如豆汁者胃苓湯加半夏枳橘若冷涎自下湧上者脾熱所致也二陳湯加白术白芍藥升麻炒芩連山梔神麯麥芽乾生姜風邪在胃翻翻不定或欝酸水全不入食者不換金正氣散腥臊氣薰炙惡心吐而雜以涎血者此屬膿血聚於經中嘔家所謂有癰膿不須治膿盡當自愈也四物湯倍赤茯苓牡丹皮虛者八珍湯加陳皮因暑而吐煩渴者黃連香薷散六一散加砂仁或枇杷葉散久病胃氣虛弱聞食氣則嘔者四味藿葉湯或四君子湯去茯苓加香附參著胸痞短氣者調中益氣湯胃口作痛口吐清水得

食暫止餓則復嘔者胃中有蛔也二陳湯加苦練根史君子白术烏梅然嘔與吐有聲者謂之嘔吐宜小半夏湯不愈者大半夏湯諸嘔吐穀不入者亦小半夏湯主之嘔吐病在膈上者猪苓湯主之嘔而心下痞者半夏瀉心湯主之病似嘔不嘔似噦不噦心中無柰者姜汁半夏湯主之有物無聲者謂之吐桔梗湯主之食已即吐者大黃甘草湯主之吐後欲飲食者文蛤湯主之仍與之水吐可即止無物有聲謂之乾嘔陳皮湯生姜半夏湯主之乾嘔而利者黃芩加半夏生姜湯主之乾嘔而手足冷者陳皮湯主之氣衝上者皂莢丸主之上氣脉浮者厚朴麻黃湯主之上氣脉沉澤瀉湯主之火逆上氣者麥門冬湯主之東垣曰若陰虛邪氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不通也用生地黃當歸紅花之類和血凉血潤血兼用甘草以補其氣微加大黃芒硝以通其氣大便利邪氣去則氣逆嘔噦自不見矣若夫暈船大吐渴飲水者即死童便最妙吐如青菜汁者亦死而嘔家忌下若至冷煩渴胸滿腹痛者甚而大便閉大小腸脫脫結也熱者大柴胡湯下之虛者潤之是又從權之法也若脉弦則胃氣無餘寒在上而反下之變成翻胃矣治者不可不慎也

荊黃湯　治上焦爲熱氣所衝脉浮而洪暴吐

荊芥穗 五錢　人參 二錢五分　大黃 一錢五分
甘草 一錢

右水煎去粗以柹榔一錢五分木香七分五厘爲細末調服

紫沉丸　治中焦吐食由食積與寒氣相搏故吐而痛宜服此丸

半夏麴　烏梅肉　丁香 各二錢
砂仁 二錢　杏仁 去皮尖　沉香
木香　白朮 各一錢　巴豆霜 另研
白豆仁 各五分　柹榔 二錢　陳皮 五錢

代赭石 二錢

右爲細末入巴豆霜和勻醋調麪糊爲丸黍米大每服五十丸食後姜湯下吐愈則止亦治小兒食積吐食易丸如麻子大

木香勻氣散　治諸氣滯胸膈虛痞惡心宿食不消心腹刺痛嘔吐

木香　丁香　檀香
白豆蔻 各二錢　藿香葉　甘草 各八錢
砂仁 四錢

右爲末每服二錢入塩少許沸湯點服

丁胡三建湯

川芎　附子　天雄
丁香　胡椒　各等分

右姜水煎入麝少許服

丁半湯　治脾中虛寒停痰留飲噦逆嘔吐

丁香　半夏　各三錢

右姜水煎服

養正丹　治飢逆反胃痰結頭暈腰疼痛霍亂吐瀉

鉛二兩鉄銚內就火微熔入水銀一兩以箸攪勻勿令青烟起烟起則水銀走矣又入朱砂一兩炒令十分勻和卽放地上候冷爲末糯米糊丸菉豆大每服三十丸空心塩湯下能升降水火助陽接眞

四味藿葉湯　治胃寒嘔吐粥藥不停

藿香　人參　陳皮

半夏　各等分

右姜水煎

大半夏湯　治反胃嘔吐

半夏　二升　人參　三兩　白蜜　一斤

右以水一斗三升和蜜揚三百四十遍煮取三升分三服

桔梗湯　氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪宜先和中

半夏麴二錢　桔梗
枳實麩炒黃色　厚朴姜汁炒
白茯苓各一錢

右水煎去柤以木香柹榔爲細末每服二錢三服之後氣漸下吐漸止去末加芍藥二錢黃著一錢五分煎服病愈則已如大便燥結食不進者以大承氣湯去芒硝微下之再服前藥如大便復結又如前法

大黃甘草湯　治食已卽吐

大黃四兩　甘草

右水三大碗煮一碗分二服

文蛤湯　治吐酸欲得水而嗜飲者兼治微風脉緊頭痛

文蛤　石膏各五兩　麻黃
甘草　生姜各三兩　杏仁
大棗十二枚

右㕮咀以水七升煮至二升温服一升汗愈

陳皮湯　治乾嘔噦手足厥

陳皮四分　生姜八錢

右水七升煎取三升分三服下咽卽愈

生姜汁半夏湯　治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤憤

半夏八兩　生姜一斤取汁

右以水五升煮半夏至三升入姜汁煮至二升半分四服日三夜一卽止勿服

厚朴麻黃湯　治咳嗽脉浮

厚朴一錢二分　麻黃八分　杏仁去皮尖　半夏各一錢　乾姜　細辛　五味子各四分　小麥一合

右用水三鍾先煮小麥熟去麥入藥煎八分服

麥門冬湯　治煩熱嘔逆食下卽吐

麥門冬　竹茹　茅根　生姜　人參各一錢　甘草五分

右水煎服

豬苓湯　皂莢丸二方俱未查有

四君子湯方俱見中風條　七氣湯方見心胃痛條　平胃散　調中益氣湯方俱見脾胃條　二陳湯　半硫丸　小半夏湯方俱見痰證條　附子理中湯　理中湯　四逆湯方俱見中寒條　小調中湯方見頭狂條　胃苓湯方見濕條　不換金正氣散方見感寒條　黃連香薷散　六一散　五苓散方見中暑條　枇杷葉散方見中暑條　半夏瀉心湯方見痞滿條　黃芩加半夏生姜湯方見咳嗽條　澤瀉湯方見飲條　大柴胡湯方見傷寒條　八珍湯方見耳証

藿香平胃散　內傷飲食塡塞太陰嘔吐不已

蒼术 一錢五分　藿香　厚朴
陳皮 各一錢　砂仁 研　神麯 炒 各五分
甘草 炙三分

右姜棗水煎

加味二陳湯　胃中有伏火膈上有稠痰時常胃口作痛及惡心吐清水不快

半夏　黃連 姜汁拌炒　蔓荊子 炒另研各一錢五分
橘紅　白茯苓　山梔 炒
川芎　白术　蒼术

香附 各一錢　乾姜 炒五錢　甘草 炒三分

挾虛者加人參一錢

右姜水煎如胃口痛入生姜汁一合和勻服

丁香安胃湯　治嘔吐噦及乃胃中虛寒所致

黃耆 二錢　吳茱萸　草豆蔻
人參　蒼术 各一錢　丁香
炙甘草　柴胡　升麻
歸身　陳皮 各五分　黃栢
右姜水煎

茯苓半夏湯　脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆

於脾胃之間當先實脾土

白朮　白茯苓　半夏
神麯 炒各一錢　橘紅　天麻 各七分
麥蘗麵 炒黃色一錢五分

右姜水煎服

椒茶餅　止嘔吐治翻胃當時卽効

川椒 去目隔紙焙三兩　芽茶　桑白皮
飛羅麵 炒各一兩五錢

右爲末煉蜜爲餅每重一錢許細嚼米飲下

煨姜秘方　治嘔吐不已兼惡心

生姜一大塊順絲薄切相連勿斷片片摻塩於內以水濕苧麻窓縛外又用紙包水濕火煨令熱取去麻紙以姜搗爛和稀米飲食之

竹茹湯　治飲食過度而嘔者

竹茹　葛根　半夏
甘草　生姜 各等分

右水煎服

碧霞丸　治吐逆立効

黃丹四兩飾過用好米醋半升同藥入銚內煎乾卽以炭火在銚內煆過通紅冷取出研細爲末粟米飯丸梧

子大煎酵湯下七丸一服卽愈

生姜人參湯　治嘔久胃虛不納穀

生姜　人參　黃耆
白朮　香附
右水煎服

茯苓澤瀉湯　治反胃吐而渴欲飲水

白茯苓八兩　澤瀉
白朮三兩　甘草
右水一斗先煮五味至三升入澤瀉再煮至二升半作三服一日服盡

桂枝　各二兩
生姜　各四兩

一李綀治嘔吐胃弱欲死用獨參湯甚効每貼三兩一嘔吐胃中有熱膈上有痰二湯加梔子黃連生姜屢試有効

一治吐逆不止粥食湯藥俱不得下者以五灵脂研碎羅去砂石狗膽汁爲丸艾實大每服一丸煎生姜酒磨汁再用生姜湯化下未服藥之先煮下熟粥左手與藥服訖不得漱口右手急與粥吃不可大多

新增

加味藿香正氣湯　治損脾胃嘔吐等證

陳皮　茯苓　各八分　藿香一錢

人參七分　半夏八分　香附
砂仁搗碎各八分　厚朴七分　甘草三分
白朮一錢
右生姜五片水煎服若胃口有火脉洪加黃連山梔子各七分炒

噎膈第三十一

噎膈者大小腸膀胱熱結也內經曰三陽結謂之膈手太陽小腸熱結則血脉燥手陽明大腸熱結則不能周足太陽膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉塞下既不通必反而上行乃陽火不降所致其脉寸口微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胸中冷佚陽脉浮則爲虛濇則傷脾胃脾傷則不磨故朝食暮吐暮食朝吐完穀不化名曰胃反脉緊而濇者其病難治脉弦者虛也又爲胃氣無餘其因或起于傷酒與食或胃熱欲吐或痞或痛或不思食或噫腐吞酸或嘈雜痞悶誤認爲寒藥

以辛香燥熱之劑劫之或愈再發再劫行之已久血液俱耗胃脘乾槁或咽喉窒塞食不能下間乎可入亦不能多名之曰噎槁在吸門也食入胃脘當心而痛須臾吐出其痛方止名之曰膈槁在賁門也皆上焦之噎膈若食物可下良久復出者槁在幽門也乃中焦之噎膈其或朝食暮吐暮食朝吐者槁在闌門也乃下焦之噎膈若因於七情所發或三焦傳化失常所致主於氣也當從氣治之或血液所虧胃脘乾槁或血積所致主於血也當從血治之故丹溪曰翻胃大約有四血虛氣虛有熱有痰必用童便韭汁竹瀝牛羊乳生姜汁虛甚者或單人參膏血虛者入四物湯中服大便閉加桃仁紅花有瘀血加牡丹皮韭汁若生蟲加蘆薈尿虛甚者加乾姜血燥加牛羊乳切不可易以人乳也內虛陰火上炎者作陰火治之寸關脉沉或伏而大乃有痰也宜二陳湯爲主或參夏湯化痰丸瓜婁實丸或用黃連吳茱萸貝母瓜婁仁牛轉草水煎寸關脉沉而澹氣結也宜開滯導氣之藥不可用香燥品劑誤投之必死脉滑而短食積也枳朮丸加黃連陳皮半夏或狗米平胃散虎脂平胃丸或用保和丸二錢加姜炒黃連三錢山查二錢爲丸如麻子大胭脂爲衣人參煎湯入竹瀝下脉沉而澹者七情鬱結也飲食許靜胸背痛者四七湯温膽

湯痞滿煩悶微嗽二便不利者分心氣飲四磨湯或木香檳榔二末白湯下傷神不睡者十味溫膽湯朱砂安神丸腹脹腸鳴者木香匀氣散有積聚者阿魏撞氣丸惡聞食氣者五膈寬中散吐而渴者茯苓澤瀉湯俱宜薄滋味以靜養之張雞峰曰噎當是神思間病惟內觀自養可以治之丹溪謂其深中病情治法亦爲近理丹溪又謂年高者不治蓋少年氣血不虛劫去痰火病不復生老年氣血已虛劫去痰火病愈復生也戴氏曰氣血俱虛者口中出沫必死大便所解如羊糞者不治蓋有積血停于內者當消息逐之大便澁者難治但令食兎血則便自利也若陽火上升而膈又宜分虛實治之實火宜黃連解毒湯加童便姜汁或益元散入姜汁澄白爲小丸時時服之或溫六丸亦可甚者六一順氣湯人參利膈丸虛火衝上食不入者枳梗二陳湯加厚朴白朮及木香少許或萸連湯渴者錢氏白朮散大便閉者導滯通幽湯或參仁丸已噎而至于膈便宜服此以防之間有身受寒氣口傷冷物因脾胃火衰膈上若冷腸鳴而脉滑微者宜暫用丁香煮散五膈湯五噎湯單附子散以劫之然不可恃以爲常也

參夏湯　治反胃嘔吐

人參 三錢　半夏 六錢

右加白蜜水煎服

瓜婁實丸　治噎膈胸膈痞痛徹背脇喘急煩悶

瓜婁實去殼另研　枳殼去穰麩炒　半夏

桔梗炒一兩

右爲細末姜汁米糊爲丸梧子大每服五十丸姜湯下

狗米平胃散　治翻胃諸藥不効者

焦黃雄狗一隻餓數日以生米喂之俟其下糞淘去浮

箔取不化之米及蟲用雞白煎湯煮作粥臨熟入沉香

末二錢平胃散一料爲丸梧子大每服四五十丸米飲下

虎脂平胃丸　治證同前

平胃散一料　老鴉爪一半　虎脂或虎肉或虎糞一半

右生姜棗肉爲丸梧子大每服四五十丸米湯下

五膈寬中散　治七情四氣傷於脾胃以致胸脇痞滿停

痰氣逆遂成五膈之證

厚朴製一斤　甘草炙五兩　青皮

陳皮　丁香各四兩　香附炒

砂仁　木香各三兩　白豆蔻一兩

右爲細末每服二錢姜塩湯點服

人參利膈丸　此東垣治膈氣聖藥

人參　當歸　藿香

甘草　枳實　大黃　酒浸
厚朴　姜製各一兩　木香　檳榔　各七錢五分
右爲末滴水丸梧子大每服五十丸温水下

萸連湯
貝母一錢　吳茱萸
牛轉草　各七分　瓜婁仁　五分　黃連
右水煎

錢氏白朮散
人參　白朮　木香
白茯苓　炙甘草　藿香葉　各一錢

乾葛二錢
右爲末每服二三錢水煎

導滯通幽湯　治噎膈大便不通氣不得下
升麻　當歸　桃仁　各一錢
生地黃　熟地黃　各五分　甘草
紅花　各二分
右水煎入檳榔末五分或麻仁泥服

參仁丸　治氣壅風盛便秘後重疼痛煩悶
麻仁　大黃　各三兩
人參　七錢五分　當歸一兩

右爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸熱水下

丁香煮散　治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香　紅豆蔻
陳皮　甘草
良姜　川烏各四分　益智仁五分
胡椒二分　乾姜　青皮

右姜鹽水煎服

五膈湯　治胸膈痞氣結聚脇脹痰逆惡心不欲食

枳殼　青皮　南星
半夏各一錢　白朮一錢二分　大腹皮八分

右姜水煎服

五噎湯　治噎食不下嘔吐不徹胸膈刺痛痰與涎出

人參　白朮　白茯苓
陳皮各一錢　厚朴　枳殼
甘草　乾姜　三稜
莪朮　神麯　麥芽各五分
訶子　桂心　木香
梹榔各三分

乾姜七分　麥芽六分　丁香
木香　草果各五分　甘草三分

右姜棗水煎服

單附子散　治翻胃

預搗生姜汁半碗聽候將大附子一箇置諸磚上四面逼以炭火附子漸熱淬於汁中又逼又淬汁盡方已然後焙乾或加丁香一錢共爲末每二錢用水一盞粟米一撮同煎七分三服即愈或爲末在掌心中抵吃

四君子湯　四物湯　方俱見中風條　二陳湯

化痰丸　方俱見痰証條　枳术丸　保和丸　方俱見內傷條

四七湯　温膽湯　四磨湯　方俱見喘條

分心氣飲　阿魏撞氣丸　方俱見心胃條　十味温膽湯　方見氣滿條

朱砂安神丸　方見顛狂條　木香匀氣散　方見腰痛條　茯苓澤瀉湯　方見嘔吐條

黃連解毒湯　方見感寒條　益元散　方見中暑條　温六丸　即益元散加乾姜五錢

六乙順氣湯　方見傷寒條　枳梗二陳湯　方見脾滿條

厚朴丸　治翻吐逆飲食噎塞氣上衝心有腹中諸疾者加羌活獨活防風名萬病紫菀丸每服五丸能下癰瘕及諸成形之物

厚朴　川椒去目微炒　川烏頭炮去皮各一兩五錢

紫菀　吳茱萸湯洗　石菖蒲

柴胡　桔梗　白茯苓

官桂　皂角去皮炒　乾姜炮

人參各二兩　黃連一兩五錢　巴豆霜五錢

右爲細末入巴豆霜和勻蜜丸梧子大每服三丸漸加至五七丸以利爲度姜湯下又治虛暑以後秋冬間下痢大効

加減法

春夏加黃連二兩　秋冬再加厚朴二兩

如治風於春秋所加黃連厚朴外再加石菖蒲黃連各一兩五錢　心之積加石菖蒲白茯苓爲輔　肝之積加柴胡川椒爲輔　肺之積加黃連人參爲輔　脾之積加吳茱萸乾姜爲輔秋冬久瀉不止加黃連白茯苓屜灰散　治反胃

用多年屜一片燒紅入驢尿內淬二十一次研爲末倉米飯焦亦爲末飯焦倍於屜末二末攪勻以蠟爲丸用驢尿和平胃散服之吞二十九

六丁丸　治翻如神

丁香　辰砂　另研各六分　五靈脂一錢

右香脂先研末後入辰砂再研勻用狗膽丸雞頭大每服一丸生姜陳皮湯磨下

桂香散　治膈氣反胃諸藥難瘥朝食暮吐甚者食已輒出此重劑也効甚速

水銀　黑錫　各三錢　硫黃五錢

右三味入銚中熬內柳木槌微火上細研爲灰取出後用丁香桂末各二錢生姜末三錢併作一處研勻每服三錢黃米粥飲調下得効再服

薤白粥　治翻胃無問新久冷熱皆効

薤白 十莖　雞蛋 三枚去白　白粟米 三合
揀參 一兩另用水一碗煎三分

右三味煮成粥入人參湯相合頓服如惡食以粟米粥飲漸加粳米粥和之

化鉄丸　治膈腸翻胃兼治臟脹煩悶氣促不能坐臥手足枯瘦累治不効者此爲神劑

五灵脂 去石炒　青皮 陳秣米 一合　陳皮 各一兩
巴豆 三十一五粒去殼膜

右咬咀先炒五灵脂香透次下青皮炒候色變又下陳皮亦炒色變方下秣米巴豆炒候黃色取出以紙攤在地上出火毒揀去巴豆研爲細末用好醋浸蒸餅丸菉豆大每服十五丸加至二十丸葱湯或茶下

神仙奪命散　專治噎食

烏梅 十三個水浸砸砂去核　雄黃 各一錢
乳香 一錢　百草霜 五錢
黑豆 各四十九粒　菉豆

右將烏梅杵爛各藥并豆俱爲末入烏梅再搗和勻丸如彈子大以乳香少加朱砂爲衣陰乾每一丸空心嚼化藥盡以餅一個劈碎入茶內泡食無碍爲驗過三五日再服一丸卽愈此藥極有功効

潤腸膏　治噎膈大便燥結飲食良久復出及朝食暮吐暮食朝吐

鮮威灵仙 四兩搗汁　生姜 四兩搗汁　眞香油 二兩
白砂蜜 四兩煎去沫

右四味同入銀石器內攪勻慢火煎如飴時時以箸挑食之一料未愈再服一料決効

大力奪命丸　治噎膈食下不下及翻胃等證

杵頭糠　牛轉草 各入兩許　糯米 一斤

右爲細末收黃毋牛口中涎沫爲丸龍眼大鍋中慢火煮熟食之加砂糖二三兩入內爲丸尤妙

白龍粉　治痰火噎膈

白滑石 桑柴火煆紅透研末一兩　桑霜 以桑柴灰淋汁熬成霜二錢　白硼砂 明如白礬者二錢

右三味研極細末每服一錢四分搗取梨汁送下降痰火開噎膈如神

海上方

一方以虎肚連糞不見水入砂礶中以蓋嚴密塩泥固濟晒

乾以三釘在地上楞起砂礶文武火煆一晝夜取出每用虎肚三分平胃散一錢老米湯調服極重者十服即好

一方用古銅四錢敲如米粒大又用核桃肉一斤同研極爛入好燒酒一斤和勻裝錫瓶內桑柴火煮一周時取出埋地下一二時每日空心服一盃病重者午後再一盃十日即減其效如神

一方翻胃不拘久近雖贏癃憊頻死者每早與日晡及臨臥各服熱驢尿二合神効

一方治翻胃多取大田螺以新水養之待吐出泥澄去清水將皮紙一張鋪於米篩傾所吐之泥於紙上候稠潤作丸梧子大每服三十丸藿香湯下立愈田螺仍放水中食之其病不復作矣

一方治翻胃以五灵脂一味爲細末用黃犬膽汁爲丸龍眼大每服一丸好酒嚼送不過三服神効

一方噎膈以王瓜燒灰存性每服一錢同棗肉平胃散二錢温酒調服神効

新增

加味順氣寬中湯　治三陽熱結胸中刺痛噯氣嘈雜飲食減少服五七十貼方見效驗

陳皮　茯苓　半夏　各八分
桔梗七分　枳實炒三分　南星七分
黃連八分　蘇子炒七分　香附七分
山梔子八分　瓜蔞仁七分　白朮八分
青木香火炮五分　土栝子炒作細末四分　黃芩七分
甘草三分

右生姜三片水煎服

飥逆第三十二

氣逆上衝喉中作聲而無餘音者謂之飥無病之人與嬰兒常有之或食大速或飲水入肺或喜笑過多或食乾物氣塞皆能致此以紙撚搐鼻取嚏或閉氣須臾或飲冷水一二口即止若別無病證忽然飥從胸內起者乃痰閉於上火動於下也係是暴病形氣必實或因怒釁熱俱宜以人參蘆煎湯吐之蓋參蘆瀉肺肺衰氣降則火土復位矣至於傷寒發飥丹溪曰有四證有中氣不足者脉虛微氣不相續而發飥宜補中益氣湯加生脉散黃栢以降陰火或少加附子服之立愈有陽明內實失下者宜大承氣湯

下之有渴而飲水大過成水結胸者宜小陷胸湯或小青龍湯去麻黃加附子兼治水寒相搏發餌尤妙有傳經熱證誤用姜桂等藥助起火邪而致痰火相搏者宜黃連解毒湯白虎湯及竹瀝之類治之考之傷寒集所論有因汗下過多胃氣成虛或與水飲水寒相搏而餌其脉沉遲其證厥逆瀉利乃寒氣鬱塞胃氣不伸之故法當温之更灸期門而止脉散者不治亦有因火熱內鬱衝逆而上不得仲越而餌其脉洪數乃下焦相火挾邪熱而升法當開導之已故餌逆不可專以爲寒也屬於寒者則脉細乃胃有寒也宜橘皮半夏生姜湯胸滿虛煩不安者宜大橘皮湯脉沉遲手足厥冷者宜理中湯或橘皮乾姜湯寒厥甚者羌活附子湯冰寒相搏者如丹溪前方屬於熱者少陽脉弦急發熱胸滿小柴胡加竹茹湯潮熱小便難者小柴胡加茯苓湯發熱小便不利者豬苓湯潮熱脉沉實大便難者甘草瀉心湯少陰失下大便難者小承氣湯但有頭汗諳語腹滿微喘此爲死證惟有灸期門穴之法及以硫黃乳香榻前酒煎聞氣或可活十之一二也若夫患痢曰久與婦人產後有此者俱屬陰虛治法虛則補之產後宜四物湯加知母黃栢陳皮竹茹痢後宜人參白朮煎湯調益元散頻服自止其他虛者又當分以寒熱如因寒吐下後誤

服寒凉之劑宜温而補之脾胃陰虛火逆冲上宜平而補之挾熱者凉而補之若屬於實別無惡候宜隨其邪之所在涌之泄之清之利之也又有因于膏粱濕熱者宜十味柴胡湯吞單黄栢丸或調益元散胃火善食者宜小半夏加參朮白芍藥陳皮夫病而至於飢已爲惡候醫而不分虛實寒熱則其危也可立而待然患此者虛與熱常多實與寒則間而有也毫釐千里之間不可不慎

橘皮半夏生姜湯　治氣虛有痰發飢

陳皮　半夏　人參　通草　各等分

右水煎服

橘皮湯　治吐利後胃虛膈熱而飢逆

陳皮三錢　人參　甘草各一錢

竹茹一小團

右姜棗水煎仲景之陳皮竹茹湯

橘皮乾姜湯

陳皮　通草　乾姜

桂心　炙甘草各二錢　人參五分

右水煎服

羌活附子湯　治吐利後胃寒發飪

羌活　附子炮　小茴香
丁香各一錢　乾姜炮　木香各二錢

右加棗一枚水煎入鹽少許服

豬苓湯

豬苓　白茯苓　阿膠
滑石　澤瀉各一錢

右水煎去楂入膠烊化服

十味柴胡湯　治氣弱不足飪

人參　黃芩　柴胡
乾姜　山梔各七分半　白朮
防風　半夏　甘草各五分
五味子九粒

黃栢丸　治筋骨軟及陰火氣從臍下起者又治腎經火燥下焦濕

黃栢不拘多少炒褐色

右爲末水丸氣虛補氣藥下血虛補血藥下

補中益氣湯方見脾胃條　生脉散方見注夏條　大承氣湯

小柴胡湯　小承氣湯方俱見傷寒條　甘草瀉心湯

小陷胸湯方俱見痞滿條　小青龍湯方見喘証條　黃連解毒湯

白虎湯 方俱見感寒條 理中湯 方見中寒條 四物湯 方見中風條

益元散 方見中暑條 小半夏湯 方見痰証條

柿蒂湯 治胃膈痞滿飢逆不止

柿蒂

右姜水煎服一方有人參一方無人參有青皮陳皮

溫中散 治吐瀉及病後胃中虛寒飢逆至七八聲相連收氣不回者難治

丁香 柿蒂 人參

白茯苓 陳皮 良姜

半夏 各一錢 生姜一錢五分 甘草三分

右水煎服

三香散 治胃冷飢逆經久不止

沉香 紫蘇 白豆蔻 各等分

右爲細末每服五七分柿蒂煎湯調下

新增

加味人參白朮湯 治氣不足欬逆

人參 一錢 柿蒂 炒二錢 黃芩 炒八分

陳皮 半夏 各一錢 柴胡 六分

白朮 一錢 五味子 七分 芍藥 炒八分

枳實 炒三分 廣木香 二分不見火

右生姜三片水煎服再滫渣

諸證提綱卷之三終

北京古籍保护