

補註醫學入門外集卷之四

丹溪朱先生雜病纂要 詳格致餘論局方發揮丹溪心法纂要日用醫按及今附餘併
各名家方書如葉氏病源好生膏僑醫纂要惜乎未之見也

雜病提綱 內傷脾胃氣血痰鬱積熱諸虛滯冷

外感

風頭眩

牙痛

面風

脾風

耳耳

遊風

中風卒倒分真似 風為百病長善行數變為卒中昏倒為癡視喎斜為搐搦反張或為寒中或為熱中或

胃氣相搏則不仁與榮氣相搏則半身不遂入經癱瘓入絡膚則痺八筋則不識人入臟則舌強吐沫挾熱

則癱緩收寒則拘攣按脈初起則脈浮有真中者急牽引口似中者急指人中蓋汗調髮交耳垂正印未

口眼喎斜語話難 風邪初起則脈浮有真中者急牽引口似中者急指人中蓋汗調髮交耳垂正印未

去內用正舌藥白附子姜蘇全蝎等分為末酒調服二錢○不語有數端有風中心脾者資善解語湯有

風中用者有小續命湯去桂附加嵩蒲有疾塞心厥者導痰湯加嵩蒲人參竹茹或岑連有舌本強硬語

言不正者用蝎稍二錢半茯苓一兩薄荷二兩為末酒調服二錢○不語有數端有風中心脾者資善解語湯有

然聖者有血虛氣虛者有腎虛及老人忽言不出者十全大補湯去桂加嵩蒲速志 痰塞喉中聲啞

同上卒倒歪斜不語名風癱身軟有汗者生汗不出者身直者死痰由水化制火閉塞其心竅 半身或一肢不

遂此不能語言不覺智不語名風癱身軟有汗者生汗不出者身直者死痰由水化制火閉塞其心竅 半身或一肢不

病在膚漆之間溫臥取汗四肢癱此身皆仰或左癱右疾或一臂不隨時復轉移一臂腫風化痰調氣

養血為主換骨丹黑虎丹神仙飛步丹有脾實者膏粱之疾非肝腎 又有五痺類風狀後四症偏枯痺

虛痿按風順丸有脾虛者十全大補湯獨活寄生湯萬寶同春湯 又有五痺類風狀後四症偏枯痺

全無莫浪猜 雖中暑中寒中濕痰厥氣厥食厥熱厥虛暈等症皆卒倒不語但風必有歪斜搐搦之症為異

地

濕

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

濕

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

似

中

盡

相

須

二

子

所

主

雖

風

中

補註醫學入門外集卷之四

丹溪朱先生雜病纂要 詳格致餘論局方發揮丹溪心法纂要日用醫按及今附餘併
各名家方書如葉氏病源好生膏僑醫纂要惜乎未之見也

雜病提綱 內傷脾胃氣血痰鬱積熱諸虛滯冷

外感

風頭眩

牙痛

面風

脾風

耳耳

遊風

中風卒倒分真似 風為百病長善行數變為卒中昏倒為癡視喎斜為搐搦反張或為寒中或為熱中或

胃氣相搏則不仁與榮氣相搏則半身不遂入經癱瘓入絡膚則痺八筋則不識人入臟則舌強吐沫挾熱

則癱緩收寒則拘攣按脈初起則脈浮有真中者急牽引口似中者陽病身熱陰病身涼人未識人入臟則舌強吐沫挾熱

口眼喎斜語話難 風邪初起則脈浮有真中者急牽引口似中者陽病身熱陰病身涼人未識人入臟則舌強吐沫挾熱

去內用正舌藥白附子姜蘇全蝎等分為末酒調服二錢○不語有數端有風中心脾者資善解語湯有

風中用者有小續命湯去桂附加葛蒲有疾塞心痲者導痰湯加葛蒲人參竹茹或苓連有舌本強硬語

言不正者用蝎稍二錢半茯苓一兩薄荷二兩為末酒調服二錢○不語有數端有風中心脾者資善解語湯有

然聖者有血虛氣虛者有腎虛及老人忽言不出者十全大補湯去桂加葛蒲速志 痰塞喉中聲啞

同上卒倒歪斜不語名風癱身軟有汗者生汗不出者身直者死痰由水化制火閉塞其心竅 半身或一肢不

遂此不能語言不覺智不語名風癱身軟有汗者生汗不出者身直者死痰由水化制火閉塞其心竅 半身或一肢不

病在膚漆之間溫臥取汗四肢癱此一身皆仰或左癱右疾或一臂不隨時復轉移一臂腫風化痰調氣

養血為主換骨丹黑虎丹神仙飛步丹有脾實者膏粱之疾非肝腎 又有五痺類風狀後四症偏枯痺

虛痿按風順丸有脾虛者十全大補湯獨活寄生湯萬寶同春湯 又有五痺類風狀後四症偏枯痺

全無莫浪猜 雖中暑中寒中濕痰厥氣厥食厥熱厥虛暈等症皆卒倒不語但風必有歪斜搐搦之症為異

地

濕葉中似審實虛主火則主氣或主濕丹內傷兼中似中盡相須 二子所主雖殊而實同也况濕則中

之見也 氣衰賊和容易襲 氣血壯盛腰理嚴密邪不能入推中平氣血始衰腰理空疎因火動而勞風又

下體多汗日內風十全大補湯加附子善濕者名曰風風宜黃芪六一湯加參朮杜蠟乾葛有房勞中風

傷同但身益振耳久則為陽風食後曰胃風又名夾食中風久則為下血有傷風在腰理為中風與

待食則胸中滿悶須探吐及理脾胃有酒濕病亦類中風當分清以瀉濕毒有內傷熱症似中風者有雜

上海校經山房石印

病虛症似中風者 火動氣中無涎活 中氣脈沉身涼無痰涎為異耳如思慮肉脆憂愁肢厥悲哀筋掣過

均不可以風治 水難制熱氣拂勢昏倒筋骨不用久則癱瘓忌服七湯宜真中中腑着四肢側可治喉浮或身而身五色

惟者正氣散合呈香散虛者八味順氣散痰者四逆散用是也如肺得中臟閉塞九竅多昏危眼偏閉可治者如

語者用防風黃芩煎水一相置於下薰入鼻中良久能言也如肺得中臟閉塞九竅多昏危眼偏閉可治者如

入臟深者心絕口閉肝絕眼閉脾絕手散肺絕脣牛黃引錐針腫腎絕遺尿或大吐多瀉下汗多尿少者皆死

瀉利榮竭無以制火煩熱愈中血脈也則至口眼或近於臟內亦有便溺阻滯則從小續命湯加減微汗

甚候熱退汗止小便便利 又有中經亦要知內阻便溺外無形症從中治秦可湯分蓋風本於熱熱則風動宜養血以勝燥大

風湯加麻黃欲微利愈風湯加大黃中腑宜汗多則亡傷中臟雖宜下口不能言肢不持手足不能

下多則亡陰若臟腑兼見者或先汗而後利或表裏兼攻者防風通聖散 痰與氣虛身右居血虛則痰火流注於左而為

弱不能言左為死血經絡與少血主之痰血少加桃仁紅花活痰與氣虛身右居血虛則痰火流注於左而為

為痰急治則愈久則痰火鬱結難治痛者為實先以二陳省風之類治痰後以附子行經瘦人火動加黃柏氣

虛者四君子湯虛甚道承聲軒腫者淡煎參芪加附子薑汁勞傷者補中益氣湯加通治南開化涎沫

竹瀝寒吹右痰痰感者二陳湯加薑汁竹瀝能食者換荆瀝此丹溪雜病通法也 字至五分擦牙熱自開痰甚者宜薑汁清見傷寒但中虛者稀涎散微吐冷涎實者用瓜蒂炒黃末五分或

一錢入全蝎末半分吹入鼻中吐如不吐用酸棗汁調下如再不吐用熱薑汁投之此藥不可輕用吐

後宜服藥火利氣安神定志之藥吐清見傷寒但中虛者稀涎散微吐冷涎實者用瓜蒂炒黃末五分或

也小兒驚搐亦宜 順氣活血風自祛活風在皆痰為患故治以開通或尚有先邪未運活風順氣久則

寶者川芎茶調散虛者為寶回春湯未可全以風治也抑論舊以西北風高真中宜分臟腑經絡調治東

南地濕兼中似中宜分氣血虛實痰火多少調治真中兼南北互有且臟腑者不可不分氣血之虛

實乎氣血痰者又可不分臟腑而經絡之病多先少調補氣血外感重而內傷輕者先經絡祛風法為

覺膚頑肌蠕動凡覺手足麻木肌肉蠕動者先用調補氣血外感重而內傷輕者先經絡祛風法為

單科 冒風惡風多屬肺病 風主皮毛通勝最易感冒頭眩身痛惡寒鼻塞音啞胡桂枝湯防風湯和

湯頭痛甚者川芎芍藥散多者金沸草散扶熱人參散毒散升麻葛根湯扶內慎勿專攻外服食過

寒十神湯扶寒濕消風百解散扶濕神末散扶暑香葛湯時行柴胡升麻湯 用防風羌活川芎隨宜加入八補藥痰中傷食加白木陳皮青皮山查麥芽扶形寒散冷加姜桂扶房勞

加參米歸地扶芎後傷氣者補中益氣湯加
重則傳變輕不傳風重傳裏一久甚能為氣血害風能燥血
用桂附八物等湯久不愈者只宜三白湯加減
散之切忌疎泄雖初起非寒月無汗麻黃禁用

寒咳一症

中寒無汗肢僵仆傷寒循經漸入中寒不問冬夏或當風取涼或坐地受冷肅殺之氣自皮膚穿入臟腑
海手足溫暾別生如極冷唇青厥急分三陰緩下元中寒字難分經絡急則姜附耳急用葱餅熨臍并灸氣
逆與脈舌卷囊縮者須臾即死小腹痛下元陽氣復而寒自消矣切忌吐下方藥補血者寒泣血故也
黃或或加此涼藥為引溫中散冷補援下元陽氣復而寒自消矣切忌吐下方藥補血者寒泣血故也
胃腸常和表裏西北苦寒中傷者多助兩池下利乾嘔吐逆常香正氣散或五積散扶食停疾者人參養
胃湯夏秋暴寒折於裏者調中湯微下之凡帶瀉嘔吐逆常香正氣散或五積散扶食停疾者人參養
氣勝膝冷虛勞瘵症諸痛皆寒所為也投風眩暈不仁扶濕四肢腫痛內傷補益如辛溫內傷勞役感寒
湯如加姜附如內傷生冷感寒腹痛脫附子建湯子煉法

暑疔

暑熱汗渴審實虛暑病身熱自汗口渴渴面垢而已除症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱
經絡最難拘經者名中渴傷症其實一也乃真襲暑氣而言日中暑陰症動作田野道途得病似傷風症屬肺
口鼻牙頰達手心中腕絡以火從火故古法祛暑取冷水灌洗勿驚入肝則眩暈中擊傷緩冒淺伏深分
須麻入脾則昏睡不覺入脾則咳嗽痰涎入腎則如渴非專心主者而無傳入也

輕重中暑暑入腸胃腹脹惡心嘔吐身煩或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌
覺變出寒熱不定霍亂吐瀉胸膈中滿痰涎壅滯五臟相搏耳
等症但暑病多無身痛間有痛者或為濕熱動風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
傷寒熱濕義同黃連香茹散暑因暑勞動發熱生風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
難治急扶陰涼處不可用濕冷地拘道熱土放臍上撥開作窠令人尿於其中待求主美或蒜薤用五
熱湯或童便送下外用布蘸濕湯敷氣海立醒後尤不可飲冷水以去積補藥服之如心神恍惚用五
苓散燈芯同煎益元砂末加砂研新汲水調服二錢降胃水治煩熱利濕止渴之要藥疾火絞腸俱可吐
暑毒疫火室塞胸中量難虛實吐之文鬱發之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調服
二錢服於腸砂腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞旋在觀須臾能死急用熱湯

暑熱汗渴審實虛暑病身熱自汗口渴渴面垢而已除症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱
經絡最難拘經者名中渴傷症其實一也乃真襲暑氣而言日中暑陰症動作田野道途得病似傷風症屬肺
口鼻牙頰達手心中腕絡以火從火故古法祛暑取冷水灌洗勿驚入肝則眩暈中擊傷緩冒淺伏深分
須麻入脾則昏睡不覺入脾則咳嗽痰涎入腎則如渴非專心主者而無傳入也

輕重中暑暑入腸胃腹脹惡心嘔吐身煩或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌
覺變出寒熱不定霍亂吐瀉胸膈中滿痰涎壅滯五臟相搏耳
等症但暑病多無身痛間有痛者或為濕熱動風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
傷寒熱濕義同黃連香茹散暑因暑勞動發熱生風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
難治急扶陰涼處不可用濕冷地拘道熱土放臍上撥開作窠令人尿於其中待求主美或蒜薤用五
熱湯或童便送下外用布蘸濕湯敷氣海立醒後尤不可飲冷水以去積補藥服之如心神恍惚用五
苓散燈芯同煎益元砂末加砂研新汲水調服二錢降胃水治煩熱利濕止渴之要藥疾火絞腸俱可吐
暑毒疫火室塞胸中量難虛實吐之文鬱發之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調服
二錢服於腸砂腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞旋在觀須臾能死急用熱湯

暑熱汗渴審實虛暑病身熱自汗口渴渴面垢而已除症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱
經絡最難拘經者名中渴傷症其實一也乃真襲暑氣而言日中暑陰症動作田野道途得病似傷風症屬肺
口鼻牙頰達手心中腕絡以火從火故古法祛暑取冷水灌洗勿驚入肝則眩暈中擊傷緩冒淺伏深分
須麻入脾則昏睡不覺入脾則咳嗽痰涎入腎則如渴非專心主者而無傳入也

輕重中暑暑入腸胃腹脹惡心嘔吐身煩或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌
覺變出寒熱不定霍亂吐瀉胸膈中滿痰涎壅滯五臟相搏耳
等症但暑病多無身痛間有痛者或為濕熱動風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
傷寒熱濕義同黃連香茹散暑因暑勞動發熱生風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
難治急扶陰涼處不可用濕冷地拘道熱土放臍上撥開作窠令人尿於其中待求主美或蒜薤用五
熱湯或童便送下外用布蘸濕湯敷氣海立醒後尤不可飲冷水以去積補藥服之如心神恍惚用五
苓散燈芯同煎益元砂末加砂研新汲水調服二錢降胃水治煩熱利濕止渴之要藥疾火絞腸俱可吐
暑毒疫火室塞胸中量難虛實吐之文鬱發之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調服
二錢服於腸砂腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞旋在觀須臾能死急用熱湯

暑熱汗渴審實虛暑病身熱自汗口渴渴面垢而已除症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱
經絡最難拘經者名中渴傷症其實一也乃真襲暑氣而言日中暑陰症動作田野道途得病似傷風症屬肺
口鼻牙頰達手心中腕絡以火從火故古法祛暑取冷水灌洗勿驚入肝則眩暈中擊傷緩冒淺伏深分
須麻入脾則昏睡不覺入脾則咳嗽痰涎入腎則如渴非專心主者而無傳入也

輕重中暑暑入腸胃腹脹惡心嘔吐身煩或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌
覺變出寒熱不定霍亂吐瀉胸膈中滿痰涎壅滯五臟相搏耳
等症但暑病多無身痛間有痛者或為濕熱動風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
傷寒熱濕義同黃連香茹散暑因暑勞動發熱生風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
難治急扶陰涼處不可用濕冷地拘道熱土放臍上撥開作窠令人尿於其中待求主美或蒜薤用五
熱湯或童便送下外用布蘸濕湯敷氣海立醒後尤不可飲冷水以去積補藥服之如心神恍惚用五
苓散燈芯同煎益元砂末加砂研新汲水調服二錢降胃水治煩熱利濕止渴之要藥疾火絞腸俱可吐
暑毒疫火室塞胸中量難虛實吐之文鬱發之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調服
二錢服於腸砂腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞旋在觀須臾能死急用熱湯

暑熱汗渴審實虛暑病身熱自汗口渴渴面垢而已除症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱
經絡最難拘經者名中渴傷症其實一也乃真襲暑氣而言日中暑陰症動作田野道途得病似傷風症屬肺
口鼻牙頰達手心中腕絡以火從火故古法祛暑取冷水灌洗勿驚入肝則眩暈中擊傷緩冒淺伏深分
須麻入脾則昏睡不覺入脾則咳嗽痰涎入腎則如渴非專心主者而無傳入也

輕重中暑暑入腸胃腹脹惡心嘔吐身煩或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌
覺變出寒熱不定霍亂吐瀉胸膈中滿痰涎壅滯五臟相搏耳
等症但暑病多無身痛間有痛者或為濕熱動風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
傷寒熱濕義同黃連香茹散暑因暑勞動發熱生風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫
難治急扶陰涼處不可用濕冷地拘道熱土放臍上撥開作窠令人尿於其中待求主美或蒜薤用五
熱湯或童便送下外用布蘸濕湯敷氣海立醒後尤不可飲冷水以去積補藥服之如心神恍惚用五
苓散燈芯同煎益元砂末加砂研新汲水調服二錢降胃水治煩熱利濕止渴之要藥疾火絞腸俱可吐
暑毒疫火室塞胸中量難虛實吐之文鬱發之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調服
二錢服於腸砂腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞旋在觀須臾能死急用熱湯

調鹽一兩灌入即安或再用陳艾陳樺木陳壁
 上各等分水煎連進三四服利血法見急救
 香和散黃連解毒湯清肺生脈散白虎湯加參
 ○如中大小調中湯益清湯批批批批批批批
 養陰內傷冷食過周身熱氣辛溫解暑散若湯
 暑氣內傷冷食過周身熱氣辛溫解暑散若湯
 砂仁或大順散或二氣丹冷下吐九皆治因暑
 涼之劑暑重尿赤者清暑益氣湯暑熱力倦者
 或為丸中嚼香茹高豆陰虛者滋陰降火湯腎
 至秋方混世預防不獨羨香茹乘涼致病每遇
 則升茶加黃柏芍藥五味子麥門冬生痰散誘行
 也如氣衰精神不足煩渴懶食者生痰散誘行九
 去升茶加黃柏芍藥五味子麥門冬生痰散誘行九

濕脹滿

赤白濁

腰酸痛

黃疸

水腫

脚氣

淋瀝

遺精

白濁

濕氣覺來分內外風寒暑濕傷人便覺濕氣重
 內濕東南內外又分上下中下宜利二便或升提
 人多外濕內外又分上下中下宜利二便或升提
 上薰喘咳痰目如蒙首位高氣清濕則如黃腫
 小便濃濕下先受之故脾脾痛活治外微汗通
 丹治內滲便利便為妙五痔應利水行氣為君
 身肢脹或過身浮腫者皆自內而出四氣相兼
 也虛實利之不放利者退黃九妙出四氣相兼
 大抵百病相兼併必惡風濕有汗發燥寒則必
 倦四肢互相兼併必惡風濕有汗發燥寒則必
 濕多肥白痰食之散治濕熱宜哉清熱燥濕兼
 治寒濕防風通聖散治濕熱宜哉清熱燥濕兼
 以清熱則腹脹浮腫實者下之虛者補利濕消
 或平胃散加桑白皮為主濕在上焦加羌活蒼
 下焦濕加升麻防風升提熱加防已黃柏龍膽草
 又四製蒼柏實者大便可攻元氣實而濕熱甚
 九三精丸

燥消渴

燥有內外屬陽明。外因時值陽明燥令久晴不雨黃埃蔽空令人狂惑皮膚乾枯肩起內因七情火燥或

燥火邪消總來金被火相刑。六氣風熱火屬燥房竭精或飢飽勞逸損胃或炙燥酒管厚味皆能偏

燥血液或手足癱痲偏枯或十指反無以制而生雀目。肺燥入腎則津液竭而頻渴及脾則隔

為風瀉或善飢而瘦或傷積變為水腫。腹脹入肺則毛焦乾。肺燥入腎則津液竭而頻渴及脾則隔

結明與肺為表裏也。絛勁渴秘雖風熱表裏俱宜潤衛榮。相天花粉或單天門冬膏如川芎合生脈散如

大秦光湯或丸。痰病消渴活曰熱燥。四順清涼飲當歸龍木自旺或脾或胃伏火便閉不食者曰血燥。搜風順氣丸

滋陰丸或丸。痰病消渴活曰熱燥。四順清涼飲當歸龍木自旺或脾或胃伏火便閉不食者曰血燥。搜風順氣丸

甘參為使風加秦芫或牛膝。熱者補中益氣湯。通出湯。用四物湯去芍為君。天冬門冬黃芩李仁為佐。升麻紅柏丸

加參為使風加秦芫或牛膝。熱者補中益氣湯。通出湯。用四物湯去芍為君。天冬門冬黃芩李仁為佐。升麻紅柏丸

能則血虛。常用氣虛者。增玉膏。津虛者。單五味。子膏。血虛者。地黃膏。凡病遇天燥亦宜量加此等潤劑。藥

火因內外分虛實。外因邪鬱經絡積熱。臟腑此為有餘之火。內因飲食積熱。虛火實火。大有力為實火。性暴無

常主病多。火病死人甚。暴變化無常。一動便傷元氣。偏勝害他。經內經病者。諸熱實火。屬腎者。諸虛火。屬

分散於各經。推廣五運。為病傷肝者。諸風之火。屬脾胃者。諸濕痰火。傷心者。諸熱實火。屬腎者。諸虛火。屬

虛火。潮熱。有瀉實補虛。升且降。虛火因外感邪鬱。在表者。九味羌活湯。半表半裏。小柴胡湯。入裏大承氣丸。九

瀉者。黑丸。九及吐瀉。火氣虛火。感因勞傷。傷胃。無力身熱。宜保元湯。補中益氣湯。其火則自退。附子理中湯。若

瀉者。黑丸。九及吐瀉。火氣虛火。感因勞傷。傷胃。無力身熱。宜保元湯。補中益氣湯。其火則自退。附子理中湯。若

瀉者。黑丸。九及吐瀉。火氣虛火。感因勞傷。傷胃。無力身熱。宜保元湯。補中益氣湯。其火則自退。附子理中湯。若

瀉者。黑丸。九及吐瀉。火氣虛火。感因勞傷。傷胃。無力身熱。宜保元湯。補中益氣湯。其火則自退。附子理中湯。若

瀉者。黑丸。九及吐瀉。火氣虛火。感因勞傷。傷胃。無力身熱。宜保元湯。補中益氣湯。其火則自退。附子理中湯。若

重者從其性而升之若火正治可以濕伏可以水滅可以直折相火反治不可以水濕折惟從其性而使之如實火發狂宜三黃硝磺正治虛火發狂宜與姜湯後二心焦之君火一身之主腎為相火遊行於身酒炒過或煎寒生甘緩又有君相民皆靜且和常等肝膽胞絡三焦之問又膀胱為腎火亦屬於腎於身天賦不可無者若五志之火則由於人是內傷火多外感火少惹火不妄動動由於心靜之一字其心中之水乎

內傷

調理脾胃傷食

積聚 蟲瘕

調理脾胃濕熱脾性濕主乎血陰或胃火化主乎氣陽也太濕則氣滯太乾則血燥濕熱則食不消或善食而瘦由是脾胃不和交氣血生疝或胃火化主乎氣陽也太濕則氣滯太乾則血燥濕熱則食不消或善寒濕脈浮緩而實或細而數為燥熱又肥人多濕瘦人多熱更參以飲食厚薄可也且按心口疼不疼勞傷手按心口刺痛食傷初寒久則熱勞倦初熱久寒生勞傷初起熱中飲食傷初起寒溫補中久受寒中宜辛熱宜辛甘口刺痛食傷初寒久則熱勞倦初熱久寒生勞傷初起熱中飲食傷初起寒溫補中久受寒中宜辛苦寒潤之熱病多火痰暈吐足痠或大濕病腫脹瀉難停消補清熱與燥濕傷元氣不足宜消導勞役飲食俱傷補益消導兼行其中或兼清熱或兼燥濕痰九○清熱小調中湯橘皮竹茹湯藜蘆神散三黃枳椏二陳湯加山查麥芽枳米丸倍飲胃冷湯加半夏化痰丸○清熱小調中湯橘皮竹茹湯藜蘆神散三黃枳椏二陳湯湯和○燥濕二陳湯六君子乘勝虛實脈堪憑脾胃邪所勝胃風黃茂連中湯三白湯胎熱和所來瀉黃散清胃散調胃承氣湯肺痿燥邪所乘八珍湯錢氏白朮散脈沉細寒邪所乘益黃散人參養胃湯九附子理中湯九補真丸脈緩無力或時隱伏正氣虛而損也四君子湯參苓白朮散脾經太過濕邪自甚也平胃散

氣氣滯痛

諸氣皆因火作孽七氣喜怒哀思悲恐驚又曰九氣者挾外感寒熱而言也人身陰陽正氣呼吸升降流

木香檳榔九辛涼以折之最忌辛香助火耗氣之劑雖木香亦好上升必佐以知母黃柏丹溪云上升之

氣其自覺其出中快相火其熱間傷生冷與寒熱按傷飲食生冷情逆過飽大實痛者蒸黃九因七情過飢

胃脫病者四君子湯加木香○按寒則腹理密而氣敏於中五積散入裡四逆湯扶風分心氣散扶風寒

身受寒氣而後取用亦變法也高陽生專謂冷生氣者泥矣○按暑熱則喜樂恐懼驚勞動散真无動

心氣散不致過則健忘歸脾湯恐傷腎精法不升過則下焦脹滿三和散補中益氣湯驚傷脾神氣不定

過則怔忡失志妙香散十味溫膽湯此三者皆令真元耗散多見不足之症又勞則喘息汗出亦令氣散

尤宜怒惱憂悲思慮逸靜滯結湯憂傷肝氣上逆過則嘔吐積梗二陳湯細珠正氣天香湯熱者紫菀

補益怒惱憂悲思慮逸靜滯結湯憂傷肝氣上逆過則嘔吐積梗二陳湯細珠正氣天香湯熱者紫菀

五臟宣中散應傷心胞及脾系其香積木九此四字皆令氣散升陽氣思傷脾其氣結過則痞滿

熱清氣湯湯木香化滯湯木香積木九此四字皆令氣散升陽氣思傷脾其氣結過則痞滿

輕者行助如愈結為積聚散虛中香分氣九大有積六聚癥瘕氣大實痛等疾暫用鹽煎散何魏釗氣丸

中益氣湯人參養榮湯自汗喘急者養正升細云氣無氣散而思不降者氣之所積無以取也必由行

如喘氣滿腎則氣始歸木香桂調其氣以星半細云氣無氣散而思不降者氣之所積無以取也必由行

補骨脂行氣散散氣始歸木香桂調其氣以星半細云氣無氣散而思不降者氣之所積無以取也必由行

白濁者行散散氣始歸木香桂調其氣以星半細云氣無氣散而思不降者氣之所積無以取也必由行

挽姜散古便連丸旋乾子主之或木香勻氣散用胸痞痺腫二便難胸膈痞塞飲便難胸膈痞塞飲便難

閉胸滿百藥不効者五香連理湯小便閉者五苓散兼血兼痰宜審別柏葉扶蘇沉七情之外感火無日不

通氣散○理則氣逆○散微微吐之治分痰積少與多降火清心尤妙訣痰積沉七情之外感火無日不

味以偏無日不積此丹溪河湖力主為火也雖然七情總發於一心七氣總詳於一七情之外感火無日不

毒解毒湯加知母枳殼分治量其所察厚薄而加減之大柴氣虛四君子湯氣實古烏附湯為主火多則黃

未寒加官桂吳英便閉加木香檳榔男子血虛及婦人胎產氣疾合四物湯

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行諸血先須分各經逆則上行順下行

熱吐曠者陽毒升麻湯○積熱因飲酒炙搏蓄熱三焦者黃連解毒湯黃連枳實二味湯龍膜內傷滋陰
 難蘇九四生九大金花九槐角九○痰血因打撲損傷聚胸膈者犀角地黃湯批仁承氣湯內傷滋陰
 補火自平○治宜開胃疾行氣二陳湯仁酒紅花升麻歸身不能藏血積憂傷肺遇思傷脾失志傷腎皆能動血
 皮蓋草生地木香氣急者加瓜蔓仁結毒四物湯加木香檳榔補虛者湯去木按加元參黃柏枳殼○內傷飲湯
 氣逆者蘇子降氣湯如失血後被七情傷氣虛火盛者單人多湯或回君子建中湯妙香散四物湯腎氣
 食生冷滯胃清道氣濁血崩者理中湯加乾薑川芎治助能分陰陽定血脈冷筆倒者加桂附傷酒吐血
 吐四君子湯胃氣乾葛山藥內傷勞傷氣虛火燥者甚陰降火湯加味道途散舒香散四物湯腎氣
 燒灰禽之髓血十全大補湯○內傷思慮傷氣虛火燥者甚陰降火湯加味道途散舒香散四物湯腎氣
 九吁嗟男女血為疾○人知百病生於氣而不知血為百病之胎也凡寒熱跌掌痺痛癢疹癩疥好忘好狂
 涼血心加黃連小腸山梔仁通絡止痛開腸瀉等症及婦人經閉崩中帶下皆痛癢疹癩疥好忘好狂
 加大黃三焦地骨皮心胞絡木丹皮清熱苦與肥腸石琥珀痰血加升麻引血歸仁非汁童便加以炒黑姜引血
 石羔乾葛大陽三焦無加連細小腸赤茯苓墨芽根久不止者加升麻引血歸仁非汁童便加以炒黑姜引血
 加清荷元參以散之血不止者加清荷元參以散之血不止者加清荷元參以散之血不止者加清荷元參以散之血不止者
 板血燥加人乳**保全脾胃可長生**○血汗下後發熱但用調和胃氣一復其血自止他如嘔吐後復發熱及傷

痰喘

嗜雜

惡心

嘔吐

狂逆

驚悸

怔忡

健忘

血

痰分新久內外邪痰乃津血所成積氣升降而重者黃濁稠粘結咯之外感傷則壅逆為患新而輕者形
 但痰症初起頭痛發熱類外感症胸膈食積則潮熱夜重類內傷痰火又痰飲流遊溢諸經主病賒為病而不
 注脈病尤多生吐于唇酸嗜嘔吐傷食積則潮熱夜重類內傷痰火又痰飲流遊溢諸經主病賒為病而不
 留於胃痰多生吐于唇酸嗜嘔吐傷食積則潮熱夜重類內傷痰火又痰飲流遊溢諸經主病賒為病而不
 集於心多怔忡骨節乾口燥咳嗽喘促名曰痰動於肝多為老痰頭風眼目稠動昏眩耳輪多胸膈痞滿名曰氣痰
 迷於心多怔忡骨節乾口燥咳嗽喘促名曰痰動於肝多為老痰頭風眼目稠動昏眩耳輪多胸膈痞滿名曰氣痰
 右疾麻木踏破奇症名曰風痰聚於腎多足膝酸軟腰背強痛肢節冷痺骨痛名曰寒痰又名虛痰凡
 身皆習如背行或身中結核或不紅不腫或下頰冷時似非腫硬小兒驚搐皆項先失散痰無常處調理
 冷涎水黑汁或大小便膿或冷痛或不通以至癆瘵在再婦人經閉小兒驚搐皆項先失散痰無常處調理
 他如開家胸背傷痛吐痛不已散血之劑因功結以風青寒黑濕色白○風熱外感或青或黑或灰善壅或喘或
 自虎丹便熱小省風湯搜風化痰立止百病兼功結以風青寒黑濕色白○風熱外感或青或黑或灰善壅或喘或
 五積散灌香正氣散重者溫中化痰九古半碗丸○溫痰或厚味積熱或外感誤溫所致色黃甚
 心痛者草半夏九或神末九濕熱色黃者
 中丸清膈管痧九在裏者青礞石丸
 執黃甚則帶紅些則帶血或紫清氣化痰九煎服大金丸

痰火鬱稠粘氣如絮○痰因飲食衣褥過厚火蒸津液成痰稠濁二陳湯加芥連山梅或柳上充潤下九

火清金潤肺緩以治之○飾齋化痰丸謝傳清金丸九早貝母黃芩天膏○氣痰三仙九千金指迷不食痞酒腎

出熱之不下形如破絮或如梅核四七湯久者換麻子加黃芩山梅海石三仙九千金指迷不食痞酒腎

脇痛加食痰因飲食不化結成痞塊積木九料煎服痰便如杯時有水聲者神保丸○酒痰小調

中湯香附瓜 痰飲有五因只一汗吐下溫用莫差 痰從伏飽眩吐五飲六症伏脾光食為一也皆因胃

水及茶酒停着不散再加外邪生冷七情相搏成痰即酒痰久而濕勝者與傷寒水症火同脈多弦滑或

伏眼下水如灰黑○痰飲水停腸胃腹響轉輒有聲令人暴肥暴瘦飲水在膈咳唾則痛懸懸思水

溢飲水溢四肢身腫重痛支飲水停膈上脘逆隔息短吐喘咳痰涎心下背冷如手摩大身短氣而渴四

諸飲在皮裏膜外表分者大小青龍湯汗之肅道也從輕汗以參每飲吐以二陳湯加防風桔梗探之分利

在腸胃裏分者十棗湯下之此皆治標之藥道也從輕汗以參每飲吐以二陳湯加防風桔梗探之分利

溫中化痰下劑開結枳朮丸九半夏湯肺湯虛實加導痰飲因濕動者曰濕痰導痰湯主之通用火加石羔青

氣動者曰痰氣順氣導痰湯因痰動者曰痰氣順氣導痰湯因痰動者曰痰氣順氣導痰湯因痰動者曰痰氣順氣導痰湯

能便大者未白木導加瓜菓杏仁老鬱痰加海石芒硝瓜菓食積如山查神麩麥芽停水加櫛柳痰在腸

下加白芥子以行之痰在四肢動於脾胃夜喘上氣升火降胃調和痰從何生○陽子竹瀝薑汁氣實和

刺墜下溫中潤肺家 痰原於腎動於脾胃夜喘上氣升火降胃調和痰從何生○陽子竹瀝薑汁氣實和

厥者麻子降氣湯三生散古疏永丹○脾虛不能運化者宜補中燥濕六君子湯加芥子竹瀝薑汁二陳湯發

鬱

鬱與氣類凡痰喘聲高脾散汗出如油身水冷者死

六鬱仍分痰火積

鬱者病結不散也六鬱氣血痰食濕熱蒸氣鬱則生濕濕鬱則成熱熱鬱則成痰痰鬱則成痞

不得變化故法

以順氣為先降火有則急治消分多少依與症治久則升散三焦通鬱本病成又不解鬱久火

大凡病當先尋

六鬱與痰火有則急治消分多少依與症治久則升散三焦通鬱本病成又不解鬱久火

發在何經加各經火藥

氣痰痰滿胸血能食 湯料參之此難病治法總要也氣鬱胸滿脇痛脈沉瀯如木香

醫學入門 卷四 痰鬱積熱 上海校經山房石印

積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒實熱因日服金石炙燂夜卧熱炕或火烘衣被久則積熱毒在
大小便閉法當清心解毒上熱涼膈散中熱調胃承氣湯下熱八正散三焦俱熱法當降火滋水金花九主
熱因消燥腎水相火炎上口渴燥渴渴精神短少心忪自汗懶於動作夜卧睡語法當降火滋水金花九主
之或只清之實分氣血清各經血復實熱洗心散甘露散澤海湯○心熱早瀉心湯肝熱瀉青丸脾熱瀉
黃散肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱導赤散胃熱瀉胃湯安胎湯○清瀉之勝虛灸升降與滋益氣清心
脫熱加味石羔湯然熱皆屬於心熱甚則能傷熱瀉胃湯安胎湯○清瀉之勝虛灸升降與滋益氣清心
逆子氣何以治熱熱久者宜升熱甚則能傷熱瀉胃湯安胎湯○清瀉之勝虛灸升降與滋益氣清心
中蓋氣何以治熱熱久者宜升熱甚則能傷熱瀉胃湯安胎湯○清瀉之勝虛灸升降與滋益氣清心
氣者在人乃胃之生氣使真氣旺而和熱自退○血分虛熱四物湯加芩連山梔或為九服久則滋陰以
降之泰元扶蘇湯或古歸芪湯滋陰降火湯滋陰散○血分虛熱四物湯加芩連山梔或為九服久則滋陰以
熱全大補脾湯不參香榮湯參加知母散調之虛風痰濕熱常相兼變症多端難執一治風熱或熱甚生風
者治其熱而自消凡頭目腫痛眩暈眼昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙腫疔疹如類皆風熱炎上之
所為也初起上攻者川芎茶調散至寶丹四神丹上清丸久而下注血衰者腎氣先加知母黃柏或當歸
龍澤丸四生散○痰熱者因痰生熱或因熱生痰凡見瀉下痢水腫或類皆風熱炎上之
翳白濁痛腰脚氣之類油濕熱下流之所為也治見各條丹溪治濕熱上焦黃芩虛者天麥門冬代
之仁紅花經曰治病必求其本此風熱
與痰熱濕熱此乃百病之根本者也

積熱

積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒實熱因日服金石炙燂夜卧熱炕或火烘衣被久則積熱毒在
大小便閉法當清心解毒上熱涼膈散中熱調胃承氣湯下熱八正散三焦俱熱法當降火滋水金花九主
熱因消燥腎水相火炎上口渴燥渴渴精神短少心忪自汗懶於動作夜卧睡語法當降火滋水金花九主
之或只清之實分氣血清各經血復實熱洗心散甘露散澤海湯○心熱早瀉心湯肝熱瀉青丸脾熱瀉
黃散肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱導赤散胃熱瀉胃湯安胎湯○清瀉之勝虛灸升降與滋益氣清心
脫熱加味石羔湯然熱皆屬於心熱甚則能傷熱瀉胃湯安胎湯○清瀉之勝虛灸升降與滋益氣清心
逆子氣何以治熱熱久者宜升熱甚則能傷熱瀉胃湯安胎湯○清瀉之勝虛灸升降與滋益氣清心
中蓋氣何以治熱熱久者宜升熱甚則能傷熱瀉胃湯安胎湯○清瀉之勝虛灸升降與滋益氣清心
氣者在人乃胃之生氣使真氣旺而和熱自退○血分虛熱四物湯加芩連山梔或為九服久則滋陰以
降之泰元扶蘇湯或古歸芪湯滋陰降火湯滋陰散○血分虛熱四物湯加芩連山梔或為九服久則滋陰以
熱全大補脾湯不參香榮湯參加知母散調之虛風痰濕熱常相兼變症多端難執一治風熱或熱甚生風
者治其熱而自消凡頭目腫痛眩暈眼昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙腫疔疹如類皆風熱炎上之
所為也初起上攻者川芎茶調散至寶丹四神丹上清丸久而下注血衰者腎氣先加知母黃柏或當歸
龍澤丸四生散○痰熱者因痰生熱或因熱生痰凡見瀉下痢水腫或類皆風熱炎上之
翳白濁痛腰脚氣之類油濕熱下流之所為也治見各條丹溪治濕熱上焦黃芩虛者天麥門冬代
之仁紅花經曰治病必求其本此風熱
與痰熱濕熱此乃百病之根本者也

赤芍脾熱如山... 虛火治法... 進血陰虛... 陰虛亦不可治... 真陽虛亦不可治... 然不足味非... 丹四聖不老... 造丸消濁... 未者此皆養性延年之藥亦必因病選用

沉寒痼冷

沉痼大補血氣... 若原只因生... 息失宜變咸... 女帶吐瀉... 身冷者古... 回陽丹黑... 陽治心經... 之氣不經... 而之氣不... 者弗去無... 此大僕達... 相建此故也

右雜病提綱... 雜病者或兼外感風寒暑濕燥火之氣或挾內傷宿食氣血痰鬱虛實之情外感厥則

為四中內傷久則為沉痾所以提之於前以見其為百病大綱其餘症皆由此變出醫能知此門戶又能知從頭至足問症之法第一辨其為內傷取為外感耶外感手昏熱而口能知味內傷手心熱而口不知味外感傷風惡風面光有汗傷寒惡寒面慘無汗傷暑惡熱煩渴面垢傷濕惡濕重着面黃內傷勞役傷則憂勞而心口不痛飲食傷脾則惡食而心胃刺痛若夫色慾傷胃則愈好色而骨蒸口多嗜味陰虛火動故也七情思慮傷心與脾則益善思而恍惚不寐憂怒傷肺與肝則愈動氣而痞滿眩嘔口仍失味諸氣怫鬱故也一切血症日輕夜重一切痰症食少肌色如故一切火症性急潮盛一切水症脇硬心下怔忡至於辨症虛實俱以似傷寒陽症者為熱且積也似傷寒陰症者為虛且寒也又辨其內外有無相兼多寡或不內不外而為本經自病男子必審房勞女人先問經孕與所處順逆及曾服某藥然後証之以脉萬無一失噫機括熟而門類顯者惟不脉而藥可以廣及然亦難乎其人之妙悟也病家一時緊急尋醫辨症且將此提綱理會亦不致差門戶以後分類有言外因風寒暑濕內因七情痰血痰火食積而不詳言其症者正以括之於此也以意會之醫門斯可入矣

雜病分類

風類

頭眩

頭眩欲倒辨瘦肥或云眩暈或云眩冒眩言其黑暈言其轉冒言其昏一也虛者內外之邪乘虛入表而
而上衝所謂無痰不作眩者是也治宜以痰為主兼補氣降火瘦人多濕痰滯於上炎起於下痰因火
風勝則地動火得風則旋旋是也治宜以痰為主兼補氣降火瘦人多濕痰滯於上炎起於下痰因火
眼花昏暗屋旋飛經曰狗蒙招尤狗蒙者如以物蒙其首招尤者招搖不定如立舟車之上起則倒伏
之精而與脉并為系上屬於腦後出於項中散於目系急而眩者矣虛弱老年陽陷越內傷勞役氣虛不
之虛其人深則隨眼系人於腦則眩轉則目系急而眩者矣虛弱老年陽陷越內傷勞役氣虛不
陽宜補中益氣湯色慾傷腎氣不能歸元四君子湯如天麻防風或十全大補湯腎氣丸加鹿茸○血
虛因產從金瘡及吐衄亡血孤陽浮越古方歸湯加炒乾姜藥血滯胸加重便○老年每早起眩暈須臾

上海校經山房石印

自定有風痰虛火者果係陽虛元散吞黑錫丹以鎮壁之玉機謂火痰重甚氣痛眉二動其疾甚者
丹鐵金石助火香竄氣多致飛越之亢豈能鎮其不歸之氣而
木之活火或壯實屬陽明者單大黃酒炒為末七情臟氣或不平澹湯心或防風等分履太陽腸少陽者七
立等分或末茶清下虛火半夏因木麻痺虛者山來史或四物湯加秦光老活通單白芷九又大風頭
湯瀉虛飲風則項強寒拘痛等石蓋散虛者山來史或四物湯加秦光老活通單白芷九又大風頭
眩手足麻痺胃脘發痛乃風寒濕三痺合至必有停飲在上宜量吐之○寒脈暑煩渴今濕重垂
無汗四肢拘急筋脈頭暈山拖川芎風濕玉壺九吐外邪和解清痰火內虛本固標自移凡肝脾
味香和散或二陳湯加黃連山拖川芎風濕玉壺九吐外邪和解清痰火內虛本固標自移凡肝脾
頭痛咳嗽感解化痰不可妄施汗下內因量施補益昔丹溪治婦人帶下頭眩專治帶而眩安蓋頭眩
不防風寒病之標也經曰治病必求其本通風合芍藥湯停水心博治五苓散酒食傷加乾土麻白附中
疾疔惡毒火或加量便如眩暈氣上衝胸戰者宜清上辛涼之藥調之氣虛倍參芪血虛倍芍歸芪
甘草湯加減○凡眩暈言亂汗多下利時時自胃者虛極不治

頭痛

厥頭痛將內外分
和氣逆上陽經而作痛甚則發厥須分內外二因治之外感寒熱表家論外感頭痛必
輕重解表湯○風症柏加桂枝香蘇散消風散熱川芎極蓋散用麻黃三五七散風寒入腦連齒痛者寒熱宜酒
以茶下○寒症連翹葛根白湯葛根白湯○暑症香薷散加薄荷白或大半夏湯姜汁為丸服○濕症
今為末茶清下○通用二陳湯加芍藥白芷湯加酒芍藥散吐吳英風寒浮寒如羌活麻黃川芎湯明黃升如熱惡寒
所宿痰偏加不止令人喪明宜合川芎茶調散探吐太陰體重腹痛脈沉必有痰加倉朮南星少陰寒厥
脈細細加附子細辛麻黃杜沐殿冷脈得緩如吳英頭項痛者宜合羌活吳湯肥人加二朮瘦人加
酒芍藥加麥刺子川芎酒芍藥苦頭內虛氣滯太陽痛宜補氣益血相火街耳鳴如知母雙刺子或四君子
湯大病後及氣虛痛血虛魚尾上生噴兩虛者調中益氣湯加川芎細辛按火者安神湯
者四柱散加茶一撮
情嘔胃脘下虛上感巔頂痛不可忍肝率之則按之則聖宜與心換痛者古葉九散湯
區痰頭眩眼吐酸水宜古芎烏散痛虛宜半夏夏病人只宜酒炒大黃為末茶清下○痰火痛甚如破二
代痰者瓜蒂散吐之○積聚痛者大黃備急丸○凡頭痛數日不食百藥不効者二氣丹無熱者黑錫丹
常服煎頭散斷根○尋常頭目不清似痛非痛參蘇飲主之以熱者嫩清膏茶連煎湯調下沫浴後者單

頭風 附眉稜骨痛

頭風項強分偏正者有痰者或柳沐取涼及醉飽仰卧風入腦入項入耳入鼻自頸項已上耳目口鼻
 或目痛或眉稜上下製痛或鼻中閉香極香聞臭極臭或有頭痛多血虛或有火或風熱則項強硬身熱
 急宜川芎茶調散或風濕通氣散主之此正頭風也○偏左痛者多血虛或有火或風熱則項強硬身熱
 虛或骨痛或痰或頭風久則為風也兼濕兼熱陰煖定○風濕腫痛連骨背或遇陰風或風熱則項強硬身熱
 利之熱微加荆防薄荷便開更加大黃微濕痰痛客多右邊○風熱腫痛連骨背或遇陰風或風熱則項強硬身熱
 病益熱者朝輕夕重宜古中歸風或四物湯加荊防白芷薄荷南星蒼朮川芎及細辛少許
 必欲神相裏包者熱鬱也宜涼血消火為主佐以辛溫散表從治二陳湯加酒炒黃芩及荊芩薄荷川芎
 法并辛或消風百解散防風通聖散○有三陽熱鬱頭痛不戴見光喜置水於頂者宜辛涼汗下三
 宜大承氣湯下之外用大黃久便閉目赤脈沉者乃肝乘脾發熱方愈而後外感自汗者
 加味烏荊丸因七情發多吐逆寒熱者參蘇散主之如頭風發熱者二陳湯加烏藥川芎夜刺身重者導痰湯
 非痰與風熱甚風痰眉眶骨痛者二陳湯加荊防白芷薄荷南星蒼朮川芎及細辛少許
 星○風熱眉稜骨痛甚生熱地黃丸或四物湯加酒黃芩風虛扶風川烏草烏細辛或金麥丹血虛扶風藥
 明眉眶痛甚者生熱地黃丸或四物湯加酒黃芩風虛扶風川烏草烏細辛或金麥丹血虛扶風藥

面風

面腫虛食熱不食面腫乃食後胃風所致能食者風虛面麻木牙關急搗竹麻胃風湯不頰腮同此分虛
 實者升麻黃連連翹乃能食為風虛不食為風熱搭頰連翹耳身下兩三熱次以升麻黃連翹
 胃水煎服詳外科非肥陽盛面熱湯衰寒胃承氣湯如黃連耳身下兩三熱次以升麻黃連翹
 是胃家疾升麻風容皮膚痰積臍腹則細虛出黃水或目生粉刺梳兒終于塗之
 湯洗之如生五色瘡只用益湯綿沒搭瘡上日五六易如生粉刺梳兒終于塗之
 內服棧皮散○面皮裏痛者用何首烏為末姜汁調敷以帛蓋定多熱鞋底射之

眼病須先分表裏
初起在肺表者氣淚刺痛久則入臟
室內精勞傷氣淚刺痛久則入臟
入房亦此理行表症起重者理
入房亦此理行表症起重者理

月白濁肺氣之精曰氣輪氣症七情氣滯則血凝
月白濁肺氣之精曰氣輪氣症七情氣滯則血凝
月白濁肺氣之精曰氣輪氣症七情氣滯則血凝

或生翳如王色浮滿不痛者忌針或生翳如王色浮滿不痛者忌針
或生翳如王色浮滿不痛者忌針或生翳如王色浮滿不痛者忌針

枯黃連瞳重者烏珠不痛者忌針或生翳如王色浮滿不痛者忌針
枯黃連瞳重者烏珠不痛者忌針或生翳如王色浮滿不痛者忌針

散以平土氣曰物湯以補肝虛經年腫子色如金深則言黃風在治者一
散以平土氣曰物湯以補肝虛經年腫子色如金深則言黃風在治者一

赤不痛或浮翳如水晶光無瑕或生翳如王色浮滿不痛者忌針
赤不痛或浮翳如水晶光無瑕或生翳如王色浮滿不痛者忌針

針入或皆頭痛或用力作勞有傷肝氣或成或痛或癢兩皆穿出心宜
針入或皆頭痛或用力作勞有傷肝氣或成或痛或癢兩皆穿出心宜

宜大黃芥防風薄荷等分上下兩胞胃與脾者肥急重者上心宜
宜大黃芥防風薄荷等分上下兩胞胃與脾者肥急重者上心宜

或或眼生如膠或用法三枚針刺目眶外以三梭針刺痛處
或或眼生如膠或用法三枚針刺目眶外以三梭針刺痛處

弱毛出翳退外用手法細針內如眼外以三梭針刺痛處
弱毛出翳退外用手法細針內如眼外以三梭針刺痛處

脾左熱寒右熱患輕者左熱患輕者左熱患輕者左熱患輕者
脾左熱寒右熱患輕者左熱患輕者左熱患輕者左熱患輕者

痛堅硬乃肝聖藥血也宜加味刺黃湯去光宜透肝散後兩股退散初
痛堅硬乃肝聖藥血也宜加味刺黃湯去光宜透肝散後兩股退散初

看之用瓶音草每日常輕微刺黃湯去光宜透肝散後兩股退散初
看之用瓶音草每日常輕微刺黃湯去光宜透肝散後兩股退散初

不使眼腎水一熱黑瞳子骨之精日熱或虛腫人內散大視物不真
不使眼腎水一熱黑瞳子骨之精日熱或虛腫人內散大視物不真

發重則生翳腫人上如凝脂色溢痛無淚或清翳如黑花子微熱先
發重則生翳腫人上如凝脂色溢痛無淚或清翳如黑花子微熱先

或眼青下起粟子而深乃五臟風熱也或血灌瞳人無翳其痛如刺
或眼青下起粟子而深乃五臟風熱也或血灌瞳人無翳其痛如刺

眼或眼青下起粟子而深乃五臟風熱也或血灌瞳人無翳其痛如刺
眼或眼青下起粟子而深乃五臟風熱也或血灌瞳人無翳其痛如刺

物撞打驚痛昏暗眼腫停留瘀血宜貼地黃膏次服決明散如撞刺生翳經久復被物撞轉如昏暗者

治經功散救之及乘緣砂塵入眼腫人不交單瞿為未輪延調敷或新筆蘸京墨點之及湯泡火燒腫

痛者不可用冷藥即點待一日後以五行湯溫洗及地黃膏敷之風症則腫在青水下向日細視方見或不

能收散乃膽受風熱宜法風一字散色相間頭痛無淚目中如生八廓寄位始有名乾為天厭位兩蓬白

暗室或雷頭風熱毒氣衝入睛中牽引瞳人或後或大則不見八廓寄位始有名乾為天厭位兩蓬白

坊為水厥位腫于屬腎良為小肝位神先為命門坤為地肺位上睛上截向小皆屬小腸為風下向日

人外屬肝位腫于屬腎良為小肝位神先為命門坤為地肺位上睛上截向小皆屬小腸為風下向日

皆歸婦人小兒大同耳毒湯活血為主忘小兒胎生胎風雙目紅而腫赤爛至三四歲不愈宜消

小兒眼肥白皮煎湯下又小兒通睛欲刺東邊則見西畔若胎開宜禁胡散神散受風五瘡小兒眼

風散柔白皮煎湯下又小兒通睛欲刺東邊則見西畔若胎開宜禁胡散神散受風五瘡小兒眼

兩眼青後虛明及初生視物近看睛睛赤腫痛溢且痒或飲食積熱或天行赤目暴赤腫痛似或傷寒後

不視至四五歲瞳人結白昏本不見暴赤腫痛溢且痒或飲食積熱或天行赤目暴赤腫痛似或傷寒後

風散為毒不可藥用涼藥因成內障赤不可復散於四膠也黃赤流淚或流淚或流淚或流淚或流淚或流淚

明散但須開目輕視又中惡崇卒痛如針刺翳膜昏總表暴赤流淚或流淚或流淚或流淚或流淚或流淚

或如大及太陽穴痛早輕夜重宜決明散翳膜昏總表暴赤流淚或流淚或流淚或流淚或流淚或流淚

難開乃脾受風食毒下而赤流淚不止食後吞當歸龍膏丸數粒○目昏者熱湯也甚則平白目

如珍珠翳去風色下而赤流淚不止食後吞當歸龍膏丸數粒○目昏者熱湯也甚則平白目

寒遇風冷則流淚尤甚者白美藍散風淚不止食後吞當歸龍膏丸數粒○目昏者熱湯也甚則平白目

無所見效傷寒兩熱極則目昏而不識人目微昏也若患風症者必多眼或如漏廉視或視如起或如

花皆目之立府開密而致眼睛神不能目微昏也若患風症者必多眼或如漏廉視或視如起或如

煩受毒則立府開密而致眼睛神不能目微昏也若患風症者必多眼或如漏廉視或視如起或如

目眩耳鳴下虛屬腎虛必眼花睛痛耳鳴○昏花者傷光內障黑花腫散香內障昏蒙外無翳膜因眼睛

昏暗者傷血熱症亦有羞明怕日但內障全不敢近光者傷光內障黑花腫散香內障昏蒙外無翳膜因眼睛

或紫虛色五色如雲烟或見五色熱治比內障全不敢近光者傷光內障黑花腫散香內障昏蒙外無翳膜因眼睛

能近視不能遠視者看一不成近視者屬心虛宜氣九地九淚冷睛疼多縹絲者香冥近視陰虛遠視陽

無火者蒸腎丸外因風熱淚挾痰外因風熱淚挾痰外因風熱淚挾痰外因風熱淚挾痰外因風熱淚挾痰外因風熱

熱則珠安胎丸外因風熱淚挾痰外因風熱淚挾痰外因風熱淚挾痰外因風熱淚挾痰外因風熱淚挾痰外因風熱

瀉青丸涼膈丸墜胎丸選用○濕則食減身倦乏氣羞明如雲霧掩日或忽然不見或畧見不明宜益木

瀉青丸涼膈丸墜胎丸選用○濕則食減身倦乏氣羞明如雲霧掩日或忽然不見或畧見不明宜益木

瀉青丸涼膈丸墜胎丸選用○濕則食減身倦乏氣羞明如雲霧掩日或忽然不見或畧見不明宜益木

瀉青丸涼膈丸墜胎丸選用○濕則食減身倦乏氣羞明如雲霧掩日或忽然不見或畧見不明宜益木

瀉青丸涼膈丸墜胎丸選用○濕則食減身倦乏氣羞明如雲霧掩日或忽然不見或畧見不明宜益木

散單者未嘗濕熱甚者神芎丸○暴寒則目瞤不明皆熱所為也人參敗毒散者升麻葛內傷氣血精
 根湯歷考眼科無寒而有虛寒泣血而不上攻取○按疫者則痛甚宜卜者風揚南星瀝多痰者羌活
 神少內傷七情氣逆膈膈而動痰涎光赤木香流氣定心丸因怒者當歸龍骨丸○內傷飲食勞倦
 補少石義散因過思勞神大志九育神湯夜吵九憂驚恐者紅目丸益木散補中益氣湯如脾胃熱兼有
 宿食者秦丸大黃為末炒鴨鴨利之脾胃濕傷內障者紅目丸益木散補中益氣湯如脾胃熱兼有
 者蘇木煎湯調人多未連鼻與手掌紫黑者四物湯肝九桃仁紅目丸益木散補中益氣湯如脾胃熱兼有
 氣虛者補腎丸腎精虛者益陰腎氣丸血虛者養神清九又肝熱之系也
 於目而照微光射注於目則神清氣爽則氣血安神者乃治眼之本也
 當歸秦丸為臣柴胡升麻若風熱并消腫止痛外浮赤而痒甚大藥表病肥人許多風熱防風黃芩
 中不赤而拉赤且燥若風熱并消腫止痛外浮赤而痒甚大藥表病肥人許多風熱防風黃芩
 當歸秦丸為臣柴胡升麻若風熱并消腫止痛外浮赤而痒甚大藥表病肥人許多風熱防風黃芩
 血虛枝風者通元參山柏仁黃九為佐地黃丸熱地黃丸通羊肝丸久甚者退翳丸活命羊肝丸○人
 古人只消一火字下也眼光不虛實而已白輪變赤火乘脾也內輪赤腫火乘脾也內輪赤腫火乘脾也
 明瞭老人火在上則視昏眼青睛有翳者倍宜前風熱藥中加杞壳杏仁破氣虛火在足於養陰
 陰藥中如知母黃柏則視昏眼青睛有翳者倍宜前風熱藥中加杞壳杏仁破氣虛火在足於養陰
 火少却宜溫力者宜補陽湯黃芪湯過多加黃柏或菊睛丸經日壯水不利兩目緊急青白翳見大皆視物無
 以消陰翳養陽是也今人辛不分陰陽專以戴外治點洗要手巧亦暴本體血虛者宜服藥以塞其源藥
 洗之生有雲膜方不可用點若無翳膜縱久但可洗之却忌過用涼藥冷洗水血虛者宜服藥以塞其源藥
 水古人忌用惟太陽經熱生翳若無翳膜縱久但可洗之却忌過用涼藥冷洗水血虛者宜服藥以塞其源藥
 草刮去他如金針撥轉眼
 人等法另是一家傳授

耳

耳聾虛熱分新舊新聾多熱少陽陽明火多故也宜散風熱開痰鬱之刺舊聾多虛腎常不足故也宜滋
 補兼通氣之劑肝症以腎為主連濡為虛浮動為火浮動為風沉瀆為氣數實為熱

兩胃怒左相火右耳聾色慾動火則左右俱聾三者怒怒為多痰火風濕氣閉可通升兩耳蟬鳴熱鬱甚
 則氣閉漸覺眼中流火宜二陳湯加黃柏通氣散因通聖散加大黃星椒又酒炒或深後丸諸
 風俱用酒炒如羌活防風俱用酒炒或五苓散加陳皮枳殼蒼術生薑濕痰神芎丸濕熱挾氣木香檳榔

腫痛用酒炒如羌活防風俱用酒炒或五苓散加陳皮枳殼蒼術生薑濕痰神芎丸濕熱挾氣木香檳榔
 先○氣雙因臟氣厥逆上壅入耳痞塞不通必兼眩暈實人因怒者當歸龍骨丸虛勞精氣脫難救

人因思者妙香散憂者流氣散子加菖蒲上感下虛者秘傳降氣湯加菖蒲

虛勞精氣脫難救

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嗜嗜而鳴或時時眼見黑花陰虛者四物湯加知柏當歸遠志
或腎氣丸加磁石故紙是於子黃柏陽虛者入味丸益腎散磁石湯○勞聾昏聩睛瞶瘦痺之方因勞力
脫氣者補中益氣湯加當歸補骨脂丸如久聾腎弱氣虛絕不聞者難治
參養榮湯加知柏或補腎丸如久聾腎弱氣虛絕不聞者難治
湯加生地知母或通聖散疫火鳴甚高歸龍會九扶濕神芎丸或青木
香丸腎虛微鳴滋腎丸氣虛四君子湯下血虛核湯下陰虛虎潛丸
耳風熱上壅流膿脂地龍錫燐五分陳皮酒脂俱燒灰各二分磨入耳中調排去重者內服柴胡龍耳湯○耳
或枯聾末亦可疼甚用吳茱萸頭尖大黃煨爛倉足掌心重者內服東垣眉粘子煎湯大要調氣與開
發腎水殺耳而能開聲者水生於金也肺主氣一身之氣積於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣開
亦劫劑之可也外治暴聾亦可流豆粒蔥汁搗丸綿裹塞耳左聾塞右右聾塞左雙聾次塞之○
通聖散和之可也外治暴聾亦可流豆粒蔥汁搗丸綿裹塞耳左聾塞右右聾塞左雙聾次塞之○
石耳黃各一錢煨及油調搽加獨貝母末乾用○百毒之取編尿以生薑擦牙自出又方用琴弦一段將乾
頭聾教一分蘸綿膠入耳粘出凡耳中乾用○百毒之取編尿以生薑擦牙自出又方用琴弦一段將乾
塞耳氣久則不通裁養生者常摩耳廓以助聲也

鼻

鼻竇須知問久新
鼻竇於肺而能知香臭者心也人身水火升降衝調和則鼻司呼吸往來不息而已
或寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清道則香臭不知新者偶感風寒鼻壅重流涕
嚏宜以風寒治之九味羌活湯參蘇飲消風百解散久則暑感風寒鼻壅等症便或乃鼻石蒸散又有
鼻熱惡寒故鼻塞乾燥而內火便宜清金降火消痰之劑涼膈散加荆芥白芷或方鼻蒸甚則
必外感四時香臭者通氣湯內有硬物者單南星散貼之痰清氣化外用石菖蒲皂角等分爲末塞之
凡九不知香臭者通氣湯內有硬物者單南星散貼之痰清氣化外用石菖蒲皂角等分爲末塞之
凡九不知香臭者通氣湯內有硬物者單南星散貼之痰清氣化外用石菖蒲皂角等分爲末塞之

辛白芷防風姜活枯梗等分姜煎入清荷葉許久爲數萬調○甄者臭濁之氣也鼻蒸久則氣壅不轉熱
分食後煎服外用細辛膏○調者臭濁之氣也鼻蒸久則氣壅不轉熱
風散加髮灰肺火用蒼耳根炒子燒枯梗湯人參平肺散○膽移熱於瀝流涕濁臭一枝薄荷存性調星散
運中用絲瓜藤血近根如山五根炒子燒枯梗湯人參平肺散○膽移熱於瀝流涕濁臭一枝薄荷存性調星散
吹鼻中絲瓜藤血近根如山五根炒子燒枯梗湯人參平肺散○膽移熱於瀝流涕濁臭一枝薄荷存性調星散
熱痛鼻淵頭紅如山五根炒子燒枯梗湯人參平肺散○膽移熱於瀝流涕濁臭一枝薄荷存性調星散
散○鼻痛因風邪入鼻與正氣相搏道不通青丸除病根外調五藍胎末服氣虛加黃長常宜服單
散○鼻痛因風邪入鼻與正氣相搏道不通青丸除病根外調五藍胎末服氣虛加黃長常宜服單

二陳湯加黃芩山 鼻瘡莫痔熱同因 肺胃清氣不能升非外感也宜補中益氣湯以和之此皆治本之論也

口舌唇

口病有熱亦有虛 心主舌 脾主唇 口熱 心勞味厚病根 心貴安詳七情煩擾 口糜爛 失其心 口苦 心火炎 加之

上亦難辨 口瘡久不愈 服涼藥反甚 者乃虛火上升 口瘡久不愈 服涼藥反甚 者乃虛火上升

瘡赤白 口瘡赤者 心熱 口瘡白者 脾虛 口瘡赤者 心熱 口瘡白者 脾虛

舌病內外因可詳 心之本脈繫於舌 根分佈五臟心實主之 故曰舌者心之苗也

下二行以粥補佳如生瘡連頰腫者立參升麻湯以舌腫火口不能舉飲及不通者名重舌用蒲黃
頻刺舌上自退如不能咽即以黃連濃煎時呼之瀉心火再不止者死或齒搖舌上脫去
再救頭即消切勿刺中肺令血不止舌下有虫如蜂蟬頭小自尾可燒烙格舌頭上脫去
長過寸者單腎虛色淡黑一二點宜以生薑蜜水洗肺痰腫舌強壅腫肝血單熱花末條之
水片末敷之腎虛色淡黑一二點宜以生薑蜜水洗肺痰腫舌強壅腫肝血單熱花末條之
裂作瘡心熱生瘡破裂裂裂黃赤熱者煎麻葛根湯加薄荷黃芩桔梗
唇屬脾家病幾般風腫動寒揪縮熱裂乾血虛無色氣瘡腫咽唇不食療應難前唇緊小不能開合飲食
皮膚灰猪肺調搽仍將青皮灰末每一錢酒調服之○又方用亂髮蜂房六畜毛燒灰
指脂調搽或椒攪燒反或黃柏散○內治實者瀉黃散虛者菊睛丸腫者普濟仁湯

牙齒

牙齒屬腎胃大腸止而不動喜寒惡熱而惡燥熱則齒搖動而牙床不固而為腫痛或出血或生
腎虛滋陰腸胃涼止而不動喜寒惡熱而惡燥熱則齒搖動而牙床不固而為腫痛或出血或生

虎潛丸惡寒熱而口臭穢者腸胃開口便知風與熱風牙則因腸胃原活最邪更兼外風熱因外風與內熱
熱也宜涼藥湯火祛風清胃散開口便知風與熱風牙則因腸胃原活最邪更兼外風熱因外風與內熱

相時滋補一服甚效○風冷入於齒齦不腫不蛀日漸動搖者溫風散○熱牙因腸胃積熱開口臭穢
痛者宜歸龍膽散加荆芥升麻石羔或調胃承氣湯塞丸服胡椒溫熱之皮也調胃客寒犯腦痛難當寒氣犯腦

之亦可○歷年齒痛或黑爛脫落心口吸風痛止者乃膏梁濕熱之火也調胃客寒犯腦痛難當寒氣犯腦
者宜頭筋痛動搖內脫或用升麻脫落心口吸風痛止者乃膏梁濕熱之火也調胃客寒犯腦痛難當寒氣犯腦

因熱上攻頭面如升麻或犀角地黃湯銀有黑點被蟲傷凡飲食不能潔齒臭腐之氣冷清日久兼之
除至如疔毒皆其種類必殺牙宣之因只有二物建血風熱者消風散加芒硝內服外搽腎虛者四湯者四

香附糊柏葉牛膝外敷綠散或用生竹茹二兩煎飲風出走馬疳參小兒方散外治必兼辛溫藥
本因熱燥被風冷所鬱故內服辛涼以治其本外宜辛溫以治其標通用搽牙方擦牙先須擦牙

笑法醫熱風胃熱方風虫牙疼方延平方却痛方為鬚固齒方消磨法取牙不犯手方擦牙先須擦牙
疾凡遇日月散未平時勿進飲食誤食多恠齒疾科

疾凡遇日月散未平時勿進飲食誤食多恠齒疾科

疾凡遇日月散未平時勿進飲食誤食多恠齒疾科

疾凡遇日月散未平時勿進飲食誤食多恠齒疾科

疾凡遇日月散未平時勿進飲食誤食多恠齒疾科

上海校經山房石印

痛風

痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

極久則手足攣攣者詳分上下與過身 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

花頭風 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

烏頭風 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

黃頭風 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

防風 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

許合 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

皮吞 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

兩行 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

桂枝 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

痛者 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

赤芍 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

星主 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

寄生 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

防風 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

物風 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

熱腫 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

等分 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

加麝 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

湯起 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

藥積 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

如甘 痛風 歷節分法 勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其痛多兼腫或不腫痛

寒濕三氣乘之麻木併作者有表血俱虛但麻而不木者蓋麻痺也雖不知痛痺尚覺氣微流行在手
多兼風濕在足多兼寒濕木則非惟不知痛痺氣亦不覺流行常木為痺血脈凝滯木為濕痰皆結
凝滯血脈不貫謂之不仁或兼虛火則肌肉不覺流行不可誤作風治中湯○身皮痛麻木者補氣湯○手足麻
不行也宜先汗後瀉黃仁湯○開目麻木者退陽明目甚者并陽和中湯○皮痛麻木者補氣湯○手足麻
氣虛者補中益氣湯去當歸使皮加五味子白芍土甘草虛甚者扶風者補中益氣湯○正料加烏藥附
子羌活防風天麻○十指麻 胃有濕痰死血者二陳湯加二木紅花桃仁少加附子以行經○左手麻
底湯○兩腿麻木者專服湯○兩脚麻木如火熱者三妙丸
痺麻木等症慎疾者須戒 宜腥龜蟹酒醋肉屬陽助火但可量要若厚味
過多下必遺溺上心痞悶先用二陳湯加芍藥黃連降火然後用本症藥

斑疹附赤白遊風

斑疹屬火有二因 斑屬三焦無根之火疹屬心火其上侵於肺則一也外因初起頭身大熱口和味者
宜清肺以化其體壯者斑勢披發如錦紋下有心痕而無頭粒重者紅如錦紋成片多發在胸腹傷寒溫濕
藥多發表藥少○外感者取毒散加茶草或升麻根湯加元參咽痛者元參升麻湯○傷寒外治宜安
毒丹麻湯湯者化斑湯便閉者防風通聖散微利之便不甚閉去積黃身元參升麻湯○傷寒外治宜安
甚者黑奴丸斑爛者黑膏○內傷發斑如蚊頭疹子者多在手足初起無頭疹身元參升麻湯○傷寒外治宜安
宜調中益氣湯黃芪建中湯○內傷發斑如蚊頭疹子者多在手足初起無頭疹身元參升麻湯○傷寒外治宜安
斑疹中外感者調中疹隱皮痒無腫痛疹子者多在手足初起無頭疹身元參升麻湯○傷寒外治宜安
傷寒最重御溫毒也升麻葛根湯 出如粟米赤白分 羌活散於肌內濕加蒼朮茯苓如肢重者此風熱扶濕也
加牛蒡子并芥防風或鼠尾湯 宜理中湯○似赤似白微黃散於肌內濕加蒼朮茯苓如肢重者此風熱扶濕也
浴後感風與汗出解衣而得宜清風散寒加官桂暑加黃芩紫胡濕加蒼朮茯苓如肢重者此風熱扶濕也
皮湯遍身疹多痛極者古苦皂丸又有斑疹並出者不可禁服用風藥恐 五色血毒風火熾丹疹或遍五色
變痰嗽渴咽疹○面生紫赤癩疹及雀子斑汗斑皆此類之緩者 五色血毒風火熾丹疹或遍五色
因血熱毒善於命門被風毒透冷加黃芩白芷通身小兒門外治上珠散浮萍湯 黑而入腹最傷人斑
暑月人多羌活散熱丹疹各類今合以其因治同也

赤白遊風屬肝心所生○赤項身血皮肉變色赤者謂之赤癩白者謂之白癩乃肝風博於皮膚血氣不和
者道遠散加山梔或腎氣丸○赤項身血皮肉變色赤者謂之赤癩白者謂之白癩乃肝風博於皮膚血氣不和
防風如累傷風毒者胡麻散平卷耳九單浮萍九此疾久者只宜滋養氣血則火自息風自定痒自止若
用祛風辛苦之劑則肝血愈燥 虛痒不止血難勻 浮萍末調服或單滾雪花為末酒調服遍身及頭上風
風火愈熾元氣愈虛變為難治

赤白遊風屬肝心所生○赤項身血皮肉變色赤者謂之赤癩白者謂之白癩乃肝風博於皮膚血氣不和
者道遠散加山梔或腎氣丸○赤項身血皮肉變色赤者謂之赤癩白者謂之白癩乃肝風博於皮膚血氣不和
防風如累傷風毒者胡麻散平卷耳九單浮萍九此疾久者只宜滋養氣血則火自息風自定痒自止若
用祛風辛苦之劑則肝血愈燥 虛痒不止血難勻 浮萍末調服或單滾雪花為末酒調服遍身及頭上風
風火愈熾元氣愈虛變為難治

傷者單苦參九或薄荷蟬退等分為末酒調服○已上症應丹疹癩癩大同小異諸方通用

寒類

咳嗽

咳嗽須分痰與聲度聲俱有肺脾經肺因氣動為聲咳乃血化為痰肺氣動則咳則脾濕動則嗽在其實者痰稠聲且重虛者聲利痰亦清痰必先審肺虛實者浮大無力若沉細有力若沉而濇也痰因四氣隨時令風乘

咳則鼻寒聲重口乾喉痒語未竟而咳參蘇飲加桑白皮湯仁或柴胡半夏湯後用諸咳丸如久咳夜咳冬咳風入肺寒者口乾喉痒語未竟而咳參蘇飲加桑白皮湯仁或柴胡半夏湯後用諸咳丸如久咳夜咳冬咳

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱咳者三拗湯加知母黃芩杏仁或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯或麻杏石甘湯

上海校經山房石印

心痛

厥心痛先問久新真心痛因內外邪犯心君一日即死厥陰氣逆上衝又痛極則發厥也○新者身既受寒口又

傷或因過元陽始砂豆逆九維舌香散苦寒海火或神保辛熱行氣為向專也○痛其發厥有二因實厥寒

客背因血脈背俞與心火痛暴發手足厥冷身熱甚則煩汗青筋痛古立金散三味川練散痧者甚者大承氣

酒食積熱疾鬱發手足腫冷而身熱甚則煩汗青筋痛古立金散三味川練散痧者甚者大承氣

湯下之後七情怔忡蟲不定則怔忡痛來去痛痛散四七湯小單九煎者連附六湯內因七情

赤黃手足青至肘即真痛不治則怔忡痛來去痛痛散四七湯小單九煎者連附六湯內因七情

發難當痛定能食則嘔沫靈痛蟲痛濕熱生虫丸攻心香經用痰火來去症昏神熱者施姜飲蠟卷九疾積白

瀉香降氣湯或五苓散倍桂並汁為丸小尚煎湯下素管腎火上攻神昏早倒蘇合香丸痛引背脛痺者

胃脘脾痛傷飲食腹脹便閉嘔頻頻頻多但七情四痛脾連心而痛入胃疾痲脾胃蓋尸痛亦少脾胃痛

應治胃虛痛因傷飲食胃痛善宜兩隔咽隔不利脾痛舌強或人參養胃湯加玉桂吳茱或木香化海湯感

應食生冷過熱食不化無妨痛止散生薑散即胃火積散或人參養胃湯加玉桂吳茱或木香化海湯感

應丸凡心過熱食不化無妨痛止散生薑散即胃火積散或人參養胃湯加玉桂吳茱或木香化海湯感

補溫中湯連腸痛復元通氣散疾滯閉順氣導痰湯二炒香飲胃寒為藥沉香湯上桂吳茱或木香化海湯感

手粘散外感三般風冷熱連脇腰背少舒伸風因肝起乘或分兩筋引加厚桂枝湯加附子或厚

乘心痛則短氣因形寒飲冷臥涼腎氣乘心痛則心懸古飢腹痛則腹脹者正氣散散扶濕者除濕

黃連丸凡諸經心痛引背多痛微冷諸熱黃連香白芍散散如麥草或厚氣血虛勞按則止虛痛按之暫止

氣不足者六君子湯加肉桂氣血俱虛者古歸木散散扶痰去地黃多偏氣血虛勞按則止虛痛按之暫止

或死胃脘痞仁承氣湯輕者四物湯加桃仁紅花經行立胡索丸失笑散血痛加當歸產後痛者桂心湯

血加韭汁桔梗虫痛加苦楝根或不香梅柳急病加胡椒薑用斑茅炒過痛不可忍加細茶乳香或石膠

暑類

瘧

瘧疾先要陰陽定

陰陽為外感邪氣其間陽為風暑有汗陰為寒濕無汗陰為內傷正氣虛其間陽為氣虛

為臟邪深機與暑原不能與正氣并發故問日蓄積乃發或三四日一發或連日發者皆由陰陽不調

均乃氣血俱受病也陰陽不調或移時分定陰陽然後陽盛陰佳陰盛則陽升散今俗人似瘧誤治變成溫瘧

之陰陽不分須臾症用藥難早或移時分定陰陽然後陽盛陰佳陰盛則陽升散今俗人似瘧誤治變成溫瘧

為分陰陽誤矣殊不知瘧有凌虛之狀在傷寒久則難愈境陽熱陰寒如期應則陽邪與陰邪爭而正氣

症在內傷久則為瘧瘧疾先要陰陽定陰陽為外感邪氣其間陽為風暑有汗陰為寒濕無汗陰為內傷正氣虛

明而瘧治知本矣寒瘧太熱陽明寒瘧無汗頭項俱痛屬太陽寒多熱少汗出難已者宗胡少陽

多寒少熱而渴者白虎加參湯或黃芩湯身疼者敗毒散咳嗽者參蘇飲少陰四正廠四旁少陰瘧發於子午

脈抽搖者烏藥順氣散加柴胡黃芩身疼者敗毒散咳嗽者參蘇飲少陰四正廠四旁少陰瘧發於子午

乾口燥嘔吐微閉戶牖輕者小柴胡湯倍半夏重者四物湯加元胡索金鈴子附子太陰辰戌丑未病

太陰瘧腹滿自利善嘔已乃寒輕者小柴胡湯倍半夏重者四物湯加元胡索金鈴子附子太陰辰戌丑未病

子理中湯身重腹脹者五苓散木附湯浮腫退黃丸已上三陰血分受病發在虛暑後者俱謂之溫瘧

感新邪濕發自臍而達之腑乃積至夏重者瘴瘧山嵐瘴一左瘧瘧山溪蒸毒令人迷困發狂或謂之伏水

土者人參養胃湯○疫瘧一方長功相須參運氣寒熱鬼瘧卒感異常性鬼瘧因卒感尸症客忤寒熱

動異常宜辟邪丹雄珠丹或用燒詳分寒熱汗且和外感寒解非草業厚補不能溫散熱多非柴胡黃芩

陰瘧無汗須加木烏梅以和之或吐或下須體盛陽瘧初起瘧稍久者祛邪丸或金丹○三陰瘧時乃可

者宜下以茵之暑瘧黃連香茹散加大黃青皮烏梅煎服寒閉麻仁仁丸俱清良一服取神派丸○五拉瘧

內傷善食惟七情外和瘧宜四散量體虛實加各經閉鬱行氣之藥勞瘧微虛損瘧勞瘧微虛損瘧勞瘧微虛損瘧

如陰虛火動干後寒熱至晚微汗乃解如非瘧也宜加味透散如地骨皮若誤用藥必死○氣血

俱虛滿類食少或道精咳者人參養榮湯加地骨皮烏梅杏仁冬或什屨九瘧瘧嘔沫多昏迷疾瘧

者十全大補湯加柴胡黃芩湯虛去茶甚則皆黑或倒常山炒過久不止者薑散截之瘧瘧嘔沫多昏迷疾瘧

倍白豆豉或行熱多嘔瘧自吐氣虛白木山查神麩黃煎發時下清痰斂汗補胃脾瘧瘧嘔沫多昏迷疾瘧

熱併小柴胡湯或平胃散俱加枳實白木山查神麩黃煎發時下清痰斂汗補胃脾瘧瘧嘔沫多昏迷疾瘧

久不愈者因濕砂或癰氣婦人兒龍虎丹用杏仁煎湯下發時下清痰斂汗補胃脾瘧瘧嘔沫多昏迷疾瘧

濕痰為主內傷瘧皆汗多陽瘧一發參丹久虛瘧中結氣滿地知柏芍藥大抵有汗要止汗以補其虛利水

無汗要發汗以散其邪稍久者一發參丹久虛瘧中結氣滿地知柏芍藥大抵有汗要止汗以補其虛利水

消痰瘧母漢者非常年積痼決不能除但有須製寒熱不損胃氣老瘧丸是也血虛者補作俱以茶湯六和

劑用老瘧散宜量氣血虛實加減藥有時瘧後兩相兼或瘧後脾飲加減分利虛者補作俱以茶湯六和

連木香當歸砂仁或總要祛邪與扶正○外感汗吐下解湯清脾飲加減分利虛者補作俱以茶湯六和

成於瘧故捷徑以祛暑消痰為要○通用二陳湯外感無汗去痰後發瘧又因雜至錯氣血然始於暑

活方風臺本陽明加苦根升麻白芷少湯加柴胡芍藥黃芩青皮少陰加芍藥黃芩黃柏太陰加芍藥黃芩

三味瘧家以損脾胃內傷無汗少湯加柴胡芍藥黃芩青皮少陰加芍藥黃芩黃柏太陰加芍藥黃芩

截瘧身常山損脾胃內傷無汗少湯加柴胡芍藥黃芩青皮少陰加芍藥黃芩黃柏太陰加芍藥黃芩

血加桃仁紅花○吐瀉不食腫脹者則不治

痢

痢濕色症分熱寒於暑熱者多寒者少然急痛色赤者為熱身涼不渴滑清大便順利色白者為寒但利因

熱可○總因濕火氣血滯血因腸下動濕赤成瘧傷氣分則氣鬱自大便下濕下為白火傷血分則血熱

七情氣鬱而為火之質者有外感寒濕內傷生冷硬物積滯或房慾傷精血而為火之虛者皆令腸胃

名滿下又云前利表症頭疼或渴嘔金起氣發熱惡寒頭疼身痛表症也熱者飲虛者飲虛者飲虛者飲虛者

也吐有寒熱者屬半表半里表症頭疼或渴嘔金起氣發熱惡寒頭疼身痛表症也熱者飲虛者飲虛者飲虛者

上攻者平胃散加黃連木香檳榔○虛嘔食少者四君子湯加防風桔梗蘆根吐胃火衝上者清六九毒滿

虛者八物湯又二陳湯加枳椇吐全不食者謂之禁口胃大甚也大便大熱香連丸加蓮肉各一半

為末米飲下又二陳湯加枳椇吐全不食者謂之禁口胃大甚也大便大熱香連丸加蓮肉各一半

碎散中以太乙膏貼之引熱下行間有過服利藥及脾胃虛者參苓白朮散去山藥加用普濟裏急腹

痛後重盛火性急速傳下或化或不化食物積滯或出而黃降火芩連以散便不使腹痛痞痞行滯

溫之入素則便腹自愈行氣則腹重自除間有積滯或出而黃降火芩連以散便不使腹痛痞痞行滯

偏熱赤見著症輕者黃芩湯重者導滯湯日久黃連何黃連大熱積紫黑清色九日久地輪散單苦參

梅黃連或熱料五積散肢冷便清古姜附湯理中湯日久黃連何黃連大熱積紫黑清色九日久地輪散單苦參

或作瀉下流似痛濕如豆汁風香是濕痢腹脹身重下如豆汁或赤黑混濁危症也當歸白各半古姜厚

非痢古更連丸痛濕如豆汁風香是濕痢腹脹身重下如豆汁或赤黑混濁危症也當歸白各半古姜厚

色偏青者乃脾胃食積及四氣相併而作古更連丸散連丸散連丸散連丸散連丸散連丸散連丸散連丸散

痛敗毒散加陳皮或姜茶七情蟹渤食積黃解毒去如蟹渤拘急獨其流氣飲子古更連丸散連丸散連丸散

煎以之更參運氣調湯七情蟹渤食積黃解毒去如蟹渤拘急獨其流氣飲子古更連丸散連丸散連丸散

一丸小便閉者五苓散久不止者氣痢丸○積刺色黃或如魚湯漿漿脹痛者溫六丸體實者導水丸虛

勞滑脫多因慾升府香附刺柏葉○房勞傷精血成毒者腎氣丸虛癆扶痲者香連猪肚丸凡痢經下後

痛墜不減虛坐勞香久不愈者皆陰虛風濕去桂加熟地主補中益氣湯白朮散毒散脾胃之氣血者八物湯

地榆檉白皮氣分真人養臟湯大歸丸四物湯加參朮惟宜休息最難禁涼藥以致氣血虛者八物湯

吞酸

吞酸吐酸皆濕熱自甚為酸醫吐皆屬于熱則酸但少陽之酸乃平時津液上升之氣鬱為痰火當飲不化則

因治吐酸多則熱伏于胃多則吐而酸不開胃中無寒或得熱生冷治之宜反行或二陳湯

內熱之湯寒表熱以麻黃熱藥煎而愈不問何處風寒內傷非七情治之宜反行或二陳湯

水者神香肉桂乾姜三味羹藥煎而愈不問何處風寒內傷非七情治之宜反行或二陳湯

降火痰用二陳湯或生料平胃散加香附砂仁神氣山查麥牙山靴仁中酸宜素食者恐滯氣也飲酸食通

痛日齒赤酸者起木丸專吐清水者用蒼朮通散四兩加山查麥牙山靴仁中酸宜素食者恐滯氣也飲酸食通

紅心腹刺酸甘吐此便閉結者更宜大黃氣虛者更合四君子湯

黃疸

黃疸須知有濕乾發黃如雀目五疸同歸濕熱黃蒸血熱土色上行而目延及爪甲身體黃

病相似但濕病在裏一身不痛渴多喘滿治之難知凡黃汗因濕熱多為脾期十日以外厚腹滿利又濕病與黃

者汗濁俱黃身體腫汗出染衣亦齒身腫者曰金黃汗因濕熱多為脾期十日以外厚腹滿利又濕病與黃

難者汗濁俱黃身體腫汗出染衣亦齒身腫者曰金黃汗因濕熱多為脾期十日以外厚腹滿利又濕病與黃

難者汗濁俱黃身體腫汗出染衣亦齒身腫者曰金黃汗因濕熱多為脾期十日以外厚腹滿利又濕病與黃

難者汗濁俱黃身體腫汗出染衣亦齒身腫者曰金黃汗因濕熱多為脾期十日以外厚腹滿利又濕病與黃

難者汗濁俱黃身體腫汗出染衣亦齒身腫者曰金黃汗因濕熱多為脾期十日以外厚腹滿利又濕病與黃

難者汗濁俱黃身體腫汗出染衣亦齒身腫者曰金黃汗因濕熱多為脾期十日以外厚腹滿利又濕病與黃

消音能發黃大要時皮癩病發黃瘰癧丸風症色黃帶青小柴胡湯加首陳寒症色黃帶喘理中湯加茵陳
陳青皮枳實無汗者用麻黃三錢煎溫服以汗之暑溫症色黃帶赤五苓散加茵陳最妙○痰血發黃
喜狂喜忘使治分表裏滲為妙治疸表症小柴胡湯微汗之表少者茵陳五苓散下之準中丸以參
黑鮮傷寒五苓散為主溫多合平胃散積加三枚煎黃連仁神龜然加枳連溫中兼補腎與肝疸不屬肝
草龍芩通利如山托胃弱合平胃散積加三枚煎黃連仁神龜然加枳連溫中兼補腎與肝疸不屬肝
藥以溫中甚者小溫則喘滿又酒疸若虛損宜黑疸不渴利者俱宜六君子湯加茵陳黃連山
疸病幸痊而雀目腫脹又作慎之

水腫

水腫上下陰陽微飽水多外因涉水而見陰症陽水先腫上體有骨痛症陰水三陽內因飲水及茶酒過多或飢
三陰經故男從下陰微起女從濕熱變化總屬脾炎為熱久則溫熱滲絡虛皆濁瀉之氣津液與
血亦化為水初起目下微腫如臥蠶及至水浮膜外則為肩脈流下魚則為臍腫手足按隨手而起如裏下
水之狀以指畫之成字者名腫水有按之作水聲者乃氣虛不能宣泄久而成水瘕如裏下
注腎經陰府腫腎主水也推脾病則肺金失養非推肺氣孤危而失降下之令秀道不通且濕熱濁氣上升為
危○金生水也推脾病則肺金失養非推肺氣孤危而失降下之令秀道不通且濕熱濁氣上升為
渴二便閉汗下分消要得宜○經曰諸腫皆屬脾虛下腫又曰表症喘咳是也○治宜桂枝合六一散加橘皮
枝苦酒湯其輕重若年家久病及虛者黃連丸初起宜導水丸下消其濕五苓散用桂枝合六一散加橘皮
又當權其輕重若年家久病及虛者黃連丸初起宜導水丸下消其濕五苓散用桂枝合六一散加橘皮
白木煎湯下兼黃連服或單山芩散湯丸初起宜導水丸下消其濕五苓散用桂枝合六一散加橘皮
之常清心火降神全脾肝木有利而濟道又且潤通此補中行濕兼全虛而有濕熱者最宜補脾土氣
補則氣煖而小使自通氣陷者升提則陽舉而陰自降故曰行濕非五苓神祐之謂也○補中氣六君子
千金養脾丸者參苓白朮散分消湯丸濕防風湯退黃丸○虛甚氣喘口無味者六君子湯加茵陳黃連
根之便元丹如忌淡滲○腎虛腰膝二便俱利者木附湯丸○虛甚氣喘口無味者六君子湯加茵陳黃連
腎丸陽虛小利者去沉附湯丸二便俱利者木附湯丸○虛甚氣喘口無味者六君子湯加茵陳黃連
短大補氣血使水主降如枳實湯丸○虛甚氣喘口無味者六君子湯加茵陳黃連
必大補氣血使水主降如枳實湯丸○虛甚氣喘口無味者六君子湯加茵陳黃連
飲食無阻者雖不藥而既產自消矣陽兼食毒與瘡癩腫者名水瘕腫丸九因酒小土者買苓散

上海校經山房石印

大滿者承氣湯古法下之服已者是也。尋常感風脹者并麻黃根湯如着木或并麻胃風湯感寒脹者
不便者六和湯濕脈腫或內傷氣滯閉且利七情鬱積暑脹二便不利者香薷散或四滑石枳殼黃連二
便者除濕湯潤者三白湯或厚朴枳實便閉者三和散四磨湯憂思氣鬱者木香化滯湯或開胃湯或六君子湯
甚者當歸龍薈丸虛者麻黃厚朴枳實便閉者三和散四磨湯憂思氣鬱者木香化滯湯或開胃湯或六君子湯
蘇子大腹皮木香草菓厚朴枳實便閉者三和散四磨湯憂思氣鬱者木香化滯湯或開胃湯或六君子湯
下焦脹氣滿者延壽氣湯加木香枳實或紙食脹有熱亦有寒因肉食菓菜不化日食香丸或鹽湯探吐膏柔
湯加香附砂仁莖者治中湯加丁香或三補丸用香附山查煎服。久則濕熱乘脾大便秘或鹽湯探吐膏柔
者黃連阿膠等分醋浸蒸餅丸或三補丸用香附山查煎服。久則濕熱乘脾大便秘或鹽湯探吐膏柔
積熱者牽牛丸虛者木承氣湯加桂或厚朴湯或殼脹痞滿心如醋因食食不化日食香丸或鹽湯探吐膏柔
厚味大便閉者大承氣湯加桂或厚朴湯或殼脹痞滿心如醋因食食不化日食香丸或鹽湯探吐膏柔
前連下或單鶴散散最妙。蟲積善食癢不眠。嘉積腹痛善食茶鹽之物十金散丸。小兒史君
願擊硬咳不眠者廣木清聖湯保水脹瀉瀉血便於喘息停水飲茶酒不飲曰水脹腸中酒瀉有聲甘
安丸如九子輕者枳木丸。蟲積善食癢不眠。嘉積腹痛善食茶鹽之物十金散丸。小兒史君
所致人參芩歸湯散血消腫湯。一般中滿症稍輕。俗云倒飽有氣連如黃連青皮白芍木香清氣
平胃散加山查麥芽或枳木丸。凡虛腫及久病癱瘓脹者俱依此分氣根深固必三五半年而後成治
濕中久則成水治脈以補更難。蓋水腫飲食如常鼓脹音聲安想不責連効乃可萬全若單腹脹大而
然此皆脾氣虛極本經古方雖有八物湯去地黃倍參木加黃連厚朴及四桂散諸蟲保命丹煨爛煮肚注
皆急血以潤虛利八物湯參門冬濕合肝相刺乃真臟病也。不治四物湯加胡急蒼寬為甘草加大腹皮厚
及君仁神氣濕虛合八物湯參門冬濕合肝相刺乃真臟病也。不治四物湯加胡急蒼寬為甘草加大腹皮厚
瀉分消丸古龍虎丹寬中健脾胃大寒餘糧丸單雞醴散內消散外敷神膏

赤白濁

赤白濁男男女女皆因濕熱脾胃濕熱中魚不清濁氣滲入膀胱為濁如夏月天熱則萬木流津。赤者血分

熱微肺與大腸主之清心瀉濕痰濕火理一同。或傷暑濕痰二陳湯加蒼朮白朮赤石。白者氣分

子飲或五積散合四君子湯。濕痰濕火理一同。或傷暑濕痰二陳湯加蒼朮白朮赤石。白者氣分

知母黃柏或真味將丸。或星半始粉丸。因七情生疾者。四七湯。瘦人多濕。火加味。道遠散。四物湯。加

上海校經山房石印

聖製熱則流通
俱清上固下宜
閣有虛勞下部
冷思慮勞心虛
者妙香散十味
温胆湯金蓮丸
房慈傷腎虛者
並鮮分清
不可忍酒
久則升提斂胃
宮以升胃氣
素不飲者
蒼大恐升動
疾火胸滿者
再加以積壳
香附神越白
朮或煎
煮當歸丸
久則升提斂胃
宮以升胃氣
素不飲者
蒼大恐升動
疾火胸滿者
再加以積壳
香附神越白
朮或煎
四炒固真丹
白朮膏或喜丸
久甚古龍振丸
石蓮散
志丸
丹

腰痛

腰痛新久總腎虛
新痛宜疎而外
清熱久則補
腎兼理氣
血不依六經
不同火腎虛
而後邪所待
以精不移
用然
涼藥亦不忍用
參朮補氣
痛外感
暴痛
寒背拘
傷寒
必依六經
不同火腎虛
而後邪所待
以精不移
用然
強紫上怒不見
紅點人中
黑者死
痛甚
加黑
身牛少
導注
尿濕痛
重濕
相利
五苓
散或
因膏
濕成
溫熱
重單
角冷
如水
喜熱
物所
者古姜附湯
連射
肩背者
通氣
防風
湯摩
腰屈
伸少
許注
尿濕痛
重濕
相利
五苓
散或
因膏
濕成
溫熱
重單
角冷
如水
喜熱
物所
甘遂牽牛
風丸
煎其
溫而
止痛
乃味
熱蒼
拍散
濕赤
有者
五苓
散未
清燥
健豬
瘦子
有諸
藥不
功者
用酒
下風
牽脚
膝強
難
活寄生湯
虛活絡
命湯
加桃
仁或
脾法
急不
可愧
加皮
筋風
快寒
濕者
散加
杜仲
煎如
散用
全蝎
炒湯
去蠟
所
乳香少許
虛者
當心
腎俱
補憂
怒腹
脇痛
相須
行五
臟皆
連取
氣而
黑不
能久
立倉
行七
脈腰
間鬱
脹去
不仲
飲食難化者
異香散
有者
當心
腎俱
補憂
怒腹
脇痛
相須
行五
臟皆
連取
氣而
黑不
能久
立倉
行七
脈腰
間鬱
脹去
不仲
連背脇積難仰
濕痰流注
經絡
大便
泄者
龜丸者
二積
湯因
醉星
蒼白
通筋
弛香
丸痛
連胸
聚香
散子
調疾
甚者速効散
積聚者
牙神
越黃
花散
便泄
者龜
丸者
二積
湯因
醉星
蒼白
通筋
弛香
丸痛
連胸
聚香
散子
調疾
仰子
控經
絡大
便泄
者龜
丸者
二積
湯因
醉星
蒼白
通筋
弛香
丸痛
連胸
聚香
散子
調疾
血順氣寶者
桃仁
承氣
湯或
黃生
姜香
木沒
拍積
積因
醉星
蒼白
通筋
弛香
丸痛
連胸
聚香
散子
調疾
桃仁
承氣
湯或
黃生
姜香
木沒
拍積
積因
醉星
蒼白
通筋
弛香
丸痛
連胸
聚香
散子
調疾
者黃陰丸
熱者
加當歸
杜仲
心或
四香
木知
樺連
五痛
者復
披服
通之
聖散
者補
陰丸
加
作勞
血脈
難愈
勞力
壯不能舉
者杜仲
丸八味
補丸
鹿茸
木瓜
當歸
不能
新用
者腎丸
味安
腎酒
壯不能舉
者杜仲
丸八味
補丸
鹿茸
木瓜
當歸
不能
新用
者腎丸
味安
腎酒
壯不能舉
者杜仲
丸八味
補丸
鹿茸
木瓜
當歸
不能
新用
者腎丸
味安
腎酒

疝氣

疝本濕熱標則寒外醉飽勞後房越痛甚有動火火鬱者入則生濕津液凝為痰痰流入肝經肝性急小腹又暴

俱熱外腎聚垂玉莖挺急寒者遇寒則發或熱便皆利或閉其標耳外小腸膀胱由肝

其標未而言其質主外腎余于經云相連相會然屬肝主肝腎所屬於外腎非任脈消而引與

無由伸縮在女子取則為下經云相連相會然屬肝主肝腎所屬於外腎非任脈消而引與

論三經于膈多寒熱血之經云相連相會然屬肝主肝腎所屬於外腎非任脈消而引與

經三經于膈多寒熱血之經云相連相會然屬肝主肝腎所屬於外腎非任脈消而引與

小腹痛納氣房勞過度或精蓋為抑水氣滯于肝而心肝氣因之為疝結心明堂六脈皆治

反少腹張吐吞酸汗久則逆流或暴止者則治大綱囊痛引小腹疝物逆上氣根心者不月令也

中囊水筋氣血孤癩寒外水邪毒結于囊中或疝囊疝而流腫脹或陰汗不自收或氣痛痺至

瓜得于小腕兩旁怒氣便毒或于芬夏大脚氣核勞于七疝名有浮腫也後皆得病陰冷如石

或控牽丸而痛得于寒入濕穴使內過勞久與無疝此石人則疝陰即小突出氣寒則皆得病陰冷

石疝之類也左陰癩腫痛硬如石此疝也如石人則疝陰即小突出氣寒則皆得病陰冷

硬疝如絞痛甚則陰疝能左右相過上氣疝或連連石疝水寒者五疝積氣痛則皆得病陰冷

青木香丸散如內消丸黑錫丹單竹葉湯外腎腫三大白如斗核散不痛者核丸散

早水香丸散如內消丸黑錫丹單竹葉湯外腎腫三大白如斗核散不痛者核丸散

用唯積樹葉不結子者是晒乾為末酒糊丸者火或腎氣虛橫偏右多濕痰食積是知疝氣與川

首當消癥血。偏墜腫大。小兒偏墜。火或腎氣虛橫。偏右多濕痰食積。是知疝氣與川

宜詳審故持抽言之。治厚腰膏。小兒偏墜。火或腎氣虛橫。偏右多濕痰食積。是知疝氣與川

合四物湯加龍膽草青皮治詳內外宜球利。遇疝壯丹皮散。生風于宮下出氣每先與身痛部全

枝湯有泄者四君子湯加姜活附子。寒症。心痛。筋縮。肢冷。食則吐。舌乾。附注。痛甚。有汗。身痛。部全

上海校經山房石印

子橋核腎氣加振柳木通少許消痰癆積補虛血下痛走注無形漏氣痛有常處有彬乃濕痰食積	小腸氣加不齒腸脫氣加金鈴消痰癆積補虛血下痛走注無形漏氣痛有常處有彬乃濕痰食積	積者芋丸○食積痰血者樞桃積查散失笑散食積熱者肉桂枝九汁積痰之不定者八味薑汁調服	紫芝四君子湯加川練子菖香枳實山查火散食積熱者肉桂枝九汁積痰之不定者八味薑汁調服	去其未姜則胃火先其所蓄之熱久矣用則諸方多滿巴氣者此也虛甚上為吐逆下必遺精而	免要知濕熱為病宜南補北不可妄用則久成癰腫者金積加贊者白菴散或理	觀腹痛有塊盤腸者宜香飲子通乳二陳湯以調香如青皮痛海核丸血或理	病痛者加大七氣湯加炒牽牛痛○通乳二陳湯以調香如青皮痛海核丸血或理	獨氣芥潤以木香油香川線白通乳二陳湯以調香如青皮痛海核丸血或理	湯飲下柴胡青皮香附行氣連芩朮皮附火木病逐合四流湯更以調香散常十四散平長砂聖	橘核散下辛溫散氣白溫散之劑五炒煎丸炒散煉丸金鈴丸四味尚香散古用竭散長砂聖	近代用針
--	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------

腳氣

脚氣須知有濕乾初起內經名兩漢石緩句月月初病不覺因他濕者筋發或奄長而軟或浮腫或生全類傷之

類謂之濕脚氣宜利濕疏風之乾即熱也乾者清房成濕熱之氣發于四肢或腫或痛或痺或

脉跳縮攣痛枯細不腫謂之乾脚氣宜利濕疏風之乾即熱也乾者清房成濕熱之氣發于四肢或腫或痛或痺或

四肢多冷如立濕地或箕取涼出汗洗足後夏月為木濕氣發于四肢或腫或痛或痺或

四久坐冷如立濕地或箕取涼出汗洗足後夏月為木濕氣發于四肢或腫或痛或痺或

察其起處濕勝腫冷寒勝痛濕勝腫冷寒勝痛濕勝腫冷寒勝痛

常烏藥黃連散酒丸○濕勝腫冷寒勝痛濕勝腫冷寒勝痛

原熱則腫痛異常加味蒼柏散二炒蒼柏散

清燥湯○食積濕痰加味蒼柏散二炒蒼柏散

妙丸搜風順氣丸○食積濕痰加味蒼柏散二炒蒼柏散

凡去地黃白芍丸○食積濕痰加味蒼柏散二炒蒼柏散

升之衝上降凡濕氣在下者宜用流注之藥

調望湧泉穴○食積濕痰加味蒼柏散二炒蒼柏散

加砂之仁青皮木瓜外用挑乃柳桑槐火楮也五枝煎入湯洗丸散腫有任痛須先藥者慈

入經絡治神以表汗粟下任湯丸左濕熱流注三陰經絡火辨成毒腫上于三陽寒熱巨惡身痛且重者

丸乃忍冬藤婦人加當歸三花神祐丸扶食積者開結導飲丸裏閉者活寄生羌活歸脾丸表裏兼見者左

經黃加跟痛轉筋背血熱亦有痰火及風寒加木瓜煎酒服而作有又當上生一孔約深半寸至下半丹

大花有筋動手足大指上一錢慢至大結存性為未每錢木瓜煎酒服而作有又當上生一孔約深半寸至下半丹

當用者此濕毒注成瘡口

燥類

消渴

消渴先明氣血分經曰二陽結謂之消渴二陽者手陽明大腸主津液外或傳裏或服食津血不足發為消

渴氣冷或病後胃虛津液或熱其熱也乾渴喜飲熱湯自止與甘溫平劑者以滋陰除熱神耗散而

止矣總是大灸不必問被消者或熱也如煎燒血物凝滯者能食者未便數者四物湯中升麻葛根湯

火皆危上消引飲便如常熱在黃心肺煩渴舌赤唇紅汁能食者飲白便數者四物湯中升麻葛根湯

心腹為飲又滿者忍冬湯九黃消六冬湯飲元散中消善饑無尿糞熱赤數大便硬者四物湯中升麻葛根湯

分瘦為癯又滿者忍冬湯九黃消六冬湯飲元散中消善饑無尿糞熱赤數大便硬者四物湯中升麻葛根湯

有飲其心火乘脾者消渴火熱甚者調胃承氣湯便閉者當病寒中消善饑無尿糞熱赤數大便硬者四物湯中升麻葛根湯

下五焦分精渴引水自致隨水即下或小便頻數如膏淋或去桂倍黃加知母黃柏子玄鹿角心

夢授王補心丹或喜丸妙香散單氣既虛石氣獨留陽道與強不交精泄者加知母黃柏子玄鹿角心

或甜白或渴而且利或渴而不結或白不渴而利或食不化或如肺滋腎脾自運治渴初宜養脾蓋本

渴則津液自生或乾也色白而身腫亦津液所為未水腫病者凡水也凡渴者少也凡渴者少也凡渴者少也

生足半夏燥也。抑乾也。能入身腫亦津液所為未水腫病者凡水也凡渴者少也凡渴者少也凡渴者少也

上海校經山房石印

令磨口出
水而死

燥結

燥結雨字亦有辨燥有風燥熱燥火燥氣血虛燥燥門結有能食肺實數者燥潤結通無後患燥
 不足辛以酒之結屬大陰其再結再通愈傷元氣濕鬱脹滿熱有時凡燥結者心腹脹滿有虫積者積
 後仍服潤血生津之劑免其再結再通愈傷元氣濕鬱脹滿熱有時凡燥結者心腹脹滿有虫積者積
 有藥石毒者大小便閉氣脹如鼓者白虎湯津少臟寒七情貫津少因發汗利小便過多及產後失血等
 合三黃湯飲食毒者香連陳皮胃火者白虎湯津少臟寒七情貫津少因發汗利小便過多及產後失血等
 導瀉通淋加指毒者香連陳皮胃火者白虎湯津少臟寒七情貫津少因發汗利小便過多及產後失血等
 血枯通淋加指毒者香連陳皮胃火者白虎湯津少臟寒七情貫津少因發汗利小便過多及產後失血等
 者與潤劑微通大便不令閉結○七情難者換桃杏仁○通者六磨湯如麻子仁湯或蘇子仁湯或
 寒用陳皮杏仁等分蜜丸服之香連陳皮胃火者白虎湯津少臟寒七情貫津少因發汗利小便過多及產後失血等
 症胃強物者二黃丸有脾胃火者酒脾丸流氣無遲憂肺子與大腸或蘇子仁湯或蘇子仁湯或蘇子仁湯
 金耗則脾失化尤宜滋陰養血在西北肺實者以胸結而大便難可也脾約凡氣血虛者潤燥為主○通用
 冷熱法煉膠

火類

脇痛

脇痛本是肝家病腹痛引小宜分左右審實虛左右者陰陽之道路也左肝陽血陰右肺陰氣陽胃者肝氣

或吳去桂如山木香青皮虛甚成損筋下常一點痛不止或外感風邪皆合肝火動脈痛如古黃連散積聚者桃

氣馮或後發者是小柴胡湯或四物湯加小柴胡紅花乳木生地外者用紫菀散積聚者桃

七情居食積渴加南星蒼朮川芎柴胡白芥子或入青煎少許姜汁和二○痰甚者用丹肝經喘咳引痛者

清痰潤肺如瓜蒌潤肺丸○飯水停滯分氣茶飲流氣飲子調中瀉積丸者散甚者連乳痛者五錢如壅

散一逆氣丸素有鬱者趨趨丸

散一逆氣丸素有鬱者趨趨丸

或前服○外感腹痛寒熱久成積還有餘腸痛二三年不已者乃痰疾結成積塊肝積肥氣肺積息賁者小柴胡加枳椇詳傷寒元通聖散附錄方

夢遺

夢遺之病全屬心交感之精雖常有一點白膜裹藏于腎而元精以為此精之本者實在乎心相火一動走精金入身之精貴于難入初因君精中多氣紅絲令濁于精元視之一于走見後不固身連連日亦不秋宜救陰不信無夢而遺者念頭將動精先沉氣宜降情宜升心一動精隨念去凝便出或久則莖中拜痛久腎氣丸不物道尤甚宜單解日久無底水虧火益燥淋瀝脾胃濕熱亦相侵濕熱夫權而相火乘脾陰少運飲食易於侵犯宜樽酒氣也固命根也中而水不妄靜故遺而滑也宜補陰藥中飲酒厚味是濕熱內攝中氣不清所化之精亦皆濁氣輝于腎中而水不妄靜故遺而滑也宜補陰藥中飲酒厚味是濕熱精以升胃中氣不清所化之精亦皆濁氣輝于腎中而水不妄靜故遺而滑也宜補陰藥中飲酒厚味是濕熱精如早年從青氣更宜歸飲食也養生者味之固精有年高陽虛脫者榮湯加減吞單膠皮丸或小便線子黑如丹年從青氣更宜歸飲食也養生者味之固精有年高陽虛脫者榮湯加減吞單膠皮丸或小便線子無形過可見精乃一時交感三焦之火吸撮而成豈先有善精于中耶惟節色氣血漸盛而精不流為精其出者謂之白淫蓋腎藏于天或見色事至單黃柏丸最妙服藥海陰戒酒色清心先要斷真淫亦有精固去思者居室太甚宜戒于淫漏而不振也單黃柏丸最妙服藥海陰戒酒色清心先要斷真淫亦有精對景忘情實際但好色種子復思手淫在不免有時發或淫蒸砂飯不成養生者慎之通用單五味子膏金真丸周補丸單非子散成喜丸石蓮散金櫻丸

淋

五淋氣血石膏夢淋小便澀痛欲去不去又來滴瀝不斷氣淋澀滯餘瀝不盡或厚元散黃湯單車前飲四物湯加香木香檳榔○血淋瀝痛遇熱則發白濁赤芍等分末酒調服石牛膝或單苦黃煎脫火也五淋散又有一種小便便見血而痛者為溺血非淋也四物湯加山梔骨石牛膝或單苦黃煎飲豆一尺廿粒甘草煎一○水煎熱入滑石末一錢單半調服酒調服引氣血凝滯如清痛墜及透石羔湯痛者六二錢如木香檳榔小茴各一錢為末服淋瀝引氣血凝滯如清痛散

上海校經山房石印

便瀝致致中腫痛土附散二木散。淋皆屬熱間有冷者外因雷風取涼暑濕熱滯於內痰痺神不
 應用內因七情心腎氣鬱小腸膀胱不利或忿怒房勞忍溺酒肉濕熱下流膀胱腎干於肝經臟腑結切不
 則熱淋血淋久則火燥為渴不渴開差釐毫熱在上焦氣分濕而小便不利者上源清熱飲子熱在下焦
 砂石淋如湯鑽煎久生燥渴不渴開差釐毫熱在上焦氣分濕而小便不利者上源清熱飲子熱在下焦
 血分不渴而小便不利者腎與膀胱無陰而陽氣不化水枯火升宜氣味俱陰之藥除熱瀉閉以分有不
 下源淋渴而多汗亡清熱利便人人曉治暑熱淋血故水亦枯火升宜氣味俱陰之藥除熱瀉閉以分有不
 渴者但不可輕瀉也清熱利便人人曉治暑熱淋血故水亦枯火升宜氣味俱陰之藥除熱瀉閉以分有不
 津又未可以輕瀉也清熱利便人人曉治暑熱淋血故水亦枯火升宜氣味俱陰之藥除熱瀉閉以分有不
 氣滿黃牛膝破血黃柏生地滑石小麥冬凡小腸溢脹脾經瀉凡小腹脹滿甚者瀉腎青皮木香丹
 痛用青皮陳肝黃柏生地滑石小麥冬凡小腸溢脹脾經瀉凡小腹脹滿甚者瀉腎青皮木香丹
 熱冬寒痛竹葉陳水六君子湯加滑石草薤瀉腎
 門冬寒痛竹葉陳水六君子湯加滑石草薤瀉腎
 背者麻石湯虛者清者參苓朮朮湯清肝益榮瀉腎
 清味脾肺以滋潤腎者死便短而黃者清肺中痰氣瀉如夢門冬五淋腎丸山藥便瀉而黃者四病者加減八味丸
 散加車前子牛膝前服若婦女老已竭而復其之則大小便中其精則愈不愈則出內飲大並小愈則愈則愈則愈則愈
 利淡之此當既化源真陽不可損用陰中虛總難利膀胱小便中其精則愈不愈則出內飲大並小愈則愈則愈則愈
 使時全為水之化源也木通系轉尿前下併炒益痛小便不通名曰轉尿者先因熱逼也蓋閉則下氣逆
 轉小腹外腎肚門拭乾伸脚仰臥用葵子赤茯苓中益氣湯等提分陰虛者尺脈調蘇合香丸服之藥不効
 尿疾走及尿尿飽食者二陳湯仰臥用葵子赤茯苓中益氣湯等提分陰虛者尺脈調蘇合香丸服之藥不効
 服此危症也休薄性急人多有之姪孕婦等分極人前

小便不通

小便不通本實熱也然腎應于心為癰候其鼻頭色黃者小便必難腎主水儲于膀胱泄于小腸實物
 清熱生津為主單起補散五苓散利大便行服者如琥珀或單琥珀末香熱人參從益者則小便閉絕無宜
 子自熱汁入蜜一匙補散五苓散利大便行服者如琥珀或單琥珀末香熱人參從益者則小便閉絕無宜
 大黃或附子仁有虛有痰有氣結虛損久病自汗丸有胃弱不能通者八物湯下多者人參從益者則小便閉絕無宜
 丸冷熱附法有虛有痰有氣結虛損久病自汗丸有胃弱不能通者八物湯下多者人參從益者則小便閉絕無宜
 渴加黃芪升麻有脾枯亡血及勞傷血虛者四物湯香氣血俱虛者八物湯下多者人參從益者則小便閉絕無宜
 渴加黃芪升麻有脾枯亡血及勞傷血虛者四物湯香氣血俱虛者八物湯下多者人參從益者則小便閉絕無宜

補中益酒客分消與調中飲酒與水遇者宜上汗下滲分消其濕葛花解醒湯銀汁即愈漆刺五苓散調
 氣湯如鴛酒嚼逆眩暈頭痛如破者補中益氣去白朮加半夏白芍芩芍柏乾葛川芎有塊者更加我水時痛者
 善飲每早長愛不吐者小調中湯最妙一月三五次服之亦可為丸如醉能行勞以致善血胃木香者
 大調中湯或八物湯加砂仁之類有塊飲不醉忽補血出前厥厥血出後發星木丸憂思抑鬱藥毒不思飲食
 者四物湯加海金沙香檳榔木通桃仁散服丸服全不食者溫肺湯神必憂思抑鬱藥毒不思飲食
 瘦者清六抑不食者二炒蒼柏散如香附白芍陳皮半夏黃連扁柏等分白朮為君姜汁食者木香化滯
 不食者三補丸
 如蒼朮倍香附

積聚

五積六聚皆屬脾經曰積聚癥瘕滿皆太陰濕土之氣如因外感內傷氣鬱醫誤補而留之以成積
 有痛與血隨氣不積者陰氣五臟所主脾積而左伏若言如根痛有常處肝積左脇下曰肥氣言風氣
 熱藥與血隨氣不積者陰氣五臟所主脾積而左伏若言如根痛有常處肝積左脇下曰肥氣言風氣
 於小腹或委心下曰奔豚言若奔之奔騰時下曰息言喘息奔而上行也令氣言陽氣為濕所蓄也令

氣積沉結不去或奔豚見發無根痛無處散聚湯七氣湯香枝丸更妙阿魏丸大安丸加參所左右中間不移
 氣不能作塊或聚塊乃發無根痛無處散聚湯七氣湯香枝丸更妙阿魏丸大安丸加參所左右中間不移
 曰癥言堅硬自固也或有或無或上或下或左或右者曰癥言聚血而成蟲毒之形且有活結者左死血

今右氣積治左破血為主海石丸或當歸龍骨散膏丸料五錢阿魏丸或當歸龍骨丸保和丸治右氣積初為寒宜半
 中痰結一團而丸凡瘕塊在皮裏膜外宜七情散紅丸或桃仁或當歸龍骨丸保和丸治右氣積初為寒宜半
 湯烏白丸大小溫中丸退黃丸阿魏丸或當歸龍骨丸保和丸治右氣積初為寒宜半

陽虛有積易治通陰虛難化若瘕積又忌藥丸外宜辛寒雅德木香檳榔丸通玄不足平補是上醫
 大便丸或醋漿丸善消融化為妙若瘕積又忌藥丸外宜辛寒雅德木香檳榔丸通玄不足平補是上醫
 久則病積益甚真氣陽而陰血燥矣但確附固不可補之如枳實門冬寒涼節色越氣暴怒正思慮厚千萬全

半而止又云養正情自除皆在虛損有積而言也平補之外如枳實門冬寒涼節色越氣暴怒正思慮厚千萬全
 中蠱害人俗不妍據方書蠱有數種皆候其間一物獨存者則以酒肉祭之取出放毒于酒中或以害

毒發令人面青黃力乏身痛吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱
 行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱

中蠱害人俗不妍據方書蠱有數種皆候其間一物獨存者則以酒肉祭之取出放毒于酒中或以害
 行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱

行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱
 行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱

行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱
 行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱

行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱
 行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱

行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱
 行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱

行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱
 行病人所食之物皆變化為虫便吐衄飲食不化死則病氣流注乾燥胸膈妨礙痛如蟲食又如蠱

力致高不知有此事否萬病解丹東坡雄碧丸主之或于足小指尖處又三壯即有物出酒飯得之隨
酒飲出肉菜得之隨肉菜出凡中盡毒不論年月遠近或于衣領中遇毒則其毒則非也又法口含大豆
含一飯項取出視之釵印俱黑即為中毒一法令子置衣領中遇毒則其毒則非也又法口含大豆
厚烟而皮脫者更盡否則亦非也如出外酒用預知子置衣領中遇毒則其毒則非也又法口含大豆
則飲氣食永不得盡復生若欲食能救更有挑生及毒泉嶺于害于人有其候初覺內腹作痛則清茶漱之
日用則物生能動行上米湯調服下腹痛在後以四君子湯去其分入熱茶內服化通口生痛之探下
者用掛金末二錢冷熱水調服下腹痛在後以四君子湯去其分入熱茶內服化通口生痛之探下
工丹麻末二錢冷熱水調服下腹痛在後以四君子湯去其分入熱茶內服化通口生痛之探下
人則入皮裏痛如針刺是三者為病初起時手足冷至肘膝又頭沙風細中如生蟲食人下則行中
痛也則入皮裏痛如針刺是三者為病初起時手足冷至肘膝又頭沙風細中如生蟲食人下則行中
日分內水焦解兩廣山峻水是地濕熱如春秋時加外感毒北胡枳木煎服微汗取止方只傷表而食得者
溫分內水焦解兩廣山峻水是地濕熱如春秋時加外感毒北胡枳木煎服微汗取止方只傷表而食得者
同宜表解清熱行疾降氣不換金正氣散加北胡枳木煎服微汗取止方只傷表而食得者
俱以平胃散為主湯承氣湯三黃湯合竹葉石羔湯或扶黃枳朮丸一粒不服水土與瘴同源山洋堅水
色及食魚肉時新菜兼生飲加減或油炒黃疸瘧疾俱于各類求之熱則以扶脾胃為本尺蠖酒
買行外宜空節飲食謹起居以官商

氣類

氣滯此即諸氣專抽氣
氣滯一詳言之耳

氣滯不行辨久新濕熱痰積是其因
氣滯天血之氣清淨不
變為雷而者山澤濕熱
煎蒸也人身元

氣滯初起宜辛溫開鬱行氣
痛等症積久則宜辛寒
降火以溫熱成疾帶隔
滯下痰氣滿積滯為積
痰

氣滯初起宜辛溫開鬱行氣
痛等症積久則宜辛寒
降火以溫熱成疾帶隔
滯下痰氣滿積滯為積
痰

氣滯初起宜辛溫開鬱行氣
痛等症積久則宜辛寒
降火以溫熱成疾帶隔
滯下痰氣滿積滯為積
痰

氣滯初起宜辛溫開鬱行氣
痛等症積久則宜辛寒
降火以溫熱成疾帶隔
滯下痰氣滿積滯為積
痰

氣滯初起宜辛溫開鬱行氣
痛等症積久則宜辛寒
降火以溫熱成疾帶隔
滯下痰氣滿積滯為積
痰

青皮破滯要約多服養血補虛同婦人男子虛勞失血及婦人產後因氣者四物湯加木香換柳陰虛損人真氣虛者慎之

兩喉而痛或一塊如卵築心平時性急適中塊物行氣填胸膈嘔逆全不入食食則吐痰或能行一塊便

白濁帶下通流瘦弱全似虛勞若穀食便香附仁子焦如厚朴枳實三棱莪朮下焦加青皮木香換柳

湯主之加山梔香附痞滿加黃連枳實火黃連加瓜蒌肝火加柴胡思動脾火加芍藥龍膽刺痛肺火加黃芩

烏鈞香附氣虛加參朮木香喜動心火加黃連瓜蒌肝火加柴胡思動脾火加芍藥龍膽刺痛肺火加黃芩

動腎火加黃柏成掛一不解者煎吞文感丹

血類

吐血此即諸血持

吐血屬胃審陰陽或身熱陰或涼內傷外感及飲食房勞墜悶五臟有傷血聚脈間從胃脫出者則為

涼者陽多積熱并怒火陽或身熱陰或涼內傷外感及飲食房勞墜悶五臟有傷血聚脈間從胃脫出者則為

香重便或芽根煎湯磨細香服之香重便或芽根煎湯磨細香服之香重便或芽根煎湯磨細香服之

命散陰為心力暴勞傷陰或前胡姜棗煎服或用鮮紅心腹絞痛自汗者四君子湯加黃芪柴胡山藥相

食為守氣逆上吐物者謂理中湯加木香胃寒也外症約血有虛冷之狀姜湯或七氣湯加川芎歸經絡不通者

古桂附湯下虛極而氣壅喘嗽血不歸元者黑錫丹全液丹心勞力傷令脾內有血塊者茯苓歸經散

如心脾脈破下血若湧泉口鼻俱出者不歸元者黑錫丹全液丹心勞力傷令脾內有血塊者茯苓歸經散

湯凡血越上痰多是以痰飲神有升者不歸元者黑錫丹全液丹心勞力傷令脾內有血塊者茯苓歸經散

先痰帶血皆痰熱山花枯化痰止陽熱涼血與行氣陰虛補滋自歸藏血

不可單行皮單止益血來多火動四病也諸病者多胃中痰火則止陽熱涼血與行氣陰虛補滋自歸藏血

味行氣開鬱為臣升提俾復其位有痰于胸膈痰止先積源而後涼血熱則行宜苦寒涼血為君辛

或單用炒乾參苓白朮散調服善清積熱痰止先積源而後涼血熱則行宜苦寒涼血為君辛

并運血燥元參苓白朮散調服善清積熱痰止先積源而後涼血熱則行宜苦寒涼血為君辛

或單用炒乾參苓白朮散調服善清積熱痰止先積源而後涼血熱則行宜苦寒涼血為君辛

瘵成矣勞傷誤用寒藥則胸滿脇痛血愈鬱矣墜墜悶挫誤行補益則痰蓄于胃心下脹滿
食下即吐石曰血逆古法以二陳湯去茯苓甘草加赤芍等分救之此血疾難綱最宜詳酌

嘔血

嘔血與吐無大異或成空無聲者為嘔怒人暴甚不可當怒氣逆甚血溢口鼻當神起全
甘桔湯加參試地刺芥黃柏水煎入童便非汁姜 血虛熱熾滋降良湯主之
汁對金少許或單黃柏蜜汁為末麥門冬煎湯下

衄血

衄血熱溢肺與胃肺竅於鼻鼻通於腦血上溢于腦又行清道所以從鼻而出兼以陽明熱鬱
吐同古人方初宜黃芩流涕加餅金或芍藥散或犀角地黃湯尺切勿欲茵梅丸去天恐膠急用百草霜
末三錢水調服四取一匙吹鼻中或用人中白末湯調服更如髮入則之如吐衄太或不止少許搗鼻立止或
村患人頭髮分間井水濕帶面上搽之亦好如鼻乾唇以麻油滴入則之如吐衄太或不止少許搗鼻立止或
上根燒酒將醋酒之今鼻噴氣以過其勢或驚然以水噴面使帶覺則諸般血藥不能止必熱氣鬱血無
止此法非特衄血雖上吐下便九竅出血者亦效止後隨症虛實調之諸般血藥不能止必熱氣鬱血無
藏涼血散火約不動者古方
芍散燥者單天門冬膏

嗽唾咯

救痰帶血本脾經虛者六君子湯加桑白皮黃芩枳 有咳屬肺恐難咳大并痰或身熱者龍腦雞蘇丸雞
阿膠丸虛者二陳芍歸湯八物湯或二陳湯加蘇桂柔白皮杏仁桔梗如母貝母 血隨唾出自腎來降火
阿膠生地山杞蓋嫩桂枝紅綠乃魚故也愈後調理宜霜膏咳血咽膈者不治 血隨唾出自腎來降火
湯痰血聚肺火相煽是肺痿難治咯出血屑瘵為咯血或帶紅絲細如線有血在咽下咯不出者甚咯則
竹瀝姜汁重便青黛或聖餅子地黃青蓄 此是肺腎真臟傷滋陰降火非偏見
血在上閉塞清道喜忘者犀角地黃湯

溺血

溺血純血全不痛血從精竅中來乃心移熱下腸四物湯加山杞苓連單 暴熱實熱利之宜暴起熱者山
眼實熱者承氣湯加當歸下膈半量淡苦酒湯下單苦菜飲單噴喉散 暴熱實熱利之宜暴起熱者山
溺血熱者承氣湯加當歸下膈半量淡苦酒湯下單苦菜飲單噴喉散 暴熱實熱利之宜暴起熱者山
物渴如山杞牛膝或單牛膝房勞傷精火動消血者膠艾四物湯腎氣丸小兒免絲子丸虛其病久者鹿角
膠丸秋石固真丸金櫻膏病不可及者單豆豉一撮煎湯溫服甚效此疾日久中乾非清心靜養不可救也

便血

便血須先分內外。自外感得者，乃白濁風隨感隨見。所以色鮮多血，在前也。又有大便氣分來者，自內傷得者，曰便血。居陰結二升三陰結三房或生冷，即化五臟則三陰脈絡不和，而病道皆因大腸經口結陰便血起一非陰寒之謂也。針經風清熱紅，其則為寒。暗毒濁濕，不痛。此屬外感風

下青鮮血用黃人參。跌毒散，加柳花青刺等分。水煎服。加大黃有瘀血者，桃仁承氣湯。○寒者色黯平胃散合

理中湯，加葛根升麻。益智神。當歸地榆。姜棗煎服。○毒者病邪，短入泄，後重。○四注。○加木香。○

柳白栝丸。濕兼熱者，古連。○濕者直來，不濕。○癰血箭，最難除。少陰風，○風，○病，○短，○入，○泄，○後，○重，○四，○注，○加，○木，○香，○

痛。○色紫黑者，濕毒甚也。○升陽除濕。○初起，○濕熱，○或當發。○長，○或補。○中，○益，○氣，○和，○血，○散，○涼，○血，○箭，○丸，○

傷食積糟粕。○混。○內傷。○飲食。○腹。○必。○脹。○滿。○相。○與。○六。○血。○同。○來。○平。○胃。○散。○補。○中。○益。○氣。○和。○血。○散。○涼。○血。○箭。○丸。○

元氣下陷者，補中益氣湯。○既。○虛。○者。○補。○附。○丹。○內。○傷。○中。○氣。○虛。○弱。○者。○四。○君。○子。○湯。○或。○乾。○姜。○人。○參。○湯。○加。○炒。○甘。○姜。○少。○許。○古

痛。○內。○傷。○脈。○絡。○下。○血。○者。○道。○連。○殼。○丸。○虛。○者。○禁。○附。○丹。○內。○傷。○中。○氣。○虛。○弱。○者。○四。○君。○子。○湯。○或。○乾。○姜。○人。○參。○湯。○加。○炒。○甘。○姜。○少。○許。○古

連。○二。○味。○須。○用。○和。○妙。○各。○揀。○出。○若。○生。○則。○偏。○寒。○偏。○熱。○久。○初。○起。○和。○血。○祛。○風。○濕。○丸。○當。○歸。○湯。○或。○乾。○姜。○人。○參。○湯。○加。○炒。○甘。○姜。○少。○許。○古

小。○料。○毒。○加。○槐。○花。○栝。○葉。○別。○芥。○風。○加。○柏。○葉。○沙。○風。○刺。○楸。○槐。○花。○皮。○黃。○芩。○地。○榆。○枳。○殼。○甘。○草。○久。○者。○加。○味。○槐。○角。○丸。○四。○物。○

血。○俱。○不。○可。○純。○用。○涼。○香。○附。○子。○或。○單。○香。○附。○丸。○又。○古。○芍。○藥。○湯。○調。○血。○上。○品。○熱。○加。○淡。○菴。○花。○令。○加。○姜。○溫。○熱。○加。○蒼。○朮。○香。○凡。○大。○小。○便。○

補。○中。○益。○氣。○湯。○散。○三。○方。○合。○服。○厚。○朴。○煎。○末。○中。○氣。○虛。○弱。○者。○四。○君。○子。○湯。○或。○乾。○姜。○人。○參。○湯。○加。○炒。○甘。○姜。○少。○許。○古

飲。○下。○亦。○好。○燕。○益。○蝕。○傷。○腸。○口。○滴。○血。○淋。○瀉。○當。○以。○蕪。○荑。○艾。○葉。○之。○苦。○練。○根。○等。○化。○或。○射。○或。○骨。○實。○之。○內。○服。○黑。○玉。○丹。

疾類

喘

醫學入門 卷四 二五

惡心欲吐不得吐一見飲食心便惡二陳湯加白豆不渴胃虛與胃寒胃寒理中湯加陳皮半夏生薑各
加炒姜汁煩渴胃家痰火聚痰或者大小半夏湯火或者二陳
黃連少許煩渴胃家痰火聚湯加姜汁炒芍連如暈惡心治同

嘈雜

心嘈似饑又煩嘔心非飢非飽或兼噯氣痞滿惡食多憂痰火合
九聖丸者大安丸保和丸憂辨者越婢丸香連丹潤痰氣鬱不喜食者三補丸加蒼朮連香附索食者
三聖丸痰因火動者治痰五更嘈者思慮傷血分稍虧宜接四物湯加香附
其痰者二陳湯加姜炒芍連法施火丸五更嘈者思慮傷血分稍虧宜接四物湯加香附
更加撮芎蒼朮痰火俱成者法施火丸

噯氣

噯轉食氣石噯氣有痰有大滯於胃宜法疾火丸潤下丸古交連丸實噯食罷噯方
噯轉多傷食濕熱所致二陳湯加蒼虛噯濁氣填胸次能復噯六君子湯加沉香為君厚朴蘇子為臣吳
木神抽李芽姜炒黃連或保和丸
香丸甚使若靈砂以鎮壓之

嘔吐

嘔吐須知胃冷熱大藥肥白肉浮多寒濕瘦黑骨露多燥熱更參脈症
嘔連山扼暴甚器加檳榔木香胃口痛加姜汁或薑根竹茹湯加味橘皮竹茹湯或山柰神曲麥芽乾茹
時常口吐清水冷涎自下湧上者此脾熱所致也二陳湯加白朮白芍升麻炒芍連或山柰神曲麥芽乾茹
姜等分或次分三焦有妙括眩暈不食氣上攻上魚吐者香藿香枯梗杷葉或七氣湯熱氣衝者古
丸或煎服胸滿酸悶食作孽中焦吐者食積氣滯或先吐而後痛或先痛而後吐
山查神厥冷下焦停有寒下焦吐者寒也胡食藉通其氣丸酒候尋常平胃散利大便不通乃陰氣偏結
理中湯四逆湯用古半碗三陽熱壅大便結小腸勝脫也如熱者大柴胡湯腹中痛甚而大便
火不己水怔忡吐痰火為多二陳湯加姜炒芍連血脈氣聚于經中所謂嘔家
痰涎水入即吐者五苓散腫脹心多痰血聚于經中所謂嘔家

盡自能四物湯結赤茯苓 容氣翻暑渴煩 風邪在胃 額額 不定或攪 酸水全不入 食者不換 金正氣 丹皮虛者未起土也方致用六君子湯 加青皮芍藥 天湯安脾丸不宜 輕用 參水熱者小柴胡湯 如青黛薑汁煎為丸服 暑吐煩渴 黃連香薷散 六一散 薄荷湯 或四君子湯 去茯苓 加香附 麥冬 氣虛痞 滿蟲痛 切短氣者 中益氣湯 胃虛寒 疾作 增半湯 或時常 憂心 胃口作痛 吐清水 得食暫 止飢則甚 胃中死此是乍然 嘔吐非細 胃比也 白未烏梅 或用 湯飲水者 多死 惟分 最妙 凡吐如青菜汁者 有此是

飢逆

飢逆分不足有餘

不足因內傷脾胃及大病後胃弱多面青肢冷便軟有餘因外不足 炎陰氣虛 元氣 感胃燥及大怒太飽多而紅肢熱便閉有餘可治 不足者危

之賦人之陰氣 滯胃氣而養胃土 受傷則水氣侵之 陰火所乘 不得內守 木扶相火直衝清道而上 乃 之甚也 青稞濕熱者 十味小柴胡湯 吞軍黃柏丸 或稠益元散 胃大善食者 小半夏湯 加山梔黃芩 吐 婦人產後益氣湯 或合生散 胎分黃相 皆宜 少許 久病寒搏火為毒 吐極是危 症脈數為人 刺金必死 凡傷寒 者 補中益氣湯 或生肌散 黃柏 皆宜 少許 久病寒搏火為毒 吐極是危 症脈數為人 刺金必死 凡傷寒 扶房勞者 境王膏 腎氣不歸 尿者 九味安腎丸 許 久病寒搏火為毒 吐極是危 症脈數為人 刺金必死 凡傷寒 為胃中寒邪所過 故脾而有生 俱宜 丁香柿蒂散 羌活 附子湯 理中湯 倍 有餘飽食 填塞 失升降 如枳 參久者 三香散 或木瓜煎 湯 脾之 中虛昏 脾結者 芩甘草湯 救之 起者 苓連二陳湯 或只陳皮 半夏 仁痰鬱 何由得泰舒 痰閉于上 火動于下 無別 症 忽熱 因怒 鬱熱者 亦宜 益參 虛瀉 補肺 泉氣 降而 汗吐下後 胃效未除 小柴胡湯 加枳皮竹茹 或有餘 湧吐 泄汗 下食 胃效未除 小柴胡湯 加枳皮竹茹 或有餘 湧吐 泄汗 下食 胃效未除 小柴胡湯 加枳皮竹茹 或有餘 湧吐 泄汗 下食

膈噎

三焦枯槁成膈噎 飲食不而下大便不通 膈噎 疏云 膈有拒格 胃即膈 食反胃也 玉機云 噎塞大便 有病因內傷 憂鬱 夫志及飲食 滯下 而動 脾胃 肝腎之痛 須臾 吐出 乃止 責門 即胃脘 口言 衰耗 胃自 枯槁 其槁在上下 焦 責門者 食不能下 下焦 胃脘 當心而痛 須臾 吐出 乃止 責門 即胃脘 口言 衰耗 胃自 奔入于胃 而氣刺傳之 下焦 膈門者 食可下 良久 復出 膈門 即胃脘 口言 衰耗 胃自 胃中 水投自此而入 小腸也 其槁在下 焦 膈門者 食可下 良久 復出 膈門 即胃脘 口言 衰耗 胃自

上海校經山房石印

乃氣血津液流通之道也。陽火上升有虛熱。經曰三陽結謂之關。小腸熱結則津液涸。三陽熱結則血脈燥。大腸熱結則不

閉塞。下既不通。大便反而上行。所以噎食不下。縱下復出。乃腸火上炎。行而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

導滯通幽湯。或益元散。入姜汁。登白脚。為小兒時。服之。乃陽火上升。而不下。降也。一承氣黃連解毒丸。加

關格與嘔吐關噎

關者不通。格者吐逆。嘔者吐也。噎者食不下。此四症皆由胃氣不調。升降失司。故有之。其治法各異。不可不察。

關者不通。格者吐逆。嘔者吐也。噎者食不下。此四症皆由胃氣不調。升降失司。故有之。其治法各異。不可不察。

關者不通。格者吐逆。嘔者吐也。噎者食不下。此四症皆由胃氣不調。升降失司。故有之。其治法各異。不可不察。

關者不通。格者吐逆。嘔者吐也。噎者食不下。此四症皆由胃氣不調。升降失司。故有之。其治法各異。不可不察。

關者不通。格者吐逆。嘔者吐也。噎者食不下。此四症皆由胃氣不調。升降失司。故有之。其治法各異。不可不察。

關者不通。格者吐逆。嘔者吐也。噎者食不下。此四症皆由胃氣不調。升降失司。故有之。其治法各異。不可不察。

症症虛實則剛宜陽補則為剛症多類風症宜清熱化痰祛風陰極則為柔症多類傷寒口噤不醒通身

強身收時醒身強不醒而實則內外皆因扶疾火或外因風邪或內因七情皆左右物後發症

疾身收時醒身強不醒而實則內外皆因扶疾火或外因風邪或內因七情皆左右物後發症

星丸姜汁竹瀝薑汁○風痰則通身麻痺火炎而發轉也火能燥物而使氣流不足宜四物二陳湯如芥

速知相竹瀝薑汁○風痰則通身麻痺火炎而發轉也火能燥物而使氣流不足宜四物二陳湯如芥

大烏藥酒下之仍忌風氣蓋火為實火則胸滿口苦或牙痛風自散不着床大便閉者鬱悶諸虛甚則亡

此等尤不可純用風藥紅日諸症強直絕無風邪反強非風也虛也故又有言曰虛為

本痰火外邪為標氣虛者補中益氣湯加竹瀝或六君子湯如黃芪附子柴胡血

虛者四物湯加防風羌活或大秦朮湯症病比瀉或六君子湯如黃芪附子柴胡血

痲有陰陽只是痰內傷最多外感極少蓋得飲食積為痰火上迷心竅驚恐憂怒則火或神不守舍空

脈沉在裏者陰身熱脈浮在表者陽脈屬六腑易治病先身冷時師何必究五三痲久搐頭昏驚作龍

狀如尸者此五痲病狀偶類之耳其實痰火與鬱三者而已○小兒風痰食三痲見五卷直痰扶火與

驚多必肥人多痰動則有聲沫出風痰星香散加全蠍三枚姜煎服或連風祛痰丸五炒因憂思藥石

散○食散醒脾散○瘦人火或面赤者防風當歸飲或丸因熱中渴如南星或深痰丸五炒因憂思藥石

龍腦安神丸十全龍腦丸○痰火或面赤者防風當歸飲或丸因熱中渴如南星或深痰丸五炒因憂思藥石

虎丹燥燥散控調中補北瀉東南南星本痰熱挾驚宜寒酒下上吐下利去痰疾老疾丸五炒因憂思藥石

平東方之木但化痰火先瀉氣順氣必黃連蘇子吐後必非辛閉目不食後用益黃散補中能食次服腎

皆溫劑又如水化痰火先瀉氣順氣必黃連蘇子吐後必非辛閉目不食後用益黃散補中能食次服腎

顛狂

顛狂痰火閉心室都緣喜怒太無常素問註云多喜為顛多怒為狂喜屬心怒屬肝二經皆火有餘之地

者葉氏清心丸金箔鎮心丸味砂安神丸風驚者抱龍膏清心丸連風法五志者火禁而戒一具為柳

以聖勝之憂傷肺者以喜勝之以怒解之陽明欬結膏柔未陽明發狂見便溺者涼隔散加大黃下之

以上聖勝之憂傷肺者以喜勝之以怒解之陽明欬結膏柔未陽明發狂見便溺者涼隔散加大黃下之

或則血脈不通而中寒陽或則肢理閉塞而外熱仲景謂陽虛陰或宜汗散其陰邪陰虛陽或宜下瀉其陽邪東垣謂盡熱陽氣旺于陽分夜熱陽氣下陷陰中皆名熱入血室重陽者晝夜俱熱反寒陰血旺于陰分晝寒陰氣上溢陽中重陰者晝夜俱寒丹溪謂惡熱非熱明是虛症惡寒非寒明是大症王冰謂熱之不熱是無火也當治其心寒之不寒是無水也當治其腎噫寒熱陰陽虛實醫家大分幸曰公發明經旨善學者必合而玩之始得

汗

自汗 侵 侵 屬 氣 虛 自汗者元陽真液因飲食勞心勞神行動出汗者曰多汗不問昏醒朝夕俱宜宜水炒過以殺其升發之性又欲其引參芪至肌表故不可缺也發亦有疾濕外邪初發自汗陳皮甘草水煎服多汗厥者古法附湯順元散間有氣血俱虛者黃芪建中湯

身耳宜潤心主熱脾主濕濕熱相搏作汗者濕蒸氣散胃熱為二甘鹹皆令有汗獨心與脾胃為濕熱

汗亦多自汗風症桂枝湯加芩上柴胡濕作汗者必外感風宜參蘇飲病止注服是反治也盜汗全是陰

症久用參芪附子不効宜養心血或汗乾仍熱者必外感風宜參蘇飲病止注服是反治也盜汗全是陰

分弱腎火脾濕心勞 睡出汗醒則收蓋睡則胃氣行於裏而表虛醒則氣散于表而汗止心火炎

白木腎火動甚者正氣渴脾濕者四製白朮散肝熱者用防風龍膽草等分為末未飲調服心虛者用

泰當歸各二錢半先用猪心血煮湯澄清以汁煎藥服思慮過度以致心孔獨有汗出者用艾湯調下狀

芩末一錢或青桑第二番葉帶露採陰乾或焙為末末飲調服或古法散通用黃芪六一湯加浮小麥

壯推麻黃根外用五倍子白礬為末津液調封臍中一宿即止或用壯瀉麥麩黃根蒸本糯米防風白

周身拔之未

諸痿不動火剋肺 註曰諸痿皆生于肺熱肺熱葉焦脾弱着足痿雙色白毛枯曰皮痿五臟受之發為諸

於地思色無窮或人房太甚口苦白淫乃肝熱膽津滲也曰筋痿則筋脈乾急蹠學居處卑濕肉不

口渴乃脾熱胃燥也曰肉痿則肌肉麻痺不仁有所勞行大熱而渴則陽氣內伐熱舍于腎水不勝大骨

與空虛色黑齒痛名曰骨痿則腰膝肺傷木旺肢體發痺則火傷則木寡畏而侮土則脾亦為之傷矣脾

廢矣五痿總屬陽明者宗筋之瀉南補北是大經補則心火降清而東方不旺脾不能運用四肢通矣

會也陽明實則宗筋潤而和潤利矣瀉南補北是大經補則心火降清而西方不旺脾不能運用四肢通矣

清燥潤虎潛丸腎氣丸調和慎勿添同風痺治痺乃風寒濕合則心火降清而西方不旺脾不能運用四肢通矣

感宜發散痿屬內傷補血氣血虛者四物湯合生脈散加蒼朮黃柏牛膝五散三散丹又有痰血妨礙者

四物湯加參或兼濕熱或兼疾有濕多者有熱多者有濕熱相半者健步丸同製蒼柏丸疾火又恐食積
求黃柏紅花或兼濕熱或兼疾有濕多者有熱多者有濕熱相半者健步丸同製蒼柏丸疾火又恐食積
妨礙陽明滯減味清燥湯如食五痿旺時病易安隨各臟旺月調補則易開有換寒者五積散天產作陽
升降陽明滯全少者白朮膏
戒厚味助火發熱故也素不能
痰薄者搜風順氣丸

厥症

條參看

厥症不獨手足厥宗筋脾胃合為導內經氣厥者氣逆也凡移寒移熱或伏熱深而振慄或虛寒甚
脈皆輸近宗筋厥則陰縮而四肢令熱厥則手足不榮太陽胸脅足難行經曰巨陽之厥腫而體仆
四肢滿赤而手足熱是六經之厥皆統于肝與脾胃也

地陽明腹滿顛狂發陽明之厥赤而熱疾欲走而妄言少陽耳聾脇肋疼而熱脇痛則暴聾煩腫
作嘔吐利大陰之厥則腹滿腹脹後不得臥少陰心痛口舌乾少陰之厥則心腹脹滿而善嘔吐

脈陰縮腫利好屈又或咽腫咳不寧腸癰項強衄吐血太陰之厥則腹脹而善嘔吐少陰之厥則心腹脹滿而善嘔吐
脈陰縮腫利好屈又或咽腫咳不寧腸癰項強衄吐血太陰之厥則腹脹而善嘔吐少陰之厥則心腹脹滿而善嘔吐

夜身熱死不可治手大陽厥逆身熱善驚汗出項不可以手太陰之厥則腹脹而善嘔吐少陰之厥則心腹脹滿而善嘔吐
使人手足寒三日死後外感寒泣暑相煎寒濕或香散散如姜汁加內傷薄厥疾火挾志氣逆而不下行

則血積于心胸內經謂之薄厥言陰陽相薄氣血奔并而成也宜四君子湯加內傷薄厥疾火挾志氣逆而不下行
則血積于心胸內經謂之薄厥言陰陽相薄氣血奔并而成也宜四君子湯加內傷薄厥疾火挾志氣逆而不下行

散怒多怒怒大吐發厥者乃疾明于上起于下而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁
散怒多怒怒大吐發厥者乃疾明于上起于下而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁

者六君子湯加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁
者六君子湯加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁

山樞竹瀝肥人加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁
山樞竹瀝肥人加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁

也總因酒色陰陽氣熱厥者乃疾明于上起于下而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁
也總因酒色陰陽氣熱厥者乃疾明于上起于下而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁

獨在故手足皆寒宜十全大補湯加附子或當歸四逆湯因陰虛發厥者四君子湯加參連竹瀝姜汁
獨在故手足皆寒宜十全大補湯加附子或當歸四逆湯因陰虛發厥者四君子湯加參連竹瀝姜汁

則色熱厥火加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁
則色熱厥火加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁

則色熱厥火加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁
則色熱厥火加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁

則色熱厥火加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁
則色熱厥火加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁

則色熱厥火加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁
則色熱厥火加參連竹瀝姜汁內傷熱發於外而黃連香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便姜汁

老人無非血液衰 兩腎中間白膜之內一點動氣大如節頭鼓舞變化開闔週身薰蒸三焦化水投外

噴而出涕耳無聲而蟬鳴食口乾寐則淫溼此老人之病也 火動風疾百病摧 陽虛氣倍或兩手脈大紫

使不通或泄瀉則對人睡則獨野惺惺初不可用若寒疎瀉○火症小風症或即風直宜口禁

雖時有煩渴聖藥大症二便閉結但以平調和氣益神如五味子大亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之

病延毒通小便頻數者腎氣去澤潤力者加味補陰丸 亦有脾虛多積滯一若從無虛之